

則身熱口中醜氣乳不消腹中痛 者出痘具正痘形
目胞亦赤呵欠煩悶乍涼乍熱咳嗽噴嚏足稍冷夜臥驚
悸多睡耳尖冷眼澁摠以耳冷尻冷足下冷及耳後有紅
縷赤脉驗之然須見心胸間細點如粟起乃爲真也

看耳筋法

未出之先紫筋者不治急服涼血解毒藥救之

亦有活者大紅者可治水紅者不藥而愈桃紅

者各分輕重治之

治法

或發或瀉或解肌或化毒涼血清肺調其藏府平其

飲食謹其禁忌嚴其揖養適其寒溫使出無不快成無不
加既愈之後不致遺毒流汗虛腠目疾醫膜瘡癩癰瘤喉
閉噤腫潮熱汗泄此大略也凡見出遲發慢者根窠欠紅

活者便當憂慮調治切勿袖手待弊 惟用溫平藥治之

不可妄下及妄攻頻與乳食不受風冷可也溫平者如荆

芥薄荷防風甘草牛蒡之類非熱劑也鼠粘子湯解毒防風湯

選而用之解毒和中安表而已 有大熱者宜利小使用

導赤散四苓散有小熱者宜解毒用消毒飲四聖散

日數 除初熱三日不算蓋有熱發三五日或十餘日故也

自報痘至收靨首尾十二日中間有不守禁戒以至淹纏

又有氣血和者不及十二日即愈 痘屬虛寒者十數日

後方死屬毒甚紫黑者不過七八日死蓋毒不能出過六

日死屬毒甚紫黑者不過七八日死蓋毒不能出過六

六日以

煩悶者肝也時發驚悸者心也乍涼乍熱手足冷者脾也

面與頤頰赤咳嗽噴嚏者肺也惟腎無候以其在下也

發熱似傷寒不辨疑似間且與升麻葛根湯參蘇飲加味

敗毒散 方俱在後

熱甚發驚用薄荷湯化下抱龍丸 發熱

欲出痘作腰痛者急服神解湯出汗以腰痛止為度免出

腎經之痘 發熱之初急宜表汗使邪毒汗散則痘出稀

少然表藥必在紅點未見之先乃可用也 傷寒瘡疹疫

癘潮熱五日已衰疑似未辨者宜用四物解肌湯五日已

內發出即出五日已外無者非痘也

發熱吉凶 身無大熱腹雖痛而腰不痛過三日後纔見紅

點堅硬碍指者不須服藥 發熱時一日遍身卽生紅點稠密如蚕種樣摸過不碍手者凶頭面上有一片色如胭脂者凶

照痘法 以紙撚蘸清油燃火照之凡燈光影與痘根圓暈相爲周旋根窠紅活漿影深厚則皆可調治若根窠不起不紅血死不活漿無影者雖輕難治故白日亦必用麻油紙撚照之全在眼法神巧又以手指摩面頰如紅色隨手轉白隨白轉紅則血活而生意在矣如指之太白舉之不紅是爲血枯雖輕勿治又看目睛神光瞭然口唇尖上紅活如常無燥白之色乃吉

報痘 熱甚煩躁悶亂喘急不食一齊突出紅紫黑色難治
報痘時煩躁腹痛腰大痛口臭出紫點或青癍者死

報痘時色白皮薄而光根窠全無紅色或根帶一點紅三五
日卽長如菘豆大此決不能灌漿後泡清水擦破而死

報痘時全不起頂又頂如湯泡及燈草燒之狀十日痒塌死
報痘時起紅班如錦紋者六日死 遍身如蛇皮者死 黑班如

瘡狀肌肉成塊黑色者卽日死

色紅紫焦枯貼肉不起皮厚而黑者名鐵甲痘八九日死

出痘三朝 發熱一日卽出痘者大重二日卽出痘者亦重

微微發熱三日後乃出痘者爲輕四五日身涼乃見痘者

尤輕自出痘一日至二三日方齊凡痘出至足謂之出齊
如發熱過三日瘡不出或不快出卽微發之用消毒飲化毒
湯犀角消毒飲如瘡發後不多出卽加藥發之
如一日二
三服可也
如加藥發後不多出卽其痘本稀不可再發也

如出速且密胸背尤多此毒盛也急服消毒飲解毒防風湯
以防青乾黑陷 出甚而內外壅熱煩渴謔狂用猪尾膏
年壯皮厚痘難快出用透肌湯 痘出而被風寒復入者用

加味四聖散或快癍散 凡出痘不快宜四聖散加味四

聖散紫草飲及絲瓜湯之類一發便密如針頭形勢重者

連翹升麻湯

瘡稠密身表熱急服鼠粘子湯防其

乾青
黑陷

痘出太盛恐入眼爲害宜消毒飲加苓連

酒炒外煎

曰飛痘此最輕或只此一痘再不生痘

出痘時吉凶 痘出如粟米大或如菉豆大似水珠光澤明

淨者吉 痘一出卽變黑者腎症也保元湯加紫草紅花

救之 痘出紅赤以手摸過皮軟不碍指者名曰賊痘過

三日變成水泡急以保元湯加紫草蟬壳紅花救之已成

水泡用保元湯加四苓散利之此千金妙法也不然則死

出痘時發紅斑如錦紋者六七日後決死急用化毒湯加

紅花黃芩升麻救之變黑斑則死

部位吉凶 額屬心火印堂以上及日月角位先見點者凶

左面肝木右面肺金如兩臉先見點磊落者吉若相聚作

塊其肉硬腫者死 頰屬腎口唇四圍腮頤地閣先見者

吉 鼻屬脾土準頭先出凶 一出紅點發於山根之上

為毒盛氣虛急用涼血解毒藥以防危急 耳輪先見凶

痘色 灰白色者氣虛也候齊後以保元湯加木通川芎肉

桂最妙 淡色不紅者血虛也保元湯加當歸赤芍

酒炒川

芎血熱者仍加生地 姜汁拌 倍黃芪煎服 皮乾燥枯澁者

必難起脹用溪中白石洗淨燒紅以井花水漬之使濕氣

蒸於痘上頃間光澤易起又能辟穢

由紅而白而黃黃而黑此出形起發成漿結痂 之正色也

出而帶紫起發而灰白此色之變也能辨形色可知死生

色之紅者痘初出也白者毒未解也黃者毒將解也乾黃者

黑者熱極而兼化水也焦黑者氣血枯也

發熱三日之後熱退身涼大小不等作三次出淡紅色如

水珠光澤者不須服藥

不可妄治

如皮肉昏黑或赤腫根苗乾

枯青紫或灰白者此毒盛也急以消毒飲奪命丹合服

托痘秘方

兔絲子一味醋浸一宿焙乾勿令焦爲末於發

熱時每歲兒用七分量兒大小加減好酒調服此方托之

使痘易出易發易張易靨且保後無他症真仙方也但氣

血弱者未出之先可用若既出之後斷不可用用則恐托

出太多也若保嬰丸則又解毒而使痘稀少

各有其用各成其妙也

保護咽喉

痘未有不咽痛者初出之初急用甘草桔梗牛

勞子湯甚者射干鼠粘子湯早令毒火解散免生喉症

保護眼目

痘方出時使不入目以神應膏塗眼四圍或只

以胭脂取汁塗之或以牛勞子為末蜜調貼額門上神效

神應膏

黃栢

一兩

菘豆粉

一兩

甘草

四兩

紅花

一兩

為細末

用胭脂水和蜜調塗兩眼四畔之痘上

眼中流淚或多眵目中紅赤用洗肝明目散加蟬退

見下

跟病大忌吃雞鵝鴨子并忌其氣觸之即傷眼

脉 痘疹脉靜身涼者生脉躁身熱者死 七歲以上五至

為平七歲以下六至為平過則為數

邪氣實也

不及為遲

正氣虛也

起脹三朝

痘出三日後當潮起脹先出者先起後出者後

起至四五日毒氣盡發於表觀痘虛實變毒淺深

在此

脫必順顴上不脹遍體皆不脹 上體已脹下體緩慢者

無害下體已脹上體緩慢者逆 起脹時漿滯不行頂陷

不起或風寒所克俱宜水楊湯浴之 按浴時冒入風邪其害尤大不如不浴須

看天時不可拘泥 凡起脹時毒盡在表須賴裡實則可無虞苟略

有瀉則內氣虛脫毒乘虛內攻而痘陷伏矣宜用固真湯

痘不起脹灰白頂陷皆虛寒也宜內托散加丁香或酒調紫

草膏若紫黑陷伏不起乃火盛血熱宜紫草湯調四齒散

或獨聖散 起脹時有痘長大而紫黑者名曰痘疔把住

痘瘡令不起失治則死急用保元湯加鼠粘子荆芥穗及

酒炒芩連外用銀針挑破痘疔頭令父母吮去惡血或綿

巽指甲揩去惡血使疔破而毒氣發泄也仍用雄黃一錢

調胭脂汁極濃點疔痘上立見紅活

雄黃拔毒
胭脂活血

起脹吉凶 五六日痘尖滿起如鼓釘摸之碍指光澤明潤

肥滿紅活者吉 出不快直待起脹時陸續出如粟米於

痘空隙處圓淨者吉 起脹時根窠全不起頭面紅腫如

匏瓜之狀者凶 起脹時痘頂皆黑其中有眼如針孔者

凶 遍身陷伏不起腹脹氣促神昏者凶

凡痘密者多難起頂以燈影之苟非皮薄水泡光潤

雖平亦
無妨

但紅活不甚長大者氣不足也用四君子湯合勻氣散加人

中黃 如焮腫色帶紅紫者血熱也用四物湯合消毒飲

如有青乾者內服快斑湯加人中黃合奪命丹外用四聖散
合胭脂塗法或用胡荽酒或用水楊湯浴法務求光壯紅
活而後已 如中間有成水泡者防其塌痒宜先補脾胃
使肌內貫不作痒可也十全大補湯加防風疎風大力子瀉火
痘至四五停住不甚起者少後力也用生黃芪人參當歸鹿
茸煎服少加木香

表虛則一齊湧出不能收斂必生痒塌裡虛則留伏壅遏
貫膿三朝 貫膿三日胃氣升也痘以胃氣爲本胃氣升騰
化毒成膿目肌肉上貫起漸至頂尖充滿光潤者順此氣
血大振毒漿已滿將欲收斂之時也 當結膿窠而不結

由血熱相搏毒氣內外灌注必復入心宜用猪尾膏

貫膿時九竅慎宜封閉飲食藥餌極忌寒涼滲淡之物若傷脾胃則清氣下陷不能貫膿也 出痘歷七日當貫膿

之時外若起脹而中空乾燥無膿血者死若略有清水根窠紅活猶有生意用內托散倍人參黃芪當歸煎入好酒人乳各半蓋溫服此貫膿之巧法也 九日十日可水之

時元氣熏蒸真陽運化其水自然消燦此循環之妙理也若未曾解毒則至此時水不能化反歸於胃胃病則不能貫膿成就或致吐瀉咽伏宜用定中湯 痘七日後壯熱毒盛氣弱聾啞用解毒方風湯

貫膿吉凶 兼行痘瘡 肥瘠黃色或蒼綠色或黃赤色

回漿四肢方纔起脹者吉貫膿時或吐瀉不食乳食不化
腹脹聲啞寒戰咬牙痘爛無膿肌肉黑者凶 貫膿純是
清水皮白薄如水泡三四日遍身搔破而死 貫膿時滿
身抓破痘中乾枯全無血水皮白乾如豆殼者凶
收靨三朝 收靨三日漿老痂結自上而下按之堅硬蒼蠟

色或黃黑或似紫紅葡萄色者佳 如當靨不靨謂之慢

有毒盛不結痂者猪心龍腦膏妙 寒戰咬牙足膝如冰

牙尻反熱於起脹貫膿收靨時俱忌乃氣血虛極宜保元
湯加桂甚者異功散救之 痘痂不焦是內熱蒸於外散
漫而行故也宣風散導之生犀角磨汁解之必着痂矣

當靨不靨發熱蒸蒸用甘露回天飲卽時熱退痘痂

外潰不結痂甄陶散搽之 發膿窠不肯靨但調砂糖湯

與吃卽結痂 膿而不焦此失清涼之氣也須察症候而

清涼之如清涼飲猪尾膏龍腦膏並佳

宜黍著痂油潤法以治著痂

收靨吉凶 痂落從頭上至胸膈手腹腰足節節緩緩靨下

者吉謝後班紅者吉白無血色者過後亦死急用消毒飲

二劑後用補氣血養脾胃藥預防之 陰囊及足上先痂

起者凶 將靨時其痘一時盡黑乃火極攻裡也卽凶

當靨時遍身臭爛如餅塲日中無神者凶

落痂 痂落後面痂突起成凸者此熱毒未盡解毒防風湯

如陷不成凹者脾胃虛不能長肌肉也人參白朮散加黃

升麻葛根湯 升麻錢一 乾葛錢二 甘草錢一 白芍錢五 蘇葉錢八

加蔥白三枚 姜三片 煎服 或服參蘇飲方見便易 小柴胡小

發熱 鼠粘子湯 鼠粘子二錢 炒研 歸身 酒浸 炙草連翹黃芩

黃芪各一錢 地骨皮二錢 空心服藥畢勿與乳食

又鼠粘子湯 鼠粘子四錢 炒研 荆芥穗 甘草各一錢 防風五分

解毒防風湯 防風 荆芥 地骨皮 黃芪 白芍 枳殼 鼠粘子

煎服

導赤散 人參 麥冬去心 生地 木通 甘草 竹葉 燈心 煎服

四苓散 澤瀉 猪苓 苓皮去 白朮 赤苓去皮 木通 煎服 或為末白湯下

消毒飲 鼠粘子二錢 炒 荆芥一錢 生甘草五分 防風五分 連翹

升麻紫草山豆根一方無荆防各等分煎服或加犀角汁酒岑山查

四聖散 治痘出不快及倒靨 紫草茸木通炙草枳壳

麩炒 各五分煎服一方有黃芪

加味敗毒散 前胡柴胡羌活獨活防風荆芥薄荷川芎

枳壳炒 桔梗天麻地骨皮各二分 加紫草蟬退紫蘇麻黃

葱白煎服表汗之除參苓恐助火也

神解湯 治發熱欲出痘腰痛者柴胡一錢半 乾葛一錢 白茯

苓麻黃升麻防風各八分 甘草五分 煎服溫覆出汗不汗再

服免出腎經之症此法甚奇

四物解肌湯 升麻葛根白芍黃芩 煎服凡傷寒痘症

未能辨者以辛涼調之即此湯也

甘草各五分糯米五十粒煎服凡用紫草必用糯米五十粒以防泄瀉

犀角消毒飲 治痘未快透或已出熱尙未解 荆芥穗

防風黃芩各一錢鼠粘子二錢甘草犀角屑各五分水煎服

猪尾膏 治痘陷伏倒靨不起發毒氣入裡黑陷者

龍腦一錢刺取小猪尾尖血和丸小豆大紫草飲或淡酒

化下熱甚則新汲水化下一方加辰砂一錢可調於藥

透肌方 治痘不快透 紫草白芍升麻各一錢糯米五十粒煎

加味四聖散 治痘出不快或陷伏倒靨 紫草茸木

通木香川芎黃芪人參甘草各四分蟬退二分糯米百粒

煎服

快癍散 治痘出不快或被風復入 紫草茸人參蟬壳

白芍各六分 木通三分 甘草二分 煎服

紫草飲 治痘出不快三四日隱隱將出未出 紫草二兩

以百沸湯一大碗沃之蓋好不令出氣候溫服半杯痘

卽出 治痘紫草皆當用茸乃有發出之功今人用根

反利大便大便泄者萬不可用

絲瓜湯 發痘疹最妙 取絲瓜連皮子燒存性爲末用

砂糖溫湯調下半匙或以紫草甘草煎湯調服尤妙

連翹升麻湯 治瘡疹一發便密如蚕種或如糠粃毒盛

者卽升麻葛根湯加連翹也 升麻葛根芍草連翹

四苓散化毒湯 見前方

胡荽酒 治痘出不快 胡荽 二以酒二升同煎沸蓋好

勿令泄氣候温用酒噴一身令遍勿噴頭面以衣温覆

須臾痘子快出無胡荽則用子可也 按須看天時切勿可冒風犯則不治

治痘出不快蒲萄研酒飲之又食之盡出無鮮者則用葡

萄乾 俗名紫白 又方蟬壳三十個煎服 山查 肉為末湯煎服

起脹 固真湯 治痘泄瀉 黃芪人參白朮茯苓白芍 炒

木香陳皮訶子肉豆蔻 煨 炙草 各三 糯米 五十粒 煎服

糯米止泄瀉養胃氣最好痘不起脹煮粥和糖服 且解毒

內托散 活血行氣調胃 補虛內托瘡毒使之盡出治痘

不起發根窠不紅灰白咬牙寒戰等症 人參黃芪川

芎當歸白芍甘草防風白芷厚朴木香肉桂姜棗煎服

色紅紫者去桂木香加紫草蟬退 色淡白者去防風

白芷加糯米 當貫膿而不貫倍參耆當歸 煎熟入人乳好酒服

紫草膏 治痘不起脹 白附子麻黃紫草茸甘草各五

錢蟾酥一錢全蝎二十個僵蚕八個 炒 為細末另將紫

草一兩熬成膏入白蜜二兩酒半盞煉過同紫草膏攪

勻調藥末丸如皂角子大一歲兒半丸三歲兒一丸 用之

紅紫黑陷者紫草湯化下淡白灰陷者好酒化熱服

痘不起 起脹肥綻 黃狗蠅四五枚溫酒研服末綻再服冬月

在狗耳內取用

等分 火煨研為細末一二歲兒服二分五六歲兒四五

分熱酒調下如神

獨聖散 治黑陷氣欲絕 穿山甲取前足及嘴上者炒

研末木香煎湯入酒少許調五分入射香少許服妙

活血散 川芎 當歸

十全大補湯 參苓朮草芎歸芍地黃芪肉桂也

快癍湯 人參五分 當歸五分 防風各一錢 木通各一錢 甘草三分 木香三分 蟬退

各二分 紫草茸二分 煎七分服

奪命丹 麻黃升麻各半兩 山豆根紅花子大力子連翹各二分

淡半 紫草茸一錢半 蟬退人中黃各三錢 共研末酒蜜和丸

辛正長方 方 三

辰砂為衣薄荷葉煎湯

下按減其分兩作煎湯服之亦可

^賈定中湯

收斂胃氣止嘔瀉神妙

取真正黃色土不雜

砂石者一塊用百沸湯泡之蓋好候溫用兩酒杯和水

飛硃砂

五分

水飛雄黃

錢一少

加砂糖溫服二服立止

^收醫

猪心龍腦膏

治痘未透心煩狂躁氣喘妄語或見鬼神

或已發而倒靨黑陷不速治必死

梅花腦子

即水斤一錢

研細滴猪心血和丸豆大每服一丸心煩狂躁紫草茸

湯化下黑陷酒化下服畢少時心神便定

得睡

痘復透活

異功散

治痘靨之際頭溫足冷腹脹渴瀉如戰寒咬牙

腹脹足冷過膝者用此救之

木香當歸

各三分半

桂皮白

扶苓白朮

各三分

陳皮厚朴人參附子

各一分

各二分

宣風散 治痘青乾黑陷煩渴腹脹而喘二便赤澁乃熱

蓄於內

黑丑

四兩取頭末一兩

半生半炒陳皮甘草

各二錢半 枳

椰

兩個

為細末二三歲兒服五分四五歲兒

下

一錢蜜湯

甘露回天飲

砂糖屑半盞入百沸湯一碗調服

浴法

水楊湯治痘因氣血虛弱或為風寒所克不能起脹

成漿貫膿或枯燥陷伏

楊柳五斤

春冬用枝夏秋用葉

洗淨搗

碎取長流水

河水也

一鍋煎六七滾去渣將三分之一注

盆中先用保元湯加川芎桂皮糯米煎服乃乘熱洗浴

良久以油紙撚點燈照之纍纍然有起勢陷處有圓暈

紅絲此漿影也如漿不滿足又如前浴弱者只浴頭面

水楊柳是草
本葉如楊柳
高尺餘無枝生
水涯

手足及背如燈照而無起勢則再添湯使透澈肌肉疎
通內外令毒氣隨煖氣而發也此藥升提開豁萬竅枯
者轉潤白者轉紅陷者自起矣冬寒則溫房內浴之

按浴法之妙尤妙在先服保元湯而後浴也切勿可
冒風

洗肝明目散 川芎當歸防風梔子柴胡羌活龍胆木賊

蜜蒙花等分為末每服一錢沙糖湯下

通治 首尾宜保元湯參耆
草姜為主 不快出不起脹不貫膿

不收膿通用猪尾膏救之水片猪
尾血凡出痘起脹回漿貫

膿頂陷不起漿滯不行俱以水盪浴之

保元湯加減法 人參黃芪甘草一錢
一錢姜片煎服 一二日

初出乾工少潤即白方當加活
康
官
均
完
解

策雖起色不光潤加白芍官桂糯米 五六日色昏紅

紫加木香芎歸 六七日不能成漿加官桂糯米 八

九日漿不上滿氣弱加糯米 十一十二日血盡漿足

濕潤不飲者內虛也加白朮茯苓 助其 十三 收斂 十四 十五日或

有雜症只此加減萬不可用者大寒大熱之品也

解毒 痘密則有毒急用涼藥解之雖數十帖無妨早防害

眼為要酒炒芩連宜解瘡毒 痘初出胸前稠密急用

消毒飲 見 上加山查酒芩紫草茸 痘出太多以犀角地

黃湯用丹皮白芍生地煎好磨犀角汁入服 無犀角以升麻代之

痘毒攻脾則泄瀉浮腫 肝則目翳攻腎則耳痛攻肺

則痰嗽 初出狀好蚊咬色黑者用四齒散猪尾膏見上

毒鬱藏燥痰甚狂叫四齒散加蟬壳黑陷驚狂譫妄者

宜加味六一散滑石六兩甘草六錢辰砂水飛片腦三分燈

心湯調下三五歲兒服一錢十歲二錢能解毒稀痘或

用紫草燈心湯磨犀角玳瑁汁服不治則聲啞而死矣

解痘毒宜解毒湯三豆飲見前絲瓜湯服朱砂法蜜調硃砂一分服

毒入胃則腹上痘多青紅紫色外症口角流涎者死

辨痘吉凶 痘欲圓滿硬實不宜虛軟痘自頂額上起且稠

者固凶然遍身變壞獨頂額上不變則吉貫膿時變成水

泡惟額上不破者可治收靨時敗症悉具惟頂額上未靨如舊者可生

不須服藥

痘脚稀疎疎根實紅活不陷實因倦痘二

三瘡作坑內無膿血或作黑泡 四口臭牙根爛牙落

五聲啞氣噎或咽藥腹中噫 六痘初出半在皮膚帶紫

黑色不出 七誤於踈轉氣啞凡痘出前後心密及兩手

心兩足心密者皆不治 又有四不治 一痒塌寒戰咬

牙煩躁 二頭温足冷悶亂欲飲 三灰白色頂陷腹脹

喘渴 四目上視氣促泄瀉不止 又初出勇壯口如蚕

種隨出隨沒如蚊虫咬及倒出者鼻燥有黑氣 以手扒鼻孔者必死

痘之輕者 作三次出 大小不一 頭面稀少 根窠紅

活 肥滿光澤 耳中無 眼中無 臍中無

重者 一齊並出 稠密無縫 身熱腹脹 頭温足冷

渴瀉不止 耳中有 齧中有

輕變為重 犯房室 不忌口 先曾渴 飲冷水吃涼藥

重變輕 避風寒 常和煖 大便稠 不燥渴忌 生冷 外人

輕者 出痘與靨俱從頭至足身體溫煖 能食大便實

重者 頭上未出未靨脚上先出先靨 身體寒涼 不能

食 大便利 出以秋冬 耳及尻反熱 一發便出盡

險症 頭脚齊出齊靨 夾疹者半輕半重

痘黑而忽瀉使膿血并痂皮者順 水穀不化者 脾 虛 逆也

瘡端黑如針孔者熱劇也

痘只出一般者善 碎密若芥子者夾疹也用黃連解毒湯

黃連七地台方寸草大連草加金瓜葛粉實山查不用炒

實山查

合消毒飲煎服 若皮肉紅腫成片者夾痲也用人

參白虎湯合消毒飲煎服 人參白虎

人參煨石膏知母甘草粳米

辨痘形色吉凶 以紅黃綠色為佳淡細者毒始出也鮮紅

則為血熱初起紫者大熱也全白者氣虛也灰白者色衰

而氣滯也黑者毒滯而血乾也 初出淡紅紅變白白變

黃者吉 症出色不紅潤者毒盛壅窒也用紫草飲 方見上

外用芥子末塗腳心 黑屬血熱涼血為主四物 芎歸芍地加

黃芩黃連紅花 白屬氣虛保元湯 參者加紫草去甘草

辨痘虛實 吐瀉少食為裏虛陷伏倒靨灰白色為表虛二

痘俱見用異功散救之 方見上 不吐瀉能食為裡實紅活凸

綻無汗為表實用涼膈散加升麻乾葛紫草荆芥解之

涼膈散

梔子連翹黃芩甘草薄荷竹葉

原方有硝黃痘科不可用

表裡俱實者難出易屬表裡俱虛者易出難屬

氣不足

肺主氣

自汗聲不出瘡頂塌陷宜保元湯四君子湯

血不足

心主血

灰白色根窠不紅不光澤宜四物湯加

紫草紅花

辨陰陽虛

足脛冷

腹虛冷

糞青色

面晄白

嘔乳

食目睛青

脈沉數已上屬陰症不可服涼藥

足脛熱

兩腮紅

大便秘

小便赤

渴不止

上氣

急

脈洪數已上屬陽症不可服熱藥

凡痘瘡虛寒用

木香異功散

見上

實熱用涼膈散有起死回生之效

寒熱宜辨清

異功散公承虛冊...

兩白礬一兩射香一分每服四錢煎服熱盛者加犀角一兩無犀角以

升麻代之輕者只一服大效身後痛膀胱經也用羌活荆芥甘草湯三味等分

身前痛肺經也用升麻葛根紫草三味身側痛胆經也用柴

胡山梔連翹防風四味四肢痛胃經也用防風白芍甘草三味

等分以急止之恐叫痛傷血而變症也若熱甚者用東垣

治消毒散又名消毒救苦湯用麻黃根羌活防風升麻黃栢

酒炒各五分柴胡川芎細辛藁本葛根黃芩酒炒蒼朮各二分歸身

黃連各三分蘇木白朮生甘草陳皮各一分生地五分吳萸紅花

半連翹五分初出者減半大者加每服五錢水二盞煎至一盞服班疹

者因內傷必出班大禁巴豆牽牛峻藥宜半夏枳實大黃

益智等去瀉止吐若耳尖冷呵欠睡驚噫眼澁知必出也

化班

按此方專治班症悉具能令不出若已出稀者再不生

班宜升麻葛根白芍甘草歸身連翹等分煎服此定法

也如肺出膿班先見喘嗽或氣高端促少加人參黃芩

如心出小紅班必先見嗑乾驚悸身熱肌肉腫脉弦洪

少加黃連如命門出癰必先骨痛身熱其疼痛不敢

動搖少加生地黃栢此治熱毒痛甚之一法也或用

仙方活命飲

見外科方

如食雞魚葡萄酒物而痛者用東垣

清胃散生犀汁若發熱飲冷大便調和用四物湯連翹

丹皮若發熱飲冷大便秘結用清涼飲若發熱作渴飲

湯用此法白朮散乃四君和藿香木瓜香薷也此食毒

九味順氣散合活血散主之九味順氣散白朮茯苓青皮

白芷陳皮烏藥人參各五分炙草二分木香一分半又名勻氣散

活血散又名芎歸湯乃芎歸少入紅花也

一則皮膚厚為外寒相搏而痛桂枝葛根湯主之乃桂枝

葛根赤芍升麻防風甘草各一錢姜三片豆豉一錢也

青黛散 治痘未作膿痛甚心煩用真青黛如棗核大水磨服之

痘將結靨乾澁而痛以猪油潤之靨可揭去則去之

以芒硝和猪胆塗蒼上令動痂落無斑仍用黄土抹之良

痒 初出時便痒者可發之使邪氣洩痘得出而痒去矣

有將收而痒者其膿已成邪氣散也與癰癤將痊而痒者

同論不須服藥但謹護之勿令撻搯以致腫爛

有起壯泡漿而痒者當血已化水水未成膿毒未化而渾身癢痒此惡候也與傷寒陽明經病皮中如虫行者同論所謂虛風外搏邪氣內強痒而不止爲泄者是已此視瘡

之乾濕以風藥佐之必令痒去方佳若痒甚皮爛不能治

矣大抵出形而皮肉紅艷起發而皮嫩多水者後多痒塌

凡痒須於形色上詳審如■向紅活光壯忽然痒者此穢

氣所觸也內服十全大補湯外用茵陳熏法用乾茵陳研

末棗子丸如雞子大晒干烈火燒烟熏之其破者以白

龍散

見敷之

如本乾又添痒者火甚也如瘡原帶水

皮肉嫩薄又痒者濕熱也

起發身痒有二血氣不足者十全大補加防風大力子有

不能食淡以致發痒者蟬脫膏主之用蟬脫去毒當歸防風甘

草川芎荆芥穗升麻白芍等分為末蜜丸芡實大薄荷湯下

如瘡乾而痒者以四物湯合消風化毒湯芎歸芍桂防風

白芍黃芪荆芥穗桂枝大力子升麻等分甘草薄荷奪命

丹麻黃升麻山豆根紅花子連翹牛蒡子紫草茸蟬退

人中黃主外用茵陳熏法如瘡濕而痒者四君參苓朮草

合消風化毒湯奪命丹外用茵陳熏法凡痘已熟忽

作痒抓破者四君加芪桂外以敗草散見下如因自利脾胃

虛致痒塌者陳氏木香散見異功散見瘡將收而痒誤犯

破損不乾者白龍散

黃牛糞燒灰也

或云

忌牛糞灰宜敗草散

丹溪法

實則脉有力氣壯虛則脉無力氣餒實痒則勢熾虛痒則勢

怯虛痒以實表之劑加涼血藥實痒以大黃少許下

其結糞

有因食毒物而作痒者二物湯用蟬退炙草白蜜或四君

加解毒藥

痒症皆因氣血虛弱所致預為調使氣血和

平庶無此患又必察其外症色白者用四君之類色赤者

用四物之類

蟬退

去頭足洗去土微炒一兩

地骨皮

炒黑一兩

為末每服

一匙水酒送下一二服神效作痒抓破皆能治之

名蟬花散

凡痘膿成漿熟或痒悞犯破者灌爛不能成痂若膿漿未成

之時不可觸破半個必然痒塌而死

醫落後毒不盡變成癩痒極痒者皆用此散正氣虛也當補氣

燥其濕 血不榮肌腠所以痒血和肌潤痒自不作 又見後世

痒一足常搖動者將發痒也因食毒物及食鹽物而痒四君

子湯 參苓 木草 加酒炒芩連大黃微潤之 痘疹血多身痛叫

喚及煩躁脹痛用白芍為末每一錢淡湯下 痘瘡痛用

蟬退湯 蟬壳 二十個 一錢 煎服如痒甚水楊湯浴之

上方見 又法鹽和百草霜水拌略炒燒烟熏之痒立止 又

蜜水調滑石末雞羽潤瘡上痒亦止 痘痒難任宜以敗

草散搽之 土墻上多年受風雨之 爛稻草晒研為末是也 蕎麥粉亦好 因虛發

痒遍身抓破宜內托散 見 去桂倍白芷當歸木香 氣行血 運痒止

痛 痛乃痘之善症初出時宜參蘇飲 見便 輕者消毒飲 見

起脹貫膿時作痛不妨 凡痘痛不為外寒所折而痛則

必脾腠厚密難出為痛寒折宜參蘇飲腠密宜小活血散

白芍末

錢一

白湯下

痘瘡煩痛宜硝胆膏用芒硝末調

猪胆汁塗之仍用真黄土細末糝之良

痘將靨乾硬

而痛宜塗猪脂潤之 收靨時遍身發抓

破無膿如豆壳者死

大法灰白者氣虛宜參耆乾燥者血虛宜芎歸氣過則泡血

過則癍氣不及頂陷不起血不及漿毒不附凡痘淡白頂

不堅實不碍指不起脹宜保元湯加酒炒黃芪肉桂丁香

川芎人乳好酒服之根窠不紅或紅而散亂以手摸過即

轉白痘上如寒光豎起枯澁不活者保元湯和川芎當歸

紅花酒

加山查以消參耆之帶加木香以消胃氣之滯

薛氏用大異功散出不快八味丸治之 如大便秘結手足

並熱喜飲冷水陽盛陰虛也用四順飲見小兒方地黃丸治之

若煩熱作渴面赤睛白此腎經虛熱亦宜地黃丸

辨症 呻者身有苦也自語者神不清也喘粗者內熱也腸

鳴者洩也坐卧不定者心煩也啼叫不止者痛也搖頭者

風也指欲搔者痒也嚙物難者咽痛也咬牙者心肝熱也

瘡乾者宜退火荆芥升麻葛根連翹之屬 瘡濕者宜瀉濕

防風白芷之屬

有大熱者利小便四聖散之類小熱者當解毒若出不快勿發

勿下攻止用抱龍丸治之瘡疹若起能食者大黃丸下一

二行卽止

凡氣虛之症 未見點用保元湯加紫蘇防風白芷見點後
保元湯加川芎桔梗見點四日之後重用參耆七八日漿
足之後保嬰百補湯卽八珍湯以川芎換山藥也

凡血熱之症 未出之前用十神解毒湯乃四物湯加紅花

丹皮桔梗木通大腹皮連翹也見點三四日熱症悉平勢

將行漿用太乙保和湯卽紫草透肌湯紫草桔梗川芎山查木通

人參紅花生地甘草糯米燈心也加減用之八九日漿足
之後用保嬰百補湯如七八日間有紫黑乾枯及青灰乾

黑陷者用奪命丹猪尾等如泄瀉後則木香異功此秘法也

連翹甘草紫草大腹皮鼠粘子燈心煎服至見點三日
之內諸症悉平則用益元透肌散
卽太乙保和湯去生地
紅花加蟬退牛蒡陳皮
加減漿足之後服保嬰百補湯調養

纔發熱一二日痘便一齊湧出者此表虛毒盛榮熱衛弱不
能約束於外故出太驟也宜用實表解毒湯人參黃芪甘
草歸尾地黃白芍地骨皮酒芩柴胡元參升麻薄荷竹葉
煎服可無塌痒之患

頭焦黑者毒凝血聚也用七物升麻丸升麻犀角芒硝梔子
大黃豆豉或當歸丸煎服得利後以紫草飲用紫草白芍

麻黃當歸甘草等
分加味四聖散仍用胭脂塗法

胭脂塗法 升麻煎濃湯用胭脂浸出紅汁拭瘡上

痘皮嫩薄者脾胃氣虛也用十全大補湯去生地加防風白芷外用六一散蜜水調拭瘡上

痘出與地骨皮相似無起發之意乃是紅班急用羌活散羌

活獨活川芎桔梗蟬退前胡柴胡地骨皮炙草栝萸荆芥

防風炙天麻

等分

加紫草紅花蟬退木通糯米連進數服

或以六一散紫草膏保嬰丹隨症用之亦可俟班退以保元湯加木香豆蔻煎服以解紫草之寒防其泄瀉若有

夾疹同此治如治稍遲則變黑班不可救矣

痘若稀疎者切不可妄治 若稠密發不透者宜細視之但

紅活不甚長大者氣不足也

毒飲人中黃主 如不潤澤而乾者血弱也芎歸湯合消

毒飲治之 如不起發不紅活平塌灰白者十全大補湯

合奪命丹加入中黃治之外用四聖散合胭脂塗法見如上

中間有成水泡者防其痒塌用十全大補加防風大力子

保護法 頻與乳食不受風冷衣服適中房屋溫煖天寒蓋

覆大熱不蓋乳母慎口不令受飢及冒風冷此妙法也

飲食 痘以脾胃為主自始至終以能食為順淡食為佳忌

吃生冷肥膩鹽茶醋酒葱蒜魚羊猪肝各血柿棗飴糖雞

鵝鴨子酸辣五辛葱姜韭菜冷水等乳母宜慎口不可令

飢及受風寒必變黑不治 嬰兒未能服藥則當兼治乳

母 乳母食後須捏去宿乳令盡乃服藥即仰卧片時乃
令兒吮其乳汁

痘疹宜食物

菜豆赤豆黑豆山猪肉白鯊

即石首魚

鯪魚

俗名鮑魚

山藥松子葡萄煨大栗蔓菁蘿蔔雪糕糯米粥

泄瀉可食

蕎麥

麵

起脹可食

母酒

起脹可食

砂糖精猪肉

去盡脂膜淡煮少食

禁忌

忌諸般臭穢煎炒油烟房事梳頭狐臭腋臭淫慾月

經酒醉葷穢硫黃蚊烟腥燥頭髮及外人僧道看經等氣

犯之則悶亂瘡痛如割而死 房內忌沉檀降真香射香

冰片燥血

故也

痘落又忌早浴切記

藥法

痘觸穢氣痒痛以蒼朮細辛甘松川芎乳香烈火燒

之更以月委委西下末合

通而大便秘塞宜寬中散麥冬湯 過用辛熱之藥而咽

痛煩躁閉渴皆用藥過深致虛而變實也切勿過於疎利

再成脫症 又如泄瀉之後調理失宜以致津液暴亡而

渴氣虛而喘皆虛極似實也治渴用參苓白朮木香散治

喘用人參定喘湯獨參杏仁湯 試思泄瀉之後豈有實熱而渴氣壅而喘之理乎

實極似虛 壯熱腮紅煩渴腹脹便秘喘急皆實症也而熱

毒壅遏或上攻而嘔吐或下陷而泄瀉或內攻而腹脹不

思飲食則實極似虛矣治宜升提發散以達其毒使熱氣

伸越則藏府和平切勿悞用丁桂半夏等熱藥於嘔吐不

食之症悞用參朮於不思飲食之症藥一入口立見殺人

然亦有虛脹而必以參芪救之者疑似之間關人性命不可不辨

熱症變虛 痘症血熱只宜清涼發散不宜用苦寒如升麻

芩連及滑泄之藥必致內傷脾胃減食澹泄外水肌肉陷

伏不漿五六日後變成虛症但一見虛便從虛治木香異

功亦可審症用之摠要辨清方可用藥蓋熱遏固宜升提

發散然散之太過則肌表空虛元氣耗散內貫清漿百病皆

至六七日後見之雖木香異功亦當進實熱之症七八九

日曾經泄瀉皆從虛治有木香異功之症便用木香異功

如無冰硬之症切勿悞投溫劑無泄瀉之症切勿悞用木

香異功等藥用猪尾膏見棗變百祥丸或加味宣風散治

凡冬令及大風不可用浴法

未出失聲者身溫則用解毒防風湯見上身冷則內托散倍

桔梗見上如漿滿聲啞者肺氣絕也痘出不好聲啞亦死

咽喉痛 痘出咽痛宜消毒飲見上或如聖飲用麥冬桔梗各一

錢 大力子甘草各五分竹葉三片煎服如咽乾澀痛牙根爛腫

心胃熱也宜如聖飲 水漿不入宜用紫雪 咽喉有毒

飲食如鋸剉喉水漿不入或吐出或常乾嘔者危惟貫膿

時見此症二便秘者反吉痘瘡入藏府咽喉閉塞宜用猪

尾膏 痘生於口舌瘡爛不能吮乳宜加味犀角消毒飲

用大力子一錢二分甘草五分防風升麻各三分荆芥穗犀角屑麥

冬桔梗各二分煎服 已上藥須能食藏府實方可用

咽痛上焦雖熱而小便清大便溏飲食不進者當清上溫下

如甘桔湯加參朮陳皮訶子等更驗手足

如不熱者白朮散調之

曰朮散四君加藿香木香乾葛

當查咽痛同看

噲水

人參

錢一桔梗

錢一人乳

杯一枇杷葉

三片

共煎濾渣服效

護眼

有方見前

宜消毒飲加酒炒芩連桑白皮草龍胆

○回漿時眼腫不能開者以水濕絹巾拭去膿尿略用手指

攀開眼皮透一點風則不致生翳膜

眼角出膿太甚必

損雙目宜清解內毒用消毒飲犀角地黄湯

犀角地黄丹皮赤芍

倒靨

陷伏用內托散保元湯

若外感及觸穢而倒靨宜

溫散寒邪用調解散青皮陳皮桔梗枳殼當歸紫蘇半夏

痘出不快及倒靨用四聖散見早能涼血解毒必無此患

痘始有白泡忽搐入腹日夜叫煩者用鬱金一個甘草一分

水半碗煮乾去甘草將鬱金切焙研為末入冰片五分同

研一錢用生猪血數滴新汲水調下不過二服此五死一生之症也

倒陷者 如大小便閉四順清涼飲合奪命丹主之泄利氣

弱者十全大補湯合奪命丹主之

橄欖從中截斷水服治倒靨立發

白花蛇連骨火炙乾勿焦丁香為末每服二分熱酒送下移時轉紅

又烏蛇用尾全蝎僵蚕去絲清水洗去石灰再晒乾用穿山甲帶肉酒洗焙干各一兩

黃芪肉桂二兩酒煮服此方全活甚衆

王先生云倒靨妄用浴法枉殺人男女若痘後結痂不能脫

起或四圍脫而中心錐痛者用生蜜蘇合油二味調勻用

銀簪敷於靨盤沿處痛立止靨自脫並無哈血鏤肉無蘇合油雞油代妙

黑陷 瘡黑倒陷用猪尾膏龍腦膏四齒散

腹痛 發熱時腹痛或腹脹者宜參蘇飲去人參茯苓加砂

仁表之 收靨時腹痛痛在中脘宜手捻散用大力子白

芍大黃桃仁各六分紅花四分桂枝二分煎服 痘出不透腹

痛甚或黑陷用蟬退湯蟬退二十個甘草一錢煎服或為末

每一錢白湯下腹痛立止 又方生猪血和腦射服亦妙

肢體厥冷而腹痛者毒氣在裡也若不審諦必作極冷治之

又與執藥為害愈烈不中景所消藥

症已內潰治無及矣用升麻白芍葛根人參川芎甘草防

風羌活各四分姜三片煎服

出不快而腹痛者用活血散即一味白芍姜湯下

陽毒入胃便血無度腹痛啼哭牛黃一分鬱金一分為末每服半

錢以漿水半盞煎至三分和滓溫服量兒大小增減日二服

溫藥治寒痛例 作渴飲湯手足並冷六脉虛細者宜益黃

散或理中湯四君加姜加白芍肉桂

涼藥治熱痛例 作渴飲冷手足並熱脉洪數者宜升麻湯

連翹升麻湯雙解散之類倍加芍藥甘草

收靨時忽然腹痛 有飲食也丁香脾積丸原物湯送下

疝 疝

丁香脾積丸 三棱煨去皮毛 莪朮去皮炒 神曲炒各七錢 青皮小

茴香炒 陳皮各五錢 巴霜五錢 丁香木香各三錢 為末醋和神

曲為丸菘豆大每服五七丸姜湯下

腹脹 脾胃虛氣攻作也脾虛則脹飲水多則脹有傷生冷

而脹者用木香散木香丁香桂皮陳皮半夏赤苓人參大

腹皮訶子皮前胡甘草各三分 姜三片煎服 冷症可用熱症不

有毒氣內陷而脹者宜人齒散用小兒齒目落者一個火

煨為末每齒末五分 入羌活一錢 穿白甲炮少許 紫草湯下

丹溪用桔梗枳壳湯二陳加枳壳湯 若虛弱自利四肢

厥冷腹脹發噦者裡氣虛也姜附理中輩急救之

水楊湯浴之 痘瘡爛不收口坑深用硝胆膏芒硝末調

猪胆塗之 痘爛成片膿水不乾宜白龍散用深山黃牛

糞晒乾火煨成灰取中心白者綿裹拍之 穢氣冲觸發

痒抓破潰爛宜服內托散見外用祛穢散蒼朮細辛川芎

甘松乳香為末焚熏 擦破周身不能回水宜甄陶散用

新瓦研細末拍之乾痂堆積內有窳膿者鴨卵清調敷

又方荔枝壳微燒存性草紙燒灰存性敗草三味為末摻之自能收水結痂

痘抓破出血黑虎丹 絲瓜連蒂連皮連黑子燒存性摻最妙

寒戰 痘出稠密有轉動艱難者不可便作寒戰妄投熱藥

痘初出寒戰症出乃定宜柴葛桂枝湯用柴胡葛根甘草

桂枝防風人參白芍等分姜三片煎服 痘已出或已成漿

而寒戰者宜養衛化毒湯用人參炙黃芪桂枝甘草當歸煎服

憎寒困倦或發寒戰能令痘子縮伏用木香異功 有用

白朮芪歸加芩治寒戰而愈者 如痘密腫痛時時振動

者不可謂之寒戰膿成痛去而解 收靨之時痂皮圓淨

但時戰慄者須俟自定 有經絡之血為瘡所耗膚肉自

動者不可謂寒戰十全大補湯主之 七日前寒戰者表虛

也咬牙者內虛也用保元湯加桂七日後寒戰者氣虛也

咬牙者血虛也保元湯加芎歸

咬牙 如發熱之初便咬牙者肝熱也用羌活湯 目上窺

陽氣弱也五味異功四君加陳皮加木香 咬牙痘赤身側最

重胆經虛熱也小柴胡麥冬散後用四物湯

人參蟬脫散治咬牙喘滿煩躁作渴人參蟬退白芍木通赤芍甘草紫草

棗變百祥丸用大戟去骨一兩大棗去核二枚水二盞同煎水盡去

大戟不用將棗肉丸如黍米大二十九丸脂麻湯下治戛齒

甚妙如嫌太峻可以宣風散代之見上

無戛散治臨危痘症寒戰咬牙 人牙雄黃珍珠先用人

牙自落者火煨存性淬入韭菜汁內三次研細末共研每服三分荔枝煎湯下一

方加牛黃五分又紫草甘草當歸防風陳皮赤芍煎服

催蟄丹 痘踰八九朝膿漿不充倏然寒戰咬牙以此治之

辛丑夏方 痘

元

虎牙人牙各一枚炙研和人參丁香末人乳和酒服

七日以前寒戰咬牙者心胃熱也七日以後寒戰者氣虛也七日

以後咬牙者血虛也七日以前屬熱凶七日後屬虛亦有可治者

驚搐 心肝熱也宜瀉風用瀉青丸利小使用導赤散

欲發痘先身熱驚跳搐搦非驚風宜紅棉散用麻黃荆芥

穗全蝎天麻薄荷紫草茸蟬壳各五分加葱白一莖以散之

先驚後痘者輕先痘後驚者逆如痘發稠密熱內熾或倒靨

黑陷時作搐搦用猪心龍腦膏

嘔吐 凡顯痘若自吐瀉者不可妄治而多吉邪氣上皆出

也 痘初熱吐瀉無妨痘出後忌之 痘出而吐者宜神

肉桂白芍煎服腸滑者肉豆蔻煨一乳香豆大為末糯米

飲調下 痘不起發根窠不紅或瀉而渴或氣促宜異功

散煎湯吞下肉蔻丸有熱則不可用泄瀉頻津液內耗宜木香散

木香丁香桂皮陳皮半夏赤苓人參訶子前胡甘草大腹皮姜各三分

冷症可用熱症切勿可用起脹時泄瀉用固真湯四君加芪芍木香

陳皮訶子皮肉豆蔻煨炙草糯米各三分煎服

痰喘咳逆 痘出後痰盛喘急宜人參清膈散用白朮黃芪

紫苑地骨皮滑石各三分石膏桔梗甘草各二分人參桑白

皮前胡當歸白芍知母赤苓各一分煎服又宜前胡枳壳

湯用前胡枳壳大黃赤苓甘草各六分煎服

痘紫黑陷伏而痰盛先用抱龍丸降痰 痘痰用白附子

杏仁煎水磨服切不可用二陳湯燥胃中津液 貫膿時

咳逆乃胃氣上越欲絕故也以真黃土鼻邊聞之立止

痰喘胸高聲啞者死凡無痰而喘急不得卧者死

煩渴 痘前渴者宜清金利水或柴苓湯加乾葛荆芥 痘

後渴者保元湯加麥冬五味子如瀉者參苓白朮散加天

花粉乾葛煎服 痘渴宜紅花子 合一加大力子煎服雖口

中如烟起即解切不可用棗湯若大渴者定中湯和沙糖

服即止 煩渴乃毒火上炎也宜烏梅湯黑豆菘豆 各一合

烏梅 三個煎服又宜甘草湯甘草瓜蒌根 各二錢煎服 飲

按夏月大忌木香散有謂津液少而與木香散亦妄矣

凡虛症見渴者死

自汗 痘初自汗不妨痘出後切忌汗多防難貫膿收靨急

用參芪止之

失血 熱甚吐衄便尿失血並宜犀角地黃湯 上方見

出痘時口鼻及耳血不止者死二便下血者亦死

尿澁 宜導赤散 小便澁宜通小便用大連翹飲大力子

五連翹當歸白芍 各一錢 防風柴胡木通黃芩 各八分 荆芥車

前子梔子 各五分 蟬退甘草 各三分 姜片煎服 痘不快煩躁

咬牙尿澁用人參蟬退散人參蟬退木通白芍赤苓甘草

紫草茸

各五分

煎服又宜紫草木通湯

紫草茸木通人參赤苓糯米甘草煎

便秘 大小二便秘結則腸胃壅遏毒氣無從發泄而變矣

凡大便二日一下者為順三四日不便為秘二日三四便

為利矣 大便秘宜當歸丸用當歸五錢甘草二錢黃連大

黃各一錢半各為末先將當歸熬膏入末為丸棗豆大米飲

吞下五七丸漸加服以利為度 或四順清涼飲或用

密皂丸 蜜二三兩熬如膏糖入皂角末二錢和勻捻作小

條子納穀道中 加猪胆汁和勻効更連

小便黃赤短澁並宜清金降火不必利水以從肺治大便秘結有

熱宜涼血燥宜順當痘疹之四五日不大便者乃氣血成

之藥解之其班漸退如赤班成塊其肉浮腫結硬者又名

丹瘤痘未就此先潰不能治 夾班痘荆防敗毒散主之

班退可治 用元參升麻湯加黃芩荆芥歸芍 班紅易

治紫斑稍難藍斑不治 夾班痘用犀角地黄湯 又用

地龍汁和犀角水服 治班各法又見上痛痒

夾丹 痘裡夾丹內熱之極也不宜遽用極寒透裡之劑若

標兩三日竟以化班湯徐徐浴之化班湯用金線薄荷大

水楊柳荆芥蒼耳草四味煎濃去渣將頭髮滾湯洗去油

垢煖處浴之內服五龍湯用黃連 三錢 生地 九錢 芍藥 三錢 紫草

茸 三錢 煎濃磨犀角汁和服 此方治痘一見形就似蚊蚤

咬的形者經云臣陵於主逆天條有福兒童驀地逃摠然
和順成功去也在刀山走一遭好把化班湯浴之

內服五
龍湯

夾丹痘 外以化班湯浴之內服生地大力子芍藥甘草木
通荆芥穗其毒自消矣頭面頸項倘如蛇纏硬腫火燒疼
痛宜用炒黃連紫草梔子車前子等王宇泰先生治痘準
前藥加減單用露桃花二錢卽丹收痘朗若腫痛須加柴
胡羌活生地芍藥倍之

夾瘡瘍 痘裡夾瘡痘迎瘡見隙而盤据愈密痘起氣虛風
痒自作用紫蘇荆芥湯浴之用芍藥黃芪生地防風白朮
殭蚕甘草蟬退紅花大力子酒煎服若楊梅瘡爛加牛黃

香馬蘭有三種分別青紅白根浮上紅者尤佳治用升麻

黃芪爲君芍藥生地爲臣羌活防風

爲佐

甘草蟬退

爲使此準格也

夾損傷

痘標一兩日或致跌撲或傷金石用人參黃芪當

歸紅花哺雞子蟬退防風白芍甘草以補托其內用文蛤

棕灰掩於傷處以收斂其外可也若損而不破者用蝦蟆

皮貼之徐徐以手摩撫若是湯潑火烙者不宜敷生冷之

藥以凝滯其痘也

宇泰先生治跌傷出痘用前方倍參

芪歸地身帶不甯加茯神桂心痛甚者少加乳香外單用

棕灰敷之若傷重痕濶勿克收痂用白芨白斂象皮搽之

白痘 有一等白痘似粉醫人所不識有盤有頂而軟肥者

用加減大紫草散治白痘似粉人所不識者用紫草人參

茯苓黃芪白朮芍藥川芎當歸甘草糯米等分每服五錢

水煎服 一方有木通無黃芪名紫草快班散 又一

方去甘草加木通防風名參芪四聖散治表裡俱虛

黑痘 黑而有光此貴品也人所不識

補元湯 治痘頂充滿而根盤不聚色不紅活乃氣有餘

而血不足也用川芎當歸白芍酒炒熟地各一錢紫草紅花

各酒洗七分陳皮甘草各三分白朮土炒一錢半糯米五十粒棗二枚酒

水各半盞煎服 觀此可知吳氏云氣愈盛而血愈乾

涸之旨矣 原說云初見深紅失於解散至於乾枯黑

稻當以涼血眼熱為症不須藥用

故頭常欲涼足常欲溫如頭溫足冷者不治 如因熱深

而厥者大便不通三乙承氣湯用大黃芒硝厚朴枳實各

錢甘草五分姜一片 瘡黑者百祥丸 如因泄利氣虛

而厥者陳氏木香散異功散 但十指頭微寒者四君子

理中湯並加桂主之又手足並冷寒戰咬牙或吐瀉不食

用獨參湯加炮附子先用一錢未應多加之更不應加至

四五錢或等亦無 如已脫者不治 又二神散治傷冷體寒肢冷

腹痛口氣冷難發者暫用丁香 九粒 乾姜 一錢 煨 爲末每服五

分白湯下蓋被片時令脾胃溫煖陰反陽回則痘變順矣

量兒大小輕重服之 其人曾多吐瀉脾藏虛怯宜和中

發表又宜急以朮作湯飲之不可因循空談廢事也先以

黃芪建中湯加防風羌活或四君加黃芪桂枝防風以發

之後以四君加黃芪白芍當歸桂心以補脾胃養氣血

不能食 四五六日前而不食者此毒盛於裡猶可治也六

七日後而不能食者難治 痘已痂起而不食宜調脾胃

其人怯弱而不食或因犯胃氣臟腑自利而不食者為虛

當溫養之益黃理中姜附輩主身熱中滿而不食者為實

當清利之白虎湯五苓輩如腹脹不食口角流涎者四君

加陳皮名小異功主之有欲食而不能食者必喉舌有痘作痛

也以爛粥米飲頻頻與之更以甘草桔梗牛蒡子解咽喉

利胸膈

其色紫暗作痛以致不救用仙方活命飲見外科如二便秘

少加大黃遍身拘急加麻黃有肌肉微腫狀如堆粟不

分類者有初出紅點變黑其硬如石者有中心黑陷四畔

突起載漿者有中心載漿四畔乾焦者有頭載白漿自破

淡爛者有為水泡者有為血泡者有瘡頭針孔漿水自出

者皆於五六日間候之但見一症即不可治痘疔必用針

挑出黑血吮去毒血見第六板宜參之又可用隔蒜灸法凡痘瘡起

發之時但見乾燥其根焦黑者即內服奪命丹外用四聖

散塗之用菘豆四十九粒豌豆四十九粒珍珠一分油頭髮燒過一分

為末胭脂水調先以銀簪撥開黑瘡以此塗之或用二

聖散用雄黃二錢紫草茸三錢為末胭脂水塗之

捲簾疔

痘六七朝舌望上捲喉鎖煩渴疔結舌根疔甚者

如黑豆次者似葡萄急把銀鈎鈎破患處拭淨惡血隨以
苦茶嗽口盡吐其惡血用龍宮丹水片礪砂青黛薄荷荆
芥殭蚕炒黃連為細末吹喉內又方用蛤蜊汁和玉露
滴者亦可按此疔人多不曉天殺兒童若患此者痘定
心經急宜清解若補助之藥不宜服也

燕窩疔

痘形五六日而腋下硬腫兩手坦垂不能活動煩

躁譫語眼碧臉赤惡渴吐沫乃毒結脇下名燕窩疔急用
銀針挑去其根盡除惡血隨將燕窩打水澄清者洗淨以

白芍連翹燈草煎服 歷詳此症左腋潛注則右體之

痘沉伏右腋潛注則左體之痘叛逆是準格也

火珠疔 痘六七日鼻竅中填塞噴火氣息甚難惡渴煩躁

面赤眼紅痰緊飲食不餐熱烙名火珠疔宜詳眼翻氣急
手足亂撒則是矣 外要鈎破隨將藥點入眼角再服瀉

金湯則愈用黃連膏和冰片點眼角 瀉金湯桔梗牛蒡

子白芍甘草梢生地紅花紫草茸木通犀角煎服二劑

忘汲疔 痘六七日兩眼沿倏然結痂疔毒封蛤腫脹熱極

而面色紫煩渴則以治鼻疔法治之挑破處速以瓦松搗
爛掩之益此處不可鈎穿者也 又方專用山慈菇和蜨

鰻肉搗爛掩上取疔根亦捷法也

豕虎疔

痘正要會膿結蠟而耳孔內結成疔毒急宜錐破

隨用鵝管石女真子薄荷共研極細末吹於患處再用馬

蘭根洗淨寸斷塞耳

王先生曰此方鵝管石宜改元精

石內還有冰片女真子亦是女貞

注命疔

痘期裡兩足掌心痘毒成疔硬腫惡痛或如錢樣

或如大黑豆或如胡椒並紫筋直注透足股盤處急用銀

針挑碗盡去惡血隨用田螺水調冰片點三次再以慎火

草

又名火丹草

菘豆浸胖搗爛掩於患處內服化毒丹

驪舍疔

痘直五六朝身發熱惡躁譫語兩眼翻厥肚腹膨

脹小便閉塞惡寒厥逆

爲細末將黃連細茶濃煎候冷取半匙調藥把細軟稻心
蘸藥通納其竅中再用油菜子鏟將其莖內服木通敗毒
散 昔一僧用細銀絲通竅內隨以清水漱口淨翕之以
盡其毒血外用真珠片腦調服亦驗

透腸疔 痘六七朝之內腹中飽悶絞痛大便閉結煩渴遂

於糞門旁湊疔腫硬紫錐名曰透腸疔速針錐其毒用金

銀花防風煎湯冷淨隨以輕粉真珠粉片腦白斂末燈心

蘸塗其上內服黃連解毒湯 此疔有剔後用野菘豆末

和紅花末摻甚妙 亦有用苧根搗爛掩者有用桑杪搗

爛和射香敷者不如前方

俗名偷糞老鼠
者想可通治也

痘癩 急用大補氣血清熱解毒之法庶可求全若待敗面
墮鼻唇崩目盲肢體殘為廢人矣用十全大補湯苦參丸
合服十全大補湯乃四君四物加黃芪肉桂也

苦參丸

苦參

一兩

白蒺藜胡麻牛蒡子

各半兩

甘草

二錢半

共為末酒調麵為丸竹葉湯下

腫脹 凡痘腫脹面浮目閉者急與解毒護目救咽喉相兼

治之內用消毒化斑湯

升麻柴胡桔梗甘草牛蒡子防

風龍胆草連翹蟬退蜜蒙花淡竹葉煎食後服外用神

應膏

見護目

如頭面預腫或腮頰預腫此名大頭瘟用

羌活救苦湯

羌活白芷川芎防風蔓荊子桔梗黃芩

爛成窩者元氣虧損亦死症也患此者須服定金湯

定金湯 黃芪當歸白芍生地白芷防風荆芥升麻參

苓朮草加芫荇一握白銀一塊燈心廿煎服

王先生曰予每診臭痘膿血流溢者生臭不臭痒者生臭不延人者生臭不抓脫者生臭不黑爛者生犯此須以芫荇艾葉燒辟其穢氣隨用升麻紫蘇湯揩挹其臭處淨潔其衣服床被卽服前方無不獲全用寒水丹搽之

雞骨帶血肉燒過 銀硃冰片赤石脂各五分 棕灰二分 末搽之

蛆痘 蛆痘不死毒盡發也用經霜桑葉野薄荷煎湯洗之

其蛆自去或先以艾條熏之後以紫蘇甘草湯洗

治痘疔痘毒一切瘡毒莫妙於仙方活命飲 見外科方

治痘後餘毒 莫妙於人參敗毒散 又見外科痘癘

痘後再發 或氣稟虛弱坐卧振搖者宜保元湯

痘後忽遍身見青黑口噤搖擗此氣虛或感風宜消風散

痘後非時發搐目窺面赤乃心熱挾痰宜抱龍丸 見舉要

痘後餘瘡塞鼻中不得睡卧宜用辛夷花為末加射香 少許以

葱白蘸入鼻中數次即通名木筆花散

心痛不可忍此餘毒歸心急服乳香散乳香 二錢煎服

愈後失音宜服天花散 天花粉桔梗白茯苓訶子肉菖蒲

甘草 等分 為末用水調半匙在碗內外以小竹七莖黃

白煨五錢 白礬二錢 共為末先以韭菜根老茶濃煎雞羽蘸

洗去腐爛惡肉至見鮮血乃敷藥日三次爛至喉中者用

小竹筒吹藥入雖牙齒爛落口唇穿破敷藥皆愈但鼻梁

發紅點則不可治

痘後咽喉腫痛宜七味甘桔湯甘草桔梗各五 防風大力子

元參升麻射干各三分 煎服

痘纔著痂即用菜子油即蔓菁子不住潤之可揭則揭若不潤及

遲揭則痂硬必成癍痕 揭之血出亦無妨

痘痂雖落其班猶黯或凸凹肉 韶粉散塗之韶粉輕粉等分

研末猪骨髓熬熟調成膏薄塗上一名減 日三次

痘後取活蠅子以水養之五日取此水洗面無班痕

痘後收靨時取稀痘湯洗面則無班洗半面半面無班神效

稀豆湯六月上伏日採葫蘆嫩蔓陰乾只此一味並無別藥

痘後下利膿血或下腸垢宜犀角地黄湯黃連阿膠丸

下痢 血黃赤宜薤白豆豉山梔煮薤白爛去渣服名薤白湯

孕婦出痘 孕婦出痘宜單胎散熱甚宜參蘇飲稠密宜內

托散見十板 倍白芍當歸去桂加香附烏藥胎動宜安胎散

單胎散赤苓白朮赤芍柴胡乾葛人參當歸桔梗黃芩防風

陳皮荆芥枳殼紫草阿膠白芷川芎砂仁甘草各三分 糯米

百苧根七 柿蒂七 瓜蒂一 用荷葉蓋覆水以銀器入煎空心服

痘後眼生醫膜遮睛 宜瀉青丸以竹葉湯和沙糖化下微

利神効 但和血解毒則疼痛自止醫膜自去不宜點藥

痘毒入眼生醫膜宜用蟬猪散蟬壳一兩猪懸蹄甲二兩入罐內

鹽泥固濟燒存性羚羊角屑二錢半為細末一歲兒取三

分三歲兒五分漿水調服日三夜一但半年內者一月取効

痘後眼腫痛突如桃者貼護眼膏見眼腫不開黃連末調雞

子清貼兩太陽穴及兩足心 食毒物睛凸出宜二仙散

二仙散仙靈脾威靈仙各一錢煎服

癍疹辨 有色黑而無顆粒者曰癍浮小而有顆粒者曰疹

癍紅痕如錦紋或如蚊迹熱極則發疹者如粟米微紅隱

隱皮膚不出作痒全無腫痛

痲 痲子最小隱隱如痲子頂平軟不碍指 痘屬五臟難

出難靨痲屬六腑易出易靨

出痲 痲毒原來只肺胃紅斑五六日方出狀如痲子遍身

無空處初熱三日出發起脹共三日出而又沒沒而又出

出沒一週時許重者遍身綳脹眼亦封閉有赤白微黃色

不同仍要紅活最忌黑陷 按此可知造名爲痧 實卽痲之紅者

痲疹雜症與痘大同但始終藥宜清涼以升麻葛根湯加葱

白蘇葉乃痲疹初起之神方也或用蘇葛湯亦妙或以加

味敗毒散表之汗出身涼紅痕自滅

壳桔梗川芎天麻地骨皮各三分加紫草蟬退紫蘇麻黃

夏月少用葱白煎服表汗之本方除參苓恐助火也

麻疹當以葱白湯飲之其麻自出如渴只宜葱白湯以滋其

渴使毛竅中常微汗潤澤可也過三日不沒者內有實

熱也犀角地黄湯見解之

葱白湯 生葱去青葉取白連根鬚水煎取汁服

痲駁 疹毒之病是肺胃熱毒熏發於皮膚如蚊蚤所咬今

俗謂之紅疫俗謂之宜葛根麥冬散出沙

葛根麥冬散 石膏煨一錢 葛根麥冬各六分 人參升麻赤

芍赤芍甘草各三分煎服

死症 麻不出而喘者死變成黑班者亦死麻沒後餘毒內
攻尋衣摸床譫語神昏者亦死

麻疹初出全類傷風發熱咳嗽鼻塞其淚汪汪或嘔或利面
腫涕唾稠粘全是肺經之症不可犯風寒宜慎飲食爲要
但據見症以瀉白散桑白皮地骨皮甘草知母貝母桔梗
梔子牛蒡子生地荆芥麥冬等加減大劑投之卽至危至
險之時無不愈者若用苦寒降火辛溫發表之藥則死矣
麻有發熱至十餘日始見者大抵主在發散肺經之熱毒者
始事也調理補養病後之元氣者終事也其間或兼風兼
痰或傷食並隨宜加對症之藥其有變症卽隨症用藥不

各一升甘草三兩以三豆淘淨用河水雪水尤妙煮豆熟去甘

草將豆晒乾又入汁浸晒令乾逐日吃豆可免出麻出痘

北人謂之粉瘡南人謂之麩瘡吳人謂之痧越人謂之瘡古

所謂麻麻發於肺清涼為宜日中淚出肺熱移於肝也或

手搯眉目唇鼻及面者肺熱也凡麻初起用瀉白消毒散

桑白皮地骨皮新鮮者佳大力子炒研荆芥穗各一錢半桔

梗甘草各一錢浮萍晒乾為末每用三錢煎服如初起重

者用旋覆花去梗麻黃去節水煎去沫前胡各七分荆芥穗一兩炙甘草

製半夏赤芍各五錢大力子炒研浮萍各七錢每用三錢加姜三片

薄荷七分煎服若泄利加白芷升麻葛根煎服能起死回生

卽十分危急守定此方必濟王宇泰先生創方活人多矣
辨症 如手足稍微冷惡寒無汗面色青慘左額有青紋者
傷寒之熱也 足稍微溫發熱有汗面赤而光者傷風之
熱也並宜遲散用桔梗細辛人參甘草茯苓白朮花粉
薄荷生姜煎服 面色青紅額正中有紋手掌有汗時作
驚惕手絡脉微動而發熱者此驚熱也用瀉青丸或牛黃
丸抱龍丸 目胞腫而右頰有青筋發熱而頭額痛腹肚
最痛或嘔吐者傷食也問所食何物卽以其物燒灰存性
山查麥芽砂糖湯調服 身熱而倍能食唇紅顏赤大小
便秘脇下汗者此風熱也 以上諸熱久而不去麻疹亦

上焦多吐宜黃芩炙草白芍加茅根蘆根枇杷葉

去毛 蜜炙 下焦

多利宜黃芩湯

芩草芍

送下香連丸中焦吐利俱多以黃芩

湯多加蘆根茅根調下六一散痢甚宜黃芩湯

芩草白芍 加

黃連滑石血痢加地榆凡麻疹吐利純是火邪

不可作別治

麻出咽喉痛用甘草桔梗大力子連翹射干或牛蒡子湯等

外用玉鑰匙吹之

硼砂元明粉

各三錢

僵蚕

炒

冰片

吹之

如咽喉腐爛加牛黃真珠末辰砂更妙

麻只怕不能得出若出盡則毒即解

渴喜飲水乃肺焦胃乾心火內亢也初發熱渴者前發散藥

中多加石膏天花粉或葛根麥冬散亦可渴甚者白虎合

黃連解毒湯用黃連黃芩知母石膏梔子竹葉麥冬生地

甘草煎服時入犀角少許胃熱渴甚多服此方免生牙疳

麻要一齊湧出謂之出盡以火照之徧身如塗朱此將出之

狀出形細密但隨出隨沒粒粒成瘡色喜通紅若色淡白

者心血不足也用養血化斑湯 歸身生地紅花蟬退人

參生姜煎服若色太紅殷或微紫者血熱也或出太甚者

並用大青湯 大青元參生地石膏知母木通甘草竹葉

地骨皮荆芥穗煎服 如色黑者不治

疹子即麻痧也 出沒常以六時為準假如子後出者午時即收午

後出者子時即收凡此隨出隨沒者輕若一出三四日不

麻疹欲出則遍身發熱或煩躁或頭眩或身拘急既出則身

便涼諸病悉解如麻痧既出熱甚不減此毒壅遏急用

大青湯見上便澀者以白虎合黃連解毒湯見上大便不通者

四順清涼飲用赤苓當歸大黃各五分薄荷三分煎服如小便

不通加燈心木通若嘔泄者加柴胡橘皮黃芩半夏人參

茯苓生姜竹茹煎服

疹出發熱不退飲食不進宜加味地骨皮散用鮮地骨皮鮮

桑白皮麥冬銀柴胡赤芍甘草乾葛生犀角調大無比散

滑石水飛六錢甘草一錢硃砂飛雄黃飛各一分為末調服

麻痧不出之時當早發散以解其毒則無餘災否則必成疔病而死

收後身有微熱此虛熱也不須施治如熱太甚或日久不減

以柴胡麥冬甘草人參元參煎服如髮枯毛豎內消骨立

漸漸羸瘦者柴胡四物湯主之如熱不除忽作搐者止用

導赤散加參麥服安神丸切不可作急驚風治 凡麻疹

初起多瀉不妨惟愈後忌瀉若重發熱急宜大補氣血 略兼疎風

疹後牙根黑爛肉腐血出口走馬疳宜馬鳴散用蚕退紙卽

名馬鳴退火燒過 二錢 人中白 煨如白鹽者五錢 五倍子 生用一錢

再用五倍子一錢同白礬 一錢 煨枯 研細末先以米泔濃汁浸

洗以此敷之神效

疹收之後動作如常有忽然心腹絞痛而死者是元氣虧損

也間有用人參湯研調蘇合丸

唇有瘡虫蝕其肛下唇有瘡虫蝕其藏腑嘔啞其聲上下不

定也麻痘後尤多此症宜化蠱丸 黃連五錢 川椒炒 苦棟

根白皮乾者各二錢 共為末大烏梅七個 艾湯浸去皮搗為丸艾湯下

若更煩躁漸成疔者用清熱除疔丸 黃連當歸各二錢

冰片青皮陳皮蘆薈各一錢半 川芎乾蟾頭燒各一錢 使君子肉

一錢二分 共為末神曲為丸米飲下

凡冬月溫熱防春發痘宜預服三豆飲方見上 服七日可免出麻痘

鄉鄰出痘取真麻油一碗 遂日飲之令盡則永不出痘

禁忌 麻後忌食雞魚必更出 鹽醋令嗽不止 五辛葱韭姜芫 令人

驚熱忌四十九日 發熱未退不可與食與傷寒症同

麻初熱卽戒風寒瓜果生冷犯之變紫黑色而死如極渴欲
飲水只宜少與葱白以滋其渴須使皮竅中常微汗潤澤
麻後忌吃梅桃魚蜜一切香鮮之物恐惹疖虫上行

水痘 痧

水痘似痘而皮薄如水泡破卽易乾而出無漸次白色或淡
紅色冷冷有水漿者是此表症發於腑也又輕於疹子大
率無害如無內症不必服藥恐無事而生事也

痧

稽古方書知麻也疹也痧也瘡也糠瘡瘡也膚疹也

一物而數名各因其地而稱之不必疑痧麻有兩治也吳
人謂之痧古謂之麻聞人氏所謂膚疹是也今人分麻痧

寒温不節將理失宜乍煖脫衣甚熱飲冷坐卧當風居處暴
 露冲冒霜雪凌晨早起呼吸冷氣久晴暴煖忽變陰寒久雨
 積寒致生陰濕如此之類皆能使人身體沉重肢節痠痛項
 背拘急頭目不清鼻塞聲重淚出氣壅胸膈凝滯飲食不入
 混名傷寒不即解散必成大病方書千百眩日迷心不學數
 年無從問路舉要三方治人百病感冒初起勸人服之無疑
 一凡男婦大小但有頭項痛骨節疼發熱惡寒無汗等症用
 羌活湯 非獨治四時之風寒春可治温夏可治熱秋可治

濕治雜病亦妙而冬令尤宜 羌活防風 各一錢半 蒼朮川芎

白芷 各一錢 細辛 五分 甘草 五分 蘇葉 一分 豆豉 炒四錢 姜片棗 二枚

舉要

去核葱白三水煎服日二劑如天氣和煖及春夏秋三時

加生地酒苓各一錢二以泄邪熱有鬱加香附二錢大香三食積

加神曲各一錢半山查各一錢半若陰虛氣弱之人勿用此方

人參敗毒散 治暑濕熱時行感冒 人參即黨參茯苓枳壳

檉柳柴胡前胡羌活獨活川芎各一錢甘草五分薄荷六分姜片三分

河水煎服或加荆芥防風如病人蘊熱煩躁在初夏及

七八月間可加梔子炒一錢二豆豉三錢

藿香正氣散 五六月七八月統治用此方功難盡述藥店買

丸每服三五錢藿香湯過服日二服亦可藿香大腹皮紫蘇

茯苓白芷各三錢陳皮白朮土炒厚朴姜汁炒半夏曲桔梗各二錢

甘草一錢姜三錢棗二錢煎服亦可以上三方通治用

汗可作熱粥投之粥內加葱白甚妙

此仲景法令用白茅根湯澄清作粥亦妙

服藥後腰以上則如常覆之腰以下則厚衣覆之欲令手

足皆周到澌澌然一時間許不可令如水淋漓耳若病不

解當重發汗 凡服發汗藥中病即止不可多服汗之太

過必作亡陽症也慎之

不可汗 太陽症非頭痛項強不可汗非身熱惡寒不可汗

脈微弱或尺脈遲者

營血腎氣不足

不可汗

衄血亡血風溫濕

溫虛煩咽喉乾燥小便淋婦人經來均不可汗

孕婦傷寒頭痛寒熱咳嗽用黃芩前胡麥冬

各一錢

川芎陳皮

白芍

土炒

白朮

各八分

紫蘇

六分

葛根

五分

甘草

三分

姜片

葱白

三莖煎服

孕婦傷寒發熱及產後發熱熱入血室用小柴胡半夏黃芩人參甘草

柴胡

合四物

川芎當歸白芍生地

煎服名黃龍湯

凡服藥後切宜避風防風能引風入骨故也

又有一種內傷氣血外感風寒一見風寒即便惡之得煖即

止身雖煩熱袒裸即涼寒熱間作而不齊頭痛時作而時

止自汗困怠口不知味等症是內傷也用補中益氣湯

黃芪

一錢半

黨參白朮

土炒

甘草歸身陳皮

各一錢

升麻柴胡

各三

分煎服

如外感重者加生地川芎羌活防風

各七分

細辛

三姜

三片

棗

二枚

葱白

三莖

煎服名陶氏補中益氣湯

病宜早治說 手集方書五十年矣信筆抄寫不次前後其

隨症用方不可以方試症也蓋外感無內傷用仲景法固
已有挾內傷者丹溪治以補中益氣海藏治以九味羌活
或用逍遙或用加味益氣治之於早又何傷寒之有

小兒變蒸切忌推拿說 兒生之日三十二日一變長生臟

腑益智故也每三十二日一變生腎六十四日二變一蒸
生膀胱由是生心小腸肝胆肺大腸脾至三百二十日十

變五蒸生胃然後始生齒而能言每變蒸前後或有發熱

吐哕將息自愈粗工以為驚妄推必死

元氣推
虛故也

凡週歲以

丙及冬令大風久病吐瀉虛弱之兒皆不可推妄推則死
如春秋時令和暖或有驚搐以蔥姜搗汁在兒兩手心足

心兩手灣足灣心灣心胸背腹輕揉二三十遍亦可但宜自推

不可用推拿之人也

若輩目不識丁只圖取利不顧兒之死活故不可用

小兒四時感冒風寒溫疫邪熱煩躁痰嗽氣急發搐伏暑等

症用抱龍丸如黃豆大一丸燈心湯冬月姜湯化下連進

二服神效之至治初病大妙若久病慢驚虛症切不可服

抱龍丸

有四方

抱者保也龍者肝也肝為母心為子母安則子

安心肺肝藥也 胆星雄黃天竺黃辰砂射香又方加入

人參琥珀茯苓甘草枳殼枳實山藥金箔檀香又有牛黃方

僵蚕鈎藤

又有蜂蜜黃蠟方

陰囊濕痒難忍用牡蠣

煨

黃丹炒

枯礬研末

搽之立止婦女陰戶濕痒同治

雜記 茉莉花不可放床上能引蜈蚣 蜀葵古時能...

飲食 糟蟹久留則沙見燈照亦沙以皂角一寸置瓶下則
不沙 醬內生虫以草烏碎切入之虫卽死 煮魚臨熟
入川椒多則去腥 米醋內入炒鹽則不生白衣 用鹽
洗膾臟則不臭 夏月魚肉內安香油久不臭 銅錫器
內不可盛酒過夜有毒 晒肉須抹油不引蠅 寸切稻
草用煮臭肉則臭皆入於草內 冬瓜切動以石灰摻之
則不爛 煮猪脂及血臟不可入椒同煮作猪糞臭 煮
羊不爛就竈邊取瓦一片同煮卽爛如泥 洗猪肝用麵
不氣洗猪臟用沙糖不氣 夏月肉單用醋煮可留十日
凡燒肉忌桑柴 酒酸用赤小豆一升炒焦袋盛入酒壘

中味卽香美 六月六日取井華水收藏可治病用作醋

醬一年不壞 凡酒壘忌見日影若見日影照之其酒必

壞 如錢大者亦忌 欲知酒之美惡但以手扣其壘聲清而長者酒

必佳重而短者其酒苦聲不響其酒必壞 黃酒煮酒少

入燒酒則經宿不酸 錫器藏酒久能殺人 砒者錫之苗也

米 凡米宜殘年春好若到春春則米發芽必多虧折

米囤上須多用草一尺蓋好頻頻取出晒乾易之則不壞

預收棟樹根葉鋪米棧內上米不蛀 稻草囤收藏白

米仍以稻草蓋之以收水氣踏實則不蛀 板倉藏米必

用草薦襯板以收水氣若藏糯米勿令發熱

搓去皮鹽
水略炒研
洋糖泡湯日飲之

胎至八九個月及足月宜多吃麻油
不可腐皮
蒸熟腐衣服至一百張易產

二物解毒滑胎又宜猪胰子
飯鍋上燉俱易產

忌吃椒姜煎炒猪血猪肝甲魚蟹忌見龜兔及一切
宰殺凶惡之事

有孕後須要兩邊換睡不可儘在一邊則易產

八九月時預買桂元四五十個
去壳取肉置湯碗內綿紙封口作

孔令透氣於飯鍋上日日蒸之極爛候臨產時用

產前宜備加味芎歸湯一劑
俗名四味湯方見婦人門益母草三斤生化

湯二劑
方見婦人方十五板炭燭酒醋粥米雞蛋裏兒綿花等物

有臨月先服宮中十二味兩三劑者方用黃芪
八分當歸

酒洗川芎兔絲子各一錢白芍一錢川貝一錢荆芥穗八分

蘄艾七分厚樸姜汁炒七分羌活五分枳壳六分炙甘草五分

姜三片水二碗煎八分空心服臨產服之即生真仙方也

臨產要法 腹痛須自家立定主意不必驚慌若痛得慢則

是誠痛只管安眠穩食不可亂動要看一連五七陣漸痛

漸緊此方是生產乃可與人說知以便伺候此第一辨清

臨產必要上床安睡閉目定心養神惜力若不能睡暫時起

來或扶人緩行或扶棹立定痛若少緩又上床睡摠以仰

睡為第一妙法使小兒轉身不費力自無橫生倒生之患

又立時宜正立坐時宜正坐不可將身左右擺扭

切勿不可輕易臨盆用力

產皆是時候未到用力太早之故

倘若用力太早致有橫生倒產者急宜安睡用大劑加味芎

歸湯救之

卽芎歸龜板血餘四味是也

將兒手足輕輕托入再睡一

兩夜自然生矣切勿驚怪又曰倘托之不入奈何曰若肯睡再無托之不入之理若吃四味芎歸再無難產之理此時只怕不與他睡又或動手動腳亂吃方藥則難救矣

臨產時只可老成曉事者二三人安靜伺候不用多人其一切親戚婦女俱勿令入房恐有大驚小怪致產母不得安睡而悞事也更忌求神許願混鬧悞人性命

飲食宜頻頻少與食之或鷄鴨肚肺清湯粥湯最妙

粥湯宜多備

冬月房中宜設火盆夏月尤多設井水仍頻換之

試痛 兒七八個月或母腹中有火或起居不時令兒不安

而痛不足爲奇只宜照常飲食加意安眠一二日自然平

靜或痛之不止用保產無憂散

卽宮中十二味方見上

一二服自止

此後近則數日而生遠則一三四月而生若不知其故

輕易臨盆終日坐立不令睡倒或揉腰擦肚或用手拖或

用藥打多致不救者多矣須辨清痛法一陣慢一陣或乍

緊乍慢者皆試痛也若一陣緊一陣者方是正生

傷食肚痛者當臍而痛手按之更痛或臍傍有一硬塊也

受寒肚痛多在臍下綿綿而痛不增不減得熱而少減是也

嚴冬天氣滴水成冰貧家房中無火以散

而產豈有此患

若依此言世無難產者矣然亦有母體太虛胎失所養者前胎

宜大補氣血

又有母病傷寒之後熱毒傷胎者又有慾火傷胎

者有平日過食椒姜煎炒熱毒傷胎者以及跌撲損傷者

多令胎死腹中否則更無難產矣

用力不過一盞茶時 小兒果到產門則渾身骨節疎解胸

前陷下腰酸腹墜迥異尋常大小便一齊俱急目中金花

爆濺真其時矣

桂元湯當於此時吃之

當於此時臨盆用力一陣子

母分張何難之有若非正產而妄用力必有橫生倒產事之

產後上床宜高枕靠墊圍緊腰間

恐腰間無力坐

勿令睡下膝宜豎

起勿可伸直隨飲熱童便一盞繼以益母草湯加入沙糖一塊或

生化湯一盞時時以粥湯與之只宜閉目靜養勿令睡熟

防血暈故也恐倦極熟睡則血氣上壅因而眩暈但不宜高聲

急叫以致驚恐須一周時一日方可睡下宜時以手從心輕磨至下腕

四壁宜遮風不問有痛無痛俱用熱童便和熱酒各半每次

一杯一日三五次間以益母湯酒亦不宜多若無大病不必服藥

產後宜用白石子燒紅入醋令醋氣入鼻帳中常有醋氣可

免血暈且收斂神氣肝氣又能解穢每日三四次亦三日而止

產後惡血冲心血暈不省人事者急用韭菜一把切碎放有

嘴壺瓶內以熱醋一大碗灌入蜜札壺口扶起產母以壺

嘴向鼻遠遠熏之腹痛甚者用生肌湯一服即愈

隣而與之以子不可咨嗟怨言令婦氣苦成病傷生只宜好言安慰又有將女溺死者決然乏嗣天理不容

飲食各處不同只要粥時吃粥飯時吃飯三日內只用雞湯吹去油澄清飲之未可食雞十日內不可吃猪肉一月內不可吃猪油恐其壅塞經絡氣血不通耳餘無所忌

雞子能去瘀生新但要煮得熟透方好糖心者大忌鴨子切不可食

忌飲醇酒食鹹味能燒乾乳汁只宜淡酒食淡最好

乳少者血虛之故用通脈湯生黃芪一兩當歸五錢白芷五錢乳

猪蹄對一煮湯吹去浮油煎藥服之覆面而睡即有乳二服必效

華陀愈風散 治產後中風口禁血暈心頭倒築吐瀉欲死

荆芥穗

除根不用
焙乾研末

每服三錢童便調服口噤則灌之牙齒

咬緊則不研末將荆芥童便煎灌入鼻中其效如神

一切胎漏血崩死胎胞衣不下橫生倒產又見婦人方

急救 有兒先露背者令產母正卧以手徐推兒背下體令

其正直復以中指摸其肩勿令臍帶絆住即生 有兒先

露足者令產母正卧以手徐推兒足仍推兒轉正即生

又有一法以繡針微刺兒足跟彼即上縮令產母安睡忍

痛片刻即順生矣 有兒頭偏在一邊者令產母正卧以

手徐摸兒頭扶之即生或兒頭後骨偏在穀道傍徐推近

上即生 有兒頭雖正但不能下因胎轉時臍帶絆肩也

用中指按兒兩肩理脫臍帶即生 皆用力太早之故

巾帶高懸令產母以手攀之輕輕屈足良久兒順卽生

又有胞漿流二三日不產者不必驚慌切勿可動手惟安睡

俟漿流漸少或流盡自生有漿水流盡胎乾難產者急用

四物湯芎歸芍地二二斤之多以大鍋在房內煎熬使藥氣滿

房口鼻吸受內服加味芎歸湯芎歸龜板血餘連進兩服以生為度

死胎辨法見前又法兒若未死少拔其髮必退入此法更妙

胎衣不下 有臨盆太早骨節開張兒下卽閉速衣下不及

者有驚嚇產母氣逆血滯停積不下者治已見前又法令

產母靜坐取桂元肉二十個煮汁半茶杯服下卽落此方

和血煖胃平肝降衣最為至切無須墜物手取致驚產母

古方有用草麻子

七粒

搗塗臍內胞出速卽洗淨否則爲害

胞衣不下有因臨產寒閉者有因惡露脹滿停阻者用產母

鞋底烘熱自臍上至小腹溫抹十四次卽下

內服紅花三錢脹消衣下

論難產之故

摠因人欠主持以致產母驚嚇氣血冲肝肝

旺則胃灼不甯卽有橫生停衣等患積血流入膀胱則成

寒熱血暈等患又有本人自招者平日懶於行動以致氣

血不和通臨產用力太早胎將轉力逼則逆胎纔轉力逼

則橫胎雖轉而頂門未露力逼則手足先出凡見此等不

必驚慌速令仰卧內服和血保產之劑則順生矣

小產重於大產其漿養調理須過正產十倍方保無病

小產後數日忽然渾身大熱面紅眼赤口渴此血虛之症宜

當歸補血湯大補陰血退血虛發熱如神可加減當歸

蜜炙黃芪兩水二碗煎一碗一服立愈若認作傷寒而用

黃芩石膏等必死

妊娠用藥 凡生地用姜製白芍用酒炒鼠兔二丸耗氣損

血產時百脉解散兒已出而香氣未消其損多矣回生丹

大黃紅花大破陰血多致血虛發熱遺患無窮總不如保

產無憂即宮中加味芎歸之無弊也芎歸湯妊娠有忌藥

勿可妄投如丹皮苡仁牛膝通草瞿麥半夏南星乾姜桃

仁延胡茜根槐角附子肉桂皂角藜蘆大黃紅花芒硝常

山天雄烏頭刀豆三棱莪朮乾漆射香巴豆非洞明病症切不可妄用

臨產六字真言一曰睡二曰忍痛三曰慢臨盆 按六字真

達生

言達生之綱領也但不詳產病之由不知此六字即可
保全天下萬世之妊婦也故歷詳產症之險使人熟此
六字即可免之猶之先開脉案而後以藥救之也

保兒舉要

凡生產艱難若遇天寒兒生下不哭或已死者

急用軟綿衣物包裹或令精壯人解衣將兒貼肉包住或
再用香油紙撚將臍帶慢慢燒斷使煖氣入腹可望陽回
氣轉漸漸作聲而活倘不急急偎抱或先剪臍帶則不可救矣

又方將胞衣連帶用火炙令煖氣入兒腹取一貓用青布
裹頭目令一伶俐女人拿住貓頭向兒耳邊以口重咬貓
耳貓大叫一聲兒即醒矣 初生無啼是肛門爲脂皮所

塞用簪通開

菖蒲搗生汁入口即活

又看舌下若連舌有膜如石榴子若啼不出聲不轉者以
指爪摘斷之有血出卽活若出血多用髮灰同猪脂塗之
斷臍法 兒出胎洗後方斷臍帶則不傷水生斷臍須將
汁盡否則寒濕入腹作臍風又須於近臍五六寸處以線
札緊以綿包裹以手溫剪刀令煖不可用冷剪刀略剪胞口在臍
帶上用綉搓軟新綿合之裹臍調其緩急急則吐呢二十
日乃解若十餘日怒啼必衣中有刺或臍燥刺腹當更裹
臍冬時須下帳燃火令煖凡換衣亦然仍以溫粉拍之

胞衣 兒胞衣乃兒性命所關密藏好置吉方則兒長壽若
虫蟻犬鳥食之則令凶死令俗用新瓶多以石灰封好

蓋口亦妙但石灰宜多

則不生虫蟻

蓋藏宜密耳

則不為人壞

貧家

有將胞衣賣錢合藥者兒必多病而天山崩鐘應理或然也錫醫某好買兒胞合藥舉家火死人以為孽報云

浴兒

兒生以益母湯洗之再以光粉蚌粉拍身上辟邪吉

三朝洗兒夏月則可冬月嚴寒斷乎不可洗則致兒百病

北方之人兒生下不洗但以舊綿拭淨包好放大人懷中

至二三歲出痘後方洗浴故元氣壯實 又古傳壬午及

丁未癸巳三日切不可浴兒主凶寅卯酉三日吉

切勿犯上三日

開乳

先以秬米湯一二匙

今人或用雪片糕

以助穀神再以川連

五分甘草二分水熬成膏與二三匙以解毒再吃硃砂飛水白蜜

二三匙然後吃乳

有用大黃者冬月斷乎不可

遺害無窮