



60





Don Juan Courtway Lib
OCT 31 1999

熱發渴嘔惡腰疼珠跳

傷於酒發熱咳咯血

每飲食入腹即疼痛吐出

通立

孫華野喉痛煩車腫

顯尤每辛苦及酒多



兄濕熱發

之痰火上衝大心痰或目嘔血一涌數

程之胎意

自面四肢

身熱痛

此處文字極其模糊，難以辨認，似有「身熱痛」等字。

僕婦產後惡露不盡腹中痛十四

狂好吾令孫右耳後生毒腫痛十五

率岳令堂右手臂肢節脹痛十六

程兩峰令眷血痢十七

程七護兄臍腹右邊疼痛小水不利嘔吐不進食

程社貴兄醉後御色次早胃腕痛極十九

汪松崗令眷左脇痛咳嗽內熱二十一

贊皇令堂產後左脇痛甚二十一

許少峰中風先兆二十二

朱宅女脊熱入血室 二十三

孫熙字肢節腫痛痰多嘔惡病多夢鬼 二十四

愛泉傷風咳嗽聲啞右邊不能貼席 二十五

汪婦戴氏有妊五月忽血大下午後發熱 二十六

靈岳迺脊胃腕疼痛頭暈舌麻 二十七

吳人峰先生內人兩脇脹急痛拒胃腕 二十八

陳鉄兄內人產後腹痛發熱下痢膿血 二十九

石洲延眷因產難子死憂 小腹方塊 痛 癢

多食圓眼腹益大脹堅 痛 癢 痛 癢

安有發明

程姬年八旬頭暈脚軟大便溏洩小水淋瀝 三十

程道吾先生令政夜厭鬼而驚馬時常暈厥 三十一

一僕婦瘟疫以勞食復作 三十三

程方塘年六十四風癱不能步者三載腿肉盡消 三十四

汪省吾瘡三日一發發於夜 三十五

汪東之丈七月初旬虛陽口瘡 有發明 令眷妊 三十六

中咳嗽 三十七

吳東渠瘡後虛憊 三十八

吳西源令眷以艱子多鬱多思肌肉盡削皮膚燥
揭遍身生瘡體如火燎二十九

族嫂程氏環跳穴這腫痛寒熱并發不能動止十四
恒宇瘡後遭跌環跳脫出不能復收四十一

作孫女周歲發慢驚四十二

程少湖以飲生酒面浮胸脹四十三

吳斗一原有腸風又感風邪發熱多痰腹痛下痢

任孫二水體甚肥胖患温瘧症四十五

寒興四十六泉元生左脇皮裏膜外疼痛四十六

色四十七患偏望臍腹腰俞脹痛四十七

一婦初齒感風寒致成鼻淵四十八

一兩峰痰血發黃吐出穢惡如爛猪肺狀大便色

如墨有發明 四十九

予表嫂小產後腹痛暈厥五十

陳士美傷寒熱症漏底有發明 五十一

程松逸兄酒疸五十二

仲諫患跨馬瘡有發明 五十三

一婦咳嗽痰中有紅五十四

周佃侄春温鼻衄寒戰 五十五

汪氏婦腹脹如斗 五十六

仲谷陽症侶陰 有發明 五十七

汪希明性躁痰火咳嗽吐紅 五十八

祝弘吾潮熱咳嗽汗流不止 五十九

汪宥翁老年勞倦感冒胸膈大熱而痞 六十

汪鍊兄內人經水紫黑血塊不止 六十一

程相如令政姪發寒熱 六十二

入台壯年咳嗽吐紅 六十三

德成女經行 月大發寒熱嘔吐 六十四

氏婦血崩後四版 腫 六十五

張雲門令郎囊癪 六十六

未宅內眷懷姪受驚而成子懸 六十七

胡鄰泉女吐血潮熱 六十八

汪思石令堂怒後暈厥 六十九

侄孫君實遍身筋骨疼如虎嚙 七十

葉子黑內人疫後虛憊 七十一

孫如亭令政右眼眦突生白泡二寸餘嘔吐眩暈

有發明
七十二

吳勉三腹痛欲死有發明

黃頤三內子產未弥月醉犯房事血來如山崩四

程心童兒類腮紅腫十五

程六十喘後發腫七十六

程七護夫發熱背痛伏梁積塊下痢紅白七

程孺人黃氏春温過時熱病七十八

程有望孺人月汛當止不止七十九

一近洲胸脇脹痛有發明

一老一內人吐

發熱

一八旬而發寒汗出不止飢餓連

聲八十二

孝廉方叔度令嫂汪氏脹十三

吳天威大便癰有發明

文貴者時疫漏底發熱語有發明

鍾澤程慶奎孺人哭子過傷因發寒熱有發明

歛潛口汪召南夫令郎盡脹有發明

岩鎮鄭景南夫痰飲積塊跳動不止有發明

醫案三卷

明新安生生子孫一奎文垣甫輯

門人 余煌

徐景奇

泰來

子

朋來

全閱梓

新都治驗

兄內傷飲食。外感風邪。洒淅惡寒。發熱煩躁。不寧。已經表汗瀉吐之後。小便短赤。口渴腹中疼。

夜不能睡耳聾氣塞神魂不安懊懷不已予脉
之兩寸滑大左關絃右關滑兩尺皆絃皆七至
據此適少陽陽明兩經合病仲景云渴而小便
不利者當利其小便先與紫苓湯加竹茹進之
耳稍聰稍得睡熱仍不退聞食氣即嘔以濟生
竹茹湯加人參麥冬黃連外與辰砂六一散三
錢服後神稍清手足心仍熱用竹葉石膏湯而
退王澳辰殊甚合目即譫語按仲景
不得眠者熱在心胸之間

得眠
枳子豆豉湯主之服後晚間仍不
塞難當改以小柴胡湯合白虎湯

進之即得眠睡中汗出二次耳頓通利因進食
早又發熱口渴舌上黃胎此陽明餘熱復萌乃
用石膏七錢甘草一錢知母三錢黃連一錢五
分百合竹茹各一錢竹葉三十片急進而熱全
退始得獲安

程龍坵翁每行動即作熱發渴嘔惡腰與環跳常
痛脉左沉細右寸滑關尺濡弱此上焦有痰火

下焦有濕熱。治當流濕舒筋。然後施補。先用以
仁三錢。蒼朮。歲靈仙。牛膝。黃柏。烏藥。葉紫荊皮。
各一錢。紅苓。桂皮。防己。各五分。水煎服。外以鹿
茸。虎骨。晚蚕沙。仙茅。黃柏。龜板。蒼朮。牛膝。杜仲。
蜜丸服之而安。二

汪松崗翁。原傷於酒。夜分有熱。咳嗽咯血。不思
食。左脇氣不調。左寸脈。芤。關。澀。尺弱。右寸短。
滑。此胃中痰火正旺。氣血俱虛。宜先清胃。保
然後六補。麥冬。知母。寒水石。甘草。紫苑。人參。

丹皮。白芍。藥當歸。貝母。桑白皮。煎服之。
大止。加側柏葉。茅根。四帖而紅止。過後四日
為怒氣所傷。血又動。左不能睡。飛仁。滑石。紅
當歸。人參。貝母。山梔。仁。甘草。香附。青皮。牡丹
煎服而安。予囑渠令子曰。寄語令堂。諸凡得意
事。可與尊翁知之。如不得意者。切不可使之聞
也。蓋肝為藏血之所。况血去多。肝火剝燥。心主
不足。內經云。主不明則十二官危。不可不謹防
之。且左不得。肝脹可知。予甚為尊翁慮。後三

年果為怒復死。命使迎予。予固辭謝曰。向曾訂
囑。今病之來。非不佞所堪任也。不逾旬而歿。二
族妹經不行者。二十日。每飲食入腹。即疼痛。必盡
吐出。乃止。居山。亦吐酸水。上焦熱。下焦寒。大便
半月始一行。長飲不進者四十日。六脉皆數。左
滑。右軟弱。妹能事者。以其夫多病。且不諳世故。
由是怏怏。病從思慮。而得恐成。膈症。今大便
結吐酸。乃膈之徵。急宜拂慮。庶藥有功。先與
靈丸一粒。吐止。繼用溫膽湯。加大腹皮。送

痛吐全安。故以二陳湯加香附。條芩。山梔。
參。砂仁。調理。而月經行。大便始潤。而膈症斯
作矣。四

孫華野脉沉絀。而數。喉痛。頰車腫。而大陽作脹。疼
遍身。皆脹痛。增寒發熱。乃痰火上壅。而變風熱。
將欲作毒也。宜急治之。薄荷。甘草。升麻。白芷。石
膏。枳壳。天荅。粉。桔梗。大力子。連翹。玄參。一帖而
愈。五

顯兄每辛苦及酒多。則咯血數口。脉兩寸皆短弱。

閔尺洪數此。胃中有痰火而下焦有陰火。由壯
年酒色所傷。以耳。以丹參滑石各三錢。白芍藥
二錢。麥冬貝母。薤仁紫苑。牡丹皮各一錢。當歸
七分。甘草五分。煎服而安。六

邑吳遂兄。木商也。在吳興年七十。因冒雨勞。汗
出。又以冷水澡浴。因而發熱。口渴。心與背
相脹疼。小便長而赤。舌上黃胎。夜不得卧。眼
如金。皮膚盡黃。吳興之醫見之。遠走不敢措
請其年高。不宜此病。讚勸回家。乃敦訪

得左麻浮船。石瀉弱。西子皆有。對子白

熱發黃症也。病雖重。年雖高。有是症。言有是藥。

母用倉惶。乃以柴胡三錢。酒芍葛根。青蒿香薷。

天荖粉各一錢。人參七分。粉草五分。連進二帖。

晚得微汗。即能睡。次早熱退其半。舌胎稍淡潤。

不焦燥矣。胸膈餘熱作煩。身黃如舊。以竹茹青

蒿芎根各一錢。人參麥門冬。天荖粉知母各八

分。白芍藥六分。二帖熱退。食進。精神陡長。後與

補中益氣湯。加青蒿麥門冬。天荖粉。十帖而眼

目肌膚之黃盡釋然矣。吳興諸公悉服其精當。各錄方而傳。七

族姪文學明之。以作文過勞。痰火上逆。大吐痰沫。因而嘔血。一涌數椀。昏暈汗出。奄奄而卧。畧不敢動。稍動即嘔吐。而血隨出色鮮紅。飲食湯水皆不敢入。入即吐。而眩運。血即隨之。里有婺君程聞野氏為之。診駭而走曰。血如涌泉。體熱脉大。眩運而藥食難入。倡無佳兆。乃速予治。予診視畢。語其乃兄勉之曰。可生。家張惶若

此勉之。以程言也。

曰。看症要圓活。勿拘泥。

據經云。心主血。肝為

口。又曰。怒則氣上。又曰。脉

虛身熱得之傷暑。

左脉絃大。右脉虛大。明之

不獨作文勞心動火。

且亦被怒傷肝。抑又為暑

所逼。以致木火上升。

眩運作吐。經曰。諸風掉眩。

皆屬肝木。諸嘔吐逆。

皆屬於火。又諸動屬火。內

為木火上衝外為暑

氣所迫。故吐而汗多。血隨

吐出也。醫貴識病。有

是病則有是藥。予特以白

丸子三錢解其暑。氣清其痰。飲抑其衝逆。則吐

可止吐止氣平則血自能歸經服後果啞然而
醒醒則吐止食進咳暈尋已繼用滑石香薷各
三錢甘草五分黃連白扁豆各一錢五分竹茹
一錢四帖全安

從嫂程氏年近五十患咳嗽吐臭膿血一日夜一
梳餘發熱晝輕夜重肌肉大瘦六脉浮而洪滑
且數人皆謂吐血身熱脉大法在不治予曰此
非吐血比也此係膿酒傷肺天為怒氣所觸痰
血濁痰滯於肺之氣竅無從而出久之化而為

膿成肺癆也治宜開肺竅活血化痰使膿盡當

自愈也諸人治之二年不効予教以白芨薏苡以

仁各三錢牡丹皮桔梗茜根歸尾山梔子貝母

白芍藥各一錢甘草葶藶子各五分三十帖全

愈後壽七十三以它病而終此疾再不復發之

族姪媳葉氏年三十身面四肢浮腫漸而入腹腹

大不可言眼泡腫而無縫飲食大減小水不利

此氣滯水脹也以火腹皮茯苓皮姜黃蒼朮厚

朴澤瀉木香烏藥陳皮服四劑而眼目能開飲

食稍進。即為食傷而復腫。予改用七傷丸調理
全安。十

族侄孫伍仲。立年善飲。好內。小便血淋。疼痛。予以
滑石甘草梢海金沙琥珀山梔。丁青蒿茅草根
煎膏為丸。梧桐子大。每空心及食前燈心湯送
下。三錢。不終劑而愈。後五年。因子遲。服補下元
藥過多。血淋又發。小便中痛極。立而不能解。必
蹲下如婦女小解樣。始能解出。皆大血塊。每行
一二碗餘。如是者半月。諸通利清熱之劑靡不

遍嘗不應。脉俱洪數。予以五靈脂蒲黃甘草梢
各二錢。小蘗龍牙草各三錢。水煎。空心服。二帖
而痛減半。血仍舊。改用蘘麥山梔子甘草各二
錢。茅根杜牛膝連葉車前草各三錢。生地黄紫
胡黃栢木通各一錢。四帖。痛全減。血全止。惟小
便了而不了。六脉亦和緩。不作前矣。後以人參
葛根青蒿白朮茯苓甘草白芍藥并麻黃栢知
母調理萬全。十一

令眷。辰州太守石峰公女也。吐紅發熱。經水二十

日一行。或一月行二次。白帶且多。胸高飽脹。脉
洪數。以丹參生地山梔子白芍藥小薊鹿角膠
水煎。臨服加入童便一酒盃。二十劑而瘳。十二
亮。御令愛。右目紅腫。如腹中飽。眼乃能開。飢則眼
不能開。此痺積虛寒症也。以夏枯草二錢。甘草
穀精草各一錢。香附一錢伍分。煎服四帖而安。

十三

侄孫少竹。大學生也。眼紅腫脹。余雲谷以苦寒治
時疾之劑與之。眼愈腫且增。兩太陽痛。前藥中

一。想。官才。惟眼腫不消。頭痛不止。且令遍身

眊。悶寢食俱廢。予為脉之。絃大而無力。乃用蔓
荆子桑白皮柴胡香附夏枯草甘草茅茶一帖
而痛定。兩帖腫消。四帖全瘳。十四

僕嬾產後惡露不盡。眼中作痛。且冒風咳嗽。嘔
吐頭暈。脚麻木。不知痛痒。亦不能轉側。與糖棗
子紫蘓旋覆花烏藥五靈脂茯苓川芎當歸澤
蘭葉玄胡索加砂糖煎服。而痛止。再進惡露行。
咳嗽嘔吐皆愈。十五

上舍程好吾公令孫右耳後生一毒腫痛遍身生
大泡瘡增寒發熱與金銀苓當歸尾甘草赤芍
連翹姜蚕大力子玄參西劑而消十六

華岳令堂年五十餘向來小水短少今則右背盜
匙骨邊一點痛夜尤痛已經半月醫治不効展
轉加劇即於右邊手臂肢節皆脹痛筋皆暴起
肌肉上生紅點子脉兩手皆滑數右尺軟弱乃
虛熱傷筋而成痛痺以東垣舒經湯為主羌活
升麻飛仁麻苧紅苓當歸防風甘草獨活猪苓

黃栢防已知毋黃連兩帖痛腫消再亦不發

十七

溪程山峰丈內人患血痢裏急後重嘔吐不納
穀兩寸脉洪大以竹茹温膽湯加姜連滑石橘
紅酒苓水煎服二帖大便結實膿血皆止惟後
重與枳壳當歸芍藥生地桃仁條苓甘草滑石
酒連四帖全安十八

由溪程七護兄臍腹右邊疼痛小水短少大便四
日未行嘔吐不能進食舌上白胎面青手冷勢

甚危急。脉之左沉伏。右滑大有力。予曰。此痰格中。焦氣閉下。焦故大小便秘而不利。氣逆嘔吐也。不急治。即無救矣。與柘樹東行根皮二錢。滑石三錢。菝葜仁。青皮。枳實。枳。即各一錢。水煎服之。夜半吐出膠痰碗餘。大便未行。痛亦不減。次日改用玄胡索五錢。水煎。臨服調下玄明粉三錢。辰刻腹下。午刻痛減大半。未刻大便始行。右脉平。而左脉起矣。覺體倦無力。以生脉散加甘草。山堽仁。黃芩。芍藥。以仁陳皮調理如故。十九

由溪程社貴兄。先醉酒。後以御色。次早四肢冷。胃腕痛極。脉僅四至。先醫以鬱火為治。投以寒涼。痛更增極。三日前所食西瓜。仍吐出不化。乃翁以為陰症傷寒。欲用附子理中湯。不決。遂予治之。予觀其面色青慘。叫痛而聲不揚。坐卧煩亂。予曰。此霍亂兼蛇厥症也。先當止痛安。蛇後理霍亂。可免死也。遲則誤事矣。急用五靈脂醋炒三錢。蒼朮一錢五分。烏梅三枚。川椒炮。姜桂心各五分。水煎飲下。痛減大半。下午以大腹皮藿香

半夏陳皮山查五靈脂茯苓兩帖全安。二十
汪松崗令眷左脇疼咳嗽內熱每咳則脇下吊痛
寢食大減與青皮香附甘草芍藥訶子山梔子
貝母茯苓柴胡薤仁滑石人參水煎飲之熱除
痛減。二十一

文學贊皇令堂產後左脇痛甚咳嗽痰不易出內
熱氣壅不能伏枕予以瓜蒌仁六錢桑白皮紫
蘆子杏仁半夏桂一槓枳壳各一錢水煎服之而
氣壅定嗽漸減。外與保和丸及七製化痰丸

而安。二十二

許少峰胃中有痰肝胆經有鬱火心血不足面色
黑而枯燥肢節疼痛健忘精神恍惚內熱將育
中風之兆左寸細數關絃數右關重按滑兩尺
弱治宜清肝胆之鬱火而養心神消胃中之痰
涎而生氣血使神帥氣氣帥血氣血周流經絡
無壅則諸疾不期愈而自愈矣何中風之有哉
用石菖蒲黃連白茯苓半夏酸棗仁天麻橘紅
各一兩牛胆南星二兩白姜蚕青黛木香各五

錢柴胡七錢五分。竹瀝生薑汁打神麴糊為丸。
藜蘆大。每食後及夜茶湯任下二錢。一日二三
次。服完神氣大健。肢節皆舒。面色開而手足輕
健。種又皆瘳。少峰曰。吾生平服藥少效。不期此
方之神。若是不惟自服有功。即諸親友有痰火
者服之。莫不響應。二十三

朱宅女。春經水行一月不止。每黃昏先寒。後熱。遍
身疼痛。胸前脹悶不通。必欲大喊叫嘶。用手於
喉中斡而吐出痰涎。乃寬。今且渴甚。此痰飲癰。

疾。今飲食不進。夜如見鬼者。乃熱入血室也。
小柴胡湯加生地黃丹皮陳皮菴仁。兩帖後以
白朮三錢。何首烏二錢。陳皮麥芽各一錢。烏梅
一枚。生薑三片。水煎服之。而寒熱止。諸症皆安。
二十四

孫熙字。肢節腫痛。痰多嘔惡。胸中氣不暢達。語言
亦不清利。夜夢皆亡人野鬼追陪。情神慘惡。驚
恐不安。且汗多不止。飲食減三之二。遠近名家
醫治逾月不應。敦予為治。診其脉。左手甚弱。汗

多故也。右手滑大痰飲濕熱而然。法當禱飲前醫皆作風治。而用踈散洩其元神。將成柔瘕。予以人參。麥門冬。五味子。白芍藥。當歸。以仁陳皮。石斛。木瓜。甘草。白朮。桂枝。服此汗大。飲而神思稍清。吐亦止矣。惟飲食不思。夜夢與亡人同遊。為惡耳。改用人參。黃耆。枸杞子。以仁。白朮。各一錢五分。當歸。遠志。茯苓。木瓜。陳皮。各一錢。甘草五分。水二鍾。入雄豬心血一枚。煎作八分。飲之。四帖乃能睡。始夢生人。不復夢亡人矣。二十五

真。年十月因傷風咳嗽。即時聲啞。繼聞父喪。過憂。右邊不能貼席而睡。醫以滋陰降火之劑。治之。半年肌肉大削。大便溏瀉。飲食減。必咳嗽。聲啞有加。喉且疼痛。迎予為治。診得六脉俱絃。數。此憂傷肺。思傷脾症也。危急甚矣。以白朮。茯苓。陳皮。粉草。以仁。桔梗。柴胡。桑白皮。酒炒。白芍藥。澤瀉。麥芽。山查。煎服一日。再以荊芥。桔梗。玄參。甘草。茯苓。白芍。酒連。扁豆。山藥。山查。木通。服此。而右邊可睡矣。改用參。苓。白朮。散加白芍藥。

烏梅訶子酒連山查調理而愈。二十六

侄婦戴氏有孕已五月矣。忽血大。下午後發。戰六
脉俱數。左寸滑大。右關搏指。左關軟弱。予以白
芍藥二錢。生地阿膠人參蒲黃各一錢。紫胡香
附地榆荆芥穗各七分。甘草五分。煎服。午後發
寒熱。每夜凡三次。頭痛惡心。腹中塊硬。所下血
塊甚多。心下怯力。此虛無疑也。以補中益氣湯
加阿膠炮姜白芍藥烏梅煎服。下午右眼白珠
發一白泡。光腫下垂。而面亦腫。此虛火遊行。無

制之。疔其夜大發。寒。批。指爪皆黑。唇白。汗大出。
腹中作痛。牽引兩乳。比痛。仍以補中益氣湯加
阿膠白芍藥桂枝五味子麥冬。服後熱退。汗止。
渴除。神氣稍定。乃有生意。次日咳嗽而胎墮。即
以獨參湯繼服。其夜。瀉二次。以人參白朮
各三錢。炙甘草一錢五分。炮姜一錢。桂心茯苓
各五分。陳皮七分。蓮子大棗煎服。後因咳嗽。以
四君子加炮姜五味子紫苑調理而愈。二十七
靈岳乃眷。胃脘疼痛。手心熱。頭暈。舌麻。兩太陽痛。

背心亦脹。內熱而外惡寒。必厚被蓋覆得微汗。廼解。二陳湯加桔梗杏。桑白皮枳殼青皮白芥子蘿蔔子酒蒸煎服。心帖舌竟不麻。晚因食鷄過多。鬲上氣帶。一湯加蘿蔔子枳實山查川芎香附酒送調理。愈。二十八

歙溪南吳人峰先生內。兩脇脹急抵於胃脘作痛。又一陣則汗出一背兩顴紅唇口亦紅。飲食湯水飲之立吐不受者三日夜矣。予為診之。兩寸脈洪大。兩尺沉微。予以井水半碗。白滾湯半

碗和之。名曰陰陽湯。用此調玄明粉一錢五分。服之。不惟不吐。痛減半矣。少頃大便行二次。因食豆腐及粥太早。而痛復萌。唇臉皆紅。此必有虫。故如是也。與白芍藥梓枝粉草烏梅荅椒五靈脂杏仁。水煎。痛廼定。共大半。再與蒼朮厚朴山查枳實茯苓玄胡索。日附一帖全止。但心背皮膚外疼。不能着蓆。而以川芎當歸白朮厚朴大腹皮粉草茯苓香附。以皮半夏調養全愈。

陳鉄兄內人產後腹痛發熱下痢膿血裏急後重
 川芎一錢當歸三錢茯苓乾姜肉桂山查陳皮
 酒炒白芍藥白朮各一錢粉草五分一帖而腹
 痛止痢輕後重亦除然又發寒熱多汗改用人參
 白芍藥桂枝粉草川芎當歸白朮茯苓香附陳
 皮山查再劑而諸症如瘥三十

程石洲乃眷因產難子死真悶小腹有塊作痛下
 午發熱不思飲食次早胎之脉右大於左者三
 且與芎歸湯加糖子澤蘭葉肉桂次日

十腰腹脹痛詰之晌午食圓眼一斤矣從此
 腹漸脹大便三日未行早晨鼻衄夜間極熱
 渴脉大無緒勢甚危急用川芎當歸紅苓桃
 一青皮枳即莪朮山查水煎調玄明粉二錢服
 後大便稍行結糞二枚安而就寢醒後進粥稍
 多又復脹痛腹大如斗堅如石氣促不安勢危
 至此亦已極矣迺與五靈脂糖子各四錢凌
 霄苓二錢赤芍藥一錢服後大便通腹軟氣定
 始可進粥漸有生氣但脉仍鼓指此腹中積滯

尚多不可不因其時而驅去也。用糖毬子大黃各三錢。飛仁二錢。桂心紅苓各五分。炙甘草七分。水煎。臨服調玄明粉一錢五分。其夜下黑糞。入熱始退。上腹雖消。臍下仍大。仍以桃仁承氣加山查滑石紅苓煎飲之。五更大便行。臍腹又漸減。後與積塊丸調理全消。是役女。女科專門為仗。故前發熱腹痛之。心虛實。即以常套十全大補湯。物入腹之時不覺。少頃漸

而脹也。且其味甘。尤能作

寧不塞其塞哉。由是而成大滿。

經謂中滿者。瀉之於內。良以此。夫彼亦

溪產後須當大補氣血之誤也。三十一

一老姬年八十餘。常頭暈脚軟。撐載上身不

走。行須人扶。否則眩暈跌仆。大便溏洩。小水淋

泄。此下元虛憊所致。以人參黃芪白朮薏以仁

各二錢。山茱萸杜仲茯苓各一錢。陳皮山藥粉

草各八分。八帖而愈。三十二

文學程道吾先生令眷。夜為夢覺。所驚時常暈厥。精神恍惚。一日三五發。咳嗽面色青。不思穀食。日惟啖牛肉脯數塊而已。時師屢治無功。吳渤海視為寒痰作厥。投以附子肉桂而厥尤加。逆予為治。脈左脈絃。右脈滑。兩寸稍短。道吾先令眷二皆卒於瘵。知其為傳屍瘵症也。不易治之。廼權以壯神補養之劑。消息調理。俟飲食進。胃氣轉。始可用正治之法。姑用人參茯苓栢子仁石薺蒲遠志丹參當歸石斛。以補養神氣。以陳

皮貝母甘草紫苑化痰治嗽。服半月而無進退。廼為製太上渾元丹藥用紫河車一具。辰砂釐甲犀角各一兩。鹿角膠紫石英石斛各八錢。沉香乳香安息香茯苓紫苑牛膝人參各五錢。射香五分。煉蜜為丸。赤豆大。每早晚鹽湯或酒送下三十六丸。又製霹靂出獵丹。藥用牛黃狗寶阿魏安息各一錢。虎頭骨五錢。啄木鳥一隻。獺爪一枚。敗鼓心破皮三錢。射香五分。天靈蓋一箇。煉蜜為丸。雄黃三錢為末。每五更空心葱白

湯送下五分。三五日服一次。與太上渾丸丹相
魚服。總服半月。精神頓異。不似前時恍惚矣。但
小腹左邊一點疼。前煎藥中加白芍藥一錢。服
之一月。精神大好。暈厥再不發矣。次年生一女。
其宅瘵疾。從此再亦不傳。三十三

僕婦年三十。患瘟疫一月餘矣。非勞復即食復。
午則發熱咳嗽。胸脇疼。耳聾口渴。大便七八日
不行。不知人事。迺與柴胡石膏各三錢。瓜萸桔
梗枳壳各一錢。五分。黃芩前胡各一錢。天冬

六分。甘草五分。黃連八分。急煎服之。人事稍清。
因大便不行。次日以大柴胡湯下之。又次日六
便雖行。熱仍不退。改以柴胡二錢。白芍藥黃芩
麥門冬各一錢。天冬粉茯苓甘草各六分。四帖
而愈。三十四

袁軍程方塘翁年六十四。向以殫胤服溫補下元
藥太多。冬月下身著單袴。立溪邊。督工受寒。致
筋骨疼痛。肩井缺盆脚膝跟踝手肘掌後及骨
節動處皆紅腫而痛。臥床褥三年。吳中溪視為

虛而用虎潛丸。吳渤海視為寒而用大附子。肉桂鹿茸。徐東臯認為濕。周皜認為血虛。張甲認為風。李乙認為歷節。百治不瘳。腿間大肉盡消。惟各骨節處腫大而疼。予適在程道吾宅。迺逆予診之。其脉絃澹有力。知其為濕熱痰火被寒氣凝滯。固澹經絡也。節為藥劑不對。故病日加。所取者目中精神尚在。胃氣仍未全損。但小水解下。以瓦盆盛之。少刻則澄結為砂。色紅而濁。兩膝下及脚指皆生大瘡。瘡靨如靴釘狀。此皆

平昔服溫補春方所致。病雖久年。雖高猶為有餘之疾。不可因高年疾痼棄不治也。迺特為先驅逐經絡中凝滯。然後健脾消痰。俾新痰不生。氣血日長。最後以補劑收功。斯得矣。翁生平好補畏攻。故進門者皆務迎合。予獨反之。以新取歲靈仙一斤。裝新竹筒中。入燒酒二斤。塞筒口。刮去筒外青皮。重湯煮三炷。官香為度。取出歲靈仙晒乾為末。用竹瀝打糊為丸。梧桐子大。每早晚酒送下一錢。一日服二次。五日後大便瀉

出稠粘痰積半桶腫痛消去大半。改以人參石
斛蒼朮黃柏以仁蒼耳子牛膝烏藥葉龜板紅
朮犀角屑木通煎服二十帖。又用前末藥服三
日。又下痰積如前之半。仍以前煎藥服半月。又
將末藥服三日。腹中痰漸少。乃為製丸藥。以虎
骨晚蚕沙蒼朮黃柏丹參杜牛膝莖葉以仁紅
朮五加皮蒼耳子龜板酒打麵糊為丸。梧桐子
大每空心白湯送下七八十丸。外以丹溪保嬰
丸食後服。半年全愈。腿肉傷。 此丸

五

汪省吾暮秋患瘧。三日一次發於夜。迨次年。瘧
猶不能止。遍身疼痛。頭疼。背脊疼。百治不應。名
亦僅止得一日。次日仍發。面色青。肌肉瘦。以瘧
叅之邪在足。太陽經。用麻黃一錢五分。人參桂
枝白芍藥粉草知母各一錢。陳皮貝母各七分。
姜枣煎服。諸瘧減半。而瘧未止。以何首烏白朮
各五錢。青蒿一錢。烏梅一箇。陳皮二錢。生姜三
大片。水煎。臨發日五更服。尋常以六君子湯加

黃耆柴胡五味子烏梅草果調理而愈。三十六
 汪不之丈。七月初旬。自浙歸。連日與客手譚過勞。
 口中生瘡。醫以香薷飲。清胃湯。瀉黃湯。三黃丸。
 黃連解毒湯。白虎湯。涼膈散。凡治上焦熱症之
 劑。竭寒涼而進之者。十一日矣。口瘡日甚。一日
 不但飲食不進。即藥亦難下咽。因瘡延及於喉
 也。逆予為診。其脉六部俱豁大無力。診罷。有外
 科陳氏者。自稱喉舌專門。銜其口。瘳敷藥之妙。
 予曰。汝試為口中一洗。看是何狀。纔開口。見

沫迷漫。不能得見面色。陳以荊芥湯洗而引之。
 攪出稠涎一二椀餘。傾於地上。偶有二鷄爭啄
 之二雞立斃。其毒何如。此亦疾之奇者。予囑陳
 曰。汝用藥。只可吹入喉中。切不可敷其舌。必俟
 喉中全好。然後敷舌。待舌好。再敷口唇。甚毋得
 槩敷。恐毒無出路。反攻入喉。極為悞事。陳曰。諾。
 予對乃翁曰。令郎之疾。迺虛陽口瘳也。翁曰。嘗
 用何劑。予曰。附子理中湯。煎熟待冷。飲之。可救。
 如它藥不能立功。翁曰。瘳乃熱症。况上。身已熱。

又天時酷暑。大熱之劑。其敢進乎。予曰。此陰盛
格陽之症。初未嘗如此。因服寒涼過劑。激之使
然。爾翁不省其西。足膝下皆冷乎。翁用手探足
下。果冷。乃欣然聽用。人參白朮各三錢。大附子
一錢。姜炙甘草各一錢。水煎冷與之。服後即甦。臍
下
一
次。早便能食粥半盞。足膝下漸暖。藥仍如
前。飯後予與二三友散步山溪。午刻歸來。乃
見舉家大慟於地。見予至。哭語予曰。不可為矣。
本具熱病。誤服熱藥。今舌腫大。塞滿口中。不
能

言語。死在頃刻。柰何。柰何。予駭然應曰。安得有
是。不祥語也。今晨臍脉與昨不二。適往返不過
二時許。何倏爾有此大變乎。待予再診決之。及
臍六脉漸斂。較昨大有神氣。面色亦和。獨舌脹
大。予心知為陳寒涼敷藥所致也。迺詰陳曰。我
別後可用敷藥否。陳點首曰。已二次矣。予撫翁
及諸人曰。無慟。立看予為翁消之。急取官桂研
末五錢。用生姜自然汁調塗舌上。纔塗上。但見
眼淚雙流。鼻中涕出口內。涎垂舌頰。消去。語近

侍曰。我無事矣。諸環侍者。男婦不下二十。皆面
面相覷。以為神奇。予曰。可即取粥與食。使壓之。
庶虛火不再升。適舌脹滿者。乃敷藥寒涼。閉其
毒氣。毒無從出。故作脹耳。桂皮乃辛熱之物。又
以姜汁調塗。取辛散之義也。諸人皆服其論。三
十七

東之丈令眷。姬已六月。為傷風咳嗽。腹中弔疼。痰
壅喉音不清。頭且眩暈。脉左滑數。右寸弱。關滑
左尺有力。右尺弱。予以人參白朮陳皮貝母茯苓

苓桔梗桑白皮紫蘊粉草黃芩前胡四帖。而病
全愈。三十八

吳東渠年五十有七。因上年患瘧。胸痞作脹。肌肉
大削。因連服攻剋太重。脾胃敗壞。膝及跟踝皆
浮腫。遍身發熱。口渴。小便短赤。舌上黃胎。舌心
焦煤。乾燥。誤服寒涼。大便連瀉五六次。目不能
開。手足無力。倦於言語。予診之。六部俱浮大。按
之豁然空虛。飲食不進。此中氣大虛。元神俱脫。
可畏之甚。即以人參白朮茯苓粉草木香葛根

酒炒白芍藥水煎服之。連進二帖。始能開目。漸
 出聲言語。後以六君子湯去半夏加葛根白扁
 豆山藥藿香以仁白芍藥石斛調理而愈。三十
 九

吳西源令眷因未有子。多鬱多思。肌肉漸瘦。皮膚
 燥揭。遍身生瘡。體如火燎。胸膈脹痛。而應於背
 咳嗽不佳。口醫治十越月。愈以為瘵疾不可治。
 知予在程方瘡之中。迺透予治。胗得右寸關俱
 大有力。左無。予以瓜蒌仁四錢。蘿蔔子貝

貝殼調氣化痰。開鬱為君。桑白皮葶藶子
 芩瀉肺火為臣。甘草前胡為使。三十帖全愈。仍
 以千金化痰丸調理。向來年又至冬月則咳嗽
 痰喘不能睡。自此後遇冬月痰喘再不復發。四
 十

族嫂程氏環跳穴邊腫痛。增寒發熱。不能動止。寢
 食俱廢。頭重惡心。上身熱。下身冷。天明乃退。口
 乾。舌上白胎甚厚。以柴胡防風桂枝解其寒熱。
 以蒼朮黃柏五加皮桑仁赤芍藥治其癩木通

利其濕熱。且引火下行。甘草調和諸藥。使各得
職。一帖而痛止大半。再進寒熱除。三帖痛全減
去。改以小柴胡湯加牡丹枳殼桔梗二帖而舌
胎脫然。四十一

上舍恒宇先生。原因生楊梅瘡後。偶遭一跌。環跳
脫出。不能復入。窠臼疼痛殊甚。兩足因長短不
齊。予思不能復入。窠臼者。以瘀血流入窠臼。占
滿故窠。致骨不得復入也。今但消去瘀血。必以
行氣活血之劑為主。以下行嚮導之劑佐之。庶

可復原。用陳年窖中磚瓦。洗淨煨過四兩。生心
杜牛膝骨碎補丹參赤芍各一兩五錢。自然銅
三兩。蒲黃車前子蘊木各一兩。鹿角二兩。玄明
粉五錢。各為末。以茅草根一斤。紅苓四兩煎
拌。嚼前藥。再以煉蜜為丸。梧桐子大。每空心
食前酒送下八九十丸。未服此藥之先。病足長
二十餘。服此丸藥後。只差半寸。設再製丸服。必
能萬全。惜渠素畏藥。中道而止。故功虧一篑也。
豈堪嘆哉。四十二

族姪孫女。一週歲時發慢驚。眼開手拳。目不動。移
脚指微動。先自顛門後遍身如少。喉中痰聲。口
中痰沫。腹脹放屁。大便亦行。先以牛黃丸蘊合
香丸進之。不効。及各治驚馬治痰等藥。與之皆不
受。即從痰沫流出。用通關散吹入鼻中。亦不作
嚏。自申時至戌時。猶不能醒。面色素青而白。氣
稟其弱。因婢者抱而偶失。跌受驚馬發熱。此驚馬氣
乘虛而入。在法已無生路。但不忍坐視。姑以人
參三錢。生薑自然汁拌炒。煎湯頻。又用匙挑心

口中初一二三四匙。皆不受。後又與五六匙。偶能
一二三四下。喉便覺痰聲稍緩。因此頻。又與之。
十匙之中。有二三匙入腹矣。喉中氣轉。目便能
動。始有生意。再以六君子湯加天麻石菖蒲姜
桑澤瀉薄荷煎服。至鷄鳴時。乃畧啼一二聲。方
識吮乳。次日咳嗽語聲不出。小水短少。以辰砂
益元散一錢。用灯心湯調下。熱退聲出。惟嗽不
盡止。改以四君子湯加陳皮五味子麥門冬桑
白皮桔梗杏仁薄荷一帖全愈。四十五

程少湖因飲生酒食硬乾豆腐以致次日面上浮腫胸中作脹今經半年腹中腸鳴四肢浮腫兩腿及陰囊皆腫口乾大小便俱不利年四十六矣夜卧氣喘膝下冷先以人參蒼朮陳皮蘿蔔子半夏麴葛根厚朴枳實破故紙大附子茯苓煎服二帖氣喘稍定腹中仍鳴加白芷仁白芥子桑白皮小水頗利浮腫漸消四十四吳斗一夫歙溪南人也八月初旬自新都往湖州途次偶感風邪發熱多痰且又腹痛下痢裏急

後重原有腸風下血之疾又以舊年乃發熱卒於湖州心甚恐怖予脉之所力尺寸俱不足乃以白芍藥一半生五錢止痛為君當歸活血酒連酒芍紫胡清熱升提陽氣為臣枳壳槐花兼治腸風為益元散木香以實大腸山查以消瘀血調脾為裨佐一帖熱減半痢稍輕次日仍用前藥外與丹溪保種丸調理五日而出戶四十五徑孫二水年三十體甚肥胖夏月常浸在溪中卧

於松陰之下。至八月大發寒熱於巳午間。至天明乃退。不能起床。飲食亦不進。嘔吐黃苦胆汁。胸膈脹悶。舌上乾燥。生茫刺。沉香色強硬。不能言語。必含冷水漱之。始能說一句。若再語三語。必三噙水而後可。惟西瓜新藕是啖。先發寒熱之日。吐血一口。今則大便下血。症甚危惡。且咳嗽。此溫瘧症也。由醫失解散。遽用黃耆以閉邪氣。致成大禍。今法當清解。止吐。俾飲食。然後庶可保其生也。柴胡知母各三錢。石膏十錢。葛

根二錢。橘紅竹茹各一錢。伍分。酒苓枳實各二錢。甘草貝母各五分。水煎服之。三帖而吐止。改用二陳湯加柴胡枳實黃芩黃連天荅粉鱉甲白朮何首烏調理而愈。迺囑其不可食葷。食葷早恐復發也。四十六

堪輿張錫泉先生患左脇皮裏膜外疼痛。有惡寒發熱之狀。以白芥子一錢。五分。川芎。柴胡。桔梗。各一錢。桂枝。甘草各五分。水煎飲之。當愈其半。次日以八珍湯加青皮為君。木香為佐。柴胡為

使一帖全愈四十七

族侄雲岳患偏墜。臍腹腰俞俱脹而痛。左關脉弦
 大鼓指。用小茴香甘草蒼朮益智仁防風各五
 分。荔枝核橘核糖棗子柴胡各一錢。山梔子善
 皮各七分。服後其痛如舊。脉且轉數。恐
 急為解毒。瓜萋五錢。當歸甘草節金銀
 錢。連翹柴胡青皮各七分。水煎服之。痛
 因食雞魚太早。次日臍腹又作脹痛發
 睡。昨日囊消後。脉盡退。今復

瓜萋各二錢。金銀朮柴胡連翹各八分。甘草節
 黃連當歸各五分。青皮七分。兩帖而愈。四十八

一婦時方妙齡。表虛易感風寒。致成鼻淵流涕
 不止。便覺頭運。兩太陽常疼。且多噴嚏。脉之
 曲寸洪大。用秦艽酒芩桑皮馬兜鈴各八分。
 白芍一錢。滑石石膏各二錢。枳壳子各五
 分。甘草三分。四帖涕止病愈。四十九

程兩峰丈偶與乃侄稍有介蒂。其晚飲於侄家。歸
 覺腹中脹滿。嘔噦不寧。次日眼珠面色皆黃。惡

寒發熱時當仲秋。正瘧痢為癘之候。醫作瘧治。五心加熱。下午潮熱。煩躁。但嘔不嘔。且鼻衄。腹痛。大便黑如墨。吐出黑血如爛猪肺者。然約掄餘。有謂所吐之物如此大便之黑。又如彼。但有中蠱之象。心疑乃侄毒之也。正欲與乃侄爭辯。予仲子泰來適在渠宅。徐語渠諸郎。症尚可起。顧不為救症。而務與人鬪圖。輕耶渠家素不急予。仍迓所親信之。見目珠如金。面若薰橘。腹大如斗。

大如楮。堅如石。兩足下皆浮腫。四肢且冷。小便赤。飲食不思。莫不面面相覷。辭而不藥。舉家聞言。通宵號泣。惟欲攘臂爭鬪。仲子泰來又語之曰。家君固不敏。其知識量不出諸公下。昨自華陽歸。迓而診之。當必有說。舉家忻然。敦予求診。其脉左澁右滑。予曰。據滑脉主痰飲。澁主有痰血也。今所吐所下皆痰之徵。斷非蠱也。使得早從事。曷有此猜忌。此號泣哉。兩峰曰。吾生平頗謹疾。痰自何致。予曰。內經云。怒則傷肝。甚則嘔。

新考三卷
血不嘔則積積而瘀於經隧。滿而溢也。兩峰曰。若謂從怒而致則此語恰當吾病源矣。敢請劑。予用當歸尾三錢。赤芍藥牡丹皮川芎各一錢五分。玄胡索五靈脂莖仁各一錢。滑石茜根各二錢。水煎飲之。所下黑物甚多。腹中仍痛塊猶未軟。前方再加青皮山查酒蒸大黃服之。大便行三次。黑瘀及痰不計其數。從此腹漸寬塊漸溶。面色稍轉而黃。日退。飲食津又有加。四肢微溫。有生氣矣。惟兩足浮腫不消。改用六君子湯。

臭茜根滑石青蒿調理而黑糞全無。二月。精神復舊。里中謂予此後匪獨認病投劑為足稱。且俾二宅釋猜疑。排忿爭。其雅誼尤足重也。五十

予有表嫂。小產後。腹痛暈厥。冷汗淋淋。遍身麻木。心怔怔動。左脉絕不應指。虛極欲也。以當歸三錢。川芎一錢五分。人參荆芥穗燈火燒存性各一錢。血母草澤蘭葉各八分。甘草五分。水煎飲之。腹痛減。惟怔怔不寧。以四君子湯倍加黃芪。

為君。當歸香附益母草為臣。川芎為佐。炮姜為
使。兩劑而安。五十一

陳士美。孤子也。年弱冠。由夢遺後。患頭疼發熱。時
值仲夏。醫治不瘳。凡市中有名者。率延致轉治。
轉熱。及加水瀉。口渴。日夜不得眠者旬日。眾視
為危。時有俞氏者。用參耆白朮為其飲。汗止瀉
而汗瀉愈。劇呻吟不聞晝夜。勺粒不入口。咳嗽
胸痞。躁悶不寧。又四日矣。渠親邵瓊林。交予。因
免邵逆予為治。診其脈。左絃長。右洪大。俱七至。

