


醫門秘旨

內閣文庫  
漢書  
二六五  
六六五  
函架冊號類

內閣文庫	
番號	漢 12655
冊數	6 ( 2 )
函號	301 38





醫門秘旨卷之二  
藥性賦

寒品

諸藥識性此類最寒犀角解乎心熱羚羊清乎肺肝  
澤瀉利水通淋而補陰不足海藻散癭破氣而治疝  
何難聞知菊花能明目而清頭風射干療咽閉而消  
癰毒薏苡理脚氣而除風濕藕節消瘀血而止吐衄  
瓜蒌子下氣潤肺喘兮又且寬中車前子止瀉利小  
便兮尤能明目是以黃蘗滄用堯鈴嗽匿地骨皮有  
退熱除蒸之効薄荷葉宜消風清腫之施寬中下氣

國立公文書館藏

醫門秘旨



枳殼緩而枳實速也療肌解表乾葛先而柴胡次之  
百部治肺熱咳嗽可止梔子涼心腎鼻衄最宜玄參  
治結熱毒癰清利咽膈升麻消風熱腫毒癸散瘡癩  
嘗聞膩粉抑肺而斂肛門金箔鎮心而安魂魄茵陳  
主黃疸而利水瞿麥治熱淋之有血朴硝通大腸破  
血而止痰癖石膏墜頭疼解肌而消煩渴前胡除內  
外之痰實滑石利六腑之澁結天門冬止嗽補虛冷  
而潤肝心麥門冬清心解煩渴而除肺熱又聞治虛  
煩除噦嘔瀕用竹茹通閉結導瘀血必資大黃宣黃  
連治冷熱之痢又厚腸胃而止瀉淫羊藿療風寒之

痺且補陰虛而助陽茅根止血與吐血石常通淋於  
小腸熟地黃補血且療虛損生地黃宣血更鑿眼瘡  
赤芍藥破血而療腹疼煩熱亦解白芍藥補虛而生  
新血退熱尤良若乃消腫滿逐水於牽牛除毒熱殺  
虫於貫仲金鈴子治疝氣而補精血壹草根治五淋  
而消乳腫側柏葉治血崩漏之疾香附子理血氣婦  
人之用地膚子利膀胱可洗皮膚之風山豆根解熱  
毒能止咽喉之痛白鮮皮去風治筋弱而療足頑痺  
旋覆花明目治頭風而消痰嗽壅又况荆芥穗清頭  
月便血踈風散瘡之用瓜蒞根療黃疸毒癰消渴解



痰之憂地榆療崩漏止血止痢昆布破疝氣散癭散  
瘡療傷寒解虛煩淡竹葉之功倍除結氣破瘀血牡  
丹皮之用同知母止嗽而骨蒸退牡蠣澁精而虛汗  
收貝母清痰止咳嗽而利心肺桔梗下氣利胃膈而  
治咽喉若夫黃芩治諸熱兼主五淋槐花治腸風亦  
匡痔痢常山理痰結而治濕瘧葶藶瀉肺喘而通水  
氣此六十六種藥性之寒又當考圖經以博其所治  
現夫方書以叅其所用焉其庶幾矣

熱品

藥有溫熱又當審詳欲溫中以蕪揆用發散以生姜

五味子止嗽痰且滋腎水脛膈療癆瘵更壯元陽  
原夫川芎祛風燥補血清頭續斷治崩漏益筋強脚  
麻黃表汗以療咳嗽韭子助陽而匡白濁川烏破積  
有消痰治風痺之功天雄散寒為去濕助精陽之藥  
現夫川椒達下乾姜煖中葫芦巴治虛冷之疝氣生  
卷柏治癥瘕而血通白朮消痰壅溫胃兼止吐瀉菖  
蒲開心氣散冷更治耳聾丁香快脾胃而止吐逆良  
姜止心氣痛之攻衝肉菘蓉填精益腎石硫黃緩胃  
驅虫胡椒主去痰而除冷秦椒主攻痛而治風吳茱  
萸療心腹之冷氣靈砂之心藏之怔忡蓋夫散腎冷



助脾胃須葶澄茄療心疼破積聚用蓬莪朮縮沙止  
吐瀉安臉化酒食之劑附子療虛寒翻胃壯元陽之  
力白芷寇治冷瀉療癰止痛於乳香紅芷寇止吐酸  
消血殺虫于乾漆豈不知鹿茸生精血腰脊崩漏之  
均補虎骨壯筋骨寒濕毒風之並祛檀香定霍亂而  
心氣之疼愈鹿角秘精髓而腰脊之痛除消腫益於  
米醋下氣散寒於紫蘇扁豆助脾則酒有行藥破血  
之力射香開竅則葱為通中發汗之需常規五靈脂  
治崩漏理血氣之刺疼麒麟竭止血出療金瘡之傷  
折麋茸壯陽以助腎當歸補血而養血烏賊止帶下

且除崩漏目翳鹿角膠任血崩能補衰羸勞絕白花  
蛇治瘰癧除風痒之癩疹烏稍蛇療不仁去瘡痒之  
風熱圖經云烏藥有治冷氣之理禹餘糧乃療崩漏  
之因巴豆利痰水能破積熱獨活療諸風不論久新  
山茱萸治頭暈遺精之藥石英医咳嗽吐膿之人  
厚朴温胃而去嘔脹消痰亦驗肉桂行血而痛心痛  
止汗如神是則鯽魚有温胃之功代赭乃鎮肝之劑  
沉香下氣補腎定霍亂之心疼橘皮開胃去痰導壅  
滯之逆氣此六十六種藥性之熱又當博本草取焉

温品



溫藥總括 匠家素諸木香理乎氣滯半夏主於風痰  
蒼朮治目盲燥脾去濕宜用芎藭去膨脹下氣製麵  
尤堪况夫鍾乳粉補肺氣兼療腎虛青鹽治腹痛且  
滋腎水山藥而腰濕杜匠阿膠而痢嗽皆止赤石脂  
治精濁而止瀉兼補崩中陽起石煖子宮以壯陽更  
療陰痿誠以紫苑治嗽防風祛風蒼耳子透腦涕止  
威靈仙宜風氣通細辛去頭風止嗽而療齒疼艾葉  
治崩漏安胎而匠荆紅菴活明目祛風除筋挛腫痛  
白芷止崩治腫療痔漏瘡壅若乃紅藍花通經治產  
後惡血之飲劉寄奴散血療湯火金瘡之苦減風濕

之痛則茵芽葉療折傷之症則骨碎補藿香葉辟惡  
氣而定霍亂草菓仁溫脾胃而止嘔吐巴戟天治陰  
疝白濁補腎尤滋玄胡索理氣痛血凝調經有助嘗  
聞欵冬花潤肺去痰嗽以定喘肉豆蔻溫中止霍亂  
而助脾撫芎走經絡之痛何首烏治瘡疥之資姜黃  
能下氣破惡血之積防己之消腫去風濕之施藁本  
除風主婦人疝痛之用仙茅益腎扶元氣虛弱之衰  
乃曰破胡紙溫腎補精髓與勞傷宜木瓜人肝療脚  
氣并水腫杏仁潤肺餘止嗽之劑茴香治疝氣腎疼  
之用訶子生津止渴兼療滑泄之病秦艽攻風逐水



又除肢節之痛楨柳豁痰而逐水殺寸白虫杜仲益  
腎而添精去腰膝重當知紫石英療驚悸崩中之疾  
橘核仁治腰疼疝氣之瘕金櫻子芎蒭遺精紫蘇子  
兮下氣涎淡豆豉發傷寒之表大小薊除諸血之鮮  
益智安神治小便之淋教麻仁潤肺利六腑之燥堅  
抑又聞補虛弱排膿瘡莫若黃耆強腰脚壯筋骨無  
如狗脊兔絲子補腎以明目馬蘭花治疝而有益此  
五十四種藥性之溫更宜參圖經而默識也

平品

詳論藥品平和性存以硃砂而去積用龍齒以安魂

青皮快膈除膨脹且利脾胃芡實益精治白濁兼補  
真元原夫木賊草去目医崩漏亦医花蓋石治金瘡  
血行則卻决明和肝氣治眼之劑天麻主脾湿祛風  
之藥甘草和諸藥而解百毒蓋以性平石斛平胃氣  
而補腎虛更医脚弱观夫商六治水腫覆益精琥珀  
安神而散血硃砂鎮心而有靈牛膝強足補精兼療  
腰痛龍骨止汗住濕更治血崩甘松理風氣而痛止  
疾荊療風瘡而明目人參潤肺寧心開胃助脾蒲黃  
止崩治衄消瘀調經豈不知南星醒脾去驚風痰吐  
之憂三稜破積除血塊氣滯之症沒石主泄瀉而神



効皂角治風痰而響應桑礫硝療遺精之洩鴨頭血  
匡水腫之盛蛤蚧治勞嗽牛蒡子踈風壅之痰全蝎  
主風癱酸棗仁去怔忡之病甞聞桑寄生益血安胎  
且止腰痛大復子去膨下氣亦令胃和小草遠智俱  
有寧心之妙木通猪苓尤能利水之多蓮肉有清心  
醒脾之用沒藥有治瘡散血之科郁李仁潤腸宣水  
去浮腫之疾茯苓寧心益智除驚悸之病曰茯苓補  
虛勞多在心脾之有準赤茯苓破結血独利水道以  
無過且如麥蘖有助脾化食之功小麥有止汗養心  
之力白附子去面風之遊走大復皮治水腫之泛溢

椿根白皮主瀉血桑根白皮主喘息桃仁破瘀血蕪  
治腰疼神麴健脾胃而進飲食五加皮堅筋骨以立  
行栢子仁養心神而有益抑又聞安息香辟惡且止  
心腹之痛冬瓜仁醒脾實為飲食之資姜蚕治諸風  
之喉閉百合斂肺勞之嗽萎赤小豆解熱毒瘡腫宜  
用枇杷葉下逆氣噦嘔可醫連翹排瘡膿與腫毒石  
楠葉利筋骨與毛皮穀蘖養脾阿魏除和氣而破積  
紫河車補血大麥和藥性以開脾然而驚甲治勞瘡  
蕪破癥瘕龜甲堅筋骨更療崩疾烏梅主便血瘡痢  
之用竹瀝治中風声音之失此六十八種平和之藥



更宜參本草而求其詳也

藥性陰陽論

夫藥有寒熱溫涼之性酸苦辛鹹甘淡之味升降浮  
沉之能互相氣味厚薄不同輕重不苛寒熱相禡  
臥相混或氣一而味殊或味同而氣異揔而言之不  
可混說分而言之各有所能本乎天者親上本乎地  
者親下輕清成象重濁成形清陽發腠理濁陰走五  
脏清中清者榮食於神濁中濁者堅強骨髓辛甘  
散為陽酸苦涌泄為陰氣為臥氣厚為臥中之臥氣  
薄為臥中之臥氣薄則發泄氣厚則發熱味為臥味

厚為臥中之臥味薄為臥中之臥味薄則通味厚則  
泄升降浮沉之理胸中豁然而貫通矣人徒知藥之  
神者乃藥之力也殊不知乃用藥者之力也人徒知  
變真偽識藥之為難殊不知分臥臥用藥之為尤難也

藥本五味

酸為木化氣本溫能收能澀胃肝經苦因火化氣終  
熱能燥能堅心脏丁甘始土生氣化濕能開緩摻助  
脾經辛自金生氣滯燥能散潤濡通肺竅鹹從水化  
氣生寒下走軟堅足腎道談之其為五行本連用須  
之造化要



氣味生成流布論

賦為氣賦為味味歸形形歸氣氣歸精精歸化精食  
氣形食味味化生精氣生形味傷形氣傷精精化為  
氣氣傷於味賦味出下竅賦氣出上竅味厚者為賦  
薄為賦中之賦厚則泄薄則通氣厚者為賦薄者賦  
中之賦薄則發泄厚則發熱壯火食氣少火生氣天  
食人以五氣地食人以五味五氣入鼻藏於心肺上  
使五色脩明音聲能彰五味入口藏於腸胃味有所  
藏以養五氣氣和而主津液相成神乃自主矣

氣味辨

氣味辛甘發散為 酸苦湧泄為陰

藥味所忌

牛膝忌牛肉 土茯苓忌茶 天門冬忌鯉魚  
甘草桔梗黃連忌猪肉 香附知母菖蒲生地忌鉄

藥性升降浮沉補瀉法

足厥陰肝經	味辛補酸瀉	氣溫補涼瀉
足少陽胆	味鹹補甘瀉	氣熱補寒瀉
足太陽脾	味甘補苦瀉	氣溫涼寒熱 <small>補瀉各從其宜</small>
手太陽脾	味酸補辛瀉	氣涼補溫瀉
手少陽心	味苦補鹹瀉	氣寒補熱瀉
足太陽膀胱		



藥分身稍

凡藥在土者中半以上氣上行也以生苗者為根中半已下氣脈下行也以入土為稍病在中焦者用身下焦者用根稍蓋根升而稍降也太凡用藥以頭身稍分為上中下病在人身半已上者天之陽也用頭在中焦者用身在人身半已下者地之胡也如形圓而無根稍者當以氣味取焉

藥宜六陳歌

枳殼陳皮并半夏  
六般之藥宜陳久

茱萸狼獨及麻黃  
入用方知功效良

藥明十八反

本草明言十八反 逐一從頭說與君 人參芍藥  
與沙參 細辛玄參及紫參 苦參丹參并前藥  
一見黎芦便殺人 白芨白斂并半夏 瓜蒌貝母  
五般真 莫見烏頭與烏喙 逢之一反疾如神  
大戟芫花并海藻 甘遂以上反甘草 若还吐毒  
并翻腸 尋常犯之都不好 蜜蠟莫與葱相見  
石决明休見雲母 黎芦莫把酒來浸 人若犯之  
都是苦

藥明十九畏



硫黃元是火之精 朴硝一見便相爭 水銀莫與  
砒相見 狼毒最怕密陀僧 巴豆性烈最為上  
便與牽牛不順情 丁香莫與鬱金見 牙硝難合  
京三稜 川烏草烏不順犀 人參又忌五炙脂  
官桂善能調冷氣 若逢石脂便躑蹠

引經報使

小腸膀胱屬太陽 藁本羌活是本鄉 三焦胆與  
肝包絡 少陰厥陰柴胡強 太陰陽明并足胃  
葛根白芷升麻當 太陰肺脈中焦起 白芷升麻  
葱白鄉 脾胃少與肺部異 升麻兼之白芍詳

少陰心經獨活至  
通經用此藥為使

腎經獨活加桂良

豈能有病到膏肓

妊娠服禁

莞花水蛭及蝮虫 烏頭附子配天雄 野葛水銀  
并巴豆 牛膝意苾與蜈蚣 三稜代赭玃班麝  
大戟蛇退黃雌雄 牙硝朴硝牡丹桂 槐花牽牛  
皂角同 南星半夏與通草 瞿麥乾姜桃仁通  
礪砂乾漆蟹甲爪 地胆黎芦都不中

諸藥瀉諸經之火邪

黃連瀉心火 枳子片苓瀉肺火 柴胡黃連瀉肝胆火



白芷瀉脾火木通瀉小腸火柴胡黃芩瀉三焦火  
知母瀉腎火片黃芩瀉大腸火川黃柏瀉膀胱火

用藥丸散有別

仲景云劉如麻豆大咬咀同取清汁循其經絡故治  
至高之病也加酒以煎俾騰經絡而升上去濕加生  
姜補元氣以大棗癸散風邪以葱白膈上之疾以細  
末者不循經絡止去脾胃上疾及臍臍之疾氣味厚  
者白湯調服氣味薄者煎以和渣服去下部之疾者  
其丸極大而去中焦之疾及上焦者極小糊丸取之  
易化直之下焦者或酒或醋取其收散之意也犯半

夏南星或欲去濕者宜生姜汁稀糊取其易化水浸  
一宿蒸餅為丸者又易化也煉蜜為丸取其遲化也  
而氣尋經絡也蠟丸者取其遲化而旋旋施功矣大  
抵湯者盪也去新久病者皆能之散者散也去急疾  
用之丸者緩也舒緩而治之也

升合分兩有殊

古之方劑銖銖分兩與今不同謂如咬咀者即今劉  
如麻豆大是也去一升者即今時一大盞也云銖者  
六銖為一分即二錢半二十四銖為一兩也云三兩  
者即今一兩曰一兩即今之六錢半也料例大者只



合二分之一足矣

七方

①君一臣三佐九制之大也遠而奇偶制大其服也  
大則教少少則二之

腎肝位遠服湯散不厭頻而多

②君一臣二制之小也 近而奇偶制小其服也

小則教多則久之

心肺位近服湯散不厭頻而少

③補上治上制以緩上則氣味薄

治主以緩緩則治其本

④急補下治下制以急急則氣味厚

治治客以急急則治其標

⑤君一臣二奇之制也君二臣三奇之制也

陽教奇

⑥君二臣四偶之制也君二臣六偶之制也

陰教偶

⑦復奇之不去則偶之是為衆方也

十二劑

⑧宣 可以去壅姜橘之屬是也

⑨通 可以去滯木通防已之屬是也



補 可以去弱人參羊肉之屬是也  
 瀉 可以去閉葶藶大黃之屬是也  
 輕 可以去實麻黃葛根之屬是也  
 重 可以去虛磁石鉄漿之屬是也  
 滑 可以去怯冬葵心榆白皮之屬是也  
 澁 可以去脫牡砺龍骨之屬是也  
 燥 可以去濕桑白皮赤小豆之屬是也  
 濕 可以去枯白石英紫石英之屬是也  
 寒 可以去熱大黃朴硝之屬是也  
 熱 可以去寒附子宮桂之屬是也

只如此休皆有所屬凡用藥者審而詳之則無失矣  
 陶隱君云藥有宜通補瀉輕重滑瀉燥濕十劑已詳  
 惟寒熱二法遺之故續補於上以盡厥旨

古人服藥有法

病在上不厭頻而少病在下不厭頓而多病在上者  
 先食而後藥病在下者先藥而後食病在四肢飢食  
 而服藥在旦病在骨髓飽食而服藥在夜

南北地氣辨

或問曰人言東南氣熱可服寒藥西北氣寒須服溫  
 藥然今東南之俗胡椒姜桂人常食之不見生病而



北京士夫畏食胡椒辛熱之物何也曰東南雖熱然  
地卑多濕西北雖寒然地高多燥辛熱食藥却能助  
燥故耳治病用藥須識此意

發熱辨

南方之人稱發熱為勞發蓋謂勞苦而發熱即東垣  
內傷之旨也此病輕者一二發自愈重者用東垣法  
補之重甚可加熟附子人若因勞力辛苦而發熱切  
不可誤作外感輕易發汗慎之慎之

傷寒發熱是寒邪入衛與陽氣交爭而為外熱陽氣  
主外寒所傷而失其職故為熱其脈緊而有力是外

之寒邪傷衛也治主外宜表散

傷暑發熱是火邪傷心元氣耗散而邪熱入容其中  
故發熱汗太泄無氣以動其脈虛遲而無力是外之  
熱邪傷榮也治主內宜補元氣

內傷發熱是陽氣自傷不能升達降下陰分而為內  
熱乃陽虛也故其脈大而無力屬脾肺

陰虛發熱是陰血自傷不能制火陽氣升騰而為內  
熱乃陽旺也故其脈數而無力屬心腎經曰脈大而  
無力為陽虛脈數而無力為陰虛無力為虛有力為  
實也



病有感有傷有中感在皮毛為輕傷者無肌肉稍重  
中者入腔腑最重寒有感寒傷寒風有感風傷風中  
風暑有感暑傷暑中暑當分表裡輕重治各不同又  
加中暑中氣中毒皆云中中者中也諸邪直入於中  
也故為中流也

丹溪曰氣病則治氣血病則治血無痰則行痰無鬱  
則開鬱斯言盡之矣近世治病多不知分氣血但見  
虛病便用參芪之屬氣虛者固宜矣若是血虛則助  
氣而反耗陰血也是為血病治氣則血愈虛耗甚而  
至于氣俱虛也故治病用藥須要分則氣血不可混

清此第一義也

声色臭味

肝色青其嗅臊其味酸其声呼其液泣心色赤其嗅  
焦其味苦其声言其液汗脾色黃其嗅香其味甘其  
声歌其液涎肺色白其嗅腥其味辛其声哭其液涕  
腎色黑其嗅腐其味鹹其声呻其液唾是五臟声色  
臭味也

十二經見症法

手太陰肺經症 善嚏悲愁欲咲洒淅寒熱缺盆中  
痛臍下痛背肩痛 腹痛小便數溏泄皮膚痛及



麻木喘少氣煩上氣見交兩手而脅

足太阴脾經 五泄注下無色大小便不通面黃舌  
本強痛口井食即吐食不下咽怠惰嗜臥捨心善肌  
善味不嗜食不化食尻陰膝膈胛足背痛煩悶心下  
急痛當脐有動氣按之牽若痛心下痞腹脹鳴飡泄  
不化足不收行善氣脚不痛九竅不通溏泄水下後  
出餘氣則快然飲發中滿食噦噫形醉皮膚肉痛身  
休不能動慄足胛腫如水

足阳明胃經 惡烟火聞木音驚狂上登歌棄衣而  
走顏黑不能言唇胗嘔呵欠消穀善肌頸腫膺乳冲

股伏兔胛臥外廉足跌背痛腦膀過乳痛口喎腹大  
水腫奔鳴腹脹胛內廉肘痛髀不可轉脘如結臑如  
裂膝臏腫痛遺溺失氣善伸數欠癩疾濕浸心欲動  
則閉戶獨處驚慄身前熱身後寒

手阳明大腸經 手大指次指難為用耳聾輝、焯  
焯耳鳴嘈、耳後肩膈肘臂外痛氣滿皮膚穀、然  
堅而不痛

足太阳膀胱經 頭若痛目似脫頭兩邊痛尻出脊  
反出下腫便膿血肌肉痿項似拔小腹脹痛按之欲  
小便不行也



手太陽小腸經 咀嚼痛頷下腫不可顧肩如拔膈  
如折腰膈痛耳聾目黃腮頰腫肘臂之外後廉痛  
手少陽三焦經 耳鳴喉閉腫痛耳後廉目銳背癢  
汗自出肩膈肘外皆疼小指痛指如癢  
足少陽胆經 口苦馬刀俠癭胸脇用脾膝外至行  
絕骨外踝前諸節足外熱竊寒憎風体無膏渾善息  
足少陰腎經 面如膝眇中青面黑如炭咳唾多血  
渴脬左脇下肩背髀間痛脰中滿大小腹痛大便難  
飢不欲食心懸如飢腹大胫腫喘嗽脊臀股後痛脊  
中痛股內後廉痛腰冷如水及腫足痿厥脘下氣逆

下腹急痛泄下腫足脘而逆腸澀水下濕四指正黑  
手指青厥足下熱嗜卧坐而欲起凍瘡下利善思善  
恐四肢不收不舉  
手厥心色絡經 笑不休手心熱心中熱面黃目  
赤心下動  
手少陰心經 消渴兩腎經內痛後廉腰背痛浸漉  
善笑恐善心上咳吐下氣泄眩仆身熱而腹痛悲心  
痛掌中熱煩心  
足厥肝經 頭疼腕色善潔耳無聞頰腫痛肝逆  
面青目赤腫痛兩肋下痛引小腹痛背下則兩肋下



腫痛婦人小腹痛腫腰膂痛不可俛仰四肢滿悶挺  
長熱嘔逆血暈腫疔暴痒足厥寒肘善瘕節時腫遺  
溺淋澀便難隆孤疝洞洩大人癩疔眩冒轉筋脉絡  
兩筋挛善恐胸中喘罵詈血在脇下喘

尋十二經水火分治

肝胆由來從火治三焦包絡都無異脾胃常將濕出  
求肺與大腸同濕類腎與膀胱心小腸寒熱臨時旋  
商議惡寒表熱小膀胱濕惡熱表寒心腎熾十二經最  
端的四經屬火四經濕四經有熱有寒時攻裡解表  
細消息裡熱理寒宜越竭表熱表寒宜汗釋濕同寒

火同熱寒熱到頭無兩說六分分來一分寒寒熱中  
停真浪舌熱寒格拒病初深亢則害承乃制別緊寒  
數熱脉症和標本求之真妙訣休治風休治燥治得  
火時風燥了當解表時莫攻裡當攻裡皆莫解表表  
裡如或兩可攻後先內外分多少治濕無過似掘川  
此個筌蹄最分曉感謝軒岐万世思爭奈醯雞笑快

虛實分治法

心為血之主肝為血之藏肺為氣之主腎為氣之藏  
誠哉是言也孝者惟知血之出於心而不知血之納于  
肝惟知氣之出于肺而不知氣之納於腎用藥模規



往往南轅而北轍矣假如血痢作恙以五苓門冬等  
劑行其心以巴豆大黃等劑逐其積而其痛獨存者  
血之所藏無以養也必佐以川芎或川歸湯則其痛  
止假如喘急氣鳴以姜橘枳實蘇桂調其氣以南星  
半夏細辛降其痰而終不下降者氣之所藏無以散  
也必佐以補骨脂或安腎丸輩則其氣歸元病有標  
本治有先後綱牽而目斯張矣噫此傳心喫緊之法  
也耳目所接故不與生之家共之○氣血冲和萬病  
不生一有憤鬱諸病生焉故人身諸病多生於鬱蒼  
木撫芎總解諸鬱越鞠丸解鬱如婦人病多憂慮者

必加去心貝母解之貝母開胃中鬱結之氣詩所謂  
言採其蠶者是也○經云腎氣動氣五臟六腑之本  
十二經脈之根呼吸之門生氣之原不可不知也○  
又曰形不足者溫之以氣溫者養也溫之者所以調  
其飲食適其起居澄心息慮從容以待其真氣之復  
常也禮記所謂柔色以溫之此溫字正與彼同或以  
藥扶助之亦溫養也東垣乃以溫為溫涼之溫蓋講  
宜溫藥以補元氣而瀉火邪世人相循而用藥流弊  
尚未尽者也請問此而復牽前人之說以贅之蓋欲  
申明其義也歟



治病求源論

筠亭張子曰治病之法必求其源先察六淫七情之感次明五運六氣之傳主客必分於勝負標本要知夫後先風寒暑濕之燥火外因成病喜怒憂思悲恐驚內因之源不觸外感不由內因有此之感不內外因六淫之發辯其何淫九氣之繼察其何真三陰三陽十二經之候六臟六腑乃九臟之神二結五鬱當審其源五勞七傷窮究其症必先歲氣天和毋代之機斟酌老少虛實定要詳分深明亢則害之理須別承乃制之因脉詳七診九候之法病分痰血氣三者

而成藥有居臣佐使新舊地道稍身方有七方十劑古留後學之繩不須執此之規合宜加意以尋誠哉望聞問切之工神聖功巧之能雖無三折肱之良謀實有曲全活人之心矣於戲誤服湯丸者食不及新特犯禁戒者死必不臘医乃人之司命不可輕忽也豈弗當切、普心於斯哉



醫門秘旨目錄

卷之四

○風門

中風脈

通閉散

稀簽丸

千金保命丹

破血益榮湯

驅風酒

沐浴方

論

牛黃清心丸

當歸飲

一醉驅風酒

治不語方

捉虎丹

青礫散

中風不治症

胡麻散

人參飲

祛風散

去痰方

經驗方

南星散



小倉西仲潛寫



驅風至宝丹

秘選錠子

換骨丹

麝香散

千槌膏

破傷風

一字散

二仙飲

奪命還真丹

○寒門

陰陽辨症

熨脐法

三陽和能散

酒耳散

鄙續

內傷

消痰益氣湯

補申益氣湯

积木丸

○暑門

脉法

東垣說

五苓散

清暑益氣湯

生脉散

六一散

按六一散

益元湯

鄙續

○濕門

脉法

丹溪辨

獨活寄生湯

四制栝木丸

薏苡仁粥

鄙續

疽疾

脉法

丹溪說

戴先生辨

茯苓滲濕湯

治黃疽方

祛黃酒

茵陳五苓散



痞疾

脈法

鄙續

河澗論

橘皮枳朮丸

腫脹

脈法

丹方奇術

三花神祐丸

治水腫方

水腫禁針灸

五皮湯

奇効卽安散

二消散

七聖散

鄙續

○燥門

論

摠治三消方

枇杷散

天門冬膏

火門

脈法

病後論

升陽散火湯

惡寒論

三黃丸

大金花丸

抑青丸

左金丸

清胃湯

柔金丸

鄙續



○風門

中風脈

脈經云脈多沉伏浮遲或虛者易治急大數實或堅  
 急而疾者難治阳浮而滑阴濡而弱者宜吐反浮而  
 滑沉而滑微而虛者皆虛與痰微而數浮而緊緩而  
 遲者皆氣中沉滑為痰氣浮大為風浮數為熱為風  
 浮而緩皮膚不仁或微數浮而緊浮而大緩而遲滑  
 而浮數者此癱瘓之症也  
 中風之症有因外感有因內傷昔人言風者外感也



東垣言氣河澗言火丹溪言痰者內傷也外感者其  
人內有鬱熱以至腠理踈豁適遇暴風而卒中也內  
傷者其人膈間有痰腎水虧耗適因忿怒傷肝肝氣  
上升為火火無所制火載痰壅遂致不救以氣也火  
也痰也其實一源流為治之法外感者分中血脈中  
腑中臟之異而治之內傷者論是氣是火是痰之的  
而理之先用開閉竅之藥以用治不病之劑是也又  
中風之病亦與中氣相同但中風之症身溫痰涎多  
不能治中氣之症身涼無痰涎須臾便醒者不旺足  
以動火也此各為中氣老衰之人血氣俱虛真水已

竭適因怒動肝火金火相畏不得以上升所以身溫  
有痰涎多不能語者水竭無以降火也名為中風

中風不治症

髮直吐沫搖頭上竄直視口開手撒眼合遺尿不知  
人或面赤如旌頭面青黑汗綴如珠声如鼾喘皆不  
可治也

通關散

治卒中風邪昏悶不醒牙關緊閉湯水不下

細辛

洗去土葉

猪牙皂角

去子各一各

右為末每用少許吹入鼻中候噴涕服藥



一方加半夏壹錢  
牛黃清心丸

治諸風緩縱不語語言蹇澁心中惛惚忘恍惚去來  
頭目眩冒胸中煩鬱痰涎壅塞精神昏憤

又治心氣不足神志不定驚恐怕怖悲憂慘憾  
虛煩少睡喜怒無時或發狂顛神情昏亂

白芍藥煨一月 羚羊角末一月 人參去芦二月

芎藭一月二月 白茯苓去皮一月 防風去芦一月

阿膠拾份炒一月 乾姜炮五月 白朮一月五月

牛黃一分二分 麝香研一月 犀角鎊二月

雄黃研飛捌分 龍腦研壹兩 當歸去芦壹兩

金箔壹千或百片 柴胡去芦壹兩 甘草剉炒伍分

麥門冬去心壹兩 杏仁去皮尖壹兩 乾山藥柒兩

桔梗壹兩式分 黃芩去腐壹兩 神麩式月半

白斂柒分半 大麥壹百個蒸 蒲黃炒式月半

大豆黃卷炒壹月 肉桂去皮壹月

右除麥杏金箔二帖末及牛黃麝香龍腦雄黃四

味另為細末入藥和勻煉蜜麥肉為丸每兩作

十九金箔為衣每服壹丸食後溫水化下小兒

驚癇即度多少以竹葉煎湯下或溫酒亦可



胡麻散

治脾肺風毒攻衝徧身皮膚燥痒或生瘡疥或生  
癰疹用手搔皆侵層成瘡久而不愈而復作面  
上遊風或如虫行紫白痲頑痲或腎腔風攻注  
脚膝生瘡神効

胡麻 拾式月壁 蚕者佳 荆芥德 捌月 苦参 捌兩

甘草 炎六冬 何首烏 焙十月 威灵仙 陸冬

右為末每服貳錢薄荷湯或茶湯蜜湯調下藥  
後頻浴之自得汗出而立効

稀莖丸

治中風口眼喎斜時吐痰涎言語蹇澁四肢緩弱  
筋脉拘挛骨節疼痛久服耳目聰明髭髮烏黑  
筋骨壯健屢用有驗

稀莖草用五月五日六月六日九月九日採葉淨  
洗晒乾不拘多少鋪入甑中用好酒和蜜層々  
勻洒蒸之復晒乾如此製之九次為末煉蜜為  
丸如梧桐子大每服四十九空心無灰酒送下  
一方制膏用効

當歸飲

治半身不遂夜間疼痛



當歸酒洗一各生地黄酒洗俱用川芎半各黃柏炒一各

蒼朮浸洗一各升麻六分防風去一各荆芥半各羌活八分

獨活八分片苓炒八分防已一各甘草二分龍胆草洗去土八分

用水一鍾半煎八分溫服

人參飲 治半身不遂

羌活 獨活 桂心 二分 白薇 川芎 甘草 三分

人參去芦防風去芦細辛去土半夏水浸石菖蒲

茯神去不遠志去心蒼耳草各等分

用水一鍾半煎八分溫服

千金保命丹

治諸風癱瘓不能言語心中健忘恍惚來去頭目

眩運胸中煩悶鬱結痰涎壅塞脚氣攻心

又治心氣不足及小兒驚癇泄瀉大人猪羊顛

發傷寒發狂熱症

硃砂一各珍珠三各南星浸姜汁甘草 防風去一各

麻黃去根白附子炮雄黃 龍腦各一各琥珀三各

姜蚕炒去犀角鎊桔梗 麥門冬去心地骨皮

柴胡去芦升麻各一各牛黃三各天麻五各枳殼炒

神麴炒茯苓去皮白朮 遠志去心人參去一各

胆礬五各射香少許片腦少許牙硝四各河車一具



黃芩炒 荆芥各一 蟬退伍分 金箔張一百 天竺黃兩二

右為末煉蜜為丸如彈子大每服壹丸薄荷湯下

不拘時服忌雞猪羊肉核桃動風引痰之物及

猪頭肉又方加猪牙皂角一 川烏去皮尖炮 半夏生

姜汁浸白芷川芎各一 共為末和前藥末為丸尤妙

一醉驅風酒治癰瘰筋骨疼痛

葶解五 加皮各四 仙靈皮各四 杜仲六 丹醉

咬咀黃酒六七斤生浸五六日服一醉効

祛風散治中風口眼喎斜半身不遂

白附子姜 蚕炒 全蝎各等分 去足

右為末每服壹錢伍分熱酒調下

活血益榮湯治左臂拘攣腿痛半身不遂

桂心熟 地黃各半 當歸酒無 芍藥各二 川芎

柴胡去芦 青皮去穢 桃仁去皮尖 紅花各一

如此十劑去青皮柴胡加姜汁竹瀝服

治不語方

用茶子壹個去壳 糯米七粒

石研細水調二匙灌在鼻內痰即出為妙

去痰方

治胖人中風不語不知人事用好醋一大碗將炭



火灸入醋内吹醋氣入患者鼻内白然甦醒

驅風酒 治左癱右瘓

防風去芦 荆芥各三 白芷 細辛各四

川芎半斤 蒼朮浸 黃蘗各四 附子即 紅花一斤

燒酒六斤蜜一斤攪勻將藥以絹袋盛入酒内浸

一七去渣能飲者服壹鍾量小者半鍾食後并臨

卧須要靜服取微汗妙不可多服恐醉傷人

捉虎丹

治風氣并走注疼痛不能忍臨卧時服一丸趕到

脚心中出黑汁乃除根如病在上者食後臨卧

用好酒下如中風体重癱軟偏枯者酒下二丸

不醒人事牙關緊閉者用酒二鍾研調二丸灌

下醒為驗

京墨燒煙 麝香各三 乳香 木香各七

白膠香 草烏去皮 五灵脂各一 地龍去土

不驚子追去油 當歸無灰 酒侵洗 七分

為末和勻糯米打糊為丸如雞子大好酒送下

經驗方 治諸風疾極効藥酒

防風去芦 主四肢骨節疼痛拘攣

虎骨酥炙 主腿骨邪風濕等氣



脱蚕沙 式月炒

主癱癩肢節不遂利小便 疼

秦艽 去芦三月

主四肢拘急語言蹇澁

拘杞子 五月炒

主補五臟內及皮骨風濕

茄根 上乾細八月飯

主風濕骨節不伸

鱉甲 酥炙式月無

主四肢不遂

蒼耳子 搗碎去刺

主風骨節頑麻

當歸 全用无灰酒

主和血定痛

革薺 式月生焙

主補腰背痛

羌活 式月

主百節疼痛

牛膝 酒洗式月

主手足軟麻

加五味子

牛蒡子 各式月

蒼朮 水泔水浸式月

松節 式月

大麻子 一升炒去壳

黑豆 一升炒去壳

石吹咀用無灰酒貳拾斤以布袋裝藥入酒中浸

一十四日取飲不可面對瓶口恐氣冲目每進三

杯一日三次渣晒乾搗羅為末酒糊為丸如梧桐

子大每服三四十九空心温酒下忌一切動風物

沐浴方 服前藥酒亦用此洗

椿根皮

茺仁

槐枝

火麻

柳枝

茄樹

天羅藤

松葉

枯桑枝

金綿藤

杉樹頭

共一鍋煎湯大桶盛之用芦蓆重圍不許透風洗



久効此方治左癱右瘓口眼歪斜百節疼痛七十  
二風邪悉皆治之

青蒙散

治卒暴風中風痰涎壅塞牙關緊急目上視等症  
青礞石四牙煅 硃砂煅 為末每服貳錢酒調下

南星散

治急中風目閉牙噤人事不省無門下藥者

川烏去皮尖 草烏去皮 蒼朮米泔水浸 川芎  
石斛 人參去芦 荆芥 附子 當歸酒洗  
白芷 防風去芦 甘草六分 全蝎去足

何首烏 忌鉄器 天麻 麻黃去節 細辛各一分  
右為末每服壹錢用好酒臨卧時調下汗出為  
妙隔二日再進壹服時用為保身之具

驅風至寶丹

治一切風痰男子婦人半身不遂左癱右瘓口眼

歪邪百節疼痛行步艱難并皆治之

荆芥根去 麻黃 川芎 羌活 細辛 當歸酒洗  
草烏皮去 天麻 蒼朮米泔洗 西頭尖各等分  
右為末用姜汁打糊為丸印作錠子好酒化下  
半錠如風病者化下一錠昭服藥法



秘選錠子

治大人一切諸風破傷風疾小兒急慢驚風

天麻 白芷 人參去芦 薄荷 白朮 茯神去木

防風去芦 乾姜 三白附子 川烏炮 牛胆 南星七冬

川芎 木香 牛黃 片腦各三冬 全蝎二十个

硃砂一兩 射香二冬 姜蚕二十一个

右為末將麻黃一斤甘草半斤蜂蜜式刀煎作

膏子稀調將前藥末印作錠子金箔為衣小兒

急驚風昏睡不省人事四肢不收生姜湯送下

大人傷風酒湯下

換骨丹

治男子婦人左癱右瘓半身不遂口眼歪斜筋脉

拘急語言蹇澁痰涎阻滯潮熱不退精神昏愦

手足頑麻骨節疼痛諸般風症大腸下血心腹

疼痛五膈五噎并皆治之

沉香 檀香 木香各三冬 人參去芦 全蝎去足

乳香制 沒藥 甘草炙 茴香炒 川椒

荆芥 草烏 木香 白膠香各五冬

當歸酒洗 藿香各六冬 牛膝酒洗 天麻 細辛

山藥去皮 芍藥煨 川芎 生地黄無灰酒洗



虎骨 酥炙

甘松

白芷

自然銅

燒過紅入醋七  
次為末各八月

羌活

川烏 炮

麻黃

去節

防風

去

蒼朮

各一月

兩頭尖

八月

右為末

酒糊為丸

如彈子大

每服

一丸 臨卧用好送下 嚼碎亦可 衣被蓋煖

○依病調引

左癱右瘓用好酒送下

狂顛諸症硃砂湯送下

遍身血氣疼茶湯送下

耳聾腰背腎疼米泔下

紫白點風防風湯送下

手足退皮掌腫天麻湯

遍身疼痛乳香湯送下

心腹脹滿冷痛生姜湯下

林瀟疼痛用鹽湯送下

髮隨梳落腎風鹽湯下

婦人手足麻血風酒湯下

赤鼻風用艾葉湯送下

傷風咳嗽生姜湯送下

耳作蟬鳴川椒湯送下

眼疾濕癢煎茶湯送下

起坐艱難脚風地黃湯下

口吐酸水胆寒茴香湯下

鷄瓜風石榴皮煎湯下

婦人黃腫血風當歸湯下

赤白帶下生姜湯送下

胎前產後咳嗽肺風用紅花煎湯送下

麝香散

治中風啞忽然倒不省人事左癱右瘓口眼歪斜

諸末藥不効惟服此有効

麝香 或冬或三冬 細研 真香油 二三月



若遇此症急將麝研細調清香油攪勻將患人口  
按開灌下其人自醒

千槌膏

治男子婦人左癱右瘓寒濕脚氣及腰痛

龍骨煨二兩 乳香

沒藥各制

銅青

絕好生佳  
各肆兩

大風子十個

去壳

不驚子四十個

去壳

松香明淨者  
俱為末

大麻

肉式碗為  
君

共一處搗千下為膏任大小攤貼効合時忌雞犬  
婦人生人見

○破傷風

一字散

治破傷風緊急用者

金頭蜈蚣一條去  
頭足

草烏

天麻

各五  
白芷一多

為末每服一多發熱清茶送下發寒溫酒送下  
或半夏茯苓煎湯送下亦可

二仙飲

治破傷風

雄黃

白芷

各等分

右吹咀好酒濃煎服如牙緊者灌之立愈

奪命還真丹

張秋頭惠廟中泰山二處石刻治風疾百發百中

全蝎

去足

姜蚕

炒菊花

半夏

湯泡

陳皮

去白

地黃

酒洗

獨活

生地

去鐵

黃連

炒

川芎

蔓荊子

桂



地骨皮各一兩 天麻 揀參 兔糸子酒洗 木香  
 白朮 藁本各一兩半 白芍藥煨 茴香 防風去  
 知母忌 杜仲炒斷 白茯苓皮去 柴胡去 黃芩炒 枳殼  
 甘草炙 石膏 當歸酒洗 薄荷各二兩 麻黃節去  
 桔梗各二兩 羌活三兩 細辛十兩 蛤蚧二對  
 共為末蜜為丸如理中丸大盒箔為衣每服一  
 丸細嚼若中風癱瘓瀨酒下遍身筋骨痛心氣  
 疼不省人事醋下洗頭風暗風茶下驚癇口吐  
 涎沫酒下婦人胎前產後經脈不調香附湯下  
 極有神驗

○寒門

陰陽辨証

凡陰症身靜有語無声氣短淨怠目不了了鼻中呼  
 不出吸不入鼻氣粗水漿不入二便不禁面上畏寒  
 猶如刀割○陽症身溫無語有声目青了了鼻中啞  
 吸出入能往能來口鼻中氣熱也

熨脐法

治陰症用葱一束以繩扎如餅大切去根葉番葱白  
 長二寸先以火煨灰麵令熟麵着脐并脐下外面以  
 熨斗熨之令熱透脐中更作三四餅壞則易之候病



人稍省手足温有汗服四逆湯

○三陽和解散

治四時疫癘胃風感傷寒發症初起者止可服三劑

乾葛君柴胡臣香附使桔梗臣甘草使川芎佐

茯苓使枳殼佐前胡臣紫蘇君独活臣羌活君

用水一鍾半姜三片葱一莖煎八分食遠熱服

取微汗忌鴛羊雞魚酒麪猪肉等物

酒耳散

猪耳草去皮連根搗碎熱酒送下出汗為妙若生

惡瘡亦用此出汗端午日取者妙其渣敷瘡亦好

鄙續

鼻塞身重畏風寒人迎脉浮此為胃風畏寒戰慄脉  
滿大此為胃寒重則為傷寒也方傳其經

內傷

東南二方溶和之氣外感少內傷者十有八九邪之  
所湊其氣必虛當補中益氣湯主之如飲食內傷謂  
之有餘之傷平胃散加神麴山查麥芽主之又有口  
食寒物生冷以至手足厥冷臍脹腹痛脉沉或遲  
凡治諸病時常審察有無飲食傷損但見胸膈飽悶  
或噫氣噯酸腹痛腸泄惡食少食便問曾食何飲食



審知傷積即便先調脾胃消導飲食然後用本病藥  
或於本病藥內加入消導飲食藥若不知審此則藥  
雖對症而不効蓋人以脾胃為主脾胃自傷則不能  
運化藥味以成功也亦有食後即藥或藥後即睡或  
藥服太多者謂之傷藥要須識此吾妻嘗病胎漏忽  
日血大崩晝暈去服小便而醒少頃復暈急煎服荆  
芥隨醒隨暈服止血止暈之藥不効忽然嘔吐予以  
其童便藥汁滿於腸胃也即以手探吐之少頃吐出  
米飯及菜碗許詢問適方午飯後著惱少頃即崩下  
不止予悟曰因方飽食胃氣不行故崩盛血既大崩

胃氣益虛而不能運化宜乎崩暈不止而血藥無力  
也急宜調理脾胃遂用白朮五錢陳皮麥芽各貳錢  
煎服之服未半而暈止再服而崩止遂專理脾胃服  
數十劑胃氣始還然後加血藥治之而安若不審知  
食滯而專用血崩血暈之藥豈不誤哉書此以例餘  
飲食過傷變為異常急暴之症人多不識嘗有一壯  
年人忽得暴疾如中風口不能言目不識人四肢不  
牽急投蘇合香丸不効余偶過聞之因詢其由曰適  
方陪客飲食後忽得此症遂教用生姜汁淡鹽湯多  
飲探吐之吐出飲食數碗即時病愈又一婦人先傷



飲食損胃後夜飯早卧因事復起少穿衣服竟虛令  
少頃得厥逆昏迷不醒余曰此必有食也今煎姜湯  
吐之出夜飲食即醒後服白朮陳皮半夏湯又加麥  
芽調理而愈大抵此症多因飲食醉飽之後或感風  
寒或着氣恼而得飲食填塞胃氣不得行內傷時重  
誤作中風中氣症而用驅風解表行氣散氣之藥則  
胃氣重傷死在旦夕嘗見人有卒暴病多作中風中  
氣用藥須臾不救莫知其由內經雖有暴病暴死之  
症但恐多有因於食者前輩曾言但人不識耳今後  
遇有此等急症要審問明白若方飲食醉飽或晏傷

飲食重復受傷但竟胸有食滯者只作食治之

凡人四時以胃氣為本然治病必先診六脉皆有胃  
氣外症雖病重亦可治胃氣未絕則藥力運化而輪  
散於皮毛經絡故易治而生胃氣胃氣既絕藥雖對  
症不能使其運用以輪藉於皮毛經絡脾脏獨見而  
藥不及矣遂成不治之症也東垣曰脉貴有神有神  
者有胃氣之謂也故諸經方論皆曰有病早治療不  
令邪氣深入所以聖人治未病不治已病正謂此也  
○消痰益氣湯遊宦四方水土不服當用此藥若任

陳皮

白朮

白朮

茯苓

神木

黃芩

炒

梔子

炒

甘草

五



神麴炒分半夏製山查 黃連伴姜片前胡 各一多  
蒼朮宿炒泔水浸一 用水一鍾半姜三片煎八  
分溫服一日一服或間日一服可免瘴病何也  
蒼白二不去濕苓連清熱解毒二陳化痰蛋麴  
理脾百病自卻更宜戒酒色慎起居

補中益氣湯

治形神勞役或飲食失節勞倦虛損身熱而煩脈  
大而虛頭痛或惡寒而渴自汗無力氣高而喘  
柴胡去芦當歸酒浸升麻 白朮 陳皮各五分  
人參去芦甘草 各一多 黃芪加一多五分待熱盛

六一散

治 暑身熱小便不利此藥性涼除胃脘積熱又  
淡能燥濕故利小便而散濕熱  
滑石 飛過六月 甘草 細末一月辰砂 三多

右伴勻每服錢新汲水調下  
按六一散入乾姜以寒溫也名曰溫六一散加紅  
麴以清熱也名曰清六一丸治痢俱効附此

益元湯

治注夏春末夏初頭疼脚軟食少體熱  
黃芪炒白朮 甘草炙陳皮 人參去芦芍藥 煨



黃栢去粗皮炒當歸無灰酒洗

水鍾半煎八分空心溫服夾痰加半夏麥門冬五味子

鄙續

靜而得之謂之中暑宜以辛散之劑微發之不可泥  
傷寒之法也動而得之謂之傷暑汗大出無氣以動  
當以人參白虎黃芪大劑主之夾飲食內傷者惡食  
右關脈沖過氣口暑藥內加神麴山查勞倦內傷者  
脈弱無力黃芪人參倍加則安矣  
有暑風一症因其夏月而病搐搦故有此名非風也  
迺暑熱亢極火盛金衰不無所制汗閉於外痰鬱於

者名曰中熱其病必頭疼發燥惡熱捫之肌層大熱  
大渴飲汗大泄無氣以動乃為大熱外傷肺氣人參  
白虎湯涼劑主之 注夏屬陰虛元氣不足夏初口  
未頭疼脚軟食少休熱者是宜補中益氣湯調之  
五苓散 治暑瀉暑熱小便不利之症  
肉桂一月白朮 猪苓 茯苓各月澤瀉二月半  
石為末每服二三多滾白湯調下

清暑益氣湯

治長夏濕熱蒸人四肢困倦精神減少懶於動作  
胸滿氣促肢節疼痛或氣高而喘身熱而煩心



下脹悶小便黃而數大便溏而頻或痢或渴不思飲食自汗躰虛身体微熱靜中所感或注夏之病俱能治之

甘草 黃柏炒 歸身酒洗 麥門去心 青皮去白

葛根各三分 人參去芦 白朮 陳皮 神麴炒

澤瀉各六分 升麻一分 蒼朮水浸 黃芪各一分 除五分

五味子九個 水二鍾煎一鍾食遠熱服

生脉散

人參去芦 麥門冬去心 五味子各等分

用水一鍾半煎八分溫服

其加減法前具辨惑論中作一服水二鍾煎一

鍾早飯後溫服

積水丸 健脾養胃消痰導滯

枳實炒 半夏製 陳皮 白茯苓 白芍 煨香附各一分

白朮四刀 甘草五分 神麴炒 山查各三月 麥芽炒 丹半

右為末壁色荷葉煎和老米末為丸如菉豆大每服

五十九粒米湯下○按麥芽用江北者良考江南麴

麥食之令人發病江北之麥麴不然何也江南之

麥其花自登發江北花夜發用者審之矧麥芽下

胎破血用之尤所當謹



○暑門

脉經云暑傷元氣所以脉虛弦細芤遲躰狀無餘又曰脉虛身熱行之傷暑脉浮自汗散火動也或浮大而散或洪而大或弦細芤遲或弦而帶微緊或脉隱伏而弱或虛遲無力中得洪緩皆暑病也

東垣曰暑熱之時無病之人或避暑熱納涼於深堂大厦靜而得之者名曰中暑其病必頭痛惡寒身體拘急肢節疼痛而煩心肌膚大熱無汗為房室之陰寒所遏使週身陽氣不得升越故治以順氣散熱藥主之是也如傷暑若行人或農夫於日中勞役得之

內故手足揚為動搖內擾神舍治宜清暑治痰之藥不可以風治之

○濕門

脉經云沉細緩或濡或濡皆中濕浮為風濕大而浮虛而濡為寒濕滑主痰身熱煩喘胸滿口燥發黃為濕熱洪緩為濕熱身甚洪弦而動濕熱為痛

脉沉而緩沉而細微緩者皆濕 脉浮風濕 脉大或浮而虛濡者皆寒濕脉來滑疾身熱煩喘胸滿口燥脉沉數濕熱脉洪而緩臥臥而虛濕熱自甚濕脉洪而動熱為痛丹溪曰六氣之中濕熱為病十居八九濕有自外入



者有自内得者陰雨湿地皆從外入宜汗散久則踈  
通泄之濕在上宜微汗而解經曰濕上盛而熱治宜  
苦温佐以甘辛以汗為効而已不欲汗多故不用麻  
黄桂枝等劑濕在中宜利小便此淡滲利濕也在下  
宜升提之

難經曰諸濕腫滿皆屬於脾土濕盛則濡泄地之濕  
氣感則害人皮肉筋脉

獨活寄生湯

治風濕卧床不起也日見効

獨活參月 細辛 牛膝無灰 桑寄生如無續 漸代之

秦艽

茯苓去皮

桂心

杜仲姜汁炒斷

防風去芦

川芎各式月

芍藥煨

當歸無灰酒洗

甘草炙

人參去芦

熟地黄酒洗

石咀每服一兩姜三片水鍾半煎八分通口食

前服外用金鳳花栝子仁朴硝木瓜煎湯洗浴

每日二三次妙

四製栝木丸

滋陰降火開胃進飲食除周身之濕治下部之濕尤効

黃栝

去粗皮四斤切成片一斤酒製一斤乳製一斤童便製

蒼朮

去皮一斤切成片四月川椒炒四月破故紙炒四月五味子

炒四月川芎炒四月各用一多炒訖除去四味方同為末



右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服六七十丸  
早酒午茶晚白湯送下

薏苡仁粥

用薏苡仁和米煮粥常食去濕極効功勝諸藥可驗

鄙續

濕熱為病十居八九明土氣火熱所生方多燥濕藥  
醫者不可以此拘當魚涼藥以治之腰以上宜汗腰  
以下宜利小便大法分利之藥中不可無也其濕症有二如  
脈滑數小便亦澀引飲為濕熱證若小便自利清白  
大便泄利或痛自汗為寒濕症治宜五苓散加香附

蒼朮木瓜主之

自內而出者膏梁過多涌溢於中濕從內作或衣濕汗或  
冒雨露或臥臥潤濕從外入也

疸

脈經云脈沉渴欲飲水小便不利皆發黃也凡黃候  
寸口近掌無脈口鼻冷不治

丹溪云不必分五種同是濕熱如盆麴相侶

戴先生曰五疸週身皮膚并眼如梔子水染因食積  
為黃者○量人虛實真否食積其餘但利小便為先  
小便利白其黃自退○疸重者大溫中丸熱多加黃  
連濕者溫中五苓散食積藥濕熱因傷胃氣服下藥  
大便不利參芪加梔子茵陳甘草



茯苓滲濕湯

治濕熱發汗黃尿或赤

白茯苓去皮

澤瀉

茵陳

猪苓

黃芩炒

黃連炒

梔子各炒

防己

陳皮

枳實

蒼朮

各等分

右咀水鍾半姜三片煎八分熱服

如小水不通加木通車前

如飲食不思受傷倍加砂仁山查神麩炒麥芽各等分

治黃疸之疾

用田螺四十九個去壳搗爛如泥又用白菓四十九個以童便煮熟又用生白菓四十九個共

搗為一處入乳一椀加童便與水二三碗露一

宿空心隨服天涼分為七日服

祛黃酒

治黃疸神方

用醇酒一碗陳艾一把研熟酒泡浸又將田螺

十個將前艾酒同搗去渣溫服

茵陳五苓散

治五疸其色如赤金

茵陳

澤瀉

白朮

赤茯苓

各一分

猪苓

八分

肉桂

三分

水鍾半煎八分空心服



痞疾

脉經云胸痞脉滑為有痰結弦伏亦痞淡則氣劣  
河間曰痞與否同不通泰也心膈悶而不痛者為痞  
滿內外皆急脹者為腫聚而成塊者為積塊也  
痞者有食積魚濕東垣有法有方心下痞用枳實炒  
黃連如稟受色蒼骨露氣實之人而心下痞者枳實  
黃連青皮陳皮枳壳如稟受素弱轉運不調飲食不  
化而心下痞者宜白朮山查麴蘖陳皮如肥人心下  
痞者乃是痰宜蒼朮半夏砂仁茯苓滑石如瘦人心  
下痞者乃是鬱熱在中焦宜枳實黃連葛根升麻如

食後感寒飲食不化心下痞宜藿香草荳蔻吳茱萸  
砂仁痞夾血成窠囊用莢仁紅花香附天黃之類無  
不効也

橘皮枳朮丸

治老幼元氣弱飲食不消脾胃不調心下痞滿

枳實炒去穢 陳皮各一月 白朮二月 東牆土

為禾荷葉煎湯打糊為丸如梧桐子大每服五  
六十九丸滾水送下食遠服夫內傷用藥之大法  
強人胃氣令胃氣益后能猛食多食重食而不  
傷此為用藥者也服此久久益胃氣令人不傷



鄙續

傷寒下早而痞者寒傷榮心主榮邪入於本故心下痞以黃連瀉心湯主之○飽食傷脾不能欲而痞者惡食氣口脈緊甚者是痰因氣滯不能運化積於胸膈脈滑而痞者○濕熱大盛而痞者四肢軟弱面黃者是也下多傷脾而痞者相類肥人多濕痰而痞瘦人多鬱熱而痞分而治之可也

腫脹

脈經曰腫脹之症有臥有臥察脈觀色問症須詳陰脈沉滯其色青白不渴而瀉小便清色脈或沉教也

赤而黃燥尿赤溺蕪渴而脹為陽浮大者生沉細者死腫脹因脾虛不能制水水漬妄行當以參朮補脾胃使胃氣得實則自捷運自能升降運動其樞機則水自行非五苓神祐之行水也宜補中行濕利小便可用二陳湯加白朮人參蒼朮為主佐以黃芩麥門炒梔子制肝水若脹佐以厚朴氣不運加不香木通氣若陷下加升麻柴胡提之隨病加減必須補中行濕二陳治濕加升提之藥能使大便潤而小便長若產後必須大補血氣為主少佐蒼朮茯苓使水自降用大劑白朮補脾若壅滿用陳皮半夏香附治之有



熱當清肺經麥門冬黃芩之屬一方用山梔子去皮  
取仁炒碾碎米湯送下一抄若肺胃熱病在上者連  
皮用

治水腫方

木香一分五分白朮二分半山梔子炒五分

右吹咀取急流水煎服水腫用大戟香薷濃煎汁

成膏丸去暑利小水大戟為末枣肉丸瀉小水劫

快實者

鼓脹又名車脹宜大補中氣行濕乃脾虛之盛必  
須遠音樂斷厚味節飲食祛鹽味戒暴怒久久調之

方得安矣

水腫禁針灸

按水腫惟針灸水溝可針餘穴水盡即死此明堂銅  
人所戒也庸醫多為人針分水殺人多矣若其他穴  
亦有針得愈者特幸為不可以為法也水溝名人中  
在鼻柱下灸三壯其水腫人中滿不治

丹方奇術

治腫脹不服藥自去水

生硫黃一分水銀粉二分巴豆肉 研去油四分

右三味和成餅要勻先用新綿一塊鋪臍上次



以餅當劑掩之外用綿縛如人行三五里自然  
瀉下惡水待行三五次除去藥以溫粥補之久  
患者隔日取水一餅可救十人神効

五皮散

治水腫煩渴小便赤澁大便閉此屬陽水

陳皮 桑白皮 大腹皮 生姜皮 茯苓皮  
石叻阻每服八分水鍾半煎八分溫服

奇効即安散

治黃腫腹大如鼓之狀

南木香 檳榔 牙皂 各四分 黑牽牛 一分

右為末頭一日服四錢消上截次日早服三錢  
半消中截三日早服三錢消下截用巽方石榴  
根上青皮半夏煎水送下先服五積散一貼出  
汗愈

三花神祐丸

治中滿腹脹咳嗽淋閉一切濕腫皆治

甘遂 大戟 芫花炒六分 牽牛式月 大黃元方  
輕粉乙夕 為末水丸菜豆大每服十丸九量虛

實加減溫水送下

二消散

治十散







層燥瀟乾疥疝枯之類為表症而於伏結臥結氣盛  
血少痰鬱風熱而又悉之

秘丹 吐血烏主摠治三消方

黃連炒 天花粉二味為末 藕汁 人乳汁 生地汁佐

以姜蜜和二味為膏每次一指面大放在舌上徐

徐白湯送下

批把散 治消渴胸滿心煩津液太少

批把葉二 麥門冬二 五味子五 瓜蒌 生地黃

人參去 茯苓去 神去 乾葛各壹 知母忌 甘草各七分

水鍾半竹葉十皮烏梅一个煎八分不拘時服

夫三消之病消渴消中消腎皆火也入水之物無物  
不潤入火之物無物不消蓋消渴之疾飲水至斗亦  
不能止其渴相火燥其膈膜此膈消也治法調之而  
不下固無以殺炎上之勢下之而不調亦無以沃膈  
膜之乾下之當以三一陳氣湯調之當以涼膈散加  
桂苓甘露飲大作劑科服之間用生地黄生藕榴汁  
服之又當慎起居戒淫慾消渴之疾不足憂矣相火  
燥其肺脏者皆肺消也飲一瘦二者必死消中之疾  
多食而反瘦亦多消而飲水相火燥其胃土也治法  
當三一氣湯節次下之五七次後用涼膈散白虎飲



桂苓甘露飲三藥合為一服服之必愈腎消者相火  
燥其腎旺者也經曰思想無窮所願不得意淫於私  
縱欲太甚白淫因洩而下或夢遺精脫治法宜珍珠  
粉丸或封髓還元丸服之必愈矣此不傳之秘妙也  
丹溪云消渴養肺降火生血為生分上中下治三消  
皆禁用半夏血虛亦忌用口乾咽痛腸燥大便難者  
亦不宜用汗多者不可用不必用鹽薑汁消渴若瀉  
泄先用白朮白芍炒為末調服後服煎藥即諸汁膏  
○內傷病根後燥火不解此有餘熱在肺經可用參  
苓甘草少許薑汁調冷服或以茶匙執薑汁送之虛

者可用人參渴天花粉消渴神藥也

上消者肺也多飲水而少食大小便如常

中消者脾也多飲食而小便黃赤

下消者腎也小便濁淋如膏之狀面黑而瘦

### 天門冬膏

天門冬五斤用溫水洗淨揀過在溫水內浸一時  
即去水只待軟透至骨去皮心搗爛每斤入水五  
碗共約羹水同煮半乾傾出漚渣滓再搗每斤再  
入水四碗約羹水同煮大半乾方用粗夏布漚汁  
去渣將前汁同和一處文武火熬過必滴水成珠



不散將膏磁礮盛貯此膏滋配降火助元氣盛虛  
有熱者用之潤燥每日滾白湯調服二三次清晨  
一服午後一服下晚一服其妙若神前有一人單  
服此膏生三十二子以其中又補滋化源也

○火門

脉經云浮大而虛為虛或洪數而細小為實沉細或  
數難治又云○脉理提綱曰火脉洪數虛則浮  
劉宋厚曰火之為病其害大其變甚其勢彰其死暴  
火者蓋能燔灼焚焰飛走狂越消鑠於物莫能禦之  
遊行乎三焦虛實之兩途曰君火也猶人火也曰折

火也猶龍火也火性不妄動不違於道當以稟命而  
運行造化生存之机矣夫人氣交於中多動少靜怒  
不妄動其可得乎故凡動者皆屬於火他火一妄行  
元氣受傷勢不兩立偏勝則病移害他經事出非細  
動之極也病則死矣今所以一水不勝二火出天造  
君相之外又有厥陰脏腑之火根於五志之中六怒  
七情激之其隨蓋大怒則火起於肝醉飽則火起於  
胃房勞則火起於腎悲哀動中則火起於肺心為君  
主自焚則死矣

惡寒發熱辨



丹溪云惡寒非寒明是熱症亦有久服熱藥而得者  
河澗謂火極似水熱盛而又竟寒冷實非寒也有用  
熱藥而少愈者亦能發鬱遏暫開爾惡熱非熱明是  
虛疽經曰陰虛則外熱陽在外為陰在內為陽之守  
精神外馳嗜慾無節陰氣耗散陽無所附遂致浮散  
於肌表之間而惡熱也當作陰虛治之  
升陽散火湯

治男子婦人四肢發熱肌熱筋皮熱骨髓中熱發  
困熱如燎們之烙手此病多因血虛而得之或  
胃虛過食冷物抑遏陽氣於土火鬱則發之意

宜服此劑

升麻 葛根 獨活 羌活 各伍分

防風 去芦 柴胡 去芦 甘草 炙 人參 去芦

白芍 煨各五分 甘草 生二分

右以咀每服八錢水煎溫服

三黃丸

治男子婦人三焦積熱咽喉腫痛心膈煩燥小便

赤澀大便閉細并宜服之

黃連 去鬚炒 黃芩 去粗皮土炒 大黃 炒各五分

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服四五十丸



流白湯送下

大金花丸

治中外諸熱寢汗咬牙時常驚悸溺血淋閉咳衄  
血瘦弱頭痛并骨蒸肺痿喘嗽去大黃加梔子

名曰梔子金花丸

又曰既濟解毒丸

黃連炒

黃柏炒

黃芩炒

大黃煨

右為末米糊為丸如菘豆大每服三四十九用

新汲水送下

身熱去大黃加梔子

柳青丸

治肝火

黃連姜汁炒不拘多少

右為末用粥糊為丸每服六七十九以流白

湯送下

左金丸

治肝火

黃連六月炒

吳茱萸七月

石用麩糊為丸隨意服

治法



小熱之氣涼以和之大熱之氣寒以取之盛熱之氣汗以發之不尽則逆取之

清胃湯

治牙床腫痛動搖黑爛脫落皆屬二陽明大腸與

胃二經之火

條芩炒一分 石膏二匙 山梔炒一分 牡丹皮一分

甘草一分 升麻七分 藿香五分 生地黄無灰酒洗八分

白芍煨七分 黃連炒八分 桔梗去芦七分 連翹去心一分

用水鍾半煎八分食遠熱服

柔金丸

竭大便閉結或生痔疾奇効

用山梔子不拘多少炒為末打糊為丸每服之

八十九空心滾白湯送下

鄙續

心火者君火也可以濕伏可以水滅也

相火者龍火也有名無位係於肝腎二臟之間不

可以直折之惟知母黃柏主之

五臟之火名五志也當論臟腑虛實治之名實火

者為有實火也經云正氣奪則虛邪氣盛則實

故實火宜瀉之虛火宜補之



諸氣憤鬱肺經也悲哀動中火起於肺  
諸風掉眩肝火也怒則火起於肝  
諸濕腫滿脾土也醉飽則火起於脾胃  
心為君火則不可輕動上則自焚而死故多暴死  
之症也

諸逆冲上屬腎火也房勞則火起於腎若火起於  
湧泉者虛之極也難治

醫門秘旨卷之四終



宇津宮木村由賢寫



