



瘍科選粹目錄

第二卷

癰疽兼證第二十五

竹葉黃耆湯

黃耆六一湯

竹葉石膏湯

葛根散

桑枝湯

托裏益中湯

托裏抑青湯

托裏清中湯

黃耆人參湯

加味解毒湯

內補黃耆湯

當歸和血飲

乳香定痛散

聖愈湯

濟生犀角地黃湯

潤腸丸


和氣飲

四神丸

二神丸

滋腎丸

清心蓮子飲



五淋散

清肺飲

琥珀散

人參平肺飲

瀉青丸

胃苓湯

參苓白朮散

疔瘡第二十六

保生錠子

神聖膏

千金托裏散

破棺丹

四聖旋疔散

天疔散

取疔散

蟾酥錠子

立馬回疔丹

提疔錠子

飛龍奪命丹

追毒丹

水沉膏

追疔奪命丹

雄麝湯

二活散

追疔湯

保生錠子

與前不同

賽奪命丹

蜂蛇散

五聖散

內托連翹飲

萬病解毒湯

回瘡錠子

走黃丹

拔毒膏

立愈疔方

夢授異功丹

紅絲瘡第二十七

癩疽第二十八

久漏瘡第二十九

神應膏

豬骨膏

附子散

桂附丸

心癰第三十

內癰

清心飲

涼膈散

內固清心散

肺癰第三十一

內癰

知母茯苓湯

紫苑散

人參平肺散

劫勞散

小青龍湯

葶藶散

葶藶大棗湯

桔梗湯

參耆補肺湯

參朮補脾湯

消膿飲

甘桔湯

太乙膏

梅豆湯

雲母膏

托裏清中湯

團參飲子

黃昏湯

青龍湯

瓜蒌子湯

葦葉湯

獨神散

人參補肺湯

參耆補脾湯

如聖丸

濟生排膿散

單方二條

胃脘癰第三十二

內癰

麝干湯

薏苡仁湯

牡丹皮散 二條

清胃散

芍藥湯

三仁湯

失笑散

單方三條

腸癰第三十三

內癰

大黃湯

薏苡仁湯

瓜蒌散

薏苡附子散

大黃牡丹湯

伏梁丸

梅仁湯

四物玄胡湯

排膿散

癰疽部分

頂門癰 太陽疽 鬚疽

頭瘍第三十四

柴胡清肝散

髮際瘍第三十五

癩頭瘡第三十六

天麻散

決効散

松脂膏

奇方十條

腦疽第三十七

羌活當歸湯

追毒萬應針頭丸

面瘍第三十八

發眉 粉痣

發髭 斑刺

腮疽 偷針眼

疔腮

遊風

月蝕瘡 牙又

小兒肥瘡

犀角升麻湯

白芷胃風湯

升麻黃連湯

連翹敗毒散

內托消毒散

消毒救苦散

硫黃散

面油摩風膏

瑩肌如玉散

去黑斑點方

祛風白芷散

羊鬚散

消毒散

黑白散

藥油

面上肥瘡

面上泡瘡

洗面去斑

月蝕瘡

偷鍼眼

紅玉膏

耳發第三十九

東垣鼠粘子湯

逍遙散

柴胡梔子散

蔓荊子散

曾青散

當歸川芎散

加味地黃丸 耳病十二奇方 抵聖散

黃連散

口瘍口疳第四十

繭唇 內疳瘡 牙癰
骨槽風 唇瘡

琥珀犀角膏 礬丹散 益膽湯

升麻散 瀉黃飲子 東垣柴骨湯

玉芝飲 犀角散 白礬散

雄黃散 鹽梅散 柳花散

青黛散 白木甘草散 黃連升麻湯

綠袍湯 蜜柏散 紅芍藥敷

半夏散 烏星散 甘礬散

多効散 陰華散 化毒法

降火膏 口瘡八方 繭唇三方

內疳瘡生肌散

咽喉第四十一

通關散 桔梗湯 清熱利咽湯

三仙膏 斬關丸 魚膽破關散

格楞藤飲 獨神飲 入聖散

漱喉丹 交泰散

痰核第四十二

二陳湯 含化丹 加味小胃湯

竹瀝達痰丸

海帶丸

星半消核湯

瘍科選粹卷之三

絲

繡水陳文治輯

東吳繆希雍叅校

癰疽兼證第二十五

○渴證

薛云若瘡瘍作渴焮痛發熱二便調和者熱在上焦
 也用竹葉石膏湯瘡痛發熱大便秘澀者內臟熱
 也用四順清涼飲若焮腫痛甚者熱毒蘊結也用
 仙方活命飲漫腫微痛者氣血虛壅也用補中益
 氣湯若因胃火消爍而津液短少者用竹葉黃耆

湯補中益氣湯若因腎水乾涸作渴口舌乾燥者
宜加減八味丸或補中益氣湯

凡癰疽發渴乃氣血兩虛用參耆以補氣歸芍以補
血氣血完津液生渴自止或用黃耆六一湯

疽愈後發渴最惡證唯加減八味丸最妙蓋癰疽多
因虛而得疽安發渴宜服此丸未渴先服永不發

渴 陽氣虛寒手足厥冷用補中益氣或十全大
補湯加薑桂

加減托裏消毒散 見用藥論

竹葉黃耆湯 治癰疽大渴發熱小便如淋

生地

黃芪 各貳錢

當歸

淡竹葉

川芎

甘草

白芍藥

黃芩

括蔞根

人參 各壹錢

石膏 煨壹錢

麥冬 貳錢

右薑參片水煎薛氏云前證乃七惡中之一也此

方治之甚捷大抵脉浮大熱渴宜發散表邪脉沉
實熱渴宜疏導內邪若潰後作渴屬氣血兩虛宜

大補氣血若服此湯而脉反大熱愈甚渴愈作乃
為敗證蓋真氣虛邪氣實也 今治潰瘍多以石

膏黃芩二藥性冷不用若胃火胃經熱毒未靜者
非此不治

托裏養榮湯

治氣血俱虛膿血大泄作渴兼發熱見惡候療治

黃耆六一湯

治渴補虛之要劑常服可免癩疽之患

綿黃耆

鹽水潤炙陸兩

甘草

壹兩半生半煎

右每壹兩水貳鍾煎加入人參尤妙或為末每服貳

錢白湯調下

竹葉石膏湯

治胃火大盛腫痛作渴

淡竹葉

石膏

桔梗

中水通

薄荷

甘草

右各等分加薑水煎

葛根散

治癰疽腫熱口渴或嘔

葛根

黃耆

升麻

麥門冬

瓜蒌根

赤芍藥

生地黄

梔子

各壹兩

黃芩

柒錢伍分

甘草

伍錢生用

右每用肆錢水煎不拘時溫服

桑枝湯

補血氣生津液大治口渴兼補肺腎之良藥

用嫩桑枝細切壹升炒用水叁升煎壹升日服無

時以多為妙抱朴子云治風痺乾燥臂痛腳氣四

肢拘攣上氣暈眩久服補肺消食

加減八味丸

止渴三日見効

見惡候療治

○嘔證

嘔證有二其一謂初發伏熱在心宜托裏散其一謂氣虛宜托裏兼補 丹溪云諸逆衝上皆因於火然治須分先後腫瘍嘔當作毒氣上攻潰瘍嘔當作陰虛老年人尤宜參朮竣補 河間云瘡瘍嘔逆者溼氣侵胃也藥中倍白朮

薛云作嘔難泥毒氣上攻而槩用敗毒等藥如熱甚熾痛邪氣實也仙方活命飲解之作膿熾痛胃氣虛也托裏消毒散補之膿熱脹痛氣血虛也先用托裏散替鍼丸泄之熾痛便秘熱蘊於內也內疏黃蓮湯導之若因寒熱傷胃而嘔者托裏健中湯

胃寒少食托裏益中湯中氣虛寒而嘔托裏溫中湯肝木乘脾土而嘔托裏抑青湯胃脘有停痰者托裏清中湯脾虛作嘔托裏益黃湯鬱結傷脾而嘔托裏越鞠湯當各究其源而施治之丹溪雖有腫瘍作毒氣上攻潰瘍作氣虛之說亦大槩言之耳大約熱毒內攻者少胃虛寒而嘔者多

新甫治一發背潰後忽嘔而瘡痛胃脘弦緊或以爲餘毒內攻按東垣云嘔吐無時手足厥冷臟腑之虛也丹溪云潰後發嘔不食者溼氣侵於內也又云膿出反痛是其虛也今胃脉弦緊木乘土位非

虛而何乃以六君子湯加酒炒芍藥砂仁藿香參以補氣血而安大抵溼氣內侵或感穢氣作嘔必喜溫而脉弱熱毒內攻而作嘔者必喜涼而脉數

必須辨明

加減消毒散

治胃虛作嘔去白芷連翹金銀花加參朮藿香見腫瘍

托裏益中湯

治中氣虛弱飲食不思瘡不消散潰而不斂

人參

白朮

陳皮

半夏

茯苓

炮薑

木香

炙甘草

右加薑棗水煎服

托裏抑青湯

治脾虛為肝木所侮不進飲食胸膈不利

人參

白茯苓

白朮

半夏

柴胡

白芍藥

甘草

陳皮

右薑棗水煎服

托裏清中湯

治胃虛有痰不思飲食

人參

白朮

陳皮

茯苓

半夏

桔梗

甘草

茯苓

右加薑棗水煎服

托裏益黃湯

治脾土虛寒水反侮土嘔吐泄瀉

托裏越鞠湯

治六鬱所傷脾胃虛弱不思飲食

○痛證

瘡瘍之證寒熱虛實皆能作痛止痛之法因時制宜
不止乳沒可以止痛

薛新甫云瘡瘍之作由於六淫七情所傷其痛也因
氣血凝滯所致假如熱毒在內便秘作痛者內疏
黃蓮湯導之熱毒熾盛焮腫作痛者黃蓮解毒散
不應仙方活命飲解之瘀血凝滯而作痛者乳香
定痛散和之作膿而痛者托裏消毒散排之膿脹
而痛者鍼之膿潰而痛者補之若因氣虛而痛四
君子加歸芪血虛而痛四物加參耆腎虛者六味
丸口乾作渴小便頻數加減八味丸此止痛之大

法也

托裏消毒散加減法

高腫焮痛者熱毒加黃連 漫腫微痛者氣虛去

金銀花連翹加參朮 腫赤作痛血凝滯也加乳

沒或仙方活命飲 膿出反痛為氣血兩虛去金

銀花連白加參耆 漫腫不痛死肉不潰為氣虛

去三味加參朮不應加薑桂甚則加附子

原方見用藥論

黃耆人參湯 治膿血大泄敗臭痛甚

人參 蒼朮 白朮 陳皮

麥門冬 當歸 神麴 甘草

五味子

各壹錢

黃耆

炙貳錢

黃檗

升麻

各肆分

右薑棗各三枚煎

薛云前證乃七惡中之二宜

治以此方亦有潰後虛而發熱或作痛者尤妙若

痛止而大便不實去黃栢麥門冬

加味解毒湯

治大痛不止服此即効

黃耆

鹽水炒

黃連

黃芩

黃栢

連翹

當歸

酒炒各柒分

甘草

白芍藥

梔子仁

炒各壹錢

按此方宜脉洪大有力者以此解之甚妙亦有便秘脉實而痛者宜內疏黃連湯下之若潰後反痛

宜內補黃耆湯補之

內補黃耆湯

黃耆

鹽水炒 貳錢

熟地

人參

茯苓

甘草

炙各伍分

白芍藥

川芎

官桂

遠志

當歸

各捌分

麥門冬

伍分

右薑三片棗三枚水煎服

當歸和血飲

治瘡瘍未發出肉痛不可忍兼治婦人產前產後腹痛

當歸

貳錢

乳香

伍分

白芍藥

叁錢

沒藥

壹錢伍分

右為末每服壹錢用水壹盞煎七分和楂服或用酒煎瘡既發出不必服

人參內補散

治瘡瘍已潰作痛不止

方見調攝

乳香定痛散

治一切瘡瘍潰爛疼痛

乳香

沒藥

各伍錢

寒水石

滑石

各壹兩

冰片

壹錢

右為末擦患處立止加南星半夏能止痛加蓖麻

仁尤佳

○出血證

瘡瘍出血因五臟之氣虧損虛火動而妄行也以犀角地黃湯為主若氣血俱虛宜十全大補湯陰火動用六味丸氣虛用補中益氣湯

瘡瘍出血煩躁脉洪大無力用當歸補血湯或八珍湯加黃芪山梔尤妙又云血脫補氣此陽生陰長之理用四君子加熟地芎歸若用涼血降火沉陰之劑則脾土復傷不但血不歸源而命亦不保矣

濟生犀角地黃湯

治胃火血熱妄行吐衄或便血

生地黃

赤芍藥

牡丹皮

犀角

各壹錢伍分

升麻

黃芩

炒各壹錢

右煎熟入犀角末服

若怒氣所傷加山梔柴胡

若脾氣虛不能攝血用歸脾湯補中湯若肝脾火動而妄行用加味道遙散若血虛有火用四物加

炮薑若腎經虛火用六味丸不應加肉桂

聖愈湯 治諸瘡血出不止以寒水石細末摻之立止如血出多而心煩不安不得臥此亡血也此

方主之

熟地黃

生地黃

各參錢

當歸

貳錢伍分

川芎

貳錢

黃耆

伍分

人參

參分

右作一服水煎熱服無時

加減托裏消毒散

膿多帶赤血虛也去金銀花連翹白芷參味加歸

地參朮如不應暫用八珍湯加丹皮 忿怒後瞞

熱血出肝火血虛也去上三味加丹皮黑山梔熟

地不應亦用八珍湯 面青脇脹而出血肝氣虛

而不能藏血也去上三味加山茱萸山藥五味子

兼用六味丸 食少體倦出血脾氣虛而不能攝

血也去上三味加參朮歸地不寐加遠志棗仁茯

神龍眼肉或兼用歸脾湯

○大便秘結證

東垣云瘡瘍熱毒深固嘔啞心逆發熱而煩脉沉而

實腫硬木悶大便秘結此毒在臟腑宜疎通之故

曰疎通其內以絕其源

又曰瘡瘍及諸面赤雖有伏火不得妄攻其裏若陽

氣拂鬱邪氣在經宜表發以去之故曰火鬱則發之

凡痞脹大便不通乃直腸乾涸用猪膽汁導之若腸胃氣虛血涸不通者宜十全大補湯培養之若潰瘍見此證因氣血虧損腸胃乾涸法當大補為主若不審虛實一於疎利必致大誤

潤腸丸

治脾胃伏火大腸結燥或風熱血結宜此方

麻子仁

桃仁

各壹兩

羌活

當歸尾

大黃

皂角刺

秦艽

各伍錢

右為末煉蜜為丸或加猪膽汁每下肆拾丸若結

在直腸宜猪膽汁導之而不結燥者急補元氣禁此藥

○大便瀉利證

瘡瘍大便泄瀉或因寒涼尅伐脾氣虧損或因脾氣虛弱食不尅化或因脾虛下陷不能升舉或因命門火衰不能生土或因腎經虛弱不能禁止或因脾腎虛寒不能司職

主治之法若寒涼傷脾用六君子加木香砂仁送二神丸 脾虛下陷用補中送二神丸 命門火衰用八味丸料送四神丸 腎虛不禁用薑附湯加

吳茱萸五味子 脾腎虛寒用參附湯送四神丸
凡腸鳴泄瀉多屬脾氣虛寒法宜溫補治如前法
多有可生

加減托裏消毒散

治脾氣虛寒腸鳴泄瀉腹冷去金銀花連芷三味
加炮薑木香手足逆冷虛寒已甚加附子煎送四

神丸

和氣飲

治癰疽潰後氣虛滑泄四肢逆冷

蒼朮

肆兩米泔水浸壹日洗淨
曬乾再以米醋拌炒黃

陳米

半升

甘草

青皮

各壹兩

良薑

肉桂

乾薑

炮各伍錢

右為末每服壹錢用炒茴香末伍分相和溫酒送

下不拘時服

四神丸

治脾氣虛弱大便不實飲食不健小腹作痛
兼治產後泄瀉肚腹作痛

肉苳蔻

五味子

各貳兩

補骨脂

肆兩

吳茱萸

浸炒壹兩

右為末別以水貳碗生薑捌兩煮紅棗壹百枚熟
爛去皮核和藥為丸如桐子大每服伍陸拾丸食

前白湯下

二神丸

治同四神丸主五更泄瀉大便不實如不應
乃命門火衰急佐八味丸補火生土

破故紙

肆兩

肉苳蔻

貳兩

右為末用大紅棗肆拾枚生薑肆兩煮丸如上法

○小便淋瀝煩數證

瘡瘍小便淋漓頻數或莖中澹痛者腎經虧損之惡證也宜加減八味丸以補陰足脛逆冷者宜八味丸以補陽若小便頻而黃宜四物湯加參朮麥冬五味以滋腎若小便短少宜補中益氣加山藥麥冬五味以補脾肺若熱結膀胱而不利宜五淋散以清熱若脾氣燥而不能化宜黃芩清肺飲以滋陰若膀胱陰虛陽無以生宜二味丸若膀胱陽虛陰無以化宜滋腎丸腎虛之患多傳此證非滋化源不救若用黃柏知母反瀉其陽以速其危若老人陰痿思慾精內敗莖中澹痛不利者加減八味丸加車前牛膝不應更加附子 王太僕云無陰則陽無以化無陽則陰無以生當滋其化源苟專用淡滲復損其真陰乃速之危也

托裏消毒散加減法

莖中痛小便不利精內敗也去連白金銀三味加山茱萸山藥澤瀉佐以六味丸 愈便愈痛去三味煎送六味丸 食少體倦口乾飲熱小便黃短脾肺虛熱也去三味加五味子山茱萸佐以六味丸 勞役便黃元氣陷也去三味加升柴 午後

小便黃短腎虛熱也去三味加升柴煎送六味丸

滋腎丸

治腎經陰虛發熱作渴便赤足熱腿軟凡不渴而小便閉者熱在下焦血分最宜此藥經云無陰則陽無以化若脾肺焦熱又當滋其化源

知母

黃栢

各酒炒

肉桂

錢貳

右為末水丸每服百丸白滾湯送下

清心蓮子飲

治膀胱氣虛溼熱玉莖痛癢莖竅澁滯口苦便赤或致白濁夜安晝熱

黃芩

麥門冬

地骨皮

車前子

甘草

炙各壹錢伍分

石蓮子

白茯苓

黃耆

柴胡

人參

各壹錢

右每服加棗三枚

玉淋散

治膀胱有熱水道不通或小便如豆汁或如砂石或如凍膏或沸熱便血

當歸

甘草

各壹錢伍分

赤芍藥

山梔

各貳錢

赤茯苓

壹錢伍分

右每服加燈心煎

清肺飲

治渴而小便不利乃肺經有熱是絕寒水生化之源宜此藥清化源

茯苓

錢貳

豬苓

錢叁

澤瀉

琥珀

藿麥

各伍分

通草

陸分

木通

藕蓄

各柒分

車前子

壹錢

燈草

壹分

琥珀散

治諸般瘡癰表裡有熱小便赤澁

白茯苓

黃芩

茵陳

紫草

藿麥

茅根

石韋

烏藥

琥珀

連翹

車前子

各等分

右為末每服參錢燈心湯調下

○頭眩暈證

托裏消毒散加減法

初腫時頭痛發熱邪在表也加川芎羌活若外邪

在表而元氣實者暫用人參敗毒散 頭痛惡寒

表虛也去金銀連翹加參耆 倦怠眩暈中氣虛

也去三味加升柴或用補中湯加蔓荊子 日晡

頭痛血虛也去三味加熟地佐以六味丸 夢泄

遺精頭暈痛或痰喘氣促腎虛不能納氣也去三

味併川芎佐以六味丸不應大虛寒也用八味丸

○煩躁證

面目赤色煩熱作渴脉大而虛血脫發燥也托裏消

毒散去三味加歸耆佐以當歸補血湯

身熱惡衣欲投凉水脉沉微氣脫發躁也去三味加

肉桂附子或用附子理中湯

○自汗盜汗證

體痛不寐脾血虛也消毒散去三味加茯苓遠志棗

仁龍眼肉或用歸脾湯 寐而汗出腎氣虛也去

三味加參耆歸朮五味子或佐以六君子湯

○多痰證

胸膈多痰脾氣虛也托裏散去三味加桔梗半夏不
應用六君子湯加枳桔 喘熱多痰脾血虛也去
三味加歸地參朮或六君子湯加芎歸熟地 咳
嗽唾痰腎虧津液泛上也去三味加山茱萸山藥
熟地佐以六味丸

○喘急證

癰疽喘急恍惚嗜臥此心火刑肺金宜人參平肺散

桑皮

知母

各茶分

杏仁

地骨皮

紫蘇

橘紅

半夏

茯苓

青皮

人參

各壹錢

五味子

貳拾粒

甘草

伍分

右薑參片水煎

此乃理氣化痰清肺之劑肺脉

洪數無力者宜若兼發熱作渴脉洪數有力者宜

用如金解毒散此證為火尅金之惡候面赤者不

治

○胸痞證

有氣滯者托裏散去三味加桔梗山梔或用補中湯
加枳桔若倦怠胸痞氣虛也去三味加參朮茯苓
不應用八珍湯加柴胡

○目斜視上

癰疽目斜視上黑睛緊小白睛青赤乃肝挾火邪宜

用瀉青丸以祛肝經之火邪肝脉弦緊洪數宜之

當歸

川芎

山梔仁

羌活

防風

大黃

草龍膽

右各等分爲末蜜丸如雞豆大竹葉湯化下一二

丸日進三四服如瀉者去大黃加荆芥或用黃連

瀉心湯一二劑

○四肢沉重證

胃苓湯

厚朴

陳皮

甘草

白朮

茯苓

壹錢柒分

白芍藥

澤瀉

木香

官桂

伍分

淡竹葉

貳拾片

蒼朮

米泔水浸貳錢

右作一服水二鍾薑三片棗三枚水煎服按前

證乃七惡中之五惡服此脾氣醒溼氣除宜用參

苓白朮散補之

參苓白朮散

人參

茯苓

白朮

蓮肉

宿砂

米仁

山藥

各貳兩

桔梗

甘草

扁豆

各壹兩炒

右為末每服貳錢用石菖蒲煎湯下

○陽氣脫陷證

瘡瘍陽氣脫陷或因尅伐太過或因膿血大泄或因吐瀉之後或因誤入房若發熱頭痛小便淋瀝或滑數便血目赤煩喘自汗氣短頭暈倦怠惡寒汗出如水此為無根虛火之假熱症 若畏寒頭痛咳逆嘔吐耳聾目矇小便難瀉利腸鳴裏急腹痛玉莖縮冷汗牙疼此為陽氣脫陷之真寒證勿論其脉勿論其瘡急宜參附補之

○寒熱往來證

托裏消毒散加減法

口苦寒熱往來肝火血虛也去金銀白芷連翹加

柴胡熟地 因怒而寒熱肝火氣虛也加柴胡黃

芩不應用八珍湯加炒山梔龍膽草棗仁 體倦

寒熱肝脾氣虛也去三味加參朮歸耆或補中湯

內熱晡熱而寒熱陰血虛也去三味加芎歸丹

皮柴胡不應佐以八珍湯加丹皮 畏寒者胃氣

虛也去三味加參苓白朮升麻不應用補中湯

脇痛痞滿肝氣滯也去三味加青皮木香不應屬

氣血兩虛加芎歸參朮

疔瘡第二十六

瘡瘍爲害之速莫甚於疔瘡蓋其初起之時只如一
小瘡按之如釘在內一樣或麻或痒非若癰疽之
有形共識腫痛難禁故患者忽之兼以不避幃幙
不戒厚味由是而毒入於內而致不救多生頭面
四肢發黃疱中或紫黑必先癢後痛先寒後熱四
肢沉重心悸眼花是其候也宜遍身尋看如有小
瘡與常患瘡稍異卽是

生於唇面口內者紅絲入於喉生於手者紅絲入於
心生於足者紅絲入於臍頃刻之變死不旋踵千
金方載疔瘡有十三種然皆不外乎臟腑所蘊之
熱毒也獨浮漚牛狗二疔不能殺人內經曰膏粱
之變足生大疔或其中飲食之毒或感不正之
氣或中蛇蠱之毒或觸死畜之穢或素食炙博之
物其毒發於頭面四肢胷背骨節者最急餘處可
治

元化云疔有五色屬五臟初如黍米黑豆等狀用
隔蒜灸大有回生之功失而不治至牙關緊急不
省人事急以燈照遍身必有隱隱小瘡卽係其毒
急服奪命丹亦須仍用灸法庶幾可以挽回若至

於鍼而不痛及目見火光與夫煩悶恍惚如醉則不可治矣瘡各有形醫各有方酌量用之

麻子疔其狀肉起頭如黍米色稍黑四邊微赤多癢忌食麻子油衣麻布走麻地

石疔其狀皮肉相連色如黑豆甚硬刺之不入微痛忌瓦礫磚石

雄疔其狀炮頭黑靨四畔漿泡起大如錢孔形高流黃水忌房慾

雌疔其狀色稍黃白裏靨亦似灸瘡心凹色赤如錢孔四面漿泡起忌房慾

火疔其狀如湯火所傷身熱如灼瘡頭黑靨四面有煙焰又如赤粟米忌火燒烙

爛疔其狀色稍黑有白斑形如匙面瘡中潰有膿水流出忌熱食及爛物

亂疔又名三十六疔其狀頭黑浮起形如黑豆四畔起赤色每日漸增若數滿三十六則不能醫矣忌嗔怒畜積怨恨

蛇睚疔其狀頭黑皮浮形如小豆狀似蛇睚而硬忌惡睚及嫉妒人見又忌毒藥

鹽膚疔其狀大如匙面四面皆赤有黑粟粒起大忌

食鹽物

水洗疔其狀大如錢中如錢孔而硬頭白裏黑靨汁出忌飲漿水及水洗渡河

刀鑱疔其狀濶狹如薤葉長一寸左側肉黑如燒烙

忌刺及刀鑱切割或鐵刀所傷惟宜藥治不可

亂攻

浮漚疔其狀圓曲而長如薤葉大內黃外黑黑處刺

之不痛黃處刺之痛

此似刀鑱疔但內黃外黑可辨

牛疔其狀肉泡起搯不破

以上十三種之外又有

猪疔形圓而小瘡口內有油

狗疔色赤而長或帶尖與牛疔同

羊疔形長而色白

驢馬疔其狀三角頂上有黑點根腳赤色或突起

水疔其狀似水泡因飲宿水中毒忌同水洗疔

瓜藤疔延蔓無數忌走瓜田

腐疔其狀水白色有泡三日內頂陷如初灸火瘡因造豆腐人滴汗於腐中食之而生忌食豆腐并豆及豆田內行走

氣疔因怒而起其形似氣泡

鬼疔中邪毒之氣而生其形異常一日泡色微白二

日泡色大白三日微紫四日大紫尚屬緩候五日微青其毒已深六日深青七日日色黑勢急之候也

疔瘡
補論

凡疔瘍身熱頭疼手足溫和飲食如常疔之四圍腫赤名曰護場易治也若睥白睛癡渴飲冷水內熱盛唇青舌槁臥不能起頭暈睥花謔語惡心腹痛冷汗及滑泄無度四圍無護場者不治

凡疔必有紅絲路急於紅絲所至之處鍼出血及刺疔四圍出血若鍼之不痛或無血以鍼燒紅烙患處以痛為度若下部所患用蒜灸之痛則灸至不

痛不痛則灸至痛再不痛宜明灸之及鍼疔四畔去惡血後用敷藥令藥從鍼入 若起紫疱切勿可鍼破服藥趕出疱自破出血水乃佳 若起紫疱腫痛以萬病解毒丸內服外塗

治法表實者宜 公用荆防敗毒散追疔奪命湯蓋初發之時必 於身疼此毒氣在表故發表令從毛腠中出

裏實者宜攻裏用 命追黃湯連翹攻裏散蓋表證皆散毒氣入裏 洩便秘毒在內也故攻之令從臟腑中出

表裏俱實者宜解表和中用化毒消腫和裏等藥其證發熱身疼口渴便秘表裏俱見故攻發竝用

腫勢盛脉浮數者宜散之蟾酥丸返魂丹 毒勢盛脉沉實者宜下之奪命丹萬病解毒丸 無表裏

證服過消毒藥後用復元通氣散加麝少許

虛弱人只用薛氏人參敗毒散及隔蒜灸法為妙

若患疔在兩脇間毒氣欲攻心乃危急之證急於瘡

尖上炷艾灸三五壯仍於灸穴左右鍼出少血灸

處四圍炮起者吉

若手足厥冷六脉俱絕此毒氣已深氣血為毒瘀併

不能流通故體冷而脉不見宜木香流氣飲連進

數服俟血氣通行自回復也然後依法治之

保生錠子 治疔瘡背疽癰廕一切惡瘡合下神聖膏千金托裏散破棺丹乃羅謙甫治疔神方

金腳信 各貳錢 輕粉 各貳錢 雄黃 各叁錢 礪砂 各叁錢

麝香 壹錢五分 蟾酥 壹錢 巴豆 肆拾玖粒生用

右為細末用黃蠟伍錢溶開將藥和成捻作錢眼

大餅子水浸半時收貯磁瓶內用時將瘡頭撥開

填入一餅次用神聖膏後用托裏散若瘡氣入腹

至危者服破棺丹

神聖膏 治一應惡瘡

當歸 膏本各伍錢 巴豆拾伍粒 去油 白芨貳錢 伍分

木鱉子伍拾個 去皮 槐柳枝各壹百 貳拾寸

右先以槐柳枝入麻油熬煎後下當歸等味熬黑

濾渣澄清稱油每兩下黃丹伍錢如法看火候停

妥下黃蠟貳兩粉霜壹錢不住手攪稍溫下白膠

香細末貳兩又下沒藥乳香末各貳錢琥珀末貳

錢伍分膽礬末壹錢緋帛攤貼大有神効

托裏散 治一切發背 疔瘡

黃耆壹兩 伍錢 厚朴 川芎 防風

桔梗各貳兩 白芷壹兩 連翹貳兩 貳錢 芍藥

官桂 甘草節 人參各壹兩 木香

乳香 沒藥 當歸各伍錢

右為細末每服伍錢酒煎三四沸和渣溫服

破棺丹 治瘡癰并一切風熱

大黃生壹兩 熟壹兩 甘草 芒硝各壹兩

右為細末煉蜜丸彈子大每服半丸食後溫酒化

下或童便半盞研化服忌冷水

四聖旋疔散 凡疔瘡生於四肢其勢微者先以好醋調藥塗上以紙護之次服內托之劑其

疔自出

巴豆仁伍分 白殭蠶 輕粉 硃砂各貳錢 伍分

右爲末醋調用之

天疔散 治一切疔瘡及諸惡瘡初起以此藥塗之急服托裏內消

山丹花蕊

白芷

各貳錢

牛旁根

天丁

乃皂角刺

蒼耳芽

鼠粘子

各伍錢

雄黃

壹兩

右端午日修合俱爲細末用好醋塗而以紙封之若瘡上有黑甲必須核桃油浸而後塗之乃可

取疔散

雄黃

礪砂

輕粉

蟾酥

信

各壹錢

巴豆

拾粒

右於疔四畔用鍼刺破醋調以此藥塗之疔落後

用拔毒長肉膏

蟾酥錠子

疔瘡毒氣攻心則死在旦夕當以患處揣捫向心行處鍼刺但覺痛而有血處卽下

錠子若至心側近處不痛無血急刺百會穴若痛而有血就下錠子如亦無血以親人血代之猶活四五此瘡惟胸背頭項最急治之不可緩也

天南星

欵冬花

巴豆仁

黃丹

淘洗淨

白信

各壹錢

獨活

伍分

斑猫

去頭足拾個

右爲極細末用新蟾酥和藥撚作鍼樣遇有疔瘡先刺患處必不知痛有血出者卽下錠子但覺痛處不須再用若更不知痛隨瘡所行處迎奪刺之至有血知痛卽止其元瘡亦覺疼痛以膏藥貼之

膿出自愈下藥法以銀作筒長三寸許其中但可
僅容藥條仍打銀鍼一隻候刺成孔以筒對之而
以銀鍼從後送出藥條入於孔內至痛而止

立馬回疔丹 治疔瘡走
亂不止

金腳信

蟾酥

血竭

硃砂

沒藥 各伍
分

輕粉

片腦

麝香 各二分
伍厘

右為極細末草烏頭汁和勻搥作細條刺瘡頭細
入次日腫痛為効

提疔錠子又名透肉錠子 治疔瘡危篤發
昏兼治癰癤

雄黃

硃砂 各貳
錢

青鹽

砒霜 生

白丁香

輕粉 各壹錢
伍分

蟾酥

麝香 各壹
錢

斑猫 去翅足
錢伍分

草麻子 貳拾
壹粒

黃蠟

右為細末於磁器內先將蠟溶開和前藥丸如梧
子大捻作餅子以鍼刺破疔瘡放一餅子於瘡頭
上立驗內服首功玄黑散或蟾酥丸

飛龍奪命丹 專治疔瘡癰毒背發腦發乳癰及一應
無頭腫毒惡瘡及有頭不知痛痒者已

成未成服之神効瘡在上食後服瘡在下食
前服服藥後忌冷小瓜茄油膩猪雞魚麵等

蟾酥 叁錢老
酒化

乳香 貳
錢

沒藥 貳
錢

雄黃 叁
錢

膽礬 壹
錢

麝香 伍分
另研

銅綠 貳
錢

輕粉 伍
分

冰片 伍分
另研

寒水石

辰砂 壹
錢

血竭 壹
錢

蜈蚣壹條 酒炙黃 去頭足

右俱為末用蝸牛貳拾個和藥搗爛少入飛羅麵為丸每服壹丸勢重人壯二三丸以葱白叁個同藥嚼爛好酒送下避風處重衣蓋定約行五里再用酒熱服數椀以助藥力發熱大汗為妙

追毒丹 主取黃去疥頭追膿立効又名萬應鍼頭丸

蟾酥 壹錢乾 酒化 蜈蚣 酒炙黃 壹對 白丁香 壹錢 硃砂 壹錢

巴豆 柒粒去殼 不去油 雄黃 貳錢 輕粉 壹錢 硃砂 貳錢 為衣

右為細末以水或酒糊為丸如黍米大兩頭令尖用針挑破瘡頭入藥壹粒用水沉膏貼之再用膏

藥及生肌藥追出毒膿惡血用此藥後其瘡即時

紅腫為度

水沉膏

白芨末放水盞內令沉下收起用紙攤貼凡用點藥宜以此膏圍貼則不傷好肉

追疔奪命湯 專治 疔瘡

蟬退 肆分 青皮 柒分 澤蘭葉 伍分 防風 捌分

黃連 壹錢 細辛 捌分 何首烏 壹錢 羌活 壹錢

僵蠶 壹錢 藕節 壹錢 紫河車 卽金線重樓柒分

如大便秘結加大黃壹錢 右加蔥薑水煎臨臥

入酒壹椀衣覆取汗

雄麝湯 解疔毒如神

地丁根 即大薊有開黃花有開紫花故又各黃花地丁紫花地丁各用貳錢

白芷 牡蠣 牛旁子 金銀花

疆蠶 山梔 荊芥穗 甘草 炙

青丁香 茜草根 即過山龍各壹錢 核桃仁 叁錢

右用酒浸片時搗細又加水壹碗煎至壹碗去渣

人雄黃 麝香 乳香 俱另研各壹錢 真菜豆粉 貳錢

如大便秘其人壯實者加大黃 芒硝各壹錢

二活散 治同追疔奪命丹

羌活 獨活 當歸 烏藥

連翹 赤芍藥 金銀花 酒洗 天花粉

甘草節 白芷 各伍錢 紅花 蘇木

荆芥 蟬退 乾葛 各叁錢 檀香 貳錢

右為細末每服叁錢煎蒼耳湯調下

追疔丹 治疔瘡神効即追疔奪命湯能內消神効

獨腳蓮 防風 倍 細辛 甘草節

白疆蠶 青皮 倍 黃連 羌活

獨活 蟬退 赤芍藥

右先將澤蘭葉金銀花金線重樓各壹錢生薑壹

兩同搗爛熱酒和服後將此藥酒水各半加薑拾片煎服衣覆取汗有膿加何首烏白芷要利加青木香大黃在腳加木瓜病減後加大黃貳錢以去餘毒

保生錠子

治發背疔瘡

真蟾酥

參錢

青桑皮

貳兩

右二味同搗如泥入雄黃貳錢共搗一處分作錠子每錠重捌分如發背用冷葱湯磨服壹錠仍以冷葱湯嗽口嚥下再磨貳分用鷄翎掃患處蓋煖取汗即愈若疔瘡於瘡頂上刺一孔入錠壹分在

內二日潰出亦用冷葱湯磨服出汗

賽奪命丹

治癰疽發背疔瘡乳癰便毒及一切無名腫毒賽飛龍奪命丹故名

蟾酥

辰砂

雄黃

膽礬

血竭

乳香

沒藥

各參錢

蜈蚣

麝香

各伍分

細辛

全蝎

蟬退

穿山甲

殭蠶

牙皂

各陸錢

片腦

伍分

白礬

伍分同信少許同枯去信不用

右為末端午日酒糊丸棗豆大每參丸葱酒壹小鍾吞下衣覆取汗或吐或不汗再進壹丸服後喫

白粥忌黃瓜水茄

蜂蛇散 治疔瘡危篤者二服即愈輕者一服即愈

土蜂房 壹小窠 蛇蛻 壹條

右共入瓦罐中鹽泥封固火煨存性為細末每服壹錢空心好酒調服少頃腹中大痛痛止其瘡已化黃水矣仍服五聖散

五聖散 治一切疔瘡癰疽初起覺憎寒頭痛即服此

大黃 金銀花 甘草 各壹兩 瓜蒞 壹個

皂刺 貳兩 生薑 壹兩

右作壹劑酒煎服

內托連翹散 治疔瘡初發色不變不痛身發寒熱者是於發黃處即是瘡頭用針刺出惡血

服此藥內托

生地黄 赤芍藥 連翹 白芷 各壹兩

大黃 黃梔子 炒 薄荷 各柒錢

黃芩 伍錢 甘草 壹兩伍錢 朴硝 貳兩

右每服壹兩加竹葉燈心煎大病只三四服愈如喘加人參少許

萬病解毒丹 治疔瘡發背及一切蟲獸螫毒砒蠱瘡

麝香 貳錢 硃砂 伍錢 山豆根 雄黃

續隨子仁 紫河車 獨腳蓮 各壹兩 山茨菰 貳兩

五倍子 叁兩 紅牙大戟 壹兩伍錢

右為末秫米糊和勻杵萬下印成錠子隨意用井水或薄荷湯磨下日可二三服

回瘡錠子 治疔大効

草烏頭 壹兩 蟾酥 柒粒 巴豆 柒粒 去皮 麝香 壹字

右為末麵糊和勻為錠子如遇惡瘡透疔不痛無血者用鍼深刺至痛有血以此藥絛之上用膏藥貼定疔瘡則於四畔絛之二三日自然拔出此藥最宜急用

走黃丹 治疔瘡走黃打滾死在須臾

牡蠣 大黃 山梔 金銀花

木通 連翹 牛蒡子 地骨皮

乳香 沒藥 皂角刺 括萎

右各等分每服伍錢氣壯者加朴硝用水酒各半煎壹服而定

拔毒膏 專治諸般惡毒疔瘡發背無名腫毒外痔初起貼之即散已成貼之即消扶疔收斂之功

銀硃 雄黃 硃砂 釘銹 各壹錢

輕粉 乳香 沒藥 各壹錢 血竭

膽礬 各柒分 麝香 壹分 共細末 荔枝肉 去勛 貳錢 蝸牛 叁個

白梅肉 叁錢 伍分 雞糖糞 貳錢 嫩松香 壹兩 為細末

右藥不見火陳醋攪成膏磁器收貯勿令泄氣用紅綾絹貼之

夢授異功丹

治疔瘡腫毒神効

蜈蚣 酒炙壹錢

麝香 叁分伍厘

雷丸 白色者甘草湯煮去外皮貳錢

木香 叁錢

川烏 去皮尖酒拌

天麻 皂角刺 用黑色者

鹿角 燒灰存性各伍錢

右各為末用金銀花藤汁九龍草即威靈仙苗蒲公英英菴草四味各取自然汁壹碗磁器煎煉待沸起白沫旋取入前藥末內攪勻晒乾勻和每服酒下叁分病重連進叁服諸毒奇功甚大

治疔立愈方

玉簪花根

栗根 如乾將水浸用

右將二味搗爛絞汁貳酒鍾用甘草貳錢菜豆壹撮此二味用水捌分煎貳酒鍾合前汁服之乃始壹服也第貳服仍用玉粟貳汁又將甘草菜豆加麻黃壹兩去節水貳鍾煎捌分同前汁熱服之用綿被發汗如再不愈去麻黃加大黃壹兩如前煎服即愈

附單方十一條

一方蒿苳擣汁敷疔極効預收青苗以備冬月為末

水調敷

一丹溪方治疔用磁石爲末苦酒和敷封之根出立愈

一丹溪方用麻內蛀蟲壹條研敷瘡上外用膏藥貼一飯頃其疔自出

一丹溪方載日本三藏傳江子肉拾粒半夏壹大顆附子半枚蜣螂壹枚入麝少許相和量瘡口大小以紙繩圍之將藥泥上又用絹帛貼敷時換新藥以愈爲止活人甚多

一方黑牯牛糞上生菌預收焙乾收藏臨時與菘菹葉各等分爲末用兩頭無節竹管一頭刻十字形一頭照患處形斷削而以壯線在痕內挂住對瘡口下竹管須陷在肉內拴縛不動卻以葉一匙滴水和勻入管內着肉少時藥滾起則疔自拔出未効再行疔必拔也

一方核桃殼取半邊剔去殼內縱橫薄殼入以鷄溲糞合在患處毒自消

一方大蜒蚰和辰砂搗敷患處消毒

一方蒼耳與白梅研爛貼疔上拔去根

一方用蟬退殭蠶爲末醋調塗四圍畱瘡口俟根出

稍長然後拔去再用藥塗

一方疔瘡垂死用紫梗菊花葉皆可搗汁一升入口
卽活神驗

一方治疔瘡生搗蒼耳根葉和童便絞汁冷服壹碗
壹日叁服甚驗

紅絲瘡第二十七

凡手足間有黃泡其中忽紫黑色卽有紅絲一條自
上而生若至心腹則使人昏亂不救亦有生紅絲
二三條者其態全類疔瘡但疔瘡按之如有一小
疔在內此則無也乃因過喜大怒氣血逆行所致
急用銀鍼於紅線所到之處刺之令其出血嚼浮
萍草根敷之立愈乃貼膏藥

癩疽第二十八

癩疽一名蛇瘡煙瘡地面多有之先作點而後露肉
四畔若牛唇黑硬小者如粟如豆大者如李如梅
發無定處或在臂或在臀或在口齒或生肚臍多
見於手足指間赤黑青白色變不常根深入肌毒
血流注貫串筋脉出血極多爛肉見骨串痛至極
令人狂言但毒氣走注所至之處卽宜緊繫之若
自手發而走至於心自足發而走至於腎均屬難

治各有小紅筋當尋其筋所至之處灸三壯即愈
 若毒氣入心入腹令人煩躁嘔噎昏悶或瘡出清水
 穢汁者腎虛極也死人甚速痛而入於心者即死
 突出於外腎者亦死其因起於感受惡風入於脉
 理或煙瘴地面傷寒瘡後及感觸蛇毒所致二十
 以後四十以前者皆積傷之毒入胃壅聚而成四
 十以後六十以前乃血閉不行壅熱積血得之治
 宜宣毒行血用瓜蒌根酒煎入乳香沒藥五靈脂
 皂刺等分以下其毒次用清心行血之劑如係蛇
 毒赤足蜈蚣最妙雄黃白芷次之或蠟礬丸冷酒
 入麝香送下外用荆芥白芷川椒葱白煎湯入鹽
 俟湯溫自手背上盪下一日三次此瘡識者頗罕
 其紅絲流行有類疔瘡血風瘡但瘡形各自有別
 故附之於後以便知識云

久漏瘡第二十九

漏瘡須先服補藥以生氣血即以參耆歸朮芎為主
 大劑服之而以附子末唾和作餅如錢艾炷灸之
 令微熱勿令痛乾則易之或再和作餅或用附片
 亦可仍用前氣血藥作膏藥貼之

神應膏

久漏瘡諸方不効者此膏治之亦治腸毒胃
 毒為丸服之神効

當歸 壹兩 壹錢

赤芍藥

大黃 各壹兩 伍錢

香白芷

官桂 各壹兩

玄參 壹兩 叁錢

川續斷 壹兩 貳錢

莪朮 壹兩

生地黃 壹兩 貳錢

右九味剉片用真香油貳觔春浸五日夏三秋七

冬十日入鍋文武火煎令黑濾去渣如夏月用黃

丹貳拾兩冷天拾伍兩旋旋下丹不住攪以水試

沉為度如漏有孔者以膏送入孔內外仍作貼子

護之

豬骨膏 治諸瘡口氣冷不收以此煖之即瘥

豬筒髓 貳個

松脂 貳錢

乳香

黃連

白芨 各貳錢 伍分

黃蠟 各伍錢

右搗研熔蠟和為膏不拘時敷之

附子散 治冷瘡日夜發歇疼痛

附子 伍錢 炮 去皮臍

雄黃 各貳錢 伍分

白礬 火煨 柒錢 伍分

膩粉 貳錢 研

右為細末研勻用麻油調敷

凡癰疽瘡癤潰膿之後外觸風寒焮腫僵硬膿水清

稀出而不絕臭汁潰敗不生好肉用木香檳榔黃

連等分為末敷之方見潰瘍斂瘡口藥

桂附丸 治氣漏諸瘡

桂心

附子

朱醋浸炮三日五日去皮臍

厚朴

薑製

粉草

白朮

各壹兩

木香

貳錢伍分

乳香

研貳錢

右為末煉蜜丸如桐子大米飲湯下二三十丸
丹溪云治冷漏用桂附丸只因瘡久不合風冷乘
之血氣不潮而致厚朴雖溫其瀉衛氣尤速不若
參耆佐以陳皮為妙若虛寒人只以加味十全湯
隨時令加減為宜

心癰第三十

癰發胸乳之間者名井疽初起如豆大急宜調治若
在鳩尾者最要緊係心熱盛極者宜疎導心火遲

則不救小便澀者清心散或涼膈散去硝黃加白
芷天花粉瞿麥木通大便秘者內固清心散或涼
膈散去硝加白芷天花粉生地若不早治入於腹
則十日死發於膺名甘疽其色青狀如穀實瓜萋
常苦寒熱不急治十日死死後出膿

清心散

治癰有熱證如小便秘加燈心木通

赤茯苓

赤芍藥

生地黃

遠志

麥門冬

知母

甘草

各伍分

右每服用薑棗水煎

涼膈散

連翹

山梔

大黃

薄荷葉

黃芩

各柒分

甘草

壹錢捌分

朴硝

肆分

右加竹葉拾片水煎

內固清心散

治惡瘡熱甚熾痛作渴煩躁以此解毒神効

辰砂

茯苓

人參

白苳蔻

雄黃

菜豆

朴硝

甘草

腦麝

皂角

各等分

右為末每服壹錢蜜湯調下

肺癰第三十一

肺居至高之分而外主乎皮毛若人不慎起居不節

飲食以致外傷風寒內傷灸燔陰火薰蒸肺癰之

疾所以作也亦有因肺痿而火燥甚肺脹為膿血

成癰者其候惡風咳嗽鼻塞項強胸脇脹滿咽燥

作渴呼吸不利甚則四肢微腫咳唾膿血其氣腥

臭入水則沉胸中隱隱微痛右寸脉滑數而實者

肺癰也若所唾止是涎沫而無膿血其脉雖數而

虛則為肺痿

或脉數而實寒熱往來自汗咳唾口中涎多知母茯苓湯主之若烙血將變為癰紫苑散火盛者人參

平肺散為丸含化虛損者劫勞散虛冷不渴者炙

紫雲石間

甘草一味加乾薑煎服喘急有寒邪者小青龍湯
喘急面浮鼻塞胸脹者葶棗散此肺之有寒有熱
而以清金降火豁痰之法也

其治肺癰之法若咳嗽喘急者亦宜以小青龍湯先
解裏之風寒邪氣咳嗽胸脹者用葶蘆大棗瀉肺
湯唾膿腥濁者用桔梗湯佐以參耆補肺湯體倦
食少者佐以參朮補脾湯至於咳嗽痰湧屬腎虛
水泛口乾咽燥屬虛火上炎皆當隨證用藥吐痰
者消膿飲咽痛者甘桔湯便結者太乙膏爲丸白
湯下血多者梅豆湯冷熱不調者雲母膏爲丸甘

桔湯下痰多食少者托裏清中湯咳喘短氣溺少
者參耆補肺湯脾虛少食者參朮補脾湯七情飢
飽勞力傷脾肺者團參飲子咳唾痰壅者腎虛也
腎氣丸口乾燥者虛火也八味丸去附子加五味
子甚至有胸脇間作潰口中膿血與竅相應而出
惟宜大補氣血其收斂瘡口止有合歡樹皮白斂
煎湯飲之爲効

大抵此證因勞傷血氣腠理虛而風邪乘之內盛於
肺久久不瘥所致食啖辛熱炙博過度酣飲濃酒
而成初發可救膿成多至不治診其脉緊數者爲

膿未成也緊甚而數者膿已成也若所唾膿血如米粥者難治唾膿不止者亦難治唾膿自止者愈脉短而澁者亦愈面色反赤者為火尅金之象亦難治宜補脾肺夫癰之在外者有目所共見茲病在腔子中苟非素有定識不至誤人者鮮矣此瘍家之最難者也

治肺癰

用綠橘葉搗爛絞汁服之吐出膿血愈 又方用柘黃一味以井水磨服以愈為度柘黃者柘樹上所生篔簹厚大而色黃 又方陳年芥菜汁煎一滾取上清者頻頻呷

之愈

知母茯苓湯

白茯苓

甘草

各壹錢

知母

五味子

人參

薄荷

半夏

柴胡

白朮

款冬花

桔梗

麥門冬

黃芩

各伍分

阿膠珠

川芎

各叁分

右薑十片水煎服

紫苑散

治虛勞咳嗽見膿血肺痿變癰

紫苑

知母

貝母

各壹錢伍分

人參

桔梗

茯苓

阿膠

甘草

五味子 拾粒

右加薑煎服

人參平肺散 治心火尅肺為疽為痿咳嗽喘嘔痰涎壅盛胸膈痞滿咽嗑不利

人參

陳皮

甘草

地骨皮

白茯苓 各壹錢

知母 炒柒分

五味子 杵炒肆分

青皮

天門冬 去心各肆分

桑白皮 炒壹錢

右水煎服

劫勞散

白芍藥 壹錢

黃耆

甘草

人參

白茯苓

當歸

熟地黃

五味子

半夏麩

阿膠 各肆分

小青龍湯

白芍藥

桂枝

麻黃

乾薑 各貳錢

細辛 壹錢

半夏 壹錢伍分

五味子

甘草

右先煎麻黃去沫方入各藥同煎服

葶棗散

葶蘆炒黃為末以黑棗拾枚煎濃湯去棗調末

錢食後服

葶蘆大棗瀉肺湯

治肺證胸膈脹滿上氣喘急或身面浮腫鼻塞身重

甜葶蘆

炒黃色叁錢為末

右用大棗拾枚水貳鍾煎至壹鍾去棗入葶藶末再煎柒分食後服

桔梗湯 治肺癰心胞氣壅咳嗽膿血心神煩悶咽乾多渴兩腳腫小便赤黃大便多澁

桔梗 錢各壹 貝母 錢各壹 瓜蒌子 錢各壹 當歸 分各捌

枳殼 分炒伍 薏苡仁 分捌 桑白皮 分各伍 防風 分各伍

甘草節 分叁 黃耆 分伍 杏仁 分去皮尖炒另研 百合 分各叁

右加生薑水煎服大便秘加大黃小便澁加木通

參耆補肺湯 治肺癰腎水不足虛火上炎咳嗽唾膿血發熱作渴小便不調

人參 黃耆 白朮 茯苓

陳皮 當歸 山藥 山茱萸

五味子 麥門冬 甘草 分各伍 牡丹皮 錢壹

熟地黃 伍錢壹分

右薑水煎

參朮補脾湯 治肺癰脾氣虛弱咳嗽唾膿涎中滿不食凡肺癰見膿血久不愈必兼服此藥以補脾生肺否則不治

人參 白朮 錢各貳 黃耆 錢貳伍分 茯苓

陳皮 當歸 錢各壹 麥門冬 分柒 升麻 分叁

桔梗 分陸 五味子 分肆 甘草 分伍

右薑三片水煎服

消膿飲 治肺癰膿脹氣上衝而嘔咳嗽

南星 壹兩

知母

貝母

白芷

生地黄

阿膠 炒

川芎

桑白皮

白芨 各伍錢

甘草 炙

防風

射干

桔梗

紫蘇葉

薄荷

天門冬 去心

杏仁 不去皮

半夏 薑製各柒錢伍分

右為吹咀每服壹兩水貳鍾生薑柒片烏梅壹個煎至捌分食後溫服

甘桔湯

甘草 壹錢

桔梗 貳錢

右水煎服

太乙膏

治一切癰疽瘡痛不問年月深淺已未成膿者並宜用之

玄參

白芷

當歸

肉桂

大黃

赤芍藥

生地黄 各壹兩

右用油貳觔捌兩浸藥夏三冬十春秋七日方入銅鍋內文武火煎至藥枯黑濾去渣油淨數如法下丹成膏如發背先以溫水洗拭攤緋絹貼之仍為丸用冷水送下血氣不通者溫酒下赤白帶者當歸煎酒下咳嗽及喉閉喉纏風綿裹含化一切風赤眼貼兩太陽穴亦為丸以山梔煎湯下打撲傷損外貼內服陳皮煎湯下膝痛外貼內服鹽

湯下唾血桑白皮煎湯下婦人經閉腹塊作痛貼
 之疥瘡別煉油少許和膏塗之虎犬蛇蝎湯火金
 瘡傷竝外貼內服諸瘰漏瘡癰及楊梅瘡潰爛先
 用鹽湯洗淨貼之竝用酒下參伍拾九凡為丸如
 梧子大以蛤粉為衣其膏可收十年不壞愈久愈
 効

梅豆湯

治腸癰冷熱證及肺癰咳唾膿血不止

烏梅壹個

黑豆壹粒

薏苡仁貳合

右水煎入阿膠生蒲黃各壹錢再煎服

雲母膏

川椒

白芷

肉桂

赤芍藥

當歸

菖蒲

黃耆

白芨

川芎

木香

白斂

龍膽草

防風

厚朴

桔梗

柴胡

人參

蒼朮

黃芩

附子

茯苓

良薑

百合皮

松脂各伍錢

甘草

栢葉

槐枝

桑白皮

柳枝

陳皮各貳兩

右用清油貳拾兩浸封七日文武火煎以柳木不
 住手攪十餘沸乃下火沸定又上火如此者二次

以藥枯黑濾去渣如法稱油下丹膏成稍温入

沒藥 鹽花 血竭 乳香 各末 伍錢 雲母石 硝石

各末 肆兩 膏冷入麝香伍錢內硝石以玄明粉代之加

至半觔尤妙

右膏作餅收貯仍為丸如梧子大如發背敗蒲煎湯洗拭貼之內服壹兩分三次温酒下未成者即愈乳癰瘰癧等疽毒穿至骨外貼內服壹兩分兩次酒下甚者即瀉惡物腸癰內服五兩分五次甘草煎湯下未成膿者消已成膿者隨藥下膿下後每日仍酒下五丸膿止住服發願發鬢發眉發耳

臍癰牙癰牙疼癰瘡及一切瘡癰腫毒竝外貼即

將毒消痛止而愈甚者內服風眼貼兩太陽穴小

腸氣茴香煎酒下一兩日三服即愈難產温酒下

壹兩血暈欲歿薑汁和童便温酒下拾丸即醒死

胎榆白皮煎湯下伍錢即生壁虎蜘蛛咬外貼雷

瘡口虎豹咬甘草煎湯洗拭貼之每日一換蛇犬

咬外貼內服拾丸生油下箭頭入肉外貼每日吃

熟菜豆少許箭頭自出中毒藥酒下壹兩每日壹

服四日瀉出惡物立瘥但有所苦藥到即愈忌羊

血餘無所忌如收此藥防身以蠟紙裹不令風乾

所收三十年不損藥力

化裏清中湯

治癰疽脾胃虛弱痰氣不清飲食少思等證

人參

白朮

茯苓

陳皮

半夏

桔梗

甘草

右薑棗水煎服

團參飲子

人參

紫苑

阿膠

百合煎

細辛

款冬花

半夏

天門冬

杏仁

去皮尖炒

經霜桑葉

五味子

各伍分

甘草

壹錢伍分

右薑水煎服

腎氣丸

方見掌疽條

八味丸

方見脫疽條

黃昏湯

治胞中甲錯隱痛知為肺癰

合歡木皮

一手掌大

右以水參碗煮取壹碗分貳次服

青龍湯

治肺受風寒咳嗽喘急

細辛

麻黃

肉桂

甘草

乾薑

炮

白芍藥

各柒分

五味子

炒伍分

半夏

陸分

右以水先煎麻黃三四沸去沫方入各藥及生薑

三片煎服

瓜蒌子湯 治同前證

當歸 水大煎 桔梗 三四枚 貝母 六分 白芷 五分

甘草 各壹錢 瓜蒌子 各壹錢

右水煎服一方無貝母白芷有葶藶

葶藶湯 治肺癰咳有微熱煩躁骨心甲錯

葶藶 貳觔 薏苡仁 半觔 桃仁 伍拾個 冬瓜仁 半觔

右以水壹斗先煮葶藶至伍升去渣入三味煮取

貳升分叁次服以吐痰如粥為愈

獨神散 治肺癰未成即消已成即潰大有神効故名

章漆樹皮 一名接骨木 一名繼骨肉 一名野黃楊

右細研羅過以好酒調服素日飲水者以生薑少

許研細和勻服

人參補肺湯 治肺證咳喘短氣或腎水不足虛火上炎痰涎湧盛或吐膿血發熱作渴小便

短澁

人參 黃耆 白朮 白茯苓

陳皮 當歸 各壹錢 五味子 伍分 山茱萸肉

乾山藥 各貳錢 熟地黃 壹錢伍分 麥門冬 柒分 炙甘草 伍分

牡丹皮 捌分

右薑棗水煎服

參耆補脾湯 治肺疽脾氣虧損久嗽吐痰涎或中滿不食服此藥補脾土生肺金否則不治

人參

白朮

各貳錢

黃耆

貳錢五分

白茯苓

陳皮

當歸

各壹錢

升麻

叁分

麥門冬

柒分

五味子

肆分

桔梗

陸分

炙甘草

伍分

右薑棗水煎

如聖丸

治風熱毒氣上攻咽喉痛痺癰塞妨悶及肺癰喘嗽吐膿血胸滿振寒咽乾不渴時出濁沫狀如米泔其氣腥臭者

其氣腥臭者

獐腦

牛黃

各另研

桔梗

甘草

各壹錢

右為末煉蜜丸每兩作貳拾丸每用壹丸噙化

濟生排膿湯

治肺癰吐痰後以此排膿補肺

生綿耆貳兩為細末每用貳錢水煎服

單方二條

凡肺癰已破入風者不治或用太乙膏丸以搜風湯救之

凡吐膿血如肺癰狀而致口臭他方不應宜消風散入無病男子髮灰清米飲調下二服而愈

胃腕癰第三十二

聖濟總錄云胃腕癰由寒氣隔陽熱聚胃口寒熱不調血肉腐壞氣逆於胃故胃脉沉細陽氣不得上升人迎熱甚令人寒熱如瘡身被甲錯或咳嗽或嘔膿吐血若脉洪數膿已成也急用排膿之劑脉

遲緊屬瘀血也急當議下否則毒氣內攻腸胃併腐其害不小但此證又不比肺癰之可認苟不嘔膿血未免他誤矣瘍家可不知方脉之理乎

考夫朱丹溪常用射干湯為主治薛立齋則兼用薏苡仁湯牡丹散太乙膏又專以壯胃氣為先是誠知本之論也若胃火盛者宜清胃散痰壅者甘桔湯大便不利者太乙膏為丸服小便不和者一湯內痛者失笑散虛而痛者牡丹皮散膿出者補中益氣湯升提胃氣又不可專泥於治

射干湯

治胃腕癰吐膿血

射干

毛去

山梔仁

赤茯苓

升麻

各壹錢

赤芍藥

壹錢伍分

白朮

伍分

右水煎服

薏苡仁湯

治風熱唇口稠動或結核或浮腫

薏苡仁

炒

防已

赤小豆

甘草

炙各等分

右用水煎服

牡丹皮散

治腸癰腹濡而痛時下膿

牡丹皮

人參

天麻

白茯苓

黃耆

炒

薏苡仁

桃仁

去皮尖

白芷

當歸

酒拌

川芎

各壹錢

官桂

甘草

炙伍分

木香分叁

右水煎服

太乙膏

甘桔湯二方俱見
肺癰條

清胃散

當歸身

生地黄

牡丹皮

黃連各壹錢
伍分

升麻叁錢

石膏貳錢

細辛叁分

黃芩壹錢

右水煎服

三仁湯

治腸癰腸中疔痛煩躁不安或脹滿不食溺
瀝婦人產後虛熱多有此證縱非是癰證疑
似之間便
可服之

薏苡仁貳錢
伍分 冬瓜仁

桃仁

牡丹皮各壹錢
伍分

右水煎服

芍藥湯治胃脘積熱結聚為癰

赤芍藥

石膏

犀角

麥門冬

木通

薺苳各貳
兩

朴硝

升麻

玄參

甘草各壹
兩

右每用伍錢水煎服

失笑散

蒲黃

五靈脂

右各等分爲末

補中益氣湯 方見掌脫條

牡丹散 治肺癰胸乳間痛吐膿血腥臭

牡丹皮

地榆

薏苡仁

黃芩 各壹錢伍分

赤芍藥

桔梗

川升麻

生甘草

敗醬 各壹錢

右作一服水貳鍾煎至壹鍾食遠服

腸癰第三十三

千金方謂腸癰妄治必殺人孫真人云腸癰為病小
腹重強按之則痛小便如淋時時汗出復惡寒身
皮甲錯腹皮急如鼓狀甚者腹脹大轉側有水聲

或繞臍生瘡或腫從臍出或從大便下王叔和云
關內逢芫腸裏癰若小腹硬痛脉遲緊者未有膿
也用大黃湯下之不敢下者用敗毒散加秦芫連
翹脉芫瀝者四物湯加桃仁紅花玄胡索木香小
腹軟痛脉洪數者已有膿也用薏苡仁湯排之或
三仁湯神効瓜蒌湯小腹疼痛小便不利膿壅滯
也牡丹皮散主之若大便或臍間出膿者不治丹
溪云腸癰大腸有熱積死血流注宜桃仁承氣湯
加連翹秦芫下之內經云腸癰為病不可驚驚則
腸斷而死患是者坐臥轉側皆宜徐緩靜養調理

瘡科遺料 月瘡

庶保萬全云

大黃湯 治腸癰小腹堅腫按之則痛肉色如故或微赤腫小便如淋汗出憎寒其脉遲緊膿未成者宜急服之神効

大黃

朴硝

牡丹皮

瓜蒌仁

桃仁

各貳錢

各壹錢

右水煎服

敗毒散

方見疥瘡條

四物湯

方見掌疽條

薏苡仁湯

腸癰腹中痛煩躁不安或脹滿不食小便澀

薏苡仁

瓜蒌仁

各叁錢

牡丹皮

桃仁

各貳錢

右水煎服

三仁湯

方見胃脘癰條

神効瓜蒌湯

治乳癰腸癰一切癰疽初起者消已成者潰及潰後餘毒老幼皆宜植可外敷

瓜蒌

壹個

當歸

甘草

各伍錢

乳香

沒藥

各壹錢

右水酒各半煎服

牡丹皮散

方見胃脘癰條

薏苡仁附子敗醬散

薏苡仁

壹錢

熟附子

壹分

敗醬

叁分

右為細末水煎連渣服小便下膿血而愈

大黃牡丹湯

大黃肆分

牡丹皮壹兩

芒硝叁分

瓜蒌子半

桃仁叁拾個去皮尖另研

右以水陸鍾煎四味至壹鍾去渣入芒硝再煎壹

沸分叁次服有膿卽下膿無膿卽下血

伏梁丸治環臍腫痛腸胃瘡疽

厚朴生薑汁製

白茯苓

枳殼麩炒去穰

白朮

荆三稜炮

半夏

人參

右爲細末麵糊爲丸如小豆大每服叁拾丸食前米飲湯下

梅仁湯治腸癰痛大便秘澁

梅仁九個去皮尖

大黃炒

牡丹皮

芒硝各壹錢

冬瓜仁研叁錢

犀角壹錢爲末

右水煎入犀角末服

四物玄胡湯治瘀血腸癰小腹硬痛者是也

當歸

玄胡索各壹錢

川芎

白芍藥

生地黃各伍分

桃仁

紅花

牛膝各壹分

右水煎空心服大便秘結者加大黃

雲母膏

凡腹痛脉滑數乃腸癰也以此膏作丸如梧子大每用壹兩以牛皮膠熔化温酒調勻送下卽下膿血而安黃耆湯亦可方見肺癰條

排膿散

治腸癰小腹脹脉滑數或裏急後重時時下血

黃耆

當歸

金銀花

白芷

穿山甲

防風

連翹

瓜蒌

甘草

各壹錢

右水煎服若膿將盡去穿山甲連翹加當歸川芎或為末每服參錢湯酒下

癰疽部分

頭瘡第三十四

頂門癰屬太陽經風熱穴名上星由臟腑陰陽不調熱毒上壅而成宜活命飲芩連藁本清熱之劑虛

者十全大補湯加羌活脉大神昏二便秘者不治

額疽屬陽明胃中積熱宜活命飲加升麻桔梗羌活

水酒合煎壯實者一粒金丹下之老弱人十全大

補湯或十宣散或黃耆內托散托之若潰爛髓出

者死破後傷外風即害人潰膿後用藥速斂合

瘡口

兩太陽生疽名勇疽亦名腦發屬足陽明胃經寒熱

併作面目浮腫宜活命飲加升麻桔梗烏金散潰

爛透腦者死

鬚疽屬手少陽二焦相火是經血少氣多尤忌見膿

不可妄施鍼灸 薛新甫云由於肝膽二經怒火
 或風熱血虛所致初起如蟲咬癢癰痛瘰癧難見即
 所謂鬢發若發熱作渴者用柴胡清肝散腫高痛
 甚仙方活命飲大勢已定餘毒未除以參耆歸朮
 為主佐以川芎白芷金銀花速成其膿膿成仍用
 參耆等托而潰之

生肌收斂脾虛者六味丸血虛者四物加參耆氣虛
 者補中益氣湯以滋其化源

柴胡清肝散 治膽肝三焦風熱怒火之證見於鬢疽
 兼治頂胸作痛或瘡毒發熱

柴胡

山梔

炒各壹錢伍分

川芎

人參 各壹錢

連翹

桔梗 各捌分

甘草 伍分

食後溫服

髮際瘍第三十五

左右髮際起瘡如粟米頭白肉赤痛如錐刺此病多
 在婦人丈夫少見始因風溼上攻所致膿出無傷
 宜防風通聖散奪命丹紫金丹汗之

癩頭瘡第三十六

癩頭瘡以防風通聖散為末酒浸焙乾凡三次食後
 白湯調下參錢日進參服取頭汗為妙或以鹽湯
 三五日一洗敷上藥亦妙

天麻散

治白禿瘡及風毒疥癬

天麻

藜蘆

狼毒

白芷

茵草

釣藤根

草烏頭

貫衆

細辛

各伍錢

雄黃

貳錢

輕粉

壹錢

右爲末用綿紙作袋盛藥以香油參兩浸三日蘸

油擦瘡油乾再添壹兩凡添三次換藥再浸

決効散

治風痒頭瘡

貫衆

參兩

白芷

壹兩

右爲末油調搽瘡

松脂膏

治遠年頭癩瘡

松脂

黃連

各柒錢伍分

黃芩

苦參

各壹兩

蛇床子

貳錢伍分

大黃

白礬

煨枯各伍錢

水銀

壹兩伍錢

胡粉

半兩合水銀入少水同研令無星爲度

右爲末研勻用臘猪油調塗瘡上大効

一方以松香爲末羅淨壹兩入大葱葉內於飯鍋內

蒸熟去葱又用水半盞將銹釘六七枚火燒紅淬

水內數十次用此水調松香爲糊搽瘡先用猪湯

洗瘡後搽其藥

一方以苦練根燒灰猪油調搽

一方以海螵蛸白松香各貳錢輕粉參錢和勻先以

清油潤瘡後擦此藥只一二次愈

一方用輕粉伍錢研細用鷲油貳兩熬化入黃蠟貳兩同溶調輕粉搽擦

一方以淡豆豉壹合炒令煙出色焦為末又以飯飲調屋塵名懸龍尾一團炭火內煨過同研入輕粉貳錢麝少許剃頭後擦之

一方用不蛀皂角壹條去皮弦劈開夾金頭蜈蚣壹條麻扎之沉於糞缸底七日取出焙乾研末溫湯洗瘡潤後敷之乾則油搽兩次除根

一方用流磺玖分焰硝七分枯礬叁分金腳信壹分為末滾熟水洗瘡拭淨敷之乾以油調搽

一方用紅棗子燒存性肆兩乳香沒藥各壹兩為末油搽

一方以堅實炭燒紅入水淬之如此數十次以水熱為度日日用以洗瘡熱毒自然趕出再以胡荽子伏龍肝懸龍尾黃連白礬等分為末油調敷內服酒浸防風通聖散末

一等狀如葡萄久而不膿名鬚毛瘡治同上各法然看其瘡若中陷而四畔高起色如黃蠟乃廣瘡也

腦疽第三十七

薛云腦疽屬足太陽膀胱經積熱或溼毒上壅或腎水虧損陰精消涸初起腫痛甚煩渴飲冷脉洪數有力屬溼熱宜黃連消毒飲 若陰虛火熾而致者漫腫微痛渴不飲冷脉數無力宜六味丸補中湯若不成膿不腐潰陽氣虛也四君子加歸耆不生肌不收斂脾氣虛也十全大補湯

若初起如木樨上起頂門下至大錐色黯不潰潰而不斂發腫如火燒色青黑如靴皮只損外皮如犬噬去肉樣乃陰精消涸名曰腦爍不治之證

腦癰皮薄易破易治腦疽皮厚難穴急宜內托

李氏云腦疽及頸項疽不宜蒜灸恐引毒上攻宜灸足三里穴五壯氣海穴二十一壯或以騎竹馬法灸之古人言頭項咽喉生疽多不可治用此法或庶幾得生

薛云大凡腫焮大痛宜活命飲及隔蒜灸以解散瘀血拔引鬱毒但灸炷宜小用火宜少若欲成膿腐潰生肌收斂竝用托裏爲主此確論也昔東垣醫元好問腦疽以兩核大艾灸百壯用黃連消毒散而瘥此爲明驗至於惡候發現竝宜照癰疽大法治之

左右額發赤疽不拘大小急宜以藥貼破見膿無害
爲其近太陽穴上至額角俱是要害處若腫滿太
陽卽成虛損至破後尤宜速斂若外傷風水卽能
殺人若七日刺不得膿十日不穴者死

左右太陽穴發癰疽亦宜急破五七日不破毒氣攻
睪睪合不開破後更傷風水卽傷睛目不特此也
若眉稜或頭或尾發疽在眉頭則攻入睪目在眉
後則攻入太陽最宜慎之

以上各疽雖有一定之方而無一定之證但腫痛未
膿者宜去溼消毒黃連消毒飲之類大痛或麻木
不痛宜蒜灸法解毒藥腫痛而便秘邪在內宜泄
之不痛不作膿者虛也托裏爲主不潰亦宜托裏
昔杜碧清病腦疽自藥不愈丹溪視之令服防風通
聖散答曰已數服丹溪云宜以酒製杜悟急服乃
瘥

凡初起宜黃連消毒飲若腫硬作痛繼以仙方活命
飲一二劑蓋此病原屬虛火按之脉數而濡乃溼
熱壅盛故用黃連消毒飲腫硬作痛乃氣血凝滯
故用仙方活命飲竝以甘溫之劑補益陽氣托裏
而潰腐之不宜苦寒之藥傷其胃氣反致不得腐

化凡瘡易消敗易腐潰易收斂皆氣血壯盛故也
可以類推

黃連消毒仙方活命俱要藥其他如槐花酒托裏金
銀花散清心蓮子飲犀角湯審其為積熱為挾風
挾虛而進退出入竝以黃連消毒活法治之

黃連消毒飲 見初起腫瘍二條

仙方活命飲 見初起湯藥條

羗活當歸湯

黃芩

酒炒

黃連

酒炒

當歸身

酒洗各錢

羗活

黃栢

連翹

各壹錢

炙甘草

伍分

澤瀉

獨活

藁本

各柒分

梔子仁

防風

各伍分

右水柒酒參食後服日進參貼參日乃愈

追毒萬應鍼頭丸

治一切腦背惡瘡欲死一粒可愈

麝香

貳錢

血竭

蟾酥

輕粉

礪砂

各叁錢

全蝎

蜈蚣

各壹對全用

片腦

壹錢

右為末煉蜜丸如黍米大瘡頭用鍼挑破微有血
出以藥壹粒放進眼上用綿紙蓋之周圍以津唾
粘定不一時愈

面瘍第三十八

發眉遊風

發髭粉刺

腮疽斑刺

疔腮

偷針眼牙疔

月蝕瘡

小兒肥瘡

面瘡有發眉生左右眉稜已見腦疽論又有眉心生
 疽名面風毒屬太陽膀胱經風熱壅結陰陽相滯
 而生宜以紫金丹蟾酥丸汗之若黑色痛甚或麻
 木或痒寒熱併作者疔也各處皆然
 鼻柱上生疽屬手太陰肺經風熱及上焦鬱火所成
 宜漏蘆湯活命飲加梔子木通薄荷

發髭在鼻下人中兩邊因摘髭入風而結屬足陽明

胃經

地角上生疽名髭毒屬足陽明經風熱所致活命飲
 加芩連玄參梔子桔梗以清熱

顴骨疽屬上焦陽明經鬱火所致宜活命飲加升麻
 桔梗乾葛酒煎仍服奪命丹烏金散汗之

靈樞經云心病者顴赤又曰腎病顴骨面黑然則當
 察其色赤者與黃連安神丸降心火補心丸養心
 血色黑者以地黃丸滋腎水不可執於陽明鬱火
 也

頰腮生瘡屬陽明經初宜活命飲加升麻桔梗或黃
 連消毒散選用或犀角升麻湯

犀角升麻湯

治口唇頰車髮鬢腫痛及鼻額連頭痛不可開口妨礙飲食

犀角

柒錢伍分

升麻

伍錢

白芷

白附子

川芎

各貳錢 伍分

防風

黃芩

各叁錢 伍分

羌活

叁錢

甘草

壹錢 伍分

右作壹服水伍盞煎至叁盞去滓分作叁服壹日壹服勢必減 按此屬陽明胃經陽明經絡環唇挾口起於鼻交額中此方以犀角清胃中飲食之毒升麻佐之蓋升麻黃芩皆入胃經餘藥皆滌除風熱之藥故効

腮臉生毒發於肌肉浮而不着骨名曰疔腮近於下

則為頤發屬足陽

明

於耳後又屬少陽熱毒上攻

所致急用活命飲加玄參芩連老弱人用十全大

補湯黃耆內托散人參養榮湯

薛云疔腮屬足陽明胃經或因風熱所乘或因積熱

所致內熱瘡痛宜升麻黃連湯白芷胃風湯外腫

作痛內熱口乾犀角升麻湯內傷寒涼不能消潰

者補中益氣湯發熱作渴大便秘者加味清涼飲

表裏俱解而作腫痛者欲成膿也用托裏消毒散

膿成用托裏散其氣虛血虛倦怠惡食等證照常

用補中湯六君子湯十全湯八珍湯選用不可泥

於風熱用尅伐之劑

又云連耳上太陽部分屬風熱加羌活防風連耳下

少陽部分屬怒火加柴胡山梔丹皮連耳後少陰部分屬相火加知母黃栢齒牙俱腫出血者清胃散加石膏

面遊風毒因積熱或多食辛辣厚味金石之藥所致

屬陽明經宜黃連消毒散去人參加薄荷梔子及

活命飲加升桔

白芷胃風湯 治氣虛風熱面目麻木或牙關緊急目

白芷 各貳錢 升麻 伍分 葛根 柒分 蒼朮 炒捌分

當歸 壹錢伍分 甘草 炙壹錢 草薹蔻 柴胡

黃栢 藁本 羌活 各肆分 蔓荊子

白殭蠶 炒去絲各叁分 麻黃 柒分去節

升麻黃連湯 治胃經熱毒腮腫作痛

黃連 牛旁子 白芷 連翹 各壹錢

升麻 川芎 當歸 各壹錢伍分

右水煎若痛連太陽加羌活若痛連耳後山梔柴

胡

犀角升麻湯 治胃經風毒血氣凝滯內熱口乾鼻額

犀角 柒錢伍分 升麻 防風 羌活

川芎 白芷 白附子 黃芩 各伍分

甘草 貳分

右水煎漱服

清胃散

方見胃脘癰

連翹敗毒散

治發願初腫服此消之

連翹

羌活

獨活

荆芥

防風

柴胡

升麻

桔梗

甘草

川芎

牛旁子

瓦上炒用

歸尾

紅花

蘇木

天花粉

俱中

右水酒各半煎徐徐溫服如不消再加穿山甲壹

錢腫痛至面加白芷大便燥結加大黃寒熱倍柴

胡炒黃芩

內托消毒散

治發願不得消者托之

人參

黃耆

防風

白芷

川芎

當歸

桔梗

連翹

金銀花

甘草節

升麻

柴胡

俱中

右水酒各半煎徐徐溫服瘡口破者以玄武膏貼

之四圍腫赤以後藥敷之

消毒救苦散

消腫散毒用米醋調敷留一頭乾即再敷

大黃

黃芩

黃連

黃栢

芙蓉葉

大薊根

白芨

白斂

南星

半夏

紅花

檀花

當歸尾

赤小豆

白芷 各壹錢 伍分

朴硝

雄黃 各壹錢 另研

硫黃散

治面瘡及鼻臉赤風刺粉刺諸藥不効者用此藥少許於臨睡時洗面淨如油粉一般用之數日即退

生硫黃

白芷

瓜蒌仁

膩粉 各伍分

全蝎 柒枚

蟬蛻 伍枚

芫青 柒枚去足翅

右為末用麻油黃蠟約度如合面油法火溶盡下火入各藥收用一方水調平胃散搽之亦佳

面油摩風膏

麻黃 伍錢

升麻

防風 各貳錢

當歸身

白芨

羌活

白檀末 各壹錢

右為末以綿裹之用油半觔入砂器內熬澄清去渣入黃蠟壹兩再熬收用

瑩肌如玉散

白丁香

白蒺藜

白牽牛

白芨

白斂

小椒 各壹兩

白芷 柒錢

當歸尾

升麻 各伍錢

楮實子 肆錢

白附子 貳錢 伍分

白茯苓 叁錢

麻黃 去節 貳錢

連翹 壹錢 伍分

右為末每用伍分洗面

去黑斑點方

白附子 壹兩

白芨

白斂

白茯苓

蜜陀僧

白石脂

定粉 等分

右為末用以洗面臨臥以人乳調塗

祛風白芷散 治面上風癬瘡

白芷 參錢

黃連

黃柏

黃丹 各貳錢

茯苓 壹錢伍分

輕粉 壹錢

右為末香油調搽癬一方加孩兒茶貳錢麝貳分

羊鬚散 治面上耳邊黃水瘡

殺羊鬚

荆芥

乾棗 去核各貳錢

右燒炒存性入膩粉伍分同研先以溫水洗淨香

油調搽

消毒散 治面瘡赤腫

菜豆

五倍子

右研細末用醋調搽

黑白散 治小兒面湮瘡

百藥煎

生礬 貳錢

右為末香油調搽

藥油 治小兒面瘡出黃水

用松香枯礬槐樹皮為末紙捲為筒蘸油燃火有油滴下收之用輕粉少許搽之

面上瘡疤

用鮮橄欖切斷蘸麝香少許擦之一二日無痕跡
面上泡瘡

胡粉水銀臘猪油同研如泥夜臥敷上勿洗三日
可愈

洗面去斑藥

去面上一切瘡刺及皮膚燥痒垢膩又潤肌膚

皂角

叁斤去皮

升麻

半斤

楮實子

伍兩

白芨

壹兩

甘松

柒錢

三奈子

白丁香

縮砂

各伍分

菥豆

捌分另研

糯米

壹升

右為末用洗面

月蝕瘡

治耳鼻面上及下部諸竅生瘡隨月盛衰

胡粉

炒

枯礬

黃丹

黃連

輕粉

各貳錢

臙脂

燒存性壹錢

麝

壹字

右為末以鹽湯洗淨乾摻或油調敷

偷鍼罪

南星地黃各叁錢研成膏貼太陽兩邊其腫自消

玉紅膏

治小兒頭上惡瘡及肥水瘡

松香

同好醋加葱頭打碎或取汁同煮壹斤

飛丹

陸兩

枯礬

陸兩

川椒

貳兩另研末

輕粉

壹兩伍錢

右共為末先以猪肉湯洗淨菜油調塗

一方瘡癩初起以旋覆花炒焦爲末油調敷之
牙又骨接處發腫張口不得皆風熱上攻或因牙癰
切忌風水觸犯宜清胃散甘露飲防風通聖涼膈
散之類量虛實選用

耳發第三十九

耳輪生瘡是名耳發疽屬手少陽三焦經內經曰耳
爲腎之外候又曰腎通竅於耳又曰心通竅於耳
故耳瘡之發必當審其經之所自中氣虛者補中
益氣湯

厥陰肝經血虛風熱或肝經燥火風熱皆能致耳生
瘡必內熱痒痛用當歸川芎散柴胡清肝散梔子
清肝湯逍遙散選用若寒熱作痛屬肝經風熱用
小柴胡湯加山梔川芎若內熱口乾屬腎經虛火
用加味地黃丸加減八味丸若發熱焮痛屬少陽
厥陰風熱用柴胡梔子散至於卒然疼痛日久流
膿諸蟲誤入各有効方用者擇之

耳中生毒皆由足少陰手少陽二經風熱上壅所致
其證有五曰停耳曰耳溼常出黃膿有耳風毒常
出紅膿有纏耳出白膿有耳疔生瘡臭穢有震耳
耳內虛鳴時出清膿雖恙有五而其源歸一又有

耳聾耳痔不作膿亦不寒熱外無臃腫但耳塞不通已上纏綿不已令人耳聾用黃連消毒飲活命飲治之若寒熱間作內外紅腫疼痛日增者爲耳癰用活命飲加升麻桔梗紫金丹烏金散或壹粒金丹下之亦有寒熱大作痛不可忍者疔也以疔治之

氣閉耳聾着惱而成通氣散効用茴香木香人參玄胡索陳皮菖蒲各壹錢羌活殭蠶川芎蟬蛻各伍分穿山甲貳錢甘草壹錢伍分各爲細末每服參錢溫酒下

肝火左脉弦數其人多怒耳鳴或聾宜平肝伐木龍膽瀉肝湯不已龍薈丸

氣虛右脉大而無力或濡細症兼倦怠口中無味宜加減益氣湯用黃耆人參治虛勞爲君甘草升麻葛根蔓荊子芍藥黃蘗用酒炒春夏倍加胃弱人去之加白朮

風熱耳根連牙床腫痛屬上焦風熱清胃兼辛涼散之升麻芷翹荆防薄荷甘桔枳殼酒炒芩連玄參花粉赤芍鼠粘生地時服勢盛加蒸大黃

耳中忽大痛如有蟲蠕動或血出或水出或乾痛用

蛇退殼燒存性以鵝翎管吹入即止

耳出膿汁或聾而鳴屬上焦風熱蔓荆子散方用蔓

荆子生地赤芍甘菊桑皮木通麥冬升麻前胡炙

草赤茯苓用薑棗水煎

耳鳴多屬陰虛火動滋腎丸虎潛丸或滋陰百補丸

耳根連及項或腫多在左邊脉必弦數屬肝火又恒

見於婦女宜平肝降火兼舒鬱用柴胡青皮香附

撫芎梔子酒炒芩連歸芍貝母連翹玄參主之若

有表證發寒熱者荆防敗毒散

凍耳用橄欖核燒灰清油調敷雀腦亦妙

停耳因勞傷氣血熱氣乘虛入於其經隨鬱成膿故

云停耳內服柴胡聰耳湯通氣散蔓荆散外用紅

綿散等吹藥

耳溼腫屬上焦風熱宜涼膈散加酒炒大黃酒炒枯

芩荆防羌活或以枯礬吹入酒客耳鳴耳聾亦宜

耳聾耳鳴須分新久虛實忽因大怒大醉而聾或鳴

百屬痰火又分輕重治中年及病後虛弱人悉屬

虛但分氣血耳治之必大補氣血滋陰制火使火

氣上行克塞流動則九竅咸利而聾鳴悉除經曰

腎氣通於耳耳和則知五音矣

薛云耳鳴脉數黑瘦人屬血虛四物加山梔柴胡若寸關大於左無力倦怠色黃白屬中氣虛補中益氣加減若血氣俱虛八珍湯加柴胡若因怒便聾或鳴屬肝膽氣濁小柴胡加芎歸山梔東垣鼠粘子湯治耳痛生瘡

昆布 蘇木 生草 蒲黃

龍膽草各貳分 鼠粘子 連翹 生地

歸尾 黃芩 炙甘草 黃連各叁分

柴胡 黃耆各肆分 桔梗壹錢伍分 桃仁叁枚

紅花

右用水煎壹大盞少熱服忌利大便寒涼藥

逍遙散

當歸 白朮 茯神 芍藥

甘草 柴胡各壹錢

右薑參片用水煎服

柴胡梔子散治三焦及足少陽經風熱耳痒生瘡或水出疼痛胸乳間作痛

柴胡 梔子 丹皮各壹錢 白茯苓

川芎 白芍藥 牛蒡子 當歸各柒分

甘草伍分

右水煎食後服太陽頭痛加羌活

曾青散 治耳內惡瘡

雄黃 柒錢 曾青 伍分 黃芩 貳錢伍分

右搗為末研勻用少許納耳中有膿出即以綿搥子拭乾再用

當歸川芎散 治手足少陽經血虛瘡症及風熱耳痒生瘡出水或婦女經水不調胸膈痞悶

當歸 川芎 柴胡 白朮

芍藥 各壹錢 山梔 炒壹錢貳分 丹皮 茯苓 各捌分

蔓荊子 甘草 各伍分

右水煎 肝氣不平寒熱加地骨皮 肝實加柴胡黃芩 氣血虛加參耆歸地 脾虛飲食不思

加茯苓白朮 痰滯加朮半 肝氣不順胸膈不

利小腹痞滿加青皮 肝血不足胸逆加熱地

肝血虛寒小腹時痛加肉桂

加味地黃丸 治肝腎陰虛耳痒痛出水小便赤澀

山藥 山茱萸 牡丹皮 澤瀉

白茯苓 熟地黃 五倍子 柴胡 各等分

右地黃用酒拌煮搗為膏入各藥和勻加蜜為丸

或用加減八味丸

加減八味丸 見惡候條

耳病十二方

一 枯白礬壹味研末吹入

一 青礬燒灰研末吹入

一 菖蒲附子去皮臍各等分爲末油調滴入

一 桑螵蛸炙黃爲末加少麝吹入兼治停耳

一 臘脂胚子蛙竹末各少許加麝一字吹入

一 蛇蛻燒存性爲末吹入兼治流血水

一 枯礬壹錢龍骨貳分黃丹貳分麝香叁釐爲末乾

一 摻治膿耳及小兒斷臍不乾卽青礬散

一 鷄內金炒黃研末香油調滴治耳膿

一 五倍子壹錢全蝎燒灰存性叁分研末吹入治膿

耳停耳

一 棗核柒枚燒灰出火氣研末拭乾摻入治膿耳

一 大棗核燒灰出火氣壹錢麝伍釐土蜂窩泥壹錢

一 臘脂胚燒灰壹分研細末吹入治停耳

一 龍骨爲末吹入治耳出血

凡蟲入耳中用桃葉捲如葱切平兩頭納入耳中蟲

從葉中出又方以香油滴入鷄冠血滴入俱佳

抵聖散 治耳膿經年不瘥

枯白礬 壹兩

烏魚骨 叁錢

乳香 貳錢

乾臘脂

輕粉 各壹錢

麝香 伍分

右爲末或摻或緝

黃連散

白礬

柒分 伍釐

黃連

伍分

右爲末綿裹納耳中

口瘡口疳第四十

凡口中生瘡皆由臟腑之熱故肝熱則口酸心熱則口苦脾熱則口甜肺熱則口辣腎熱則口鹹胃熱則口淡若謀慮不決肝移熱於膽亦口苦脾胃氣弱木乘土位亦口酸膀胱移熱於小腸膈腸不便上爲口糜生瘡潰爛傷寒狐惑蟲蝕其臚上唇生

瘡蟲蝕其臚下唇生瘡是臟腑之病未嘗不應諸口故凡口瘡者皆病之標也治者當推求其本焉然不外乎五味之異以察五臟之屬若服涼藥而不愈乃中焦土虛相火衝上無制用理中湯人參白朮甘草補土之虛乾薑散火之標甚則加附子或噙官桂乃崇治之法醫家之妙用也

琥珀犀角膏

治咽喉口舌生瘡其効如神

琥珀

犀角

辰砂

各壹錢

茯神

人參

酸棗仁

各貳錢

右爲極細末另研片腦貳分伍釐煉蜜調膏每用

彈子大壹塊麥門冬濃煎湯化下壹日伍服

礬丹散 治口瘡

枯礬

黃丹 炒

白梅 燒存性 各壹錢

人中白 壹錢 伍分 麝香 少許 另研

右五味各研極細末和勻再研乾摻瘡上甚者加

硼砂伍分片腦壹分

益膽湯 謀慮不決肝膽虛氣上溢則口舌生瘡

黃芩

炙甘草

人參 各壹錢

遠志 柒分

官桂 伍分

苦參

茯神 各叁分

右水煎服

升麻散 治上膈壅熱口舌生瘡咽喉腫痛

生甘草 肆分

升麻

赤芍藥

人參

桔梗

乾葛 各捌分

右薑水煎服

瀉黃飲子 治風熱蘊於脾經唇燥折裂口舌生瘡

白芷

升麻

枳殼 去白 炒

黃芩

防風

半夏

石斛 各捌分

甘草 炙肆分

右薑水煎服

東垣柴胡地骨皮湯 治膀胱移熱於小腸口糜生瘡 心胃壅熱水穀不化

柴胡

地骨皮 各貳錢

右水煎服大便秘者加大黃朴硝

玉芝飲子

治膈熱口舌生瘡咽喉腫痛

藿香葉

石膏飛水

山梔仁各伍分

甘草炙壹錢

右為極細末新汲水調服

犀角散

治口舌生瘡咽喉腫痛

升麻

桔梗

右為細末入竹葉五片水煎熱漱徐徐嚥之

白礬散

治赤口瘡

枯白礬

乳香

沒藥

銅綠

右等分為細末摻之

雄黃散

治白口瘡

雄黃

乳香

沒藥

各壹錢

輕粉

巴豆霜

各少許

右為細末摻之

鹽梅散

治口瘡

枯礬

鹽白梅

燒存性

黃丹

洗炒各壹錢

麝香

少許

硼砂伍分

片腦壹分

人中白壹錢伍分

右為極細末摻之

柳花散

治口舌生瘡

玄胡索

叁錢

黃栢

黃連

各壹錢伍分

蜜陀僧

玖分

青黛陸分

右為末乾敷

青黛散治口舌生瘡

青黛淘淨伍錢

硼砂伍分

冰片少許

右為末乾摻

白朮甘草散治口瘡舌強多痰

白朮

甘草稍各壹錢

人參

赤芍藥

木通各伍分

生地伍分

瓜蒌子十貳枚

黃連

右作壹貼煎服

黃連升麻湯治口舌生瘡

升麻壹錢伍分

黃連叁錢

右為細末綿裹含津嚥

綠袍散治大人小兒口瘡多不効者

黃栢肆兩

炙甘草貳兩

青黛壹兩

右先取貳味為末入青黛同研勻乾貼

蜜栢散治口瘡久不愈者

用黃栢不計多少以蜜炙灰色為細末臨臥乾摻上忌酒醋醬犯之則瘡難愈

紅芍藥散

心病口瘡

紫桔紅蒼

參錢肆兩

五服安康

右紫苑桔梗紅芍藥蒼朮各等分爲細末羊腸肆兩批開摻藥末參錢用麻扎定火內燒令熟空心食之白湯送下神効

半夏散 治少陰口瘡聲絕不出者是寒遏陽氣不伸

半夏 製壹兩 桂 烏頭 各壹字

右同煎壹盞分作貳服

烏星散 治滿口生瘡因虛火上攻

草烏頭 壹枚 南星 壹枚 生薑 壹塊

右焙爲末每服貳錢臨臥又用醋調作擦子貼

心一夜愈

甘礬散 治太陰口瘡

甘草 貳寸 白礬 栗子大

右含化咽津

多効散 治唇緊瘡及疹

訶子肉 五倍子 各等分

右爲細末乾貼上効

陰華散 治走馬牙疳腐爛幾死

寡婦淨桶白垢 火煨壹錢 銅綠 叁分 冰片 壹分

右爲末敷之

化毒法

凡口瘡無問新舊遇夜臥將自己兩丸以手攪緊左
右交手揉三五十遍但遇夜睡覺行之如此三五
度因酒而生者一夜愈久病諸口瘡三二夜愈如
鼻流清涕惡寒者攪貳丸向上揉之數夜可愈
降火膏

吳茱萸爲末醋調塗腳心

口瘡八方

一方黃栢灸同細辛各貳錢研極細末敷之仍禁口
少頃必滿口生涎吐之又敷如此數次立愈

一方治心脾熱舌煩生瘡用黃栢皮蜜炙與青黛各
壹分同爲細末入生龍腦壹字研勻摻瘡上有涎
吐之

一方好酒煮黃連呷下立愈

一方治膈上熱極口舌生瘡用膩粉壹錢杏仁柒粒
不去皮尖臨臥細嚼口中涎出則吐之仍用溫湯
漱口未愈再用

一方以五倍子爲末敷之便可飲食

一方以膽礬壹塊用百沸湯泡開每合壹口漱一回
卽吐出一夕可愈

一方以好墨研螻蛄極細敷之立効蓋螻蛄走小腸

膀胱其効甚捷但力峻氣猛若陰虛氣上致瘡者則不可用熱在上焦者其効如神

一小兒口瘡其色通白及爲風疳蝕透以白殭蠶炒令黃色拭去蠶上黃肉毛爲末用蜜和敷立効

繭唇用五倍子貳錢蜜陀僧甘草各少許各爲細末另用粗皮嫩黃栢壹兩將參末水調敷在黃栢上

火炙乾又換以藥盡爲度將黃栢劈開片子臨臥時貼唇上天明即愈

一方以青皮燒灰敷之

一方以皮紙撚在刀上燒取所熏瀝敷之

內疳瘡生於上腭如蓮蓬蒂下垂初小漸大必宜以

小鈎刀去其根燒鐵烙以止其血然後以雄黃輕

粉粉霜白芷白斂爲細末以敷之仍以槐枝起其

牙一二時許瘡口自合次日出膿以生肌散敷之

若上腭腫硬內熱體倦作渴乃多骨疽也服補中

益氣湯腎氣丸其骨自出

牙癰名附牙屬足陽明胃經熱毒宜清胃散黃連消

毒飲或刺出惡血

清胃散

治酒食積熱唇口腫痛齒跟潰爛喉痛惡寒發熱

升麻

貳錢

生地

丹皮

黃連

當歸 各壹錢

右水煎服如不應量加石膏

又有骨槽風又名穿腮毒初起生於耳下及頸項隱
隱皮膚之內有小核漸大如胡桃牙齦腫痛寒熱
大作腐爛不已由憂愁思慮驚恐悲傷所致日增
紅腫或上或下或左或右牙關緊急不能進食必
用鷲翎探吐風痰服黃連解毒湯活命飲加玄參
桔梗柴胡黃芩切忌刀鍼及點藥如破傷入風虎
火上升嘔吐血痰臭穢不食至不可救

上腭生癰狀若紫蒲萄名懸癰亦作寒熱屬手大陰
手厥陰至舌不能伸縮口不得開唯欲仰臥鼻出
紅涕乃三焦積熱所致用黃連消毒飲加玄參桔
梗及犀角琥珀膏敷之 疑卽內疳瘡

唇瘡以甌上滴下汗敷之神効

唇上瘡以白荷瓣貼之 又以八月藍葉搗汁洗之
唇黃泡腫烏頭炒灰研墨香油調塗

咽喉腫痛第四十一

人之咽喉名曰吸門又謂之會厭卒然腫痛水漿不
入呼吸不通死在須臾誠爲急證內經曰一陰一
陽結謂之喉痺考一陰卽手足厥陰一陽卽手足

少陽四經皆有相火元氣一虛相火隨起衝逆於上其證乃作經曰一水不能制五火凡五味七情勞役皆足以起本臟之火故謂之五火也世俗稱為橫鶩堅鶩緩者先治其本用桔梗甘草玄參升麻防風羌活荆芥人參白朮茯苓之類少加乾薑附子徐徐頻與不可頓服亦不可驟用寒涼之劑一氣服盡則上熱未除中寒復作不死於熱卻死於寒矣此與天行大頭瘟及時毒之類大同小異故東垣之普濟消毒飲皆可通用也至於危在頃刻必鍼刺患處大湧其痰或灌以童便然後用藥

方論已備於咽喉條矣茲以喉瘡各方附之

通關飲

治喉痺腫痛不能語言但可進藥無不神效

白茯苓

人參

白朮

各壹錢

桔梗

貳錢

防風

柒分

荆芥

薄荷

乾薑

炮

附子

炮各伍分

甘草

炙壹錢伍分

右水煎徐徐呷服

普濟消毒飲子

方見時毒條

桔梗湯

治咽喉微覺腫痛聲破難言

當歸身

馬勃

各壹錢

白殭蠶

炒

黃芩

各叁分

麻黃

去節伍分

炙甘草

桔梗

各壹錢

桂枝

少許

右用水先煎麻黃去沫方入羣藥同煎徐徐呷服
清熱利咽湯 治咽喉腫痛喉風喉閉口舌生瘡

黃連 升麻 桔梗 玄參 各壹錢

枳殼 分叁 梔子仁 當歸 各捌分 石膏 伍分

薄荷 防風 炙甘草 牛蒡子

赤芍藥 各陸分 滑石 羌活 各柒分 燈心 二尺四寸

右水煎徐徐呷服

三仙膏

馬蔞菊 車前草 五爪龍草

右各等分搗取汁徐徐飲之

斬關丸 治咽喉腫痛兼治口舌生瘡

薄荷 玄參 硼砂 風化硝

石膏 山豆根 桔梗 甘草 各貳錢

片腦 叁分

右各另為極細末和勻生蜜丸如芡實大每用壹

丸舌上噙化

魚膽破關散 治咽喉腫痛

綠礬 伍錢預取青魚膽壹個 朴硝 貳錢伍分 另研

銅綠 壹錢 輕粉 伍分 青黛 少許

右以膽礬同巴豆在於銅銚內飛過去巴豆不用

合朴硝等四末入麝香少許每用貳叁分吹入吐血立愈

格楞藤飲

格楞藤

右壹味不拘多寡搗汁頻呷吐出惡涎立効

獨神飲

青艾葉

右壹味取汁灌入喉中立愈

入聖散

治喉風

鷄內金

炒存性

飛礬

青黛

各壹錢

蟾酥

壁錢

炒存性各伍分

右為極細末吹入立愈不能開口者吹鼻內

漱喉丹

治喉痺痛又治下疳眼痛

鴨背膽礬入青魚膽內陰乾為末吹入或敷上或

同醞醋研於喉中頻咯吐又治眼痛用無根水調

圍眶上

交泰散

大南星

右壹味以醞醋磨塗湧泉穴

痰核第四十六

痰核者乃溼痰流聚所成也人之一身津液周流貫通百脉一有壅滯則為癰為疽為痛其稱痰核者蓋不紅不痛不作膿推之可動者也其發多在項頸宜陳二湯加大黃連翹柴胡桔梗體薄者二陳湯加桔梗黃芩玄參麥門冬及防風少許煎成入竹瀝服之自消如在耳後或項下宜含化丹若發在手臂肩背雖覺微痛但瘡不紅亦宜二陳湯加防風酒炒黃芩連翹皂角刺川芎蒼朮若生他處在上體多兼風熱在下體多兼溼熱宜用加味小胃丹竹瀝達痰丸海帶丸

二陳湯

白茯苓

陳皮去白

半夏

甘草炙

右薑水煎服

含化丹

治腦項耳後結核

殭蠶

大黃

青黛

膽星

各等分

右為末蜜丸含化

加味小胃丹

南星

半夏

各貳兩伍錢用白礬皂角刺及薑汁水煮十五次

桃仁

杏仁

用白礬皂角水

紅花

陳皮

枳實

用白礬水泡半日炒

白朮

白芥子

蒼朮

貳兩用米泔白礬皂角水浸一宿炒

右爲末薑汁竹瀝煮神麩爲丸服中風痰痞積眩暈喉痺淡薑湯下癩瘕不語濃薑湯下惟痞塊頭風頭痛宜臨臥食後服神効

竹瀝達痰丸

治有痰而氣弱者此能搜逐積痰從大便而出不損元氣孕婦弗用

大黃

黃芩

各捌兩

沉香

伍錢

人參

白朮

白茯苓

陳皮

甘草

半夏

各叁兩

礞石

煅硝煨過壹兩

右俱爲細末以竹瀝薑汁和如稀糊磁器內晒乾又研細復用竹瀝薑汁和晒共三次然後再研細

仍以竹瀝薑汁和丸如小豆大每服壹百丸米飲

送下

海帶丸

治痰核癭氣經久不消

海帶

青皮

貝母

陳皮

各等分

甚者加昆布

右爲末蜜丸彈子大每壹丸食後含化

星半消核湯

治大人小兒頸內痰核癭瘡

半夏

牛膽星

天花粉

桔梗

白芷

金銀花

夏枯草

昆布

海藻

瓜蒌仁

陳皮

甘草

瘍科選粹

咽喉腫痛

八十六

防風

川芎

當歸

羌活

海粉

貝母

右用水貳鍾薑

一片煎服

...

...

...

...

瘍科選粹目錄

第四卷

頸項第四十三

瘰癧第四十四

清肝益榮湯

梔子清肝湯

柴胡通經湯

加味逍遙散

龍珠膏

琥珀膏

回燕膏

必効散

立應散

宣熱湯

托裏益氣湯

人參養榮湯

斑雞丸

白蚕丸

追膿化毒丹

軟硬皂子丸

補中勝毒餅

夏枯草散

瘍科選粹

目錄

紫雲石間

卷四

鼠髮膏

蘆薈丸

貓頭丸

海藻散堅丸

銀右散

蚕繭散

白蛇散

東垣柴胡連翹湯

東垣消腫湯

東垣敗毒潰堅湯

東垣升肝調經湯

東垣連翹散堅湯

補陰八珍湯

瀉青丸

紫參丸

消毒化堅湯

益氣養榮湯

東垣三聖湯

內消連翹丸

破結散

龍泉散

羅謙甫太乙膏

玉燭膏

尅効散

翠玉膏

羌活連翹湯

防風羌活湯

加味敗毒散

小犀角丸

入神散

破堅散

復全膏

托裏救神應丸

化氣調經湯

追奪神異湯

勝靈丹

肩疽第四十五

臂疽第四十六

白芷升麻湯

油泥膏

手疽第四十七

胸疽第四十八

乳癰第四十九

一醉膏

芷貝散

歸脾湯

內托升麻湯 復元通聖散 十六味流氣飲

神効瓜萸散 瓜萸大黃湯 連翹橘葉湯

青皮散 蒲公英酒 奇方八條

乳岩第五十

黃芪托裏散 一味青皮湯 橘皮湯

丁香散 奇方四條

脇疽第五十一

腹癰第五十二

發背第五十三

腰疽第五十四

便毒第五十五

玉燭散 加減龍膽瀉肝湯

雙解散 神効祛毒散 瀉毒散

消毒散 止痛方 牡礪散

牡礪湯 防風通聖散 復元通氣散

立消散 敷藥湯 五虎湯

單方三條

陰瘡第五十六

腎臟風 陰痒

四生散 補瀉丸 猪穢散

白膠香散 烏頭丸 牡礪丹

浴毒湯

沐浴長春湯

單方三條

硫檳散

婦人陰瘡五條

女人陰瘡第五十七

藿香養胃湯

補心湯

菖蒲散

硫鯉丸

雄黃蛻散

枳殼熨散

玉粉散

洗搨二方

甘溼散

單方五條

下疳第五十八

泄水丸

敷藥

龍膽瀉肝湯

甘草大豆湯

洗方

消疳敗毒散

八正散

大蘆薈丸

博金散

丁泥散

蘆甘石散

水仙散

黃栢散

雞金散

青黛散

香珠散

單方七則

囊癰第五十九

加味瀉肝湯

加味小柴胡湯

黑龍湯

滋腎丸

清肝益榮湯

白蠟膏

烏金散

懸癰第六十

製甘艸方

清心蓮子飲

加味托裏散

肛內癰方

瘍科選粹卷之四目錄終

瘍科選粹卷之四

竹

繡水陳文治輯

東吳繆希雍叅校

頸項瘍第四十三

頸癰屬手少陽三焦經鬱火積憤驚惶所致初覺卽
隔蒜灸服活命飲加玄參桔梗及勝金丹奪命丹
汗之壯實者一粒金丹下之老弱者十全大補湯
人參養榮湯若潰而不斂煩躁脹滿小便如淋嘔
吐者死

神勞多怒頸項腫塊不消用八珍湯加柴胡香附及

隔蒜灸法勞心過度者補中益氣湯

婦人因怒頸項腫後乃月水不通小便如淋此血分證也宜用椒紅丸俟經行腫消再用六君子加柴胡枳殼

頸後腦下發疽名對口瘡屬督脉陽盛氣有餘火炎上所致急服烏金散勝金丹汗之壯實者一粒金丹下之若潰出膿水入風發搐卽難治有毒邪壅盛鮮血瀑湧者死毒攻心腹膨脹譫語者死此證燉赤腫痛可治若根大精神昏憤者不治量表裏虛實而爲干下內托內消外用大圍藥箍住中點六灰膏之類破泄其毒不可走失根腳若欲流兩肩脊者不可療或服追疔奪命湯二服後服活血化毒湯

治對口瘡用鮮白茄蒂柒枚秤若干重又用鮮何首烏秤同茄蒂重用水壹鍾半煎服壹服出膿壹服收口如無鮮的收下乾的亦可用此等皆輕劑不可以治重病耳

夾喉兩旁生疽名夾疽屬手少陰心經足太陰脾經足厥陰肝火熱毒上攻而然宜琥珀犀角膏犀角散黃連消毒飲活命飲加玄參桔梗黃連潰內者

難治

癰發嗑中名曰猛疽又曰喉癰屬任脉及手太陽手少陰積熱憂憤所致宜清熱攻毒用琥珀犀角膏黃連消毒飲紫金丹烏金散選用壯實者一粒金丹下之過時不治穿潰咽嗑者死

癰癧第四十四

癰癧之證屬於三焦并肝膽二經多起於耳後少陽之分結核如豆大如銀杏連續者名癰癧浸淫於陽明太陽流注於腋脇堅硬如石形長如蛤者名馬刀

若排行成列或二或三或六或七相聚名蟠蛇癧宜早治止生壹個於頸項者名單窠癧最稱難治一胞裹十數枚者名蓮子癧以手觸之能轉動者尚可用藥堅硬者必發熱躁渴雖神聖亦無如之何生於頸項或左或右初則單生後重疊見之名重臺癧藥石無功鍼灸難効萬死一生害人甚速形似燕窩者名燕窠癧亦不可治初生在項漸至四肢遍體結毒名流注癧

總之因怒火風熱血燥或肝腎二經精血虧損虛火內動或恚怒氣逆憂思過受風熱邪氣內搏於肝

肝主筋肝受病則筋縮累累如貫珠也

初覺增寒惡熱咽項強痛或寒熱熯痛乃肝火風熱而氣病也便用清肝益榮湯梔子清肝湯柴胡清肝湯及小柴胡湯以清肝火加味四物湯以養肝血若手推可動而滑軟者屬痰也以化痰為主用二陳湯加防風桔梗黃芩竹瀝見於少陽之分者柴胡通經湯見於陽明之分者升麻調經湯

若寒熱止而核不消乃肝經火燥而血病也用加味逍遙散以清肝火六味地黃丸以生腎水或初用五香連翹湯或牡蠣大黃湯疎下二三次或服內

消丸皂角丸之類外貼十香膏烏犀膏及淋瀝腫湯潰毒湯時加淋瀝內外兼治必使之消散可也此證不比疔疽爲害之速故人皆玩視殊不知腫結日深流注愈廣經久不瘥變而成癭元氣虛敗則爲不治面色眊白乃金尅木之象亦不治赤脉貫瞳人有幾條則幾年死非可忽之疾也且其臭穢醜觀豈宜治之不早旣用前藥矣卒不可退其人面色痿黃患處腫高稍軟皮膚壯熱膿已成也宜以鍼刺核中或用火鍼刺法內維蟾酥膏外用烏犀十香等膏仍服托裏之劑三日後取去核中稠

膿膿盡則又取核外薄膜先破初起之核以絕其源餘核不消盡如前法次用金寶膏龍珠膏等藥除去其根而服除風熱之藥自是可愈

若已成癩者則用蒜餅子灸法瘡口敷紫金散翠雲散或貼琥珀膏回燕膏之類巢氏病源載癩癧有三十六種千金聖惠論癩癧有九漏內經謂陷脉爲癩畱連肉腠總論說有風毒熱毒氣毒之異故先哲立法不一而必効散立應散瓜萋散大有奇効

丹漢云治癩癧以必効散與瓜萋散相間而服神効然必効立應二散非王道之劑服後宜酌量調治體實風熱盛者宜宣熱丹體虛者托裏益氣湯或八物湯合二陳湯多服則瘡口自斂若虛甚者先服人參養榮湯患之輕者止用斑鷄丸便堅胃盛者白蠶丸或追膿敗毒散軟硬皂子丸若附筋而生肉色不變內熱口乾精神倦怠久不消潰及肝脉弦緊腎脉洪數乃腎水不能生木以致肝火虛動筋攣忌風熱燥藥至於破爛日久膿血大泄則脾腎愈虧火炎燥肺均宜用腎氣丸補中勝毒餅爲主兼服逍遙散加桔梗麥門冬玄參以清肺火

若多怒有肝火者清肝解鬱湯有寒熱者單夏枯草散肝火旺盛或近骨處生蟲作痒者蘆薈丸通用貓頭丸海藻散堅丸外治宜銀右散蠶繭散虛弱者內服單夏枯草膏外加麻油攤貼若歲久不斂變而爲癩宜大補氣血兼用薰洗平肌塞竅之藥如白蛇散者是也

外臺秘要云肝腎虛熱則生癩病機云癩癧不係膏梁丹熱之變因虛勞氣鬱所致宜補形氣調經脉其瘡自消不待於汗之下之也若不詳脉證經絡受病之異妄施汗下犯經證病證者虛虛之禍如

指諸掌

患此者須加意於三不惑則可保全萬一若男子患此最怕咳嗽潮熱女人患此亦忌經閉潮熱但以玉燭散和血通經服之自消經久閉者用加味逍遙散清肝益榮湯以上治法雖若詳盡而證變不一更集治療次第使用者知所取舍云

治療各有次第初覺憎寒壯熱咽項強痛腫結不消者用羌活連翹湯又時服消癧丸又以稜鍼刺破令出血以拔毒湯淋洗一日累刺累洗五六次刺時放蟾酥末少許於鍼處上以琥珀膏貼之更以

內消膏貼之久之自然消散若已潰不愈宜益氣
養榮湯八物湯加柴胡地骨皮夏枯草香附貝母
多服取効

焮赤腫痛脉沉數者邪氣實也宜泄之用化毒消腫
和裏散加減

腫痛憎寒發熱或拘急脉浮邪在表也宜散表用荆
防敗毒散加減

因於怒者宜疎肝行氣以小柴胡湯加青皮青木香
紅花桃仁腫硬不潰者宜補氣血用益氣養榮湯

潰後不斂者氣血俱虛也宜大補先用益氣養榮湯
次十全大補湯加香附貝母遠志

虛勞而致者宜補之先服補中益氣湯次服益氣養
榮湯

因有核潰而不斂者以鍼頭散腐之以益氣養榮湯
補之

脉實而不斂或不消者下之用羌活連翹湯 腫痛
發寒熱大便秘者先用羌活連翹湯次用神仙活

命飲
耳下結核腫痛發寒熱宜荆防敗毒散表證悉退用

散腫潰堅湯

腫硬久而不消不作膿者服散堅敗毒藥不應灸肘尖肩尖再服益氣養榮湯

潰後發熱煩躁作渴脉大無力此血虛也宜當歸補血湯次用聖愈湯八物湯加貝母遠志若因勞心

過度頸腫發熱服敗毒散加服補中益氣湯

清肝益榮湯 肝膽小腸經風熱血燥筋攣結核或耳項胸乳脇肋作痛

山梔 當歸 白茯苓 木瓜 各壹錢

柴胡 川芎 白芍藥 白朮 炒各壹錢

甘草 炙伍分 龍膽草 捌分 熟地黃 壹錢伍分

右薑水煎服

梔子清肝湯 治三焦及足少陽經血虛肝火風熱耳內作痒或生瘡出水或頸項胸乳等處

作痛或寒熱晡甚自汗口苦或目唇搖動等證

山梔 柴胡 牡丹皮 各壹錢 茯苓

川芎 芍藥 牛蒡子 當歸 各柒分

甘草 伍分

右水煎服

柴胡清肝散 方見鬚疽條

小柴胡湯 方見耳瘡條

二陳湯 方見痰核條

柴胡通經湯 治項側有核堅而不潰名曰馬刀亦治癩癧

柴胡

連翹

當歸尾

生甘草

鼠粘子

荆三稜

黃芩

桔梗各貳分

黃連伍分

紅花少許

右水煎食後稍熱服此攻裏內消之劑

加味道遙散

治潮汗虛甚者

芍藥

白朮各壹錢

白茯苓

麥門冬

生地黃各陸分

甘草

桔梗各貳分

地骨皮

當歸各捌分

山梔仁

黃栢各叁分

右水煎服

六味地黃丸

即腎氣丸

方見掌疽條

五香連翹湯

牡蠣大黃湯

方俱見初起湯藥條

內消丸

方見初起湯藥條此亦可用之方

十香膏

方見膏藥條

淋濁腫湯

方見濁瀆瘡腫條

金寶膏

方見痔漏條

龍珠膏

龍牙草

伍兩

棘棗根

伍錢

海藻

貳錢伍分

蘇木

伍錢

右咬咀用水貳拾碗煎至拾貳碗濾去渣又用

桑柴灰

石灰

蒼耳草灰

各壹碗半

以草紙二層皮

紙二層鋪於籬底置灰於上以前所煎之水熱淋
取灰汁拾碗許澄清入鍋內煎成膏入白丁香石
膏輕粉各伍錢麝香壹錢攪勻收磁罐內用以敷
癰核壹日壹換併磨去之再上新藥其核即潰而
愈根小者只敷根上

琥珀膏

貼癰癰未潰可消已潰即斂

琥珀

壹兩

木通

桂心

當歸

白芷

防風

松脂

朱砂

壹兩

木鱉子肉

各伍錢

丁香

木香

各叁錢

右琥珀桂心朱砂丁香木香各為極細末和勻其

餘以芝麻油壹觔搗兩煎藥黑色濾去渣照油實

數每油壹觔下淘洗炒淨黃丹搗兩膏成稍溫下

琥珀等末

回燕膏

治癰癰已潰寧波僧人患此類項盡腐遇一
鄉士夫在宦所得此方以授之即全愈僧乃
珍藏以索人高價總帥李
天衢百計得之試果有效

穿山甲

伍錢

五靈脂

研羅去
渣伍錢

男子頭髮

肆兩皂角
水洗淨

右用香油壹觔肆兩慢火煎至髮熔盡穿山甲已

黑濾去渣秤油實重若干兩以折半為準將淘洗

淨炒過黃丹炒過官粉共合油之半徐徐以柳枝

攪油而下候丹粉已發下枯白礬末貳兩再下煮

洗過松香末肆兩再下煮洗過黃蠟肆兩又下朝

北燕窩土研細末貳兩候藥成醬盪色離火稍冷

下輕粉乳香麝香各伍錢卽傾入水拔洗去火毒

必効散

癩癧氣血無虧癧核不去者服之大有神効雖有斑猫然已炒熟且有巴豆制之弱者先服益氣養榮湯數貼壯者服後用益氣養榮湯屢試屢驗

南硼砂

貳錢伍分 輕粉

壹錢 麝香

伍分 巴豆

去皮心膜伍粒

斑猫

肆拾個去頭足翅同糯米炒以米黃爲度去米不用

白槿榔

壹枚

右研極細末取鷄子貳個去黃留清調藥仍入殼

內以溼紙數重糊口入飯甑蒸熟取出曬乾研細

壯者壹錢弱者伍分炒生薑煎好酒壹甌五鼓調

服如覺小腹痛卽用益元散壹服其毒從大便出

孕婦勿用

立應散

連翹

赤芍藥

川芎

當歸

甘草

滑石

各伍錢

黃芩

叁錢

斑猫

米炒叁錢

川烏尖

柒個

土蜂房

蜜水洗飯上蒸晒乾

白牽牛

伍分

右爲末每服壹錢濃煎木通湯調臨臥服毒從小

便出如粉片血塊是也未効再服繼以宣熱丹解

其風熱且斑猫性毒濟以烏尖或衝上麻悶者嚼

葱白茶清下以解之如小便澀用燈心煎湯調五

苓散服患處用好膏貼若宜導癰疽惡毒去黃芩
瓜蒌散 方見乳癰條

宣熱丹

薄荷

皂角

連翹

何首烏

蔓荊子

三稜

荊芥

各壹兩

右為末用熱醋浸淡豆豉貳兩伍錢搗膏和九桐

子大每參拾丸熟水下日壹服解癰癧風熱之毒

自小便出宜毒之後病雖愈宜常服之

托裏益氣湯

治癰疽腫硬肉色不變或脯熱或潰而不斂并一切血氣內虛證如口乾加五味子麥門冬寒熱往來加柴胡地骨皮濃清加黃耆膿多加川芎肌肉遲生加白斂肉桂

白朮

貳錢

人參

茯苓

貝母

陳皮

香附

芍藥

當歸

熟地黃

各壹錢

桔梗

甘草

各伍分

右水煎服

八物湯

方見乳癰條

人參養榮湯

治積虛成損四肢倦怠肌肉消瘦面少顏色吸吸短氣飲食無味

白芍藥

叁兩

當歸

人參

白朮

甘草

黃耆

肉桂

陳皮

各壹兩

熟地黃

五味子

茯苓

各柒錢

遠志

伍錢

右每貼參錢薑水煎空心溫服虛甚者煉蜜為丸

可以常服如遺精加龍骨咳嗽加阿膠麥門冬挾
火加知母黃栢

斑鷄丸 治癩癧多年不瘥

斑猫 壹兩 薄荷 肆兩

右為末以鷄子清和丸棗豆大空心及臨臥茶清
下壹丸每日加壹丸加至玖丸每日減壹丸減至
壹丸又每日加壹丸加至五丸後每日仍服伍丸
以臍下痛小便取下惡物為効如小便秘吃葱茶
少許或用烏鷄子壹個頂上開壹竅攪勻以斑猫
壹個入內以紙封之蒸熟去斑猫吃蛋壹日壹個

煎生料五積散送下不過肆伍枚已破者生肌未
破者消散

白蠶丸 治蟠蛇癩宜平服此或單用海藻壹觔浸酒服亦可

海藻 殭蠶

右各等分為末取白梅肉湯泡搗丸桐子大每服
陸柒拾丸臨臥米飲下毒從大便泄去忌豆心鷄
羊酒麵日伍陸服

追膿化毒散 治一切癰疽癩癧便毒痰火胸緊初起下以平之

穿山甲 當歸 大黃 各壹錢 玄明粉

殭蠶 乳香 沒藥 各壹錢 白芷 貳錢

右水煎服

軟硬皂子丸

玄參

連翹

各壹兩

皂子

壹盞去粗皮黃心

右水伍盞煮乾揀軟者食後細嚼津液下硬者蜜丸如彈子大每夜含化壹丸半月即効

腎氣丸

方見掌疽條

補中勝毒餅

治癩癧馬刀

黃耆

壹錢

人參

叁分

甘草

伍分

以上參味調氣補中為主

生地黃

熟地黃

白芍藥

當歸

各叁分

以上四味和血生血涼血惟芍藥兼能益氣之

虛

陳皮

叁分

升麻

伍分

柴胡

伍分

連翹

壹錢

防風

伍分

右參項俱為細末湯浸蒸餅調劑捏作餅子晒乾搗如米粒大每服叁錢白湯下

清肝解鬱湯

方見乳癰條

夏枯草散

治癩癧潰爛久不愈者

夏枯草陸兩水煎服甚者多取數筋煎成膏水調服仍以香油調搽

鼠髮膏

用鼠骨壹副亂髮如鷄子大以三年臘月猪脂煎令骨髮俱消半塗瘡上半以酒調服須臾鼠子從瘡口出

蘆薈丸

蘆薈

木香

蝦蟇

酒浸炙黃去骨

檳榔

黃連

各壹兩

蕪荑

去皮

青皮

陳皮

各伍錢

巴豆

貳拾壹粒去殼油

右為末猪膽汁丸如小豆大二三歲兒參拾丸米飲下

貓頭丸

治瘰癧馬刀不問遠年近日已破未破用此加減得宜皆效

貓頭骨

壹個酥炙

蝙蝠

壹個以硃砂參錢填入腹內瓦上炙焦

南星

白礬

各壹兩

右為末用黃蠟溶化和丸菜豆大每服參拾丸臨臥米飲下

海藻散堅丸

治瘰癧馬刀堅硬形瘦潮熱不食兼治一切瘰癧氣

昆布

龍膽草

蛤粉

通草

貝母

枯礬

真羅松

各參錢

麥麵

肆錢

半夏

貳錢

右為末酒調服或蜜丸菜豆大每參拾丸臨臥白

湯送下或含化嚙之忌甘草魚鷄猪肉五辛生冷

銀右散

朱砂

雄黃

蛇含石

磁石 各壹錢 伍分

明礬 壹錢

銀右石

乳香

沒藥

各壹錢 伍分

信石

白丁香

各陸分

麝香

叁分

牛黃

壹分

巴豆

貳錢 伍分

右為末唾津調勻用患人男左女右手塗瘡上外用筆蘸藥圈四圍藥點中間水粉膏貼之上藥一七二七其核自落後用生肌散

蠶繭散

蠶繭 叁個

白朮

信石

各壹錢

右俱火煨為末摻爛肉上三日其核即下

白蛇散

治九漏癰癧增寒發熱或痛或不痛利後用海藻石決明羌活瞿麥各等分為末米飲調

下貳錢日三服下盡清水後用調補藥以除病根

白花蛇

貳兩

青皮

黑丑

各伍錢

生犀角

伍分

右為末每壹錢入膩粉伍分研勻糯米飲調下以利下惡物十日後再進壹服忌發風壅熱物如瘡已成者一月可効

黃連消毒湯

方見初起湯藥方條

東垣柴胡連翹湯

治馬刀瘡癰癧

肉桂壹分

歸尾叁分

鼠粘子

炙甘草

生地黃

酒黃栢各壹錢

柴胡

黃芩炒

酒知母

連翹各壹錢伍分

瞿麥壹錢

右水煎食後熱服

東垣消腫湯

治馬刀瘡

鼠粘子炒

黃連各伍分

歸尾

甘草各柒分

瓜蒌根

黃耆各壹錢

連翹貳錢

生黃芩

柴胡各壹錢貳分

紅花少許

右水煎食後熱服

東垣散毒潰堅湯

治馬刀及癩癧

龍膽草

酒洗四次瓜蒌根酒洗

黃栢酒洗

知母酒炒

桔梗

昆布酒洗各伍分

柴胡肆分

甘草炙

荆三稜酒洗炒

廣茂酒拌炒

連翹各叁分

乾葛

白芍藥

歸尾各貳分

黃連

升麻各壹分

黃芩八分酒炒壹半生壹半

右水煎食後臥下足高頭低乘熱每含一口作十

數次嚥下務使藥氣上畱仍以前方加炒海藻伍

分合丸藥煉蜜如菉豆大每服壹百丸方內海藻

反甘草但東垣妙處正在此二味也

東垣升陽調經湯

治癩癧遠頸或至頰車皆屬足陽明胃經若瘡根深遠隱曲肉底屬

足少陰腎經乃戊胃傳於癸腎名爲夫傳妻俱作塊子堅硬大小不等並皆治之

升麻八分

龍膽草酒炒

葛根各肆分

黃芩酒炒

廣茂酒炒

荆三稜酒炒

甘草炙肆分

歸尾

白芍藥各叁分

黃栢酒炒

知母酒炒

右水煎服如上法仍以十倍煉蜜作丸服

東垣連翹散堅湯

凡耳下或至缺盆肩上生瘡堅硬如石動之無根名曰馬刀屬少陽

經或生兩脇已破未破並皆治之

柴胡壹錢

龍膽草酒炒

土瓜根酒炒

黃芩酒炒

歸尾

生黃芩

廣茂

荆三稜酒炒

連翹

白芍藥各伍分

炙甘草叁分

黃連酒炒

蒼朮米泔浸

右水煎服如上法仍以十倍煉蜜作丸服

補陰八珍湯

治癩癧等瘡

當歸

川芎

熟地黃

白芍藥

人參

白朮

白茯苓

炙甘草

黃栢酒炒

知母酒炒

右水煎服

瀉青丸

肝經實熱癩癧腫痛寒熱或脇乳作痛大便秘結

當歸

山梔

大黃炒

羌活

防風

龍膽草酒炒

右各等分爲細末生蜜丸如鷄豆大每服壹貳丸
白湯送下

紫參丸 熱毒癩癧腫毒未成者內消已潰者行膿止痛散腫

紫參 苦參炒 麝香 另研 膩粉 各壹兩

丹參 壹兩伍錢 連翹 貳兩 滑石 貳兩伍錢

右爲細末另以玄參壹觔搗碎以酒參碗浸三日
揉取汁去渣又以皂角子參百個煨熟爲末和玄
參酒熬成膏卻入前七味藥末丸如梧子大煎黃
耆湯日服壹丸逐日加至患人歲數以貳拾丸爲
則仍日減壹丸其瘡自乾未潰者自消大有神効

消毒化堅湯 治癩癧馬刀生耳之前後或項下胸膈已破未破並皆治之

炙甘草 龍膽草 薄荷 各肆分 黃芩 伍分

天花粉 白芍藥 玄參 各陸分 昆布

羌活 鼠粘子 升麻 各柒分 黃耆

當歸 柴胡 桔梗 各壹錢 連翹 壹錢伍分

陳皮 捌分

右加薑水煎食後服或加甘草節知母貝母海藻
更佳

益氣養榮湯 治頸項等處患腫不拘軟硬赤白或潰而不斂

人參 白茯苓 貝母 陳皮

香附

當歸

川芎

黃耆

鹽水拌炒

熟地黄

酒拌

白芍藥

炒各壹錢

甘草

炙

桔梗

各伍分

白朮

炒貳錢

右水煎熱服

東垣三聖丸

治療癩劫藥

丁香

伍拾粒

麝香

壹錢另研

斑猫

拾個去頭足翅同糯米炒

右為末同鹽豉伍拾粒湯浸爛研如泥和前藥末丸如棗豆大每服柒丸食前溫酒送下日用參服至五七日覺小便淋瀝是藥之効小便所下如青筋膜乃病之根忌溼麵毒食

內消連翹丸

連翹

叁兩

漏蘆

胡桃仁

夏枯草

土瓜根

射干

澤蘭

沙參

白芨

各兩半

右為末胡桃仁研勻酒糊為丸空心鹽酒送下

許學士云夏枯草大治癩癧散結氣有補養厥陰血脉之功而經不見觀其能退寒熱虛者儘可倚仗實者以行散之藥佐之外施艾灸漸可取効一方以夏枯草陸兩一味水煎六七分時服此癩癧之聖藥或竝十全大補湯服

破結散 治癩癧馬刀五癭大有神効

海藻 酒淨

龍膽草 酒炒

海蛤粉

通草

貝母 去心

昆布 酒洗

礬石 枯

松蘿 各參

真桑寄 生代

麥麵 炒肆

半夏麵 貳

錢以

右爲細末每服貳錢熱酒調服忌甘草鯽魚雞肉并辛辣生冷此方平易効雖不速然亦無害

龍泉散 內服連翹散堅湯外宜服此

龍泉粉

即磨刀石上粉也青石者佳

瓦粉

廣茂

荆三稜

酒洗

昆布

各伍

右爲細末熟水調塗去病猶速

羅謙甫稱曲陽縣劉牌師善治癩癧其効甚捷授予

四方太乙膏玉燭散尅効散翠玉膏試之每每効

太乙膏 治癩瘡神効

沒藥 肆

麝香 叁

輕粉

乳香 各貳

腦子 壹

右乳沒粉俱爲細末腦麝另研用香油壹觔柳枝

壹握葱柒根先在銅鍋內慢火熬至油黑色滴水

中不散濾去渣稱油每兩下丹伍錢照火候成膏

以軟硬得中爲度先入乳沒粉參味膏溫入腦麝

玉燭散 治癩癧和血通經

當歸

白芍藥

大黃酒蒸

甘草

熟地黃

芒硝

黃芩

川芎各等分

右為麤末每服參錢薑水煎去渣服七八日見効

尅効散

斑猫

肆拾玖個不去足翅炒

官桂伍分

粳米肆拾玖粒

赤小豆

肆拾玖粒

礪砂煮熟方用

右五味俱研為細末煎樟柳根湯初服貳分伍釐次服伍分又次柒分伍釐又次壹錢俱空心服以小便淋瀝為効雖惡心嘔吐黃水無妨按斑猫雖毒而通經脉所必用且能疎滲小便以瀉心火也

翠玉膏

治瘰癧腫膿瘻

瀝青

肆兩

沒藥

參錢研末

黃蠟

銅綠各伍錢

右先將銅綠為細末入香油調勻次將黃蠟瀝青火上熔開入前銅綠油火上攪勻熬待油熟方入沒藥又攪勻將藥傾入河水內扯拔去火毒照瘡口大小捏成餅子貼上

羌活連翹湯

治瘰癧初發寒熱腫痛

羌活

連翹

防風

夏枯草

柴胡

昆布

枳殼

牛蒡子

黃芩

川芎

甘草

金銀花

右加薄荷水煎次以追毒散行之以化堅湯消之
大効

防風羌活湯

治癩癧發熱

防風

羌活

連翹

夏枯草

升麻

川芎

黃芩

牛蒡子

甘草

昆布

海

殭蠶

右薄荷水煎服虛人加人參當歸實加黃連大黃

加味敗毒散

治風熱上壅頸痛或因怒氣發寒熱服此方四五劑不應再服益氣養榮湯

卽荆防敗毒散加玄參牛蒡子

方雜

小犀角丸

常服除去根本截其源流應効如神諸癩並治

犀角

黑牽牛

半生半炒

青皮

陳皮

各壹兩

連翹

伍錢

右爲細末用皂角貳條去皮弦子泡槌以布絞取汁壹碗又用新薄荷貳觔研取汁同熬成膏入前藥末爲丸如梧子大每服叁拾丸連翹煎湯食後服間以薄荷煎湯服

入神散

治癩癧未破者百藥不効此方如神

杏樹葉

陰乾爲末伍分

蝙蝠

火焙乾爲末

白花蛇蛻

燒灰存性爲末

人中白

火煨爲末各貳分伍釐

蜜蜂

柒個焙爲末

右用清水調杏樹葉末卻入後四味調勻敷患處
 以綿紙壹片鍼刺小孔貼藥上水乾再用清水紙
 上刷之每壹晝夜換壹次如面上發熱服清涼飲
 子數貼

破堅散 治癩癧未破神効

白膠香 海螵蛸 降真香 取心各等分

右為末摻患處外以溼紙掩之一夕而退

復全膏 治癩癧未破神効

蜜蜂 貳拾壹個 蛇蛻 柒分伍釐

右用香油肆兩入貳味漫火熬化濾渣入光粉貳

兩以桑枝急攪候冷在水中浸七晝夜紙上攤貼
 患處

托裏救苦神應丸 治流注癩

烏頭 伍兩 當歸 酒浸壹宿 沒藥 白芷

陳皮 甘草節 各壹兩 蟬蛻 水洗五兩 薑黃 壹兩伍錢

大皂角 柒錠去皮弦子 川烏附 去皮臍生用壹兩

右用皂角敲碎水四大碗煎至貳大碗濾去渣用
 汁煮烏頭川烏候烏頭爛為度搗如泥其餘諸藥
 另為末和烏頭泥為丸如桐子大每服陸拾丸薄
 荷湯下若瘡既破穿鑿孔穴其處必生腫肉如指

大或黑或白乃風與氣搏宜驅風行經散氣之劑
以化氣調經湯主之

化氣調經湯 治流注癩瘡與神應丸間服

橘皮兩貳 羌活兩壹 白芷兩壹 皂角刺

天花粉各伍錢 甘草伍錢 牡蠣煨伍錢

香附末酒浸壹宿晒乾壹兩

右為細末每服貳錢用清湯不拘時候調下日服

參次

追奪神異湯 治癩癧脈有力者先服此而後用神應

辰砂 血竭各壹錢 麝香壹字共為細末 大黃

大甘草節各伍錢

右為咬咀作壹貼河水壹鍾煎半鍾調前末子臨臥服之

勝靈丹 治馬刀挾癩者從耳下或耳後下頸至肩

或入缺盆中者乃手足少陽經之分野其癩受心脾之邪而作也今將二證合治之

黃耆 壹錢護皮毛實腠理及活血氣 人參叁分補肺氣如

氣短及不調而喘者加之 升麻壹錢 真漏蘆伍分勿誤

葛根伍分 明經藥 甘草伍分能調中和 連翹壹錢

味走十二經凡瘡中之藥不可無者 當歸身叁分

能散血結與氣聚此瘡家之神藥也 牡丹皮叁分去腸胃 生地黃叁分 熟地黃叁分此

經中和血生 **白芍藥** 參分如夏月倍之其味酸其

血涼血藥也 **肉桂** 參分大辛熱能散結聚如陰證瘡

如冬月寒 證勿用 寒覆蓋其瘡用此大辛熱 柴胡 功同連翹如瘡不

之劑去之煩躁者勿用 昆布 參分味鹹若瘡堅硬甚

黍粘子 參分無 腫不用 **京三稜** 炮貳分此二味瘡堅硬

廣茂 參分 **防風** 各壹錢能散結 **麥芽** 壹錢能消

獨活 去上部風邪 **益智仁** 貳分如咳吐多者胃不和也 **黃連** 炒參分

或吐沫吐食胃中寒者加之 **神麴** 炒貳分食不 **厚朴** 薑製壹錢貳分

有熱或腿腳無力加之若煩躁欲 **黃栢** 炒參分

去衣者此腎中伏火也更宜加用 **右共為細末湯浸蒸餅捏作餅子晒乾搗如米粒**

大 每服參錢白湯下 如氣不順加橘紅甚者加

木香 少許量病人虛實消息之毋令藥多妨其飲

食 此治之大法也 如止在陽明分者去柴胡黍

粘子 三味餘皆用之 如在少陽分為馬刀挾瘦

去獨活漏蘆升麻葛根加瞿麥參分 如本人氣

素弱其病勢來時氣盛而不短促者亦可考其平

素宜作氣盛而從病變治之權也加黃芩黃連黃

栢 知母防已邪視氣在上中下而用之假令在上

焦 加黃芩 半酒洗 在中焦加黃連 半酒

酒 製黃栢知母防已之類選而用之 如大便不

通而滋其邪盛者加酒製大黃以利之 如血燥而大便乾燥者加桃仁泥大黃 如風結燥不行者加麻仁大便以潤之 如風澁而大便不行加煨皂角仁大黃秦芫以利之 如氣澁而大便不通者加郁李仁大黃以除風燥 如陰寒證為寒結秘而大便不通者以局方半硫丸或加炮附子乾薑煎成候冰冷服之 大抵用藥之法不惟瘡瘍一家凡諸疾病氣數怯弱者當去苦寒之劑多加人參黃耆甘草之類瀉火補元氣餘皆倣此

老君丹 治癩癧并痰核結硬

老君鬚 肆分

紫背天葵 叁錢 乳香

沒藥

紅麩

防風

紅花 各叁分

梔子

血竭

孩兒茶

土茯苓

金銀花

白芥子 各伍分

當歸尾 捌分

草果仁 壹錢

川芎 肆分

右共搗為末先用獨蒜壹個順搗爛入好酒壹碗

攪勻復濾去渣入藥於內重湯煮一時去渣食後

臨臥服三劑全消妙不可言

生肌乾膿散

治癩癧馬刀膿汁不乾

黃連

貝母

降真香 燒存性

白芨

海螵蛸

五倍子 炒黑

芸香 各伍錢

輕粉 伍分

右為末用藥水洗次揆此末外貼膏藥

天葵丸 治瘰癧

海藻

海帶

昆布

貝母

桔梗 各壹兩

海螵蛸 伍錢

紫背天葵 壹兩伍錢

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服柒拾丸食後溫酒下

麝艾灸法 治瘰癧

以蕎麥麵做成圈子置於瘡之四旁將黃酒糟壓乾撒於圈中瘡上又用麝香入艾槌爛鋪糟上火燒艾過則再換俟瘡膿水乾為止貼後膏藥

應艾膏 貼灸後瘰癧

草麻子 壹百貳拾粒去殼

蜂房 貳個

右用香油肆兩熬草麻子枯黑慮植稱油每兩下官粉伍錢成膏入後藥

蛤粉 伍錢

沒藥

孩兒茶

龍骨

蜜陀僧 各貳錢伍分

乳香

血竭 各貳錢

右研極細和勻徐徐入膏中不住手攪將藥鍋坐在水盆之上出火氣紙攤貼其効如神

一丹溪方治瘰癧初發頭項硬未破牡蠣肆兩甘草貳兩為細末每服壹錢食後茶調一日二服半月

除根其効如神

遇仙無比丸 治癩癧

白朮

防風

郁李仁 湯泡去皮 檳榔

蜜陀僧

斑猫 去翅足用糯米炒去米不用

甘草 各伍錢

右爲細末麵糊爲丸如梧桐子大每服貳拾丸早晚煎甘草檳榔湯送下服至壹月覺腹中微痛於小便中取下癩子毒物有如魚目狀已破者自合未破者自消

治頸下卒結核漸大欲成癭瘡名海藻酒方

右用海藻昆布洗去鹹酒貳升浸壹宿取壹貳合

飲之酒盡將藥渣曝乾搗末酒調壹錢七日叁次

卽瘥如浸用絹袋盛了漬春夏貳日秋冬叁日

治癩瘡

野栗子一名追栗連殼燒灰存性苦絲瓜連子殼燒灰存性各等分爲細末菜油調敷不可入口

夏枯草湯

治癩癧馬刀已潰未潰或日久成漏者

用夏枯草 陸錢 水貳鍾煎至柒分去渣食遠服此生

血清熱治癩之聖藥也虛甚宜煎服膏兼十全大

補湯加遠志貝母香附和服并以膏塗患處佳

拔生膏

治諸般惡瘡及癩癧鼠瘡纒起點破卽愈

血竭 壹錢

蟾酥 壹錢

麝香 伍分

雄黃 伍錢

輕粉 叁錢

乳香 貳錢

沒藥 貳錢

右用蕎麥楷灰或真炭灰壹斗貳升淋灰湯捌玖碗用栗柴或桑柴文武火煎作叁碗取壹碗收雷將貳碗盛於好磁器內候溫將柴味藥碾為極細末入灰湯內用桑柳枝攪又用好細石壹升入藥灰湯攪勻候冷盛磁罐內凡諸惡瘡點在當頭壹日貳次以血水出為妙恐日久藥乾將前次雷者和湯和用

肩疽第四十五

肩生疽係手足三陽交會之所是名肩疽由風熱鬱結所致或因負重傷損而然竝宜烏金散勝金丹活命飲加柴胡桔梗

○缺盆疽生肩前陷中又名鎖骨疽屬足陽明胃經手少陽三焦經宜紫金丹奪命丹證退或潰後服十全大補湯是經少血多氣瘡口不合者殆

○肩膊後骨上生疽名曰上搭怒鬱所致屬太陽兼少陽經初起宜隔蒜灸服活命飲加羌活桔梗柴胡或勝金丹紫金丹奪命丹選用潰後十全大補湯黃耆木香散人參養榮湯

○項腋兩乳旁結核或兩胯軟肉處生腫塊是名瘰癧屬手少陽三焦經其發緩慢屬冷證非熱證宜回陽玉龍膏熱藥敷貼服內補十宣散勝金散

○夾肢癰生肩膊下隙內屬手少陰心經手厥陰心包絡風熱所致宜服內托黃耆柴胡湯壯實者一粒金丹下之老弱者黃耆木香散人參養榮湯十全大補湯

臂癰第四十六

垂臂兩處發接骨下臂鷺上起如鷄鴨卵大皆由榮衛不調所致宜急消或發穴早治 兩臂肘起在

接骨下引手至小骨上發癰此處連大小筋骨舉動不便垂手墜痛膿深徹骨或致傷筋拳縮不舒宜用緩慢筋脉藥治之

玄機云在臂外為癰在臂內為魚肚發在臂上節腫連肩髃為臂風毒宜活命飲加羌獨活桂枝桔梗水酒各半煎服及奪命丹紫金丹勝金丹選用壯實者可下若慢腫無頭服敗毒藥不動者用十全大補湯加桂枝桔梗托之

白芷升麻湯 治臂癰

白芷 壹錢 伍分

升麻

桔梗 各壹錢

黃芩 酒炒 肆錢

生黃芩 錢叁

紅花

甘草 炙各伍分

右水二酒一煎至八分服

肘之內生癰屬三陰經乃心肺胞絡鬱火引經用黃連升柴肘之外生癰屬三陽經乃胃大小腸積毒引經用藁本升柴竝用黃連消毒飲活命飲或烏金散紫金丹勝金丹選用壯實者可下老弱者黃耆木香散十全大補湯千金內托散
臑臂表裏俱赤唯肘節處差小俗名藕包以內外分陰陽俱同上治

油泥膏 治藕包

塘泥 倍一 桐油 倍三

右和勻以鷄鷲毛掃時時塗勿令乾

手疽第四十八 手發背 穿掌疽 手了刺 腕癰 指疽 天蛇頭 替指

○兩手背發癰疽無頭漫腫聚毒成瘡乃三陽經風熱鬱滯宜服活命飲加芩連山梔桔梗升麻寒加桂枝熱加薑黃水酒煎服有表證者紫金烏金奪命丹汗之有裏證者一粒金八陣散下之老弱者大補之

○手心毒赤腫名穿掌又名穿窟天蛇若偏於掌邊者名穿邊天蛇此手厥陰心包絡積熱所致初宜

隔蒜灸再服活命飲加桂枝薑黃實者酌表裏而汗下之仍於紫金奪命烏金一粒金丹選用既潰參耆大補之

一方用仙人掌根磨米醋煖塗又藜蘆子煎醋熏洗
○虎口結毒焮赤腫毒名合谷疽又名手丫刺又名擘蟹毒手陽明大腸經風熱積毒初宜隔蒜灸服活命飲加桂枝薑黃桔梗升麻水二酒一煎服汗下補三法皆同前例

○腕癰手屈之處結痛焮腫屬手三陰經風熱毒治法同前 宜用玉樞丹加蟾酥少許塗之

○手大指疽於大指頭發小點如粟漸大如豆如桃李或青或紫乍黃乍黑或痒或麻木或徹心大痛屬手太陰肺經積毒急服烏金散紫金丹汗之壯實者下之若攻心嘔吐不食及齒縫出血者不治若人患此指色黑者其指已死宜截去之不然黑至臂不治

○手指結毒焮赤腫痛名天蛇頭既膿裂開如蛇頭故名屬手厥陰心包絡積熱宜服活命飲加柴胡羌活桔梗及黃連消毒飲紫金丹烏金散選用用蒲公英同蒼耳草貳味等分爲末以好醋濃煎浸

洗即効 又蒲公英忍冬酒治天蛇頭極妙 或

用鮮公英搗細水和調半椀服之 又以椀患處

拔毒散 治毒瘡生手指間俗呼發指徹骨疼痛

乳香 泥蜂窩 多在一壁縫間

右為末 醞醋調塗乾再以醋潤之痛立止 或以

蜈蚣壹條燒煙熏之 或以鷄子清浸之

治蛇頭瘡 即天蛇頭在手足之間

雄黃 蜈蚣 全蝎 各壹錢

右為末瘡口開入藥在內以小油抹裁帛拴住如

乾小油搽潤

○代指生指甲內劇者爪為之脫得冷藥湯漬之佳

蓋爪者筋之餘筋賴血養血熱甚注於指端故指

腫熱結釀而成膿病同指疽然無蘊毒故色不黯

黑亦不殺人丹溪以烏梅入醋研浸患處立効

一方用酸漿水入鹽熱浸之冷再換 一方單用

甘草 一方單用芒硝或麻黃煎熱浸之

胃疽第四十八

疽發於胃名井疽初起如疔疔肉色不變若冷氣攻

心精神恍惚嘔吐冷痰毒母氣內陷腹脹滿者死

若心躁如焚肌熱如火次血汗唇焦引飲冷水是其

正候急服活命飲加黃連桔梗及勝金丹奪命丹汗之壯實者下之惡疔見者犀角解毒湯或爲丸
○疽發於膺在胸兩旁高處又名臆名甘疽色青苦寒熱治如上法

○心窩上兩乳間生疽名臈中發此乃氣之海能分布陰陽臟腑中陰陽不和七情鬱結則發宜活命飲加紫蘇薄荷汗之再以紫金等丹藥選用

○脾發疽生心窩下兩旁皆由過食煎燂醉飽入房所致治略同上數條亦可汗下

乳癰第四十九

乳癰之作多起於忿怒鬱悶以致胃火上蒸乳房汁化爲膿或爲其子口氣所吹而成治有多方効亦屢見然不分別經絡體認表裏終屬孟浪也

按乳房屬足陽明乳頭屬足厥陰故陽明之血沸騰則熱甚而成膿厥陰之氣不行則竅閉而成膿初起之時必忍痛揉令軟大吮令汁透自可消散若已成而爲癰癤治之之法以青皮疎厥陰之滯石膏清陽明之熱生甘草節污濁之血瓜蒌子消導腫毒或加沒藥青橘葉皂角刺金銀花當歸身爲湯爲散佐之以酒煎或一羣膏芷貝散爲主 氣

虛合四君子湯加芎歸柴胡升麻 憂思傷脾者

歸脾湯加瓜蒌根貝母白芷連翹甘草節水酒各

半煎服 因肝火結核腫痛者清肝解鬱湯乃正

治也再施隔蒜灸法尤効或服瓜蒌散或內托升

麻湯或復元通聖散加漏蘆虛者托裏消毒散

至若焮痛寒熱當發散表邪腫焮痛甚當清肝消毒

或氣虛血虛脾虛胃虛證變不一隨宜處治

如將潰之時兩乳間出黑頭瘡項下作黑眼者內托

升麻湯已潰寒熱者內托十宣散少食口渴者補

中益氣湯晡熱內熱者八物湯加五味子胃虛作

嘔者六君子湯加乾薑藿香過勞腫痛者八物湯

倍參耆歸朮遇怒腫痛者八物湯加山梔誠不可

以一方之効是拘也各書所載世俗所傳或方或

法均為已効竝錄以俟臨時酌用焉若荏苒歲月

而至傳囊僅有歸脾湯一藥可延歲時傳至一半

者死男子亦有患此者乃因房慾過度肝虛血燥

腎虛精怯不得上行所致宜瓜蒌散十六味流氣

飲餘證彷彿女人所患慎勿輕用清熱敗毒劑也

一 羶膏 治癰疽發背乳癰初起神効如要宜毒加皂刺壹錢

甘草 伍錢

沒藥 貳錢伍分

瓜蒌 壹個去皮研爛

右用酒參碗煎至壹碗半分兩次溫服重者再進

壹服以瘥為度或加當歸白芷乳香亦妙

芷貝散

凡有孕乳結核名內吹有見乳結核名外吹俱宜以此頻服乃不致潰膿若無乳者加漏蘆煎酒調服

白芷

貝母

各等分

右為末每服壹錢用酒調頻服

歸脾湯

當歸

龍眼肉

酸棗仁

遠志

人參

黃芪

白朮

茯神

各壹錢

木香

伍分

甘草

叁分

右薑棗煎服

清肝解鬱湯

治肝經血虛風熱或鬱火傷血乳內結核或為腫潰不愈

人參

壹錢

柴胡

八分

白朮

壹錢伍分

牡丹皮

八分

白茯苓

壹錢

陳皮

八分

甘草

炙伍分

當歸

壹錢伍分

貝母

壹錢

川芎

八分

山梔

炒

白芍藥

炒

熟地黃

各壹錢

右水煎服

瓜蒌散

治乳癰未潰者即散已潰者去石膏沒藥皂刺金銀花用歸身加人參黃芪川芎白芍藥

瓜蒌仁

青皮

各壹錢

石膏

貳錢

甘草

沒藥

歸尾

金銀花

皂刺

各伍分

青橘葉

取汁 貳匙

右水酒各半煎空心服

內托升麻湯

治兩乳間出黑頭瘡瘡項陷下作黑眼子并乳癰初起

葛根

升麻

連翹

各壹錢 伍分

黃耆

炙甘草

當歸

各壹錢

黍粘子

伍分

肉桂

叁分

黃栢

貳分

右水貳盞酒壹盞同煎服

復元通聖散

青皮

陳皮

各貳錢

甘草

叁錢

穿山甲

瓜蒌根

各肆錢

右為細末酒調服

托裏消毒散

治癰疽腫痛俱慢色不甚赤元氣虛弱或行攻伐不能潰散宜用之未成者消

已成者潰又去腐生新之劑加減同前虛弱及已潰者去翹芷金銀花三味消毒方見用藥條

內托十宣散

治一切癰疽瘡癤未成者散已成者潰膿自出無用手擠惡肉自去不犯鍼刀

服藥後疼痛頓減排膿生肌其効如神小兒痘疹亦宜用此托裏即排膿內托十宣散方見初起湯藥條

十六味流氣飲子

通行十二經之藥病在一經者不用

人參

黃耆

當歸

各壹錢

川芎

肉桂

厚朴

白芷

甘草

防風

烏藥

檳榔

白芍藥

枳殼

木香

各伍分

桔梗

參分

紫蘇

壹錢伍分

右水煎食後服若由忿怒者加青皮壹錢

神効瓜蒌散

治乳癰初起自消膿成即潰

當歸

伍錢

生甘草

伍錢

乳香

沒藥

各壹錢

黃瓜蒌

壹個子多者妙

右水酒各半煎服 一方有穿山甲貝母 一方

以此方各末入瓜蒌內重紙封之微火煨存性爲

末每用末貳錢酒下

瓜蒌大黃湯

治吹乳及一切惡瘡初起與瓜蒌散同功氣弱人與孕婦不宜服此

生薑

壹兩去皮

瓜蒌

壹個去皮

生甘草

大黃

各伍錢

右共搗爲一處水煎去渣入乳香沒藥末各壹錢

調服

連翹橘葉湯

治吹乳初起

連翹

川芎

瓜蒌仁

皂角刺

青橘葉

青皮

去穰

甘草節

桃仁

各壹錢

右水煎食後服

青皮散

治乳癰初發

青皮

去穰

穿山甲

炒

白芷

甘草

貝母

各八分

右爲細末温酒調服

蒲公英酒

治乳癰服後一睡其癰如失

蒲公英

忍冬藤

各壹兩

右用酒煎服渣搗爛敷患處

單方八條

一方以鹿角於石上磨取白汁塗之再三不得近手
再用人啣出黃水一日而散鹿角剉末酒服亦可
忌孕婦

一方葑菜地中蚯蚓糞搗碎塗之即愈

一方蛇蛻壹條燒存性入乳香壹錢共為末酒調服

一方獨核肥皂去核入糯米填滿溼紙包煨過存性

為末酒調服

一方真羯羊糞燒灰為末入麝香少許酒調服

一方苦葫蘆子焙乾為末酒調服

一方以貝母為末酒調貳錢卻以身覆桌上垂兩乳
令通

一方葱葉內灌蜜左乳吹右鼻右乳吹左鼻

乳岩第五十

乳岩由憂鬱積忿而成始有腫核大如栗核不痛不
痒人皆不知其隱伏之禍五七年後破而成瘡如
岩穴之狀雖飲食如常必洞見五臟而死但初起

便宜多服疎氣行血之劑攻散乃可十六味流氣
飲是也虛者用清肝解鬱湯或十全大補湯若至
成瘡終不可治若初起之時曾有以追風逐溼膏
貼而散之亦一神劑也

黃耆托裏湯

治乳岩潰爛此方解毒補血益氣

黃耆

排膿益氣生肌

甘草

解毒補胃氣

當歸身

和血生血

升麻

葛根

漏蘆

三味入足陽明經

連翹

防風

二味散結疎經

瓜蒌仁

黍粘子

皂角刺

引經

白芷

入陽明

川芎

參分

肉桂

參分

炒栢

右水壹盞入酒壹盞煎服

單煮青皮湯

治婦人拂意憂鬱乳內有核

青皮壹味用四錢細切水煎壹日貳服或加甘草

末生薑汁煎

橘皮散

治如前證

青皮

甘草節

石膏

各伍分

瓜蒌子

當歸頭

伍分

皂角刺

去皮壹錢伍分略炒去汁

沒藥

蒲公英

各伍分

右加青橘葉壹握酒煮食後或臨睡服

一方但覺乳中結核如棊子大不痛便以青皮甘草

為末用人參煎湯入薑汁少許食後調服壹貳錢

壹日夜五七次七日自消

一方用樺皮油核桃燒灰存性入枯礬輕粉少許香油塗敷

一方沒藥壹錢甘草叁錢當歸叁錢水煎入酒少許熱服

一方用人牙燒存性為末酥麻油調塗癰上

丁香散

治乳頭破裂

丁香壹味為末乾敷患處如燥用津唾調敷

脇疽第五十一

兩脇下起疽名發脇因心肝火盛虛中有熱而發屬

手厥陰心包絡足厥陰初起宜神効瓜萋散或柴

胡清肝湯或活命飲加柴胡不可過投陽藥潰後

亦惟清熱托裏兼資腎水斯得其法若下至臍上

及膝下兩旁一二寸發癰填氣伏硬急難潰膿且

偏難發穴穴後難合須先用煖內藥外用熱藥貼

令和軟若急破穴則朝夕出膿不住故須緩破使

其一湧而出易於將息也若虛弱人仍用大補藥

神効瓜萋散

方見乳癰條

柴胡清肝湯

方見鬚疽條

一方治脇下生瘡狀如牛眼膿血不止以鹽少許入

白牛耳取其垢以敷瘡卽瘥

一方用鷄糞搗爛入鹽少許醋和敷之則腫消痛止
膿成者敷之亦安

一方脇下至腰間腫赤如霞名丹毒甚至徧身青紫
急砭出惡血服防風通聖散再以紫金勝金丹_汗

腹癰第五十二

腹癰生於肚腹皮裏膜外左關脉洪數而腹痛甚者
乃其候也其因起於膏粱七情火鬱脾虛氣滯而
成但腹皮厚而脂膜脆易至內潰爲患不小惟宜
扶脾胃壯元氣爲主佐以行經活血之劑

若蔓腫堅硬肉色不變未有膿也宜四君子湯加芎
歸白芷枳殼或托裏散煨腫痛甚者邪氣實也先
服活命飲仍用隔蒜灸法以殺其毒後用托裏散
以補其氣

若至腫起而軟皮色紅者膿已成也宜托裏消毒散
以速其潰儻不自潰是氣血虛也已有白頭者用
替鍼丸未有白頭者以鍼刺之若誤服尅伐涼藥
必致腫不能潰潰不能斂壯者弱而弱者死急宜
大劑參耆薑附或十全大補湯救之

若發小腹疼痛而振身發寒熱名曰衝疽由心火熾

盛流入腎經所致活命飲勝金丹奪命丹選用五日變色可刺導引毒膿失治則五十日而死

背疽第五十三

發背有上中下三發俱在脊中屬督脉上發傷於肺發於天柱骨下中發傷在肝爲對發下發傷於腎爲對臍發皆因積熱怒氣所致初如粟米或麻或痒或拘急或不痛或大痛初覺便宜隔蒜灸之或汗或下或托量虛實治之凡發在上俱忌木通恐導虛下元也

三發總與他處不同宜速治活命飲加羌活紫金丹勝金丹奪命丹選用壯實者一粒金丹下之老弱者托之十日外不見膿不治

背脇之間兩三處名老鼠攢又名遊走血脾癰由怒氣積熱所致爲足少陽足厥陰二經宜順氣清熱之藥黃連解毒湯活命飲加黃連梔子或服紫金丹壯實者下之老弱者大補托之

又有當背心而痛及麻木累累如彈如拳堅硬如石名酒毒發宜黃連解毒湯加羌活乾葛或神効消毒散內疎黃連湯紫金丹紫金錠選用

又有背上細癩無數浸淫開濶如湯火傷煩躁口渴

此名丹毒宜黃連消毒散

又有背上生疽長竟尺如黃瓜名黃瓜癰疼痛引心
四肢麻木此證難治急服活命飲加羌柴紫金丹
勝金丹奪命丹神仙追毒丸選用

發背有五曰陰陽金石飲食瘴氣已見一卷論中大
約毒氣勇悍發如火焚初如手掌五六日如碗面
焮熱赤引浮面漸潰去紫瘀膿汁多而腫不退痛
不止發渴發逆嘔吐氣急浮淺開濶者尤宜發膿
托毒此乃陽證屬實

有大只如盞面而毒氣深沉緣內虛而毒已近膜必
內攻入臟腑卻入四肢先攻頭面次攻手足此乃
毒氣散入四肢其人聲嘶氣脫眼黑睛小十指腫
黑乾焦不治此陰證屬虛

精要云凡癰疽初發腫硬高起者毒氣卻淺此乃六
腑不和爲癰證屬陽勢急而易治若初發如粟粒
如豆許與肉平等或作赤色或覺痒甚母抓破此
乃五臟不調爲疽屬陰毒氣內畜勢緩而難瘳

大約發背之名雖多總之陰陽二證若初始發一粒
如豆便身熱焮赤疽處腫大熱痛此外發也屬陽
雖如盆盃可治初起身不熱覺倦怠疽處亦不

熱數日漸大不腫不痛卻低陷而壞爛此內發也屬陰難治

薛云發背屬膀胱督脉經或陰虛火盛或飲酒厚味或鬱怒房勞均可致之脉洪腫痛者為熱毒易治脉數無力色黯作渴為陰虛難治脉微細不腫不痛為甚虛尤難治

腫焮作痛寒熱作渴飲食如常此形氣病氣俱有餘先用活命飲次用托裏消毒散 若頭痛拘急乃表證先服人參敗毒散次用金銀花散槐花酒神効托裏散 焮痛腫硬脉實用清涼飲活命飲皆

參丸 腫硬木悶疼痛發熱煩躁引飲便秘脉沉實者內疎黃連湯清涼飲大便已利欲作膿者用活命飲托裏散外用神異膏

漫腫微痛或色不赤不思飲食此形氣病氣俱屬不足用托裏散調補之 若不作膿膿成不潰陽氣虛也托裏散加參耆肉桂 膿出而反痛或膿清氣血俱虛也八珍湯調補 惡寒不斂陽氣虛也十全大補湯 晡熱內熱或不收斂陰血虛也四物加參朮 作嘔欲吐或不收斂胃氣虛也六君子加炮薑 食少體倦不收斂脾氣虛也補中益

氣加茯苓半夏 肉赤不斂血熱也四物加山梔
連翹 肉白不斂脾虛也四君子加酒炒芍藥木
香

若初起未發出而寒熱疼痛作渴飲冷此邪氣內蘊
也仙方活命飲口渴飲熱漫腫微痛元氣虛也托
裏消毒散飲食少思四肢倦怠脾胃虛也六君子
湯不應加薑桂若真氣虛邪氣盛不能發出亦有
死者在旬日外見之

若已潰腐用托裏散以生肌不應急用溫補脾胃若
脾氣虛弱不能收斂亦有壞者在月餘外見之

若已發出用托裏消毒散不腐潰用托裏散不應急
溫補脾胃若真氣虛弱不能腐潰亦有壞者在二
旬之外見之

治發背有火照方名神燈照火方并敷藥二方俱秘
方已見用藥論中

大抵初起邪氣盛大用隔蒜灸法灸終不痛明灸之
但未潰已前皆可灸更用箍藥圍之更用烏金等
膏點之候有瘡口以烏金膏或翠青錠子緝之

腰疽第五十四

纏腰火丹

或問十四椎旁腰腎之間發疽何如曰此名連腎發

卽下搭也由房勞大過傷腎水而致其證口乾作寒熱百節疼痛急服勝金丹活命飲黃耆內托散不治潰爛透膜而死若咳嗽嘔噦腰間似折不能俯仰者死

有腰胯之間患疽如石經月不潰名石疽屬少陽陽明二經之積熱邪毒固結元氣不足不能起發急服活命飲加羌獨活柴胡黃芩及紫金丹汗之壯實者八陣散一粒金丹下之老弱者十全大補人參養榮湯托之嘔噦不食神昏脉散者死

遶腰生瘡累累如珠名火帶瘡卽纏腰火丹由心腎不交肝火內熾流入膀胱纏於帶脉故如束帶急服活命飲內疎黃連湯壯實者下之外用清熱解毒藥敷之不早治毒由臍入膨脹而死

治蛇纏瘡用雄黃爲末醋調塗仍酒調服丸爲蛇傷蜂蠆蜈蚣毒皆治之

便毒第五十五

腿胫兩處起爲便毒生於小腹下兩腿合縫之間大道前小道後初發寒熱交作腫起疼痛是也大慾不能直遂故敗精搏血雷聚經隧結爲便毒每在腿與小腹合縫之間精氣所出之道初起忌寒涼

之藥恐氣血踰滯不能宣通反成大患唯宜開鬱散氣清利熱毒使精血宣暢則自愈
謂便毒由於鬱火敗精固是一說然亦有交合不潔淫火衝動膚腠開通亦致受毒初發之時切忌敗毒之藥何也毒邪非虛不入若復虛胃氣則毒邪下陷治之更難收功初宜發汗次利小便膚腠所感之邪汗之易散陰莖腿縫皆肝經絡肝腎主下焦又肝主小便故令毒邪從小便中出皆正治也若已發汗利便而體厚邪固不得宣通乃以敗毒活血調氣之劑攻之俟毒氣宣通隨以補劑托之亦不失先後着也

薛云便癰屬厥陰肝經內熱外寒皆由房慾不節或慾心不遂強固其精或肝經溼熱所致內熱外寒者雙解散勞倦過度者補中益氣湯慾心不遂者先用五苓散加大黃疎其滯精後用六味丸補其肝腎以固其精或溼熱壅滯者龍膽瀉肝湯疎肝導滯

便癰發於厥陰肝經之絡脉衝任督脉之隧道七疝之中此爲血疝俗呼爲便毒以其近於二便也婦人患此多在兩拘腫痛或腹中結塊小便澀滯治

之得法不難奏功不宜槩用大黃等劑以求內消致損氣血大抵先宜疎導更用托裏

表證腫痛發熱用荆防敗毒散或雙解散

裏證焮痛大小便秘脉有力用玉燭散或龍膽瀉肝湯

虛弱人用參耆歸朮補托白芷皂角刺柴胡澤瀉山

梔甘草節排膿清肝火潰後用八珍湯十全大補湯補養此大槩必用之法也

表證發熱用小柴胡湯加青皮退後用補中湯加穿山甲或再用托裏之藥最妙

清肝火導溼熱用八正散或小柴胡湯加知柏芩歸勢重者用仙方活命飲

小便不利肝脉數用加減龍膽瀉肝湯加山梔黃柏服尅伐藥而致大便不利先用二神丸次用十全大補丸倍白朮茯苓

或有遺精滑精等證大便不利腰脚沉重者下元虛也仲景主氣血俱虛用六君子加破故紙肉苳蔻數劑再用十全大補湯

婦人兩拘腫痛腹內有塊不時上攻小便不利屬肝脾氣滯用四君子加柴胡芎歸山梔或間以加味

歸脾湯龍膽瀉肝湯加味道遙散選用

玉燭散 即四物湯合調胃承氣湯各半

加減龍膽瀉肝湯

龍膽草 酒炒

澤瀉

車前子 炒

木通

生地

當歸尾

山梔

黃芩 各壹錢

甘草 生用 伍分

水二鍾煎食前溫服溼熱加黃連大便秘加大黃

雙解散

便毒外挾風邪內蘊熱毒或交構失宜精血妄錯腫結疼痛

辣桂 壹錢

大黃 叁錢

白芍藥

澤瀉

牽牛 炒 梓

桃仁 各貳錢

甘草 壹錢

右加生薑五片煎服

神効祛毒散

治便毒一方用大黃黑丑各通真散不用蜈蚣朴硝

當歸 貳錢

甘草節 伍分

木鱉子 壹枚 去殼

殭蠶 壹錢 炒

穿山甲 炒 壹錢

皂角刺 伍分

右酒水各半煎再用大黃叁錢朴硝貳錢蜈蚣壹

條去頭足炙為末以前煎成熱藥衝和空心服用葱

湯漱口仍飲數口利下膿血數次再服冲和解毒

湯二服

瀉毒湯 治便毒

青皮

白芷

柴胡

赤芍藥

檳榔

朴硝

烏藥

木瓜

大黃

連翹

瓜蒌

生地黃

節

黃芩

三稜

蓬朮

犀角

皂角刺

右各等分水參蓋煎壹大碗飢時服以瀉為度

消毒散

治便毒三四日可消

皂角刺

金銀花

防風

當歸

大黃

甘草節

瓜蒌實

各等分

右水酒各半煎服食前溫服仍提掣頂中髮立効

止痛方

治便毒腫硬不消不潰痛不可忍此藥一服立止

人參

大黃

各伍錢

右水酒各半煎壹盞入乳沒各壹錢空心服

牡礪散

治血疔

當歸

甘草節

滑石

煨

牡礪

煨各壹錢伍分

大黃

參錢

木鱉子

伍枚去殼杵

右作壹劑水貳鍾煎壹鍾露壹宿五更服冬月頓

溫服服後未潰者膿從大便出按此導滯之劑

宜久曠房慾便秘發熱或交構秘精者宜若虛弱

勞倦人忌之

防風通聖散

治瘡瘍便毒若瀉去芒硝大黃此方能解暑月熱毒及遍身頭面瘡

芍藥

芒硝

滑石

煨

川芎

大黃

桔梗

石膏

荊芥

麻黃

各肆分半

山梔

白朮

連翹

當歸

薄荷

甘草

防風

黃芩

各八分

此方非表裏俱實大小便秘者未可用通聖散合

益元散名雙解散

復元通氣散

治便毒初發

南木香

延胡索

天花粉

藜香

炒

白牽牛

白芷

當歸

甘草

各壹兩

青木香

錢伍

穿山甲

酒浸炙貳兩

右為末每服貳錢木香湯或酒調服

立消散

治消便毒癰瘡如神

全蝎

炒

核桃

去殼肉只用隔及肉衣

右等分為末空心酒調參錢日貳服參日愈

敷便毒腫毒方

雄黃

乳香

各貳錢

黃柏

壹錢

右為末用新汲水調敷

五虎湯

治魚口便毒已成者速潰未成者內消

五靈脂

木鱉子

去殼

白芷

各參錢伍分

大黃

實人壹兩 虛人伍錢

穿山甲

炒貳錢 伍分

右作壹服利下五六行即愈一方加全蝎伍分炒

殭蠶貳錢尤妙

丹溪治便毒用射干貳寸生薑如指大壹塊同搗取

順流水煎壹沸即服以瀉為度又用牛皮膠醋煮

塗患處

射干用紫花的

一方用大蜘蛛壹個研爛熱酒調下

一方用蛤蜊壹隻剝去皮連骨雜加葱伍錢搗過患

處以皮覆之

牡蠣湯

治便毒久近皆効此方與前散大同小異

大黃

牡蠣

煨

木鱉子

去殼

梔子

皂角

地丁

連翹

甘草

各壹錢 伍分

右酒水各半煎露一宿空心服以利為度

陰瘡第五十六

腎臟風

陰庠

隱處瘙痒成瘡挾有耳鳴目痒鼻赤脉浮指縫白等

證為腎臟風瘡

外為風溼所襲從陰囊溼汗作痒起流注四肢手叉

白色悉生瘡瘍俗謂之腎臟風

腎臟風屬腎虛有火血燥或入房不洩而內敗初起

兩足熱腳跟作痛漸至脛或臙大痒抓破成瘡漸

漸延開至腿至股若晡熱盜汗口燥咽乾吐痰體瘦腰脚倦怠以腎氣丸為主佐以四生散若脾胃虛者補中湯為主佐以腎氣丸四生散

若遍身生瘡膿水淋瀝兩腿尤甚體倦作痒經年不愈乃腎中虛火八味丸主之外敷猪臟散白膠香散世有以陰囊痒指為腎臟風者非也此乃溼熱所致擦以牡礬丹硫檳散利溼服以黑龍湯不可不知分別

四生散

治腎臟風如前論證及婦人血風瘡

白附子

白蒺藜 去刺

黃耆

羌活 各等分

右為末貳錢鹽酒調下或以猪腎破開入鹽及藥末煨食亦妙一方用獨活

補瀉丸

治腎臟風指縫白者二三服効

黃耆 壹兩

木通

甘草

黑丑 各五錢

右剉用蟹螯柒枚去翅同藥炒焦黑去蟹螯餘為末蒸餅糊為丸空心鹽湯下參拾丸

猪穢散

治脚上生瘡腫痛作痒抓破水流不止

猪糞 煨

檳榔 各伍錢

片腦 伍分

花椒

龍骨 各壹分

右為末溼瘡乾摻乾瘡香油調敷

如有膿水加輕粉壹錢

白膠香散 治諸疔浸淫日久不愈下注兩腿

白膠香 赤石脂 枯礬 各伍錢 黃丹

乳香 沒藥 輕粉 各貳錢

右為末搽如上法

烏頭丸 治腎臟風上攻下注及生瘡癬

川烏 草烏 各壹兩二味用黑豆半升拌煮透去皮臍切片晒乾

天麻 地龍 白附子 各伍錢

右為末酒糊為丸鹽湯酒下

牡礬丹 治陰囊兩邊生瘡溼水浸淫痒入骨髓無可奈何此方用二三日即効又治腳汗腋汗

牡蠣 黃丹 炒各貳兩 枯礬 肆兩

右為末臥即以藥擦之一夜至三四次不數夜而

愈腳汗先擦透再裝藥於鞋底腳板上塗藥扎之

浴毒湯 治小腸風陰瘡痒痛

木通 貫衆 藁本 枳殼

荆芥 甘松 薄荷 白芷

右每用貳兩水五碗煎成入苾硝半兩熱洗

沐浴長春散 治男子下元陰溼久冷陰囊痒抓之成瘡流水為患及治婦人下部陰溼

牡蠣 蛇床子 破故紙 紫稍花

乾荷葉 官桂

右等分每用貳兩水煎入葱白數莖再煎去渣先

熏後洗再用後藥

枯礬 壹兩

黃丹

蛤粉 各伍錢

右為末熏洗了用手捏藥搽溼痒處

一方腎臟風痒用吳茱萸蛇床子等分煎洗

一方腎臟陰汗用莧菜根莖葉燒灰存性為末細抓

破敷之再以蒼耳草蛇床子煎湯洗

一方用生甘草煎湯洗

硫櫝散

治陰囊兩腿風溼痒瘡

檳榔

貳枚劈開用黃丹叁錢合定用溼紙包煨

全蝎 陸枚

蛇床子

硫黃

各四錢

麝 少許

輕粉

青黛 各伍分

右為末每用少許清油調搽將兩掌擦熱抱囊一

頃次擦兩腿

一方陰痒用黃栢枯礬輕粉各壹錢片腦貳分為末

敷之

一方陰囊溼瘡用蜜陀僧乾薑滑石等分為末擦之

一方先以吳茱萸煎湯洗後用吳茱萸蛇床子各伍

分寒水石輕粉各叁分黃栢樟腦硫黃白礬檳榔

白芷各貳分為末麻油調搽

黑龍湯

見囊癰

女人陰瘡第五十七

女人之證有諱而難言者雖夫婦之間亦不可得而知故曰寧醫十男子莫醫一婦人隱而至於陰戶中亦有傷生之恙醫家方論顧可獨遺乎夫女人之性多鬱每至傷於肝脾者則溼熱下注陰中挺出一條其長尺許其形如蛇痛墜出水而溺澁宜朝服補中益氣湯晚服龍膽瀉肝湯外塗藜蘆膏而自收若所突如菌如雞冠四圍腫痛者乃肝鬱脾虛下陷宜補中益氣湯如山梔白茯苓車前子青皮以清肝火兼升脾氣漸愈更以歸脾湯加山梔白茯苓川芎調理外塗藜蘆膏

若因於勞力者血虛四物湯加龍骨氣虛補中益氣湯

若陰中生蟲如小蛆者乃溼熱甚而心氣鬱氣血凝滯所致宜藿香養胃湯補心湯硫鯉丸外用生艾搗汁調雄黃末燒烟熏之仍以雄黃蛻散納陰中若生細蟲痒不可忍甚則發寒熱與癩證相似其蟲入食臟腑者卽死此等之病敢以告之於夫耶殊不知其關於死生也宜於蛇床子煎湯洗淨拭乾後用梓樹皮焙乾爲末入枯礬四分之一麝香少許敷之立効

若陰戶兩旁癰痛手足不能舒伸者用四物湯入乳香末同搗成餅入陰戶立効腫而痛極便秘欲死者用枳橘熨之

但凡腫俱宜四物湯加柴胡山梔牡丹皮龍膽草煎服如時常陰痛者宜四物湯加藁本防風若癰痛而不閉者逍遙散十全大補湯腫消而不閉者補中益氣湯腫墜者加山梔牡丹皮溼痒出水而痛者憂思過也歸脾湯加柴胡山梔牡丹皮白芍藥生甘草潰爛者逍遙散若癰痛不閉寒熱溺澁體倦少食者補中益氣湯加升麻柴胡量入茯苓山

梔若不閉而小便淋瀝腹中如有一物攻動而脹痛者逍遙散加柴胡山梔車前子至於交接出血乃平時悻悻過情所傷肝脾虛而不藏血宜補中益氣湯用熱艾以細帛裹入陰中或以亂髮燒灰敷之若出血過多見雜證者調補肝脾自愈

龍膽瀉肝湯

治肝經溼熱或囊癰便毒下疳懸癰腫

煇作痛小便澀滯或婦人陰瘡痒痛或

歸脾湯

男子陰挺腫脹或出膿水方見下疳條方見乳癰條

藿香養胃湯

治陽明經虛不榮肌肉陰中瘡不愈

藿香

薏苡仁

神麩

烏藥

砂仁

半夏

茯苓

白朮

人參

各伍分

華澄茄

甘草

各叁分半

右用薑棗水煎服

補心湯

治婦人陰戶生瘡或痛或痒如蟲行狀膿汁淋漓陰蝕已盡治之當補心養胃如溼熱有蟲者去薑蘇參梗加苦參生艾桃仁吳茱萸炒黃連

人參

茯苓

前胡

半夏

川芎

各叁分

陳皮

枳殼

紫蘇

桔梗

乾薑

甘草

各伍錢

當歸

白芍藥

各壹兩

熟地黄

壹兩伍錢

右每服肆錢薑棗煎服

菖蒲散

治女人陰戶腫痛月水澁滯

菖蒲

當歸

各貳錢

秦艽

七錢伍分

吳茱萸

伍錢

右為末每服叁錢空心葱湯送下更以枳實炒熟

頻熨患處若陰內膿水淋漓或痒或痛以升麻白

芷黃連木通當歸川芎白朮茯苓煎服仍用塌腫

湯洗

硫鯉丸

大鯉魚壹尾去頭尾入硫黃壹兩黃泥固濟火煨

煙盡為末米糊丸桐子大每服貳拾丸温酒下

雄黃蛻散

桃仁 壹錢

雄黃

青箱子

苦參

黃連 各貳錢 伍分

右為末生艾搗汁和如小指尖大綿裹納陰中

逍遙散 方見耳瘡條

枳橘熨法 治婦人陰毒如石痛不可忍二便不利欲死者用此

陳皮 各四兩炒 令極熱

右以絹袋盛之遍身從上至下及陰腫處頻頻熨

之冷則又換直至喉中覺枳實氣則痛止腫消便

利矣

玉粉散 治陰瘡浸淫不止

白礬灰 定粉

右為極細末先洗淨摻之

洗溺散

五倍子 川椒 苦參

葱白頭

明礬 蛇床子

右水煎洗瘡用猪肝切大片以葱椒拌猪油煎乾待温納陰戶中少頃取出其蟲俱入肝內另換一片取盡為度仍以湯洗

又洗溺散 治陰口生瘡腫痛出膿水

甘草 乾漆 黃芩 當歸

白芍藥

地黃

各壹兩

龜甲

兩五

一方有川芎貳兩

右細切水煎洗瘡如人行十里許一日二次拭乾即上甘溼散半日又洗曾有一女人用此七日愈

甘溼散

蚬蛇膽

分四

青木香

石硫黃

鐵精

各四分

麝香

分四

右四味為末麝香臨用方研入蓋麝能消蛇毒若麝先入則蛇膽力詘矣

又法以大雄雞取肝帶熱納陰戶中少頃其蟲俱在肝上取出

一方婦人陰瘡痒痛蝕爛用狼牙貳兩水四升煎作

壹升以綿纏筋頭大如繭浸湯中時時瀝陰戶中

日數次

一方陰瘡用蛇床子壹味末之以白粉少許和勻綿裹如棗大納陰中

一方用新桃葉納陰中日三四易

一方陰毛際生蟲作痒搗桃仁擦之

下疳第五十八

下疳屬肝經溼熱下注或陰虛火燥或由交接過度與不潔婦人污穢所致治法腫痛發熱者四物加

柴胡山梔腫痛寒熱者肝經溼熱也小柴胡湯加
 龍膽草黃連澤瀉木通茯苓以清肝火導溼熱腫
 痛便澀者溼熱壅滯也龍膽瀉肝湯瘡痛腐潰者
 氣血虛而有火也八物湯加柴胡山梔或小柴胡
 湯加參朮芎歸日晡倦怠者陽氣虛而下陷也補
 中益氣湯經久不愈腎水不能生肝木用六味丸
 若筋縱或痒痛出白津此曰筋疝龍膽瀉肝湯氣
 虛者補中益氣湯加山梔龍膽草或清心蓮子飲
 間服

此證以陰虛火燥為本瘡痛寒熱為標宜以六味丸

生肝血佐以補中益氣湯加麥門冬以滋化源肝
 脾血虛者六君子湯加升柴或肉突出久不愈必
 成廣瘡宜預服仙遺糧湯及荆防敗毒散以防之
 外治不過淨洗敷藥或點以鷲膽膏輕者自愈
 若至腐潰綿延痛在莖之竅或在莖之標皆手足太
 陽經不利熱毒下傳入足厥陰故變紫黑色若蝕
 盡玉莖者死宜用張子和泄水丸導其溼毒先泄
 其根次治其標用葱白黑豆汁漂洗拭乾外以黃
 連木香蜜陀僧乾臘脂之類摻敷或內潰膿不出
 用追膿散仍用子和泄水丸

子和泄水丸

藥性太峻虛弱人慎之

大戟

芫花

甘遂

海帶

洗

海藻

洗

郁李仁

續隨子

各伍錢

樟柳根

壹兩

右為末煮棗肉為丸菜豆大每服六十九丸白湯下

服泄水丸後用敷藥

黃連

滑石

各伍錢

定粉

叁錢

輕粉

伍分

乳香

壹錢

蜜陀僧

貳錢

右為細末乾摻或加乾臙脂木香檳榔

龍膽瀉肝湯

治下疳因溼熱腫痛溺澀及莖縮縱痒痛出白津

柴胡

青皮

龍膽草

山梔

大黃

白芍藥

木通

連翹

黃連

滑石

各等分

右水煎服

甘草大豆湯

洗下疳陰蝕痒

甘草

叁兩

赤皮葱

叁根

大豆

壹合

右用水參升槐條壹把同煮以豆熟為度取濾清

汁熱淋如冷再熱淋壹貳時大効

消疔敗毒散

柴胡

壹錢伍分

赤芍藥

赤茯苓

木通

龍膽草

各九分

黃柏

八分

連翹

荆芥

知母

黃連

蒼朮

防風

獨活

各六分

甘草

炙參分

右加燈草水煎服

八正散

治下疳因熱勝二便秘

大黃

車前子

瞿麥

扁蓄

山梔

木通

各貳錢

滑石

貳兩

甘草

壹錢

右水煎服

大蘆會丸

治肝火大盛下疳潰爛

胡黃連

蘆薈

黃連

木香

白蕪荑

白雷丸

鶴虱草

青皮

各壹兩

麝香

壹錢

右為末蒸餅糊為丸如桐子大每服壹錢米湯下

博金散

治下疳爛臭

白礬

蜜陀僧

各伍錢另研為末去渣入沙鍋內火炮用

白堊

貳錢

黃丹

淘淨

乳香

伍分

麝香

貳分半

右為細末用槐枝葱白鹽甘草共熬湯淋洗一二時候乾搽此藥重者不過三五次但用時須洗浴以免生瘡

丁泥散

孩兒茶

壹錢伍分

珍珠

煨伍分

乳香

貳分

沒藥

貳分

冰片 壹分

綵線 燒灰存 性七分

右為末先用淨洗如上法後摻此藥約厚壹文錢以紙裹縛如結痂即已有水出再洗換藥

蘆甘石散

輕粉

黃栢 各壹錢

黃連

韶粉

蘆甘石 各貳錢 火煨黃 連湯淬數次

冰片 叁分

右為末苦茶洗淨乾摻一方加龍骨人中白血竭

孩兒茶

水仙散 驗方

冰片 壹分

鱉甲 燒灰存 性貳錢

右為末溼者乾摻乾者麻油調搽

黃栢散

黃栢 猪膽汁潤 炙叁錢

橄欖核 燒存 性

陳螺螄 燒存 性 各貳錢

孩兒茶

輕粉 各貳錢

右為末甘草湯洗淨摻之

鷄金散

鷄內金 壹錢

菜豆粉

輕粉

冰片 叁釐

右為末鹽茶洗淨乾摻一日二次

青黛散

蘆甘石 黃連 水煨

青黛

血竭 各壹錢

冰片 壹分 五釐

外科選料

癰疽部分

紫雲石間

卷四

六十六

右為末洗淨搽之忌鷄魚

香珠散

此方兼治臙瘡瘡作夾膏貼

血竭 伍分

冰片 壹分

麝香 壹分

珍珠 壹分

輕粉 伍分

右為末洗淨麻油調搽或加飛丹少許

一方用椽斗子貳個各盛黃丹令滿相合以髮纏定

燒煙盡為度研為末先用葱白熟漿水洗淨敷之

重者不過二三次

一方用泥墻上白螺螄不限數洗淨火煨為末用六

分以上好罪藥四分冰片五釐另研和勻米泔水

洗淨拭乾搽之即能結痂試過効極速

一方用舊羯子燒灰伍錢桃樹上乾桃燒灰伍錢蘆

甘石火煨童便淬貳錢伍分臨用加冰片少許椒

葱煎湯洗瘡搽上三四次愈試過

一方用面粉輕粉冰片半分鷄子內衣燒灰叁分敷

一方冰片半分草果燒灰叁錢輕粉叁分洗淨搽之

一方下疳小便腫脹用冰片壹分伍釐大黃貳錢黃

栢貳錢輕粉壹錢為末以田螺肉搗為膏塗之

一方用地骨皮為末塗妙或煎湯洗以訶子連核燒

存性乾搽亦治玉莖瘡

囊癰第五十九

附陰頭癰

陰囊生癰屬厥陰肝經不但溼熱下注亦由陰虛所致也丹溪云但以溼熱入肝施治而佐以補陰雖潰脫可愈故治宜消毒兼補若專攻其瘡陰道愈虛必生別患矣

此證但於初起時覺腫赤脹痛小便澀滯寒熱作渴者卽與清肝火兼分消溼熱宜以黑龍湯吞滋腎丸如因色欲過度囊腫如斗小腹脹悶溺澀發熱口乾痰壅則危如反掌宜用腎氣丸料加車前子牛膝煎吞滋腎丸滲利溼熱癰痛仍在者宜補陰

托裏以速其膿而鍼之若至便秘乃熱毒壅滯也宜托裏消毒散或不減者是熱毒未解也宜清肝益榮湯膿已成者活命飲潰後皮脫或罌丸懸挂甚至脫出其玉莖半腐亦無害命惟宜托裏散加破故紙黃耆五味兔絲子或四物湯加參朮吞腎氣丸兼服補中益氣湯倍參耆歸朮大補氣血脾胃外塗白蠟膏自然平復若服寒涼攻伐及滲淡損陰之劑是促其危也

陰頭癰亦屬厥陰醫法彷彿似此外以鱉甲燒灰鷄子白和敷之自愈

黑龍湯 治陰囊腫痛溺澀寒熱作渴

龍膽草 黑炒

柴胡

木通

甘草節

金銀花

當歸

皂角

赤芍藥

吳茱萸 水炒

防風

黃連 各等分

右水煎壹服腫痛止後加川芎茯苓

滋腎丸

黃柏 鹽酒炒

知母 酒浸各壹兩

肉桂 伍錢

右為末蜜丸如桐子大每服五十九鹽湯送下

清肝益榮湯

治肝膽小腸經風熱血燥筋攣結核或耳項胸乳脇肋作痛并一切肝火血證

白朮 貳錢

熟地黃 壹錢伍分

山梔

木瓜

茯苓 各壹錢

龍膽草

川芎

芍藥

柴胡 各七分

甘草 伍分

右水煎服

龍膽瀉肝湯

治腫痛未膿或發熱用此疎肝降火導溼方見便毒

加味瀉肝湯

治肝經溼熱陰囊腫痛或潰爛皮脫罌丸懸掛或便毒下疳瘡痛並治

龍膽草

車前子

當歸

澤瀉

生地黃

黃柏 酒炒

芍藥

黃連

知母

防風 各壹錢

草稍 伍分

右水煎食前服外敷烏金散

加味小柴胡湯

治囊癰潰爛發熱

柴胡

人參

黃芩

川芎

白朮

黃耆

當歸

黃柏

知母

甘草

半夏

痛甚加黃連水煎食前服

白蠟膏

治癰疽發背湯火等證去腐生肌止痛補血續筋又與新肉相宜其效如神加乳香沒藥龍骨血竭兒茶輕粉尤妙

生地黃

當歸

各壹兩

右用麻油壹兩煎藥枯黑濾去渣入白蠟壹兩溶化候冷攪勻即成膏矣

烏金散

麩炭

紫蘇葉

右等分爲末香油調搽

懸癰第六十

陰囊之後穀道之前所生之毒謂之懸癰屬任脉別絡俠督脉衝脉之會癰生其間如懸物然屬足三陰虧損之證輕者爲漏瀝盡氣血而亾重則肉潰即殞此處肉理如縷易潰難合此證屬陰虛不足之人多患之

初覺之時若因溼熱壅滯作痛或小便澹滯即用龍膽瀉肝湯腫痛者仙方活命飲竝以製甘草佐之

如法早治雖成亦輕雖潰亦淺不成膿不潰者八
 物湯若膿成急宜鍼刺如不能收斂隨其虛而補
 之腎虛者腎氣丸血虛者四物湯加參朮氣虛者
 四君子湯加芎歸脾虛者補中益氣湯久成漏者
 十全大補湯蠟礬丸首尾宜服國老膏若誤用寒
 涼消毒之劑病斯危矣

穀道左右發癰名爲痔癰宜急補脾臟初起貼發穴
 散破後用抽膿膏膿盡用合瘡口散亦不可遷延
 而致成漏也

龍膽瀉肝湯 方見下疳條

活命飲 方見初起湯藥條

製甘草法 治穀道前後生癰

大粉草帶節四兩取山澗向東長流水壹碗以甘
 草漬而炙炙而復漬水盡而止研爲末入皂角灰
 少許作四服湯調下大有神効或酒煎服久之自
 消

腎氣丸

四物湯

補中益氣湯 三方俱見掌疽條

四君子湯 方見乳癰條

十全大補湯 方見脫疽條

蠟礬丸 方見癰疽各方

清心蓮子飲 治懸癰小便赤澁脉無力

黃芩 伍錢 黃耆 石蓮肉 赤茯苓

人參 各七錢 伍分 車前子 炒 麥門冬 甘草

地骨皮 製甘草

右每壹兩用水煎食前服發熱加柴胡薄荷

加味托裏散 懸癰不消不潰

人參 黃耆 當歸 川芎

麥門冬 知母 黃栢 芍藥

金銀花 製甘草 柴胡 各壹錢

右用水煎服

肛內癰

蜈蚣 穿山甲 炒 血餘 血管鷲毛

鹿角 新血者

右俱煨存性研細和勻每服伍錢好酒下

瘍科選粹卷之四 終

醫氏廷壽 子獻辰

