



痘證經驗遂生編原序

語云走馬看痘症。極言其變症之速也。經云痘稟於陰而成於陽。譬之種豆亦必天氣陽和地土溫暖方能發生人身之痘亦猶是也。痘之將出全仗真陽託送斯時培補氣血尚且不暇何堪剋削無如近代痘師但見發熱便用寒涼無非連翹大黃及一切涼藥元氣乍虧痘瘡立陷又云痘之一症有神司之某家子本好痘轉眼間換爲壞痘而斃如果神欲殺之當其初何不卽與其壞痘先與其好痘而換爲壞痘神何心哉委因不知培補妄行政伐此立時告變之明徵也走馬看痘症痘神換壞痘此二語舉世相傳迷而不悟縱更換醫師亦總是寒涼尅削愛女嬌兒必驅之於萬不

能生而後已。或亦生民之厄也。一夔性嗜岐黃。身試既久。嘗見痘瘍者甚多。不勝扼腕。遂考究痘症一門。二十年來博覽羣書。竟得箇中秘訣。臨危治愈頗獲奇功。萬無一失。治痘之法宜溫補兼散。治疹之法宜養血兼散。二症俱忌寒涼消導。所謂秘訣者。如是而已。竊取先哲名言。與鄙見相符者。集成一帙。願後之得此書者。不致爲庸醫所悞。依方療治。定可以順遂其生。爰名之曰。遂生編。或亦活人之一助云爾。時嘉慶二年丁巳春仲武進莊一夔譔。

痘證經驗遂生編

武進莊一夔著

治法

痘科一症順者不必治逆者不能治可治者惟險症耳。險症治之得法則生不得法則不生是治法之不可不精也。內經未嘗言及今行世諸書皆本之於諸瘡痛癰皆屬於熱八字所以立意先言解毒開方定用寒涼在其父母聞之解毒最爲入耳寒涼似亦應然殊不知痘瘡全以發透爲吉起發必賴氣血滋培方能自內達外。齊苗灌漿結痂無非陽氣爲之主也。寒涼則血滯。慾削則氣破。血滯氣破。毒氣乘虛深入此痘症陷塌之所由來也。譬之猪脬即屎

胞。若欲其脹滿。必需以氣充之。散其氣立卽陷矣。此理相同顯而易見。痘之始終全憑氣血。但得氣血充足。則易出。易結。氣血不足。則變症百出。痘之欲出。陽氣蒸騰。小兒發熱。正是痘欲見苗。斯時氣虛者。宜服補中益氣湯。血虛者。宜服荆防地黃湯。兼寒者。宜服大溫中飲。或大補元煎。察其氣體之虛實。酌而用之。所謂培補氣血。疎通筋絡。無不立奏全功。時師不明此理。定言用補。太早則補住。毒氣乃愚陋之見也。不知補中。卽所以託毒灌根。卽所以發苗。萬無補佳之理。且有散藥在內。此實先哲治痘之心傳。高明者必以爲然。淺學者。何能窺其萬一。要之治痘之法。總不外乎虛寒。實熱四字。何者爲虛寒。凡小兒向日氣體薄弱。面色青黃。唇淡畏寒。

大便溏而不結。小便清白。飲食減少或不甚消化等症。知腹中火少。出痘時必難灌漿。亦難結痂。氣血不足之故。是名虛寒。速宜培補元陽。以防變症也。何者爲實熱。或小兒氣體壯實。飲食易消。出痘時大便結而燥。小便赤而臊。口鼻中出氣如火。惡熱喜涼等症。是名實熱。然須審明。果是內熱。方可暫行清解。荆防地黃湯用生地加大黃一二劑。而火退矣。切不可以虛火誤認爲實火。察虛火實火之法。全憑大小便爲主。小便清白。大便不燥。身雖大熱。乃是中宮有寒。火無所依。浮而在外。悞服寒涼。亦有此症。不得以身熱便認爲實火。虛火者。十中八九實火者。數十中之一二耳。

痘有四宜

一宜補氣。真陽充足。方能送毒外出。以成痘。倘痘項不起等症。皆元氣不足之故。宜服黨參白朮黃芪甘草之類以補之。

二宜補血。真陰充盛。方能隨氣到苗。以成漿空殼無膿等症。皆陰血不足之故。宜於補氣藥中加熟地當歸丹參川芎之類以補之。

三宜補脾胃。脾土壯健。氣血自充。飲食減少口淡無味等症。皆脾土虛弱之故。須脾胃雙補。卽於前氣血藥中加枸杞故紙附子肉桂等藥。痘瘡自無陷塌泄瀉之患。經云虛則補其母。此之謂也。

四宜察虛實。小兒飲食有味。二便如常。不服藥最爲穩。當設或

灌漿不滿。燒漿不乾等症。必察其氣分血分。何處虧虛。昭症調補。不可妄用涼藥。必口臭尿臊便結。有實火可據者。方可暫行清解。

痘有四忌

一忌清熱敗毒。胎中陰毒。必賴陽氣託送。方能發出。陽氣被清。陰毒內歸。痘之塌陷。實由於此。是連翹生地黃芩澤瀉等藥。非有寶火者。萬不可用。

二忌尅伐氣血。氣血充暢。痘易成功。尅削下咽。中氣虧而毒乘虛深入。泄瀉塌陷諸症作矣。是大黃芒硝山甲山查等藥。在所必禁者也。

三忌妄授醫藥。小孩出痘。延醫診治。求其有益也。豈知近代醫
師。不分虛實。總是涼藥。毒輕者幾死。毒重者不生。是以不如不
服藥之爲妙。客問曰。痘之順症。可以不藥。我知之矣。痘之險症。
亦可不藥乎。余曰。若純用涼藥以治險症。但見治斃。未見治愈
也。客猛然省悟而去。

四忌吞服醫家小丸。近代痘師所帶小藥。總是巴豆丸。彼以爲
痘是胎毒。巴豆下行。自必可以瀉去之。豈知中虛下陷。性命休
矣。小丸數粒。斷非溫補氣血之藥。卽抱龍牛黃等丸。亦與痘症
大有妨礙。是以最不可誤服。親友處受此害者甚多。目擊心傷。
故特表而出之耳。至於前人所製人牙散。獨聖散。雞冠血。桑蟲

之類。逼毒外出。旋卽收陷。皆非正理可。曾見其治愈一人。斷不可用。

辨痘法

小兒發熱。五指稍及中指。冷是痘症。中指熱是傷寒

看耳法

耳後紅筋。痘必輕。紫筋起處。重沉沉。兼青帶黑尤難治。用藥精詳也得生。

認痘法

小而充實者名珍珠痘。大而飽滿者名大痘。四圍起而中陷者名茱萸痘。平扁不起者名蒸餅痘。古書所載逆症。今治愈甚多。是以各書內所云不治症槩不列入編

發熱

痘者胎中之陰毒也。必賴陽氣以成之。小兒出痘大約發熱三日。肌肉鬆透然後能見點。苗齊熱退乃真陽內伏。交會於陰。復發熱三日。是運水到苗。以成清漿。漿足熱退。及至養漿。真陽仍出。發熱三日。化毒以成膿。膿成熱退。而陽伏。毒既化膿。又必發熱。蒸乾方能結痂。痂落後。真陽外出。蒸化斑點。謂之燒斑。倘有黑斑。乃是火衰。並非因喫鹽醬之故。所謂痘稟於陰而成於陽也。如此治痘之法。始終當以補氣血。扶陽氣爲第一義。用藥以溫補少加發散爲首務。否則氣不足。則痘頂不起。火不足。則漿不稠。且恐厥逆腹痛。

陰寒起而壞症作矣

或問曰。痘宜溫補。此理甚明。若兼發散。豈不傷氣。不知純用散藥。汗多則傷氣。少加發散藥。於溫補藥中。則血脉疎通。痘瘡易出。無壅滯之患。受解散之功。所以古方補中益氣湯。內有升麻柴胡。大溫中飲。內有麻黃。溫中補氣。尙用散藥。可見古人用心之妙。痘之初出。是斷不可減去散藥者也。或又問曰。痘宜溫補兼散。此理已明。後開大補元煎。六味回陽飲。此二方重用附桂。並無散藥。兼用龍骨粟殼收濬之藥。其義何取。不知溫補兼散。乃治尋常痘瘡之法。更有一種小兒發熱一二日。卽遍身出痘。古書無方。時師袖手。此乃陰毒太重。陽氣太虛。陰毒一發。陽氣已消。故瀉痢不止。瀉出

之物多作青黑色。肝氣所化。胃氣將竭之兆。速宜大補元煎。六味回陽飲。二方大劑連進。可以扶元陽。可以消陰毒。操起死回生之功。有鬼神莫測之妙。二方合煎。名返魂丹。治痘收效。指不勝屈。余

治外孫汪陵醫案。所當細閱。

一切清火解毒涼藥。必審明果有實火者。方可暫用。若悞用於齊苗時。則水不能升而頂陷。若悞用於養漿時。則漿不能稠而癢瘍癰瘍者。眞火衰也。明者當前速宜參熟並用附桂同煎。脾腎雙補大劑疊進。尙可挽回。否則寒戰咬牙。吐瀉交作。不可爲矣。至於身涼而膿不乾。痂落而斑不化。及痘後發毒。皆因悞服生地銀花澤瀉連翹等涼藥之故。不可不知。熱有邪正。必當體察。正熱者。陽氣

蒸騰自內達外。喜露頭面不惡寒。時熱時止。兼有小汗。手足溫和。飲食有味。二便如常。所謂內外無邪。不必服藥。邪熱者偶受風寒。頭痛惡寒。四肢冷而無汗。荆防地黃湯。內加肉桂一錢。一二劑儘可解散表邪而愈。古人云。熱不可盡除。眞格言也。

形色

痘以飽滿爲形。紅活爲色。項陷不起。是氣虛。色不鮮明。是血虛。宜培補氣血爲主。真陽虛者。乃無紅暈。甚至通身皆自身涼。不溫。宜大補元煎。陽回身溫。轉白爲紅矣。又有一種遍身血泡者。此非血多。乃氣少不能統血。故血妄行。急當大補元煎。陽氣充滿。血泡變白。而成功矣。庸醫不明此理。謬言血熱。悞用寒涼。變症日增。形與

色外象也。必要飲食有味。二便如常。知其無內病。可以不服藥。若二便不調。飲食不下。煩躁悶亂。夜中不寢。形色雖好。亦甚可憂。必當察其病情何故。小心用藥。挽同方妙。形色不佳。多半是氣體虛寒。手足厥冷。頭重神疲。便清泄瀉等症。必當大補元煎。兼用附桂。若泄瀉不止。並當添入龍骨。粟殼等藥。以收濬之。瀉止方可回生。痘以紅爲貴。有圈紅。噀紅。鋪紅之別。圈紅者。一線紅圈。緊附痘根。最爲佳兆。噀紅者。痘根血色隱隱散漫。亦氣不收之故。速宜大補氣血。鋪紅者。一片平鋪。無痘之處亦紅。所謂地界不分。若兼不惡寒。口臭而渴。小便躁而短。大便燥而結。內熱有據。宜白虎地黃湯。以利之。熱退身涼。卽宜平補。不可多劑。又有一種錫光痘。身涼不

溫色白不紅此乃陽虛陰象也宜大補氣血附桂同施氣足陽回
痘根紅而漿稠癰結矣又有一種根無紅盤頂含黑水者乃陽氣
大虛陰氣凝結亦宜大補元陽兼用附桂黑水化而爲膿矣

痘有五泡曰水泡膿泡灰泡血泡紫泡痘有五陷曰白陷灰陷血
陷紫陷黑陷水泡者皮薄而明經言氣熱生水要知清漿皆水何
以不成膿火少故也必當薑桂附子等藥大劑疎進水必成膿若
悞用涼藥作瀉後轉爲白陷膿泡失治則破流膿水灰泡失治轉
爲灰陷二症亦宜參熟附桂大劑多進若有小顆粒發出謂之子
救母生意在焉血泡者乃氣虛非血熱亦宜大補元陽否則變爲
血陷紫泡者其證有二紫中帶青者亦因氣虛不能攝血陰血凝

卷之三
結而成其人必身倦惡寒舌胎白飲食不多大小便清白速宜大補元陽否則變爲紫陷又有一種紫黑焦枯者乃純陽無陰之症其人必口乾惡熱小便短大便結此實火也宜清涼解毒白虎地黃湯酌加大黃以行之但得線漿尚可望生失治轉爲黑陷又有二種小兒因服涼藥腹中作痛嘔吐瀉利將成慢驚頭面大熱唇焦舌黑亦似實火此乃火不歸元之故實火者二便躁閉虛火者瀉利不止全在細心體察方得其真經云有者求之無者求之實者責之虛者責之蓋言萬病皆當體察寒熱虛實醫治痘症可駁云實火雖用苦寒尅削以斃人性命耶

起脹

痘至開盤頭面腮頰亦腫。謂之起脹至膿成漿足。痘回而脹消。謂之收脹。蓋緣毒氣由內達外。此時尚在肌膚之間。故腮頰亦隨之而腫。迨至膿成漿足。毒氣盡化爲膿。而脹自消。亦必脾胃強健。方能如此。若當起脹而不起脹。乃由元氣內虛不能送毒外出之故。宜用大補氣血之藥。少加發散。大補元煎。大溫中飲。相間服之。盤自開而脹自起。若痘未開盤而頭面先腫。乃元氣大虛。此乃虛腫非起脹也。其痘必不能起脹。亦宜大補元氣。腫自消而脹自起。又有痘已回而腫不消。乃元氣大虛。不能攝毒。餘毒留於肌肉之間。不能盡化爲膿。所致亦宜大補元煎。大溫中飲。相間服之。餘毒盡化而脹消矣。痘書云。痘出稠密。封眼者有救。不封眼者無救。此言

不確。起脹者有救。不起脹者無救。此言甚確。封眼者。眼弦多痘。胭脂水塗之。仍可以不封眼。不起脹者。乃元氣大虛。何以送毒外出。必當大補元煎。附子。內桂。大劑多進。脹起而毒化。一定之理也。

養漿

痘之緊要。全在養漿。漿成則毒化。漿不成。痘斯壞矣。自發熱見點。齊苗灌漿。無非爲養漿而設。若顆粒稀疎。根盤紅潤。精神爽健。二便如常。乃上等痘也。可以不藥。倘形色平常。全憑用藥。助其氣血。以養其漿。最怕者無熱。全仗真陽充足。出而用事。方能化毒成膿。設陽氣不足。何以蒸化其毒。宜大補陽氣。實爲上策。緊防泄瀉。鴻鴻則中虛。陽氣一虧。毒必內陷。定當預爲隄防。補其陽氣。助其脾胃。

漿乾癥結而成功矣。煎藥方無非補中益氣湯，大補元煎之類。相間服之，萬不失一。而世之面麻者，皆因不明是理。養漿時被庸醫悞用消伐之藥，中氣乍虧所致。若於養漿時，大劑溫補，氣血充足，落痂後，斷無面麻之患。又有一種小兒痘後，滿頭潰爛，名曰虛陽貫項，又曰髮疽。經年不愈，此乃出痘時，悞服涼藥，胃中受寒，陽無所依，上沖頭項，譬之火爐中以水潑之，則熱氣必上沖。此理無二。速用大補元煎，大溫中飲，相間服之，引火歸元，旬日可愈。

收結

收者，漿回而脹收也。結者，膿乾而癥結也。收結如法，其功成矣。倘漿回而腫不消，膿成而癥不結，亦是真陽不足，身無熱，不能乾漿。

卷之三
化毒之故。膿漿充足。必賴陽氣薰蒸。方能結痂。陽氣二字。豈非痘症始終必需之至寶。設此時氣體虛弱。不能結痂。必相其虛實。無非培補氣血。無不立見奇功。又有一種漿不能乾而生蛆。謂之蛆痘。總由陽氣不足之故。俱宜大補元煎。大溫中飲。相間服之。膿自乾而蛆自化。結痂而愈。

痘毒

痘本胎毒。自內達外。若出痘時。盡化爲膿痘。痘後無餘毒矣。當其初總宜培補元陽。兼用散藥。毒氣方能盡出。化而爲膿時。師用連翹黃芩澤瀉等藥。在彼以爲涼藥。可以解毒。豈知痘乃胎中陰毒。得陽氣則行。得涼藥則滯。毒氣因涼藥留滯於肌肉之內。痘後所以

發爲大疽。名之曰痘。毒皮色不變者居多。宜大溫中飲數劑全愈。其色紅白相兼者半陰半陽症也。荆防地黃湯與大溫中飲相間服之。數日亦愈。倘已潰爛。亦以荆防地黃湯與大溫中飲相間服之。計日可愈。荆防解其凝結。薑桂散其寒涼。所以可愈。倘時醫見之不分陰陽。統言火毒。仍用生地連翹銀花等藥。以致堅腫不消。潰爛不斂。清膿淋漓久而不愈。漸至泄瀉不食。脾胃一敗。不斃鮮矣。若紅而帶紫者。乃陽症也。方可以荆防地黃湯愈之。大便結者下之。然陰症多陽症少。痘後並未見有陽症之毒也。

麻疹

經云。疹秉於陽而成於陰。謂養血滋陰。即所以濟陽。疹科

諸書俱用寒涼斃人多矣。疹之將出必發熱五日方能見點宜慎風寒切戒。猪油、蕈腥等物宜服。當歸三錢、荆芥防風、白芍、生草各一錢升麻、柴胡各三分。倘眼紅口渴二便秘結或可少佐清涼。若氣體素虛卽宜於痘症藥方中求方治之。多有鼻中出血又兼作瀉。醫師定云實熱不知委係虛寒。速用土磚燒熱熨臍兼服溫散之劑。古肆用涼藥逼火上冲必致喉痛不食嘔惡慢驚等症作矣。斯時速用大補元煎大溫中飲方可挽回世之庸醫終身不醒可歎可悲。

痘症藥方

補中益氣湯此方補氣散毒氣虛者初出痘時服三四劑痘易

起發痘頂陷者亦宜服之。

黨參三錢 黃芪二錢 白朮一錢 半 炙草一錢 當歸一錢 陳皮五分

升麻三分 柴胡三分

加薑煎可與荆防
地黃湯相間服之

荆防地黃湯 此方補血散毒。血虛者初出痘時服三四劑。痘易灌漿。與前後各方相間服無所不可。

荆芥一錢熟地四錢山藥二錢丹皮一錢防風一錢雲苓一錢
山萸一錢生草一錢

加生薑三大片爲
引並加黃酒沖服

大溫中飲 此方補氣血散寒邪提痘漿散痘毒。凡痘頂不起空

殼無膿。嘔吐泄瀉。脾胃不開。痘色不紅。將欲塌陷。速宜煎服。並與大補元煎相間大劑連進。溫中散寒。立時起發。功難盡述。

熟地 五錢 柴胡一錢 白朮三錢 山藥二錢 黨參 三錢 黃芪 二錢

炙草一錢 麻黃一錢 肉桂一錢 炮薑一錢

加生薑二片。竈心土水煎濃用夏布搣出藥汁。少加黃酒。多次灌之。不可減去。麻黃汗多者減之。

大補元煎

此方大補氣血。治痘症。悞服涼藥。嘔吐泄瀉。痘不

起發。危在旦夕。速宜大劑連進。不可減去附子。與六味回陽飲。

相間服之。立見奇功。有鬼神莫測之妙。倘二三劑後泄瀉不止。

酌加附子。更加龍骨粟殼各一錢。

倘泄瀉全止。減去附子。若附子太多。則小便閉塞。

熟地 五錢 黨參 三錢 山藥二錢 杜仲 二錢

棗仁 二錢 枸杞 二錢

萸肉一錢。炙草二錢。故紙二錢。白朮三錢。肉桂二錢。附子一錢。

加生薑三大片。好核桃仁三個。打碎爲引。痘後減去附子。只用內桂數分。調理數劑。計日可復元。

六味回陽飲。此方大補元陽。耑治小兒氣血本虛。痘瘡自瘻。或悞服涼藥。嘔吐泄瀉。將成慢驚。危在頃刻。速宜服此方。倘有轉頭。卽加入大補元煎之內。同煎疊進。名返魂丹。真仙方也。

附子一錢。炮薑一錢。當歸三錢。內桂二錢。黨參三錢。炙草一錢。

加胡椒細末三分。蜜心上水澄清煎藥。或減去附子。亦名六味回陽飲。多進爲妙。

白虎地黃湯。此方去實火。解邪熱。耑治小兒出痘。發熱不退。口渴喜冷。痘瘡黑陷。小便赤臊。大便閉結。口鼻氣熱等症。酌加大黃。以行爲度。若二便清白。不喜飲冷。身雖大熱。乃是虛火。仍宜

溫補所謂甘溫退大熱不可妄投此藥此乃備而不輕用之也。

石膏三錢生地二錢當歸三錢枳殼一錢大黃錢半木通二錢

生草

一錢澤瀉二錢

加燈心爲引熱退身涼卽宜以荆防地黃湯調理之

治驗

一余外孫汪宣六歲。向日氣體虛弱。偶爾感寒。或食涼藥。卽喘瀉發熱。素知其中虛生寒。宜用溫補。不宜寒涼。乾隆甲寅年出痘。醫師開方。皆是生地銀花等藥。余曰藥性與氣體相違。何能對症。因改用補中益氣湯加薑桂四劑。痘瘡結痂而愈。

葱白頭

一大

老生薑

二大

生蘿蔔

四五箇如無時
以子一合代之

三味其搗爛

炒熟用布

作兩包輪換久

久罨熨心胸

脇下痛處無不豁然自

汗出而愈數次炒乾則烹之以酒且不宜太熱恐犯格難

受也若大便結兼熨臍腹

傷寒傳變症候繁多大抵自霜降後春分前寒邪

暎感者爲正傷寒

春夏別感者謂之四時傷寒

而兼雜症惟得病之初宜先審

辨則調理不差夫傷寒症候大類傷暑但傷寒惡寒而身寒傷

暑則惡暑而身熱

脈緊惡寒謂之傷寒脈緩惡風謂之傷風脈成

皆風寒之脉

病脈虛急而浮大而散或純索

皆寒虛之脉

病脈虛急而浮大而散或純索

皆寒虛之脉

自汗倦怠少氣。或背寒惡寒甚。則迷悶不省。手足搐搦。或嘔瀉。腹痛下血。發黃出斑等。行路得之爲中熱。靜室得之爲傷暑。又胸膈脹滿。頭痛發熱。時有止歇者。勞役食積也。惟頭痛惡寒發熱。身足痠痛。晝夜不歇。傷寒也。依此看過。果係傷寒。若無良醫。幸莫用藥。蓋此症死於病者少。而死於醫者多。惟宜密室避風。勿食粥飯米粒。謹靜自守。只以薑汁熱酒。或薑茶等類與飲。待七日傳遍經絡。雖不服藥。亦自然全愈。古云傷寒不藥得中醫。正此謂也。至於過經傳隔。經傳兩感。傳之症。病本至危。尤非良醫不治。若用藥一誤。是速之死耳。可不慎歟。

又方 治傷寒犯內傷食積蓄血。小腹硬脹。不能言語。神思欲脫。

兩目直視。手足強。什症候危篤。難以下藥者。急用紫蘇半斤煎濃湯。將大手巾摺數層。蘸透熱。略絞乾。乘熱攤肚上。至臍以下。用手在巾上旋摩。冷則再換數次。候。暖氣透入其宿糞硬塊。積血自下而病愈。如肛門閉結不通。不得下。須以稠蜂蜜和猪膽汁。熬煉成條。插入糞門導之。自通。此法屢驗。但積糞下後。須用藥調理。

試傷寒法。用野芋頭擦背脊第三骨節。不覺痛癢者是。卽以手擦周身。熱得汗可解。

傷寒狂走。有用新葩出雞子蛋壳。煎湯服。卽安睡。

亦奇方也

傷寒炒熨法。傷寒結胸而中氣虛弱者。葱薑蘿蔔子炒熨。自然

滯行邪散。胸卽開豁如冷。再加酒烹。○風寒結痛。薑葱橘皮炒
熨。○食結。生薑水菖蒲根陳酒糟鹽炒熨。或作餅貼胸。○熱結。
生薑勿炒。和蚯泥薄荷汁蜜水井水調。採心口或加冰片。○痰
結。生薑茶葉煎湯調銀硃明礬塗胸口。以上理淪駢文外治法

又傷寒結胸。整瓜蔓一個捶碎甘草一錢同煎服。奇效。

傷寒傳經。由表入裏。前三日在陽分。後三日在陰分。蓋初起傳太
陽膀胱經。則頭痛惡寒發熱。腰脊強。繼傳陽明胃經。則目痛鼻
乾。唇焦不臥。皆爲在表。宜汗。再傳少陽膽經。則目眩耳聾胸滿
脇痛。口苦寒熱往來。屬半表半裏。宜和解。如失治。卽傳入三陰
矣。傳太陰脾經。則腹滿痛。咽乾自利。傳入少陰腎經。則口燥舌

乾痛利清水。目不明傳厥陰肝經。則小腹滿。舌卷囊縮厥逆。皆屬裏宜下。或有七日傳徧。其病自回。此常序也。壯實人不藥。亦有自愈。故古有不藥爲中醫之說。總須辨明陰陽治之方效。傷寒時疫感冒通治。麻黃膏。黃連膏。各一錢。和勻入膽礬。牛黃。冰片各五分。青魚膽一錢。拌薰點兩眼內。此方內外通治。其驗如神。合麻黃發表黃連清裏而爲一。乃雙解法。曾試點過。麻辣流淚。渾身毛骨竦然。是卽開腠理之明效也。

食結傷寒冷熱不調者。一云腑熱藏寒者。用巴豆大黃。唾和餅貼臍。艾燒數炷。熱氣入肚卽住。拭去藥毒。如畏艾炙。用熨斗盛炭火熨之。

傷寒不能分陰陽。目定口呆。身熱無汗。便秘不省人事。卽煮雞蛋。
砌臍四旁。或用老油松節七兩。胡椒照病人年。每歲七粒。煮蛋乘熱切頂殼。
三分覆臍。眼用麪作圈護住。冷易視。蛋黑爲驗。收盡陰氣自愈。
一用煮雞蛋去殼。乘熱滾擦。亦能變陰爲陽。名蛋熨法。

中寒。寒中三陰。口禁失音。四肢強直。攀急疼痛。似乎中風者。或
厥逆唇青。囊縮無脈。或卒倒尸厥。脫陰脫陽等症。俱用。葱白
一斤。微搗炒熱。分二包輪換熨肚臍下。久久俟。緩氣透入。自愈並。
以葱白三十。搗爛酒煎灌之。陽氣卽回。此華陀救卒方也。若病
危甚者。再以艾丸如豆大。炙氣海穴。關元穴。各二七壯。其脈漸
現。手足漸溫。可得生矣。氣海穴在臍下半寸。元關穴在臍下三

寸。

又方。治中寒四肢厥冷。肚腹疼痛。亦治陰症腹痛。吳茱萸一斤酒拌溼。布袋二個分包。甑蒸透熱。更換多熨兩足心。兼熨肚臍下。候氣透手足。緩爲度。

又方加麥麩食鹽葱白等分。同炒熱熨。

中風。此症卒中。皆倒不省人事。牙關緊閉。痰涎壅盛。或口眼喎斜。或肢節不舉。或瘡不能言。其外候也。皆未有不由虛而感者。顧有血虛氣虛之不同。中臟中腑之各異。有宜汗宜下。有可治不可治。非可膠柱鼓瑟者。茲惟舉通用便方。以備倉卒救治。

開關散。中風卒急。先用此藥開關。

皂角二錢北細辛五錢共研細。

末吹少許入鼻中卽醒。如買細辛不及。卽皂角一味。亦可

又砭法。用鋒利碎磁片刺少商穴。使出血卽解。○少商穴在十指頭指甲之兩旁。與出指甲之處相齊。只離指甲兩邊各一韭葉寬是也。先從臂上抹至指間。使血行下方刺。從大指中指刺起。但得甦醒輕鬆。不必徧刺亦可。破竹筋頭夾住磁片。只露磁鋒一分在外。用線紮緊。以兩指捏着筋稍直接穴上。再用竹筋一隻。橫敲紮線處。使磁鋒刺入。則輕重有準。此爲不善刺者說法。

稀涎方。痰涎壅盛。用此先吐其痰。病卽輕鬆。皂角一條。明礬一
四兩
其爲細末。溫酒調三錢。徐徐灌下。

明礬一兩

又方 中風不省人事得病之日卽服此免成廢人。側柏葉一把
葱白連鬚一并搗如泥用無灰酒一大碗煎二十沸去渣俟
溫灌服。不善飲者分數次服。

中風口渴用皂角爲末陳米醋調塗口上左渴塗右右渴塗左。
乾則頻換數次愈。

又方 治中風中痰並治小兒驚風。生石膏一兩辰砂五分各研末
和勻大人每服三錢若小兒一歲至三歲服一錢以次遞加用
生蜂蜜調下立效。此仙方也傳方者若受謝及食病家茶酒則不效

又方 治中風中痰並治中氣中暑乾霍亂數症皆妥效。老生
薑自然汁一盃童便一盃和勻灌下。

中惡猝死。凡中惡客忤猝死者。或先病及睡臥間。忽然而絕。或猝然撲地。及一切痰壅。手足搐扯。皆是。用韭菜心。於男左女右鼻內刺入六七寸。令目開血出卽活。或搗韭汁灌鼻。更視上唇內沿。有如粟米粒者。以針挑破取出。○或皂角末。或生半夏末。如豆大。各吹兩鼻中。俱見洗冤錄詳解燒炭一爐。以陳醋澆炭上。使患者鼻中得聞醋氣。卽活。須捉定兩手。勿令驚亂。或灌醋於鼻中。○此症切忌以白湯水灌之。蓋湯入則痰涎永繫心絡。恐遺後患。或生他疾。

中暑。中暑者靜而得之。如避暑深堂大厦。爲陰寒所遏。暑不得越。故也。外症見身熱頭痛。煩躁不甯。或咳嗽發熱。汗出不止。然

必熱有進退。脇下有汗方爲傷暑。若久熱不止。脇下無汗便是夏月傷寒。症雖少見。不可不詳辨而妄投湯藥也。又腹痛嘔瀉爲冒暑。宜涼解。清利四肢。困倦不思飲食。爲熱傷元氣。宜補。忽然昏撲。不省人事。爲暑風。宜清涼而加風經藥。不可概從中暑治也。

中暑方

蒜頭

二顆研爛取路上熱土

日晒熱處淨土若污泥不可用

攬新汲井水

調

匀服一碗

甚效

○又黑芝蔴

炒

井水擂汁灌下

卽愈

○又扁豆葉搗汁飲亦效

又方

滑石

六兩研細水飛晒乾

生甘草

一兩辰砂研末水飛晒乾

和勻每服三

錢涼水調下方名益元散。治伏暑泄瀉煩渴。

暑極宜預服此

傷暑出丹。凡暑月身熱昏沉未明症候。恐是出丹。法以生白扁豆數顆食之。如不腥吐。則以生白扁豆水泡溼研汁一小杯。調水一盞服之卽愈。

中熱 中熱者動而得之。如行人酷日趙程。農夫炎天勞力。以致津竭汗盡卒然昏倒。名爲中熱亦名中暎。切不可誤飲冷水。及受寒涼。蓋以得冷則不可救。法用稻草結爲長帶。曲盤肚臍。外用熱土搓碎圍之。使數人共尿其中。令溫氣入腹。久之自愈。此爲道途倉卒無措者設法。若在可辦熱湯處。則用布蘸熱湯更換熨之。熨臍與臍下三寸爲要。醒後仍忌飲冷水。飲之復死。○內服方 皂角燒存性 生甘草各一錢 其爲末溫水調灌。如無

藥處則用生薑汁。或蒜汁一酒杯沖童便。或熱湯一大杯灌之。無有不愈者。

凡中熱中暑霍亂中風中痰中氣數症。俱宜用老生薑搗取自然汁一鍾和童便一大鍾灌服。無藥處此爲簡便方。卽有藥亦不如此方妥效。

霍亂得吐瀉者名溼霍亂。其病輕。不得吐瀉者名乾霍亂。其病危。欲吐不吐。欲瀉不瀉。心腹脹痛。煩悶欲死。治不得法。皆能殺人。凡遇此症。斷不可與穀食。卽米湯亦不可飲。一入口。卽不救。須俟愈後平定。久久方可進食。些少亦不宜多。

腹中絞痛。無論乾溼霍亂。食鹽一撮放刀口上燒紅。以陰陽水一

鍾沖服半滾水。名陰陽水。半冷半熱。服後腹痛漸止。再服藿香正氣散全愈。若無醫藥處。則有一極效妙法。用鋒利碎磁片刺破少商穴。委中穴二處。使出紫血。卽時全愈。萬試萬靈。少商穴在十指頭刺法。詳見中風方內。委中穴在腿灣。須手蘸溫水拍打。打出紫紅紋是也。

華陀危病方治霍亂神效

白礬一錢爲末

百滾湯
調服

外治方 霍亂吐瀉將死。藥不可下者。用食鹽填滿肚臍。於臍上置艾丸。炙七壯。卽愈。

霍亂轉筋。木瓜煎湯服。外以布蘸熱湯熨之。凡轉筋。男子以手挽其陰。卽愈。女子以手牽其乳向兩旁。卽愈。

急治方 霍亂吐利及轉筋 鍋底煤 竈額上煤各五分用百滾湯沖一盞。急攬數十下以碗蓋之稍定通口。吞二三口立愈。以後戒食烏魚。

乾霍亂 吐瀉不得身出冷汗 食鹽一兩薑五錢切片同炒變色以水一大碗煎服得吐自愈。

絞腸痧 胡椒七粒布包嚼碎納入臍中。膏藥貼上以熱手按之。蓋被臥少頃。腹中作熱有汗。寒散自愈。

又治手足厥冷。欲吐不吐。欲瀉不瀉。陰陽乖隔。升降不通。痰壅腹脹。汗出欲絕。用炒鹽一兩牙皂一錢水煎服即吐。

腹痛症 胡椒綠豆各四十粒同研滾酒沖服立止。寒熱並治。

序注

復痛

房事後中寒腹痛。生薑葱白同搗爛。熱酒沖服。強睡片時。汗出卽愈。體虛者不宜。如痛甚。再以葱頭搗爛炒熱。攤貼臍上。用艾灸之。得鼻尖有汗。其痛立止。又方見中寒下。

土熨法。治身受寒熱。心腹疼痛。醫家辨症不清。涼熱混投。或鄉僻之地。無藥調理。飲食漸至不進。大便不通。小便短澁。上下關格。渾身擁緊。或六脈沉伏。或緊數之極。甚至手足腰膝殼硬。不省人事。此危篤之症。急用陳乾土磚。搗成粗末。約二升許。以鍋炒大溫熱。用青藍布包。一半揉熨腰背胸腹等處。冷則另換。一周流揉熨。約半時久。自覺胸腹氣流通而愈。或再用皂角末少許。吹入鼻中。得噴嚏。則氣隨通暢。

癰症 陰癰則腹痛而手足冷。看身上有紅點以燈草火爆之。陽
癰則腹痛而手足煖。用針刺指頭少商穴使出血即解。少商穴
見前中風下。無論陰陽二症。忌食熱湯熱物。

治陰症時癰手足抽弔卽麻腳痙 硫黃五錢 瑤桂三錢 丁香二錢 香附
二錢 腐香一錢 各研極細末和勻。如平時配合磁瓶封固可以濟人。
如急用。約以藥末一分。五厘。繆臍中用。煖臍膏封貼。卽愈。如症重。若
氣漸敗。急用艾鋪或草紙三四張。罩臍。以熨斗熨之。無不立愈。
回陽後當救陰。孕婦忌用。

又方 用食鹽二斤炒熱以青布包更換熨胸腹腰背。久久熨之。
氣透卽愈。或以葱熨亦可。再用鹽置刀口上燒紅。陰陽水調。

服或吐或瀉而愈。

凡一切陰陽痧斑痘瘡烏癧絞腸痧霍亂等症

白礬
錢三敲成米粒

大粗末用陰陽水送下再用針刺眉心頭頂心中指尖使出血

立愈

中淤腹痛或昏沉悶脹試取生芋艿頭食之如非痧則難食是痧則甘美異常再食一箇脫然而愈

又法以食鹽一握揉擦兩手腕兩脇兩足心並心窩背心八處擦出許多紫血點漸覺鬆快而愈一切痧脹及中暑霍亂等症雖垂死亦活此第一簡便良方也

刮痧法有人因暴雨後中陰寒痧毒之氣上爲嘔惡下爲胸腹絞痛以鹽湯探吐其氣愈升其痛愈劇因而上塞喉嗌不能出聲水藥毫不可入乃用刮痧法擇一光滑細口磁碗另用熱湯

一鍾入香油一二匙。將碗口蘸油湯令其緩而且滑。兩手覆執其碗於病人背心上。輕輕向下刮之。以漸加重碗乾而澁。則再蘸再刮。良久覺胸中脹滯下行。始能出聲。頃之腹中大響。大瀉如注。其痛遂減。睡後通身搔癢。發出疙瘩風餅遍身。而病愈。今有於頸臂刮痧者。亦能治病。然五臟之系。咸附於背。向下刮之。邪氣隨降。故毒深病重者。非治背不可也。此爲患痧症者。起死回生之方。神效無比。

治斑痧。其症頭腹痛。煩悶眩暈。若與別症相同。但起於卒然之頃。痛甚狂叫。六脈皆沈。或右關浮洪。胸背股上有細斑。隱于肌膚之內者是也。用燈草蘸菜油點火照之。隱隱紅斑上焮。必爆

响務要細看。以紅斑粹盡爲度。否則復發。再用蕎麥五錢煎湯溫服。自愈。忌食薑茶酒烟。陳皮。紫蘇。甘草。半夏。猪羊肉。誤食者凶。又方用升麻煎水偏掃愈。

痳疹外治。古書痳爲肺病。痳爲陽毒。凡痳疹癰瘍。南北稱名不同。實則一也。痳發不透。氣喘欲死。亟用芝麻五合。滾水泡之。乘熱熏頭面。起死回生。理淪
駢文

羊毛疹。眼目黃。指甲多紫。用燒酒搏黃土。慢揉擦心口。

痢疾。痢症多起於暑天之鬱熱。而又感以水溼雨露之氣。紅白相間。如血如膿。甚者如屋漏水。如魚凍水。裡急後重。崩追瘀痛。欲下而不能。欲不下而不得。一日夜數十次。甚至百餘次。氣息。

奄奄坐而待斃此痢之概也。若驟止其邪則死生頃刻不止其邪則危絕如絲。欲補氣而邪氣轉加。欲清火則下行更甚。此時惟有因勢利導之方可行。或疑人已氣血虛敗。更加利導恐其難堪。不知邪氣一刻不去。則正氣一刻不安。古人治痢無止法。

信不誣也

方用白芍

當歸各三錢

蘿蔔子兩

枳壳炒 檳榔

車前子

甘草各三錢

水煎服一劑卽止。二劑全安。可用飲食矣。

此方之奇妙全在重用歸芍。蓋水瀉忌當歸之滑。而痢疾則正喜其滑也。芍藥味酸以平肝木。使木不敢再侵脾土。又有枳壳。梔榔消逐其溼熱之邪。又加車前子分利其水溼而又不耗其真陰之水。所以功勝於茯苓也。尤奇其用蘿蔔子一味。蓋蘿蔔

子味辣而能逐邪去溼。且又能通達上下消食利氣。使氣行於血分之中。助歸芍以生新血。而祛蕩其敗污也。少加甘草以和中。則無逼烈之患。此奏功之神奇。實有妙理耳。

痢疾三方。痢爲險症。生死攸關。不惟時醫治之失宜。卽古今治法。千家多未得道。惟倪涵初三方。不泥成法。不膠成說。自然奇妙。有識者切勿更張。遵而用之。百發百中也。

初起方。川連一條。芩白芍各一錢。枳壳二分。梔榔厚。模姜汁。青皮各八分。當歸。甘草。地榆各五分。紅花三分。桃仁酒炒去皮三分。木香各二分。研木香分。水煎空心服。或紅或白裏急後重。身熱腹痛者俱可服。如單白者去地榆。桃仁加橘紅四分。木香三分。如滯澁。

甚者加酒炒大黃二錢服一二劑仍去之。若一劑帶澁已解則二劑不必再用。若年壯者大黃可不必拘定二錢。此方惟用於三五日及旬日神效。若半月內外則當加減。另詳於左。

又加減煎方。川連酒炒六分條芩酒炒六分白芍酒炒四分稭紅四分當歸五分青皮四分梔榔四分甘草炙三分桃仁六分紅花三分木香二分水煎服如延至月餘覺脾胃弱而虛滑者法當補理。

又補理煎方。川連酒炒六分條芩酒炒六分白芍酒炒四分梔紅六分當歸五分甘草玉人參各五分水煎空心服。渣再煎服。若貧人無參則重用於潛白朮亦可。白朮用米泔水浸透土炒荷葉包蒸。以上三方隨用輒效。如孕婦服則去桃仁紅花梔榔。

又經年不愈者名休息痢。虎骨炙焦搗末米湯煎服二錢每日三服。又哺退雞子壳研極細末每用一分白湯調下。

又飲食不下者名噤口痢。五穀蟲於流水處洗極淨瓦上焙乾爲末每服一二匙米湯或黃糖湯調下便能思食大有奇功湯水皆不能下則用蘿蔔切片蘸蜂蜜入口噙之嚥汁味淡再換久則自然思食再進稀粥則下矣。

噤口痢神方。神曲二兩炒山楂二兩連翹一錢另蒸烏梅三個甘草分荔枝肉七個水三大碗煎溫服且吐且服自然開闢。

又方。木鱉子末和麪作餅貼臍中效。

又方。水蛙一隻連臟搗烘熱和麝香五分作餅貼臍上氣通即進食。

又方 五桔子 車前子 細茶葉 各二錢 煎服

治泄瀉暴痢。大蒜搗貼足心或臍中。兼治下痢噤口及小兒泄瀉。

腹瀉紅白痢仙方。紅曲五錢。金銀花五錢。陳皮一兩。荷葉蒂四個。各炒過。煎湯服。立愈。屢驗。

又方治久痢二三年者。用苦參子二十粒去皮。將桂元肉每粒包好。飯鍋上蒸。候冷分早中晚每服七粒。如未愈。明日再服廿一粒。開水送下。屢試多人神效良方。

又方久痢不止。臭椿樹皮五錢。用酒二碗煎服。立愈。

又痢疾方 血痢不止。用荷葉蒂十枚。水煎服。卽止。下痢噤口。開

胃方。用河糖半斤烏梅一個水二碗煎一碗時時服卽愈神效。

預免瘧疾

三伏日生薑

半斤煎湯熏洗腿臻兩腳

理滄
駢文

又痢疾奇效方。不拘紅白久近皆治。有患病日夜不止。越三十八夜不能睡。藥窮待斃矣。用此一服卽安。三服全愈。
蘿蔔取自然汁。老生薑自然汁。半酒杯。生蜂蜜一酒杯。細茶陳者佳濃一杯。和勻服。若無蘿蔔。多用蘿蔔子。冷水浸過搗取汁亦可。

瘧疾。倪酒初瘧疾三方最爲神妙。不拘陰陽瘧。自一二三日及四時瘧。不分老少。不分久近。依方循次服之。百發百中。切勿妄爲增減。

第一初服方

陳皮

茯苓

製半夏

威靈仙各一錢

柴胡

蒼

蒼

朮米泔水厚朴炒黃芩各八分
青皮 桔榔各六分 炙草三分
片
井河水各一鍾煎飢時服。頭痛加白芷一錢。無汗加麻黃一錢。只用一劑仍去之。此方平胃消痰理氣除溼。受病輕者二劑卽愈。若三劑後病勢減而未全愈者。則服二方。

第二方

生首烏

三錢陳皮

茯苓 柴胡 黃芩

各八分當歸

白

分

分

分

分

分

分

分

各八分當歸

白

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

朮米泔水威靈仙各一錢。知母去毛淨鹽炒二錢。鱉甲不見湯者醋炙三分。薑三片。井河水各一鍾。煎八分再加酒半鍾。再滾空心服。久瘧加蓬朮一錢。此方補瀉互用。虛實得宜。卽極弱之人受極重之病。五劑之後立有起色。如加減一二卽不效。至瘧止之後。再用三方。

再用三方。

第三方 人參 黃芪

一錢 二分 當歸

一錢 一錢 陳皮 八分 炙草 分柴

胡八升

升麻 酒炒 四分

或加何首烏二錢 知母一錢

或加青蒿子八分

麥冬一錢

薑棗爲引半飢時服

三五劑元氣充實永不發矣無力用參者

則重用黃芪白朮。

三日瘧 獨蒜一枚黃丹一錢搗和分作三丸。於發日早起向東以井花水送下一丸。連服三日效。

久瘧勞瘧 蟹甲炙研末每服二錢酒下。隔夜一服清早一服臨時一服無不斷者。或加雄黃少許。

久瘧極虛 於潛白朮米泔泡透土炒一兩老生薑五錢水煎露一夜五更時隔水燉熱服。夜發者加當歸三錢輕者三服重者五服安效。

愈後多服數劑亦佳。

外治方 胡椒疏黃各三厘。研末摻膏藥上貼背脊之正對肚臍眼處。過期卽愈。○又方 明雄黃 製附子 真潮腦各等分爲細末。於瘡未發前一時以棉花少許包裹藥末三分塞鼻孔中。男左女右。塞藥後勿食湯水。睡過此時卽愈重者依法塞二次必效。小兒量爲減用。

陰症 一方見傷寒門。一方見中寒門俱同治。

此症腹痛肢冷昏厥。或面唇青手足紫黑。多因得於大吐大瀉之後。又或因房事而厥。男死爲脫陽。女死爲脫陰。方用葱白一大束去根及青葉留白約二寸。以布條圍束成餅。烘熱安於

肚臍上以熨斗在葱餅上熨之。葱爛再換。俟熱氣透入卽愈。內以連鬚葱白七根搗爛。酒煎濃灌之。陽氣卽回。

又陰症握陰取汗法。露蜂房三錢燒存性和葱白五寸同研爲丸。着手中男左女右。握於陰口。靜臥汗出卽愈。

治陰症肚痛欲死。立刻卽效。並治傷寒夾陰。
枯礬 火硝 胡椒 黃丹各一錢 丁香五分共爲細末。陳醋調成團。握在手心。男左手右。以帛絹紮緊手。久之汗出而愈。

治陰症肚痛面青。鴿子屎一大撮。研細末。沖入滾酒。薰被令燶。覆臥一時。汗出卽愈。永禁食鴿子。再無後患。

治陰症手足紫黑。用黑料豆三合炒熟。加連鬚葱白三大根。好

酒煎滾乘熱服立效終身忌食黑魚。

腳氣。此症始於受溼復挾風寒食熱之邪而成。故先起於腿足。必腳屈弱而舉體轉筋肢節疼而足脃腫。小腹不仁心中悸動。胸滿便澁但發熱頭痛身疼之候。絕似傷寒人多誤治。故仲景以腳氣爲類傷寒症。另立篇目以別之。古人謂之厥症。類傷寒則難察。能致人死則難治。詳究其症候之由。平居於酒色及勞役之後。外感風寒暑熱忽然手足逆冷或熱。其氣逆從脚下而起。上沖小腹作痛。或脹悶。或嘔吐。或昏迷。或兩足脃紅腫。寒熱如傷寒狀。從此或一月一發。半月數月一發。漸漸四肢攀縮。腳膝腫大。此爲腳氣。非中風寒也。或發作而手足不病者。亦謂之。

腳氣。此病南方人最多。雖由卑溼之氣所感而始寔。自酒後房勞傷其胃腎。倘不知爲腳氣。而誤以傷寒中風治之。其不至於殺人者鮮矣。

腳氣外治驗方 白礬二兩。地漿水十大碗。新杉木數斤。煎六七滾用杉木桶新者更佳盛一半浸腳。留一半徐徐添入。上以衣被圍身。使略有微汗。洗完隨飲薄粥。如一次未愈再洗二次。照前方更加硫黃三錢。無有不愈矣。 取地漿法於淨土地上掘二三尺深。用新汲井水傾入攪濁。少俟澄定。取半清半濁者吹去浮沫用之。○又方治腳氣兩脰紅腫。鳳仙花葉枸杞葉同煎濃湯浸洗。再生搗汁敷。

治寒熱腳氣方

花椒一兩。葱一株。大薑三片。水數盃。煎湯熏洗。卽愈。

治腳底板紅腫熱痛。名爲腳隱。敷藥效方。

大蒜頭和鹽同搗爛。

敷過一夜次日卽愈。

治腳氣攻注。急用大田螺數個。搗爛敷於兩足股上。便覺冷氣。

趨出至足而安。

治鄉人中肥足潰

凡農家糞澆地上爲烈日晒蒸人跣足行其

上。則受熱毒。必足趾腫痛似潰非潰。俗名惹肥。用鴨毛煎湯入

皂礬洗之。卽瘥。

治感冒一切風寒。神白散

白芷一

兩

生甘草五錢

淡豆豉五十粒

加生

薑三片。葱白三個。水煎服。取汗。卽愈。

感冒初起。發熱頭痛。口乾無汗。

細陳茶

一錢

核桃肉

三個

生薑

二錢

連

鬚葱白

七個

共搗碎。

用水一碗煎

七分熱服

益被取汗愈。

又方

黑豆一合炒深黃色爲末。

分二次黃酒沖滾服。自愈。

治頭疼

川芎一錢

茶葉二錢

水煎服。

偏頭疼

蘿葡汁一錢

加冰片少許

昂頭灌入鼻中

左痛灌左

右痛灌右

卽愈。

外感初起

柴胡一錢

荆芥一錢

半夏一錢

製黃芩一錢

甘草一錢

水煎服。

此先治之法也。

四時不正之氣由皮毛而入營衛。今用柴胡荆芥先

散皮毛之邪。免致入裏。半夏黃芩使不得挾痰挾火爲患。又用

甘草以和中。所以邪氣先散。而正氣又不受傷。○又方亦先治

法也。柴胡一錢當歸一錢白芍二錢甘草一錢陳皮一錢天花粉一錢黑梔

水煎服。

一錢當歸一錢白芍二錢甘草一錢陳皮一錢天花粉一錢黑梔

子一錢水煎服。此方不獨治外感也。凡肝氣鬱者服此一劑卽快。又治內傷初起者服此一劑亦效。又云一家不食牛犬二肉。不染瘟疫之症信然也。

一枝梅 試男婦新久諸病生死用 珠砂 靈脂 雄黃各三

錢

各三

銀硃一錢巴仁 草麻仁各五分 加油胭脂杵爲膏。捏成小餅貼於印堂。約一炷香時去之。如貼處紅腫飛散者可生。如皮色不變者已危。若是遠客可卽早送回鄉亦爲陰德。○又此方用蜜丸貼眉心紙蓋可治噤口痢疾。理淪
駢文

百歲酒方 炙棉芪五錢 茯神五錢 熟地五錢 生地三錢 當歸三錢 炙潞黨四錢

麥冬二錢 五分 去心 茯苓三錢 焦朮二錢 五分 桑皮二錢 五分 分去核 川芎一錢 五分 龜膠二錢

本草綱目 卷之二十一

外感

百歲酒方

五分防風二錢甘枸杞二錢陳皮二錢肉桂一錢五分五味子一錢羌活一錢加鹿角膠二錢五分黑棗八兩紅棗八兩冰糖四兩膏梁燒五斤

增輯普濟應驗良方

瘡毒各方卷二

喉蛾 凡喉中生毒須看頭上有紅疙瘩卽用針挑破或生紅髮

卽扯去其毒自解

凡治喉症初起宜用表散風火痰藥

兼治咽喉十八種毒 猪牙皂

七根去邊水

二鍾煎六分去渣入蜂蜜

少許或雞蛋清少許溫服卽吐出風痰

毒氣自洩勝用刀針○

又外用米醋調皂角末塗頸與下頰乾又換塗

乳蛾自破○又

方雙單蛾皆治 麻雀屎

二十粒浸糖少許和成三丸每用一丸

以薄綿裹之吞嚥下甚者不過三丸立見奇效

治喉閉 臭蟲

七個

燈心灰一人指甲灰

一分

其研細末吹

喉中結塊。不通水食。危急欲死。

百草霜

卽鍋底烟煤。鄉村人家燒草者爲真。少和。

蜂蜜爲丸。如芡實大。新汲井水化一丸灌下。甚者不過二丸。此

名百靈丸。

○又膽礬

釐

含口內。惡涎自出。吐之自愈。

○又方治

一切喉痺及咽腫痛

白僵蠶

三錢

水煎服。下咽即效。

無論雙單蛾及一切喉毒。燈草燒灰。吹入喉神效。

針法

耑治喉閉。並治大頭風。蝦蟆瘻。

用磁鋒或銀針刺少商

穴。使出紫血。卽愈。少商穴及刺法詳見中風門。但喉閉。左腫刺

右大指。右腫刺左大指。若口噤不開。並刺兩大指。以線繫指根

方刺。若蝦蟆瘻。則並刺左右大指及中指。

爛喉丹痧症最速暴甚。有且發夕危。一時醫藥所不及者。最爲可

憫有至便之法可以立治其法喉初痛時卽用錢薰香油隨其痛處於頸內括之外見紅斑內痛立止即使紅腫勢甚湯水難嚥一面延醫用藥亦速於腫痛處四圍括之並可洩毒而愈

急喉風 噁刻不通欲死者返魂草一根洗淨納入喉口待取惡涎出卽瘥更以馬牙硝津嚥之卽絕亦甦本名紫苑南人呼夜牽牛驗方○一方用燈盞油甚者不過三四五呷可通急鎖喉風一方用膽礬一塊含口中其痰涎自壅出吐盡愈單方全集喉閉先兩日胸膈氣緊出氣緊促猝然喉痛手足厥冷氣閉命在頃刻速用雞毛或鵝翎蘸桐油喉間擾探吐痰立開或用山豆根唧汁嚥之亦開忌牛黃入口不救如無藥與有藥不進者急將兩

臂以手勒數十次。取油髮繩扎大拇指。以針刺甲邊一分。卽少商穴血滴下。其喉卽開。男左女右。重者兩手齊針。吳興錢青捨單方全集

解毒喉風丹

治喉科危急之症

雄黃五錢

川鬱金三錢

巴霜二錢半

醋糊爲丸

歸脾

○又方治喉風十八症

明礬豆大一塊

和入重湯溫溫

啜下

口瘡方 川黃連 北細辛 二味生研極細末。以小管吹入瘡上。神效。此方熱因寒用。寒因熱用。功成而無偏勝。大人小兒並治。

治口瘡方

朴硝含之漸愈。凡咽喉口舌生瘡。以吳茱萸爲末。醋

調貼兩足心。一宿卽愈。此藥性能引熱下行之故。

口舌生瘡 黃柏

八分

川連五

兒茶一分

生研細末。擦之。

舌腫 又名翹舌。猝然舌大腫硬。咽喉閉塞。至危之症。

皂礬量用

少於新瓦上燶紅色爲度。放地下出火氣。候冷研細。搗開牙關。以竹管吹入舌上。或將藥頻擦。其效如神。飲以真百草霜酒調服三錢。愈後忌食龜肉及鯀魚二物。

舌出血 槐花研細末敷即止。

舌蕈生舌上。出血不止。卽不救方用 五倍子炙研一錢烏梅去核炙研一錢糠絲三分研細末。摻蕈上。以小膏藥蓋之。方能久留於舌上。否則隨津嚥吐矣。日日換之。愈後乃止。屢效。

癰疽疔瘻。一切重症。以下十二方皆妙。

芙蓉散 一切癰疽疔瘻皆治。秋芙蓉葉 或生研。或乾研加蜂

蜜調塗周圍留瘡頭不塗乾則頻換更取汁和酒隨量飲初起者卽消已成者易潰已穿者易斂或用花或用根皮俱奇效再加赤小豆末一錢效更速但無蜜則粘緊難揭爲囑

神仙截法治癰疽疔瘻一切大毒。眞麻油一斤。砂鍋內煎數十滾傾出。兌酒二碗。通口熱飲一二碗。少頃再飲。急則一日飲盡。緩則分二日飲。無有不愈。獵者凡中毒藥急飲麻油藥毒卽消其效如神矣。

隔蒜灸法治一切瘡毒。或大痛。或全不痛。或麻木痛甚者。炙至不痛。不痛者。炙至痛。其毒隨火而散。大蒜頭去皮切得三文錢厚。安瘡頭上。用艾壯於蒜上炙之。三壯換蒜復炙。未成者卽消。已

成者亦減。其勢不能爲害。如瘡大則將蒜搗爛攤於患處。用艾鋪上燒之。蒜敗再換。○凡不痛或不作膿。不起發或陰瘡尤宜灸之。如多灸而仍不痛。不作膿。不起發者。不治。○若頭上見疽。宜用騎竹馬灸法。及足三里穴灸之。○若背疽漫腫無頭。用溼紙貼腫處。但見一點先乾處。即是瘡頭。可用大蒜十顆。淡豆豉半合。乳香末錢許。研勻鋪瘡上。攤艾灸之。如上法更換。

葱熨法。治虛怯人。肢體患腫塊。或作痛。或不痛。或風襲經絡。肢體疼痛。或四肢筋攀骨痛。又治流注。及婦人乳吹乳癰。及便毒初起。葱白搗爛炒熱。布包熨患處。冷則易之。再熨再易之。數次腫痛即止而愈。永戒食龜肉。

桑木炙法。治一切癰疽疔瘻。並治瘰癧流注。瘰瘻頑瘻久不愈者。俱有神效。乾桑木劈碎。紮作小把。燒燃一頭。吹熄。持近患處。炙之。每炙片時。日三五次。以瘻肉腐動爲度。大抵未潰。則解熱毒。止疼痛。消瘀腫。已潰。則補陽氣。散餘毒。生肌肉。若陽症腫痛。或重負如山。用此法出毒水。卽內消。日久者用之。雖潰亦淺。且無苦楚。○陰瘻不起者。炙之即起

豉餅炙法。治一切癰疽。既潰不斂。瘻色黑黯。香豆豉升入少水。搗成泥。照瘻大小。作餅。厚三分。安瘻上。鋪艾炙之。但使溫溫覺熱痛急去之。患當減快。一日炙二次。如瘻有孔。留孔勿覆。列艾其傍。炙之。聽其出汁爲妙。

礬蠟丸

白礬

三黃蠟

兩

先將蠟鎔開離火傾入礬末攪勻俟少

溫眾手急丸桐子大冷則堅凝難撚此爲托裏消毒固臟腑止

疼痛之妙藥也○諸毒潰後服之能護膜止痛消毒化膿若腸

肺生癰及遍身生瘡狀類蛇頭者更有排膿托裏之效每日百

丸分三次服食前酒下

菜油飲治一切瘡毒重症陳久菜油三大杯一時飲盡並以菜

油煎葱白至黑色趁熱旋塗患處止痛立愈

栗子散治疗毒重症

栗子

用壞黑不可食者連壳瓦上煅枯

海螵蛸去甲等分研

末蜜調遍敷再以金銀花煎湯調服三錢奇效

菊花汁治疗毒重症家園菊花多取搗瀘汁一大碗飲之即愈

無花用葉。

無葉用根皆效。治療神方也必須多汁。少則無益矣。

神燈照法治一切大毒。不拘已成未成。已潰未潰。始終俱可用也。
雄黃 没藥 碑砂 血竭 鐵各一錢 麝香 分二 共爲細末。用綿紙作
撚。每撚用藥三分。蘸香油點撚離患處寸餘。自外而內。周圍徐
徐照之。毒大者連用撚三根。日照二次。毒小者用撚一根。日照
一次。重者不過五六日已成者卽消。已潰者卽斂。陰瘡不起發
者。一照卽起紅暈。毒隨火散。百試百驗。

忍冬酒 忍冬藤即金銀花藤 生採五兩。忌鐵器。以木椎搗爛。加甘草
節兩同入砂罐內。水二碗。慢火煎至一碗。入無灰酒一碗。再煎
十數沸去渣。分爲三服。一日夜服盡。重者一日二劑。以大小便

通利爲效。再將藤上花葉摘取一把。瓦鉢搗爛少入白酒調塗。
四圍中留一孔洩氣。○此方治一切無名腫毒癰疽瘡背。屢有
奇效。

瘡瘍用藥。有因人而異者。有因時而異者。亦有舍時從症者。
皆須通變。以上十二方爲通治妥法。百試百效。無論陰症陽
症。在上在下。在內在外。一切大小瘡毒。及無名險惡症。擇方
依用。皆可化凶爲吉。

代刀散。鹽滷蟾酥共和一處。如瘡腫疼。將此放上。立刻頭破。比
刀刺爲平妥。

治背毒未成者。用活蝦蟆一個。繫放患處。半日蟆吸去毒。必昏憤。

取置水中。以救物命。再易一個。必踉蹌。又易其蟆如常。則毒散矣。

凡患癰疽瘡癧者。用土中大蝦蟆一個。剝整皮蓋貼瘡口。皮上用針刺數孔。以出毒氣。自覺安靜。且能爬住瘡口。不大極神效。

消毒散 蜈蚣三條 炮甲一錢 純香三分 破砂二錢 明雄三錢 共爲細末。磁瓶收貯。凡用少許散膏上貼之。卽消。

對口瘡 活鯽魚一大尾。入瓦盆內搗爛。加頭上篦下髮垢四兩。和勻敷之極厚。外以紙貼一二日。卽愈。加生山藥一條同搗。并治乳癰瘰癧。○又方。猪眼角處臭肉。形如腰子。有花紋者。量瘡大小。用多少個。和糯米飯同搗成餅。緊貼不空。頭立時止痛。已潰者亦

拔毒收功愈後永遠戒食鯽魚

治瘡毒收口方 鱉甲陰陽瓦焙存性研細末過篩摻之數日愈
治一切瘡久不收口方 蜜陀僧一兩輕粉四錢枯礬各一錢共爲
細末摻之無不收口

治瘡生致命處用金殼榔研水摻可移於不致命處一二寸此藥
出廣東者極佳但有毒不可入口

腸癰一足攀口有臭氣即是此症桑樹上結繫一塊以陳米醋磨汁服。毒卽瀉
下瀉後急服補中益氣湯以防氣脫此神效方也。

珍珠八寶丹 甘石五錢龍骨四錢梅片三分鹿霜一錢石脂五分血珀五分
錢珍珠一錢掃輕粉二錢共乳細末

凡腹內生毒不可藥治者。皂角刺酒煎溫服一碗。其膿血下從小便中出。水煎亦可。角刺不拘多少皆可。

肺癰

綠橘葉

一把洗淨搗汁服。吐出膿血即愈。

乳癰

白礬

雄黃

松蘿茶

各一錢

共研細末。飽時服每用一錢。

以豆腐皮包之吞下。飲酒盡醉。未成者一服消已。成者兩三服

愈。

膝上生癰

名牛頭癰

連鬚葱頭

切碎

用糯米飯乘熱拌敷。重者五六次

卽消。

血疔出血不止方。用飲真麻油一大鍾卽止。

紅線疔。此症危急。生於足者。紅絲漸長至臍。生於手者。紅絲漸

長至心。生於唇面者。紅絲漸至喉。至則不可治矣。急用針或磁
鋒刺破其紅絲盡處。使出血。以浮萍嚼塗刺處。隨用白礬三錢敲
碎。以葱頭七根搗爛。包裹礬末吞下。再服葱酒一二杯。被遮臥。
汗出卽愈。其效如神。

治疗毒疔瘡乃外科旦夕之險症。此方統治各疔。價廉可預合施送。其功莫大。 雄黃 大黃 巴

豆去壳心皮各生用。王錢三共一處搗如泥。以飛麵陳醋煮糊爲丸。如鳳仙子大。症重者二十三丸。輕

者二十一丸。放舌上熱水送下。服後打噎則愈。如瀉更妙。俟三四次。卽以新汲水飲之。卽止。如重不省人事。將二十三丸用滾水化開。從口角邊灌入。服後扶坐片刻。便醒。忌雞魚葱蒜牛馬肉。辛炙飲酒行房。七日後好。

治疗瘡小奪命散及腦疽惡毒其效如神。

槐花子

蒂子 千

頭子

卽掃
箒子

各等分水煎溫服

加蟾酥少許更妙

又方

家園菊花

無花卽
取根葉

取汁一碗服下卽愈

又方摻疔散

滑石

二錢硃砂一錢冰片

分爲末摻之

治閉口疔生於人中將起時頭痛身熱如延不治對時卽死方用

生鳳尾魚頭

如無生的
鹹魚亦可卽

煅灰醋浸再用人面果去核將魚頭

灰嵌入貼患處立效

治疗毒方

巴豆一粒 飯一粒 同搗如泥貼之

拔疔秘方

鯇魚膚用手括下不可見水陰乾收儲用時以銀針

撥開疔頭將一片貼上外以清涼膏蓋之一宿揭開其疔連根

拔出後用生肌散收功。有人腳趾患此二年。用一片以銀花湯浸軟。拭乾貼立愈。

紅絲疔。此症若不急治。隔一日外即難救矣。須用銀針挑斷紅絲。再將多年糞坑上橡木燬灰研末。用鶴糖拌塗疔上。聽其出頭無害。

翻唇疔毒。有少年唇口患疔。接連七個。頭腫如斗。心悶神昏。一女丐曰。此名七星赶月。急用蛔蟲搗爛塗之。頃刻瘡口流出黃水。腫消神清。次日愈。如無蛔蟲。以五谷蟲一錢。燬末。白礬三分。蟾酥三分。燒酒化烊。共搗勻塗疔上。少刻疔破。流出毒水亦效。凡疔生唇口上。卽看大腿灣有紫筋起者。急用銀針刺出血。卽

疔瘡走黃。凡患疔毒。悞食猪肉走黃法在不治。急搗芭蕉根汁。服之立效。屢試屢驗。

又方 丁香 木香 沈香各四分。乳香五分。雄黃六分。麝香一分。共爲細末。醋調勻。先將瘡頭挑破。搽藥加觀音膏貼之。三日愈忌口戒房事一月。

骨疽出骨不止。烏雌雞一隻去肉。取生骨燒成炭。再取三家所用蠶罩及砧案。各刮下垢屑一兩。俱燒枯。共研爲細末。納入瘡口。其碎骨卽盡出而愈。○又方蜜陀僧研末。桐油調稠。攤布貼之。○又方蟻蟎七枚同熟大麥搗敷亦效。

惡瘡腫痛。叫號不眠。人難別者。獨頭蒜數顆搗爛。麻油拌和。厚敷。瘡上乾。又換。毒消痛止。無不神效。

惡瘡有肉。如飯粒突出。破之流血隨生。馬齒莧燒枯研末。以豬脂油調敷。神效。永禁戒食鵝肉。

癰疽。惡瘡。膿血不止。生枸杞根皮。洗淨。先將皮內白瓤成片。刮起。留用。以粗皮及梗煎湯洗。令膿血淨。隨以白瓤貼之。卽結痂而愈。倘有惡血隨洗時出。勿懼。洗淨貼瓤自止。

頑瘡。腫掀多年不已。馬齒莧生搗敷之。三次卽愈。奇效。

腫毒皮厚不出頭。麻雀屎研細末。米醋和成豆大一粒。乘溼安瘡。當中卽穿破。○又蛇蠅燒灰。猪油和塗。卽有頭出。

諸毒瘡不斂口。龜甲殼研末摻之卽斂。永遠戒食龜肉。

治瘡不收口。西洋秘法用整石灰一斤放缸內以清水八斤燒滾傾入攬勻。俟澄清另傾在一盆。濾渣聽用。如要收口。剪新白布一塊浸入一刻取起貼患處卽收口。或以象皮浸貼更妙。

鼠癟。瘡雖合口有旁眼出膿不止者。鼠毛搗爛亂髮一團以陳猪油或火腿肥肉熬令鼠髮消盡爲度。以一半塗瘡眼一半酒服自愈。永遠戒食鵝肉及兔子肉永遠無後患。

腫毒疼痛難忍。芭蕉根搗爛塗之卽止。

神功沃雪湯

治一切無名腫毒

當歸

最重者用八兩輕者二兩

白芷

重者用四兩輕者一兩

夏

枯草

重者二兩

姜蠶

一兩輕者二錢半

頸以上

加川芎

膝以下

加牛膝

水酒各

半其驗如神。

無名腫毒方

大黃

黃芩

黃柏

各三兩

陳小粉

二兩炒黑共

研醋調卽軟

諸瘡潰爛之後。疼痛難忍。

天南星

爲末遍擦甚效

方名壽星散

洗瘡方。一切瘡潰。以此洗之。能消熱毒去惡解穢。

白芷

甘

草

羌活

赤芍

當歸

露蜂房

各等分

用猪蹄一隻水

五碗煮湯三碗入前藥共三兩煎數沸洗之奇效。

瘡疽作痒難忍。食鹽乾摩其四圍卽止。

蟬蠅或末或煎水擦

洗亦止。

瘡癩作痒。白扁豆搗研細末封之卽止。

破傷風。凡瘡破以及刀傷打破皆須禁風。若受風傷。則瘡欲死。

晉漢良方 卷二
蟬蠅去頭足翅六錢淨

瓦上焙乾爲末。陳酒調服卽吐出汗卽愈。

瘡破風傷水傷作痛。牛屎燒烟薰之令汗出卽愈。

瘡犯婦人惡露穢氣發惡。巴豆三十粒入麻油煎至黑色去豆

以油調硫黃輕粉末頻塗。

又一切瘡毒方。三七者。田州真醋磨汁塗卽散。破者研末乾摻。此李

瀨湖名醫集簡方。屢效。

虎口毒。生大指次指間。鮮螃蟹搗爛塗之。自消永遠戒食螃蟹。

穿掌毒心。新桑葉研爛塗之。愈後永遠戒食鵝肉。

天蛇頭。生指。蜈蚣一條研末。猪胆汁調塗。奇效。

代指。指頭潰爛。黃蠟。松香。鉛和作筒。指頭上久之自愈。

火珠瘡形如珠始生髮生蘿蔔搗爛醋浸敷之卽愈。

中相染不已

生蘿蔔搗爛醋浸敷之卽愈。

鬚毛瘡

生頭上如葡萄狀

黃柏

兩乳香半錢爲末

槐花煎水

調敷效。

燕窩瘡

生眉間葡萄狀

肥皂

燒存性枯礬等分爲末麻油調塗先用白礬泡水

洗○又方白菜搗塗亦效。

纏腰瘡

腰生細瘤兩邊生紅筋圍至臍卽死

陳京墨水磨濃和雄黃末塗之。

治纏腰火丹瘡毒方

此瘡初起發紅如帶圍住用龍胆草研細

末柿漆調塗立驗。

纏腰火丹糞缸上舊竹籤

煅出火氣研細末

麻油調敷。

白蛇瘡

遍身細白泡形如白蛇相纏

白芨

水龍骨

糞船板縫乾灰陳朽者更佳

共研細末

用無根水新汲未落地者調塗自愈。

瘰疽生手足肩背累累如赤豆刺之出汁大鯽魚一個亂髮圍大豬油四兩同熬成膏

塗之效愈後永戒食鯽魚烏龜肉

流火瘡兩腿紅腫放光其熱如火馬前子磨水塗一日一次其痛卽止。

流火在腿上成片色紫者用豆腐切薄片將甘草放在上同煎俟腐色黃取出候溫貼患處日換兩三次

赤遊風腳踝芭蕉根搗爛塗之最效

天行發斑狀如燒紅如豌豆頭面及身須臾周遍皆載白漿蜂蜜

升麻水煎每服一杯日三四服

再以綿蘸升麻蜜汁時時拭之自愈

天火瘡初起似疖子漸如水泡熱如火燒其色赤芸臺根苗

蔓青根苗各等分搗如泥

以雞蛋清調敷無蔓商陸根亦效青用商陸根亦效

不痒。五六次漸愈。除根乃止。如間斷則復發。如烟油。卽烟店刨
烟葉榨上打出之油。

鵝掌風癬手掌脫皮血肉外露豆腐熱沫。久久洗之。拭乾後塗以桐油燒松
毛烟薰之。自愈。永遠戒食鵝內。

又治鵝掌風。白礬。皂礬各四兩。兒茶五錢研。側柏葉八兩。河水十碗。
久煎入桶中。以麻布遮桶口。塗桐油於掌。擱布上。使熱氣薰之。
水冷乃已。七日可愈。忌以水湯洗手。

圓癬。皂礬炒乾爲末。猪胆調塗。立愈。○又方。穀樹皮剪圓如癬大。以
有毛一面粘口唾貼上。用手時時撲之。奇效。

治癬瘡方。雞蛋一個。浸在好醋內七日夜。其蛋自化。用時先以

穿山甲刮破患處。將蛋絞汁搽之三四次自愈。

紫癬風

雄黃

硃砂爲末。

以茄蒂蘿擦加蛇蛻并治

白癬風

白癬風

硫黃

蜜陀僧

爲末姜汁調擦加蛇床子并治

白癬風

汗癩

生黃瓜

蘚硼砂

末搽

隨搽

隨愈

搽藥後

以汗出

效愈

○又

方刺蒺藜

味一

研極細末

過篩去刺

用白醋調搽

以手指用力推

搽黑斑隨手而愈

惟薄留影子

連搽五六次

除根

愈後永遠戒

食各種飛禽野鳥等物

不致再發

血風瘡久不愈者

老南瓜

去皮煮爛

包布擠去水

以穰厚敷

三日收功

又方千年陳石灰研敷

卽止痛而愈

神效

治癩癩方

白蠟

二柏樹膠

三水銀

二黑鉛

一錢鎔化

投水銀內

共研爲丸

有癩處搽之卽愈。

下疳

陰頭生瘡

治

茲備載諸方俾自知

早治以免害也

亂髮團

大鹽水

洗去油再洗晒乾瓦上炙枯

棗核

七個

火燄紅其研勻

先用熟水

淘米泔洗瘡

忌用生水

拭乾敷之奇效

囊癰

騎馬癰懸瘡

凡覺玉莖後穀道前腫痛

卽多用生甘草濃煎多服

以殺其毒外用紫蘇

面青背紫者是葉

焰乾研末

麻油調敷

楊梅瘡

初起卽治卽愈免致毒氣染人

其食醋碟其處

小便卽能傳染

羊角

核桃殼俱燒灰存性等分研細末

每用半錢

好酒調早晚各一服

四日後毒從大便出如血如膿漸減作

每日一服

半月毒盡後

量人虛實服八珍湯以補之虛則多服數劑

魚口毒生一把左膀槐花炒黃燒酒一碗煎服出汗卽愈

外用百草霜

五棓子炒黃研末等分陳醋調塗一日夜卽消○又方瓦松焙乾爲末雞蛋清調敷不出膿奇愈

便毒毒生右膀

全蝎

去頭足米炒

生大黃

穿山甲

白芷等分水煎服

外用葱白搗爛和蜂蜜厚敷效

下疳陰痒

生甘草煎湯久久薰洗效海螵蛸末摻之愈

陰囊溼痒

蘇葉

枯炭

共研末摻之卽止

腎子爛出

鳳仙花子生甘草等分爲末麻油調敷卽生肌效

腎腫如水晶陰汗潮溼

龜心土

三升研碎熱鋪橈上

再以川椒小茴撒在上面將陰囊薰燙冷則再炒三次愈

又下疳方 鱉甲殼研雞蛋清生調服。外用生甘草研末蜜調頻塗。

腎莖脛門癰痒 陳葫蘆燒灰存性撲之即止。

陰囊痒 乾者用油核桃潤之 溼者用蘆甘石蛤粉撲之。

陰毛內生蟲或紅或白 生白果口嚼塗蟲自絕。

八腳虱便毛生虱其形八脚嘴入肉裏奇痒難忍除之不絕百部煎濃湯久洗再用水銀以唾津製之塗上除根愈後永戒食甲魚不致再發。

魚口便毒初起卽大如核桃花可以敷消方用 飛羅麪 黃豆

麪 雞蛋清調敷外用桑皮紙蓋貼每日早晚換二次數日可愈

大麻瘋方 鎮江丁參領得此秘傳法治全愈又以醫治多人無不取效如神但患此症者眉毛若已脫落其症難治如眉毛未

脫雖手足骨節有瘍損皆可取治。若初起未深之症百試百效也。○先服湯藥四劑。每日一劑。服完再服丸藥。

湯藥方 陳皮 白芷 苦參 天麻 秦艽 川續斷 防風
荆芥 羌活 風藤 蕃藶仁 牛膝 當歸 海桐皮 蒼
朮 木香 桂枝 連翹 甘草各一錢 黑棗二枚 生姜一片 水
二碗煎至一碗服。渣再煎二次服。

丸藥方 每丸藥一錢。加楓子膏。春秋八厘。夏六厘。冬一分。大胡麻一斤。
小胡麻一斤。牛夕四兩。白蒺藜一斤。苦參一斤。防風荆芥各八兩。當
歸六兩。蒼朮六兩。薏苡仁四兩。續斷四兩。共研細末水疊爲丸。每日早午
晚三服。每服三錢。照數加楓子膏。撲圓攏和以毛尖茶送下。或二錢。

楓子膏方 大楓子去壳取仁銅鍋內炒至三分紅色七分黑色爲恰好大過無力不及傷眼炒後研成細膏如紅砂糖一樣用銅杓盛向火上熬四五滾倒在紙上放地土面以物蓋之待用如上面霉拭去照常用○百日內切忌房事切忌食鹽犯之不效並忌食醬酒醋及一切雞魚發氣動風等物

耑治遠年男女陰陽血癬牛皮各癬奇效方

土荆皮一

木鱉子兩

一個
切片
楡榔七個
切片
防風二
錢射香二
冰片三
土螺螄七個
俗名揩包
瓦上或天井內
花台潮處皆有
愈多擦幾次
永不再發
愈後終身戒食牛內螺螄不致再發矣

治蛀髮毒癬方

要預用活蜈蚣

三

浸菜油內七日聽用

再量用

生木鱉

切片水浸數日入鍋煮極透取湯用卽令剃髮將木鱉湯洗之後卽用前油擦頭至愈

日止。

或用草烏

切片微火炙脆研細如粉醋調每日塗三次數日愈終身永遠戒食黑魚永不發

治熱毒溼瘡方

有人遍身生瘡痛而不痒手足尤甚並粘着衣

被不得睡覺卽用菖蒲

二三斤晒乾爲末

摻布席上臥之仍以被蓋臥

且不粘衣又能得睡五六日卽愈

漆瘡方

用真香油調樟腦擦赤腫處卽消

又治漆瘡方

韭菜搗汁擦之效

或以蟹殼煎湯待溫洗之亦

佳切忌熱水洗爲囑

治搭背第一奇效良方屢試屢驗

用虎骨

打碎黃連雞爪連人三錢黃連二錢

中黃

二錢人中白

二錢

白芷

二錢

乳香

二錢

沒藥

二錢

樟腦

五錢

青黛

一錢

五冰片二錢。右藥照方戥足。用週正不破不裂新磁碗兩個。一個
畧大。一個稍小。取其好蓋。將藥裝在畧微大些碗內。再將稍小
些碗蓋好。以綿料紙捻紙條二根。將紙條潤潮粘裏輕粉週圍
將碗口封密。勿使稍有微隙。然後再用黃泥拌薺糠全行將碗
週圍封固。單留下面碗底。用栗炭文火升提要升一根香工夫。
俟冷定後。將碗揭開。上面小碗內結胎的即是升藥。刮下來用
小磁瓶收貯。以蠟封口。勿令洩氣。用時照發背大小。以骨簽挑
藥末。搽患處。復以膏藥蓋上。立刻止痛去癟生新。輕則三五
日重則五七日。卽全愈如故矣。切勿輕視。

增輯普濟應驗良方

急救各方卷三

凡自刎自縊。凍死溺死等症。事關人命。人多畏懼不救。不知律書
末載洗冤錄一卷。原示人救活之法。今悉遵載入。以便檢閱。有
定識者。依此出力救之。起一人之生息。兩家之訟。功德最宏。善
莫比焉。

救縊死 凡縊從早至夜。雖冷猶可救。從夜至早。稍難。若心上溫。
一日以上。猶可救。不得遽截繩。但緩緩抱解放臥。令一人踏其
兩肩。以手提其髮。常令緊不可使頭下垂。一人微微撓整喉嚨。
以手擦按胸腹散動之。一人摩擦臂足屈伸之。若已僵。但漸漸

強屈之。如此一飯。久卽氣從口出。得呼吸眼開甦醒後。又以官桂湯及粥飲與食之。令潤咽喉。更令二人以筆管吹其耳內。若依此救無不活者矣。官桂湯 陳皮八分 厚朴一錢 肉桂五分 製半夏一錢 乾薑五分 甘草三分 ○ 又法。用手緊掩其口。勿令通氣。兩時許氣急卽活。○ 又法。用皂角細辛等分爲末。如豆大許。吹入鼻孔。○ 又法。用真野山羊血二三分研極細末。以好酒灌下。立活。

又法 凡男女縊死。身雖僵冷。尙可救活。不可割斷繩索。抱起解下。安放平坦處。仰面朝上。頭要扶正。先將手足慢慢曲彎。然後將大小便用綿軟之物裏塞。不令洩氣。一人坐於頭前。兩足踏其肩。揪住頭髮。將縊人之手拉直。令喉項通順。再用二人將筆

管入耳內。不住口吹氣。不住手撫摸其胸前。用活雞冠血滴入喉鼻之中。男左女右。男用雄雞。女用雌雞。刻下卽能甦活。如氣絕時久。照此救法。務要多吹多摸。勿謂已冷。忽略不救。以上見洗冤錄

註明
詳解

又灸法。如前法救治。再將其兩手大拇指並排平正。以小帶縛定於兩指縫中。離指甲角一分半之處。名鬼哭穴。用艾火灸三七壯。卽活。凡無故中邪而縊者。以久灸爲妙。

救溺死。水溺一宿者。尙可救。撈起時。急將口撬開。橫嚼筋一隻。使可出水。以竹管吹其兩耳。研生半夏末。吹入其鼻孔。皂角末置管中。吹入穀道。如係夏月。將溺人肚皮橫覆牛背上。兩邊使

人扶住牽牛緩緩行走。腹中之水自然從口中并大小便流出。再用生薑湯化蘇合丸灌之。或生薑汁灌之。若無牛則用大鍋覆寬櫈上。將溺人肚臍覆對鍋底。兩人擡櫈搖動。如係冬月急將溼衣解去。爲之更換。一面炒鹽用布包熨臍。一面厚鋪被褥。取竈內初熄草灰。多多鋪於被褥之上。將溺人覆臥於上。以棉枕一個墊臍下。再以草灰將渾身厚蓋之。灰上再加被褥。不可使灰迷於眼內。其櫈口。竅口。筋灌蘇合丸。薑湯。吹耳鼻。穀道等事俱照夏天法。甦醒後。冬天宜少飲溫酒。夏天宜少飲粥湯。按灰性緩而能拔水。凡蠅溺水死者。以灰埋之。少頃卽活。此明驗也。凡溺人倘或微笑。必爲急掩其口鼻。如不掩。則笑而不止。不可。

救矣。切不可驟令見火。但一見火。則必大笑。凍死者亦然。○又
醋灌鼻中。綿裹石灰納下。竅水卽出。○又法。以酒罇一個。燒紙
片一把。放罇內。急以罇口覆臍上。冷卽再燒紙片入罇。覆臍去
水卽活。俱見洗冤錄集解

救刀傷。凡殺傷不透膜者。用乳香。沒藥各一皂角子大。研
爛。以小便半盞。好酒半盞。同煎至半盞。溫服。然後用烏賊魚骨
或龍骨爲末。敷傷處。卽愈。若有預製花蕊石散。敷之更妙。○昔
推官宋琢。定驗兩處殺傷。氣偶未絕。亟令保甲取葱白炒熱。遍
敷傷處。繼而呻吟。再易葱白。傷者無痛矣。○又被刀傷出血不
止。用真降香。磁瓦刮末。於石礮研細敷之。

金瘡腸出者。多用小麥水煮瀘汁待極冷。令病人臥席上。含汁噴其背。則腸漸入。初噴時勿令病人知。勿使多人在旁言語。如腸未入檯席四角。輕搖則自入。既入須用麻油潤線縫之。仍以闊帛紮束。慎勿驚動。免瘡口復迸。以上洗冤錄集解

自刎斷喉。須救在早。遲則額冷氣絕。乘初刎時。氣未絕。身未冷。一面將頭墊曲。合攏刀口拭去血。一面急用大雄雞一隻。快手輕去其毛。生剝皮。乘熱包貼患處完好。安穩枕臥。自然漸漸甦醒。善爲調理痊愈

咽喉癩傷。飲食不下。雞蛋一個。開一孔。去黃留白。入生半夏一個。微火煨熟。止食蛋白即愈。

七釐散方。此藥必須預爲製合。以備送人救急之用。專治金刃

跌打損傷。骨斷筋折。血流不止者。先以此藥七釐沖燒酒服之。量傷之大小。再用燒酒調敷。如金刃傷過重。或人食嗓割斷。不必用雞皮包紮。急用此藥乾摻傷處。定痛止血。立時見效。此方傳自軍營。凡打仗受傷。有起死回生之功。兩廣雲貴得此方者。調治鬪毆諸樣重傷。無不應手立痊。竊念藥既平淡。配製甚易。而奏功神效。視鐵扇散爲更捷。旣救人生且息訟端。願同志者。共寶之。以互傳濟世焉。

硃砂一錢。麝香一分。冰片二釐。乳香

一分。沒藥一錢。兒茶二錢。紅花一分。血竭一兩。以上之藥。共研極細。末於端午日正午時。製合磁瓶收貯。黃蠟封口。勿令洩氣。貯

久更妙。或未預備此藥者。卽選擇天德月德日。或臨時配合亦可。然服之只須七釐。不可多服。孕婦忌服。

火燙燒傷

或被火燒肢體。遍身受傷重者。火毒攻心。

黃連

花粉

玄參

各二錢

陳皮

桔梗

山梔

各一錢。半淡竹葉二十片。

外遍身潰爛者。先喫童便。或蘿蔔汁一二碗。

可護其心。外塗蚌殼灰。

或雞子清調搽。

白礬末和香油塗。亦可。

愈。

經霜桑葉燒灰。香油調塗亦可。

湯火傷

切勿以冷水冷物淋搗。恐熱氣內逼。有爛入筋骨之患。

傷甚。則急飲小便一碗。免火毒攻心。急切無藥。先以鹽末摻之。

護內不壞。然後用藥敷之。

生大黃

研細末。

先遍敷真桐油。隨將

藥末撒上。卽覺清涼。其痛卽止。愈後。且無痕跡。一切單方。皆不

及此方能立刻止痛也。○又方用尿桶中宿尿或澆或浸一時之久再以蜂蜜麻油調敷此二方取之至便卽火燒湯潑遍身垂危者皆能治之。○又湯火傷有治不得法以致焮赤腫痛毒腐成膿用此膏拔之止痛斂口。麻油四兩當歸一兩入麻油內煎焦去渣再入黃蠟一攬化隔水拔火氣以布攤貼取效。

又湯火傷用久遠糞缸內磚塊煅灰冷透敷之。○又用香灰將菜油調塗立愈屢試仙方。○又柳樹燒汁搽。又紋銀磨人乳搽均奇妙。

湯火藥蒲黃二兩黃柏一兩寒水石一兩黃丹五錢赤石脂兩上藥俱用生的爲末井水調搽如爛用麻油調鴟毛刷。

救凍死○切忌見火

詳救溺下

雖四肢直口噤。但胸前微溫。皆可救用。

大鍋炒灰。令極煖。袋盛熨心上。灰冷。卽換。俟目開爲度。以溫酒或清粥稍灌之。已救活。宜用生薑陳皮煎湯溫服○又法。用氈或草荐捲之。以索繫定。放平坦處。令二人相對。推踏。令滾轉。往來如扦氈法。候四肢溫卽活。以上洗冤錄詳解

又方 用生半夏末。吹少許入耳鼻內○又凡凍死溺死者。飲湯酒切忌太熱。恐傷齒盡落。

救魘 不得用燈火照。并不得近前急喚。但痛咬其足跟。及足大拇指。頻頻呼其名。及唾其面。再灌以薑湯。必活。

魘不醒者 移動些小臥處。徐徐喚之。卽醒○凡夜間魘者。原有

燈卽存燈原無燈不可用燈照。○又用筆管吹兩耳以皂角末如豆大許吹兩鼻得噴嚏則氣通三四日者尙可救。○又酒調蘇合丸灌之。○又炙兩足大拇指向上生毛處三七壯效。俱見洗冤錄

解詳

救自食生鴉片烟起死回生方。

藜蘆五錢

生甘草五錢

生大黃一兩

上三味用長流水三大碗煎汁去渣再入白蜜五錢膽礬二錢研細沖入溫涼灌服不論用茶酒食生烟者皆能全活服後在上焦者卽吐在下焦者卽瀉或吐不效再服一劑起死回生無不立

驗。

治驚癇以釀酒一二杯溫灌之自活。洗冤錄集註

平治良方 卷三
撲打猝死。五絕及撲死等症。俱須心頭溫煖。雖經日亦可救。先將死者盤屈在地。上如僧打坐狀。令一人將其髮控住。放低用生半夏末。以竹管各吹於兩鼻內。久之卽活。再以生薑自然汁灌之。兼解半夏毒。五絕者產暈邪魅自縊溺死。醫治法俱用生半夏末每鼻孔各吹如豆大許。又諸症俱以酒調。蘇合丸灌之。但身未冷。下喉卽活。俱見洗冤錄詳註

跌壓傷死。凡跌壓重傷之人。口耳出血。昏暈不醒。但看面色尚有生氣。身體尙爲鬆軟。皆可救。但不可多人環繞。嘈雜驚慌。致令驚魂不復。急令親人呼而扶之。且就坐於地。緊爲抱定。曲其手足。如僧打坐樣。隨以熱童便灌之。卽大人溺亦可。須未食葱蒜。而清利者去其頭尾數滴。若有馬溺更妙。但強灌得一二杯。

下喉便好。然後輕移於相呼之人懷中。抱入室內。如前坐法。更以足繫抵糞門。不令洩氣。並將窗櫺遮蔽。令暗一面。以加味。四物湯。近身旁煎之。傾入碗內。卽放鼻下薰之。總要傷者聞藥氣入腹。則不致入口惡逆。乘熱用小鍾灌之。如難急受。少頃再灌。陸續灌完。不可使臥。其糞門更須頂緊。恐其氣從下洩。以致不救。也必俟其腹中動而有聲。上下往來數遍。急不能待。方可使解。所下盡是淤紫毒。已解下方可令睡。必致淤盡。所下是糞。始停前藥。否則再進一劑。次第調理。不可輕用補藥。加味四物湯。桃仁去皮尖一兩。紅花一兩。山楂二兩生大黃二兩當歸二兩川芎二錢炒白芍三錢熟地九錢。用急流水急火煎。數沸和童便一杯服。見洗冤錄。

詳解

又一切撲折及從高墜下木石傾壓落馬墜車以致瘀血凝滯氣絕欲死者倉卒無藥急以熱小便灌之免惡血攻心再用乾淨黃土五升椎碎飯蒸熟舊布重包二包便熨傷處數次痛止傷消但不可太熱恐燙傷皮肉

治跌撲傷損方 筋骨折傷急取雄雞一隻刺血量患人酒量沖服痛立止赤水元珠跌打骨斷用金櫻子根去皮煎酒熱服渣敷患處立愈願濟堂刊施接骨不知痛用鳳仙花根酒磨服半寸最多一寸然後揉托而上則不知痛但多服傷人以一寸爲極秘方集驗治重物打壓傷 凡手足肩背被重物打傷或青腫紫赤血痕疼

痛不致內傷。用蘇木煎汁磨真降香塗之。不可落水。連塗數日。其腫消散。屢驗。

又方 用虎膽草搗爛擦傷處即愈。

玉真散 治金刃撲破傷風。天南星防風等分爲末。好酒調敷。傷處再用薑汁炒天南星防風白芷炒天蠍等分研末。童便好酒調服三錢。雖牙閉舌縮腰背反張。內有瘀血。病在垂危者。服之立可回生。

凡遇破傷風。以及婦人產後驚風。先以手三指聯並。插入病人口內。三指可入者易治。若止入二指者。其症必危。用此法驗之。可知其生死。

又接骨神方

治跌傷斷骨從高墜下驟馬上跌折筋骨碎斷痛不可忍此能接骨續筋止痛活血

硼砂水

治跌傷斷骨從高墜下驟馬上跌折筋骨碎斷痛不可忍此能接骨續筋止痛活血

硼砂水

粉
當歸

各一錢蘇木湯下

接骨又方

損骨碎者生半夏。

黃柏
敷七日愈

又接骨。自然銅三個均燒紅。醋淬七次。土鱉蟲三個。乾麝香三分。共爲細末。每服七釐酒調服。甚效。

陰陽玉炙

接骨簡效方

治骨

解脫盡體

有性酒
其骨自合

夾棍傷。急用熱童便一盆浸足。燒紅磚淬之卽熱童便上白油浮起。其傷盡出。再用肥皂搗爛和雞子清和勻罨患處。以草紙裹紮緊。一夜不可動。內服末藥人中白一兩。乳香各二錢。燈草炒去油。牛膝三錢。

木耳炭五有

錢性

骨折筋斷痛不可忍。取路旁牆腳來往人小便處日久碎瓦片洗淨火煅醋淬五次黃色爲度。刀刮爲細末。每服三錢。好酒下此藥極效不可輕忽。

又接骨方。五加皮四兩。小雄雞一隻去毛連骨不去血不沾水。同搗極爛敷斷處。骨即響。聽至不響。卽將藥刮去。遲則多生骨矣。○又活蟹一隻。生搗爛。滾酒沖服。卽效無後患。篇末補打傷眼睛方。

凡跌打及刃傷血流不止。多用葱白搗爛炒透。少和以蜜沙糖亦可。乘大溫熱撲上冷則再換。此方止血定痛。且無瘢痕。又用白蠟二三錢。刀刮爲末。酒調服。

杖傷。急飲童便。一外用熱豆腐鋪在傷處。其氣如蒸。豆腐漸成

紫色。再換豆腐鋪之。須得紫色散盡。得淡紅色爲度。內服白芨
二錢爲末。米湯送下。○又方。木耳四兩。淨沙鍋內炒焦存性。忌鐵器爲
末。每服五錢。好酒調下。服後坐少時。俟藥力行至傷處。從肉裏往外透如
鍼刺癢甚。不時流血水。卽其效也。凡臨杖。預服四五錢。則減痛
不致重傷。○又方。黃蠟香油同熬敷之。此方見楊椒山集。註並治手足凍裂。

受傷瘀血注痛。生大黃末。薑汁調塗一夜。黑者變紫。二夜變白。

治毒蛇咬方。龍骨一錢。絹包虎骨一錢。滑石三錢。全蠍五個。蜈蚣一條。殭蠶二錢。穿山甲三錢。木通一錢。五分木香一錢。加臭花娘草三錢。隨量用陳酒煎服。如咬下部。再加牛膝木瓜各一錢。兩貼必愈。不可多服。此方乃捕蛇者秘傳極效。

蛇蟲傷

毒蛇噉死

用香白芷一味爲末

麥冬煎湯調服

雖至死

亦活

○又方五靈脂一雄黃

五錢爲末酒調灌服

二錢並亦敷傷處

俱洗冤

錄詳註

蜈蚣咬

先用鹽湯洗傷處

痛止隨取雄雞冠血擦之

或以手指

攢取雞口

中涎擦之鍋底煤

草紙煤擦之俱效

蠍蟹毒

取井底泥敷乾則再換

或以明礬爲末水蘸擦

諸毒蟲咬

傷痛至危甚

青黛

雄黃

各二錢

麝香一分冷水調敷

並

效

蜘蛛毒

燉熱成片如疖子

癢痛難忍

苧麻葉連梗洗淨搗汁調

青黛或藍靛不必太濃

搗

隔宿者不

鴟翎蘸敷每日敷十餘次

苧麻汁須鮮

搗隔宿者不

可
用

誤吞螞蝗。多以蜂蜜調水飲。蝗卽化水無害。○又螞蝗入腹生子。腸痛黃瘦。田中泥和水飲數碗。蛭必盡下。或用牛羊熱血。生調猪油飲之亦下。

蚯蚓毒。形如大麻瘋。眉髮皆落。每夕聞身中有聲如蚯鳴。多用白鹽煎湯浸洗數次卽愈。

百蟲入耳皆治。麻油滴入蟲卽出。韭汁雄雞冠血俱效。

癩狗咬。乘毒未發。用斑貓七枚去頭足翅淨。用雞蛋二枚打破同蒸。去斑。猫淡食雞蛋。於小便內取下血塊。痛脹不解。則血塊未淨。仍再食塊盡乃止。或用斑貓同米炒黃色。以米研末蒸淡食。見洗

免錄註斑貓有毒若中其毒者用玉簪花搖水飲之卽解但須張大口吞不可使水近齒近則齒傷○又方用槐樹老皮內軟白皮一塊安放傷處再以麵粉水和作圈圍之內以人糞填滿上蓋槐樹白皮一塊用艾丸如芡實大炙二七壯俟熱透身上出汗爲度○內服方地榆二兩銅鎖一把同入新砂鍋內酒水各一大碗半煎至一碗空心溫服其毒內消並無後患再以明雄黃一錢麻油一茶鍾調服三日三服其傷處炙後再以生甘草末杏仁搗和沙糖敷之若家處起泡則以麻油調生大黃末敷取效

癩狗咬若不急治至一月則腹腫狗胎其人作狗吠毒深不可治矣被咬後其毒上攻頭上生有紅髮須扯去此方男子二十一

日可治。女子十四日可治。過期則難治。斑鴟七個去頭足翅膀
米不用如人虛弱者只用三四個同米炒黃色去殼殼鑊殼鑊酒水各一碗煎至碗半飽時服。服後小便解下血塊候至小便清白方爲毒盡。然後食溫粥一碗。則止而不解矣。但百日內忌聞鑼鼓聲。須避處幽僻之所。又忌食豬羊雞魚酒葱及發氣動風之物。又忌穿麻布衣帳。又忌往麻地。茄地。赤豆地上行走。犯之復發不可活矣。

烟火熏至死。白蘿蔔搗汁灌之立醒。無則用葉乾者水泡搗亦可。

烏銃傷 蜂蜜八煎沸入好燒酒一隨量熱飲被遮取汗安臥一夜鐵砂自出粘被上

箭鏃傷 陳醃豬肉紅活美好者用其肥細切剉濃再以象牙及人所退爪甲研細極入醃肉內剉勻厚敷週圍一飯時箭鏃自迸脫出洗冤錄詳註

箭鏃入目 用寒食餳糖

清明前一日所作餳糖點入目待其發癢一鉗出

中藥箭毒 真麻油內服一碗外時刻塗之必保無恙

人咬傷 急用童便洗淨齒毒以瀝塘雞糞塗之立刻止痛不作膿○又方生栗子嚼爛敷奇效此症難治方亦不多錄此救急魚骨鯰喉 獨頭蒜塞鼻中骨自出○又橄欖研爛水沖連渣服

或以橄欖核磨水飲亦效。○含硼砂一粒徐徐咽津下之。○有
創傷至重數日不出者。○鯉魚鱗皮燒灰水調服。或用真象牙
磨濃汁飲立愈。永遠戒食鯉魚不致後患。

骨鰓喉歌 紹砂草果威靈仙 清水砂糖共配煎接連服下二
三碗諸般骨鰓化爲涎。

甲魚骨鰓 取甲魚生眼珠包腐衣拚命吞之否則命在頃刻。凡
某魚骨鰓卽以其魚眼依法吞下亦愈。

雞骨鰓 芋艿根搗汁 ○又方威靈仙沙糖酒煎服。

一切骨鰓咽腫水食不能下。人指甲

燒存性爲末吹人喉立效

中藥毒 中巴豆毒者口渴面赤五心煩熱泄瀉不休用黃連乾

薑等分爲末。冷水調服二錢。○又多飲麻油亦解。○又芭蕉葉搗自然汁。服之卽止洗冤錄註。○中砒霜信石毒至重者。黑鉛一塊重四兩以

井水於石上磨出黑汁。旋磨旋灌。灌盡卽愈。○又熱鴨血灌之。

立解。洗冤錄註○又白礬錢新汲井水調灌。吐出卽愈。○中蒙汗藥

毒飲冷水卽解。○中藥毒鳩毒已死。但心頭尚溫皆可治。荳豆

粉三合。井水調服。○中諸藥毒煩悶欲死。俱用葛根煎濃汁。服無

患。

凡中一切藥毒及一切飲食毒。飲糞清卽解。

取廁中宿糞布包瀘汁。效倉猝若取亦便

統解諸毒他藥不及。若症勢危急。最宜飲此。惡死甚於惡穢也。

飲食毒。飲饌中毒倉卒不知何物。急以

生甘草薺芫等分煎

湯飲之入口卽活○洗冤錄
註解

但覺腹中不快。卽以生黃豆試之。口嚼不聞腥氣者。中毒也。急以升麻五錢煎汁。連飲之。以手探吐。可保無恙。○又方。菉豆生甘草水煎服。卽解。○急則多飲麻油亦解。

服鹽滷毒。將常用抹桌布搓出濁水灌之。使吐。吐出卽安。但切不可用熱水。洗冤錄註豆腐漿。○肥皂水。皆能令吐而安。○又方。白洋糖四兩。湯調灌。卽活。

飲燒酒中毒。鍋蓋上氣流水半盞灌下。卽醒。○又醉死者。急以新汲井水浸其髮。再以舊布浸溼貼胸膈上。仍時以清水少少灌之。自醒。○又用生蚌瀝水灌之。亦效。○中諸魚毒。橄欖搗汁。

飲或飲麻油亦解。○中龍毒齧青水或鹽汁俱可解。○中蟹毒蘇葉煮濃汁飲或蒜汁或麻油俱可解。

一切蕈毒。笑蕈毒。磨姑諸草毒。閉口椒毒。斷腸草毒。俱飲地漿可解。於淨土地上掘三尺深。用新吸水傾入攬濁。少俟澄定去上浮沫。取半濁半清者飲之。所謂洗盡腹中毒。全憑地上漿愈後。永戒食鱠魚。

中諸果毒 廣木香

水磨汁研入

麝香一服之。卽解。

中六畜肉毒 伏龍肝

研末水

調服。取吐卽解。

吞金銀

中黃金毒者。食鷄肉。

○中銀毒者。以黃連甘草解之。

詳註洗冤錄

○又方。誤吞金銀。胸膈痛甚。用羊脰骨燒灰。米湯調下。

三錢立從大便出甚驗。

治誤吞金銀

荔枝肉二兩砂仁二

威靈仙三錢

煎水飲之化從大便

下。

誤吞諸物。吞銅鐵者。砂仁煎濃汁服。卽從大便出。○又吞鐵者。
用燒紅栗木炭。乘紅卽研細末。沙糖調服三錢。卽從大便出。○
吞鐵骨之類。腸中不能轉送。覺重墜者。多食青菜。猪脂自然送入
大腸而出。○誤吞銀銷。服黃泥水一二碗。卽愈。○誤吞竹木屑。
搶喉不下。用鐵斧於石上磨水。隨取灌之。卽下。○小兒誤吞銅
錢。多食荸薺核桃。銅自化。○小兒誤吞針。生取蝦蟆眼一枚。木
通煎湯整吞下。針自穿眼內。從大便出。又葷菜蠶豆同煮食。

針隨大便下

竹木刺入內。桐油類塗。腫脹卽止。次日刺自出。○沙糖厚敷之。刺亦出。○鹿角燒枯研末。水調敷。雖日久者。一夜卽出。○蟬蠅蟲搗敷患處。次日其刺自出。

打傷眼睛方。生豬肉一片。用坐臘佳。以當歸赤石脂二味研末。摻肉上貼之。救出瘀血。眼卽無恙。

灸鬼法。治一切邪祟驚狂譫語。踰牆上屋尋死等症。將病者兩手大拇指用細麻繩縛并平正於兩指縫中。離指甲角一分半之處。名鬼哭穴用艾火灸三七壯。自愈。

女人病邪與邪物交。獨言獨笑。悲哭恍惚。雄黃一兩。松香二兩。鎔化。

以虎爪撮之。大如彈子。夜燒籠中。令女坐其上。以被蒙之。露頭在外。扶住熏之藥。完次日再配。連熏三夜。邪自斷。永遠戒食螃蟹。

男女爲鬼怪所迷。以桐油多塗陰處。數次自絕。

鬼擊身青腫。金銀花兩水煎服。奇效。

夜寐鬼魘。以雄黃帶頭上。及繫左腋下。○又法。以犀牛角爲枕。俱可免魘。○救魘方見前。

癲病神方。治男婦抽鬱顛狂。及風痰迷悶。鬱金兩。白礬兩。共爲末。麵和丸。滾水下。三錢。藥完病愈。昔一婦人。病狂十餘年。遇異人授此方。初起心閒。如有物脫去。神氣灑然。二服全愈。

下頰脫。此症起於腎肺虛損。元神不足。或談笑高興忘倦。一時元氣不能接續所致。治法患者須平身正坐。令人以兩手托住下頰。向腦後送上關竅。隨用絹條兜頰於頂上。須避風外用天南星研末。薑汁調塗兩頰。一夜卽上次。日當服煎劑調理。恐風邪外受。致痰涎壅盛。口眼歪斜。風中臟腑。則十無一瘳矣。煎劑宜用。人參如無以黨參代之可。製白朮。白茯苓。製半夏各五錢當歸二錢。殭蠶二錢。天麻。陳皮各一錢。川芎八分。甘草三錢。製附子六分。燈心四分。生薑三分。水煎服。根。五分。卽愈。

交腸。小便出屎。大便出尿。名爲交腸用。舊幞頭燒灰酒調服。

五分。卽愈。

腎漏。陽痿不舉。精流不止。痛如針刺。

韭菜子。破故紙各一兩。

共爲末。每服三錢水調。日三服即止。

救男婦尸厥

凡婦人奄奄去死

氣動無氣。氣閉不通。名謂尸厥。將

菖蒲屑納入鼻孔中。再用肉桂屑放舌下。或剝取本人左角髮方寸燒灰研末。過細篩。和熱酒灌之立愈。并以竹管吹其兩耳更妙。

救蟲毒及金蠶蠭

先以白礬末。令嘗之。不澀。反覺味甘。次再食

黑豆。又不腥。乃中毒也。卽濃煎石榴皮根湯飲之。吐出蠭皆活。無不愈者。○又方。凡中毒以白礬芽茶搗爲末。冷水調下。卽愈。救中水銀毒。以炭末煎汁飲卽解。

救水銀入耳 以黃金或金飾器枕耳自出如水銀入內令人筋
攣疼痛以金物熨之水銀仍出蝕金其病卽瘥

救中鉛粉毒 以麻油調蜂蜜如餉糖與食卽解

壁虎入耳 用雞冠血滴耳內卽出

醒迷至寶丹 治痰迷心竅癡呆癲狂不論新久其效如神 膽

南星

生棗仁

遠志肉

茯神

柴胡

各二錢

川貝母

半夏

曲

各二錢

陳皮

生甘草

廣木香

砂仁

各一錢

共爲末蜜丸桐

子大硃砂

三錢爲衣每清晨開水送下三四十九

鐵扇散 治刀傷斧剗其效如神 眞象皮

五錢

花龍骨

五錢

老材香

如無老材香卽用數百年陳石灰亦可

即棺材內石灰一兩寸柏香

卽黑色松香一兩

松香

兩

煉熟明礬

兩

照單研末摻

解吐毒

上用扇搗之立愈

附粵撫朱中丞傳救吞洋煙方

藜蘆

三錢其性辛溫能解煙毒
有宣壅導滯之功使邪氣

熱痰

二錢其性苦寒解
出雄精諸毒能化血爲水

青礬

二錢五分酸寒性滯帶收
解煙毒並能墜濁

砂

二錢五分性辛寒
消魁能柔五金

用井水煎服如牙關緊閉雕開灌之或

從鼻孔灌入

凡吞洋煙死者腦後胸膛必發熱如火須將此人

頭髮披散用井水向腦後浸之

胸膛以冷水蘸濕水巾頻拭之

或揭去衣服用板床于天井中

將胸膛露之不拘寒熱之時以

開聲爲度雖死三五日皆可救活總之身上溫軟無不可救若

身冷硬不能療矣

附解砒毒方 用防風一兩研末水調服其效如神

卷三終

增輯普濟應驗良方

雜症各方卷四

血症 吐血成斗。命在須臾。

貫仲五錢爲末黑頭髮瓦燬研細五錢側柏葉

多取搗入末於汁內。隔湯煮一柱香時。取起加童便一小盃茶黃酒

孟一小盃徐徐飲之。神效。

又吐血方 蘭節蒲黃血餘等分開水調服。立止。

又治咳嗽吐血方 木耳 槐米 荆芥 蒲黃各一兩研末。每服三錢米湯調。

清金膏 潤肺清火。治勞病吐血甚效。天冬麥冬茯苓川貝母各一
觔水熬成膏。每日服數匙。

嘔出全是血者此血從胃中來用。

韭菜

茅草根

藕節

側

柏葉荷葉以上五味或全用磨陳京墨或隨便用俱取汁磨五六分加薑汁三匙冷服寒天湯溫之如無好陳墨則用童男剃下頭髮洗淨五煅研細過篩調汁服俱效。

先痰嗽後吐血。此乃肺中積熱方用

天冬

麥冬

生地

白

芍 紫苑 黑山梔 桑白皮

蜜水炒

地骨皮

各一錢

水煎取蘭花

根搗汁沖服氣急者加蘇子

二錢炒研去天冬

先吐血後痰嗽。嗽出血絲及血粒如米大者此乃陰虛症。

生地

二錢痰多洩瀉者減半 白茯苓 山萸肉 丹皮 麦冬 川貝母

山

藥 青蒿 枸杞 白芍

各一錢澤瀉一錢遺精小便多則用三四分

五味子

三分

鱉甲醋炙三錢蘇子二錢水煎服。○熱盛加犀角磨汁一匙和服。○陰火盛加龜膠。○此症忌用生半夏白朮薑桂之燥熱更忌黃連黃芩黃柏之苦寒。

凡吐血者以水盈盛看浮者肺血也。以羊肺蘸白芨末食沉者肝血也。以羊肝蘸白芨末食半沉半浮者心脾血也。羊心羊脾蘸白芨末食。白芨用微火略焙研末可也。

經云喉不停物毫髮必致血既滲入愈致愈滲惟飲溲便則百無一死。若飲寒涼則百無一生。凡勞嗽吐血急宜得重便之清利者日日飲之勿間或自己戒食葱蒜等臭濁之物并戒房事則小便自清去其頭尾數滴盛之日飲二三次一月見效久飲

除根身體強健此方百試百驗幸勿遲疑誤事

吐血不止 凡吐出全是血而多者謂之吐血。與痰中帶血者不同急用三四兩重大當歸一隻全用切細好陳黃酒一觔慢火煎至一滿碗頓於鍋中以溫爲妙。倘將要吐尙未吐口中有血含住取藥酒連血漱和嚥下服二劑決愈斷不復發。每有醫家阻云吐血尙要戒酒豈可服酒煎當歸殊不知酒煮當歸乃引血歸經之妙藥此方真百試百驗從無一悞如敢悞人誓同嚼舌。桐涇沈啟白秘方○又方白薄紙五張燒灰酒服效不可言。普濟方又方乾薑爲末童便調服一錢甚妙。雲臺方

癆症 凡勞性之症服藥未效者宜用

建蓮

淮山藥

共磨成粉以人

牛乳猪脊筋髓蒸熟拌食大能補益去病。惟泄洩者忌服。○童勞方見
小兒門。

又勞嗽方 大白蘿蔔一個挖空。入白洋糖填滿紮緊。取露水二三
碗煮極爛宿。一燙溫空心服甚效。

治吼病方 細霜絲瓜簾四兩水三碗煎成一碗。早晚二服自愈。
一切傷力 鮮韭菜汁一盃。加土鱉七個。用瓦焙乾研末。陳酒沖
服。每晚連服七日。復本還原。

治勞傷腰痛方 瓜黃芪五錢杜仲二錢補骨脂二錢。鹽水炒紅花二錢。
桃肉八個。用酒煎服即愈。

又治勞嗽并一切弱疾 雞冠油一個少加水。於砂鍋內熬出油去。

渣入白洋糖。二筋熬匀。食數個效。

不拘時服。

臓症。峩眉山僧奇方治一切水腫溼腫氣腫肚腹四肢發腫。
乾雞屎一觔。炒黃。黃酒碗三大。煮一碗。濾去渣。一時飲盡。少頃腹中動
作瀉一二回。次日用田螺一個。滾酒泡熟。食之即止。此方奇效無
比。但不可令病者知之。○若治小兒。則只用雞屎兩。加丁香一錢
和蒸餅爲丸。桐子大。每服一錢。米湯下。○又方。雄豬肚一個。入
兩煮爛。淡食五六個。忌鹽醬醋。百日自消。

水臌小便淋閉。大田螺四個。大蒜五個。車前子三錢。爲末。共研成餅。貼臍
中。以布束縛。則水從小便出。漸消。終身戒食螺螄。○又方。商陸
根。熟白同鳩。填臍中小便利。則腫自消。○又方。甘遂爲末。水調

腹繞臍周圍另煎生甘草湯服之。其腫卽消。但此二方切不可誤相攬和食之。蓋其性相反也。

治單腹脹方 脹脹一症最爲難治。然有嘔吐不受穀食。氣味難投諸藥不效者。用木瓜錢三廣皮錢二取好酒隔水煮一炷香。再入春梅花數十枝浸泡。每日分兩次服。完半月卽消。奇方也。

氣脹

陳久大麥芽煎湯服漸消。

黃疸 治黃腫五疸神丹 膽礬多少入瓦罐內蓋定炭火燶至白色爲末。煮棗肉和丸如芡實大。每服五丸日三服用冷黃酒送下。忌食醋及生冷發物。○若有蟲服之亦吐出神效。

又治男女黃疸病方 猪膽一個傾出汁以腐漿沖服三個卽愈。

黃腫通治

純黑豬膽個陳黃米末

炒研

入膽汁爲小丸分數次生

白酒下外用白芥子二錢研爛燒酒調用布攤貼臍下小肚上一週時起泡爲度忌食甜鹽之物若小兒只用芥子五分○又方黑髮燒灰研末水調服一錢七分每日三服

發黃 苗陳生薑同搗爛於胸前及四肢日日搽之數日愈內以雞蛋白三個熱酒沖服

治哮喘 食哮水哮風痰哮年久哮各別古專主痰後謂寒包熱

治須表散以行氣化痰爲主忌寒藥閉邪熱藥升火 寒哮用

白果麻黃搗裹塞鼻 热哮痰稠便鞭實熱者用蕎麥麪雞蛋

清二味和圓滾擦胸口 又古方治遠年近日哮喘痰嗽用蠅

蛻足

去輕粉馬兜鈴各一錢

兩

生靈脂

生雄黃

杏仁

生砒

各五錢

淡豆豉

四十粒九粒

以生薑草慈自然汁丸如黃豆大

臨臥擦胸餘丸

乾後

仍以薑汁化軟日擦必愈○又治哮喘咳嗽及痰結胸用

白鳳仙花根葉熬濃汁擦背脊上極熱

再用白芥子

三兩白芷

三錢輕粉

三蜜調作餅貼背梁第三骨節雖覺熱極炙痛切勿揭

動此正是拔動病根去盡全愈此方不論寒熱虛實鹽醬各哮喘並治如神貼數餅必除根以上哮喘之藥切勿入口

理淪

定喘法巴霜薑汁爲丸用橘皮裏條塞鼻卽止

理淪

痞積

不拘何膏藥二張以一張揭開用白信石五分摻膏上

兒

只用三分再用一張合粘將背面貼患處以布束緊數日痞化爲水

治皮裏膜外者效尤速。如貼膏後腹中脹悶乃痞將散須服湯藥枳壳八分大腹皮一錢鹽水洗蘇梗八分厚朴二錢青皮一錢峩朮八分山楂二錢烏藥六分香附一錢砂仁五分廣木香三分水煎空心服之三劑全愈。

食積血痞 木賊研末三分白湯空心服卽消。年遠者連服三日。○

又方。慈白搗和蜜攤布上貼患處。用熨斗微火熨之。○又方。生鵝血。好酒滾沖。服盡量飲。消化無形。重者服數次。○又方。野鵝子屎水煎服。方書稱爲左盤永忌食鵝子。

蟲積 苦棟根取向東不露出土者去皮及骨四兩使君子二兩生薑兩水五碗煎至三碗去渣再熬至一碗加白蜜四兩又熬至一碗露一宿次。

早隔湯頓熱空心服。一日服完須於朔日服蟲頭向上故也。不吐不瀉。蟲從大便成團出。少則一服多則二服除根。一切蟲積皆治。若小兒則分兩量減可也。

蟲積作痛。口中有涎流出。湯飲不能進。危在旦夕者。烏梅。花椒。生薑等分水煎服。卽愈。○又方。葱汁半杯。菜油半杯。和服蟲化爲水除根。須空心服。

翻胃初起。用紫砂糖一老生薑一。勑其搗爛入腐乳瓶理土內。七日取出。每早晚一調羹冲湯服。

膈食反胃。糯米粉以牛口涎拌和作小丸。煮熟食之。神效。取牛涎法。以水洗淨老牛口。用鹽塗之。少頃涎自出。愈後永戒食牛

內

治膈噎初起未成 檳榔 枝壳各二錢
陳皮一錢半 廣木香一錢煎服之。
連服五劑。胸心漸開。導痰氣下行自愈。

凡病膈食。胸前生二小骨。漸漸交合。則不能食。法用生鵝血乘熱飲之。數次。胸前二骨白化。永遠戒食牛鵝二物。○又方。小兒胎髮一團。陰陽瓦焙存性。研細未。陳酒送下效。

膈食膈氣。韭汁梨汁薑汁人乳各二盞。飯上蒸熟服之。三日後再服如神。

膈氣方

撫院慕天顏母患大黃膈異人所傳愈

大黃

二兩酒製九次上

沉香

五錢

桃仁

泡去皮尖研末

砂

分五更舌上舐津下

油六錢

烏藥一兩

水煮炒研末

分五更舌上舐津下

增輯普濟應驗良方

婦女各方卷七

凡崩漏帶症。多由久鬱并氣血大虛所致。治之宜大補氣血藥中。帶澁藥有鬱則內加理鬱藥味。專破固不可。專澁亦宜慎。

血崩。百草霜三錢陳京墨磨濃酒杯一桃枝嫩杪三個楊柳嫩杪三個冬月則用枝搗爛。用沙糖煎化。調服立止。○又方海螵蛸去甲研末三錢。生地一煎湯調服卽愈。

治崩漏不止。及赤白帶下。烏梅個連核燒灰存性研末。白湯調服。止後再用蓮子燒灰存性香附炒研爲末每服二錢。淡醋湯調服。○又赤白帶下。亦用海螵蛸水煎濃汁服效。

乾血勞奇方

過三年者不治

白鴿子

一隻去淨腸雜

入血竭

一兩

以綫縫合無灰

酒煮熟食完瘀血卽行如心中慌亂急食白煮猪肉一塊卽止

病二年者血竭二兩三年三兩

赤白帶年久者

貫仲

一個全用刷淨毛

切塊好醋薰溼

慢火炙熟研

末每服二錢空心米湯調服效

白帶白淫

風化陳石灰

一兩

白茯苓

三兩共爲末

糊丸桐子大

每服

二三十粒空心米湯下必用灰無害屢試有效

治婦人白帶方

白雞冠花

醋炙紅花

燒酒炒

荷葉

燒灰各等分

共爲細末陳

酒送下不飲者米湯下

又治白帶

實症馬齒莧

搗汁一鍾

雞蛋清

調湯溫

服再一服愈

血淋 白雞冠花燒灰存性。米湯調服三錢數服愈。

月經久閉 蟻沙四兩炒半黃色。用無灰酒半斤於砂鍋內煎滾濾去。蠅沙入磁瓶貯之。每溫飲數杯自通。

月經久閉逆從口鼻出血。先以好京墨濃磨一盞服之。其血立止。

次用當歸尾紅花各三錢水一鍾半煎八分服。○又方。韭菜搗汁一盞入童便半盞。燙熱服卽止。

調經奇方 當歸酒洗一錢五分。陳皮七分。川芎八分。白芍一錢。元胡索七分。醋炒

大熟地一錢。吳茱萸蒂梗酒炒二分。香附酒炒一錢五分。白茯苓八分。

丹皮七分。○經行先期色紫者。加條芩酒炒一錢五分。經行後期色淡者。

加官桂五分。炮黑薑五分。艾葉醋炒五分。引用生薑一片。水一碗。煎至八

分空心溫服渣再煎臨臥服俟經行日服起運用四劑次月再服四劑則經調受孕矣○此方穩妙百試百效不可妄爲加減倘兼有外感他症則且緩服慎之

治久慣小產神效膏藥方

當歸一兩

生地八兩

白芷六錢

甘草三錢

續斷

六條芩

酒炒一兩

黃芪五錢

白芍酒炒一兩

肉蓯蓉五錢

益母草一錢

用麻油二

錢

浸七日熬成膏

加白蠟一兩

再熬三四滚

加飛過黃丹七兩

五錢再熬

再加飛過龍骨一兩

攬勻用時以緞攤碗口大

貼丹田上十四日

一換貼過八個月爲妙保安胎萬全

又治小產

用絲綿一兩

入瓦罐內封固

煅灰存性

熱酒沖服空心

服須於小產月內服

以後永不再墮

安胎萬全神應方

治胎孕三月前後或經惱怒或經蹶跌以致

胎傷腹痛腰痛一服卽安雖見血二二日未離宮者猶可安之

若曾經三四五個月小產者再孕後及到月分稍覺腰痛痠脹

一服卽安數服則萬全矣

當歸

白朮土炒條芩各一川芎六

白芍酒炒白茯苓

炙黃芪

杜仲

鹽水炒熟地七分薑汁炒各七分

甘草三分如胸前作脹加紫蘇陳皮各六

分甘草三分如見血加川續斷一錢

錢蘚艾一分如見血加川續斷一錢糯米百

粒水煎空心溫服後載保

胎無憂方亦安胎

治胎前發瘧乍寒乍熱方

夜明砂三

錢空心茶和服卽愈

治懷孕數月之後忽然中風涎潮仆地目弔口噤名曰子癇

羚

羊角

細屑一錢

獨活

防風

川芎

當歸

棗仁

炒茯神

杏仁

泡去皮尖炒五分

加皮

薏仁

各五分

甘草

三分

生薑

引水煎服

治胎氣不和。奏上胸前。腹滿頭痛心腹痛。名曰子懸。

白芍

炒人酒

參

川芎

陳皮

大腹皮

各五分

紫蘇

一錢

當歸

分七分

甘草

三分

引水煎空心服。或用黨參一錢代人參亦可。

治妊娠心驚。膽怯。終日煩悶。名曰子煩。

淡竹葉

十片

麥冬

一錢五分

茯苓

一人參五錢

黃芩

酒炒一錢

燈心

引水煎服之

治妊娠小便不利。名曰子淋。

細辛

三分

當歸

甘草

黃芩

滑

石各五分

共爲末。用麥冬

一錢

人參

分五錢

燈心

一束。蒸湯。

分二次調服。

治妊娠大便閉塞。

枳殼

炒

阿膠

炒

珠等

等分

爲末。蜜丸桐子大。用六

一散爲衣。清湯下二十丸。如尙未通。可加至五十丸。六一散卽

滑石分甘草分

治孕婦咳嗽不止胎氣不安。

紫苑錢一天冬一錢桔梗五錢炙草五錢桑

白皮六分

杏仁泡去皮尖六分竹茹四分水煎入蜜一小鍾溫服○又方川

貝母炒黃研末

砂糖爲丸如芡實大口含化一丸奇效

治孕婦癆疾方

荷葉蒂個燒灰存性研末酒沖服奇效○又方

胎前產後下痢

方敗龜甲米醋研末白湯下數服愈

治妊娠兒在腹中啼

黃連二錢甘草一錢

水煎服立止

仙授奇方

神效保產無憂方

專治一切產症。有胎卽能安胎。臨產卽能催生。

服全愈。躡盆難橫生逆產。六七日不下及兒死腹中。命在須臾。危者一服卽生。

服全愈。躡盆難橫生逆產。六七日不下及兒死腹中。命在須臾。危者一服卽生。

者亦一服卽下懷孕者七個月卽宜預服。七個月服一劑。八個
月服二劑。九個月服三劑。十個月亦服三劑。臨產服一劑。斷無
難產之患。紫厚朴畫汁炒當歸酒炒一錢。川羌活五根。殼麩炒
芥穗八分。川貝母去心淨爲末一錢。川芎五分。斷艾六分。荆
芥穗八分。川貝母不入煎以藥沖服。川芎五分。斷艾七分。生黃芪
八分。生甘草五分。免絲子揀淨酒泡一錢白芍酒炒一錢。二分。藥須照方揀
選炮製。後用戥秤准不可加減。分毫引用老生畫三片。水二大
鍾。煎至八分服。預服者空心服。臨產及胎動不安並勢欲小產者皆臨時熱服如人虛
極再加入參三分。更妙已產後此藥一滴不可入口。切勿誤服。
此方藥劑等分雖輕功力甚大。不論體之強弱年之老少皆宜效如神助。等分歌訣○歸芍錢半朴
艾七分。芪荆八分。貝絲一錢。羌甘五分枳六分。一錢。三分白芍畢。

治死胎不下

凡下死胎只宜佛手散並加芍藥

蒼朮米泔水厚朴薑

炒

陳皮去白各三錢

甘草炒二分

加朴硝二三錢

一服能令化下甚易

也古人立法各有精義且經屢驗不吾欺也勿用奇方怪藥致

傷母命○又方黃牛牯屎不拘多少塗母腹立出○又方烏骨

雞去尾煎湯摩臍下立效

外治最穩妥

治胞衣不下

無名異

爲末三錢卽漆匠所用煎油之藥是也

以鴨蛋白調勻再以

陳米醋一茶鍾煎滾沖服其胞衣卽縮小如秤錘產下倘或未
下不必驚惶再服一劑卽下萬無一誤○又法將產婦自己頭
髮塞口中打一惡心卽下○又用灶腳下泥放肚臍眼內濃煎
甘草湯服之亦卽下神效○又方黑豆四五千令醋三大碗煎數

滾布蘸溫熨臍腹並厚敷。胞自下蓋豆滑而醋斂也已驗。
治逆生。手足先出爲逆。忌針刺。速將灶心土搽母臍中。如足出
者。用中指點鍋底煤於兒足心畫一叉。如手出者。放鹽於兒手
心卽進。或用蛇蛻灰少加麝香酒調勻塗兒手足心。

治坐產太早。下部受凍。血冷凝滯。產戶不開者。紫蘇煎湯熏之。或
胞破已久。水竭血乾者。葱湯濃煎熏洗自下。

治臨產時忽暈絕者。乃氣悶亂不清所致。以生半夏飯丸裹塞
鼻卽醒。○又方用紅花煎濃湯熏。或同醋煎熏鼻。

治盤腸產生子腸不收。枳殼三錢水煎服卽收。○又方用醋半冷
水七分調勻噴婦面三噴三收。

保產萬應方

治向有難產或慣滑胎或偶動胎氣。有胎腰痛腹痛。或見血不止。勢欲小產。如有胎七八個月。每月二劑。

臨產母子平安。

全歸酒

川芎

白芍酒炒

川貝去心一錢半

嫩蕊

八分密灸

荆芥穗

八分斷調根

厚朴

七分薑汁炒

羌活

五分枳殼炒

甘草

三分酒炒

甘草

五分水

三鍾薑

三片煎八分溫服

渣照前預服者空心溫服

臨產安胎者隨時熱服人行五里卽下。

神效達生散

治久慣小產孕至三月後常服之。

臨產前一日加秋葵子六分炒

臨盆時加秋葵子一錢催生如神可免

難產諸症。

蘇梗

一錢當歸五分

當歸酒洗

白芍

二錢酒炒

甘草

三分川芎一錢大腹

皮

一錢黑豆汁洗

枳殼

一錢麴炒

白朮

一錢土炒

陳皮

八分川貝二錢分

川貝去心

二錢葱頭個長流

水煎服。

又產後血暈方

五靈脂半生研末

白湯調一錢灌之入喉卽活。

○又方。韭菜切碎入壺內。以熱醋沖入封口。將壺嘴向鼻遠遠熏之。

○又方。生半夏研末。以少許吹入鼻中自醒。

治產後五七日大小便結塞。切不可妄服藥餌。惟用大麥芽微炒研末。

每服三錢。白湯調服。與粥間服自通。

治內吹外吹。治乳結核腫痛。寒熱交作。甚者惡心嘔吐。胎熱所致爲內吹。兒食乳所致爲外吹。並用此方。柴胡

陳皮 川芎 山梔炒黑青皮 石膏煅黃芩酒炒連翹各一錢 甘草

五橘葉二十分。晚煎八分食。遠服。外用葱白切碎炒熟敷乳

上以帛包之。冷則換數煎濃。

又治乳吹方。香白芷二錢川芎母三錢。共爲細末。滾黃酒調服。出汗。頻以手擦患處。卽愈。已成未成皆治。

乳癰初起

芙蓉根切碎酒煎盡量飲卽內消。

當歸

八錢生黃芪五錢

金銀花

五錢

炙甘草

一錢桔梗一錢八分黃酒二碗煎八分半飢半飽時服○又方鹿角

尖三寸燬紅存性研末熱酒調服重者二服卽消○又乳癰方牛

舌頭草根全白洋糖搗敷治一切乳症

乳癰初起因小兒鼻風所致用

麥芽炙灰存性陳酒下三錢盡

量蓋被得汗卽消

治凡乳初起結核不疼不癢最惡之症防成乳巖每日用山茱

萸一錢胡桃肉三個共搗泥酒送下以散爲度否則變患莫測不可忽視

奶串久潰凡乳癰串爛年久不愈洞見內腑深陷不愈者以搖

船櫓上手搃處舊藤緇剪下陰陽瓦焙末。以竹管紮棚篩。日日摻之。如乾處以香油搽潤。不過半月全愈。有人驗過。

又治乳巖。枸橘李切片炙研。每日酒調二錢服。半月愈。

又治乳核。用蒲公英五錢。當歸三錢。金銀花三錢。甘草節一錢。蟬退五錢。共煎陳酒和服。一服愈。

治乳巖。乳中初起堅硬一粒如豆大漸長如蛋大七八年必破。破則難治矣。急服此方。生螃蟹殼瓦上焙焦爲末。酒沖服一錢。日服之。以消爲度。

乳汁不通。木通與猪前蹄同煮并汁食。卽通。○又方。黑芝麻炒爲末。每用三錢熱酒沖服。○又雄猪胰子切碎。不另入油乾炒半熟。以黃酒煮滾。空心食二次。卽通。

治陰癢生瘡 蛇床子一兩 艾葉五錢 白礬五錢 杏仁五錢 川連三錢 煎水久洗自愈。

陰內生蟲癢極難忍。猪肝切成長片。以豬油拌川椒末同碎葱煎乾。待稍溫納入陰戶。少頃取出再換。其蟲隨肝而出。如此數次蟲盡。再以烏倍子川椒白礬葱頭煎水洗自愈。

產後陰腫 皆由下體受風。形似生毒。紅赤腫疼。歌曰：婦人忽患陰中腫。葱白研膏入乳香敷貼患處。休洗去。原來海上有奇方。又法用羌活防風各兩煎湯熏洗亦消。○又治陰腫極痛。用馬齒莧搗爛敷數次即消。

雞眼方 蕎麥麵一錢 萍薺一錢 個共搗照雞眼大小貼上。一日一夜連

根齊落。

增輯普濟應驗良方卷七終

增輯普濟應驗良方

小兒各方卷八

小兒初生不啼。急看上齶有泡。用銀氣磨利挑破。指裹軟絹拭去惡血卽活。但挑破時須低覆兒頭。使血往外出。切不可使其吞血下喉。致生他疾。

小兒失音不語。大蝦蟆胆汁點少許於兒舌尖上。少頃卽語。治孩兒月內月外。兩目紅赤澀閉。腫爛不開。以蚰蜒泥搗塗額門。乾則再換。不過三次。卽愈。或以生大黃。南星等分爲末。用醋調塗兩足心。亦愈。卽洗去。

遺尿方 荚菜子炒一兩 煅龍骨一兩 桑螵蛸酒炒一兩五錢 破故紙水兩五錢 鹽水

炒五錢。右藥研末用雞腸一洗淨晒乾炒研同藥法丸空心酒服。

一錢小兒五分。

初生二便不通腹脹欲死急令老成人漱淨口吸咂兒前心背心兩手足心及臍下共七處以紅赤色爲度少頃自通○又方甘草 枳殼各一錢水煎服卽通或以糞清灌之立通。

治胎垢小兒身如蛇皮鱗甲用 蛇蛻或殭蠶均可煎濃湯洗兩大腿近小腹處生瘡皮脫開名胎剝黃柏末猪膽汁敷均愈。顫門腫陷 腫用黃柏末水調塗兩足心腫卽消○陷用生半夏末水調塗兩足心陷卽起。

初生週身無皮 速用白米粉乾撲之俟生皮乃止或用陳壁土。

研細末撲之卽生皮。

小兒初生遍身紅赤。此胎熱也。用 生地 花粉 甘草 連翹錢各一水煎服。

初生遍體如魚胞。如水晶破則水流又生。

蜜陀僧生研撲之。

週歲小兒尿血。服蘇合丸自愈。

蘇合丸藥店中
有現成者售

大甘草一兩水六碗煎二碗服完卽愈。

脫肛

猪油二兩煉去渣

入蒲黃末一兩調勻塗肛卽縮入。

陰囊腫痛。蟬蛻一兩煎水洗。○紫蘇葉搗如泥包之卽愈。

陰莖腫痛。燈草煎湯時時服之。腫消痛止。○又臍腫出汁枯攀末敷。或黃柏末敷。俱效。

治新生小兒其卵甚大。日後長成恐成木瘤。須滿月外俟端午午時以腳盆盛熱水安於中堂隨抱小兒將腎卵放水內一浸再將小兒在堂屋門檻正中一坐其卵上水痕卽印於檻用艾圍在檻中水印處灸三壯其卵自逐漸收小如故此法異人所傳甚驗。

兒多啼致臍中出血白石脂研末敷之愈如尚未愈再以末微炒過放冷再敷仍不可剝揭前藥必愈。

兒臍中久不乾當歸焙研頻敷之棉花子燒灰敷之亦效。

預防小兒臍風馬牙簡驗方

枯礬二錢硼砂五分硃砂三分冰片二分

五厘射香五共爲細末。几小兒生下洗過卽用此末摻臍眼上每

換尿布必摻之。摻完一料。永無臍風等症。

臍風撮口方

臍內受風必致面赤喘急。啼不出聲。其下身必發青筋。一道須臾行至腹。卻開兩爻。遲則行至心胸難救。

急用香油燈草火於青筋起處炙三次。於兩爻盡處各炙三次。

臍上炙三次。再用紫蘇、前胡、殼蠶各等分。水煎候溫。

以綿蘸滴口中。頻滴以口開爲度。開口後切勿卽令吮乳。

又臍風拔毒方

上硃砂如生四日則用四分。按日加減。麝香每日用三厘。按日加用。未足

月小雞雛

一隻。論公母。先將硃砂麝香研細末。用刀將雞背脊剖開。

去盡腸雜。乘熱將藥末圍放雞脯子中間。如酒盃大。急合於兒

臍上。以紬帕紮緊。一炷香久解下。看雞必青黑。青氣拔出而愈。

小兒臍風炙法。凡小兒七日內。面赤喘啞。吮乳口鬆者。必是

濟濟良方 卷八
臍風細看臍上定有青筋一条直冲心口如至心十難救一急用艾絨搓團如小黑豆大置筋頭處燒之少刻卽縮下寸許再移縮處燒之少頃筋消病除屢試如神

小兒臍內破爛出水 煅龍骨 黃連 炙桑螵蛸各一錢 輕粉
枯礬各五分 研細末敷之

走馬牙疳 急用大針縛箸上將牙齦白點盡挑破出血要擠出白點如半粒米者擠盡用青絹絞盡口涎以薄荷湯磨好京墨遍塗滿口勿卽令吮乳待睡片時無不立效若爲兒護痛多致天傷○又方女人尿桶中白火煅研末一錢銅綠三麝香分共爲細末擦牙齦亦效

口舌生瘡乳藥不能下 白礬

吊吊灰

即厨中灰塵吊各等分爲末雞

蛋清和成餅。敷兩足心布包過夜卽愈。○又方桑樹皮中白汁

擦之人中白煅研吹之俱速效。

口瘡 甘蔗皮燒灰研末吹之奇效。

鵝口滿口白爛

薄荷

六錢黃柏五錢

青黛

水飛冰

硼砂二硃砂

水飛冰

冰

片二分共研細末。每用少許吹之自愈。或加枯礬一錢亦可。

重齶重齦重舌俱治

上齶皮腫牙齦腫

二症以大針刺患處使出惡血用

生蒲黃

海螺蛸

共研末摻之。○若舌下生舌則用大針刺舌下紫脈出血以蒲

黃末螺蛸末摻之。○又舌腫滿口者亦以此末摻之亦效。

黃末螺蛸末摻之。○又舌腫滿口者亦以此末摻之亦效。

木舌

舌下生薄膜連舌尖絆住正

治法用銀簪磨利橫刺膜中直

勒至舌尖下斷其膜。須看仔細。下簪勿穿在總筋之內。刺後拭去血涎。用蒲黃海螵蛸共研細末。摻之。或用好京墨塗。亦可
舌膜初生有白膜皮裏舌或遍滿舌根急用指甲刮破其膜。令出血。卽以枯礬末少許摻之。若不看治。恐或病啞。

治白膜裏舌 小兒生膜裏舌。卽挑去以白礬硃砂末少許敷之。
治鵝口白屑 甘草 黃連各一錢煎濃以帛拭口中。再不復發。至神方也。

安神散 治小兒內熱心煩夜啼 蟬蛻四十九個去頭足翅淨用後半截 茶荳荳荳
二錢共研細末分作四服用鉤藤煎湯調服藥完卽愈合藥時忌婦女小兒看見

夜啼不止狀若鬼祟

蟬蛻

後半截十
四個爲末

硃砂

水飛二分

薄荷

四兩煎湯加

酒數滴調服立止○又烏柏子

焙

津唾和成餅

填臍內

小兒不吮乳

黑豆

十九粒

茅草根

七節長寸許

赤金器

一寸件

銀器

人乳一盃煎至五分服完後卽能食乳

斷乳奇方

山梔一個辰砂

射香

雄黃

雌黃各二分

輕粉

分共其

研末待兒熟睡時用麻油調搽小兒兩眉上卽不思乳此名畫眉丹須擇伏斷曰伏斷日須查建歷

吐乳

白蔻仁

七粒

砂仁

七粒

甘草

生炙各半

二錢

共研細末

頻擦口中任其

咽下自愈

治小兒赤遊流火

馬蘭頭

不拘多少

根亦可

水洗去泥杆爛絞

汁以羽翼毛蘸汁搽之。燥則再換如頸項腿筋縫中潰爛。以此汁調飛淨六一散搽之即愈。極效。

自汗盜汗俱用五倍子研口唾和成餅。以布貼臍上。一夜即止。

燒針丸治小兒吐瀉如神黃丹飛水

硃砂水

明礬火燄各等分爲末紅棗肉和

口汗盜汗。俱用五棓子研口唾和成餅。以布貼臍上。一夜即止。
燒針丸治小兒吐瀉如神。黃丹水飛硃砂水。飛明礬火飛。各等分爲末。紅棗肉和黃豆大。每用三四丸。燭針尖上燈火燒紅存性。研爛涼米泔水調服。瀉者食前服。吐者不拘時服。外用雞蛋清調和真綠豆粉作膏。吐者塗兩足心。瀉者塗顙門。

小兒水瀉不止。葱薑搗爛入黃丹末爲丸。每用一丸填臍內。
用膏藥蓋之。卽止。

萬全湯 治小兒感冒發熱無論早晚皆可服之。柴胡五分，白芍一錢，當歸三分，白朮三分，炒葛根一錢。

芥錢甘草一山楂三黃芩三分蘇葉二麥冬一錢神曲三分水煎熱服。
春加青蒿三分夏加石膏三分秋加桔梗三分冬加麻黃一分
有食加枳殼三分有痰加白芥子三分瀉加豬苓一錢吐加白
豆蔻一粒有驚加金銀器各一件同煎照方按時對症服之。

小兒咳嗽 蘇葉五分桔梗一錢甘草一錢水煎熱服。有痰加白芥子八分

○又方老薑

兩搗碎煎湯沐浴週身卽愈

俗怕受寒用薑汁薰棉花俟乾貼背心袋

治胎驚 新產小兒或月內外忽發驚搐一二周時不愈諸醫束手無藥惟求雄鼠卵一枚平時拌硃砂懸挂陰乾者研末用開水調送二三匙其搐立瘥能乳至效奇方預藏爲妙

治小兒急慢驚風無論輕重發寒發熱飽悶等症奇效方

杏仁

桃仁 桔子各七個 飛羅麪五錢共搗爛用真好燒酒調勻塗兩手

兩足心男左女右。用絹包札一日乾則落。重者再塗一次。自愈。

急驚風

方見中風門

○又驚風起死回生方

硃砂

五厘烏梅三厘研極勻

用乳調灌

○又方以雞蛋煎熟取芙蓉嫩葉搗爛作餅包裹煎

蛋再煎至熟貼兒臍上立甦

小兒因發熱不退生驚。凡小兒壯熱不退忽然生驚勢甚危急。

用青蒿蟲丸治之神效。

青蒿蟲丸方 立秋前數日取青蒿剖開梗中有蟲取出麻油浸
儲量蟲多少用辰砂五錢輕粉 大黃各二錢射香三分研爲丸。如
葉豆大周歲一粒兩三歲二粒四五歲三粒用人乳和服此丸
功效甚大。有心濟人者宜預製之。

仙授清火散驚湯

白芍一錢 白茯苓二錢 陳皮一分

甘草一分 山梔三錢 炒黑

白术三分 土炒法半夏一分

柴胡三分 水煎服卽愈

小兒五疳

疳症不同宜各對症治之俱詳於後

小兒疳疾

疳有五種面色黃瘦肚腹脹大此腹內生蟲必服殺

蟲之劑然藥性峻利率傷腸胃今得外治之方既可除根又無傷損用羊屎脬一個吹脹陰乾灌入項好高梁酒二兩線札緊掛在小兒心口胃腕之間疾重者數個時辰酒氣自必消減酒減再換數次卽愈效驗神速仙方也

心臟受疳

小便不通口乾舌爛牙臭方用羊肝散

穀精草五錢

胡黃連二錢

銀柴胡二錢

地

骨皮五錢

蘆薈三分

甘草三分

共爲末每用羊肝一具竹刀剖縫入藥

錢

錢

錢

錢

末五分以線縛固砂罐內蒸熟隨時服。服之七日見效。

肝臟受瘡

積熱損目名雞眼
眼方用雞肝散

夜明砂

水飛淨

雄黃

威靈仙

谷

精草

蛤粉

各一錢

共爲末用雞肝一具入藥末五分砂鍋內煮

服七次自愈。

肺臟受瘡

龜胸咳嗽發熱夜啼方用二冬膏

天冬

麥冬

各三錢

苦棟皮

桑白皮

橘紅

生地

各三錢

河水十碗

煎至一碗瀝去渣再用白蜜八兩

共熬成膏再用山藥一兩爲末攬勻每服一二匙

日三次服完

自愈。

脾臟受瘡

夜出盜汗撒瀉口乾方用白朮散

白朮

白茯苓

澤瀉

各二錢

二胡黃連

陳皮

各一錢

神曲

炒

山楂

各五錢

其爲末每日清米湯調服

一錢

極效。

腎臟受疳

肌體瘦極遍身瘡疥或作寒熱頭熱腳冷或齒腫齦宣甚則牙齦潰脫名爲走馬牙疳

方分外吹

內服人中白

煅紅二兩

兒茶一兩

黃柏薄荷青黛各淨末一錢

冰片五分

研其研

極細末先用溫水漱淨口然後以藥吹牙齦

口吹六七次吹藥

後涎從外流爲吉涎毒內收爲凶○蘆薈

銀柴胡

川黃連

胡黃連元參桔梗

山梔黑

炒石膏

牛蒡子

薄荷

羚羊角

各五分

甘草升麻

各三分

淡竹葉

水二鍾煎六分食後服

此方雖穿腮破唇俱治

五疳丸

統治小兒

羊肝一具

竹刀切片瓦上焙熟

海螵蛸二兩

醋

浸炒黃色老粳米五錢炒

共爲細末

和羊肝搗爲丸

如黍粒大

日服二三錢米湯下

又治五疳八積腹大黃瘦骨立頭生瘡髮生結個放瓶中綿紙封口。七日後取糞中蟇洗淨。不拘多少入瓶中。俟蟇食完。取蟇去頭爪與肝腸。以麻油塗蟇身瓦上焙枯爲末。米湯調服。或用蜜爲丸服。連服五六個。一月後形容頓改。病除體壯。○兼治小兒癬瘡口耳瘡久不愈者。謂之月蝕。俱用此藥末調香油塗之。

小兒愛食壁土。桴炭。茶葉。生米等類。炒芝麻一鍾。拌雄黃末一二分。白水送下。三日後單食芝麻。久服自愈。○若止愛食壁土者。單用壁土末煎。黃連汁和餅食之。立愈。

小兒痞塊。肚大肌瘦。面黃。白芙蓉花。陰乾研末。入雞肝內紮合。飯上蒸熟食之。數次即愈。

食積痞硬 痘後傷食或小兒積痞用木賊草五錢研爲細末每服五分。開水空心服。近年一料卽消。遠年不過兩料全愈。

遍身奇痒叫啼不休 生薑搗爛稀布包擦自止。

撲癩子 緑豆粉 滑石等分少加輕粉一錢舊綿蘸撲效。

小兒中暑吐瀉或卒然昏倒 背陰側柏葉搗汁三匙生蜜二匙。井水三小盃調灌卽愈。

小兒痢疾 香茵五錢紅糖 白糖各二錢五分煎湯服立愈。○又外治方。土木鱉半個母丁香四粒麝香一分研爛唾津和丸如芡實大納一丸於臍中以膏藥貼之自愈。

小兒瘧疾外治方 未發前一刻以蛇蛻塞鼻。男左女右過時取

去效。

蟲疾。史君子。榧子各十枚。檳榔。甘草各一錢。爲末飯和搗爲丸。如桐子大。每日早服十九。五日蟲盡下。宜上旬日內服。蟲頭向上故也。

治腹中寸白蟲。飛羅麵。製半夏。生白礬各三錢。共爲細末水

滴成丸。分三日服。白湯下。蟲化爲水。大人照方十倍合服。

治男女童勞。野茄稈內蟲。取數十條。和入食物內食之。勿使病

者知。數次病愈。卽效。茄根上有蛀孔內卽有蟲身帶綠色者黑者是也。○又方。露天糞

坑內蟲。取入稀布袋於流水處漂漾極淨。瓦上焙黃色。每一兩入粳米糯米各二兩。炒和磨細。以砂糖米湯調服自愈。

稀痘奇方

手足指甲

要本生父母者平時收存除外之日取齊置新瓦上火燄以烟盡爲度存性放地上

除火氣

鳳凰衣

卽噴退雞蛋壳內白皮要臘月半

研末蟬蠅研以上

研末

鳳凰衣

卽後所出鮮者炒微黃色研末

蟬蠅研以上

三味依指甲輕重爲準等分研勻除夕夜用滾水調與兒食之一連三年服過三次永不出痘如服此一二年內卽遇出痘亦必稀少保無他患

局

鵝稀痘三豆湯

赤小豆

黑大豆

綠豆

各三

小甘草

三兩切片

用新竹筒一個兩頭留節開一小孔削去竹青入甘草於筒中以木尖布裹塞孔鎔蠟封固放糞坑內百餘日取起將筒洗淨晒乾取出甘草用長流水八碗雪水更佳與甘草三豆同煮透熟濾起豆晒乾入汁再浸再晒以汁盡爲度磁瓶收貯每日以

豆一小杯水一大杯砂罐肉煮連湯與豆食之預食能稀痘臨症服能解毒清火更爲相宜。

稀痘方 常煮老鼠與兒食妙不可言廣東人家常食此物故無痘患。

稀痘並免驚風方 小兒初生三日內於無風處以手指蘸雞蛋清摩揉小兒腦後風門骨起下至尾閭骨止按背脊骨逐節輕揉男左旋女右旋周而復始有黑毛如髮愈採愈出採盡可免出痘並免驚風六日九日再採更妙。

防痘入眼法 凡見痘引卽嚼牛蒡子貼額門則痘不入眼。治痘入眼 取黑狗耳上血一滴點眼內其痘卽除。

治痘不起漿。凡痘至七八九日無漿者生搘大蝦蟆三個要肚皮紅色者爲佳。用布包其身爪只留頭在外手持蝦蟆使其口與出痘者之口相對。約一頓飯時久將蝦蟆放去再以第二個如前法爲之連用三個則漿自起滿足不可傷蝦蟆屢試屢驗。

治痘漿不起及倒靨焦黑。醫家不肯用藥萬死一生方。瓦花搗汁同酒釀溫服卽堆沙而出。

解毒膠治小兒痘疹後餘毒結成癰疽連珠不已兼治年久惡瘡並頭上禿瘡。馬齒莧搗汁。猪油白蜜錢各一熬膏塗之卽效。

痘瘡丹治痘疹餘毒牙齦破爛出血或成走馬牙疳無不立效。人中白卽尿壺之白垢刮下。

銀罐中煅紅洽定取

每銅綠三分。麝香一分研細末茶洗口牙淨指搽藥卽愈。

胎毒暗眼。新產小兒兩目紅赤腫爛不開。以蚰蜒泥搗塗額門。
乾則再換。不過三次卽愈。

又方 生南星 生大黃等分爲末。醋調塗兒兩足心亦愈。不
拘月內外皆可用。

治小兒胎毒肥瘡方 花椒 白芷各三錢 鉛粉 枯礬
各二錢 共研末。麻油調搽自愈。

治小兒一切胎毒並解諸毒 金銀花鮮者晒乾不炒研末四兩 白洋糖三兩拌匀 磁瓶收贮。服之或作糕餅食。或以物蘸食甚妙。

治小兒羊鬚瘡 小紅棗燒灰存性。香油調塗卽愈。

小兒兩頰生螳螂子。代赭石用胭脂水磨濃塗頰上卽消。如割有

小兒癩 黃豆炒熟。青皮甘蔗炙灰存性。等分研末。麻油拌敷。
治鱗癩頭 胞衣瓶內石灰。蜜陀僧等分爲末。先用花椒湯洗。
淨香油調敷。聽其自落。卽愈。

治癩瘡方 硫黃 大椒 雄黃等分。陳珀化烊擦擦。

治生豆誤塞兒鼻 脹痛欲死者。急令兒緊閉兩目。令一人兩手掩兒兩耳。又一人以一手掩兒無豆鼻孔。另一人口對兒口用力一吹。豆自出落。奇妙屢驗。理淪
駢文

附列蔡松汀第一保產神效方

大熟地一兩
蜜炙真成芪一兩
淨歸身四錢
雲茯神三錢
醋炙淨龜版四錢
西黨參四錢
川芎一錢
酒炒杭白芍一錢
甘枸杞四錢
川貝母三錢
米炒荳一錢
蔻壳五分
車前子三錢

原 跛產以氣血爲主。氣足則易於送胎出門。血足則易於滑胎落地。若痛久則傷氣。下多則傷血。此方大補氣血。當臨產危急時。無論平時氣質強弱及胞衣已破未破。連服此方四五帖。煎以其力薄則痛可立減。產自順下。或竟熟睡片時。產下如不覺者。有疑惑先受外感。補恐爲患。不知痛甚且久。腠理齊開。邪從表解矣。胞水迸下。邪從下解矣。到此時候。有邪可服。無邪更可服。沈子。

璜家臨產必用此方。數十年無產難。亦無產後諸病。劉望珠家有難產四五日不下。危險已極。連服三帖頭煎。卽平安生產。試驗已久。萬無一失。○金壽之氏註。余內人先產三胎。悉稱順利。第四胎受孕後。所患各狀絕不類胎。至四個月後。忽爾漏紅。旋至發厥崩。中腹下始覺有塊。然仍時隱時現。日服補陰兼潤劑。崩漏不止。間下血塊。更不料其爲胎。至七個月時。無端橫產一手。託進復出。無慮十餘次。人則仍如平時。並無痛陣。惟小便脹極不通。穩婆輩均稱罕見。束手無策。連服加味芎歸湯。及人參桂圓等類。驗難見效。適有友人以此方施治多人。諄囑速服。遂悉照方內分量。精選良藥。頻煎與飲。一帖甫完。小便通暢。腹

中寬舒。孩手託進不復出。將滿兩帖。平安產下。而小孩僅能微動。俄頃卽殞。蓋胎中受傷已久。半體青腫。其橫出一手。實由無力轉動。較尋常誤用力而橫生者尤爲難治。使無此大補氣血之藥。爲患不堪設想。特將此方附刻。並敘試驗明效。以廣流傳。而免疑慮。

晋书

達生編

臨產

六字真言。一曰睡。二曰忍痛。三曰慢臨盆。

初覺腹痛。自家拿穩主意。不必驚慌。疼一陣。過五七陣。漸疼漸緊。此是要生。疼得慢。則是試疼。只管安眠穩食。不可亂動。若認作正產。胡亂臨盆。錯到底矣。此時第一要忍疼。忍住疼。照常吃飯。睡覺。疼得久。自然易生。千萬不可揉腰擦肚。站時穩。站坐時正坐。不可將身左右擺扭。此時必要寬懷。惜力安睡。明日養神。若不能睡。且扶人緩行。或扶桌站立。疼若緩。又睡。總以睡爲妙法。且宜仰睡。腹中寬舒。無踴踴遲早。不可用力。不可驕。教坐婆說。孩兒頭已在此。若當其時。小兒自會鑽出。至小兒力薄。其

轉身用力。已及到產門。不能得出。只稍用力三陣助之。便然而下矣。

或曰。大便時亦須用力。如何生產不用力。自夫便果物必須人力。小兒自會轉動。不但不必用力。正切忌用力。小兒端坐廁中。及至生產。垂頭向。下。若小兒未會轉身。用力三遍。則腳先出。致轉身未定。用力三遍。則橫臥腹中。三手先出。此等弊病。皆由妄自用力之故。當用力只有三盡。蓋時其餘不可亂動。節如夫便未到其時。縱用力亦不能出。況於人乎。

或問。何以知此。一盡。茶時而用力乎。曰。著小兒到產門。則渾身骨節疎解。胸前陷下。腰腹重墜。夫小便二齊俱急。自中全化。耀機。

六字真言。一曰睡。二曰忍痛。三曰慢臨盆。

初覺腹痛。自家拿穩主意。不必驚慌。疼一陣。通五七陣。漸疼漸緊。此是要生。疼得慢。則是試疼。只管安眠穩食。不可亂動。若認作正產。胡亂臨盆。錯到底矣。此時第一要忍疼。忍住疼。照常吃飯。睡覺。疼得久。自然易生。千萬不可採腰擦肚。站時穩。站坐時正坐。不可將身左右擺扭。此時必要寬懷。惜力安睡。閉目養神。若不能睡。且扶人緩行。或扶桌站立。疼若緩。又睡。總以睡爲妙法。且宜仰睡。腹中寬舒。無論遲早。不可用力。不可驅。收生婆說。孩兒頭已在此。若當其時。小兒自會鑽出。至小兒力薄。其

轉身用力。已及到產門。不能得出。只稍用力一陣助之。脫然而下矣。

或曰。大便時亦須用力。如何生產不用力。曰。大便呆物。必須人力。小兒自會轉動。不但不必用力。正切忌用力。小兒端坐腹中。及至生產。垂頭向下。若小兒未曾轉身。用力一逼。則腳先出。或轉身未定。用力一逼。則橫卧腹中。一手先出。此等弊病。皆由妄自用力之故。當用力。只有一盡茶時。其餘不可亂動。卽如大便未到其時。縱用力亦不能出。況於人乎。

或問。何以知此。一盡茶時而用力乎。曰。若小兒到產門。則渾身骨節疎解。胸前陷下。腰腹重墜。大小便一齊俱急。目中金花爆濺。

此時用力一陣。則母子分離矣。

或問忍疼過久。恐亦不妙。曰。從不聞婦人私產而難產者。總因怕人知覺。極力忍疼。疼到莫奈何處。自脫然而下矣。

或問若快用力。致橫生倒產。有法治否。曰。急令安睡。用大劑加味芎歸湯服之。將手足緩緩托入。再睡一宿。自然生矣。又云。托之不入。柰何。曰。若肯睡。再無托不入之理。如亂動或亂服藥。必不好矣。

或問盤腸生是何故。曰。是用力之過。蓋產母平日氣虛。臨時用力努掙。渾身氣血下注。以致腸躄兒下。一次如此。下次路熟。又復如此。若等瓜熟蒂落。何得有此怪異乎。

或問一痛便生。又何也。曰。益氣已足。母子兩分。兒自出矣。
或問臨產有經驗之藥可用否。曰。不用。既不用力。不動手。又有睡
法。便自會生。何須用藥。

或問用藥有損否。曰。有損。如鼠兔二丸。耗氣損血。回生丹。破血損
氣。以致產後中風發熱等疾。此二方古今稱爲靈寶。尙然如此。
其他藥可知矣。

或問總無可用之藥乎。曰。只有加味芎歸湯。佛手散。此二方使宿
血出。而新血生。且身體壯健。無別病。

凡生產艱難。或天寒孩兒生下不哭。或已死者。急用衣服包裹。再
用香油紙燃將臍帶。慢慢燒斷。緩氣入腹。有氣而活。如先剪斷

臍帶則死矣。

或問臨產飲食如何。曰。此時全要好飲食調理。但不可過於肥膩。倘不能食。常進米粥及肉湯之類。吹去油澄清。連連飲之。有益能壯精神。人以食爲命。豈可缺乎。

臨產時宜老成安靜二三人伺候。不必多人。夏月更不宜人多。熱氣擁盛。使產母煩躁發暈。爲害不小。房中宜輕言低語。令其得睡爲妙。第一勸其放心安靜。忍痛歇息。不可當面求神號佛。咨嗟驚詫。皆能令其憂疑擾亂。以致悞事。冬月宜設火盆。盛夏多貯井水。亦勿過涼。

或問試疼何故。曰。兒到七八月會動。或母腹中有火。或起居不時。

令兒不安以致動疼。宜照常穩食安睡一二日自安。或痛之不止用安胎藥一二服。萬不可輕易臨盆亂動。如剖卵出籬。豈能活乎。

何爲試疼。一陣緊一陣者。正產也。一陣慢一陣。或乍緊乍慢。皆試疼也。止腹痛者未產也。連腰痛者將產也。

傷食受寒。何以辨之。曰。傷食者當臍而痛。手按之更痛。或臍旁有一硬處。寒痛多在臍下。繸繸而痛。不增不減。得熱物而稍緩也。或問。倘將正生認作試疼。不亦害乎。曰。無害。果當其時。小兒自會鑽出。縱或過時。不過落於褲中。有何大害。

孕已知覺。卽用布一幅六七寸寬。約纏兩道。橫束腰間。直至臨盆。

之時解去。若試疼不宜解去。

有孕後睡時須兩邊換睡。不可儘在一邊。使小兒左右便利。則產時中道而易生矣。

有孕後最忌暴怒。口不可出疾言。手不可用鞭撻。蓋怒傷氣血。多有因此動胎者。卽不動胎。怒氣入胎子孫多疾。

娠婦不可登高上梯。恐傾跌有損。不可伸手高處取物。恐胎傷而子啼。腹中如腹中子啼。但令娠婦鞠躬片時。或俯拾地上錢壹之類自安。

孕婦禁忌。一切宰殺凶惡之事不可看。修造興工動土之事不可看。龜兔及殘疾污穢怪異形象俱不可看。

產後數日忽然渾身大熱面紅眼赤口渴此血虛之症宜用當歸補血湯若認作傷寒而用石膏芩連等寒涼之藥則必死矣。

產後上牀宜高枕靠墊勿令睡下膝宜堅起隨飲熱童便一盞只宜閉目靜養勿令熟睡亦不宜高聲急叫以致有驚恐四壁宜遮風不問有痛無痛俱要用熱童便和熱酒各半每次一杯一日三五次至三日而止若無大病只是如此不必服藥米粥不拘時候可進則進忌葷腥一月

死胎只宜佛手散服之自下如不下再用平胃散一服外用黃牛糞炒熱絹包熨腹何以知其胎死曰面赤舌青母活子死而青舌赤子活母死面舌皆青母子俱死

胞衣不下何故。總是臨盆早之故。當產骨開壯者數日合弱者一月方合。不待其開而強出之。其胎出而骨眼隨閉。以致胞出不及耳。

此症可傷命否。曰。不妨。不必服藥。不必驚恐。若胞衣不下。急用粗麻線。將臍帶繫住。又將臍帶雙折。再繫一道。以微物墜下。再將臍帶翦斷。過三五日。自痿縮乾小而下。此方屢驗。只與產母說知。不必驚恐。萬不可聽收生婆妄用手取。傷生者甚多。

或問早一時。不可用力亂動。如遲一時。可不妨否。曰。不妨。若當其時。必無不出之理。或偶有不出。宜上牀安睡。使小兒在腹中亦安睡。歇力少刻。自然出矣。何用早動乎。

昔一婦產兒手先出。不能得入。穩婆用力欲取子。知之急令安睡。
與大劑芎歸湯服之。徐徐手入。明日早生下。

大方曰。婦人孕有七八箇月生者。有一二年後生者。不可不知
方藥。

加味芎歸湯 百試百驗

治交骨不開產門不閉 活胎卽生死胎卽下

當歸

一兩 川芎

七錢

龜板

手大一片

醋炙研末

婦人頭髮

如雞蛋大瓦

上焰存性

水二碗煎一大碗服

如人行五里卽生

或胎死

或交骨不開急

服此方死胎亦下如神

佛手散 治六七月後傷胎

或子死腹中疼痛不已

口噤昏悶

或心腹疼滿

血上衝心者

服之生胎卽安

死胎卽下

又治橫生倒

心腹疼滿

血上衝心者

服之生胎卽安

死胎卽下

又治橫生倒

產卽安臥煎藥急服。再安臥卽順生。又治產後腰疼發熱頭疼。
除敗血。生新血。能除諸病。

當歸

五錢 川芎

三錢

水七分。酒三分。同煎七分。如橫生倒產子。

死腹中者。加黑豆一合。炒焦熟。乘熱淬入水中。加童便一半煎。
服少刻再服。

平胃散

蒼朮

米汁炒

厚朴

薑汁炒

陳皮

甘草

炒

三味各三錢。甘草一錢二分。

生化湯

治產後兒枕痛及惡露不行。腹痛等症。

當歸

六錢

川芎

四錢

乾薑

炒五分

桃仁

五分

甘草

炒五分

水一盞。童便一盞。

煎服。若惡血已行。腹疼已止。減去桃仁。再多服數服不妨。

安胎方

黃芩蜜杜仲

姜汁炒

茯苓各一錢

黃芩五分

白朮生用五分

阿膠一分

珠錢甘草三錢

續斷八分

胸疼脹滿加紫蘇陳皮各八分

下紅加艾

葉地榆各一錢

阿膠多錢

引用糯米百粒酒二杯煎服如腹痛急火

煎服

安胎銀苧酒

治孕妊胎動欲墜腹痛不可忍及胎漏下血。苧

根兩紋銀兩

酒一碗如無苧之處用苧草根五兩加水煎之。

絮酒

治孕妊腰疼如折。

黑料豆二合炒

焦熟陳酒一

大碗煎至七分空心服

當歸補血湯

大補陰血退血虛發熱如神。

黃芪蜜炙

一兩當歸三錢

水二碗煎一碗。一服立愈分兩不可加減。

華陀愈風散

治婦人產後中風。口噤手足抽掣。及角弓反張。

或產後血暈。不省人事。四肢強直。或心頭倒築。吐瀉欲死。

荆芥穗

除梗不用
焙乾研末

每服三錢。童便調服。口噤則挑口灌之。齒噤

則不研末。只將荆芥以童便煎好。微溫灌入鼻中。其效如神。無

童便用黑豆酒亦可。

通脈湯 治乳少或無乳

黃芪

生用一兩當歸五錢

白芷五錢。七孔猪蹄一對煮湯。吹去浮油。煎藥。

一碗服之。覆面睡卽有乳。或未效。再一服無不通矣。

新產無乳者。不用猪蹄。只用水一半酒一半煎服。體壯者。加好紅

花三分。以消惡露。

急救難產仙方 即保產無憂散 方列文科第四頁

全當歸一錢五分酒浸川貝母一錢去心羌活五分細甘草五分荆芥穗八分厚朴七分姜斯七分川貝母七分荆芥穗八分蜜分川
汁製蘄艾七分兔絲餅一錢四分酒泡生黃蓍八分蜜只壳六分川
芎五分白芍一錢秋冬天一錢二分分水炒分蜜炒
此方務必稱足分量不可加減多少如三兩月胎動不安者服
一劑卽安五七月預服一劑則臨產平安易生如臨月服一劑
順利無比或橫生逆產五七日不下三二日不養者按方服一
劑立刻順生母子平安矣此乃仙授奇方救過千萬人慎勿爲
庸醫加減分兩如有仁人君子轉刻施送則功德無量矣

福幼編原序

世之醫者委云小兒無補法。只此一語禍延靡極。夫小兒臟腑柔嫩。經脈未充。易于受邪。而入之未深。偶遇身熱惡食。稍爲和解足矣。乃醫者始必羣聚疏風。削尅之藥重劑雜投。不應。又繼以沈寒固冷。殊不知風藥多則陰血受傷。而多汗亡陽。氣亦隨耗。再用苦寒傷胃。俾陽明無司運之權。而太陰亦失傳送之度。以未充之經脈柔嫩之臟腑。受此無窮之消伐。慢驚之所由致。端在是矣。當此之際。尚不思補偏救弊之法。猶謂邪未盡。而熱未除。必驅之萬無可生之路。而後已。殺人毒手。未有慘于此者。至慢驚一症。亦有無所因而內發者。此根于賦稟本虛。陰陽失養。互相生長之機。漸形

歟絕之狀。惟審其偏勝。力爲補救。庶幾全活一二。若猶以外因治之。縱使稍爲和解。殺亦至捷也。今讀毘陵莊在田先生是編。其言慢驚致病之由。則究本窮源治法。則絲絲入扣。立方則審其陰陽之辨。而直中其窽竅。古有活人書。此其是矣。宜亟付之梓。人廣行于世。俾醫者覺迷途于未晚。而世間赤子保全者。奚止數萬萬而已哉。是爲序。時乾隆丁酉季夏吳門慕豫生譔。

福幼編

凡例

一此編雖專主溫補。然亦須審視小兒平日秉氣。凡小兒既成慢
驚。必于後開條目內。有數處相合者。卽放心照方服藥。勿謂此
書與古方疎風清熱之藥不同。仍泥用古方以自悞也。

一此編凡鹿茸人參等貴重難覓之藥。悉不闡入。恐窮鄉僻壤。及
無力之家。不能購覓。仍束手以待也。

一此編之藥。隨處皆有。但必須另包過戥。如法炮製。

一此編乃獨得之奇。發古人不傳之祕。但天下之大小兒待命者。
甚多焉。能處處施散。有志活人者。能翻刻廣傳。陰德最大。卽力

元編
有不能施捨者。或抄寫數部。或逢人講解。使村夫老嫗。皆知小兒慢驚風。並非不治之症。但審視于後開條目內。有數處相合。卽依法療治。全活愈多。功德愈大也。

一近時所賣之抱龍牛黃等丸。皆疎風化痰之藥。急驚最爲對症。若慢驚之甚者。下喉卽死。不可不慎。

急驚與慢驚全屬相反。急驚之症。當其驚風大作。喉中多有熱痰。用抱龍丸下咽。卽醒。再用清熱消導之藥。一劑而安。本欲附方于後。仍恐治慢驚者先用之。爲害匪淺。是以姑述其由。而方不敘入。蓋慢驚乃寒痰虛風。非逐去寒邪。扶治肝腎不可也。
此編內新立二方。明言慢驚屬虛寒。溫補卽所以治慢驚急驚。

屬實熱。清熱正所以治急風。古人每以一方治二症。未究其治病之根也。

一近代醫家皆云慢驚一症。先須鎮驚開竅。往往用硃砂及金銀器物煮水。仍煎清熱散風之藥。所以愈治愈危。從未聞治愈一人。良可歎也。

一小兒病重。不免問卜求神。星士瞽者。又有某日服藥有效。某日無效等語。但慢驚之症。總因虛極生風。非速加溫補。不能奪命。愈早愈妙。切勿妄聽坐失機宜也。

一海內醫書。未可枚舉。諸子各執一見。議論紛陳。得失參半。惟慢驚一症。自古沿今。相承錯謬。殊堪扼腕。是編專辯慢驚一症。與

各書不同。尙有經驗之方。槩不列入。恐舉一漏百。反足貽笑方家。且爲字無多。翻刻較易。

一爲善濟人。當得福報。尙能廣傳此書。使天下後世活人無數。又非尋常陰隲可比。費甚小而功甚大。何不爲此。

一是編旣有獨得之祕。可以活人焉。敢隱而不宣。況小兒一得此症。其父母無不驚惶急遽。有此一編。細加斟酌。即可心有把握。不至急亂投醫。唯願見是編者。廣爲傳播。不惜講解流傳。陰德亦大。若心知其是。妄加評駁。或靳不示人。此等人當易得惡報。今姑蘇中州。俱已梓行矣。東省尙無是編。因急爲刊板施送。伏望

四方仁人君子。見卽翻刻。由近及遠。務使家家有福。幼編一書。
存活無窮。積德無量。較之刊刻經卷佛像。請人供養者。尤爲現
在功德矣。

一藥方內有條參一味。稍爲貴重。此物俗名太子參。南中三四十
換。可以買得。若萬分無力之家。或用上好西黨參一兩。煎濃汁
與伏龍肝所煎之水和合一處。再入各藥同煎。亦可代得。

福幼編

武進莊一夔著

總論

凡治慢驚專以溫補見功。於後開條目內有數處相合者。卽放心照方服藥。勿謂此書與古方清熱散風之藥不同。仍泥用古方以自悞也。

凡小兒久病不愈。諸病之後。均能轉爲慢驚。得之最易。而醫之最难。人但知清熱散風。不知溫補。氣血間有見及慢驚。是虛寒症。欲用溫補。又因不合古書。恐招訕謗。是以慢驚竟爲幼科第一危險之症。此編新立二方。專治慢驚。蓋急驚屬實熱。則清熱可以治之。

慢驚屬虛寒。惟溫補可以治之。二症有寒熱之殊。用藥有雲泥之異。古人每以一方治二病。未究其致病之根源。不可信也。

凡抱龍牛黃等丸。皆清熱化痰之藥。急驚則對症。若慢驚之甚者。下喉卽死。

薑桂附子。乃方中之用神。減去則無效。肉桂好者難得。薄桂溥桂但有油者。皆可用之。

慢驚之輕者。理中地黃湯內多用薑桂。亦可治愈。若虛寒至極者。非用附子不可。本草附子下註明治慢驚。可見溫補乃治慢驚祕訣。無所疑也。

醫家謂慢驚一症。先須驅風化痰鎮驚。往往用金銀器物煮水。仍

煎發散消導之藥。愈治愈危。未聞治愈一人也。

元空集

卷之三

六

武進莊一夔著

治慢驚風心得神方

慢驚之症。緣小兒吐瀉得之爲最多。或久瘧久痢。或痘後疹後。或因風寒飲食積滯。過用攻伐傷脾。或秉賦本虛。或悞服涼藥。或因急驚而用藥攻降太甚。皆可致此症也。其症神昏氣喘。或大熱不退。眼開驚搐。或乍寒乍熱。或三陽晦暗。或面色淡白青黃。或大小便清白。或口脣雖開裂出血。而口中氣冷。或瀉利冷汗。四肢冰冷。並至腹中時响。喉內痰鳴。角弓反張。目光昏暗。此虛症也。亦危症也。俗名謂之天吊風。虛風。慢脾風。皆此症也。若再用寒涼。再行消。

導或用胆星抱龍以除痰。或用天麻全蝎以驅風。或用知柏芩連以清火。或用大黃巴豆以去積。殺人如反掌。良可畏也。若治風而風無可治。治驚而驚亦無可治。此實因脾胃虛寒。孤陽外越。元氣無根。陰寒至極。風之所由動也。治宜先用辛熱。再加溫補。蓋補土所以敵木。治本卽所以治標。凡小兒一經吐瀉交作。卽是最危之症。若其屢作不已。無論痘後。疹後。病後。不拘何因。皆當急用參朮。以救胃氣。不唯傷食當救之。卽傷寒。傷暑。亦當救之。蓋其先雖有寒暑實邪。一經吐瀉。業已全除。脾胃空虛。倉廩匱乏。若不急救。恐虛痰上湧。命在頃刻矣。庸醫見之。皆誤指爲熱爲食。投以清火去積涼藥。立時告變。爲之奈何。于是羣起而譁曰。慢驚本不治之症。

也。夫慢症而以急症治之不死何待。今天下既以慢驚爲不治矣。曷不推究此理與其失之寒涼萬難生活不若失之溫補猶可療救此論發明吐瀉驚風之理極爲明確亦極易辨別後之君子將臚列各條細加詳察如有數處相合卽急救之萬不可再有濡滯致喚奈何也。

今將慢驚辨症臚列於後

小兒病不能自言又不能看脈

醫者一見

朋友卽知

所以爲病
欺人之語
其不死於

一慢驚吐瀉脾胃虛寒也。

一慢驚身冷陽氣抑遏不出也。

一慢驚鼻孔煽動真陰失守虛火燦肺也。

一慢驚面色青黃及白色乃氣血兩虛也。

藥者幾希
矣然小兒

之爲病須

細察其形

色可探問

乳之者病

因何而起

所食何物

曾否驚嚇

夜間如何

情景如此

逐一問去

再開方用

藥庶乎百

方一得

一慢驚大小便清白。腎與大腸全無火也。

一慢驚昏睡露睛。神氣不足也。

一慢驚手足抽掣。血不行于四肢也。

一慢驚角弓反張。血虛筋急也。

一慢驚乍熱乍涼。陰血虛少。陰陽錯亂也。

一慢驚汗出如洗。陽虛而表不固也。

一慢驚手足瘓癰。血不足以養筋也。

一慢驚顫門下陷。虛至極也。

一慢驚身雖發熱。口唇焦裂出血。卻不喜飲涼茶水。以及所吐之乳。所瀉之物。皆不甚消化。脾胃無火可知。唇之焦黑。乃真陰之

不足也。

大凡小兒因發熱不退。及吐瀉過多。總屬陰虛陽越。必須預防其成慢驚之症。此與感冒風寒發熱迥乎不同。故不宜再散治。宜培元救本。加薑桂以引火歸源。必辛熱開寒痰。再進溫補。萬無一失冀。

仁人君子詳審前開條欵。速爲拯救。禱切禱切。

今將經驗二方列後

逐寒蕩驚湯

藥性溫緩。專治小兒體弱久病。或痘疹後。悞服寒涼。轉爲慢驚。認係虛寒。速服此。開痰寬胸。止吐。同元。

肉桂

一錢研細或磨濃汁不可經火

炮薑

一錢

胡椒

一錢研

丁香

十粒研

另用灶心土三兩。煮水澄極清。煎前四藥之末。一大酒杯。頻頻

脾胃虛寒
胸膈胃口

有寒痰拒藥不受者
可先權用
溫中補脾
湯如不應
再用此湯
溫中補脾
湯西党

灌下一二劑嘔吐漸止。再接服後方。定獲奇效。切勿遲疑。
加味理中地黃湯 助氣補血。治小兒精神虧氣血壞狼狽瘦弱。皆可挽回。濃煎頻服。參天救本之功。難以盡述。
熟地 五錢 當歸 三錢。如三四劑後泄瀉未止者去之。 黃肉 一錢 枸杞 三錢
白朮 四錢 炮薑 一錢 桂枝 二錢 紫草 一錢 栗仁 二錢
內桂 一錢 五味子 一錢 破故脂 二錢
生薑三片。紅棗三枚。胡桃一個。打碎爲引。仍用灶心土一兩煮水煎藥。取濃汁大半茶杯。加附子三分。煎水攪入。諒兒大小分數次灌之。如有咳嗽。加荳蔻一錢。金櫻子一錢。如大熱不退。加白芍一錢。泄瀉不止。加丁香六分。只服一劑。卽去附子。止用丁香七粒。隔二三日。只用附子一二分。蓋因附子太熱。中病即宜頻煩灌之。

乾姜 半錢 白蔻 各八分 砂仁 半錢
官桂 半錢 陳皮 半錢
炙草 半錢 茯苓 各六分
荳蔻 半錢 加姜棗濃煎一酒杯

去之。如用附子太多。恐小便閉塞。若不用附子。則沈寒臟腑。固結不開。如不用丁香。則泄瀉不止。此又神而明之。存乎其人者。唯在依方療救者。臨時斟酌。萬全而已。此方乃救陰固本之要藥。治小兒慢驚。稱爲神劑。若小兒吐瀉。不至大甚。或微見驚搐。胃中尚可受藥吃。乳便利者。並不必服。逐寒蕩驚湯。只服此藥一劑。而風定神清矣。如小兒尙未成驚。不過昏睡發熱不退。或時熱時止。或日間安靜。夜間發熱。以及午後發熱等症。總屬陰虛。均宜服之。若素來壯實之小兒。偶染新病。眼紅口渴者。乃實火之症。方可用清解之劑。但果係實火。必大便閉結。氣壯聲宏。且喜飲冷茶水。若吐瀉交作。卽非實火可知矣。此方補造化陰。

陽所不足。實回生起死有神功。倘大虛之後。一劑未見大驗。審視小兒稍有起色。卽加重多服。可奏奇功矣。

治驗

一余胞姪乳名文豹。素甚壯實。週歲疹後發熱。兼旬不退。咳嗽時以手捫口喉。痛可知。後數日晝夜昏睡不醒。因延本地時醫。投以清熱解表涼藥。一劑而熱立止。逾時體冷徹骨。熱復大作。再投前劑。則無效矣。又延他醫。投以芩連石斛等藥。非惟熱不能解。且面色青黃。三陽黑暗。大喘大瀉。愈增危篤。醫亦束手。余查痘疹諸書。皆云疹係熱症。宜用寒涼。其說亦與症不符。姑用救陰固本平補之藥。一劑灌之。悉皆吐出。余母顧兒謂余曰。腹中

矣兒歲僅一

週久病瀉聲

真淚眼青唇

自己感慢驚服

碧葉湯未

能覺望江右

謝晉梁溪

或深得醫

心傳謫望

些瘞已極前

右服則此

時挑破不及嚼

用吳茱萸煎

夏三錢頻煎

與服連陽於

作响風已動矣。喉如雞聲。痰已塞矣。且喫乳卽吐。頭搖睛泛氣促神昏。兩目無光。面無人色。敗症現矣。急請前醫。皆裹足不至。遍查各書。俱載疹後發熱不退。而搖頭睛泛。吐瀉神昏。乃慢脾風不治之症。然亦不忍坐視不救。細思喉中作响。必係寒痰。蓋緣真陽外越。寒生於中。如係實火。則前此芩連之藥。何至反劇。外雖極熱。內實真寒。非用大辛大熱之品。不能冲開寒痰。故前諸藥皆吐而不受。因取附子薑桂煎湯欲灌。余母曰。此兒現在發熱。且脣已開裂出血。何可再用附子。余思內經云。假者反之。此症非辛熱之品。終不能引火歸源。以消寒滯也。雖易去附子。仍改用胡椒一錢。肉桂一錢。炮薑四片。似覺平淡。以期老母不

證治萬物猶豫

記事錄依方

煎酒因辛辣不

能下咽入喉即

吐商之 謝君

不得呌乾姜

減爲錢半附子

仍用三錢更加

多草錢半以

和中而解接

連服外用附

子草各二兩

研末分盛兩布

袋封裹腹令

則輪換一日夜

疑。煎湯灌下。痰聲立止。又取伏龍肝冲水灌之。吐亦漸止。少頃兒忽眼動。呵欠咳嗽時。卽不以手捫口。又頃連溺小便。稠濁紫黑。疹後邪毒節次盡下。似有起色。因用附子理中湯合六味地黃湯去澤瀉丹皮。加故紙枸杞一劑。而敗症全除。惟大熱未退。乃於前湯內復加棗仁五味白芍斂陰之藥。一劑而安。此正類經所云。治風先治血。及甘溫退大熱之義也。其後細審此症。咳嗽喉痛。心火爍肺金也。嘔吐泄瀉。脾腎虛寒也。用胡椒薑桂。所以開湧喉之寒痰也。用灶心土者。補土所以敵木也。木平則風息。土旺則金生。金既得生。火不能尅。則向者尅肺之邪火。仍返而歸心。心爲君主之官。邪不能犯。心與小腸相表裏。故疹毒傳。

中眼病三劑病

減十之五六再
服數劑始改別

方竟得愈慢

驚癲屬寒虛

寒至極非用此

等藥不能痊

疾猶憲橫行

非健將不能勦

捕勿謂執性猛

烈多生疑惑至

本草載附子納

小便一說亦不

可概論。吾見五

六日內共服附

入膀胱下溺爲紫黑色也。聊記簡末以備方家採擇。或於活人
之術不無小補云爾。

一鄰友方元興有子歲餘常見其持單買藥詢之方曰兒病已久。
更數醫矣今又延某醫包治此其藥單也逾數日泣謂余曰某
醫悔口子不生矣君其有術乎細叩其故方曰我子體熱已久。
近日氣弱神昏腹中膨脹吐瀉發喘兩目上視命在須臾邀余
往視見其子顙門下陷面色青黃取向日醫方閱之悉是去積
發散涼血之藥與症相反余曰得之矣用理中地黃湯去附子
澤瀉加枸杞故紙一劑而安又十餘劑而氣體復元矣。

片兩以外。小
便如常。蘋果
對症即有益。而
無損用。裏面
出壽之延。

已成慢驚。雖神醫來此。亦難爲力。廣文呼號求救。幾不欲生。同
學宋孝廉以福幼編授程。程閱而疑之。宋曰。此子已無生理。舍
此更無他術。服此溫補之劑。或可挽回。倉猝間無內桂。遂以桂
子四錢研碎。加入理中地黃湯內。如法濃煎。頻頻與服。一劑驚
止。又三劑全愈。

一裕州刺史徐公。獨子十歲。氣體本虛。病後大熱不退。屢服涼藥。
泄瀉嘔吐。角弓反張。諸症作矣。羣醫畢至。仍係清熱解表。病勢
更加萬無生理。少府史某。詣署謁見。徐曰。小兒慢驚壞症。醫技
已窮。若能救之乎。吏袖出福幼編。曰。此木耑治慢驚。但其方與
古書不同。應否與服。其自主之。徐曰。著書人斷無孟浪之理。卽

遵照編內之方。不減分毫。用逐寒蕩驚湯一劑。喉間寒痰已開。
接服理中地黃湯四劑。驚止熱退全愈。此編愈人甚多。聊記數
條以備酌用。閱者益可堅信。無致疑悞也。

