

方補經固真湯

白葵花

研爛四分

橘皮

五分

藁朮

郁李仁

柴胡

甘草

炙各一錢

乾薑

細末

人參

各二錢

右咬咀水煎空心溫服。少壯行早飯壅之。

治心腹疼痛。赤白帶下。面色萎黃。四肢羸弱。以卷栢丸或當歸

煎丸主之。

方卷栢丸

卷栢

醋炙一兩

黃芪

熟地黃

各一兩五錢

鹿茸

赤石脂

煨紅醋淬七次

白石脂

川芎

代赭石

艾葉

桑寄生

鱉甲

當歸

地榆

木香

龍骨

乾薑

各七錢五分

右件依法製度為末。酒煮糯米粉糊為丸。如梧桐子大。每服

七十九空。心米湯送下。

方當歸煎丸

當歸

赤芍藥

牡蠣

阿膠

熟地黃

地榆

白芍藥

續斷 各等分

右件依法製度為末。醋煮麩糊為丸。如梧桐子大。每服五十丸。溫酒米湯任下。

病癩。面白帶下。疰脚氣。腰已下。如在冰雪。以火焙重衣。蓋上。猶

寒冷之極。面白如枯魚。肌肉如刀刮。小便不止。與白帶長

流不禁。目青如菜。晄々無所見。身重如山。腿膝枯細。大便

難。口不能言。食不下。心下痞煩。懼懼。口垢背寒。嘔噦不止。

行步欹側。不能安地。虛之甚。極以酒煮當歸丸主之。

方酒煮當歸丸

茴香 五錢

黑附子

良薑

柴胡 各二錢

當歸

兩以上四味到如宜大用上好酒一升煮至酒盡焙乾

甘草

苦棟生

丁香

各五分

木香

升麻

各一錢

黃鹽

全蝎

各三錢

玄胡索

四錢

右件依法製度。共為末。酒煮糊為丸。如梧桐子大。每服五六

十丸。空心用淡醋湯送下。

〔治〕五種帶下。腰腹疼痛。以大溫經湯主之。

方見本卷前。

〔治〕夏月帶下。脫漏不止。以升陽調經湯主之。

方見本卷前。

〔治〕赤白帶。與痢同法。以胃風湯主之。

方見四卷內。

○諸積

諸積其狀不同。感病稍異。痞者在腹內近臍。左右有一條筋脉急痛。八者如臂。小者如拍。若弦之狀。癰者為僻。側在兩肋之間。

有時而痛此皆陰陽不和經絡否隔飲食停滯氣不宣通邪冷之氣搏結不散而成故得冷則作疼痛也。瘕者在腹內或腸胃之間與臟氣結搏其牢強推之不移有血食二種食瘕者月候來時多食生冷之物脾胃氣虛不能消化結聚成塊日漸生長血瘕者血氣勞傷月水往來經絡否澁惡血停瘀結聚所生積年不散瘕者假也其結聚浮假而痛推移乃動其發則腹痛逆氣上行乃胞中絕傷惡血不散久則結成或飲食不節寒濕不調或由胞胎生產月水往來血脉精氣不和之所生也腹痛交滿胸脇腰背相引四肢疼痛月事不調如懷胎之狀邪氣甚盛令人恍惚夜多異夢寒熱往來四肢不舉陰中生氣甚者害於小便小腹重痛或淋瀝面色黃黑則不復有子其候有黃瘕青瘕燥瘕脂瘕狐瘕蛇瘕鱉瘕血瘕八種也千金外臺言之備詳

疝者內為臟腑氣弱外為風冷入腹與血相結所生主乎肝經故腹中勁急脉亦弦急也痞者其氣痞逆不宣暢也得冷則痛面無顏色四肢瘦弱其諸積為患若入於子臟則使無子入於胞絡則月事不通也。

〔病〕 疝瘕冷氣及心腹痛不可忍以麝香丸主之。

〔方〕 麝香丸

麝香

五錢 另研

五靈脂

阿膠

麪裹煨熟去麪

桃仁

京三稜

各七錢五分

元花

醋炒

檳榔

各一兩

蓬朮

桂心

沒藥

另研

木香

方研

當歸

各五錢

右件依法製為末和勻以軟米飯杵爛為丸如梧桐子大每服十丸淡醋湯空心送下。

〔病〕 血瘕腹中有塊攻刺小腹痛引腰背調順氣血並以琥珀丸

或聚寶丹主之。

〔方〕琥珀丸

琥珀另研 白芍藥

川烏 牛膝 鱉甲

蓬木 當歸

厚朴各一兩 木香 淫蘭葉

官桂 各五錢

麝香 五分

右件依法製度酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服七十九空
心溫酒米飲任下

〔方〕聚寶丹

沒藥 琥珀 各二錢

辰砂 五分 乳香 五分 當歸 二錢

麝香 二分

右件修合各另為末和勻滴水為丸每兩作十五丸溫酒空

心磨下

如難產及產後敗血衝心惡露未盡並入童便少許不拘時服。

治諸積復中疼痛肌體倦瘦以葱白散王之治疝瘕効速。方見本卷

前款

治瘀血成積腹疼不已以桂枝桃仁湯主之。方見本卷前

治疝瘕久不清令人黃瘦危羸兩脇妨悶心腹疼痛以乾漆散

治之。

方乾漆散

乾漆 木香 芫花 赤芍藥 桂心

當歸 琥珀 川芎各二錢 大黃炒

桃仁另研各四錢 牛膝三錢二分 麝香一錢

右件修製為細末每服一錢溫酒調下漸去其積。

治血癥血積。以桃仁丸下去異物。後以調理氣血藥補之。

方桃仁丸

桃仁 大黃 朴硝 各一兩 蜚蠊 五錢

右件依法製度各另為末。先以醕醋二升半。銀石器內。慢火煎取半炷香。下大黃桃仁蜚蠊三味。不住手攪。欲下手丸得。方入朴硝。不住手攪。良久出之。丸如梧桐子大。前一日不喫晚飯。五更初服五丸。溫酒送下。待去如赤豆汁。或如鷄肝鰕衣狀為度。未下再服。如畧見鮮血來即止。

病月經不調。結成血積。腹疼堅硬。以增損四物湯若有氣。加木香。虛弱減棗木。加白朮。

方增味四物湯

當歸 一錢 三稜 八分 川芎 白芍藥 各一錢 官桂 五分

熟地 錢 生薑 五片 蓬朮 八分 乾漆 五分

右咬咀。水煎熟。食前温服。

病瘕痞及惡血氣攻心腹疼痛。回無顏色。以川山甲散主之。

方 川山甲散

川山甲 熬甲 赤芍藥 大黃 炒 乾漆

桂心 各一兩 川芎 芫花 當歸 各五錢 麝香 五分

右件。修製為細末。每服一錢。温酒空心調下。

治血癥疼痛。以瑞金散治之。

方 瑞金散

薑黃 一錢 牡丹皮 蓬朮 紅花 當歸

川芎 赤芍藥 桂心 玄胡索 各一錢

右咬咀。用水二鍾。酒一分。空心煎服。

治血癥心腹疼痛以牡丹皮之劑。

方牡丹皮散

牡丹皮

桂心

玄胡索

當歸

各一錢

蓬大

赤芍藥

牛膝

各二錢

荆三稜

一錢五分

右咬咀用水二分酒一分煎服。

治月經不通達臍寒疝其脉沉緊此由寒氣客於血室結積為

氣所衝以小溫經湯。

方小溫經湯

當歸

人參

川芎

牛膝

赤芍藥

牡丹皮

蓬木

各七分

官桂

甘草

各五分

右咬咀水煎熟食前溫服。

治月水不調腹中疝癖寒熱盜汗以人參荆芥散主之。

方見本草。

治疝氣疼痛。腹中如弦。筋脉勁急。以蟠葱散主之。

方見本卷

治下部癩氣。或奔上疼痛。以五苓散。加川練子木香茴香主之。

方見三卷內。

治疝癩疼痛。并上嘔吐。湯水不納。以五苓散治之。

方見三卷內

○胎前

夫胎孕者。父精母血。因感而會。精之施也。血能攝之。精成其子。此萬物資始於乾元也。血成其胞。此萬物資生於坤元也。數勝其血。則陽爲之主。受氣於左。子宮而爲男形。精不勝血。則陰爲之主。受氣於右。子宮而爲女形。陽施陰化。胎孕乃成。血氣虛損。不足榮養。其胎自墮。或勞怒傷情。內大便動。亦能墮胎。推原其本。皆因於熱火能消物。造化自然。病源乃謂風冷傷於子臟。而墮。此未得病情者也。東垣先生。令濃煎白朮湯。調黃芩末服者。

正此意也。因而思之。墮於內熱而虛者。於理為多。曰熱。曰虛。當分輕重。好生之士。幸毋輕視。經曰。陰搏陽別。謂之有子。既成胎。孕。又有難產者。往往見於鬱悶。安佚之人。富貴奉養之家。若貧賤辛苦者。無有也。保養者宜舒其氣。勿為妄動。若孕婦臨月。必預置熟炭。釀醋乾漆。備分娩之後。去血過多。氣并血逆。而上。必作昏憤。名曰血暈。當用乾漆投炭火中。烟起。以醋洒。放在產婦鼻邊熏之。其氣入內。血從而下。則得甦。兼服血竭等散。有未足月。自為跌撲。或誤服傷胎之藥。致墮之時。去血過多。過崩中。月水。或金瘡吐衄。等過極而暈者。此法亦良。凡妊娠有疾。非比無胎之人。誤觸無妨。臨症之際。留心慎焉。

○脉症並陳

脉經曰。婦人三部脉沉。以手按之。無絕者。孕子也。

脉滑疾重以手按之散者胎已三月也重手按之不散但疾而為滑者五月也妊娠四月脉左疾為男右疾為女俱疾為生二男又云右手沉實為男右手浮大為女右左俱沉實生二男左右俱浮大生二女又云婦人尺脉左偏大為男右偏大為女婦人懷妊離經而浮設腹痛引腰疼者欲生也。

凡婦人欲生者其脉離經半夜覺日中即生。

〔兩〕妊娠惡阻惡聞食氣痰逆嘔吐以半夏茯苓湯若因傷食嘔吐腐氣以枳縮二陳湯治之。方見二卷內。

〔方〕半夏茯苓湯

半夏

赤茯苓

各一錢五分

熟地黄

一錢 桔梗

白芍藥

川芎

各五分

旋覆花

橘紅

人參 各一錢

甘草 四分

生薑 五片

右咬咀水煎熟食前温服。

病 妊娠惡阻吐逆酸水惡聞食氣多臥少起以旋覆半夏湯。

方 旋覆半夏湯

旋覆花

人參

赤茯苓

當歸 各一錢 川芎

半夏

各八分

細辛

五分

乾生薑

甘草

各四分

橘皮

去白一錢五分

生薑

五片

右咬咀水煎熟食前服。

病 妊娠煩熱頭疼煩悶胎氣不安吐逆不食以安胎白朮散主

之。

方 安胎白朮散

白朮

橘紅

人參

各一錢

前胡

川芎

麥冬

赤茯苓各七分 甘草 半夏各五分

右咬咀用生薑五片竹茹一團水煎食前服。

病經候不行無病似病脉滑大而六脉俱勻或尺中不絕乃是孕婦之脉也精神如故惡聞食氣或但嗜一物或大吐或吐清水此名惡阻切勿作寒病治之以人參橘皮湯或保生湯主之。

方人參橘皮湯

人參 白木 麥門冬各一錢 橘皮一錢五分

甘草 厚朴各四分 竹茹一團

右咬咀用生薑五片水煎食前服。

方保生湯

人參 白木各一錢 甘草五分 橘紅一錢二分

香附子 烏藥

各七分

如惡心嘔吐加丁香

三分

右咬咀用生薑伍片水煎食遠溫服。

病妊娠寒熱頭疼嘔嘿不欲食脇下痛嘔逆痰氣以黃龍湯主

之 方見本卷前。

治胎氣不和嘔吐氣升以縮砂仁火焙為細末每服一錢紫蘇

湯或艾煎湯調不拘時服。

治妊娠心驚胆怯終日煩悶名曰子煩以竹葉湯

方竹葉湯

白茯苓 二錢 防風

麥門冬

黃芩 各一錢

石咬咀用竹葉十片水煎食遠溫服。

病胎氣不和奏上心服脹滿疼痛乃懷胎近上謂之子懸以紫

蘇飲治之。

方紫蘇飲

紫蘇 人參 陳皮 當歸 大腹皮

川芎 白芍藥 各一錢 甘草 一錢半炙

如氣逆胸膈不寬加縮砂仁七粒炒研碎

右咬咀用生薑五片葱白二莖水煎食前服

病妊娠臨月因發風瘧忽悶憤不識人事吐逆眩倒小醒復發

名曰子癇以葛根湯主之 方見五卷內

病妊娠中風頭項強直筋脉牽急言語蹇澁痰涎不消或時發

搐不省人事亦名子癇以羚羊角散治之

方羚羊角散

羚羊角 獨活 酸棗仁 五加皮 防風 當歸

川芎 茯神 各七分 杏仁 木香

甘草 各五分

薏苡仁 七分

右咬咀用生薑五片水煎食前服。

治胎動腹痛或漏胎以如聖湯主之。

方如聖湯

鯉魚皮

熟地黃

當歸

各一錢

阿膠

八分

白芍藥

六分

川芎

七分

續斷

五分

甘草

四分炙

苧麻根

少許

生薑

五片

右咬咀水煎熟食前溫服。

治胎漏經血妄行淋瀝不已以桑寄生湯主之。

方桑寄生湯

桑寄生

當歸

續斷

川芎

白朮

香附子

阿膠

茯神

人參

各八分

甘草 四分

右咬咀用生薑五片水煎熟食前服

治因什胎動不安腰腹疼痛以膠艾湯

方膠艾湯

當歸頭 一錢五分

川芎

白芍藥

熟地黃

黃芩 各一錢

阿膠

甘草

艾葉 各五分

治咬咀用生薑五片枣子一枚水煎空心服

治胎孕不安以芩朮湯主之下血不止加當歸頭

方芩朮湯

白朮 五錢

黃芩 五錢

右咬咀水煎熟食前服

病胎動不安或疼或見惡露或不夜或不見惡露以安胎飲治

之

方安胎飲

當歸 黃芩 白芍藥 川芎 各二錢 白朮 一錢

右件或為細末酒調方寸匕一日二服尤妙

治妊娠小便澁少遂成淋瀝以安榮散

方安榮散

麥門冬 通草 人參 各八分 滑石 炒六分

當歸 一錢 燈草心 甘草 各五分 細辛 四分

右咬咀水煎熟空心溫服

病妊娠胎水不利胸滿腹脹小便不通遍身浮腫或胎動腹中

以鯉魚湯主之

方鯉魚湯

白茯苓

當歸

白芍藥

白朮

各一錢五分

先用鯉魚尾破水淨同橘皮五分用生薑七片水三鍾煮汁

煎先藥空心服服後水去盡為度

〔病〕妊娠轉胞小便不通以舉氣湯服後拍探喉中吐出藥水

頃再飲再吐

〔方〕舉氣湯

當歸

川芎

橘皮

人參

白朮

各一錢

甘草

四分

熟地黃

半夏

各八分

白芍藥

七分

右咬咀水煎如前法服之

〔病〕妊娠有水氣身重小便不利洒淅惡寒起即頭眩以葵子茯苓散

葵子茯苓散

〔方〕葵子茯苓散

葵子 半升

茯苓 一兩五錢

右為細末。米飲食前調下方寸。一日三服。小便利則愈。不拘時服。

治轉胞小便不通。以八味丸主之。或使病人噴嚏。令氣升亦通。

方見四卷內。

治妊娠小便不禁。以桑螵蛸散主之。方見七卷內。

治妊娠面目虛浮。如水腫狀。以全生白朮散。

方全生白朮散

白朮

生薑皮

大腹皮

陳皮

茯苓皮

等分

右件共為末。每服食前服之。

治妊娠忪悸。睡裏多驚。以大如聖湯。

方大如聖湯

白茯苓

黃芪

各一錢五分

川芎

當歸

人參

麥門冬

各一錢

木香

甘草

各五分

右咬咀用生薑五片水煎食遠臨臥服。

治 妊娠風壅咳嗽喘滿痰多以百合散主之。

方 百合散

百合

紫苑

目母

白芍藥

前胡

赤茯

桔梗

各一錢

甘草

五分

右咬咀。生薑五片。水煎食遠服。

治 妊娠痢疾腹中疼痛。以當歸芍藥湯。

方 當歸芍藥湯

當歸

白芍藥

川芎

白茯苓

澤瀉

各一錢

白木

二錢

右吹咀水煎熟空心温服。

〔病〕妊婦平日苦於難產若氣實者耗其氣使和平預以瘦胎飲

服之若氣弱者臨產前以大達生散若分娩之際驚恐連日不下服之尤驗。

〔方〕瘦胎飲

甘草 炙七錢五分

枳殼 二兩五錢

右件製度為細末空心白湯調服二錢。

〔方〕大達生散

紫蘇 人參 陳皮 當歸 大腹皮

白芍藥 川芎 各一錢 甘草 炙七五分

右改咀生薑五片葱白二莖水煎食前服。

〔病〕難產者以催生丹或葵子散或用草麻子十四粒去殼研爛

貼脚心得分娩就去勿遲。

方催生丹

乳香 二錢五分 母丁香 一錢 麝香 二分五厘

右方須臘月修合前藥各另為末和勻用兔腦髓去膜研細為丸如芡實大每臨分娩胞水破後用溫肺湯吞下一丸立產。

方葵子散

葵子 七十粒

右件如法修製研為細末用無灰酒調服。

病孕婦欲產時遇腹疼不肯舒伸行動多曲腰眠臥恐痛其兒

在腹中不得轉動故腳先出謂之逆生須臾不救以烏蛇

退一條蟬退十四箇胎髮一箇各燒灰為末酒調併進二

服。仰臥霎時卽順生。如無前藥用槐子二七粒。并花水吞下。亦無槐子。用綉針於兒脚心刺三次五次。急用鹽少許塗之。卽時順生。

〔治〕難產。以馬枳擲一枚。煎湯送下。男左女右。以手持出。產有苦於難產。不欲育。以貝母絕經湯。產後三朝服之。

〔方〕貝母絕經湯

貝母

當歸鬚

紅花

猪牙皂角

黑豈

虎杖

各等分

右咬咀水煎熟。產後服。

〔病〕妊娠九月而瘖。乃足少陰脉。養胎約氣斷。則瘖不能言。其胞絡繫於腎。少陰之脉貫腎。繫舌本。故也。無治當十月復。

〔治〕妊娠吐衄血。以必勝散主之。

散主之。

方見五卷內。

○產後

初產之婦。血氣雖虛。好血未必虧。汚血未必積。臟腑未必傷。何以藥爲飲食。起居勤加調護。何病之有。倘或病作。當求病起。何因。病在何經。氣病治氣。血病治血。寒者溫之。熱者清之。凝者行之。虛者補之。血多者止之。或因飲食所傷。只宜健脾。使其運化。毋得妄行消克。或染傷寒。只宜和解。禁行三法。其諸魚肉鷄子。肥滑湯品。宜當却去。以此石首。鱖。淡煮。與之助粥。仍避風寒。彼富貴之家。驕恣之婦。卒有白帶頭風。氣痛膈滿。痰逆口乾。經水不調。髮脫體熱。皆是陽盛陰虛之病。天生血氣。本自和平。曰勝曰虛。豈非自故之耶。

○麻症捷言

產後氣血兩虧。宜細小則吉。洪數實大則凶。

治產後血暈昏迷不醒衝心悶絕以獨行散溫酒調灌入喉即愈。

方獨行散

五靈脂 二錢半生炒為細末溫酒調下。

一方加荆芥穗等分為末童便調下。

病產後血暈血入心經語顛倒健忘失志產後百病以血竭散於分娩時用酒和童便調下其惡血皆自下行更不得衝上。

方血竭散

血竭 沒藥 各等分

右件如法共為細末每服一錢童便和酒煎兩三沸調下為愈。

治產後血暈昏不知人更以乾漆燒烟醋酒鼻中熏之須置醋炭在傍不絕次以清鬼散主之。

方清鬼散

澤蘭葉

五錢

人參

五錢

荆芥穗

一兩

甘草

四錢

川芎

一兩

右件共為細末熟湯溫酒和勻調灌二三錢不拘時服。

病生產或半產漏下昏冒不醒瞑目無所知覺此皆血暴亡所致以全生活血湯。

方全生活血湯

紅花

一分

蔓荊子

細辛

各二分

生地黃

夏月多加

熟地黃

各一分

藁木

川芎

各五分

防風

羌活

甘草

灸

柴胡

當歸身

白芍藥

葛根

升麻 各一錢

右改咀。水煎熟。食前溫服。

治產後一切諸疾。總方分。媿以四味散主之。

方四味散

當歸 五分 心膈煩倍之

玄胡索 五分 如氣悶倍之

血竭 惡露不快倍之

沒藥 五分 心腹撮痛倍之

右各另研為細末。用童便一盞煎至六分。通口服。

治產後惡露不盡。胎衣不下。血氣攻心。以黑神散主之。方見七卷內。

病形弱。婦人產後乍寒乍熱。或有惡露不盡。停滯胞絡。亦能令

人寒熱。但小腹急癭。以參薑四物湯。

方參薑四物湯

川芎 人參 各一錢五分 乾薑 八分 白芍藥 一錢

當歸 一錢五分

甘草 五分

右咬咀用生薑五片水煎空心服。

治產後傷風熱入胞宮寒熱如瘧嘔逆不已以黃龍湯主之若

泄瀉泄去黃芩倍白朮

方見本卷前

治產後惡露方來忽然斷絕續發寒熱以柴胡地黃湯主之

內。三卷

治產後去血過多暈倒不醒一切去血以芎歸湯

方芎歸湯

川芎

當歸 各等分

右咬咀水和童便煎食前服。

治墮胎或產後惡血上攻已死者以欬金灰散灌下立醒。

方欬金灰散

鬱金 五錢

右件燒灰存性為末。每服二錢。米醋一呷調立甦。

〔病〕產後敗血停積五臟。流入四肢。令人浮腫。不可作水氣治之。但調經血。浮腫自消。以調經散主之。若去血過多。心虛易驚。加龍腦少許。

〔方〕調經散

沒藥

肉桂

琥珀

細辛

麝香

各五分

赤芍藥

當歸

各一兩

甘草

炙一錢

右為細末。每服二錢。生薑汁酒任便調下。

〔治〕產後血氣停于脾胃。腹脇滿悶。嘔逆惡心。以抵聖湯。

〔方〕抵聖湯

赤芍藥

半夏

澤蘭葉

人參

各一錢

甘草

炙五分

橘紅 一錢一分

右咬咀用生薑七片水煎食遠服。

治產後血入肺經面黑發喘欲死以人參蘇木散主之。

方人參蘇木散

人參 一兩

蘇木 二兩

右將人參為細末將蘇木煎湯去滓調參末不拘時服。

病產後虛弱不止少氣脚弱眼昏頭眩飲食無味以熟地黃湯

治之。

方熟地黃湯

熟地黃

人參

糯米

各一錢五分

甘草

炙五分

麥門冬

天花粉

各一錢

棗子

三枚

右咬咀用生薑五片水煎食前服。

〔病〕產後因虛以致敗血停閉心竅神志不能明了。蓋舌乃心之本。心氣閉塞。舌亦強矣。故今不語。以七珍散主之。方見五卷內。

〔治〕產後虛寒腹疼泄瀉四肢厥冷以理中湯。方見三卷內。或理

〔方〕理中丸

白朮

乾薑炮

人參

甘草

炙各等分

右件依法製度為細末和勻煉丸如大彈丸每服一丸食

前沸湯化下兼治新產內虛及冷虛人多吐

〔病〕產後感冒盛邪時發寒熱盛腹脇疼痛嘔吐以柴胡四物湯

主之泄瀉去黃芩加白朮茯苓嘔吐加橘紅生薑汁。方見本卷

前收

〔病〕產後蓐勞蓋緣生產日深久坐多語運動用力遂致頭目四

肢疼痛。寒熱如瘧。自汗。以白茯苓散主之。

〔方〕白茯苓散

白茯苓

一錢五分

當歸

川芎

桂心

黃芪

白芍藥

人參

熟地黄

各一錢

棗子

二枚

右咬咀。用生薑三片。用猪腎一對。細切洗淨。去筋膜。先同薑

煮水三鍾。煎一半。去此三件。入藥煎八分。空心服。

〔病〕

產後大便不通。乃亡血津少所致。若氣實者。以潤腸湯。

方見三卷

欵止可蜜導。或猪胆法。不宜通利。

二方俱見七卷內

〔治〕產後小便不通。以歸苓散主之。

〔方〕歸苓散

當歸

茯苓

芍藥

生甘草稍

木通

陳皮

白朮

燈心

各等分

右咬咀。水煎熟。食前溫服。

〔治〕產後兒腸不收。以枳殼二兩煎湯溫浸良久則入。

〔治〕產後子宮不收。以三物湯薰洗即入。

〔方〕三物湯

荊芥

藿香

臭椿皮

各等分

右咬咀煎湯薰洗子宮則入。

〔治〕死胎不下。以香桂散或芎歸湯水酒煎服。

方見本卷前。

〔方〕香桂散

麝香

當門子一錢

官桂

三錢

右件各另研為細末。作一服溫酒調下。

〔病〕胎衣不下。惡血湊心。其症心頭迷悶。胎衣上逆衝心。須臾不

救。以大附子一枚炮去皮臍乾漆炒為末。五錢用大黃末

五錢酒醋熬乾。卽入前末爲丸。如桐子大。每服三丸吞下。須臾連進二服。如無前藥用赤小豆一升。炒過水三升。煮二升取汗溫服。亦無豈用婦人自己手足指甲燒灰酒調。須臾又進一服。令婦人抱起將竹筒於心上趕下。

〔治〕產後勞力自盜二汗不止。俱以四物湯加黃芪人參。方見三卷內。

〔治〕肥衣不下。以牛膝主之。

〔治〕產後下痢赤白。腹中疼痛。以胃風湯主之。方見四卷內。

〔病〕產後因氣或得寒物。惡血不行凝滯。成脹如鼓。時覺疼痛。以散血消脹湯主之。方見六卷內。

〔治〕惡血去多。或血虛成腫。腹滿喘促。以當歸散主之。方見六卷內。

〔治〕產後內虛煩熱短氣。以甘竹茹湯主之。

〔方〕甘竹茹湯

甘竹茹 一錢五分

白茯苓

人參 各一錢

甘草 五分 黃芩 八分

右咬咀水二鍾煎一鍾食前溫服。

治產後虛煩及心虛驚悸以人參門冬湯主之。方見五卷內。

治產後兒枕痛惡露不行臍腹疼痛以沒藥散主之。方見本卷前。

治損胎瘀血停留小腹急痛以大溫經湯。此方見本卷前。

治產後惡露不盡臍腹疼痛以當歸鬚散主之。方見六卷內。

病產後寒熱頭痛不可便作外感施治先審其乳房脹痛必乳

汁欲行以通草湯若乳無病間其惡血去少腹中必痛此

瘀血作也以當歸鬚散。方見六卷內。又非敗血必產育勞苦或

去血過多而然以白茯苓散。方見本卷前。審無是者或起床

日早梳沐勞役而作以補中益氣湯。方見三卷內。又非勞役或

因飲食所傷。必心胸飽脹。以枳縮二陳。

方見二卷中。又

非飲食。敢是偶冒風寒。方以柴胡桂枝湯加川芎主之。

〔治〕產後惡露不通。心荒昏沉。寒熱交攻。

〔方〕通瘀飲

當歸尾

三錢

大黃

三錢

白朮

一錢

木通

一錢

紅花

五分

右水一碗。用酒一小盞。煎三滾。用桃仁三十箇。搗爛。再煎二

滾。去渣。溫服。

〔病〕產後左脇脹悶。一塊臥。不敢着床。

〔方〕養血佐肝丸

當歸

酒洗

川芎

白芍

酒洗

陳皮

去白

白朮

半夏

香油炒

青皮

油炒

神麴

炒

萊菔子

炒

牡丹皮

紅花

各一兩

香附

醋炒

柴胡

酒炒

龍膽草

酒洗六錢

桃仁

八錢去皮尖

三棱

莪朮

各五錢醋炒

白茯苓

一兩

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服百丸白湯送下

○雜用可法

〔治〕膈氣上壅久嗽不寧用此燒梨之法極妙。

〔方〕燒梨法

水梨

一枚去心用白鹽一錢研細入水梨中

右用綿紙九重包裹煨梨熟徐徐常食極能潤腸下氣

〔治〕一切癰腫不散用此圍法能使患處潰之

〔方〕圍法

赤小豆為細末用井水調敷瘡腫四圍乾則易之再敷良

久自愈

〔治〕一切痰喘及中痰不語。或小兒悞食鹹物成齆。氣喘乳食不

進。俱用此法亦良。

〔方〕吊痰法

甜瓜蒂 七枚

右件為細末。用涼水一茶匙調澄清。取汁一呷。吐痰涎。若翻

狀。則胸次頓覺。齆喘亦定。待再作。又行。

〔治〕小兒驚風等症。并皆治之。

〔方〕蝎梢餅子

蝎梢 去毒

乳香

白花蛇 肉

辰砂

南星

牛胆釀

僵蚕

各五錢

蜈蚣

一條全足者

麝香

三錢

右件依法製度為細末。酒煮麵糊為丸。如芡實大。捏作餅子。

人參湯。若氣實。薄荷湯。或金銀煎湯。每服一餅。化開。食遠。

服一歲以下半餅。

治魚刺鯁喉及心氣疼痛並治

獺肝餌法

獺肝一具

右伴陰乾為末。每服方寸。白湯調服。○或取獺爪為末。酒調

熱服。

治腎虛百損。並皆治之。

方製猪腎子

猪腎子一對

右去脂膜洗淨。用童子小便二盞。無灰酒一盞。入新器貯之。

以泥封固器口。日初慢火養熟。火至中夜止。至五更再濕

發瓶取腎食之。原汁送下。

凡人體弱氣弱用此煮鰻之法亦能生精養胃建脾補中。

〔方〕煮鰻法

鰻魚

用鮮活者不拘多少

右件去腸雜垢物洗淨用椒薑葱煮糜爛入淡酒好醋鹽各少許調和甘美常食些須不可多食過多恐為發瀉。

〔方〕淹滯之眼不能治之書云久則有蟲故用此法。

〔方〕覆盆子汁取蟲法

覆盆葉

不拘多少

右件取青新者嚼碎取汁將皂紗矇眼以筆畫兩眸於紗上然後以汁滴眼下緣轉盼間蟲從紗中出形細如絲失治長久孳生不已如無青者用乾者為末小兒所食之乳汁浸約人行十里許點於眼中仰臥不過數日即瘥。

〔治〕眼目不明用羊膽以療之。

〔方〕羊膽點法

羯羊膽一枚去脂膜用好蜜一匙拌勻填原胆中蒸之候乾研細為膏以銀匙挑少許常點之。

〔治〕行路人突然昏暈在地不省人事急以後方治之。

〔方〕蒜上法

大蒜一握

右件用道上熟土相和搗爛新汲水和研濾去渣決開齒灌之則甦。

〔治〕解諸蟲蛇毒故用長松餌之法

〔方〕長松根餌法

蓋長松根皮色似薺芘長三五寸味微苦狀類如人參清

香可愛無毒生於古松下。食之毛髮復生言貌如故此物并代州之人多雜甘草中得乾煎湯飲之亦可。

治一切惡毒其効莫如此法。

方祛毒法

香白芷

右件爲細末濃煎麥冬湯調服其黃水羶穢從口出則愈。或於蛇齧處灸之引去毒氣。

治諸毒初起用此法令毒氣潰之。

方隔蒜灸法

背瘡初覺欲結未結赤熱腫痛先以濕紙覆腫上視其紙先乾處則是結聚毒頭取大蒜切片如當三錢厚安在腫頭上艾炷灸之三壯卽換一片痛灸至痒痒灸至痛則止。

早灸為上。

〔治〕久嗽不止方用此法。

〔方〕咳逆灸法

乳下一指許。正與乳相直骨間陷中。若婦人屈乳頭齊處是穴。炷如小菝大灸三壯。男左女右。但火到肌則瘥。

〔治〕齒癰消縮法

土地黃 取汁一茶匙

右用猪牙皂角數枚。火上炙熱。蘸地黃汁。再灸再蘸。令汁盡為度。晒乾為末。敷上即縮。

〔治〕患牙疼用此灸法

右將肩尖上微近後骨縫中。少舉臂取之。當骨解陷中。左疼灸左。右疼灸右。五壯灸畢。以痛良久乃定。求不再發。

〔治〕臭刺灸法

項後髮際兩筋間宛中灸三壯立止蓋血自此入腦注鼻中出也

〔治〕婦人難產用此難產灸法

以孕婦右脚小指尖頭上艾注如大麥灸三壯火畢立產

〔治〕金刃血出不止法

右用真血竭研細乾敷或降真香碗鎌刮下后器研細乾敷亦妙勿犯鐵器

〔治〕詳內傷何物法

傷米穀 神麵水

傷肉 阿魏草菓

傷魚鱗 紫蘇生薑橘皮

傷瓜菜 桂心丁香

傷水 枳壳白朮

傷寒物 乾薑欲行巴豆

傷熱物 黃連欲行大黃

〔治〕胃中米穀不納。用此安胃之法。

橘紅 二兩

甘草 炙

食鹽 炒各五錢

右件為細末。白湯不時調服。以代茶湯。

〔治〕一切瘡腫。已穿未穿者。將此消腫之法施之。

阿膠 一兩

右用水半碗煎令消鑿。後下緋丹一兩。慢火再熬數沸。攪勻。

俟五沸乃攤令冷。用磁器收貯。如用掃塗四圍。而露其中。

心如未成瘡。止是紅腫。則遍塗其處。良久自消。切勿犯手。

慎之。

〔治〕懸癰。必以甘草酒神效。

甘草 大者一兩。用橫紋者。截長三寸。

右件取山澗東流水一大盞。以甘草蘸水。文武火上慢炙。不

不可性急須用三時久而水盡為度。劈視甘草但水中澀。然後為透以無灰好酒二碗煎至一碗作一次空心服。查再煎又服三口服一帖已破者難治其患在穀道前外腎之間初發甚痒狀如松子漸如蓮肉月久如核桃加以赤腫若破六小便從此出不可治也須是澗水若井水河水無力。

治女人陰戶癰用此陰腫之法消之。

枳殼

用

右件用半斤切碎炒熱熱帛烘熱裹熨冷則易之神効。

治大小便秘結以臍下貼法。

大田螺

二枚

食塩

一茶匙

右件和搗碎貼病者臍下一寸三分用軟帛緊繫之若然暴

通。

〔治〕筋或傷斷用此續筋之法。

旋覆根 不拘多少

右研校汁取筋相對以汁塗而封之即相復續如故。

〔治〕下腸癰法

但腸中痛不可忍而大便從小便中出切其脉孔知是腸癰以雲母膏丸如棗豈大以濃黃芪湯服六七十丸下膿血數升而愈。

〔治〕漏中蟲法

右用活鱸一條擲鱸在地鱸困屈盤就其盤以竹釘五七枚釘貫之覆蒼良久以鱸入水中覺蠕動必有如線細之蟲有否再覆如是者六七易後用乾艾煎湯投白礬二三錢

洗瘡淨以黃連檳榔各等分極細末乾敷月餘方愈

治傷指甲法

右將新採葱塘灰中煨熟剝皮劈開其間有淚取罈頂處數
易則效

治胎不寧用以寧胎之法

右用鼠窟前畚土研細為末每服二錢用麝香泡湯調服

引箭鏃法

凡人被箭入胸喉及肉不能出以螻蛄搗汁頻頻滴上以
出為度若針入肉此法亦良

左祛熱法

遍體生熱毒瘡粘着衣被痛不可忍以石菖蒲晒乾為末
三斗布席上使患者恣臥其間五七日其疾如失

治臍下連二陰生濕瘡遍滿痒熱而痛大小便澁出黃汁身面微腫此中下二焦蓄積風熱毒氣是也用後法

方收毒法

右用馬齒莧四兩研爛極細入青黛一兩研勻塗瘡上時久

藥燥再塗如此半月而安內服八正散數帖分散客熱

治跌撲打傷瘀血不散積聚用後法

方散血法

右用韭菜搗汁令漸呷服之約盡五斤而散

新刻太醫院發刻醫家必究杏苑生春卷之八終

[General Information]

书名=杏苑生春 三十四

作者=

页数=52

SS号=12764181

出版日期=