

段田壘 元戎


五之六



庫文閣内
漢

| | |
|------|---------|
| 内閣文庫 | |
| 番號 | 漢 12422 |
| 冊數 | 6 (3) |
| 函號 | 300 215 |





醫聖元戎卷第五

少陽證

海藏論男子煩人傷寒同一法

仲景小柴胡湯 易簡小柴胡湯

逍遙散 易簡逍遙散

錢氏地骨皮散 文潞公藥準注李琬方

四順飲子 柴胡桂枝乾姜湯

大柴胡湯 深師黃芩湯

易簡參蘇飲 易簡溫膽湯

易簡降氣湯 許學士地黃丸



金匱大薯蕷丸

外臺秘要仲景病源小品方

龍腦雞蘓丸

黃耆膏子煎丸

地骨皮枳殼散

黃龍湯

柴胡蠶申散

王氏秦光散

生犀散

治人妊婦傷寒加減例

不老丹例

不老丹歌

又方

又方
遂凡丹

治瘰癧方

消瘰癧丸

治瘤氣瘰起

五香連翹湯

治瘰癧鷺鷥丸

孫尚藥方

青蒿散

鱉甲煎丸

白虎加桂枝湯

蜀漆散

牡蠣湯

小柴胡去半隻加枳萸湯

柴胡桂薑湯

九轉靈砂丹

又方

海藏瘰癧論

通脈四逆湯

小柴胡湯議論

舌胎滑例

三焦燻用藥大例

卷第六

三陽拾遺例

海藏通聖散評議

韓氏微旨論和解因時法

調脉湯

葛根柴胡湯

人參桔梗湯

薄荷湯

防風湯

香芎湯

六物麻黃湯

七物柴胡湯

發表湯

人參湯

石羔湯

解肌湯

芍藥湯

知母湯

韓氏十四葉定經

仲景瓜蒂散例

仲景瓜蒂散

宋氏仲景鈐法嗜菜瓜蒂散

勝金丸

瓜蒂散

三聖丸散

經驗方

外臺射後方

又方

又方

仲景治百合例

百合知母湯

百合雞子湯

百合地黄湯

百合栝蒌牡蠣湯

病源小品養性湯

陽且湯

牙齒例

陳希夷神仙制牙菜廣射香間王散

千金羽異五苓散

犀角升麻湯

升麻丸

又方升麻散

治齒根宜露動搖方 治牙齒脫落不牢方

簡要方

草撥散

立効散

返老還童丹

古今巴豆例

仲景備急丸

梧桐淚散

白牙齒菜

三聖散

治牙齒脫落不牢方

二十八宿散

擦牙菜

益神散

仲景白散

仲景飛尸走馬湯方
黑神丸

狀元丸
酒癥丸

神應丸
青娥丸

紅粉丸
解毒雄黃丸

玉霜丸
活人黑神丸

錢氏紫霜丸
感應丸

神應丸
局方感應丸

簡易感應丸
五脂丸

木香五靈脂丸
三倍丸

解毒丸
軟紅丸

比金丸
青娥丸

尋金丸
導氣丸

安中丸
透蘿丸

溫白丸
易老活五積

萬病感應丸
萬病紫苑丸

耆婆萬應丸
小麋射香丸

神保丸

全注

醫壘元戎第卷五

趙州教授兼提舉管内學王好古進之笈次

少陽證 先是經從湯液 次午經從雜例

海藏論男子婦人傷寒同一方

活人云婦人傷寒治法與男子不同舉男子調

氣女子調血以為大畧舉取緊脉緩脉洪為傷

寒傷爪契病為一證當行當下不必調血而

後行仲景不分男女良以此與此論然當猶

為未也仲景歌聖也世醫所知仲景大知有

是理乎聖人初物賢者述之事可以為天下利

聖人已先壞之矣何待世人明之乎聖人不
害以其男子同診也後人不如湯液之源故
主為婦人法則異於男子常人可易聰明眼
者青以此為是乎然以芣考之則可知也假
令桂枝芍藥固榮芍藥衛非血芣如何麻黃
防風雖為之矣行本治孔子餘疾也血芣如
何白虎小柴胡中知母則治腎柴胡則調經
皆氣中之血芣也當歸地黃不言可知為血
芣白木人參皆以為氣劑本草言能利脾胃
間血芣水芣芣大抵用之在陽便是氣芣用

之在陰便是血芣若男子與女人傷寒皆榮
衛受病其證一也何必云男先調調氣女先調
血也地二白雲岐子以為治雜病法之常體
非為傷寒設也其所以異者以其任衝盛而
有子月事行有非有熱入血室一證不得不
異也在妊孕不得不保有經血不得不調表
裏行下何嘗有異也無汗下芣中增損自有
調保之儀活人云妊娠不用桂枝芍藥夏桃仁
柴胡湯減芍藥更為黃龍湯是則是矣必竟畜
血極而隣於死須抵當湯丸則安得不用也

是減劑從輕可也。故黃帝云身重毒之何如
岐伯曰有故無損亦無損也大積大聚可輕
犯也裏其大半乃止過者死此所以有從輕
之義活人注中舉以似其書甚當仲景不言
子婦人有異其意蓋由諸此以知桂枝半夏
桃仁可用處必用不可全無但當從輕別可
以保安凡中有桂枝附生膝皆隨胎之劑以其
數多之中些少是亦從輕而無妨也又為引
用必須少而不可無已大意如此後之君子
更宜詳定保劑多破劑少破者從其保破劑

多安劑少安者從其破此理不可不知又
寒熱多少例寒者多熱者少熱不為之熱熱
者多寒者少寒不為之寒

此婦人之病多有經血不調故婦人傷寒一
條例少陽條下

仲景小柴胡傷

治往來寒熱胸脘痛而耳聾或咳或嘔尺寸
脈俱浮而弦

柴胡 三兩 人參 半夏 黃芩 甘草
右以咀生薑棗煎本經加減之法 此方亦

治瘧與雜病中外不相 雜病寒熱往來
經水不調加秦芫芍藥當歸知母地骨皮牡
丹皮川芎白朮茯苓去半夏 治婦人虛勞
發熱加拾蚘赤茯苓 小柴胡湯與四物湯
各半一名調經湯 無孕嘔者加半夏亦可
無汗者加柴胡 惡寒者加桂 有汗者加
地骨皮 嗽者加紫苑 通經加三稜廣茂
勞者加鱉甲
又小柴胡後加法 若胸中煩不吐者去半夏
人參加胎萸實二枚若渴者去半夏加人

參合前成四兩半括萸根四兩 若腹中痛
者去黃芩加芍藥三兩 若脇下痞鞭者去
大棗加牡蛎四兩 若心下悸小便不利去
黃芩加茯苓四兩 若不渴外有微熱去人
參加桂三兩溫覆取微汗愈 若嗽去人參
大棗生姜加五味子半兩乾姜二兩 血弱
氣盡騰理間邪氣因入與正氣相搏結於腹
下正邪分爭往來寒熱發作有時默然不欲
飲食臟腑相連其痛少下邪高痛下故使嘔
也小柴胡湯主之

易簡小柴胡湯

治傷寒溫病身熱惡爪頭項強胸滿脹痛煩
湯嘔減小便不利大便秘鞭或過經未解潮熱
不除兆汗兆下之調並宜服之及產後勞復
發熱頭疼往來寒熱及婦人傷寒經水適來
通斷發熱發寒晝則明夜則謔語此為挾下
入血室刻血必結故使寒熱如瘧狀此藥主
之小兒溫熱悉能治療

柴胡 二兩 半夏 黃芩 人參 甘草 各二兩

右以咀每服五錢水鐘半生薑五片棗一枚

煎至分去滓食前服若腹痛去黃芩加芍
藥半兩 心悸去黃芩加茯苓一兩 若不
渴外有熱者去人參加桂三分溫服合有汗
則解 若咳嗽去棗加五味子三分乾姜半
兩 胸中煩而嘔者去半夏人參加枳椇實
半兩 渴者去半夏加栝蒌根一兩 胸中
痞鞅者加煨了牡蛎一兩 傷寒十三日不
解胸脇滿而嘔者脯則發熱已微利醫以丸
茶利之非其治也宜加芒硝一兩 傷寒十
余日結熱在裏往來寒熱或心下急藪々微

煩或口生白胎大便不通或發熱汗出或膈
中滿痛或日晡發熱如瘧或六七日目中不
子了暗不和無裏証大便難身發熱者實也
去人參加枳實大黃一兩名大柴胡湯服之
以利為度熱除不亘處用補藥仍忌羊肉腰
子并酒難化之物或有取傷是名食復難以
治療切宜忌之

逍遙散主治修製並見局方

柴胡 二兩 當歸 芍藥 白朮 茯苓
甘草 各兩 薄荷 少許

右咬咀生薑煎服 勿謂云治婦人大人小
兒男女同法

易簡逍遙散

治血虛勞倦伍心煩熱肢體疼痛頭目昏重
心松頰赤口燥咽乾發熱盜汗減食嗜臥及
血熱相搏月水不調潮腹脹痛寒熱如瘧又
療室女采衛不和痰嗽潮熱肌躄羸瘦漸成
骨蒸

白茯苓 白朮 當歸 白芍藥
柴胡 各一兩 甘草 半兩

右以咀每服四錢水一鐘煨生薑一塊切片煎至六分去滓熱服每時一方名人參飲治婦人血熱虛勞骨蒸兼治邪客於經絡、肌熱痰嗽五心煩燥頭目昏疼夜多盜汗補正氣解勞倦用人參白朮茯苓柴胡半夏當歸赤芍藥乾葛甘草黃芩各等分以咀每服四錢水鐘半生薑四片束二枚煎至六分不拘時服應有勞熱證者皆可服之熱退即止但婦人寒熱亦因有經血結閉者致令五心煩熱及骨節間熱或作虛勞之反以為害

積日既久乃成真病法當行其經血若月事以時自然平治或以局方大聖散用紅花煎酒調服不能飲者以醋代之仍以紅丸子醋湯蒸下此二藥大治經事不調或腹有血塊若久無子息服之數月其效特異非可數服責無其功或因下血過多為寒熱當用當歸地黃之類如大建中藥令養勞雙和葷是也然有痰飲停積之人則難用此蓋當歸地黃與痰飲不得其宜及傷胃氣因是不進飲食遂成真病至於不救者多矣痰飲

中積致生寒熱者宜以二陳湯參蘓飲等藥
療之應手其效 更是有服退熱冷茶大過
因而咳嗽下利寒熱自汗皆不可用之惟真
武湯增損名因湯湯仍以震靈丹服之病輕
者可療重者當別求治法

錢氏地骨散

秦艽 鱉甲 柴胡 甘草湯

秦艽 青蒿 烏梅 甘草湯

文潞公茶准注李琬方

柴胡 連翹 山梔子 防風 甘草

治人連翹 梔子 防風 甘草湯 連翹 飲子

四順 飲子 一名清涼 飲子 治夜則在血熱而

不厥 加荆芥 白朮 麻黃 為洗心散

守真柴胡 飲子 治便艱 氣血各半 柴胡 煮散

錢氏 黍粘子 荆芥 防風 甘草湯

局方 消毒散 減防風 餘三味

舉鄉 舉敗散 治婦人產後傷寒 凡瘧角 張

柴胡 桂枝湯 小柴胡湯 加桂枝芍藥是也

柴胡 桂枝 乾姜湯

柴胡 黃芩 甘草 枳實 根 桂枝

乾姜 牡蛎

柴胡龍骨牡蛎湯 小柴胡湯去甘草加鉉丹

桂枝龍骨牡蛎茯苓大黃

小柴胡加芒硝湯

治十三日過經不解大祗須看少湯證不退

而臟結宜用小柴胡加桂湯治瘧疾兼文結

大柴胡湯 主治數條並見本經并活人某證

柴胡 黃芩 半夏 生姜 大麥

芍藥 枳實 大黃

活人拳伊尹湯液大柴胡湯八味今監本無黃

芩脫落之也

潔古老人云治表證仍在裡證已急不如此不

可用小柴胡去參草加枳實大黃如緩治不

減人參甘草

澤師黃芩湯

治傷寒六七日發汗不解嘔逆不利小便不

利胸服痞滿微熱而煩

茯苓 四錢 柴胡 半夏 各八錢 桂心

黃芩 各三錢

右以咀生姜水煎服

易簡參蘓飲

治感冒發熱頭疼或因痰飲凝積發以為熱
並互服之若感冒發熱亦如服養胃湯法以
被蓋卧連進數服微汗即愈尚有餘熱更互
徐々飲食服之自然平治因痰飲發熱性連
日頻進數服以熱退為期不可預止雖有前
胡乾甚但能解肌耳既以枳殼橘紅葶自能
實中快曠不致傷脾兼大治中晚痞悶嘔逆
惡心胸胃進食無以喻此母以性涼為疑一
切發熱皆能作効不必拘期前因也小兒室

女充互服耳

- 前胡 加三 橘紅 紫蘓 乾葛 半夏
- 茯苓 枳殼 陳皮 甘草 桔梗
- 木香 各半兩

右以咀每服四錢水一鍾半生薑七片棗一
故煎至六分去滓不拘時候服素有痰飲者
俟熱退以二陳湯或六君子湯間服 本方
治痰飲停積中脘因寒眩暈嘈煩燥悸嘔逆
及痰氣中人停留胸膈午脚躄曳口眼喎斜
半身不遂食已即嘔頭疼發熱狀如傷寒者

悉主之一方用此菜三兩加四物二兩合和
名茯苓補心湯大治男子婦人虛勞發熱或
五心煩熱逆治吐血衄血便血并婦人下血
過多致虛熱者並得其互 亦有用心過度
發熱者用之亦有神效往來寒熱尤宜治之

易間溫膽湯

治大病後虛煩不得睡兼治心膽虛怯觸事
易驚或夢寐不祥或異象眩惑遂致心驚膽
怯氣鬱生涎、与气疇變生諸證短气悸之
或復自汗或四枝浮腫飲食無味心虛煩悶

坐卧不安未安能主之

半夏一兩 枳實二兩 橘紅二兩半

甘草四錢 茯苓二錢 一、二、三、四

右以咀每服四錢水一鍾半生姜七片香一
枚竹茹一塊如錢大煎至六分去滓食前熱
服竹茹即刮竹青也大治傷寒後虛煩 若
傷寒後尚有餘熱并熱在上焦兼汗下後表
裡俱虛不可攻者宜用人參竹葉湯下利者於
竹葉湯中去石羔加熱附名既濟湯 嘔者
二陳湯一法治傷寒壞證時或發熱消渴煩

躁用新羅參不均多少煎湯浸冷令水令候盛
渴之時與之頓服熱則隨去矣大抵傷寒渴
者不可多與水々多積胸中便為結胃矣然
亦濡沫之可也 傷寒之後有吃逆者此證
最危其他證有此亦然當用半夏一兩生薑
半兩白水煎服 一方用丁香十粒柿蒂十
五枚煎湯半鐘葉葉墊無時頓服

易簡降氣湯

治虛陽上攻氣滯不快上盛下虛膈塞痰冥
咽乾不利咳嗽中滿喘急氣粗但膈膈膨脹滿

胸虛煩微渴引飲頭目眩腰痛脚氣四肢
倦怠此茶專治脚氣上攻中滿喘急下元虛
冷服補茶不効者立効

前胡 厚朴 甘草 當歸 各一兩
肉桂 陳皮 各三兩 半夏 五兩

右以咀七味并紫蘊子五兩綠難得真者不
治用紫蘊如前胡之數代之共為八味每服
四錢非一鐘半生薑五片生一枚煎至七分
去粗食後服 凡人中爪中氣腫滿及脚氣
等患多是虛氣上攻胸膈不快不進飲食此

茶大能降氣真命山人降氣湯後加參附五
味大服皮之類却非其真 若素脚氣只是
上氣喘急不得卧者宜用橘皮紫蘊人參五
味子桔梗各等分名神秘湯甚用此謂鐘乳
粉下養正丹 脚氣入腹大便秘不任冷茶
者宜用養正丹以溫利之 一方以八味丸
加川芎細辛桔梗茯苓共十一味名大降氣
湯治法一同若尊年人虛氣上壅當間以生
附加生姜煎倍熟磨以沈香服之尤為穩當
許學士地黃丸此方當在大薯蕷後

生薑二兩 秦艸九

黃芩

柴胡

芍藥

各半兩

右細末蜜為丸烏梅湯下三十九丸無明日二

服學士云楮澄治寡婦僧尼室女別得其法
診其脉左平手獨出寸口過臍際乃知女子
思男而不可得也 或云寡婦師尼不可言
僧字然為當以經勞之二陽病發心脾不得
隱曲故女子不月此一條本為女子而言王
准內復云男子少精是經言女而註言男皆
勞也言僧字亦兼男之義 倉公傳濟北
王侍人女病腰膝疼熱倉公曰病得之欲男

不可得何以知之診其脉弦出寸口是知之
婦人以血為本血盛所以思男褚澄云僧
尼則異於婁妾學士改僧字為師字甚當經
云女子不月條下主註云男子少精兼之意
也又知僧字兼男之義易老云仲景治婦
人經不調盡在小柴胡調治條下以此推之
活人梔子烏梅甘草黃芩柴胡湯
治懊懷煩躁不得眠

右五味粗末生姜水煎加竹葉鹽豉三十粒
仲景治少陰心悸不致水火調其中而治本也

仲景云少陰證四逆條下言或咳嗽或悸自
或便是假令一證並不是上下一條通為一證
也或悸而反舉之言姑以四逆散主之若呆
四逆必不用於此也何以然下文云悸者加
桂腹痛不利者加附子即知雲岐子於此正
條內去或悸二字并散便用四逆湯下取主
甚當

金匱大暮瀕凡治虛勞諸不是凡氣百病

- 暮瀕 如分 甘草 炙二分 當歸 桂枝
- 乾地黄 大豆黃卷 麴 各十分

阿膠蛤粉炒 人參各七 芎藭 麥門冬各

芍藥 白朮 杏仁去皮炒 防風各六

柴胡 茯苓 桔梗各五 乾姜三分

白欵二斤 大棗百枚為膏

右二十一末細末煉蜜丸彈子大空心酒下

一丸一百劑

外臺秘要仲景病源小品方

大陽病過經十餘日及二三下之後四五日

柴胡湯證仍在者先與小柴胡嘔不止心下

急云嘔前々微煩者為未解也可與大柴

胡湯下之即愈

半復湯洗柴胡各半 黃芩 芍藥各三

大棗二十枚 破生 姜五兩 枳實四箇炒

右七味切以水一斗二升煮取六升去滓更

煎取三升溫服一升日服一方加大黃二兩

今不加大黃恕不名為大柴胡湯也忌羊肉

湯兼治天行千金翼時後同 海藏云正經

吧家雖多陽明證不可下大柴胡主治但言

吧不止心下急大柴胡湯下之不疑也及點

示正即內無大黃却与本條相合 注

中小字亦作吧止小安仍未解者即宜大黃也故注後有加大黃一句若全用有大黃却是易老法治表證仍在裏證已急者也古人用芟其精妙如此

龍腦雞蘇丸 增損此之御茶院方

除勞解熱下氣散苗即去肺熱咳血心熱驚悸脾胸熱口乾吐血肝膽熱氣出口苦腎熱神志不定上而酒毒瞷熱消渴而血利五淋血崩比芟清神爽氣潤肺開心益志滋肝補腎令人身強體輕耳目^{聰明}又能利膈化熱痰

去膀胱中積熱三焦永無滯寒

雞蘇葉 即龍腦薄荷是 新蒲黃 黃耆 甘草

木通 各二兩 麥門冬 去心 甘草 一兩半

黃連 一兩 乾地黃 六兩 阿膠 炒 焦二

柴胡 銀州龍尾紅色者二兩判同木通用沸湯半升浸一日夜絞取汗

右為細末用西路好蜜二斤餘先練一二沸

然後下生地黃末不任半攪徃々入絞下者木通柴胡汁慢火熬成膏勿令火緊焦了然後將其餘芟末和丸如豌豆大每服二十九白湯下 虛勞煩熱抱子湯下 肺熱黃芩

湯下 心热悸動恍惚^惚人參湯下 唾咯吐
衄血去心麥門冬湯下 脾胃热赤芍药生
甘草湯下 肝热防瓜湯下 腎热黄柏湯
下以上諸證並食後臥 治五淋及婦人血
崩漏下車前子湯下 莖中痛蒲黄滑石
各一錢温水調下 室女虚劳寒热潮作煎
柴胡人參湯下 痰嗽生姜湯下 氣逆橘
皮湯下

黄耆膏子煎丸

人參二兩 白朮各二兩半 甘草 炙 白芷錢五

柴胡 棟淨 黄芩 各一兩 鱖魚甲 一箇半半 大者酥炙

右細末黄耆膏子丸如梧桐子每服三十丸
至五十九丸百沸湯食前服 製黄耆膏用黄
耆半斤粗末水二斗熬至一斗去滓再熬不
住^手攪成膏至半斤入白蜜一两再熬令蜜
餳熟得膏子十兩放冷丸茶此為下利冬約
量用之

地骨皮担殼散

治骨蒸劳热肌肉消瘦少力困乏夜多盜汗
地骨皮 葶苈 柴胡 枳殼

當飯

鱉甲

醋炙

知母

右等分為末水一鍾桃柳枝頭各七箇姜三

片烏梅一箇每服三錢煎至七分去滓臨臥

空心溫服

黃龍湯

治胎前產後寒熱

小柴胡去半夏加芍藥是也 一法以四物

湯加蒲黃亦名黃龍湯

柴胡鱉甲散

大便硬者柴胡鱉甲散 大便瀉者半氣半

血道遙散

柴胡

知母

貝母

地骨皮

鱉甲

醋炙黃

右為細末蒿心七葉烏梅三箇同煎

王氏秦艽散

鱉甲

醋炙

秦艽

各一兩半

知母

炙甘草

各一兩

柴胡 二兩

右以咀杏煎服

局方秦艽鱉甲散

局方沈香鱉甲散

局方人參荆芥散

以上三方主治脩製並見局

孫用和小柴胡治瘡疫久瘧面黃肌瘦不以月
日淺深悉皆治之 心胸痞不思飲食加陳皮
渴者加枯櫻根喘者加杏仁便秘加大黃服
痞鞭者加牡蠣去皮三五劑 去半夏加
人參枯樓根名曰黃龍湯 虛煩熱竹葉湯
此溫熱證與濕熱證與傷寒稍別 療傷寒
一桂枝二麻黃三毒^毒竜四白虎五柴胡精當
不差立時見効不必頃候轉泄其間變壞悔
之晚矣 如色脉交乱須辨明白無疑 陽
盛焚多則白虎竹葉陰盛寒濕則逆理中

以此思之又豈有三百九十七法耶 雲岐
子論正法与此同意 王朝拳拳杜士云凡
春夏宜發汗秋冬不宜汗秋冬傷寒只用
柴胡頓服自愈無汗亦愈若未便傷寒疑是凡
氣痞壅等皆治之若渾身痛小柴胡加桂充
妙也

生犀散

治小兒骨蒸日晚潮熱夜間盜汗能飲食無
肌肉病後餘毒傷寒後服熱物發熱不除及
食羊肉物

羚羊角 地骨皮 秦艽 枳殼

大黃 麥門冬 赤芍藥 茯苓

柴胡 人參 桑白皮 黃耆

鱉甲 醋炙黃色各等分

右以咀青蒿水煎去滓溫服

活人妊婦傷寒加減例

妊婦傷寒仲景無治法非無治法也以無有
岐伯有故無損可杞裏其大半一條更不必
云謂紛々也取以不言明者當識謂如瘧濕
喝一篇每茶仲景豈無治法而不知茶惡後

人有兩遺^耳活人治婦人傷寒妊婦服茶

不弔謹考而詳之無論有胎無胎產前產後主

不治茶味皆不出故聖人意計云俗方可採者

不與其間參用則知其間亦有達古人意者何

必去以法考之疑非古法也 茶熱惡寒不離

桂枝芍藥 往來寒熱不離柴胡前胡 大

渴不離知母石羔五味子麥門冬 大便澀

者不離桂附白朮乾姜 大便燥結不離大

黃芩 經水適來適斷者小柴胡 安胎

不離人參阿膠白朮黃芩 發汗不離生薑

豆豉麻黃旋覆花 頭疼不離前胡石膏扼
子 傷寒頭痛不離柴胡石羔甘草 滿咽
不離枳實陳皮 胎氣不安不離黃芩麥門
冬人參 癸班變黑不離黃芩梔子升麻
觀此數條皆不出古人意豈可云仲景無治
法不言婦人妊娠之的方也仲景一書婦人
小兒兼之矣活人論婦人傷寒但云仲景不
言其意已足不可云仲景無治法以治之茱
末之皆仲景本意曷嘗出古人哉活人此言
雖失亦急為後人不知湯液者言之也豈敢

云仲景不知也活人之言失之過而不甚的
當耳

不老丹例

不老丹

何首烏

蒼朮

桑椹

煎如並見活法

局方何有首烏蒼朮地黃煎

右地黃膏子煎與蒼朮煎合點服全養氣血
無上神菜也

不老丹歌

皇甫敬之作為德甫服此七十而無白髮

蒼朮四斤泔浸軟竹刀刮皮切作片
一斤炒以四兩鹽一斤椒炒黃色變
一斤各以酒醋浸 三味出之以日見
何首赤白各一斤 泔浸竹刮切來勻
豔豆五升同一甑 豔豆爛時曝乾減
地黃二斤通槁細 槁汁和之如芻劑
置在盆中與按平 仍澆槁汁高三指
夜取月精晝日華 汲盡槁汁菜乃佳
其菜精乾靡作塊 亦用石臼搗無害
槁之細熟須細羅 煉蜜為丸桐子大

空心酒服一百丸 此是人間不老丹
又方

何首烏 一斤赤白相半 桑 一斤入鍋內用河水煮了却以竹刀切開炒乾去核同用
牛膝 酒浸焙乾一兩 防風 用水洗浸去芦二兩
右為細末石臼杵棗肉丸梧桐子大空心溫酒下五十粒

又方
何首烏 一斤 牛膝 二兩 熟地黃 二兩
蒲黃 二兩 乾桑椹 二兩
右為細末蜜丸桐子大棗蜜各半丸亦得

逐爪丹 右爪疾通

地骨皮一兩

何首烏一斤

黑豆 三升河水

荆芥穗 四兩

甘草 四兩

右為細末酒調三錢或蜜丸彈子大細煖一

九茶酒任下

治瘰癧 瘡氣癰起結疔瘡癰

右用黑熟桑椹二升新布紋汁砂鍋內然

不圯鉄釜後成膏子沸湯點服

又治瘰癧經年久不差者以玄明粉傳之日
二次

消癭丸治結核瘵氣

連翹 枹子

桔梗

甘草

乾柿

防瓜 牡蛎

玄參

丹參

荆芥

續斷 鼠李

海藻

昆布

何首烏

白疆蚤

牛房子

白頭翁

各等分

右為末煉丸食後茶酒任下以茶下之

治瘤氣癰起

連翹

枹子

瞿麥

防瓜

乾柿

桔梗

甘草

各等分

右細末蜜丸桐子大服

五香連翹湯

治癰疽瘰癧爪結腫氣惡瘡毒氣瘡氣入膈
嘔逆惡心并皆治之

木香 沈香 獨活 升麻 甘草

麝香 各半兩 連翹 乾葛 大黃

桑寄生 薰陸香 各二兩 泔竹茹 二兩

雞心香

右吹咀一本無水字水煎每入竹茹成

治癰路鷓鴣丸

海鷲 海帶 海蛤 木通

青皮 昆布 訶子 去核 連翹 各等

晚蠶沙 欵冬花

右細末煉蜜丸雞頭實子一本大每服一九食後臨

臥噲化津液嚥下

孫尚菜方 治小兒盜汗湖熱往來潮

南蕃胡黃連 柴胡 各等分

右細末煉蜜丸雞頭實子一本大每服二九至三九

五丸銀石鮑子內用酒少許化用更入水五

分重湯煮二三十沸放溫食和滓服

治傷寒勞服身熱大小便赤如血色者

胡黃連 山梔子去殼各 蜂蜜半兩

右仲和炒微焦二味為細末用豬膽汁和丸

相子大每服生薑三片烏梅一箇童子小便

三合浸半日去粗食後煖小便令溫逆下十

丸臨臥再服效

青蒿散 治骨蒸便軟渴者

青蒿 烏梅 秦艽 甘草 各等分

右吹咀同小麥煎服

金匱要略瘧病脉證并治證三條方六首

師曰瘧脉自強々救者多熱弦遲者多寒弦小

急者下之若弦遲者可溫之弦緊者可發汗

鍼灸也淳大可吐之弦救者凡熱也以飲食

消息吐之 向曰瘧以月以日發當以十五

日愈設若不差當月盡解也如其不差當云

何 師曰此結為癥瘕名曰瘧毋急治之宜

鱉甲煎丸

鱉甲煎丸

鱉甲炙 烏犀燒 黃芩 柴胡

石葶二分 厚朴三分 瞿麥二分 紫葳二分

三本

半复一分 人参一分 牡丹皮五分 麩虫五分
 阿膠三分 蜂窠四分 芫硝十二分 蜣螂六分
 大黄二分 苟菜五分 桂枝三分 葶藶二分
 桃仁三分 皮尖去 鼠一分 煎
 右二十二味為末取 鍛竈下灰一斗清酒一
 斛五斗浸灰候酒盡一半着鼈甲於中煮取
 泛泛如膠漆候取汁內諸菜煎為丸如桐子
 大空心服七九日三服
 師曰陰氣孤絕陽氣獨發則熱而少氣煩滿手
 是熱而欲嘔名曰痺瘡若但熱不寒者邪氣內

藏於心外舍分內之間令人消鑠肌肉温
 瘡者其脉和平身無寒但熱骨節煩疼時嘔
 宜用

白虎加桂枝湯主之

知母六兩 甘草炙二兩 石膏一斤 桂枝三兩
 粳米六合

右五味以水一斗二升煮米熟去滓煎
 至三升温服一升日三汗出愈

蜀漆散治瘡多寒者名曰牡瘡

右并為細末末茶前以漿水服一錢

加蜀漆半分臨發時服時錢匕一方雲母作雲實

牡蛎湯 治牡瘰

麻黃去節牡蛎煑各四兩蜀漆先去甘草炙各二兩

右以咀以水八升先煮蜀漆麻黃去上沫得六升內諸藥取二升去粗溫服一升吐則勿更服見外臺

小柴胡去半夏加栝蒌湯 見外臺經心錄治方

柴胡八兩黃芩炒二兩生薑切三兩大棗十二人參各四栝蒌兩

右七味以咀以水一斗二升煮取六升去粗再煎取三升三服

柴胡桂姜湯

治寒多微有熱或但寒不熱服一劑如神故錄之

柴胡八兩桂枝去皮黃芩各三兩牡蛎炒甘草炙乾姜各二兩

右七味以咀以水一斗二升煮取六升去粗再煎取三升溫服一升日三初煩出愈也傷寒論

九轉靈砂丹

治瘡

柴河車

一錢八分研細和後二味

一錢 信一錢

右用雄黑豆一百粒水浸一宿去皮透時研如泥和三味勻末丸桐子大菽豆大黍粒大三等量虛實老幼大小服之每服一二九或三九臨晨日未出面東無根水下不祭日服經日當其盛必毀因其衰也是必大昌此之謂也

又方治瘡久不愈

右用蒜不以多少拌和鉉丹九雞頭實大每

服丸臨晨面東新水下

海藏瘡論

暑之為病以瘡舍於榮衛之間得秋之風寒取傷而後發亦有非暑感風寒而得之邪在於陽利發熱冰水之能涼邪轉於陰則發寒湯火不能溫轉則病作離則病止故有時而休在氣則發之早在血則發之晏淺則日作深則間之或在頭項或在脊中或在腰脊雖上下遠近之不同在大陽則一也或在四肢者爪搖之取隨取傷而作不必盡當爪火

也先寒而後^溫者為之寒瘧先熱後寒者為
之溫瘧二者不當治水大當從乎中治中治
者少陽也渴者^燥盛也不渴者濕勝也瘧雖
傷暑遇秋而發其不應者秋病寒甚太陽多
也冬病寒不甚陽下爭春病則惡凡夏病則
多汗二者平少陽虛也其病隨四時而作異
形如此又有得之於寒而發之於暑邪舍於
腎是少陰也有藏於心居之於內熱索於肺
少陰也至於少氣煩寬有是熱而不寒為之
瘧^瘧瘧足陽^明也治之奈何當其盛而必毀^因

其衰也是必大昌矣治法易老瘧論備矣
問曰婦人經痛大人小兒內熱潮作并瘧寒熱
其法同否帝又問曰病中外何如岐伯曰從
內之外者調其內若盛於外者先治內而後
治外此言表裏而出之異也又云中外不相
及則治主病中外不相及者半表裡也自外
而入者有之自內而出者亦有之外入內出
雖異也在半表半裡則一矣此從外之內者
治其內若盛於內者先治外而後治內中外
不相及為少陽也治生病者治少陽也帝問

大熱之病惡寒發熱如瘧或發一日或發間
日岐伯對曰以勝復元氣奪遇之時有多有
少陰多陽少其發日遠陽多陰少其發日近
此勝復相搏盛衰之節瘧亦同法瘧者少陽也
少陽者東方之氣也逆之則發寒順行則發
熱故分之氣異往來之不定也婦人經水過
來過斷病作少陽治之傷寒雜病一體經云
身有妊而脈有邪經閉也又云月事不來者
胞脈閉也經閉者尺中不至胞閉者生化絕
源二者皆血病厥陰主之厥陰病則少陽病

矣累及其夫也小兒外感內傷若有潮作寒
熱等證並同少陽治之男女同 已上男子
婦人小兒閏女或大寒或大熱或虛變成勞
脈有浮中沉之不同故藥有表裡和之不一
^察審其有氣有血定其行陽行陰使大小不失
其宜輕重各得其取從緩從急逆順而舉則
無不當乃可以萬全矣此少陽一治不可不
知也

素問五藏瘧證湯液

肝瘧令人色蒼々然大急其狀若死者通脈

四逆湯主之

胃瘧令人病也善飢而不能食之而支滿腸

大理中湯理中丸主之

心瘧令人煩心甚欲嘔清水及寒多不甚熱

桂枝加黃芩湯主之

脾瘧令人寒腹中痛熱則腸鳴鳴已汗出小

建中湯芍藥甘草湯主之

肺瘧令人心寒々甚熱熱間苦驚如有見者

桂枝加芍藥湯主之

腎瘧令人洒々腰脊痛不能宛轉大便難自

胸々然手足寒桂枝加當歸芍藥湯主之

素問六經瘧候湯液

少陽令人身體解傷寒不甚熱不甚惡見人見

人心惕々然熱多汗出甚小柴胡湯

厥陰令人腰痛小腹滿小便不利如瘧狀非

瘧也救便意恐悞慎氣不足腸中愷々四物玄

胡苦練附子湯

陽明令人先寒洒淅寒甚反乃熱々去汗出

喜日月火光氣乃快然桂枝二白虎一黃芩

芍藥加桂湯

大陰令人不樂好大息不嗜食多寒熱汗出
病至則善嘔病已乃衰小建中湯異功散
大陽令人腰痛頭重寒從背起先寒後熱熛
々喝々然熱止汗出難已羌活生地黄湯小
柴胡加桂湯

少陽令人胸嘔吐甚之寒熱々多寒少欲閉
戶牖而處其病難已小柴胡加半夏湯

小柴胡湯議論

小柴胡湯不汗不下不利小便故潔古名三
奈湯也後人用六乙涼膈和餅之不知何意

涼膈氣中之下藥六乙則雜病膀胱中知便
藥也而少陽證當陽明與大陰之間故云半
表裏前以小柴胡不汗不下不利小便今六
乙涼膈既利而復下之故有畜血心下痞證
豈可輕用為哉若以利下之劑為可用則古
人麻黃羌氣五苓合而用之也豈為有矣古
人之意其害非輕明者當識半有表及身後
之表半在裏非下之半在裏乃身前之裏則
藥不至於差惑也

舌胎滑例 王朝奉證治論臟結附

舌上胎滑此丹田有热也脉陰陽俱緊者口中氣出唇口乾燥倦臥足冷鼻中涕出舌上胎滑勿妄語也到七八日以來微热手足温為欲解或八日以上及大發熱為難治設使惡寒者必欲嘔也可以柴胡湯去半夏加人參枳朮湯出小柴胡湯加減法 腹中痛者可理中丸 臟結如結胸然飲食如故時々下利脉浮關脉小沈細緊名曰臟結舌上胎滑者難治可刺關元穴 臟結無陽證不往來寒熱一云寒而不热其人反靜舌上胎滑

者難治也可刺關元穴眼服小柴胡湯 陽

明病脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒及惡熱身重若下利則骨中虛客熱薰膈心中懊懣舌上治滑者服小柴胡湯胃氣和汗出而解

三焦热用茱萸大例

上焦热

清神散 連翹防風湯 凉膈散

龍腦飲子 犀角地黄湯

中焦热

小養氣湯 調胃養氣湯 洗心散

四順清涼飲 桃仁養氣湯

下焦熱

大養氣湯 五苓散 立效散

八正散 石葶散 四物湯

抵當湯丸

海藏云此內熱之大畧也有外熱者當求則法兼此例有輕重氣血之分用者當擇具可準而已矣

醫聖元戎卷第五終

醫聖元戎卷第六

趙州教授兼提舉管內醫學字王好古進之筌次

三陽拾遺例

海藏通聖散評議

通聖散治雜病最佳治傷寒傷風有失其故何也防風麻黃蕒豉汗也大黃芒硝下也梔子滑石利小便也經云發表攻裡本自不同故發表不遠熱攻裏不遠寒仲景云當汗而反下之者逆也當下而反汗之者亦逆也又云桂枝下咽陽盛則澀氣入胃陰盛乃亡

既有汗菜而復在下菜茶表攻裏合而並進
有失古右人用菜之本意兼日便不宜遽利若
利之過則燥而畜血汗之不當則生黃下之
不當則結會若菜隨虛而變上行則在汗
多亡陽之證下行則有下多亡陰之證其害
非輕可不煩欬在大定間此菜盛行於世而
多效何哉當時雜市井之徒口腹備衣著全
心志樂而形不苦雖然用涼藥多效而少失
如今之時乃豪亂之餘蘆塩糟糖有吸不糠
加以天地肅殺之運五十餘年敢用涼菜如

平康之世即故多失而少効者如仲景用桂
枝當漢之末也韓祗和解桂枝當宋之隆也
其時世之異不可不知兼菜祀三禁傷風不
宜汗而汗之一也傷寒不宜下而下之二也
小便不宜重利而利之三也若知此而不犯
亦無生黃畜血結胸之證攻餘有白朮神米
二湯以葦世醫之弊云耳

韓氏微旨論和解因時法李思訓保余傷寒亦出此書論

傷寒病在可汗者論中但統言其汗證及可統
汗脈或云脈浮弱或云脈浮而數或云脈浮

緊或云脉浮無汗而喘或云脉浮為在表今
畧舉數條後人但憑其脉之火槩並不分脉
浮有陰陽虛實之理又不分有可汗不可汗
之趣語投藥表某則多變成陽毒之患今舉
病人有汗惡風無汗發熱分為三等及據立
春已後至立秋已前氣候輕重各方治之庶
學者易為開誤耳 病人二三日已前兩手
脉浮救或緩或急緊按則差軟寸關尺若力
齋等其力不甚大者亦未可便投解不甚大
表某此是見表證未見表脉也直候寸脉力

小如關尺脉大即可投表某大極治傷寒病
見證不見脉未可投某見脉不見證雖少投
某援亦無害矣凡治雜病以色為先脉為後治
傷寒病以脉為先證為後病人兩手脉浮數
而緊名曰傷寒若關前寸脉力小關後尺脉
力大雖然不惡風不自汗出此乃陰氣已盛
先見於脉也若不投某和之後必惡風及自
汗出若立春已後至清明以前宜調脉湯至
之清明已後至芒種以前宜葛根柴胡湯至
之芒種已後至立秋以前宜人參桔梗湯至

之
調脈湯

葛根一兩 防風去芦 甘草炙各半兩 前胡去苗三分

右為屑末每服二錢水一鍾生薑一塊如小

指大擘破煎至七分去粗溫服如寸脈依前

力小加棗三箇劈破同煎

葛根柴胡湯

葛根二兩 柴胡去蘆洗二兩 芍藥二分 甘草炙

桔梗各五分

右以咀每服二錢水一鍾生薑二片煎至七

分去滓熱服如寸脈依前力小加葱白三寸

同煎服

人參桔梗湯

人參 桔梗三兩 甘草炙各三分 麻黃去節一兩

石膏三兩

右以咀每服一錢水一鍾荆芥五穗煎至七

分去粗熱服如寸脈依前力小加麻黃二分

去節同煎服 病人兩手脈浮數而後名曰

中凡若寸脈力小尺脈力大然不惡凡不行

出此乃陰氣已先見於脈若於授藥和之後

必惡凡自行出若立春已後清明以前宜薄荷湯主之清明以後至芒種以前宜防風湯主之芒種以後至立秋以前宜香薷湯主之

薄荷湯方

薄荷一西 防風去芦 葛根各半 甘草炙

人參各三

右以咀每服三錢水一鐘煎至七分去粗熱服如三五服寸脈刀尚小加薄荷三分

防風湯

防風去芦 厚朴去粗皮炙 桔梗各三分

甘草炙 旋覆花各半兩

石以咀每服三錢水一鐘生姜一塊如指大碎破煎至七分去滓熱服如三五服如寸脈力尚小加荆芥五七穗同煎

香薷湯

川芎一分 升麻三分 石膏二兩 厚朴姜汁

甘草炙

右以咀每服三錢水一鐘煎至七分去粗熱服如三五服後寸脈尚小如細辛二分

前二段又將中凡與傷寒各立法者何蓋謂病

人始得病三日以前或因中風脈緩或因傷
 寒脈緊然脈雖先見而病證猶未見尚可以
 芎藭之散各立方耳 病人兩手脈浮數或
 緊或緩寸脈短反力小於關尺脈者此名陰
 盛陽虛若自汗出而惡風者是邪氣在表陰
 氣獨有餘也素問曰陰氣有餘為多汗身寒
 是也即可投消陰助陽養表芎藭治之若立春
 以後清明以前宜六物麻黃湯主之清明以
 後至七種以前宜七物柴胡湯主之芒種以
 後至立秋以前宜以養表湯主之

六物麻黃湯

麻黃去節 一兩 蒼朮三分 葛根三分 甘草炙 半兩
 人參半兩

右以咀每服三錢水一鍾束二枚煎至七分
 去滓熱服如三五服後汗未止猶惡風者加
 荆芥三分如三五服後不惡風猶汗自出者
 加船上丁香皮半兩

七物柴胡湯

柴胡去苗 二兩 蒼朮去黑皮 升麻炙 荆芥一兩
 麻黃去節 一兩

右以咀每服二錢水一鍾生姜一塊如指大
擘破棗二枚擘破同煎至七分去滓熱服如
服三五服後汗未止猶惡爪者入葱白三寸
如三五服汗猶未止者加當釀一西兩每服加
棗二枚枚同煎服

發表湯

麻黃去節 蒼朮去黑皮 當釀去芦
兩五錢 三兩
人參各半 甘草各五 舶上下香皮三
兩 分 分
右以咀每服三錢水一鍾入生姜一塊如指
大擘破棗三枚擘破同煎至七分去滓熱服

如三五服後汗未止猶惡爪者加桂枝三分
如汗未止更如加細辛半兩以汗止為度 病
人脈浮數或緊或緩其脈上出魚際寸脈力大
於關尺者此名陽盛陰虛也若發冒悶口
燥咽乾者乃是邪氣在表陽氣獨有餘也素
問曰陽氣有餘為身熱無汗是也可投清陽
助陰藥以解表若立春以後至清明以前宜
人參湯至之清明以後至芒種以前宜前胡
湯至之芒種以後至立秋以前宜石膏湯至
之

人參湯

人參 半兩 甘草 炙 芍藥 各三 石膏 二兩

柴胡 去苗 一兩

右以咀每服三錢水一鐘生姜一塊如指大
碎破同煎至七分去滓抵服如三五服後依
前煎未解每服入鼓三十粒水一鐘同煎至
八分去滓抵服

前胡湯

人參 前胡 南星 半夏 麩 木香
枳殼 橘紅 紫蘇 甘草 炙 赤茯苓

已上各一錢半

右作一服水二鐘生姜五片煎至一
溫服

石羔湯

石膏 黃芩 各三 升麻 三合 柴胡 去芦

芍藥 炙甘草 去紅皮 各一兩

右為末每服三錢水一鐘半入鼓一合煎至
八分去粗抵服如服三五服後抵未解加知
母一兩又煎未解加大青一兩 二病人西午
脈浮數或緊或緩三部俱有力無汗惡風者

此是陰陽氣俱有餘素問曰陰陽有餘則無汗而寒是也可用柴平之若立春以後至清明以前宜鮮肌湯主之清明以後至芒種以前宜芍藥湯主之芒種以後至立秋以前宜知母湯主之

鮮肌湯

石羔二兩 麻黃去節三兩 升麻 甘草 各半兩
右吹咀每服三錢水一鍾半入豉半合煎至八分去滓熱服如三五服後猶惡爪者加黃半兩石膏一兩

芍藥湯

芍藥

荆芥穗各一 石膏三兩

炙耳草半兩

右吹咀每服三錢水一鍾入姜一塊如指大
碎破同煎至七分去滓熱服如三五服後猶惡爪每服加生姜一塊如指大碎破同煎
知母湯

知母

石膏

麻黃去節

升麻各一兩

炙耳草半兩

右吹咀每服三錢水一鍾入生姜一塊如指

大辟破同煎至八分去滓温服五五服後猶
惡爪加麻黃半兩升麻半兩

仲景云傷寒為病脈緩者名中風脈緊者名傷
寒今分此二端者何也始因冬寒毒之氣中
人其內伏之陽沈潛於骨髓之內每春復發
時皆因外傷寒引內邪出或外傷爪而引內
邪出及年內邪既出而為病一也故古人立
此二端恐後疑其緊脈與緩脈治法引也若
中風與傷寒脈異何故仲景無別
乃後人不究仲景之也 此

前三段又將中風與傷寒一法治者何蓋病人
始得病後脈與證俱見若投解利藥必不得
愈故立前方同法而治之

病人始得病一二日至五六日尚有表脈及
表證者亦可以依脈證投藥凡投解表及斃
表藥每日可飲三服若證甚可至五服外不
可頻服茶也如證未解次日依前再投如證
依前未解可作熱粥內如葱白亦可也汗出
勿厚衣蓋覆恐出汗太過作亡陽證也
傷於風者上先受之傷於濕者下先受之

海藏云韓氏微旨可汗一篇有和鮮因時發言
傷寒之脉頭小尾大傷風之脉頭大尾小李
思訓保命新書亦分寸尺與韓氏同之非若
前人總言尺寸脉浮而緊尺寸脉俱浮而緩
緊則為傷寒無汗緩則為傷風自汗又在傷
寒有汗者在傷風無汗者脉亦^五差與證不
同前人已盡之矣惟韓李所言頭小尾大^即
為傷寒尾小頭大即為傷風也人病間有脉
證異於尺寸者故韓李之述為和鮮因時發
也又恐後人疑其不與前聖合遂於本方某又立

加減數條亦不越前人之意何其當哉兼
二公者當宋之盛時故有戒桂枝麻黃不可輕
用故用石膏麻黃葛根柴胡之平劑當特則
此百世當行時世遷移之治法也可汗一篇
若從湯液隨證應用自有定規辨明哲不可
踰又寸口脉小飲冷與惡露同傷同作中
焦治之韓李云傷寒寸小者勿認與飲冷
與惡露同傷一體也飲冷惡露寸口舉按全
無是陰氣在胃不知陽氣不能升越也傷寒
寸口小者只於關以下至膀胱全部見之寸

口雖小只是舉之微小沉得在也非若飲若
露而路舉按全無也若果寸口與按全無即不
可解利則只宜温中不可不知耶

韓氏十四菜定經

- 調脈湯 陽明少陽也
- 葛根柴胡湯 陽明少陽也
- 人參桔梗湯 大陽陽明也
- 薄荷湯 陽明也
- 防風湯 陽明也
- 香薷湯 陽明也

六物麻黃湯

大陽陽明也

七物柴胡湯

大陽少陽也

乾姜湯

火陽也

人參湯

陽明少陽也

石羔湯

陽明少陽也

鮮肌湯

大陽少陽也

芍藥湯

大陽少陽也

知母湯

大陽少陽也

右韓氏十四菜以經絡求之各有部分輕重
緩急自有取宜連氣加臨各按其當因而在

其中矣不必分至之遠近寒暑之盛衰而謂之因時也

仲景瓜蒂散例

仲景瓜蒂散

病人桂枝證頭不痛項不強寸脉微浮曾中痞鞭氣上衝咽喉不能太息者此為胸中在寒也當吐之宜

瓜蒂散

瓜蒂

赤小豆 各等分

右為細末每服一錢匕豉一合湯七合先漬

之須更煮作稀粥去粗稠散溫服頓服不吐少々加之得快吐乃止諸亡血虛家不可用此

宋氏仲景鈐法噓藥瓜蒂散

瓜蒂

十四個

丁香 一個

黍米

四十粒

右細末噓水取一字噓鼻下黃涎

治偏正頭痛久不愈服諸藥及針刺莫能効者以其濕氣在頭也一味細末一味者瓜蒂也少許噓之鼻中清水徐徐出一晝夜濕盡痛止為度此亦吐之意也經云濕氣在上以苦吐之

故邪在胸中者服之邪在頭目者噉之皆吐
之屬也張子和云點日出淚噉鼻瀝涕口食
漉涎皆有以同^手吐也

又濕在胸中故灸頭痛瓜蒂末一錢赤小豆
末半錢米湯調下吐之或醋漿亦得濕氣在
頭者此茶亦能吐之然莫若噉之為愈也
瓜蒂散治傷寒三四日者或覺心滿堅硬脚
手心但熱變黃不治而欲死者宜瓜蒂為細
末每用一字吹鼻中令黃水出餘殘末用水

小兒久患風痼纏喉凡痺及大人凡涎潮^抵
^抵不省人酒積食勞黃疸脾溫腫滿勞熱上喘
肌^抵咳嗽中滿眩暈^抵管^抵痰飲^抵厥頭痛一
切胸上病患脈沈實按之有力者並約量刮
料輕重多少服之以上瓜蒂吐不止用麝香
湯解之

勝金丸

薄荷 羊介 瓜蒂 羊介 藜蘆末 一兩 米^末 砒^末 兩
豬牙皂角 二兩
右牙皂槌碎水一升與薄荷一處^末取汁熬

成膏子別將藜芦瓜蒂硃砂研勻用膏子如
丸龍眼太以餘硃砂為衣溫酒化下一丸以
吐為度得吐而着人車者愈不者則不可救
也或者謂中氣凡無吐法下金虎碧霞以為
戒且如卒暴疼生聲如瓊瑤牙園不開湯某
不能入其命須臾若無此吐法其誤人之旨
深矣

瓜蒂散

治痰飲酒積食滯留飲停滯或寒結胸中熱
當取化絲宜用之

瓜蒂

赤小豆

各七錢
五分

人參
半錢

生甘草二錢半

右細末每服一二錢量虛實加減酒調空心
辰刻飲之

三聖散

防風

瓜蒂

各三錢

藜芦一兩

石粗末每用三錢以藜汁一大盞煎至七分
去滓溫服飲探引令吐為度宜將煖室不透
風虛用吐至此好醋葱湯解之
古今吐法不一在胸中者或噦之在頭者或

收 瓜蒂四十九箇 六月 丁香四十九箇

右二味用乾鍋子內燒烟為度細碾末大人一字々小兒半字吹鼻中及擦牙立効

外臺肘後方

瘵傷寒汗出不渴三四日胸中惡心欲吐者

豉三斤以綿裹之 鹽一兩

右二味以水七升煮取二升半去滓內蜜一升又煮二服頓服二升安臥當吐不吐再服

又方

苦參二分 甘草一分 瓜蒂三枚 赤豆二七枚

右四味加以水一升煮取半升作一服之

當吐若吐不止者以葱豉粥解之少止忌海

藻菰菜

又方

苦參 黃芩各二 生地黃半斤

右三味切以水八升煎取二升服一升或吐

下毒物忌蕪荑

仲景治百合例 金匱祖方全

百合知母湯 百合滑石代赭石湯

百合雞子湯 百合地黃湯

又方

治傷寒腹中痛

百合一兩炒黃為末米飲調服

孫真人治陰毒傷寒

百合煮取濃汁服之一升良

素問解休 仲景百合諸湯 治人訖百合

謹

右仲景百合諸湯名本草所載備之後治人

主治服餌載之百問讀者當知其祖

百合知母湯 治百合病汗後者

百合七散

知母二兩

右先以水洗百合漬一宿當去白沫去其水
更以泉水二升煮取一升去滓別以泉水二
升煮知母取一升去滓後合和再煎取一升
半分二溫服

百合滑石代赭石湯 治百合病下之後者

百合七箇 滑石三兩 代赭石如彈子大一塊

右先將百合如前法製後去滓別以泉水二升
煮滑石代赭石取一升去滓後合和再煎取
一升半分二溫服

海藏百合四君子湯 治老弱虛人不得服
解脰尺脈緩潘尺為陰部腹腎主之絡為熱
中潘為無熱而無血故解脰而不可名之然
寒不寒熱不熱弱不弱壯不壯虛不可名為
之解脰也惟百合一證與此比之相若
病源小呂葶藶湯

療冬溫及春月傷風傷寒則發熱頭眩疼痛
咽喉乾名強胸內疼心胞痞滿腰背強痞者
結病也

葶藶 一兩 白薇

麻黃 去節 獨治

芎藭

杏仁 去皮

青木香

如無此鹿射香
一分代之

甘草

三上各
二兩

石膏

三分為
末綿裹

石九味 切以水

八升煮取三升分三服若一

寒一熱加朴硝一分及大黃三兩下之忌海

藻松菜 古方錄驗同 一方有葛根二兩

千金療傷寒傷風五六日以上但胸中煩乾嘔

者宜栝蒌實湯至之方祖金匱

栝蒌實 一兩

柴胡 半斤

黃芩

甘草 各二兩

生姜 四兩

大棗 十枚

右六味切勿令大碎吹去末以水一斗二升

者得六升絞去滓更煎取一升温服日三
千金翼五苓散

論云猪苓散此當在大陽五苓散條下

猪苓 茯苓 白朮各三分 桂心 二分

澤瀉 五分

右五味搗篩末服方寸七日二多飲煖汗出
愈

耳草浮心湯 傷寒中風醫反下之其人下利

日數十行水穀不化腹中雷鳴心下痞堅而

嘔乾嘔心煩不解得安醫見心下痞以為病

滿本論

本論

未盡重複下之其痞益甚此非結熱但以胃中

胃本論

中虛客氣上逆故堅痞轉甚耳草浮心湯至

之

耳草 浮心 黃芩 三兩 大棗 十枚 黃連 二兩

乾姜 炮 二兩 半夏 洗去滑 半斤

右六味切以水一升煮取六升分六服一方

有人參 三兩

古今往驗療中風傷寒脉浮發熱往來汗出惡

風頭強氣鳴乾嘔陽且湯主之方 大棗 二十

枚 桂心 三兩 芍藥 三兩 生姜 三兩 甘草 二兩 黃芩 二兩

右六味吹咀以泉水六升煮取四升分四服
日三自汗者去桂心加附子一枚煩渴者出
桂加枳朮三兩利者去芍藥桂加乾姜三兩
附子一枚炮心下悸者去芍藥加茯苓四兩
虛勞裏急者正陽且湯主之煎得二升內膠
飴半升分為兩服若脈浮緊者不可與也
全同

海藏十餘證辨并藥

傷風脈緊仲景大青龍湯主之 無汗惡風
仲景葛根湯主之 已上二證傷風得傷寒脈

傷寒得傷風脈是也易老斬為桂枝柴黃各
半湯

中風傷寒姜桂湯 中風傷寒陽旦湯

傷寒中風枳朮實湯

此前後取傷不同其中變證所苦各異故用
藥雜非桂枝麻黃之正藥也

| | | |
|------|------|----------|
| 尺寸脈盛 | 重感於寒 | 變為溫瘧 |
| 陽脈浮滑 | 陰脈濡弱 | 更遇於風變為風溫 |
| 陽脈洪數 | 陰脈實大 | 更遇溫熱變為溫毒 |
| 陽脈濡弱 | 陰脈洪緊 | 更遇溫氣變為溫疫 |

中風傷寒

傷風見寒

中暑中濕
中暑飲冷

蓋因傷於寒邪

又感異氣而變

皆重傷也

凡此收病

海藏云已上十餘證前後死傷不同內外凌證

不一非精於持診者不能別也

張文仲療傷寒白骨摩體中卒當于遍菜力乃

行並療惡瘡小兒頭瘡牛領馬鞍背療之先

以塩湯洗惡瘡布拭之着膏上摩向火于愈

日再自消

天雄

烏頭

莽草

羊躑躅

右四味各切以苦酒湯三升漬一宿作東向

路竈又作十二聚温土各一升許成膏豬脂

三升著銅器中加竈上炊以葦薪為火令膏

釋內死漬菜炊合沸下者着土聚盡遍菜成

絞去滓傷寒頭痛酒服如杏核一枚溫覆取

汗咽痛含如枣核日三嚥之不可近目千金

同

牙菌例

海藏云牙菌者足陽明經也年陽明經也足陽

明之經先^走上牙中^手乎陽明之經走下齒中牙
齒者骨之餘也堅則令人強食或血出齦爛
諸痛寒熱不一皆^手足陽明也

陳希夷神仙刷牙藥白牙黑髮益精神

豬牙皂角及生姜 西四升麻蜀地黃

木律早連槐莢子 細辛荷葉要相當

香鹽等分同燒煉 研熬將來用最良

擦牙牢齒烏鬚髮 誰知世上有仙方

右用二兩並剉碎十新罐子盡盛其藥用瓦

子蓋口以麻素子^索繫定上用鹽泥^固因濟約厚

半寸許熬乾作一地坑子坑子方^潤二尺深
約七寸先放一方磚後安茶甌子以口向下
坐用木炭一秤燒令透後清烟出稍存性去
火爇一宿取出研為細末每蘸茶刷上下牙
齒溫水嗽口吐之

射香玉散

酸石榴皮 訶子各 升麻 綠礬^枯

何首烏 川芎 白芷 射香^錢五倍子

石膽礬^{各半} 腦子^錢 豬牙皂灰^各 百葉煎

青黛 白檀^錢 零陵香 木別子^各

白茯苓^{一兩} 藿香葉 沒石子^{各一兩}
 好草^華撿 青鹽 細辛 荷葉灰^{一兩}
 右細末用茶後茶清嗽之又方無腦子加射
 香三錢

犀角升麻湯

治陽明受風熱口唇煩連髮腫痛電額連頭
 痛

犀角^{七錢} 升麻 五錢 防風^{三錢} 羌活^{三錢}
 川芎 三錢 白附子 白芷^{二錢} 黃芩^{二錢}
 生耳草^{二錢}

右咬咀作一服水五錢煎三解去滓分三服

梧相淚散

治陽明經虛風熱所襲流傳^木毒攻斷內則
 致腫結妨罔甚者為斷問津液相搏化為濃
 汁宜用此茶

梧相淚 石膽礬 細辛根 亂髮灰^{二錢}
 黃礬^{五錢} 芎藭^{五錢} 升麻^{五錢} 射香^{一錢}
 珠砂 川芎 當歸 牛膝^{各二錢}
 右細末先以耳草湯嗽口後用茶少許傳久以
 常用少許擦牙齒去凡退熱消腫化毒^固

牙齦永無宜痲血蛙之病

升麻丸

治陽明有熱攻注牙齦腫痛脈洪大而實宜以

細辛升麻 防己 羌活 內加牽牛

大黃浮之加減丸數

右並等分為末煉蜜丸梧桐子大每服三丸臨臥溫水下

白牙齦菜

零陵香

白芷

青鹽

沙鍋別研

升麻兩

石膏別研

細辛二錢

射香別研

右除內砂鍋石膏射香外細末入此五味同調勻早晨夜間用藥擦牙溫水漱

又方升麻散

細辛六錢 川芎二兩 升麻兩 藁本一兩

石膏一兩 皂莢一兩 白芷一兩

右每用藥少許刷牙溫水漱用沙羅三次三聖散 治齒齦腫痛動搖

甘胡荽四兩 牛膝二兩

右細末每用五錢匕水一盞半煎至一盞去滓稍熱漱多時吐之嘔噦不妨食後隨睡治齒根宣露動搖方

枳殼 防風 杏仁 青鹽 地骨皮

細辛 生地黄 各一 蔓荊子 半兩

右為細末茶一錢酒水各一盞煎至一盞去滓熱嗽冷吐

治牙齦脫落不安方

熟銅末二兩 當皈一分 防風一分 地骨皮三分 細辛根一分

右為末將當皈末和銅末研如泥粉封蓋日夜各二度三五日牢一月內忌硬物
簡要方治牙齦腫痛

白礬 一兩 露蜂房 一分 西

右為末每用二錢水一盞煎十餘沸

二十八宿散治遠年近日發牙痛

丁香 草揅 大椒 蠟 箱

右各七箇同碾為細末痛處用津點搽立止
草揅散治風蛀牙疼牙肉緊急

草揅 草烏頭 細辛 升麻 良姜

蝎梢

右為細末如牙疼時擦少許澀涎痛即止

擦牙菜

川芎 細辛 訶子 五倍子 百菜煎

各二錢半 膽礬兩 綠礬兩 射香 如無以耳

右為細末再入膽礬射香研勻為度每用字

臨臥刷之

五効散治牙疼

小椒 露路瑋房 青鹽 各等分

右為細末煎數沸放溫漱之痛即止

益神散 一法加青黛棗核栗蓬薑灰同末刷

牙

五倍子 半兩 訶子 三個 石榴皮 三錢

膽礬 錢半 零陵香 錢白芷一錢

綠礬 半兩炒乾一 射香 加鹽 半兩

食療去皂角 錢兩

右同炒令赤細碾夜々用擦牙齒一日後在

動者齒及血壘並差其牙堅牢

丹 反老還童

青鹽六分 升麻一兩 羌活一兩 當歸兩半

五倍子一兩 西川芎半兩 熟地黃一兩

豬牙皂角一兩

右用確子一個隨葉多少用自已退髮少許
蓋茶面用瓦子蓋之鹽泥固濟文武火煨香
熟氣絕為度取熬研為末每日早晨及晚
擦牙久而見効

病源曰午陽明之支脉入於齒之是骨之脈絡
髓之死養若凡冷寒入於經絡傷骨致氣入
齒根則齒痛

海藏云此骨與大腸俱熱大便秘經絡壅治而

齒斷痛者治法不同也凡齒痛並見外臺
秘要

古今已三例

本草云味辛溫主溫熱寒有毒可以通塞可
以開胃可以磨堅可以止法又可以備急而
隨腸或佐以寒或佐以熱如以五色各隨其
藏貝見於後以其此葉多治腸胃手足陽明
之經也故入三陽拾遺例金匱玉函要畧傷
寒論并雜療諸方皆張仲景祖神農法伊尹
體箕子而作也唐宋以來如孫思邈葛稚川

朱奉議王朝奉輩其餘各醫雖多皆不出仲
景書也

仲景備急丸

治卒暴百病中惡客忤治口禁停尸卒死

巴豆 大黃 乾姜各等分

右蜜丸拊子下丸如小豆大每服三丸苦酒下

如幹口不用折齒灌之三物司空裴秀亦作

散用治心腹諸疾與上同巴豆即斬鬩奪門

之將散不及丸必用散者取其急也

三物須精新好者細末蜜丸和搗十杵丸如

小豆大胸滿卒痛如錐刀刺氣口急禁停尸
卒死以煖水苦酒服之若不下捧頭幹開灌
令下咽頃臛差未和臛與三丸當便腸鳴搏
即時吐下得愈若口禁不用折齒灌之某下
而生

仲景白散

桔梗 貝母各一字 巴豆熬研

右巴豆入散內碾勻服強人半錢已弱人少

減病在上必吐病在下必利不利進熱粥一

杯不止進冷粥一杯若汗出已腹痛與芍藥三

錢

仲景飛尸走馬湯方

巴豆二枚去

杏仁二枚去

右二味綿纏令極細投熱湯二合指捻取

白汗便飲之食項當下量大小危勿虛穿加

減服之通鬼擊病忌野豬肉芦笋張文仲同

黑神丸 治心腹諸疾

巴豆二錢

鹽頭四兩

右為細末滴水丸桐子大麥炒香水上浮不

用麥酒吞二丸

狀元丸 一名酒癰丸

神麴炒

葛根各半

半夏洗

雄黃二錢

巴豆五

白麴一兩

右六味滴水丸桐子大麥炒香水上浮不用

麥酒下十二丸

酒癰丸

巴豆五

雄黃六

皂塊

蝎稍

白麴五

右為細末水丸豌豆大稍乾

神應丸

大治心腹脹滿宿食不消飲食取傷不喜飲

食諸藥不効

巴豆一百二十粒 麵一斤炒 盡油

右連麩一處為細末醋糊丸棗豆火水

下 二三十丸食遠

青娥丸 此後並巴豆杏仁例

一加法 青黛一錢五分 巴豆二錢五分 白芍半兩

右蒸餅丸棗豆大每服二丸甘草湯下食後

紅粉丸

一法加明脂治婦人血不通

一法加朱砂

解毒雄黃丸

治纏喉風急喉閉卒倒失音不語不省人事

一法加雄黃一分 壽金一分 巴豆十四個

玉霜丸

一法加輕粉 滑石 一法加白卷

活人黑神散

一法加鹽豉 五靈脂 治溫痰食積

錢氏紫霜丸

一法加代赭石 赤石脂 一加法

附子 烏頭治寒 一加法 大黃治熱

感應丸 主治修製

並見本方

丁香

木香 各一錢

肉豆蔻 三錢 乾姜 半兩

巴豆 半兩

杏仁 半兩

百草霜

蠟 二兩 醋 煮

神應丸 治冷飲注泄者至止海藏所改法也

許學士云此方得之王景長之家近世名醫多用即知此方乃古方也惟此為真局方高殿前家亦非也本方雖云秘者能下泄者能止用之少効子反覆本草味菜証但言巴豆得大者良予改法為神應丸

本香 一錢 丁香 別研 乾葛 炮半兩 百草霜 研細

四味菜末和勻

杏仁 半兩

蠟 三四醋煮垢先備下

巴豆 半兩炒去油盡微存生

右同碾為泥上四味和勻重羅細入沉中焙化蠟入小油半兩勻同入泥與細末中研勻及數百迴後至凝可搓作餅蠟紙封裹每挺可重一錢

局方感應丸

治虛中積冷氣弱有傷停積胃曉不能傳化或因氣滯因飢飽食飲酒過多心下堅滿兩脇脘痛心腹大疼霍亂吐瀉大便頻併後重

遲滯久利赤白膿血相雜米谷不消除而後
 祭又治中脘嘔吐痰逆惡心喜睡頭疑胸膈
 痞悶四肢倦怠不欲飲食又治妊婦傷寒新
 產有傷若久有積寒吃熱菜不效者並悉治
 之又治久病形羸雀再歲月漸致虛弱面黃
 肌瘦飲食或進或退大便或秘或泄不拘久
 新積滯並悉治之大病不過三服便見全愈
 此菜溫無毒並不燥熱不損胃氣亦不吐瀉
 止是度化積聚消逐濕冷療飲食所傷仗三

雀巢丸

新棟丁香二兩 南木香去芦一兩 川乾姜二兩
 肉豆蔻去皮仁子 巴豆七個 細女蓋油
 杏仁煉者去皮土一兩 研極爛如膏
 百草霜用庄家錫底上
 右七味除巴豆粉百草霜杏仁三味餘四味
 搗為細末與前三味同样研令細用好蠟置
 和先將蠟六兩鎔化作汁以重綿濾去滓更
 以好酒一升於錄石器內煮蠟鎔滾煎沸頃
 酒去其錫自浮於上取蠟秤用丸春夏修合
 清油一兩於鈹內熬令末散香熟次下酒煮

蠟四兩回化作汁乾鍋內乘紙拌和煎菜
末林冬俱合用清油一兩半同煎煮收作汁
和通菜末同煎分作小錠子以油單紙裹之
旋丸如菜豆大每服三五粒量虛實加減過
水吞下不拘時候常服進飲食消酒毒令人
不中酒又治小兒脾胃虛弱景有傷滯黃白
難^鮮息^殺下利水軟每服五粒黍米火乾姜湯下
不拘時候前項疾證連綿月日用熱菜攻取
轉並不成効者不拘老幼處心服餅立有神
効

簡易感應丸

法在治療之
法並見局方

- 丁香 木香 杏仁 豆蔻 乾姜
- 巴豆 百草霜

右用見成丸子半兩入巴豆十枚去殼爛碾
成膏用烏梅三個蒸過取肉三件一處別碾
令極勻丸如菜豆大今人^性見巴豆不去
油不敢輒服况尊貴之人既在聲色之奉極於
心在恠尤不肯用但巴豆之性恠以濕煖之
劑止能去菴莖不鄣藏氣在飲則行無飲則
利若病形體雖不甚壯實既有飲氣積氣之

患與大邪氣入腹火使便秘若非揆郭何由
得去猶豫不決則病勢攻攪愈見氣乏莫若
於病始萌之時對證用之流利之後或大俯
不調則以石菖蒲鮮之自然平治却於吐咀
方中選某調理治心腹疼痛不可忍服十丸
姜湯下若未通再服以利為期服某之後痛
或愈甚既以流利痛或未除仍陰陽攪亂藏
之未平且甚痛甚者主於厥逆或面青口禁
當先以藜合香丸灌之次投此某治惡心嘔
逆全不納食此某微令利通方服溫脾之某

治赤白痢病心腹疼痛先以此某微利次方
漸下兼治男子瘰癧疝氣膀胱奔豚腎氣脚
氣攻刺入腹亦用此某微利之酒積痰飲
為患婦人血氣並宜服

五脂丸 一名通膈丸

五靈脂一斤 青皮取末 巴豆剉碎

右為細末水調搗成丸大人菜豆大三丸溫
水下食後臨臥小兒米粒大一二丸量虛實
至三五丸若合得經年陳久愈佳中有痰涎
相混不能施化亦加至七丸傷寒當下用藥

氣湯等不能下者可前養氣湯一服此丸三五丸或五七丸即可便也

木香五靈脂丸

木香二錢丁香二錢肉豆蔻三錢

青皮各半陳皮各半牽牛半五靈脂五錢

巴豆四個

右為細末醋糊丸菜豆大每服十五丸至二十丸溫水下治胸膈痞悶氣不順心腹疼痛

酒食所傷等証

三信丸

黃蘗一兩蛤粉三兩巴豆七個

右將蘗為末入粉勻再入豆霜滴水丸桐子大每服二三丸水下

解毒丸

雄黃二分蘇合一分巴豆七個

右為細末醋糊丸菜豆大熱茶清下七丸吐
出頑涎立便蘗者末吐再服如至死者心頭
尤熱口禁某不下即以鐵草匙幹開或折齒
嚙之某下咽喉無在不治微吐泄不妨及上
膈壅熱痰涎不利咽喉腫滿目赤癰腫一切

熱毒並宜服之小兒喉腫痛驚熱痰涎壅塞
服二丸或三丸量大小加減

軟紅丸 治婦人

杏仁 二十個

巴豆 四個 乾桐脂 十個

白芨

右滴水丸菜豆大每服三丸姜湯下

此金丸

治小兒驚風體熱喘粗涎嗽心忪顛赤大小
便不利夜臥不安

輕粉 半兩 滑石 半兩 犀角 二錢 巴豆 三十個

取用青黛 二錢

右細末糊丸麻子大每服一歲見一丸薄荷
湯下如急驚風頭熱足冷口噤面青筋脈細
掣睛中眼涎甚者加一二丸並桃附湯下蘊
毒焚毒涎出立便安愈小兒瘡疥後餘毒宜
服此藥解之食後

青娥丸 治婦人

巴豆

青黛 二錢 白芨 半錢

右細末蒸餅丸菜豆大每服二丸耳草湯下
食後

桑金丸治酒積

雄黃 杏仁 巴豆 各等分

右細末寒食麩丸菜豆大乾糖炒令黃色

導氣丸治內傷積聚

大黃 甘草 皂角 巴豆

右吹咀醋糊凡作餅子以箬草蓋如造曲法發色上有黃衣為度

丁香 木香 縮砂仁

與上同為細末醋糊丸黍米大每服二三丸白湯下加至四五丸

安中丸 丸去黃衣中山陳之細南頗傳得此方

棗 杏仁 白朮 巴豆

右用蘆餅劑四兩內菜三味各和勻與棗和餅劑裏慢火燒黃熟去皮一鬼搗成膏

蘿蔔子大每服五七丸白湯下食後

透羅丹治胸膈痞悶酒食

羊夏 皂角 杏仁 巴豆

右四味用麩五斤同炒令黃色為度去麩不用為細末入寒食麩二兩炒黃色醋煮糊丸

如棗三大每服三九生薑湯下食遠臨臥
黃帝問曰婦人重身之毒何也岐伯曰在故無損
亦無損也帝曰請聞其故何謂也大積其可
犯也衰其大半及大過者死衰其大半不足
以害生故止其藥若過則毒氣內餘則敗損
中和故遇積聚索古老人治積則有法少壯
人無積虛人則有之脾胃怯弱氣血兩衰四
時有感皆能成積若遇以磨壅破結之藥治
之疾似去而人已衰矣乾漆硃砂三稜牽牛
大黃之類藥之暫快某過則依然氣愈消疾

愈天竟何益哉故善治者當先補虛氣血壯
積自消如滿堅君子縱有一小人自然無容地
而出矣不問何藏先調其中使能飲食是其
本也

溫白丸

治心腹積聚久壅癖塊大如杯碗黃疸宿食
朝起嘔吐滿上氣時々腹脹心下堅結上未
搏心勝及兩脇下腫水病八種痞塞翻胃吐
逆飲食噎塞五腫淋疾九腫心痛積年食不
消化成癥疾連年不差及療一切諸凡身體

頑^頑痺不知痛痒或半身不遂或眉髮墮落及
療七十二種風三十六種遁尸疰忤及癩癩
或婦人諸疾斷統不生治下淋瀝五邪失心
憂愁思慮意不樂飲食無味月水不調及腹
中一切諸疾有似懷孕連年累月羸瘦困弊
或歌如鬼死使但服此藥無不除愈

川鳥 去皮臍炮
柴胡 洗淨去蘆頭
吳茱萸 用湯洗七次焙
乾姜炮
厚朴 去粗皮
皂莢 去子炒
茯苓 翻洗水
黃連 去毛
人參 去蘆頭
紫苑 去苗葉
菖蒲 去鬚九
桔梗 去里皮
桂枝 去粗皮
蜀椒 去目炒

巴豆 去油心腹
右為細末入巴豆合勺煉蜜丸桐子大每服
三丸生姜湯下食後臨臥服漸加至五六丸
易老治五積

肝
○肺息貢
○心伏梁
○脾痞氣
○肺肥氣
芎藭
溫白丸加
吳茱萸
乾姜
○肺肥氣
柴胡
川芎
腎奔豚
丁香
茯苓
遠志
治伏梁氣在心下結聚不散用桃奴三兩為

未空心温酒下桃奴是实著對不落实中者
正月栳樹上乾桃是也

萬病感應丸

主治脩製并見本方後有全註於上温白丸
内加

羌活 西半 三稜 西半 牙遂 西半 杏仁 西半

防風 西半 藏靈仙 西一加 上六味却減蜀椒

萬病紫苑丸全註

此藥療治久患瘰癧如椀大及諸黃病每地
氣起將上氣衝心遠將絞痛一切虫咬十腫

水 盡病及胃冷吐食嘔逆惡心飲食不消天行
時病婦人多年月水不通或腹如懷孕多血
天陰即冷又治二十種風頑痺不知年歲登
夜不安夢與鬼交頭多白屑或哭或笑如鬼
魅所著腹中生瘡服之皆効

紫苑 去苗 吳茱萸 湯洗七次焙乾 厚朴 姜製 西半

菖蒲 節者佳 柴胡 去油 桔梗 去黑皮 芦炒

茯苓 去皮 皂莢 去皮 桂枝

乾姜 炮 黃連 去毛 蜀椒 去目及閉

巴豆 去皮膜 出油研 人參 去芦各 川烏 炮去皮 羊錢

加羗活 独活 防风等分
右為細末入巴豆勻煉蜜丸如桐子大每服
三丸漸加至五七丸生薑湯送下食後臨臥
初有孕者不且服吳引於後 有楊駙馬患
風氣衝心飲食吐逆遍身枯瘦日服五丸至
七丸服至二十日浮出肉塊蝦蟆五六枚白
膿二升 又趙侍郎先食後吐目無所見耳
每死聞服至五十日浮出青蛟五七條長四
寸許惡膿三升愈 王氏患大風淚眉髮墜
落掌内生瘡服之半月浮出癩虫二升以馬

尾長寸許後愈李靈惠肥氣服五丸經一月
浮出內蠶三枚 如黃門卒中風病發時服
菜浮出惡膿四升赤黃水一升肉虫乳髮相
似愈 李知府妻楊氏帶下病七年血崩不
止骨疼着床日服五丸至十丸十五丸取下
膿血 五升黃水一升內塊如雞子大愈
此菜治一切疝患萬病如神惟初有孕者不
宜服之痔漏腸風酒下 赤白痢訶子湯下
膿血痢米飲下 和傷血問四肢不收酒
下 蛔虫絞心癩瘡湯下 氣噎憂憂荷葉

湯下 一切凡升麻湯下 寸白虫^根枳柳湯
下 霍亂乾姜湯下 咳嗽杏仁湯下 腰
腎痛豆淋湯下 陰毒傷寒溫酒下 吐逆
生姜湯下 脾風陳皮湯下 頭痛及心下
水下 脾凡陳皮湯下 頭痛及心下痛酒
下 大小便不通灯草湯下 因物死傷本
物湯下 吐水利湯下 氣痛乾姜湯下
小兒天爪吊搯防己湯下 小兒疳病葱白
湯下 小兒乳食傷白湯下 月信不通煎
紅花酒下 婦人腹痛川芎湯下 懷孕半

年後胎漏艾湯下 有子氣衝心酒下 產
暈痛溫酒下 血氣痛當飯湯下 產後心
腹脹滿豆湯酒下 產後益智湯下 產後
血痢當飯湯下 豆淋湯下 赤白帶下酒煎
艾湯下 鮮內外傷寒粥飲湯下 室女血
脉不通酒下 子死葵子湯下 又治小兒
驚癇大人癩狂一切凡及無孕婦人身上頑
麻狀如虫行四肢俱腫呻吟走痛中疾

老婢弟雁丸

牛黃

射香

俱研

犀角 錢

朱砂

研飛

雄黃研黃連去毛 大戟剉炒 芫花醋炒
 人參去芦 茯苓去皮 乾姜炮 肉桂去皮
 當歸去芦 芫蕪 芍藥 芫菜 身遂
 黃芩 細辛去苗 巴豆去皮 桔梗去芦
 前胡去芦 紫苑去芦 蒲黃炒 防風去芦
 葶藶炒 川椒去目微炒 桑皮剉炒 蜈蚣去頭
 禹餘糧醋浸火 石蟻去尾足 芫青炒 黃芩去頭
 石蟻去尾足 芫青炒 黃芩去頭

右為細末入研茶臼煉蜜丸如小豆大療七
 種癰塊五種癩病十種注特七種飛屍十二

種盡毒五種黃病十二種瘡疾十種水病八
 種大凡十二種瘳凡并大頭目暗漠及上
 氣咳嗽喉中如水雞聲不得臥飲食不作肌
 膚五藏滯氣積聚不消壅閉不通心腹脹滿
 連及胸背鼓脹氣堅結流入四肢或腹脹心
 膈氣滿無時舉癸十年二十年不瘥五種不
 利并蛇虫寸白虫諸虫上下冷熱久積痰飲
 令人多 腫消瘦無力蔭入骨髓便成滯疾
 身體氣腫飲食嘔逆腰脚酸疼四肢沈拿不
 能久行並婦人因產治入子藏之中不降或

閉塞不通胞中瘀血冷白帶流出不盡時々
疼痛為患或曰此新產并小兒赤白下利及
狐身耳龍耳等病服此藥以三丸為一劑
服藥不過三劑病悉除說無窮盡故稱萬
病丸若一歲以下小兒在疾者每乳母服兩
小豆大亦以吐以利為度 在逆病及卒病
皆用多積久病少服常服微瀉利為度卒病
欲死服三丸取利瘥卒中惡口噤服二丸
漿水一合繳下利即瘥 五疰鬼刺客忤服
二丸男女邪病歌哭腹大如妊身服二丸日

三夜一箇食服之 盡毒吐血腹痛如刺服
二丸若不瘥更服 諸在瘥服三丸冷癖服
三丸日三服皆間服常令微瀉利 宿食不
消服二丸取利 癥瘕積聚二丸日三服
拘急腹脹滿心痛服三丸 上氣嘔逆胸滿
不得眠服二丸不瘥再服大利服二丸服日
三服 疢温服二丸以一丸如杏仁大和鮫
泔二合灌下部中 水病服三丸日再服間
食服之差即止人弱隔日服 頭痛惡寒服
二丸覆取汗 傷寒天行服二丸日三箇食

服之 小便不通服二丸不瘥明日更服
大便不通服三丸又內一丸下部中即通
耳聾時耳以綿裹如枣核塞之 鼻衄服二
丸 癰疽疔瘡破腫服一丸如麻子大日傳
之根亦自出 疔瘡血出以豬脂和塗有
孔則內孔中瘥 癩瘡鮓^汁洗訖取菜和豬
脂塗之 漏瘡有孔以一丸內孔中和豬脂
傳之 痔瘡塗綿筋上內孔中日別易瘥瘰
癧以豬脂和塗瘥 癬瘡以布揩令^汁出以
鮓汁和塗十日一易瘥 胸背腰腿腫以醋

吐

和傳腫上日一易又服二丸 諸冷瘡積三
不瘥以鮓汁和塗之惡刺以一丸內瘡孔中
即瘥 蜈蚣螫以少許內螫處若毒入腹心
煩欲絕者服三丸蝎螫以少許塗之蜂螫以
少許傳之 婦人諸疾胞衣不下服二丸
小兒驚疳服一丸如米許又以塗乳令^吐之
看兒大小量與服之 小兒客忤一丸如米
大和乳塗頭與嘔之以意量之 小兒乳不
消心腹脹滿一丸如米許塗乳頭令嘔取瘥
瘡疾未瘥前服一丸未瘥更服

小射香丸 治鬼注飛尸厲疾

射香 三分 雄黃 別研當歸 焙

乾姜 炮 桂心 芍藥 細辛 各五

莽草 炙 犀角 屑 梔子 鑿 巴豆 各十

烏頭 炮去皮臍各五枚每枚重半兩 附子 炮去皮臍 蜈蚣 中頭尾炒

右為細末和勻蜜丸楊至千杵如菴豆大

或小便大每服二丸服漸加至四丸五丸

神保丸 主治修製並見局方

治膀胱氣上至兩脇心腹疼痛一投而效

巴豆 胡椒 蝎稍 木香

右末朱砂為衣有人病項筋痛醫作風治

不效久久又注兩服甚苦合一投而瘥

已上例中諸藥丸用巴豆新者峻利力大陳

者緩慢力小欲急治者宜新欲緩治者宜陳

或有用新者云某經年愈亦待陳之意也

医壘元戎卷第六終

Handwritten notes in the top right corner, possibly a date or reference.

Vertical handwritten text on the right side of the page.

Main body of vertical handwritten text, likely a letter or official document.



