醴陵縣志

凌恩鳳題

卷五

食貨志上

食貨志

山林川澤。地不愛寶。知所以生之取之。則民阜矣。醴陵土沃宜稻。山谷有水之地。幾盡闢爲田。水不足者。輒拓以種薯。陵阜徧植松。次之杉與油茶。又次之爲楓樟之屬。遭時多故。合抱之木。百不存一。常美之山。多突而童。惟植桐樹果蒔麥之風。比年轉盛。明一統志載醴陵產鉛鐵。今縣境雖有鐵鑛。產量甚微。無開採者。惟煤礦特富。石門口之煤且與安源並稱。同治志列舉貨之屬二十。太半屬於農礦。其爲工業出品。僅有夏布棉布土絹瓷器四種。當時亦祇銷行境內。甚少輸出。凡此皆今與昔異者也。動植之類。皆湘中各縣所常見。罕特產。分類紀述。詳其用途。至有一物而數見者。嘉種時自外來。培養關乎人力。非可以地域限也。故物產不立專編。

農林

善言治者爲民興利。務在富之。故昔之循吏。常出入阡陌。視其稼穡之修。桑果之茂。畜產之肥瘠與否。而加勸懲焉。醴陵編氓什九爲耕農。不待督課而以勤勞著。所治又皆得之經驗不同耳食。有足稱者。然其病在於拘墟。今之講求農學者衆矣。政府且特設農場。俾民則傚。自田父視之。若渺不相涉。狃於習慣。卒莫之改也。毋亦道之之術有未善歟。

農宜

氣候土壤隨地而殊。樹藝之時。因之各異。爾風月令。驗之吾醴。不盡合也。茲按節候。詢諸老農。參以學理。列舉於左。

節候	國曆	陰曆	農宜
立春	二月四五日	正月節	栽松　植果樹　插柳
雨水	二月十九二十日	正月中	繕補農具　預作肥料
驚蟄	三月五六日	二月節	植油茶　番椒播種　施肥果樹
春分	三月二十一二十二日	二月中	孳蓄播種　分蘭　栽菸　栽藕　植桐
清明	四月五六日	三月節	蒔藍　種高粱　種瓜　種棉　早稻播種　菹菜
穀雨	四月二十二十一日	三月中	栽薑　種豆　孵雞　插早禾　始蠶　採茶
立夏	五月六七日	四月節	刈麥　放魚　插中禾

小滿	五月二十一日 二十二日	四月中	耘田　黃瓜生
芒種	六月六日 七日	五月節	蒔秫　插晚禾　栽藷
夏至	六月二十一日 二十二日	五月中	翻子播種　作綠肥
小暑	七月七日 八日	六月節	桃李熟
大暑	七月二十三日 二十四日	六月中	早稻熟　插翻子　食瓜　種胡蘿蔔
立秋	八月八日 九日	七月節	播芥種
處暑	八月二十三日 二十四日	七月中	中稻熟　栽葱　栽韭　種蕎麥　移蒔菊於盆
白露	九月八日 九日	八月節	播萊菔種　種冬葵　栽蒜　烹芋　積谷歸倉
秋分	九月二十三日 二十四日	八月中	蒔菘　孵雞　撒草子　燒土　移植花木
寒露	十月八日 九日	九月節	種豌豆　晚禾熟　蒔薤　掘薯　栽芥
霜降	十月二十三日 二十四日	九月中	翻子熟　摘茶球　種芸薹　種小麥
立冬	十一月七日 八日	十月節	鋤田塍　抽草溝　種大麥
小雪	十一月二十二日 二十三日	十月中	榨油　壅麻
大雪	十二月七日 八日	十一月節	蓋茅屋　燒木作炭
冬至	十二月二十二日 二十三日	十一月中	梅始華
小寒	一月六日 七日	十二月節	決塘取魚
大寒	一月二十日 二十一日	十二月中	炕肉　碾米　可久貯不蛀

說明　表內下種時節。就普通而言。他如因土質地勢之差異。及氣溫之急變。或農作之冗忙。亦常有變更者。

本縣無氣候測量。大抵七八兩月爲最熱時期。一月間最冷。以溫度分季。則寒季始於小雪。終於驚蟄。爲時三月至三月半。熱季始於立夏。終於秋分。歷時凡五閱月。春秋兩季。各僅兩月。酷熱期起於小暑一候。終於立秋一候。適爲稻作需要最高溫時期。夏季多南風。南風最盛之時。約自芒種至處暑間。冬季多西北風。老農言。當禾苗盛長時。忌東風。宜南風北風西風。蓋以東風生蟲。西風能殺蟲也。三十年來。邑中無嚴霜。畏霜之植物如芸薹蕎麥蘿蔔石榴之類。鮮有蒙其害者。即大凌僅於十年前一見。除民國十九年曾大凌彌月外。邑中罕見堅冰嚴霜。大雪亦不常有。有之則農

夫額手以預兆豐年相慶。蓋侵害植物之蟲多。被其殲滅無餘也。多雨時期有二。一自四月至五月。正農家需水最殷之際。一自六月至七月初。此期間亦需水最殷。惟時有驟雨。易釀成水災。

縣境以內之石。多爲砂巖礫巖葉巖。歷年久遠風化爲沙。山高坂峻。夏季山洪暴發。輒泥沙俱下。冲積於沿溪澗之低窪而爲沙土及沙質壤土。其不當水冲者。則多爲粘質壤土。瀕縣河南河一帶。什九皆沙質壤土。益以大水推來之腐植土。（俗呼潮泥）故稱沃壤最宜稻。丁家坊之萊菔。南門洲上之橘柚尤著。至於粘質壤土。色褐或金黃而底層黃泥者。與沙質壤土腐植土同爲上業田。各鄉鎮皆有之。惟畝積多寡不等。其由急水冲積而成之鼓皮沙子。與粘土之火赤夾埴土之青夾泥油乾泥碗泥。不適於植物之生育。然以農夫勤于耕作施肥之故。亦常有變磽瘠爲肥沃者。土質之佳。向推東鄉。次之爲西南兩鄉。北鄉多涇田。泥深而常濕。（惟可插糯及中粘）近且相率改浸冬而種草子矣。山地多礫。含酸化鐵甚富。土人勤事開墾。種樹種藷。收益不亞於五穀。東北鄉饒埴土。以之製造陶瓷磚瓦。爲本縣每年出產一大宗。

農占

農夫推測氣候。悉本經驗。父子相傳。有歷歷不爽者。然未可以科學推求也。略舉如次。所紀均係陰歷。

每歲冬至日起九。向以九九八十一日爲寒季。醴陵地當溫帶。冬至後天氣尚有微熱。至三九四九乃爲寒沍下雪之期。六九春氣漸至。楊柳生稊。七九以後。則寒氣消而農事起矣。（諺云一九二九熱。三九四九雪。五九六九脫衣衫。七九六十三。行人路上八九七十二。牛在田裏拉。九九八十一。農夫戴斗笠。）元月二十日。有風則秤上之物貴。有雨則斗上之物貴。（諺云風打秤雨打斗。）立春前鳴雷則雨多。（諺云後春先驚四十八工天陰。）春天丙寅日忌晴。（諺云春社無雨不耕田。）提要錄云。社公社母。不食舊水。是日雨。爲社公雨。若無雨。則有旱矣。清明日宜晴。穀雨日宜雨。（諺云乾清明暗穀雨。）俗傳穀雨日有雨。則魚苗豐足。三月二十四雨連夜則麥敗。（諺云麥吃四時水。只怕三月二十四日連夜雨。）四月八日宜晴。（諺云四月八日滴一滴。洞庭湖裏開大拆。）芒種時多雨。則夏至時多晴。（諺云芒種雨連連。夏至火燒天。）初伏日有雨爲漏伏。（諺云初伏一滴。二伏一七。三伏日日。）湘潭植中禾。收穫遲。以漏伏爲佳兆。醴陵早稻收穫。常在大暑節。漏伏則灑穀難乾。稻草多爛。立

秋有雨。謂之漏秋。旱災可免。湘潭則以漏秋爲憂。蓋處暑以後正值收割之期。多雨則穀壞矣。

七月以後。風雨調勻。則晚稻多穫。諺云晚禾不要糞只要秋雨噴。又有驗風色以爲占候者。四季東風。均有極大變化。諺云春發東風雨漣漣。夏發東風似火煎。秋發東風禾生耳。冬發東風雪滿天。春季南風。夏季北風。均爲致雨之兆。諺云春南夏北。不離時刻。又云一日南風暴日狗攛竄。言春暖發南風。必驟變寒也。三夏季西風。致雨甚速。諺云春南夏發西打馬送簑衣。北風在秋天則反晴。諺云秋發北。晒死芳。芳爲刺之俗字讀若勒。黃沙從北方沙漠捲來者。古謂之霾。依霾見久暫。可判陰晴。諺云一日黃沙三日雨。三日黃沙九日晴。水口之泡色隨晴雨而轉。諺云黃風黑雨白日頭。鷓鳥名也。其字不載於字典。圖書集成庶徵典彙考七之九載之。鳴者如僅爲一則晴。多則必大雨。諺云一鷓晴。二鷓雨。三鷓四鷓長大水。總之湘省春冬兩季。雨量較多。往往一雨兼旬。猶淅瀝未已。夏秋兩季。雖雨不過數日。諺云春無三日晴。夏無三日雨。足以盡之。七月十五日拂曉登高山望月。以月落早晚。卜來歲穀米之貴賤。諺云荒不荒。七月十五看月光。又中秋望月不見。卜來歲元宵必雨。諺云雲掩中秋月雨打上元宵。亦往往有驗。

農田

縣境東北南三面。均爲羅霄山脈所盤紆。山地多而平原少。地勢特高。故水皆西流。沿瀠水南河一帶。皆稱沃壤。惟每夏季山洪暴發。或下游大水倒注。俱易成災。山地之可耕者。亦已開闢殆遍。民國三十一年。測丈全縣農田。凡六十二萬餘畝。佔醴陵總面積一萬零三十萬方里百分之十六。依地位地目土壤灌溉。配分爲乙丙兩等。凡六級。列表如左。

鄉鎮別	等則	乙上	乙中	乙下	丙上	丙中	丙下	合計
荷里鄉	畝	一〇三二・二三七	九八六三・一〇〇	九八七九・四七五	一八四三・四二七	六八八・六一五	二一・六九六	二三四二八・六四八
清正鄉	畝	四二二・五二八	一二九二七・四三七	七一二五・九六七	一八九九・〇九七	六七四・五二七	三六・三〇八	二三〇七五・八六四
漾仙鄉	畝	一四九・四六五	一三七九・三九四	六四〇五・八〇二	一六七五・四三三	五一五・五八二	二三・三六九	二三五四九・〇四五
王仙鄉	畝	一三六六・三〇四	一〇八九四・七六七	一二八三四・〇三二	一九七六・一八一	七〇七・九四六	一八・二一二	二二七七・四四二
醴泉鎮	畝	三九〇・五六〇	四一一五・〇五三	四二六一・四六八	九四九・六八二	一七五・五二五	一・八三五	九八四・一二三
清泉鄉	畝	七一五・七五四	八四一二・七〇〇	六九一五・三二一	一三二一・七九八	五三七・〇七二	五八・五六四	一七九三九・一八九
楚東鄉	畝	七七二・五七〇	一五四五七・八九四	一七八二五・九九六	五八三一・六五九	六二二・五二一	五四・五〇六	三八五九六・九四六
杉仙鄉	畝	七・七〇八	六四四二・八六五	一二三八〇・〇五〇	三八二六・八二八	一五九七・一七	五四・八一一	二四〇二一・六六七

泗汾鄉	一四四•五二〇	一八八七一•五三一	一九四六九•二四六	四三七六•九六三	一四一四•二二六	四五•一七六	四四三二一•二六二
船灣鄉		五二六〇•五六三	七七七八•八八六	二六三三•九六二	一四五八•一〇二	一一五•九一四	一七三三七•四二七
清江鄉	一•一七九	七一六六•五四三	一一五四〇•七九〇	二五〇五•一四六	一七八〇•四三二	一四•二五九	二三〇〇八•五四九
明月鄉	•七八〇	八四二九•一七一	一三三九五•五四一	三八七九•一八九	二〇八六•二三〇	一三六•一五四	二七九二七•三二六
神福鄉	三八九•八二五	五九七五•九九二	一六〇一〇•九九三	三四八六•七三〇	一七〇一•八四五	八三•四六七	二七六四八•八五二
集體鄉	四一五•八八八	五八二九•一五八	八三三三•四八二	二六三一•五六一	五九六•七三六	一五•八四〇	一七八三三•六六五
平橋鄉	六四四•八二〇	一五〇三五•〇六二	一九八四五•九六九	三五四五•七五〇	一七〇二•一二四	七六•四二六	四〇八五〇•一五一
均清鄉	三五〇•一〇〇	六七六六•七二六	一〇四五四•二三一	三〇七一•二〇五	九二六•〇一八	三五•〇五二	二一六〇三•三一二
退化鄉	四九•六九五	五四七三•九八二	九七五二•九六八	三四五四•七八四	二六八三•〇三九	三〇•五三一	一九四四四•九九九
成竹鄉	一七•七三〇	二七一四•八一九	八〇一五•七八二	三六九一•八九八	二九三四•四〇二	三六七•七四四	一七七四二•三七五
馬軍鄉		五七一六•六三〇	一三八九八•八七五	三四三四•六〇六	一九〇九•五三三	一三〇•二五一	二五〇八九•八八四
務本鄉	四三二•八五〇	八五三三•四〇二	一四八一六•九一七	三二四七•六〇五	一二一八•八五五	五二•一八一	二八二九〇•八一〇
長田鄉	二六八•一三三	三八五〇•八一三	七九三八•八六七	一八八〇•二四〇	一〇二五•五七九	一一•四二〇	一四九九五•〇五一
忠愛鄉	二三八•二四三	六八八五•三九三	一五一〇四•九九一	二六六一•二八五	一二七五•三八六	三七•二八九	二六二〇二•五八七
和信鄉	四二〇•一三七	二二三一•二九三	四六四〇•二五四	二四九八•三四八	一二九六•五七三	一八•二三三	一二一〇四•八三八
元亨鄉	一四三•〇五四	八六四一•九八二	一六二五一•一四七	二九〇九•四四二	一五五八•二五九	五八•一八一	二九五六二•〇六五
利貞鄉	一一六•二八七	一四五二七•二二三	一九八九五•七四〇	四八八三•九六五	六九三二•一三七	一五八〇•五七九	四七七三五•九二七
總計	九四九九•一四六	二一七九二•三九〇	二九三八二•七六八	七二一〇八•七九一	三七八一九•四七〇	二八三八•二三九	六二七八八〇•八〇四

綜計各鄉鎮農田業主載在賦册者。凡一十九萬六千三百餘戶。每戶平均三畝二分弱。然據戶籍統計。全縣僅十萬戶。戶有田者不及半數。平均要亦不過十餘畝。蓋百數十年前。邑中有筦田千畝乃至萬畝者。今則無矣。其中自耕者居三之一。而佃農亦往往自有數畝之田。民國二十五年。縣政府統計室根據抽查資料製表如左。

全縣農戶及耕地按耕種面積分組調查表

組別	戶數	面積（公畝）	附記

三〇公畝以下	一四、八二三	三五九、九二三	公畝每畝一百方公尺合中國舊畝〇・一六二七六〇四畝
三一——六〇公畝	四二、三五一	一、七一三、九二〇	
六一——九〇公畝	一二、七〇五	八九九、八〇八	
九一——一二〇公畝	六、三五五	六七一、六七八	
一二一——一五〇公畝	五三〇	六九、六二八	
一五一——一八〇公畝	一、〇五九	一七六、七四八	
一八一——二一〇公畝	二、一一八	四一七、七六八	
二一一——二四〇公畝	一五九	三五、三五〇	
二四一——二七〇公畝	一〇六	二六、七八〇	
二七一——三〇〇公畝	一〇六	二九、九九四	
三〇一——六〇〇公畝	五三	二一、四二四	
六〇一——九〇〇公畝	五三	三二、一三六	
總計	八〇、四一八	四、四五五、一五七	

全縣農戶及耕地按自耕佃耕分類調查表

類別	戶數	耕地面積（公畝） 自有田地	租用田地	共計	附記
自耕農	二七、五一一	一、五九一、五八一	六七七、二六九	二、二六 八五〇	本表之所謂自耕農即其自有田地佔其所耕田地半數以上者
佃耕農	五二、九〇七	五一二、一八四	一、六七四、一二三	二、一八六、三〇七	
總計	八〇、四一八	二、一〇三、七六五	二、三五一、三九二	四、四五五、一五七	

地價調查表

地屬	地類	每畝價格 最高	普通	附記
城鎮	商業中心地	一、〇〇〇元	六〇〇元	本縣購買田地均以舊畝計算每畝合六・一四四公畝
	住宅地	三〇〇元	二〇〇元	
	園圃地	三〇〇元	二〇〇元	
鄉村	耕地 水田	二五元	一八元	

	旱田	非耕地		
		林地	牧地	鑛地	其他
	一五元	七元	五元	二〇元	五元
	一一元	五元	三元	一〇元	四元

地價高下。以其收益爲準衡。農田之收益主要爲稻。此外有種蔬菜菽麻芸薹者。大抵利用農隙或旱田爲之。至於菽麥紅薯玉米棉花之屬。則不在田而在土。收益之豐。不亞於稻。例皆爲耕者所有。無庸納租。次之則爲畜魚養猪牧羊植果造林及家庭工藝。通謂之農家副業。

水利

醴多山田。皆資陂塘井泉之利。惟滁江南河官莊河兩岸。設筒車挽水灌溉。然水落則停轉。不足爲救旱之備。舊志所載邑中陂塘。不下五百餘處。歷年既久。或被水潦衝壞。或爲泥沙塡塞。人民昧於遠計。吝惜資費。不加修濬。稍旱即涸。設遇連年雨暘時若。則視塘井爲無用。培土成田。或墾公蔭塘尾餘地及陂壩山澗。種植稻穀。歲旱熟田亦成焦土。爭訟耗累。往往得不償失。重以近年磁業發達。窰廠所在之地。率將窰屑泥滓傾棄於河。以至河道日狹。每遇山洪暴發。田疇輒被摧毀。政府雖明令禁止。犯者自若也。邑中設塘壩委員會蓋有年矣。於陂塘泉井之毀圮。河道之淤塞。一聽民之自爲。不加督導。水利其何由興乎。

塘井　農民勤於墾殖。高亢之地拓爲稻田。則必謀所以瀦山谿之水。以濟壩堰之所不逮。田疇日闢。塘井則日以增加。固無俟上令督促爲也。塘井最大者。厥爲治西之神塘。寬三里。周圍八九里。蔭田凡三千六百畝。每當春水渙漫。一碧無際。水鳥浮沉。風景絕佳。（原名淳塘。塘中自生蓮。醫病甚效。因更名神塘。神蓮曰。）治東之荷葉塘。治南之蓮池汪。治北之大灌塘。皆其次也。泉塘四時不涸。其利尤溥。首推治東之潼塘與溫泉。潼塘有二。上泉塘灌田廣袤可數里。下泉塘源更大。地低弗能遠及。日夜舂水碓十六。挽筒車二。（塘之南數百武有井曰醴佳。其出如珠。其味甘冽。）西湖虎跑泉不及也。）溫泉塘縱橫十餘畝。塘底白沙隨水珠上湧如沸釜。挽筒車十。境內之田。惟此是賴。所產之米無缺角。視他處產者石重三觔。蔭餘之水犇流入河。頓成碧綠。與上游絕異。或謂潼江得名以此。（邑人湯澍霖有記。略謂水經

言淥水源出東漉山。近泉塘有東山。在淥水之濱。疑即東漉山也。塘中有土阜。古木葱蘢。天然成趣。每逢春秋佳日。皓月當空。朝暾初上。水光灩瀲。一如西湖云

他如治南之泉塘。距城里許。治東之蘭溪泉前山泉櫸樹泉。治西之龍王井龍井。皆泉蔭之最著者。至于以湖名塘者。則有煙竹湖石壁湖落星湖灣塘湖。灣塘湖近泗汾市。逶迤紆曲至一里而遙。落星湖在王仙山下。周圍不半里。相傳星隕成湖深約三四丈。灌溉之利勝於灣塘。拓塘使廣。不如濬塘使深。亦言水利者所不可不知也。

本縣塘井蔭田五十畝以上者列左 塘井下載所在地及蔭田畝數

鄭家湖 治東瓜畬壠蔭田八〇畝
上大塘 譚家衝五〇
下大塘 譚家衝六〇
和尚塘 夏家山八〇
劉家塘 寨子嶺五〇
第一塘 第四塘一六〇
第四塘 第四塘一〇〇
劉家塘 丁家坊五〇
船形塘 丁家坊五〇
藕塘 丁家坊六〇
泉塘 丁家坊一五〇
沙塘 壕山坡一二〇
泉塘 珊田冲一〇〇
清水塘 長茅港一七〇
馬槽塘 黃沙上洲二〇〇
蓮蓬塘 黃沙中洲二〇〇
長塘 黃沙洲一一〇
石塘 企石洲五〇
栗塘 烏尖一〇三
雷塘 烏尖一〇二
柘塘 柘塘坪五〇
橫塘 柘塘坪一〇〇
三眼塘 黃竹衝二〇〇
新塘 煙竹湖三〇〇
石壁湖 石壁湖八〇〇
大塘 大塘坳三〇〇
椏塘 清龍橋一〇〇
清水塘 亭子嶺八〇
長塘 橫嶺八〇
淡家塘 橫嶺八〇

湖塘 落星湖一〇三
長塘 大塘衝一〇〇
石塘 洪家灣一四〇
七眼塘 灌衝二〇〇
荷葉老塘 王莊八〇〇
荷葉新塘 王莊一〇〇
大塘 花椒衝三〇〇
三义塘 冷水坑六〇〇
金井塘 仙石二〇〇
大石塘 大石塘一二〇〇
石塘 石塘一四〇〇
萬家井 淥石堰五〇〇
溫泉塘 溫泉一二〇〇
陳家塘 溫泉四〇〇
大絲塘 覘市對面四〇〇
楊林塘 楊林塘一二〇〇
七眼塘 夏家坊一四〇〇
湖塘 白兔潭五〇
坡口塘 坡口衝一四〇
三眼井 天符廟五〇〇
何家塘 版石洲一四〇
鍾家塘 版石洲一二〇
黃鶴塘 黃鶴塘一二〇
大塘 余鷄壠一六〇
長塘 官寮一二〇
張公塘 銀岡衝二〇〇
陽春塘 銀岡衝二〇〇
貫泉塘 銀岡衝二〇〇
湖塘 白兔市五〇
坡口塘 坡口衝尾一四〇
周家塘 周家塘九〇
黃泥塘 西社祠九〇
上下潼塘 潼塘六〇〇
大塘 江口二〇〇
大龜湖 華富一五〇
小龜湖 華富一五〇
大泉湖 華富六〇
石子塘 華富一二〇
大蔭塘 麻石一〇〇
鍾家堰泉塘 麻石一〇〇
大泉湖 唐家坊一一〇
小泉湖 唐家坊八二
珠樹泉塘 柏莊八〇
烏塘 柏莊七〇
蔭泉井 麻衝六四
曾家泉塘 老壩上一〇〇
蓮塘 祖塘舖二二〇
泉湖 孟陂口一〇二
老虎泉塘 大山下一六〇
大塘 陽家山下九二
長塘 蜈蚣山下八三
渣塘 東源衝六三
大塘 石岡衝六二
過路塘 嶠嶺一二〇
煤炭塘 煤炭衝一〇〇 以上東鄉
泉塘 治南泉塘七五〇
東門塘 東門境一五〇
栗塘 泥塘社一三〇
黃鴉塘 泉塘境二〇〇
湖頭塘 湖頭境一二〇

煙塘 湖塘境八五
龍家井 冷水一二〇
立塘 盤樹舖七八
車扛塘 石門口一二〇
株木塘 盤樹舖一四〇
大陂塘 盤樹舖八〇
肥塘 盤樹舖八〇
山塘 盤樹舖七〇
迴龍塘 迴龍塘六〇
泥鰍塘 石門口一〇〇
漆家塘 盤樹舖六〇
荷葉塘 西山下八〇
石灰塘 盤樹舖一〇〇
牛會塘 盤樹舖五〇
亨子塘 盤樹舖二〇〇
菱角塘 盤樹舖一五〇
新塘 盤樹舖五〇
泥塘 泥塘社五〇〇
古塘 泥塘社五〇
橫塘 泥塘社六〇
大砂塘 泥塘社七〇
大塘 泥塘社三〇〇
倒茨塘 東門境三〇〇
西林塘 西林二〇八
東塘 龍源社一〇〇
南塘 龍源社一〇〇
梁薦塘 龍源社一〇〇
西塘 西塘社五〇
才塘 神仙甲一二〇
恩塘 土地甲九〇
阮塘 鯉浦社一〇〇
東塘 鯉浦社一二〇
福主塘 石桑社二〇〇
澗塘 龔祠上一八〇
長塘 李家山一四〇
茅塘 徐家衝一一〇
丁塘 陽家嘴一〇〇
荷塘 成天橋二八〇
水鴨塘 圓寶橋一八〇
漕塘 荷花橋二〇〇
顏家塘 仰山廟一二〇〇
樟木塘 杉仙社一六〇
迎塘 杉仙社一二〇
中塘 將軍社二四〇
青水塘 杉陽社一六〇
間塘 下關社一二〇
鳳儀塘 許祠上二四〇
楊梅塘 楊梅塘三〇〇
泥塘 三都裡一〇〇
源頭塘 北衝一八〇
大新塘 土橋上二〇〇
小洞塘 楚東四〇〇
黎燕塘 楚東二〇〇
南塘 芷泉嶺八〇
芷泉塘 芷泉嶺二〇〇
龍塘 龍塘三〇〇
龍塘 龍塘二四〇
炭塘 河口二七〇
大塘 大塘六〇〇
白馬塘 大塘一〇〇
五家塘 大塘九〇
蓄水塘 大塘五〇
蝦塘 大塘六〇
上塘 山下甲一五〇
下塘 山下甲一五〇
年塘 蛟湖壠一五〇
大塘 樟樹下八〇
古井 泗汾二〇〇
壩塘 麻杉嶺二〇〇
返塘 三林橋八〇
西塘 三林橋一〇〇
趕塘 蛇塘脚下三六〇
長塘 郭家園五〇
新大塘 新大塘二〇〇
新塘 新塘二二〇
三大塘 三大塘三〇〇
烏龜塘 烏龜塘一〇〇
蜂子塘 蜂子坑一〇〇
院背塘 李嘉村五〇
繞富塘 新井塘一二〇
泉塘 五陌墻一一〇
甌塘 茶埠塘一二〇
雙塘 易祠前一〇〇〇
井塘 牌坊下一二〇
上下大塘 漢家村一八〇
印心塘 塘濱衝一二〇
新塘 淇田柳樹山五〇
野塘 淇田柳樹山二五〇
新塘 鵝形嘴二〇〇
砂子塘 鵝形嘴五〇
黃崗塘 黃崗衝三〇〇
樟樹塘 黃崗衝九〇
梓木塘 梓木塘一〇〇
新塘 添滋廟一〇〇
新屋塘 新屋坪五〇
泉塘 田樓三〇〇
大塘 田樓二〇〇
梘舖塘 田樓五〇
黎塘 黎塘九〇
煙塘 煙塘八〇
大華塘 茶埠塘五〇
米篩塘 茶埠塘八〇
上下才塘 石灣二一〇
琵琶塘 流芳里一五〇
淡家塘 流芳里五〇
上下大塘 茂田上壠五〇〇
下橫塘 茂田五〇〇
蜂子塘 茂田五〇〇
上葉家塘 茂田下壠五〇〇
下葉家塘 茂田下壠五〇〇
黃埠塘 茂田五〇〇
梘渡塘 茂田一〇〇
上塘 新灣里一〇〇
雪塘 陳家壠四〇〇
長塘 陳家壠五〇〇
灣塘 灣塘八〇〇
黎煙塘 江家山六八〇
杜丫塘 髦坪二〇〇
一甲湖 一甲坪二〇〇
新塘 一甲坪一〇〇

倒樟湖 倒樟湖一〇〇
柳家湖 柳家湖一〇〇
大烟塘 徐家祠八〇
道中塘 道中塘二〇〇
思古塘 老虎衝一二〇

增家塘 增家塘三〇〇
滙塘 江家灘二〇〇
西塘 新坊二五〇
古董塘 新坊一五〇
黃土大塘 梘上二〇〇

墻塘 梘上五〇
黃鴨塘 梘上一五〇
老鴨塘 梘上一五〇
大塘 三星湖三〇〇
大古塘 大古塘五〇

伴竹塘 三星七〇
大沙塘 沙塘里六〇
柏葉塘 三星尾五〇
黃塘 黃塘五〇
樟塘 樟塘五〇

東塘 東塘七〇
南塘 高登岸七〇
黃泥塘 黃泥塘八〇
石獅塘 老官衝五〇
泗畝塘 新村一二〇

泗水塘 泗水塘五〇
才塘 三眼塘八〇
監山塘 水口山一六〇
丁大塘 馬頭陂八〇
茶背塘 殿上七〇

楓樹塘 塘下里七〇
河塘 豆田岱上二〇〇
上新塘 新塘衝五〇
下新塘 新塘衝五〇
肥塘 黌堂社三五〇

溫塘 流塘下六〇〇
泉塘 流塘下六〇〇
大塘 東源村三〇〇
墻塘 蟹形五〇
福塘 蟹形五〇

滲塘 滲塘五〇
車塘 車塘五〇
大沙塘 滲塘尾二四〇
龍塘 楓林一五〇
煙塘 楓林六〇

中活塘 林家壠六〇
上鵝塘 林家壠五〇
下鵝塘 林家壠五〇
新大塘 新大塘二〇〇
龍木塘 新大塘五〇

大富塘 雷峯菴一〇〇
荷塘 雷峯菴六〇
湘塘 杉山三〇〇
儒塘 儒塘二五〇
上新源塘 儒塘一〇〇

葛塘 鹽山三〇〇
泊塘 鹽山三〇〇
蒙塘 鹽山三〇〇
八角塘 伍家村一二〇
荷塘 荷塘八〇

荷塘 灣富二〇〇
灣富塘 灣富四八〇
天井塘 灣富五〇
熟路塘 熟路村二〇〇
社塘 熟路村二〇〇

槽皮塘 東塘二〇〇
荊塘 荊塘五〇
烏龜塘 烏龜塘五〇
上南塘 東塘北岸七〇
下南塘 東塘北岸八〇

清水塘 東塘北岸五〇
車角塘 唐村五〇
西塘 馬戀巷三〇〇
上鶴棲塘 馬戀巷八〇
下鶴棲塘 馬戀巷五〇

藕塘 藕塘冲一六〇
古新塘 爛柴衝一二〇
柞梓塘 柞梓衝一八〇
石塘 石塘衝四〇〇
李郎塘 北衝口八〇〇

新源塘 新源塘一五〇
龍塘 慕衝三〇〇
大石塘 南岸一五〇
徐文塘 顏家巷一五〇
龍塘 齋江三〇〇

鬼石塘 東塘一六〇
車舟塘 塘衝三〇〇
菴蹟井 沙洲灣五〇
雙井 雙井五〇
蛟塘井 柏園一〇〇

銀子井 岩背衝五六
文園井 潘家園子三〇〇
清泉井 熊家園子五〇
齊家井 棗樹下五二〇
屈塘 屈塘社六〇〇

小塘 小塘灣一八〇
玉塘 鴨溥衝三六〇
饒塘 龍花衝五〇〇
牛角塘 牛角衝四八〇
迷子塘 欄樹園五二〇

龍塘 鹽溪衝二〇〇
蛇湖塘 金子坪六〇〇
長湖 樟樹達六〇〇
大湖 湖溪二四〇
洞井 麗村五〇

玉塘汦 汦背嶺一一〇〇
楊梅塘 官溪二〇〇
玉帶塘 官溪一〇〇
走馬塘 官溪一〇〇
大鴨塘 鴨塘一〇〇

車塘 車塘一〇〇
茅塘 厚陂壠二〇〇
黃崗塘 黃崗灣一〇〇
下湖塘 堆上八〇
大華塘 楓木塘八〇

新塘 洛塘上八〇
洛塘 洛塘上五〇〇
長塘 清水江七〇
上下墻 楊木墻五〇
鐵匠墻 楊木墻五〇

湖沙塘 楊木墻五〇　苦馬塘 楊木墻五〇　大塘 氣江衝五〇　門塘 譚家壠五〇　園塘 明甫五〇

蛇塘 楓樹下五〇　香塘 香塘一〇〇　宗泗塘 瑞湄灣二〇〇 以上南鄉　大東塘 上三洲五〇　耿塘 泰園衝三〇〇

楊梅塘 張家衝六〇　大塘 泗圍衝五四〇　湖塘 湖下一〇〇　蕭家塘 湖下二〇〇　柘源塘 柘源嶺一九〇

橫塘 柘源嶺一九〇　大西塘 梅霞里一〇五　煙竹塘 梅筱下境一〇〇　長塘 石塘社一〇八〇　南塘 梅筱下境七〇

指背塘 梅筱下境五〇　瀟塘 梅筱下境五〇　大塘 梅筱下境一〇〇　神塘 湯家坪一八〇〇　上長湖塘 湯家坪四二〇

下長湖塘 湯家坪三〇〇　大塘 湯家坪一二〇〇　新塘 湯家坪一二〇〇〇　兌小塘 湯家坪四五〇〇　龍井 季公壠一二〇

大塘 檀山螺頭沖三〇〇　檀山塘 檀山灣上一〇六　檀山大塘 檀山灣上八〇　石塘 李家衝八〇　包壺塘 大溪壠七五

大石塘 小溪八〇　菟子塘 小溪七〇　藕塘 小溪六〇　和尚塘 小溪七〇　荷塘 西園坪一四〇

西塘 西園坪一五〇　泉塘 泉塘均下三〇〇　大塘 鍾家山六〇〇　楊塘 楊塘七〇　大乙塘 楊塘一〇〇

橫基塘 楊塘六〇　老虎塘 楊塘五〇　松樹塘 紙槽村五〇　黃泥塘 下蕉衝七〇　德樹塘 下蕉衝五〇

荷葉塘 冷水上壠一〇〇　龍塘 金錢衝二〇〇　廖彩塘 廖村一〇〇　藕塘 均源村五〇　中塘 均源村二〇〇

芭樹塘 均源村五〇　荷塘 荷塘六〇　燕塘 羅家嶺一〇〇　茅塘 長水四八〇　楠木塘 上東岡二〇〇

栗心塘 上東岡六〇　漣塘 黃田一七〇　白茅塘 白茅衝三六〇　牛形大塘 凌家灣上首二〇　冷水塘 冷水塘二〇〇

相公塘 中灣一〇〇　墻面塘 雷缽山一〇〇　楊耿塘 唐大境八〇〇　石塘 黎家橋二〇〇　迴塘 迴塘殿二〇〇

白雞塘 石亭一九〇　烏豬塘 廖家壠一〇〇　中塘 石亭二六〇　大金塘 廖家壠一〇〇　烟塘 董家橋一〇〇

河塘 官莊衝三〇〇　心塘 爛泥衝二〇〇　黃沙塘 午甲衝一〇〇　蕭家塘 午甲衝五〇　蘆角塘 馮家壠二〇〇

胡大塘 馬家壠五〇　蓬塘 馬家壠六〇　漣塘 馬家壠六〇　荷塘 九里衝二〇〇　南塘 南塘壠一〇〇

下川塘 石背嶺一〇〇　荊塘 荊塘八〇　三塘 大豪坪六〇　黃泥塘 檀山灣八〇　王家大塘 泗洲站一五〇

[illegible]婆塘 石灰壩七〇　椏株塘 白塘衝下首六〇　楓梓塘 楓梓衝一〇〇　白茶塘 南岸四〇〇　石板塘 南岸一八〇

[illegible]塘 桐梓山三〇〇　匡蒲塘 遐化鄉一二〇　新塘 袁家洲二四〇　小星塘 遐化鄉三〇〇　高沙塘 高沙洲五〇〇

上祠塘 上寶衝一〇〇　下荷塘 上寶衝一〇〇　花園塘 花園塘一〇〇　上大塘 下港五〇　下大塘 下港五〇

郭家塘 三門五〇〇　三石塘 鐵屎嶺三〇〇　蛟村大塘 蛟村四〇〇 以上西鄉　賀家塘 治北寨下一〇〇　新塘 烏石衝七〇〇

漣塘 蕭家衝八〇　螺絲塘 唐家衝尾一〇〇　三口塘 流碧橋一〇〇　白沙井 寨下冷水衝一〇〇　泉塘 斯陶坪李家衝五〇

淡泊塘 大屋壠一〇〇　新塘 唐家衝三〇〇　君臣塘 唐家衝一五〇　龜泉 唐家衝二〇〇　清水井 株樹下三〇〇

石塘 龍潭橋 二〇〇　石龍井 香爐山 三〇〇　沙井 楊家壩 五〇

泉井 大亭衙 二〇〇　橫塘 花草橋 五〇〇　方塘 花草橋 五〇　泉水井 譚家衙 一〇〇　窖坡井 車家壩 一〇〇

荷葉塘 劉家衙 二二〇　樂城塘 大源衙 三五〇　橫壩塘 小源衙 一〇〇　神仙井 石塘衙 六〇　東塘 夏平橋 三二〇

大灌塘 大灌塘 四〇〇　小灌塘 橫塘基蜡樹下 二〇〇　荷葉塘 板杉鋪 五〇　漢塘 漢塘 五〇　白鷺塘 中三洲 二〇〇

蜈蚣塘 鐵河口 一二〇　荷葉塘 新陽 二二〇　春塘 新陽 二〇〇　荷花塘 新陽淦背 五〇　社泉 新陽社泉 三六〇

栗塘 塘下衙 七〇〇　四方塘 花橋 八〇　橫塘 花橋 八〇　龍塘 花橋夏家衙 一三〇　間山塘 間山嶺 七〇

油榨塘 塘下衙 三〇〇　機塘 登上 三〇〇　帥家塘 花橋張家灣 五〇　鄢官塘 石羊 六〇〇　株塘 佛祖嶺 六二〇〇

魯塘 石羊魯塘冲 五三〇〇　五口塘 青泥灣上社 三〇〇　丫塘 青泥灣上社 三〇〇　湖塘 青泥灣 一五〇　槻塘 青泥灣 一五〇

陳家大塘 青泥灣 一〇〇〇　三角塘 龍窟洲 一六〇　牛嘴塘 清安舖師洲社 一二〇　藕塘 清安舖師洲 一二〇　鏡塘 青泥灣 二〇〇

龍塘 龍塘洲 五〇　高洲大塘 高洲衙 五〇　過路塘 蘇家壩 一〇〇　凌基塘 東埠衙 八〇　料塘 趙家堰 三〇〇

新屋大塘 漁潭洲 六〇　冷水井 清安舖橫塘壩 三〇　馬王井 梢岡舖 三〇〇　樟樹井 油田湴塘衙 三〇〇　放塘 東埠衙 七〇

胡家塘 東埠衙 五〇　半江塘 曉嶺 一〇〇　廟冲大塘 曉嶺 五〇　藕塘 喻家衙 一〇〇　桔木塘 東埠衙 五〇

新塘 梢岡舖新塘衙 七〇　清水大塘 丁家衙 一〇〇〇　楹株塘 檀木橋 一一〇　劉家塘 傅家衙 七〇　巫家大塘 巫家衙 三〇〇

絲竹大塘 絲竹衙 二〇〇　羊塘 羊塘衙 二六〇　社塘 大鄉衙 二四〇　鐃鈸泉 高沙 六〇〇　西塘 西塘洲 六五〇

松崗塘 松崗塘 三五〇　龍眼井 腰衙 一二〇　湖塘 湖塘 二五〇　潮塘 桑蘭衙 一五〇　月塘 月塘衙 三〇〇

以上北鄉

壩堰　縣境河流長而大者。澇江而外厥爲南河。其餘皆支流也。澇江自東鄉至澇口之攔口灘。爲壩一百二十有四。支流之壩在治東者八十一。在治南者一百三十二。在治西者九十一。在治北者一百。綜計凡六百五十二。蔭田不足五十畝或專爲舂泥榨油用者不與焉。椓木爲棧。雁齒排列。遇大水衝圮。修復之費不貲。耕者苦之。王家坊壩堰。獨爲圳溝長五里設閘二十有四。以時啓閉。蔭廣而均。壩費亦以省。是可倣法也。

本縣壩堰蔭田五十畝以上者列左 首縣河次南河再次支流小源匯流先後爲序

麻石壩 治東麻石 萍鄉上栗市水 接連十二座有筒車十六架 共灌田一〇〇〇畝
蕭家壩 馬家洲 萍瀏水 二〇〇
中合壩 馬家洲 一一〇
三元壩 馬家洲 一〇〇
鄒家壩 夾洲上 二一〇
陳家新壩 九子洲 二三〇
朱家壩 黃中壩 一二〇
陳家老壩 九子洲 二三〇
鄧家壩 鄧家棚 三〇〇
尖角壩 白兎潭 一五〇
老 壩 洙塘陂 二六〇
中 壩 洙塘陂 一五〇
下筒車壩 洙塘陂 一〇〇
高車壩 洙塘陂 一〇〇
吳家壩 洙塘陂 一〇〇
張家壩 襲家坊 一〇〇
洲下壩 下碼頭 八〇
猪婆石壩 潼塘 一四〇
謝家老壩 石千娘 一六〇
姚家壩 夏家坊 四一〇
四架車壩 夏家坊 四二〇
彭家壩 水口 一四〇
保豐潭壩 水口 一四〇
賴家壩 陳家坊 四〇〇
羅家壩 李家洲 一八〇
梁家壩 李家洲 二〇〇
洲腦壩 馬家山 四〇〇
白沙洲壩 佘家港 三五〇
雙車壩 普口市 一八〇
新車壩 桂花潭 一八〇
老車壩 榮家坪 二〇〇
柳仙壩 雲霧灘 二〇〇
矮車壩 河溪頭 三三〇
連四壩 箭竹山 六〇〇
矮洲壩 洪家灣 二二〇
張劉壩 洪家灣 二四〇
李鍾壩 溫泉 三〇〇
葉家壩 溫泉 二一〇
鍾家壩 溫泉 三〇〇
葉家壩 溫泉上車頭 一〇〇
五福壩 張家蓬 一六〇
下 壩 文家洲 一五〇
矮車壩 湯家灣 一二〇
蘇家壩 蘇家洲 一三〇
新車壩 蘇家洲 一二〇
劉家壩 爛泥洲 六〇
高車壩 鄒家灣 九〇
矮車壩 倒網灘 九〇
三勝壩 龍船洲 一五〇
靈官壩 幌市 一六〇
油埠壩 油埠社 二一〇
石嶺壩 石嶺上 一八〇
新 壩 滁石堰 三一〇
人字壩 金家洲 一五〇
高車壩 青龍菴 三一〇
狀元壩 高洲 一二〇
泥 壩 爛泥洲 一三〇
攔河壩 雙江口 滁水 二〇〇〇
蔡家壩 蔡家棚 一〇〇
天然壩 黃家洲 一〇〇
矮洲壩 矮洲上 一二〇
高車壩 牛丫洪 萍鄉水 二〇〇〇
上鄧家壩 牛丫洪 八一
下鄧家壩 牛丫洪 八〇
曾家壩 仙石灘 一〇〇
羅家壩 羅家堰 一二〇
楊家壩 楊家灣 一〇〇
熊家壩 失鯉浦 一〇〇
張家壩 潭灣 一〇三
上人字壩 潭灣 二〇二
下人字壩 荊潭 二〇五
曾家壩 荊潭 一〇三
葉家壩 丁家坊 二〇〇
張家壩 丁家坊 二〇〇
人家壩 丁家坊 二五〇
大 壩 丁家坊 五〇〇
馬頭壩 珊田衝 六〇
梓梯壩 高黃社 二三〇
上洲老壩 企石社 二〇〇
珊田壩 黃沙中洲 二〇〇
車蓬壩 黃沙東岸 一五〇
得勝壩 黃沙東岸 三〇
藍家壩 江東坊 六〇
連三壩 江東坊 二四〇
永壽壩 黃沙東岸 一三〇
張家壩 冷水壩 三〇〇
蕭家壩 冷水壩 一三〇
合興壩 狀元洲上 一二〇
半邊壩 鄧家渡 一六〇
神仙壩 大西灘 三六〇
鐘鼓壩 鄧家渡 三〇〇
螺絲峽壩 中三洲 三六〇
彩望壩 中三洲 三六〇
羅家壩 下三洲 三四〇

林家壩 下三洲 三〇〇
界陂上壩 治南界陂萍水石河 五六
刷子灣壩 金家屋塲 九〇
倉下壩 花草陂 九〇
矮子壩 謝家灣 八〇
新壩 清水江 八〇
老祠壩 楊模檔 五〇
土岸上壩 土岸上 五〇
下灣壩 下灣 六〇
黃沙新壩 黃沙洲 一六〇
上車壩 上車陂 一四〇
橋上壩 陽家坊 一二〇
楊柳壩 楊柳江 一七〇
壟坵壩 達洲上 二四〇
惜字爐壩 蛇湖 一一〇
窩盆壩 栗山 一一〇
廟嶺壩 栗山 一〇〇
連雲壩 台子上 泗水 二〇〇
灣頭壩 沈潭渡上 一五〇
滋塘壩 滋塘岸上 二〇〇
賴家壩 賴家屋塲 一二〇
李家壩 朱家灣 一〇〇
冷人壩 龍洲橋 一〇〇
鄧家壩 樟嘉園 二〇〇

醴陵縣志

永寧壩 石崖嘴 一四〇
新壩 石崖嘴 三〇〇
半江壩 鐵河口 一六〇
界陂下壩 治南界陂萍水石河 五〇
白菓壩 治南界陂萍水石河 五〇
廟前湖壩 曉煙湖 八〇
郭家壩 譚山衝 六〇
曹家屋塲壩 曹家屋塲 七〇
長坡岩壩 長坡岩 八〇
雙壩上壩 雙壩下 九五
雙壩下壩 雙壩下 六〇
黃埠洲壩 黃埠洲 七〇
老壩 清水江 八〇
清江下壩 清水江 五〇
淇陂壩 淇陂潭 五〇
羅家壩 堆上 九〇
明湖壩 明湖社 小春河 五〇
楊模檔壩 楊模檔 六〇
田頭陂壩 楊模檔 五〇
易家上壩 楊模檔 五〇
易家下壩 楊模檔 七〇
中壩上壩 中壩上 七〇
五甲壩 五甲嶺 一一〇
棧港壩 棧港里 一二〇
永古壩 鴨塘洲 一四〇
平塘壩 平塘灣 一二〇
卦坵壩 鹿浦 一三〇
下洲壩 下洲上 一二〇
江岸壩 江弦 一二〇
崩岸壩 何家嘴 一一〇
左光陂壩 左光陂 七〇
草墻基壩 草墻基上 六〇
漆家壩 新屋里 六〇
湖頭壩 湖頭潭攸水沙河 一二〇
退齡壩 德達嶺沙河 二二〇
楚玉壩 江邊洲 一二〇
怡恒壩 蕭家洲 一六〇
京春壩 京春洲 一三〇
洲里壩 洲溪 一三〇
江弦壩 栗山 一一〇
中洲壩 栗山 一三〇
下樟樹壩 栗山 一一〇
菱角灘壩 菱角灘 二〇〇
葵花壩 小龐田 二〇〇
榮家壩 榮家台 一二〇
樟葵壩 樟葵壩 一二〇
周家壩 麻杉嶺 二〇〇
巫家壩 樟嘉園 二〇〇
廖家壩 廖家灣 一〇〇
灘洲壩 桐梓壩右 二〇〇
潘家壩 潘家屋右 一三〇
鯉湖壩 樓下 一〇〇
劉家壩 牛鼻頭 一〇〇
和家壩 峴上 一〇〇
魏家壩 水府廟 一〇〇
雙車壩 泗溪橋 二〇〇
崔家壩 崔家屋塲 一六〇
老壩 樟葵壩上 一三〇
汪家壩 栗山 一三〇
泥善壩 栗山 一三〇
灣壩 灣頭 二〇〇
老壩 沈潭渡下 二〇〇
車上壩 新田渡上 二〇〇
黃家洲壩 栗山 一二〇
大灣灘壩 栗山 一一〇
何家壩 蛇湖 一一〇
何家壟壩 蛇湖 一一〇
惜字爐壩 蛇湖 一一〇

家壩	廖家灣	一〇〇	顏家壩	中洲上	六〇	上車壩	中洲上 一〇〇
中車壩	上車下	八〇	下車壩	朱家壩上	六〇	朱家壩	龍山港上 二五〇
新壩	蛟湖壠	七〇	上洲壩	蛟湖壠中	五〇	下台壩	蛟湖壠下 五〇
凌家壩	鵝公洲	八〇	顏家壩	豆田	六〇	橫壩	豆田 二〇〇
神壩	豆田	一〇〇	謝家壩	貓子口	九〇	何家壩	鴨婆洲 九〇
新壩	治西唐家渡泗水	一三〇	老壩	山口	九〇	新車壩	山口橋 六〇
老車壩	廖家棚	五〇	矮洲壩	廖家棚	五八	靈官壩	廖家棚 六六
左車壩	廖家棚	五七	藍家壩	范槎洲	八〇	王家壩	范槎洲 八〇
張家壩	石塘	二四〇	左家壩	雙滂	八〇	姚家壩	雙滂 一六〇
周家壩	湖下	六〇	徐家壩	湖下	六〇	許家壩	湖下 六〇
楊家壩	湖下	七〇	龍虎洲石壩	龍虎洲嘴五〇以上南河水		窰洪灘夾壩	鐵河口下淥江 三六〇
鍾家壩	江邊山	三六〇	袁家壩	江邊山	三六〇	船廠壩	松陽渡上面 三五〇
白石灘壩	火燒廟	三〇〇	沈家壩	易家渡	三六〇	易家壩	青泥灣 四〇〇
文家壩	李家渡	一〇〇	鄭家壩	夏湖田	一二八	傅家壩	傅家街子 一四〇
渡口壩	石亭	八〇	新壩	漁潭下洲	七〇	老壩	王浦灣 七〇
神仙石壩	攔口灘三二〇以上淥江水		大牙壩	治東水岸祠萍水	八〇	老壩	柏莊楓梓神前雪嶺水 三一〇
孟陂壩	孟陂口	二二〇	王家壩	水口山荷田來水	六〇	門邊壩	水口山 五六
莊家壩	水口山	七〇	周光壩	水口山	五八	荷子壩	水口山 八〇
白洲陂壩	水口山	五〇	湖家壩	彭家洲洪源冲水	二〇〇	高梁壩	峽山口 二〇〇
上石壩	塘衝 三竅塘水	五六	下石壩	塘衝	五六	樂蛟壩	官寮山栗樹下 三〇〇
早禾壩	官寮易祠後	一〇〇	曹交壩	官寮塔下	八〇〇	石壩	清水潭洪源衝水 一〇〇
揚長壩	清水潭	一〇〇	沙壩	清水潭泉山下水	四五	下油舖壩	櫟塘廟上 四六
大閘壩	櫟塘廟上	三四〇〇	小壩	洙陵陂三竅塘水	三四〇	高壩	洙陵陂 三四〇
石干娘壩	石岸境嶠嶺來水	五四	犖确壩	石岸境	五〇	划水壩	石岸境 五六
上梅橋壩	泉山境	一三二	下梅橋壩	泉山境	一七二	沙壩	泉山境 五二
新壩	泉山境	五三	菱角壩	泉山境	五六	三口壩	仙石彭家衝來水 八一〇
羅家壩	仙石	六〇	烏石壩	仙石	六一	黃坊壩	仙石 六二
泉水壩	塘下里	六〇	合水壩	塘下里	五八	高壩	塘下里 六四
夏家壩	陳家坊	六一	李陳壩	陳家坊	六〇	嚴公壩	陳家坊 五八
中洲壩	陳家坊	六〇	古塘壩	王家坊泮川衝來水	三二〇〇	青山壩	灌衝鯉魚衝來水 六〇
遲禾壩	灌衝	五四	過路壩	灌衝	五一	石橋壩	灌衝 一二〇
三砂壩	灌衝	四二〇	藍田壩	馬頸坳下李家山來水	三四〇	新菴壩	王仙天濟寺 一〇二

馮家壩 觀口 一〇三
六合壩 王仙 四〇〇
大橋壩 王仙 二〇三
石　壩 大灣七坵田來水未詳
老虎壩 鄧家灣 未詳
陳家壩 陳家灣 一四〇
鰲綠壩 王仙 李家山水 一〇四
李家壩 王仙 二〇三
傅家壩 王仙石壁下 一二〇
唐家壩 野鷄灣 未詳
大汾壩 王仙 二〇〇
鍾家壩 大汾壩 一五〇
蜈蚣壩 螺頭山 一七〇
灌皂壩 老仙廟 二〇二
蘇家壩 洪橋 一〇〇三
黃竹壩 黃竹壩尖高山水 二〇〇
小林壩 白石口漏水坪水 二〇〇
大林壩 大林橋老鴉山水 二〇〇
中林壩 大林橋 五〇
龍潭下壩 龍潭 三〇〇
鴛鴦壩 清潭橋 三五〇
迎欄壩 莊埠 七〇〇
喻家壩 莊埠 三〇〇
龍潭上壩 龍潭老鴉山漏水坪水匯三〇〇
新　壩 治南插嶺關下萍鄉黃岡鎮水五〇
犬形壩 大壩上 六〇
大　壩 楚東橋 一〇〇
三砂壩 黃洲坪 三〇〇
新　壩 桐橋 二〇〇
上滾子壩 高橋下壩水 金溪一五〇
下滾子壩 大溪橋 二〇〇
黃泥塘壩 錫福橋 一〇〇
羅家壩 高崗衝水 石陂湖八〇
賴家壩 高崗衝 六〇
高岡壩 西山 老虎岩水七〇
蛇　壩 爛泥冲 本冲水五〇
甕橋壩 竹山下 五〇
棟清壩 碧山嶺口 三〇〇
王家壩 東堡 瀉山水 一〇三
鵝公壩 瓦子山 六〇
石　壩 吳家灣 二九〇
戴　壩 戴仙橋 二六〇
文家壩 馮家灣 一五〇
新　壩 薛家灣 五二
陳家壩 龍神廟 一二一
官陂壩 湯家老屋 二〇三
凍陂壩 東堡 五〇
猴陂壩 東堡 六〇
大　壩 治北 五里牌 二三〇
石家壩 治北 七二〇
羅家壩 治北 一五〇
小　壩 治北 一五〇
蘆茅壩 治北 柘塘坪水 二六〇
彭家壩 治北 一五〇
唐家壩 治北 三四〇
中大壩 吳家堰 檳牌鋪水 一〇〇
下大壩 吳家堰石門口水 一五〇
茅陂橋壩 石塘菴吳家堰石門口水匯二〇〇
小河陂 蛇湖境長嶺冲牛角塘水 一〇〇〇
龍虎陂 蛇湖境雙塘冲水 六〇
車頭陂 蛇湖境 五〇
班山陂 蛇湖境 四〇〇
餘富陂 栗山境 一〇〇
顏家陂 栗山境 二〇〇
象形陂 栗山境 五〇〇
新　陂 楠木橋水 鑿石源 二〇〇
石　陂 嵩歸台 三〇〇
橋下陂 賀家橋 二〇〇
土　陂 文郎屋塲 一〇〇
泉水陂 文郎屋塲 一〇〇
石　陂 新屋冲 一〇〇
大　陂 賀家橋 四〇〇
叢木陂 劉江岸弦 一〇〇
新橋陂 雅鷹 二〇〇
竹官陂 賀半上境 二〇〇
歐　陂 賀半上境 三〇〇
廟　陂 十主廟 二〇〇
駕黃陂 熊家灣 一〇〇
陳家陂 蔣家嶺下 一〇〇
大陽陂 賀半上境 四〇〇
大　陂 石獅口 三〇〇
田心陂 田心陂 一〇〇
神仙陂 神仙陂 一〇〇
頭　陂 寺林 一〇〇
妙　陂 妙泉 一〇〇
香花陂 妙泉 四〇〇
石　陂 龍船橋 四〇〇
界　陂 東邊境 四〇〇
漕　陂 東邊境 四〇〇
東塘陂 東塘 一五〇
西流陂 南屏山 一六〇
山水陂 羅家口 三〇〇
新　陂 羅家口下 四〇〇
頭二陂 達三江口石筍冲水 二四〇
富卿陂 彭家園 一三〇
皂莢陂 水口山 五〇

楓梓陂　梅英第　二〇〇
土　陂　謝家橋　四〇〇
橋達陂　汪家橋　一〇〇
曹陂壩　北岸　汪家壩水匯　六〇〇
東塘陂　北岸　五〇
西律陂　塘村　五〇
海螺壩　雙江橋汪家壩賀家橋水　四〇〇
筒車壩　江下灣　一六〇
木　壩　吳家老屋　一九〇
樓下壩　陶家壩　一八〇
淇陂壩　淇田　四〇〇
山陂壩　淇田　五〇
甕　陂　淇田　七〇〇
永濟壩　符田　六〇〇
官陂壩　符田　六〇〇
和尙潭壩　符田　四〇〇
羅家洲壩　符田　五〇
老子潭壩　符田　五〇
暮陂壩　茂田菴前賀家橋汪家壩水八〇〇
溫家壩　茂田菴後　二〇〇
出水潭壩　茂田高橋下　二〇〇
長流洲壩　茂田觀音閣後　六〇
江家壩　江家屋塲　八〇
龍潭壩　龍潭里　一〇〇
泉井壩　蛇形嘴水　新大塘　六〇
松木壩　泉井壩下　八〇
樟樹壩　水口里　五〇
十罐壩　新屋里　五〇
石頭壩　杉仙林水　新大塘楓　二〇〇
王公壩　東源村大平菴香爐冲水　三〇〇
湖陂壩　湖陂　溫泉塘水　一〇〇〇
周家壩　嘉樹下　王家壩水　一〇〇
朱公壩　青龍橋下　杉仙水　一四〇
永斗壩　望公祠　西塘水　五〇
花園陂　羅冲　一四〇
中　壩　丁家橋下　丁家橋水　一〇〇〇
大　壩　瑞秀橋下　萍鄉官橋水　五〇
矮子壩　彭家壩　五〇
五公壩　廟前　五〇
老丫壩　夏家橋上　五〇
亭淮壩　謝家橋下　六〇
少淮壩　新塘橋下　六〇
黃邱壩　黃邱陂　五〇
馬頭陂壩　馬頭陂官橋山口里水　五〇
石岸壩　石岸下　五〇
廠下壩　廠下里　一五〇
火造壩　下新坊　大西塘古董塘水　五〇
法家壩　下新坊　三五〇
小陂壩　下新坊下　一〇〇
譚家壩　石灣　六〇〇
龍虎壩　石灣　七〇
李家壩　李嘉村鴨塘港水　六〇
洪毛壩　串邊垇　五〇
土王壩　串邊垇　五〇
田家壩　田家壩　五〇
一　壩　何家壩　八〇〇
二　壩　何家壩　八〇〇
三　壩　何家壩　八〇〇
四　壩　何家壩　八〇〇
五　壩　何家壩　八〇〇
爾章壩　獅冲　獅冲水　一〇〇
柳樹壩　煌公祠下　五〇
土王壩　過駟橋　東富三星水　六〇〇
謝家下壩　過駟橋　五〇
榮華壩　三星　易家橋水　五〇〇
謝家上壩　三星　六〇
金星壩　謝家壩下　五〇
榮升壩　夏家坊　一〇〇
龍灣壩　東富　甚泉嶺水　一〇〇
大　壩　王家壩　黎煙塘水　五〇
龜山壩　大塘　五〇
公家壩　圓壽橋　五〇
大　壩　隴山里　三〇〇
黃龍壩　梅筱下境水　小港　七〇
担水壩　梅筱下境　五〇
石　壩　治北楓林市村水　黃二〇〇
中　壩　南山灣　蕉源水　二〇〇
玉池壩　石坪灣　二〇〇
担水壩　石坪灣　六〇
黃土壩　九房門首　一〇〇
井頭壩　六房門首　蕉源黃村水　四〇〇
瞿家園壩　龍山橋　四〇〇
木魚嶺壩　龍山橋　三〇〇
洞溪壩　小洞塘洞塘水　西林小　一〇〇
陳家壩　蛟湖壩水　戒定菴　五〇
石陂壩　治西唐家渡圳山口里都堂六冲泉源　三二〇
劉家壩　夏家坊　二〇〇
周家壩　龍山舖水　石成金　二〇〇
船灣壩　龍山舖　五〇
石　壩　龍山舖　五〇
案山壩　張果皂水　八〇
章仙壩　蔣家灣　二〇〇
奉先壩　蔣家灣　一〇〇
鈎子壩　蔣家灣　一〇〇

名	地	水
周家壩	未詳	二〇〇
皮家壩	長嶺灣	二〇〇
等子壩	金橋灣	一〇〇
觀音壩	伍家橋建安山孫家冲水	一〇〇
黃土壩	新屋街子漆家坳水	三六〇
夾圳壩	劉家圳	三〇〇
窰下灣壩	新陽小河水	一〇〇
雷家壩	簡家冲	一〇〇
大壩	壩灣打牛嶺水	五〇
樟樹壩	姚家壠新站	一〇〇
烏珠壩	篾織街蔣家橋水	四〇〇
檀山壩	石橋舖	五〇
石壩	劉家灣口	一六〇
大壩	丁家橋旁山水	一〇〇〇
蔣家壩	八步橋唐家冲水	一〇〇
易公壩	伍家橋建安山孫家冲水	一〇〇
泉水壩	板杉舖橫冲燕冲來水	一〇〇〇
楊家壩	陽西坪下	三二〇
耿境壩	耿境眞人山錫家壠水	一〇〇〇
湖潭壩	簡家冲	三〇〇
蘇家壩	川井壠東方冲水	三六〇
蘇家壩	姚家壠新站	一二〇
同心壩	沙窩里蔣家橋流碧橋匯水	一八〇
柳樹壩	石橋舖	五〇
蝦蟆壩	德州灣	八〇
石壩	丁家橋	五〇
檀樹壩	八步橋	二〇〇
下圳壩	黃鱔冲	一〇〇
大石壩	大石橋	三七〇〇
賀家壩	嘉木橋	二〇〇
黎家壩	簡家冲	五〇
高家壩	花橋流碧橋水	二〇〇
吳家壩	桐木冲水	七〇
曠家壩	梢岡舖月形山下烏石冲打卦石水	三〇〇
恢復壩	沙窩里	二〇〇
石壩	石橋舖	七〇
官壩	長嶺灣	四〇〇
大壩	大壩嚴家冲水	一〇〇
黃土壩	大屋壠淡泊溪水	二〇〇〇
石壩	貓眼井	一二〇
三砂壩	宋家冲桐子塘水	六〇〇
石壩	回頭山	二〇〇
羅家壩	簡家冲	一〇〇
洪仙壩	花橋托家灣	三〇〇
姚家壩	姚家壠	二五〇
油田壩	油田爛泥冲及冷水泉源	五〇〇
石橋壩	石橋舖	六〇
雙石壩	攸塢	七〇
新陂壩	攸塢水匯	一〇〇
黃竹壩	冷水	七〇
丁公壩	攸塢	八〇
石頭壩	均源村水	六〇
江溪壩	均源村	六〇
老大王廟壩	檀山橋黃田水	六八
高車壩	鍾家山	五〇
神山壩	青泥灣中社東埠冲水	一一〇
油壺壩	深坑	五〇
董家壩	廖家壠	二五〇
紅土壩	楠竹山	三〇〇
胡家壩	學堂門前牛王坪柴塘水匯	五〇
墨陂壩	攸塢	二〇〇
新岸壩	江富村	八〇
盧公壩	攸塢匯水	一五〇
石嘴壩	均源村	六〇
雙江壩	大石冲	四八〇
丁家壩	雙板橋	五〇
担水壩	大溪壠	七〇
南衝上壩	大南冲獅形大南冲水	一〇〇
楊梅壩	姚家灣上首南冲東冲西冲水匯	五〇
文家壩	文家灣	二〇〇
曹家壩	蕭家壠	二〇〇
丁家壩	顏家老屋門首	一〇〇
文家壩	文家壩奔岸冲長茅洞齋江水	一〇〇
牛形壩	江富村	五〇
大壩	集體鄉	一〇〇
廟壩	均源村	六〇
石頭壩	石雞頭	八〇
黎家壩	鍾家山	五二
黃土壩	大溪壠牌冲水	九〇
私源壩	門閂嶺牌冲水	六〇
胡家壩	黎家橋水	三〇〇
中秋壩	水口山	三〇〇
黃壩	黃壩灣	三五〇
曹家壩	老虎坪	三〇〇
賀家壩	文家壩	一〇〇
宋家壩	揚谷坪冲水	七〇
早禾壩	早禾壩	七〇〇
孫家壩	均源村	六〇
老壩	老壩頭樓架均源等村水	二〇〇〇
鄧家壩	鍾家山	七〇
靈官壩	靈官橋黃田石牌冲深坑水匯	七〇
南衝口壩	南冲灣口獅形大南冲水	二〇〇
門前壩	保家樓	三五〇
江園壩	楠竹山	二五〇
實竹壩	排口衝水	五〇
上壩	程祠門首南坑牛王坪水匯	一五〇

下壩 程祠門首 一八〇
紫草壩 下港 野雞壠水 一〇〇
石劣壩 長冲中爪 二〇〇
石山壩 老屋塘 一八〇
神山壩 港背壠 一〇〇
迎江壩 寺下灣 黃塘水 五〇
高家壩 雙牌舖 書坊冲水 六〇
陳家壩 寶塔壠 八〇
沙壩 沙壩壠 一二〇
扶起壩 趙家嘴 九〇
張家壩 橫廈橋 書坊冲石子頭水 一八〇
石壩 黃竹衖 六〇
茅家壩 易家灣 橫廈橋水 四〇〇
雙江壩 曉嶺 橫廈橋水 三〇〇
新壩 橙頭市李家灣黃泥塘水 一〇〇
老壩 橙頭市李家灣 八〇
富家壩 張公嶺 九〇
新石壩 鑿斷灣 張公嶺水 六〇〇
高田壩 曉嶺 六〇〇
楊柳壩 曉嶺 七〇
大江壩 曉嶺 一〇〇
泉水壩 胡家壠早禾冲陶家壠水 一六〇
龍家壩 龍家壩 門口嶺水 八〇
大壠橋壩 大鄉冲三聖石青山 狗思梅橋水 三〇〇
顏家壩 大鄉冲三聖石青山 狗思梅橋水 二〇〇
黃家壩 陌公爪青山狗思梅橋水 二〇〇
簡家壩 陌公爪 長山坳團山水 三〇〇
黃家大壩 黃家港鐵山團山水 三〇〇
何家壩 黃家港 二〇〇
均壩 黃家港 七〇〇
黃土壩 茶亭 月塘冲水 一二〇
大壩 大壩橋 袁家塘水 一〇〇
鍾家壩 周家坊鰲家山玉壩冲等水 五〇
王家壩 周家坊 五〇
夏家壩 殷家冲 一〇〇
寺前壩 殷家冲 一〇〇
豫章壩 殷家冲 一〇〇
譚家壩 殷家冲口 一四〇〇
曾家壩 殷家冲口 二三〇〇
江西壩 番王洲 一〇〇〇
徐家壩 君子橋下 五〇〇
黃土壩 唐大境陳家灣小南冲文家冲水 三〇〇
大壩 楊家台 敖家山與上列三水匯 二二〇
沈家壩 唐家壠樓下灣 一二〇〇
墨陂壩 樟樹灣 敖家山鴛橋寺水匯 一八〇〇
王家壩 黃谷田 五〇〇
吳家壩 黃谷田 五〇〇
黃谷壩 黃谷田 七〇〇

荷葉壩 夏壓冲 萬冲夏壓冲水 三〇〇
晌水壩 馬軍鄉一保 五〇
雙水壩 馬軍鄉一保 六〇
石岩壩 馬軍鄉一保 一〇〇
窰前壩 馬軍鄉一保 一六〇
楊家壩 馬軍鄉一保 一五〇
新屋壩 馬軍鄉十三保 六〇
丁家壩 馬軍鄉十三保 六〇
賀家壩 馬軍鄉十三保 一五〇〇
周家壩 周家灣 軍山周家灣水 三〇〇
實竹壩 寶塔嶺 六〇〇
靈官壩 李婆塘 六〇
馬家壩 李婆塘 一二〇
曹家壩 馮家灣 二〇〇
新江壩 馮家灣 一二〇〇
廟洪壩 茶園湖 二四〇
西江壩 馬洲上 三〇〇
曲下壩 馬洲上 三〇〇
毛家壩 造水塔 三〇〇
石壩 洲上至望東橋經毛坪入昭陵湘江 四〇〇
廣通壩 鵝頸 橫江水 一〇〇
劉家壩 官莊 黃絲坑橫江水匯 五〇
港通壩 官莊 六〇
橫壩 官莊 二〇〇
桐子壩 官莊 六〇
靈官壩 官莊 六〇
欄橋壩 官莊 六〇
陳家壩 磨盤洲 五〇
長潭壩 長潭至春江橋入瀏陽界 一〇〇

肥料

凡百種植。必令滋養無缺。始克遂其生成。土壤也。大氣也、雨水也、皆直接間接以供植物之養分也。而其最要者厥爲氮燐鉀三種。肥料富有此三種要素。施之於土壤。以補其不足。植物生活細胞中之原生質。即賴以滋生。而天機暢矣。特其品類不一。成分互殊。而植物所需之質與

量又各因種類而異。農產物之收穫。必於其施之當否判豐歉焉。邑人勤於農事。習用之肥料。率本老農老圃之經驗。亦常有合於近世農學家言。惟不明配劑之方。往往所得不逮所耗。是當根據學理以力求改進者。輪栽之法盛行於歐美。蓋利用甲種植物遺留土中之質。以供乙種植物之攝取。可以省肥料。辟蟲害。增收益。邑中雜糧蔬菜之種植亦有行之者。惜未能遍也。

人糞尿　人之食物較一般動物爲優。故其排泄物含氮化物最多。溶解土壤之性特強。實爲本縣肥料中之最主要者。（城市之糞優於鄉村。則因肉食者。其糞多含肥分也。）冬至前後田家紛紛向各地收買。貯之窖中。覆以茅稈。使之發酵。表面呈綠色。以備明春耕作之需。（陳者較新鮮者爲優。）於臨用時和以汚水或猪尿水。潑諸畦中。或拌以柴灰。（謂之窖灰。隔宿即用。）施於稻麥蔬菜發芽之際。（菜苗黃萎者澆以尿水即轉青。）民國十四五年。外商有運肥田粉以賤值輸入邑中者。試之良佳。逾年不用。竟一變而爲瘠土。農民乃動色相戒。仍恪守其以屎尿爲肥料之成法。（日本農民以含有多量有機物之粘土。待其乾燥。碎爲粉末。而後注加糞尿攪拌之。使適量濕潤。及再乾燥。則再注再拌。如此數回。粘土所吸收之肥料已十分飽和。於是製成團塊。外更和以三分之一木炭。此法既便施用。又易於輸送遠地。可倣法也。）

牲畜糞尿　猪之糞尿多於他畜。且能疏鬆土質。故施肥於稻作時。人糞尿常與猪糞尿並用。（純用人糞能使粘土益粘。）牛糞性冷。土壤溫暖輕鬆者宜之。羊糞馬糞性熱。土壤冷濕重粘者宜之。牛欄中墊以稻稈。（羊欄多墊以煤灰。以其惡濕也。）聽其踐踏。使之與屎尿混合。數日後取出而堆積之。使之酵化。是謂之廐肥。其功效比單獨施用者爲勝。（施之於農作物。可使其根莖肥大堅實。種芋尤佳。）耕田較多之戶。常別造茅屋。堆積廐肥。以防雨雪之侵入。及日光之直射。

隨時取用。（貯藏最久不得逾五六個月。否則內部發惡臭。氮素必損失大半。）普通農家多於出廐後即移置塔中。與堆肥混合。而勤翻動之。亦甚簡便也。（雞糞含氮燐最多。鴨糞次之。鄉間大都雞鴨同塒。下墊炭灰或鋸屑。蓋二者皆善吸收水分。清潔畜舍。膨鬆土質。而鋸屑含有機物質尤多也。）

錐形。四圍鑿溝。以避雨水侵入。（以三砂鋪地左右分爲二間。中開一溝。溝端設有溝池。土壁之旁。均開小溝。此爲最完全之構造法。鄉村尚不多見。）又植樹或高粱包粟於其傍。以避日光。時取其滲出之汚水。注加堆上。調其燥濕。（大燥則內部發熱而燃燒。大濕則三成分爲水溶化而散去。）上下攪拌。（約二十日行一次。）待其腐熟。久之取出。即成良好肥料。（牲畜糞尿統稱廐肥。初從廐中取出者。宜用於粘濕之土及成熟腐爛者。多施於重粘土。腐熟者宜施於成熟之植物。）

期短之植物。

骨肥　邑中向所罕用。惟間將牛猪骨燒成炭。舂碎拌灰。施之冷水田中。收效頗著。

魚肥　邑人未嘗用魚作肥料。惟間有將剖魚之水傾諸汚池聽其自腐。畜魚之塘。塘底恒有黑泥。濃且厚。爲魚糞與植物淤泥之混合物。三年一易。移置田土中。所植必倍蕃其肥可敵麻枯。（以剖魚之水澆蘭。可使葉茂不生蟲。）

血肥　血液居動物體重十分之一。內含多量之氮。農家於屠宰家畜之際。常將其血傾入人糞池中。或使吸收細土與木炭等。令其腐敗而後施用之。

綠肥　本縣農家多於秋分後播草子油菜種於稻田中。至翌年春則碧綠如茵。小葩怒放。犁而覆之。即成最佳之肥料。又刈野草萃葉或灌木嫩枝。於田中作塹漚之。以時翻動。俟其盡呈黑色。即散佈於全坵。謂之漚塹。

菸葉　種翻子者。多捲製成團。拆禾下。其成分含燐酸最富。菸蒂尤多。故其功效不僅殺蟲

豆肥　用大豆久浸。俟其發酵腐化。即成肥料上品。（種蘭者用之。）

堆肥　爲雜物質肥料。如其中多爲新鮮植物。亦可稱之爲綠肥。農家常於屋側掘坎爲塹。納庖湢汚水及屋中垃圾。隨時將雜草落葉豆苗藁稈鋸屑木灰等傾入。並混以廢棄之動物糞尿。及各種之鑛物質使之腐化。如顯乾燥。即注加汚水。攪拌數回。務令全部腐熟。（凡有機物必令腐熟。否則有害於植物之根。且爲害蟲病菌寄生作物之媒介。）

藁肥　凡稻麥荳類已腐敗之莖幹。皆有改良重粘土爲輕鬆之功能。農家往往取其新鮮者作爲蓐草。或牛羊之飼料而後用之。蓋屋經年之陳稈。散佈於田中。能使禾苗勃興。其爲廚室烟薰而陳久者。尤有殺蟲之效。又用稻稈燒灰亦爲重要肥料。

燒土　當春初或深秋。鋤雜草苔蘚。並將土壤表層之泥土。（輕輕削起。厚約二三寸。）曝乾堆積上覆以薪引火燒之。令成煨燼。過數日即可用。俗呼火土灰。普通多於秋分後預製之。燒後攤開使之日晒雨淋。篩去石子。堆積待用。春日施之於種豆及少有機物之粘土。則易生根。（燒土能使土壤間之分子膨脹。使土壤中肥分變化爲可溶性。以適於植物之吸收。並可殺滅害蟲與卵粒。燒除雜草。其效甚著。）

柴灰　本縣農村所採之薪。什九爲松葉。其次爲小灌木。又其次則爲茅草。故燃燒所餘之灰。除氮已散失外。內含鉀與燐酸石灰質甚多。以之混入人糞尿或肥堆中而施用之。輒爲重要之肥料。土人總稱之曰灰糞。或柴灰。厚八九寸。灰與糞相間疊至數層。堆積十餘日。澈底翻動拌勻後。成圓錐形。或間澆以尿糞。閱十餘日再翻拌一次。則全部腐熟而成灰。堆置勿動。不令受雨濕。於取用之前二日。略晒半乾。用猪糞尿拌勻。窖一日。即成灰糞。其功用不亞於人糞。或云此法缺點頗易致氮素耗損。炊竈上層所積之炭煤。一稱百草霜。殺蟲之力尤強。惟性大烈。僅於春寒料峭。秧田催青時用之。普通施用。必與尿水或堆肥混合。使成液體。

油粕　卽榨取植物油所賸之殘渣。俗稱爲枯。是爲濃厚肥料。其含油多者。不易腐化。宜和堆肥以俟其發酵而後用之。或浸諸糞池中。芸薹粕卽菜枯。近年產量頗饒。人爭購用。桐枯多用之於浸冬田。及種薯種菸。菜枯燒灰。於晚稻發生車兜蟲時插之。良效。荳枯麻枯棉枯非本地產。惟近湘潭一帶稍有購用者。他如豆腐渣酒糟糠粃之屬。皆以之飼猪。無直接用作肥料者。

藍渣　卽藍葉製靛所剩之渣滓。含石灰甚多。置之糞池中漚三四日。卽腐熟而爲肥料。邑中惟漏水坪李家山等處有之。

垃圾　垃圾中含有機物甚多。取之於城市中者更佳。或漚諸塘中。使之腐化。或堆積燃燒。令成灰分。均可改良土壤。爲有益之肥料。

溝泥　大部分含腐朽之有機物質。夏時取用。可增土壤肥潤。助植物之生長。陰溝中者更佳。

石灰　農作必用石灰。已成通例。石灰爲間接肥料。其變化土中有機物質。及諸不溶解之物質。中和腐敗之酸性。解除各種之鑛毒。均比其他肥料特強。不僅以殺滅害蟲枯死雜草輕鬆粘土見長已也。然失之濫。則土壤成分盡被吸去。卽變磽瘠。又有機物缺乏之地。亦非所宜。

本縣通用之肥料。僅此十餘種。大部分皆動植物質。含水與有機物最多。至含氮燐鉀三要素成分。各有等差。

本縣耕耘收穫及灌溉用具。概爲舊式。農業進化。允宜採用機器。藉省人工。椎輪爲大輅之始。用縷記之。以諗將來。

名稱	用途	附記
生胚犁	第一次犁硬田破土塊	嘴尖銳爲三角形以鋼鐵製之即耜也嵌曲木柄謂之耒俗呼犁轅
耖田犁	第二次犁田	鐵製較小
老耙	第一次耙田	鐵製齒粗而長排列如梳
橫田耙	第二次耙田	鐵製齒短小而密
牛舌鋤	鋤田	鐵製圓口上南鄉用者較多
方口鋤	鋤田修整田岸	鐵製亦稱鋤頭各鄉通用
鍬	鬆土散肥	鐵製有四齒俗稱耙頭齒方惟西北方用扁各鄉通用
蝙子	插灰前用	一稱畫子用木製小輪盤十枚排列一尺二寸等距離畫格泥上
橫田耙	第二次耙田	鐵製齒短小而密
老耙	第一次耙田	鐵製齒粗而長排列如梳
耖田耙	第二次犁田	鐵製較小
生胚犁	第一次犁硬田破土塊	嘴尖銳爲三角形以鋼鐵製之即耜也嵌曲木柄謂之耒俗呼犁轅

名稱	用途	附記
硬鐮刀	刈草用	似柴刀而小用以刈草
藍插子	栽藍用	鐵製尖嘴長尺許闊二寸短木柄用時深插入畦土中然後以藍種隨插植下即抽出倒其柄令緊種疏亦適用但其插型短而柄闊
手滾子	耘田去草	木製一人持之向前推行清光緒初年始有試用者近年遍及於東北鄉普通耘田植杖而運用足蹴俗呼耒田耒讀若來
大滾子	插翻子前用	硬木製亦有用鐵者僅插翻子處用之
籐索	拖牛	用糯禾稈搓成
簑衣	禦雨	櫻製
拖盆	撒塏肥	木製
晒穀坪	晒穀	多用三合土製亦有用牛糞調人尿敷於泥上爲晒穀用者
打衣耙	去禾衣	六長齒
小盪耙	晒穀	木製無齒

名稱	用途	附記
鉤鐮	刈草	似柴刀而小用以刈草
禾鐮	割禾	鐵製有尖嘴方嘴之別
茅鐮	草刀	鐵製
禾架	架禾担之登塲	竹木製
禾桶	打禾	木製圓形徑四五尺
扮箝	打禾時環竪桶緣	竹製
禾棚	打禾	厚竹皮橫排十疊
耘田刀	耘田	鐵製
牛衣	天寒雨雪覆牛背	櫻編
斗笠	禦雨	箬葉編
籮筐	挑穀	竹製
晒簟	晒穀	篾編

名稱	用途	附記
糞杓	施肥	大者木製一稱糞斗小者截竹爲之
糞桶	施肥	木製
溝泥擢箕	插灰	竹製
灰船	插灰	木製
堯鋤	開壟	鐵製無齒
羊角耙	破土塊	鐵製二齒如羊角
小鬆耙	鬆土	二齒三齒不等
溜耙	於插秧前耙田	木架竹齒

大盪耙	收穀	木製無齒
大掃帚	晒穀	竹枝編
風車	去穀之虛浮者	木製
糠碓	舂糠	木身鐵嘴爲杵杵頭嵌方石臼用石製
糠篩	篩糠	竹製
夾篩	去碎米	竹製
研子	研米研糠	用牛或水力
龍骨手車	輓水灌田	木製身長一丈許削木爲葉中貫以轂節節相銜如龍骨然
牛車	同右	製同手車惟另造大輪用牛曳之旋轉覆以茅亭
脚車	同右	製同手車有架可坐二人
筒車	同右	輪徑數丈周圍綴以竹筒湍流激輪晝夜自轉筒俛舀水上昂則瀉以槽承之注於溝洫
翻穀耙	晒穀	竹齒
穀篩	去禾葉	竹製
礱	去穀殼	俗稱推子以黃土及硬木片爲之
米碓	舂米	石臼木杵石嘴
米篩	篩米	竹製
大欄盤	篩米	竹
土車	運穀及其他農作物	木製輪小脚矮
柴刀	砍柴	鐵製
鈎刀	砍柴	鐵製
鋸	伐木	鐵製
斧	析薪伐木	鐵製

稻

宋仁宗遣使航海。賫早稻萬石于占城。國名。今安南南部地。分授民種。其種與熟俱早於常稻。後又輸入翻子。即番子。因來自番國故名。于是地不必熱帶。田不必膏腴。皆歲可二熟矣。邑之農勤于東作。通治二熟禾雖間亦有蒔中稻糯稻爲一熟者。特百分之一耳四境之內。土質不一。氣候水性。又山谷與平原異。故佳種有宜於此而不宜於彼者。亦有以數年一換爲佳者。乃紛爭求諸外。而試種之。以至稻之品類。迄今益繁。綜計凡七十有五。增於同治志所載四倍焉。

名稱	類別	別名	播種期	分秧期	成熟期	特性	栽培區域	附記
早稻	五十早	五月早 茶花早	清明	穀雨	大暑		各鄉皆種早稻晚稻兩種可備水患崇阿高麓可耕	見同治志
	黃泥粘						之處皆插早稻因春天雨水足故也	仝右
	麻殼早	麻殼粘						仝右
	矮子粘							仝右
	沙雞粘							仝右
	葉下園	葉下黃						穗在葉下
								仝右

鬚芒粘	西黃粘			穗短		新輯
竹葉早				穀短而圓		仝右
紅脚瀏陽早			大暑		東鄉多用之	仝右
白脚瀏陽早			立秋			新輯
黑脚瀏陽早			大暑		東鄉多用之	仝右
藍脚瀏陽早			立秋			仝右
獅毛粘						見同治志
中稻						
二樣早		穀雨 立夏	處暑	中稻一次收成足抵早晚稻兩	西北兩鄉沿河一帶多水患故每插中稻飯香軟	仝右
等秋黃				次		仝右
高洋白						
大葉早						
觀音秈						
湖北早						
斜八石				穗長稈長而大		
安福早						
鷄早						
雲貴白						
三百零						
石板粘						見同治志
立穀粘						仝右
冬粘						
早白冬粘		穀雨 小滿	寒露	耐寒	冷水田泥脚較深處均插之歲一熟	同治志有早白子遲白子之名
遲白冬粘		夏至				
早紅冬粘		芒種				
遲紅冬粘		夏至				

糯稻	長穀糯	粘穀糯	穀雨	芒種	寒露	質黏軟	與茶陵糯同	
	瀏陽糯		穀雨	小滿	霜降		插早禾中	見同治志
	毛糯子		穀雨	小滿	霜降	穀有毛粗細質稍硬	插早禾中	
	紅嘴糯	秋毛糯	穀雨	小滿	霜降	粒長而嘴紅宜晒凍米		
	茶陵糯		穀雨	芒種	寒露	穀長質極粘宜蒸食	晚禾秧田分秧後宜插之	
	萬載糯							
	麻殼糯					宜晒凍米		
	石膏糯							
	白殼糯							
	香禾糯	香糯				掌葉色紅		
	大粒糯							
	黑箭糯	早糯子早禾糯	清明	穀雨	大暑			
晚稻	早麻殼		穀雨	小滿	寒露			
	蘇遲麻殼		芒種	霜降	粒小			
	蘇獅麻殼							
	秈粘							
	晒而白	晒米白						
	桂花早	秋風早			秋分			
	三日齊				寒露			
	早紅米							
	遲紅米				寒露	紅實粒大味帶澀		
	雪粘		芒種	霜降		性粘軟		
	蘆茅粘					葉大而硬粒大而軟		
	鬍髭	胡溪早						

	寒露早					
	露水白					
	明稈粘					
	早白米					
	青稈粘					
	早粒子					
	中粒子					
	遲粒子					
	細穀二禾					見同治志
	大穀二禾					新輯
	拘粘					
	鐵板粘				東南兩鄉種者最多	
	廣東早		寒露			
翻子	青殼子	夏至	寒露	易生螟虫早禾割後栽插	東鄉種者甚多	
	高脚翻子				或諱言翻稱爲順子	
	中脚翻子					
	矮脚翻子					
	紅米翻子			味略澀		
	遲翻子					
	拘翻子			以冬粘種于插翻子時分秧		
	大穀翻子			穀粒大與早稻同	上東鄉多種之	
	細穀翻子					
旱稻		乾禾		耐旱	山田有種之者收穫不多	

農夫終歲勤動。率由祖宗成法以冀其田。計時程功從可知稼穡之艱難矣。一曰選種。打稻於

塲。取其先隕。曝諸烈日。簸以風車。韞櫝而藏。及春啓用。再淘以水。稗秕咸祛。粒壯而勻。斯爲佳種。二曰浸種。估田幾畝。量種浸之。（田十畝爲一石種。早稻需種穀八斗。晚穀四斗。翻子二斗。糯稻一斗。中稻一斗。）信宿漉水。昏揚沸湯。覆之以藁。再壓以甕。視甲微坼。去藁攤開。溫水抄之。旋復密覆。俟熱再攤。沃以冷水。復覆輕壓。萌芽生焉。三曰播種。先期旬日。預治秧田。擇地向陽。兼宜灌瀉。耖土令細。注糞維均。溫之砥平。撒種其上。風和日煦。攢簇如茵。揚炭催青。唯以禦變。（秧下泥後十日即青。若遇天寒往往遲至二十餘日。須撒炭煤灰以催之。）四曰整田。布穀催耕。西疇舉趾。一犁烟雨。轉緣爲肥。東作孔忙。於斯爲甚。地臨高亢。彌重深耕。三犁三耙。可耐久暵。五曰插禾。秧針分蒔。秩然成行。畫格用轆。衡縱尺二。（如須插晚禾者。橫行較寬。）田爲冷水。溫以牛骹。醮灰秧根。蕃滋可待。六曰施肥。矢溺柴灰。混而爲一。納諸禾下。謂之安兜。及荄既舒。恃肥助長。施如其量。是爲追肥。（晚稻耘田時。須肥料一次。每畝用牛糞猪糞各十石。石灰十斤。菜枯十斤。早稻亦多有用者。）牲糞石灰。同爲珍物。或用或否。榮悴判然。七曰除草。恐莠亂苗。去惡務盡。巡行禾壠。俛掇草根。繼耔而耘。代耨以足。及時再舉。毋怠毋荒。（立夏時拾草根一次。早稻於小滿芒種時耘田兩次。晚稻於大暑後耘田兩次。）八曰灌溉。大田多稼。亢旱輒枯。水以潤之。乃秀乃實。每丁炎夏。競轉轆轤。浴汗廢眠。寧辭兄瘁。聿修塘壩。貴在平時。九曰收穫。言刈於野。穰穰滿篝。舉而挾之。承以大桶。既乾且淨。乃納諸倉。遺穗在田。雞鶩用飽。十曰冬作。明歲春耕。須早爲備。廣敷草子。（邑中稻田。除浸多田外。什九皆種草子。每畝撒子三升。）載藝蕓薹。斂彼汚萊。以焚以漚。更以暇日。捆屨索綯。毋曰歲餘。逸居是戒。（詩翻子於早稻刈後。須用牛曳滾子壓平其蔸。然後插禾。捲菸葉爲筒。插於禾下。以避螟蟲。工作較繁。）

本縣稻穀產量。尚無精密統計。每畝歲穫。有多至十石少至二石者。全縣農田六十餘萬畝。以平均六石計之。可得三百六十萬石。每年平均每人食穀四石。全縣人口六十餘萬。共需穀二百四十萬石。飼豬八萬頭。需穀四十萬石。飼雞鴨需穀十萬石。煑酒熬糖需穀五十萬石。以產抵銷。可餘二三十萬石運銷長沙湘潭一帶。此蓋就大熟之歲而言。通常以八成計算。則爲三百萬石。僅足供本縣銷耗。歲歉即虞不足。故近年以來。政府征購賦穀。益之以災害頻仍。民乃大困矣。

近百年來醴邑禾稼。自水旱爲災外。罹蝗災一。（咸豐七年）黑穗病（光緒十八年。）螟災則凡數十見。農夫遘此。向惟束手徬徨。日引領西風暴雨之至。以消弭之。以至創鉅痛深。小農與中產之家。往

往一蹶而莫能再振。邇來東鄉一帶。多有插菸葉於苗下。預爲之防者。每畝用菸葉七斤製成丁。或再拌以石油。效用更大。顧限於翻子。且未能徧及。致災情仍不少減。縣政府曾通令各鄉拔禾蔸而焚之或拔或否。成效亦不著。又有燃燎田塍。俾先去其母蟲者。法甚簡陋。最近乃有誘蛾燈之設。但知製用者甚少。不能使農村集合行之。功用適得其反。與螟同類者有多種。據農學家研究結果。稻之蟲害已達百餘種。醴有若干種。尙無精確調查。土人但知有車兜蟲綉葉蟲包葉蟲鑽心蟲打屁蟲螟蟲牛屎蟲之名。任其自生自滅。以故繁殖成災。年復一年。或將種稻之田。易之以種菜。種於蟲災往往往自弭。蓋有害于甲種作物者。未必害於乙種。此卽今日科學家之所謂輪栽法。

雜糧

縣產糧食以稻穀爲主。此外概稱雜糧。產量之巨。首推番藷。一名甘藷。一名紅藷。明淸之際。始由南洋羣島輸入閩粵。康熙乾隆間。閩粵之人遷移至醴。乃挾其種以俱來。剪莖插土。稍施肥料。不待灌溉。自然繁殖。根肥當糧。藤葉飼豬。最初爲紅心藷光緒二十年後。始有紅皮白心種。謂之臙脂紅。又有由茶陵輸入者。皮色亦紅大而短。稱茶陵薯。光緒末年。有所謂六十工者。皮色白自栽種以至成熟。需時僅六十日。又一種由雲南輸入。謂之雲南薯。皮色亦白。生食頗鬆脆。既而又有四十工者。皮色紅。生長更速。歲可兩種。贛州藷形如紡錘。質硬粉多。並爲人所重視。邇來人煙日以稠密。近山者遂爭事蒔藷。戶產率二三十石。斜坡深谷。大半闢爲藷土。全縣歲入。不難從估計得之。通常藷三石易穀一石。切絲曝乾。每斤易米一升。故山谷之民。雖遇歉歲。而有含哺鼓腹之樂。此種殖之所由日蕃也。豆麥粟粱俱可充飢。年荒穀貴。種者倍於往年。然其產量。不及番藷遠矣。廣東近試種木藷。成績甚佳。其蒔在冬季。不擇土。每畝穫十石左右。亦一新發明之重要雜糧也。

名稱	種類	用途	產地	產量	附記
番藷	紅心藷	蒸食煮食煨食生食皆可居民以此爲重要糧食可製粉皮及果餌釀酒熬糖	產於地力薄弱之山地及沙地各鄉皆有以桃花陽坑漏水坪老鴉山泮川塘	宜沙土牛糞用菜枯易招小蟻用柴灰則多鬚根用桐枯最肥或以桐油滴藷秧上和炭灰少許而後貼土中則尤蕃	
	臙脂藷				
	茶陵藷			碩如於先年冬掘藷時留正根及藤置窖中覆以土至來春立社時取出剪藤分蒔則結藷早於尋常一月	
	六十工				
	贛州藷				俗稱秤錘藷

雲南諸						
四十工		約共一百萬石				
麥 大麥	作粉餌熬糖	山間荒地	約三千石	寒露霜降皆宜播種明年穀雨後收穫宜沙土穗有芒		
小麥	當粮作灰麵	坡土岸沙荒洲	四千石	播種期與早麥同穗無芒者立夏收穫亦稱麵麥		
蕎麥	作粉餌	不畏瘠壤岸田沙洲皆可種以神福港李家渡最多	六百石	屬蓼科一名花麥實成三稜色黑處暑下種霜降前收穫		
黃粟	有粘糯二種	作餐餌釀酒	山坡	二十石		
玉蜀黍	有早遲二種色白而糯者稱糯米包粟	煮食蒸食炒食均可山中人用作飯	性耐瘠壤陽坑花麥田等處每戶約十餘石各鄉藝圃及山坡亦多種之	四百石	俗呼包粟一稱包穀屬黍類	
高粱	有粘糯二種	釀酒作食料	東鄉爛泥洲淥口高粱州產量最富	四千石	清明播種穀雨分秧處暑前後收穫宜畬土沙洲	
豆 黃豆	炒食製腐造醬	坡土田塍南鄉最多	二千石	有大小之分近年多種菩豆結實多其莢成叢種豆宜柴灰並以時鋤鬆		
蠶豆	可充飢	坡土均清神福荷里三鄉最多	三千石	花如蝶以蠶時成熟故名		
豌豆	煮熟充飢	坡土	一千石	秋分播種明年清明採取		
綠豆	煮粥製糕	田塍坡土	二千石	清明前後種立秋前後逐日摘取		
飯豆	煮食益人山中人用以當飯	田塍山坡	一千石	有紅白黑三種		
黑豆	炒食煮食	全右	四百石	小者名六月烏治目疾其他專供蔬食者另列		
青豆	炒食	全右	二十石			
脂麻	有黑白二種	園土	五百石	產量甚少尙無用以取油者		
植物油						

縣產植物油向祇茶桐榮木四種。近數年始有蓖麻油樟子油。

茶油　茶油爲人生日用必需品。產量向稱饒裕。近十餘年來。各鄉種油茶樹者益多。佔全縣林塲五分之一。茶球有大包子珍珠子之別。縣產多爲大包子。又有贛州包者。球色紅。殼比大包子薄。輸入未久。人爭選用。向例以寒露或霜降入山摘取。每球三石。去殼得子一石。（殼薄者可得七桶。）榨油十四五斤不等。（珍珠子油較多但不易摘取。）除供本地食用外。銷售長沙湘潭一帶。民國三十年。農業推廣所調查清正荷里楚東明月杉仙集體忠愛和信諸鄉產油。凡三萬一千四百石。其他各鄉數量較少。

桐油　以前桐油銷路不廣。所產無多。至民國十年後。乃行銷美洲。何鍵主湘政。提倡植桐。陶廣鍾光仁湯新昭等。首於本縣自闢農場。所植各以萬計。各縣翕然向風。二十七年。對外貿易。湘省出產首推桐油。遂益爲國人所重視。二十九年。省政府通令造林。縣設模範桐林場一並指導植桐技術。其要點有七。曰擇地。林地土層深處。須在三尺左右。土質須相當肥沃而無鹼性者。最忌石灰質之土壤。地勢宜高原山坡崗陵等排水暢行之處。以三十度爲限。方位以東南面爲佳。至於過於當風及卑濕低窪之處均非所宜。曰選種。須擇母樹年齡在八年至十五年以內。結果多果內食子多。且爲十分成熟而色澤不壞者。曰播種。春天白雨水至穀雨皆可播種。種籽連一部果皮橫臥穴中。每穴二三粒。各粒距離四五寸。上覆以土。至冬季或第二年春舉行拔苗。留其健壯者。千年桐雌雄異株。須去其雄者。曰勻苗。株間距離須在一丈以上。行間距離一丈五尺左右。每放株數最多以五十株爲限。如株數過少者可混種油茶杉木。或間種雜糧。惟不得損傷苗及苗根。曰翻土。伏天將地面雜草荊棘剷除。堆腐爛作肥料。並將桐樹橫生大側根斬去。先端使多生細根。於桐樹根際。稍壓以土。使之時應行保土工作。或開溝。或編籬。築堤。以免土沙沖刷。曰施肥。肥料以草木灰堆肥及各種獸糞類爲宜。樹衰弱者在翻土後秋初或早春。施於離根株二三尺之圓圈外。俾幼根易於吸收。曰除害。如土中石灰過多。則桐葉萎縮。由黃而白。以至枯死。宜施廐堆肥。或其他酸性肥料以期減輕。又如發現蛀心蟲後。應立即設法撲滅。至於欲求油質之潔。油量之增。則榨油之法尤須改良也。三十年春。農業推廣所報告醴陵全縣增植八萬株。其樹有千年桐週歲桐兩

種。千年桐六七年開始結實。週歲桐二三年即開花結實。霜降節入山取子。每子一石。可榨油二十斤。邇來發明桐油可製汽油。價值提高。植桐者倍踴躍。將來產量之巨。必且駕茶油而上之矣。

菜油　苤薹俗名油菜。種於晚稻登場後。收穫在早稻分秧前。故恆種諸田中。自抗戰後。煤油來源斷絕。產量驟增。西北兩鄉尤盛。春二三月。彌望皆蕓薹花。子一石可榨油三十斤。以之燃燈。其光比桐油亮。民間多用以供食。今縣所產在萬石以上。榨後所賸之渣滓謂之菜枯。爲肥料佳品。另有一種名臘油菜。種於土中。收穫較遲。油汁更富。

木油　木子樹即烏桕。其實色白。秋末成熟。收以製油。可爲肥皂及蠟燭之原料。子中仁壓榨所得之清油燃燈尤明。東鄉尚堅衝樟樹壩多有是樹。僅供本縣製燭之用。春分後燭即不適用。近數年來。始知用以取油。遂咸呼爲洋桐子。清明節種

蓖蔴油　邑人從前僅以蓖蔴子爲藥。近數年於牆角籬邊或山麓曠土。極易生長。莖高六七尺。中空如竹。葉大掌狀深裂。秋開黃花。結實成簇。每簇約十球。每球有子三粒。光澤而現黑斑。一年連結五次。子每斗可榨油四斤。如用

作燃料。榨時須攙茶子或菜子。俾不至凝結成脂。以之點燈。光芒奪目。再經提煉。可作機器油。上東鄉一帶已多種者。如冬不霜雪。至來年老幹仍可生長結實。

樟油　邑中素產樟樹。大者數圍。夏初開小朵花。結實大如豌豆。冬至後不摽自落。歛之盈箕。近始發明可以榨油。燃燈比茶油更亮。惟作樟木臭。老樟木亦可熬油。自民國七年以後。被軍隊斬伐殆盡。上年雖有試熬者。旋以樹少值昂而罷。

工藝原料

醴陵農產物。爲工藝重要原料者。曰棉。曰蔴。曰蓆草。曰藍靛。產量之多寡。視時價之起落爲轉移。歲無定額也。

棉　邑中舊產不多。近因紗價踊貴。始多種者。有鐵子綠子灰色子及山花諸種。鐵子花苞色白。綠子紅。山花紅黃。邇來種灰色子者漸少。以其子粘棉不易軋也。近又有美棉種輸入。結實比中棉多三分之一。民國二十九年。湘省農業改進所謀增進棉花生產。栽培方法。以歷年試驗結果。昭告于衆。一、條播宜時。中棉美棉下種。均以國曆四月下旬至五月上旬爲宜。蓋即立夏節前後。若下種過早。則溫度尙低，發芽困難。多生高株。過遲則棉株未壯。又值蟲病發生。無力抵抗。樹棵矮小。產量不豐。二、施肥宜足。如係瘠土。或以小麥油菜爲前作者。需肥特多。遲效肥料。用作基肥。在下種前一月。用牛羊糞堆肥油枯草木灰等。斟酌地力而定用量。撒於地面。然後翻土耙平。以待播種。速效肥料用作追肥。于第二次中耕除草前。沿棉行開淺溝。施入糞尿。然後覆土。遲則無效。本縣農場試驗種棉肥料。以蔴枯棉枯爲上。菜枯次之。其他桐枯菜枯。皆不及也。三、行列宜疏。行距一尺至一尺五寸。株距五寸至一尺。如爲美棉。更宜加廣。四、鋤耨宜勤。棉苗出土後六七日。舉行第一次中耕除草。嗣後每遇天雨。或雜草叢生。應隨時分別中耕除草。在頭二次中耕時宜深。（不得超過三寸）以後稍減。拔去苗之弱者。祇可留一二株。經一月後再行培土。以防風害。土法于下種時用糠頭拌灰糞。亦鬆土之一法也。五、摘取宜遲。當鈴色尙青時。纖微未熟。愼勿摘取。致有損品質。民國三十年調查全縣棉產爲二千担。

蔴　當夏布業發達時。縣人多種苧蔴。以西鄉君子橋昭陵泗洲站一帶爲最夥。宿根在土中。每年冬鋪草燒之。澆以糞水。再用牛糞及肥土培壅。明春滋生益茂。株高四五尺。一年三刈。歲產凡十餘萬斤。佳者名鷄骨白。纖維細長。無紅間。績細夏布者必用土產蔴。以其能辟至極細。且富韌力。爲外來者所不逮也。今夏布業衰。種落者遂日見減少。苧蔴有野生者。曰野蔴。又一種名黃蔴。清明後種子。立秋前後拔出。可製繩索及芒鞋。

葛　春初生苗。葉似楓葉而長。引藤蔓延長一二丈。取其皮浸之。如漚麻然。績成葛布。出自北鄉。其價高于夏布。後因漂坊用漂白粉。下水即破。遂無人過問矣。搗根爲粉。曰葛粉。可食。刈其藤用束磁器。銷路頗旺。

蓆草　產于北鄉之八眼塘。東鄉白兔潭之澡東橋。南鄉泗汾之灣塘及五里墩一帶。歲約六萬斤。所織之蓆厚而密。耐久用。惟墨守舊法。不及外來者之美觀也。

藍靛　藍靛係植物染料中最普通之一種。邑中所產。除供給本縣應用外。暢銷于鄰縣。漏水坪李家山老鴉山大小陽坑山谷陰翳之地。多種植之。每年產量在百萬斤以上。民國初年。舶來品黑靛粉快靛印度靛輸入。藍靛成色不及遠甚。因製造不良。價值低落。種藍者遂年減少。幾瀕滅種。抗戰軍興。舶來品來源斷絕。藍靛業乘時復興。數年來藍田膴膴。轉勝於前矣。藍草屬於蓼科。有數種。邑中所種者。其葉大。莖高不過二尺。俗稱大葉藍。春初將田土舉行深耕。清明前數日耙田抽溝。將隔年所留之種。每株間隔一尺栽插。隨時鬆土施肥。（肥料以菜枯爲最佳人糞次之。）初伏後即開始採葉。以後每隔一月採葉一次。收穫至四次時。則並刈莖之半。

所穫重量。等于前之三次。）留莖下截爲種。擇乾燥田土掘深二尺許之穴藏之。上覆以土。用蓁蔽之。防雨水侵入。以備翌春種植。亦有窖藏者。至于製靛方法。先用三砂土築成堅固之製靛池。（圓形直徑八尺。深約三尺許。）石灰池。圍靛池。及水溝砂坪。製靛池貯滿清水。漚藍數晝夜。（天熱祇需二日天冷則五六日）將渣滓濾盡。水成綠色。佮稱綠水。攙入澄清之石灰水。（分量每百斤藍葉約須石灰十斤。）用耙攪之。綠水旋變藍色而沉澱。即靛也。以種稻穫穀一石之田。種藍可得靛一石。其值三倍於穀。清末民初。漏水坪潘季宏講求製靛法。剔盡澄滓。盛以洋鐵瓶。入呼土洋靛。運銷湘潭。售價倍常產。山民以其煩且成本重。尚無仿傚者。（有名子靛者。莖高三四尺。葉小。開花結實。如小豆角。中有子。即以是爲種。歲可三刈。漚一夕即可成靛。每葉百斤。僅能製靛五六斤。染布特佳。漏水坪曾得子試種。旋以難得善價而止。）

茶菸

茶　清光緒間紅茶爲醴陵大宗產品。運銷於外。歲可二萬石。窮陬僻壤。青翠成叢。入民國後。茶業衰歇。遂多摧而爲薪。其存者當春採製烟茶。（即黑茶）亦不在少數。官莊桃花陽坑花麥田一帶。所產銷售於瀏陽普蹟。而以產自西鄉龍骨衝者香味特佳。全縣居民所需茶葉。大都

取之當地。不待外求也。又有一種味如甘草者名甜茶。性質涼。邑東北深山中常見之。

菸　一名淡巴姑。卽烟草也。燒之作濃烟。故俗直呼爲烟。近四十年來。東鄉耕者幾乎無家不種。平均每戶可二百本。肥料用堆肥煤柴灰茶枯或桐枯。少用人糞尿。勤除害蟲。摘去心芽腋芽。佳者每三本可收乾葉一斤。蒸晚稻翻子當禾苗盛長時。必須插烟於根旁。以防蟲害也。近以菸價奇昂。各鄉多自種以供吸食。綜計全縣產量。約數千担。邑東渣江古塘。有田不半畝。所種之菸葉。紋皆對筋。氣味特濃厚。間歲一種。所穫不過百斤。移蒔隣田。則變種。邑中間有取菸葉刈後再發之嫩葉以製紙煙者。然紙煙原料別有佳種。湘潭夏灣所產之菸葉。植於山上。其葉於收穫時熏烤。亦可用。近漸傳入縣境矣。

蔬菜

邑人勤於園藝。自城居者外。莫不家有蔬圃以備四時之需。擇種留良。不一其類。近城園戶。利早穫。種蒔先於鄉村。施肥既足。歲取特豐。田家忙於東作。而種菜往往後期。亦勢使然也。

青菜　卽芥也。葉如規而狹長者曰鐵規芥。闊者曰闊規芥。葉深刻如菊花。葉柄細長者曰花

芥。一曰高脚芥。葉大而心實。重八九斤者。曰包心芥。以上諸芥。城鄉皆有之。最早者處暑卽種。至清明開花。結實則苗葉已老不可食。其生長開花較遲。葉縐而深綠或純紫者。曰麻芥。一曰四月芥。其味特辛辣。芥爲蔬中之最普通者。故統稱青菜。而以沸水煮軟者爲黃菜。近城譚家衝。以所產之包心芥製菹子黃菜。味特可口。菜之下體曰菜腦。以高脚芥爲良。上菜及葉之中規曰菜心。以包心芥爲良。切碎以蒸以晒。謂之醃菜。以鐵規芥爲良。

白菜　卽菘也。其葉柄圓厚而微青者二。一曰箭桿白。一曰調羹白。言其形似也。有葉柄扁薄而層層包結者。謂之黃芽白。宜在受日光最多之地。至冬至乃以稈束之。反是則爲青白菜。有葉似青白菜而密。遲生後老者。曰四月白。至於葵花白菜俗呼包菜。卽甘藍也。其葉層層緊包如覆碗。味肥脆。其種近始輸入。調羹白一名油白菜。子可榨油。又俗稱泥白菜者。味帶泥腥。係菘菜之一種。非白菜也。

莧菜　莖葉長而尖者。曰柳葉莧。有紅白二種。莖葉色皆白者。曰木耳莧。莖葉色帶花紅者。曰半截觀音。莖葉皆紅。能耐久采者。曰重陽莧。別一種葉大而圓且肥厚。莖長攀緣他物者。爲

落葵。俗稱藤莧。食與普通莧異。摘葉置已調味之沸湯中略煮即熟。鮮嫩可口。實非莧也。

菠菜　即菠稜菜。一名波斯草。出西域波陵國。又名赤根菜。白露下種。可備冬食。至雷鳴後。則老而味劣矣。葉圓而長。綠色。根長數寸色赤。其味甘美。連根葉和豆腐煮食。益人。多食冷大小腸。

薤菜　薤音薤。俗讀若邂。莖軟而中空。故亦稱空心菜。有二種。子薤清明前下種。枝密葉短。秋分後則開花結子。即老不堪食。藤薤取宿根於清明後種插土中即活。或斷之如種番薯然。節節生芽。一本可成一畦。以時摘取。可經數月。蒔宜近水。亦有插田中者。

芹菜　俗忌言窮。呼芹爲富菜。有旱芹水芹二種。旱芹一名藥芹。起伏時即下種。立秋蒔秧。至冬莖葉可食。老則味苦。水芹一名胡芹。根白色。宜蒔水邊。葉如細柳。高大易長。刈後復生。近城多種之者。

葱　有三種。葉大而硬。四季不凋者。曰四季葱。春末開花成叢。冬即枯葉者曰漢葱。葉小而柔。處暑下土。立夏時葉即枯萎者。曰藥葱。又一種野生似薤者。曰胡葱。

韭　叢生莖高三寸便剪。一剪一施肥。隔四十五日一剪。夏至停剪。入秋開花香而可口。多季嚴寒時。用柴灰和炭灰覆之。初春啓覆。芽嫩而色黃。謂之韭黃。

蒜　莖葉粗而尾常青者曰蘆茅蒜。莖藥柔而尾帶黃者曰茶陵蒜。其味比蘆茅蒜香。家用選購是種。立夏時抽薹長尺餘。其味香甜。此外又有廣蒜。葉捲曲而柔。觀音蒜。小蒜老蒜。諸種。蒜薹老則開花結子。取其子播於土中。生苗如韭。葉稍闊。味亦相似。

薑頭　即薤也。葉之下部色白。故稱薤白。霜降後埋種。立春後採食。葉粗而硬。其味滯者曰木薑。頭較大。醬園用之。葉細而柔。其味滑者曰米薑。家用多選是種。

冬莧　即冬葵也。曰露前後蒔秧。或種子畦中。葉綠而嫩。略煮即熟。清明後老而抽薹。

馬齒莧　野生蔓地。葉如馬齒。可菹食。久煮即酸。

茼蒿　葉作鋸齒形。曰露種。立冬前採食

油菜　即薹薹。春日抽薹。宜炒食。有一種葉似調羹白。莖作紅色者。名紅油菜。莖葉皆可食。霜降前後栽。

恭菜　恭音甜。一名蒼薘菜。葉闊大。厚而有光。色青。成長後莖高三尺許。四時皆可爲蔬。邑中種者尙少。

芫荽　荽音綏。一名胡荽。俗名延荽菜。立秋後下種。初生柔莖圓葉。葉有花歧。根軟而白。冬春采之。邑中種者尙少。

苦蕒　莖可一二尺。葉長卵形。抱莖而生。嫩者可爲蔬。多作飼料。

雪裏蕻　葉似芥而小。花黃。雪深諸菜凍損。惟此菜獨青。味稍辛。

芥藍菜　九月下種。葉有缺裂。形長而厚。色濃綠。臘月卽由心葉抽莖。十字花冠。色黃。其味脆而爽。

蘿蔔　一名萊菔。皮肉皆白色。有兩種。其作長圓形者。葉似枇杷葉葉早生。一歲可種二三次。伏天所產之娃娃菜。卽此種也。又形似沙罐底而扁圓者。葉如鋸齒。遲生。一年可種一次。生沙壤者脆而甘。生瘠地者堅而辣。出自丁家坊者最良。每畝田可掘七八十石。其地以是爲業者近百家。佔田凡數百畝。撒子土中曰滿天花。根葉同食。摘去尾根。移蒔他處。結實乃大。

胡蘿蔔　俗呼爲紅蘿蔔。產自歐洲。一說產自西域。其輸入我國在唐以前。宜沙質壤土。伏天下種。冬月掘取。根尖長。帶紅黃色。其味甜。生熟皆可噉。

大頭菜　一名蕪菁。葉刻深如羽狀。形似花芥而長。其莖圓大如椀。漬鹽作榨菜。

芋　春季埋種。秋分掘取。其塊莖大者謂之芋腦。一稱芋娘　小者謂之芋奶。有水旱二種。水芋及長柄之薑蒿芋。皆蒔水田。觀音芋質白味香。紅芽芋黑莖紅芽。多粉易煑。白芽芋青莖白芽。魁大難煑。皆蒔土中。莊埠產者特佳。

大薯　一名雪藷。有二種。長者名椿蒿薯。大而多駢枝者曰脚板藷。其色均有紅白之別。種時須掘坎。墊以垃圾及灰糞。則根莖向下生長。重至四五斤。漏水坪一帶多蒔於藍田中。

山藥　卽薯蕷也。葉蔓與大薯葉相似。莖紫。葉有三尖。開花成穗。淡紅色。根肥長尺許。邑人有采野生試種者。用竹刀切段約二寸許。排列種之。覆土五寸許。則澆水及牛糞麻枯。切忌人糞。生苗後以小竹扶之。

涼薯　蔓生葉似蛾眉豆。開白花。結莢長如麂角豆。內有黑子七八枚。清明種子。混以堆肥草

木灰。其塊根稱涼薯。重至斤許。生食炒食均宜。

馬鈴薯　葉爲羽狀複葉。以大小二種葉合成。春暮莖端開花。花白成子。塊莖多澱粉。俗呼洋芋。宜輕鬆乾燥肥沃之土。

蒿苣　一名萵苣。其地下莖白嫩如芥菜腦。謂之萵筍。園中多種之。

百合　葉短而闊。似竹葉。莖圓高二三尺。其根爲鱗片集合成球。花色不一。開白花者良。東鄉百合。

泗衝多產之。又一種煑食味苦者。稱藥百合。

磨芋　一名蒟蒻。一名魁芋。春種。立秋後取根實。洗淨磨漿。磨時用石灰水少許淋之。即成凝脂。再用灰鹼水久煮。或煮至二三次。即可食。謂之磨芋腐。僧人多種食之。

薑　苗高二尺。葉似蘆而稍闊。清明栽。夏至生。立秋前後新芽頓長。如列指狀。采食無筋。謂之子薑。秋分後採者次之。經霜則老。東鄉李家山種者頗多。原產自東印度。其種輸入我國最早。日本得種於我國。栽培甚盛。與我國所產同銷行歐美。

洋薑　一名菊芋。立夏種。莖葉粗糙有毛。葉尖長似洋蒗。花黃似菊而小。霜降前後採其根莖

蕨　生山野中。春風後生芽。如小兒拳。可食。根大如指。立春掘取作蕨粉。

菱筍　即菰菜也。一稱菱白。俗呼蘆筍。二月插種於池沼中。宜深宜肥。葉似蘆葦。故名。八月即

於莖部長筍如椎形。鄉人多種之。

筍　冬月掘竹根下未出土者爲冬筍。春月掘取爲春筍。生於篠竹下者爲小筍。

齋食。

南瓜　一稱金瓜。產量甚富。清明栽。夏秋結實。陸續采食。有形如枕頭者。有如斗笠者。墨瓜皮色由青綠而墨綠而紅黃。甜而多粉。其種特佳。或謂南瓜子留種。以煤炭灰裹之。使乾不見日。明歲瓜味自甜云。

冬瓜　春秋夏秋采食。大者至數十斤。皮色青者良。

黃瓜　即胡瓜。種由張騫使西域傳來。故名。或以爲月令王瓜。非也。結實在諸瓜之先。立夏前後采取。長數寸。色黃綠有刺。老則轉白色。生熟均可食。

絲瓜　蔓生。春分種。宜近水處。有青白二種。白皮而肥者良。小暑前後陸續采食。可至秋季。爲夏季蔬品中之最要者。

苦瓜　驚蟄種。春分栽。芒種後以次摘取。暑天食之可解暑。有青白二種。農家皆種之。

瓠瓜　俗呼富瓜。驚蟄種。立夏後逐日摘取。味甘。瓢瓜亦瓠瓜之一種一稱葫蘆瓜。上部細長。一端圓大。嫩時可食。老則去瓤作舀水盛酒之用。有似東瓜者。色青而有絨毛。六月熟。

甜瓜　立夏前栽。葉圓而青。如醬瓜葉。小暑後結實。圓似白茄。無蒂。宜生食菹食。

醬瓜　圓長似瓠瓜。無絨毛而現凹凸。宜菹食。另一種小而質硬。

茄　實卵圓。有青白紫三種。紫者結實多且久。較白皮者勝。

番茄　原產於南美祕魯。漸盛行於歐洲。以製番茄醬。爲西菜之常用品。果實爲漿果。色黃赤。形如柿。俗呼西紅柿。肉軟而多汁。味甘酸。除製醬外。生食炒煮調湯醃漬咸宜。邑中稍有種者。

辣椒　卽番椒。早者立春驚蟄間下種。春分蒔秧。開白花。結實初爲青色。老則轉爲紅色或深黃。種以形分。其小而向上者。曰朝天椒。一曰五爪龍。味最辛辣。肥大而短者曰燈籠椒。一曰大紅袍。長而曲者曰牛角椒。長而直者曰豆豇椒。長大而多肉者曰常德椒。其種由常德傳來。味甜不辣。邑人嗜椒。家家種之。賀家橋爛柴衝一帶。產量尤富。

洋辣椒　莖高五六尺。結實於層葉下。如廣東香蕉狀。多漿汁。間四五日一摘。其味甘。

刀豆　夾扁而劍脊。三稜宛然。清明栽。夏秋間摘取。其嫩者可連莢作齏。

蛾眉豆　卽扁豆之一種。有紅白兩種。白者良。

豇豆　俗呼豆殼。有紅白黑三種。夏秋結實。莢長者二尺許。立秋後種者名秋豇。

飯豆　葉與豆豇同。莖較矮。莢短。子有紅白黑三種。穀雨種。夏至熟。

羊鬚豆　一名螞蟻豆。莢長豆小。成椭圓形。白者良。煮食益人。

麪角豆　一名狗爪豆。莢長大而肥。去莢上粗皮炒食。

猪牙豆　頗似蛾眉豆。色淡青。其味比蛾眉豆更爽口。

四月豆　一名野綠豆。清明種。立夏前卽結實。可作蔬。幷莢食。

萊豆　蔓生。葉卵圓端尖。似麪爪豆苗。開花結實。每莢有豆四五粒。如猪腰。味甘美。

茴香　三月從宿根長苗作叢莖。高五六尺。葉細裂如絲。夏開小黃色花。結實如麥。色黃褐。氣

味香甜。可調菜。

銅綠菌　陰歷三月九月生於有茅之處、傘平微凹。現銅綠色。肌理玉潔。

樅樹菌　卽松樹菌。春分或秋分前後生。比癩頭菌稍小。脚矮味更甜。

雁來菌　紅頂白摺。二四八月卽生於陰濕之地。凡雜木叢生之地有之。味滑香脆。生長期適值雁來雁去之時。故名。

地皮菌　一名地耳。生石板邱陵。狀如木耳。春夏雨中卽生。雨後采之。不堪見日。俗名踏地菰。

木菌　生桑槐楓楮及桐子諸雜木上。軟者可食。茶葉樹下生者味尤鮮。

菌之種類以千計。多有毒。以上所列者。土人常采食之。間有中毒者。用黃土埋身或用冷水攪黃泥成漿灌之卽活。邑人食菌時有用燈芯一丸與菌同煮者。如燈芯變色。卽認爲有毒。不可食。

菜之害蟲。有金龜子、蚜蟲夜盜蟲、截根蟲、山椒蟲、黃絨蟲、菜鋸蜂、白蝶、守瓜蟲、僞瓢蟲諸種。

當菜苗幼時。罹害尤酷。除蟲之法老圃用者有六。一雄黃和糠頭撒苗土上。二鈎吻（俗呼黃藥根）萃皮磨粉或熬汁微撒葉上。三菸萃葉浸水澆之。四鋪楸木柴並石灰及柴灰於其周圍五、

洒以煤油和水。六人工捕捉等六法。新法每運用捕蟲網誘蛾燈噴粉器噴霧器。散佈諸種藥劑。且注重種種預防。收效較宏。邑中尙罕有行之者。菜有不因蟲災而忽呈異態。奄然萎謝者。是曰病害。原因不一。栽培之不力。以及濕度日光土壤濕度之不調和。皆足以致之。其起於病菌之寄生者。傳播迅速。損傷更鉅。凡病之屬於生理者。非藥力所能囑。但強其體質。適其生理。改良土質。補給肥料。調劑氣濕。於栽培加以注意。病自愈矣。若屬於菌類之寄生者。除直接施以石灰柴灰及殺菌藥劑外。尤當防止其傳播蔓延。凡罹害之根實莖葉。附近之雜草。必悉芟夷而聚焚之。又農具以鹽水消毒。少用氫肥。（人糞尿廐肥綠肥豆肥）行輪栽法。皆能杜絕傳染。此蓋適用於一切農作物之病蟲害。不獨蔬菜爲然也。（近時歐美所常用之殺菌劑首推波爾多液。此液係以硫酸銅十二兩生石灰十二兩。與一斗至六斗水相合而成。製法。用硫酸銅入於非金屬製之桶。注以熱湯溶解之。次卽注生石灰少許。漸次遞加。俟石灰成爲細粉後。更將前溶解硫酸銅所剩之水。一併加入。使成爲濃度適當之溶液。以蘇袋濾去其殘滓。冷卽可用。其液之效力。僅得存於十日或十日以上。故施於病劇之作物不宜。所謂硫酸銅者。卽中藥店所售之膽礬。）

森林

醴陵山國也。曩者干霄之木鬱然成林。造器架屋之需。舉皆足以自給。數十年來人煙日密。取求不時。所謂輪囷大樹者。大半毀傷於民國七年之北軍。與十六年之農協。抗戰以來。往來兵士。又復濫施斧斤。山戶憤其然也。遂不惜盡所有而斬伐之。於是沿驛路一帶。鮮有存焉者矣。今全縣營杉棚業者。凡數十家。大都取材異地。即燒磁之松柴。亦多來自他邑。夫森林非直爲觀賞供材用已也。水源之涵養。氣候之調節。水土之保持。悉於焉是賴。苟任其衰敗。水旱之災。將無歲蔑有。政府規定以三月十二日。當春分前七日或八日。爲植樹節。近復有農業推廣所之設。皆所以倡導人民致力於培植也。亡羊補牢。其在斯乎。

松　爲常綠喬木。俗亦呼樅。吳其濬植物名實圖考。謂湘中方言簡讀謂松爲樅。其實樅另係一種。生長極易。瘠地礫土。皆可植。最宜高燥之黃土及赤土。春分前種之。無不活者。十年以後。即可取用。東北鄉磁廠林立。需此燒窯。售之恆得善價。故山戶競造松林。其面積佔全縣森林十分之八。近以供不應求。數十年大樹遂亦析而爲薪矣。種類甚繁。赤松亦稱油松。多脂。可作鐵道枕木及燃料。浸之水中。千年不腐。橋樁壩樁皆用之。故縣產通選是種。白松亦稱杉松。俗呼糠頭松。與赤松混俗呼洋松。宜植於日光直射之肥沃地。材質優於赤松。剛勁耐久。堪水濕。且易施工作。用途最廣。

杉　常綠高幹。縣產均係刺杉。宜北面及東北面之山腹凹地。性喜陰濕。成長極速。木理通直。堅軟適宜。凡建屋製日用器具通用之。皮可蓋屋。從前產量頗富。陽坑東坑長水衝羅家嶺生。質輕理白。可製器。美樅枝葉形如偃蓋。生晒穀坪蝦蟆石雲岩寺等處。可供清賞。落葉松俗呼洋松。宜植於日光直射之肥沃地。材質優於赤松。剛勁耐久。堪水濕。且易施工作。用途等處爲多。近因斬伐不時。日見稀少。其炭爲製火藥之原料。埋小杉樹於土中。逾年即發生杉秧。一節一株。截樹分栽極易生長。

柏　有二種。葉細如鱗。與枝密結者曰扁柏。亦曰側柏。葉似短針成簇。曰刺柏。亦曰杉柏。皆可作香料。側柏葉與子俱可療疾。杉柏質堅。可供建築及製造用。祠廟寺觀旁種之。以作觀賞。但不多耳。

樟　常綠喬木。有赤心白心兩種。宜背風面南之沃地。生長頗速。葉美成陰。人多喜種諸門前。點綴風景。百年老樹。猶歷歷可數。地以樟得名者。有大樟園樟臘竹樟樹台株抱樟下馬樟

樟樹下樟樹灣等處。木理燦然。富有香氣。作器最良。近有蒸餾製樟油樟腦者。因折閱而罷。

楓　枝幹修聳。葉經霜而紅。鮮明悅目。多大樹。可作造屋宇之幹。但易生蟲。實如球。可入藥（有一種。刺楓。不堪作器。祇能作薪。）

栗　有板栗錐栗二種。高二三丈。板栗樹亦名樁栗。葉圓木堅硬。可作主牌及地脚砧。耐水濕。錐栗亦名大栗樹。木直。樹可製板。木質堅硬。能耐水濕。建築屋宇之礎木多用之。埋置水中。漸成黑色或彩色。性燥。不能製各種細器。樹皮可供鞣皮及黑色染料用。

梓　常綠亞喬木。夏開黃花。結實長尺許。似豇豆莢。常植屋旁及花園。木可造舟作器皿。野生不多。李家山有之。

桐　常綠喬木。木質堅實。可製車。深山有之。

檀　縣產檀木無香氣。有二種。大水檀肌白。石尖檀肌黃。皆紋理錯雜。不易剖析。多用作車轂。

山棗　野生高三四丈。可作大廈之楹柱及棟几。（鋸板浸水中兩月。光澤如花梨木。製桌面良。）

女貞　常綠喬木。放白蠟虫於樹上孳生。結白蠟。土人歲取其虫。運銷臨武。俗呼蠟樹。冬結實。

枯桐　落葉喬木。多植於庭園中。可蔽烈日。供觀賞。土人當取其皮作麻。爲索綯織履之用。

枯桐　一名白桐。花色有紫白二種。開白花者。木理粗而體性慢。開紫花者。木理細而體性緊。宜土地稍乾燥且不當日光之處。材白色。質甚輕軟。宜爲琴瑟用。製箱類。能防溼氣。製爲炭。可供畫家之用。又可爲火藥之原料或黑色之染料。

櫟　落葉喬木。其材粗硬易裂。不適於用。可製船舵及龍骨。燒爲炭。樹皮不脫。仍保有木材原形。其實長圓而尖。有殼斗包其半。即橡實也。仁如老蓮可食。殼斗可染皂色。故亦稱皂斗。

槲　俗呼大葉櫟。葉大而邊緣有缺裂。結實如橡子而短小。其材僅可燒炭。其葉可染青布。

楮　落葉喬木。俗呼穀皮樹。（其實穀皮樹另係一種。名曰構。）生長極速。皮可作紙。其漿富黏性。可作樹膠。

山中野生。

櫧　常綠喬木。山間壟上野生。有數種。一苦櫧。木紋粗赤。宜作几。實可製腐。一圓櫧。粒小而圓。材心黑而堅。宜製器。潮濕即脆。一石櫧。質極硬。可作磨齒。又一種葉似石櫧而尖。結實如櫟。

俗呼五筋樹。質理似桐。細而白。富彈力。靭力。宜作扁担及農工用具之柄。

白楊　落葉喬木。先葉開花。結蒴果。色白。有木棉狀絨毛。材質輕軟易腐。可製器作火柴軸木。

鄉間稍有種者。

黃楊　常綠小喬木。生長極緩。多生於石灰岩上。材質緻密堅硬。可製美術品。及貴重器具。稍有種者。

桑　種類甚多。邑中舊產。多爲野桑。光緒二十一年吳大澂撫湘。始採運湖桑秧苗至醴。教民種植。其在狀元洲者可千株。今擢伐殆盡矣。葉可飼蠶。實可入藥。木適於作裝飾用材。

烏桕　俗呼木子。山崗荒地。道旁田埂。皆可種。性不畏水。可保圩堤。子可榨油。材可製彈棉花之磨盤。

化香樹　落葉喬木。樹幹酷似胡桃。結實如松球。材質粗鬆。惟可作燃料。老木燒之發香氣。可驅蚊。葉有毒。幹皮及根皮可鞣皮。果可製玄色染料。山間略有野生者。

楝　俗稱苦楝。落葉喬木。野生。堅軟中庸。可製家具。本縣多以作藥及門架犁轅。葉根皮實。均含有毒性。可入藥爲驅蟲之用。

冬青　高數丈。材白而堅密。可作小器具。作燃料。葉可作褐色染料用。

桐樹　常綠喬木。極易生長。葉似枇杷葉而薄。木材堅。外白中紅。鋸屑粘膚則癢。可作器皿屋幹。

皂莢　落葉喬木。枝幹間多刺。材質堅硬。肌理疏鬆。適爲器具材。及薪炭材。莢可除汚垢。供洗濯用。花及根皮可製藥。肥皂角樹形與檀及皂角相似。莢長三四寸。肥厚多肉。供洗濯尤良。子大可潤髮。

黃金樹　落葉喬木。原產於北美西北部。高至一百二十尺。直徑達三四尺。樹幹端直。生長迅速。木材輕軟而富彈性。用途甚多。如用爲鐵路枕木。可保存二十年。此外電桿建築材農具材等多用之。上年樹種輸入。成績不佳。蓋於造林法尚未能加意講求也。

槐　落葉喬木。葉互生。夜合朝開。花黃結莢實。其材質堅。可作小器皿。

洋槐　植於壤土及利於排水且溫暖不當風之地。發育最良。質堅而有彈力。可製器。葉可飼

牲畜。根皮可作藥。種者尚不多。

柞　葉常綠。壕塹之上多有之。抵抗諸害之力強。質堅理密。可作油榨牛車水臼車軸。

柳　種類極多。醴產爲線柳官柳杞柳水楊柳數種。其材概白而軟。適於各種小用及火柴軸。木條可編爲行李箱。植於低濕地或汚池旁。能分解汚水。吸收汚物。線柳一名垂柳。對諸害之抵抗力大。故可用以固堤防。護道路。淥江南河沿岸及汽車火車路附近多植之。清明前切粗如拇指之枝。長八九寸。斜插地中。深約五六寸。踏之堅固即活。

櫏樹　一名猴梜木。一名香樟。俗呼猴樟。樹幹聳直。高達五丈。木材白色。似樟而稍帶紫赭色。可作家具及裝飾用品。鄉人多將枝幹斲舂爲粉名曰香粉。大幹則剉成薄片。爲潤髮之用。粘性極強。俗呼美人膠。此樹馬軍鄉多有種植者。香粉運銷於外。歲千餘石。

椶櫚　多產於官莊山中。幹直無枝條。葉大而圓。攢簇梢頭。喜溼潤肥沃之粘土質地。其材堅靭。可作橋梁及器具。皮生兩旁。一匝爲一節。多纖維。耐水溼。可製繩及毛刷蓑衣。葉可製夏帽囊枕蒲團草履團扇。多以之植於庭園爲風景樹。

南竹　高二三丈。大者徑六七寸。以製器用甚廣。四鄉均產。清明生筍可食。

斑竹　一名笙竹。高二三丈。徑三四寸。有彈力。可任重致遠。製筐筥。節稀可作篙。立夏生筍可食。

黃竹　大約五寸圍。節稀而質柔靭。可剖細篾。製篩簟。夏至後生筍。不可食

小竹　有數種。苦竹有大小兩種。醴陵所產爲其小者。僅可編籬。立夏生。筍味甚苦。貓竹節稍大如指。水竹一名淡竹。大如拇指。柔靭可緣器邊。絨可入藥。筍可食。黑竹一名紫竹。高丈許。大如拇指。其根可治猘犬毒。立夏生筍。箭竹一名實竹。高八九尺。中孔小如針。土人取以爲杖及鼓槌。鳳尾竹叢生。高二三尺。植花園中。可供賞玩。方竹。高六七尺。莖始生而圓。漸長而方。生岩上。

果

醴陵縣境曠土頗多。且多爲黃色粘土。內含鐵質頗富。以之栽培果樹。黃色粘土特宜於梨桃之栽培尚稱適宜。又沿淥江兩岸。多沙質壤土。肥沃疏鬆最宜柑橘。邑人向於果樹園藝不甚講求。光緒末葉。南門外始有種橘者。今則鬱然成林。爲本縣大宗出品矣。近年由外埠輸入之品種。與白兔市益農果樹種苗場之果苗。既多且佳。且精研栽培之法。將來之繁殖固未可限量也。抗戰勝利後。陽三

石集義農場。東方中學及鄉間民家私自造之果園。如雨後春筍。新添不少。

橘　邑中橘樹，向惟於籬邊屋角間。見一二株。近二三十年來。綠林丹實。徧於城廂。歲可摘五千石。運銷漢口湘潭。其種類不一。最多者爲大紅袍。本地產。果大皮紅味甘。十一月成熟。惟核多不耐儲藏。次年一月底不爛。即鄭皮俱乾。無味。次之爲南橘。果實較大紅袍爲小。其餘完全相同。又大廣橘。果大十兩上下。皮色橙黃。初吃味甘酸適度。愈留愈甜。十一月下旬成熟。耐儲藏。次廣橘。果實較大。形正圓。味甘耐儲藏。倘採摘收藏得法。幾可接新。誠爲極有希望之品種。至於金鐶橘。一名金旦橘。果中大。皮色黃嫩。核少。耐儲藏。曰南豐蜜橘。江西南豐原產。果肉甘香可口。核少。均在試種時期。

柑　形似橘而圓大微長。熟則黃赤味酸。頗耐儲藏。甘者名沙柑。產量尚不甚富。

橙　樹似橘而葉尖。實圓比柚小而香。以前栽者不多。且無佳種。近由美國日本輸入之種。爲華盛頓臍橙。美國種。又名花旗蜜橘。果短楕圓形。頂部有突出之大臍。橙黃色。果皮紫實。肉瓤柔軟多汁。味清爽稍酸。瓤囊十個。深多上旬成熟。曰早生溫州蜜橘。日本改良種。果大扁圓形。皮生長強壯。能耐寒。曰早生溫州蜜橘。日本改良種。果大扁圓形。皮較大。形正圓。味甘耐儲藏。倘採摘收藏得法。幾可接新。誠爲極有希望之品種。至於金鐶橘。一名金旦橘。果中大。皮色黃嫩。核少。耐儲藏。曰南豐蜜橘。江西南豐原產。果肉甘香可口。核少。均在試種時期。

金旦橘爲佳。亦有種者。最近有蜜橘種輸入。曰改良溫州蜜橘。日本改良種。果扁圓形。皮薄無核。汁液豐富。風味甚佳。曰宮川早生蜜橘。日本名種。果實較大紅袍爲小。其餘完全相同。又大廣橘。果大十兩上下。皮色橙黃。初吃味甘酸適度。愈留愈甜。十一月下旬成熟。耐儲藏。次廣橘。果實較大。形正圓。味甘耐儲藏。倘採摘收藏得法。幾可接新。誠爲極有希望之品種。至於金鐶橘。一名金旦橘。果實橢圓形。似牛奶。故名。餘畧與金旦橘同。但大量栽培。仍以

旬成熟。

檸檬　邑中向無此樹。白兔潭益農農場。近植有美國檸檬。果似楕圓特大。皮色黃。味清爽稍酸。瓤囊十個。深多上旬成熟。

柚　家園多種之。近城治果圃者。與橘柚並重。舊種有紅瓤柚。果有楕圓及圓形二種。肉瓤紅色。味甘酸。耐儲藏。白瓤柚。果分瓣圓扁圓二種。甘酸適度。耐儲藏。近年輸入者。爲安江香柚。安江種。果圓。初摘食味甜微酸。久留更佳。極耐儲藏。爲洪江柚之代表。塘泉下顧家有此種。石榴香柚。安江特種。果扁圓特香。瓤肉如石榴肉粒。味特佳。爲安江柚中之極品。上二種。陽三石附近三立農場有之。無核柚。果中大。無核。味頗甜。民國二十五年。益農農場派員考察。首先於安江發現。至於酸柚。則舊種之劣者。僅能供作砧木用。

梨　梨爲水果中佳品鄉村多種之。但舊種多爲糠頭梨。果大肉粗硬。多渣味酸。樹性生長健速。對抵抗火爛病性強。爲嫁接梨中佳良砧木。其佳者曰早禾梨。本地種。果中大。甘酸可口。皮綠色。早熟。曰雪梨。本地種。果中大。肉嫩味甜。晚熟耐藏。曰秋白梨。較雪梨略遜。新輸入者爲萊陽慈梨。山東萊陽原產。果大倒卵形。果面凹凸斑點粗大。皮色黃綠。肉細味甘。富香味。十月間成熟。河北鴨梨。果大圓錐形。肉白質細。汁液豐富。八月上中旬成熟。又西洋種則有冬耐。果不甚大。早生豐產。我國之白梨。果類日本種則有菊水。果實扁圓形。外皮綠色。富光澤。肉色純白。汁多味甘。頗適於本地風土。八雲。果中大長

圓形。外皮黃綠色。有香氣。品質優良。肉質緻密。八月中旬成熟。祇園果　實圓形。外皮黃綠色。有香氣。品質良。八月中旬成熟。長十郎果　實圓形柄較長。外皮赭色平滑。肉白多汁而甘。品質良。豐產。八月中旬成熟。久保果　中等正圓形。皮赭黃色。味甘沙粒少。性強健。耐貯藏。九月間成熟。二十世紀果　實扁圓。外皮黃綠。斑點褐色。肉白色緻密。味甘而香多汁。今村秋果　大圓錐形。皮呈古銅色。豐產。品質優良。耐貯藏。十月間成熟。晚三吉果　甚大。圓錐形。皮深綠赭色。品質佳。晚熟。耐貯藏。諸品。均見之益農苗塲。而以棠梨爲砧木陸續嫁接者。歲可數千株。近有以楓樹爲砧木接麻梨者。汁細而鬆。味甘多汁。始於瀏陽。已漸移種至縣矣。

枇杷　夏初實熟。形圓色黃。味甘酸。近城及鄉間有之。栽時取樹秧接於他本。本以淋過灰壅之。不宜澆糞。新輸入者。有白沙枇杷。江浙種。果大圓。皮肉淡黃。味甘。端午前成熟。大紅枇杷。形圓而大。果皮橙黃色。味甘多汁。樹性強健。豐產。六月中旬成熟。茂林枇杷。日本改良種。果甚大。每果重約六十餘公分。六月下旬成熟。木瓜　多植於籬邊。實形楕圓。色黃味酸。不酸而香者。名曰香木瓜。改良種。果倒卵形。每果重約五十餘公分。赤黃色。肉厚汁多味甘。六月下旬成熟。

梅　產官莊潭塘一帶。春間取核埋之肥地。待長三寸許。以桃接之。若欲移種。須去其枝。沃以溝泥。無不活者。向僅有青梅果大色青。味甘多汁。六月間成熟。田中枇杷日本改良種。果甚大。每果重約六十餘公分。汁多味甘。樹性強健。豐產。六月中旬成熟。茂林枇杷。日本

皮色紅。味清爽。植下四年生果。產量極豐。端陽節前成熟。

桃　鄉村到處有之。爲腦潭桃花衝櫻桃嶺西岸境八里庵一帶尤盛。其類不一。最多者爲毛桃。果小。皮有絨毛。味酸澀。次之爲胭脂桃。本地產。果皮略帶紅色。果中大。味微酸。早熟。芒種桃皮半白半紅。肉嫩可口。早熟。禾桃果較胭脂桃微大。味甘可口。皮青白色。早熟。象牙白桃果大味甜。皮白色。中熟。及李桃矮桃觀音桃諸種。近年始有種水蜜桃樹者。兩三年即結實。特甘美。有玉露水蜜桃。奉化特產。果大圓形。肉白色。近核深紅。味甘而香。多汁。產量極豐。七八月間熟。早生水蜜桃。果大圓形。肉白味甘。七月上中旬成熟。企園桃即杭州陳圃水蜜桃。果形甚大。漿液豐富。八月中下旬熟。又另有新種。名陳圃蟠桃果極大。扁平形。肉白色。近核部微紅離核。味甘多汁。七月間熟。亦佳。毛桃樹性強健。生長迅速。可供嫁接砧木。亦稱台木之用。

李　立春前取根上發生之苗。移植他處。排列宜稀。各鄉皆有之。以瀘口馬家衝釗陵爲最多。牛心李果大味頗佳。狀如牛心故名。紅心李果中大。肉紅味頗甜。又名內紅李。一名夫人李。珠紅李皮朱紅。果中大。肉白色。味極可口。汁甚多。麥李與麥同時成熟。皮黑肉微紅。皆盛行於時。又有紫粉李沙糖李水李秧李郁李餳李諸種。最劣者爲石灰李。近有來自沅江者。曰大平李。果特大。皮面起白霜。味極佳。用毛桃作砧木。繁殖。爲沅江名種。

楊梅　產於山中。山居者多種之。地宜肥沃。接以他樹。臘月開溝。根旁離四五尺許。以糞土壅之。不宜着根。使肥水徐徐滲下。則結子肥大而繁。有紅白二種。均於端節前成熟。紅者甘酸。白者味極甜。果極大。邑東楊家村顆大色白或紫黑。年可產五六百石。又鐘鼓山亦年產二百石上下。

櫻桃　花園間有之。春分後分其根株栽土中。糞澆即活。結實如小丸。色紫紅可食。

石榴　栽者漸多。清明前將嫩枝插肥地中。時時沃以清水。即生根。夏初開花。單葉者結實。熟則綻裂如瑪瑙。甚甘美。其色有紅白二種。

棗　鄉村向有之。果粒小。味不佳。稱爲米棗。新近由西北省輸入者爲西棗。色赭紅。味甜而多肉。

葡萄　相傳張騫從大宛移來。即蒲桃也。今人家折藤枝插肥地。蔓長作架承之。早春將前年老枝剪去。則子肥大。佳者稱牛奶葡萄。果粒疏而長大。爲牛奶形。淡綠色。肉緊厚多汁。味甘。九月中旬收穫。其由歐美輸入之種曰白玉。美國種。果房大。豐產。果粒綠白色。味甘。多汁。耐貯藏。曰玫瑰香。歐洲種。我國北方之主要品種。果房大。果粒稍圓。紫紅色。肉緊厚。味甘香多汁。九月上旬成熟。曰龍眼。歐洲種。煙台盛產之。果房大。果粒圓形。紫紅色。果皮厚。味甘而香。耐貯藏。

柿　邑中栽者甚少。果不大。味甘帶澀。新輸入之種爲富有柿。日本種。果形大扁平。濃紅色。核甚少。味甘多汁。十月下旬熟。螃蟹柿。果大扁圓。爲河南名種。

柹　亦柿之一種。皮色青黑。其味甘。與柿同。當未熟時。擣取其汁。謂之柿漆。可製傘染罾。土人呼爲柹膠。

西瓜　五代時胡嶠征回紇得此種歸。故名。大暑後熟。瓤有紅黃白等色。味甜多汁。其子亦爲食品。宜沙質壤土。邑中種者甚少。民國二十六年。教育局於近城譚家冲闢農場試種蔬果。得西瓜重三十餘斤。

栗　栗樹高至四五丈。實有殼斗。剌如蝟毛。霜降後熟。其苞自裂而子出。有魁栗。果大味甘。尖栗。樹勢用途與魁栗同果爲尖圓錐形。兩種。魁栗亦稱板栗。山中人多種之。陽坑有尖栗坡。以產尖栗著。果小者曰茅栗。山中到處有之。栗當新熟時藏之沙中。可留至來春不壞。

白果　即銀杏也。葉有雄雌。雄者三稜。雌者兩稜。須雄雌同種。乃結實。大如枇杷。俟成熟時積

而腐之。獨取其核。鄉村間有是樹。

無花果　插枝於溼潤壤土即生。幹如枇杷。夏至前於枝間作隱花。苞內結實。熟則軟爛。色紫味甘。花圃中有之。

落花生　產自巴西。清初始傳入中國。莖葉似扁豆。開花落地。一花就地結一果。故名。簡稱花生。有大小兩種。宜沙質壤土。清明後下種。立秋後收穫。黃沙洲上及石亭等處產之。不宜用人糞及廐肥。

蓮藕　季夏荷花盛開。有紅白二種。紅者蓮子多而藕劣。白者蓮子少而藕佳。故種藕多取白花者。務本鄉多產之。藕有二種。以大紅袍爲最大。味甘。九節蓮則細長多渣。

菱角　莖端出葉。浮於水面。夏開小白花。實青色或紅色。有四角三角兩角。故名。八步橋有之。

芡實　俗呼雞頭蓮。葉似荷而大。實有刺。夏至後開紫花。菱花開背日。芡花開向日。故菱寒芡暖。一苞數十子。去皮色白。鄉間亦間有種於陂塘者。

荸薺　即鳧茈也。生淺水田中。春分時選種植泥缸中。一月後苗長數寸。移種水田。至暑季苗盛。即行分蒔。農民每於早稻收穫後。即以稻田爲之。莖如龍鬚中空。秋後地下發生球莖。冬至後成熟。作扁圓形。肉白而肥。味甘多汁。有兩種。苗高而粗。皮色紫而肉脆者。曰羊荸薺。苗短而細。色黑而肉硬者。曰猪荸薺。產量富。俗呼慈姑。誤。蓋慈姑別爲一種。邑中無是也。

果樹栽培法。栽培果樹。俱以落葉後發芽前樹液流動遲滯之時爲適期。樹之細根不可吹乾或晒乾。主根大長及腐黑者。均宜剪去。惟須多留細根。又栽時酌量剪去枝葉。洞宜三尺深大。先鋪乾燥細散之肥土。堆平其孔。用雙手搖動樹身使細土與根密接。切忌過深。灌之以水。俟乾後取粗土堆於周圍。夏秋時常澆灌一深。過乾過濕。均非所宜。初栽忌糞。七八寸之溝。將苗疏排溝內。覆之以土。灌之以水。待五六日後生機恢復。宜掘再行定植。至於栽植距離。因樹種類不同。普通接枝梨苗。須有一丈二尺至一丈五尺左右。接枝桃柚。普通一丈五尺至二丈二尺。初年其行間植豆類雜糧。栽培果樹。初年。可留強壯枝芽二三枝。秋季或翌春。再各留尺餘長剪去。至二年再選留五六枝。三年可留八九或十一二枝。使之排列均勻。無過疏過密之弊。如枝有過旺過強。悉宜剪去施肥。不可過近根際。人糞爲最佳之肥料。每石濃糞和水三石。油粕等肥料。宜和土施用。施肥最好於春秋多三季行之。果樹有隔年結果。性宜於隔年酌疏其花果以調節之。使其產量平均。果實碩大。果樹過弱。宜施肥料以培養之。過旺宜酌爲修剪以抑制之。

果樹扦插法。葡萄無花果石榴皆適用之。當早春休眠時。取一二年生老成枝。其上有一個以上之芽者。截條插於溫度氧气水濕適宜之處。覆以土。以足踏緊之。即易生根。

果樹壓條法。常用之於楊梅及葡萄石榴等。其法將近地面之枝條屈曲。壓入其一部於土中。壓以鈎狀物或土。待其生根。然後剪斷之。即獨立成株。壓時將其枝之基部切傷。或爲環狀剝皮。發根更易。

果樹接木法。分三種（一）切接。劈開台木之一邊。以削成馬耳狀之枝條（一名接穗）插入之。務使兩皮相接。束以稻草。覆以泥土。（二）割接。一稱劈接。將較大之台木。於離地一二尺處截斷。從中劈開。用接穗削成楔形插入之。束以稻草。敷以濕潤之泥。（三）芽接。於台木離土一二寸之處。用刀劃成十字。剝開其皮。將由接穗上削來之芽貼入之。用稻草纏緊。數日膠合。將俟新芽長出。始剪去台木之上端。

果樹接木時期表

樹名	切接時期	割接時期	芽接時期
梨 桃 梅	三月上中旬 三月下旬	三月上中旬	八月上旬至九月上旬 八月中旬至九月上旬
橘 柚	三月下旬至四月下旬 三月中旬至下旬	三月下旬至四月下旬 三月中旬至下旬	六月至八月 七月中至下旬

附記

表內時間均係國歷

果樹抱枝法。將選定欲繁殖之枝條。（普通多爲橘柚）用小鋸鋸斷其枝條下端橫斷面五分之三。再於鋸入之末端。向上割開一二寸。用瓦罐或竹筒納入之。外縛以繩。內盛以土。候筒內生根。再將其枝割下。栽入土中。即可成長。高接期間以春季爲宜。其罐或筒須有出水孔。倘夏秋愆勤灌水。當年深秋即可取下。否則須延至兩年。方能滿根。

花卉

廣治花圃。四時皆春。肩以入市。利輒三倍。惟以銷售無多。業此者尚尠。士紳家庭院點綴。多爲自種。擇其要者列具於左。

梅　今稱國花。開占百花之先。有單瓣雙瓣及紅白諸種。白者曰綠萼梅。名綠萼梅。葉後花而生。

蠟梅　枝似梅而花黃。故名。花重瓣。有素心狗蠅二種。

山茶　葉厚不凋。有單瓣重瓣及紅白諸種。其爲複瓣深紅不結實者曰絳桃。花黃蕊如金

桃　有單瓣重瓣及紫白粉紅深紅淺紅諸種。其爲複瓣深紅。結實扁圓者。

絲者。曰金絲桃。葉長花淡紅。自春開至初冬者。曰夾竹桃。花有紅白藍三種。複瓣深紅。結實扁圓者。

曰五寶桃。

桂　有丹桂金桂銀桂月桂春桂五種。金桂色深黃。花繁而香尤烈。月桂每月開一次。八月開者始香。春月攀枝着地。以土壓之。仲夏生根。逾年截斷。含蕊移栽。灌以猪糞。壅以蠶沙。花自盛開。如用金桂銀桂接石榴。其花必紅。即丹桂也。懸芝蘇梗於樹上。可避蟲。

牡丹　種類甚繁。有單瓣複瓣及黃紫紅白黑緋淺碧諸色。唐代名曰木芍藥。見重當時。有花王之稱。性宜涼。畏熱喜燥惡溼。得新土則茂。種子分根接枝。均可繁殖。栽時用陳猪糞火土灰及生土拌勻。分粗細二種。近根處用其細者。並拌白蘞末數兩。或更和以木炭屑糠頭。可避蟲蟻蚯蚓之害。撒麥數十粒於穴內。則花尤盛。初澆以清水。繼之以薄肥水。（猪尿水之類）惟當嚴冬酷暑及花大放時。切不可澆。開花前摘去蓓蕾之繁者小者。開花後剪其子。勿令結。皆能使花好。（一說埋猪大腸或死鼠於花本下。開花必盛。）

芍藥　向與牡丹並重。有花相之目。秋分後出其根以甘泉滌之。用竹刀剖開。去其老腐。用猪糞和泥。分種向陽處。種後培以雞糞。渥以黃酒。則花能改色。（其本無論新舊老幼。必三年一分。春日開花前切。勿分根。分則永遠不花。花謝後亟須剪去其子。盤屈其枝條。從此灌溉不失時。來年花必大茂。）

海棠　有西府貼梗垂絲諸種。春分時攀貼梗海棠枝着地。壅以肥土。自能生根。來春移栽。如以棠梨接之。則成西府。爲海棠上品。別有秋海棠係草本。喜溼。宜植階砌。

茉莉　氣味清香。爲製造香片茶葉之要品。性喜肥好暖。初苗時摘去嫩枝。使之再發。澆以米泔水。則枝密花繁。（用各種肥料均佳。但必待芽後方可施肥。尋常澆水時薄加魚肥水。亦宜。）至冬加土壅根。移畺煖處。清明後始可移出。梅雨時扦插陰肥地。易活。邑人不解扦插法。庭園清賞。多購自攸縣。（春初擇三四年之枝。剪長六七寸許。去其葉。每七八枝爲一束。開沙質壤土爲畦。每畦分二行。錯播株間。相距尺餘。栽時枝頭宜抹水。枝稍露土八九分。將其旁之土密覆其上。隔年始施糞水。至三四年後。視地之肥瘠酌量施之。枝葉宜常剪。仲夏至季秋。爲開花之期。花子離蒂時始可採摘。宜注意金龜子之害。樹之壽命可經五十餘年。一畝之田。可栽一千八百株。每株歲可得花十餘兩。）

玫瑰　花色有黃白朱紫四種。其氣甜香。可作香水釀糖浸酒。（移栽宜在秋末冬初。肥料忌人溺。）

蘭　爲盆花之上品。葉光潤而長。四時常青。花開五瓣。香遠益清。有建蘭（出自福建。一莖一花。）黃蘭（葉長而軟。一莖四五花。）澤蘭（葉短小）素心蘭（普通蘭皆黃綠色瓣上有紅紫斑點。此獨純白。）墨蘭（葉闊而厚。花色黑。此種極少。）四季蘭鈞蘭諸種。朱蘭生於王仙山岩。花色緋紅。一莖九朵。芬芳襲人。（移栽盆中。須常置諸南階。）蘭性喜陰畏寒忌烈日。冬宜藏諸暖室或土窖中。春夏之交移置高亢陰涼之地。暑月澆以冷茶。秋天灌以肥水。（用黃豆浸水使之發酵。或用桐枯。）昔人以春不出。夏不日。秋不乾。冬不溼。爲養蘭要訣。然亦視當地當時氣候而定。未可拘泥也。葉現斑點。即爲生蝨之徵。洒以魚肥。（即剖魚之水。）或用大蒜和水塗之即

去。秋分前後及春分前皆可分蒔。忌用鐵鍬。須擊碎其鉢。取竹刀剔去其根旁土及根之已腐者。一法移鉢於池塘邊。舀水沖洗。使之泥去根出。可保全其鉢。以三四本插栽盆中。培以羊糞陳者良。枯樹土老樟樹下土可辟蟲。火土灰冬月劇草皮和土煨之。宜用陳者。之混和物。拌勻置盆內面上面蓋以含有沙質之黃土。滋生自易。

荷　有紅白兩種。結蓮蓬有不結實者曰千葉蓮。有野生者曰鳧葵蓮又名金蓮。縣地在昔以種荷得名者。一爲縣東七十里之荷田。四十里之荷葉塘。一爲縣南六十里之蓮池汪。一爲縣西七十里之荷葉壩。一爲縣北三里之藕塘。今各處塘陂間有之。千葉蓮植於人家花園池沼中。

菊　菊之種類多於牡丹。以色分。則有白紫黃御袍金銀荔枝等類。以形分則有球子玉繡毬蘿蔔絲金錢銀台等類。以花分則有醾醾桃花茉莉等類。高而獨頭者曰佛羅菊。狀似嬰兒者曰孩兒菊。高與籬齊者曰東籬菊。一幹開二色者曰二喬菊。縣城各公所及人家花圃中皆植之。春日擇菊花之嘉種者。摘枝尾二寸許插土中。日澆清水。俟苗高尺許。始澆以薄糞大而茂。近轆入除蟲菊種。有紅花白花二者。秋日擇高亢向陽處治畦。用篩過細土與肥料混合。平鋪畦面。然後播種。再薄敷細土於其上寸許。遮以糞草。俟發芽後去覆。勤除雜草。及長至寸許。即移植他之苗床。至翌年乃植於圃。培以人糞及牛糞。五月開花。即連莖刈之爲藥用。其根明春仍當發芽。此外容易培植者。木本則有七里香。即山蘁也。葉生不對節。凌冬不凋。暮春開小白花繁而香。披條插之即活。多植庭園。青綠可愛。芙蓉　有白色純紅淡紅及朝紅暮白諸種。掩以土。來春移植池塘四圍。即活。紫荊春分前有紅碎花附枝而開。先花後葉。喜肥畏濕。冬種子或春栽根旁小條。均易茂。玉蘭開花碧白色。其香似蘭而烈。樹有高二丈許者。花大如蓮。夜合性喜暖。燥而不畏水。尤宜沙質壤土。初栽時宜重肥。馬纓即紅檵木。取根旁小條栽之。易活。梔子有大葉小葉單瓣複瓣之別。小葉複瓣者花甚香。辛夷即木筆花。喜肥畏濕。形似紅蓮。自夏開。至秋搔樹皮則葉動。俗名癢樹。白蘭葉大而尖。春夏秋紫花甚香。月季插枝即活。性畏日。花時間一日一澆清水。不可頻灌。薔薇。喜陰肥地。春秋分後下種。平常皆插芽或壓條移栽。草本則有魚子蘭葉小而尖。其花與魚子相似。色黃極香。萱一名忘憂。俗呼黃花。其花亦有紅色者。喜肥濕地。春夏秋俱可種。玉簪喜陰肥地。每年春掘出去其老根。移肥地栽之。則花多而繁。瑞香喜陰肥。惡濕畏寒。忌人糞澆。宜雞鴨糞。用白薇末撒土中培之。可免蟲。鳳仙喜肥。隨地隨時皆可生。花落後去其蒂則花不絕。牽牛喜肥。易生如鳳仙。蝴蝶花藍色。形如

蝶。**水粉花**。花爲漏斗形。十樣錦。花如剪絨。色淺紅。有各色。**路邊蘭**。一名間路草。如韭。開白花。**十姊妹**。花小而一蓓七朵。一蓄蓓者。有紅紫白淡紫四色。又有名七姊妹。**雞冠**。性喜肥易生。**剪春羅**。性喜陰。惡大肥木灰及薄肥水。**野蘭**。即蕙也。一稱草蘭。野間。二三月開花甚秀。**繡毬**。性似紫荊而不畏日。有紅白二種。栽培法同。**洋牡丹**。重瓣朵大而豔。備諸色。無蕊。**洋菊花**。如洋牡丹。有蕊。**芭蕉**。種於肥沃近水之地。滋生極茂。高者數尺。綠葉成陰。入冬則萎。覆以稻草。來春芽苗時。即可分根移栽。有一種開黃色或紅色花者。名美人蕉。花期長至數月。可作盆玩。**萬年青**。葉長梢帶卵圓形。深綠色。冬夏不枯。每莖三葉。春分秋分時栽盆中。置陰處。培以肥土。澆以冷茶。**吉祥草**。莖如蕙蘭。四時青翠不凋。夏開紫花成穗。宜多植於盆石中。但不可失水。**菖蒲**。澗邊常有之。鮮知用作盆玩。

畜產

邑中罕有專事畜牧者。割宅圈豕。豢魚於陰田之塘。與夫牛羊鷄鶩之畜。皆農家利之所在。其

重視與耕稼同。然不明防疫之法。孳養成羣。動殲於疫。救濟無方。輒乞靈於清醮。可嘅也。

牛　有水牛黃牛兩種。水牛全體灰黑色。能入水中游泳。故名。入水不宜久。久則生病。力大能勝服犂挽車之任。黃牛體較小。色黃褐。能曳磨。亦能耕田。東鄉耕者。多用水牛。南鄉則兼用黃牛。本地產牛少。約四戶有牛一頭。爲農家所重視。政府嚴禁屠宰及販運出口。三年前有牛乳公司。於縣城附近地飼養黃牛取乳者。踰年停止。以人類利益言。乳用牛。當與耕牛並重也。廐舍宜爽塏南向。或東南向。透日光。通空氣。糞薦不厭頻易。時其飢飽。順其涼燠。節其勞作。食後更微飲以鹽水。則牛自強健。冬季寒時。飼以棉粕及煮熟之糠糟。用沸水溶解。與穀秕。可以禦寒。牝牛孕時忌食腐冷不易消化之物。更不宜有驚駭顛頓勞役衝突等事。以致墮胎。牛如染疫病。則高熱減食。眼口肛門粘膜紅腫。齒齦泡爛。大便初乾後下痢。數日即死。其病直接由病牛傳染。間接由糞尿污藁飼料等媒介物均可傳染。須早防之。

羊　縣產惟山羊一種。牢宜清潔溫暖。近山田家。一戶恆畜至十餘頭。專供庖饌。無用以取乳者。防疫與牛略同。並宜注射血清。羊乳優於牛乳。取乳宜瑞士種。

豕　一名豚。俗呼豬。縣產毛色花白。絕少純黑者。農家恃廐肥爲栽培之用。家家有之。不放牧。

飼以熟食。幼爲白米粥。漸長則和以草及壯則混合米糠諸藤及粕水或豆腐渣酒糟等於一釜。日飽食兩頓。圈宜溫暖而闊。使之晝夜酣臥不動。則易肥。豬瘟病有霍亂及丹毒兩症高熱減食。初便祕後乃下痢。皮膚發赤斑或紫斑。其排洩物及分泌物。皆可直接傳染。

犬　分守犬田犬二種。守犬短喙善吠。有尾大毛長狀若獅子者。俗呼獅毛狗。有帖耳而短小如貓者。俗呼哈吧狗。田犬長喙細身。尾總無毛。追獵物甚捷。犬有病時。土人磨烏藥與之飲則愈。犬被癩犬毒。細菌侵襲即發顚病。初起時。體力倦怠。舉動遲鈍。咽頭痙攣不思食而甚渴。見水則恐怖嫌忌又不能飲。數日後舉動暴烈。常咆哮狂奔。遇物即咬。人若殃及。即被感染。此病潛伏期甚長。在咬後三週至七週始發。不久即死。預防法。可注射狂犬血清。或用鐵絲罩籠罩其口。舊法用黑竹根煎水。人畜皆可食。於初起時有効

貓　戶必畜一以捕鼠。純黃純白純黑者佳。其全身黑色。惟爪趾白者。名烏雲罩雪。尤爲上品。畏寒喜獨。其腸可製腸絲。供醫生縫合創口之用。

馬　有畜以代步者。然不多見。騾亦間有之。驢則冬季購自普蹟或他處。專爲熬驢膠之用。

兔　毛色灰白或黑白相間。嗜食蔬菜。生殖極繁。每年可產六次。畜者埋甕於地。俾其棲宿。

鷄　鄉村家家有之。每戶約五六隻。卵富營養分。用石灰飽和溶液濾淸盛瓶中。貯藏雞蛋。可以經久不腐。孵雛以春

秋兩季爲宜。用人工孵化者。則不拘何時。鷄塒宜向南或東南。俾易受日光。溫暖乾燥。其糞爲佳良之燐質肥料。飼以穀。日游行圃中。啄食蟲豸。歲暮圈鷄。扃之於極小之暗室。喂以油炒飯及細糠。逾月而肥。烏骨雞皮肉骨皆黑色。可作藥用。三年前顧潤民於南城外沙洲上。自闢雞園。採桃源雞種。孳生至一萬頭。已而染疫。死亡過半。遂中輟。雞瘟有霍亂黑死等症。發熱減食。雞冠變色。不久即死。蓋由病菌侵入消化器所致。近傳有治雞瘟方。用巴豆一粒搗碎。調以麵灰。灌食即愈。

凡牲畜預防染疫之方法。必須將未病者與病者隔離。並嚴行消毒。凡病者用具及食剩飼料。切忌與未病者混用。又疫死之內臟及其糞尿肥料。須拌石灰。深埋土中。不可使未病者接近。並須於此時禁各牲畜往來於疫症流行之區。

鴨　縣產多爲鶩鴨。農家皆畜之。平均每戶約五六隻。肉富脂肪。其卵多以之製鹽蛋皮蛋。雌鴨不善孵卵。當以雞代之。豢湖鴨者。千百成羣。則用人工孵化。每頭歲可產卵二百六七十枚。羽毛謂之鴨絨。可作褥墊。另有體肥大而步行遲鈍者。俗呼洋鴨。畜者尙少。

鵝　縣產。有灰麻色白色兩種。體重十餘斤。飼料爲靑草豆苗糠粃等。產卵期多在仲春。卵大。

年可產二三十枚。沿河一帶。蓄者較多。

鴿　喜羣居。善飛翔。富記憶力。佳者放至十餘里外。仍能飛返故處。雌雄同居。每年產卵數次。每產兩卵。雌雄交互孵卵。雛初生時。盲目裸體。其母自嗉囊分泌乳汁液哺之。迨羽翼豐滿。則又自孵其卵矣。約板爲櫃。中分數格。每格畜鴿一雙。聽其飲啄。極易蕃衍。

鷓鴣　色黑嘴長。頷下有小喉嗉。善入水捕魚。東鄉潘姓萊子山漁戶。豢養頗多。

蜜蜂　蜜蜂爲營社會生活之昆蟲。每巢有一女王。稱爲蜂王。統數百頭雄蜂及一二萬職蜂。其健存與否。關係全羣之存亡。（蜂王腹長翅短。拙於飛翔。尾端有產卵管。生活期三年至九年。一生中僅與雄蜂交尾一次。即能繼續產卵。）雄蜂翅發達。無毒刺。交尾後爲職蜂殺斃。職蜂爲生殖器退化之雌蜂。體小翅大。尾端有毒刺。生活期約八月。專司營巢採蜜育子種種勞役。變態完全。卵分受精與不受精之二種。受精卵成雌性蜂。於幼蟲期主食花蜜則成蜂王。否則成爲職蜂。不受精卵則成雄蜂。新蜂王產生。舊蜂王便率領舊部他徙。是曰分封。職蜂爲生殖器不完全之雌蜂。凡百勞作皆其分內事。釀成之蜜。爲糖類之精。（與沙糖爲四比一。）蜂蠟爲重要工藝品。鄉村住戶。間有養蜂者。懸方桶於簷下以爲盛衰關於家運。一任自然。歲取蜜十斤或二十斤不等。如生巢蟲則蜜少。當取蜜時。將巢皮割下。往往損及其蛹。甚或誤傷蜂王。以至全羣覆沒。西人有言。一箱之蜜蜂。勝於一畝之耕田。蓋謂勞力少而所獲多。不惟可以多得蜜。且助農作物結實也。故歐美各國莫不注意蜂種之改良。及其飼養之方法。民國十九年縣人鄧光里始輸入意大利蜂種。在縣農會後園依新法飼養。由三羣發育至卅餘羣。甫兩年。同歸於盡。蓋此地蜜源。宜於土蜂。不宜於意蜂。如芸薹花期早。橘柚花期短。烏桕桐花雖好無多。夏末秋初。又缺乏豆花蕎麥花以資接濟。冬季偏山皆茶花。則爲意蜂休假之期。如縱其出採。則越冬力弱。壽命減短。且茶花蜜含水分極重。冬寒不易蒸發。致蜂羣儲藏之蜜。亦不純熟。值是年冬。天氣轉暖。意蜂爭出採蜜。故不久皆染疫以死。土蜂則不然。誠能選擇蜂種。改良蜂桶。俾取蜜不致傷蛹。且可得純潔之蜜。鄉村每戶（相距約二方里）可飼蜂五六羣。每羣可得蜜卅斤。如普及全縣。亦一大宗出產也。（鄧光里發明改良蜂桶製法。）

（用一吋厚四吋寬之杉木板。製成長十六吋。寬十三吋。高四吋之長方格。格內用小鉛絲穿三四橫線。乃可支持蜂巢。底板寬與格同。長可比格長三吋。以便蜂出入落脚之用。三面沿邊釘木條高半吋。以長方格五格或四格疊置其上。頂面作一木板蓋。大小與格同。即成蜂桶。蜂桶外面兩側前後用木條作框。連蓋底夾之。以免格之動移。但木框均宜作活筍。以便格之增減。蜂羣位置宜向南。不宜放置太高。可作兩尺高木架。置桶其上。取蜜與看管均極便利。當花期盛時。職蜂終

日勤勞。看護須倍周到。蜂之刺人。原出於自衛。人至蜂場。如無特殊香氣及其他氣味。取箱時徐徐去手。必不來刺。勤入蜂場。隨時注意。久之自能成趣。蜂羣之強弱。全視蜂之優劣爲轉移。每逢春夏之交。分封熱起時。自然作出王台。產生新王。應選其長大而垂直者。保留一二。餘皆去之。蜂遇有戰鬥或因其他情形在箱外結成球狀。不可用物挑之。須用冷水一噴。自然解散。分蜂落於樹枝時。首先亦宜用冷水一噴。以免他飛。迄收入收蜂器或草帽頂內。放入空桶。亦宜用冷水噴之。然後將蓋板蓋好。即由蓋板作新葉。新羣成矣。蜜蜂釀蜜成熟後。儲於蜂葉之頂層。並吐蠟封固。舊式蜂桶。取蜜不易。每將蜜蜂有用之新葉及幼蟲。附帶割下。純熟之蜜。反難取之。如改用新式長方格桶。則取蜜便利。一至取蜜期。將桶外夾條鬆開。用鉄絲燙熱。從蓋板縫隙拉開蓋板。然後噴以煙。使蜂落於下格。乃照取蓋板之方法。取去上格。即得純蜜。

陳子釗以醴邑境內極宜提倡飼養中蜂。蓋以中蜂習性。刻苦耐寒。雖採蜜力不大。而消耗量亦小。恰與意蜂相反。就其歷年經驗所得。利用舊式豆腐格巢箱。採用新穎方法。務求適合中國農村之需要。分飼養分封禦敵越冬四項。簡便易行。而收效至鉅。陳子釗中蜂飼養法。（一）飼養中蜂之要訣。不外一個「安」字。如取蜜多留餘糧。使無飢餓之虞。蜂箱位置宜向東南。以避風雨曬。又宜避煙與灰。蜂箱內外務宜清潔。使蠟蛾無從產卵。以發生綿蟲。夜間注意防止蜂虎侵入。新置巢箱。務使無木質氣味。以免引起蜂羣之不快。且糖蜜不宜亂放。致養成盜蜜習慣。發生鬥爭。總之一切。均應使之舒適。（二）蜂羣宜保持其優勢。過弱則無採蜜之望。分封期間多在春末。事先有黑色之雄蜂出現。於時間常加以檢視。其法燃香一根。燻巢脾之下端。蜂羣即往

上擁。見巢脾下部側面。垂有如花生者。即爲王台。台內爲未出房之幼王。倘蜂羣過弱。可立予殺毀。不使分封。若蜂羣強盛。則用小刀。將其中最大之王台割下一枚。略附巢脾。用溶臘粘於另一新製空巢箱之上面底板下。其餘王台儘行刺毀。再與舊巢箱互異位置。老蜂因習於環境而飛入舊地新製之巢箱。見有王台。即行擁護。如此乃分封爲兩箱矣。再蜂羣分封之先。有偵探蜂四處偵覓安全住址。吾人可用火柴匣將偵覓居址之蜂捉住。放入預置之新巢箱內。（最好由巢箱上部側面孔內放入。使由新巢箱內飛出。）如此捉七八隻。各蜂先後飛返報告。偵覓之結果相同。分封之時必直飛入新巢箱。如此分封之後。因新巢箱內之蜂羣毫無儲蜜。晚上可將白糖調水用盆盛之。上蓋棕一塊。放入巢箱。以充足其糧食。日中即須撤去。以免養成盜蜂發生鬥爭。（三）養蜂須注意驅除害敵。如蜂虎綿蟲之類。其防禦之方。於蜂虎則用篾織小眼之笄。晚間遮其巢門。螞蟻則可探尋其來源。施用石灰。以截斷其路。大黃蜂來時。可用網捕捉。蜘蛛網勤於打毀。即可避免。至於綿蟲。可勤掃巢箱底板。再將暴露蜂羣勢外之巢脾割去。以免臘蛾產卵其上而生綿蟲。對於盜蜂。則無使蜜糖暴露。養成盜性。又蜂羣羣勢不宜強弱過於懸殊。倘已發生盜蜂。宜儘量縮小巢門或竟將蜂羣轉移較遠之處。以避免之。（四）蜂羣經過嚴冬。常有因氣候過寒。成儲蜜不多。致全羣死亡者。其救濟之方。即秋季取蜜不宜過多。使有充足之飼料。再則冬季降霜以後。即將稻草打軟或舊棉絮充實箱內空處。再將新聞紙油紙草薦等包圍巢箱四週。以免寒氣侵入。如此即可安全越過寒冬矣。

蠶　醴陵舊產桑樹。皆爲小葉。清光緒二十年。巡撫吳大澂輸入湖州桑種。越數年。蔚然成林。三十三年。知縣汪文溥設蠶桑講習所於縣城。招生學習。養蠶乃知改用新法。然以修業期

短。績效弗彰。民國元二年。長沙開辦蠶業學校。邑中女子多有肄業其中者。風氣一變。繅成之絲。光澤勻膩。與吳綾埒。迨後時局稍寧。又値人造絲大宗輸入。絲價驟落。鄉村婦女乃咸舍是而事紡績矣。當日所植之湖桑。至今尙多存在。如能重事倡導。當易爲功也。蠶性最忌陰濕。室宜向東南。常受陽光。使室溫暖。室中設備用具。以及催青掃蟻飼育給桑除沙分箔上簇收繭製種。皆有適當之方法。爲養蠶家所宜講求者。

魚

魚秧俗呼魚水。遠從瀟水來。草魚鯇魚鰱魚散子在穀雨節。其子綜集流下至湘江洄結白泡如指大。沿河居民用夏布爲罾撈取之。寘諸木桶中。上篷後泡始破見魚。豢新魚爲業者。每年夏至前後。輒肩簍往株洲或湘潭縣城購取。其細如髮。肩行二時許。必換水。用喇筒取去其陳水。雜魚常在下層。往往隨之而出。非所惜也。飼以鹽鴨蛋黃。畜之小池中。再飼以人糞汁及沙蟲。半月後改飼紫萍。踰月長寸許。分售與人。按類計値。草魚爲上。鯇次之。鰱又次之。鯉青爲下。混養於一塘。塘底須有肥泥。俾諸小動物繁殖其中。以供魚之自然食餌。水面宜多受日光。勿注入鑛泉。則溫暖而魚易長。故每當伏暑。爲魚發育最盛之期。飼料須四時無乏。冬至前投菜枯或人糞於塘之中央。大小魚羣聚一處而嗡之。隔十日一次。一冬共投三次。可使魚肥。新造之塘尤宜。

鯇　俗稱草魚。形圓長。脩帶灰色。食草及瓜類莩蘇之葉。如飼料能按日給與。一年長可八寸。二年尺有半。三年則重六七斤矣。

鰱　卽鱮也。體側扁。頭小。鱗細。背青腹白。體弱性燥。食草魚糞。好游泳於水之下層。養草魚千頭。配鰱魚二百則易長。

鯉　體扁而肥。爲紡錘形。鱗大排列如覆瓦。口旁有觸鬚。雄雌異體。雌魚於四五月間躍起產卵。每尾產卵數達三十萬粒。雄魚卽隨後注精液於其上。約經七日孵化。冬季水溫降低。則不攝食而冬眠。生活力甚強。失水後數日不死。有紅鯉青鯉白鯉金絲鯉等種。白者脊直。一年可長至四斤。惟塘中之鯉。不如在河中者之易長也。

鯆　似鯉而黑。俗呼雄魚。頭大而多髓。

鯖　一名青魚。形似草魚。頭與口較小。鱗大。背部青黑。腹部稍帶黃色。食螺類水藻等。每塘放一頭。一年可長至七八斤。

右五種皆養魚家所最注重者。此外則統稱雜魚。種類甚繁。其要者曰鯽。即鮒也。形似鯉而小。旁無鬚。小滿產卵。經七八日孵化。至二年而成。重約七八兩。喜藏石岩中。色有紅青白之異。花缸中所畜之金魚。爲鯽魚之變種。曰鯿。即魴也。體廣而扁。頭尾皆尖小。細鱗。曰鮎。體圓頭大。尾扁無鱗。多粘質。口闊有鬚。背蒼黑。腹色白。曰黃頰魚。即鱨也。俗呼黃牙古。黃頰無鱗。身尾俱似小鮎。腹下黃。背上青黃。羣游作聲軋軋。曰黃鯛魚。一名黃骨魚。俗呼漢骨子。扁長細鱗。曰鱧。俗呼烏魚。形長而圓。體尾幾相等。細鱗黑而有斑紋。曰鰷。即鯈魚。長數寸。形狹而扁。狀如柳葉。性好羣游。至於鰻鱧鱺鱖。池塘中雖偶見之。然不常有。

野生動物

明代醴陵土貢。有野味雜革雜翎名色。清沿明制。田賦項下。猶征活麂麂皮銀兩。乾隆縣志所列物產。有鹿有錦雞。迨後人稠地闢。漸乏豐林茂草以供潛藏。獵取不時。存者漸罕。近代歐美各國設動物保護會。除顯著爲暴者外。咸禁止任意捕殺以其捕食害虫。實有裨於農事。在禽類尤夥也。以鳥鳴春。以虫鳴夏。促織鳴。嬾婦驚。皆天然管籥。而爲田家益友。宜知所護惜矣。民國二十年。實業部以私宰耕牛捕釣田蛙均妨害農業。通令各省政府飭屬查禁。

野生動物譜

野獸類

虎 俗呼老虎。毛黃而有黑色條紋。土人稱爲扁担花。居深山中。噬人畜。然數年不一見。

豹 俗呼豹虎。體比虎小。毛色黃褐。有黑色圓斑。俗呼金錢豹。亦有現黑色花紋如艾葉者。性兇殘。常夜深至民家攫食豚犬。

狼 土人混稱豺狼。似犬而大。毛色雜黃黑。頭銳喙尖。目斜有光。尾長下垂。頰有白色小斑點。性殘暴。棲山中。飢則襲人食犬羊。邑中不常見。至日寇投降之明年。乃發現狼患。四出噬小兒。

柴狗 喙尖。身長而瘦。毛色褐或

野禽類

燕 體瘦小。飛行甚速。每小時可百四十里。嘴短闊。飛時張口。捕食飛虫。日可捕蟲三四千。春自南來。尋覓舊巢。如舊巢已破。則撮泥土重作。巢成產卵四至六枚。雌雄更番孵抱。經兩週而化。至秋氣候漸寒。食料漸少。遂成羣而返。

竹雞 似鶉而大。頭扁尾禿。羽褐色多斑。常羣棲茂密灌木中。食昆蟲蚯蚓。喜鬥善啼。能去壁蝨白蟻之害。諺云。家有竹雞啼。白蟻化爲泥。故人多畜之。

伯勞 即鴃也。體大於雀。背灰褐色。尾翼里褐色。喙短

昆蟲類

螳螂 俗名禾猴子。前足成鐮狀。生棘刺。適於捕虫。雌者在秋間產卵於樹枝。常集多數成塊。外裹膠質物。大如拇指。稱爲螵蛸。螳螂性勇猛。善捕食小蟲。有益農作。

蜻蜓 複眼特大。頸細如絲。迴轉自如。常飛翔空中。捕食小虫。雌者產卵水中。謂之蜻蜓點水。幼虫曰水蠆。專食水中小虫。越年始脫皮羽化。其色有青紅黃等類。

蜘蛛 口有毒腺。尾有三對乳頭狀突起。上有無數小孔。與內部之紡績腺相通。由紡績腺分泌粘液。接觸空氣。即凝結成絲。

昆蟲類

蛾 俗呼飛蛾。翅有細鱗。體肥大。觸角細長如絲。翅上面灰白。止時形如水平。常以夜出。有多種。

天蛾 幼虫喜食芋類之葉。故名芋虫。一名烏蠋。

人面蛾 幼虫青色體面光滑無毛。長約三四寸。食甘藷胡麻等之葉。

樟蠶蛾 幼虫叫樟蠶。體綠色。各節有疣狀突起六枚。簇生青色之長毛。體長約三寸餘。害食樟栗白楊等之葉。

松枯葉蛾 體色多變化。前翅有白褐黑等線條。幼虫食害松葉。

鱗介類

石龍子 即蜥蜴也。亦稱四脚蛇。全體生細鱗。背暗褐色。有五條青綠色之縱線。腹黃褐色。棲息草間或礫石間。捕食虫類。遇敵則脫尾逃去。尾斷後仍能再生。有全部青綠色者曰觀音蛇。不噬人。人偶被螫輒銜草至。取而揉之立愈。故有蛇醫之稱。

守宮 一名壁虎。頭扁平。背灰黑色。脚有吸盤。常巡行牆壁或木石上。捕食虫類。

蛇 爬虫類。體長圓無足。以肋骨自由伸縮而行。舌分裂兩歧。齒曲如鈎。有有毒無毒之別。有毒者別具毒牙

麻灰。四肢前短後長。尾垂後。鳴聲似犬。常盜食家禽。係豺之變種。俗以爲狐。非也。

犴 一名渠搜。其種來自西戎。俗呼西狗。似狗而小。烏喙黃身。其行成羣。猛而捷。能逐虎豹。

鼠 形小尾長。性怯懦。晝伏夜出。極易蕃殖。鼠疫流行時。爲傳播病毒之媒介。鼯鼠亦作碩鼠。尾長眼紅。居土穴樹孔中。好食穀豆。鼯鼠一名飛鼠。尾長腹白。前後兩肢間有膜。能飛行樹上。松鼠一名栗鼠。齒銳能破堅果。皆爲農林害。

鼬 又名黃鼠狼。頭略圓。體長脚短。半蹠踏地。背黃褐色。腹淡褐色。常吸吮家禽之而鈎曲。性猛。捕昆虫爲食。此鳥醴陵最多。爲除害虫之最力者。夏鳴。似呼姑惡。

雉 俗稱野雞。雄之羽毛美麗。綠色而有金屬光澤。雌之羽毛淡黃褐色。棲於野草叢中。食穀類虫類。善走。不能久飛。

鷹 俗稱巖鷹。（巖讀若牙）頭扁平。嘴灣曲如鈎。眼圓大。視力甚强。每肢四趾。爪鈎曲。翼長大善飛。肩羽與翼羽黃白色。性兇暴狡猾。喜獨棲。常捕食雞雀等弱小動物。

鴞 一名貓頭鷹。俗呼貓公鳥。頭圓兩眼向前。瞳孔能收放。適於夜間視物。耳有角羽。羽毛柔軟。飛時無聲。晝匿樹間。夜出捕食用以結網捕虫。性殘酷。同類相食。雌雄亦不相容。卵生。

蚯蚓 體爲圓長形。由百餘環節合成。好穴居土中。吞食腐植土。排出之糞。富含氮素肥料。又能翻鬆土壤。有益於農。

寄生蜂 體細長色黑。產卵管甚長。能插入別種昆虫體內產卵。孵化之幼虫。即寄生其體內。

瓢蟲 頭極小體成半球形。脚短不顯於外。翅鞘黃赤色。有黑點七粒。幼虫黑色與成虫均食蚜虫。有益農作。

斑蝥 體色美麗。多棲於沙地。性强暴。掠食他虫。

蝶 一名蝴蝶。體小有四翅甚大。多美麗。喜飛翔於花間。

鳳蝶 體色黃綠。翅二對。前翅黑。翅之外緣列生黃紋八條。中央部有黃斑。後翅具尾狀突起。體長約一寸。展翅闊約三寸半。五六月至九月間。發生三次。卵產於柚柑橘等樹。幼虫名烏蠋。爲果樹之害蟲。

黃蝶 春生者翅黃。表面無斑紋。夏生者。翅亦黃邊綠色。幼豆食。害豆科植物之葉。

粉蝶 又稱白粉蝶。翅白色。翅端帶黑色。幼虫叫青虫。食害十字花科植物之葉。

二。自能起伏。種類甚繁。土人象其形而名之。其著者如左。

貓公蛇 即蝮也。頭大而扁。形如三角。毒牙爲管狀。頸細。身長僅尺許。全體灰暗有褐色斑紋。至尾則驟短小。衆蛇之中此獨胎生。極毒。人被螫着手斷手。着足斷足。否則全身糜爛以死。口常吐涎沫於草木上。人誤觸之成瘡身腫。謂之蛇漢瘡。

鐵籤蛇 身小而甚長極毒。螫者不治。

兩頭蛇 有兩頭。頸現白環二套。腹白或紅。長五六寸。中其毒者不治。

百節蛇 身長背紋黑白相間。凡血而遺其肉。閹之則捕鼠如貓。追逐矯捷。能入鼠穴。

黃腰獸 俗呼黃斑。鼬身貍首。善躍。舌利如鋒。鹽虎之腦。舐牛之尻。俱能使之立斃。此獸不常有。或於深山偶見之。

蝙蝠 形略似鼠。棲檐間。俗呼檐老鼠。前肢趾骨延長。張以皮膜。達後肢及尾。觸覺銳敏。晝伏暗處。暮則飛出捕食蚊蛾。三獅洞石涵山洞最多。屎名夜明砂。入藥。

水獺 俗呼黃獺。頭闊耳短。脚短有蹼。能游水捕魚。吸取其血液。棄肉道旁。毛柔軟。可作襟袖。

獾 俗呼獾狗。體小而肥。尖喙短足。前小鳥。

雀 又名麻雀。體長約三寸。尾短翼小。不能遠飛。棲息簷下或屋角。永留一處。好食穀。但在育雛期間。則捕食虫類。

鸜鵒 俗稱八哥。全體俱黑。兩翼及尾有白點。常成羣降落田圃求食。人多取其頭上有幘者。珍爲籠鳥。飼以肉及蛋炒米小虫等。於端午或白露日修剔其舌使圓。可教以言語。又能擬他鳥之鳴聲。

鵲 一名乾鵲。體尾俱長。肩腹臀諸部。爲灰白色。餘爲青銅色黑色。性喜乾燥。常營巢於大樹梢上。兼旬乃成。將成之時。衆鵲共啣一巨枝。十百成羣。

螢 腹部後端黃色。至夜間發光。能捕食小虫。故爲益虫。

蟻 結羣營社會生活。與蜂同。每羣有雌蟻雄蟻職蟻兵蟻四種。雌雄蟻至夏季生翅兩對。飛行空中。交尾完畢後。雄蟻立死。雌蟻即脫翅歸巢產卵。蓋即所謂女王也。職蟻體形最小。終生無翅。專司種種勞役。兵蟻頭大顎極發達。亦終生無翅。搬食時司押隊作戰等工作。蟻能合羣力捕食諸虫。蠶豆梧桐之屬。出蜜誘蟻。防諸害虫之侵襲。互相保衛。此類植物。總名蟻植物。

蠍 略似蝦。前腹部闊。有七節。後腹六節細長成尾。尾端有毒鈎。螫人奇痛。上顎成

弄蝶 又名一字蝶。幼虫叫稻苞虫。體色綠。長成時色灰黃。食稻葉。常牽數葉爲一巢。在內化蛹。每年發生三四次。

蜚蠊 亦名負盤。一名稻椿象。俗名打屁蟲。體扁平而楕圓。色黑頭尖。觸之發惡臭。有翅能飛。好於清晨集稻上。食稻花。使稻不蕃。秋涼多入人家。民國三十五年。早稻有打屁蟲爲災。其形與常異。喙尖而長。爲長管狀。有觸鬚二。身長似蜻蜓。翅短能飛。有臭氣。色麻或黃或綠。

浮塵子 頭大腹小。形如小蟬。前後翅皆透明。種類甚多。色綠或濃褐。體長百節。多伏於溪澗旁。極毒。被螫者行百步即死。農夫持火把單常追逐其後。

鬥風蛇 一名扇頭風。口大如箕。齒有鈎。背現棋盤斜格紋。黑白相間。見人則昂首竪身逐之。遇者須急繞道走避。如身旁有長巾。則拋去使之咬緊。可曳行數里。又有頭爲銳三角形。背紋黑紅黃相間者。名犂嘴鬥風蛇。有劇毒。亦虺之一種。

狗屎蛇 即虺也。體比蝮蛇小。色如土。蟠時不圓。亂屈如狗屎。故名。

土鼈蛇 麻色。長二尺許。常伏路邊及大豆苗下。茶

肢之爪強大。適於掘食甘薯及植物之根。並食果實蚯蚓等。

狸 似貓而大。有數種。九節貍俗呼五臟虎。口突出。尾粗而長。白黑相間。現九節。亦有多至十三節者。花面貍有直線白色。亦喜食貓。貓貍亦稱野貓。夜間入人家竊雞鶩。牛尾貍俗呼果子貍。嘴尖尾長褐色。有斑紋。能上樹。食百果豆豇。

山牛 角短分兩歧。牛尾馬蹄。似鹿無梅花點。山中罕見。民國三十年邑東溫泉土人捕得一頭。重百六十斤。

麂 頭似鹿。雄者有小形彎曲之短角。脚細善跳躍。常夜出掘食番藷。毛暗赤褐色。皮若相賀者。（鄉人稱爲鵲上梁。多以是日爲吉日。）鳴聲喈喈。俗以爲吉兆。呼爲喜鵲。

慈烏 體小嘴黑而細。翼羽帶綠翠色光澤。俗稱此鳥初生時。母哺六十日。長則反哺六十日。故曰慈烏。

翠鳥 嘴長而尖銳。棲水邊樹上。常入水取魚。羽毛翠綠。昔人用以飾冠。有以網取翠鳥爲業者。今則絕尠。又有一種麻色者。曰魚狗。似翠鳥而大。亦善捕魚。

百靈 一名雲雀。體色褐。腹部喉部及頰皆白色。翅及尾深黑色。後趾之爪甚長。棲於平原。有時上唳天空。如一黑點。故又鉗狀。下顎變成一對大螯。能挾持食餌。晝伏夜出。子胎生。

蜉蝣 長六七分。頭似蜻蜓而有四小翅。體細而狹。尾毛有三。春夏之交。多近水而飛。生數小時即死。故有朝生暮死之說。惟其幼蟲棲息水中。捕食微細蟲類。經二三年乃化爲成蟲。

蜈蚣 體形扁長。胸腹部由二十二環節合成。各節有脚一對。第一對脚爲毒鉗。即毒顎。性畏日光。常潛居土石下。夜出捕食蟲類。子卵生。

蚰蜒 一名蝛螋。俗名蓑衣蟲。象蜈蚣。色黃或灰白。間或黃黑。口器有毒鈎。善咬。脚十五對。細長五分許。常以吻插入稻莖中。吸收汁液。稻即枯萎。桑葉大豆蔬菜罹害亦同。每年發生四五次。以卵體越冬。

螟 害稻之蟲有三種。一曰二化螟。幼蟲黃白色。背有黑縱線五在稻莖或葉鞘間作白色繭。蛾灰色。前翅長方體形。產卵葉上。扁平而增圓。每年發生二次。二曰三化螟蟲。卵如二化螟蟲。惟上有褐色毛覆之。幼蟲淡黃色。無條紋。蛹體細長白色。蛾淡黃色。每年發生三次。三曰大螟蟲。卵球形淡黃色。生於葉鞘間。幼蟲淡紫色。體長寸許。居稻莖中。蛹青褐色。前翅上有四黑點。後翅灰白色。每年發生三次。

兜下。

青竹篙 遍身綠色。日間常以尾鈎樹枝上倒懸。長七尺。最毒。

紅線邊 身有黑黃紅三色。長約三尺。

筍壳斑 色黃褐。現斑點。長四五尺。潛居屋角牆下。

烏梢公 頭背均黑褐色。長達五尺。激怒時頭部後方膨脹。可浸酒。

三劍蛇 背現三線如鋸齒。藏混泥中。食魚蛙。

松花蛇 松花菜花山烈均無毒。松花蛇頭色黑。現兩重王字。身青色。捕毒蛇食之。諺云。一里有松花。十里無惡極細軟。爲工業用品。

麞 形似鹿而小。雌雄均無角。雄者上顎犬齒甚大。故稱牙麞。每屆性期。常招呼雌性。鳴聲越越。俗以爲有鬼物憑之。妄也。

野猪 頭呈楔形。頸短不能回顧。吻端有鼻孔。犬齒發達。爲攻擊防禦器官。並用以掘土盜食蔬菜山芋等。牝者產子數頭。遇捕者至。則諸子緊銜其乳。負之以趨。

野兔 體似家兔。毛茶褐色。耳長能轉動。驚則耳聳尾立。毛肉俱可用。

豪猪 一名箭猪。頭大眼小耳短。足蹠如猴。背生棘毛如矢。遇敵則捲曲。立竪硬毛以禦之。晝伏穴中名告天鳥。鳴聲可愛。

黃鶯 一名黃鸝。一名蒼庚。體長約八寸。色黃而美。嘴淡紅跗蹠黑色。巢築於樹林高處。深杯形。好食果實。鳴聲悅耳。

鶯 一名告春鳥。俗呼春哥子。體小背黃灰色。腹淡黃色。夏棲山林。冬遊平原。嗜昆蟲。鳴聲清亮。春囀夏停。

百舌 伯勞之一種。似伯勞而小。全體黑色。喙甚尖。色黃黑相雜。鳴聲圓滑。能反覆其舌。傚百鳥之音。故一名反舌。

黃雀 形似雀而稍小。頭頂及腰部皆黃色。喉部黑色。鳴聲優美。啄食穀粒。即詩之黃鳥也。易脫落。能司觸覺。常棲息人家。夜出覓食。好脂油香。能入耳及諸竅中。雞食之死。其所食脂油。食之亦死。

黃蜂 體黃褐。尾端有毒刺。人被螫則腫痛異常。巢以纖維造成。狀如蓮房。多懸於樹枝或簷下。至晚秋雌蜂伏巢過冬。雄蜂俱死亡。此蜂能傷樹皮及果實。

紡織娘 一名沙雞。一名絡緯。羽灰黃或青色。羽下深紅色。夏秋棲息草中。雄者夜鳴如紡紗聲。

叫哥哥 一名括括兒。體長一二寸。色綠或帶黑。腹胖翅短。前翅之基部有鳴鏡。鳴聲期期。不舍晝夜。

天牛 俗稱鐵牛。體長大。頭方形有黑甲。甲上有黃白點。甲下有翅二對能飛。有二觸角如牛。其喙如鉗。能嚙破樹皮。產卵於樹皮下。孵化爲鐵砲蟲。嚙食樹木之形成層。越三年始變蛹羽化。啄木鳥常啄樹用舌鈎食之。

蚱蜢 體帶綠色。長寸許。口器適於咀嚼。胸部有翅兩對與脚三對。不能成羣遠飛。但善跳躍食稻及牧草等之葉。蛙爲大敵。

白蟻 蜉蝣類。似蟻而白。頭大脚短。口器堅銳異常。羣居於暗濕之地。蛀食腐枯之樹幹及建築物。被害之處。不顯於外。迨發現後。其內部已成隧蛇。又頭現黑王字。身金黃色。現有青花而美觀者。曰江西菜花蛇。

菜花蛇 似松花蛇。惟頭上王字不顯明。其臊如牛屎。

山烈蛇 背褐色。腹白。長四五尺。入藥。另一種腹黃者。名黃荊條。

魴　鯉　鯇　鯖　鮒　鯈　鱨　鱧

右詳畜產篇

。夜出覓食樹根樹皮果實番藷。

蝑 一名蝑鼠。體長尺許。甚肥。頭足皆小。全身有尖銳棘毛。遇敵則捲縮如栗球。食田間害虫。有益於農。

穿山甲 一名鯪鯉。體長三尺餘似鯉。有四足。全身披角質之鱗甲。能自開闔。性好食蟻。有腥氣。常張甲如死狀。誘蟻入甲。即閉而入水。開鱗甲蟻皆浮出。因接而食之。尾鱗尖厚入藥。

畫眉 全身黃褐色。喉腹及下尾筒白色。眼圍與眼後有眉形之白斑。雄鳥喜鳴好鬥。雌鳥則否。好食昆蟲穀類。

鶺鴒 體小尾長。尾緣色。棲於樹林。鳴聲幽靜。難辨方向。

蟋蟀 一名促織。體色黑褐。善跳躍。性畏日光。棲土中礫下。食植物之幼根。雄者能鳴。且好爭鬥。又一種似蟋蟀而小。棲竈間者。曰竈雞。亦能鳴。

蟬 頭短口爲長吻。能吸吮植物之液汁。翅膜質而透明。腹膨大。雄者胸腹交界處有發音器。常臨風而鳴。其聲宏亮。在鳴蟲中爲第一。雌蟲腹部末端有產卵管。卵產於樹皮內孵化之。幼蟲由樹幹潛居土中。吸樹根之液汁。蛻皮成蛹。出而登樹。再蛻皮而成蟬。歷時二三年。及爲成蟲。交尾即死。雌者產卵後即死。普通自夏至秋常鳴於日間。其體長。略帶綠色。至日沒時始鳴者。曰寒蟬。體小背青綠。頭有斑紋。其聲清圓者曰蜩螗。又體短色黃綠。夏日發呢呢之聲者。曰蟪蛄，皆蜩類也。

蛙 俗呼蝦蟆。捕食昆蟲。雄者大都能鳴。雌者則否。四肢前短後長。趾間有蹼。故上陸能跳。入水善游。體色隨棲處而變。色青者曰青蛙。亦稱金線蛙。色灰黑而有斑點。皮面有小疣者。曰土蛙。亦自北來。春又北去。

白鷺 簡稱鷺。全體純白。嘴黑色。頭有白冠毛。甚美。用作帽飾。羣棲河池相近之樹林中。好行涉稻田。捕食虫魚。

秧雞 一名水雞。體長四寸餘。形略似雞。羽毛黑褐色。嘴根與脚赤褐色。棲於水田。營巢於稻株下。善行涉淺水。不能高飛。食蚯蚓昆虫等。夏至後夜鳴達旦。聲如擊柝。秋後即止。卵有斑點。每產五六枚。約孵三星期而化雛。

斑鳩 一名鵓鴿。全體淡灰褐色。背面有黑色半環輪。營巢樹顛。雌雄雙棲。於久雨將晴及久晴將雨時輒長鳴。故稱爲喚晴喚雨。後結繭化蛹。成蟲變蝶。或爲蛾。松毛蟲化蛾。前翅有白褐黑等線條。

蠅 有數種。一曰青蠅。體色金綠。複眼赤色。全體密生細毛。脚有鈎爪與吸盤。喜逐腥臭。粘附汚物。傳播各種疾病。如霍亂傷寒赤痢肺結核等。繁殖力極強。每年可傳八代。每次產卵百餘粒。一曰飯蠅。形小體色灰黑。複眼赤褐色。常飛集於室內。一曰麻蠅。體大色灰。背上有顯明之黑紋。常產卵於肉中。

蚊 體細長灰褐色。口喙爲細管。中含毒汁。雄蚊常棲於草野。吸植物汁。雌蚊喜居室內。吸人畜之血。產卵汚水中。密集成塊。孵化後即沉水底。經二日幼蟲出。體細長。頭大胸小。腹末有呼吸管。常倒懸水面。以口食物。蛻皮四次。變爲蛹。蛹體短。頭胸腹三部明顯。腹末有一對尾鰭。常游泳水中。羽化後即飛去。

蛞蝓 蛾類。幼蟲有灰白黃褐諸色。長二三寸如蠶。呼毛蟲。每節有肉隆起。簇生長毛。人觸之輒腫痛。每年自春至秋。發生一次或二三次。類皆戕害植物。（有梅毛蟲金毛蟲茶毛蟲松毛蟲之異矣。

油葫蘆 形似蟋蟀而大。體色茶褐有脂光。棲於園地或石礫下。食害農作物之根部。晚秋則鳴。其聲幽咽。

螻蛄 俗呼土狗。體圓長。色黃褐。全體密生軟毛。後翅大。前翅粗短而堅。利於掘土。雄者夏夜發連續之聲。或誤以爲蚯蚓鳴。侵食稻麥蘿蔔之根。

金鐘兒 體形如西瓜子。但稍渾圓。色黑褐。棲於草叢或牆下。夜則鳴。鳴聲可愛。

金琵琶 一名松蟲。體形如梭。綠色。棲於樹林。鳴聲幽靜。難辨方向。

蠐螬 大口細鱗。有斑紋。

鰍 俗呼棹魚。口尖銳。腸有僅一小根。常追逐小魚吞之。

鰻 俗呼鈎魚。體厚而長似鰍魚。而腹稍起。扁額長喙。口在頷下。細鱗腹白。亦可噉魚。

鰻鱺 俗呼白鱔。體如圓柱。尾扁。鱗極細。大者長三四尺。

鱓 俗稱黃鱔。體圓而長。鱗隱皮下。產田泥中。

鱔 俗呼泥鰍。體圓尾扁。無鱗而有粘液。夏季產卵。常潛居泥中。又一種在河沙中者。曰沙鰍。

龜 腹背有甲。背甲雌平雄隆起。

鼈 俗呼團魚。體形似龜。甲圓。邊緣柔軟成鋸裙。吻端尖突。頸長性兇暴。喜食魚介。

蟹 生溪澗中。體小不肥。

蝦 爲節足動物之長尾者。常棲水邊。

蚌 藏體殼內。殼有靱帶。開合自如。秋季產卵。在鰓間孵化。

螺 殼呈螺旋形。食植物質。在田中者。曰田螺。棲水中石岩者。曰石螺。殼厚而堅。

雨。

鳶　天氣晴朗時。常見盤旋天空。視力銳敏。見地面有餌。從空中降下爪掠而去。有時亦捕捉小雞。

杜鵑　一名子規。一名杜宇。嘴扁平。上嘴尖。末端少曲。口大尾長。背黑灰色。腹白多暗色橫條紋。棲處隨氣候轉移。春深自南來。至秋復返。當春夏之交。晝夜哀鳴。嗜食毛蟲。有益於森林。俗稱陽雀催春。即此鳥也。巴縣志及郭嵩燾湘陰縣志。俱云杜鵑即陽雀。

布穀　又名郭公。似杜鵑而稍大。胸腹部之橫行黑條紋較細。常棲於山野。春來秋去。鳴聲如呼割麥插禾及各插各個。喜食蟲類。

啄木鳥　嘴銳直如錐。舌細長尖端有鈎。以嘴叩樹。察其中有蟲。穿孔鈎出之。百不失一。縣境所見者。多爲青啄木。背尾綠色。頭灰白。額頰皆黑。

鸊鷉　俗名氽雞。體小。羽五彩而多紫色。頭有纓毛上翹。一名紫鴛鴦。

稱泥蛙。色暗褐而有斑。腿部多顆粒者。曰錦襖子。又名金襖子。諸蛙均以小蟲爲食餌。有功農作甚大。宜保護之。

蟾蜍　一名癩蝦蟆。體肥胖。行遲緩。不能鳴。色灰黑。背有小疣。疣內分泌乳色毒汁。可入藥。

化爲子孓。經蛹而成蚊。有一種蚊能傳染瘧病者。名瘧蚊。體成黑色。翅上有斑點。飛時聲低。靜止時尾端蹺起。體與物面約成六十度之角。蚊卵產清水中。互相分離。子孓帶綠色。呼吸時體與水面平行。

蚤　頭小體肥。黃褐色。六足善跳。常棲於塵埃床褥間。好吸吮血液。卵白色。每產十餘粒。幼蟲蛆狀。脫皮四次而造繭化蛹。經十餘日化爲蚤。蚤能傳染鼠疫。即其糞中亦含有鼠疫菌。可從毛孔侵入之。

壁蝨　俗呼臭蟲。體扁而長。色赤褐。有奇臭。畏日光。常夜出吸血。能耐飢餓。三年不食亦不死。五月間產白色卵。幼蟲黃色。一年而成蟲。

蝨　體爲長橢圓形。口突出。適於吸收。普通可分爲三種。頭蝨色黑。寄生頭髮間。衣蝨色白匿居衣縫中。每一雌蟲產卵五六十粒。約經六日孵化。經十八日而成熟。毛蝨體圓而頭小。寄生於陰部或腋部。

蛭　俗稱馬蟥。體黃褐色。能伸縮。口腔有緣如鋸齒。好貼附人畜肌膚而吮其血。多生水田中。爲農所苦。中西醫治瘍。常用以瀉血。

藥產

明李時珍集中藥之大成。著本草綱目。近世英人伊博恩氏迻譯之。視同鴻祕。歐美醫學界遂羣致力於中藥之研究。且歲向我國購取大宗藥材。用製新藥。良以一草之微。其愈疾之神。有不可思議者。全國人民生命所寄。消費之多。關係之重。不在菽粟下矣。醴陵多山。草木繁殖。可爲藥用者。幾於俯拾即是。且有爲醫書所不載。而土人習用之。其效特著者。摘要鉤沈。得五百九十三種。顧原野雜生。人多不知採擷。知採擷矣。又恒苦供不應求。如地黃厚朴藿香防風以及朮苓歸芍之屬。每年從外輸入。奚啻數千百擔。要皆可用人工培植也。誠能廣治藥圃。於國民經濟。豈曰小補。至於藉口血肉補血肉。濫殺以饗口腹。既乖人道。亦蓋養生。然以蛇蝎之毒。鷄廳豕零之賤。施之於療病。往往與草木同功。就本縣所有而甄錄之。凡一百三十種。又縣產之金石水土常用以入藥者凡五十四種。具如表。形狀功用。大抵本諸本草綱目。及近世科學。而得之於土人經驗。亦十之二三。務求翔實。昭愼重焉。

縣產藥品表

名稱	形狀	採取部份	功用	附記
山草類 沙參	多年生草葉輪生夏初開喇叭花其色不一根一年後始可用	根	去痰除虛熱治咳嗽	
萎蕤	多年生草莖高尺餘有稜葉爲長卵形有平行脈葉腋開白色管狀花	根	治虛熱客熱風溫頭目痛咽乾	一名玉竹參本地產者根瘦
土蒼朮	多年生草莖高二三尺葉稍圓互生秋開筒狀花根似老薑色黑內黃白	根	燥濕解瘴	斷面無紅點氣味均劣
白朮	多年生草莖方高二三尺葉爲羽狀深裂莖頂開花有紫碧紅數種根粗色微褐內白	根	和中益氣健脾暖胃除熱去濕出汗消痰利腰臍間血通水道	葉如大薊根如枹味如薑故有枹薊及山薑之稱邑中有試種者勝于平朮
龍膽草	春從宿根抽莖高一二尺葉似竹葉對生無柄開藍青色花晝展夜合	根	健胃治目疾慢性粘膜炎	有以合掌消之根僞充者色黃而性劣
土柴胡	葉有鋸刻似菊艾冬初抽穗似青蒿結紅子根似苦賣根	根	開鬱調經	苗葉與普通柴胡異以生者數兩煎服調經有特效
前胡	多年生草莖高三四尺葉爲羽狀複葉秋開深紫五瓣小花	根	疏風化痰下逆氣治咳嗽	根質柔軟天花台出產最富如堅硬其心無紋者不可用
獨活	二年生草一莖直上葉爲羽狀富毛莖開繖形花	根	搜伏風燥寒濕治金創疼痛	
竹葉柴胡	葉似竹葉根粗而軟	根	疏肝除虛癆散肌熱去早晨潮熱寒熱往來治瘧	
防風	苗似青蒿而短小葉羽狀三裂開五瓣小白花結子色黑	根	疏肝泄肺祛風去濕散頭目滯氣	有試種者產量甚微
黃精	春從宿根抽苗莖高一二尺葉短而闊似竹葉互生夏開花結實如豆	根	補脾胃填精髓除風濕治大風癩瘡	俗呼山薑本草綱目以野生之薑爲山薑蓋另係一種

人參	根	高尺許葉爲掌狀複葉葉小色白子如腰子式秋紅如血根長多肉
野黨參	根子葉	莖長小如針中空葉卵形秋冬結實圓而紅根大如指肉白皮黃味甘揑之有黏汁
薺苨	根	一莖直上葉似桔梗但葉下光滑無毛根無心味甜
玄參	根	莖方色青紫葉長卵形尖有鋸齒對生夏開小筒形淡黃綠花圓錐花序
升麻	根	莖長二三尺葉似麻爲複葉小葉有缺刻及鋸齒夏開白花秋結實黑色根紫黑多鬚
仙茅	根	葉青如茅而軟腹略闊有縐紋又似初生棕櫚高尺許花黃根有節色黃多涎
黃連	根	葉小而尖背微紅根無珠多毛又一種葉似菊葉而大根若雞爪
淫羊藿	根葉	自宿根叢生數細莖春生葉及穗一柄三枝九葉葉卵圓有鋸齒開四瓣花
土當歸	根	莖高三四尺葉似芹葉葉爲羽狀複葉夏開小白花秋結漿果
知母	根	葉細長叢生莖高尺許夏間頂開淡紫花成穗實細莢內有三稜黑子
紫草	根	高二尺許葉長瘤圓形互生夏開小白花結子
細辛	根葉	葉闊而尖甚狹有長葉柄花三瓣色紫黑根細味極辛
杜蘅	根	春從地上莖生新葉心臟形有長柄開壺狀小朵花葉圓如馬蹄而背紫青者佳
及已	根	苗高尺許一莖直上有節如膝莖頭四葉中抽長穗開白花根似細辛
苦參	根	多年生草本春由宿根生苗三四尺莖紫葉互生似槐夏開蝶形花秋結實
白茅	根花	高二三尺葉細長而尖平行脈夏開白絨花成穗結細實根甚長白軟如筋有節
菅茅	根	苗似白茅而長入秋抽莖花似蓑花結黑實長分許根短硬如細竹根無節
芒	莖	叢生葉如茅而大開白花成穗
丹參	根	一年生草莖高二尺許葉爲奇數羽狀複葉開小唇形花
石蒜	根	初冬自其地下莖生葉似水仙而瘦硬春則枯死初秋抽梗開紅花裂爲纖形
山慈姑	根	冬月生葉如韭春分抽莖如箭幹高尺許莖端開花簇成朵立夏前結子有三稜苗旋枯
三七	根葉	葉似艾無岐有齒深綠柔脆秋開黃細花經年不槁
白頭翁	花根	多年生草葉爲羽狀複葉莖頂簇開大瓣花結瘦果有白毛如老人白髮
貫衆	根	葉叢生於一根作羽狀稍彎曲長一二尺小葉似楔形冬月不凋

補五臟益元氣安神生津調中泄火明目聰耳子發痘瘡葉清肺止渴祛暑降虛火	種至三年以上始可取根邑人有試種者培養不得法故無多收穫
治肺虛補中益氣	功同上黨參而力遜亦似沙參唯沙參斷面有孔此則無之
解百藥毒治蛇咬瘡毒	俗呼土羅蔔一名甜桔梗作濫者以之蒸過充人參
利咽喉通小便消腫毒	
輕宣升陽發汗行瘀血透斑疹療腫毒	
開胃消食下氣暖腰腳明目填骨髓治一切風氣	俗呼獨脚絲茅酒浸焙乾用忌鐵器
清心火涼血解熱毒消瘀健胃治火眼火灼傷	入藥以似雞爪者爲勝野生不多有自種者
治陽萎強腰腎利小便	
和血治金創及悶拘手足	一名活血草一名血當歸間有種之圃中者
治潮熱熱瘧肺萎子煩	
治痘出不快	
治頭面風痛口瘡鼻瘜風痺	
健胃潤腸驅虫治瘡瘍	
根除伏熱利小便止諸血花治吐血衄血並去鼻塞敷金創	俗呼絲茅
殺蟲治內牙腮諸惡瘡風瘰皮膚蟲癢煎汁浸並敷之	一名獐耳細辛俗呼馬脚連有毒不可食令入口使人吐血
治風瘙及婦人血病	藥肆以其瘦小多不採用
散血搗汁治虎狼傷	
益氣止渴除熱在胸膈	俗呼東茅
治瘡腫乳癰瘰癧及蛇虫狂犬傷	與石蒜極相似惟有毛殼包裹爲異耳
敷腫毒疔瘡惡核脇癰喉痛便毒	一名老鴉蒜一名銀鎖匙俗呼石蕊頭球莖皆屬根部以下準此
散血止血治跌打損傷及腫瘍	一名見腫消摘苗植土中即生有大葉小葉二種葉小者良
根明目除風氣暖腰膝逐惡血治腸風赤痢金創鼻衄經閉毒蛇咬傷花治熱瘧疾療白禿瘡	
消濕熱止崩帶解毒殺虫	俗呼野雞尾生山野谿谷陰濕地

狗脊	莖高尺許葉花相對而生似貫衆葉有齒面背均有蒼毛根大如拇指	根	強肝腎健筋骨治風虛絨毛治金創血出
野葸薺	性喜燥生山野土中葉三出似韭而細上面光根如豆大年久則有大如錢者	根	去目星瞖肉面斑
山馬蘭	苗似劉寄奴蔓延至繁到處生根葉互生無椏花心微黃赤	根花	治風痰喉閉驚風流注疔瘡疥痔兩腿伏火內痛
芳草類 當歸	莖高二三尺氣香葉爲羽狀複葉質厚色深綠有光澤互生開五瓣小白花根黑色	根	補血潤燥滑腸舒筋溫中散寒和血破瘀排膿止痛
牡丹皮	二月生苗葉與家種牡丹無異四月開單瓣白花結實秋綠冬赤根黃白色長數寸	根	和血生血治血中伏火除煩熱
芍藥	高一二尺葉爲羽狀複葉互生初夏開花結子根有赤白二色	根	瀉肝安脾斂陰養血散瘀清熱
青木香	蔓長數尺葉心臟形根皮赤有香氣	根	消毒散滯氣除心腹痛治瘧症
紅木香	蔓葉均與青木香相似惟葉背紫紅色根香	根	治雷頭風胃氣痛風氣痛跌打損傷瘧症腹痛
山薑	莖葉皆如薑惟根作樟木氣不堪食	根花	根治腹中冷痛中寒霍亂去惡氣花及子調中下氣消食止霍亂解酒毒
高良薑	春生莖葉如薑苗而大高一二尺花初生有大籜函之一穗數十蕊淡紅鮮妍子圓而紅	根子	健胃寬噎膈破癖除瘧瘧治打傷子燥濕散寒治霍亂嘔吐水瀉解酒毒
建蘭	有長葉短葉闊葉諸種一莖數花香遠益清花色不一黃瓣或素心者入藥	花葉根	花解鬱止瀉素心蘭催生葉止渴開胃散結滯根治跌打和血墨蘭花治青盲
草蘭	葉狹長而柔花甚香一莖一花者入藥	葉根	葉下氣開鬱止渴治噎及口甜根治瘋狗咬傷
澤蘭	莖紫赤葉類薄荷枝節對生秋開白花或淡紫花	莖葉	治水腫調經止血及產後諸症
馬蘭	莖赤葉長卵形尖端甚粗糙有鋸齒高二三尺開紫色花裂爲頭狀花序有冠毛結子根白	葉根	涼血破宿血治諸瘧酒痘鼻衄喉痺口緊絞腸痧腹痛血痢金瘡痔瘡蛇傷解諸菌毒
香薷	苗高二三尺分岐甚多枝莖葉皆有毛葺香氣強烈開穗狀花色紫	莖葉	發汗散暑熱治霍亂腹痛吐下去口臭
石香薷	莖葉一如香薷惟葉小而狹長莖有刺葉如月季而多	莖葉	治病同香薷而力更勝治天泡瘡甚效
瑞香	枝幹婆娑常綠冬春之交開花成簇色白香烈	根花	治急喉風花治乳岩初起齒痛
茉莉	弱莖繁枝綠葉圓尖初夏開小白花重瓣秋盡乃止	花根	花長髮潤面生肌根作麻醉劑跌損接骨	紫茉莉根治乳癰白濁子名士山奈取其粉可去面上瘡痣粉刺花可浸酒忌鐵器
玫瑰	莖有刺葉如月季而多鋸齒花有紅白二種	花	治吐血崩傷風痺噤口痢乳癰肝胃氣痛	苗與山馬蘭無異惟花色不同嫩時可爲蔬土人通稱泥鰍串
野薔薇	葉細莖多刺開粉紅單瓣花香最甜	花子根	花治瘡子治產後癱軟根治肺癰吐膿痰	
薄荷	多年生草春抽苗尺許莖方葉對生有鋸齒秋開粉紅色花	莖葉	健胃鎮痙清熱	春秋二季分根植於沃壤易生
毛薄荷	莖圓有毛葉粗糙有鋸齒開黃花	葉	治痧症霍亂	
荆芥	莖柔軟而方高二三尺葉爲箭鏃形淡黃綠色秋開小唇形花白色結實如蘇子	莖穗	發表祛風理血清熱下氣破積散瘀解毒	此藥用途廣邑中尚無自種者
積雪草	莖方蔓地葉圓互生大如錢周圍有小缺裂甚香夏開唇形小花	葉	治女子小腹痛小兒寒熱腹內熱定喘止哮嗽瘧腦漏牙疼淋濁肚癰疥瘡鵝掌風	一名金錢草一名連錢草一名爛銅錢

滿天星		莖葉均似積雪草小而無缺裂圓徑約一二分小如扣生陰濕堵砌	治目疾喉痛損傷腦漏黃疸牙疼玉莖腫痛疔瘡走黃	一名銅錢草一名落地金錢功用與積雪草略同
紫蘇		莖方有稜及稀毛葉稍圓而尖有鋸齒對生開小花結瘦果	莖葉子根 發肌表散風塞下氣殺魚肉毒消痰定咳喘	土人常用作發散藥農家多種之
水蘇		多生水旁苗似紫蘇葉對生甚香開花成穗	莖葉 治吐血下血頭風目眩	一名雞蘇土人呼爲筆直
薺苨		葉比水蘇稍長有毛氣臭	莖葉 治冷氣洩泄生食除胸間酸水挼碎傅蟻瘻	一名野蘇
藿香		方莖有節中虛葉微似茄葉至色黃時乃可取	根葉 治吐逆止霍亂心腹痛開胃口去口臭	山民有種者較售諸市者更香
草果		莖皮黃色薄而稜峭或黑色厚密者子粗味臭	仁 祛寒濕除痰破氣消食化積	
透骨消		藤蔓地而長葉似爛銅錢而大氣香開淡紫色花	葉狹長中抽花梗開淡紅花根葉皆如生薑作樟木氣	根 治惡氣牙疼心腹冷氣痛
山柰		葉狹長中抽花梗開淡紅花根葉皆如生薑作樟木氣	根 治跌打風丹鬧瘡	
縮砂仁		苗似薑葉長尺許開花結實如穗狀皮厚而縐	仁 祛寒濕除痰破氣消食化積	
益母草	隰草類	莖方有縱溝每節對生有長柄之葉缺裂如艾開淡紫色唇形花	莖子 活血調經治產後諸症子明目益精治產後胎前諸病	一名艾蒿到處有之
白花菟蔚		即益母草之開白花者	莖子 破血治產後腹痛	一名蠶桑益母草紫花者入血分白花者入氣分
蒼耳	蔵	葉似菊葉薄而多細丫背色青莖白如艾莖粗秋開淡黃花結實有細子	子 治五臟瘀血閃挫腰痛產後氣痛	子名龍鈴子一名春香子
夏枯草		莖方葉對生長穗圓形開淡紫唇形花	莖葉 治目疾瘰癧子宮及陰戶黏膜炎	俗呼矮子打傘生田塍近水處土人常採以充飢
菊		春由宿根生葉有缺刻冠花周圍爲舌狀中部爲管狀形色不一白而甘者良	花 治目頭風熱暈眩濕痺	苗煎水治女人陰腫先熏後洗
野菊		莖多分枝葉有深缺刻及鋸齒花小而黃爲頭狀花序	莖葉根 散腫消毒治一切癰疽根治癰閉及瘰癧未破	近水處常有之味苦不堪食
除蟲菊		苗與普通菊無異夏季開花有紅白二色	莖葉花 殺植物一切害虫驅蚊	邑人近有試種者
牛膝		多年生草莖方色青紫有節葉對生開小綠花	根 治腰膝痛經閉淋症血尿	葦白者稱白牛膝治喉痛
白牛膝		葉大卵圓而尾尖一節一葉莖葉皆有茸毛結子成穗如高粱	根 治喉痺痲症經閉膀胱氣痛	
麥冬		常綠多年生草葉似韭而堅韌有縱紋開穗狀花實黑根如連珠狀	根 止咳生津潤肺養胃瀉火祛痰	山野自生初夏採根植于黑壤肥沙地
茵陳		春從宿根生莖高二三尺葉細互生開穗狀花白者良	莖葉 治黃疸解熱發汗清血	生山野及河邊砂礫中
麻黃		狀稍類木賊莖有節甚顯節間有小葉如鱗片並生小枝夏開單性花	莖 治傷寒咳嗽發汗利小便	
地黃		多年生草高六七寸葉爲長橢圓形互生開唇形花實如小麥	根 止吐血衄血濕病女子崩中安胎明目	
旋覆花		春月抽苗一株一莖或二莖葉如披針無柄互生	花莖葉 下氣消痰除噫軟堅	其苗名金沸草功用與花同

名	產	用	備考
小薊	多年生草莖高二三尺葉似苦蕒葉爲羽狀有刺莖頂開紫紅筒狀花	根葉 治暴下血金創出血嘔血	一名刺薊
大薊	苗葉與小薊同惟高三四尺莖葉俱多刺葉縐花色如髻淡紅根多肉	根葉 根涼血消腫治吐血鼻衄崩帶痔漏牙病葉治腸癰去腹臟瘀血敷瘡疥	俗呼芳芥菜土人但知採根治牙疼
木賊	多年生常綠草莖綠色挺立不分歧中空有縱凸綫每寸許結節	莖 治目疾傷風及婦女血水不斷	莖粗糙可作擦木用
蒼耳	莖高四五尺互生葉卵圓形夏開小白花結實多刺	實 治久瘧鼻淵身癢頭痛一切風氣	莖葉功用略同
苧麻	葉卵形而尖有鋸齒背生白花開淡黃綠單性花	根葉 根葉熬膏治一切瘡毒根治淋安胎下骨鯁傅腫瘍葉治蛇虫蛟傷	以苧麻與產婦枕之止血暈
土洋參	蔓生葉似蕃椒葉根如小胡蘿蔔色白味甘	根 清熱止渴生津	近多有蒔諸苦瓜棚下者
漏盧	苗葉就地叢生葉似花芥葉葉中抽梗開紅白花結實如脂麻房	根 下乳汁止血排膿治皮上層熱毒疸痔濕痺	
青蒿	莖高三四尺葉小而香色深青至秋不黃開花結子俱可入藥	莖葉根 治瘧疾骨蒸殺虫治瘡毒金創	蒿有數種先蒿燒之可殺蚊
棉花子	草棉所結之實炒至黃黑色去殼爲末用	實 補血暖腰治腸紅下血崩帶癰疸經水過多便毒痔漏牙疳卵腫	花可止血殼可治腫
白蒿	葉似嫩艾而歧細面青背白	治風寒濕痺補中益氣利膈開胃	一名艾蒿生近水陰濕地香美可食春日采取作餌呼艾粑粑
紫花地丁	自葉叢抽莖開五瓣花花紫者莖白花白者莖紅	莖葉 治紅腫掀發之瘡瘍	
劉寄奴	春從宿根抽苗似艾而莖葉厚秋開黃色頭狀花	莖葉花子 破瘀活血通月經治產後血氣脹及金創出血	
淡竹葉	莖高二三尺葉互生似竹葉作廣披針形開粗大穗狀花	葉 去煩熱利小便	
鴨跖草	多年生草莖高尺許色紫葉如箭而闊夏開藍花如蛾形	莖 治瘴瘧喉痺疔腫蛇咬	俗呼竹葉草一名水蕹菜采花取汁可爲繪畫顏料
萱草	葉如蒲蒜而柔弱新舊相代四時青翠夏開六出花	花根 消食利濕熱治小便赤瀝除酒疸治沙淋便血乳癰	其花俗呼金針一名黃花菜可食
雞冠花	一年生草莖長葉青互生秋開紅花或白花聚生如雞冠最耐久	花子 治痢疾痔瘡赤白帶下腸風下血	用花及子炒拌紅白糖和汾酒燒之然後加水及鴉片治痢神
青箱子	莖直立高一二尺葉卵圓或鈹針形花紅色其穗尖長秋結子	子 明目	花與雞冠花異形
芭蕉	高八九尺莖軟重皮相裹外青裡白葉甚長大根如芋魁味甘	根 治天行狂熱煩悶消渴產後血脹搗敷癰毒	
艾	多年生草葉似菊而香秋開菊頭小花	葉 調經安胎驅虫治消化不良	
蓼	一年生草莖紅葉狹長夏秋開花色紅或白成穗下垂結子大如胡麻	子莖葉根 治霍亂及癰瘍瘰癧蛇咬	有大蓼水蓼等種原野常見者爲辣蓼其味辛辣燒之驅蚊
蒴藋	高三四尺每枝五葉花白子如菉豆大色紅	苗根 治身癢風疹濕痺螻尿瘡寒濕腰痛脚氣頭風	
酸漿	葉嫩時可食四五月開小花黃白色紫心白蕊	苗葉子莖根 利濕去熱痰治癰疽明目利水道治寒疸喉痛子治難產胎熱天泡濕瘡	一名燈籠草一名天泡草
敗醬	春初葉布地生狹長下部爲羽狀複葉上部爲單葉有鋸齒夏秋莖高二三尺而柔弱數寸一節節間生葉花黃根紫	根 破血散毒排膿催生落胞產後腰腹痛血暈鼻衄吐血傷風下血赤白帶下治目疾脾耳丹毒腹癰	一名苦菜俗呼苦齋可作菜食味微苦搗汁隔夜即作陳醬氣
魚腥草	多年生草莖細長葉爲心臟形有腥氣開淡白花即蕺菜一名石臭靈丹生近水處	莖葉 解熱毒治癰疽金創及蛷螋尿瘡	用豇豆葉或箬葉數重包煨之冷敷惡瘡拔毒及炸彈傷甚效土人于端午日采取晒乾作茶解暑

名	莖	葉	花	根	子	實	葉	根	子	苗	莖	葉
豨薟	莖方葉對生爲卵形而尖邊緣有粗鋸齒莖葉有茸毛開小黃頭狀花序結瘦果	葉	治麻痺骨痛膝弱及瘡毒虎傷蜘蛛咬									
王不留行	莖高一二尺葉形如箭鏃對生脚抱莖無柄開淡紅五瓣花蕚爲筒狀結實如天泡子殼有五稜內包一子	莖子	行血止血定痛催生通血脈下乳汁治遊風鼻衄便血瘰癧疽惡瘡金創	俗呼野小豌豆								
菸草	葉無柄卵形晒乾研末又條絲煙作坊及吸煙桿內之煙油亦可入藥	葉油	殺虫消毒油治毒蛇蜈蚣咬傷及惡瘡頑癬	俗呼生煙								
野蕎麥	形似蕎麥莖質柔而性堅上有倒刺開粉紅或白色花結子	根	治喉痛喉閉痔漏乳癰	一名金鎖銀開一名鐵邊箕土人呼野花麥								
半邊蓮	從宿根抽莖就地延長極易繁殖葉尖長有鋸齒無柄開花花偏一方恰似一半	花葉	治蛇咬寒齁氣喘散血消腫治血淋打傷	俗呼野冬莧								
蘆根	莖中空葉互生細長而尖有平行脈秋開細白花圓錐花序	根	止嘔除煩熱發疹瘖開胃	俗呼野蘆筍其芽初生如筍治熱膈解蟹毒及狗馬毒								
決明	葉似槐葉夜不合秋開深黃五出花結莢長二寸許內有子褐色成數行	實葉	子明目去頭風益腎助肝氣治目疾頭痛鼻衄葉除痰止渴調中解蛇毒莖葉治霍亂煩渴腹脹癰疽	此種本草稱江芒決明一名望江南俗呼土大干種園中可僻蛇蟲								
藍	莖高二尺許葉似蓼秋冬之交抽長梗開小紅花	葉子根	解熱毒治發斑時疫癰瘡	其汁治斑麻蜘蛛咬傷欲死者神效								
藍澱	以藍葉浸池中加石灰攪之去水即成靛		解諸毒傅血瘡小兒禿瘡熱腫撐耳風									
青黛	浸藍葉于池加石灰打澱所起之沫也		去煩熱吐血咯血斑疹陰瘡殺惡蟲									
虎杖	莖斑葉圓秋季開花狀似菊色似桃九月結子		治產後瘀血作痛墜撲昏悶通經破結									
萹蓄	布地而生花節間白葉細綠花細微青色黃		利尿消腫治蟲癢蛇咬心痛女人陰蝕									
瞿麥	葉作長披針形對生夏開淡紅花秋結長角內有小子	實	利尿通經									
七葉黃荊	莖上起稜一凸間作紫色葉針長相對一枝七片開細白花秋結子如珊瑚	子根	根行血敗毒治魚口便瘡跌打蛇咬									
紫背天葵	葉大如錢面青背微紫開細白花夏初即枯根形如鼠矢外黑內白	根	清熱治勞傷七疝治癰疽疔痔瘰癧跌撲瘋犬傷子治癰痺									
旱蓮草	生田塍上葉似柳莖似馬齒莧揑之有汁如墨開花細而白	莖	止血排膿化熱毒散滯氣通淋治乳癰疔腫截瘧飲汁解蛇毒	俗呼墨草一名鱧腸草一名黑面蜈蚣								
蒲公英	葉由宿根叢生羽狀分裂有大鋸齒下向早春葉叢抽花莖斷之有白汁頂開舌狀黃花冠有冠毛中有子	根葉	解熱毒滯氣消乳癰結核健胃暖下	一名黃花地丁一名白鼓釘								
萬年青	多年生常綠草葉厚叢生中抽花莖開淡綠小花成穗結圓子	花葉	治咽喉急閉火丹湯火傷天泡瘡蛇毒子催生	多有栽于盆中者								
野苧麻	苗長尺許葉圓而尖如卵形子細碎根肥白搗之有汁	根	治疔瘡發背蟲螫蛇咬	一名天青地白生溪澗邊								
黃麻	苗似紫蘇葉爲長卵形互生	葉	治血症崩中氣症心疼痞結子治欬傷肺	大麻即火麻與黃麻科屬各別入藥功用迥異本草綱目誤作一物								
水燈芯草	莖圓而細長高二三尺色綠無枝葉生水中	莖	止渴利小便									
馬鞭草	莖方葉有缺裂夏秋間開紫花爲穗狀花序	根	行血敗毒消腫治久瘧打傷脫節風	一名鐵馬鞭								
菥蓂	即大薺花葉均似薺而大莖硬有毛	苗子	苗和中益氣明目子治目痛淚出除痺痔心腹腰痛	味甘可食邑人無用作蔬者								
薺菜	冬至後生苗春起莖五六寸開小白花結莢如小瓶中生細子		明目補肝益胃解熱治痢子治痛青盲腹脹	土人于上巳日采煮雞蛋食								

鼠麴草　葉似鼠耳有白毛抽莖開黃花一名鼠耳草俗呼鼠麴艾

剪春羅　苗高尺許柔莖葉綠入夏開花深紅色花如盞周圍邊如剪成

迎春草　叢生高者二三尺方莖一枝三葉葉如小椒葉而無齒面青背淡春初開小黃花不結實

金盞草　苗高數寸葉抱莖對生厚而狹莖頭開花大如指頭金黃色狀如盞子四時不絕

天茄　苗似茄莖有淺楞開五瓣小白花結實如茄子大如拇指色紫黑味甜

女青　葉對生長卵形莖葉皆臭夏開白花

狗舌草　叢生葉似車前而無文理抽莖開黃白色花四五月採莖晒乾

見腫消　春生莖高一二尺紫色葉似桑葉而光滑面青紫色

海金砂　莖質硬葉爲羽狀複葉有子囊

車前　春從地下莖生葉五六片形橢圓或倒卵有柄夏開紫色小花結蒴果

穀精草　叢生一株分歧數條莖長五六寸開小白花結實

蒺藜　苗如蔓偃伏地上爲羽狀複葉長橢圓形夏開小黃花果實似菱有刺

牛勞子　莖高三四尺葉大如芋葉初夏開花成叢色淡紫結實似楓球而小

連翹　葉赤色葉狹而小爲橢圓有鋸齒開黃花結實內含黑子如粟粒

天名精　葉叢生狀似艾莖邊緣有鋸齒皺毛其氣辛臭夏開小黃花結實

鶴蝨　即天名精之子極尖細

攀倒甑　苗如地茄莖麻色開白花而小

臭牡丹　葉大如掌似桑而糙臭氣甚烈夏開粉紅花一蒂百花

石打穿　立夏發苗布地生葉有微毛抽莖高一二尺寒露開黃色小花成穗

鐵筅帚　莖方有紫線紋葉馬鞭草秋初開小黃花結實似筅帚形能刺人手

綿絮頭草　苗如鼠麴草葉較大毛厚密似棉絮立夏開黃花一莖直上成簇

土花椒　葉對生尖而有刺開小白花結實生青熟黑

箸葉　根莖似小竹叢生葉長大頭尖面青背淡柔而韌

狗尾草　苗葉似粟而小其穗亦似粟黃白色而無實采有花者之下截用

土人和米粉作餈近有患臁瘡數年面瘢者采此當茶服至數十斤竟愈

調氣益中止血除痰止咳去濕

治火帶瘡繞腰生者

研末酒服治腫毒惡瘡

治胃脘痛流精蠍毒葉敷腫毒金創拔毒

治腸痔下血久不止

一名長春草

解蠱毒逐邪惡氣辟疫治暴死

俗呼臭青

治淋症滲濕熱

俗呼蝦蟆藤

道旁田畔到處有之

生田中俗呼鑽子草雷挺草

一名刺蒺藜風家用之炒黃去刺可以救荒

治小兒蚘蟲

黔人衣有臭氣俗呼臭蟲婆

治吐血喉腫瘡毒蛇傷刀斧傷

一名地菘一名鶴虱草一名杜牛膝

宣肺散結清熱解熱治咽喉痲疹

一名大力子葉同功

散諸經客熱利小便治癰腫瘡毒

治疔敷一切癰疽洗痔瘡脫肛蛇咬

俗呼臭草其花開于端陽前故一名鬧端陽

治囊風濕瘡梅瘡下疳茸治刀斧傷封血

與普通花椒異

去風濕治筋骨痛

即簪葉

治諸血症喉閉耳痛洗目疾利小便消癰腫

治黃疸噎膈翻胃吐血脫肛血崩癰腫

一名頂龍芽類似馬鞭草惟花色不同

治風痙黃疸吐血跌撲鬼箭風鶴膝風瘰癧

治赤眼睫毛倒植疣目風疹羊毛疹癰疔面癬

火眼外治法翻轉目臉用二二莖蘸水憂之去惡血

狗卵草　蔓延而生葉小開細碎花極間結子似腎內有兩細核　治疝氣

鹿藿　苗葉似綠豆而小　治蠱毒女子腰腹痛瘵癰止頭痛　即野綠豆

蘩縷　上月生苗葉大如指頭細莖引蔓斷之中空有一線如絲味甘花白五月五日採乾　苗　去惡血下乳汁治產後腹中塊痛積年惡瘡痔丈夫陰瘡潰爛小便卒淋鼻痔　一名鵝腸菜嫩時甘脆邑中田野間有之無用作蔬者

雞腸草　葉對生似蒙縷而色微深莖不空無絲開紫花結實味微苦嚼之涎滑　苗　治毒腫止遺溺療一切瘡及風丹遍身癢痛及小兒赤白痢

翻白草　高七八寸葉尖長而厚有鋸齒皺紋面青背白開小黃花根大如指形似雞爪赤皮白肉多粉生熱皆可食　　治吐血下血崩中瘧疾癰瘡　一名雞爪根俗呼雞脚爪近人僞充甘遂以其形似也

翹搖　蔓生細葉春深開小花紫白色結角子扁小　　平胃破血止血生肌治黃疸去熱風止熱瘡　一名紫雲英俗呼草子農家用以肥田亦可作蔬

蕘荷　春從地下莖抽苗高二三尺葉尖長類薑夏開淡黃花根似薑芽而肥　根葉　治蠱及瘧吐血痔血解蛇毒敷惡瘡點目赤腫葉治溫瘧蠱毒　其芽俗呼薑筍紅脆可食

茅膏菜　高數寸葉如半月形有毛分泌粘液捕小蟲食之花小色白　苗　治赤白久痢

山丹　莖短葉狹長而尖夏開六瓣紅花子紅小其根似百合小而瓣少　根花　根治瘡腫驚邪女人崩中花活血傳疔瘡惡腫　即野百合

土芋　蔓生葉苗如豆苗根圓如卵似小芋肉白皮黃　根　生研水服能解諸藥毒熱食去熱咳

四方如意草　高數寸叢生一莖一葉如犁尖四方分開四月開紫花結實有殼裂成三瓣　苗　活血追風辟時疫治飛蛇瘡偏頭風目疾　俗呼犁嘴草

美人蕉　形類蕉而小抽莖作花開至數月色紅　葉花　葉治一切吐血花燒研湯下治心痺痛

白蝴蝶花　高二尺許葉爲鍼針形脈平行花美有鋸齒如毛白色者入藥　根　洗瘡瘡焦黑痔漏膀胱落下治手足拘攣楊梅結毒瘡癬

吉祥草　葉如建蘭而短小勁直入冬不凋夏開紫花成穗根下有子　莖葉　治癰腫拔毒治發背瘡解蛇毒　性大寒暑天采葉搓水即成凍色綠故一名六月凌俗呼鐵箍散

苦芙　葉如地黃味苦初生有白毛夏抽莖生毛開白花結實　苗　燒灰傅漆瘡刀斧傷治丹毒洗痔　俗呼毛地黃一名苦藉

野蓆草　莖輭蓆草稍短夏初開小花根似竹根黑色　根　止血痛風痛

水楊柳　葉如柳其莖春青夏赤條條直上不分枝極　根　治目疾搗貼寸口俟發燒覺痛即去之貼處起泡隔日挑破出水即愈

水楊梅　高尺許莖有毛葉似菊現三叉莖頂開黃花結子綠色似楊梅　根　治疔瘡腫毒目赤痛

三白草　莖多節葉柄如鞘抱節而生葉橢圓基脚成心臟形秋開穗狀花　根　消痰除積治水濕黃疸脚氣痘後目疾　一名百節藕一名山稗子根

地蜈蚣　葉卵圓對生夏開黃花每節間有二朵　解諸毒治大便不通脫肛虛黃噎膈水腫蜈蚣蛇毒　一名神仙對坐草俗呼蔓地蜈蚣

野菸　莖葉皆有毛葉爲長卵形似菸草而小開黃花　葉　敷腫瘍火瘡研末治金創出血　一名地菸

茅燭　葉似白茅而闊中厚如劍脊根結白茸長抹如蜡燭狀　苔　傅刀斧傷止血止痛

野苦蕒　苗似苦蕒而短根肥而硬秋分後開黃花結實小有絨毛　根　治牙痛清熱

蜀葵 莖高六七尺葉略帶心臟形五裂至七裂夏日開花頗大色紅或白亦有重瓣 子花莖根 通小便催生潤燥治癰腫尿血火瘡金瘡

角蒿 葉莖如青蒿有香氣開淡紅紫花結角長二寸許微彎 一名一丈紅植庭院中

黃蜀葵花 葉深裂大如苘麻葉開花大如椀鵝黃色結角二寸許 花子根 花治惡瘡難產湯火傷根及子治癰腫催生利小便 土人多以此爲因陳或別其名曰陽陳其功用與因陳迥異

半夏 毒草類 春從宿根生莖莖頂生三葉夏開花花苞深裂如匕花軸尖端如鼠尾 根 治吁痰嘔吐胸痺腹鳴 麥田常有之立夏採歲輸出甚夥生者有毒依法泡製方可服食

常山 莖圓有節葉橢圓有透明小點臭氣甚烈開淡黃色小花 根 治諸瘧吐痰涎

蚤休 多年生草一莖獨立高尺餘莖當葉心葉成層輪生凡二三層層有七葉夏開黃赤色花一花七瓣有金絲蕊下垂 根 治驚癇搖頭弄舌癰瘡蛇毒解水莽毒 一名七葉一枝花一名白甘遂一名金線重樓一名紫河車

天南星 多年生草莖高一尺至三四尺葉爲複葉有長柄數葉相聚如鳥足開穗狀花果色鮮紅 根 散經絡風痰治麻痺驚風驅蟲鎮痛 俗呼小磨芋有毒須泡製

羊躑躅 葉長倒卵形枝葉皆有毛葺春開漏斗形花色黃 子花根花 花殺蟲治諸瘴蠱毒子治血疏風治七十二種風氣根治痔漏 花有大毒一名老虎花羊食之則死俗呼牛矢花其根一名巴山虎子名土連翹

澤漆 莖高七八寸中有粘性白汁春暮頂生五葉分五枝葉爲倒卵形開淡褐色小花根白而硬 莖葉葉 治水腫利大小腸止痿消痞退熱治瘰癧蠱毒除癬蟲 一名貓兒眼睛草一名綠葉綠花草

毛茛 莖葉皆有細毛葉爲單葉掌狀分裂春夏開花黃色五瓣結小乾果 莖葉實根 除腹部冷氣截瘧療癰腫惡瘡根搗貼寸口治喉蛾 有毒不可食即外敷亦勿令近肉俗呼毛芹菜

白花射干 莖高二三尺葉似菖蒲葉脈互生密排若麥扇開六瓣花色白 根 治咽喉腫痛水腫吐酸

白附子 獨莖細葉同匝生于穗間根似烏附之小者清明後採用 根 祛風痰治面上百病

狼毒 一莖直上莖葉有毛結實甚重根皮色黃肉白 根 下氣破積行水治癬疥 俗呼洋桐子多種以榨油

莞麻 莖高六七尺圓而中空葉如梧葉大如掌互生開花結蒴果 實 通大便催生拔毒治瘰癧瘡瘍 子性急速善能軟堅但能損齒不可多用用時不宜沾牙

獨脚連 一莖直上生葉如盤有八角而青背紫年長一莖莖枯則根爲臼即鬼臼也 根 下死胎治瘡癰疽蛇毒射工毒 一名八角連諺云識得八角連可與蛇共眠

蒴藋 春時生苗至五月移之與南星相似但多斑點開紫花 根 治癰腫風毒磨敷腫上 即磨芋

草烏 多年生草莖高二三尺作四稜葉互生掌狀分裂如艾秋開紫碧花成穗實小黑色根外黑內白 根 治陰疽腫毒風濕痺痛 有大毒只宜外用

鳳仙 莖有紅白二色中空而脆葉尖長有鋸齒開花狀如飛禽結實 子花根葉 子治難產積塊噎膈下骨鯁治蛇傷根葉治骨骾 子性急速善能軟堅但能損齒不可多用用時不宜沾牙

玉簪 二月生苗成叢莖柔葉大如掌圓而有尖開花如玉簪 子花根 子軟堅滑骨催生下魚刺癬斑瘡毒塗癰腫瘰馬病 能損牙搗汁服時須以竹筒導入喉中

海芋 即野芋之大者苗及葉均似芋葉高數尺抽莖開花碧色或白色一名觀音蓮 根 治門節風蛇頭指毒腫風癩蛇咬 有大毒俗呼山芋搗碎調醋不可服葉治蜂螫

鈎吻 草本者蔓生葉爲長卵形尖端花黃而小木本者葉類黃精但有毛鈎子二個開黃綠花結紅子又一種葉似淡婆婆葉背現紅筋花黃子紅 根 治惡瘡疥蟲金創 俗呼黃藥一名斷腸艸有大毒食之腸黑爛而死可用雞棄汁或白鵝血白鴨血羊血解之

曼陀羅花 葉如茄花開六瓣花白色狀如牽牛花而大結實圓而有丁拐中有小子 葉子根 花及子治驚癇脫肛並入麻藥洗風痺腳氣花葉燒煙治哮喘 俗呼洋金花花子根有毒誤食令人發狂

藜蘆 葉狹而長有平行脈莖青紫高二三尺春開花小而紫黑根莖皆有毛 根 引吐治風癇痰疾上膈風涎黃疸喉痺瘡毒去死肌殺諸蟲 以糯米泔製方可用諺云藜蘆巴籤衣漏蘆戴斗笠象其根也

茼茹 莖高二三尺葉爲長卵形莖葉中有汁折時甚白旋凝黑如漆春開小花結實如豆一顆三粒根如葉蔗 根 散風熱去濕破血治傷寒咽痛

藤蔓類				
粉葛	多年生草莖長葉互生有褐色茸毛秋開蝶形花	根	養肌生津止渴發汗	
鈎藤	葉腋生兩鈎棘攀緣于他物葉對生開淡黃褐小花	鈎根	熄風滌痰定驚癇止暈眩	
蓬蘽	藤蔓繁衍葉莖皆有刺葉如掌狀厚面有毛結實成簇秋分後熟色紫暗味甘	實根葉	子生髮益精長陰安五臟耐寒濕益顏色葉治目疾金創臁瘡根治目腎五淋	俗呼泡子芳實名割田泡其藤過圳者曰過水連倒入水者曰倒水連治淋用根
覆盆子	苗葉小于蓬蘽亦有鈎棘一枝五葉面背皆青光薄而無毛開白花結實比蓬蘽小夏初熟色赤味甘	實根葉	子補腎益精縮小便烏髮補肝明目葉根治冷淚目瞖	俗呼插田泡
懸鈎子	樹高四五尺莖白花有倒棘葉爲長卵形有細齒青色無毛背後淡青夏初開小白花結實色紅味酸	實葉	醒酒止渴除痰去酒毒葉治喉中塞根皮治子死腹中不下崩帶久痢腹痛破血殺蟲毒	一名木莓一名小莓俗呼泡子樹
蛇莓	莖長尺許莖頭三葉花黃子赤甚似插田泡	汁	治胸腹大熱不止敷瘡腫蛇傷湯火傷	大寒有毒俗呼蛇泡子
菟絲子	夏生苗如細絲黃赤如金纏繞他草梗而起其根自絕于地而寄空中無葉有花白色微紅而香結實黃而小	實	養肌強陰堅筋骨治莖中寒精自出溺有餘瀝腰痛膝冷消渴	
無根草	即菟絲苗以色黃而似絲者爲佳	苗	涼血散血利水通淋解痘毒治癰腫毒便血崩帶	亦名無根金絲草俗呼無葉藤
瓜蔞	春從宿根抽莖甚長葉作心臟形腋生蔓鬚夏開白花結實橢圓形至秋成熟	實	治胸痺咳嗽腸紅	山野自生俗呼屎冬瓜以其瓤形色類屎也
天花粉	即瓜蔞之根秋後採者有粉早採則無	根	生津止渴排膿生肌消腫	
赤雹子	蔓生似黃瓜葉葉爲心臟形花下結實如彈丸有紅黃二色皮粗澀	實	生用潤心肺治黃疸炒用治肺萎吐血下血赤白痢尸癆	即王瓜一名土瓜
土瓜根	即王瓜之根澄粉白膩須深掘二三尺乃得	根	驅熱行瘀治消渴內痺經閉	
土茯苓	莖有細點葉似大竹葉而厚滑其根色白肉軟者良	根	排毒消熱治梅毒利小便	俗名冷飯團
山豆根	苗蔓如大豆葉青經冬不凋	根	解諸藥毒止痛消瘡腫治喉腫頭風熱厥心腹痛痔痛蛇犬蜘蛛傷	
木蓮	蔓延牆壁葉橢圓花紅實上銳下平中有小子	子葉	子固精消腫散毒止血下乳葉治背癰血淋	
牽牛子	一年生草葉互生有紅毛夏開合瓣花漏斗形實如球形蒴果子黑	實	下氣治脚滿水腫除風毒利大小便	一名丑牛子
黃藥子	莖高數尺柔而有節葉爲心臟形根大如卵外褐內黃味苦	根	涼血降火消癭解毒	俗呼毛卵它葉似薯蕷故土人亦呼之爲山藥用治馬病與白藥功同
萆薢	葉比菝葜大如心臟形邊緣有缺刻柄長夏開淡黃花成穗狀子三稜根長大而硬	根	利尿治風寒濕痺肢痛	俗呼馬夫子
菝葜	苗莖成蔓長二三尺有刺葉圓而大秋開黃花結紅子其根作塊結黃赤色	根	根治腰背冷痛小便滑數沙淋消渴	一名鐵菱角一名金剛芳蔸汁可染黃布
葎草	葉似蓖麻葉而小且薄蔓生小刺花白結子如黃麻子	葉根	治五淋蛇蠍傷	俗呼老甘草
何首烏	莖紫色葉相對夏開黃白花結子有稜似蕎麥而小	根	治頭面瘡傷風下血及惡性癰	有赤白二種以大如拳五瓣者良
天門冬	多年生草蔓長丈餘葉小若鱗片由葉脈生綠色小枝枝生小葉彎曲如線	根	滋腎潤肺治肺痿癰咳嗽消渴	其苗俗呼飛天蜈蚣
百部	葉大而尖長頗似竹葉而光根數十相連	根	治肺病殺虫治疳	
木通	落葉蔓性灌木葉爲掌狀複葉對生夏開穗狀花果實長橢圓色白甘美可食	莖	行水瀉火下乳通淋	有大小之別

忍冬藤	葉常綠其藤左纏樹木夏開花	葉	解毒治瘟疫毒痢瘡瘍
金銀花	即忍冬藤之花黃白相間故名	花	解毒治瘟疫毒痢瘡瘍　葉與花同功
黃藤	藤褐色搗之如漿色紅或黃葉爲紉錐形微光開紅花結莢長如皂士人呼雷公刮矢片	藤子根	治氣根薰茶解飲食中毒利大小便
白毛藤	莖葉皆有白毛秋開花結子如豆而軟紅如珊瑚葉爲心臟形春生冬槁	藤葉	活血追風除骨節痺痛止血淋治疝氣黃疸　生人家園中牆壁上一名尋骨風
紅藤	莖帶紅褐色有節每節對生兩葉倒卵形背有白細毛	根	治諸風通五淋殺蟲治腦漏腸癰　一名省藤其皮可以縛物
山烏龜	蔓小色由紅而青葉圓而薄如小荷葉開花結子根形如龜皮褐肉白	根	治瘡瘍蛇頭指跌打金瘡蛇毒及馬病　土人亦呼爲白藥與本草所載之白藥功略同而形狀異或其別種耶
土茜草	立春發芽葉攢莖節而生每節四葉葉如箭簇方梗皮粗糙	根	治下血崩帶打傷疔瘡經閉　土人以葉尖者爲雄其根瘦圓葉者爲雌其根肥俗呼活血丹
活血籐	藤青而光莖八方葉似大豆葉枝頭二葉一圓一半圓如卦銚根大而長斷面現花紋		活血通經絡治濕痺　一名大活血丹
青藤	藤青葉光滑無花實	葉	洗瘡毒
石南藤	莖圓細多節一節一葉卵形而尖網脈長柄四時常青莖葉極臭辣	莖葉	消風痺逐冷氣强腰脚治血風上氣咳嗽療金瘡疼痛
使君子	常綠蔓性木葉對生鈹針形邊緣有細鋸齒實似梔子	實	補脾潤腸治疳殺蛔虫
月季花	青莖長蔓硬刺葉小如薔薇花深紅逐月開放不結子	花	活血消腫敗毒
馬兜鈴	繞樹而生葉圓如長心臟形結實如鈴中有紅子圓如豆	實	實瀉肺下氣治咳嗽痰結喘促解蛇毒
土青木香	即馬兜鈴之根晒乾香味與廣木香相似	根	根利大腸治頭風瘡瘍疔腫蛇毒止血治痢
木鼈子	多年生草葉無柄對生花小子扁圓青綠色	實	消腫治瘤及一切風氣痛
九仙子	蔓長數尺莖細而光葉卵形端尖開花結實根圓大者如卵小者如半夏一連九枚九月採生石隙者良	根	治咽病喉痺散血用新汲水或醋磨汁含嚥　生石上者圓而扁俗呼破石珠生土中者圓如珠俗呼九牛子
扶芳藤	枝葉皆似梔木攀楓樹而生	根	治風血腰脚去一切風　俗呼上楓枝
赭魁	葉爲卵形繞藤叢生開花結莢根粗揑之有汁從根皮流出如血	根	通經絡行瘀血除痺痛　俗呼血風藤一名血藤
絡石	生木石間葉常綠質厚對生面青背淡而澀初夏開白花爲聚繖花序結實成莢小而甚長	莖葉	治喉舌腫閉癰疽瘋痛服汁並洗治蝮蛇瘡毒心悶敷刀斧傷　其蔓折之有黑汁俗呼石梔木有圓葉尖葉兩種
烏斂莓	藤柔而有稜一枝一鬚凡五葉葉長而光有疏齒面青背淡秋開黃花如聚繖實生青熟紫根大如指長一二尺搗之有汁出	葉莖	消癰瘡毒敷蛇蟲咬治喉痺尿血　一名五葉藤一名五爪龍
大南蛇	根長呈黃色屈而如蛇莖淡紅色葉有圓尖二種腋生小刺莖現秤星	根	敗毒去濕治痺痿	
內紅消	莖細長葉長卵形端尖厚而光滑結紅子根長味苦而辛皮白肉紅	根子	消暑熱治泄症腹痛通經絡祛風寒除腫痛子補氣葉治刀斧傷　莖葉頗類鈎藤根皮紅肉白者曰外紅消
羊開口	葉小長而光藤小而青每枝三葉實橢圓長三四寸內有瓤如脂味甘可食有數黑子	根	根治淋症血崩實瘤治陰瘡腎氣子拔牙不痛　俗呼牛卵它一呼拿瓜
八葉挪藤	一組八葉亦有七葉者葉卵圓尖端似土茯苓而大微凹	根葉	拔毒消腫治蛇咬癰疽	

七步蓮	莖葉俱帶白色每枝三葉或七葉根及藤葉均似蕃薯採藤即有白汁泌出如乳	葉藤根	治無名腫毒蛇咬傷根磨服拔牙止痛	
大風藤	葉大如掌現三叉開白綠花結綠子圓而多漿搗之有涎	根	散結去熱生肌止痛治瘡毒紅腫咬傷湯火傷	
鑽地風	藤褐而長葉長卵形面糙根長大力雄能穿入石隙	根	去風濕通經絡	
過山龍	葉似為藥葉開小花蔓生石岩或樹上其根壯而長斷面有菊花心吹之通氣	根	通關節治痺痛	本草綱目以茜草為過山龍誤
過牆風	葉長卵形有缺裂三叉莖紅無刺開黃花似蕹菜花根肥多肉	根	去風濕敷瘡	
山胡椒	葉相交如十字連綴而成葉上有刺結黑子如胡椒	根葉實	去風止癢殺蟲	一名澄茄子
牛皮凍	葉為心臟形圓而大對生摘之即有白漿流出根似蕃薯一連數枚	葉	敗毒治熱癤取汁點蛇咬傷	
雷公藤	獨莖蔓生莖穿葉心莖上又發葉葉三角如犂尖藤有小刺	葉根	截瘧治瘰癧黃白疸魚口毒	俗呼犂嘴草一名犂嘴藤一名貓即芳
糯米藤	蔓長二三尺葉為長卵形對生粗糙開白花結實根搗之粘膩	根	治癰疽蛇頭指拔毒消腫	性猛烈祇宜外治
解毒子	葉青而圓厚硬凌冬不凋無花實根皮黃白色纍纍相連	根	清痰降火治咽喉腫痛眉稜骨痛	
赤地利	莖赤葉青花白均似蕎麥結子青色根皮紫赤肉黃赤	根	治赤白痢帶下游瘮蟲蛇犬咬敷惡瘡	
黃環	藤生高二尺葉黃而圓端大花紫結角似皂莢	根子	根治痰嗽消水腫利小便子治瘡疥殺蟲	實名狼跋子
藤茶	藤小而青葉小而尖長柔滑頗光潤生食味微苦	葉	明目止渴清熱	即本草列入藤部之黃練芽而土人所稱之黃練芽為大樹但葉與根相同耳
白蘞	狀如小灌木春生苗葉為掌狀複葉春夏間開黃綠色小花實圓多漿根如卵而長一株數枚皮黑肉白	根	瀉火散結生肌止痛除熱治溫瘧白帶瘡毒	
水草類 石菖蒲	葉有劍脊夏開綠褐色穗狀花		去風解毒治耳聾癰瘡	
蒲黃	即香蒲之花蕊也香蒲根肥大少節莖端開花		涼血活血止心腹諸痛	香蒲比菖蒲葉小其筍可食搗汁治妊娠勞熱煩燥胎動下血
水馬齒莧	葉似馬齒莧開白花生泉水中入藥		敷火疔火眼	
剪刀草	莖背有線楞葉有三角似剪秋開小白花結子根似慈姑	苗	散血消腫治蟒蟹叉	根一名水慈姑一名化丹慈姑和飯搗汁敷頭頂治子衣下墜
菰根	葉似蘆荻春末生白芽如筍根似蘆根		燒灰敷火瘡蛇咬	一名菱草筍一名菱筍俗呼菱瓜作蔬食
龍舌草	葉如大葉菘菜根生水底抽莖出水開白花根似胡蘿蔔而香		敷癰疽湯火灼傷	
蘋	莖細而長葉浮水上面青背紫四葉合成中拆十字		治暴熱下水氣利小便止渴塗熱瘡搗汁飲解蛇毒	一名四字草一名四葉連
紫背浮萍	多生池澤止水中葉細浮水面有背面俱綠者其面青背紫者入藥良		治暴熱身癢麻痺汗斑丹毒下水氣止消渴鼻衄療目赤翳膜	
荇菜	莖白葉紫形正圓浮水上根在水底夏開黃白花		治消渴熱淋敷腫毒火丹	
羊蹄大黃	春初叢生大葉長尺許如牛舌春末抽花莖開淡綠小花結子如蕎麥根長近尺至夏即枯秋深復生	根	治疥癬腫毒頭風白屑喉痺	生濕地葉可作菜食止癢內痔俗呼牛舌大黃

石草類				
石斛	多年生草莖色青綠高數寸寸有節生葉如鍍針	莖	治傷中補虛益氣除熱	三獅洞石崖中有之
骨碎補	生木或石上引根成條上有黃赤毛及短葉附之又抽大葉成枝爲羽狀複葉有椏缺背有黃點根扁長似薑		破血止血殺蟲治閃折筋骨傷損腎泄耳鳴牙疼	俗呼猴薑一名石薑一名毛薑
石葦	多年生草常綠莖面密生茶褐色如鱗片葉背有子囊	根	治小便癃閉	
金星草	葉長一二尺色深綠質堅硬至深冬背生黃色子囊羣		治發背癰瘡結核解硫黃丹石毒解熱通五淋涼血	一名鳳尾草一名七星草又名延鐵草形如匕首而尖稍曲治瘰癧特效
石長生	葉似蕨而細莖高尺許經冬不凋莖近地處密生黑褐毛春生新葉		治寒熱大熱疾惡瘡疥癬下三蟲辟暑	一名鐵脚宮花
石莧	苗高尺許莖青葉似莧而短		治齁齡吐風涎	
虎耳草	常綠多年生草一莖一葉葉圓有鋸齒及刺毛夏開白花	葉	治聤耳瘟疫	
鵝不食草	莖高二三寸多平臥地上隨處生根葉本狹末廣有鋸齒其氣臭開頭狀綠色細花結子如胡椒		通鼻氣去目瞖治瘡腫	一名石胡荽
酢漿草	叢生陰濕地莖頭生三葉葉二片至夜即合夏開小黃花結小莢	苗	治惡瘡血淋湯火蛇咬傷疳積	
地錦	蔓延於地莖赤葉青紫色而有光澤夏開紅花結細黑實斷莖有汁(亦有開黃花者)	苗	散血止血治金創出血惡瘡見血血痢血淋下血崩中	生田野及寺院階砌間一名草血竭一名血見愁
地側柏	草本生陰濕地高尺許葉似側柏	莖葉根	敗毒止痛治熱毒消腫女子吐血及湯火傷	
佛甲草	莖高四五寸似馬齒莧細小且長夏開黃花	苗	貼湯火灼傷	一名佛指甲一名石馬齒莧
鏡面草	蔓生石上葉狀似螺靨微帶赤色而光如鏡背有小毛		治小便出血吐血衄血齲齒痛敷癰腫風疹	一名螺靨草
卷柏	高數寸苗似柏葉而細拳攣如雞足無花子		通月經止咳逆治脫肛及下血散淋結除頭風	三獅洞石壁上有之一名長生不死草
玉柏	高五六寸如松紫花即石松之小者	莖葉	輕身益氣止渴	一名千年松久養不死
石松	高一二尺生石上似松		治風痺脚膝冷痛皮膚不仁	
雜草類 六月雪	葉長而尖有白毛開白花成穗結小子	苗根	清暑熱止瘡毒	
踏地消	葉橢圓尾尖而厚生白毛貼地叢生抽花梗開小白花根似細辛	根葉	去濕熱敗毒治虎咬傷療陰筍喉痛	本草拾遺雪裡香治喉痛齒痛肺癆苗與此同疑係一物
合掌消	一莖直上葉對生橢圓而厚開白花結莢上大下尖內有白絨	根葉子	敷瘡毒打傷花治金創出血	本草蘿摩蔓生葉上大尾小花實均與此略相似功用亦略同豈一物而二種歟
羅裙帶	葉長二尺似建蘭而闊花梗長花如龍爪下垂色紅		治閃跌損折腰痛	
搖竹消	苗如小竹有風不動無風自動		治諸風症腰痛閃折	
龍鬚草	橫生布地苗似萹蓄而細夏月抽莖開小花青色	苗	治火症牙痛口咽諸痛及一切瘡疥跌打	
牛筋草	葉似韭而柔六七月生莖高尺許開花三叉葉柔韌不易斷		治行血脫力虛黃勞力傷治瘵	俗呼吊馬椿
毛葉仙橋	葉狹尖粗糙背紫色微有毛開花莖蔓地黏土兩端如橋	苗	散風火濕熱澀精治失力黃白濁療白火丹癰疽疔瘡	俗呼仙人搭橋又名兩頭攀

酸草 貼地生葉小作心臟形嚼之味酸開黃花結紅子分三瓣

野毛豆 莖細弱有茸毛葉對生結實如毛豆莢內有子十二如小綠豆色黑

扣子草 高尺許葉圓小如扣子開花結子

接骨仙桃 葉如石榴葉結小桃子如葉豆大熟則微紅內生小蟲根及莖俱紅色

落得打 苗長二三尺葉細碎如蒿艾秋開小白花結子白色成穗纍纍

醋草 莖空而脆有紅斑點無枝極對節生葉卵形味酸

翠羽草 獨莖成瓣細葉攢簇色翠而妍如翠鈿雲翹

地茄子 莖葉如茄夏初開花結實圓如小球有粗毛紫黑色味甘

伸筋草 藤長數尺葉長卵圓形尖而且厚

張天罐 高四寸葉小如人字夏季抽長梗梗頂開紅花結實如瓶形中有子

撮口珍珠 一年生草葉卵圓端尖有鋸齒葉腋有小葉如箕中生二朵之小花苞如珍珠

蘇芥菜 冬盡發苗葉貼地生似芥而小約一指寬抽莖開小紫花成穗結子

醴陵縣志

酸草	葉	貼地生葉小作心臟形嚼之味酸開黃花結紅子分三瓣	
野毛豆	莖葉	莖細弱有茸毛葉對生結實如毛豆莢內有子十二如小綠豆色黑	
扣子草	子	高尺許葉圓小如扣子開花結子	平肝火治疳疾目疾
接骨仙桃	苗	葉如石榴葉結小桃子如葉豆大熟則微紅內生小蟲根及莖俱紅色	治喉痛
落得打	根	苗長二三尺葉細碎如蒿艾秋開小白花結子白色成穗纍纍	散瘀血治吐血打傷女人血氣痛
醋草	葉根	莖空而脆有紅斑點無枝極對節生葉卵形味酸	治跌打損傷
翠羽草	苗	獨莖成瓣細葉攢簇色翠而妍如翠鈿雲翹	止渴調中瀉熱
地茄子	實苗	莖葉如茄夏初開花結實圓如小球有粗毛紫黑色味甘	治女子吐血痔漏耳毒解火毒散喉癰
伸筋草	根	藤長數尺葉長卵圓形尖而且厚	治中風痰涎痲痺下熱毒氣破堅積膨膈滯癰腫
張天罐	莖葉	高四寸葉小如人字夏季抽長梗梗頂開紅花結實如瓶形中有子	治風痺拘攣
撮口珍珠	莖葉	一年生草葉卵圓端尖有鋸齒葉腋有小葉如箕中生二朵之小花苞如珍珠	治痢及瘡毒
蘇芥菜	苗根	冬盡發苗葉貼地生似芥而小約一指寬抽莖開小紫花成穗結子	解熱毒治瘡瘍痢疾
朝天一炷香	莖根	一莖直上葉繞莖生尖而長夜合開黃花結絨毬	治疳積跌打去風
消飯草	根苗	一年生草高四五尺莖方有瞿麥葉對生卵形色白有毛開淡紅花結子根長	消腫消積治外毒疔氣
肺風草		一莖直上無枝極花葉均小	治吐血
酒利干	根葉	莖圓而青葉爲長卵形而尾尖	敗毒涼血治瘡毒痔漏目疾
穿牆消	苗根	苗高尺許葉對生似藍葉而小每葉腋生一鉤下向開黃綠花	治小兒疳積敷腫瘍
千蛇歸總		莖長葉小而密似先蒿略大春初叢生	治諸蛇咬及瘡毒
返魂丹		高二三寸葉遶節生似三七葉狹而尖長開紅花	治跌打損傷
紅娘娘	葉	高二三尺莖紅葉青似六月雪而無毛味不苦	煙軟止血治金創蛇咬
誅心劍		葉叢生厚而深綠如長劍	治淋症及裡急後重
田皂角		莖圓葉似合歡葉而小結莢內有子六	治疳積

人字草	苗	苗叢生似蓼而矮葉小橫扯之作人字形夏開小花	治小兒疳積腹痛
奶生草	苗根	葉似萹蓄蔓生地上莖紅色有漿如乳	治疔積敷腫瘍
天朝一炷香	莖苗根	一莖直上葉繞莖生尖而長夜合開黃花結絨毬	治疔積跌打去風
消飯草	根苗	一年生草高四五尺莖方有瞿麥葉對生卵形色白有毛開淡紅花結子根長	消腫消積治外毒疔氣
肺風草		一莖直上無枝極花葉均小	治吐血
酒利干	根葉	莖圓而青葉爲長卵形而尾尖	敗毒涼血治瘡毒痔漏目疾
穿牆消	苗根	苗高尺許葉對生似藍葉而小每葉腋生一鉤下向開黃綠花	消熱治喉痛足跟痛
千蛇歸總		莖長葉小而密似先蒿略大春初叢生	治諸蛇咬及瘡毒
返魂丹		高二三寸葉遶節生似三七葉狹而尖長開紅花	治跌打損傷
紅娘娘	葉	高二三尺莖紅葉青似六月雪而無毛味不苦	煙軟止血治金創蛇咬
誅心劍		葉叢生厚而深綠如長劍	治淋症及裡急後重
田皂角		莖圓葉似合歡葉而小結莢內有子六	治疳積

人字草	苗	苗叢生似蓼而矮葉小橫扯之作人字形夏開小花	俗呼陰陽草一名鳥即窠
奶生草	苗根	葉似萹蓄蔓生地上莖紅色有漿如乳	治小兒疳積腹痛
天朝一炷香	莖苗根	一莖直上葉繞莖生尖而長夜合開黃花結絨毬	一名夜關門一名掛山條
消飯草	根苗	一年生草高四五尺莖方有瞿麥葉對生卵形色白有毛開淡紅花結子根長	一名搜飯箕一名羊骨小
肺風草		一莖直上無枝極花葉均小	
酒利干	根葉	莖圓而青葉爲長卵形而尾尖	
穿牆消	苗根	苗高尺許葉對生似藍葉而小每葉腋生一鉤下向開黃綠花	
千蛇歸總		莖長葉小而密似先蒿略大春初叢生	一名千條蜈蚣一名掃地蜈蚣
返魂丹		高二三寸葉遶節生似三七葉狹而尖長開紅花	一名打死還生拔苗晒乾隔宿復活
紅娘娘	葉	高二三尺莖紅葉青似六月雪而無毛味不苦	一名斬蛇劍
誅心劍		葉叢生厚而深綠如長劍	
田皂角		莖圓葉似合歡葉而小結莢內有子六	

人字草	苗	苗叢生似蓼而矮葉小橫扯之作人字形夏開小花	其子觸之即躍去故有急性子之稱
奶生草	苗根	葉似萹蓄蔓生地上莖紅色有漿如乳	俗呼矮桃樹
天朝一炷香	莖苗根	一莖直上葉繞莖生尖而長夜合開黃花結絨毬	本草拾遺蒴枝草治急驚喉症痔瘡楊梅其苗與此同或係一種
消飯草	根苗	一年生草高四五尺莖方有瞿麥葉對生卵形色白有毛開淡紅花結子根長	俗呼酸筒梗以鹽漬之可爲果餌
肺風草		一莖直上無枝極花葉均小	一名翠雲草一名鳳尾草一名孔雀花一名金雞獨立草
酒利干	根葉	莖圓而青葉爲長卵形而尾尖	一名皮綽珍珠與黑豆煮食治休息痢
穿牆消	苗根	苗高尺許葉對生似藍葉而小每葉腋生一鉤下向開黃綠花	
千蛇歸總		莖長葉小而密似先蒿略大春初叢生	
返魂丹		高二三寸葉遶節生似三七葉狹而尖長開紅花	
紅娘娘	葉	高二三尺莖紅葉青似六月雪而無毛味不苦	
誅心劍		葉叢生厚而深綠如長劍	
田皂角		莖圓葉似合歡葉而小結莢內有子六	

七葉艻	莖有刺葉爲尖卵形有缺刻每枚生七葉開小白花結紅子	葉　一名七姊妹
坐東連	貼地生一本多葉有毛似菜菔葉中抽長梗梗頂開紫紅色花	治吐血
鐵羅漢	苗高尺許葉似冬葵根如芋色白	葉　葉酒炒敷跌打損傷根搗服散瘀血
元寶草	一莖直上葉對節生中間兩頭尖如梭子狀穿莖直上或三四層或六七層開黃花結子	苗　性涼補陰治吐血衄血癰毒跌撲腰挫痛
荷包草	蔓延貼地逐節生根似地連錢而葉有皺紋形如腰包	葉　治火丹牧腫初吐血痔瘡疝氣黃疸熱眼調經
老鸛草	蔓生田塍葉掌狀開五叉莖方有毛	莖　去風疏經絡活血健筋骨治風痺
七層樓	蔓地生葉莖長而尖包莖如穗開白小花苗高數寸根長有七層每層生鬚根甚多	苗根　治腰痛洗蛇咬毒　一名對口連生山石間
九頭獅子草	苗高六尺許葉小成簇每株有九簇如獅子形	治瘰癧　西鄉榮仁甫家曾得其種子湘潭植之甚茂
瞎眼蛇	生田塍或其他避西晒之陰濕處貼地生葉小而圓上有兩點如眼狀	治紅白等喉痛　搗碎調醋用鴨毛醮點患處或含飲少許連點二三次點後流涎即愈
胡麻（穀類）	即脂麻莖方葉尖結角八稜或四稜子有黑白二種服食以黑者爲勝取油以白者爲勝	治傷中虛羸補肺氣利大小腸瘡金創止痛敷瘡毒及湯火傷諸蟲咬傷　油治髮癥催生落胞止鼻衄解諸毒
小麥	入藥沉者良其浮而不實者稱浮小麥與麥麩均可作止汗用	除咳熱止煩渴咽燥利大小便止漏唾血自汗盜汗
大麥	粒皮似稻而有芒炙湯或作麨用	平胃止渴消食瘴脹滿敷蠼螋尿瘡湯火傷潰瘡
麥芽	洒水於麥俟芽長二寸許即曝乾去鬚用	消食開胃除脹滿　一名麥蘗
糯米	即稻禾之黏者	温肺暖脾胃止冷泄縮小便收自汗
麥奴	即麥穗將熟時所起之黑黴	治陽明熱毒極發狂大渴及温瘧　一名麥角西醫用作止子宮出血之要藥
雀麥	生墟野間苗葉似小麥而弱子甚細燕雀食之故名	益氣止煩渴止瀉撲粉治自汗不止初生無皮　下死胎胞衣瘡蟲牙　一名燕麥
蕎麥	赤莖綠葉開小白花結實	消積滯熱腫治頭昏丹毒熱瘡湯火灼傷　莖葉性質與子同除痣治癰疽辟壁蝨
米粞	碾米細糠即米之外皮	治脚氣通腸磨積塊
米麴	以米和藥爲之用以釀酒	開胃去冷氣消食積酒積止痢安胎　一名麴母俗呼酒藥子
米酒	酒有多種惟米酒入藥陳者良凡經蒸溜者謂之燒酒邑人普通用之穀蒸者味醲而烈名穀酒	行藥勢通血脈散濕氣除風禦寒殺惡蟲毒　燒酒太熱太毒過飲傷胃傷腦刼陰損壽與薑蒜同食能生痔疾
米酒糟	用臘月及清明重陽造者漉乾入少鹽收之	醫撲損瘀血浸凍瘡敷蜂蛇傷
紅麴	以粳米作飯入米麴以時聚散久之自成	破血活血消食健脾　入藥以陳久者良

玉蜀黍　俗呼包穀莖二三尺高開花成穗莖側別出一苞久之苞裂子出顆顆攢簇
根　利小便淋瀝沙淋石淋痛不可忍
葉及球心功用與根同

米醋　醋有多種惟米醋入藥
散瘀血治產後血運胞不下婦人心痛血氣及傷損金創

黃粟　穗小而毛短粒細陳者良
米　解諸毒去煩悶利小便治虛熱消渴泄痢

稗　生野外或禾田中
苗根　止金創及損傷出血

薏苡　春生苗莖葉如黍葉開紅白花穗結實子白色
實根　健脾益胃補肺清熱去風濕根去蚘蟲治卒心腹痛通經治黃疸牙疼
其實可作粥飯食邑人間有種者野生者俗呼素珠子

綠豆　葉小而有毛開小花結長莢
實　消腫清熱治痘毒霍亂轉筋瘡腫湯火傷解砒霜金石草木諸毒
凡解毒及治癰疽均生研末水調服

黑豆　豆之黑皮者有大小兩種
實　治腎病利水下氣制諸風熱活血解諸毒豆葉搗敷蛇咬

穭豆　黑豆之細者
壯筋骨止盜汗補腎活血明目益精
一名馬科豆俗呼六月烏

黃豆　大豆皮色黃者顆粒亦有大小煮食或磨作漿漿可代牛乳
實　寬中下氣利大腸消水腫嚼敷指瘡

豆腐　黃豆磨水成漿加石膏少許即凝結爲腐
利腸胃消腫滿貼目腫杖瘡及酒醉死者腐漿治鹽哮痰喘便血淋濁
腐渣炒熱治一切惡瘡無名腫毒

豆豉　諸大豆皆可爲之以黑豆製者入藥有淡豉鹹豉兩種治病多用淡豉不用鹹者
下氣調中治傷寒溫毒發斑嘔逆安胎治難產及一切惡瘡

豆醬　多以大黃豆作之陳久者入藥良醬汁稱豆油功用同
除熱止煩滿殺百藥及熱湯火毒殺一切魚肉菜蔬蕈毒解砒毒淨蛇蟲蜂蠆等毒

蔬菜類

韭　葉歲三刈處暑後開白花結黑子如花麥
根葉　根葉煮食溫中益陽止渴盜汗煮汁治產婦血運散胃脘瘀血解肉肺毒洗腸痔脫肛
子　治感冒風寒大小便閉脫陽危症敷金創癰腫及蟲蛇毒解鈎吻毒

葱　葉細長而尖中空成孔有平行脈葉之下部色白
根部係包括葱頭及鬚根以下準此

胡葱　葉細長稍扁平根似薤開花結子
殺蟲解諸毒
野生

蒜　有大小二種入藥多用獨頭者
下氣消穀化肉敷足心治產亂轉筋鼻衄大小便閉骨鯁喉痺頭風塗瘡毒蟲蛇咬傷

薤白　葉似韭而中空有稜根如小蒜一本數顆
補虛解毒溫中散結氣治胸脾刺痛赤白帶下骨鯁
一名胡葱

辣茄　即辣椒也實小者名象牙辣茄
溫中散寒燥濕導滯止瀉泄擦癬洗凍瘡除壁蟲敷毒蛇傷

蔓菁　即蔓菁葉根俱大俗呼大頭菜
治喉止渴去心腹冷氣痛及熱毒風腫敷乳癰妬乳寒熱陰腫豌豆瘡子明目

菘　即白菜有數種黃芽者味佳開黃花結角
菜葉消食下氣利大小便治遊丹漆瘡子醒酒

冀金子　油白菜收子作種者中心老根內有粒如鼠矢炒研用
治血症慢驚
菜櫐中不常有百幹中不過數粒

芥　葉有缺裂面皺立夏前後開花結實
菜葉　利膈開胃下氣利上焦痰滯
芥菜瀹汁陳至三年以上者治肺癰喘脹

白芥子	葉背有刺有長柄葉爲掌狀橢圓形開黃花結子白色大於普通芥子		治利氣谿痰止痛除寒喘嗽反胃脚氣痺痛癰腫	
蕨	春生嫩葉其端卷曲如拳後生複葉長三四尺有子囊羣	箕根	泄熱利水通治暴熱氣壅經絡筋骨間毒氣敷蟲蛇傷	
薇	葉似萍對生有卷鬚莖葉氣味皆似豌豆莢短而黑結子似豌豆而小	苗	利水道下浮腫潤大腸	一名野豌豆苗可作蔬食子可炒食充飢
旱芹	葉長橢圓形有鋸齒及長柄由地生莖叢生莖頭開青紫花		治寒熱聚氣結核濕熱瘀血霍亂癰瘡	
水芹	葉對節而生爲羽狀複葉莖有節稜中空開細白花無實	莖	止血養精利大小腸治煩渴崩帶黃疸霍亂	
蕹菜	夏秋兩季蔬有藤蕹子蕹兩種	莖葉	擣汁解鈎吻毒治難產	
萵苣	有二種尖如柳葉者青色細圓如牛角者色白其味勝亦稱白苣	葉子	利五臟通經絡開胸膈去口氣通乳汁殺蟲蛇毒	子通乳治陰腫痔漏傷損作痛
苦蕒	莖中空而脆折之有白汁出開黃花如野菊一花結子一叢子有茸毛	子苗	和血通氣治血淋洗痔敷疔瘡蛇咬對口瘡子治黃疸	一名苦苣
蕓薹	葉脚包莖春暮開花結長角子黑	莖葉子	葉莖治風遊丹腫乳癰子行滯血消腫治產後心腹諸疾	即油菜
胡荽	柔莖圓葉葉有花歧根軟而白	葉莖子	消穀辟魚肉毒通小腹氣治產後乳熱後滯結搗汁塗赤丹蛇咬子治食肉中毒痔脫肛牙痛	即蓆荽菜俗呼延綏菜
莧	莧有赤白紫數種入藥多用紫者	根葉	殺蟲毒治產後下痢小兒緊脣擦蜈蚣蜂蠆蟲傷塗蛇毒並搗汁食	莧菜子明目益精殺蚘蟲有野生者名野莧莖燒灰治久咳
馬齒莧	布地生莖柔葉細對生采取晒乾去莖用	苗	散血消腫利腸解毒通淋止痢治肺病吐血產後虛汗	一名九頭獅子草
蒸菜	即著蓬也葉青白色似白菘葉而短其味微作土氣開細白花結實		解熱治痢止血敷諸禽獸傷根通經脈下氣開胸子治小兒熱	俗名泥白菜
冬葵子	俗呼冬葵爲冬莧暮春開花結子	子	通大小便消水氣滑胎通乳下胞衣治難產口噤	
菠薐根	菠菜爲冬春兩季常蔬根長色赤	根	通血脈開胸膈潤腸燥止渴	
茴香	有八角茴及小茴二種功用大致相同	子	開胃進食治疝氣腰痛乾濕脚氣	大茴一名懷香小茴一名蒔蘿
生薑	莖高二尺狀如箭簇對生開淡黃花地下莖色黃味辛	根	去臭氣止嘔吐散煩悶開胃氣散風寒解菌及野禽毒嚼敷瘡腫金創	
芋	葉大似荷葉而長葉柄肥大花爲肉穗花序有苞包之	根	芋子煮服寬腸胃充飢滑中下氣冷啖療煩熱止渴磨汁食止小兒驚風	葉莖除煩止泄治妊婦煩及黃水瘡敷蛇蟲咬
山藥	宿根野生莖細蔓長葉如長心臟形夏開淡綠色線狀花實爲蒴果	根	補益虛損治泄精健忘久泄	即薯蕷也今圃中所植之大薯亦其一種不入藥
甘藷	莖細葉長心臟形花似牽牛塊莖煩圓味甘	根	補虛乏益氣力調經健脾胃強腎陰治酒積熱泄黃疸五疳	葉嚼敷蜈蚣咬傷
百合	莖高三四尺葉爲鈹針形開筒形大花其色不一白者良	根	潤肺止咳治百合病	野生者稱山百合入藥更勝惟皮色斑者不可食
地髑髏	蘿蔔作種者須俟其結子後始出土瘦而無肉老而多筋故名	根	解熱脹治痢後重通肺氣解煤氣毒消痞塊	
萊菔	莖高尺餘葉大作羽狀分裂開四瓣花實成長角子如胡麻子黃赤色根長圓或扁圓多汁	根子	下氣化痰消食去熱散瘀和中補不足汁治頭痛鼻衄消渴失音吞酸反胃子治痞積脹滿利大小便	即蘿蔔入藥多生用
冬瓜	長橢圓形有青白二色白者如粉塗其子亦白以之入藥	實	實益氣止渴除心胸滿治水腫黃疸子治腸癰白濁帶下皮治水腫消渴損傷	

南瓜蒂 南瓜爲普通蔬食其老者子與蒂均入藥　蒂　蒂治疔瘡乳巖安胎

南瓜子 老南瓜子晒乾收藏勿令霉蛀陳至三年以上者入藥　子　嚼敷鐵釘竹木刺入肉

甜瓜蒂 瓜橢圓熟時自落于蔓上取蒂繫于屋東有風處吹乾　蒂　吐風熱痰涎消上膈痞鞭治風眩頭痛頭癲痛　瓜解暑宜除癮食瓜子仁治口臭脾腫內壅葉治折傷瘀血蔓治經閉癮治口鼻瘡

敗瓢 係瓢瓜剖作壺盧陳至三五年者入藥　實　消脹殺蟲治痔漏崩帶　苦瓢瓜癮及子治瘡毒及水腫

苦瓜 蔕細長葉掌形分裂開黃花結實皮多皺　實葉　瓜明目清心除邪熱解勞乏葉治一切丹火毒氣金瘡結毒脂麻疔火疔　花治目痛胃氣痛徵瘡子益氣

絲瓜 蔓生蔕有稜葉掌狀多缺裂有細毛刺夏開黃花瓜如而長　實葉　瓜通經絡去風解毒消腫化積結痛殺蟲治諸血病葉治蟲癬癰疽卵腫湯火傷　藤根治齒蠹腦漏殺蟲解毒花治五淋

天瞿髏 經霜之老絲瓜懸于外風乾者子名烏牛子　實　治頭脹積聚一切筋骨疼痛婦女白帶血淋　又名絲瓜絡

胡瓜 即黃瓜葉如冬瓜葉有毛夏開黃花結瓜長者尺許　瓜葉根　瓜清熱解渴利水道葉搗汁治小兒閃癖根敷狐刺毒腫

茄 蔕葉互生開五瓣紫色花結實　蔕實根花　實散血止痛消腫寬腸蔕治腸紅血淋下血口瘡齒齲花治金創牙痛根治凍瘡血淋陰蝕

蓪豆 即蛾眉豆子粗圓而色白者入藥　實　和中下氣治中暑霍亂吐利解肉脯草木毒　蠅蝮尿瘡極毒惟蓪豆葉敷之即痊

豇豆 蔓長葉本大末小莢長子有紅黑白等色　子　補腎健胃止消渴吐泄

刀豆 葉爲卵圓形由三小葉而成開蝶形花　子莢根　子燒焦治吧逆利腸胃根治鼻漏頭風莢燒研治腰痛經閉血瘕喉痺癬牙根臭爛

赤小豆 苗高尺許枝葉似豇豆葉微圓秋開紅褐色花結長莢長二三寸豆緊小赤黯　子　排膿散血治難產下胞

菌類 槐耳 即槐樹上菌也煮漿粥置槐木上以草覆之即生薹取堅桑耳者入藥　治腸痔婦人陰中痛月水不斷產後血痛

桑耳 桑樹上所結之菌也　止鼻衄腸風泄血歸人心腹痛赤血帶下　功用與槐耳略同

柳耳 柳樹上所結之菌也　治反胃吐痰心痛

土菌 生陰濕處凡菌從地上生出者皆主治瘡疥生糞上黑菌尤佳燒灰用　敷腫毒惡瘡　一名地蕈

杉菌 生積年杉木上　治心脾氣痛及暴心痛

松蕈 生松陰　治溼溺不禁

皂莢蕈 生皂莢樹上不可食焙乾備用　治腸風泄血又磨醋塗腫毒初起

櫻樹蕈 生櫻檷樹上　治氣痛

楓蕈 生楓樹上　土人有以之治風疹者本草不載但言中楓樹菌毒者笑不止須服地漿或綠豆粉甘草煎水解之

竹蓐 生于朽竹根節之上狀如木耳色紅大如彈丸　治赤白痢　苦竹上生者有大毒須用灰汁水煉三度方可煮食否則戟喉令人手爪盡脫

石耳 生山中岩石上狀如木耳成片碧色　明目止熱治泄血脫肛縮小便

靈芝	生朽木上因濕氣薰蒸而成盤結如雲有五色多黑者其質堅硬光滑		益腎氣利水道通九竅治癃閉氣痛	
馬勃	生濕地或腐木上色灰褐而虛軟彈之有粉出		清肺散血解毒治大頭病鼻衄喉痺惡瘡	俗呼灰菌
雷丸	爲附生竹根部之一種菌塊小者如指頭大者如棋子爲不整圓形塊狀皮黑內白色若赤黑者能殺人不可用		消積驅蟲	研成細末和以砂糖加熱水揑成丸百沸水吞服
果類 李根白皮	取根向東行者刮去皺皮炙黃入藥用苦李惟治奔豚用甘李		止消渴煩燥逆奔豚氣	
烏梅	取青梅以籃盛之掛于柴竈上屚薰黑再用稻灰淋汁潤濕蒸過		斂肺澀腸止渴調中去痰殺蚘解魚蟲毒	白梅花含苞欲放者開胃散鬱祛稀痘治瘰癧
白梅	取大青梅以鹽汁漬之日晒夜漬十日即成		止血除痰敷刀斧傷及刺在肉中者治中風驚癇中痰偃仆及瀉利煩渴霍亂吐下	
桃仁	桃實核中之仁雙仁者有毒不可用		治血結血秘血燥通潤大便硬蓄血	
桃梟	桃子乾懸于樹上經冬不落者正月採之中實者良		治中惡腹痛五種瘧疾妊娠下血小兒盜汗及頭瘡	一名鬼髑髏一名桃奴一名陰桃子
桃葉根	嫩葉及根皮樹皮東行枝皆入藥	葉根皮	葉療傷寒時氣風痺無汗治頭昏通大小便止霍亂腹痛截瘧	根皮治疫癘黃疸身色如金殺諸瘡蟲
木瓜	花先葉而生結橢圓漿果有甘酸二種		治中暑霍亂吐利轉筋及脚氣	
樝子	形似棃而圓小如木瓜色微黃蒂葉皆粗味酸澀		斷痢去惡心酸咽止酒痰黃水霍亂轉筋	一名木桃俗呼香木瓜一名欒木瓜治轉筋特効
榠樝	花葉實酷似木瓜但較木瓜大而色黃無重蒂味酸		解酒去痰止吐酸霍亂轉筋治髮白髮赤	一名木李
枇杷葉	葉尖而長背有茸毛須刷去毛用		和胃降氣清熱解暑治肺熱咳嗽脚氣	
橘	葉作長卵形端尖色深綠有香氣實於霜後成熟色紅味甘未熟者色青味酸食之生痰	實葉	實潤肺開胃寬膈葉治脇痛乳癰胸膈痞痛	
橘皮	以色紅且收貯日久者爲佳故有極紅及陳皮之稱廣橘皮尤勝	皮	寬膈降氣消痰飲止咳嗽	其未熟而青色者稱青皮消積散滯氣
橘核	橘實中之子以新瓦焙乾去殼取仁研碎入藥	核	治腰痛㿗疝陰核腫痛	藥肆多以未破殼者煎藥功用不顯
柚	枝有刺葉爲長卵形花白實徑四五寸形圓頂高色正黃皮極厚	實葉	實消食解酒毒治腸胃惡氣妊婦吐痰葉治頭風痛花澤面治氣痛	皮可煑食或和糖晒乾可消食化痰快膈不入藥用花名代代花
金錢橘	葉橢圓開白花實大如錢皮黃而甘肉酸不分瓣	實	消食下氣快膈醒酒治胸中痞悶	
石榴	榴有甘酸兩種酸者入藥用勿犯鐵	實葉皮	實消食解酒毒葉治頭風痛皮下氣化痰止泄下蚘蟲治下血脫肛崩中帶下	榴花千叢者治吐血衄血金創出血
梨	佳者名雪棃肌鬆多汁味特甘	實	潤肺涼心消痰降火解瘡毒酒毒	葉搗汁治中菌毒枝治霍亂吐利
棠梨	樹似梨而小葉邊有鋸齒開白花結實如楝子大味澀而酸	實枝葉	治反胃霍亂轉筋實燒食治滑泄	
乾柿	用大柿去皮壓扁日晒夜露至乾納甕中待生白霜後收用之	實	治反胃咯血血淋腸澼痔漏下血霜清肺熱止渴寧咳治咽喉口舌瘡痛	
柿蒂	即大柿之蒂		治呃逆噦氣	
櫻桃	葉卵形有鋸齒嫩莖及葉之背面生毛甚密春開五瓣淡紅花實爲核果紅色味甘	實	止洩精水泄核治凍瘡葉治蛇咬根殺蚘蟲	此樹山中多有之其實多被鳥啄食

椑柿	爲柿之小而卑者實似柿而青黑	實	止煩渴去胃中熱解酒毒	搗浸汁即柿漆俗呼椑膠
胡桃	葉爲奇數羽狀複葉夏初開花雄雌同株實爲核果果中仁及硬殼青皮均入藥	實	仁益氣	
楊梅	葉倒卵形面青背白花隱而不見結實球形肉果夏至熟有紅白紫數種	實	去痰止嘔吐消食下酒止渴燒研止痢敷破傷	樹皮及根煎水洗惡瘡癬疥漱牙痛解砒毒燒灰治湯火傷
葡萄	蔓生葉掌狀分裂開小花成穗結實紫綠色	實藤葉	調中益氣逐水治淋	
銀杏	落葉喬木葉如扇有缺刻小花結實霜後肉爛取核中仁用	仁	治哮喘白濁腸紅白帶乳癰狗咬成瘡	又名白果
枳椇	葉橢圓互生夏開五瓣花結實熟則變爲肉	實	解酒毒利尿	俗呼雞爪梨
棗	落葉亞喬木葉小作卵形互生花小而黃實橢圓	實	補中益氣平胃養脾除煩悶	本地產者多核大而肉不肥
栗	葉如箭簇實殼斗生刺霜後熟內有子數枚稱扳栗	實	實益氣厚腸胃補腎	
榛	葉甚闊略圓尖端有細齒開花如長穗作苞一苞一實下壯上銳		功用與栗同	俗呼尖栗
橡實	形圓端尖有殼斗包其半仁如老蓮肉	實	止泄厚腸殼治腸風下血	一名櫟球俗呼角蘿櫧
榧實	葉似杉木如柏實大如橄欖殼紫褐色有核其仁黃白色		治白蟲咳嗽白濁五痔消穀食	一名野杉俗呼椆杉土人但知其材可用不知其仁可食也
藤梨	蔓延他樹葉圓厚有毛實大如雞卵而橢圓內有黑子如脂麻	實	解煩熱下石淋實治骨節風	即獼猴桃
西瓜	有卷鬚葉缺裂實大味甘多汁	實	消煩止渴解暑熱治喉痺口瘡	
落花生	莖高尺餘爲羽狀複葉開蜂形黃色花花後子房入地一二寸結實成莢	實	潤肺補脾油滑腸下積	
蓮子	葉大而圓柄細長夏開花有紅白諸色	實	補中養神止脾泄崩帶	蓮花益顏色治墜損嘔血蕊鬚止血崩吐血連子心去熱止血產後渴蓮房破血脹腹痛胞衣不下
藕	蓮之地下莖肥大有節	根	搗汁止悶除煩治霍亂破產後血閟	藕節消熱渴開胃除煩散瘀血
荷葉	嫩者敗者新者陳者均可入藥煮服或炒香研末用	葉	止渴落胞破瘀治產後口乾燥煩及一切血症	
芡蕡	花莖及葉皆有刺葉大而圓面青背紫夏開紫花結實如栗	實	止熱益腎治小便不禁遺精白濁帶下	
荸薺	莖高二三尺管狀色綠花穗聚于莖端地下球莖形圓	根	療膈氣消宿食治誤吞銅錢血痢下血血崩	
山楂	落葉灌木枝繁葉互生有鋸齒開白花五瓣花結實如球有赤黃二色	實	破氣活血消積化痰治產後兒枕痛根治反胃莖葉洗漆瘡	
櫧子	櫧樹所結之實有苦甜二種甜者粒小而圓苦者粒大而有尖	實	止洩破惡血止渴食之不餓皮葉煮汁止產婦血嫩葉貼臁瘡	鄉人常下苦櫧子磨粉製腐作菜食甜櫧子者一名圓櫧子
君遷子	樹類柿而葉長結實小而長如牛嬭	實	止消渴去煩悶鎮心悅顏色	俗呼牛嬭柿
橄欖	葉爲奇數羽狀複葉花攢簇成穗實爲堅硬肉果	實	生津止渴清咽解酒及魚鼈毒核治魚骨鯁及食膾成積仁治唇吻燥痛	
無花果	葉大而粗糙花隱於花托中結肉果熟則色紫軟爛味甘無核	實	開胃消食治五痔咽喉痛	葉薰洗痔腫痛

甘蔗　葉狹而長莖如竹有結節中實可食榨之取汁及所餘渣滓與皮皆入藥

香木類 側柏　葉皆側向而生開細碎花結實成霜後四裂中有數子大如麥

松香　大松樹流出之脂

松節　松樹膠柯修聳多節節質最堅浸酒或煎水或炒焦用

松花粉　花長四五寸單性雄雌同體雌花叢生于莖頂下有多數黃色粉之雄花

杉木　葉硬微扁若刺針結實如楓球其木有赤白二種赤者多油入藥良

樟木　樹高數丈葉卵形質硬有光背有黃赤毳毛淡黃結實如豆入藥以樹年老者爲良

樟腦　取樟木之根葉枝幹爲薄片置器中蒸之蒸氣着於蓋上冷之即結爲晶再加石灰加熱精製之即成白色

辛夷　即木筆花先花後葉花未開時苞上有毛尖長如筆拭去毛收灸用

楓脂　五月砍松樹成坎漸泌溢成脂冬初取之

楓毬　楓樹所結之實有柔刺如栗中間核上多孔穴如蜂窩

樟木　樹高數丈葉卵形質硬有光背有黃赤毳毛淡黃結實如豆入藥以樹年老者爲良

樟腦　取樟木之根葉枝幹爲薄片置器中蒸之蒸氣着於蓋上冷之即結爲晶再加石灰加熱精製之即成白色

辛夷　即木筆花先花後葉花未開時苞上有毛尖長如筆拭去毛收灸用

楓脂　五月砍松樹成坎漸泌溢成脂冬初取之

楓毬　楓樹所結之實有柔刺如栗中間核上多孔穴如蜂窩

烏藥　常綠灌木高八九尺葉橢圓端尖質厚有光常下垂夏開淡黃綠色小花秋結小圓實生青熟紫

杉木　葉硬微扁若刺針結實如楓球其木有赤白二種赤者多油入藥良

松花粉　花長四五寸單性雄雌同體雌花叢生于莖頂下有多數黃色粉之雄花

松節　松樹膠柯修聳多節節質最堅浸酒或煎水或炒焦用

松香　大松樹流出之脂

香木類 側柏　葉皆側向而生開細碎花結實成霜後四裂中有數子大如麥

甘蔗　葉狹而長莖如竹有結節中實可食榨之取汁及所餘渣滓與皮皆入藥

檀　葉如槐皮青而澤肌細而膩

乾漆　漆樹高二三丈皮白葉似椿花似槐結子六七月破皮取汁入藥取乾者搗碎炒熟或燒存性

桐油　有千年桐周歲桐兩種取子榨油功用無別

梧桐　幹直而青葉闊大有深缺刻背有毛夏開黃色小花結實

苦楝皮　葉密生如槐而長開紅紫花實如彈丸雄者根赤有毒殺人雌者入藥服食

金鈴子　即苦楝樹所結之實

合歡皮　葉似槐細而繁密至夜即合夏開紅白小花有茸毛結實成莢小如米粒

白桐　桐大易生長皮色粗白其木輕虛俗呼枯桐

椿樗　椿木皮細肌實而赤其葉香樗木皮粗肌虛而白其葉俱入藥功用略同

厚朴 喬木類　葉如槲葉四季不凋開細花結實如冬青子生青熟赤

山桂　葉互生尖端略如竹葉有網狀脈柄短腋有乳芽

桂花　葉長有鋸齒而光澤花有黃紅白諸種不結實樹皮薄而不辣

樟腦　取樟木之根葉枝幹爲薄片置器中蒸之蒸氣着於蓋上冷之即結爲晶再加石灰加熱精製之即成白色

辛夷　即木筆花先花後葉花未開時苞上有毛尖長如筆拭去毛收灸用

楓脂　五月砍松樹成坎漸泌溢成脂冬初取之

楓毬　楓樹所結之實有柔刺如栗中間核上多孔穴如蜂窩

烏藥　常綠灌木高八九尺葉橢圓端尖質厚有光常下垂夏開淡黃綠色小花秋結小圓實生青熟紫

杉木　葉硬微扁若刺針結實如楓球其木有赤白二種赤者多油入藥良

松花粉　花長四五寸單性雄雌同體雌花叢生于莖頂下有多數黃色粉之雄花

松節　松樹膠柯修聳多節節質最堅浸酒或煎水或炒焦用

松香　大松樹流出之脂

香木類 側柏　葉皆側向而生開細碎花結實成霜後四裂中有數子大如麥

甘蔗　葉狹而長莖如竹有結節中實可食榨之取汁及所餘渣滓與皮皆入藥

檀　葉如槐皮青而澤肌細而膩

乾漆　漆樹高二三丈皮白葉似椿花似槐結子六七月破皮取汁入藥取乾者搗碎炒熟或燒存性

桐油　有千年桐周歲桐兩種取子榨油功用無別

梧桐　幹直而青葉闊大有深缺刻背有毛夏開黃色小花結實

苦楝皮　葉密生如槐而長開紅紫花實如彈丸雄者根赤有毒殺人雌者入藥服食

金鈴子　即苦楝樹所結之實

合歡皮　葉似槐細而繁密至夜即合夏開紅白小花有茸毛結實成莢小如米粒

白桐　桐大易生長皮色粗白其木輕虛俗呼枯桐

椿樗　椿木皮細肌實而赤其葉香樗木皮粗肌虛而白其葉俱入藥功用略同

厚朴 喬木類　葉如槲葉四季不凋開細花結實如冬青子生青熟赤

山桂　葉互生尖端略如竹葉有網狀脈柄短腋有乳芽

桂花　葉長有鋸齒而光澤花有黃紅白諸種不結實樹皮薄而不辣

檀　葉如槐皮青而澤肌細而膩

乾漆　漆樹高二三丈皮白葉似椿花似槐結子六七月破皮取汁入藥取乾者搗碎炒熟或燒存性

桐油　有千年桐周歲桐兩種取子榨油功用無別

梧桐　幹直而青葉闊大有深缺刻背有毛夏開黃色小花結實

苦楝皮　葉密生如槐而長開紅紫花實如彈丸雄者根赤有毒殺人雌者入藥服食

金鈴子　即苦楝樹所結之實

合歡皮　葉似槐細而繁密至夜即合夏開紅白小花有茸毛結實成莢小如米粒

白桐　桐大易生長皮色粗白其木輕虛俗呼枯桐

椿樗　椿木皮細肌實而赤其葉香樗木皮粗肌虛而白其葉俱入藥功用略同

厚朴 喬木類　葉如槲葉四季不凋開細花結實如冬青子生青熟赤

山桂　葉互生尖端略如竹葉有網狀脈柄短腋有乳芽

桂花　葉長有鋸齒而光澤花有黃紅白諸種不結實樹皮薄而不辣

檀　葉如槐皮青而澤肌細而膩　根皮　塗瘡疥殺虫

乾漆　漆樹高二三丈皮白葉似椿花似槐結子六七月破皮取汁入藥取乾者搗碎炒熟或燒存性　邑中原有漆樹近已罕見髹工所用之漉漆布及漆渣則到處有之

桐油　有千年桐周歲桐兩種取子榨油功用無別　敷惡瘡凍瘡湯火傷

梧桐　幹直而青葉闊大有深缺刻背有毛夏開黃色小花結實　葉研末蜜調敷發背煎水浸凍瘡子治小兒口瘡根白皮治淋症牙痛　花治湯火傷

苦楝皮　葉密生如槐而長開紅紫花實如彈丸雄者根赤有毒殺人雌者入藥服食　葉治手足浮腫消腫毒生髮皮治奔豚氣病　殺虫止瘡治疥虫疥癬及蜈蚣蜂螫傷　枝葉煎水可除植物害虫

金鈴子　即苦楝樹所結之實　治熱厥心痛腹痛疝氣虫痔

合歡皮　葉似槐細而繁密至夜即合夏開紅白小花有茸毛結實成莢小如米粒　生筋肉續筋骨治肺癰唾濁折傷疼痛

白桐　桐大易生長皮色粗白其木輕虛俗呼枯桐　葉木白皮　消痰下氣去結水消宿食治霍亂及腹痛脹滿胃中冷逆胸中嘔不止　燥濕散寒治腹內諸冷　治鼻淵鼻衄鼻窒鼻瘡面腫齒腫

椿樗　椿木皮細肌實而赤其葉香樗木皮粗肌虛而白其葉俱入藥功用略同　葉木根白皮　葉煎水洗瘡疥風疽皮治口鼻疳虫齦虫血崩腹紅白帶瀉治腸紅　外科用樗尤良取皮置食櫃中可辟蜈蚣

厚朴 喬木類　葉如槲葉四季不凋開細花結實如冬青子生青熟赤　皮　生筋肉續筋骨治肺癰唾濁折傷疼痛

山桂　葉互生尖端略如竹葉有網狀脈柄短腋有乳芽　枝皮　燥濕散寒治腹內諸冷　幹皮薄亦有香氣藥店多以之充官桂袞羊肉用之

桂花　葉長有鋸齒而光澤花有黃紅白諸種不結實樹皮薄而不辣　花　辟臭化痰治風虫牙痛和麻油蒸潤髮作面脂　其樹皮與牛漆藍根煎水治喉痺腫痛服並嚥立效（此爲岩桂之一種）

海桐皮	似桐而皮黃白色枝幹有刺葉掌狀圓而有光澤花色深紅實如風毬	根皮花	去風行經絡治脚痺跌打牙痛赤目花止金創血	俗呼芳楓樹
槐實	槐花小而色黃其實作莢連球中有黑子子多者良一名槐角	實	殺虫去風止涎唾除熱淚治五痔脫肛心悶	槐花功用亦同兼治衄血吐血尿血婦人漏血血崩花苞未放者稱槐米
皂莢	皂樹葉如槐葉瘦長而尖枝間多刺夏開小黃花結實以脂多者爲佳有長二尺者有小如豬牙者均入藥	實	利九竅去頭風治痰氣喘咳喉痺腹脹中風口噤風癘疥癬	用時去粗皮及子弦
天丁	即皂莢樹小刺		通關竅消癰疽搜風殺蟲治腹內生瘡胎衣不下	
肥皂莢	葉如皂角葉結莢長三四寸肥厚多肉內有黑子數顆	實	去風濕下痢便血瘡癬腫毒	土人用以洗衣勝於洋鹻後遂稱洋鹻爲肥皂
無患子	即肥珠子樹如椿葉對生夏開白花結實大如彈丸老則皮皺且黃實中有核正圓如球可作唸珠核外肉及子中仁入藥	實	子皮去面點研末治喉痺	澣垢與肥皂角同
櫸樹皮	皮似檀槐葉如櫟槲其木如柳俗作椐	木皮	治時行頭痛熱結在腸胃通身水腫毒氣攻腹	
柳絮	枝細長下垂葉狹長開深紫穗狀花實熟則絮飛如雪	實	治潰癰吐血金創血出	
柳枝	柳枝及根葉皆外科消毒要藥		治癰疽腫毒如乳疔瘡反花瘡	
櫻櫚灰	櫻俗作棕取皮毛燒黑存性	皮	治鼻衄吐血血崩血淋小便閉	樹根浸酒活血治打傷風痺
白楊皮	葉圓而尖背白面青有鋸齒木肌細白取樹皮刮粗皮用	木皮	治樸損瘀血續筋骨止孕痢漱牙痛治口瘡消癭氣腹癖	
膚木	樹狀如捲葉樹生長而有齒面青背白有細毛味酸夏開花青黃色成穗	樹皮根皮	破血止血治蠱毒血痢殺蚘虫根治酒疸腿珠雞骨骾蛇毒	即五倍子樹俗呼鹽夫一名白面蜈蚣
鹽膚子	即膚木所結之子大如細豆而扁生青熟微紫色味鹹酸其核淡形如腎	實	生津降火化痰潤肺滋腎消毒止痢收汁治風濕眼病	一名鹽樹子
烏桕	樹高數丈葉圓開黃白花結白子俗呼木子取根去粗皮用	根	療頭風通大小便解蛇毒下蚘虫	
大風子	樹大結實如椰子而圓其中有核數十枚大如雷丸子有仁	實	敗毒殺虫治風癬疥楊梅諸瘡	
紅豆	樹高丈餘葉似槐花似皂莢其莢似扁豆其子大于小豆半截紅半截黑	實	治瘴瘧蠱毒殺腹臟及皮膚一切虫	
槲	即大葉櫟花葉本狹末廣鋸齒成波紋結實如橡子而短小	木皮葉	葉治吐血鼻衄腸紅淋症鼻齇狐臭木皮洗惡瘡瘰癧煎服除虫除漏治腸風下血	槲實味劣荒歲亦有食之者其葉可染青布
榆白皮	葉背圓而大有鋸齒花開淡紫包結實周圍果皮伸長如鳥翅其形扁圓成串故謂之榆錢	皮	利竅逐濕除熱滑肯易產治久咳欲死下有形積滯	此樹古寺間有之
梓根皮	葉掌狀淺裂夏開脣形花色淡黃微紫實長似豌豆莢	根	散熱毒殺虫治時氣溫病頭身煩熱目疾身癢反胃浴小兒肚熱及瘡癢	去黑皮取裡皮用葉治手足火爛瘡及豬瘡
吳茱萸	幹直枝作十字形葉對生長而皺似椿而闊梢頭開黃綠小花結實成簇無核	實核	子溫中下氣止痛除濕氣痺吞服治厥陰痰涎頭痛陰毒腹痛	葉治心腹痛冷氣內外腎鈎痛枝治大小便間格不通根白皮殺寸白虫治牙疼中惡腹中刺痛漆瘡
椰皮樹	高丈許葉橢圓背面粗糙有鋸齒開花結子黃麻色根多肉皮韌可作繩搗之甚粘葉間生蛾無數	樹皮	敷瘡毒治背花蛇咬	板石洲龍王廟有十二餘株大者數圍
黃練芽	葉似槐而尖揉乾代茶清香可口	葉	生精明目清積解熱毒	俗呼黃連芽邑北新陽大土里一樹大如盆
灌木類 桑葉	葉爲卵形肥大經霜後摘取懸於當風處或孟夏采取吹乾亦可		治目疾盜汗霍亂轉筋	桑枝治風痺
桑皮	東行桑根用銅刀刮去青黃薄皮一重取裡白皮焙乾用	根皮	瀉肺火利大小腸降氣散血治刀斧傷蛇咬	作線縫金創腸出更以熱雞血塗之

名	形狀	部分	功效	備考
桑椹	即桑實也略似棗形熟則紫黑味甘采取晒乾爲末或搗汁或釀酒	實	補虛止消渴利五臟關節痛血氣解中酒毒消腫烏髮	
茶油	油茶樹所結之實榨取得之		清胃潤腸殺虫解毒除髮膻燃燈益目	其樹一名茶子樹皮葉洗風瘡瘙癢
楮實	即穀皮樹所結之實樹雌者皮白而葉稍椏尖實如楊梅熟時收陰乾	實	治陰痿水腫骨骹益氣明目	其枝葉可作浴湯治小兒風熱皮間白汁治毒蛇犬傷
郁李仁	樹高五六尺葉如箭簇形有鋸齒開五瓣小白花實如小李	仁	破血潤燥下水利氣治浮腫固結	
小蘗	即黃白之一種高數尺每節生三葉深缺刻有刺開細黃花結黑子	木皮根	皮去濕熱涼肝緊腎	根功用同
枳實	木如橘而小高五七尺葉如橙多刺春開白花至秋成實七八月采者爲實九十月采者爲殼	實	消食散敗熱破積堅去胃中濕熱治胸痺痛明目	枳殼功効略同但實利胸膈殼利腸胃
枸橘	葉爲掌狀複葉幹高多刺開白花結實大如彈丸殼薄不香熟則色黃	核樹皮葉刺	葉治下痢膿血後腫咽喉怪症刺治風虫牙痛核治腸風下血樹皮治中風強直	
毛橘	枝葉與橘同結實外有白毛味劣不堪食	皮	下氣化痰	藥店以之僞充毛化橘謂之次化
酸棗仁	葉圓而大至冬不凋實圓味酸其核中仁微扁	仁	生用治沈睡熟用治不眠及盜汗	山人采棗肉和米粉作餻
白棘	一名棘刺即酸棗樹高三四尺未長大時枝上之刺	刺	治心腹痛癰腫潰膿止痛決刺結痛陰萎滑精喉痺	
蕤核仁	一名白桵叢生小木葉如枸杞而狹長莖多細刺實扁圓色紫		明目治目赤痛淚出齆鼻鼻衄破心下結痰痞氣	
梔子	葉似李而厚硬開六出白花夏秋結實薄皮細子	實	治心煩心痛吐血衄血血痢下血損傷瘀血及傷寒勞復熱厥頭痛疝氣湯火傷	
金櫻子	枝幹有刺開白花結實如小石榴亦有刺	實	補血益精治脾泄小便不禁	一名山石榴俗呼棠榔子樹根治寸白虫下血崩中濕痺敷腫拔膿
女貞	即蠟樹子葉全緣對生子黑色橢圓形	實	強陰健腰膝黑髮明目	端午節采葉與桑葉苧葉陰乾研末敷金創止血歛口
冬青	即凍青葉似女貞而薄有鋸齒四季常青子赤色正圓形	實皮根葉樹	子去風補虛明目益肌治痔瘡皮功用同葉治瘡毒皸瘃根與皮治火瘡	
五加皮	一枝五葉每一葉下生一刺開白花結青子漸變黑色	根皮	堅筋骨治脚腫疼痺男子陰痿囊下濕女人陰癢	有一枝三葉者稱三加皮土人以之醫牛
地骨皮	即土枸杞之根皮	根皮冬采	解骨蒸肌熱消渴涼血治骨槽風金創	
土漆皮	皮如桃樹皮黏着人手即發腫	皮	止金創出血	一名野漆
白鮮皮	葉對生似椿而香臭氣嫩時可食枝幹多刺開細白花根皮白心實	根皮	通關節利九竅及血脈通小腸治諸黃風痺去濕除熱療婦人陰痛疥癬風瘡	俗呼芳椿本草列入山草類其實爲木本樹有高至一二丈者
茶葉	在穀雨前采稱雨前茶入藥用陳者	葉	消積食下氣去噫氣清六經治頭風肚腹脹瘧痢經霜後采者治羊癇風	泡過茶葉晒乾爲末治無名腫毒火瘡犬咬
黃荊	葉爲掌狀複葉開小朵花結子	根莖葉實	子治骨間寒熱肝胃痛呃逆小腹疝氣葉治霍亂轉筋血淋下部瘡九竅出血根治心氣	一名小葉黃荊根似常山
石黃荊	幹心方枝對生每枝三葉或五葉長而尖有鋸齒	葉子	葉治九竅出血及脚痛脚蛀子消食下氣治傷寒發熱	生石隙一名大葉黃荊一名山黃荊
路邊荊	高約三尺葉小橢圓而尖數片相集而生開壺狀小白花結子有絨毛	根葉	頭風解肌發汗洗漆瘡治疳積清濕熱	
紫荊	枝節叢生春先葉開花花爲蝶形紫色結莢果	花皮根	解熱毒消癰腫破瘀活血	

木橿	高數尺葉爲卵形三裂互生花五瓣短柄朝開暮落	根皮花木皮	止腸風瀉血痢熱渴治癬花治腸紅
木芙蓉	葉心臟形掌狀淺裂有葉柄互生開花甚鈍	花根皮葉	治大小癰疽拔膿止痛
山茶花	葉似桂稍厚而硬經冬不凋花有單瓣複瓣紅白諸色複瓣大紅者入藥陰乾爲末	花	治吐血衄血腸風下血塗燙灼傷
柞木皮	葉小有鋸齒光滑而靱幹及葉腋皆有刺開碎白花		催生利竅治鼠瘺黃疸
黃楊木	葉如卵形質厚而柔軟開淡黃小花木堅	葉	治難產及暑生瘧
一種三苗	高三尺幹葉即泌出白漿形狀不一有圓者有前闊後狹如牛舌者有長而尖者	汁	治中蛇毒身赤腫如蛇鱗者　一名牛奶樹
木藜蘆	高二三尺葉狹而長皮面皺開黃色小花結子如小豆	根	殺虫治癬疥　俗呼梨盧樹治鬧瘡特效
香葉樹	高丈餘葉橢圓端尖四季常青富膠汁	子根	子治痧症根散寒去風濕治腳痛牛病　製線香者採用
紫薇花	樹皮極滑澤葉橢圓形對生花紅紫或白花瓣多皺紋夏日始開秋季方罷	葉	嚼敷瘡癤拔毒生肌
半桐楓	高丈餘葉橢圓尾尖柄長中分三岐如楓葉者	根	去風濕治筋骨痛
斬蛇劍	莖葉均有小刺葉對生長卵形葉尖有細鋸齒搓之氣臭	葉皮根	洗瘡毒蛇咬根皮敷蛇咬傷及蛇頭指
陽毒消	高四五尺葉橢圓而尖幹葉均有刺		洗瘡毒蛇咬
醴陵縣志			
陰毒消	莖有刺葉對生如槐葉色淡紅開花結紅子	葉皮根	洗瘡毒蛇毒
鴨椿子	葉小而尖開花結蒴紅如雞脞形內有黑子一粒如小黑豆	實根	破氣積治疝氣腎囊腫　俗呼雞脞子樹一名鴨婆樁
檄木	山間小木高數尺葉面粗糙春開白花下垂如纓結黑子如胡椒大	葉根	葉敷金創出血根治喉痛小兒虫痛　紅檄木開紅花者根治白喉良
臭梧桐	葉爲心臟形薄而現八角開細白花花葉皆有臭氣	根皮葉花子	治風濕痺痛蹙脚楊梅瘡洗鵝掌風瘡疥外痔汗斑眼瞼瘡花治頭風冬痢　俗呼八角楓
土阿魏	即臭葉梧桐根皮搗出之汁如膠者		寬筋活血化痞消癥
乍似風	即黃老鼠柴高四五尺葉圓微尖色青冬則轉黃	葉根	治疔毒瘡癤拔膿止痛
鴨公青	枝葉皆青葉似苦楮樹葉	葉	去風治發瘡蛇咬
狗乾艻	葉現三叉每叉生一刺開花結紅子	葉子	葉根治風濕脚腫子治目疾　葉可熬膏作黏液
米蜡樹	高數尺葉橢圓微尖背黃色	根	治口瘡喉痛湯火傷
大青	高二三尺莖圓葉長三四寸面青背淡對節生秋開小花結子	根	治火毒口瘡喉痛小兒肚皮青黑風熱頭痛　俗呼淡親家母一名淡婆婆本草列入草部
七葉黃荊	高二四尺葉小每枝七葉或九葉	根葉	行血敗毒治撲跌癰腫蛇咬　是爲木本另有艸本
社壇消	高五六尺葉互生薄而光如皂角樹葉九月結子圓如黑豆	葉根	葉洗瘡腫根治打傷

甜茶葉　生于山野葉全邊端稍尖互生質厚而光滑春開五瓣小白花甚香　苗根　清熱解毒治目疾洗瘡癰

金腰帶　高二尺幹紅葉圓對生略似檀樹葉結紅子　根　治蛇咬洗瘡毒傷損

碓棧樹　高丈餘葉卵圓而尖有鋸齒青而光結子至冬紅如珊瑚子根如苧根搗之黏膩　根白皮　治腫瘍蛇咬

鐵籬笆　葉尖有刺常綠根似黃連味苦　根　治火眼　一名山黃連

見風消　葉卵形端尖全邊互生開小穗花實正圓色紅黑　葉根　根拔毒消腫葉消風敗毒敷金創　植物名實圖考載見風消葉似檫面青背白與此異當係別爲一種

四方消　高三四尺幹方葉橢圓而尖開白紅花成穗似羊尾　穗　消紅腫止癢祛風

百鳥不宿　高二三尺羽狀分裂莖有刺根長無主根　莖葉根白皮　根追風行血定痛催生下胎治雙單喉蛾喉閉流注跌損葉治難產小兒風疾身癢

密蒙花　樹高數尺葉似冬青葉而厚背白有細毛花微紫小朵成簇　花　潤肝燥治目中障翳赤腫　俗呼其樹爲白米風取根治脚痺痛一稱貓即骨

南天燭　即南燭高數尺葉類苦楝而小經冬不凋冬生紅子如珊瑚　枝葉子　枝葉止泄除睡强筋治一切風疾子强筋骨氣力固精駐顏

山礬　即七里香葉似梔子葉而有光澤花繁白如雪黃蕊結子　葉　治久痢止渴殺蚤蟲洗爛弦風眼

玉蘭花　樹有高至一二丈者花大如蓮色白極香　花　消痰益肺和氣治痛經不孕

羅漢松　闊瓣厚葉樹老結實長四五分底平上銳色紫黑大者如雞卵小者如豆　實　補腎益肺治心胃氣痛樹皮治一切血殺虫療癬

鳳尾蕉　葉長二三尺每葉生細尖瓣如鳳尾色深青冬不凋隔多年一開花　葉花　治一切心胃病及肝氣痛難產花治吐血

映山紅　葉細長仲春偏山皆是花色紅或白蒂如石榴花　花根　花治一切風血補益攻諸病根治瘰癧牙痛調經　一名杜鵑花一名山躑躅

綉花針　高數寸葉對生卵圓尾尖葉間生刺如小針開淡紅花結小紅子直根有肉有鬚　根　治淋症齒痛氣痛腳痛縮筋跌打心痛鼻衄崩中

陽雀花　莖有刺葉小爲長卵形叢生于葉腋春開小黃花　根　治牙痛喉痛調經風濕脚痛

滿山香　葉互生長卵圓形端尖　葉　消腫毒通竅止瘡癢去風治跌打傷

隔山香　葉長而尖似櫸樹葉開黃花結莢八角子圓如豆色淡黃　根　散寒燥濕治膀胱氣痛骨節痛

茯苓　寓木類　生山谷大松下皮黑而內堅白形似龜鳥者良山人掘土常偶得之　根　補五勞七傷逐水暖脾生津止泄　抱根者名茯神治心神恍惚健忘不樂

楓寄生　鳥食半春子遺矢楓樹上春間生長葉即半春子葉　半春子寄生在杉樹上者　治小兒風疾

杉寄生　半春子寄生在杉樹上者　治淋症腹痛

樟寄生　寄生於樟樹　治氣痛

松蘿　蔓近松上全體分細支無數狀如絲黃綠色而細長　平肝邪去寒熱治痰熱溫瘧頭瘡

上樹猴猻　爲楓樹枝節處附着之寄生物蔓藤年遠結成連珠如傀儡　追風治癱瘓急

苞木類	水竹	即淡竹似篁而茂節稀肉薄節間有粉味甘多汁刮取內皮之絨稱竹茹截竹燒之得瀝稱竹瀝
	苦竹	邑產無大者節膨大而肥厚筍味苦有紫白二種
	紫竹	係苦竹之一種
	篁竹	堅而促節體圓而質勁皮有粉如霜
	竹筍	竹雌者乃有筍篁竹淡竹苦竹諸筍皆可食冬月生大竹根下未出土者名冬筍
	竹實	竹無大小其茂密成林者間嘗開花結子大如粟粒竹旋枯死
昆蟲類	蜂蜜	蜜蜂所釀之糖白如膏者良
	蜜蠟	生於蜜脾取蜜後煉過濾入水中候凝取之
	石乳香	石蜂採楓脂釀成者在深山岩石間色黃有香氣
	露蜂房	大黃蜂在樹上或屋上所作之巢
	蠟蝎	即細腰蜂色黑腰細
	蟲白蠟	春月散蠟虫種于蠟樹上芒種後大如蟣蝨延緣樹枝食汁吐涎於枝即結臘
	五倍子	小虫遺種於鹽膚木上營造小毬久之由青而黃
	桑螵蛸	即螳螂產卵桑樹上所營之繭
	雀甕	毛虫在石榴樹上所營之繭狀如雀卵入藥取未出蛹者
	白殭蠶	頭蠶自死箔上取其白色而僵直者
	蚯蚓	白頸者入藥有爲末化水燒灰諸種用法
	蝸牛	即具殼蝘蜓以圓而大者爲勝
	蠍	八足而長尾有節色青捕者以鹽泥食之去足焙用
	水蛭	取水中馬牆新瓦焙乾研末用
	蛆	取糞中蛆入新布袋置長流水洗淨新瓦焙乾研末用
	狗蠅	生狗身上狀如蠅黃色能飛
	壁蝨	即臭虫也用時置溫水中漂去其臭氣焙乾爲末
	蠐螬	如蠶而大身短節促足長有毛生樹根或糞土中

苞木類	茹治嘔吐温氣寒熱吐血崩中胎動瀝治中風中痰口噤大熱煩燥癲狂
	葉止渴除煩熱治時行發黃安胎止產後煩熱
	癰治牙疼明目功同水竹葉治口瘡目痛塗一切惡瘡根治心臟惡毒氣
	解癲狗毒
	茹治勞復齒衄月經不止瀝治喉痺風瘧葉治煩熱風痙嘔吐霍亂轉筋惡瘡根止渴下氣
	筍利膈下氣化熱消痰爽胃治消渴苦竹筍治明目解酒毒治出汗中風失音水竹瀝治目瞽
	實益氣下積滯
昆蟲類	蜜益氣補中潤腸止痛解毒
	蠟治泄痢臟血補中續絕傷瘀金創
	石乳香活血定痛治血氣難產折傷
	露蜂房殺虫治癲疝疔腫疳毒牙痛臍風
	蠟蠟治久聾鼻窒署竹木刺
	蟲白蠟生肌止血定痛補虛
	五倍子治頑痰盜汗下血漏胎齒痛眼赤
	桑螵蛸治遺精白濁遺尿陰痿
	雀甕治小兒急慢驚風臍風
	白殭蠶治一切風痰皮膚風瘡丹毒疳蝕金創
	蚯蚓治熱結狂小便不通急慢驚風腎臟風注頭風聤耳木舌卵腫蜘蛛毒
	蝸牛治臍風喎口喉痺鼻衄耳聾腫毒痔漏解蜘蛛蜈蚣蠍蠆毒
	蠍治中風抽掣小兒驚搐耳聾疝氣諸風瘡女人滯下陰脫
	水蛭治惡血瘀血月閉血癥折傷墜撲畜血
	蛆治小兒諸疳積
	狗蠅治痰瘧不止痘瘡倒黶去翅足酒服
	壁蝨拔疔治咽膈敷臁瘡及眼生挑針蛇蠍咬傷
	蠐螬治唇緊口瘡丹疹破傷風瘡血瘀目瞽金創內塞下乳汁敷惡瘡

一名文蛤以其形似也依法釀過者名百藥煎可含噙

用蠋蠟塗禿瘡日久自生髮

一名贏

俗呼黃臘提煉則白

凡被火灼者用蚯蚓和沙糖即化水塗之即愈

蝸殼治一切疳疾牙蠹

被蠍螫者以布漬冷水搨之

治赤丹腫瘍者取生蛭十餘枚令吸其血飽即置水中更換新者至皮皺乃已

即金龜子之幼虫

斑蝥	多生豆葉上甲黃色有黑斑點長四五分	治疝癥解疔毒猘犬毒輕粉毒下死胎	此虫有毒不可輕用
鼠婦	生卑濕處多在甕底土坎中形似衣魚而長大灰色	治久瘧寒熱風虫牙齒疼痛小兒撮口驚風鵝口瘡痘瘡倒靨解蜘蛛毒蚰蜒入耳	
蜂虎	首尖身圓有翅遍身生毛灰斑色鼻上有鬚三根伸縮自如飛入蜜巢則盡食其蜂	治咽喉腫痛心腹痛	捕得裝入布袋懸檐下陰乾瓦上烙去絨毛及頭翅尾足研末
人蝨	不潔人家常有之入藥用黑色者	治脚指間雞眼眼毛倒睫疔瘡	
木蝨	生木葉上卷葉如筒子初出如白蛆漸化爲虫形似蠅而大飛吮牛馬血	治目赤痛眥傷淚出寒熱瘀血血閉	
飯蠅	頭赤褐色兩翼麻色聞飯香則至	敷面疔塗瘡癤塞鼻治拳毛倒睫	
桑蠹	桑樹上虫及虫屎蛀屑功用相同	治小兒驚風婦人崩中漏下墜胎下血痘瘡黑陷	
黃麻梗蟲	生黃麻梗近根一節中形如小蠶以葱葉貯之挂風處陰乾	治疔拔毒	
桃蠹	食桃樹虫及其糞皆可入藥	辟瘟疫令不相染	
柳蠹	生柳木中內外潔白虫屎亦可用	治瘀血腰脊歷節痛心腹血痛風癩風毒	功同桃蠹
桐蛀	生桐油樹中焙末用	治沙眼惡腫毒	
竹蛀末	虫食乾竹所餘之粉	治耳出膿水湯火傷	俗名粉虫
蠶繭	已出蛾者燒灰酒服	治癰腫無頭者	
蠶脫紙	初出蠶子遺殼在紙上者燒存性用	治吐血下血衄血崩中淋痛牙宣牙癰纏喉風	一名馬明退
晚蠶砂	晚蠶所排泄之糞晒乾淘淨再晒	治消渴癥結血崩頭昏眼赤	晚蠶蛾炒研末敷金瘡及蛇虺咬傷出血
蜘蛛	種類甚多入藥惟用懸網如魚罾者	治中風口喎小兒口噤脫肛瘡腫齒蠱	
壁錢	虫似蜘蛛形扁斑色八足而長作白幕如錢貼牆壁間	取汁治鼻衄及金創出血燒研治牙蝕喉痺窩幕封金創血止虫牙痛	壁錢螫人至死可用桑柴灰調白礬末搽之
青蒿蠹	生青蒿節間狀如小蠶	治急慢驚風	
蚱蟬	蚱蟬蛻出之殼淋湯洗淨晒乾用	治小兒驚癇壯熱瘡疹出不快難產頭風疔腫啞病	
蜣蜋	此類有多種喜入糞中取糞丸而推之鼻高目深背黑甲者入藥	治大小便痔瘻疔腫附骨疽瘡鼻中瘜肉	
樗雞	生臭椿上頭方面扁尖喙向下六足重翼色黑外翼灰黃有斑點內翼五色相間	通血閉破瘀血瘰癧散目瞖辟邪氣療犬猘傷	一名紅娘子有小毒不可近目
牛膝蛀	生牛膝草節中香油浸製	敷指頭毒痛不可忍者	
蒼耳蠹	生蒼耳梗中狀如小蠶燒存性研末用	治疔腫惡毒	
百鳥不宿蟲	如蛆頭生百鳥不宿幹中搖之虫即下竄須於上午揮利刃砍樹取之	治風毒流注痘瘡毒內陷	

茄棵蟲	生茄棵內上有蛀眼內即有蟲綠色黑嘴	治男女童癆	
蚱蜢	在稻田中方頭身青黃色者入藥	治小兒急慢驚風鸕鷀瘟破傷風痧脹凍瘡	一名阜螽
天牛	大如蟬黑甲光如漆目前有黑角入藥用獨角者	治疔腫惡毒小兒急驚風去痣靨	
螻蛄	有短翅四足雄者善鳴而飛	治產後胞衣不下水腫石淋口瘡出肉中刺下骨骾	
衣魚	一名蠹魚全身有銀色細鱗食衣服書畫	治小兒臍風嘬口客忤天弔風癇口喎重舌目臀淋閉	
蜃蟲	即土鼈也形扁如鼈不能飛有臭氣鹹寒有毒焙存性用	行產後血積折傷瘀血治重舌木舌口瘡小兒腹痛夜啼	生牆壁下濕處
蜚蠹	即噉牛馬血之蟲候其飽時掩取乾之	治蛇螫出血樸墜瘀血於孕婦病篤時去胎	古方有取白水牛身上之蝨焙研作麵餅食預防痘毒不如近世種牛痘之穩且便也
蟾蜍	即癩蝦蟆于端午日捕取風乾	拔取疔毒治發背一切惡腫疳疾牙疼破傷風	古方所用蝦蟆即指此種其皮用針刺孔貼大毒能拔毒外出
蟾酥	即蟾蜍眉間白汁用手揑眉棱取之塗于油紙	爲外科拔毒要藥	
山蛤	黃麻色腹下有黑點且氣腥常仰臥若死小鳥來啄則捕而食之常食蛇鳴聲如擊柝大者似巨椀	治小兒勞瘦疳疾婦人經閉	藏山石中俗呼石般蝦蟆本草綱目大者曰田父能食蛇當係一種
蜈蚣	黑頭赤足者良炕爲末	治小兒驚癇風搐臍風口噤丹毒禿瘡	凡中蜈蚣毒者以蚯蚓桑皮解之
蛞蝓	即蜒蚰俗呼鼻涕蟲無殼有觸鬚	治口喎攣縮脫肛腫毒焮熱脚脛爛瘡蜈蚣蠍毒	
鱗介類 穿山甲	即鱗鯉有四足能陸能水尾鱗堅厚入藥	通經脉下乳汁消癰腫排膿血通竅殺蟲	
石龍子	即蜥蜴生山石間似蛇有四足頭扁尾長形細長七八寸有細鱗金碧色其五色全者爲雄入藥尤勝	利水治五癃石淋下血癥結水腫尸疰留飲	
守宮	一名壁虎色灰黑扁目四足	治風痓驚癇歷節風小兒暗風疳疾蠍螫	
蛇蛻	即蛇脫出之皮只取白如銀者燒灰用	治小兒驚癇喉痺口瘡腫毒耳痛目臀產難	
白花蛇	龍頭虎口黑質白花兩脇現二十四個方勝文腹有圓斑尾有佛指甲	治風痺驚搐癩癬惡瘡	俗呼棋盤斗方蛇有大毒去頭尾取中段浸酒用
烏蛇	背有三稜色黑如漆頭圓尾尖眼有赤光	治諸風破傷風小兒驚風	
水蛇	大如鱓黃黑色有繖紋	治消渴熱毒癬皮治小兒骨疽手指天蛇瘡	
蝮蛇	長一二尺褰鼻鈎牙取活者置醇酒甕中一年後乃啓封	治大風諸惡風癩疾惡瘡偏枯	有大毒咬人不急治必死可用黃荊嫩葉嚼敷之
土虺蛇	身短而小土色而無紋	治大風中惡疾	有大毒
魚鱗	諸魚鱗燒灰用	治食魚中毒煩氣或癥積又下魚骨骾	
魚膽	草魚鯽魚鱖魚胆皆可用鱖魚尤佳臘月收取懸簷陰乾	治一切骨骾竹木刺在喉中酒化溫呷取吐	鯉魚胆功用詳下
鯉魚	脇鱗一道自頭至尾有三十六鱗鱗有小黑點	煮食下水氣利小便安胎燒末發汗定風喘咳嗽下乳消腫	鱗燒灰治產婦滯血腹痛血症血氣骨骾鼻衄胆治目疾喉痺

鯽魚	色黑而體促腹大而脊高忌與野雞麥冬菜沙糖同食	煮食治虛羸水腫生搗治惡核腫毒炙油塗婦人陰疳瘡和麻油熬膏治一切瘡毒	
鱧魚	即烏魚形長體圓頭尾相等黑色有斑點其胆味苦	肉治濕痺腫滿脚氣腸痔大小便壅塞腸及肝治痔瘡蟲胆治喉痺將死者	
鱓魚	臨用時取生者斷尾滴血	治口眼喎斜耳痛鼻衄疹後生瞖塗赤遊風頭治消渴除瘡	
黃頰魚	身尾似小鮎腹下黃背上青黃羣游軋軋作聲	醒酒去風煮食消水腫利小便燒灰治瘰癧久潰諸惡瘡	
龜版	以龜甲鋸去四邊但取其底版勿令中濕石上磨淨炙用熬膏者名龜膏	治腰脚酸痛補心腎益大腸止久痢久洩治難產消癰腫燒灰敷臍瘡	以松毛刺龜鼻取尿滴耳聾點舌下治大人中風舌瘖小兒驚風不語
鼈甲	生取甲剔去肉以綠色九肪多鋸重七兩者爲上	治久瘧陰毒腹痛勞復食復斑痘煩喘驚癇難產陰脫血瘕石淋陰頭瘡潰瘡	
石蟹	生溪澗石穴中小而殼堅赤者良	塗漆瘡解鱓魚毒治濕熱黃疸搗敷久疽瘡	殼治凍瘡熏臭蟲爪能安胎下胎破宿血食蟹中毒者冬瓜汁紫蘇汁豉汁蘆汁皆可解之
蚌粉	用蚌殼火蝦作粉	治疳積痰咳反胃白濁帶下除濕腫明目擦陰瘡及脚指濕爛	
田螺	生水田中與石螺功用略同	利二便取汁擦痔瘡胡臭涎治水腫殼燒研治心痛遺精下血驚風	
石螺	生溪澗大如指頭而殼厚	醒酒解熱治大小便消黃疸水腫治反胃脫肛痔漏疔瘡	殼煆過治濕痰心痛膈氣諸瘡湯火傷
禽類 白鵝膏	臘月取白鵝之脂鍊收	塗手足潤皮膚愈皸裂灌耳治卒聾又消癰腫解丹石毒	屎治鵝口瘡毛治噎疾
鴨血	白鴨者良臨用時取熱血	解中金銀丹石砒霜鈎吻毒治中惡及溺水死	屎塗蚯蚓咬
烏骨雞	有白毛烏骨者黑毛烏骨者肉白骨烏者觀雞舌黑者則骨肉俱烏入藥更良	補虛勞羸弱消渴中毒女人崩中帶下及一切虛損病	
雞冠血	三年雄雞者	療經絡間風熱塗頰治口喎不止塗面治中惡卒飲之治縊死欲絕小兒卒驚塗瘡癬毒蟲咬	雄雞血功用略同
雞內金	即雞膍胵裏黃皮用不落水者陰乾或焙乾研末	止泄精幷尿血崩中帶下腸風瀉血食瘧反胃消酒積	
雞矢白	雄雞矢有白者臘月收之	下氣消積利大小便治皷脹癥瘕破傷風燒末治鼻衄牙痛小兒驚啼	治產後中風者須和黑豆炒兌酒服古方有雞矢醴莊子雞瘧即雞矢也
雞子	即雞卵也新生者良	鎮心安五臟止驚安胎益氣治產後諸痛解鈎吻毒塗蟲蛇傷	卵黃補血白清氣功用略異
鳳凰胎	即雞卵抱未成雛者研爛和麻油用又抱出雞卵殼焙研入藥	治中鈎吻毒殼治疸瘡惡瘡耳疳頭瘡外腎腫	其已成雛頭鬱不得出而死者治樸跌經閉
左盤龍	即鴿矢其矢皆左盤故名野鴿矢尤良	治瘰癧諸瘡破傷風及陰毒垂死者殺蟲	
白丁香	即雄雀屎頭尖挺直取甘草水浸一夜焙乾用	治疝瘕積脹痃癖及目瞖努肉癰疽瘡癤咽塞口噤齒痛	凡癰腫未穿者和鼠屎黃豆搗敷即穿
燕矢	取燕子窠中屎熬香用之	治小便淋閉療痔殺蟲去目瞖止牙痛作湯治小兒驚癇	
伏翼	即蝙蝠燒灰存性用	治目瞑癢痛久瘧久咳上氣哮喘乾血氣痛多年瘰癧小兒驚風	肉性瀉利但可治病若煮食多致身死
夜明砂	即蝙蝠屎炒研用	治目盲障瞖明目除瘧治疳毒瘰癧	
鴟頭	俗呼鴟爲貓公鳥以其頭目似貓也	治頭風目眩顛倒癇疾	

鴉翅 老雅翅羽炙焦研末用

鷹糞白 燒灰存性

鷹吐毛 鷹每日食雀時連毛食之肉消而毛不化聚成一團如芡實大次早吐出煅存性

獸類

虎骨 用頭及脛骨色黃者佳

治筋骨毒風攣急走注瘀痛尸蛀惡瘡

豹脂 豹狀似虎而小其毛紋如金錢者曰金錢豹如艾葉者曰艾葉豹

生髮潤腸

豬脂 臘月煉淨收用勿入水可久留凡病猪及自死者勿以入藥

豬零 即豬矢也外科用以黃泥包煅存性爲末或敷或服

除熱解毒治驚癇男女下疳十年惡瘡

羊肉 白羊黑頭黑羊白頭獨角者幷有毒食之生癰

補中益氣安心止痛治風眩羸瘦五勞七傷產後虛症小兒驚癇

羊糞 以青穀羊者良煅灰或煮水絞汁用

古方有羊肉湯羊脛骨治脾弱白濁羊腎補腎虛羊胆治目疾羊血熱飲治產後血暈胎衣不下解鈎吻毒羊乳治漆瘡口瘡蜘蛛傷羊膏治脫肛產後腦中絞痛皆要藥也

牛乳 黃牛者佳

補虛羸養心肝解熱毒潤皮膚止渴治反胃熱噦小兒吐乳

牛膽 臘月用黃牛青牛者良

通大小便敷惡瘡殺疳蟲治目赤目瞽

黃明膠 一名白膠即牛皮膠用黃牯皮及其骨髓腎蔥熬之

釀南星末謂之胆星治驚風釀白芍末治癲狂釀槐實治痔瀝目疾

治血止痛潤燥利大小腸治諸症撲損湯火傷

牛洞 即牛糞也烏牯者良

燒灰敷炙瘡癰腫爛瘡痘瘡絞汁治消渴黃疸脚氣牛尿治水腫腹痛

驢皮膠 即驢皮所熬之膠也以雄而毛色黑者良

補血及一切血症骨節疼痛及經水病胎前產後諸症

狗膽 青犬黑犬者良

治鼻衄睛耳止消渴殺蟲除積能破血酒服治血氣痛及傷損

狗糞 以白毛者良

治疔瘡倒靨對口發背惡瘡解酒消毒蛇毒

馬通 即馬屎也白馬者良燒存性或絞汁

治吐血下血鼻衄崩中金創出血攪腸痧痛

治攪腸痧用陳者燒灰泡水服有奇效

貓頭骨 用臘月死貓頭燒灰存性用

治心下鱉瘕痰鼾牙疳瘰癧鼠瘻

白松香 即瓦上多年之貓糞色白火煅用

治瘟疫鹽哮蚘厥作痛鼠瘡

兔皮毛 臘月收之燒灰用無則用兔皮毛所製敗筆亦可

治產難胞衣不下餘血搶心者通癍閉瘀痔脫肛瘡陰腫

望月沙 即兔屎也

治目瞽勞瘵五疳痔瘡

獺肝　其肝與諸畜異一月一葉十二月十二葉其間又有退葉

鯉骨　即野貓之骨其頭骨尤良

鼠　即人家常鼠也

雄鼠屎　兩頭尖者

鼷鼠　即田鼠也黑色脚極短項尤短尾極小常穿行地中

鼹鼠　居土穴樹孔中形大如鼠

鼬鼠　狀似鼠而身長尾大黃色帶赤其氣臊臭

猬皮　體長尺餘背及側面密生短刺毛其皮細錘炒黑入藥

豪豬　狀如豬而項脊有豪如箭

麝骨　麝似鹿而小無角

獾油　獾尖喙矮足短尾深毛褐色

狼脂　臘月收鍊可久藏

人類

人中黃　冬月以竹筒入甘草末于內密封兩頭浸糞缸中立春即出

人血餘　即亂髮洗淨煅焦存性研末

人中白　即人溺澄下白質也以風日久乾者爲良以瓦煅過用

童便　用吃乳健嬰所排出者或十二歲以下無病童子勿令食葱蒜韭薤辛辣羶腥之物得之童男者太良

乳汁　取無病婦人之乳白而稠者良

人牙　用人齒脫者燒存性研末

爪甲　刀刮爪取屑末或剪甲燒存性研末

金類

赤金　生金有毒須經百煉使之成屑成漿近人無用者惟將金質金釵環燒過作針砭用

銀　生銀有毒方家鍊銀爲箔或鍊爲泥用之今人用熟銀磨水服或煮藥或作針刺用

銀銚　首飾店溶銀罐所餘之黑滓合麻黃黃丹熬成膏

赤銅屑　即打銅落下之屑或取紅銅火煅水淬亦自落下以水淘淨酒炒研末用

野豬黃　野豬腹中所結之黃如彈丸大

豬膽　豬膽汁

豬心血　豬心血

豬肝　豬肝

豬肺　豬肺

豬腎　豬腎

豬肚　豬肚

豬屎　豬屎

豬脂　豬脂

豬油　豬油

豬骨　豬骨

豬蹄　豬蹄

豬糞　豬糞

豬尿　豬尿

豬膽　治扁勞咳嗽虛汗客熱及傳尸瘵

治尸疰遊風噎病瘵癰痔瘻

治金創止血生肉療癩瘺惡瘡

治小兒白禿疳疾痔瘡

治虛損洩精

治水腫脚氣奔豚黃疸

治五痔下血腸風陰腫遺精疝積瘵猶犬咬傷除瘕肉

治心腹痛殺蟲

治咽喉痺痛

殺蛔蟲消癰疽治瘡疥痔瘻糞治蛇虺咬傷

治傷寒勞復男子陰易腹痛室女經閉子死腹中乳癰陰脫

豬糞消瘤治魚臍瘡及下痢

治小兒中惡熱毒煩悶胎動不安漏血

治一切無名腫痛癬瘡痔漏發背疔瘡

治女人血氣心痛又和醋治狐臭

治豬尿血喉蛾咽逆淋閉破傷風針入肉飛絲入目

砭風眼爛弦水銀入目針牙齒風痛

治乳癰未潰痘瘡倒靨

補五臟悅顏色治目赤痛多淚解牛馬毒

治惡瘡鼻衄湯火灼傷

治熱病發狂鼻衄骨蒸解熱毒薑毒肉脯諸毒

治吐血咳血鼻血便血尿血一切血及大小便不通小兒瘡癤

潤燥澤肌驅風散逆結氣治積久風痺塗惡瘡

製金創藥酒用初生尚未生毛者

治瘡疥黑陷用人牙犬牙等分火煅研末蜜水調服方名無價散

或巡用尿水功用亦同跌傷飲自己小便可去瘀止痛

秋月取童便依法煉製凝結如白石謂之秋石治虛勞症

有毒不可食中毒者飲黃泥水烏梅湯可解

銅青 即銅綠也取銅器上綠色者淘淨洗之　治惡瘡疳瘡爛眼弦吐風痰殺蟲敷諸蛇螫毒　近人多以醋製銅生綠充用

古錢 須在五百年以上者開元通寶有指掐痕如月形者大佳　治目中瘴翳腐蝕壞肉婦人橫生逆產五淋

銅器 盛飯食茶酒經夜有毒醫家多用作砒熨　熨臍腹

鐵落 煆鍊鐵於砧上所落之甲皮　平肝除胸膈中熱氣治驚邪癲癎小兒客忤消食及冷氣

鐵精 出煆煉爐中如塵紫色輕者爲佳　療驚氣定小兒風癎熨女人陰脫男子陰腫敷脫肛下疋骨刺

鐵銹 此鐵上赤衣也　乎肝墜熱消瘡腫口舌瘡醋磨塗蜈蚣咬

鐵器 如鐵秤錘刀斧之屬皆可用　燒赤淬酒治產難橫逆胞衣不出並治產後血暈腰腹痛磨刀水利小便消熱腫解蛇咬毒

密陀僧 鉛在空氣中燃燒而製之　止血消積殺蟲染鬚髮治瘡疾驚癎瘡毒狐臭脚丫養

石類 石英 天然之矽酸化合物爲透明六稜結晶體分五色入藥多用白紫兩種　主治心腹邪氣胃冷驚悸女人心腹痛下乳白者治肺癰肺瘘紫者治驚癎癰腫蝕膿

雲母 生於石中作片成層可折五色並具多黑者用時須依法製之成粉　治身痺死肌中風五勞七傷瘧疾痢帶下產難敷癰疽金創出血

寒水石 即凝水石由結晶炭酸鈣而成明潔易碎　治傷寒發狂熱心燥丹毒喉痛金瘡

赤石脂 色絳滑如脂以理膩拈舌綴唇者爲上　養心明目益精治腹痛腸癰脫肛瘡毒崩帶產難胞衣不出　太平山有之

長石 爲含水矽酸化合物屬單斜晶系或三斜晶系堅硬潔白有珠光敲之段段片碎　止消渴下氣除肋肺間邪氣

方解石 灰石之透明而結晶者成爲炭酸石灰稜狀之六方晶系　治心中留熱結氣黃疸通血脈去蟲毒

石鐘乳 含炭酸石灰由岩陰滴下其石灰質日久凝結如鐘之乳白而薄者可服　益氣補虛強陰下乳汁　忌與參朮同服犯之多死本草有石髓

石花 即鐘乳滴於石上迸散日久積成如花形　壯筋骨療腰痛風冷

石炭 即黑煤入藥用堅硬如石者　治婦人血氣痛及諸瘡毒金創出血小兒痰癎　一名烏金石

石灰 即氧化鈣由灰石煆燒而成加水則發熱成粉入藥多用陳者　散血定痛止水瀉脫肛陰挺治風癆瘡腫及湯火傷

地龍骨 即古墓中石灰棺下者尤佳　治頑瘡瘻瘡膿水淋漓斂諸瘡口　一名千年雪

水龍骨 即艗船之油石灰陳者良　治金創跌損出血及諸瘡瘻

土墊 石灰窰中流結之土渣也須轉色赭　治痰核紅腫

麥飯石 山溪間麻石中常有之有粒點如豆如米撮聚如飯團其色黃白大小不等　治一切癰疽發背　用時須炭火煆赤投米醋浸之搗碎碾細如泥

赤石 即土珠也亦稱鐵朱色紅青如雞冠者良　治哮呷

石燕 生洞中色如土堅重如石狀類燕而有文圓大者爲雄長小者爲雌　治淋疝腸風難產目翳

朴硝 取多年土牆下土浸水熬之即成硝在上有芒者爲芒硝有牙者爲牙硝入藥良　治五臟積聚久熱胃閉陰邪破留血痰結通經利大小便及月水治目疾　芒硝久置風中化爲白粉者名風化硝

玄明粉 以朴硝溶解於水露一夜和蘿蔔片煮熟露一夜再與甘草同煎露一夜後盛以大沙罐封固久煅即成　治心熱煩燥並五臟宿滯明目消腫毒

滑石 色白質輭觸之滑膩　化食去結滑胎利小便治中暑燥渴　色青赤者有毒不可用

爐甘石 狀似羊脚鬚如石脂砥之黏舌味甘　明目去翳生肌止血療腫毒　產金鐵中者色微黃產銀鐵中者帶青或帶綠或粉紅

禹餘糧 石中有細粉如麵色黃外有硬殼裹之形如鵝卵者佳　治崩中漏下血閉癥瘕

土類 白堊 一稱白土一稱白善土即磁土也搗篩末以鹽湯飛過晒乾用或燒　治陰腫痛漏下血瘕鼻衄臁瘡　爲製瓷器之原料

觀音粉 細如麵粉色白荒歲偶發現之土人掘食以止饑或其內含有植物質　益氣調中解蟲毒逐水腫明目療濕黃

赤土 俗呼土紅研末用　治湯火傷牙宣疳蠶風疹瘙癢

黃土 掘取三尺以下者攪漿或煮水用　治腹內熱毒絞痛小兒喫土爲沙驚風甘辛無見解諸藥毒及野菌毒又醋調塗湯火傷

東壁土 屋之東壁土常先見日入藥多取年久牆上之陳者　治溫瘧霍亂煩悶急心痛小兒臍風瘡癬六畜肉毒

燕窠土 燕子銜泥營窩於人家梁上或壁上　治風瘙癮疹濕病疔瘡吻爛頭禿丹毒及一切惡瘡

土蜂窠 果蠃自營土窩育子其中負螟蛉以爲食餌故俗呼螟蛉窩炙研末用　治小兒雀亂吐瀉難產醋調塗腫毒蜘蛛蜂蠆毒

白蟻泥 用松木土者同黃丹合炒黑研末用　治惡瘡腫毒

鼠穴泥 老鼠洞內炒熱布包用　治偏正頭風

蚯蚓泥 蚯蚓於土中營巢如穴　敷小兒卵腫時行腮腫丹毒吹乳去熱毒治蛇犬傷

井底泥 在汲水井底者臨用時取用　塗湯火傷瘡妊娠熱病取敷心下或丹田可護胎氣

伏龍肝 俗呼竈心土即竈內黃土年久者研末用　止嘔血衄血崩中尿血催生下胞治心痛狂癲及小兒夜啼臍瘡重舌　和醋搽狐刺瘡又炒三升囊盛搨心下治子死腹中及胞衣不下　山螞蟻窩在深山樹上根中冬寒時尋取搓去草泥研末爲潰癰及刀傷收口要藥

白珠砂 以細瓷粹片煅紅研極細末水飛用或用瓷片磨水古瓷良　治帶下血崩止嘔吐催生破血止血接骨去目翳敷癰腫

烏古瓦 取屋上年深者　煮水止渴利小便解心中之熱

釜臍墨 即鍋底之灰　消食積止血治中惡吐血血運心痛鼻塞塗金創舌腫

百草霜 即燒柴竈上煙突之墨其質輕細故名又廚上似線吊者俗呼吊脚京煤　消積滯止上下諸血治胎前產後諸病傷寒陽毒發狂瀉痢口耳喉鼻諸瘡

水類 井泉水 遠從地脈來者味甘氣冽乃爲眞泉水將旦首汲曰井華無時初出曰新汲入藥宜用此二者　治消渴反胃熱淋下熱氣洗目中膚瞽煎一切痰火氣血藥　邑有泉名溫泉者係普通泉水並不含硫黃質

流水 取溪澗中長流水而清潔者以杓高揚之千萬偏乃以之煎藥　治陽盛陰虛目不得瞑及霍亂泄瀉傷寒後欲作奔豚　逆流水治中風卒厥頭風宣痰吐飲

臘雪　臘月下雪取置罎中密封置陰處數十年亦不壞

地漿　掘地深三尺見黃土有泉滲出謂之地漿如乾燥無水者用泉水傾入攪之取出澄清亦可

解一切毒治瘟疫小兒熱癇狂啼酒後暴熱黃疸洗目退赤解熱抹痱塗治湯火灼傷

煮沸飲解諸毒

說明　神農本草。分上中下三品。共三百六十五種其見於邑產者。凡二百有三種。自陶宏景作別錄後。歷唐宋元明。代有增益。數且十倍。大都從治療經驗得來。蓋一病必有一病之特效藥。時醫習用。僅百餘種。此外概被摒棄。即古方常見之敗醬、酸漿、繁縷、亦幾無人齒及。中醫衰替。此其一大原因。各藥名稱。俗呼恆與本草異。而其功用亦多不相侔。有詳載本草而爲今人所忽者。亦有今人新發明。足補前人之闕者。博采標本。廣事徵詢。求其一一脗合。始以入表。至於不見醫籍之土藥。亦必詢諸病家。僉云有效。乃最錄之。不徒憑業采藥者一二人之言也。

各藥分類。依本草綱目。略有出入。如綱目草部之白鮮皮、通脫木。實爲木本。今改入灌木類。綱目菜類之蒲公英、蕺菜等十餘種。邑人無用作蔬者。今改入隰草類。又綱目蔓草類。兼收木本之藤。今改稱藤蔓類。如一物而兼取數部入藥者。並仿綱目例於本條下分別紀註其功用。其爲重要藥品。如括蔞天花粉之類。則另列之。

各藥產量向無統計。如夏枯草、萹蓄、茺蔚、大小薊、以及車前、馬蘭、黃荊、白茅之屬。幾乎徧地皆是。或用飼牲畜。或析而爲薪。或漚作肥料。皆莫之或惜。青蒿、香薷、土茯苓、荊芥、木通、山藥、粉葛、半夏、麥冬、梔子、香附、牛膝、五加皮、地骨皮、淡竹葉、夜明砂等。雖常有人采取。而委棄於地者。尚不知凡幾。他如茯苓、菟絲、則寥寥不數覯。山谷之民。間有自種當歸、川芎、蒼朮、白朮、防風、藿香、人參、厚朴、薏苡、黃連、薄荷以備用者。亦無收穫量可言。同爲縣產。自未可以其產量微而遂略之。舊志列舉藥產之名。共祗三十九種。茲增收近七百種。耳目有限。挂漏猶多也。

各藥產生不一其地。大抵薈萃於縣境內之各大山。西南鄉軍山天花台一帶。爲藥材著名產區。東北兩鄉太平山、尚寶冲、陽坑、彰仙嶺等處次之。湘潭莊客。每年來縣采辦大宗輸出者。凡百餘種。沙參、前胡、香附、天冬、黃精、葛根、葛花、梔子、萆薢、天丁、金銀花、黃藥、土茯苓、天花粉、瓜蔞實、鈎藤、柴胡、貫仲、木通、丹參、苦參、萎蕤、大青、青蒿、蒲公英、天南星、白蘞、威靈仙、夏枯草、穀精草、淡竹葉、金櫻子、側柏葉、細辛、五加皮、枳殼、枳實、伸筋草、山慈姑、過山龍、內紅消、烏藥、茜草、鶴虱、枇杷葉、石菖蒲、白頭翁、海桐皮、艾葉、紫蘇、苦楝子、活血藤、骨碎補、板藍根、青黛、澄茄子、浮小麥、卷柏、白芨、半夏、白蘚皮、石榴皮、青皮、橘紅、草麻子、鬧羊花、旋覆草、金沸草、續斷、薺苨、香薷、益母草、茺蔚子、槐花、槐米、槐角、松花粉、桃仁、絡石、各種寄生、山藥、枳

棋子、青葙子、何首烏、女貞子、陳、絲茅根、淫羊藿、草烏、蜜蜂、蒼耳子、萊菔子、土花椒、老鸛草、龍膽草、茵甲、夜明砂、土紅、斑蝥、土鼈、蛇蛻、穿山甲、龜板、鼈寒水石、赤石脂。自栽之種。間有來自他邑。歷年既久。即成土產。惟不能在本地繁殖。如水仙花者則弗錄。

草木之根多相似。最易以僞亂眞。故於一花一葉。必詳其狀。其有毒者。特加註明。藉防誤中。至於溫涼補瀉。以及泡製配方。具見本草綱目。及其他醫書。本表限於篇幅。不能詳也。

農業經濟

本縣農民數。約爲總人數百分之八十強。半爲佃農。佃田者必先立佃約。預納押租。如其租額。謂之規儀。田之所穫。東佃各取其半。穫穀二石。則完租一石。（如爲沃壤及肥料足者佃戶可得十分之六。）佃戶於早晚兩稻登場時。分次繳納。如遇災歉。請東主看禾減租。必具盛饌。歲杪送東主雞一魚一。謂之莊禮。東主有婚喪事。須爲服務。勞不取值。然近年以來亦惟大莊爲然也

田種稱石稱斗。每田十畝。計種一石。納租穀約三十石。故曰斗打三。謂田種一斗。納租三石也。（此就普通而言。然亦視田畝肥磽而異。高者每畝多至四石。低者二石。）亦有專計租穀不計種者。人稠地狹。鄉農類皆貧苦。惟無田可佃之是憂。而田經轉賣。必清莊改佃。租額視前加重。十年前之顯宦。與抗戰後之富商。動挾巨金以求田。於是地價日高。稅額日增。而農民乃益困矣。平均一戶所耕之田。不足十畝。數口之家。所穫不敷半年之食。故多兼種紅薯豆麥。以之療飢。

至於農村副業。婦女則績麻紡紗。自洋紗暢銷以來。紡土紗者甚少。迨抗戰軍興。紡紗始有利可圖。每戶至少必有一紡車。南鄉則多製織機自織。曩者農家婦女幾無不績麻。北鄉尤盛。近因夏布業衰。績者漸少。上東鄉一帶婦孺操編爆業者數以萬計。東北兩鄉多磁廠。畫碗女工亦不下數千。惟女工資極廉。一日勞作所得。僅足以餬一人之口。男子則近城一帶。有兼種蔬菜菓木出售者。凡陶磁廠石灰棚炭棚附近居民。每於農隙掘煤燒灰摶土埴坏取泥運碗。人數在數萬以上。而墟場所在之地。肩摩轂擊。無非農民。養魚之風。以東鄉爲最盛。雞豚之畜。幾於比戶皆然。昭陵泗洲站一帶以漁爲業者。三千餘人。萊子山潘氏。向專澈水捕魚之利。東北山谷之民則多勇於圍獵。蓋皆以暇日爲之。不妨農事也。耕田少者但能努力於副業。歲入恆數倍於田。而其衣粗食糲。居室湫隘。耐苦嗇用。往往爲人所難堪。積寸累銖。不數十年頓躋於

富有。近代農村勤儉之風。漸不如昔。由稼穡起家者。遂不多覯矣。

鄉村貸款。向例穀一石。納息二桶。以六桶合成一石計之。適等於三分之一。荒歉之歲。利率尤高。或貶價之半。預糶新穀。以至雖遇豐年。亦呼庚癸。打會之風亦盛行於農村。發起人自居首會。邀戚友六人爲會脚。按年輪接輪繕二分行息。七年而畢。謂之七星會。又有會脚多至十人以上。接會次第及利率。臨時定之。謂之標會。然必首會具有財產之資格。始易集事。貧農則不敢問津。境乃日趨於窘。邇遭倭寇之亂。饑饉洊臻。農具耕牛。十不存一。耕者抗租辭佃。業主懸田待售。閭里蕭條。於斯爲極。此固有賴於銀行農貸以濟其窮也。

農業工人工資調查表　民國二十五年縣政府製

工人別	工作期間單位	全期平均工銀與膳宿各費之和	最高	最低	平均	全期膳宿及其他供給之費用	附記
男工	年	七六·〇〇元	六〇·〇〇元	二〇·〇〇元	四〇·〇〇元	三六·〇〇元	民國二十五年法幣價格與現洋無異
	月	七·〇〇	六·〇〇	二·〇〇	四·〇〇	三·〇〇	
	日	〇·二五	〇·二〇	〇·一〇	〇·一五	〇·一五	不供給膳宿及其他費用者則每人每日工資〇·三元
女工	年	六〇·〇〇	三六·〇〇	一二·〇〇	二四·〇〇	三六·〇〇	
	月	五·〇〇	三·〇〇	一·〇〇	二·〇〇	三·〇〇	
	日	〇·二〇	〇·一五	〇·〇五	〇·一〇	〇·一〇	不供給膳宿及其他費用者則每人每日工資〇·二五元
童工	年	四四·〇〇	三〇·〇〇	一〇·〇〇	二〇·〇〇	二四·〇〇	
	月	四·〇〇	三·〇〇	一·〇〇	二·〇〇	二·〇〇	
	日	〇·一四	〇·一〇	〇·〇四	〇·〇七	〇·〇七	不供給膳宿及其他費用者則每人每日工資〇·二五元

農民副業調查表　民國二十五年縣政府製

種類	從事副業者人數 男	女	童	共計	出產量	出產價值	工作月份
農戶數							
織布	五、八二四	二、九一三	五、八二四	八、七三六	土棉布四三六、八〇〇疋	五二四、一六〇	全年
養雞	八〇、四一八			一六〇、八三六	四〇二、〇九〇頭	一六〇、八三六	全年
養鴨	五六、二五二		一一〇	五六、三六二	二八一、二六〇頭	八四、三七八	全年
養豬	六七、七二〇	九四、八〇八	一〇一、五八〇	二四三、七九二	一三五、四四〇頭	二、七〇八、八〇〇	全年

栽植果木	五、五〇〇	六、六〇〇	六、〇五〇		一二、六五〇	二七、五〇〇株	五五、〇〇〇	春夏秋季
績麻	二二、一六七		四四、三三四	一二、八六六	五七、二〇〇	二二、一六七疋 夏布	一二一、〇〇〇	春夏秋季
編爆	一一、二五六	二、二五一	二二、五一二	四、五〇二	二九、二六五	一二、〇〇〇箱	一五六、〇〇〇	全年

本表未列養魚。養魚之產量及其利益。在養雞鴨之上。

農政

清光緒末年。邑紳黎樹藩等。創設樹藝局於伍家巷。以提倡農業保護森林爲幟志。反正後裁撤。由縣署兼理其職務。民國十九年。建設廳創設農事試驗場於長沙東郊。通令各縣開辦苗圃。委林務專員主其事。醴陵林務專員初爲胡解兮。闢苗圃於西山。培松杉桐茶及諸雜樹苗九百餘萬株。辦事處即設山麓。及湯有騅繼任專員。乃遷東門先農壇。並移苗圃於三官殿。時邑紳潘昉爲教育局長。以僻遠學產易附郭田數千畝。擬擴大苗圃。以供學子之實習。已而昉去田售。不果實行。未幾湯亦引退。旋奉上令改名農林場。場設五里牌。由技術輔導團負責指導。三十一年改設縣農業推廣所。李健芸李舒藻魏俞相繼爲主任。三十三年六月。日寇犯縣。

停辦。迄今未復。鄉村民衆爲自衛計。每社必有一禁山會。亦稱查會犯禁者罰鍰充公。相沿已久。後一律更改名稱。隸屬縣林務處。至於植桐委員會及塘壩修建委員會。則於民國二十年後奉令設立。推舉邑紳爲委員。附設於縣政府建設科。不另開支。要亦虛有其名。每歲循例塡表具報而已。

農會

清末農工商部訂立各省農會通則。宣統三年。龍璋等始成立省農會。民國元年冬。各縣農會同時設立。醴陵亦然。未幾因政變而罷。自國民革命軍出師北伐以還。邑中農民聞風興起。踴躍組織團體。參加革命運動。於是民國十五年。有縣農民協會之成立。會長孫筱山。繼任唐寄凡。均就縣東城先農壇爲會址。組織龐大。工作緊張。農運發展甚速。遍及窮鄉僻壤。惜爲共產黨所把持。造成赤色恐怖。於農民本身之利益無補也。十六年。馬日政變發生。縣農民協會解散。負責人先後就戮。或亡命遠颺。自是邑人聞農協之名。幾於談虎色變。會務因之停頓者有年。民國二十年春。中央確定農運方針。縣黨部奉令恢復。縣農會派鍾首賡爲幹事長。仍就原

會址辦公。月支經費。列入地方預算。翌年。鍾首賡辭職。蕭方典繼任。民國二十三年。蕭方典辭職。彭可成繼任。民國三十年。彭可成病故。胡秉章繼任。民國三十五年冬。胡秉章辭職。改選張秉鈞繼任。並變更其名稱曰理事長。刻正力謀整理各級農會。以爲建設現代農村之基礎。奉省政府令。指定爲示範縣農會。

倉儲

記曰。三年耕必有一年之食。九年耕必有三年之食。自來爲治者莫不以積儲爲人民生命所託而重視焉。魏李悝籴行平糴。以歲上中下熟之收。權大小中饑之發。漢耿壽昌師其意作常平倉。隋長孫平更作義倉。俾民自儲。宋朱熹推衍之。立社倉法。皆所以救荒歉。濟困乏。利耕農也。歷代相沿。往往以時地異宜而變其制。醴陵常平倉。明以前無可考。萬歷間知縣王學曾捐俸買穀。每都給一十五石。每石加二出息。初爲義倉。繼任游於北奉文動支庫帑。建倉收貯。萬歷二十二年。始改名常平倉。知縣晏朝寅申支庫銀。買穀增儲。始議止許平民平糴。穀多陳腐。至是詳准歲稔民有稱貨者聽之。每石止餘加耗五升還倉。於治西及瀘口建預備倉二。後又

添建治西瀘口明蘭泗汾黃梁五倉。統名常平。明末俱廢。清制各州縣設立常平倉。視其地之廣狹以定儲數額。常年平糴以存七糶三爲率。每石減糶價銀五分。遇歉歲或逾額出糶。每石減銀一錢。皆於秋收後以糶價採補。康熙間知縣王光世陳九疇相繼捐穀。建備賑倉於縣堂之西偏。自後世際承平。民樂輸捐。陸續勸募於縣城及泗汾瀘口建常平倉四。嘉慶二十二年。知縣王應培補修。並添建二倉。凡一百四間。儲穀三萬二千三百餘石。道光六年大水。瀕河倉厫多圮。耗穀四千八百三十二石。道光十二年平徭軍米應付口糧穀八千石。咸豐九年。提解省倉穀一萬七千石。是時僅存縣署西側一倉。實儲不足四千。旋由省倉發還六千石。當元年疑誤光緒十九年大飢。縣人文俊鐸請於巡撫吳大澂。自省倉領回穀一萬一千石。嗣因頻年災歉。續有耗散。民國紀元。易名縣倉。九年驅張之役。南軍大至。提縣倉穀一萬二千石。以充軍食。倉爲之空。逾年夏飢。縣人劉師陶等呈請省政府撥帑填倉。不報。二十二年。縣長羅植乾委縣人李式猷等同旅省同鄉及本縣殷實各戶募得二萬五千石。分存各區民倉。名曰縣分倉。

見通志。據此省倉發還六千石。當爲清查以前事。同治志紀爲同治

自區制廢。即分存各鄉鎮。不儲於縣。懼重耗也。然自抗戰以還。徵調頻繁。多所挪用。委員查驗。當事者輒藉詞搪塞。甚或指民倉以誑之。實存幾何。末由確覈。

宋嘉定間眞得秀知潭州。仿行朱子社倉之制。易穀九萬五千石。分頒十二縣。資其設立。醴陵之有社倉。當自此始。但置廢不詳。明萬歷二十年。晏朝寅捐俸買穀。分給各里。倡勸士民共輸。二十二年。守道刊佈義倉條例。勸民續捐。每都量地廣狹。穀數多寡。會報社長收貯。每年夏初。諭鄉約出貸貧民。秋成加二還倉。已而成立義倉一百九所。在鄉治者十一。在各鄉者九十八。明季俱廢於兵燹。清康熙四十二年建議設立社倉。於本鄉捐出卽貯本鄉。令本鄉誠實之人經管。上歲加謹收貯。中歲糶借易新。下歲量口散賑。雍正五年。醴陵復設社倉六十四所。分佈縣境。共貯穀八千七百五十四石。乾隆志一百七。本城土地祠五里牌貯穀四百五十石。下坊本城土地祠五里牌貯穀四百五十石。新陽門一百一十六石。三都亭子嶺九十一石。新陽門一百一十六石。三都亭子嶺九十一石。大塘老虎石一百一十石。大塘角九十五石。觀下八十四石。寨下九十一石。大塘老虎石一百一十石。大塘角九十五石。觀下八十四石。寨下九十一石。楓林境六十五石。大茅江八十一石。楓林境六十五石。大茅江八十一石。金橋八十一石。玉塘九十四石。金橋八十一石。玉塘九十四石。五都水符廟二十七石。五都水符廟二十七石。西林寺一百五十八石。西林寺一百五十八石。新田三百二十四石。新田三百二十四石。李家渡一百九十石。李家渡一百九十石。

食貨志　倉儲　九九

縣設總倉六處。一在縣城。一在瓜畬坪。一在東鄉普口市。一在南鄉泗汾。一在西鄉石亭。一在北鄉清安舖。一在瀘口。乾隆四十四年。加募八千石。共貯穀一萬六千五百八十一石零。乾隆四十八年。頒行社倉條規。社設司出納者二人。稱正副社長。選充後。官給執照戳記。頒斗斛印簿。領穀限於貧農。（一切貿易及不耕之民概不准借）視其耕田及戶口多寡分配之。最多不過二石。須本地有業之人作保。收以八月九月。過車上倉。拒收低潮癟穀。每石加一算息。（以四升作開銷修倉盤折鼠耗及斗級工費。六升歸公。）有拖欠不完者。由社長稟縣勒追。設立滾單。挨戶滾催。一如催錢糧法。十月完竣盤查。年終核算出入貯欠數目。造册結報地方官轉報。如社長經理不善。捏欠侵挪者。許地保稟官

查拿革懲。照例治罪。仍令賠還。若州縣不嚴行約束。經府州訪聞。據實參辦。自是社倉管理之權。悉操之官司。吏役從中勒索。有究辦舉報求免具認規禮。及盤查滿倉繳息結報各種詐錢名色。社長不勝其煩。賢者不願承充。不肖者則挾同盜賣。地方官又太半藉端挪移。以至名存實亡。民徒病擾。嘉慶四年。上諭社倉仍聽本地殷實富戶。擇其謹厚者自行辦理。不必官吏經手。以杜弊竇。六年。湘大吏修改條規。所有以前提貯縣倉及併歸總倉之穀。仍令各社分貯。由地方選擇老成正副社長經管。其辦理善者。照例給獎。不拘定年限更換。刪去官頒印簿斗斛及盤查册結各條。一時稱便。日久玩生。多有因民欠豎社長虧空而儲不足額者。同治二年。巡撫惲世臨檄各屬勸捐積穀。頒發章程。每租一石抽捐穀三升。倉費錢十二文。其穀各存各團。官止綜核數目。不令丁胥干預。亦不提用。十年。巡撫劉崐檄勸續捐。知縣張玉森湯瑄等先後勸民納穀。按團置倉以鄉人典掌之。官吏不得支放焉。人民審知其利害之切己也。率循規約。視社倉彌謹。久遂並各處社倉通稱爲積穀倉。倉設積穀會。（當時諱言會。故通稱祀。）置首事三人。（一稱經理一稱經理）年一換。或三年一換。本社民衆皆有選舉監督之權。積儲有年。往往大於原額數倍。乃至數十倍。因謀收換之便。又多由合而分各族姓祀會及有力之家。且紛紛成立義倉。以補其不足額。而不償者。輒停止其再貸。及期歸倉。罔敢或後。以故十里之內。恆有數倉。倉恆有穀百數十石。貧苦農工。每年當青黃不接之時。咸賴以濟。即遇凶歲。亦不虞不給。民國二十八年。倭寇陷南昌萍醴告急。徵民夫十萬。破縣境鐵路公路驛路。限期訖事。取地方積穀爲食。繼以連年蝗災旱災兵災。借穀者太半無力歸倉。各倉儲量坐是大減。致政府屢事查驗。責令籌填。卒鮮成效。民國十九年。內政部頒行各地方倉儲管理規則。分縣倉市倉區倉鄉倉鎮倉義倉六種。縣鄉鎮各倉爲必設倉。以一戶積穀一石爲準。由縣長鄉鎮長負責管理。地方推舉公正士紳三人至五人協助之。不得挪作別用。或變價存儲。其依法使用。如平糶散放或貸與者。均當於一年內填還。至於私人捐辦之倉。稱爲義倉。則由主管官署監督其取息。（不得過一分）及平糶價格。年終各將儲數報署。二十四年。湖南民政廳斟酌地方情形。訂定管理細則。及各縣縣長籌辦倉儲考成條例。規定縣倉儲額。一等縣三萬石以上。二等縣二萬石以上。三等縣一萬石以上。除樂捐外。凡業戶有年租在五十石以上者。於最低百分之一。最高百分之十以內。依累進法派收。

醴陵縣志

遇糧食缺乏。糧價高漲。鄉鎮倉平糶不敷時。酌以原有穀三分之一辦理平糶。春夏之交。以陳易新。鄉鎮倉利率貸與農民。秋收歸倉。縣政府或其他機關非法提用。皆得由人民於正當範圍內盡力防護。如提用機關屬於縣政府以外者。縣長應負防止之責。蓋至是無論縣倉鄉倉。皆確定爲民有民享。無在鄉在官之別矣。中日戰衅既開。國民政府以倉儲有關國防。通令各省儲足十五年糧食。二十九年及三十年。醴陵奉文增籌積穀。按畝派收。得二萬九千石。各就本鄉鎮儲存。以三分之一歸縣分倉。三分之二歸鄉倉。改稱鄉倉爲鄉總倉。而以各社積穀倉爲鄉分倉。以昭統一。其爲各族姓私儲之義倉不與焉。會軍事緊急。饑饉洊臻。縣長劉康年派員分赴各鄉鎮清查倉儲。三十二年一月。移交新任縣倉穀一萬七千一百八十石零八斗五升八合。鄉倉穀七萬二千一百七十八石三斗一升六合。義倉穀二萬七千九百二十七石四斗六升八合。三十三年設鄉鎮倉儲整理委員會。推瞿覺峻主其事。審核各鄉鎮公所册報。不合者發還更造。至五月杪有五鄉未及齎。以敵騎深入而止。縣分倉及鄉總倉均無固定之倉鄉分倉凡三百餘所。義倉一百餘所。綜計各倉儲量視前雖有增加。然其中縣分倉鄉總倉。多

有挪移已罄虛有其數者。鄉分倉義倉。則因恐政府抽提。又多故意短報。自淪陷後。損失復不貲。益難究詰矣。

縣人文在芳義倉記。癸巳夏五月。饑民弗靖。長郡諸邑各相聚肆掠。我醴亦然。邑侯王公謀於衆。減糶勸借。而醴民自力田而外。無他營糶。安所得錢。家君因於里之困乏者按戶借給之。乃穀不數百石而家慶那居矣。比至秋。率皆歸其逋。家君因嘆曰。邇時紛紛若將爲亂。得數百石穀。遂帖然無譁。是不可不有以備之。。爰捐穀三百石。設立義倉。收加一息作耗。出於夏末。歛之秋初。命在芳輩掌之。。家先生幹臣。攸明經也。弟在華在蘭遊其門。一日問家君曰。聞君設義倉以周里人。有之乎。家君曰然。曰。嗟乎。米穀貲財。天之所生。地之所長。而常人之所吝也。覘其疾苦。憫其危亡。而有以相周。良法美意。將行之而無敝。雖古仁人之用心何以加茲。第吾因是而竊有感焉。里中有君爲之調劑。君之惠也。里之幸也。但由里推之鄉國。推之天下。果家給人足。盡無斯饑之嘆乎。天下降災。聖君不免。吾恐天下呼庚癸而就羸瘠者。更知幾何里矣。安得君之粟如恒河之沙。大被此林林總總。得以愜吾志。快吾心也。家君曰。不然。天下之大。皆里之所積也。天下之人之衆。其情不甚相遠也。人之視其里。諒亦猶吾之視吾里也。安知人之恤其里者。不猶吾之恤吾里乎。孔子曰。十室之邑必有忠信。孟子曰。人人親其親。長其長。而天下平。里之中有我。而凡所謂里者。未必無一我也。里里恤其里。而天下安矣。何慊乎哉。維時家先生唯唯不贅。芳適侍側。聆其問答之詞。謹執筆記之。將有望於天下之居里者。時康熙丁酉歲麥秋之六日。