

V
584.92
Tri Pan
54726

NOT TO BE ISSUED
OUT OF THE LIBRARY.



BOMBAY BRANCH
OF THE
ROYAL ASIATIC SOCIETY.
TOWN HALL, BOMBAY.

Ex. C. 13.

120


PANICEARUM GENERA

RETRACTAVIT

SPECIEBUSQUE COMPLURIBUS ILLUSTRAVIT

C. B. TRINIUS.

54726



Extrait des Mémoires de l'Acad. d. sc. de St.-Pétersb. Sér. VI. Sect. des Sc. phys. et nat. Tom. III.

V

584.92.

Tri / Pan

54726



00054726

Typotheque delicto factum est, ut paginatus rarer in hoc operis
lo scriptio impresso ali sint quam ii, quibus ipsorum Actuum
academiarum paginae inscriptae sunt. Itaque, ut species in Indice
suo enumeratae seu singulare loco inventari possint, paginae hanc
et signare opus est, ut a n^o 89. incipient.

PANICEARUM GENERA

RETRACTAVIT

SPECIEBUSQUE COMPLURIBUS ILLUSTRAVIT

C. B. TRINIUS.

(Conv. exhib. die 25. Oct. 1833.)

Opuscularum, quae paulatim edidi, agrostographicorum partem retractatam conventui hodie proponens, ut dissertationibus prioribus (alteri de Gram. uni- et sesquifloris, alteri de Gram. paniceis), ita et huic theoriam constructionis gramineae spectantia quaedam praemittendi veniam peto. Ad quam quidem rem adeo controversam denuo perpendendam eo magis incitatus sum, quo minus, me quidem judice, in iis, quae, tam de universa graminum structura, quam de hoc illo eorum organo explicando, eruditii vel nuperrime disseruere, acquiesci posse videatur. Verum tamen, ne familia una, a reliquis, quibus naturali nexus juncta est, sejuncta et avulsa mihi, de internodiis floreque gramineis solis tractanti, crimini vertatur, pri-
mum exponenda forent, quae de universa phytologia statuenda censemus, principia; nisi angustii monographici opusculi fragmento concedendi limites tam amplum vetarent discursum. Itaque, ut theoriae nostrae tantulum quidem, quanto opus videatur ad vindicandum illi suum, cum legibus de vegetatione universe statuendis nexum, lucis afferatur, paucissimae interea eaeque abruptae theses sufficient. Ipsam autem, quam proposituri sumus, theoriam nil aliud esse volumus, nisi tentamen e principali illa, Glumacearum structuram evidenter definiente, lege, alternationis inquam, floris graminei constructionem explicandi. Plarima quidem atque diversa Natura argumen-

tanti offert loca, unde consecutariorum ordiatur filum, eo longius tamen ducendum eoque plura complectens, quo ulterius annexum ex imo, quo descendere liceat, deductum fuerit principio naturali.

1. Telam vegetabilem non e cellulis, sed e filis contextam esse, quibus conglutinatis cellulae demum formantur, naturae sanior contemplatio jam pridem argumentis, lentis ope VIVIANI nuperrime docuit. Contextus illius partem, succo percurrente cylindrice extensam, in vasa converti constat, quorum partis cujusdam spiraliiter convolutae rationem, ei, quam electrodynamicam vocant, minime plane alienam, ulterius prosequi hic non locus est. Quae quidem vasa, prout in vegetabili extenduntur, distribuantur, ramificantur, ita maxime varias illi formas, Speciei reproductione in perpetuum stabilitas, impertinent. Ut enim vitae animalis ultimus summusque finis est intelligentia, ita vitae vegetabilis est reproductio. Quamobrem genitalium analogon quoddam capitum locum in plantis occupat. Differentiae autem illae, quibus plantarum classificationes nituntur, qualescumque et quacumque ratione modificatae sint, ad eundem tamen finem cunctae redeuntes, non nisi unius ejusdemque apparatus organici variationes haberi possunt.

2. Organismi igitur vegetabilis vita universalis, prolis productionem, individuorum peculiaris nutritionem curans, utraque ad eundem nihilominus finem communem tendit. Quapropter organismus nutritivus (*s. vegetativus*) natura sua nequamquam alias est ac organismus reproductivus (*s. vegetabilis*), partemque plantarum vegetativam quamlibet, caulem, ramos, folia rel., datis conditionibus, prolificare, proprie reproductivam quamlibet ad functiones formamque mere vegetativas reprimi posse, notum est. Cum autem vegetabile, qualemcumque sit, vegetabile esse non possit, nisi ex natura sua universal, quae est reproductiva *s. prolifica*, neque vero e vegetatione sua, quae est nutritiva; vegetabile integrum per singulas partes suas nil nisi organismum prolificum esse, sponte liquet.

3. Duo igitur sunt, quae in plantae vitam agunt, intime quidem conspirantia, momenta: alterum vegetabile, alterum vegetativum. Illud, conditionibus intraneis sive principio organico (vitali) ipso nisum, plantae vitam orditur a puncto centrali,

pro se quidem sensibus non percipiendo. Evoluto autem caulinulo, centrum illud principale *nodis* constituitur, sive in medulla sola, sive in toto caulis ambitu expressis. Eodemque simul modo, nodo scilicet centrali utrinque recluso et polariter producto, *forma* vegetabilis *primaria*, quae est filiformis s. bacillaris (§. 1.), *caulis* inquam prodit, qui primitus nil est nisi tubus medullaris. Alterum momentum, a conditionibus extraneis (aëre, aqua, luce rel.) pendens, parenchymatis vegetabilis dispositionem sollicitat talem, quali mutuum curu incitamentis illis extraneis commercium pro omnibus ac singulis partibus suis quam perfectissime paretur, h. e. parenchyma illud expansum in laminam planam, *folii* termino distinctam, minime vero sistentem organon quoddam universalis vegetabilis naturae (prolificae) expers, s. a reliquis diversum.

4. Glumaceas inter vegetabilia monocotyledonea partibus suis, altera alteram vaginando, alterno situ sese excipientibus, ab iis, quas Petaloideas dicunt, distingui constat. Quae quidem alternationis lex, Cyperacearum Graminumque constructioni communis, ut in calmi graminei internodiis promta et proposita est, ita et in squamis floralibus (paleis), vel arctissime compactis, invenienda erit.

5. Culmus gramineus, a statu illo primitivo, cujus in §. 3. mentio facta, per totam vitam suam vix discrepans, tubus est medullaris, vasis cinctus et in plerisque percursus, nodis interceptus intergerinis, quibus totidem formantur internodia absoluta, in summo culmo saepe a se invicem solubilia.

6. Partes cujusvis internodii sunt nodus, articulus, vagina. Quarum etsi duae priores altera alteri superpositae sint; tamen nodi singuli nonnisi alterno quovis latere turgent: unde internodia, in rhachi compactiori, alterna geniculatione anfractuosa esse solent. Vagina autem infra articulum ipsum, quem cingit, ortum ducens, manifeste cum articulo suo alternat*).

*) Ubi partes oppositae esse videntur, ut in floribus plerisque polygamieis, ibi articulus internodii abbreviatus i. obsoletus est; aut, ut in *Ophiuri* spica, in cylindrum compactissimum coarctata, hac ipsa contractione sit, ut alternatio legitima laesa videatur; id quod in *Hemarthriae*, inter *Ophiurum* et *Kottbölliam* magis explicatam intermediae, spicae constructione videre est.

7. Nodum necessario, vel si minus manifestus sit, cuivis internodio competere, per se patet. Itaque de articulo potissimum, cum *vagina* sua, nobis tractandum erit. Ista autem, internodii, tam in culmo quam in spicularum rhachi cuiusvis, partes geminae, sunt corpora duo involuta, e parenchymate eodem contexta, internodium integrum ita formantia, ut alterum (articulus) ejusdem pars interior s. superior, alterum (in culmo *vagina*, in spicularum internodiis *palea*) pars exterior s. inferior sit. Quae itaque duae, in culmo gemmam, in rhachi fructum foventes partes, organon proliparum absolutum constituunt.

8. Utramque igitur harum partium, intime conspirantium, utpote eadem indole praeditarum, eodem quoque jure phytonomico frui, eodemque, singulam suo, pro positione sua aut centrali aut extranea, modo, ulterius evolvi oportet. Articuli, in apice suo quilibet novum excipientes articulum, toties repetuntur, quot universa graminis altitudo requirit internodia. Idem fit in parte exteriori s. *vagina*, tamen, ob ipsam ejusdem positionem extraneam, minus perfecto modo. *Vagina* enim, perinde ac articulus, nodo terminatur, eo vero, ut ipsa, concavo tantum, nec circumcirca clauso; ex quo nodo novum prodit internodium illud, quod folii, aut, sive involutum sit, sive complanatum, laminae nomine venit.

9. Novo huic internodio (laminae s. folio), *vaginae* superposito, ex apice suo, subjecta denuo articulatione s. nodo, novum progignendi internodium facultas innata quidem est, sed, extraneae illius positionis causa, non nisi rarissime plene se manifestat. Quam ob rem folium *vaginae* processum primum simulque ultimum manere videmus. Nihilominus frequentissime folii apex non solum callosi quid induit, quasi nodi rudimentum dicas; sed ne desunt quidem foliorum exempla, ex hac ipsa callositate, tum in articulationem perfectiore mutata, internodolum breve, iterum laminiforme, s. foliolum proferentium; cuiusmodi *Glyceriae nervatae* specimen spontanea asservo.

10. Sed illud ipsum *vaginae* internodium (folium) e duabus, internodium quolibet rite constituentibus, compositum esse debet partibus, quarum altera articuli, altera *vaginae* vices gerat. Qui quidem articulus, si, imperfecte evolutus et longe plerumque formae articularis expers, ipso folio sistitur, pariter imperfecta et hetero-

morpha stipatus erit vagina. Haec enim, plerumque brevissima, nec nisi membranaceae aut in pilos solutae texturae, folii cavitati plus minus aptata, genuinam naturam suam adeo dissimulat, ut hanc membranam organon quoddam peculiare, squamam adventitiam s. stipulam credas, quam *ligulae* termino insignire placuit.

Obs. Sicut vagina culmea non ex ipso, cui adnata est, nodo, sed e nodo inferiore ortum dicit, ita et ligula non ex ipsa, cui adglutinata est, articulatione folii, sed inferius prodit.

Par laminarum, folio ligulaque compositum, etsi, extraneae vegetationis internodium extitum constituens, prolem gignere non valeat; tamen cilia illa, quae in axilla ejus saepissime nascuntur, quaeque in *Parianis* filamentorum fere speciem prae se ferunt, rudem aliquam evolutionem floralem moliri videntur.

11. Quo propius culmi internodia ad orbem graminis altiorem, reproductioni proprie dicatam, adscendunt, eo magis lamina vaginarum abbreviari solet, ita, ut in vagina graminum complurium suprema folium penitus nullum sit. Idem vero de internodiorum floralium ipsorum vaginis s. paleis valet, quae aut lamina prorsus orbae (muticae) inveniuntur, aut ejusdem non nisi nervum medium, tum (ut in *Bromo*, *Festuca*, al.) setam formantem, evolvunt. Clarius tamen laminae palearis evolutionem parant *aristae*, more internodiorum e callosa paleae articulatione terminali oriundae, et e nervis pluribus (3) compositae, plerumque (ut in *Danthonia* al.) coalitis, rarius (ut in *Aristida*) in totidem radios divulsis.

12. Gemmae culmi graminei simplices*, internodio materno homogeneae, e partibus constant duabus, quarum exterior *Vagina*, interior *Articulus* est, nova posthac sibi superposita pariturus internodia. Ista autem duae partes inter culmi articulum vaginamque, situ cum ipsis alterno, ita collocatae sunt, ut vagina juvenilis articulum maternum dorso suo, ob hanc ipsam pressionem binervi, premat, marginibus amplectens articulum suum, inter ipsam et internodii materni vaginam positum.

13. Eodem autem, quo gemma culmea, modo floralis quoque gemma evolvitur, partesque ejus eandem, tam inter se quam cum internodii materni partibus, mutuam

* Quae ex internodiis s. squamis compactissimis composite sunt ramosque demum confertissimos emittunt; *Bambusae*, *Arundinariae* rel., gemmae, ad constructionis gemmae gramineae imaginem puram praebendam minus aptae sunt.

servant positionem. Haud aliter itaque frondescunt internodia axeos communis Paniculae, quam internodia culmi; eo tantum discrimine, ut illorum vaginae in squamulam minutam, imo saepe obsoletam, abbreviatae esse soleant. Inter hanc vero squamulam (in *Agrosti* al. satis manifestam) articulumque axeos paniculae, ramus (radius) prodit, inter se et articulum illum saepissime foyens barbam pilorum, quam, pro radio modo dicto (articulum gemmae floriferae sistente) idem esse, quod vaginam juvenilem pro ramo culmeo, autumare fas est. Qui quidem paniculae radius aut simplex esse potest, aut e fasciculis vasorum (nervis) pluribus compositus, nunc (ut in *Paspali* axibus partialibus) coalitis, nunc (ut in verticillis *Poae* al.) sejunctis, idque haud aliter, ac nervos in aristis *Aristidae* discretos esse supra observavimus. Ceterum, sicut in *Bambusae* l. *Arundinariae* ramorum culmeorum fasciculis, ita et in verticillis panicularum densioribus, praesertim fasciculatis, gemmae una plures confertim eruptae concipi poterunt.

Obs. Qualis universe gramine innatus est, aut coercendi aut dispergendi, nisus, talis illi inflorescentia. Quapropter gemma floralis aut, fulcro interjecto nullo, statim in florem recluditur, aut singuli vasorum fasciculi in totidem convertuntur nova, ut ita dicam, granaria floripara. Illud ubi graminis naturae convenit, flos basin internodii occupat: aut sessilis (*Tripsacum*, *Rottbóllia* al.) — quam inflorescentiam, *spiculae* gramineae imaginem exactissimam, *Spicam* exclusive appellandam esse duximus; aut radiis suffultus, sive simplicibus sive compositis, ut in *Panicula*, proprie sic dicenda. In iis autem, ubi nervi plures materia florali praeognant, pedunculi florum aut ex internodiorum alternorum apice, iisque brevissimi, prodeunt — cujuscumdi, omni Hordeacearum tribui communem, inflorescentiam distinctissimam *Caducei* termino insigniendam proposuimus; aut, internodiorum confluentium nodis ipsis deletis, pedunculi per omnem axin sparsi undique erumpunt. Qui si brevissimi et magis minusve conserti sunt, *Thyrsum*, si elongati et rariores, *Jubam* formant. Utraque autem inflorescentiarum illarum *racemosa* esse potest, ubi radii, in axin partialibus coaliti dorsoque suo axi communi primum adpressi, ad exterum tantum latus florum pedicellos exserunt.

Qua quidem terminologia, tam naturae ipsi quam distinguendis generibus atque speciebus aptissima, ut hucusque usus sum, ita et in Paniceis describendis utar. Ceteroquin inflorescentias supra memoratas per transitus sibi invicem adpropinquare posse, facile intelligitur. Numquam autem fiet, ut Spica in Caduceum vel in Thyrsum convertatur; tamen nihilominus tres isti adeo diversi florendi modi in terminologia, qua auctores uti solent, cuncti nomine *Spicae* geniunt!

- 14. Eandem denique, qualem in axis floralis culmique gemmis, et in *Spiculis* ipsis invenies constructionem, si internodiorum earum, ut esse solent, abbreviatisimorum, nodos articulosque (s. internodii cuiusvis partem internam), in infimis tantum spiculae internodiis manifestos, in superioribus deletos concipis. Cujus Glumacearum constructionis typicae simplicitatem originariam p[re]ce ceteris servant Cyperaceae*). In omnibus enim Cyperaceis, Epiphystis in modum constructis, genitalia nuda prodeunt ex axilla, quae ab articulo singulo ejusque vagina (squama) formatur. Articulus autem quilibet, in Epiphysti semicylindrum valvulaceum s. membranaceum referens, apice suo internodium subsequens, eodem modo constitutum, excipit. In aliis (ut in *Carice* al.) squama una alterave s. totidem internodia praevia genitalibus subjecta sunt; in aliis denique genitalia, squamarum loco, pilis cinguntur, quorum, inter Gramina, *Knappiae* valvulae, e pilis laxissimis contextae, analogon sistunt.

15. Graminei floris typus est series internodiorum ter trium. Quorum internodiorum duo priora s. infima, inter orbem graminis vegetativum et reproductivum confinia gemmamque nullam evolventia, *glumarum* nomine distinguntur. Gluma inferioris articulus plerumque satis manifuste evolutus est (*Phragmites*, *Danthonia* al.); superioris contra saepe vix ullus, aut, ubi exstat, corpusculi cyathoides pusilli (in *Fundamentis Agrost. Cyathium* mihi dicti) forma expressus esse solet. Internodium tertium, gemmam floralem propriam fovens, constat e palea, *calvula perianthii inferior* dicta, et ex articulo, nunc, ut in Vilfaceis, fere nullo, nunc, ut in Agrosti al., ad callum parvulum reducto, nunc, ut in Calamagrosti al., bacillum formante (*penicillus*, *processus*, *rudimentum* nuncupatum), apice suo plerumque exserens pilorum fasciculum aut squamulas abortivas; in s. d. Multifloris autem internodium ferens integrum, novum, tumque toties repetitum, quot spiculae

*) Quam floris graminei architypum sistere olim contendit, *Epiphystis*, genuina Cyperacea, et fortasse *Cyperi* ipsius species est. Hoc loco Cyperacearum omnium, quae floribus unisquamis praeditae sunt, *Epiphystis* nomen p[re]beat collectivum.

totius longitudo symmetrica requirit internodia floralia. — En primam s. infimam floris graminei compaginem ternariam.

16. Internodiorum, membra floris, alterum tertiumque, tricola constituentium articuli, excepto tertii extremo, penitus deleti sunt, adeo, ut palea altera ex axilla alterius, imo paleae plures quam una ex uno eodemque disco prodire videantur. Qua quidem simulata positione parallela, alternationis legi utique contraria, Glumaceae Petaloideis appropinquare censeri possunt. Alternatione autem inviolabili illa probe aestumata et rite recognita, gemmam floralem eodem, quo culmeam, modo constitutam esse perspicias. Palea enim ejusdem infima (quae *Valvula perianthii superior* dici solet) articulum internodii materni sui haud secus, ac vaginula illa juvenilis rami culmei articulum maternum suum, dorso premit, eamque ipsam ob causam, illius instar, constanter binervis invenitur. Hujus autem ipsius paleae, modo dictae, articulus, ut jam monuimus, obsoletus, novum fert internodium, *Lodicula* dictum, et articulo suo, itidem obsoleto, internodium sustentans illud, cuius vaginula s. palea, rarius quidem evoluta, *squamam*, ut audit, *lodiceula tertiam* format. — Quae itaque tria internodia, paleis s. vaginulis solis expressa genitaliumque velamentum formantia, alteram floris graminei trigam sistunt.

OBS. *Lodicula*, plerumque (stamine interposito premente?) ad basin usque in lacinias duas fissa immo in squamas 2 segregatas discedens, nullo modo e binis, iisque, ut in *Ehrhartis* quibusdam esse feruntur, alternis, paleis composita haberi potest. Quod, nisi e sola floris synthesis, inviolabili Glumacearum alternationis legi superstructa, eluceret, vel ipsa laciniarum illarum, in graminibus nonnullis in unicam confluentium, positione semper parallela probaretur. — *Squama* *tertia* s. *posterior* *lodiceulae* in quibusdam generibus (*Stipa*, *Aristida*, *Urachne*, *Olyra*) fere constanter, in aliorum speciebus tantum nonnullis (v. gr. in *Arundine tenaci*) evoluta est. — Ceterum *squamae* *lodiculares*, quoad ipsarum indolem physiologicam, parum a staminibus diversae esse videntur. In *Elytrophoro* non nisi stamen unicum, idque locum *squamae* *lodicularis* posterioris tenens. In *Polypogone filiformi*, duobus tantum staminibus evolutis, *lodicula* posterior duplex est, et s. p.

17. Tertia s. extima gemmae floralis trias composita est genitalium apparatus, cuius paleae duae infimae, ubi ambae evolutae exstant, altera alteri adeo admotae sunt, ut bases earum penitus confluant. Illae autem *squamae* diffissae staminibus,

typice senis, constituuntur; palea tamen superiori, s. filamentorum ternorum fasciculo altero, non nisi rarius evoluta. Ex contrario paleae ejusdem articulus, internodium supremum s. seminale sustentans, perinde ac articulus culmi extimus, totum orbem floralem ferens omniumque longissimus, fere semper manifestus, imo longitudine quadam insigni esse solet. Internodium enim illud tertium s. terminale Pericarpio sistitur plerumque brevius longiusve pedicellato, i. e. palea, marginibus suis a summo ad imum connata, nec nisi rarissime (v. gr. in s. d. *Sporobolis*) ab una parte aperta.

Obs. Staminum paleas eadem ratione fissas concipimus, ac aristas Aristidae, aut radios paniculae verticillatos. Quo ipso modo et in Cyperi speciebus quibusdam articulus rhacheos, in plerisque integer, triparitus invenitur: parte intermedia firmiore internodium subsequens ferente, lateralibus, magis membranaceis, appendices, alas l. squamis proprias referentibus. Quae quidem paleae omnes, tam appendices illae, quam Caricum urceolus graminumque valvula sie dicta perianthii superior, perperam e squamis 2 vel 3 connatis compositae habentur; dum genicularum s. ramorum culmeorum vaginam insimam, itidem binervem, eodem modo e squamis 2 coalitam esse nemo facile opinabitur.

Physiologorum consideratione dignae videntur paleae genitales masculae distenso-fissae, feminea constricto-clausa.

18. Quemadmodum igitur per totam spiculam nil nisi ipsius culmi ramive cuiusdam internodia contracte repetita agnoscimus, articulis tantum abbreviatissimis, eamque ob causam vaginalis (paleis) in axillis suis gemmam non ramigera sed genitalem foventibus; ita et in extremi internodii floralis gremio gemmam tandem seminalem nasci, partesque ejus eodem, quo in gemmis culmeis floralibusque, modo collocatas videmus. Primum autem pericarpio, ut internodium sit ex axilla sua gemmiparum, haud secus ac reliquis internodiis floralibus, articulus suus statuendus est. Quem vero articulum, cum internodium hocce totius evolutionis extremum sit atque terminale, numquam evolutum esse posse per se intelligatur. Interpres tamen ejusdem squamula est illa vaginalis tenerrima, Brongniartio *tegmen*, aliis *perispernum* dicta, quae, dorso suo articulo illi dicto adversa, articulum suum, itidem obsoletum, novum autem individuum & embryonem ipsum ferentem, amplectitur.

Cujus denique embryonis vaginula primaria (Cotyledon), e prima ejusdem articulatione prodiens, culmo juvenili, plumula expresso, eodem modo vaginae inservit. Quo autem tegmen illud repletur, perispermio s. albumine, sit, ut embryo, cum cotyledone sua in tegminis cavum retrusus, imum ejusdem sinum occupet.

* * *

EXPLICATIO TABULAE ADJECTAE.

Fig. 1. Culmi pars vaginata.

- a) *Articulus culmi*, s. internodii pars centralis.
- b) *Vagina*, s. internodii pars extranea.
- c) Internodii extranei novi pars exterior (*Ligula*).
d) Internodii extranei novi pars interior (*Lamina*).

* Rudimentum internodii novi s. tertii (in *Glyceria nervata*).

Fig. 2. *Anisopogonis* valvulae inferioris pars cum arista sua: nervis aristae, cum apice valvulae articulatae, coalitis.

Fig. 3. *Aristidae* valvulae inferioris pars cum arista sua: nervis aristae discretis.

Fig. 4. Internodii proliferi partes sejunctae:

- a) *Articulus culmi*.
- b) *Vagina* ejusdem.
- c) Ramus ex ejusdem axilla pronatus:
 - α . Internodii ramei infimi articulus.
 - β . Internodii ejusdem *vagina* (binervis).

Fig. 5, 6 et 7. Ortu radiorum ex axi communi florali:

- 5. Radius solitarius simplex (v. gr. *Urachnes*).
 - a) Squamula, quae vaginæ loco est, inter quam axis articulum radius originem dicit.
- 6. Radius solitarius, e nervis aliquot coalitis compositus, racemiflorus (v. gr. *Paspali*).
 - a) Barba pilorum, respondens vaginæ β in Fig. 4.

7. Radii plures, s. nervi discreti, fasciculum aut verticillum formantes.

a) Squamula, ut in Fig. 5.

Fig. 8. Pars spicae Cyperi (Epiphysis) §. 14.

Fig. 9. Spiculae gramineae paleae duae infimae (*glumae*).

a) Gluma inferior s. vagina articuli *.

b) Gluma superior s. vagina articuli * (*cyathii*).

Fig. 10, 11 et 12. Spiculae gramineae pars trimembris inferior s. prior, composita e glumis et perianthii sic dicti valvula inferiore: articulo valvulae hujus sensim magis evoluto:

in Fig. 10, nullus (v. gr. *Vilfa*).

in Fig. 11, calliformis et aciculatus tantum * (v. gr. *Agrostis*).

in Fig. 12, in processum piliferum * productus (v. gr. *Calamagrostis*).

Fig. 13. Spicula multiflora, i. e. processu * toties repetito et iterum florifero, quot symmetrica spiculae longitudo internodia requirit.

Fig. 14. Spicula graminea simplex, synthetice concepta: parte qualibet ex internodiis tribus composita:

A. Spiculae pars trimembris prior s. infima.

a) Internodium primum s. gluma inferior cum articulo suo.

b) Internodium alterum s. gluma superior c. a. s.

c) Internodium tertium s. Valvula perianthii inferior c. a. s.

B. Pars trimembris altera s. intermedia:

a) Internodium primum s. Valvula perianthii superior (articulo suppresso).

b) Internodium alterum s. Lodicula anterior (art. suppr.)

c) Internodium tertium s. Lodicula dorsalis (art. suppr.)

C. Pars trimembris tertia s. terminalis:

a) Internodium primum s. fasc. fil. trium (palea in nervos 3 discedens).

b) Internodium alterum s. fasc. fil. 3, (plerumque suppressus, articulo autem (c *) plerumque evoluto).

c) Internodium tertium s. ovarium (palea clausa).

Fig. 15. Gemma seminalis, synthetice concepta:

- a) Internodii ejusdem infimi vagina (articulo * suppresso), s. *Pericarpium*.
- b) Internodii alterius vagina (embryone articulata sistente), s. *Tegmen*.
- c) Internodium terminale, formatum ex articulo juvenili (*Plumula*) a,
- d) ejusdemque vagina (*Cotyledone*).

Fig. 16. *Fructus*, i. e. tegmen (a) perispermio repletum; Embryone cum plumula sua (b) in sinum tegminis retruso.

P A N I C E A E.

Graminum polygamicorum tribum alteram, flosculorum compage glumis regulariter duriori, rarius valvularum glumarumque subaequali, eaque tum membranaceo-chartacea, *Paniceae* constituunt. In hanc itaque tribum recipienda erunt omnia graminum genera ea, quae, intra glumas compagis modo dictae bisflora, flosculum imperfectum intra inferiorem, fructiferum intra superiorem positum habent: alioquin palearum *) armationis, sive seta munitae sint, sive arista, ratione nulla habita. Pari autem jure et ea hoc referentur genera mere uniflora, quae, palearum compage Paniceis solenni praedita, sive monoecea sint sive hermaphrodita, aut flosculi aut glumae inferioris suppressorum notas praebent. Cujusmodi generum, si, formarum analogia quadam, aut palea aliqua, solito suppressa, fortuito evoluta ductus, cohortem, cui adjudicanda sint, jam facile conjicies, tutiorem adeo recognoscendae paleae cujusdam suppressae ducem habebis nervorum in glumis, quae prstant, numerum. Ille enim nervorum numerus, in spiculis typice hermaphroditis ita distributus, ut gluma inferior paucioribus, quam superior, nervis notata sit, in polygamorum graminum uniflororum gluma inferiori, aut major, aut cum nervorum glumae superioris numero idem est. Quas quidem status polygamici uniflororum

*) Paleae nobis d'cuntur squamae florales in universum; in specie autem *glumae*, palearum illarum duae insimae; *valvular*, *tertia* et *quarta*, *squamulae*, eae, quae lodiculam sustinent.

notas in generum singulorum charactere naturali, infra uberiorius descripto, fusius expositas habebis.

E generibus Panicearum tribum constituentibus ignota mihi sunt, quae sequuntur: *Zeugites* SCHREB., *Chaetium* N. AB Es., *Berchtoldia* PRESL (Chaetio, ut videtur, maxime affinis), *Arthraxon* P. B. — Reliqua, quae novi, ita disponenda propono:

S P I C U L A E

I.	Dioecae	Spinifex.
II.	Monoeciae:	
	Spica. Mares polyandri, plures, stipitati, femineam cingentes solitariam, sessilem	Pariana.
	Panicula. Mares 6-andri, pedicellati, cum femineis sessilibus in radiolis geminati	Pharus.
	Panicula. Mares 3-andri, aut in radio eodem inferiores, aut in paniculis distinctis, tum superioribus, collecti	Olyra.
	Panicula. Mares 6 — 10-andri, in panieula eadem superiores	Luziola.
	Panicula. Mares 6-andri cum femineis mixti	Caryochloa.
III.	Hermaphroditae s. pseudouniflorae:	
	Paniculatae, perianthio mutico	Milium.
	Paniculatae, perianthio apice aristato	Urachne.
	In racemis simplicibus; valvulae glumis 2 diores	Paspalum.
	In racemis simplicibus; valvulae cum gluma solitaria herbaceo- membranaceae	Reimaria.
	In thyrsi simplicis capitulis echinatis	Lappago.
IV.	Hemilogamae vel hemigamae:	
a)	Flosculo mutico (l. brevissime caudulato aut aciculato), Intra thyrsi simplicis involucella, formata e laciniis coriaceis, inferne connatis	Cenchrus.

Intra thyrsi simplicis involucella, formata e setis liberis; spicularum basin coronantibus	Pennisetum.
Intra vaginas spathaceas alternas, paleis stipatae	Xerochloa.
In racemo simplici, spatha incluse, ad axin continuum solitariae l. binae (totae membranaceo-chartaceae)	Thouarea.
In racemis simplicibus, liberis, ad axis partialis articulos subquaternae	Trachys.
In axis simplicissimi torosi scrobiculis	Stenotaphrum.
In racemis, thyrsi, panicula vel juba; nec priorum notae .	Panicum.
b) Flocculo fertili apice aristato,	
Spiculae in radiolorum paniculae apice solitariae	Arundinella.
Spiculae in radiorum (vel radiolorum) paniculae apice ternae .	Tristachya.

Species paucas, cruce (‡) anteposita notatas, e Kuntzii opere splendidissimo (*Revision des graminées*), praeclare ibidem descriptas, iis, quas ipse examinavi, inserendas esse duxi.

S P I N I F E X . L.

Axes floriferi fasciculato - vel squarroso - capitati: masculi et fructiferi in distinctis plantis. *Spiculae* sessiles: *Masculae* ad axin suum plures, biflorae: flosculo utroque staminifero; *Fructiferae* (hemiologamae) ad axis sui basin solitariae.

Gramina regionis tropicae orientalis littora arenosa habitantia, 1 — pluri-pedalia, prostrata, ramosissima, coriacea.

Folia e vaginis ad nodos pl. min. arce congestis et dilatatis semiteretia, saepe pungentia.

Ligula longo-ciliaris.

Capitula vel *fasciculi florales* terminales et axillares, magni, compositi ex axibus plerumque plurimis, dense fasciculatis, saltem in feminea planta capitatis et squarroso-divergentibus, subaequalibus aut (in mascula planta) inaequalibus, subuliformibus:

Plantae masculae nunc laxe- (et tum subcadiueiformi-) nunc arctius thrysifloris, omnibus (aut longioribus tantum) inferne longius breviusve ananthis. — *Spicula* quaevis ad axis dentem sessilis, ovata. *Glumae* 2, chartaceo-membranaceae, nunc flosculos subaequantes, nunc illis pl. min. minores, 7 — 9-nerves: inferior paulo brevior. *Flosculi* 2, sessiles, masculi, bivalves, substantia glumarum: valvulis aequalibus, acutis: inferiore 5 — 7-, superiore dissite 2-nervi.

Plantae fructiferae axes uniflori, ceterum ut in mare, plerumque tamen longiores. *Spicula* solitaria ad axis basin sessilis, lanceolata, hemiologama. *Glumae* 2, chartaceo-membranaceae, aequales, flosculos aequantes l. paulo excedentes, acuminatae, 7 — 9-nerves. *Flosculus* inferior neuter vel mas-

culus, 1 — 2-valvis: valvula inferiore 5-nervi, superiore, si adest, perparva, teneriori. *Flosc. superior* hermaphroditus, chartaceus, incompletum aequans, valvula inferiore 3-nervi superiorem amplectente.

Lodiculae in utriusque sexus spiculis squamae 2, subspathulatae, rotundato- et subbilobo-truncatae, basi carnosae.

Ovarium in pl. fructif. oblongum, glabrum. *Styli* 2, basi connati, elongati. *Stigmata* plumosa.

Stamina 3. *Filamenta* elongata. *Antherae* lineares.

Fructus Caryopsis elliptico-ovalis, subdepressiuscula, libera, eberbis, scutello suo dimidio longior.

Spinifex squarrosus L. Mant. 2. Axibus masculis dissitiuscule et subcaduceato-floriferis; Spiculis, vaginis foliisque glabris: his canaliculatis, subulatis, arcuatis, pungentibus.

Spinifex squarrosus. R. et S. II. p. 844.

Stipa spinifex L. Mant. 1. (planta fructifera).

V. spp. Ind. or. Sumatr.

Folia palmaria, quam in sequente validiora magisque coriacea. *Culmus* praelongus. *Lodiculae* squamas in spicula fructifera, quam examinare licuit, triplo quam muscularum longiores, cuneiformes, trinerves inveni, quod non in specie sequente.

Spinifex hirsutus La Bill. Axibus masculis densiuseule thrysato-floriferis; Spiculis, vaginis foliisque pubescens: his linearis-involutis, rectiusculis.

Spinifex hirsutus. R. et S. II. p. 845.

V. spp. N. Holl.

Specimina mea vix pede longiora. *Culmus* etiam pubescens. *Folia* spithamea — dodrantalia.

P A R I A N A *Aubl.*

Spica solitaria. *Spiculae masculae* polyandrae, stipitibus depresso insidentes, sub-5, articulum quemvis *Femineamque* solitariam, sessilem, cingentes. ♂ *Perianthium* nullum (rarissime evolutum, hyalinum). ♀ *Perianthium* demum induratum.

Gramina Americae tropica, sylvatica, erecta, pedalia et altiora.

Folia ovata l. ovato-lanceolata, saepissime latitudine insigni (bipollieari), acuminate, basi plerumque in petiolum brevissimum contracta, multinervia.

Ligula coriaceo-chartacea, brevis, truncata, dorso longe plerumque pilis setiformibus numerosis, longis et subsquarrosis stipata.

Spica terminalis solitaria, cylindracea. Rhachis articulata, plerumque minus facile solubilis, flexuosa, complanata; alternatim hinc pro recipienda spicula feminea canaliculato-concava.

Spiculae masculae 3, 4, 5, (6?), ovatae, acutiusculae, insidentes *stipitibus* subcoriaceis, e basi articulorum circum circa ortis, complanatis, liberis l. per paria connexis, articulo, quem cingunt, paulo brevioribus, apice biauriculato-appendiculatis: laciniis herbaceo-coriaceis, evatis, acutis, glumas collaterales mentientibus; flosculum suum aequantibus l. eodem brevioribus, 3 — 5-nervibus*).

Glumae herbaceo-coriaceae 2: inferior dorso laciniis stipitis adpressa; ovata, acutiuscula, complanata, 3-nervis, superiore concavam, obsolete 3 — 5-nervem, marginibus amplectens. *Perianthium* 0, rarissime 1-valve, hyalinum, longitudine glumarum. *Lodiculae* squamae 2, acutae l. obtusae, plerumque fimbriato-dentatae, multinerves, haud raro in unam, tum dilatatam, coalitae. *Stamina* indefinita (circiter 30), exserta. *Filamenta* saepe fasciculatim conata. *Antherae* lineares.

*) In specie Bahiensi quadam (*Pariana parviflora* herb. nostr.) incompleta, laciniae istae fere ex ipsa articuli basi nascuntur, stipite subnullo.

Spicula *seminea* ad basin articuli cuiusvis solitaria eique facie adversa s. impressa, sessilis, stipitibus muscularum occultata: *Glumae* 2, membranaceae, subaequales, flosculo paulo longiores, acutae, carinato- 1 — 3 nerves: nervis 2 marginalibus. *Perianthium* subcoriaceum, demum induratum. *Lodicula* ut in maribus, sed paulo major. *Ovarium* ellipticum. *Styli* 2, coaliti. *Stigmata* plumosa.

Fructus akenium oblongum, dorso depressiusculum, liberum, eberbe, pericarpio atrato. *Scutellum*

Pariana lunata N. ab Es. Laciniis stipitum pubescentium ipsis aequilongis, flosculo plus duplo brevioribus, obtusiusculis; Foliis ovato-lanceolatis; Ligularum setis praelongis.

Pariana lunata. N. ab Es. Agr. bras. p. 295.

V. sp. Bras.

Culmi aliquot sesquipedales. *Pili* setiformes (hispiduli), ligulam stipantes, fere semipollulares. *Petioli* sesqui — 3-lineales. *Folia* 4 — 8-pollucaria, pollicem cum dimidio — lineas 10 lata. *Spica* 4 — 5 pollices longa, crassa.

Pariana mollis N. ab Es. Laciniis stipitum basi villosulo-barbatorum, pubescens, ipsis aequilongis, flosculo duplo brevioribus, acutis; Foliis lanceolato-ovatis; Ligularum setis brevibus.

Pariana mollis. N. ab Es. Agr. bras. p. 296.

V. sp. Bras. (Spicae articulum et folium).

Pariana scabra N. ab Es. Laciniis stipitum basi villosulo-barbatorum ipsos flosculumque aequantibus, acuminatis; Foliis lanceolato-ovatis; Ligularum setis breviusculis.

Pariana scabra. N. ab Es. Agr. bras. p. 294.

V. sp. Bras. (Spicae articulum et folium).

Pariana lanceolata. Laciniis stipitum pilosulo-pubescentium ipsis brevioribus, flosculum aequantibus, acutiusculis; Foliis lanceolatis; Ligularum setis praelongis.

V. spp. Bahiens.

Culmi 1 — 2, dodrantales — pedales, simplices, teretes, plurinodes, ad nodos barbati, ex ima basi nodulosa squamisque aliquot tecta fibras radicales emittentes paucas, ramulosas. *Vaginae* totae fissae, superne laxiusculae, lamina breviores, ad margines tomentoso-ciliatae, striatae: inferiores aphyllae, superiores satis confertae, subdistichae. *Ligula* chartacea, brevis, truncato-semilunarlis, fimbriato-denticulata, dorso stipata pilis setiformibus, numerosis, subsquarrosis, semipollicaribus. *Folia* patula l. patentia, lanceolata, in petiolam brevissimum, marginibus hirtum attenuata, acuminata, hirtula: inferiora plana, spicae subjecta involuta, intermedia majora: pollices 5 longa et pollicem dimidium l. lineas 7 lata. *Spica* (fracta) videtur digitalis, teres, cum reliquis partibus subflavendo-saturate viridis. *Articuli* solubiles, lineas 5 longi. *Rhachis* pertenuis, sere filiformis, complanata, pilis brevibus adspersa: articuli cejusvis apice claviformi. *Stipites* marium 3 — 5, liberi aut per paria connati, lineas 4 longi, lineares, complanato-convexi, striati, pilis brevibus adspersi; *appendices* singuli 2, lineam et quod excedit longae, ovatae, acutiusculae, scabriusculae, 3-nerves. *Spiculae masculae* tot quot stipites, horum appendicibus, quas longitudine aequant, extus involucratae, ovatae, acutiusculae. *Glumae* 2, aequilongae, herbaceo-coriaceae, glabrae: inferior exterior, 3-nervis, superior dissite binervis (nervo medio obsoleto). *Perianthium* univalve: valvula hyalina, lanceolata, 3 — 5-nervis, longitudine glumarum. *Lodicula?* *Stamina?* — *Spicula feminea* rhachi adpressa, sessilis, 5-linealis, elliptica. *Glumae* 2, membranaceae, aequales, flosculum aequantes, ovatae, subcaudato-acuminatae, subcarinato-concavae, 1-nerves. *Perianthium* ellipticum, subcaudato-acuminatum, coriaceum: valvula inferior superiore late obvolvens. *Lodiculae* squamae 2, ovatae, acutae, glabrae, 3-nerves. *Fructus* (immaturus) coronatus Stylo 1.

P H A R U S L.

Panicula: radiis solitariis, racemosis, compositis. *Spiculae* in radiolis alternatim binatae: altera *sessilis*, *feminea*, elliptico-lanceolata, multo major, perianthio subcoriaceo; altera *pedicellata*, *mascula*, hexandra, parva, perianthio membranaceo.

Gramina Americae tropica, sylvatica?, erecta, sesqui — bi-pedalia.

Folia (lato-) lanceolata l. oblonga, aut obovato-lanceolata, acuminata, plana, basi in petiolum satis longum attenuata, multinervia: nervis obliquis folii marginem petentibus et anastomosibus crebris inter se junctis.

Ligula membranacea, perbrevis, fimbriato-lacera.

Panicula radiis solitariis, strictis, racemosis, compositis, cum axi radiolisque pubescensibus.

Spiculae in radiolis alternatim et pl. min. dissite binae:

Sessilis feminea. *Glumae* 2, membranaceae, lineari-lanceolatae, subaequales, flosculo suo plerumque breviores, fuscae: inferior 5-, superior sub-3-nervis. *Perianthium* elliptico- aut lineari-lanceolatum, inferne substipitato-attenuatum, depresso, bivalve: valvula inferior intra glumam inferiorem, coriacea, sub- 7-nervis, concava, superiore subaequilongam, linearem, paulo tenuiorem, dissituscule binervem amplectens. *Lodicula* 0. *Ovarium* linearis-oblongum, glabrum. *Stylus* 1, longus. *Stigmata* 3, pubescentia. *Fsuctus* caryopsis cylindracea, acutata, libera, dorso profunde sulcata; scutellum . . .

Pedicellata mascula, sessili multoties minor. *Pedicellus* à parte glumae superiores femineae exsertus, tenuis. *Glumae* 2, membranaceae, ovato-oblongae, obsolete plurinerves: nervo medio distinctiori: inferior flosculo duplo magisve brevior, superior paulo longior l. flosculum aequans. *Perianthium* membranaceum, oblongum, 2-valve: valvula inferior intra glumam inferi-

orem, 3 — 5-nervis; superior aequilonga, 2-nervis. *Lodicula* 0? *Stamina* 6, *antheris* linearibus. — (Interdum spicula mascula radiolo ipsi paulo supra femineam adnata, pedicello proprio nullo).

Pharus latifolius L. sp. pl. ed. 2. Perianthiis femineis totis pubescentibus, glumis spiculaque pedicellata duplo longioribus.

Pharus glaber Hb. et Kth. n. gen. et sp. 1. p. 196. Agr. syn. p. 17.?

V. spp. Ind. occ. Bras.

Folia in spp. nostris lanceolata, acuminata.

Pharus brasiliensis Raddi. Perianthiis femineis totis pubescentibus, glumis duplo longioribus, spiculam pedicellatam subaequantibus.

Pharus brasiliensis. N. ab Es. Agr. bras. p. 302. — *P. pubescens* Sprgl. (Foliis angustioribus).

V. spp. Bras.

Folia lanceolato-oblonga, acuta. Spiculae femin. (4-lineales) fere duplo minores quam prioris.

Pharus micranthus Schrad. Perianthiis femineis (totis?) pubescentibus, glumas aequantibus, spicula pedicellata brevioribus.

Pharus micranthus. N. ab Es. Agr. bras. p. 302.

V. spp. Bras.

Folia lanceolata, utrinque attenuata, subtus e punctulis minutissimis subtilissime puberula. Spiculae femineae lineares, bilineales, pedicellum masculae subaequantes. — Radii in nostris contracti, sine dubio serius patent.

Pharus scaber Hb. Kth. Perianthiis femineis superne pubescentibus, glumis spiculaque pedicellata paulo longioribus.

Pharus scaber. N. ab Es. Agr. bras. p. 301. Kunth. Agr. syn. p. 17. —

P. lappulaceus Aubl. — *P. latifolius* Lam.

V. spp. Guaj. Bras.

Folia ovato-l. obovato-lanceolata.

O L Y R A L.

Panicula (*Juba panicularis*), vel *racemi* thyrsoidei. *Spiculae masculae* triandrae minores (angustiores), aut in radiis l. racemis inferiores, aut in paniculis distinctis, tum superioribus. ♂ *Perianthium* O. ♀ *Perianthium* demum cartilagineum.

Gramina Americae (insularumque maris pacifici) tropica, sylvatica, erecta, saepe ramosa, variae magnitudinis.

Folia pro statura plantae lata, plerumque lanceolato-ovata, basi in petiolum brevissimum attenuata, longe plerumque altero laminae latere latiori trapezoideo-subangulata.

Ligula chartacea, brevis.

Flores nunc in paniculae (s. potius *jubae panicularis*) radiis pl. min. simplicibus, nunc in pedunculis thyrideo-racemosis.

Spiculae masculae femineis semper angustiores et plerumque etiam breviores, in *Jubae* radiis vel in racemo inferiores, rarius in paniculis culmi peculiariibus, iisque pedunculos femineos superantibus, brevipedicellatae, lineari-lanceolatae, deciduae, triandrae. *Glumae* 2, herbaceo-membranaceae, trinerves, aut superior, paulo brevior, binervis tantum: inferior saepissime caudato-subulata. *Perianthium* nullum, rarissime 1-valve, hyalinum (ut in *Ol. cordifoliae* spiculis masc. nonnullis vidi). *Lodiculae* squamae 3, (an interdum 2 tantum?) cuneatae, subtruncatae, emarginatae: 2 anteriores, tercita dorsalis. *Stamina* 3, *Antheris* linearibus.

Spiculae femineae ovatae, in *Jubae* radiis vel in racemo superiores, rarius in racemis peculiariibus iisque tum maribus subjectis, masculis longe plerumque pauciores iisdemque serius deciduae, pedicello suffultae apice dilatato. *Glumae* 2, herbaceo-membranaceae, subparallelo-alternae, aut aequali-(7-)nerves, aut inferior, saepissime caudato-subulata, 5 — 7, superior, paulo brevior, 3 — 5-nervis. *Perianthium* glumis pl. min. brevius, ellipticum

l. ovatum, obtusiusculum, coriaceum demumque subcartilagineum l. eburneum, 2-valve: valvula inferiori superiorem amplectente et includente. *Lodiculae* squamae 3, forma ut in maribus. *Ovarium* oblongum, glabrum. *Styli* 2, inferne connati. *Stigmata* 2, plumosa.

Fructus caryopsis oblonga, libera, eberbis, dorso inferne sulcata, scutello suo $\frac{3}{4}$ longior.

a) *Spiculae femineae in Juba l. in racemis superiores.*

Olyra paniculata Sw.! Paniculae terminalis (interdum insuper axillaris) radiis inferne masculis; Spicula feminea terminali, subsolitaria; Glumis utriusque sexus caudato-subulatis, glabris; Perianthio femineo elliptico, glabro laevique; Foliis lanceolato-oblongis l. ovato-lanceolatis, acuminatis, basi hinc subtrapezoideo-rotundatis.

* Vaginis hirto-pubescentibus:

Olyra paniculata. Schlechtend. in Berl. Mag. 1818. p. 144. — *O. latifolia* L. Am.? Hb. et Kth n. g. l. p. 197. Agr. syn. p. 69? — *O. pubescens* Raddi Agr. br. p. 18?

* Vaginis glabris:

Olyra arundinacea Hb. et Kth. l. l. Agr. syn. p. 68. N. ab Es. Agr. bras. p. 306.
V. spp. Ind. occ. Bras.

Olyra cordifolia Willd. Paniculae terminalis radiis inferne masculis, superne paucifemineis; Glumis marium acuminatis feminearumque caudato-acuminatis glabris; Perianthio femineo ovato, glabro laevique; Foliis ovatis, acuminatis, basi subcordata subaequali-rotundatis.

Olyra cordifolia. Schlechtend. l. l. Hb. et Kth. l. l. p. 198. Agr. syn. p. 69.
N. ab Es. l. l. p. 308.

V. spp. Ind. occ. Bras.

Olyra semiovata. Paniculae (interdum una plurium) terminalis radiis inferne vel inferioribus totis masculis; Spicula feminea terminali solitaria; Glumis

utriusque sexus caudato-subulatis, glabris; Perianthio femineo elliptico, basi apiceque sericeo-barbato; Folii lanceolato-ovatis, basi hinc trapezoideo-angulatis.

Olyra semiovata Trin. Diss. II. p. 249.

V. spp. Bras. — ? O-Taiti.

Culmi, qui 2 — 3-pedalis videtur, pars superior teres, crassitie pennae corvinae, glabra, ad nodos, plures et glabros, aequa, vaginis foliorum tecta. *Vaginae* laxiusculae, internodio longiores, undique glabrae, superne carinatae, apice utrinque in auriculam obtusam productae. *Ligula* membranacea, brevissima, truncata, sub lente ciliatula, fusca. *Folia* in ramis (culmis) qui coram sunt plura (3 — 5 — 8), lanceolato-ovata, petiolo brevissimo obsolete pubescente suffulta, basi altero latere angustiori convexa, altero latiori oblique subtruncata, acuminata, excepto margine hispidulo glabra: inferiora dodrantalia, pollices 3 l. $2\frac{1}{2}$ lata, laete viridia. *Pedunculus* e vagina suprema nunc solitarius, nunc 2 — 3, glabri: altero binisve tum elongatis (pedalibus); tertio, serius florente, breviori. *Juba panicularis* ovato-oblonga, circiter spithamea, densiuscula. *Axis communis* angulatus, glaber. *Radii* sparsi, communiter tamen plures in pseudoverticillum collecti, pertenues, scabri, circiter a medio radiolosi: radiolis brevibus, secundis; radii inferiores pl. min. digitales, plerumque toti masculi; superiores sensim breviores, inferne masculi, spicula feminea solitaria terminali. *Spiculae masculae* plurimae, angusto-lineari-lanceolatae, non computata cauda 4-lineales. *Glumae* trinerves: inferior in subulam flexuosa, pertenuem, circiter bilinealem excurrentes; superior paulo brevior, acuminata. *Perianthium* nullum. — *Spiculae femineae* in radiis superioribus terminales, solitariae, elliptico-ovatae, non computatis glumarum subulis lineas 6 longae. *Glumae* sub- 5-nerves, glabræ: inferior in subulam flexuosa ipsius longitudine attenuata. *Perianthium* elliptico-ovatum, glumis triplo brevius: valvula inferior basi apiceque margine albo-pubescentio-hirta. *Lodiculae* squamae 3, 4 — 5-nerves.

Obs. Quoad perianthium semineum affines *Olyrae: humilis N. ab Es., ciliatifolia Radd. et longifolia Hb. Kth.* — Species ex O-Taiti foliis pedunculisque prorsus conveniens ob spiculas delapsas incerta.

Olyra humilis N. ab Es. Paniculae terminalis radiis inferioribus totis masculis, superioribus spicula feminea solitaria terminatis; Glumis masculis acuminatis semineisque caudatis glabris; Perianthio femineo ovato-elliptico fronte (præsertim inferne superneque) sericeo-pubescente; Foliis lanceolato-ovatis (vel lanceolatis, imo lanceolato-linearibus tantum), basi hinc subtrapezoideo-angulatis.

Olyra humilis N. ab Es. Agr. bras. p. 304. Duperr. it. tab. 22.

V. spp. Bras.

Hujus, excepta foliorum forma et latitudine descriptioni ill. NEESII perfecte respondentis, non nisi varietatem angustifoliam vidi. — Sunt autem huic nostrae *Culmus* sesquipedalis, tenuis, simplex, sub lente pubescens; *Nodi* annulares, prominentes, angusti; *Vaginae* pl. min. hirtae; *Ligula* brevissima l. obsoleta; *Folia* lanceolata l. lanceolato-linearia (ovato-oblonga *Ns.*), lineas ad summum 5 ($\frac{2}{3}$ — 1-pollicem *Ns.*) lata, subtus glauca et hirta l. scabra tantum. Panicula contracta, fere 4-pollicaris (ad summum sesquipollicaris *Ns.*). *Spiculae masculae* lineares, purpureae, *femineae* lanceolato-ovatae, virides.

Olyra fasciculata. Paniculae terminalis axillariumque radiis fasciculatis, simplicissime thyrsoideo-racemosis, inferne masculis, superne pauci-femineis; Glumis masculis acutissimis semineisque subcaudato-acuminatis glabris; Perianthio femineo elliptico-lineari, glabro, punctulato; Foliis ovatis, acuminatis, basi plerumque hinc subtrapezoideo-rotundatis.

V. spp. Bahiens.

4-pedalis? *Culmi* abscissi ad nodos glabros subaequi. *Vaginae* glabrae, lamina breviores. *Ligula* membranacea, brevis, apice truncato brevissime fimbriata-denticulata. *Folia* ovata, acuminata, basi ant subaequali cuneato-rotundata, aut hinc subtrapezoideo-latiore, in petiolum brevem attenuata, undique glabra, pagina inferiori glaucescentia: inferiora dodrantalia et pollices

3 lata. E vagina suprema et ex foliorum superiorum axillis prodeunt aut radii paniculae adhuc latentis, aut pedunculus nudus in radios pl. min. fasciculatos discedens. *Radii* pl. min. palmares, simplicissime thyrsigeri, inde ab ipsa basi *spiculas* exserentes *masculas*, brevissime pedicellatas, plurimas, subadpressas, lanceolato-lineares, acutas, lineas 3 longas. *Spiculae semineae* aliquot terminales, distantiores, ovato-lanceolatae, 6 — 8-lineales. *Glumae* 7-nerves, caudato-acuminatae: inferior paulo longior. *Perianthium* 4-lineale, linearis-ellipticum, obtusiusculum, glabrum, tenuissime punctulatum.

Olyra capillata. Paniculae terminalis radiis inferioribus totis masculis, extremis axillaribusque totis femineis; Glumis masculis capillaceo-caudatis feminis-que subulatis glabris; Perianthio femineo elliptico-lineari, glabro laevique; Foliorum, sursum majorum, superioribus ovatis l. lanceolato-ovatis, acuminatis, basi subaequali-rotundatis; inferioribus cordatis.

Olyra floribunda Trin. Diss. II. p. 250. (non Raddi).

V. spp. Bras.

Culmus sesquipedalis, plurinodis, ad nodos pubescentes aequus l. parum geniculatus. *Vaginae* glabrae, marginem versus hirtulae. *Ligula* membranacea, brevis, subrepando-truncata. *Folia* sursum sensim majora; inferiora cordata, pollicaria et breviora (interdum brevissima et angustissima), superiora 3 — 4-pollicaria, lanceolato-oblonga l. lanceolato-ovata, sesquipollicem lata, in petiolum brevissimum hirtum attenuata, basi subaequali-rotundata; omnia acuminata, undique glabra, glaucescentia. *Juba* terminalis 3-pollicaris. *Radii* solitarii l. aliquot in pseudo-verticillum collecti, satis conferti, racemiformes, adpresso-radiolosi: inferiores toti masculi; supremus totus et masculorum superiorum unus alterve apice feminiferus. *Spiculae masculae* plurimae, brevi-pedicellatae, angusto-lineari-lanceolatae, circiter 3-lineales, rubentes. *Glumae* 3-nerves: inferior in subulam capillaceam excurrens; superior acuminata. *Perianthium* nullum. — *Spiculae semineae* aliquot in jubae radiolo supremo praetereaque in racemis foliorum axillaribus breviusculis simplicissimis, pedi-

cellatae, linearis-ovatae, semipollicares aut paulo longiores. *Glumae* parum inaequali- subcaudato-subulatae: inferior, paulo longior, sub-7-, superior sub-5-nervis. *Perianthium* linearis-ellipticum, obtusum, glabrum, laeve, glumis quintam partem brevius.

Olyra filiformis. Paniculae terminalis (pauciflorae, angustae) interdum et axillarium (filiformi- et elongato-peduncularum) radiis inferne masculis; Spicula feminea terminali subsolitaria; Glumis masculis acutis femineisque subulatis glabris; Perianthio femineo elliptico-lineari, glabro, punctulato; Foliis sub-linearibus, acuminatis, basi inaequali hinc trapezoideo-angulatis.

V. spp. Bahiens.

2 — 3-pedalis? — *Culmi* graciles, plurinodes, ad nodos annuliformes glabros aequi. *Vaginae* arctiusculae, glabrae, lamina breviores. *Ligula* chartacea, brevis. *Folia* fere linearia, lineas 5 — 8 lata, pollices fere 6 longa, acuminata, basi in petiolum brevissimum attenuata et altero latere latiori trapezoideo-angulata, marginibus hispidula, in pagina inferiori viridi scabra, in superiori glauca. *Pedunculi* e vagina suprema, interdum etiam ex axilla folii secundi, 1 — 2, filiformes, elongati, paniculam ferentes angustam, paucifloram, circiter palmarem, e radiis aliquot subadpresso-erectis et subsimplicibus compositam. *Spiculae masculae* in radiis inferiores, plures, subadpressae, brevissime pedicellatae, plerumque binatae: altera subsessili: lanceolatae, acutae, lineas 2 et quod excedit longae, sub lente scabriusculae. *Gluma* inferior 3-, superior 2-nervis. — *Spicula feminea* in apice radiorum terminalis, ovata, circiter lineas 8 longa. *Glumae* caudato-subulatae, non multum inaequales, glabrae: inferior 5 — 7-, superior 5-nervis. *Perianthium* elliptico-lineare, acutiusculum, glumis dimidio brevius, glabrum, punctulis apiatum.

Olyra ventricosa N. ab Es. Paniculae terminalis radiis inferioribus masculis, superioribus pluri-femineis; Glumis caudato-subulatis: masculis glabris, femineis hirsutis; Perianthio femineo ovato, scrobiculato-aspero; Foliis lanceolatis l. ovato-lanceolatis, acuminatis, basi subaequalibus.

Olyra ventricosa. N. ab Es. Agr. bras. p. 303. — *O. micrantha* Hb. Kth. n. gen. et sp. 1. p. 199. Rev. gram. tab. 12. Agr. syn. p. 69 et 70. (Var. ligula elongata). — *O. hirsuta* Trin. Diss. II. p. 250.

V. spp. Bras.

Memorabilis ob ligulam interdum ad pollicis longitudinem elongatam, subcoriaceam, culmum obvolventem; in *ventricosa* N. Es. quidem subnullam dictam: quam tamen per Varietatem foliis angustioribus sensim accrescere videre est.

Olyra ramosissima. Panicalis ramorum terminalibus, numerosis, inferne masculis, superne plurifemineis; Glumis utriusque sexus acutiusculis: masculis hirsutis, femineis glabris; Perianthio semineo ovato, glabro laevique; Foliis linear-lanceolatis, acutiusculis, basi parum inaequalibus.

V. spp. Bahiens.

2-pedalis? Rami plurimi, conferti, patuli, strictiusculi, glaberrimi, fasciculato et strictiusculo-ramulosi, plurinodes, ad nodos annuliformes glabros aequi.

Vaginae glabrae. *Ligula* sere nil nisi margo transversalis angustissimus. *Folia* patula et patentia, linear-lanceolata, acutiuscula (ex apice obtuso brevi-acutata), strictiuscula, superne magis, inferne et ad margines minus scabra, sesqui — 3-pollicaria, linea 4 — 6 lata (ramorum juniorum angustiora). *Paniculae* (*Jubae*) in apicibus radiorum, e vaginis saepe conferte fasciculatorum, numerosae, circiter 2-pollicares. *Radii* sparsi, solitarii vel aliquot conferti, parum compositi: inferiores toti masculi, supremi toti feminei. *Spiculae masculae* in quovis radiolo plures, inaequali-pedicellatae, linear-ovatae, acutiusculae, sesquilineales. *Glumae* tenero-herbaceo-membranaceae: inferior 3-nervis, hirsuta; superior subnervis, glabra 1. superne pilis aliquot adspersa. —

Spiculae femineae in radiolis supremis plures, oblongae, acutiusculae, marium longitudine sed iisdem latiores, glabrae. *Gluma* inferior 7-, superior 5-nervis. *Perianthium* glumis tertiam partem brevius, oblongum, obtusiusculum, glabrum et laeve.

b) *Spiculae femineae in racemis propriis, inferis vel paniculae masculae subjectis (Lithachne PB.).*

Olyra floribunda Raddi. Pedunculis terminalibus axillaribusque fasciculatis: aliis subpaniculiferis mere masculis, productioribus, aliis racemosis mere femineis, brevioribus; Glumis caudato-subulatis: masculis ciliatulis, femineis hirsutiusculis; Perianthio femineo lanceolato; Foliis linearis-ovatis, obtusis, basi aequalibus.

Olyra floribunda. N. ab Es. Agr. bras. p. 309. Kunth Agr. syn. p. 69.

Raddia brasiliensis Bertol.

V. spp. Bahiens.

Spiculae tam masculae quam femineae 3-lineales: illae angusto-linearis-lanceolatae, haec ovatae.

Olyra polypodioides. Pedunculis axillaribus: foliorum superiorum subpaniculiferis, mere masculis, folii infimi racemoso, mere femineo; Glumis masculis acutis femineisque subcaudato-acuminatis glabris; Perianthio femineo ovato-lanceolato; Foliis linearis-ovatis, obtusis, basi subaequalibus, distichis.

an *Strephium distichophyllum Schrad.* N. ab Es. Agr. bras. p. 298.

V. spp. Bahiens.

Culmi e radice sublignosa plures, simplices, tenues, fruticulum referunt erectum, circiter spithameum. *Nodi* plures, pubescentes. A basi ad medium culmum usque *Vaginae* aliquot distantes, internodio multo breviores, brachyphyllae; a medio ad apicem culmi plures, confertae, subimbricatae, praesertim marginem versus hirtae, lamina breviores. *Ligula* membranacea, brevissima. *Folia* a medio ad apicem culmi conferta, disticha, patentia, subsessilia (ita ut culmus quilibet frondem Filicis quodammodo aemulet), linearis-ovata, obtusa cum mucronulo, basi subaequalia, glabra, viridia, sursum sensim patulo minora; inferiora lineas 8 longa, lineas 2 cum dimidia lata. *Pedunculi* e foliorum axillis breves: superiores subcompositi, mere masculi: Spiculis lanceolato-linearibus, bilinealibus, acutis. *Racemus* femineus non nisi e folii infimi axilla: Spiculis

ultra-bilinealibus, ovatis: gluma inferiori subcaudato-acuminata, 5-, superiori 3-nervi. *Perianthium* obtusiusculum, glumis paulo brevius.

Olyra pauciflora Sw! Pedunculis racemosis: terminalibus masculis, axillaribus feminis; Glumis masculis acutis feminineisque caudato-subulatis glabris; Perianthio femineo obovato, truncato; Foliis oblongo-lanceolatis, acutissimis, basi hinc trapezoideo-angulatis.

Olyra pauciflora. Schlechtend. l. l. — *O. axillaris* Lam.

Lithachne axillaris PB. Agrostogr. Tab. XXIV. f. 2.

V. sp. Jam.

L U Z I O L A Juss.

Paniculae: terminalis *Spiculae masculae*, majores, sub-10-andrae: Perianthium 0; axillarium *Spiculae femineae*: Perianthium 0. *Semen* pericarpio (solubili?) coriaceo inclusum.

Gramen Americae tropicum, aquaticum, repens, pl. min. pedale.

Folia linearia, plana.

Ligula membranacea, producta, acuta, lacera.

Paniculae terminalis, 2—3-pollicaris, contractae, radii tenues, simpliciusculi, cum radiolis (pedicellis) glabri. *Spiculae* omnes *masculae*, ovato-oblongae, 2-lineales, glabrae, muticae. *Glumae* parum inaequales, membranaceae: inferior 9-, superior 7-nervis. *Perianthium* nullum. *Lodicula* nulla. *Stamina* plerumque 10, filamentis brevissimis; Antheris angusto-linearibus, luteis.

Paniculae axillares s. inferiores ejusdem magnitudinis. *Spiculae* omnes *femineae*, lineam longae, masculis angustiores, ovato-lanceolatae, acutae. *Glumae* 2, subaequales: inferior 5-, superior 3-nervis. *Perianthium* nullum. *Lodicula* nulla. *Ovarium* ovato-oblongum, glabrum. *Styli* 2. *Stigmata* plumosa. *Fructus* (immaturus) akenium? obovato-oblongum, depresso-ovatum, liberum, cibere, scutello suo paulo longius. *Pericarpium* coriaceum.

Luziola peruviana Juss. Kunth Agr. syn. p. 10. — *L. mexicana* Hb. Kth.

Milium natans Sprgl. S. V. l. p. 120.

V. spp. Bras.

C A R Y O C H L O A *Trin.* Diss. II. p. 54.*)

Panicula. *Spiculae masculae* majores, 6-andrae, cum *femineis*, paulo minoribus; mixtae. *Perianthium* in utrisque nullum. *Fructus* akenium.

Genus (*Luziolae* fortasse nimis affine) Americae tropicum, paludosum; Culmo erecto, ultrapedali.

Folia linearia l. lanceolato-linearia, praelonga, vaginis in basi culmi confertis, longis, carinatis.

Ligula membranacea, producta, acuta, lacera.

Panicula circiter dodrantalis. *Radii* fasciculati, compositi. *Spiculae* utriusque sexus in panicula mixtae: *masculae* deciduae, lineam cum dimidia longae, oblongae, compressae, aentiusculae. *Glumae* tenui-membranaceae, subaequales: inferior 7-, superior angustior 5-nervis. *Perianthium* nullum. *Lodicula* nulla. *Stamina* 6. — *Spiculae* *femineae* lineam longae, ovato-orbiculatae, basi brevi-attenuatae, mucronulato-acutae. *Glumae* 2, subaequales, demum inflato-concavae: aut utraque 5-nervis, aut inferior 5-, superior 3-nervis. *Perianthium* nullum. *Lodicula* nulla. *Ovarium* subglobosum, glabrum. *Styli* 2. *Sigillata* plumosa. *Semen* orbiculari-oblongum, compressiusculum, liberum, scutello suo $\frac{2}{3}$ longius, pericarpio coriaceo, solubili, nitido inclusum.

Caryochloa brasiliensis *Trin.* Diss. II. p. 248. N. ab Es. Agr. bras. p. 299.

Arrozia micrantha Schrad. ined. Kunth. Agr. syn. p. 11. •

V. spp. Bras.

*) Obs. Sprengelii *Caryochloa* ad Urachnem referenda.

M I L I U M L.

Panicula. *Spiculae* hermaphroditae, elliptico-oblongae. *Perianthium* subcoriaceum, muticum.

Gramina utriusque orbis, a zona tropica (Americae) ad gradus boreales 60 et ultra descendenter, alia sylvas humidas, alia sicca et aprica amantia, erecta, 1 — 4-pedalia.

Folia linearia l. lanceolato-linearia; interdum involuta.

Ligula nunc membranacea, producta l. brevissima, nunc nil nisi margo fimbriatus angustissimus.

Panicula, rarius Juba panicularis, radiis verticillatis solitariisve pl. min. compositis.

Spiculae elliptico-oblongae, acutiusculae, 1 — 2-lineales, clausae, 1-florae. *Glumae* herbaceo-membranaceae vel membranaceae tantum, flosculum aequantes l. codem parum longiores, aquales: nunc aequaliter (3 — 5-) nerves, nunc inferior pluribus (5 — 7) quam superior (3 — 5) nervis praedita.

Perianthium hermaphroditum, sessile, elliptico-l. lanceolato-oblongum, chartaceo-subcoriaceum, plerumque deciduum, muticum: valvula inferiori superiorem obvolvente.

Lodiculae squamae aut ovatae, acutae vel inaequaliter denticulatae, aut cuneiformes, emarginatae.

Ovarium oblongum, glabrum. *Styli* 2. *Stigma* ramoso-plumosa.

Stamina 3. *Antherae* lineares.

Fructus caryopsis oblonga, compressiuscula, libera, eberbis, exsulca, scutello suo $\frac{2}{3}$ longior.

Obs. Nec lodicularum forma (cuneata in *Mil. amphicarpo* et *lanato*, saepe dentibus aliquot excisa in *Mil. effuso*) nec margo hyalinus perianthii *Milii lanati* sufficiunt ad divellendum genus satis naturale.

Milium effusum L. sp. pl. ed. 1. *Paniculae* radiis semiverticillatis, horizontali-patenibus; *Glumis* foliisque planis glabris; *Radice* perenni.

Milium effusum. R. et S. II. p. 319.

Miliarium effusum Mönch.

Agrostis effusa Lam.

V. spp. Germ. Petrop. Lapp. Cauc. or. Alt. Kamtsch. Canad.

Milium vernale MB! Paniculae radiis semiverticillatis, erecto-patulis; Glumis asperiusculis; Foliis planis, scabris; Radice annua.

M. vernalis. R. et S. II. p. 319. — *M. scabrum* Mirlet.

Agrostis vernalis Poir.

V. spp. Taur. Iber. Armen.

† *Milium minutiflorum.* Paniculae radiis (simplicissimis) verticillatis, erecto-patulis; Glumis pilosis; Foliis planis, glabris; Radice annua.

Panicum Perrotetii Kunth rev. gr. p. 395. tab. 111. Agr. syn. p. 96.

Senegal.

1 — 2-pedale. *Folia* 3 lineas lata, sub- 3-pollicaria. *Panicula* 5 — 6-pollicaris, radiis pollicaribus. *Spiculae* solitariae, pusillae. *Glumae* 3-nerves. *Perianthium* acutum.

Milium amphicarpon Pursh. Paniculae radiis subsolitariis, erectis; Glumis glabris; Foliis planis, pilosis; Radice (Rhizomate) vivipara.

Milium amphicarpon. R. et S. II. p. 320. — *M. ciliatum* Mühlenb.

Amphicarpum Purshii Kunth Agr. syn. p. 67.

V. spp. Am. bor.

Obs. De florū structura v. Sprgl. n. Entd. II. p. 50. Spiculae paniculae non masculae, sed hermaphroditae; rhizomatis majores mere^{re} feminine? Tam his quam illis glumae 2: in prioribus 5-, in radicalibus multi- (15-) nerves.

Milium lanatum R. et S. Jubae panicularis radiis pseudoverticillatis, contractiusculo-erectis; Glumis villosis; Foliis subinvolutis, glabris; Radice annua.

Milium lanatum. R. et S. II. p. 322. Kunth rev. gram. p. 497. tab. 163. (var. grandiflora).

Paspalum lanatum Hb. Kth. n. gen.

Leptocoryphium lanatum N. ab Es. Agr. bras. p. 84.

V. spp. Bras. Ind. occ.

Glumae 5-nerves, aut inferior 7-, superior 5 — 7-nervis. Perianthium membranaceo-marginatum.

U R A C H N E *Trin.* Fund. Agr. p. 109.

Panicula (interdum linearis- s. racemiformi-restricta). *Spiculae* hermaphroditae, elliptico-oblongae. *Perianthium* coriaceum, apice obtuso aristatum: arista caduca.

Gramina partim tropica Americana (*Nassella*), partim utriusque hemisphaerii borealis (intra gradus circiter 40 — 50), sylvas, graminosa, saxosa habitantia, erecta, majora pedes aliquot alta.

Folia linearia aut linearis-lanceolata, interdum angustissima et involuta.

Ligula plerumque membranacea, nunc pl. min. producta, nunc brevissima; interdum ciliaris.

Paniculae radii 2 — 8 in semiverticillis, superne floriferi, (interdum breves, simplices et sub- 1-flori, racemiformi-contracti).

Spiculae hermaphroditae, elliptico-oblongae vel, ob glumas acuminatas, ovato-lanceolatae, erectae, 1-florae. *Glumae* membranaceae, subaequales (inferiori tamen paulo majori), perianthio longiores vel ipsum aequantes, acuminatae vel, rarius, acutiusculae tantum, nunc aequali- (3 — 5-) nerves, nunc inferior pluribus (5 — 7 — 9 — 11) quam superior nervis notata: nervo medio saepe solo percurrente, lateralibus tum abbreviatis, interdum brevissimis.

Perianthium callo brevi, nudo vel pilis barbato insidens, suborbiculare vel pl. min. ellipticum, coriaceum, demum induratum et deciduum, nunc verrucosum, nunc glabrum, nunc pubescens, imo quandoque lanatum, valvulis aequalibus: inferiore (in *Nassella ventricosa*) superiore angustiorem plerumque late obvol-

vente, apice obtusiusculo aristata: arista recta, pl. min. aequa, e glumis longe plerumque pl. min. exserta, caduca (in *Nassella* ob perianthium hinc gibbum laterali).

Lodiculae squamae 3 — 5: tribus (interioribus) lanceolatis, quarum 2 collateraliter anteriores, tertia dorsalis; binis exterioribus, si adsunt, interiores basi tubo brevi cingentibus, multo brevioribus, rotundatis, interiorum duabus anterioribus antepositis*).

Ovarium oblongum vel obovatum, glabrum vel superne pilosulum. *Styli* 2. *Stigmata* plumosa.

Stamina 3. *Antherae* lineares: apice nuda l. barbatae.

Fructus caryopsis oblonga, teres l. depressiuscula, libera (arcte inclusa), eberbis vel apice obsolete barbulata, dorso linea l. sulco angustissimo notata, scutello suo $\frac{3}{4}$ longior.

a) *Perianthium hinc gibbum, Arista lateralis: NASSELLA.* (*Caryochloa Sprgl.*).

Urachne chilensis. Glumis acuminato-caudulatis, perianthio linea minori, laevi et undique glabro fere dimidio longioribus; Arista aequa, incurva, hispidula, glumis bis terve longiori.

Caryochloa chilensis Sprgl. ms.

V. spp. Chil.

Culmus erectus, satis longe supra basin fasciculato-s. verticillato-ramosus: ramis subfiliiformibus, floriferis. *Ligula* brevissima, membranacea, pilis tenuibus brevibusque stipata. *Folia* angustissima, siccitate setiformi-involuta, in-

*) Haec lodiculae, ubi squamis 5 composita est, organisatio, in gramine vivo ulterioris investiganda, distincta in *Ur. caerulecente*, *grandiflora*, *virescente* et *tanata*; in *parviflora* tres interiores tantum, basi vero in tubum manifestum confluentes vidi. In *Nassellis* ut in *Ur. racemosa* et *asperifolia* squamae 2 exteriores nullae. *Ur. brevicaudatae* lodiculam status spicularum, nimis juvenilis rite examinare non concessit: in hac squamas non nisi 2 collaterales vidiisse mihi videor. — Squamae 3 interiores, cum staminum filamentis alternantes, staminum trium aliorum rudimenta, exteriores 2 vero, rotundato-cuneatae, vera, Paniceis sub hac forma solemnis, lodicula censendae videntur.

feriora sesquipalmaria, culmea breviora (2 — 1 — semi-pollicaria), interdum refracta (quam var. b. SPRENGEL ms. s. n. *Caryochloae refractae*). *Panicula* sesquipollucaris et brevior, plerumque angusta. *Glumae* 3-nerves, aut inferior 5-nervis.

Urachne trichotoma. Glumis subacuminatis, perianthio linea minori, verrucoso-aspero, basi villis medium ipsius attingentibus cincto, fere triplo longioribus; Arista subaequa, tortili, hispida, glumis quinquies longiori.

Stipa trichotoma N. ab Es. Agr. bras. p. 375. Kth. rev. gr. tab. 121. Agr. syn. p. 182. Trin. in Mém. Ac. Petr. Ser. VI. I. p. 73.

V. spp. Bras. merid.

Culmus sesquipedalis et longior, subfiliformis. *Folia* setacea, spithamea et breviora. *Ligula* chartacea, brevis, rotundata. *Panicula* dodrantalis, laxa. *Glumae* 3-nerves, vel inferior nervo laterali adventitio.

Urachne panicoides. Glumis caudatis, perianthio linea minori, verrucoso, basi villis brevissimis cincto, paulo longioribus; Arista flexuosula, demum parum tortili, glumis sesquialongiori.

Stipa panicoides (vix *LaM.*) R. et S. II. p. 341. N. ab Es. Agr. bras. p. 376. Kth. rev. gr. tab. 122. (var. *parvula*); Agr. syn. p. 182 (excl. syn. *LaM.*? et Rich.).

Piptochaetium setifolium Presl. rel. Haenk. I. p. 222. tab. 37. f. 1. (panicula angusta, minori). *Stipa setifolia* Kth. Agr. syn. p. 182.

V. spp. Chil. Bras. merid.

Culmus sesquipedalis et minor, tenuis. *Folia* filiformi-setacea. *Panicula* bipollucaris, linearis-oblonga. *Gluma* utraque 5-nervis, aut inferior 5-, superior 3-nervis.

Urachne setosa. Glumis caudatis, perianthio ultra-(subsesqui-) lineali, striato, basi villis fere medium ipsius attingentibus cincto, tertiam partem vel subduplo longioribus; Arista tortili, flexuosula, inferne pubescente, glumis subtriplo longiori.

Stipa panicoides LaM. (omnino videtur!) — *St. ovata* Trin, l. l. — *St. bicolor*, β , 1. *N. ab Es.* Agr. bras. p. 373.

Oryzopsis setacea Rich. in Dict. class. T. XII. p. 445, cum tab. (planta pumila).
V. spp. Chil. Montevid.

Culmus 1 — 2-pedalis (aut minor). *Folia* setacea. *Panicula* sesqui — 4-pollicaris, contracta: plantae Chilensis atropurpurea, Brasilianae pallide virens aut e flavente et purpureo varia. *Glumae* 5-nerves, aut inferior 5-, superior 3 — 5-nervis.

b) *Perianthium ellipticum, aristam medio apice ferens.*

Urachne parviflora. Paniculae radiis in verticillo pluribus, multifloris; Perianthii, glumis acuminatis tertiam partem brevioris, glabri, arista glumis duplo longiori; Antheris barbatis.

Agrostis miliacea L. sp. pl. ed. 2. — *A. oseroensis* Seen! — *A. montis aurei Delarb.* — *A. Milium comosum* Poir. — *A. monandra* ht. Hafn.! —

Milium multiflorum Cav. — *M. arundinaceum* Sibth. — *M. frutescens* Sieb. — *M. pauciflorum* ht. Madr. (macrum). — *M. geditanum* ht. Gor.

Achnatherum miliaceum PB.

Piptatherum multiflorum PB. R. et S. II. p. 329. Kunth Agr. syn. p. 177. — *P. frutescens* Lk. En. — *P. comosum* R. et S. II. p. 330. mant. 2. p. 184.

Urachne parviflora Trin. Diss. I. p. 173. — *U. multiflora* et *frutescens* LK. ht. Berol.

V. spp. Hisp. Gall. Ital. Graec.*

Urachne caerulescens. Paniculae radiis binis solitariisque, multifloris; Perianthii, glumis acuminatis subduplo brevioris, glabri, arista intra glumas occulta; Antheris nudis.

Urachne caerulescens Trin. Diss. I. p. 174.

Milium caerulescens Schousb. — *M. purpureum* LaPeyr.

Agrostis caerulescens Poir.

Piptatherum caerulescens PB. R. et S. II. p. 328. Kunth. Agr. syn. p. 176.
V. spp. Hisp. Gall. Cret.

Urachne grandiflora. Paniculae radiis binis, multifloris; Perianthii, glumis acuminatis tertiam partem l. subduplo brevioris, pubescens, arista glumis tertiam quartamve partem longiori; Antheris barbatis.

Urachne grandiflora Trin. Diss. I. p. 174. Ledeb. Fl. alt. I. p. 78. Ic. tab. 221.
Agrostis holciformis MB!

Piptatherum holciforme R. et S. II. p. 328. Kunth Agr. syn. p. 177.
V. spp. Taur. Alt.

Urachne virescens. Paniculae radiis 2 — pluribus, multifloris; Perianthii, glumis acuminatis tertiam partem brevioris, pubescens, arista glumis quadruplo longiori; Antheris nudis.

Agrostis paradoxa L. sp. pl. ed. 1.

Milium paradoxum Scop.

Piptatherum paradoxum PB. R. et S. II. p. 328. Kunth. Agr. syn. p. 177.

Oryzopsis paradoxa Nutt. Journ. of the Acad. of Philad. III. p. 125.

Urachne virescens Trin. Diss. I. p. 173.

V. spp. Monsp. Carinth. Iber. Armen.

Urachne lanata. Paniculae radiis binis, plurifloris; Perianthii, glumis caudato-acuminatis tertiam partem brevioris, sericeo-lanati, arista glumis paulo longiori; Antheris barbatis.

Stipa membranacea Pursh. Kunth Agr. syn. p. 186. — *St. hymenodes R. et S.* II. p. 339. Mant. II. p. 188. — *St. villosa Walt?*

Eriocoma cuspidata Nutt.

Milium cuspidatum Sprgl. S. V. I. p. 251.

V. sp. Am. bor.

Glumae 5-nerves, obsolete pubescentes. Valvula inferior undique, praesertim inferne apiceque erecto-villosa. Valvula superior, apice brevi-cuspidata, medio dorso longitudinaliter villosa.

Urachne racemosa. Paniculae radiis binis, plurifloris; Perianthii, glumis acuminate paulo brevioris, pubescentis, arista glumis fere triplo longiori; Antheris nudis.

Milium racemosum Sm. Schult. Mant. II. p. 178.

Oryzopsis melanocarpa Mühlenb. — sub *O. asperifolia* Kunth. Agr. syn. p. 176.

Piptatherum nigrum Torr!

Urachne racemosa Trin. Diss. I. p. 174. — *U. melanosperma* Lk.

V. spp. Pennsylv.

Gluma inferior 9-, superior 5-nervis. Lodiculae squamae lanceolato-linnaeas, ovarium pilosum aequantes: anteriores 2, obtusiusculae; tertia dorsalis ovarii basi adhaerens, anterioribus sublongior, acuta.

Urachne brevicaudata. Paniculae radiis binis, plurifloris; Perianthii, glumas nunc acutiusculas nunc obtusas aequantis, pubescentis, arista glumis paulo longiori; Antheris nudis.

Stipa canadensis Poir. R. et S. II. p. 338. Kunth. Agr. syn. p. 180.

Stipa juncea Mchx.

Milium pungens Torr! Schult. Mant. II. p. 178.

Oryzopsis parviflora Nutt. Journ. of the Acad. of Philad. III. p. 125.

V. spp. Am. bor. (ad lacum Winnipeg II.).

Culmus circiter sesquipedalis, tenuis, subfiliformis, ad nodos 2, glabros, aequus l. leviter geniculatus, simplex, scabriusculus, superne longe nudus.

Vaginae laxiusculae, superiores lamina longiores, superne scabriusculae, cum foliis pallide glaucae. *Ligula* chartacea, exserta, acutiuscula, decurrentia. *Folia* erecta, perangusta, fasciculorum filiformia, culmea subsetaceo-involuta eorumve unum vel alterum planiusculum, lineam dimidiam latum, asperiuscula: fasciculorum dodrantalia — ultrapedalia; culmea strictiuscula: inferiora palmaria — bipollicaria, suprema breviora. *Panicula* 2 — 3-pollicaris, contractiuscula. *Radii* plerumque bini, altero latere scabri, superne (vel unus alterve non longe supra basin) di-vel trichofomi. *Pedicelli* apice subclavati. *Spiculae*,

maturae partim totae (cum glumis) deciduae, oblongae, bilineales, e viridi albentes vel amethystinae. *Glumae* plerumque persistentes, membranaceae, subaequales (inferior tamen nonnihil longior), acutiusculae, maturitate plerumque obtusae, glabrae, perianthium aequantes: inferior obsolete sub-9-, superior 3 — 5 — 7-nervis: nervo medio in plerisque solo subpercurrente, reliquis pl. min. abbreviatis. *Perianthium* caducum, callo brevi barbulato insidens, coriaceo-chartaceum, ellipticum, praesertim inferne et superne pubescens: Valvula inferior ex apice obtuso emitit aristulam brevem, rectam, scabram, deciduam, glumas paulo superantem. Valvula superior aequilonga. *Ovarium* oblongum, glabrum.

Urachne asperifolia. Paniculae (simplicissimae, racemiformi-linearis) radiis binis, subunifloris; Perianthii, glumas mucronato-acutas aequantis l. subexcedentis, pubescentis, arista glumis subsesquiloniori; Antheris barbatis.

Oryzopsis asperifolia Mchx. R. et S. II. p. 264.

Urachne asperifolia Trin. Diss. I. p. 174. — *U. leucosperma* Lk.

V. spp. Amer. bor.

Gluma inferior 9 — 11-, superior 7 — 9-nervis. *Perianthium* basi dense barbatum. *Lodiculae* squamae 3, lineari-lanceolatae, hyalinae: anteriores 2 praelongae (ovario glabro multo longiores), acutae; dorsalis, ovarii basi adhaerens, brevior, paulo angustior, obtusiuscula.

P A S P A L U M .

Racemi simplicissimi, nunc solitarii, nunc digitati l. jubato-paniculati. *Spiculae* hermaphroditae, clausae, 2 — 3 — 4-serialiter imbricatae. *Perianthium* pl. min. oblongum, coriaceum, muticum l. (rarissime) aciculatum.

Gramina: utriusque quidem orbi indigena, in recentiori tamen numero longe prevalentia, in antiquiori orientalia; potissimum tropica: in illo, septentrionem

versus, ad 40 (- 46), in hoc, meridiem versus, ad 35 et quod excedit, gradus descendantia, diversissimo solo familiaria, erecta l. repentina, magnitudine varia.

Folia linearia, saepe involuta; haud raro lanceolata.

Ligula membranacea, plerumque brevis et brevissima; saepe ciliaris.

Spiculae in racemis simplicibus, aut solitariis, aut digitatis, aut alternis vel jubato-paniculatis, ad axin partiale plerumque complanatum interdum foliaceum unilaterales, regulariter 2 — 3 — 4-serialis, pl. min. imbricatae, sessiles l. brevipedicellatae, axin dorso convexo spectantes, fronte planiores, orbiculatae, oblongae l. ellipticae, obtusae l. pl. min. acutae, clausae, hermaphroditae, (rarissime hemiologamæ).

Glumæ membranaceæ, flosculum aequantes vel superantes, aequilongæ, 3 — 5-nerves, aut inferior rarius brevior, concava, 5-nervis, superior planior 3-nervis. — Ob nervos, praesertim medios, saepe obsoletos, gluma inferior interdum non nisi 3 — 5-nervis invenitur, dum superior (flosculus neuter) nervis pluribus (5 — 7) gaudet. — Rarissime glumæ superiori subjecta glumula pusilla, ut in Panico).

Perianthium subsessile, pl. min. coriaceum (rarius chartaceum), orbiculatum, oblongum l. ellipticum, muticum aut aristulato-mucronatum l. apice barbulatum.

Valvula inferior concava superiore subaequilongam planiore amplectens.

Lodiculae squamae 2, breves, collaterales, subcuneato-quadratae, emarginatae.

Ovarium oblongum, glabrum. *Styli* 2. *Stigmata* plumosa.

Stamina 3. *Filamenta* brevia. *Antheræ* lineares.

Fructus caryopsis oblonga l. orbicularis, depresso-sculpta, libera (arcuata inclusa), eberbis, exsulca, scutello suo dimidio l. longior.

S u b d i v i s i o n e s:

- A.** *Spiculae* cum pedicello claviformi mediante toro calloso articulatae; *Perianthium* apice aciculatum, l. barbulatum — **HELOPUS.**

OBS. Ut Paspalum non nisi defectu glumae inferioris (paleae quintae — in speciebus nonnullis nihilominus vage adventitiae) a Panico distinguitur, ita gluma s. d. superior (flosculus neuter) in Helopode nonnunquam reapse bivalvis invenitur.

B. Spiculae cum pedicello absque toro junctae; Perianthio mutico, l. rarius apice barbulato — PASPALA genuina (exclusa Cabrera quae Panici subdivisio).

A. H E L O P U S Trin. Fund. Agr.

(Gramina plerumque ramosa, racemis alternis, rarius subconjugatis; Spiculis lanceolato-ellipticis, acutis l. acuminatis, semper villosulis et depressis; Perianthii elliptici, obtusissimi, glumis pl. min. brevioris, aristula l. coma inclusa).

Paspalum annulatum Flügg. Sesquipedale, decumbens. Racemis 10 — 15, alternis, pedunculatis sessilibusve; Axi communī partialibusque glabris (illove leviter pubescente); Spiculis ultralinealibus, acuminatis, 4 — 2-serialibus, laxis; Perianthio aristulato; Foliis linearibus, glabris.

Paspalum annulatum. R. et S. II. p. 303. Trin. ic. gr. XII. tab. 133.

Milium ramosum Retz.

Agrostis ramosa Poir.

Helopus laevis Trin. in Sprgl. n. Entd. II. p. 49.

Eriochloa? annulata Kth. Agr. syn. p. 73.

V. spp. Ind. or. Philipp. Bras.

Ramosum. *Vaginae* glabrae. *Ligula* ciliaris. *Folia* plana aut compresso-involuta, lineas 1 — 3 lata; spithamea — palmaria. *Axis communis* 3 — 4 pollicaris, teretusculus. *Racemi* interdum radiolosi (spiculae loco radiolus 3 — 4-florus). *Pedicelli* superne pilos exserentes aliquot, satis longos, apice clavulatos. *Glumae* 5-neives. *Perianthium* punctato-striatum, pallidum, aristula brevissima. — In speciminibus Brasilianis racemi sessiles, quorum inferiores in gram. orientali pedunculati; axis communis puberulus; pedicelli nudi.

Paspalum punctatum Flügg. 1 — 3-pedale, erectum. Racemis 5 — 12, sparsis, sessilibus; Axi communi partialibusque dense pubescentibus; Spiculis subbilinealibus, acuminatis, 4 — 2-serialibus, laxiuscule imbricatis; Perianthio aristulato; Foliis lanceolato-linearibus, glabris.

Paspalum punctatum. Trin. ic. gr. XIII. tab. 153.

Piptatherum punctatum PB. R. et S. II. p. 329. — *P. annulatum* Radd. Agr. bras. p. 30.

Milium punctatum L.

Agrostis punctata LaM.

Helopus pilosus Trin. Fund. Agr. p. 104.

Oedipachne punctata Lk.

Eriochloa punctata Hamilt. Kth. Agr. syn. p. 72.

V. spp. Ind. occ. Gajan. Bras.

Nodi pubescentes. *Vaginae*, excepta sauce, glabrae. *Ligula* ciliaris. *Folia*, 3 — 5 lineas lata, inferiora pedalia. *Axis communis* 3 — 6-pollicaris, angulatus. *Pedicellorum* pili longi, apice clavulati. *Glumae* et *Perianthium* ut in praecedente, sed aristula longior.

Paspalum succinctum. Palmare — pedale, adscendendo-prostratum. Racemis sub-6, alternis, sessilibus; Axi communi partialibusque puberulis; Spiculis ultralinealibus, acutissimis, 4 — 2-serialibus, laxiusculis; Perianthio aristulato; Foliis sublanceolato-linearibus, pubescentibus.

Paspalum, succinctum Trin. Diss. II. p. 199. ic. gr. XIII. tab. 156.

Eriochloa succinta Kunth Agr. syn. p. 73.

V. spp. Astrachan.

Culmi ramosi. *Vaginae* pubescentes. *Ligula* ciliaris. *Folia* linea latiora, 1 — 2-pollicaria. *Axis communis* sequi — tri-pollicaris, triquetus. *Racemi* (pl. min. pollicares) subadpressi, cum tota planta glaucescentes. *Pedicelli* pubescentes, pilis apicis brevissimis, attenuatis. Rel. ut in priori. *Aristula* brevis.

Paspalum tridentatum. Spithameum, adscendens. Racemis sub-3, alternis, sessilibus; Axi communi partialibusque hirsuto-pubescentibus; Spiculis bilinealibus, tridentato-mucronatis, biserialibus, subimbricatis; Perianthio aristulato; Foliis lanceolatis, glabris.

Paspalum tridentatum Trin. Diss. II. p. 119.

V. spp. Am. aequin.

Ramosissimum. *Vaginae* pubescentes. *Ligula* ciliaris. *Folia* e basi cordata lanceolata, sesqui — 3-lineas lata, pollice breviora — fere 2-pollicaria. *Racemi* pl. min. semipollicares. *Pedicellorum* brevissimorum pili attenuati. *Glumae* ultra medium usque pilosulae: inferior apice 3-dentata: dente medio productiori. *Perianthium* glomis dimidio brevius; aristula brevissima.

Paspalum obtusifolium Radd. Pl. min. pedale, repens l. adscendendo-erectum. Racemis 2 — 3, subconjugatis alternis, sessilibus; Axi communi partialibusque glabris; Spiculis subultrilinealibus (majoribusve), acutis, biserialibus, subimbricatis remotisve; Perianthio apice barbulato; Foliis linearibus l. oblongo-linearibus, (obtusis), ciliatulis.

Paspalum obtusifolium. Trin. ic. gram. X. tab. 115. — *P. barbatum* Schult. Mant. 3. p. 558.

Panicum ischaemoides Koen! in hbio Banks. (fide herb. ill. JACQUINI; nam longissime hoc gramen distat ab eo quod Retzius descriptis in Obs. IV. p. 17). *Helopodus barbatus* Trin. in Sprgl. n. Entd. II. p. 49.

V. spp. Ind. or. Bras.

Pl. min. ramosum, interdum late repens. *Vaginae*, excepta fauce, glabrae. *Ligula* membranacea, subobsoleta. *Folia* basi rotundata, semi-amplectentia, linea 3 — 7 lata: in gramine humiliori oblongo-linearia, 1 — 2-pollicaria, in altiori linearia, interdum spithama longiora. *Racemi* 1 — 2- (rarissime 4-) pollicares. *Pedicelli* brevissimi, glabri. *Spiculae* interdum ad nervos pilosulae, in majoribus remotiores. *Glumae* 5 — 7-nerves. *Perianthium* punctulato-striatum, albens.

Paspalum brachystachyum. Pl. min. 2-pedale, erectum. Racemis 2—4, alternis, sessilibus; Axi communi partialibusque hirsuto-pubescentibus; Spiculis sub-sesquilinealibus, acutissimis, biserialibus, imbricatis; Perianthio barbulato; Foliis linearibus, pubescentibus l., ut vaginæ, glabris.

Helopuss brachystachys Trin. ic. gr. XXIV. tab. 277.

? *Eriochloa distachya* Kth. n. gen. p. 95. tab. 30. (ubi vero perianthium glumis duplo brevius dicitur).

V. spp. Bras:

Culmus ad nodos barbulatos et infra racemos pubescens, interdum squarroso-ramosus. *Vaginæ* glabrae aut pilis rarissimis adspersae. *Ligula* ciliaris. *Folia* fasciculorum angustissima, pl. min. involuta, pubescentia; culmea plana, linea 2 lata, glabra vel pubescentia: inferiora spithamea et longiora. *Axis communis* tenuis, sesqui—bi-pollicaris. *Racemi* pollice breviores, distantes. *Pedicellorum* brevium villi extimi spiculam fere aequant. *Glumæ* 3—5-nerves: superior (flosculus neuter l. incompletus) plerumque bivalvis cum rudimentis staminum: valvula interiori subaequilonga, tenera, dissitæ binervi. *Perianthium* pallidum, tenuissime transversim rugulosum, glumis paulo brevius.

Paspalum ctenostachyum. 4—5-pedale, erectum. Racemis 3—6, alternis, sub-sessilibus; Axi communi partialibusque hirsuto-pubescentibus; Spiculis bi-linealibus, acutis, biserialibus, (pectinato-) imbricatis; Perianthio barbulato; Foliis linearibus vaginisque pubescentibus.

Helopuss grandiflorus Trin. ic. gr. XXIV. tab. 278.

V. spp. Bras.

Culmus totus, praesertim infra nodos et racemos, molliter pubescens, simplex l. basin versus ramos erectos emittens. *Vaginæ* totæ pubescentes. *Ligula* membranacea, brevissima, dorso pilis brevibus stipata. *Axis communis* fere spithameus. *Racemi* erecti, distantes, gilvescentes, 2-pollicares. *Pedicellorum* brevissimorum villi supremi spicula non multum breviores. *Glumæ*

obsolete 5-nerves: superior (flocculus incompletus) plerumque bivalvis, mascula; valvula interiori tenui-membranacea, paulo breviori. *Perianthium* glumis fere tertiam partem brevius, pallidum, punctulatum.

B. P A S P A L A G E N U I N A *).

a. *Spiculis pusillis vel minimis **).*

a. *Axi partiali spicula singula angustiori (=) vel ejusdem latitudinis (=).*

Paspalum granulare. Pedale, decumbens? Racemis conjugatis (sesquipolligaribus); Axi =, glabro; Spiculis pusillis, 2 — 3-serialibus, pedicellatis, oblongis, acutiusculis, pilosulis; Foliis linearibus vaginisque glabris.

Milium setaceum Koen! in hbio Banks.

Paspalum granulare Trin. in Sprgl. n. Entd. II. p. 47.

V. sp. Ind. or.

Culmus filiformis, inferne ramosus. *Vaginae* glabrae. *Ligula* oblonga, truncata. *Folia* linea lata, plana, inferiora sesquipolligaria. *Racemi* tenues, brevipedunculati. *Axis partialis* angustissimus. *Glumae* obtusiusculae: inferior 5 — 7-, superior 3 — 5-nervis. *Perianthium* acutiusculum.

Paspalum papillosum Sprgl.* Digitale — dodrantale, erectum. Racemis conjugatis (pollicaribus); Axi =, glabro; Spiculis minimis, biserialibus, subsessilibus, orbiculatis, papillosis; Foliis linearibus, villosis.

*) *Spiculae* in hac e^t sequente tribu dicuntur:

<i>pusillae</i> i. e. linea dimidia breviores.	<i>pedicellatae</i> i. e. pedicello spicularum longitudine.
<i>minimae</i> i. e. linea dimidia.	
<i>parvae</i> i. e. linea breviores.	<i>brevipedicellatae</i> i. e. pd. spicula circiter dimidiō breviori.
<i>lineales</i> i. e. linea longae.	
<i>magnae</i> } i. e. linearum 2 — 3.	<i>brevissime pedicellatae</i> i. e. pd. spicula multo breviori.
<i>maximae</i> }	

**) Species hujus subdivisionis, regensitae secundum racemorum numerum, incipiendo a racemis conjugatis progrediuntur per digitatos et alternos ad julgato-paniculatos.

Paspalum papillosum. Schult. Mant. II. p. 166. N. ab Es. Agr. bras. p. 51.

V. spp. Bras.

Erecto-ramosum. *Ligula* brevissima. *Folia* conferta, 1 — 3-pollicaria, lineam lata, acuminata. *Racemi* furcati. *Glumae* 3-nerves.

Paspalum Swartzianum Flügg. Sub-bipedale, erectum. Racemo solitario vel 2 — 3 subdigitatis (2 — 3-pollicaribus); Axi sub—, glabro; Spiculis subminimis, biserialibus, brevipedicellatis, ellipticis, obtusiusculis, cum Foliis angustissimo-linearibus vaginisque glabris.

Paspalum Swartzianum. R. et S. II. p. 297. — *P. lineare* Sw. ms. — *P. filiforme* Sw. Fl. Ind. occ.

V. sp. Ind. occ.

Gramen tenuer. *Folia* subfiliformi-linearia, tertiam lineae partem lata, doradantalia — sensim breviora. *Racemus* (in exemplo a me viso solitarius) falcatus, pertenuis, glaucescendo-viridis. *Spiculae* linea dimidia paulo longiores. *Gluma* inferior 5-nervis, nervis lateralibus marginalibus; superior 3-nervis. *Hermaphroditus* junior viridis.

Paspalum capillare Lam. Semipedale, pedale, adscendens. Racemis 2 — 7, subdigitatis (pollice brevioribus); Axi —, glabro; Spiculis minimis, biserialibus, sessilibus, ellipticis Foliisque lanceolatis glabris.

Paspalum capillare. R. et S. II. p. 301. Trin. ic. gram. IX. tab. 100. Kth. rev. gr. p. 199. tab. 11.

V. spp. Bras.

Ramosum. *Vaginae* carinato-compressoae. *Ligula* brevissima. *Folia* 1 — 2-pollicaria, lineas 1 — 2 lata. *Racemi* tenuissimi. *Glumae* 5-nerves. *Perianthium* fuscescens. — Lineolae pilosae spicularum, a cl. Kunth descriptae et delineatae, in nostris speciminibus nullae aut obsoletissimae.

Paspalum abstrusum. Pedale, decumbens. Racemis 2, alternis (4 — 5-linealibus); Axi —, glabro; Spiculis minimis, laxiuscule 2-serialibus, brevipedicellatis,

ellipticis, obtusis, glabris; Foliis angustissimo-linearibus vaginisque laxe longoque villosis.

V. sp. Bras. (Specimen unicum, cum gramine quodam alio complicatum).

Culmus filiformis, superne longe nudus. *Nodi* glabri. *Vaginae* laxe villosae: villis subpatentibus, e glandulis pusillis enatis. *Ligula* membranacea, brevissima, villis longis occulta. *Folia* circiter lineam dimidiata, eodem modo ac *vaginae* undique villosa: inferius spithameum. *Racemi* 2, dissite alterni, contracti, tenuissimi. *Axes partiales* basi fasciculo villorum satis longobarbati. *Spiculae* laxe et alterno-solitariae, pedicello ipsis dimidio breviori et pilosulo. *Gluma* inferior 5-, superior 3-nervis. *Perianthium* ellipticum, obtusissimum, saturate viride.

Paspalum serpens N. ab Es. Spithameum, adscendens. Racemis 3—4, alternis (semipollicaribus); Axi —, glabro; Spiculis pusillis, biserialibus, subsessilibus, oblongis, glabris; Foliis linear-lanceolatis, junioribus pilis adspersis.

Paspalum serpens N. ab Es! Agr. bras. p. 50.

V. spp. Bras.

Vaginae ad eras barbatae. *Ligula* nil nisi margo transversalis. *Folia* 1—sesqui-pollicaria, acuminata: majora sesquilineam lata, juniora vix linea dimidia latiora. *Racemus* inferior pl. min. *vaginatus*, reliqui basi barbati. *Glumae* perianthio parum longiores, binerves.

Paspalum pusillum Vent. Digitale — dodrantale, repens. Racemis subterris, alternis (semipollicaribus et ultra); Axi —, glabro; Spiculis minimis, biserialibus, perbrevi-pedicellatis, obovato-orbiculatis Foliisque linear-lanceolatis glabris.

Paspalum pusillum. R. et S. II. p. 298. Trin. ic. gr. XXIII. tab. 273. —

P. orbiculare Poir.

V. spp. Guian. Bras.

Ramosum. *Nodi* pilosi. *Vaginae* compressae. *Ligula* brevissima. *Folia* pl. min. pollicaria, sesquilineam lata. *Racemi* basi barbati. *Spiculae* vix acutiusculae. *Glumae* 3-nerves. *Perianthium* demum castaneum.

Paspalum parviflorum Rhode. Digitale — spithameum, erectum. Racemis 2 — 4, alternis (semipollicaribus); Axi =, scabro; Spiculis pusillis, biserialibus, pedicellatis, elliptico-orbiculatis, glabris; Foliis angustissimo-linearibus vaginisque hirsutissimis.

Paspalum parviflorum. R. et S. Il. p. 298. Trin. ic. gr. X. tab. 116.

V. spp. Bras. Ind. occ.

Dense et arctissime caespitosum, erecto-ramosum. *Ligula* brevissima. *Folia* erecta, 1 — 2-pollicaria. *Racemi* demum patentissimi, basi barbati. *Glumae* 2-nerves. *Perianthium* viride.

Paspalum arenarium Schrad. Spithameum — sesquipedale, adscendens. Racemis 1 — 2, alternis (sesquipollicaribus); Axi =, glabro; Spiculis minimis, biserialibus, pedicellatis, obovato-subrotundis, glabriusculis; Foliis subovato-lanceolatis, hirtis.

Paspalum arenarium. Schult. Mant. II. p. 172. N. ab Es. Agr. bras. p. 54. Trin. ic. gr. X. tab. 109. — *P. longepedunculatum* Lecont. — *P. debile* Mühlenb. Schult. Mant. II. p. 172.

V. spp. Bras.

Gramen siccum fuscum. *Nodi* glabri. *Vaginae* ciliatae. *Ligula* subciliaris. *Folia* inferiora pl. min. pollicaria, lineas 4^o lata, subamplexicaulia. *Pedunculi* communes elongati, tenues. *Glumae* obsolete 3-nerves. *Perianthium* viridi-pallens.

Paspalum caespitosum Flügge! Pedale, erectum. Racemis 3 — 4, alternis (pl. min. pollicaribus); Axi =, glabro; Spiculis subminimis, 3 — 4-serialibus, inaequaliter longepedicellatis, obovato-ellipticis, obtusis, glabris l. subpubescentibus; Foliis lanceolato-linearibus, glabris.

Paspalum caespitosum. R. et S. II. p. 308. Trin. ic. gr. XI. tab. 121.

V. spp. Ind. occ. Guian.

Nodi pubescentes. *Vaginae* glabrae. *Ligula* brevis, membranacea, pilosula. *Folia* palmaria — spithamea, $1\frac{1}{2}$ — 2 lineas lata. *Glumae* 3 — 5-nerves. *Perianthium* virescens, demum stramineum.

Paspalum hyalinum N. ab Es. Ultrapedale, erectum. Racemis 2 — 3, alternis (subpollicaribus); Axi —, glabro; Spiculis minimis, biserialibus, brevissime pedicellatis, oblongis, obtusis, glabris; Foliis subinvolutis, subdistichis, glabris l. basin versus tuberculato-ciliatis.

Paspalum hyalinum N. ab Es! Agr. bras. p. 49.

V. sp. Bras.

Culmus totus vaginatus. *Vaginae* compressae, glabrae. *Ligula* brevissima. *Folia* 3-, sensim semi-pollicaria, lineam lata. *Glumae* 3-nerves: nervo medio obsoleto. *Perianthium* pallidum.

Paspalum scalare. Pedale, obliquum? Racemis 1 — 4, conferto-alternis ($1 - 1\frac{1}{2}$ -pollicaribus); Axi —, glabro; Spiculis subminimis, 4-serialibus, subbrevipedicellatis, elliptico-oblongis, villoso-pubescentibus; Foliis sublanceolato-linearibus, patentissimo-distichis, glabris.

Paspalum scalare Trin. ic. gram. XXIII. tab. 274.

V. spp. Bras.

Totum pallidum. *Culmus* subfiliformis, distiche foliosissimus, superne adpresso-ramosus. *Vaginae* ad oras villosulae. *Ligula* brevissima, pilis coronata. *Folia* acuminata, 1 — 2-pollicaria; lineam lata. *Glumae* 3-nerves. *Perianthium* albens.

Paspalum paniculatum L. sp. pl. ed. 2. 2 — 3-pedale, erectum. Racemis 4 — 50, jubatis (3 — 1-pollicaribus); Axi —, glabro (l. setoso-ciliato); Spiculis minimis l. subparvis, 3 — 4-serialibus, inaequaliter pedicellatis, obovato-orbiculatis, pubescentibus; Foliis lanceolato-linearibus, glabris pilosulive.

Paspalum paniculatum. R. et S. II. p. 312 et 880. Trin. ic. gr. XI. tab. 127. —

P. strictum Pers. R. et S. II. p. 313. — *P. hemisphaericum* Poir. — *P. compressicaule* Radd. Agr. bras. p. 29.

V. spp. Ind. occ. Bras.

Nodi plerumque barbati. *Ligula* dense ciliaris. *Folia* semi — ultra-pedalia, medio pl. min. pollicem dimidium lata. *Juba* palmaris — spithamea, stricta. *Spiculae* obsolete acutiusculae. *Glumae* 3-nerves. *Perianthium* viridulum.

Paspalum malacophyllum. Tripedale et ultra, erectum. Racemis plurimis, jubatis (2 — 3-pollicaribus); Axi =, subglabro; Spiculis subminimis, 2 — 4-serialibus, inaequaliter brevipedicellatis, obovato-ellipticis, glabris; Foliis lanceolatis, molliter sericeo-pubescentibus.

Paspalum malacophyllum Trin. ic. gram. XXIII. tab. 271.

V. spp. Bras.

Nodi glabri. *Vaginae* inferiores glandulosae, marginem versus pilis molliibus hirsutae. *Ligula* brevissima. *Folia* acuminata, inferiora dodrantalia, pollicem lata, in pagina superiori subfuscresentia. *Jubae* pedalis axis pubescens. *Racemi* (30) basi barbati, margine hinc inde pilis adspersi. *Gluma* inferior 5-, superior 3-nervis. *Perianthium* chartaceum, fuscescendo-albens.

β. *Axi spicula latiori* (=).

Paspalum fluitans Kunth. Pedale, repens. Racemis plurimis, jubatis (pollicaribus); Axi =, foliaceo, glabro; Spiculis minimis, 2-serialibus, brevissime pedicellatis, lanceolato-ellipticis, acutis, pubescentibus; Foliis linear-lanceolatis glabris.

Paspalum fluitans Kth. rev. gr. p. 24. — *P. mucronatum* Mühlenb. Schult. Mant. II. p. 167.

Ceresia fluitans Ell.

V. sp. Am. bor.

Decumbens, multinode, ramosum, totum vaginatum. *Vaginae* compressae. *Ligula* membranacea, brevis. *Folia* pl. min. digitalia (inferiora breviora), latiora lineas 3 lata. *Jubae* e vaginis emergunt solitariae, 2—3-pollicares. *Racemi* subverticillati sparsique, tenues. *Spiculae* pallidae. *Glumarum*, perianthium excedentium, nervi obsoleti.

b. *Spiculis pl. min. linealibus (parvis — magnis maximisque).*

a. *Axi partiali spicula singula angustiori (=) vel ejusdem latitudinis (=) *).*

Paspalum aspidiotes. 2—3-pedale, erectum. Racemis 2, conjugatis (2—3-pollicaribus); Axi =, glabro; Spiculis maximis, biserialibus, sessilibus, cordatis, acutis Foliisque sublanceolato-linearibus glabris.

Paspalum aspidiotes Trin. ic. gram. XXIII. tab. 269.

V. spp. Bras.

Vaginae teretes, glabrae. *Ligula* membranacea brevissima. *Folia* linearia l. fere lanceolato-linearia, attenuata, lineas 3—4 lata, plana l. siccitate involuta, subcoriacea, pl. min. dodrantalia. *Racemi* crassi, gilvi. *Axis* partialis apice attenuato flores excedens. *Spiculae* depresso-complanatae, 3-lineales. *Glumae* inferior 7-nervis, cordata, superior angustior, 3-nervis, leviter scrobiculata. *Perianthium* chartaceum, glumis multo angustius et brevius, pallens, ad latera pubescens, apice barbulatum.

Paspalum pectinatum N. ab Es. Sesqui—3-pedale, erectum. Racemis conjugatis l. cum tertia inferiori (ultrabipollicaribus); Axi =, glabro; Spiculis maximis, biserialibus, subsessilibus, elliptico-cordatis, obtusiusculis, pectinato-ciliatis; Foliis linearibus, hirsutis.

Paspalum pectinatum N. ab Es. Agr. bras. p. 34. Trin. ic. gr. X. tab. 110.

V. spp. Bras.

*) Species hujus subdivisionis, recensitae secundum racemorum situm, a racemis conjugatis l. subconjugatis progrediuntur per digitatos — approximato-flabatos ad disse alertos.

Culmus tenuis. *Vaginae* teretes, glabrae aut apicem versus hirsutae. *Ligula* membranacea, brevis. *Folia* subcoriacea, radicalia perangusta, culmea lineas 3 et qu. exc. lata: inferiora spithamea l. digitalia. *Spiculae* 3-lineales. *Glumae* 3-nerves: inferior basi cordata, superior, angustior et paulo brevior, e margine glanduloso pilis longis pectinata; (sub hac interdum glumula pusilla). *Perianthium* glumis angustius, albens, inferne apiceque pilosulum.

Paspalum notatum Flügg. 1 — 2-pedale, erectum. Racemis conjugatis l. 1 — 2 approximatis (1 — 3-pollicaribus); Axi =, glabro; Spiculis 1 — 2-linearibus, biserialibus, brevi-brevissimeque pedicellatis, ovato-(obovato-) oblongis l. ellipticis, pl. min. obtusis, nudis; Foliis linearibus, glabris pilosisve.

Paspalum notatum. R. et S. II. p. 299. Trin. ic. gr. X. tab. 114. — *P. distichum* Sw.

* Racemis gracilioribus, spiculis maculatis:

Paspalum maculosum Trin. Diss. II. p. 98. ic. gr. X. tab. 113.

V. spp. Bras.

Ligula brevissima. *Folia* linearia l. sublanceolato-linearia, acuta, lineas 1 — 2 lata, inferiora in planta majori fere pedalia, in minori brevia. *Axes partiales* basi quandoque nigro-notati. *Gluma* inferior 5-, superior 3-nervis. *Perianthium* viridi-albens l. stramineum. — Varietatis *maculosa* culmus altior, folia angustiora, magis acuminata, racemi graciliores, basi barbatae, glumae fusco-maculatae.

Paspalum vaginatum Sw! Pl. min. pedale, repens. Racemis conjugatis l. tertio quartove approximato (1 — 2-pollicaribus); Axi =, glabro; Spiculis linearibus majusealisve, biserialibus, brevissime pedicellatis, ovato-oblongis, acutis, glabris l. subpubescentibus; Foliis linearibus, planis l. subinvolutis.

Paspalum vaginatum. R. et S. II. p. 299. Trin. ic. gram. X. tab. 120.

* Foliis longioribus, involutis:

Paspalum littorale Br! R. et S. II. p. 316. Trin. ic. gram. X. tab. 112. —

P. longiflorum Pal. Beauv. Fl. d'Ow. p. 46. tab. 85. f. 2. (omnino videtur! non *P. vaginatum* tab. 92. f. 1.)

V. spp. Am. bor. Ind. occ. Chil. Bras. Radak (Inss. Mulgr.) N. Holl. Mascar.

Pl. min. ramosum. *Vaginae* carinato-compressae. *Ligula* membranacea, exserta. *Folia* palmaria — pollicaria, lineam lata, in * involuta. *Glumae* 3-nerves l. inferior 5-nervis. *Perianthium* glumis plerumque nonnihil brevius, apice obtusiusculo barbulatum vel, rarius, nudum et acutiusculum.

Paspalum distachyon Poit. Ultra-pedale, assurgens. Racemis 2, conjugato-digittatis (pedunculatis, subpollicaribus); Axi =, glabro; Spiculis linealibus, biserialibus, brevissime pedicellatis, sublanceolato-ovatis, acutis Foliisque subuliformi-linearibus glabris.

Paspalum distachyon Poit! ined. in hbio Mertensii patr.

V. sp. Doming.

Totum pallescens assurgit ex ima basi contracto-ramosum: ramis floriferis, subaequalibus. *Vaginae* teretes, superne carinato-compressiusculae, glabrae. *Ligula* brevissima, subciliaris. *Folia* stricto-erecta, inferne compressa, medium versus planiuscula, subulato-attenuata, latiora lineam lata, fere sesquipalmaria, superiora sensim minora. *Racemi* pollicares vel vix pollicares, erecti, arcte contracti, pedunculis 2 — 3-linealibus insidentes, subaequales, angusti, pallidi. *Axis partialis* flexuosus. *Spiculae* alternae, appressae. *Glumae* 3-nerves, aequales (glumulae exterioris tertiae in pluribus rudimentulum truncatum). Hermaphroditus glumas aequans, acutiusculus, laevissimus, albens.

Paspalum conjugatum Berg. Pedale et ultra, repens l. assurgens. Racemis conjugatis l. terris approximatis (sesqui — 4-pollicaribus); Axi =, glabro; Spiculis parvis l. sublinealibus, biserialibus, brevissime pedicellatis, orbiculato-ovatis, acutis, margine pl. min. villosulis; Foliis linear-lanceolatis, glabris ciliatulisve.

Paspalum conjugatum. R. et S. II. p. 298. Trin. ic. gr. IX. tab. 102. P. Beauv. Fl. d'Ow. tab. 92. f. 2. — *P. tenue* Gaertn. — *P. ciliatum* Lam.

V. spp. Ind. occ. Bras.

Vaginae compressae, fauce interdum pilosulae. *Ligula* margo angustissimus, barbulatus. *Folia* majora medio lineas 6 lata, bipollucaria — spithamea. *Racemi* graciles. *Spiculae* lenticulari-depressae. *Glumae* 3-nerves, nervo medio obsoleto. *Perianthium* albo-virescens.

Paspalum eucomum N. ab Es. 1 — 2-pedale, erectum. Racemis conjugatis (sesqui — ultra-3-pollicaribus); Axi —, glabro villosulove; Spiculis linealibus, biserialibus, brevissime pedicellatis, ovatis, acutiusculis, villosissimis; Foliis linearibus involutisve, hirsutis.

Paspalum eucomum N. ab Es! Agr. bras. p. 37. Trin. ic. gram. X. tab. 110.

V. spp. Bras.

Nodi 5 — 6, glabri. *Vaginae* teretes, exceptis supremis pilosae. *Ligula* ciliaris. *Folia* superne subulata: inferiora plana, lineas 2 lata, spithamea. *Racemi* plerumque contracti et horizontales. *Glumae* 3-nerves. *Perianthium* pallide viride.

Paspalum fastigiatum N. ab Es. Pedale, fastigiato- et conferto-ramosissimum. Racemis 2 conjugatis l. 1 — 3 approximatis (pl. min. sesquipollucaribus); Axi —, glabriuscule; Spiculis bilinealibus, biserialibus, sessilibus, linearilanceolatis, margine hirsutis; Foliis angusto-linearibus, pubescendo-pilosis.

Paspalum fastigiatum N. ab Es! Agr. bras. p. 33. Trin. Diss. II. p. 100.

V. sp. Bras.

Culmus in ramos multos erecto-adpresso divisus. *Vaginae* teretiusculae. *Ligula* brevissima, ciliatula. *Folia* lineam lata, pollices 2 longa. *Racemi* contracti. *Spiculae* acutae. *Gluma* inferior 5-nervis: nervo dorsali obsoleto, lateralibus longe ciliatis; superior obsoleta 2-nervis. *Perianthium* pallidum.

Paspalum guttatum. Pl. min. bipedale, erectum. Racemis 2 conjugatis vel 3 digitato-approximatis (3 — 4-pollicaribus); Axi —, pilosulo; Spiculis

sesqui — bi-linealibus, biserialibus, brevissime pedicellatis, elliptico-oblongis, acutiusculis, sericeo-villosissimis; Foliis involutis, glabris pilosive.

Paspalum guttatum Trin. Diss. II. p. 91. Ic. gr. IX. tab. 104. N. ab Es. Agr. bras. p. 37.

V. spp. Bras.

Culmus gracilis. *Nodi* 4, glabri. *Vaginae* teretes, glabrae, aut apicem versus pilosae. *Ligula* margo angustissimus, pilis brevibus coronatus. *Folia* infima ultrapedalia. *Racemi* contractiusculi, nutantes. *Glumae* 3-nerves, maculis atrosanguineis conspersae. *Perianthium* e viridi albens.

Paspalum campestre. Pedale, erectum. Racemis 2, approximatissimo-alternis (1 — 2-pollicaribus); Axi =, glabro; Spiculis linea brevioribus, biserialibus, brevissime pedicellatis, oblongis, obtusiusculis, glabris; Foliis lan-ceolato-linearibus, pubescendo-pilosis.

V. spp. Bras.

Culmus simplex, non nisi ex ima basi caespitoso-subramosus, compressus, spithameus — ultrapedalis. *Nodi* 2 — 3, glabri. *Vaginae* compressae, pilosae. *Ligula* brevissima, membranacea, ciliis brevissimis stipata. *Folia* circa basin conferta, erecto-patula, pl. min. bipollicaria, acuta, sesquilineam et qu. exc. lata, cum rel. partibus fuscescendo-canescens: culmea compressa, pauca, breviora, supremum vix ullum. *Racemi* patuli. *Glumae* subobsolete 3-nerves: (subinde tertia pusilla adventitia). *Perianthium* virescens, tenuissime punctulato-striatulum.

OBS. Non nisi cum *Pasp. setaceo* confundi posset, cui vero racemi (si uno plures) distantes, longiores, spiculae longius pedicellatae. — Varietas? minor, racemis vix pollicaribus, Spiculis magis obovatis, Foliis iisdem, sed glabris (in graminosis humidiusculis prope Rio Jan.)

Paspalum scrobiculatum L. Mant. 1 — 2-pedale, ramoso-erectum. Racemis 2 — 3, approximato-alternis (pl. min. bipollicaribus); Axi =, glabro; Spiculis linea paulo majoribus, biserialibus, brevipedicellatis, oblongo-subrotundis, acutiusculis Foliisque linearibus glabris.

Paspalum scrobiculatum α et β , R. et S. II. p. 296. (excl. syn. Willd. sp. plant.). N. ab Es. Agr. bras. p. 58. Trin. Diss. II. p. 122, α . Ic. gr. XII. tab. 143. (ubi culmus perperam repens depictus est). — *P. Commersonii Lam.* — *P. frumentaceum Rottl.* — *P. Kora W.* ht. Berol.

V. spp. Ind. or.

Pedunculi floriferi terminales et axillares. *Vaginae* glabrae (basi hirsutae, ciliatae, *L. Mant.* I. p. 29). *Ligula* linea brevior, rotundata. *Folia* subacuminata, spilhamaea — palmaria, linea latiora. *Racemi* plerumque 2, approximati, crassiusculi. *Axis partialis*, marginibus deflexus, spicula singula latior vix dici potest. *Glumae* (5—) 7-nerves: nervis inter laterales mediumque abbreviatis; superior ad latera scrobiculato-plicatula. *Perianthium* fuscum.

Paspalum distichophyllum Hb. Kth. Ultrapedale, stolonifero-adscendens. Racemis 2—3, approximatis (pl. min. sesquipollicularibus); Axi =, ciliatulo; Spiculis linealibus, 3—4-serialibus, brevi-pedicellatis, lanceolato-ellipticis, acutiusculis, longo-pilosissimis; Foliis linear-lanceolatis, glabris, distichis.

Paspalum distichophyllum. R. et S. II. p. 291. Kunth Agr. syn. p. 41. —

P. polypyllum N. ab Es! Agr. bras. p. 41. Trin. Diss. II. p. 114. Ic. gr. XII. tab. 141.

V. spp. Bras.

Culmus tenuis, multinodis, foliosissimus. *Vaginae* teretiusculae, glabrae. *Ligula* membranacea, brevis, dorso pilis stipata. *Folia* acuminata: juniora et fasciculorum angusta, molliter pubescentia, culmea disticho-patentia, lineas 2 lata, glabra: inferiora pl. min. bipollicularia. *Axis communis* circiter semipollicularis. *Racemi* basi barbati, demum patentibus. *Glumae* 3—5-nerves: inferior marginibus villosissima. *Perianthium* albens, apice barbulatum.

Paspalum angustifolium N. ab Es. Bipedale, erectum. Racemis 2—3, approximatis (pollicularibus); Axi =, glabro; Spiculis 1—2-linealibus, biserialibus, brevi-pedicellatis, oblongis ellipticisve, obtusiusculis, glabris; Foliis subfiliformi-angustis, aut totis aut inferne hirsutulis.

Paspalum angustifolium N. ab Es! Agr. bras. p. 64. Trin. Diss. II. p. 99.

Ic. gr. X. tab. 111. — *P. lineare* Trin. Diss. ibid. (varietas grandiflora). —

P. Neesii Kunth Agr. syn. p. 48.

V. spp. Bras.

Nodi barbati. *Ligula* brevis. *Folia* radicalia bipedalia, culmeum inferius circiter semipedale. *Racemi* crassiusculi. *Glumae* 5-nerves: superior interdum transversim undulata. *Perianthium* pallidum, punctulatum.

Paspalum flaccidum N. ab Es. Bipedale, erectum. Racemis 1 — 2 — 6, approximatis, subfastigiatis (sesqui — bi-pollicaribus); Axi =, glabro; Spiculis linealibus, 2 — 3-serialibus, brevi-l. brevissime pedicellatis, obovato-oblongis, obtusis; Foliis angustissimo-linearibus, viloso-pubescentibus.

Paspalum flaccidum N. ab Es! Agr. bras. p. 48.

V. sp. Bras.

Culmus 3-nodis, superne longe nudus. *Vaginae* apicem versus villosae. *Ligula* brevis. *Folia* subdecorticalia, subfiliformi-linearia. *Axes partiales* basi barbatae. *Glumae* 3-nerves: inferior perianthio pallido, punctulato-striato brevior. — *Habitus* praecedentis.

Paspalum platycaulle Poir. Pedale et longius, decumbendo-adscendens. Racemis 2 — 5 subdigitatis, l. cum inferiori solitario remoto (1 — 2-pollicaribus); Axi =, glabro; Spiculis subparvis linealibusve, biserialibus, subsessilibus, ellipticis, obtusis acutiusculisve, glabris ciliatulisve; Foliis latiusculo-lineari- bus l. e basi ovata sublanceolatis, glabris l. ciliatulis.

Paspalum platycaulle. R. et S. II. p. 300. Trin. Diss. II. p. 95. Ic. gr. X. tab. 118. fig. B. — *P. tristachyum* Lam. — *P. laticulatum* Sprgl. — *P. compressum* N. ab Es! Agr. bras. p. 23.

? *Milium compressum* Sw!

* Spiculis acutiusculis, foliis e basi ovata lanceolatis, ciliatulis, pedunculis tenuioribus (Trin. ic. l. l. fig. A.)

Paspalum complanatum N. ab Es! l. l. p. 22.

V. spp. Peruv. Bras.

Culmus 1 — 2-nodis. *Vaginae* carinato-compressae. *Ligula* brevissima. *Folia* obtusiuscula, spithamea — palmaria, in humilioribus 2-pollicaria et breviora, lineas 2 — 4 lata. *Pedunculi* e vagina 1 — 2 — 5, elongati, filiformes, compressi, plerumque tenuissimi. *Racemi* subfastigiati, tenues. *Glumae* 3-nerves, aut superior 5-nervis; nervo medio saepe obsoleto. *Perianthium* albens l. spadiceum, tenerrime punctulatum. — Specimen a Swartzio missum *Mili compressi* sui spiculas habet subparvas, ciliatulas, acutiusculas; hermaphroditum glumis paulo breviorem, apice pilo uno alterove subbarbulatum. Axis spicula paulo angustior. Folia linearia acuta. Digitariam refert! an reapse synonymon *Pasp. platycaulis*?

Paspalum dissitiflorum. Pedale, erectum. Racemis 2 — 3, subdigitatis (2 — 4-pollicaribus); Axi sub =, longe ciliato; Spiculis linealibus magnisve, laxe biserialibus, subsessilibus, linearis-ellipticis, acutis, viloso-hirsutis; Foliis angustissimis, canaliculatis, pilosis.

Paspalum dissitiflorum Trin. Diss. II. p. 92. Ic. gr. IX. tab. 103. N. ab Es.

Agr. bras. p. 32.

V. spp. Bras.

Culmus tenuis. *Vaginae* teretiusculae, glabrae. *Ligula* margo angustissimus, ciliaris. *Folia* mucronata, canaliculato-compressa, e glandulis minimis pilosa: infima spithamea. *Racemi* contractiusculi, erecti, albo-flaventes. *Glumae* 3 — 5-nerves. *Perianthium* acutum, fuscescens.

Paspalum marginatum. Pedale, erectum. Raëmis 4 — 5, subdigitatis (subsesquipollicaribus); Axi =, glabro; Spiculis linealibus, biserialibus, subsessilibus, linearis-ellipticis, obtusiusculis, margine hirtis; Foliis angusto-linearibus, hirsutis.

Paspalum marginatum Trin. Diss. II. p. 90. Ic. gr. IX. tab. 105. N. ab Es.

Agr. bras. p. 28.

V. spp. Bras.

Culmus subsiliiformis, nodis 2 — 3, glabris. *Vaginae* carinato-compressae, pl. min. pilosae. *Ligula* brevissima, dense barbata. *Folia* acutiuscula, compressa, pl. min. palmaria, undique hirsuta. *Glumae* 5-nerves: inferioris nervo medio obsoleto. *Perianthium* apice barbulatum, albens.

Paspalum maritimum. 1 — 3-pedale, basi late repens. Racemis 2 — 10, approximato-alternis, superioribus fastigiatis (2 — 3-pollicaribus); Axi sub =, glabro; Spiculis parvis, 4-serialibus, brevi-brevissimeque pedicellatis, obtusatis, obtusiusculis, pubescentibus; Foliis e basi cordata lanceolatis l. sublanceolato-linearibus, glabris basive pilis aut ciliis adspersis.

V. spp. Bahiens.

Culmus stolones praelongos emittens, ad nodos tomentosos, foliis brevissimis cordatis l. cordato-lanceolatis dissite vestitos. *Rami* e stolonum nodis enati erecti vel obliqui, compressi. *Vaginae* compressae, tumidiusculae, glabrae, in colli dorso carinato-compresso barbatae. *Ligula* membranacea, brevis. *Folia* ramorum florentium brevia (pl. min. pollicaria): inferiora lineas 4 lata, superiore et juniora compressa, magis linearia: illa interdum subnulla, haec fere spithamea. E vagina suprema tumidiuscula *pedunculi* 2: alter poly-, alter oligostachyus, elongati. *Glumae*, excepto ipso margine, enerves. *Perianthium* oblongo-subrotundum, obtusum, brevissimum.

Obs. Refert quodammodo *Pasp. platycarpe* robustius l. vegetum. Totum gramen siccum fuscum.

Paspalum laxiflorum. Bipedale et ultra, erectum. Racemis 8 — 10, approximato-alternis, subfastigiatis (3 — 2-pollicaribus); Axi =, glabro; Spiculis linearibus, laxe biserialibus, pedicellatis l. subbrevi-pedicellatis, linear-ellipticis, obtusiusculis Foliisque subcylindraceo-involutis glabris.

V. spp. Bras.

Culmus compressus, strictiusculus, nodis 1 — 2, puberulis. *Vaginae* ad basin culmi confertae, inferne sericeo-pubescentes, carinato-compressae, subcoriaceae, culmeae 2 glabrae. *Ligula* brevissima, ciliaris. *Folia* coriacea, strictissima, basi compressa et hirsuta; deinceps cylindraceo-involuta, glabra:

inferiora sesquipedalia. *E* vagina suprema pedunculi 2, satis longi, inaequales, compressiusculi. *Axis communis* sesquipollicaris, tenuis. *Racemi* valde laxeflori, axi pertenui. *Spiculae* pallidae. *Glumae* 5-nerves, — (*Spiculam* in hoc aliquam bifloram vidi, flosculis prorsus homogeneis).

Paspalum saccharoides N. ab Es. Orgyale, erectum. Racemis plurimis, approximatissimis, fastigiatis (inferioribus dodrantalibus); Axi ==, glabro; Spiculis linealibus, biserialibus, brevipedicellatis, lanceolatis, acutissimis, sericeo-villosis; Foliis linearibus, glabris.

Paspalum saccharoides N. ab Es. in Sieb. Agrostoth. no. 137. Trin. ic. gr. IX. tab. 107.

Saccharum polystachyum Sw. R. et S. II. p. 287.

Panicum saccharoides Klh. rev. gr. p. 237. tab. 30. Agr. syn. p. 125.

V. spp. Ind. occ.

Vaginae teretiusculae, glabrae aut superne hirsutae. *Ligula* margo angustissimus, villis longis ciliatus. *Folia* acuminatissima, lineas 4 — 6 lata, pl. min. pedalia. *Axis communis* circiter palmaris. *Racemi* graciles: inferiores semiverticillati, pl. min. pedunculati, superiores sparsi. *Glumae* 2-nerves: inferior ad latera longo- sericeo-villosa, superiori interdum subjecta glumula brevissima. *Perianthium* chartaceum, pallide prasinum.

Paspalum suffultum Mik. 1 — 3-pedale, erectum. Racemis 3 — 30, approximatis, subfastigato-jubatis (digitalibus — spithameis); Axi ==, glabro l. sub spiculis pilifero; Spiculis linealibus parvisve, biserialibus, lineari-ellipticis, subsessilibus l. brevissime-pedicellatis (binervibus), cum Foliis compresso-linearibus glabris, hisve basi ciliatis.

Paspalum suffultum Mik! in Sprgl. n. Entd. II. p. 46. N. ab Es. Agr. bras. p. 26. Trin. Diss. II. p. 90. Ic. gr. IX. tab. 108.

V. spp. Bras.

Culmus 3 — 4-nodis. *Vaginae* compressae. *Ligula* brevissima, ciliaris l. membranacea. *Folia* subcoriaceo-firma: fasciculorum palmaria — spithamea,

culmea inferiora dodrantalia — pedalia. *Pedunculi* e vagina suprema 2, satis longi. *Axis communis* 1 — 2 — 3-pollicaris. *Racemi* tenues. *Spiculae* obtusae aut acutiusculae, subimbricato-biseriales, basi plerumque pilis stipatae. *Glumae* binerves (nervo medio evanido). *Perianthium* castaneum, basi album, tenuissime punctulatum.

Paspalum barbatum N. ab Es. 1 — 6-pedale, erectum. Racemis pluribus plurimisve approximatis, subfastigiatis — (vel jubato-sparsis, patentibus) — (5 — 7-pollicaribus); Axi — vel sub —, glabro; Spiculis pl. min. linealibus, biserialibus, linear-ellipticis, brevissime pedicellatis, glabris ciliolatisve (5-nervibus); Foliis subfiliformi-involutis (l. planis), glabris hirsutisve.
a) Racemis erectis, subfastigiatis, basi tomentoso-barbulatis; culmo humiliori; nodis pubescentibus, vaginis apice pilosis:

Paspalum barbatum N. ab Es! Agr. bras. p. 27. Trin. ic. gr. IX. tab. 98. —

P. barbigerum Kth. Agr. synopt. p. 45.

Idem, foliis inferioribus dense hirsutis.

b) Racemis adultioribus patenti et dissitiusculo-jubatis (juba ultrapedali), basi nudis; culmo elato; nodis vaginisque apice obsoletius barbatis glabrisve; foliis saepe planis.

V. spp. Bras.

Culmus 3 — 4-nodis. *Vaginae* aut subpresso-teretiusculae aut teretes. *Ligula* brevissima. *Folia* angustissima, in a subfiliformi-involuta, in b-superne saepe explanata: inferiora pro statuta pedalia — bipedalia. *Racemi* satis graciles, in gramine humiliori circiter 10, contracto-erecti; in altiori (8) 30 — 40, ad axin communem tenuem, dodrantalem jubato-sparsi, subhorizontali-patentes. *Spiculae* in hac varietate minus arcte quam in genuino Neesii gramine imbricatae, ceterum ex toto eadem. *Glumae* 5- (7-) nerves. — Gramen, quod var. b diximus, aperte nil nisi Neesianum, vegetatione uberiori magis explicatum.

Paspalum fasciculatum Willd. 3 — 6-pedale, erectum l. procumbens. Racemis 6 — plurimis, approximatis, subfastigiatis (2 — 4-pollicaribus); Axi —, glabro; Spiculis sub- 2-linealibus, 2 — 3-serialibus, brevissime pedicellatis, ellipticis, acutissimis, subpubescentibus; Foliis lanceolato-linearibus, glabris l. inferne pilosulis.

Paspalum fasciculatum. R. et S. II. p. 292. Trin. ic. gr. XXIII. tab. 270.
Kth. Agr. syn. p. 44.

V. spp. Bras.

Culmus compressus: procumbens inferne valde ramosus, erectus pl. min. simplex. *Vaginae* compressae, dorso superne pilosulae, interdum fauce ciliatae. *Ligula* brevissima: in planta glabra membranacea, in pilosula ciliaris. *Folia* acuminata, glabra aut inferne ad nervum carinalem pilosula, pro statura graminis lineas 4 — 9 lata, spithamea — pedalia. Racemi 6 — 30, plerumque basi barbati, jubam constituunt communiter lato-ovatam, palmarem — dodrantalem. *Spiculae* plerumque, praesertim marginem versus, villis adspersae. *Glumae* 3 — 5-nerves. *Perianthium* albens.

Paspalum pellitum N. ab Es. 4 — 5-pedale, erectum. Racemis plurimis, approximatis, contracto-jubatis (inferioribus dodrantalibus); Axi —, glabro; Spiculis subparvis (vix linealibus), biserialibus, brevissime pedicellatis, lanceolato-ellipticis, pubescentibus glabriusculisve; Foliis involuto-linearibus vaginisque molliter sericeo-tomentosis.

Paspalum pellitum N. ab Es! Agr. bras. p. 29. Trin. ic. gram. IX. tab. 106.
V. spp. Bras.

Culmus, totus vaginis vestitus, crassus. *Vaginae* teretes, tomento mollissimo fulvescente l. griseo vestitae. *Ligula* brevissima, villis sericeis dense coronata. *Racemi* graciles, contracti (nec fastigiati) jubam constituunt dense angustatam, ultrapedalem, basi vaginatam. *Spiculae* longe plerumque pubescentes. *Glumae* 5- (7-) nerves. *Perianthium* glauco-canescens.

Paspalum stoloniferum Bosc. Subbipedale, decumbens. Racemis plurimis, approximatis, jubatis (1 — semi-pollicaribus); Axi = (foliaceo), ciliatulo; Spiculis linealibus, biserialibus, brevissime pedicellatis, lanceolato-oblongis, acutis, undulatis, apice penicillatis; Foliis (oblongo-) lanceolatis, glabris.

Paspalum stoloniferum. R. et S. II. p. 295. — *P. racemosum* Jacq. — *P. purpureum* Rz. et Pav.

Milium latifolium Cav.

V. spp. Chil.

Ligula membranacea, brevissima. *Juba* circiter palmaris, densiuscula, angusta. *Axes partiales* undulati. *Glumae* perianthio duplo longiores, 5-nerves: nervis lateralibus submarginalibus, inferioris intermedio obsoleto.

Paspalum cristatum. Pedale et longius, decumbens. Racemis plurimis, approximatis, jubatis (pollice brevioribus); Axi =, glabriusculo; Spiculis linealibus, biserialibus, brevissime pedicellatis, ovato-ellipticis, obtusiusculis, aequis, nudis. Foliis (lineari-) lanceolatis, pubescentibus.

V. spp. Chil.

Simillimum stolonifero, differt glumis aequis, apice pl. min. obtuso nudis, aequali-3-nervibus, perianthio paulo tantum longioribus.

Paspalum densum Poir. 4 — 5-pedale, erectum. Racemis plurimis, approximatis, jubatis (5 — 2-pollicaribus); Axi =, margine pilifero l. nudo; Spiculis linealibus, 4-serialibus, inaequaliter pedicellatis, subrotundo-ovatis Foliisque lato-linearibus glabris.

Paspalum densum. R. et S. II. p. 353. Trin. Diss. II. p. 104. Ic. gr. XI. tab. 122.

V. spp. Ind. occ. Bras.

Vaginae compressiusculae, superne carinatae. *Ligula* dense ciliaris. *Folia* acuminata, lineas 6 — 7 lata, inferiora 2-pedalia. *Juba* spithamea l. dorantalis e racemis saepe 60. *Spiculae* magis rotundae quam in specie sequente.

Glumae 3-nerves.

Paspalum virgatum L. sp. pl. ed. 2. 3 — 4-pedale, erectum. Racemis 6 — 50, subapproximatis, jubatis (5 — 4 — 1-pollicaribus); Axi =, glabro l. margine pilifero; Spiculis linealibus majusculisve, 4-serialibus, inaequaliter pedicellatis, oblongo-ovatis, pubescentibus (glabrisve); Foliis sublanceolate-linearibus, glabris.

Paspalum virgatum. R. et S. II. p. 314. Trin. ic. gram. XI. tab. 151. 132.

Kth. Agr. syn. p. 61.

V. spp. Bras.

Nodi 3 — 5, glabri. *Vaginae* teretiusculae. *Ligula* brevissima, ciliaris. *Folia* acuminata, lineas 6 — 10 lata, 1 — 2-pedalia. *Racemi* crassiusculi, pl. min. approximati, jubar formant dodrantalem — pedalem. *Spiculae* obsolete acutiusculae, superne longe pleramque pubescentes. *Glumae* 5-nerves. *Perianthium* fuscescens.

Paspalum Lagascae R. et S. II. p. 317. 3 — 5-pedale, erectum. Racemis 3 — 50, subapproximatis distantibusve, jubatis (2 — sesqui-pollicaribus); Axi =, glabro l. margine pilifero; Spiculis 1-l. fere 2-linealibus, 4-serialibus, subaequali-brevipedicellatis, ellipticis, hirtis; Foliis linearibus (totis vel in ferne triquetro-involutis, rarius inferioribus latiusculo-latis) glabris.

Paspalum Lagascae. N. ab Es. Agr. bras. p. 65. — *P. pubescens* Lag. — *P. ferrugineum* Trin. ic. gr. XII. tab. 136. — *P. quadrifarium* ht. Berol. teste Kth. Agr. syn. p. 60.

V. spp. Bras. Chil.

Vaginae radicales basi sericeo-pubescentes, culmeae teretiusculae. *Ligula* brevis, obtusa l. (in var. oligostachya et grandiflora) lineam longa, acutiuscula. *Folia* superne pl. min. complanata ibique lineas 1 — 2 lata, satis firma, inferiora ultrapedalia. *Juba* pro numero racemorum palma longior — pedalis, griseo l. ferrugineo-spadicescens. *Glumae* 5-nerves. *Perianthium* viridi-albens.

Paspalum umbrosum. Sesqui — bi-pedale, basi subadscendens. Racemis 9 — 13, pl. min. dissite jubatis (sesqui — fere 3-pollicaribus); Axi sub =, pilis

adsperso; Spiculis parvis, 4-serialibus, inaequaliter brevi-pedicellatis, elliptico-obovatis, pubescentibus; Foliis linear-lanceolatis, pubescendo-hirsutis.

V. spp. Bras.

Culmus simplex. Nodi glabri. Vaginae subcompressae, praesertim superiores e tuberculis minimis pilosae. *Ligula membranacea*, brevissima, ciliis longis dorso stipata. *Folia* subacuminata, pl. min. spithamea, lineas 5 — 6 lata, utrinque satis dense hirsuta, superiora basi pl. min. amplectentia. *Racemi* inferiores longiores, basi pl. min. barbati, ad marginem axis partialis pilis rarius culis adspersi, jubam constituunt circiter spithameam. *Spiculae* satis parvae, sub-lente e tuberculis pasillis pilosae. *Glumae* 3-nerves. — Gramen siccum totum fuscum.

Paspalum coryphaeum. 4 — 6-pedale, erectum. Racemis 7 — 50, pl. min. disseminate paniculato-jubatis (3 — 5-pollicaribus); Axi =, glabriuscule; Spiculis sublinealibus, 4-serialibus, inaequaliter brevi-pedicellatis, (obovato-) ellipticis, villosulo- (interdum subobsolete) pubescentibus; Foliis linearibus, l. linear-lanceolatis, glabris vel obsolete puberalis.

Paspalum coryphaeum Trin. Diss. II. p. 114. N. ab Es. Agr. bras. p. 70. — *P. pruinatum Trin.* ic. gram. XXIII. tab. 272. (var. nodis barbatis).

V. spp. Bras.

Nodi nunc glabri nunc barbati. *Vaginae* teretiusculae, saepe villosae. *Ligula membranacea*, linea paulo brevior, truncata, dorso pilis stipata. *Folia* acuminata, inferiora sesquipedalia, lineas fere 6 lata, rubendo-fuscescentia, infra saepe albentia. *Juba dodrantalis* — ultrapedalis. *Axis communis* nudus l. pubescens. *Racemi* sparsi vel semi-vorticillati, basi barbati, ex albo-viridi fuscoque varii. *Glumae* sub- 5-nerves. *Perianthium* virescens.

Paspalum pubescens hortul. 2 — 4-pedale, erectum. Racemis 6 — 20, pl. min. disseminate jubatis (2 — 4-pollicaribus); Axi (sub-) =, glabro; Spiculis linealibus, 4-serialibus, inaequaliter brevi-pedicellatis, obovatis l. subrotundo-oblongis, pubescendo-hirtulis; Foliis linear-lanceolatis, pl. min. pubescentibus.

Paspalum tenellum Ht. *Paris.* R. et S. II. p. 315. — *P. elegans* Flüg. Kth.

Agr. syn. p. 59.

V. cc.

Vaginae teretiusculae, superne carinatae. *Ligula* membranacea, brevis, pilis stipata. *Folia* acuta potius quam acuminata, laete viridia, rariuscule pubescentia, margine brevi-ciliata, dodrantalia — pedalia et breviora. *Racemi* basi barbati, inferiores saepissime pl. min. longe pedunculati. *Axis partialis* spiculam latitudine fere aequat, tamen eadem et manifestius angustior occurrit. *Glumae* 3-nerves. *Perianthium* viridulum.

Paspalum corcovadense Radd. 1 — 2-pedale, erectum. Racemis 2 — 5 — 15, pl. min. dissite jubatis (3 — sesqui-pollicaribus); Axi —, glabro; Spiculis (sub-) linealibus, 4-serialibus, inaequaliter pedicellatis, ovato-ellipticis, glabriusculis; Foliis lanceolatis, pl. min. glabris.

Paspalum corcovadense. Trin. Diss. II. p. 115. Ic. gr. XIII, tab. 155. — *P. lanceolatum* Mik.! in Sprgl. n. Entd. II. p. 48. — *P. plantagineum* N. ab Es. Agr. bras. p. 69.

V. spp. Bras.

Nodi 3 — 4, glabri. *Vaginae* carinato-compressae, oras versus ciliatae, extus circa Ligulam membranaceam et brevem tomentosae. *Folia* interdum linear-lanceolata tantum, acuminata, medio lineas 3 — 6 lata, pollices 4 — 7 longa, interdum dorso pubescentia. *Racemi* basi barbati jubam constituunt pl. min. palmarem, patulam. *Spiculae* siunc acutiusculae tantum, nunc acutae l. acutissimae. *Glumae* 5-nerves. *Perianthium* viridulum.

Paspalum setaceum Mchx. 1 — sesquipedale, obliquum l. decumbens. Racemis 1 — 2 — 3, pl. min. dissite alternis (4 — sesqui-pollicaribus); Axi —, glabro; Spiculis linealibus parvisve, 2 — 4-serialibus, pedicellatis l. brevi-pedicellatis, ovatis l. oblongo s. obovato-orbiculatis, glabris (interdum pubescensibus); Foliis lanceolato-linearibus lanceolatisve, pl. min. pilosis.

Paspalum setaceum. R. et S. II. p. 306. Trin. ic. gr. XI. tab. 129. — *P. hirsutum* Poir. — *P. pubescens* Mühlenb.

V. spp. Am. bor. Ind. occ.

* Culmo decumbente, racemis (3) paucis minoribus, minus gracilibus, foliis brevioribus, lanceolatis, hirsutis:

Paspalum supinum Bosc! N. ab Es. Agr. bras. p. 53. Trin. ic. gr. XI. tab. 130.

V. spp. Am. bor.

** Decumbens, racemis gracilibus, foliis longioribus, lanceolatis, glabris l. margine pilis adspersis:

Paspalum protensum Trin. Diss. II. p. 108.

V. spp. Mascar. (Sieb. lib. Maur. II. no. 29.)

Paspalum denticulatum. Bipedale, erectum. Racemis circiter 10, pl. min. dissitae alternis (sesqui — 1-pollicaribus); Axi sub —, glabro vel margine longe pilifero; Spiculis linealibus parvisve, 4-serialibus, inaequaliter subbrevi-pedicellatis, oblongo-ovatis, margine denticulatis; Foliis linearibus, glabris.

Paspalum denticulatum Trin. Diss. II. p. 111. Ic. gr. XI. tab. 123. Kth.

Agr. syn. p. 61.

V. spp. Am. aequin.

Nodi glabri. *Vaginae* compressiusculae, glabrae. *Ligula* breviuscula, membranacea. *Folia* acuminata, lineas circiter 2 lata, spithamea, sensim breviora, glabra l. basi in pagina superiori villosula. *Racemi* basi nudi, in var. ciliata barbati. *Axis partialis* in eadem var. margine pilis tenuissimis, 3 — 4-linealibus, patentibus, rarinsule ciliatus. *Spiculae* (in var. ciliata minores) lenticulari-depressae, arte imbricatae, circum circa, praesertim apicem versus, ad glumae inferioris nervos laterales denticulatae. *Glumae* 3-nerves. *Perianthium* pallens, punctulato-striatum.

Paspalum mandiocanum. Sesquipedale, ascendens. Racemis 4 — 10, pl. min. dissitae alternis (sesqui — 1-pollicaribus); Axi —, glabro; Spiculis lineali-

bus, 4-serialibus, inaequaliter brevipedicellatis, ellipticis, glabris; Folii lanceolatis, ciliatis.

Paspalum mandiocanum Trin. Diss. II. p. 113. Ic. gr. XIII. tab. 154. N. ab Es. Agr. bras. p. 68. (an synn.?)

V. spp. Bras.

Vaginae compressiusculae, fauce margineque pubescentes. *Ligula* brevisima, dorso pilis dense stipata. *Folia* lanceolata l. lineari-lanceolata, acuta, 5 — 6 lineas lata, culmea inferiora spithamea. *Racemi* basi barbulati, ad axin communem 2 — 3-pollicarem. *Spiculae* acutiusculae, interdum linea subbreviores. *Glumae* 5-nerves aut superior 3-nervis. *Perianthium* pallide virescens, punctulato-striatum.

Paspalum dissectum L. sp. pl. ed. 2. Pedale, basi repens, fasciculato-ramosum.

Racemis 2 — 3, dissite alternis (1 — 2-pollicaribus, demum subfalcato-cernuis); Axi =, glabro; Spiculis subparvis, biserialibus, brevipedicellatis, subrotundo-ovatis (dorso gibbis) Foliisque linearibus glabris.

Paspalum dissectum. R. et S. II. p. 294. N. ab Es. Agr. bras. p. 56. Kth. Agr. syn. p. 54. (excl. syn. Trinii).

Panicum dissectum L. sp. pl. ed. 1.

V. sp. Am. calidioris?

Rami e culmo basi prostrato plures fasciculati, iterum in fasciculos folii-ramiferosque, erectos, basi vaginis aliquot lineari-lanceolatis et aphyllis (spathaceis L.) stipatos divisi. *Nodi* glabri. *Vaginae* fasciculorum solitae, folii-ferae compressae, glabrae; culmea's. ramorum teretiusculae. *Ligula* brevis, membranacea, istrinque auriculata. *Folia* acuminata, lineam vel cum dimidia lata, inferiora pl. min. palmaria. *Axis communis* 1 — 2-pollicaris. *Spiculae* vix lineam longae. *Glumae* 5-nerves, nervis lateralibus sere in unum confluentibus. *Perianthium* fuscum.

Paspalum orbiculare Forst. Sesqui — bi-pedale, adscendendo-erectum. Racemis 2 — 5, dissite alternis (sesqui — 4-pollicaribus); Spiculis linealibus l. pl.

min. parvis; 2 — 3 — 4-serialibus, brevissime pedicellatis, subrotundis oblongisve (pl. min. depressis) Foliisque sublanceolato-linearibus glabris.

Paspalum orbiculare. Willd. En. R. et S. II. p. 296. (sub *P. scrobiculato*). —

P. Kora Willd. Sp. pl. Pal. Beauv. Fl. d'Ow. II. tab. 85. f. 1.

V. spp. Inss. cap. virid. Societ. Marian. — N. Holl.

A *dissecto*, cui valde affine, distinguitur culmo adscendente, saepe erecto, nec nisi ramum unum alterumve subdecumbentem basi emitte; Racemis plerumque pluribus, semper patulo-erectis; Spiculis brevissime pedicellatis, lenticulari-depressis, saltem dorso minus gibbis; Foliis longioribus, magis lanceolato-linearibus (lineas 3 latis); Ligula breviori, non auriculata. — Gramen novae Hollandiae spiculis oblongis, acutioribus, glumis perianthium paulo superantibus, an hujus loci?

Paspalum ammodes. Ultrapedale, erectum. Racemis 2 — 4, alternis (2 — 1-pollicaribus); Axi =, glabro; Spiculis subultralinealibus, 2 — 3 — 4-serialibus, brevipedicellatis, obovato-ellipticis, obtusiusculis, pilosis; Foliis compresso-linearibus involutisve, glabriusculis hirtisve.

Paspalum ammodes Trin. Diss. II. p. 120. Ic. gr. XIII. tab. 152. N. ab Es.

Agr. bras. p. 40.

V. spp. Bras.

Culmus tenuis. *Vaginae* teretiusculae. *Ligula* membranacea, brevissima. *Folia* firma, compressa linea angustiora, radicalia spithamea — sesquipedalia. *Axis communis* nunc semipollicaris, nunc palmaris. *Racemi* basi pl. min. barbati, canescentes. *Glumae* 5-nerves. *Perianthium* viridulum, tenuissime punctulato-striatum.

Paspalum blepharophorum R. et S. Ultrapedale, erectum. Racemis 3 — 4, alternis (sesqui — bi-pollicaribus); Axi =, ciliatulo; Spiculis subultralinealibus, 4-serialibus, inaequaliter sub-brevipedicellatis, lanceolato-ellipticis, acutis, margine villosissimis; Foliis linearis-lanceolatis, ciliatis.

Paspalum blepharophorum R. et S. II. p. 292. N. ab Es. Agr. bras. p. 42.

Trin. ic. gr. XII. tab. 134. — *P. ciliatum* Hb. Kth. Agr. syn. p. 42.

V. spp. Bras.

Nodi 5 — 6, glabri. *Vaginae* teretiusculae: inferiores plerumque ad marginem ciliatae. *Folia* acuminata, rigidiuscula, lineas 2 lata, pl. min. digitalia. *Axis communis* circiter sesquipollucaris. *Racemi* subpedunculati, basi barbati. *Glumae* 3 — 5-nerves: inferior margine canescendo-hirsuta. *Perianthium* pallidum, apice barbulatum.

Paspalum sanguinolentum. Bipedale, erectum. Racemis 4, alternis (2 — sesquipollucaribus); Axi —, glabro; Spiculis fere 2-linealibus, 2 — 3-serialibus, brevissime pedicellatis, linearis-ovato-ellipticis, acutiusculis, villosulis; Foliis lanceolato-linearibus, glabris.

Paspalum sanguinolentum Trin. Diss. II. p. 116. Ic. gr. XII. tab. 142. N. ab Es. Agr. bras. p. 59.

V. spp. Bras.

Culmus cum reliquis partibus e sanguineo suscescens. *Vaginae* compressiusculae, glabrae, radicales basi albo-tomentosae. *Ligula* membranacea, brevissima. *Folia* acuminata, coriacea, lineas 3 lata, ultrapalmaria. *Racemi* basi barbati. *Spiculae* virides. *Glumae* 5-nerves, tenero- et brevi-villosae. *Perianthium* albo-virens.

Paspalum erianthum N. ab Es. 2 — 4-pedale, erectum. Racemis 3 — 9, alternis (sesqui- 2-pollucaribus); Axi —, glabro; Spiculis 2-linealibus, 4-serialibus, inaequaliter brevipedicellatis, ovato-ellipticis, obtusiusculis, villosis; Foliis sublanceolato-linearibus, sericeo-hirtis.

Paspalum erianthum N. ab Es! Agr. bras. p. 38. Trin. Diss. II. p. 121. Ic. gr. XII. tab. 135.

V. spp. Bras.

Culmus satis tenuis, basi bulbosus. *Vaginae* compressiusculae, sericeo-hirtae, superiores pubescentes tantum. *Ligula* membranacea, brevissima. *Folia*

acuta, in majoribus lineas 3 — 4 lata; inferiora spithamea. *Axis communis* pl. min. palmaris. *Racemi* grisei. *Glumae* 3-nerves. *Perianthium* viridulum. *Paspalum laeve* Mchx. Sesqui — bi-pedale, obliquum? Racemis (plerumque) 3, alternis (2 — 3-pollicaribus); Axi =, glabro; Spiculis subultralinealibus, biserialibus, brevi-pedicellatis, oblongo-orbiculatis Foliisque linearibus glabris (hisve basi pilis adspersis).

Paspalum laeve. R. et S. II. p. 296. an Lecont.? Schult. Mant. 2. p. 167.

V. spp. Am. bor.

Vaginae compressae, omnes glabrae. *Ligula* membranacea, productiuscula. *Folia* subacuminata, compressa vel superne plana, lineas 2 — 3 lata, inferiora interdum pedalia, culmea palmaria — spithamea (LECONTEO brevia dicuntur). *Glumae* 3-nerves: nervis lateralibus adeo marginalibus, ut illae uninerves videantur. *Perianthium* tenuissime punctulatum. — Simillimum sequenti differt potissimum spiculis hinc convexis, foliis latioribus.

Paspalum lentiferum LaM. Bipedale et ultra, erectum. Racemis 4 — 6, dissite alternis (sesqui — 2-pollicaribus); Axi =, glabro; Spiculis subultralinealibus, 3 — 4-serialibus, inaequaliter pedicellatis, oblongo-orbiculatis, utrinque depresso Foliisque linearibus glabris.

Paspalum lentiferum. R. et S. II. p. 512. Trin. ic. gram. XII. tab. 137. —

P. praecox Walt.

V. spp. Am. bor.

Vaginae compressiusculae: radicales et fascicularum sericeo-villosae, culmeae glabrae. *Ligula* membranacea, brevis. *Folia* acuta, superne plana et sesquilineam lata, inferiora spithamea. *Racemi*, ad axin 2 — 4-pollicarem, basi barbati. *Glumae* 3-nerves. *Perianthium* laete viride, punctulato-striatum.

Paspalum tenax. Bi — tri-pedale? erectum. Racemis sub-4, dissite alternis (3-pollicaribus); Axi =, glabro; Spiculis subultralinealibus, 4-serialibus, subaequaliter brevi-pedicellatis, ovato-ellipticis, acutiusculis Foliisque linearibus glabris.

Paspalum tenax *Trin.* Diss. II. p. 122.

V. sp. Nov. Zeel.

Culmus totus vaginatus. *Vaginae* glabrae, (superiores) terciusculae: suprema elongata. *Ligula* membranacea, lineam longa, obtusa. *Folia* compressa, firma, acuminata, culmi abscissi inferius ultraquadriplicare, explanatum lineas 2 et qu. exc. latum. *Axis communis* 3-pollicaris. *Racemi* basi audi. *Glumae* 5-nerves: nervo utrinque intermedio subobsoleto. *Perianthium* virescens.

Paspalum scutatum *N. ab Es.* Sub-bipendale, erectum. Racemis 4 — 6, dissidente alternis (3 — 1-pollicaribus); Axi —, glabro; Spiculis linealibus, 3 — 4-serialibus, inaequaliter brevipedicellatis, obovato-subrotundis, inferne margine utrinque retusis, apice mucronatis, glabris; Foliis linearis-lanceolatis, villosis.

Paspalum scutatum *N. ab Es!* *Agr. bras.* p. 45. *Trin. Diss. II.* p. 105.

V. sp. Bras.

Vaginae compressiusculae, inferiores villosae. *Ligula* margo angustissimus. *Folia* acuminata, lineas circiter 4 lata, inferiora semipedalia, villosa. *Axis communis* 4-pollicaris. *Racemi* basi barbati. *Spiculae* e miniaceo et ochraceo variae. *Glumae* 3-nerves. *Perianthium* pallidum.

Paspalum plicatulum *Mchx.* Tripedale, erectum. Racemis 3 — 5 — 12, dissidente alternis (sesqui — 3-pollicaribus); Axi —, glabro l. tenuissime pubescente; Spiculis linealibus paulo majoribus, 3 — 4-serialibus, inaequaliter brevipedicellatis, ovato-l. obovato-oblongis, glabris dorso puberulis; Foliis linearibus, glabris l. pubescentibus (villosive).

Paspalum plicatulum. *Trin. Diss. II.* p. 112. *Ic. gr. XII.* tab. 140. — *P. undulatum* *Poir.* *R. et S. II.* p. 509. *Kth. Agr. syn.* p. 62. — *P. plicatum* *Pers.* — *P. virgalum* *Walt.*

V. spp. Am. bor. Guian. Bras.

Vaginae radicales magis, culmeae minus compressae, glabrae l. inferiores pl. min. pubescentes, fauce nudae l. villosae. *Ligula* membranacea, plerumque

lineam longa. *Folia* acuminata, lineas 1 — 3 lata, inferiora saepe sesquipedalia. *Racemi* plerumque 5, ad axin 3 — 5-pollicarem solitarii, basi nudi I. barbati. *Spiculae* obtusiusculae. *Glumae* 5-nerves: nervis lateralibus sibi approximatis; gluma superior tantum non semper plicatula! *Perianthium* atrofuscum, basi albidum. — *Var.* foliis molliter denseque villosis, racemis 2, longis, e Bras.

Paspalum dilatatum Poir. 2 — 3-pedale, erectum. Racemis 2 — 10, dissite alternis (4 — sesqui-pollicaribus); Axī =, glabro; Spiculis pl. min. ultralinealibus, 4-serialibus, inaequaliter pedicellatis, ovatis, acutis, (depressis), margine villosulis; Foliis (sublanceolato-) linearibus, glabris.

Paspalum dilatatum. R. et S. II. p. 315. Kunth rev. gr. p. 197. tab. 10. Agr. syn. p. 60. — *P. ovatum* N. ab Es? Agr. bras. p. 43. Trin. ic. gr. XII. tab. 139. — *P. platense* Sprgl!

V. spp. Bras.

Vaginae compressae: radicales pl. min. villosae, culmeae glabrae. *Ligula* membranacea, nunc brevis, obtusa et pilis stipata, nunc 2-linealis, acuta, nuda. *Folia* fere e lanceolato linearia, acuminata, lineas fere 3 lata, inferiora ultrapedalia. *Axis communis* pollicaris — dodrantalis. *Racemi* crassiusculi, saepe nutantes. *Spiculae* depressae, longius breviusve acutae. *Glumae* 5-nerves: inferior margine tenui- et longiuscule villosa. *Perianthium* lepidulare, e viridi albens, tenuissime punctulatum.

Paspalum glabrum Poir. Tripedale, erectum. Racemis sub-5, dissite alternis (3 — 4-pollicaribus); Axī =, glabro; Spiculis parvis, 3 — 4-serialibus, brevipedicellatis, obovatis, pubescentibus; Foliis linearibus, glabris.

Paspalum glabrum. R. et S. II. p. 309. Kth. Agr. syn. p. 58. — *P. ischnocaulon* Trin. ic. gr. XI. tab. 126. Kth. Agr. syn. p. 45.

V. spp. Ind. occ. Mascar.

Culmus gracilis. *Vaginae* compressiusculae, glabrae. *Ligula* membranacea, brevis, dorso pilis stipata. *Folia* lineas 2 — 3-lata, acuminata, fasci-

culorum sublanceolata, culmi inferiora ultrapedalia. *Racemi* graciles, basi brevissime barbati. *Axis communis* 4 — 5-pollicaris. *Gluma* 3-nerves. *Perianthium* spadicescens.

β. *Axi partiali spicula singula (spiculise) latiori* (=).

1) *Spiculis lanato-villosis.*

Paspalum carinatum Flügg. Sesqui — 2-pedale, erectum. Racemis 1 — 2; subapproximato-alternis; *Axi* spiculis paulo latiori; Spiculis bilinealibus, bi-serialibus, subsessilibus, lineari-ellipticis, obtusis, sericeo-villosis;. Foliis linearibus, plerumque involutis, hirsutis pilis tantum adspersis.

Paspalum carinatum. R. et S. II. p. 191. Kth. Agr. syn. p. 41. — *P. stellatum* Trin. Diss. II. p. 100. Ic. gr. X. tab. 119. (ubi in descriptione, *P. carinatum* et *stellatum* confusa sunt, in icoⁿe racemi axis partialis nimis latus depictus est).

V. spp. Brás.

Nodi in variet. foliis hirsutis barbati, in var. foliis glabriusculis glabri. *Vaginae* teretiusculae, glabrae aut pl. min. hirsutae. *Ligula* brevissima, membranacea, subciliari-lacera. *Folia* subuliformi-angusta, rarius explanata et fere lineam lata, plerumque canaliculato-involuta, nunc e tuberculis hirsutissima, nunc pilis rarioris tantum adspersa, imo glabra. *Axis communis* semipollicaris; *partialis* planus l. marginibus tantum deflexus, spicula singula duplo, utraque paulo latior. *Spiculae* depressiusculae. *Gluma* 3-nerves, nervis lateralibus prorsus marginalibus. *Perianthium* glumis paulo brevius, obtusum, superne apiceque barbulatum, interdum basi quoque adpresso-vilosulum.

Obs. Varietas foliis hirsutis *Paspalo euromo* habitu adeo similis est, ut, nisi consideraveris hujus racemos conjugatos, axin partiale minus latum spiculasque minores et acutas, illam facile cum hoc confunderes.

Paspalum lanciflorum. Bipedale et ultra, erectum. Racemis 2, conjugatis; Axi praelato, marginibus deplicato; Spiculis maximis, biserialibus, sessilibus, ovato-lanceolatis, acuminatis, basi barbatis; Foliis linearibus, hirsutis.

Paspalum lanciflorum Trin. ic. gr. XXIV. tab. 286.

V. spp. Bras.

Nodi pl. min. pubescentes. *Vaginae* teretes: inferiores superne e glandulis hirsutae. *Ligula* membranacea, brevis, dorso pilis stipata. *Folia* rigida, acuminata, lineam et qu. exc. lata, antice et praesertim margine papilloso-hirsuta: inferiora dodrantalia. *Racemi* (rarius 3 digitati) basi villoso-barbati, pollices 2 — 3 et ultra longi. *Axis partialis* expansus lineas 2 latus. *Spiculae* depressae, apicibus axis marginem excedentes, laete virides, lineas 2 cum dimidia longae. *Glumae* 3-nerves: inferior basi pilis brevibus et squarrosis, superior, brevior, obtusa, ibidem villis erectis et longioribus barbata, marginibus ciliata. *Perianthium* ellipticum, acutiusculum, minute pedicellatum, glumis dimidio brevius, glabrum.

Paspalum stellatum Flügg. Sub- 2-pedale, erectum. Racemis 1, l. 2 subconjugatis; Axi latissimo, compresso; Spiculis linealibus, biserialibus, subsessilibus, ovatis, acutis, sericeo-villosis; Foliis linearibus, planis involutisve, hirsutis glabrisve.

Paspalum stellatum. R. et S. II. p. 290. Kth. Agr. syn. p. 41. — *P. cujabense* Trin. ic. gr. XXIV. tab. 284. (var. monostachya, nudifolia).

V. spp. Bras.

Nodi glabri. *Vaginae* teretes, glabrae l. pl. min. hirsutae. *Ligula* ciliaris. *Folia* inferiora (praesertim varietatis nudifoliae) plerumque plana, lineam lata, superiora et fasciculorum pl. min. involuta vel subsetacea. (Inter numerosissima e Brasilia missa specimina ne unum quidem distachyum). *Axis compressus* spiculas totas obvolvit, expansus latitudine lineas 3 excedens. Denticuli, *pedicellarum* loco spiculas sustentantes, stellatim barbati. *Spiculae* de-

pressiusculae, cum lana sua linea longiores. *Glumae* 2-nerves. *Perianthium* glumis brevius, pl. min. acutiusculum, nudum.

Paspalum membranaceum *LaM.* 2 — 3-pedale, adscendens. Racemis 2 — 10, alternis. Axi latissimo, compresso; Spiculis ultralinealibus, biserialibus, subsesilibus, ovato-oblongis, acutiusculis, sericeo-villosis; Foliis linearilanceolatis, glabris pilisve rarissimis adspersis.

Paspalum membranaceum. R. et S. II. p. 290. — *P. Commersonii* Zucc.

Ceresa elegans Pers.

V. cc.

Nodi glabri. *Vaginae* teretiusculae, glabrae. *Ligula* membranacea, brevis l. fere linealis. *Folia* plana, acuminata, interdum linearia tantum, lineas 2 — 5 lata, inferiora dodrantalia. *Axis communis* 2 — 4-pollicaris. *Glumae* 2-nerves. *Perianthium* glumas aequans, acutiusculum, apice subpubescente pilo uno alterove comatum.

Paspalum heterotrichon. Bipedale et altius, erectum. Racemis 3 — 7, alternis; Axi latissimo, compresso; Spiculis linealibus, biserialibus, brevissime pedicellatis, elliptico-oblongis, dorso sericeo-villosis; Foliis angusto-linearibus, glabris.

Paspalum heterotrichon *Trin.* ic. gram. XXIV. tab. 285.

V. spp. Bras.

Culmi gracilis nodi barbulati. *Vaginae* teretes, glabrae. *Ligula* brevisima, membranacea, barbata. *Folia* attenuato-acuminata, linea plerumque angustiora, culmea inferiora breviora (1 — 2-pollicaria), versus medium culmum longiora (palmaria — spithamea). *Axis communis* pl. min. pollicaris. *Racemi* 2-pollicares, paulo nutantes. *Axis partialis* compressus, villorum, spiculas vestientium, non nisi apices emergere sinit. *Spiculae* cum ipsis villis lineam longae. *Glumae* 3-nerves: inferior ad flexurae angulum villosa basique medio barbata. *Perianthium* chartaceum, lanceolato-ellipticum, acutiusculum, glumis fere tertiam partem brevius.

2) *Spiculis glabris l. pubescentibus tantum.*

Paspalum gracile Rudge. 1 — 6-pedale, erectum l. repens. Racemis pluribus plurimisve, confertim jubato-paniculatis (1 — 3-pollicaribus); Axi spiculis latiori, glabro; Spiculis parvis, 2-serialibus, brevissime pedicellatis, sublanceolato-ellipticis, acutis, glabris vel cum Foliis lato-l. lanceolato-linearibus pubescentibus.

- a) Juba majori, densiori, Racemis plurimis, longioribus, Spiculis pubescentibus.

V. spp. Bras.

Idem, spiculis glabris.

Paspalum pyramidale N. ab Es. Agr. bras. p. 77.

- b) Juba breviori, lucidiori, Racemis paucioribus, brevioribus, Spiculis pubescentibus;

Paspalum gracile Rudge Guian. p. 20. tab. 26. R. et S. II. p. 316.

Idem, humile, flaccidulum, repens (in aquis fluitans).

V. spp. Bras.

Gramen siccum canescendo-fuscescens. *Culmus* totus vaginatus. *Nodi* glabri. *Vaginae* laxae et praesertim inferne ampliatae, glabrae, apice utrinque setaceo-l. subulato-appendiculatae: laciniis in gramine humili linealibus, in majori erecto fere semipollicaribus. *Ligula* membranacea, breviuscula, truncata l. obtusa. *Folia* acuminata, praecipue in humiliiori planta magis lanceolata, in altiori lato-linearia, (lineas 6 — 8 lata): in illa 2 — 3-pollicaria, in hac pedalia et longiora (omnia pl. min. aequilonga); utrinque minutissime tuberculata, praesertim in pagina superiori pilis minutis pubescentia; margine in majoribus hispida. *Juba panicularis* in humili gramine 2-pollicaris, in majori spithamea — pedalis, stricto-erecta. *Racemi* tenues: in illa 15 — 20, in hac innumeri. *Axis partialis* vix lineam latus, subfoliaceus, apice acuto spicularum series excedens. *Spiculae* depressae. *Glumae* pertenues, binerves

aut inferior 3-nervis: nervo marginali prominulo; in nostris speciminiibus omnibus pubescentes. *Perianthium pallidum*, glumis paulo brevius.

Obs. An ad var. humiliorem, spiculis glabris: *Paspalum pallidum* Hb. Kth. R. et S. II. 294. Kth. Agr. syn. p. 43?

Paspalum firmum. 2-pedale, erectum. Racemis 4 — 6, alternis (superioribus confertis), subfastigiatis (4 — 3-pollicaribus); Axi spicula singula latiori, glabro; Spiculis linealibus, biserialibus, subbrevisse pedicellatis, obovato-subrotundis Foliisque lanceolato-linearibus glabris.

Paspalum firmum Trin. Diss. II. p. 105. Ic. gram. XI. tab. 125. Kth. Agr. syn. p. 60.

V. spp. Mascaren.

Culmi simplicis, toti vaginati, nodi glabri. *Vaginae* carinato-compressae, glabrae. *Ligula* membranacea, sere lineam longa, obtusa. *Axis communis* sesqui — bi-pollicaris. *Racemi* crassi. *Axis partialis* complanatus, marginibus angustis deflexus, spicula singula duplo latior, spiculas ambas latitudine aequans. *Glumae* 5-nerves, vel inferior sub- 7-nervis. *Perianthium castaneum*, basi albens, tenerime punctulato-striatum.

Paspalum quadrifarium Lam. 2 — 3-pedale, erectum. Racemis 5 — 12, alternis (pl. min. ultrapollicaribus); Axi spicula singula latiori, dense ciliato; Spiculis parvis, 4-serialibus, inaequaliter brevipedicellatis, ellipticis Foliisque linearibus glabris.

Paspalum quadrifarium. R. et S. II. p. 314 (sub *virgato*). N. ab Es. Agr. bras. p. 71. (ubi vero axis partialis spiculis angustior dicitur). Trin. ic. gr. XI. tab. 128.

V. spp. Bras:

Nodi pl. min. barbati. *Vaginae* compressiusculae, glabrae. *Ligula* membranacea, linea brevior, obtusa. *Folia* attenuato-acuminata, firma et rigida, lineas 2 lata: culmea inferiora sesquipalmaria. *Axis communis* 3 — 4-pollicaris; *partiales* spicula singula plus duplo latiores, quaternas latitudine aequantes,

margine glandulosi et dense ciliati pilis circiter sesquilinealibus, deflexis. *Glumae* 3-nerves.

Paspalum commutatum N. ab Es. Sesquipedale, (adscendendo-) erectum. Racemis 2 — 4, alternis ($2\frac{1}{2}$ pollicaribus); Axi spiculis latiori, glabro; Spiculis parvis, biserialibus, brevipedicellatis, obovato-subrotundis, glabris; Foliis linearibus vaginisque (inferioribus) hirsutis.

Paspalum commutatum N. ab Es. Agr. bras. p. 59. — *P. dissectum* Trin. Diss. II. p. 106. Ic. gr. XI. tab. 124.*

V. spp. Bras.

Nodi glabri. *Vaginae* compressae, inferiores undique aut superne hirsutae, superiores glabrae. *Ligula* membranacea, breviuscula, rotundata. *Folia* attenuato-acuminata, lineam vel cum dimidia lata, inferiora dodrantalia hirsuta, superiora basin versus ciliata tantum. *Axis communis* 1 — 2-pollicaris, *partialis* spiculis margine deflexo latior. *Glumae* 3 — 5-nerves. *Perianthium* fuscum, punctato-striatum.

* *Paspalum longifolium* Roxb. 3-pedale, erectum. Racemis 7 — 20, alternis (3 — 2-pollicaribus); Axi spicula singula (omnibusque sub-) latiori, glabro; Spiculis linealibus l. subparvis, 4-serialibus, inaequaliter brevipedicellatis, oblongis, pl. min. mucronulatis, pubescentibus; Foliis compresso-linearibus, glabris.

Paspalum longifolium. Schult. Mant. II. p. 175. Trin. ic. gr. XII. tab. 158.

V. spp. Molucc. Jav.

Nodi glabri. *Vaginae* superne carinatae, glabrae. *Ligula* membranacea, breviuscula, pilis aliquot stipata. *Folia* subacuminata, compressa et lineas 2 lata, apicem versus pl. min. complanata, 1 — 3-pedalia (suprema brevia). *Axis communis* spithameus — pedalis. *Racemi* inferiores remotiores. *Axis partialis* sesquilineam latus, margine hispidulo et angusto-deflexo spiculis quaternis sublatior. *Spiculae* sublenticulari-depressae, interdum obsolete puberuli tantum. *Glumae* 3-nerves, aut superior 5-nervis. *Perianthium* dilute viride, sub lente tenuissime punctulato-striatum.

R E I M A R I A Flügg.

Racemi simplices, conferto-alterni. *Spiculae* subsessiles, angusto-lanceolatae, acuminatae, e paleis (glumis et valvulis) herbaceo-membranaceis 3 compositae.

Gramina tropica Americae, repentiā l. adscendendo-erecta, ramosa, pedalia vel minora.

Folia angusta, linearia l. lanceolato-linearia, breviuscula.

Ligulae loco barba pilorum.

Racemi simplicissimi, conferti, sparsō-alterni, pl. min. pollicares, tenues.

Spiculae in axis partialis linearis excavationibus laxiuscule alternae, adpressae, subsessiles, angusto-lanceolatae, acuminatae, parvae. Paleae, quibus compositae sunt, tres, parum inaequales et ejusdēm substantiae: inferior, axi opposita, et secunda, axis dorso adjacens, 3-nerves; tertia, cum secunda flosculum hermaproditum constituens, binervis. (Inferior itaque aut gluma inferior est, superiori suppressa, tumque perianthium inversum; aut, gluma utraque suppressa, flosculus neuter univalvis, quod, ob substantiam flosculorum aequalem, probabilius).

Lodiculae squamae 2, collaterales, cuneatae, apice emarginatae.

Ovarium linearī-oblongum, glabrum. *Styli* 2. *Stigmata* pennato-plumosula.

Stamina 2, 3? *Antherae* lineares.

Fructus caryopsis obovato-elliptica, libera, eberbis, exsulca, depressiuscula, brevipedicellata, scutello suo duplo et qa. exc, longior.

Reimaria acuta Flügg. Spiculis linea longioribus, subulato-acuminatis, infra pilosis; Culmo repente.

Reimaria acuta. R. et S. I. p. 289. Trin. Diss. II. p. 59. Ic. gram. XXIII. t. 275.

V. spp. Bras.

Prostrata, pedalis. Racemi 4 — 6, demum patentissimi et reflexi, basi ananthi.

Reimaria conferta N. ab Es. Spiculis linea brevioribus, acutissimis, nudiusculis (basi minute ciliatis); Culmo adscendente.

Reimaria conferta N. ab Es. Agr. bras. p. 15. Trin. Diss. II. p. 59. Ic. gram. XXIII. t. 276.

V. spp. Bras.

Adscendens, semipedalis. Racemi quam in praecedente plures, pl. min. contracti, a basi floriferi.

LAPPAGO Schreb.

Thyrsus simpliciusculus (subcompositus). *Spiculae* 2 — 5 in thyrsulis capituliformibus partialibus. *Gluma* inferior nulla, superior minima. *Flosculus neuter* ad costas glochideo-echinatus.

Gramen utriusque orbis regiones tropicas ad grad. bor. circ. 45 usque transgrediens, arenosa et inculta amans, pedale, ramosum, plerumque prostratum.

Folia lanceolato-linearia, brevia, firmula.

Ligula brevis, membranacea, ciliata.

Thyrsus cylindraceus, subcompositus, formatus e fasciculis s. thyrsulis subcapituliformibus, 2 — 5-floris: axi partiali brevissimo, radiolos emittente approximatisimo-alternos, brevissimos, inferiores binato-spiculiferos.

Spiculae specie uniflorae, sed ex omni analogia hemiologiae censendae: *Gluma* inferiore suppressa, superiore minima, membranacea, enervi. *Flosculus neuter* 1-valvis, magnus, ovalis, acutus, 7-nervis, ad nervos coriaceos dense glochideo-echinatus. *Hermaphroditus* chartaceus, neutro vix brevior, lanceolatus, acutus: valv. inferior 3-nervis superiorem teneriorem obvolvens. — *Spicula* in radiolis superior s. extima angustior, sterilis.

Lodiculae squamae 2, oblique truncatae et hinc in denticulum productae.

Ovarium oblongum, glabrum. *Styli* 2. *Sigmalia* plumosula.

Stamina 3. Antherae oblongae.

Fructus caryopsis subfusiformi-ovalis, antice depresso-ovalis, libera, e herbis, scutello suo plus dimidio longior.

Lappago racemosa Willd. Kth. rev. gr. tab. 120. Agr. syn. p. 170. — *L. biflora* Roxb. — *L. aliena* Sprgl.

Cenchrus racemosus L. Schreb. gr. tab. 4. — *C. linearis* Lam.

Tragus racemosus Hall. R. et S. II. p. 378. — *Tr. muricatus* Mönch. — *Tr. Berteronianus* Schult. Mant. 2. p. 205. — *Tr. alienus* et *biflorus* Schult. ibid. — *Tr. occidentalis* N. ab Es. Agr. bras. p. 286.

Phalaris muricata Forsk.

V. spp. Monsp. Dalm. Iber. Afr. oriental. Chin. Dom. Bras.

Spiculae in plantia extra-europaea plerumque minores.*

C E N C H R U S L.

Thyrsus simplex. Spiculae (1 — 5) intra Involucrum capituliforme setoso-l. spinoso- rarius lingulato-laciniosum, coriaceum, basi integrum, cum ipsis deciduum. Lodicula nulla.

Gramina utriusque orbis regiones tropicas, in antiquo ad gr. bor. 35-, in America fere ad gr. 50 usque transgredientia, 1 — 3 (— 6-) pedalia, erecta l. decumbentia, plerumque ramosa.

Folia linearia l. sub lanceolato-linearia.

Ligula ciliaris, rarius membranacea,

Thyrsus cylindraceus, simplex, formatus e capitulis spinoso-setosis, subsessilibus.

*) Obs. Huic generi proximus et fortasse associandus *Zaitzea* Kth. rev. gr. tab. 42. Agr. syn. p. 171., gluma superiore una cum inferiore suppressa.

Spiculae intra involucrum 1 — 5, sessiles, lanceolato-ovatae, hemiologamae. *Glu-*
mæ 2 vel, inferiore supressa, 1, membranaceæ, acutæ: inferior pl. min.
 parva, 1-, superior flosculis paulo magisve brevior, 3 — 5-nervis. *Flosculus*
inferior neuter vel masculus, membranaceus, 1 — 2-valvis: valvula inferiore
 acuta l. acuminata, 5 — 7-nervi. *Flosc.* *superior* hermaphroditus, subchar-
 taceus, lanceolato-ovatus, acutus l. acuminatus: valvula inferior superiorem
 arcte obvolvens. — *Involucrum* spiculam l. spiculas cingens, constans e laciniis
 coriaceis, rarius simplicibus, plerumque setoso-aut spinoso-partitis, basi in di-
 scum turbinatum solidum connatis: laciniulis deorsum aculeolatis: extimis multo
 brevioribus, setiformibus, plerumque patentissimis; interioribus sensim cras-
 sioribus, spiculas non nimis superantibus, plerumque inferne villosis (unica vel
 aliquot interdum paulo protractioribus).

Lodicula nulla.

Ovarium oblongum, glabrum. *Styli* inferne connati, 2. *Stigmata* plumosula.

Stamina 3. *Antheræ* lineares.

Fructus caryopsis oblonga, depressiuscula, intra valvulas clausa libera, eberbis,
 scutello suo duplo vel tertiam quartamve partem longior.

a) *Involucelli laciniis partitis, deorsum aculeolatis; gluma inferiore manifesta;*
Ligula ciliari.

Cenchrus myosuroides Hb. et Kth. Capitulis thyrsi erectis; Involucelli 1-flori laci-
 niis omnibus setaceis, fere ad basin usque liberis, erectis, eberbibus.

Cenchrus myosuroides Hb. et Kth. Gem et sp. I. tab. 35. R. et S. II. p. 257. —
 An huc *C. alopecuroides* Presl. rel. Haenk. I. p. 317?

Pennisetum myosuroides Sprgl. S. V. 1. p. 305.

V. sp. Chil.

Culmus dicitur erectus et orgyalis. *Vaginae* cum *Foliis* angusto-linearibus,
 subinvoluto-compressis, scabris, glabrae. *Thrysus* cylindricus, satis angustus,
 densus, 5-pollicaris. *Gluma* inferior flosculis triplo brevior, 1-, superior iis-

dem paulo brevior, 5-nervis. *Flosc. neut.* in nostro specimine 2-valvis; valvula inferior 7-nervis. *Hermaphroditus neutrūm aequans*, scabriuscuslus.

Cenchrus echinatus L. sp. pl. ed. 1. Capitulis patulis; Involucelli 1 — 4-flori laciniis fere ad basin usque liberis, erectis inferioribusve squarrosis; exterioribus setaceis nudis, interioribus subulī- (vel spini-) formibus pl. min. villosis.

α. Spiculis 2 — 4 intra involucellum:

Cenchrus echinatus. R. et S. II. p. 253. — *C. pungens* Hb. et Kth. N. ab Es. Agr. bras. p. 288. — (In horto Erfurt. distinguuntur *C. macrocarpus* et *microcarpus*).

Elymus caput medusae Forsh.

V. spp. Am. bor. Ind. occ. Bras. Cap. vir. Manill.

β. Spicula solitaria:

Cenchrus australis Br!

V. spp. N. Holl. O-Tait. — Chil.

Culmus 1 — 2-pedalis, procumbens, ramosus. *Folia* interdum longitudinem ultrapedalem et latitudinem sesquipollicarem acquirunt. *Thyrsus* pollices 2 — 3, rarius 4 — 5 longus. *Axis* glaber l. pl. min. pubescens. *Gluma* inferior saepe minima tumque enervis, superior flosculis tertiam partem l. paulo tantum brevior, 3 — 5-nervis. *Flosc. neut.* 1-valvis, 7-nervis, *Hermaphroditum* scabriuscum aequans.

Obs. Specimen Chilense (var. β.) differt involucelli laciniis (exceptis aliquot extimis brevibus) omnibus densius villosis, basi distinctius turbinato-connatis.

Cenchrus echinatus interdum non nisi aegre a sequente distinguitur; cuius generis est *Cenchrus echinatus* Torr!

Cenchrus tribuloides L. sp. pl. ed. 1. Capitulis patulis; Involucelli 1 — 3-flori laciniis basi subturbinato-connatis, squarrosis (inferne tomentosis), omnibus (vel exceptis aliquot extimis setaceis) spiniformibus, omnibus l. interioribus pl. min. villosis.

Cenchrus tribuloides. R. et S. II. p. 253.—*C. carolinianus* *Walt.*—*C. spinifex* *Cav.*
V. spp. Canad. Bras.

Similis praecedenti. *Capitula* plerumque majora magisque globosa; laciniæ *involucelli* latiora. *Flosc. masc.* vel *neut.* bivalvis.

Cenchrus agrimonoides. Capitulis (conoideis) reflexis; Involucelli 1-flori laciniis inferne turbinato connatis, exterioribus setaceis, brevissimis, squarrosis, interioribus subuliformibus, conniventibus, villosulis.

Cenchrus agrimonoides *Trin.* Diss. II. p. 72.

V. spp. ex O-Waahu.

Culmus 2-pedalis et ultra, satis validus, strictus, decumbens, ramosus. *Vaginae* cum foliis glabrae. *Folia* stricta, supra scabriuscula, marginibus hispida, lineas 5—7 lata, dodrantalia — pedalia. *Thyrsus* laxus, 3—5-pollicaris. *Axis* glaber. *Capitula* acuto-conoidea, brevi-pedicellata: pedicello basique turbinate pubescens. *Gluma* inferior parva, 1-, superior flosculis tertiam partem brevior, 5-nervis. *Flosc. masc.* 2-valvis: valvula inferior 7-nervis, *Hermaproditum* aequans.

b) *Involucelli laciniis simplicibus, margine sursum hispidulis; Gluma inferiore nulla; Ligula membranacea* (ANTHEPHORA).

Cenchrus laevigatus, Capitulis erectis; Involucelli 1—5-flori laciniis (4—5) aequalibus, lingulatis, basi in discum claviformem connatis.

Cenchrus laevigatus *Trin.* Diss. II. p. 74.

Tripsacum hermaphroditum *L.* sp. pl. ed. 2.

Colladoa monostachya *Pers.*

Anthephora elegans *Schreb.* Gram. tab. 44. R. et S. II. p. 497.

* *Vaginae* foliisque pl. min. villosis, *involucellis* pubescens;

Cenchrus villosus *Sprgl.* S. V.

Anthephora villosa *Sprgl.* N. Entd.

V. spp. Ind. occ.

P E N N I S E T U M Rich.

Thrysus simplex. *Spiculae* (lanceolatae, acutae) setis arcte *involucratae*, aut ipsarum basin, aut, ubi pedicellatae, pedicelli basin coronantibus: *involucrum* spiculis deciduo. *Hermaphroditus* ovato-lanceolatus, demum glumis firmior. *Lodicula* nulla aut extra valvulam superiorem sita.

Gramina utriusque orbis maximam partem tropica, pauca ad grad. 37. lat. bor. descendantia, decumbentia l. erecta, 1 — 5-pedalia.

Folia plerumque linearia, interdum involuta, rarius lanceolata, saepissime circa ligulam extus cingulo pilorum brevium notata.

Ligula ciliaris aut, si membranacea, brevissima, ciliatula.

Thrysus simplex, cylindraceus, pl. min. densus.

Spiculae intra involucellum solitariae l. 2 — 4 sessiles aut pedicellatae, lanceolatae, hemiologamae. *Glumae* 2 vel, inferiore suppressa, 1, membranaceae, variae longitudinis, enerves ubi minimae, ubi majores, inferior 1-, superior 3 — 5 — 7-nervis, integrae vel apice denticulatae. *Flosc. inferior* neuter vel masculus, 1 — 2 valvis, membranaceus l. subchartaceus, muticus, interdum caudulatus.

Flosc. superior hermaphroditus, ovato-lanceolatus, acutus l. acuminatus, membranaceus l. chartaceus, demum glumis firmior: valvula inferior superiorem arcte obvolvens. — *Involucrum*, spiculam vel spiculas cingens, constans e setis plurimis, plerumque valde inaequalibus, in plerisque spiculam superantibus, aut omnibus hispidis tantum, aut inferioribus (raro omnibus) inferne plumosis; sessile vel pedicellatum, spiculae, si haec sessilis, basi ipsi circumcirca enatum, si spicula pedicellata, pedicelli basin arcte cingens.

Lodicula plerumque nulla, in iis autem, quibus styli ad basin usque liberi, supermanifesta: squamae 2, fere ut in Panico, sed teneriores et extra valvulam superiorem sitae.

Ovarium ovale, glabrum. *Styli* plerumque inferne connati, liberi in lodiculatis tantum? *Stigmata* plumosa.

Stamina 3. Antherae lineares.

Fructus caryopsis oblonga, depressa, intra valvulas clausas libera, eberbis, exsulca, scutello suo duplo (duplove magis) vel tertiam partem longior.

OBS. Genus *Cenchrus* nimis fortasse affine, cuius involucella magis tantum indurata eandem ad *Pennisetum* habent rationem, quam v. gr. *Echinaria* ad *Sesleria* aut *Sclerochloa* ad *Poam*.

D i v i d i t u r:

- a) Ipsa spiculae basi (setis, rarissime villis) involucrata (*Pennisetum* et *Gymnothrix*).
- b) Spiculae pedicello basi involucrato, basi spiculae ipsa nuda (*Penicillaria*).

a. *Spiculae basis ipsa involucrata:*

α. *Involucellis hispidis,*

* *pedicellatis.*

Pennisetum compressum Br. Thyrso solitario, densiusculo (palmaris L. breviori); Involucellis (1 — 2-floris) pedicellatis: setis hispidis, inaequalibus, spicula solitaria sensim subtriplo longioribus; Gluma inferiore pusilla, superiore flosculis duplo breviori; Hermaphrodito acutissimo, neutrum 1-valve acuminatum aequante; Folii angusto-linearibus, glabris.

Pennisetum compressum. R. et S. II. p. 261.

Setaria compressa Kth. Agr. syn. p. 150.

α. Involucellis purpureis:

Cenchrus purpurascens Thbg! in Linn. trans.

Panicum hordeiforme γ, Thbg. Pl. jap. — *P. alopecuroides* L. sp. pl. (nec Mant. 2.) excl. syn. Plucken.

Gymnothrix purpurascens Sw. ms. — *G. japonica* Kth. Agr. syn. p. 158.

Pennisetum japonicum Trin. in Spr. n. Entd. II. 76. Diss. II. p. 63. Ic. gr. II. tab. 19.

V. spp. Jap. et e sem. Cibsp. cult.

$\beta.$ Involucellis pallide flaventibus:

Alopecurus hordeiformis L. sp. pl. ed. 1.

Cenchrus hordeiformis Thbg. prodr. R. et S. II. p. 256. excl. syn. Desf.

Panicum hordeiforme Thbg. Fl. jap.

Gymnothrix cenchroides R. et S. II. p. 499. (excl. syn. PB.) Kth. Agr. syn.
p. 158. (excl. synn. N. ab Es. Steud. et Eckl.)

Pennisetum hordeiforme Sprgl. S. V.

V. spp. Cbsp.

Culmus 1 — 2-pedalis, simplex, compressus, infra thyrum pubescens.

Folia lineam lata, saepe involuta, praelonga. *Setae* longiores subaequales.

Spiculae, demis setis, ultrabilineales. *Ligula* nulla. *Styli* inferne connati.

** *Involucellis sessilibus.*

Pennisetum nervosum. Thyrso solitario, denso (palmari — spithameo); Involucellis sessilibus: setis hispidis, inaequalibus, spicula sensim quartam tertiamve partem longioribus; Gluma inferiore flosculis $\frac{3}{4}$ — $\frac{2}{3}$ breviori, superiore Hermaphroditique caudato-acuminato neutrum univalvem caudatum aequantibus; Foliis lato-linearibus, glabris.

Gymnothrix nervosa N. ab Es. Agr. bras. p. 277.

V. spp. Bras.

Culmus sesqui — bi-pedalis et ultra, nodis glabris. *Vaginae* glabrae. *Ligula* brevissima, ciliaris. *Folia* scabra, lineas 4 — 6 lata, dodrantalia — ultrapedalia. *Thrysus* gilvescens vel purpurascens. *Spiculae*, demeo involucello, 3-lineales. *Gluma* inferior acuta, 1-nervis, superior crasse 7 — 9-nervis. *Flosc. neut.* crasse 7-nervis. *Herm.* valv. inferior tenui-5-nervis, superior apice subcaudato brevi-bifida. *Lodiculae* squamae tenerae, cuneato-subquadratae, basi cruciatae, apice truncato emarginatae. *Styli* liberi.

† *Pennisetum macrostachyum.* Thyrso denso (dodrantali); Involucellis sessilibus: setis hispidulis, aequalibus, spicula quadruplo longioribus; Gluma inferiore mi-

nima, superiore flosculis duplo breviori; Hermaphrodito acuminato neutrum univalvem parum superante; Foliis linear-lanceolatis.

Gymnothrix macrostachys Brongn. it. Duperr. bot. p. 104. tab. XI.

Inss. Molucc.

Culmus geniculato-adscendens, 2 — 3-pedalis. *Vaginae* glabrae: *Ligula* brevissima, truncata. *Folia* subpedalia, lineas 6 — 8 lata, glabra, acuminata. *Thrysus* 6 — 8-pollicaris, fulvescens, apice nutans. *Gluma inferior* enervis, obtusa, *superior* 1-nervis, acuta. *Lodicula* nulla. *Styli* basi connexi.

Pennisetum macrourum. Thyrso solitario, denso (6 — 10-pollicari); Involucellis sessilibus: setis hispidis spiculam parum (in junioribus magis) superantibus: unica subdupo magisve longiori; Gluma inferiore minutissima vel obsoleta, superiore brevissima; Hermaphrodito acuto neutrum univalvem acutum aequante; Foliis angusto-linearibus, glabris.

Pennisetum macrourum Trin. Diss. II. p. 64.

Gymnothrix caudata Schrad. Schult. Mant. 2. p. 284. Kth. rev. gr. tab. 38. Agr. syn. p. 159. — *G. hordeiformis* N. ab Es. in Linn. 1832. p. 276. excl. syn. Thbg. (Inter plantas Ecklonianas nomine *Perotis latifoliae* prostat).

V. spp. Cbsp.

Culmus 3-pedalis, simplex. *Vaginae* glabrae l. pilis brevissimis adspersae. *Ligula* ciliaris. *Folia* rigidiuscula, lineas 2 — 3 lata, pedalia, sicca involuta. *Thrysus* flavescens. *Spiculae* sine involucello 2-lineales. *Lodiculae* squamae subcuncatae l. subquadratae, non emarginatae, tenerae. *Styli* liberi.

Pennisetum alopecuroides Steud. Thyrso solitario, denso (sesqui — sub-3-pollicari); Involucellis sessilibus: setis hispidis, inaequalibus, spicula sensim duplo longioribus; Gluma inferiore nulla, superiore minima; Hermaphrodito rostrato-acuminato neutro univalvi caudato-setigero longiori; Foliis linearibus glabris.

Gymnothrix purpurascens Schrad. Schult. Mant. 2. p. 283. N. ab Es. in Linn. 1832. p. 277.

An *Panicum geniculatum* et *Cenchrus geniculatus* Thbg? R. et S. II. p. 255.

V. spp. Cbsp.

Culmus 1 — 2-pedalis, nodis glabris. *Vaginae* glabrae, faucem versus ciliatulae. *Folia* compressa, carinata, expansa linea latiora, palmaria — dorso-ventralia. *Thyrsus* saepe purpurascens. *Spiculae*, demto involucello, sesquilineales. *Gluma* superior eroso-truncata, enervis. *Flosc. neut.* 1 — 3-nervis, hermaphroditum non nisi seta sua aequans. *Herm.* valv. inferior 5 — 7-nervis. *Lodicula* nulla. *Styli* basi connati.

Pennisetum articulare. Thyrso solitario, densiusculo (2 — 3-pollicari); Involucellis sessilibus: setis hispidis, inaequalibus, spicula sensim duplo triplo longioribus; Glumis flosculis subdupo brevioribus: superiore paulo longiori; Hermaphrodito acuminato, neutrum vel masculum bivalvem subaequante; Foliis (numerosissimis) angusto-linearibus, inferne hinc inde pilis adspersis.

Pennisetum articulare Trin. Diss. II. p. 65, Ic. gr. XXIV. tab. 287. Kth.

Agr. syn. p. 163.

V. spp. Nucahiv. (Inss. Marchion.)

Culmus decumbendo ramosissimus et foliosissimus, ramis ramosis, 1 — 2-pedalibus, nodis glabris. *Vaginae* glabrae l. pilis tenuissimis adspersae. *Ligula* ciliaris. *Folia* lineas 1 — 2 lata, fere fastigiata, culmum floriferum subaequantia, scabrinacula. *Thyrsus* flavescentes l. purpurascens. *Spiculae*, demto involucello, 2 — 3-lineales. *Glumae* acutissimae: inferior 1-, superior 3-nervis. *Flosc. incompleti* valv. inf. 5-nervis. *Lodicula* nulla. *Styli* basi connati.

Pennisetum parviflorum. Thyrso solitario l. e vaginis superioribus aliquot fasciculato-pedunculatis, densis (palmaribus — spithameis, angustis); Involucellis sessilibus: setis (parcis) hispidis, inaequalibus, spicula sensim paulo longioribus: unica longissima; Gluma inferiore nulla, superiore flosculis lon-

giori; Hermaphrodito obtusiusculo, neutro masculove bivalvi minori; Foliis linearibus, sub lente pilis brevissimis adpressis adspersis.

Pennisetum parviflorum Trin. Diss. II. p. 65. (excl. syn. Poir.). Ic. gr. XXIV. tab. 288.

V. spp. e Sierra Leone.

Culmus sesqui — 2-pedalis, decumbens, ramosus, nodis glabris. *Vaginae* glabrae vel faucem versus ciliatae. *Ligula* ciliaris. *Folia* lineas 1 — 2½ lata, inferiora spithamea, sub lente glandulis minimis adpresso-piliferis adspersa. *Thyrsus* circiter sesquilineam crassus, demum fuscescens. *Spiculae*, demto involucello, vix lineam longae. *Involucelli* setae circiter 9, unica spicula 3 — 4-plo longior. *Gluma* superior brevi-aciculata, 5-nervis. *Flosc. inferior* gluma circ. quartam partem brevior: valv. inf. subcuspidata, 5-nervi. *Herm.* demum subco-riaceus, flosculo inferiore fere tertiam partem brevior. *Lodicula* nulla. *Styli*...

Pennisetum latifolium Sprgl. Thyrsis aliquot e vaginis superioribus fasciculato-pe-dunculatis, densis (sesqui — bi-pollicaribus); Involucris sessilibus: setis hispidis, inaequalibus, spiculam sensim aequantibus: unica plus duplo longiori; Gluma inferiore minima, superiore flosculis pl. min. triplo breviori; Hermaphrodito acuto, neutro acuminato univalvi breviori; Foliis lato-lan-ceolatis, glabris,

Gymnothrix latifolia Schult. Mant. 3. p. 601. N. ab Es. Agr. bras. p. 278.

V. spp. Montevid.

Culmus fere orgyalis, simplex, nodis strigilosso-barbatis. *Vaginae* superiores glabrae, *Ligula* ciliaris. *Folia* in petiolum attenuata, majora medio pollice latiora, fere bipedalia. E vaginis superioribus rami aliquot versus medium vaginati: hac vagina pedunculos emitte tenues, curvatos, inaequales, thrysiferos. *Thyrsi* virescentes. *Setae* superne saepe purpurascentes. *Spiculae*, demto involucello, sub- 3-lineales. *Lodiculae* squamae cuneato-quadratae, emarginatae, basi cruciatae. *Styli* liberi.

*β. Involucellis plumosis,*** pedicellatis.*

Pennisetum fasciculatum. Thyrso solitario, laxo (2 — 3-pollicari); Involucellis pedicellatis, 1-vel fasciculato- 2 — 3-floris: setis inaequalibus, spicula sensim subduplo longioribus: interioribus plumosis: intima elongata; Gluma inferiore flosculis fere triplo, superiore iisdem paulo breviori; Hermaphrodito caudato-cuspidato masculum bivalvem acutissimum aequante; Foliis linearibus, glabris.

V. spp. Pers. et e monte Sinai.

Culmus vix pedalis, inferne fasciculato-ramosissimus, ramis adscendentibus, floriferis. *Nodi* barbati. *Vaginae* glabrae, superne ciliatae. *Ligula* brevisima, ciliaris. *Folia* compressa, explanata vix lineam lata, 4 — 5-pollicaria (superiora breviora). *Thyrsus* pallidus l. purpurascens. *Axis* pubescens. *Pedicelli involucrorum* brevi-lanati. *Spiculae*, demto involucello, 3-lineales. *Gluma* inferior obtusa, superior aciculata, 3-nervis. *Flosc. masc.* valv. inf. 5-nervis. *Lodicula* nulla. *Styli* basi connati.

*** Involucellis sessilibus.*

Pennisetum cenchroides Rich. Thyrso solitario, densiusculo (1 — 2-pollicari); Involucellis (sub-) sessilibus, 2 — 3-floris: setis inaequalibus, spicula sensim duplo longioribus: interioribus plumosis: intima longiori, crassiori; Gluma inferiore flosculis duplo-, superiore iisdem tertiam quartamve partem breviori; Hermaphrodito acutissimo masculum bivalvem aequante; Foliis linearibus, excepta basi glabris.

Pennisetum cenchroides. R. et S. II. p. 259. N. ab Es. in Linn. 1832. p. 277.
excl. syn. Thbg. — *P. ciliare* Lk. ht. Berol.

Panicum vulpinum W. En.

Cenchrus ciliaris L.

V. spp. Mader. Canar. Cap. vir.

Culmus (plantae spontaneae) dodratalis, ramosus. *Vaginae* glabrae l. superne e glandulis piliferae. *Folia* lineam lata, palmaria et ultra. *Thrysus* purpurascens. *Spiculae*, demto involucro, 2-lineales. *Lodicula* nulla. *Styli* inferne connati. *Pennisetum dichotomum* Delile. Thyrso solitario, densiusculo (sesqui — ultra- bi-pollicari); Involucellis sessilibus, 1-floris: setis parum inaequalibus, spicula paulo longioribus: interioribus aliquot plumosulis; Gluma inferiore flosculis paulo breviori, superiore Hermaphroditoque acutissimo masculum bivalvem aequantibus; Foliis involutis, glabris (breviusculis, rigidulis).

Pennisetum dichotomum. Schult. Mant. 2. p. 148. — *P. phalaroides* Schult.

l. l. p. 147. sub *P. polystachyo*.

Phalaris setacea Forsk.

(an *Panicum dichotomum* Forsk?)

V. spp. Aeg. et Ind. or.

Culmus 1 — sesquipedalis, decumbens, basi ramosus, ut totum gramen vidulo- vel stramineo-pallens. *Vaginae* glabrae, sulkatae, inferiores solutae emarcidae. *Ligula* ciliaris. *Folia* 1 — ultra- bi- pollicaria, infima breviora. *Spiculae*, demto involucello, 3-lineales. *Setae* interiores parce et tenui-pilosae. *Gluma* inf. 1-, superior 7-nervis. *Flosc. masc.* valv. inf. 5-nervis. *Lodicula* nulla. *Styli* basi connati.

Pennisetum setosum Rich. Thyrso (rarius) solitario, (plerumque) e vagina una alterave (interdum e pluribus simul) aliquot fasciculato-pedunculatis, densis (palmaribus — spithameis); Involucellis sessilibus, 1-floris: setis inaequalibus, spicula sensim duplo longioribus: interioribus plumosis: intima elongata; Gluma inferiore flosculis duplo — triplo breviori — minima l. nulla, superiore iisdem paulo longiori; Hermaphrodito apice barbulato masculo l. neutro 1 — 2-valvi tertiam partem minori; Foliis (lanceolato-) linearibus, glabris.

a. Gluma inf. flosculis circiter triplo breviori, Flosc. masc. l. neutr. bivalvi, Setarum plurimis spicula duplo longioribus:

Pennisetum setosum. R. et S. II. p. 259. (excl. synn. praeter LaM). Trin. Diss. II. p. 66. Ic. gr. II. tab. 20. — *P. purpurascens* Hb. et Kth. — *P. breve* N. ab Es! (setis atropurpureis). — *P. Richardi* Kth. rev. gr. tab. 39. Agr. syn. p. 161. (an synn. Rich. et Poir. priora, et Neesii?) — *P. triticooides* R. et S. II. p. 877.

Panicum alopecurus LaM. — *P. triticooides* Poir.

Cenchrus setosus Sw!

V. spp. Mex. Ind. occ. Bras. Cap. vir. Seneg. Jav.

β. Gluma inf. nulla, Flosc. neutr. 2-valvi; Setis ut in α, aut non nisi aliquot spicula longioribus, unde spiculae minores videntur:

Pennisetum violaceum Hort. Trin. Diss. II. p. 67. (an Rich. cum syn. LaM., quibus involucellum spiculas aequare dicitur? Nec, ut videtur, Kth. rev. gr. tab. 40. Agr. syn. p. 161). — *P. uniflorum* Sieb. Hb. Mart. no. 23.

V. spp. Ind. occ. Mex. Seneg.

(Misit b. SWARTZ s. n. *Pennis. purpurascens* et *Pennis. setoso proximi*. — Folia in culta planta saepe lato-lanceolata).

γ Gluma inferior minima, Flosc. neutr. univalvi;

Pennisetum uniflorum Hb. Kth. n. gen. tab. 34.

V. spp. Seneg.

Culmus circ. 2-pedalis, medio l. superne ramosus. *Vaginae* glabrae. *Ligula* ciliaris et plerumque pilis longis exsertis stipata. *Folia* facie aspera, saepe compressa, expansa lineas 2 — 4 lata (in culto gramine plana, interdum satis lato-lanceolata), digitalia — spithamea (in culto longiora). *Thrysus* gilvescens l. pl. min. purpurascens aut purpureus. *Axis* glaber. *Spiculae*, demto involucello, ultra-sesqui — 2-lineales. *Glumae* tenero-membranaceae: inferior vaga, superior 5 — 7-nervis, apice dentato-acuta. *Flosc.* incompl. valv. inf. apice dentata, 5-nervis. *Lodicula* nulla. *Styli* basi connati.

Obs. Huc fortasse etiam *Panicum polystachyum* L. — *Pen. borbonicum* Kth. rev. gr. t. 41. (*Pan. longisetum* Poir.) differt a *setoso*, cui simillimum, gluma superiore flosculis quadruplo breviori.

Pennisetum pedicellatum. Thyrsis aliquot e vaginis superioribus fasciculato-pedunculatis, densis (ultrapalmaribus); Involucellis sessilibus, unifloris: setis inaequalibus: omnibus plumosissimis: interioribus spicula (pedicellata) plus duplo longioribus: unica (paulo) productiori; Gluma inferiore flosculis quartam tertiamve partem breviori, superiore eosdem superante; Hermaphrodito apice barbulato, masculo bivalvi paulo minori; Foliis linearibus, glabris.

V. spp. e Cap. vir.

Culmus (abscissus) videtur decumbens, 2 — 3 pedalis? (superne) ramosissimus, nodis glabris. *Vaginae* glabrae. *Ligula* brevissima, membranacea, ciliatula. *Folia* compressa l. plana (superiora lineas 2 lata et palmaria). E vaginis superioribus *pedunculi* 2 — 3, superne iterum vaginati, vagina hacce thyrsu basi involucrante. *Thyrsus* sordide gilvescens. *Axis* glaber. *Setae* numerosissimae, inferne dense plumosae. *Pedicellus* spiculae lineam longus, villis tenuissimis crispis vestitus. *Spiculae*, demto involucro, 2-lineales, basi lana tenuissima involucellatae. *Gluma* inferior 1-nervis, superior acuta, 5-nervis. *Flosc. masc.* valvulae parum inaequales: inferior 5-nervis: nervis, ut glumarum, tenuibus. *Lodicula* nulla. *Styli* . . .

b. *Spiculae, intra involucrum pedicellatae, basi nudae, ad pedicelli sui basin involucellatae (PENICILLARIA).*

(*Axis* crassior, pubescens. *Involucra* pedicellata spiculas subaequantia. *Hermaphroditus coriaceus*).

Pennisetum typhoides Rich. Thyrso cylindraceo, densissimo (1 — 2 — 3-pollicari); Involuci 2 — 3-flori setis interioribus pl. min. plumosis; Gluma utraque obsoleta vel pusilla (aut superiore perparva); Hermaphrodito acuto, masculum & neutrum bivalvem excedeant; Foliis lanceolato-linearibus, (in spontan.) tuberculato-pilosis.

Panicum americanum L. sp. pl. ed. 1.

Holcus spicatus L. sp. pl. ed. 2. *

Pennisetum typhoides. Delile Aeg. tab. 8. f. 3.

Penicillaria spicata Willd. R. et S. II. p. 498. — *P. Plukeneti* Lk. ht. Berol. (fol. vaginisque glabris).


V. spp. Aeg. et cc.

Culmus spontaneus 3-pedalis, erecto-rainosus, nodis nunc glabris nunc pilosis, superne infra thyrum pubescens. *Vaginae* et *Folia* cultura sebaritiem et pilos pl. min. exuant. *Pedicellus* involuci nunc brevior nunc longior, quod etiam de pedicellis spicularum valet. *Spiculae*, demto involucro et pedicello, pl. min. 2-lineales. *Lodicula* nulla. *Styli* inferne connati.

Pennisetum cereale. Thyrsi cylindrico, densissimo (9-pollicari); Involuci 2—4-flori setis interioribus plumosis; Gluma inferiore minuta, superiore Hermaphroditoque obtuso (margine hyalino-membranaceo, ciliato) neutrum 1-valvum (villosum) subaequantibus; (Foliis lanceolato-linearibus? glabris?) an *Panicum spicatum* Roxb? Schult. Mant. II. p. 282. (sub *Penicillar. spicata*).

V. thyrsos e China (ubi colitur).

Orgyale. (*Vaginae* et *folia* non amplius suppetunt.) *Culmus* infra thyrum tenerrime pubescens. *Thyrsus* seminiferus lutescens, exacte cylindricus. *Involuci* (rarius subuniflori, plerumque 2-flori) pedicellus ipsius fere longitudine, villosus. Pedicelli spicularum intra involucrum ipsis breviores, glabri, clavati. *Spiculae* lineam longae. *Gluma* superior 3-nervis. *Flosculus* neut. enervis, dorso villosus. *Hermaphroditi* valv. inf. medio coriacea, superne 5-nervis. *Caryopsis* oblongo-subrotunda l. obovata, scutello suo tertiam partem longior.



X E R O C H L O A Br.

Panicula simplicissima, formata e vaginis spathaceis, alternis, flores includentibus. *Spiculae* hemigamae, sterilibus squamisque aridis circumdatae, intra vaginam communem: altera sessilis, altera pedicellata: utraque biflora: flosculo inferiore masc. l. neutro, superiore feminineo.

Gramina tropica Novae Hollandiae, juncea, subcoriacea, erecta, pedalia, Spinifex habitu quodammodo comparanda, tenuiora tantum, culmo simplici l. ex ipsa basi erecto-ramoso.

Folia e vaginis arctiuseulis, internodio multoties brevioribus, involuta, juncea, incurva.

Ligula brevissima, ciliaris.

Panicula angusta et simplicissima, formata e vaginis ad axin communem pauci-articulatum alternis, aridis, inflato-concavis, flores includentibus, quorum dispositionem et organisationem fusius descriptam v. in horum actor. Ser. VI. Tom. II. p. 326.

Xerochloa barbata Br! R. et S. II. 788.


V. sp. Nov. Holl.

Differt a *Xer. inberbi* non nisi squama spiculam inferiorem stipante barbata, quae glabra in illa.

T H O U A R E A Pet. Thouars.

Racemus simplex, solitarius, intra vaginam spathaceam, aphyllam. *Spiculae* alterno-solitariae binaeve in axi coriaceo, compresso. *Gluma* inf. (in spiculis inferioribus) nulla; superior et flosc. masculus membranacei.

Gramina orbis antiqui orientalis tropica, longe lateque repentia, foliosissima, brevi-ramosa.



Folia lanceolata l. lanceolato-linearia, breviuscula.

Ligula ciliaris.

Racemus simplicissimus, intra vaginam ramorum extimam spathaceam diu absconditus, nil nisi spicularum apicibus exstantibus, circiter semipollicaris, 5-florus. *Axis* coriaceus, e basi dilatata et compressa sensim attenuatus, inferne obsolete articulatus (nec solubilis). *Spiculae* intra axis cavum solitariae vel binae, hemiologamae. *Gluma* inferior in spiculis inferioribus nulla (vel ejus loco squamula minutissima), non nisi in spicula extima sterili saepe manifesta, tumque linearis, flosculis circiter tertiam partem brevior; superior membranacea, flosculos aequans, acuta, 7 — 9-nervis. *Flosculus* inferior masculus, bivalvis: valv. inferiore glumae superiori simillima. *Hermaphroditus* chartaceus, masculum aequans, ovato-lanceolatus, acutus, valvula inferiore 3-nervi superiorem obvolvens.

Lodiculae squamae 2, truncatae, hinc in denticulum productae.

Ovarium oblongum, glabrum. *Styli* 2. *Sigmata* plumosa.

Stamina 3. *Antherae* lineares.

Fructus caryopsis ovalis, subdepresso-teretiuscula, eberbis, inclusa-libera, scutello suo dimidio longior.

Obs. Spatha racemum involvens, in ramis terram versus refractis, medio in se ita replicata est, ut, apice basi adglunitato, saccum formet induratum, caryopsin includentem.

Thouarea sarmentosa Pers. Culmo glabro; Spiculis solitariis.

Variat foliis latioribus (lanceolatis, lineas 4 — 5 latis) et angustioribus (sesquiline. l. lin. 2- et qu. exc., latis), glabris et pl. min. pubescentibus.

Thouarea sarmentosa. R. et S. II. p. 807. Kth. Agr. syn. p. 174. rev. gr. tab. 35. — *Th. media* Br! (non diversa). — *Th. involucrata* Eschscholz! in Mém. de l'Ac. de St. Péters. Tom. X. p. 291.

An *Ischaemum involutum* Forst.

V. spp. N. Holl. Inss. Mulgr. Soc. et Carol.

Culmos vidi 6-pedales, nodis plurimis radicantes, ramis palmaribus, erectis. *Folia* sesqui- 3-pollicaria, indumento maxime variabilia, interdum glabra et glaberrima. Non omnes rami *Racemo* terminantur. *Spiculae* cum axi suo pl. min. pubescentes, interdum laevigatae, bilineales.

T R A C H Y S. Pers.

Racemi simplices 1 — 2. *Axis partialis* complanatus, articulatus. Ad articulum quemvis extus *Spiculae* (plerumque 4) subfasciculatae, subsessiles: *Gluma* flosculique sterilis *Valvula* inferioribus coriaceis.

Gramen Indiae orientalis, pl. min. pedale, decumbens, ramosum.

Folia linearis-lanceolata, breviuscula.

Ligula breviuscula, membranacea.

Racemi plerumque 2, approximato-alterni. *Axis partialis* ex articulis circ. 6 compositus: articulis 3 — 4-linealibus, demum solubilibus, formatis e nervo crasso, utrinque (altero latere paulo latius) herbaceo-alato: ala linearis, plurinervi. Ad basin cuiusvis articuli extus *Spicularum* fasciculus, e stipite communi brevissimo ita partito, ut spiculae inferiores (3) subfastigiatae sint, quarta aut, si plures, extima, paulo altius posita (sterili).

Spiculae inferiores completae: *Glumae* 3-nerves: inferior (olim pro lacinia involucelli sumta) flosculis plus duplo brevior, coriacea, lanceolata, plerumque recurva; superior-paulo longior, membranacea, pugioniformis, adpressa, inferne villosula. *Flosculus neuter* 2-valvis: valvula inferior maxima, coriacea, ovalis, cuspidato-acuminata, marginibus inflexis, 13-nervis; superior minutissima, oblonga, obtusa, unervis. *Hermaphroditus* neutro plus dimidio brevior, chartaceus, ovato-lanceolatus, acutissimus: valvula inferiore trinervi superiorem arcte obvolvens. — *Spicula extima* e paleis aliquot coriaceis et sterilibus pl. min. recurvis composita.

Lodiculae squamae 2, tenerae, truncatae, nervosae.

Ovarium ovale, nudum. *Styli* 2, inferne connati, elongati. *Stigmata* plumosula.

Stamina 3. *Antherae* lineares.

Fructus caryopsis elliptica, depressiuscula, eberbis, intra valvulas clausa libera, scutello suo duplo longior.

Trachys muricata Pers. (lapsu calami *mucronata* dicta). Kth. Agr. syn. p. 168.

Panicum squarrosum Retz!

Cenchrus muricatus L. Mant. Schreb. gr. tab. 34. R. et S. II. p. 255.

V. spp. Ind. or.

Vaginae nunc glabrae, nunc dense pubescentes. *Folia* nunc tenui-, nunc tomentoso-pubescentia. *Racemi* circiter sesquipolligares.

S T E N O T A P H R U M *Trin.* Fund. Agr. p. 175.

Spica torosa, aut continua aut demum articulatim solubilis, altero vel utroque latere *Spiculas* vel *Racemulos* in scrobiculis alternis fovens.

Gramina utriusque orbis pasenorū tropica, vel regiones tropicas meridiem versus paulo excedentia, ramosissima, longe lateque repentina.

Folia linearia l. lanceolata.

Ligula ciliaris.

Spicae in ramis terminales, interdum et axillares, solitariae. *Rhachis* torosa, de- pressa l. cylindracea, nunc articulata demumque solubilis, nunc continua: illa altero latere anantha, altero florifera; haec utroque latere alternatim flores serens.

Spiculae hemiologamae, serobiculis s. excavationibus rhacheos pl. min. profundis immersae, nunc solitariae, nunc in racemulis 2 — 5-floris. *Gluma* *inferior* (*antica*) minima, membranacea, enervis; *superior* (*postica*), non in omnibus evoluta tumque ipsa rhachi compensata, membranaceo - chartacea, flosculos

subaequans, 7-nervis. *Flosculi* 2, mutici, elliptico-ovati, subparallelis: *inferior* (anterior) neater l. *masculus*, 1 — 2-valvis: *valvalis chartaceis* l. *superiori teneriori*, *inferiori 3-nervi*; *superior (posterior)* *aequilongus*, *hermaphroditus*: *valvula inferiore subcoriaceo-chartacea*, *trinervi*, *superiorem aequilongam marginibus amplectente*.

Lodiculae squamae 2, cuneato-quadratae, truncatae, nervatae.

Ovarium oblongum, glabrum. *Styli* 2. *Stigmata plumosa*.

Stamina 3. *Antherae lineares*.

Fructus . . .

Stenotaphrum glabrum *Trin.* Diss. II. p. 60. *Spica articulata*, *depressa*, *hinc florifera*; *Foliis linearibus*, *pl. min.* *obtusis*.

* *Scrobiculatis 1 — 2-floris*:

Rottböllea dimidiata *Sw.* R. et S. II. p. 426. — *R. tripsacoides* *LaM.* — *R. stolonifera* *Poir.* (*Spicis brevioribus*, *depressissimis*).

Stenotaphrum sarmentosum *N.* ab *Es.* Agr. bras. p. 93. — *St. americanum* *Schrank* Ht. Mon. tab. 98. — *St. Koenigii* *id.* Flora 1824. Beyl. 1. p. 28. (*Spicula altera tertiale longius pedicellatis*, *vaginis longioribus*).

V. spp. Ind. occ. Guian. Bras. Inss. Sandw. Ind. or. Cbsp.

** *Scrobiculatis 3 — 5-floris*:

Panicum dimidiatum *L.* R. et S. II. p. 426.

Rottböllea dimidiata *L.* spp. — *R. complanata* *Sw.*

Stenotaphrum complanatum *Schrank* Flor. I. L. — *St. dimidiatum* *Brougn.* in Dup. it. Bot. p. 127.

V. spp. Mascar. Cbsp.

Stenotaphrum subulatum. *Spica continua*, *cylindraceo-subulata*, *utrinque florifera*; *Foliis lanceolatis*, *acuminatis*.

V. spp. Guahan (Inss. Marian).

Culmus prostratus, ramosus, multo quam in praecedente tenuior, late repens. *Nodi* plurimi, glabri, pl. min. geniculati. *Vaginae* teretes, glabrae. *Ligula* ciliaris. *Folia* plurima, lanceolata, acuminata, lineas 3 — 5 lata, pl. min. digitalia. E vagina ramorum supra prodit *Spica* stricta, circiter 3 — 4-pollicaris, angusto-cylindrica (vix lineam crassam), subulata, non articulata, viridis. *Racemuli* hinc et illinc alterni, excavationibus rhacheos impressi: inferiores 5-, superiores 3 — 2 — 1-flori. Axis partialis brevissimus, angulatus, ad angulos brevipilosus. *Spiculae* lineam et qu. exc. longae, ellipticae, acutae, antice complanatae. *Gluma inferior* minima, rotundato-truncata; *superior* nulla. *Flosculus inferior* neuter, 1 — vel 2-valvis: Valvula inferior forma spiculae, herbaceo-chartacea, 3-nervis; superior, si adest, pusilla, hyalino-membranacea. *Flosculus superior* (posterior) forma et magnitudine anterioris, subcoriaceo-chartaceus.

P A N I C U M L.

Inflorescentia racemata, thyrsata, jubata, paniculata. *Spiculae* biflorae, hemiologamae (interdum setis, e pedicello ortis, cinctae). *Glumae* (nonnumquam setigerae) proportione varia (inferior saepe minima, interdum obsoleta). *Flosculus superior* seminiferus, mulicus (l. brevissime caudatus aut aciculatus), coriaceus l. rarius chartaceus, *inferiore*, neutro l. masculo (interdum setigero), longe plerumque firmior. *Styli* 2.

Genus vastissimum, polymorphum, cuius conspectum geographicum species infra recensitae 255 ita praebent:

Species tropicae 217 } Occidentis s. Americae 144.
 } Orientis (computatis ins. maris pacif.) 73, (e Capite
 b. sp. species non nisi 4.)

Species extratropicae 38 } Americae borealis 24.
 } Eur. et As. australioris 5.
 } — — — borealis 9 (e quibus 3 [Echinochloa 1,
 Setaria 2] usque ad lat. bor. grad. circ. 60.)*)

Gramina solum omnis generis habitantia, a pollicum aliquot ad pedum triginta
alitudinem assurgentia, erecta l. prostrata.

Folia linearia (saepe involuta), lanceolata, ovata, cordata.

Ligula ciliaris l. membranacea, plerumque brevissima, sed et pl. min. producta; interdum nulla.

Inflorescentia maxime varia (neque vero Spica, nec Caduceus): *Racemus* nunc solitarius, nunc plures, digitati vel alterni vel jubarunt — *Thyrsus* simplex, vel pl. min. compositus — *Juba* — rarius *Panicula* vera.

Spiculae hemiologamae, (in *Isachnes* speciebus nonnullis hemigamæ) bifloræ (ubi gluma inferior obsoleta, nonnumquam pseudounifloræ), minimæ — 4-lineales, oblongæ, (rarissime orbiculatae), ovales, ovatae, obovatae, lanceolatae; thyrsatae plerumque setis e pedicellis sparsim enatis-, racematae saepe pilis cinctæ. *Gluma* inferior superiore longe plerumque minor, interdum pusilla l. obsoleta, rarius superiore aequans, rarissime subexcedens, nervis, quam superior, paucioribus (rarissime pluribus) 1, 3, 5, (7 — 9 — 15) notata; *superior* raro flosculos superans raroque illis brevior, 3 — 5 — 7 — 9 — 11 — 15-nervis, herbaceo-membranacea, mutica l. rarius (cum inferiore) setifera. — *Flosculus* inferior sessilis, 1 — 2-valvis, masculus vel neuter (rarissime subhermaphroditus vel, in *Isachnes* speciebus nonnullis, seminiferus): valvula inferior glumæ su-

*) Subdivisionum distributio geographicæ: *Cabrera*, tropica occidentalia omnia. *Digitaria*, tropica utriusque orbis 15, extratrop. 5. *Urochloa*, trop. orient. *Orthopogon*, trop. utr. 8, extratrop. 1. *Echinochloa*, trop. utr. 9, extratrop. 3. *Setaria*, trop. utr. 18, extratrop. 6. *Harpastachys*, trop. occ. omnia. *Brachiaria*, trop. utr. 31, extratrop. 4. *Virgaria*, trop. utr. 60, extratrop. 10. (Eur. austr. 2.). *Miliaria*, trop. utr. 55, extratrop. 15. (Eur. austr. 1.). *Ichnanthus*, trop. occid. omnia. *Isachne*, trop. utr. 0.

periori fere semper simillima ejusdemque substantiae herbaceo-membranaceae, 3 ad 15-nervis, mutica vel, rarius, setigera. Valvula superior, si adest, tenerior, binervis, plerumque inferiore brevior. — *Flosculus superior*, interdum brevissime pedicellatus, bivalvis, coriaceus demumque cartilagineus, vel rarius chartaceus tantum, plerumque clausus, flosculo incompleto haud raro brevior: valvula inferior convexa superiore planiore marginibus obvolvens, mutica, l. (rarissime) brevicaudata, aut apice, tam obtuso, brevissime aciculata.

Lodiculae squamae 2, subcuneato-quadratae, emarginatae (altero latere in paucissimis productioni).

Ovarium oblongum, glabrum. *Syli* 2. *Stigmata* plumosa.

Stamina 3, rarius 2. *Antherae* lineares.

Fructus caryopsis oblonga, libera intra valvulas induratas, eberbis, exsulca, scutello suo dimidio l. $\frac{2}{3}$ longior.

Subdivisiones.

A. *Flosculus inferior substantia glumae superioris; hermaphrodito, basi interiori nec scrobiculato nec appendiculato, planior.*

1. CABRERA. *Racemi simplicissimi, digitati. Axes pilis aureis ciliati. Spiculae subsessiles, regulariter biserialis, ellipticae, minimae l. parvae. Gluma inferior pusilla, vaga aut nulla. Hermaphr. muticus. Flosc. neut. 1-valvis.*

Ob glumulam inferiorem frequentius manifestam quam nullam et ob inflorescentiam Panico (Digitariae) propriam quam Paspalo, illi nec huic associanda sectio.

2. DIGITARIA. *Racemi simplices (raro solitarius), subdigitato l. jubato-approximati, subfastigiati. Spiculae subsessiles vel pedicellatae, plerumque irregulariter (rarissime seriatim) dispositae, pl. min. lanceolatae. Gluma inferior pusilla, rarius nulla. Hermaphr. muticus. Flosc. neut. 1-valvis.*

3. UROCHLOA. *Racemi umbellato-digitati. Spiculae irregulariter dispositae, inaequali-pedicellatae, ovatae. Gluma inferior flosculis dimidio brevior.*

Hermaphr., subulato-caudatus. (Squamae lodiculares hinc in dentem l. lobum acutum productae).

4. ORTHOPOGON. *Racemi alterni. Spiculae subirregulariter dispositae. Glumae flosculis breviores: altera vel utraque, nec non subinde flosculo incompleto ex apice setiferis.*
5. ECHINOCHOA. *Racemi alterni l. subjubati, simplices l. compositi. Spiculae brevissime pedicellatae, imbricatae, 2 — 6-serialis, totae strigiloso-hirtae. Flosculus incompletus acuminatus vel pl. min. longe caudato-subuliferus.*
6. SETARIA. *Thysus simplex aut compositus, l. Racemi (subthyrsiformi-) jubati:*
 - a) *Axis partialis* in setam productus lateraliter exserentem pedicellum spiculae, nunc solitariae, nunc, si harum plures, terminalis (PABACTAENUM PB.).
 - b) *Spicula quaeris* setis, e pedicello pronatis, hispidis stipata.
7. HARPOSTACHYS. *Racemus simplicissimus, solitarius, (rarissime 2, subconjugati). Spiculae subsessiles, imbricatae, regulariter 1 — 2 — 4-serialis, nonnumquam subdistichae.*
8. BRACHIARIA. *Racemi simplicissimi, alterni: axi partiali anguloso, plerumque triquetro). Spiculae (glabrae, pilosae vel lanatae nec totae strigilosae) sessiles l. brevissime pedicellatae, pl. min. imbricatae, 2 — 3 — 4-serialis, muticæ.*
9. VIRGARIA. *Radius alterni, jubati vel paniculati, manifeste angulosi (plerumque 3-quetri), nunc racemiformes (racemis compositis, pedicellis brevissimis), nunc virgati aut vario modo compositi et decompositi, pedicellis brevioribus longioribusve.*

Radioli, in radiis racemiformibus interdum brevissimi et biflori, hos tum simplices mentiuntur; sed in his spicula inferior non ex eadem, cum superiori, basi (ut in Brachiaria), sed manifeste ex axi partiali (brevissimo) ipso, supra ejusdem basin, prodit. Itaque, ubi in definitionibus de pedicellorum longitudine agitur, horum semper in racemulis insimis, nec terminales (quippe qui nil nisi axis ipsius extremitas) intelligendi sunt. — Radii in Virgariis semper distincte angulosi (triangularis), praescritum, in re dubia, jubae vel paniculae superiores. Ubi vero nihilominus de specie quaerenda dubia manent, inspiciendae erunt Miliariae, radiis subangulosis (nonquam triangularibus, sed non perfecte teretibus tantum).

10. **MILIARIA.** *Radius alterni, jubati, paniculati, teretes vel subangulosi (angulis irregularibus l. obtusis), compositi, decompositi.* (De charactere Miliariae, i. e. de radiis *teretibus* dubio, radii juba vel paniculae *superiores* prae reliquis consultandi sunt).

B. *Flosculus inferior ut in A. Hermaphroditus basi faciei utrinque canaliculato-scorbiculatus vel (plerumque) auriculato-appendiculatus* (de quibus appendicibus et scorbiculis vid. infra OBS. sub *Pan. Ichnantho*):

11. **ICHNANTUS.**

(Panicula l. juba. Spiculae longe plerumque magnae. Gluma inferior fere semper magna s. dimidia spicula longior. Folia lanceolata l. ovata).

C. *Flosculus inferior ejusdem cum hermaphrodito formae ac substantiae, saltem glumis firmior:*

12. **ISACHINE.**

(Panicula l. juba. Spiculae orbiculato-obovatae, obtusae, linea numquam longiores, plerumque minores. Flosculus superior saepe semineus tantum, brevipedicellatus, interdum (rarius una cum inferiore) pubescens. Paleae omnes subaequilongae).

I. Cabrer a.

Panicum holochrysum. Sesquipalmare, erectum. Racemis 2, subconjugatis l. 3 — 5 approximatissimis (subpollicaribus); Axi spicula subangustiori; Spiculis parvis, (laxis), oblongo-obovatis, acutiseulis, hirsutis; Gluma inferiori obsoleta l. nulla; Folii linear-lanceolatis vaginisque hirsutissimis.

Paspalum radicum Trin. in Cat. dupl. mus. Acad. Petrop.

V. spp. Bras.

Culmus filiformis, strictus, glaber, inferne erecto- et florifero-ramosus. Vaginae compressiusculae, ampliatae. Ligula ciliaris. Folia e basi latiori sensim

attenuata, lineam et qu. exc. lata, vix pollicaria. *Axis communis*, si racemi duobus plures; 3-linealis. *Racemi* tenues, patentissimo-divaricati. *Gluma superior* et flosc. neuter 5-nerves (nervo medio in hoc obsoleto), ad nervos hirsuti. *Hermaphroditus laevis*.

Panicum chrysostachyum. Pedale, erectum? Racemis 7 — 10, subdigitato-approximatissimis (sesquipollicaribus); Axi spicula subangustiori; Spiculis pusillis, obovatis, obtusis, glabris; Gluma inferiori pusilla; Folii carinato-compressis, hirsutis.

Paspalum chrysostachyum Schrad. N. ab. Es. Agr. bras. p. 81. Trin. Diss. II. p. 88. Ic. gram. IX. tab. 101. Kunth Agr. syn. p. 64.

V. spp. Bras.

Culmus basi florifero-ramosus, inferne foliosissimus. *Vaginae* confertissimae, carinato-compressae, glabrae, faucem versus tomentoso-pilosulae. *Ligula* margo membranaceus angustissimus. *Folia* confertissima, subcoriacea, angusta, incurva, pungentia, bipollucaria. *Axis communis* circiter semipollicaris. *Racemi* erecti. *Spiculae* linea dimidia breviores. *Gluma* inferior minuta, truncata, superior 5-nervis. *Flosc. neuter* 3 — 2-nervis. *Hermaphroditus* albens, tenuissime punctulato-striatus.

Panicum aureum. Sesqui — tri-pedale, obliquum? Racemis 2 — 8, subdigitato-approximatissimis (2 — 4-pollicaribus); Axi spicula sublatiori; Spiculis minimis, obovatis, obtusiusculis, glabris (hirtulive?); Gluma inferiori pusilla (vaga); Folii compresso-linearibus, glabris (basi ciliatis).

Paspalum pulchrum Willd. herb. № ab Es. Agr. bras. p. 79. Kunth Agr. syn. p. 64. — *P. aureum* Trin. Diss. II. p. 88. Ic. gram. IX. tab. 97.

Digitalia aurea Sprgl. (excell. synn. Humb. et Lag.).

Var. culmo adpresso-ramoso, nodis glabris:

Paspalum ramosissimum N. ab Es. l. l. p. 80. Kunth. rev. gr. p. 499. t. 164.

Agr. syn. p. 64.

V. spp. Bras.

Culmus (inferne) plurifolius et saepe ramosus. *Vaginae* carinato-compressae, glabrae, superne ciliatae. *Ligula* membranacea, brevissima. *Folia* acuminato-attenuata, firma, subpungentia, sesquilineam lata, inferiora palmaria — ultraspithamaea. *Axis communis* circiter semipollicaris; *partialis* spicula paulo latior vel eidem subaequilatus, pro spiculis recipiendis leviter scrobiculato-excavatus. *Spiculae* lineam dimidię longae l. paulo breviores. *Gluma* inferior, si adest, minuta, truncata; superior 5-, flosculus neuter 3-nervis. *Hermaphroditus* fuscus, punctato-striatus.

Panicum immersum. 1 — 2-pedale et ultra, erectum. Racemis 2 — 5 — 12, sub-digitato-approximatissimis (1 — 2-pollicaribus et ultra); Axi spiculis latiori; Spiculis pusillis, ovato-ellipticis, obtusiusculis, glabris; Gluma inferiori nulla; Foliis linear-lanceolatis, planis, glabris (ciliatulis).

Paspalum immersum N. ab Es! Agr. bras. p. 82. — *Pasp. excavatum* Trin. Diss. II. p. 88. — *Pasp. aureum* HbKth.?

V. sp. Bras.

Culmus simplex vel e basi erecto-ramosissimus. *Vaginae* carinato-compressae, glabrae. *Ligula* membranacea, brevissima. *Folia* subacuminata, flaccida, lineas 4 — 6 lata, spithamea et longiora. *Axis communis* in oligostachyo gramine subnillus, in polystachyo sub-ultra-semipollicaris; *partialis* spiculis ambabus latior, pro ipsis recipiendis profundius serobiculatus. *Spiculae* linea dimidia breviores. *Gluma* et *Flosc.* neuter, dissitissime binerves. *Hermaphroditus* spadicescens, laevis.

Panicum chrysodactylon. Sesqui — 3-pedale, erectum l. adscendens. Racemis 2 — 6, subdigitato-approximatissimis (3 — 4-pollicaribus); Axi spicula angustiori vel ejusdem latitudine; Spiculis parvis, obovato-ellipticis, seriatim hirtis; Gluma inferiori pusilla, vaga; Foliis linearibus l. sublanceolato-linearibus, planis involutisve, hirsutis glabrisve.

Paspalum canescens N. ab Es! Agr. bras. p. 79. Trin. Diss. II. p. 89. Ie. gram. IX. tab. 98.

V. spp. Bras.

Culmus simplex. *Vaginae* graminis angustifolii teretiusculae, hirsutae, latifolii carinato-compressae, glabrae. *Ligula* margo membranaceus, brevissime ciliatus. *Folia* acuminata, rigidiuscula: in aliis involuta et glabra, in aliis (genuino Neesii gramine) plana, lineam l. cum dimidia lata, glabra. *Axis communis* vix semipollicaris. *Spiculae* linea breviores, interdum mucronulatae. *Gluma superior* et *Flosc. neuter* 5-nerves, ad nervos pl. min. hirti. *Hermaphroditus* fuscescens.

II. D i g i t a r i a.

Panicum platycarphum. Erectum, culmo ramosissimo. Racemis 2 — 3 digitatis, arcte (biseriatim) floriferis; Spiculis (ad axin ipsis latiore) solitariis, altralinealibus, lanceolato-ellipticis, acutis, pubescendo-villosulis; Gluma inferiore nulla, superiore minima. Folii lanceolato-linearibus vaginisque glabris glabriusculisve.

V. spp. Inss. Bonin.

Caespitosum, circiter dodrantale. Rami consertissimi et inferne foliosissimi. *Vaginae* teretiusculae, carinatae. *Ligula* brevis, membranacea, lacera, utrinque brevi-auriculata. *Folia* firma, pungendo-acuminata, sesquilineam lata, pl. min. sesquipollicaria, plurima, consertissima, glabra vel pilis tenuibus rarsusque adspersa. *Pedunculi* e foliorum sarcinis exsurgunt nudi, terminati Racemis 2 — 3 digitatis, contractis, sere bipollicaribus. *Axis partialis* subfoliacetus, linea angustior, spiculis latior, glaber, fronte utrinque ad septum medium scrobiculatus pro recipiendis *Spiculis* alternis, adpressis. *Gluma* superior posterior, minuta, quasi in fimbrias soluta. *Flosculus neuter* 1-valvis, 7-nervis, marginibus pubescendo-villosulus. *Hermaphroditus* neutrum aequans, chartaceus, laevis. — Racemi *Paspalum* mentiantur.

† *Panicum Gaudichaudii* Kth. Erectum, culmo simplici. Racemis 7 — 16, fasciculato-jubatis, arcte (biseriatim) floriferis; spiculis solitariis, subultralinealibus,

linearis-ellipticis, obtusiusculis, glabris; Gluma inferiori nulla, superiori pusilla; Foliis linearibus vaginisque glabris.

Panicum Gaudichaudii Kth. rev. gr. tab. 106. Agr. syn. p. 86.

Digitaria stricta Gaudich. in Freyc. it. p. 409.

Inss. Marian.

Culmus bipedalis et altior, nodis glabris. *Vaginae* teretes, glabrae. *Ligula* membranacea, breviuscula. *Folia* glaberrima. *Spiculae* subsessiles. *Glumula* ovato-lanceolata, acuta. *Valvula neutra* sub-7-nervis. *Hermaphroditus* obtusiusculus.

Panicum denudatum Kth. Decumbens? Racemis 4 — 12 fasciculato-jubatis, arcte floriferis; Spiculis geminis, minimis, ovalibus, glabris; Gluma inferiore nulla, superiore pusilla; Foliis sublinearibus (longis) pilis rarissimis adspersis.

Panicum denudatum Kth. Agr. syn. p. 80.

Digitaria denudata Lk.

V. cc. ex hto Berol.

Culmus 1 — 2-pedalis. *Vaginae* compressae, ad fissuram superne villosulae. *Folia* lineas 1 — 3 lata, spithamea — dodrantalia, flaccida, inferne pilis raris adspersa. *Racemi* tenues. *Gluma superior* interdum obsoleta. *Flosc. neuter* 7-nervis. *Perianthium* demum atropurpurascens. — A sequente vix nisi spiculis paulo minoribus, flosculo neutrō 7-nervi, et culmo foliisque minus firmis diversum.

Panicum fasciculare Ht. Goett. Decumbendo-obliquum. Racemis pluribus digitatis et fastigiatis, vel plurimis jubato-fasciculatis, arcte floriferis; Spiculis geminis, parvis, lanceolato-oblongis, glabris; Gluma inferiori nulla, superiori pusilla; Foliis sublanceolato-linearibus, sebriusculis, vaginis hirsutis.

Panicum bifasciculatum Trin. Diss. II. p. 76. — *P. Schraderi* Kunth rev. gr. p. 32. Agr. syn. p. 80.

Digitaria villosa ht. Vienn. — *D. fascicularis* Lk. ht. Berol.

V. cc.

Culmus pl. min. bipedalis. *Vaginae* compressae, carinatae. *Folia* glabra vel pubescentia pilisve adspersa, superiora racemos subaequantia. *Racemi* inferiores 3-pollicares et ultra. *Spiculae* pl. min. interrupte et irregulariter imbricatae. *Flosc. neut.* 5-nervis. *Hermaphroditus* mucronulatus flosculum neutrum subexcedens.

Panicum pruriens. Prostratum. Racemis 3 — 7 digitatis l. jubato-fasciculatis, laxe floriferis; Spiculis geminis, subultra-linealibus, linearis-lanceolatis, ad latera nervosque plerumque pubescentibus; *Gluma* inferiore pusilla l. obsoleta, superiore minima; Foliis lanceolato-linearibus, asperimis.

Panicum pruriens Trin. Diss. II. p. 77. Ic. gram. VIII. tab. 92. (var. foliis hirsutis). Kth. Agr. syn. p. 83.

V. spp. Iuss. soc. Sandw. Carol. et Marchion.

Culmus 2 — 3-pedalis, ramosus. *Vaginae* carinatae, nunc hirsutae, nunc villosae, nunc glabrae, plerumque a culmo solutae. *Folia* nunc hirsuta, nunc pubescentia, nunc glabra, semper asperima (nec nisi in gramine ex ins. Ulea Carolin. vix scabriuscula vidimus). *Racemi* satis tenues, 3 — 4-pollicares. *Gluma* inferior, si adest, pusilla, truncata; superior flosculis saltem sexies brevior, glabra l. ad nervos (3) pubescens. *Hermaphroditus* mucronulato-acutus.

Panicum corymbosum Roxb! Prostratum (natans): Racemis pluribus (15) jubato-fasciculatis, arcte floriferis; Spiculis geminis, sublinealibus, linearis-oblongis, acutis, ad latera pl. min. villosulo-pubescentibus; *Gluma* inferiore nulla, superiore minima; Foliis linearibus, hirtis.

Axonopus? corymbosus Schult. Mant. II. p. 177.

V. sp. Ind. or.

Racemi 4 — 8-pollicares. *Gluma* superior flosculis circiter quinques brevior, glabra l. villosula. *Hermaphroditus* mucronulato-acutus.

Panicum sanguinale L. sp. pl. ed. 1. Decumbens l. ascendens. Racemis 2 — 15, digitatis l. jubato-fasciculatis, pl. min. laxe floriferis; Spiculis geminis ternisve, linealibus, elliptico-lanceolatis, acutis, glabriusculis vel margine

pubescentibus villosis; Gluma inferiore pusilla l. (rarius) subobsoleta, superiore flosculis duplo-, duas tertias tertiamve partem breviori; Foliis sublanceolato-linearibus cum vaginis hirsutis glabriusculis.

1. Gluma superiori flosculis $\frac{2}{3}$ l. $\frac{1}{2}$ breviori.

a) Racemis crassioribus:

longioribus, spiculis glabris l. pubescentibus:

Panicum aegyptiacum Retz. (spiculis glabris).

Digitaria aegyptiaca Willd. R. et S. II. p. 471. — *D. umbrosa* Lk. (ex spicamine ht Berol.). — *D. sienitica* ht. Petrop. e sem. Berol. (racemis paulo gracilioribus). — *D. sanguinalis* Scop. R. et S. II. p. 469. (spiculis pubescentibus). — *D. eriogona* Schrad.

Phalaris velutina Forsk.

Dactylon sanguinale Vill.

Syntherisma vulgare Schrad.

Paspalum sanguinale Poir.

V. spp. Gall. Germ. Ross. austr. Taur. Cauc. Aeg. Teneriff. Cbsp. Inss. Sandw.

Idem, pumilum, racemis brevibus:

Digitaria australis Willd. herb.

Panicum ornithopus Trin. in Sprgl. n. Entd. II. p. 83.

V. spp. Inss. adsc. et soc.

Spiculis ciliatis:

Panicum ciliare Retz. Kth. Agr. syn p. 82. (an Syn. Schult. Neesii et Steud?)

Digitaria ciliaris Koel. R. et S. II. p. 472.

Syntherisma ciliare Schrad.

Paspalum ciliare DeC.

V. spp. Astr. Jap. Cbsp.

b) Racemis tenuioribus:

erectis, axi nudo, spiculis glabriusculis l. pl. min. pubescentibus:

Paspalum inaequale Link! En. Schult. Mant. II. p. 174.

Digitaria inaequalis Link ht. Berol.

V. spp. Ind. occ. Bras. Inss. Sandw. Soc. Mulgr. Philipp.

Oes. In gramine orientali saepe racemi tantum 2—3, digitati, pertenues).

Rac. divergendo-jubatis, axi pilis adsperso, spiculis glabriuseculis, pubescens l. ciliatulis:

Panicum horizontale Meyer. Kth. Agr. syn. p. 81.

Digitaria horizontalis Willd. R. et S. II. p. 474. — *D. setigera* Roth. R. et S. ibid.

Panicum trichostachyum Ht. Gor.

V. spp. Ind. occ. Bras. Cap. vir. Mascar.

2. Gluma superiore flosculis $\frac{1}{3}$ paulo breviori.

a) Racemis crassioribus:

Panicum glaucescens N. ab Es. Agr. bras. p. 100. — *P. Neesii* Kunth. Agr. syn. p. 84.

Digitaria marginata Link! Schult. Mant. II. p. 262. (Racemi cum foliis breviores tantum in gramine Neesii. — Trin. ic. gr. VIII. tab. 93).

Panicum Linkianum Kunth rev. gr. p. 33.

Nec diversa *Digitaria bifloris* Willd. (qu. v. ex. Ind. or. in hb. Mertensii patr.)

V. spp. Ind. occ. Bras. Mascar.

b) Racemis tenuioribus:

brevibus, digitatis; foliis brevibus et perangustis:

Panicum subtile N. ab Es. in Sieb. Agrostoth. no. 72.

V. spp. Mascar.

longioribus:

Panicum fimbriatum Presl! Rel. Haenk. I. p. 298. Kunth. Agr. syn. p. 81.

V. spp. Nov. Hisp. Inss. soc. Ind. or.

praelongis, spiculis remotis:

Paspalum distans N. ab Es! Agr. bras. p. 21. (Trin. Ic. gram. VIII. tab. 94).

V. spp. Bras.

Obs. Plantae cultae culmus haud raro erectus; *Panici aegyptiaci* spontanei semper pl. min. procumbendo-radicans. Foliorum vaginarumque pilositas inconstantissima. Spiculae interdum solitariae — quaternae; pubescens earum per gradus vagos transit in villositatem ciliarem. Glumula inferior numquam penitus desideratur: interdum in uno eodemque racemo nunc manifesta, nunc subobsoleta. Longitudinis glumae superioris limites non ita circumscripsi, ne vel in unius ejusdemque speciminis spiculis aliis flosculi dimidium, in aliis ejusdem duas tercias et qu. exc. partes attingat.

Panicum serotinum. Decumbens. Racemis 3 — 5, subdigitato-fasciculatis, sublaxifloris; Spiculis geminis, parvis, obovato-ellipticis, acutis, ad nervos pubescentibus; Gluma inferiore pusilla, superiore flosculis dimidio breviori; Foliis lanceolato-linearibus vaginisque hirsutis (glabrisve?).

Syntherisma serotinum Walt.

Digitaria serotina Mchx.

Paspalum serotinum Flügg. R. et S. II. p. 305 et 878.

V. spp. Carolin.

Specimina a cel. BOSC comm. 2: alterum foliis omnibus brevibus (sesqui — bi-pollicaribus), lanceolato-linearibus, cum vaginis insigniter hirsutis; alterum foliis (superioribus, culmus enim abscissus) angusto-linearibus, longioribus, cum vaginis glabris. — Racemi tenues. Spiculis albido-pallidis, pubescentibus (non villosulis) et parvis (non linealibus) a *Panico sanguinali* distinguitur.

Panicum glabrum Gaud. Subadscendendo-decumbens. Racemis 2 — 6, subdigitatis, laxiuscule floriferis; Spiculis geminis, linealibus, elliptico-oblongis, acutiusculis, pubescentibus; Gluma inferiore pusilla l. obsoleta, superiore flosculos subaequante; Foliis lanceolato-linearibus vaginisque glabris.

Panicum glabrum. Trin. ic. gram. XIII. tab. 149. Kunth Agr. syn. p. 83. —

P. sanguinale Foll. — *P. Ischaemum* Schreb. Erl. — *P. arenarium* MB! —

P. lineare Krock. — *P. humifusum* Kth. rev. gr. p. 33.

Digitaria filiformis Koel. — *D. humifusa* Pers. — *D. glabra* PB. R. et S. II. p. 471.

Syntherisma glabrum Schrad.

Paspalum dactylon Lam. — *P. ambiguum DeC.*

V. spp. Helv. Gall. Ross. aust. Cauc. Pers. Am. bor.

Raro pede longius. *Folia* vix unquam ultrabipollucaria, strictiuscula, semper nuda. *Racemi* pollices 2 raro excedunt. *Gluma* inferior rotundata (triquetra in *P. sanguinali*).

Panicum striatum Br. Decumbens. Racemis 10 — 18, subfasciculato-jubatis (filiformibus), laxiuscule floriferis; Spiculis geminis, parvis, oblongis (obovato-oblongis), acutis, margine puberulis; Gluma inferiore pusilla, superiore flosculos aequante; Foliis lanceolato-linearibus vaginisque glabris.

Panicum striatum. R. et S. II. p. 462. — *P. australe Sprgl.* S. V. Kunth
Agr. syn. p. 85.

Paspalum patulum Horn. R. et S. II. p. 313.

V. spp. n. Holl. et cc.

Sesqui — bi-pedale. *Racemi* pertenues, 4 — 5-pollicares, in planta spontanea conniventes, in culta patentibus. *Hermaphroditus* mucronatus.

Obs. Alia species e Nov. Holl., *Panicum ramulare* Trin. Diss. II. p. 244: Racemis (10), laxe jubatis, inferioribus compositis, laxe floriferis; Spiculis geminis, perparvis, oblongis, acutis, glabris; Gluma inferiore pusilla, superiore flosculis $\frac{1}{3}$ breviori; Hermaphroditio mucronato-acuto neutrum excente, — est quoque *Digitariae* species, cuius vero folia non vidi, et quam inter Panica Brownii desidero.

Panicum filiforme L. sp. pl. ed. 1. Erectum l. adscendens. Racemis 2 — 8, approximato-alternis l. subfasciculato-jubatis, laxiuscule floriferis; Spiculis geminis, parvis, oblongis, acutis, glabriusculis pilosulive; Gluma inferiore nulla, superiore flosculis paulo breviori; Foliis linearibus, inferne vaginisque hirsutis.

Panicum filiforme. Trin. ic. gr. XIII. tab. 148. (Varietas minor, adscendens).

Milium paniceum Sw.

Agrostis lenta Ht. Kew.

Digitaria pilosa Mchx. — *D. filiformis* PB.

Paspalus filiformis Flüg. R. et S. II. p. 304. (excl. synn. Walt. et Pers.).

V. spp. Am. bor. Bras.

Culmus simplex, rarius inferne erecto-ramosulus. *Vaginae* inferiores hirsutae. *Folia* erecta, basin versus pilis, quam vaginarum longioribus, obsita. *Racemi* pertenues, parum patuli, in planta humiliori (1 — sesquipedali) 2 — 3, pollices 1 — 3 longi; in altiori (2 — 3-pedali) 4 — 8, pollicum 3 — 5. *Axis communis* semi — 2-pollicaris, pertenuis.

Panicum debile Desf. Decumbens. *Racemis* 4 — 5, jubato-fasciculatis, laxifloris; *Spiculis* geminis, linealibus, elliptico-lanceolatis, acuminatis, subobsolete pubescentibus; *Gluma* inferiore pusilla, superiore flosculo neutro subcaudato-acuminato parum breviore, hermaphroditum aequante; *Foliis* angusto-linearibus, glabris.

Paspalum debile Poir. Enc. R. et S. II. p. 303.

Panicum filiforme Poir. it.

Digitaria debilis Willd.

V. spp. Numid. Neap.

Racemi tenues, speciminis Neapolitani pollicares, Numidiani pollices circiter 4 longi. — Insigne flosculo neutro caudulato-acuminato.

Panicum parvulum. Decumbens, ramis spithameis. *Racemis* 2, conjugato-digittatis, arctiuscule floriferis; *Spiculis* solitariis (— binis ternisve?*) subminimis, lanceolato-ellipticis, acutiusculis, pubescendo-villosulis; *Gluma* inferiore nulla, superiore flosculos aequante; *Foliis* lanceolato-linearibus (disticho-patentibus, brevissimis), glabris l. pilis adspersis.

Paspalum brevifolium Flüg! Monogr. p. 150. — *P. longiflorum* Retz. R. et S. II. p. 306. Présl. rel. Haenk. 1. p. 208.

Panicum longiflorum Gmel.

Digitaria longiflora Pers.

V. sp. Ind. or.

*) ex Flügge, contra Retzium, Preslii nostrasque observationes.

Culmus prostratus, pertenuis, nodis numerosis, internodiis brevissimis. *Folia* ramorum floriferorum per distantias 2 — 4-lineales disticha, patentia, subamplexicaulia, latiora lineam lata, attenuato-acuminata, longiora semipollicaria. *Racemi* brevipedunculati, tenuissimi, pl. min. pollicares, albidi, Paspaliformes. *Spiculae* linea dimidia parum longiores, brevipedicellatae, in nostro specimine solitariae. — Retzius, cui Paspalorum, quae novit, paucorum spiculae semper oblongae l. orbiculatae visae fuerant, hanc speciem, ob spiculas lanceolato-ellipticas, longifloram dixit.

Panicum connivens. Decumbens. Racemis 2 — 3, digitatis, laxiuscule floriferis; Spiculis geminis, ultralinealibus, lanceolato-ellipticis, acutis, glaberrimis; Gluma inferiore nulla, superiore flosculos aequante; Foliis lanceolato-linearibus, glabris (brevibus).

V. spp. Bras.

Totum glabrum. *Culmus* repens, ramosus, undique decumbens. *Nodi* numerosi, radicantes. *Vaginae* laxae, hirsutae. *Folia* pollice breviora, patentia; lineam lata, firmula. *Racemi* pallide et laete virides, contracti, sesquipollice paulo longiores. *Spicularum* binarum inferior brevi-, superior longius pedicellata. *Gluma* et flosculus neuter aequales, 7-nerves; *Hermafroditus* pallidus, acutus.

Panicum cuyabense. Decumbens. Racemis, circiter 10, subfasciculato-jubatis, laxiuscule floriferis; Spiculis geminis, linealibus, elliptico-lanceolatis, acutis, margine puberulis; Gluma inferiore nulla, superiore flosculos aequante; Foliis linearibus, scabris, vaginis hirsutis.

V. spp. Bras.

Tripedale, basi repens, nodis barbulatis. *Vaginae* inferiores hirsutae. *Racemi* parum patuli, minus quidem crassi, tamen tenues non vocandi, saturate virides: inferiores 4-pollicares.

Obs. Affinis *Digitaria violascens* Lk. (qu. v. c₉) differt racemis tenuissimis, pallidis, spiculis parvis.

Panicum mollissimum Kth. Decumbens. Racemis 3 — 9, alternis, laxe floriferis; Spiculis geminis, linealibus, ovato-ellipticis, villosulis; Gluma inferiore nulla, superiore flosculos subaequante; Foliis linearibus vaginisque velutino-pubescentibus.

Panicum mollissimum Kth. Agr. syn. p. 84. — *P. leucites* Trin. Diss. II. p. 85.

Milium velutinum DeC. R. et S. II. p. 321. — *M. filiforme* Sessé.

Digitaria villosa Pers. — *D. mollissima* Schrad.

Paspalum? velutinum Kunth Agr. syn. p. 65.

V. cc.

Racemi filiformes; pl. min. patentes, 3 — 4-pollicares, valde laxiflori. Totum gramen album.

† *Panicum gibbosum* Br. Erectum, basi ramosum. Racemo solitario, arctiuscule florifero; Spiculis ternis, parvis, lanceolato-ovatis, acutis, dense sericeo-pubescentibus; Gluma inferiore nulla, superiore flosculis $\frac{1}{3}$ breviori; Foliis angusto-linearibus, glabriusculis.

Panicum gibbosum. R. et S. II. p. 463. Kunth rev. gr. p. 383. tab. 105.

Agr. syn. p. 85.

N. Holl.

Culmus filiformis, superne pubescens. *Folia* latiora lineam lata, sesqui — subtri-pollicaria. *Vaginae* pubescentes. *Racemus* $2\frac{1}{2}$ pollicaris. Gluma superior dense sericea, arcuato-concava. *Flosculus* neuter hermaphroditio inferne gibbo longior, lateribus dense sericeus.

† *Panicum Gayanum* Kunth. Erectum. Racemis 2, digitatis, laxe floriferis; Spiculis subternis, linealibus, sublanceolato-ovatis, acutis, viloso-comatis; Gluma inferiore minima, superiore flosculos aequante; Foliis linearibus, inferne ciliatis.

Panicum Gayanum Kth. rev. gr. p. 239. tab. 31.

Senegal.

Culmus sesquipedalis, simplex. *Vaginae* glabrae, hispidulae. *Ligula* ciliaris. *Folia* sesquilineam lata, 2 — 3-pollicaria. *Spicula* tertia abortiva.

Gluma inferior rotundata, superior 3-nervis, villosa. *Flosculus neuter* 5-nervis, villosus. *Hermaphroditus* chartaceus, scaber, acuminatus.

Panicum phaeothrix Trin. ic. gram. VIII. tab. 91. Erectum. Racemis 4 — 6, sub-digitato-alternis, laxe floriferis; Spiculis geminis ternis, linealibus, ovato-ellipticis, hirsutis; Gluma inferiore obsoleta, superiore flosculis dimidio breviori; Foliis filiformi-involutis vaginisque glabris.

Trichachne ferruginea N. ab Es! Agr. bras. p. 90.

Panicum ferrugineum Kunth rev. gr. tab. 165. Agr. syn. p. 125.

V. spp. Bras.

Culmus 2 — 3-pedalis, gracilis. *Folia* spithamea — dodrantalia. *Axis communis* 1 — 2-pollicaris. *Racemi* conferti, inferiores semipedales. *Gluma* inferior minutissima l. nulla. *Flosculus neuter* bivalvis.

III. U r o c h l o a.

Panicum cimicinum Retz. Racemis 2 — 10, superne floriferis; Glumis trinervibus: superiore margine aequo ciliata; Lodiculae squamis hinc lanceolato-elongatis.

Milium cimicinum L. Mant.

Agrostis cimicina Poir.

Axonopus cimicinus PB. R. et S. II. p. 317. Mant. II. p. 177.

Urochloa cimicina Kunth rev. gr. tab. 103. Agr. syn. p. 74.

V. spp. Malab. Nepal.

Folia e basi ovata lanceolata. *Racemi* $2\frac{1}{2}$ — 5-pollicares, axibus glabris, basi nudis. *Spiculae* solitariae, geminae ternaeve.

Panicum semialatum Br. Racemis 2 — 4, a basi floriferis; Glumis 5-nervibus: superiore margine repando-alato ciliatula; Lodiculae squamis hinc in dentem brevem productis.

Panicum semialatum. R. et S. II. p. 461.

Urochloa semialata Kunth rev. gr. p. 31. Agr. syn. p. 74.

V. spp. Nepal. (s. fol.).

Racemi 2 — 4-pollicares, axibus villosulis, basi barbatis. *Spiculae* geminae — quinae, maiores quam in priore.

Obs. Reliquae ab auctoribus ad *Urochloam* relatæ species ad *Brachiariam* pertinent.

IV. Orthopogon.

a) *Glumarum seta attenuata, hispida.*

Panicum Burmanni Retz. Racemis pl. min. contiguis, arcte floriferis; Axi communis pl. min.-, partialibus Spiculisque villoso-ciliatis; Glumis flosculoque neutro setigeris: glumae inferioris seta spicula sesqui — bis l. ultra longiori; Foliis ovatis lanceolatisque glabris pilisve adspersis aut cum vaginis pubescentibus.

Panicum hirtellum Burm. — *P. bromoides* Lam. R. et S. II. p. 483. (sub *Oplismeno*).

Orthopogon Burmanni Br.

Oplismenus Burmanni PB. R. et S. II. p. 482. Kth. Agr. syn. p. 139.

V. spp. Ind. or. Manill.

* Majus, axi communis villosiori, racemis superioribus magis approximatis:

Panicum Burmanni. Trin. ic. gr. XVII. tab. 193. — *P. album* Lam. — *P. lappaceum* Willd. hb.

Oplismenus albus R. et S. II. p. 890. — *O. Humboldtianus* N. ab Es. Agr. bras. p. 264.

V. spp. Bras.

Racemi 5 — 6-lineales. *Seta* inter dentes glumarum. *Flosculus* neuter 1-valvis, 7-nervis. *Hermaphroditus* chartaceus.

b) *Glumarum sela obtusa, laevi.*

Panicum setarium Lam. Racemis brevissimis, remotis, arcte floriferis; Axi communis, partialibus Spiculisque glabriusculis; Glumis flosculoque neutro setigeris: glumae inferioris seta spicula bis et ultra longiori; Foliis lanceolatis vaginisque margine pubescendo-ciliatulis, glabris.

Oplismenus setarius R. et S. II. p. 481. Kth. Agr. syn. p. 139.

Orthopogon setarius Sprgl.

an *Panicum aristatum Retz.* R. et S. II. p. 455. — *P. hirtellum Mchx.*

V. spp. Bras.

Culmus tenuis. *Folia* breviuscula: inferiora pollicē breviora, suprema bipollicaria. *Racemi*, non computatis setis, lineas 2 — 4 longi: inferiores remotissimi.

Panicum imbecille. Racemis (brevissimis) remotis remotiusculisve, arcte floriferis; Axi communis glabro, partialibus hirsutulis; Spiculis glabris ciliatulisve; Gluma inferiori setigera: seta (in racemulis inferioribus) longitudine spiculae vel paulo longiori; Foliis anguste lanceolato-linearibus vaginisque glabris.

Orthopogon imbecillis Br. Trin. ic. gr. XVI. tab. 191.

Oplismenus imbecillis R. et S. II. p. 487. Kth. Agr. syn. p. 142.

V. spp. Nov. Holl.

Culmus 1 — sesqui-pedalis, tenuis. *Folia* sursum sensim longiora, inferiora pollicaria, superiora 2 — l. vix 3 - pollicaria. *Racemuli* 2 — 4-lineales. — *Panico setario* tenuiori simillimum et fortasse mera ejusdem var. macra.

Panicum undulatifolium Ard. Racemis (brevissimis) remotiusculis, arcte floriferis; Axi communis hirsuto, partialibus (subnullis) nudis; Glumis ciliatulis flosculoque neutro setigeris: glumae inferioris seta spicula sesqui-, extima fere triplo longiori; Foliis oblongo-lanceolatis, adpresso-pilosus; Vaginis hirsutis.

Panicum undulatifolium. Trin. Diss. II. p. 158. (excl. var. β). Ic. gr. XVI.

tab. 192. — *P. hirtellum All.* et al. (non L. nec Host, nec *Mchx.*). —

P. Burmanni MB.

Oplismenus undulatifolius PB. R. et S. II. p. 482. Kth. Agr. syn. p. 159.

V. spp. Helv. Germ. Iber.

Panicum compositum L. sp. pl. ed. 1. Racemis contiguis, laxifloris; Axi communi, partialibus Spiculisque glabris vel pubescentibus; Glumis setigeris, flosculo neutro mucronulato: glumae inferioris seta spicula sesqui — bis longiori; Foliis lanceolatis vaginisque glabris, hisve pl. min. pubescentibus.

Panicum compositum, a, Trin. Diss. II. p. 153. Ic. gr. XVI. tab. 187.

Orthopogon compositus Br. — *O. remotus Tr.* Fund. Agr.

Oplismenus compositus PB. R. et S. II. p. 484. Kth. Agr. syn. p. 141.

Digitaria composita Willd. En.

V. spp. Ceyl. Inss. Carol.

* Var. *tenuiculmis*, flaccida:

Panicum compositum, b, Trin. Diss. II. p. 154. Ic. gr. XVI. tab. 189. A.

V. spp. Nov. Zeel. Nepal.

Racemi plerumque internodio longiores, ultrapollicares vel fere pollices 2 longi. In gramine Ualanensi Carolinarum axes communis et partiales pubescunt. — An huj. loci etiam *Pollinia undata Sprgl!* (*Andropogon undatus Jacq.* *Oplismenus Jacquinii Kth. Agr. syn. p. 140.*) cuius v. specim. Mascar. (Trin. ic. gr. XVI. tab. 189. B.)

Panicum sylvaticum LaM. Racemis remotis l. pl. min. contiguis, arcte arctiusculeve floriferis; Axi communi partialibusque hirtulo-pubescentibus (illove glabriusculo, his pl. min. pilosis); Glumis glabris pilosulisve cum flosculo neutrō setigeris: glumae inferioris seta spicula sesqui — bis longiori; Foliis lanceolatis, glabris, pubescentibus l. rariusculo-pilosis; Vaginis apice (tuberculato-) pilosulis.

Panicum compositum d, et f. *Trin.* Diss. II. p. 155.

Variat:

$\alpha.$ Axi communi partialibusque pubescendo-hirtulis; racemis internodio longioribus; spiculis pubescentibus; foliis glabris; vaginis tuberculoso-hirtulis:
V. spp. Inss. soc.

$\beta.$ Axi communi pubescendo-hirtulo, partialibus hirsutis; racemis internodio longioribus; spiculis pilis adspersis; foliis glabris; vaginis tuberculoso-hirtulis:
Oplismenus sylvaticus R. et S. II. p. 481. Kth. Agr. syn. p. 139. (Trin. ic.
gr. XVI. tab. 190. A.).

V. spp. Mascar.

$\gamma.$ Axi communi pubescendo-hirtulo, partialibus setoso-pilosis; racemis internodio brevioribus l. contiguis; spiculis pilosulis; foliis obsolete pubescentibus l. pilis adspersis; vaginis obsolete tuberculatis hirtulisve:

Panicum compos. var. *Trin. ic. gr. XVI. tab. 188.*

Oplismenus africanus PB! R. et S. II. p. 484 et 890. Kth. Agr. syn. p. 141. —
an *Oplism. brasiliensis* Raddi?

V. spp. Inss. Sandw. Afr. Bras.

$\delta.$ Axi comm. et partialibus pubescendo-hirtulis; racemis remotis; spiculis pubescentibus; foliis glabris; vaginis obsolete tuberculosis, pubescentibus:

Echinochloa lanceolata PB. R. et S. II. p. 476.

Oplismenus lanceolatus N. ab Es. Agr. bras. p. 266.

V. spp. Ins. Nucahiw. Manill.

$\epsilon.$ Axi comm. glabro, partialibus spiculisque pilis adspersis; racemis contiguis; foliis brevibus, pubescentibus (infimis ovatis, glabris); vaginis obsolete tuberculosis, superne hirsutulis:

Panicum compositum e, *Trin. Diss. II. p. 156. Ic. gr. XVI. tab. 190. B. et 2.*

V. spp. Manill.

Obs. Fortasse etiam *Pan. aristatum* Retz. ad hanc speciem variabilem revocandum.

Panicum loliaceum Lam. Racemis remotis contiguis, arcte floriferis; Axi communi glabro hirtulove, partialibus ad spicularum basin setoso-barbatis;

Glumis ciliatulis flosculoque neutro setigeris: glumae inferioris seta spicula quadruplo longiori; Foliis lanceolatis vaginisque ciliatis, glabris.

Oplismenus loliaceus PB. R. et S. II. p. 483. Kth. Agr. syn. p. 140. — *O. hirtellus Radd.* Agr. br. p. 41? — *O. latifolius Haenke hb.*

V. spp. Ind. occ. Guian. Bahiens.

Culmi linea pubescens unilateralis nota neque satis constans, neque huic speciei soli propria. *Folia* ima basi interdum ciliata. *Racemi* semipollicares — pollicares, ob setas spicularum confertarum longas quasi pectinati.

V. E ch i n o c h l o a.

a) *Ligula nulla.*

Panicum colonum L. sp. pl. ed. 2. Racemis simplicibus (semi — sesqui - pollicari- bus), alternis geminisque, interstitia pl. min. aequantibus; Spiculis binis, ternis (4 — 6 - serialibus), subultralinealibus, mucronato - acutis; Foliis linearibus.

Panicum colonum. R. et S. II. p. 424. Mant. 2. p. 224. Trin. ic. gr. XIV. tab. 160. — *P. tetrastichon* Forsk.

Oplismenus colonus Hb. et Kth. Agr. syn. p. 142.

V. spp. Ins. adsc. Cap. vir. Marian. Aegypt.

* Racemis basi setigeris:

Panicum pseudocolonum Roth. R. et S. II. p. 424.

V. spp. Bras. Ins. Philip. Jav. Mascar.

** Foliis vaginisque atropurpureo - zonatis:

Panum zonale Guss. — *P. numidianum Presl.* Gr. Sic. p. 3?

V. sp. Sic.

Culmus spithameus — ultrapedalis, obliquus, saepe radicans, simplex vel ramosus. *Vaginae* glabrae. Folia acuminata, lineas 1 — 2 lata, palmaria — spithamea. *Racemi* 4 — 18.

Panicum frumentaceum Roxb. Racemis simplicibus (pollicaribus), alternis geminisve, interstitiis paulo longioribus; Spiculis binis solitariisque (3-serialibus), linearibus, acuminato-mucronatis; Foliis lanceolato-linearibus.

Panicum frumentaceum. Schult. Mant. II. p. 250.

Oplismenus frumentaceus Kth. Agr. syn. p. 146.

V. sp. Ind. or.

Obs. Specimen nostrum (v. Ic. gr. XIV. tab. 164.), ex ipsis quidem Roxburghii plantis, *Panico colono* nimis affine. V. descr. ap. Schult. l. l.

Panicum cuspidatum Roxb! Racemis simplicibus (circiter semipollicaribus), alternis, interstitiis paulo longioribus; Spiculis binis solitariisque (3 — 4-serialibus) ultra-sesquilinealibus, subulato-mucronatis (margine strigilosis); Foliis linearibus.

Panicum cuspidatum. Trin. Diss. II. p. 134.

Digitaria cuspidata Schult. Mant. II. p. 265.

Oplismenus cuspidatus Kth. Agr. syn. p. 147.

V. spp. Ind. or.

Glancum. Culmus obliquus, basi repens. Vaginae glabrae. Folia undique laevia, acuta: (superiora) lineas fere 2 lata, digitalia. Racemi 6 — 12.

Panicum crus galli L. sp. pl. ed. 1. Racemis simplicibus compositisve (1 — 3-pollicaribus), conferto-alternis jubatisve, interstitiis (multo) longioribus; Spiculis binis ternisve (4 — 6-serialibus), ultra-l. fere bi-linealibus, mucronato-acutis l. pl. min. longe caudato-subulatis; Foliis lanceolato-linearibus.

Panicum crus galli. Trin. Diss. II. p. 435.

Varietates notabiliores sunt:

α. Spiculis ultralinealibus; racemis subsimplicibus eorumve racemulis brevisimis:

Echinochloa crus galli PB. R. et S. II. p. 478.

Panicum crus corvi auctt. (non Linn.) — *P. crus galli* Trin. ic. gr. XIV. tab. 161.

Milium crus galli Mönch.

Oplismenus crus galli Kth. Agr. syn. p. 143.

V. spp. Gall. Germ. Ross. Alt. Taur. Philipp. N. Holl. Am. bor. Chil.

* Idem, juba angustata; racemis alternis simplicibus; Foliis gracilioribus:

V. spp. Aeg. (Sieber, s. n. *Panici stagnini* e Damiatt.)

β. Spiculis subbilinealibus; racemorum racemulis brevissimis:

Panicum oryzoides Ard. — *P. oryzinum* Gmel. — *P. stagninum* Host. —

P. Hostii MB.

Echinochloa commutata Schult. Mant. 2. p. 267.

V. spp. Grus.

γ. Vaginis hirsutis:

Panicum hispidum Mühlenb. Schult. Mant. 2. p. 280. (sub *Setaria muricata*).

V. spp. Am. bor.

δ. Culmo crasso; juba densa; spiculis linealibus, longo-subuligeris:

Panicum sabulicolum N. ab Es! Agr. bras. p. 258. Trin. ic. gr. XIV. t. 163.

Oplismenus sabulicola Kth. Agr. syn. p. 145.

V. spp. Bras.

ε. Juba pl. min. densa; racemorum racemulis productis; spiculis saepe longissime subuligeris:

Panicum crus galli, longisetum, Trin. ic. gr. XIV. tab. 162. — *P. echinatum*

Willd. — *P. crus paronis* N. ab Es! Agr. bras. p. 259.

Echinochloa echinata PB. R. et S. II. p. 476.

Oplismenus crus pavonis et *echinatus* Kth. Agr. syn. p. 144. 145.

V. spp. Am. bor. Chil. Bras.

Praeterea occurrit nanum: (*Pan. crus corvi* Pall. in hb. Ac. Petrop.) V. spp. Wolg. — Flaccidum, racemis brevissimis: v. spp. Wolg. Austr. Ind. or. —

Aliae modificationes s. ab auctoribus exsculptae s. d. species sunt: *Pan. hispidulum* LaM.; *Pan. hispidulum* Retz.; *Pan. muricatum* Mchx.; *Pan. limosum* Presl? — al.

b) *Ligula dense longeque ciliari.*

Panicum stagninum Koen. Racemis (1 — 2-pollicaribus) alternis, interstitiis pl. min. longioribus; Spiculis binis solitariisque (3 — 4-serialibus), bilinealibus, (brevi-) subuligeris; Foliis linearibus; Culmi nodis glabris.

Echinochloa stagnina PB. R. et S. II. p. 477. (excl. synn. Host. Ard. et Gmel.)

Oplismenus stagninus Kth. Agr. syn. p. 144. (excl. syn. M. Bieb. et fortasse LaM.)

V. spp. Ind. or. Aeg.

Simile *oryzino* Ard. — Tripedale. *Vaginae* glabrae. *Folia* lineas 3 — 5 lata, superiora racemos aequantia l. superantia, facie pl. min. scabra, margine hispida. *Subula* valvulae inferioris flosculi neutrius 1 — 4-linealis.

OBS. *Panicum pictum* Koen. et *Pan. scabrum* LaM. hujus videntur varietates.

Panicum spectabile N. ab Es. Racemis (sesqui — bipollicaribus) alternis jubatoque sparsis, interstitiis pl. min. longioribus; Spiculis binis ternisque (4 — 6-serialibus), bilinealibus l. longioribus, subuligeris; Foliis lato-lineari-lanceolatis; Culmi nodis hirsuto-barbatis.

Panicum spectabile N ab Es! Agr. Bras. p. 262. Trin. ic. gr. XIV. t. 166.

Oplismenus spectabilis Kth. Agr. syn. p. 145.

V. spp. Bras. — Var. axi hirsuto, Essequ.

Culmus 3 — 4-pedalis. *Vaginae* glabrae l. hirsutae. *Folia* pollicem lata, 1 — 2-pedalia, acuminatissima, margine hispida. *Racemi* crassi. *Subula* pl. min. semipollicaris.



VI. S e t a r i a .

a) *Axibus partialibus (interdum non nisi unifloris) productis in setam, pedicellum laterali emittentem.*)*

a. *Flosculo seminifero masculo duplo (vel $\frac{1}{4}$ **) breviori; Ligula membranacea.*

Panicum Chamaeraphis. Thyrsi simplicissimi radiolis unifloris; Spiculis linearibus, obtusiusculis, seta ipsis multo longiori suffultis; Flosculo seminifero sessili.

Chamaeraphis hordeacea Br! R. et S. II. p. 791. Kth. rev. gr. tab. 36. Agr. syn. p. 148.

V. spp. N. Holl.

Culmus ultrapedalis, erectus. *Folia disticha*, glabra, linea angustiora, pl. min. digitalia. *Thyrsus bipollicaris*, *Hordeum distichum* referens. *Spiculae* trilineales, angustae, albidae, glabrae. *Gluma* inferior pusilla, tenuissime membranacea, truncata, enervis; superior flosculum masc. 2-valvem aequans, 7-nervis, rigida. *Flosculus superior* femineus cum staminibus (2) effetis, chartaceus.

Panicum paradoxum Br. Thyrsi simplicissimi radiolis unifloris; Spiculis lanceolato-linearibus, acuminatis, seta ipsis duplo longiori suffultis; Flosculo seminifero brevi-pedicellato.

Panicum paradoxum. R. et S. II. p. 463. Kth. rev. gr. tab. 32.

Chamaeraphis paradoxa PB. ex Schult. Mant. 2. p. 253. Kth. Agr. syn. p. 148.

V. sp. N. Holl.

Culmus semi — 1-pedalis, repens. *Folia* sublanceolato-linearia, acutiuscula, lineas 1 — 2 lata, ultrapollicaria, glabra. *Thyrsus* sesquipollice longior. *Spiculae* trilineales, e viridi purpureoque variae. *Gluma* inferior flosculis

*) Quamobrem radiorum pluriflororum spiculae *non* terminales seta nulla involucellatae sunt.

**) Quod additum est ob *Pan. unisetum* (Urochloam unisetam Presl. rel. Haenk. I. p. 519. *huc pertinens*, cui flosculus seminiferus (aciculatus) masculo non nisi quartam partem brevior.

4 — 5^{pl}o brevior, obtusa, sub- 5-nervis; superior flosculos excedens, acuminata, multi (15-) nervis. *Flosculus masculus* 2-valvis; superior femineus cum staminibus (2) effetis, chartaceus.

Panicum abortivum Br! Jubae simplicis racemis laxe sparsis, remote floriferis; Spiculis lanceolatis, acuminatis: terminalibus solis seta sussultis; Flosculo seminifero brevi-pedicellato.

Panicum abortivum. Schult. Mant. II. p. 253. Trin. ic. gr. XVI: tab. 181.

Andropogon squarrosus Linn. Herb. (non L. sppl.)

Chamaeraphis abortiva Poir.

V. spp. N. Holl.

Culmus 2-pedalis, adscendendo-decumbens, ramosissimus. *Folia* linearia, acuta, supra seabra, margine hispida, adultiora lineam lata, 1 — 3-pollicaria. *Racemi* circiter 17 ad axin digitalem; inferiores 2-pollicares, pauciflori. *Spiculae* sesquilineales. *Gluma* inferior pusilla, truncata, enervis; superior flosculos excedens, acuminata, 7-nervis, ad nervos medios aculeolata. *Flosculus masculus* 1 — 2-valvis; superior femineus, chartaceus.

β. *Flosculo hermaphrodito incompletum subaequante; Ligula ciliari*.

Panicum rescissum. Racemis compositis, laxiuscule paniculato-jubatis, contractiusculis; Spiculis linealibus, ovalibus, mucronulato-acutiusculis; Gluma inferiore flosculis triplo-, superiore iisdem duplo breviori; Folis linearibus, ad nervos pilosulis.

Setaria longiseta PB. Flor. d'Oware Tab. 110. f. 2. Kth. Agr. syn. p. 158.

V. spp. Guin.

Culmus 3-pedalis. *Vaginae* margine superne hirtae. *Folia* attenuato-acuminata, lineas 2 lata, dodrantalia. *Panicula jubalis* e viridi et fusco-rubente varia, dodratalis — pedalis, pl. min. contracta, lucidula. *Racemi* inferiores circiter 3-pollicares, solitarii, remoti; superiores conferti; axes partiales hispiduli. *Racemuli* 2 — 6-lineales. *Spiculae* solitariae l. geminae:

illae brevipedicellatae, plerumque absque seta; harum superior seta ipsam duplo triplove superante sussulta; *Glumae* 5-nervis; vel inferior, pl. min. obtusa, 3-nervis. *Flosculi* mucronulati: neuter l. masculus bivalvis: valvula inferiori chartacea, 3-nervi, ad nervum medium exarato-retusa demumque (ut in *Thrusyis Kth.*) fissa. *Herm.* tenui-rugulosus.

Panicum paractaenoides. Racemis compositis, laxe paniculatis, patentibus; Spiculis linealibus, ovalibus, acutiusculis; *Gluma* inferiore flosculis duplo et qu. exc., superiore iisdem paulo breviori; *Foliis* linearibus, glabris.

V. sp. e. Krabbeneiland.

Culmus 3-pedalis, florifero-ramosus. *Vaginae* glabrae. *Folia* acuminata, lineas 3 et ultra lata, dodrantalia. *Panicula* rara, lucidissima. *Racemi* per distantias satis regulares solitarii, pollice breviores; axes partiales hirtuli. *Racemuli* brevissimi, sub- 1-lineales. *Spiculae* subsolitariae. *Seta* spiculata non nisi paulo excedens. *Gluma* inferior 3 — 5-, superior 5-nervis. *Flosculus* neuter 2-valvis: valvula inferior 3- l. sub- 5-nervis, plana vel medio longitudinaliter leniter retusa. *Hermaphroditus* tenui-rugulosus.

Obs. Inflorescentia, ad specimen unicum descripta, an semper eadem?

Panicum excurrens. Racemis compositis, in jubam angustam laxam contractis; Spiculis sesquilinealibus, ovalibus, acutis; *Gluma* inferiore flosculis triplo-, superiore iisdem tertiam partem breviori; *Foliis* linearis-lanceolatis (utrinque attenuatis), sulcato-plicatulis, glabris.

Panicum excurrens Trin. ic. gram. VIII. tab. 89. Kth. Agr. syn. p. 94.

V. spp. Nepal.

Culmus bipedalis et ultra, inferne florifero-ramosus. *Vaginae* glabrae. *Folia* latiora medio lineas 5 lata, inferiora dodrantalia. *Juba panicularis* spithamea, angustata. *Racemi* inferiores bipollicares. *Racemuli* 4-lineales; axi partiali laeviusculo. *Spicularum* terminalium seta ipsis circiter lineas 2 longior. *Glumae* inferior 5-, superior sub- 7-nervis. *Flosculus* neuter 2-valvis:

valvula inferior 7-nervis, medio longitudinaliter retusiuscula. *Hermaphroditus rugulosus*, mucronulatus.

Obs. Cf. infra *Obs.* sub *Pan. plicato*, cui haec species valde affinis.

Panicum sulcatum *Aubl.* Racemis compositis, in thyrsus densissimum contractis; Spiculis linealibus, ovali-lanceolatis, acutis; Gluma inferiore flosculis dimidio magisve-, superiore iisdem tertiam partem breviori; Foliis lato-lanceolatis, plicato-sulcatis, glabris.

Panicum sulcatum. R. et S. II. p. 441. N. ab Es. Agr. bras. p. 253. — *P. palmifolium* *Koen.*?

Setaria sulcata *Bert.* Schult. Mant. 2, p. 278.

V. spp. Bras.

Orgyale. *Folia* pollicem l. fere pollices 2 lata, sesqui — bi-pedalia, utrinque attenuata. *Thrysus* sesquipedalis, lanceolato-cylindraceus, apice nutans, pallide virens. *Spiculae* racemulorum intermediae absque involucello. *Gluma* inferior 3-, superior 5-nervis. *Flosculus neuter* bivalvis: valv. inferiori 5-nervi, medio longitudinaliter retusa. *Hermaphr.* tenuissime rugulosus.

Panicum speciosum *N.* ab *Es.* Racemis compositis, thyrsato-jubatis, patentissimis; Spiculis bilinealibus, ovali-lanceolatis, acuminatis; Gluma inferiore flosculis plus dimidio-, superiore iisdem tertiam partem breviori; Foliis latissimo-lanceolatis, glabris.

Panicum speciosum *N.* ab *Es!* Agr. bras. p. 252. — *P. elongatum* *Poir.*? R. et S. II. p. 883. (*P. Poiretianum* *Schult.* Mant. 2. p. 229. *Setaria Poiretiana* *Kth.* Agr. syn. p. 155).

V. sp. Bras.

Culmus 3 — 4-pedalis. *Folia* pollices 2 lata, 1 — 2-pedalia, utrinque attenuata. *Thrysus* sesqui — bi-pedalis, strictus, subpyramidalis. *Racemi* sesqui — 1-pollicares, horizontales. *Spiculae* racemulorum intermediae absque seta, virides. *Gluma* inferior 5-, superior 7-nervis. *Flosc.* neuter bivalvis: valv. inferior 5-nervis, medio longitudinaliter retusiuscula. *Herm.* tenuissime rugulosus.

b) *Pedicellis ipsis (omnibus) setiferis.*

Panicum glaucum L. sp. pl. ed. 2. Thyrso simpliciusculo, subcylindrico, arcto; Involucelli pluriseti aculeolis sursum versis: setis omnibus spicula plerumque bis (quaterve) longioribus; Gluma inferiore flosculis triplo duplo-, superiore iisdem tertiam partem magis breviori; Hermaphrodito toto rugoso; Foliis linearibus l. sublanceolato- (s. latiusculo-) linearibus.

Panicum glaucum. Trin. ic. gr. XVII. tab. 195. — *P. viride* Poll. — *P. flavescens* Mönch. — *P. lutescens* Wieg. — *P. laevigatum* β. Lam.

Setaria glauca PB. R. et S. II. p. 490.

Pennisetum glaucum Br.

V. spp. Gall. Germ. Ross. Pers. bor. Am. bor. Ind. or. N. Holl.

β. Spiculis minoribus:

Panicum tejucense N. ab Es! Agr. bras. p. 243. — *P. dasyurum* W. hb. (fide speciminis ex hbio Berol. a Sellowio lecti non diversum).

Setaria tejicensis Kth. Agr. syn. p. 150.

V. spp. Bras. Sumatr.

γ. Setis flaventibus l. purpurascenibus:

Panicum alopecuroides Koen.! — *P. flavum* N. ab Es! Agr. bras. p. 239.

Setaria flava Kth. Agr. syn. p. 149. — *S. corrugata* Schult. Mant. 2. p. 76.

Kth. Agr. syn. p. 153.

V. spp. Ind. or. Bras.

δ. Setis spicula quadruplo longioribus:

Panicum penicillatum Willd. Herb. N. ab Es! l. l. p. 241. (Proxima huic *Setaria Ventenatii* Kth. rev. gr. tab. 37).

V. spp. Bras. Ind. occ. Inss. Marian.

ε. Foliis thyrum superantibus:

Panicum holcoides Igq. Eccl. (non Roxb.)

V. cc.

Obs. Quid *Panicum glaucum* L. sp. pl. ed. 1.?

Panicum imberbe *Poir.* Thyrso simpliciusculo, angusto-linearis, arcto; Involucelli pluriseti aculeolis sursum versis: setis nonnullis omnibusve spicula brevioribus eamve aequantibus, reliquis ipsa duplo longioribus; Glumis et Hermaphrodito ut in *P. glauco*; Foliis angusto-linearibus.

Panicum imberbe. N. ab Es. Agr. bras. p. 239. — *P. glaucum* var. *Trin.* ic. gr. XVII. tab. 196.

Setaria imberbis *R. et S. II.* p. 891. — *S. gracilis* *Hb. et Kth.* *R. et S. II.* p. 491. *Kth.* Agr. syn. p. 149.

V. spp. Bras. Chil. Guin.

* Foliis compresso-involutis, v. spp. Chil.

β. Involucello spiculisque purpurascens:ibus:

Panicum imberbe β, *pumilum* *N. ab Es. Agr. bras.* p. 240.

Setaria purpurascens *Hb. et Kth.* *R. et S. II.* p. 489. *Kth.* Agr. syn. p. 151.

V. spp. Bras.

Panicum geniculatum *Poir.* Thyrso simpliciusculo, cylindrico, laxiusculo; Involucelli pluriseti, spicula duplo longioris, aculeolis sursum versis; Gluma inferiore flosculis $\frac{1}{3}$ (non prorsus duplo) breviori, superiore eosdem aequante; Hermaphrodito toto rugoso; Foliis sublanceolato-l. latiusculo-linearibus.

Setaria geniculata *P.B.* *R. et S. II.* p. 491. *Kth.* Agr. syn. p. 150.

Pennisetum geniculatum *Icq.* Eccl. tab. 26.

V. cc.

Panicum viride *L.* sp. pl. ed. 1. Thyrso pl. min. composito, subcylindrico, arcto; Involucelli sub-biseti, spicula pl. min. longioris, aculeolis sursum versi; Gluma inferiore flosculis triplo breviori, superiore eosdem aequante; Hermaphrodito tenuissime ruguloso; Foliis sublanceolato-vel latiusculo-linearibus.

Panicum viride. *Trin.* ic. gr. XVII. tab. 203. — *P. laevigatum* α, *LaM.* —

P. purpurascens *Opiz!*

Setaria viridis *P.B.* *R. et S. II.* p. 488.

Pennisetum viride Br.

V. spp. Germ. Ross. Sib. Chin. Dahir. Alt. Byz. Aeg. Am. bor.

Panicum italicum L. sp. pl. ed. 1. Thyrso composito, cylindraceo, arcto; Involucelli 2 — 3-seti, longitudinis variae (interdum obsoleti), aculeolis sursum versis; Gluma inferiore flosculis triplo-, superiore iisdem paulo breviori; Hermaphrodito tenuissime punctato-ruguloso; Folii (lineari-) lanuginosatis.

α. Thyrso mediocri, setis longioribus:

Panicum germanicum Willd. (Trin. ic. gr. XVII. tab. 199.)

Setaria germanica PB. R. et S. II. p. 492.

V. spp. Germ. Ross. austr.

β. Setis spicula 4 — 5-plo longioribus:

Panicum macrochaetum Lk.

Setaria macrochaeta Icq. Schult. Mant. II. p. 274.

V. cc..

γ.. Involucellis thyrsove toto purpurascensibus:

Panicum maritimum Poir.

Setaria maritima R. et S. II. p. 492.

* thyrso majusculo:

Panicum erythrospermum Hornem.

Echinochloa erythrosperma R. et S. II. p. 477.

V. spp. Ross. austr. Pers. Ital.

δ. Setis abbreviatis l. nullis:

Panicum compactum Küt. — *P. sibiricum et serolinum Hortul.*

* *pumilum*:

Panicum pumilum Lk.

Setaria pumila Schult. Mant. 2. p. 274.

V. cc..

$\varepsilon.$ Thyrso majusculo, crassiori:

Panicum intermedium Hornem!

Echinochloa intermedia R. et S. II. p. 477.

V. cc.

$\zeta.$ Thyrso maximo, crasso:

Panicum glomeratum Mönch. — *P. italicum Willd.* Trin. ic. gr. XVII. t. 200.

Setaria italica PB. R. et S. II. p. 493.

Praeterea varietates in hortis occurunt s. n. *Panicum attenuatum, setosum, setarium, melfrugum, asiaticum, indicum.*

Panicum semirugosum N. ab Es. Thyrso subcomposito, subcylindrico, arcto; Involucelli biseti, spicula subtriplo longioris, aculeolis promiscue deorsum sursumque versis; Gluma inferiore flosculis triplo duplove-, superiore iisdem tertiam partem magisve breviori; Hermaphrodito inferne rugoso, apicem versus laevi; Folii linear-lanceolatis.

Panicum semirugosum N. ab Es! Agr. bras. p. 243.

Setaria semirugosa Kth. Agr. syn. p. 152.

V. sp. Bras.

Setarum aculeoli brevissimi.

Panicum scandens. Thyrso subcomposito, cylindrico, arcto; Involucelli 1 — 2-seti, spicula (suborbiculata, minima) duplo l. subquadruplo longioris, aculeolis superioribus deorsum versis; Gluma inferiore flosculis triplo breviori, superiore eosdem subaequante; Hermaphrodito tenuissime ruguloso; Folii lanceolato-linearibus.

$\alpha.$ Setis spicula duplo longioribus:

Panicum scandens Trin. Diss. II. p. 166. Ic. gr. XVII. tab. 201.

Setaria scandens Schrad. Schult. Mant. II. p. 279. — *S. Trinii et scandens Kth.* Agr. syn. p. 151.

Pennisetum scandens Ht. Vindob!

V. spp. Bras.

β. Setis spicula quadruplo longioribus:

Setaria tenacissima Schrad. Schult. l. l. Kth. l. l.

Panicum tenacissimum N. ab Es. Agr. bras. p. 238.

V. spp. Madeir. Bras. Peruv.

Panicum verticillatum L. sp. pl. ed. 2. Thyrso composito, cylindraceo; Involucelli 1-seti, spicula (ovato-elliptica) paulo l. triplo (magisve) longioris, aculeolis omnibus deorsum versis; Gluma inferiore flosculis triplo breviori, superiore eosdem aequante; Hermaphrodito (submucronato) tenuissime ruguloso; Foliis linearis-lanceolatis.

Panicum verticillatum. Trin. ic. gr. XVII. tab. 202. — *P. adhaerens* Forsk. —

— *P. asperum* LaM.

Setaria verticillata PB. R. et S. II. p. 488. — *S. nubica* Lk!

Pennisetum verticillatum Br.

V. spp. Gall. Germ. Ross. austr. Cauc. Astr. Taur. Cap. vir. Măscar.

Obs. In *Setariae nubicae* specimine, in hto Berol. culto, setae spicula non nisi paulo longiores.

Panicum chinense. Thyrsi compositi, interrupti, laxi, racemis glomeri-floris; Involucelli 1-seti, spicula (oblongo-orbiculari) subduplo longioris, aculeolis sursum versis; Gluma inferiore flosculis 5-plo-, superiore iisdem paulo breviori; Hermaphrodito tenuissime ruguloso; Foliis lato-linearibus, glabris.

V. sp. Chin. (Pro frumento seritur).

Culmus videtur 4 — 5-pedalis. *Nodi* cum *Vaginis* glabri. *Ligula* dense ciliaris. *Folia* lineas 8 — 12 lata, sesquipedalia, scabriuscula. *Thyrsus* flacidus et pendulus, dodrantalis, glaucescendo-albens. *Racemi* ad axin pubescen-tem interrupte sparsi, pollice dimidio paulo longiores, a basi densissime et compactissime floriferi, satis crassi. *Pedicelli* fasciculati, brevissimi, cum seta hispiduli potius quam aculeolati. *Spiculae* vix lineam longae, imbricatissimae. *Glumae* (in thyrso maturo) membranaceae: inferior perparva, remotiuscula, acuta, 5-nervis; superior hermaphrodito quintam circiter partem brevior,

5 — 7-nervis. *Flosculus neuter* 1-valvis, 7-nervis. *Hermaphroditus* orbicularis, flavendo-albens.

Species 4 sequentes, quibus glumarum proportio (inferior flosculis duplo l. paulo magis, superior iisdem paulo brevior), hermaphroditus rugulosus et involucrum uni-vel sub- bi-setum communia sunt, excepto forte *P. onuro*, varietates potius unius ejusdemque speciei videntur.

Panicum onurus Willd. hb. Thyrsi compositi, cylindrici, arctiusculi l. glomeratolaxi, racemulis brevissimis; Axi tenuissime pubescente; Foliis angusto-linearibus l. lanceolato-linearibus, glabris; Ligula ciliari.

Panicum setosum β. N. ab Es. Agr. bras. p. 251. Trin. ic. gram. VIII. t. 96. fig. B. et analys. ad tab. 95.

Setaria gracilis Sprgl. ms. (non S. V. I. p. 305.) — *S. megapotamica* id. ms. (quaerens an *S. erythrosperma* S. V. I. p. 304.)

V. spp. Montevid.

Spiculae quam in seqq. affinibus magis orbiculatae.

Panicum caudatum LaM. Thyrsi compositi, gracilis, laxi, racemulis brevissimis brevibusve; Axi hirsuto; Foliis linearibus l. sublanceolato-linearibus, angustis, pubescensibus; Ligula ciliari.

Setaria caudata R. et S. II. p. 495. — *S. rariflora* Mik! in Sprgl. n. Entd. II. p. 78. Trin. ic. gr. VIII. tab. 96. fig. C.

V. spp. Bras.

Panicum setosum Sw! Thyrsi compositi, sublinearis, arcti aut patulo-laxi, racemis pollice brevioribus; Axi pl. min. hirsuto; Foliis sublanceolato-linearibus, supra pubescensibus glabrisve; Ligula membranacea, ciliata.

a. Thyrso contracto-arctiori; setis flaventibus; foliis lineas 4 — 6 latis:

Panicum setosum. Trin. ic. gr. VIII. tab. 96. fig. A. — *P. cylindricum* Lk.

Setaria setosa PB. R. et S. II. p. 494. — *S. macrostachya* Hb. et Kth. Agr. syn. p. 154.

V. spp. Ind. occ.

β. Thyrsi patulo-laxiori; setis purpurascentibus; foliis lineas 2—3 latis: an *Panicum scabrisolum* N. ab Es. Agr. bras. p. 246. (cujus folia autem lineas 4—8 lata dicuntur). — *P. setosum* Trin. ic. gr. VIII. tab. 95. (nec analysis).

V. spp. Bras.

OBS. Specimina *P. setosi* Sw., ab ipso b. auctore accepta, folia utrinque glabra habent: alterum axin hirsutum, alterum tenui-villosulo-pubescentem. — Aliud specimen, Brasilianum, axi subobsolete s. tenerrime pubescente, habitu *P. onuri*, ob spiculas oblongas, racemos longiores et setas subpurpurascentes hic potius referendum esse videtur.

Panicum macrourum. Thyrsi compositi, fusiformis, arcti, racemis brevibus — ultrapollicaribus; Axi hirsuto; Foliis lato-lineari-lanceolatis, glabris; Ligula membranacea, dorso pilis ciliaribus stipata.

Setaria alopecurus hort. Gor.! — *Set. composita* Hb. et Kth. R. et S. II. p. 493. Kth. Agr. syn. p. 194. — *S. polystachya* Schrad. Schult. Mant. II. p. 277.

Panicum compositum et *macrostachyum* N. ab Es. Agr. bras. p. 244. 245.

V. spp. Bras.

VII. Ha r p o s t a c h y s.

Panicum decumbens R. et S. Racemi (pl. min. pollicaris) solitarii (rarissime 2) axi angusto, glabro, arcte florifero; Spiculis geminis, parvis minimisve, orbiculato-ovatis, glabris; Gluma inferiore flosculis quadruplo-, superiore iisdem subdupo breviori; Foliis lanceolatis, pubescentibus.

Panicum decumbens R. et S. II. p. 429. N. ab Es. Agr. bras. p. 107. Trin. ic. gram. XIII. tab. 146. Kth. rev. gr. tab. 16.

Paspalum decumbens Sw. — *P. nutans* Lam. — *P. pedunculatum* Poir. — *P. curvistachyum* Radd.

V. spp. Guian. Bras.

Culmus pl. min. pedalis, decumbens, ramosus, rarius ex nodo uno alterove inferiori radicans. *Vaginae* carinatae, ampliatae. *Pedunculi* graciles, 1 — 4-pollicares, solitarii l. aliquot fasciculati. *Racemus* falcatus. *Spiculae* oblique 4-serialis. *Gluma* inferior acutinscula, superior rotundata. *Hermaphroditus* punctulato-striatus.

Panicum monostachy whole Hb. et Kth. Racemi (2 — 6-pollicaris) solitarii axi spiculam latitudine subaequante, glabro; Spiculis geminis, pl. min. sesqui-linealibus, ovato-ellipticis, glabris; *Gluma* inferiore nunc brevissima, nunc flosculis subdupo-, superiore iisdem paulo (ad $\frac{1}{3}$) breviori; *Foliis* lanceolato-linearibus, pubescentibus.

Panicum monostachy whole Hb. et Kth. R. et S. II. p. 464. Kth. rev. gr. tab. 104. Agr. syn. p. 76. — *P. cultratum* Trin. Diss. II. p. 126. Ic. gr. XIII. t. 145. (var. macrostachya).

Thrasya cultrata N. ab Eş. Agr. bras. p. 96. Kth. Agr. syn. p. 71.

V. spp. Bras.

Culmus sesqui — 3-pedalis, erectus, ad nodos et infra racemos pubescens. *Folia* lineas 3 — 6 lata, inferiora spithamea — pedalia. *Racemus* rectiusculus, viridis. *Spiculae* oblique 4 — serialis, inferiores laxiores, superiores arctius imbricatae. *Gluma* inferior in spicula cuiusvis paris inferiori flosculis fere dimidio brevior; in superiori brevissima. *Flosculi* masc. valv. inferior in spiculis inferioribus, quae liberae, dorso retusa quidem, sed integra; in superioribus, arctius pressis, medio longitudinaliter fissa. *Hermaphr.* punctulato-striatus.

† *Panicum Thrasya*. Racemi (2 — 3-pollicaris) solitarii axi spicula latiori, compresso, ciliato; Spiculis solitariis, ultralinealibus, lanceolato-ovatis, villosis; *Gluma* inferiore minutissima, superiore flosculos aequante; *Foliis* linearibus, pubescentibus.

Thrasya paspaloides Hb. et Kth. n. gen. I. p. 121. tab. 39. Agr. syn. p. 71.

R. et S. II. p. 802.

Ins. Panumana Orinoc.

Culmus sesquipedalis, erectus. *Pedunculi* saepe 3, fasciculati. *Racemus* falcatus. *Gluma* superior pilis flavidis hirsuta. *Flosc. masculi* valvula inferior fissa: lacinia utraque, praeter pilos quibus superne hirsuta est, infra apicem emittens pilum longiore, filiformem. *Hermaphr.* superne barbatus.

Panicum thrasyoides. Racemi (2 — 3 - pollicaris) solitarii axi spicula latiori, compresso, ciliato; Spiculis solitariis, 1 — sesqui-linealibus, lanceolato-ovatis, apice barbatis; Gluma inferiore pusilla, superiore flosculis dimidio breviori; Foliis linearibus, hirsutis.

Panicum thrasyoides Trin. Diss. II. p. 126. Ic. gr. XIII. tab. 151.

Thrasya hirsuta N. ab Es. Agr. bras. p. 94. Kth. rev. gr. tab. 102.

V. spp. Bras.

Simillimum praecedenti, differt axi e glandulis ciliato, gluma superiori dimidio breviori, pilis valvulae masculae productis nullis, foliis hirsutis.

Panicum petrosum. Racemi (spithamei — dodrantalis) solitarii axi spicula latiori, compresso, glabro; Spiculis solitariis, sub- 3-linealibus, ovato-lanceolatis, villosis; Gluma inferiore minutissima, superiore flosculos aequante; Foliis angustissimis, compresso-involutis, glabris.

Panicum petrosum Trin. ic. gr. XXIV. tab. 280.

V. spp. Bras.

Culmus 3 — 4-pedalis, gracilis. *Vaginae* subcarinatae, glabrae, ciliatulae. *Folia* subcoriacea, inferiora sesquipedalia. *Racemus* subfalcatus. *Spiculae* basi torulo-auctae, ut Helopodes. *Gluma* inferior dentiformis. *Flosc. masculi* valv. inferior bipartito-fissa. *Hermaphr.* superne pubescens, apice barbatus.

Panicum ansatum. Racemi (sesquipollucaris) solitarii axi spiculis latiori, cucullato-concavo, glabro; Spiculis solitariis, sesquilinealibus, oblongis, pilosulis; Glumis flosculos aequantibus: inferiore adscendendo-incurva; Foliis angusto sub-lanceolato-linearibus, rariusculo-pilosis.

Panicum ansatum Trin. ic. gr. XXIV. tab. 279.

V. spp. Bras.

Culmus vix pedalis, pertenuis, adscendens, ima basi ramosus. *Vaginae* ciliatae, glabrae. *Folia* radicalia lineam lata, 1 — 2-pollicaria, culmea perbrevia. *Racemus* lanceolato-linearis, rectus. *Axis* membranaceus, subinvoluto-concavus, spiculas foveas. *Glumae* angustae, compressae: inferior, basi angustata et curvata a flosculo amota, superne eidem adpressa, ad curvaturam barbata; superior superne villoso-ciliata. *Hermaphr.* acuminatus.

Panicum repandum N. ab Es. Racemi (sub-pollicaris) solitarii binorumve axi latitudine spiculae, glabro; Spiculis solitariis binisve, bilinealibus, obovato-ellipticis, glabris; Gluma inferiore flosculis circiter tertiam partem breviori, superiore eosdem aequante; Foliis linearibus, villoso-pubescentibus.

Panicum repandum N. ab Es. Agr. bras. p. 98. Trin. ic. gr. XIII. tab. 150.

Kth. Agr. syn. p. 76.

V. spp. Bras.

Culmus bipedalis, erectus, superne pubescens. *Vaginae* hirtae, superne moliter pilosae. *Folia* sesquilineam l. lineas 2 lata, inferiora pl. min. spithamea. *Racemi* crassiusculi: ubi 2, approximatissimi, reflexi; ubi 1, pl. min. rectus. *Spiculae* inferne 2-, superne 3-serialis, obtusae. *Flosculus* inferior masculus cum pistillo abortivo.

Panicum Echinolaena N. ab Es. Racemi (pl. min. pollicaris) solitarii axi spiculis angustiori, hirsuto glabro; Spiculis solitariis, 3 — 4-linealibus, ovato-lanceolatis, hirsutis; Glumis (praesertim inferiore) flosculis longioribus; Foliis e basi subcordata (linearis-) lanceolatis, glabris, hirtis hirsutisve.

Panicum Echinolaena N. ab Es. Agr. bras. p. 128.

Varietates mihi notae sequentes:

a. Axi racemi hirsuto vel glabro; Foliis sub-linearis-lanceolatis (angustis), laevibus scabrisve, vaginis glabris:

Echinolaena scabra Hb. Kth. Nov. Gen. I. p. 118. tab. 38. R. et S. II. p. 322.

β . Axi glabro; Foliis subcuneato-lanceolatis (latioribus) vaginisque hirsutis: *Cenchrus marginalis* Rudge. Guian. p. 19. tab. 25. R. et S. II. p. 258. — *C. inflexus* Poir. R. et S. ibid.

Echinolaena hirta Desv. R. et S. II. p. 322.

γ . Axi hirto; Foliis sublineari-lanceolatis (angustis) vaginisque velutinosis (glaucis).

V. spp. Bras.

Culmus circiter sesquipedalis, pl. min. ramosus, saltem basi decumbens, in α et β glaber, in γ pubescens. *Folia* var. α et γ lineas 2, in β 4 lata. *Spiculae* acuminatissimae, inferiores in α saepe minus longe acuminatae et propterea breviores. *Glumae* 5-nerves, e glandulis hirsutissimae, in var. β indutae. *Flosc. neut.* 2-valvis: valvula inferior superne barbata, 5-nervis. *Hermaphr.* neutro paulo brevior, ellipticus, albus, praecipue in Var. γ basi utrinque (ut in *Ichnantho*) membranaceo- sub-alatus: appendicibus tamen non solubilibus.

Panicum Sclerochloa. Racemi (bipollucaris) solitarii axi spicula angustiori, glabro; Spiculis solitariis, bilinealibus, cuneato-oblongis, glabris; Glumis flosculos aequantibus; Foliis linear-lanceolatis, glabris.

Panicum Sclerochloa Trin. ic. gr. XXIV. tab. 283.

V. spp. Bras.

Culmus pedalis, adscendendo-decumbens, ramosus, rigidus, cum reliqu. part. laete viridis. *Vaginae* compressae, glabrae. *Folia* firma, sulcato-striata, acutiuscula, lineas 3 lata, sesqui — 3-pollucaria. *Racemus* strictus. *Spiculae* 2-seriales, herbaceo-coriaceae, depressiusculae, obtusae. *Glumae* carinatae. *Hermaphr.* chartaceus; superne retuso-attenuatus.

Panicum eriochryseoides N. ab Es. Racemi (sesqui — 3-pollucaris) solitarii axi angusto, puberulo, arete florifero; Spiculis solitariis, sub- 3-linealibus, lanceolatis, (ferrugineo-) hirsutissimis; Gluma inferiore flosculis tertiam partem breviori, superiore eosdem superante; Foliis linearibus, pilosis.

Panicum eriochryseoides N. ab Es. Agr. bras. p. 103. — *P. ferrugineum* Trin.

Diss. II. p. 159. Ic. gr. VIII. tab. 90.

V. spp. Bras.

Culmus sesqui — bi-pedalis, erectus, tenuis, simplex. *Vaginae* radicales sericeo-pubescentes, culmeae superne villosulae. *Folia* fasciculorum subinvoluta, pl. min. palmaria, culmea linea paulo latiora, 2 — 1-pollicaria. *Racemus* pl. min. nutans. *Glumae* dense hirsutae: inferior obtusiuscula, denticulata, 3-nervis, superior acuminata, 5-nervis. *Flosc. neuter* 1-valvis, dense hirsutus. *Hermaphr.* acuminatus, albus, laevis.

Panicum rottböllioides Hb. et Kth. Racemi (3 — 6-pollicaris) solitarii axi angusto, glabriuscule, arctiuscule florifero; Spiculis solitariis, sesquilinealibus, ovato-lanceolatis, praesertim inferne (fulvo-) hirsutis; Gluma inferiore flosculis quartam tertiamve partem breviori, superiore eosdem excedente; Foliis sublanceolato-linearibus, pilosulis pilosive.

α. Culmo ramoso:

Panicum rottböllioides. R. et S. II. p. 463. Trin. ic. gr. XXIV. tab. 281.

β. Culmo simplici, racemo longiori;

Panicum Lolium N. ab Es. Agr. bras. p. 102. Trin. ic. XXIV. tab. 282.

V. utr. var. spp. Bras.

Culmus 2-pedalis et ultra, erectus, satis tenuis. *Vaginae* inferiores glandulis pilisque adspersae, superiores glabrae. *Folia* firma, latiora lineas 2 lata, inferiora 2 — 3-pollicaria. *Racemus* erectus. *Gluma* inferior truncata, basi et ad margines hirsuta, subnervis; superior obtusa, bifida, basi hirsuta, 3-nervis. *Flosc. neuter* 1-valvis, margine hirsutus. *Hermaphr.* acutus, albus, apice hispidulus. — In β. racemus duplo longior, folia magis pilosa.

Panicum exaratum. Racemi (pl. min. pollicaris) solitarii axi angustissimo, glabro, distiche et laxiuscule florifero; Spiculis solitariis, sesquilinealibus, linearis-oblongis, (albido-) villosis; Glumis flosculos subaequantibus; Foliis setaceis, glabris.

Panicum exaratum Trin. Diss. II. p. 160. Ic. gr. XVII. tab. 194. N. ab Es.
Agr. bras. p. 105.

V. spp. Bras.

Culmi pertenues, simplices. *Vaginae* radicales squamiformes, pubescentes, culmeae glabrae. *Folia* rigidiuscula, fasciculorum digitalia, culmea sesquipollicaria. *Racemus* erectus l. paulo nutans. *Glumae* acutae, 5-nerves: inferior tota, superior margine tantum, tum brevius parciusque inter nervos villosa. *Flosculus neuter* 1-valvis, apicem versus margine hirsutus. *Hermaphr.* acutus, glaber, pallidus.

VIII. B r a c h i a r i a.*)

a) *Spiculis pubescensibus, pilosis, hirsutis l. lanatis.*

Panicum holosericeum Br! Racemis (4-linealibus) alternis, interstitiis subbrevioribus; Spiculis solitariis, laxis, linealibus, oblongis, brevicaudatis, lanato-comatis; Gluma inferiore flosculis dimidio breviori; Hermaphrodito mucronato-aciculato, punctulato-striato; Foliis sublanceolato-linearibus, pilosis.

Panicum holosericeum. R. et S. II. p. 460. Trin. ic. gr. XV. tab. 173. Kth. rev. gr. tab. 18.

V. spp. N. Holl.

Culmus vix pedalis, erectus, tenuis, superne hirsuto-pubescentes. *Vaginae* glandulosi-piliferae. *Folia* lineam lata, pollicaria. *Racemi* circiter 6, pauciflori, ad axin hirsutum. *Gluma* inferior aciculato-caudata, superior apice subcincinnata. *Flosculus neuter* bivalvis: valvula inferiore caudata. *Hermaphr.* superne ad margines villos aliquot emittens.

Panicum argenteum Br! Racemis (semipollicaribus) alternis, interstitia subaequantibus; Spiculis solitariis, laxis, linealibus, turbinatis, lanato-comatis; Gluma

*) Ordo in utraque subdivisione secundum racemorum ad axis communis interstitia proportionem (Rac. interstitiis breviores — aequilongi — longiores).

inferiore flosculis triplo breviori; Hermaphrodito mucronulato-acuto, tenerime punctulato; Foliis sublinearibus, pubescentibus.

Panicum argenteum. R. et S. II. p. 459. Trin. ic. gr. XV. tab. 170.

V. spp. N. Holl.

Similis praecedenti. *Culmus* pede brevior, cum *Vaginis* inferioribus pubescens. *Folia* linea pl. min. angustiora, margine cartilagineo-serrulata, pollice breviora. *Racemi* circiter 5, pauciflori, ad axin tenerrime pubescentem. *Flosculus* neuter 2-valvis: valvula inferior mutica. *Hermaphr.* superne pilo uno alterove adspersus.

Panicum serratum Sprgl. Racemis (3 — 6-linealibus) alternis, interstitia aequantibus; Spiculis solitariis, subimbricatis, linealibus, oblongis, obtusis, villo-sulo-pilosis; Gluma inferiore flosculis dimidio breviori; Hermaphrodito adunco-mucronato, punctulato; Foliis sub lanceolato-linearibus, glabris, (serratis).

Panicum serratum. Kth. rev. gr. t. 19. — *P. scopoliferum* Trin. ic. gr. XIV. t. 165. (racemis brevioribus).

Holcus serratus Thbg.

Sorghum serratum R. et S. II. p. 839.

V. spp. Cbsp.

Culmus ultrapedalis, erectus, basi ramosus. *Vaginae* inferiores pubescentes. *Folia* stricta: alia compressa, alia plana, e margine indurato et crenulato spinulescentia, lineas 1 — 2 lata, 1 — sesqui-pollicaria. *Racemi* circiter 5, patuli l. recurvo-patentes, ad axin pubescentem. *Spiculae* biserialis. *Flosc. masc.* bivalvis.

Panicum perforatum N. ab Es. Racemis (pl. min. semipollicaribus) alternis, interstitia subaequantibus; Spiculis solitariis geminisve, laxiuscule imbricatis, subultralinealibus, ellipticis, obtusiusculis, hirsutis; Gluma inferiore flosculis $\frac{3}{4}$ et ultra breviori; Hermaphrodito acutiusculo, superne pilis adsperso; Foliis linearibus, dense pilosis.

Panicum perforatum N. ab Es. Agr. bras. p. 126. Trin. ic. gr. XV. t. 175.

V. spp. Bras.

Culmus sesquipedalis, erectus, cum *Vaginis* compressus et pubescens. *Folia* lineam et qu. exc. lata, inferiora spithamea. *Racemi* 6 — 8, interdum sub-compositi, ad axin 2 — 3-pollicarem, pubescentem. *Gluma* superior glandulis nigris adspersa. *Flosc. masc.* bivalvis.

Panicum trachystachyum N. ab Es. *Racemi* (ultrasemipollicaribus) alternis, interstitia subaequantibus; *Spiculis* geminis, laxiusculis, subultralinealibus, ellipticis, obtusis, hirsutis; *Gluma* inferiore pusilla; *Hermaphroditum* obtusiusculo, superne pilis adsperso; *Foliis* filiformi-compressis, glabris.

Panicum trachystachyum N. ab Es. Agr. bras. p. 125. Trin. ic. gr. XIV. tab. 167.

V. spp. Bras.

Videtur varietas praecedentis. *Culmus* bipedalis, compressus, infra racemos pubescens. *Vaginae* glabrae. *Folia* angustissima, non nisi basi supra pilosula: inferiora pedalia. *Racemi* 6 — 8, ad axin digitalem, hirsutum. *Spiculae* (ut prioris) e badio sordide canescentes. *Flosc. masc.* bivalvis.

Panicum brachystachyum. *Racemis* (semipollicaribus) alternis, interstitia aequantibus; *Spiculis* geminis solitariisque, pectinato-imbricatis, ultra-bilinealibus, ovatis, acutis, hirsutis; *Gluma* inferiore flosculis dimidio breviori; *Hermaphroditum* acuto, laevi; *Foliis* lanceolato-linearibus, pilis adspersis.

Panicum brachystachyum Trin. Diss. II. p. 138. Ic. gr. XIV. tab. 157. N. ab Es. Agr. bras. p. 129.

Echinolaena brachystachya Kth. Agr. syn. p. 172.

V. spp. Bras.

Culmus pedalis, erectus, firmus, praesertim superne pubescens. *Vaginae* glabrae. *Folia* stricta, linea latiora, circiter sesquipollicaria. *Racemi* 3 — 4, patentes, ad axin hirsutiusculum. *Spiculae* compressae. *Flosc. masc.* bivalvis. *Hermaphr.* masculo paulo brevior.

Panicum falciferum. Racemis (subpollicaribus) alternis, interstitia subaequantibus; Spiculis solitariis, imbricatis, subultralinealibus, oblongis, obtusinsculis, dorso margineque hirsuto-pilosus; Gluma inferiore flosculis tertiam partem (dimidio minus) breviori; Hermaphrodito mucronulato, laevi; Foliis angusto-linearibus, glabris.

Panicum falciferum Trin. Diss. II. p. 127. Ie. gr. XIII. tab. 147. Kth. Agr. syn. p. 80.

V. sp. Guin.

Culmus bipedalis, gracilis, simplex. *Vaginae* glabrae. *Folia* subinvoluta l. plana, lineam et qu. exc. lata, pl. min palmaria. *Racemi* (4) per distantias aequales alterni, secundi, falcati, ad axin laevem. *Spiculae* biserialis. *Gluma* inferior obtusa, glabra, multinervis. *Flosc. masc.* vel *neuter* bivalvis.

Panicum pulchellum Raddi. Racemis (semipollice brevioribus) alternis, interstitia pl. min. aequantibus; Spiculis geminis, laxiusculle imbricatis, parvis, ovalibus, acutis, pilosis; Gluma inferiore flosculis dimidio breviori; Hermaphrodito acutiusculo, laevi; Foliis ovatis, pilosulis.

Panicum pulchellum. N. ab Es. Agr. bras. p. 118. Trin. ic. gr. XV. t. 178. *Eriochloa?* *pulchella* Kth. Agr. syn. p. 73.

V. spp. Bras.

Culmus pedalis, adscendendo-repens, tenuis. *Folia* laete viridia, culmea pollicem dimidium lata, pollicem longa. *Racemi* 8 — 12. *Flosculus* neuter bivalvis.

Panicum Isachne Roth! Racemis (pl. min. semipollicaribus) alternis, interstitia aequantibus l. iisdem paulo longioribus; Spiculis solitariis, imbricatis, sublinealibus, ovalibus, acutis, pilosis; Gluma inferiore brevissima; Hermaphrodito obtuso, laevi; Foliis lanceolatis, pubescentibus.

Panicum Isachne. R. et S. II. p. 458. Mant. 2. p. 252.

V. sp. Ind. or.

* Vaginis pubescentibus:

Panicum caucasicum *Trin.* ic. gr. XXII. tab. 262.

V. spp. Cauc. or.

Glaucescens. *Culmus* pl. min. semipedalis, adscendendo-decumbens, basi ramosissimus. *Vaginae* tumidiusculae. *Folia* lineas 2 et qu. exc. lata, pl. min. pollicaria. *Racemi* 6 — 12, secundi, axi pl. min. adpressi. *Flosc. neuter* bivalvis.

Obs. In planta Indica vaginae glabrae, folia glabriuscula, et racemi inferiores nonnumquam sub-compositi.

Panicum velutinosum *N. ab Es.* Racemis (pl. min. pollicaribus) inferioribus alternis, interstitiis sublongioribus; Spiculis geminis solitariisque, laxiusculis laxisque, subultralinealibus, ovalibus, acutis, pubescendo-pilosis; Gluma inferiore flosculis dimidio breviori; Hermaphrodito pusille mucronulato, ruguloso; Foliis lanceolatis, puberulis l. pubescentibus.

Panicum velutinosum *N. ab Es.* Agr. bras. p. 121. — *P. Petiverii* *β. Trin.* Diss. II. p. 144. Ic. gr. XV. tab. 180.

V. spp. Ind. occ. Bras.

Culmus digitalis — pedalis, adscendens, inferne ramosus, praesertim superne, cum vaginis inferioribus, pubescens. *Folia* lineas 3 — 4 lata, 1 — 2-pollicaria. *Racemi* 9 — 12, ad axin pubescentem. *Spiculae* irregulariter dispositae, fuscescendo-virentes. *Flosc. neuter* 1-valvis.

Panicum distichophyllum. Racemis (pl. min. pollicaribus) alternis, interstitiis longioribus; Spiculis geminis solitariisque, laxiusculis, linealibus, obovato-oblongis, acutiusculis, pilosis; Gluma inferiore flosculis subdimidio (plus dimidio) breviogi; Hermaphrodito acutiusculo, punctulato-ruguloso; Foliis compresso-sublanceolato-linearibus, margine serrulatis.

Panicum distichophyllum *Trin.* Diss. II. p. 147. Ic. gr. XVI. tab. 182. Kth. Agr. syn. p. 90. — *P. cartilagineum* *N. ab Es.* Agr. bras. p. 112.

V. spp. Guin.

Culmus pedalis, adscendens, inferne contracto-ramosus, cum *Vaginis* inferioribus pubescens. *Folia* subamplectentia, attenuato-acuta, rigidula, compressa, linea latiora, cartilagineo-marginata, circiter sesquipollucaria. *Racemi* 7 — 8. *Spiculae* inaequaliter biserialis. *Gluma* inferior flosculis interdum fere triplo brevior. *Flosc. neuter* bivalvis. *Hermaphr.* neutro paulo brevior.

Panicum Helopus. Racemis (inferioribus bipollucaribus) confertiusculo-alternis, interstitiis multo longioribus; Spiculis subsolitariis, laxiuscule imbricatis, fere bilinealibus, ovatis, acutis, dense pubescendo-pilosis; *Gluma* inferiore floscelis quadruplo breviori; Hermaprodito aciculato, ruguloso; Foliis e basi subcordata lanceolatis, pilosulis.

Panicum Helopus Trin. in Sprgl. n. Entd. II. p. 84. Ic. gr. XVI. t. 183. —

P. hirsutum Koen! — *P. Koenigii* Sprgl. S. V.

Oplismenus hirsutus Schult. Mant. 2. p. 271.

Urochloa pubescens Kth. Agr. syn. p. 74.

Setaria hirsuta Kth. ibid. 157.

V. spp. Ind. ou. Mascar.

Culmus 1 — 2-pedalis, decumbendo-adscendens, radicans. *Nodi* barbulati. *Vaginae* pilosae. *Folia* lineas 3 — 6 lata, 2 — 4-pollicaria, supra e glandulis pilis adspersa, inferne ciliata. *Racemi* 8 — 10, ad axin superne pubescens, sesqui — 3-pollicarem. *Axes partiales* saepe pilis adspersi. *Spiculae* 2-, rarius 3-seriales, depressiusculae. *Flosc. neuter* bivalvis.

b) *Spiculis glabris.*

Panicum rarum Br! Racemis brevissimis (1 — 2-floris) alternis; Spiculis linealibus, obovato-oblongis, acutiusculis, glabris; *Gluma* inferiore flosculis dimidio-breviori; Hermaprodito acuto, rugoso; Foliis angustissimo-linearibus, glabris.

Panicum rarum. R. et S. II. p. 459. Trin. ic. gr. XVII. tab. 200. Kth. rev. gr. tab. 15.

V. spp. N. Holl.

Culmus pedalis, pl. min. ramosus. *Vaginae*, excepto margine, glabrae. *Folia* hinc inde glandulis adspersa, 3 — 4-pollicaria. *Axis comm.* circiter digitalis, *partiales* inferiores 1 — 2-flori, lineam longi, superiorum loco *Spiculae* ipsae brevissime pedicellatae. Ad spiculae cujusvis basin axis s. processus subuliformis, spicula brevior.

Panicum flavidum Retz. Racemis 3 — 10-linealibus, alternis, inferioribus interstitiis multo brevioribus; Spiculis solitariis, biseriatim imbricatis, linealibus, subrotundo-oblongis, acutiusculis, glabris; Gluma inferiore (rotundata) flosculis dimidio- (superiore iisdem paulo-) breviori; Hermaphrodito apice adunco, ruguloso; Foliis linearibus, glabris.

Panicum flavidum. R. et S. II. p. 426. Kth. rev. gr. tab. 17. — *P. brizoides* Trin. Diss. II. p. 128. Ic. gr. XIV. tab. 158. 159. — *P. brizaeforme* Presl. rel. Haenk. I. p. 302?

V. spp. Ind. or. Inss. Philip. Jav. Mascar.

* Culmo tenuiori, racemis brevissimis, remotissimis:

Panicum granulare Lam. R. et S. II. p. 426. — *P. distans* Trin. ic. gr. XV. tab. 172.

V. spp. Mascar. N. Holl.

Obs. *Panico brizoide* L. genuino, cuius quidem *Panica flavidum* et *fluitans* Retz. nil nisi varietates esse me persuasum habeo, nondum cum his collato, nomen Retziandum servandum esse duxi. Difserit autem *Pan. flavidum* a *P. brizoide*, ipso Retzio teste, non nisi statura minori, racemis interstitiis non aequantibus, pauci- (6- nec 15-) floris, spiculis 2- (nec 5-) serialibus; *fluitans* racemis interstitiis longioribus, spiculis 2-serialibus. Hujus specimen ex ipsis Koenigii manu provectum vidi, flavo exakte simple, nisi quod racemos longiores (pollicares) et multi- (ad 20) floris habuerit. Quod denique attinet ad glumas apice violaceo-maculatas, eas, contra Retzium, in racemis multifloris, nec in paucifloris, eujusmodi *flavidi* genuini sunt, invenio. — *Panicum mucronatum* Roth haud magis a brizoide specie diversum esse videtur.

Panicum jubiflorum. Racemis inferioribus pollicaribus, alternis l. fasciculato-sparsis, exceptis supremis, interstitiis multo brevioribus; Spiculis solitariis, biseriatim imbricatis, linealibus, oblongis, acutiusculis, glabris; Gluma in-

feriore flosculis dimidio breviori; Hermaphrodito mucronulato, acuto, ruguloso; Foliis . . .

Panicum jubiflorum Trin. Diss. II. p. 130. N. ab Es. Agr. bras. p. 117.

V. spp. N. Holl. s. fol.

Specimina, imperfecta quidem, tamen speciei distinctae. *Culmus* videtur 2 — 3-pedalis. *Axis comm.* fere pedalis. Racemi adpressi vel parum patuli. *Glumae* 3-nerves. *Flosculus* neuter univalvis.

Panicum uncinatum Radd. Racemis pl. min. pollicaribus, alternis, interstitiis plurumque brevioribus; Spiculis binis solitariisque, laxis, subsesquilinealibus, ovatis, acutiusculis, racemorum inferiorum glabris, superiorum ad glumam majorem spinuloso-echinatis; Gluma inferiore flosculos subaequante (iisdem nunc breviori nunc longiori); Hermaphrodito acutiusculo, laevi; Foliis (ovato-) lanceolatis, glabriusculis.

Panicum uncinatum Trin. ic. gr. XVIII. tab. 216. — *P. glandulosum* N. ab Es. Agr. bras. p. 128. — *P. heteranthum* Lk! ht. reg. Ber. I. p. 212. Kth. Agr. syn. p. 92.

Echinolaena polystachya Hb. et Kth. R. et S. II. p. 322. Kth. Agr. syn. p. 172.

V. spp. Bras.

Racemi sub-4, distantes. *Spiculae* in superioribus racemis sensim magis echinatae. *Gluma* inferior saepissime caudulata, acumine tum flosculos superans. *Flosc. neuter* bivalvis. — In culta planta (*P. heteranthum*) spiculae glumae superioris in pilos breves arrectos conversae sunt.

Panicum strictum Br. Racemis 6 — 2-linealibus, alternis, interstitia subaequantibus; Spiculis subsolitariis, laxiusculis, lineam et qu. exc. longis, (sublanceolato-) ovalibus, obtusiusculis, glabris; Gluma inferiore flosculis 4 — 5-plo breviori; Hermaphrodito acutiusculo, sericeo-pubescente; Foliis linearibus, glabriusculis.

Panicum strictum. R. et S. II. p. 459. Trin. ic. gr. XV. tab. 179.

V. spp. N. Holl.

Culmus 1 — 2-pedalis, basi decumbens, stricto-ramosus. *Vaginae* (juniores?) refracto-pilosae, (adultiores?) glabriuscule. *Folia* plana l. margine involuta, rigida, lineam et qu. exc. lata, pollicaria — digitalia. *Racemi* 6 — 8 ad axin sesquipolliacem. *Spiculae* irregulariter biserialis. *Flosculus masculus* 1-valvis.

Panicum paspaloides Pers. Racemis pollicaribus, alternis geminisve, interstitiis plerumque paulo longioribus; Spiculis solitariis, biseriatis imbricatis, sublinealibus, oblongis, mucronulatis, glabris; Gluma inferiore (truncata) flosculis $\frac{2}{3}$ breviori; Hermaphrodito mucronato, laevi l. tenui-ruguloso; Foliis sublinearibus, glabris.

Panicum paspaloides. Kth. Agr. syn. p. 77. — *P. geminatum* Forsk. — *P. brizoides* Lam. — *P. fluitans* Delile! Fl. aeg. n. 74. — *P. beckmanniae-forme* Mik! — *P. truncatum* Trin. Diss. II. p. 130. Ic. gr. XIV. t. 168. — *P. affine* N. ab Es. Agr. bras. p. 113.

Digitaria affinis R. et S. II. p. 470. (planta humilior).

V. spp. Ind. occ. Bras. Cap. vir. Aegyp. Mascar.

Culmus basi radicans, 1 — 2-pedalis, totus vaginatus. *Vaginae* infimae abbreviatae, aphyllae; superiores laxae, glabrae. *Folia* lineas 2 — 3 lata, subdisticha, inferiora dodrantalia. *Racemi* 10 — 20, adpressi, satis tenues. *Gluma* inferior amplectens. *Flosculus masc.* l. neuter bivalvis.

Panicum subquadriparium. Racemis pl. min. pollicaribus, alternis, interstitiis paulo longioribus; Spiculis solitariis, laxiscale imbricatis, subultralinealibus, lanceolato-oblongis, acutissimis, glabris; Gluma inferiore flosculis dimidio breviori; Hermaphrodito obtusiusculo, punctulato-ruguloso; Foliis linear-lanceolatis, glabris pilisve adspersis.

Panicum subquadriparium Trin. Diss. II. p. 145. Ic. gr. XVI. tab. 186. Kth. Agr. syn. p. 80.

V. spp. Marian. Ind. or.

Culmus pl. min. pedalis, adscendens, floriferō-ramosus. *Vaginae* glabrae l. ciliatae et e glandulis pilis adspersae. *Folia* semi-amplexicaulia, lineas 2 — 3 lata, 1 — 4-pollicaria. *Racemi* 2 — 5, ad axin 2 — 3-pollicarem. *Flosc.* neuter 2-valvis.

Panicum plantagineum Lk. Racemis sesquipollicaribus, alternis, (superioribus) interstitiis paulo longioribus; Spiculis solitariis, laxiusculi imbricatis, bilinealibus, elliptico-ovatis, obtusiusculis acutiusculisve, glabris; Gluma inferiore flosculis triplo duplove breviori; Hermaphrodito obtusiusculo, punctato-ruguloso; Foliis sublanceolatis, glabris.

Panicum plantagineum Lk. ht. reg. Berol. I. p. 206. — *P. Leandri* Trin. ic. gr. XXVIII. tab. 335.

V. spp. Bras. et cult. (in hto Berol.)

Culmus 2-pedalis, inferne ramosus. *Vaginae* tenuissime ciliatae. *Folia* basi compressa amplexieaulia, medio lineas circiter 6 lata, majora 4-pollicaria. *Racemi* 8, ad axin fere dodrantalem. *Spiculae* biserialis, interdum obovatae, depressiusculae. *Glumae* tenui- 5 — 7-nerves: inferior apice subrotundata. *Flosc. neut.* 1 — 2-valvis. *Hermaphr.* neutro vix brevior.

Obs. Differentia sola inter plantam LINKII cultam et Brasiliensem nostram in racemis in illa inferne ananthis posita est, reliqua prorsus convenient.

Panicum polyphyllum Br! Racemis sesqui — 1-pollicaribus, alternis, interstitiis paulo longioribus; Spiculis solitariis, laxis, linealibus, obovato-oblongis, acutiusculis, glabris; Gluma inferiore flosculis dimidio breviori; Hermaphrodito acuto, punctato-striato; Foliis linearis-lanceolatis, pilosis.

Panicum polyphyllum. R. et S. II. p. 460. Trin. ic. gr. XV. tab. 177.

V. spp. N. Holl.

Culmus 2-pedalis, decumbens? cum *Vaginis* e glandulis pusillis pilosus. *Folia* lineas 2 — 3 lata, utrinque pubescendo-pilosa, 3-pollicaria. *Racemi* circiter 7, ad axin pubescentem, brevipedunculati. *Spiculae* dissitusculae, quasi 1-seriales. *Flosc. neut.* 1-valvis.

† *Panicum obtusum* Hb. Kth. Racemis subpollicaribus, alternis, interstitiis paulo longioribus; Spiculis geminis, laxiusculis, sesquilinealibus, obovatis, obtusis, glabris; Gluma inferiore flosculis $\frac{1}{2}$ breviori; Hermaphrodito obtusiusculo, laeviusculo; Foliis linearibus, supra puberulis.

Panicum obtusum. R. et S. II. p. 425. Kth. rev. gr. t. 116. Agr. syn. p. 97.

Mexico.

Culmus pedalis, erectus, inferne ramosus. *Vaginae* glabrae. *Folia* rigidula, sesquilineam lata, 2 — 4-pollīcaria. *Racemi* 4 — 7, ad axin 2 — 3-pollicarem. *Spiculae* sub- 4-serialis. *Gluma* superior flosculis paulo brevior. *Flosc.* neuter 2-valvis. *Hermaphr.* sub lente tenuissime punctulatus.

† *Panicum javanicum* Poir. Racemis bipollicaribus et ultra, alternis, interstitiis longioribus; Spiculis subsolitariis, laxiuscule imbricatis, magnis, ovato-oblongis, acutis, glabris. Gluma inferiore flosculis quadruplo breviori; Hermaphrodito obtuso, aciculato, ruguloso; Foliis linearibus, pilosis.

Panicum sanguinale Burm.

Oplismenus javanicus R. et S. II. p. 891.

Urochloa panicoides PB. Kth. rev. gr. tab. 14. Agr. syn. p. 74. (an synn. Roxb. et N. ab Es?).

Java. Mascar.

Culmus sub- 2-pedalis, erectus? simplex, nodis *Vaginis* que pilosis. *Folia* utrinque tuberculato-pilosa, lineas fere 3 lata, spithamea. *Racemi* 3 — 5. *Spiculae* 2-serialis. *Flosc. masc.* 2-valvis. *Hermaphr.* masculo brevior.

Panicum ambiguum. Racemis sesquipollicaribus, alternis, interstitiis longioribus; Spiculis geminis, laxiuscule imbricatis, fere bilinealibus, ovato-lanceolatis, acutis, glabris; Gluma inferiore flosculis $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ breviori; Hermaphrodito obtuso, aciculato, tenuissime punctato; Foliis lanceolato-linearibus, glabriusculis.

Urochloa paspaloides Presl. rel. Haenk. I. p. 318. Kth. Agr. syn. p. 75.

V. sp. Manill.

Descript. cel. PRESLIR optima. *Culmus* speciminis nostri prostratus, ramosus, nodis puberulis. *Folia* in pagina superiore tuberculis minutissimis, in inferiore pilis adeo brevibus adspersa, ut lentis ope tantum cognosci possint. *Racemi* 3, pallidi. — *Paspalo annulato* habitu persimile.

Panicum glumare. Racemis sesquipolligaribus, alternis, interstitiis longioribus; Spiculis geminis solitariisque, laxiusculis, subultralinealibus, lanceolato-ovatis, acutis, glabris; Gluma inferiore flosculis parum breviori; Hermaphrodito obtusiusculo, aciculato, punctulato-subruguloso; Foliis linearibus, subpubescentibus.

Panicum glumare Trin. Diss. II. p. 143.

Urochloa glabra Brongn. Dup. it. Bot. p. 121.

V. spp. N. Zeel.

Culmus (abscissus) 1 — 2-pedalis? decumbens? ramosus. *Vaginae* pubescentes. *Folia* lineas 2 — 3-lata, inferiora dodrantalia, superiora racemos superantia. *Racemi* (4) ad axin bipollicarem, pubescentem. *Gluma* superior subacuminata, *flosculum neutrum* bivalvem excedens.

Panicum numidianum LaM. Racemis (inferioribus nonnumquam subcompositis), sesqui — 3-polligaribus, alternis, interstitiis longioribus; Spiculis geminis solitariisque, laxiuscule et subirregulariter imbricatis, linea longioribus, (sublanceolato-) oblongis, acutis, glabris; Gluma inferiore flosculis quadruplo-breviori; Hermaphrodito acutiusculo, cuspidulato, tenuissime punctulato; Foliis lanceolato-linearibus, glabris.

Panicum numidianum. R. et S. II. p. 433. Trin. ic. gr. XV. tab. 174. N. ab. Es. Agr. bras. p. 122.

V. spp. Aegypt. Bras.

Culmus tripedalis, erectus, subramosus. *Vaginae* glabrae. *Folia* lineas 2 — 3 lata, palmaria — spithamea. *Racemi* 7 — 12, ad axin sesqui — 2-palmarem solitarii interdum gemini. Spiculae 2 — 3-serialis. *Gluma* inferior solito angustior. *Flosc. neut.* l. mase. 2-valvis.

Panicum adspersum. Racemis pl. min. sesquipolligaribus, (confertiusculo-) alternis, interstitiis longioribus; Spiculis geminis solitariisque, laxis l. interrupte et irregulariter subimbricatis, linealibus, obovato-oblongis, acuminatis, glabris l. obsolete pubescentibus; Gluma inferiore flosculis triplo breviori; Hermaphrodito acutiusculo, punctato-ruguloso; Foliis lanceolatis, glabris.

Panicum adspersum Trin. ic. gr. XV. tab. 169. Kth. Agr. syn. p. 90. — *P.*

caespitosum Sprgl! S. V. p. 310, (excl. synn.)

V. spp. Doming.

Culmus 1 — 2-pedalis, decumbendo-adscendens, pl. min. ramosus. *Vaginae* pubescendo-ciliatae. *Folia* interdum oblongo-lanceolata, basi amplectentia, lineas 3 — 5 lata, sesqui — 3-pollicaria. *Racemi* 3 — 6, ad axin 1 — 2-pollicarem. *Spiculae* non distincte seriatae, glabrae l. pube vaga adspersae. *Flosc. neut.* 2-valvis.

Panicum pyramideum Lam. Racemis 1 — sesqui-polligaribus, conferto-jubatis, interstitiis multo longioribus; Spiculis geminis solitariisque, laxiusculis, linealibus, oblongis, mucronatis, glabris; Gluma inferiore flosculis dimidio breviori; Hermaphrodito mucronato l. aciculato, ruguloso l. laevi; Foliis sublanceolatis linearibusve, glabris.

Panicum pyramidale. R. et S. II. p. 428.

α. Vaginis glabris, fol. linearibus, axi partiali epili, spiculis ad nervos superne hispidis, herm. mucronulato, laevi:

Panicum pyramidale. Kth. rev. gr. tab. 23. Agr. syn. p. 93.

V. sp. Senegal.

β. Vaginis glandulosō-pilosis, fol. sublanceolatis, axi partiali ad pedicellos pilifero, herm. aciculato, ruguloso:

V. spp. Guin.

Var. α folia (superiora) lineas $2\frac{1}{2}$ lata, pedalia; hermaphroditus acutus, leviter striatus. *Var.* β folia (superiora) sensim attenuato-acuminata, subam-

plectentia, inferne lineas 6 lata, pollices 5 longa. Ad spicularum pedicellos pili spicula longiores; Herm. obtusus, acicula brevi. — In utraque var. racemi plurimi, basi barbati, conferto-alterni et subverticillato-fasciculati, jubam constituant 6 — 10-pollicarem, sublanceolatam, patulam.

Panicum prostratum LaM. Racemis (nonnumquam subcompositis) semi — 1-pollicaribus, conferto-alternis, interstitiis multo longioribus; Spiculis geminis solitariisque, laxiusculis laxisve, sublinealibus, ovalibus, acutis, glabris; Gluma inferiore flosculis quadruplo breviori; Hermaphrodito cuspidato-mucronulato, punctato-striato, subruguloso; Folii lanceolato-cordatis, l. e basi cordata lanceolatis, glabris (ciliatis).

Panicum procumbens N. ab Es. Agr. bras. p. 109.

Pedicelli nunc nudi, nunc pl. min. setigeri: setis vagis. Ad var. α , pedicellis setigeris, synonyma:

Panicum prostratum. Trin. ic. gr. XVI. tab. 185. A. — *P. setigerum* Retz. R. et S. II. p. 436. (sub *P. grossario*). — *P. grossarium* herb. non L. — *P. repens* (Burm.) Roxb! Schult. Mant. 2. p. 232. — an *P. barbatum* LaM? R. et S. II. p. 428. (var. racemis subcompositis?)

Echinochloa setigera R. et S. II. p. 480. Mant. 2. p. 270.

V. spp. Ind. occ. et or. Jav. Mascar.

β . Idem, culmo flaccido, foliis angustioribus, racemis paucioribus: (Trin. l. l. tab. 185. B. planta minor):

Panicum umbrosum Retz. Kth. Agr. syn. p. 90. (an synn.?)

Digitaria umbrosa Pers. R. et S. II. p. 475.

V. spp. Ind. or.

γ . Pedicellis plerumque nudis:

Panicum caespitosum Sw! R. et S. II. p. 430. 883.

V. spp. Ind. occ.

δ. Idem, foliis margine subcartilagineo-serratis (Trin. l. l. tab. 184.):

Panicum Sieberi Lk. — an *P. subcordatum Roth*: R. et S. II. p. 480. Mant. 2. p. 270. (sub. *Echinochloa*; spiculae autem obtusae dicuntur).

V. spp. Aegypt.

Culmus 1 — 2-pedalis, repens, ramosus, nodis pubescentibus. *Vaginae* aut totae glabrae, aut ciliatae. *Folia* plerumque basi ciliata, semper pl. min. amplexicaulia, 1 — 2-pollicaria. *Racemi* 4 — 15 ad axin 1 — 2-pollicarem. *Flosculus neuter* bivalvis.

IX. V i r g a r i a.*

a) *Gluma inferiore flosculis dimidio magissee breviori (interdum nulla).*

Panicum obseptum. Radiis subracemiformibus, simpliciusculis, alternis, contractis; Pedicellis spicula brevioribus; Spiculis subultralinealibus, lanceolato-ovatis, acutis, glabris; Gluma inferiore flosculis 4 — 5^{pl}o breviori, enervi, superiore 7-nervi; Hermaphrodito acuto, tenuissime striato; Foliis angusto-linearibus, glabris: supremis racemos aequantibus vel superantibus.

Panicum obseptum Trin. Diss. II. p. 149. Kth. Agr. syn. p. 80.

V. spp. N. Holl.

Culmus semi — ultra-pedalis, decumbens, subsimplex. *Nodi* plurimi, barbulati. *Vaginae* glabrae. *Ligula* ciliaris. *Folia* lineam dimidiā vel integrā lata, 1 — 3-pollicaria, strictiuscula, superiora aliquot confertiora racemos involucrantia. *Axis communis* pl. min. pollicaris. *Racemi* pauci, paulo laxiflori, police breviores. *Pedicelli* validiusculi. *Flosculus neuter* 1-valvis, 5 — 7-nervis, cum gluma superiori *Hermaphr.* lineari-elliptico vix longior.

*^o) Ordo incipiens a radiis racemiformibus (racemis simpliciusculis), per radies magis compositos — virgatos — progreditur ad radios decompositos.

Panicum floridanum. Radiis racemiformibus simpliciusculis, alternis, contractis; Pedicellis brevissimis; Spieulis fere bilinealibus, ovatis, obtusiusculis, glabris; Gluma inferiore nunc minima nullave, nunc flosculis triplo duplove breviori, superiore 5-nervi; Hermaphrodito obtusiusculo, laevi; Folii sublanceolato-linearibus, excepta basi glabris.

V. spp. Florid. Alabam.

Culmus 4-pedalis, satis gracilis, ad nodos villosulo-pubescentes. *Vaginae* glabrae vel molliter et longiuscule villosulae. *Ligula* membranacea, brevis. *Folia* firmula, lineas 2—4-lata, basin versus supra villosula, interdum pruinosa; inferiora dodrantalia — spithamea, sensim breviora. *Racemi* 2—5, dissite alterni, 3—4 pollicares, basi villosulo-barbati, ad axin in gramine pluristachyo dodrantalem. *Racemuli* 2—3-flori, nunc remotissimi ita, ut radios (racemos) singulos depauperatissimos (6—7-paros) reddant, nunc magis approximati magisque contigui, plerumque tamen pl. min. interruptodissiti. *Spiculae* laxae, turgidae. *Gluma* inferior in uno eodemque individuo longitudine varians. *Flosc. neut.* 4-valvis, 5-nervis.

Panicum altissimum Meyer. Radiis racemiformibus simpliciusculis, verticillatis, patentissimis; Pedicellis brevissimis; Spiculis sesquilinealibus, ovato-oblongis, acutiusculis, glabris; Gluma inferiore flosculis 3—5^{pl}o breviori, 3-, superiore 9-nervi; Hermaphrodito acuto, laevi; Folii lato-lanceolato-linearibus, glabris.

Panicum altissimum. N. ab Es. Agr. bras. p. 155. — *P. megiston* Schult. Mant. 2. p. 248. — *P. tuberculatum* Presl. rel. Haenke. I. p. 307. (ubi vero gluma superior 5-nervis dicitur). — *P. elatius* Kth. Agr. syn. p. 121.

V. spp. Bras.

Culmus 4—5-orgyalis, ramosus. *Vaginae* glandulis adspersae. *Folia* pollicem lata vel latiora, ultrapedalia. *Panicula* sesquipedalis. *Racemi* spithamei — dodrantales, in singulis verticillis plurimi, inferne pl. min. longe ananthi. *Racemuli* biflori. *Spiculae* laxae, turgidae. *Flosc. neut.* 2-valvis.

Panicum plicatum Lam. Radiis racemiformibus (2 — 8 · pollicaribus) simpliciusculis, jubato-sparsis, patentibus; Pedicellis brevissimis; Spiculis linealibus, ovalibus, acutis, glabris; Gluma inferiore 3-nervi, flosculis quadruplo-, superiore 5-nervi, iidem $\frac{1}{4}$ breviori; Hermaphrodito acutiusculo (mutico cuspidulatove) demum ruguloso; Foliis lato-lanceolatis (plicato-costatis), pilis rariusculis hirtis.

Panicum plicatum. R. et S. II. p. 428 et 882. Mant. 2. p. 228. Trin. ic. gr. XIX. tab. 223.

V. spp. Mascar. Nepal.

* Foliis latioribus (poll. 2 latis), racemis minus dense confertis:

Panicum palmifolium Poir. R. et S. II. p. 882. Mant. 2. p. 228.

Obs. * videtur gramen in hortis nostris cultum; plantae spontaneae enim, quotcumque ejusdem viderim exempla, cultae alioquin simillimae, folia semper angustiora sunt. — Racemi in Nepalensibus interdum spithamei l. dodrantales (an haec: *Pan. nervosum Roxb.* — *P. neurodes R. et S.* — *P. nepalense Sprg!.*?)

Spicularum structura prorsus ut in Subdiv. VI. a, β; quid, quod in spontanea planta racemulorum axis saepissime in setam pl. min. longam excurrit. (Conf. *Pan. excurrens.*)

Panicum costatum Roxb! Radiis racemiformibus (pollice brevioribus) simpliciusculis, patenti-confertissimis; Pedicellis brevissimis; Spiculis linealibus, ovalibus, acutis, glabris; Gluma inferiore 3-nervi, flosculis quadruplo-, superiore 5-nervi, iisdem subduplo breviori; Hermaphrodito mucronato-acuto, ruguloso; Foliis lanceolatis (plicato-costatis), hirtis.

Panicum costatum. Schult. Mant. 2. p. 228. Trin. Diss. II. p. 135.

V. sp. Mascar.

Culmus repens, 3 — 6-pedalis, infra racemos hirtus, nodis barbulatis. *Vaginae* praesertim marginem versus e tuberculis piliferae. *Ligula* ciliaris. *Folia* medio pollicem dimidium vel integrum lata, spithamea, superiora breviora et angustiora. *Juba* in specimine nostro bipollicaris, densissima. *Axis comm.* hirsutus. *Spiculae* imbricatae, glaucescentes. *Flosc. neut.* bivalvis. — *P. plicato* nimis affine.

Panicum marginatum Br. Radiis racemiformibus simpliciusculis compositisve, alternis jubatisve, contractis; Pedicellis brevissimis; Spiculis ultralinealibus, lanceolato-ovalibus, acutis, glabris; Gluma inferiore flosculis quadruplo magisve breviori, enervi, superiore 5-nervi; Hermaphrodito acutiusculo, sericeo-pubescente; Foliis sublanceolato-linearibus, glabris.

Panicum marginatum. R. et S. II. p. 460. Trin. ic. gr. XVIII. tab. 209.

V. spp. N. Holl.

Culmus pedalis, procumbens, ramosus, nodis pubescentibus. *Vaginae* glabrae l. tuberculis saepe piliferis exasperatae. *Folia* (siccitate interdum involuta) lineas 2 et qu. exc. lata, supra pl. min. aspera, 2 — 5-pollicaria. *Axis* comm. 2 — 3-pollicaris. *Racemi* pollice breviores. *Racemuli*, ubi adsunt, circiter 3-lineales. *Spiculae* laxiusculae. *Flosc.* neut. 1-valvis.

Panicum excelsum N. ab Es. Radiis racemiformibus simpliciusculis, consertissimo-jubatis, adpresso-contractis; Pedicellis spicula paulo brevioribus; Spiculis sublinealibus, lineari-subellipticis, obtusiusculis, glabris; Gluma inferiore flosculis triplo l. subduplo breviori, 3-, superiore (iisdem $\frac{1}{4}$ breviori) 5-nervi; Hermaphrodito acutiusculo, laevi; Foliis acuminatissimo-linearibus (amplexicaulibus) glabris.

Panicum excelsum N. ab Es. Agr. bras. p. 180.

V. spp. Bras.

Culmus orgyalis, simplex, strictus. *Vaginae* glabrae. *Folia* stricto-erecta, firma, arce amplectentia, inferne compressa, dein plana, pl. min. pollicem dimidium lata, sesquipedalia. *Juba* dextrantalis — sesquipedalis, lanceolata, glaucescens, axi glabro. *Racemi* angusti, stricto-erecti. *Racemuli* brevissimi, 5 — 6-flori. *Spiculae* hinc arcuato-convexae. *Flosc.* neut. 1-valvis.

Panicum stoloniferum Poir. Radiis racemiformibus simpliciusculis, alternis jubatisve, cum Racemulis contractis, illisve pl. min. patentibus. Pedicellis brevissimis; Spiculis linealibus, ovato-lanceolatis, acutissimis, glabris; Gluma inferiore flosculis triplo vel subduplo breviori, 3-, superiore (flosculis parum

breviori) 5-nervi; Hermaphrodito (neutro dimidio minori) acutiusculo, laevi; Foliis ovato-lanceolatis, glabris.

a. Majus, racemis confertissimo-jubatis:

Panicum frondescens Meyer Esseq. Schult. Mant. 2. p. 236. N. ab Es. Agr. bras. p. 177. Kth. Agr. syn. p. 91. (excl. syn. Trin.) — *P. olyraefolium* Radd. Agr. bras. p. 43. — *P. stoloniferum*, var. *major* Kth. rev. gr. tab. 108. — *P. brachyclados* Rchbch. in Weig. hb. Surin.

V. spp. Guian. Bras.

β. Minus, racemis pl. min. patentibus, distinctius alternis:

Panicum stoloniferum Poir. R. et S. II. p. 883. Kth. rev. gr. tab. 22. — *P. ctenodes* Trin. ic. gr. XV. tab. 171.

V. spp. Bras.

Culmus semi — ultra-pedalis, repens, ramis erectis. *Vaginae* pl. min. ci- liatae. *Folia* in gramine humiliori lineam dimidiata — lineas 3 lata, lineas 4 — 12 longa; in majori lineas 6 — 10 lata, 2 — 4-pollicaria; interdum subtus pilis brevissimis adspersa. *Racemi* in β , 5 — 12, discreti, in α , pluri- mi, dense conferti, jubam constituentes linear-lanceolata, 3 — 6-polli- carem, *Axi* nunc pubescente, nunc pl. min. glabro. *Racemuli* brevissimi. *Spiculae* fusco-virides. *Glumae* ad carinam superne hispidulae. *Flosc.* neuter 2-valvis.

Panicum paludicola N. ab Es. Radiis racemiformibus, simpliciusculis, jubatis, ra- cemulisque contractis; Pedicellis brevissimis; Spiculis subsesquilinealibus, lanceolatis, acuminatis, glabris; Gluma inferiore flosculis duplo triplo bre- viori, 3-, superiore (iisdem paulo minori) 5-nervi; Hermaphrodito (neutro paulo breviore) acuto, laevi; Foliis cordato-lanceolatis, amplexicaulibus, glabriusculis.

Panicum palustre Trin. Diss. II. p. 181. — *P. frondescens* Trin. ic. gr. XIX. tab. 288. (in descriptione affines species confusae).

V. spp. Bras.

* Foliis angustioribus, juba minus densa:

V. spp. Jav. Manill.

Culmus tripedalis, erectus, simplex aut ramosus. *Vaginae* glabrae. *Folia* in planta Bras. lineas 9 — pollices 1 — $1\frac{1}{2}$, in orientali lineas 3 — 5 lata; supra plerumque pilis brevissimis adspersa, ultrapalmaria — dodrantalia. *Juba* spithamea — ultrapedalis, pallide virens. *Racemi* infimi pl. min. remoti. *Racemuli* 2 — 4-lineales. *Flosc. neuter* 1 — 2-valvis.

Panicum pilosum Sw. Radiis racemiformibus simpliciusculis (plerumque pilosis) jubatis, erecto-patulis; Pedieillis brevissimis; Spiculis minimis l. perparvis, ovalibus, obtusiusculis, glabris; Gluma inferiore flosculis duplo breviori, 3 — 5-, superiore 5-nervi; Hermaphrodito acuto, laevi; Folis (e basi ovata l. subcordata) linear-lanceolatis, glabriusculis.

Panicum pilosum. R. et S. II. p. 427. N. ab Es. Agr. bras. p. 183. Trin. ic- gr. XVIII. tab. 213. — *P. pilisparsum* Meyer. Schult. Mant. 2. p. 248. — *P. trichophorum* Schrad. Schult. l. l. p. 247. — *P. heterophyllum* Sprgl. n. Entd. — *P. Sprengelianum* Schult. l. l. p. 234.

Setaria pilosa, Meyeri et Schraderi Kth. rev. gr. p. 47.

V. spp. Guian. Bras. O-Tait.

Culmus pl. min. 2-pedalis, erectus et erecto-ramulosus, l. basi decumbens ramis divaricatis: illius nodi glabri, hujus barbati. *Vaginae* ciliatae. *Folia* (latiora) pollicem dimidium latę, digitalia — dodrantalia. *Juba* linear-lanceolata, spithamea et longior. *Racemi* 1 — 2-pollicares. *Axes partiales* plerumque e marginum tuberculis pilosi, aut pilis adspersi tantum, rarius prorsus epiles. *Racemuli* 2 — 6-flori. *Spiculae* ad carinas palearum denticulatae, circiter lineam dimidię longae. *Flosc. neuter* l., masc. 1 — 2-valvis. *Hermaphr.* flosculo incompleto parum brevior.

Obs. Conf. infra p. 264. *Pan. polygonatum*.

Panicum laxum Sw! Radiis racemiformibus simpliciusculis compositis (nudis) alternis jubatisque, patentibus vel cum Radiolis pl. min. contractis; Pedi-

cellis brevissimis: Spiculis minimis, lanceolato-ovalibus, obtusiusculis, glabris; Gluma inferiore flosculis plus duplo breviori, 1—3-, superiore 3—5-nervi; Hermaphrodito obtusiusculo, apice subbarbulato, laevi; Foliis lanceolato-linearibus (vel linearibus tantum), glabris.

Panicum laxum. R. et S. II. p. 453. — *P. tenuiculum* Meyer. Schult. Mant. 2. p. 247. N. ab Es. Agr. bras. p. 186. Trin. ic. gr. XVIII. tab. 215. — *P. agrostidiforme* Radd. — *P. diandrum* Kth. rev. gr. tab. 110. Agr. syn. p. 96.

V. spp. Ind. occ. Bras.

Culmus 1—3-pedalis, nunc tenuis et debilis, nunc inferne crassitie pennae gallinaceae et firmus, pl. min. compressus, simplex vel ramosus. *Vaginae* glabrae l. superne ciliatae. *Folia* plana l. compressa, lineas. 1—3 lata, 1—sesqui-palmaria. *Racemi* 1—3-pollicares, solitarii, tenues, inferiores remoti, superiores conserti, ad axin palmarem — spithameum. *Racemuli* 2—5-lineales. *Flosc. neut.* 2-valvis.

Obs. A priori, cuius varietati epili valde simile, dignoscitur radius, ob radiolos plerumque evidentes minus linearibus, magis sparsis, longioribus; foliis angustioribus.

Panicum amplexicaule Rudge. Radiis racemiformibus simpliciusculis, in jubar thrysodem densissimam angustamque coarctatis; Pedicellis brevissimis; Spiculis bilinealibus, linearis-lanceolatis, acuminatis, glabris; Glumis 3-nervibus: inferiore flosculis $\frac{3}{4}$ breviori; Hermaphrodito acuminato, laevi; Foliis (amplexicaulibus) lato-linearis-lanceolatis, glabris.

Panicum amplexicaule. R. et S. II. p. 456. Trin. ic. gr. XVIII. tab. 205. — *P. myuros* Kth. Agr. syn. p. 86. (an' Rich. et LaM., quibus spiculae minimae dicuntur?)

Agrostis myuros LaM. — *A. monostachya* Poir.

Hymenachne myuros PB. R. et S. II. p. 468. N. ab Es. Agr. bras. p. 275.

V. spp. Ind. occ. Bras.

Culmus ergyalis, ramosus. *Folia* pollices $\frac{1}{2}$ — 2 lata, pl. min. pedalia. *Juba* *thyrsodes* cylindrico-angustata, pedalis et longior, viridis. *Flosc.* neuter 1-valvis, glumam superiore excedens. *Hermaphroditus* chartaceus, neutro paulo brevior.

Obs. *Panicum polystachyum* Presl. rel. Haenk. I. p. 512. huic nimis affine videtur, thyrsos breviori et racemis patulis differens.

Panicum vilvooides. Radiis racemiformibus (brevissimis) simpliciusculis, in thyrsum angustissimum densissimumque coarctatis; Pedicellis spicula brevioribus; Spiculis linealibus, ovatis, acutatis, glabris; Gluma inferiore flosculis subtriplo breviori, (praeter carinam) tenui- pluri-nervi, superiore 9-nervi; Hermaphroditio (neutro duplo minori) adunco-mucronulato, laevi; Foliis linearibus, glabris.

Panicum vilvooides Trin. Diss. II. p. 171. Ic. gr. XVII. tab. 204. Kth. Agr. syn. p. 88.

Hymenachne fluvialis N. ab Es! Agr. Bras. p. 273.

V. spp. Guian. Bras. Guin.

Culmus sesquipedalis, compressus, basi contracto-ramosus. *Vaginae* compressae, glabrae. *Folia* lineas 2 — 3 lata, inferiora ultraspitamaea. *Thyrsus* gracilis, spithameus — sesquipedalis, siccus fuscescens. *Radii* brevissimi, appressi. *Spiculae* pl. min. horizontales, compressae, supra paulo arcuatae. *Gluma* inferior praeter carinam nervis 12 — 14 tenuissimis notata. *Flosculus* neuter bivalvis: valv. inf. 9-nervis.

Panicum gibbum Ell. Radiis subracemiformibus simpliciusculis compositive, in thyrsum contractis; Pedicellis spiculam aequantibus; Spiculis bilinealibus, lanceolato-l. elliptico-ovatis, nunc acutis nunc pl. min. obtusis, glabris; Gluma inferiore flosculis subquadruplo breviori, 3-, superiore 11-nervi; Hermaphroditio (neutro duplo minore) obtusiusculo, laevi; Foliis pl. min. lanceolato-linearibus, glabris.

Panicum Elliottianum Schult. Mant. II. p. 256. Kth. Agr. syn. p. 88.

V. spp. Am bor. (Delaware).

Culmus videtur 3-pedalis, inferne contracto-ramosus. *Vaginae* pl. min. ciliatae. *Folia* plana vel compressa, lineas 3 — 6 lata, inferiora spithamea et fortasse longiora. *Juba thrysodes* spithamea et ultra, circiter lineas 3 — 4 lata. *Radius* (inferiores) pl. min. pollicares, contracto-radiolosi. *Spiculae* deciduae, saepe a parte glumae superioris gibbae. *Flosculus neuter* 2-valvis: valv. inf. 5-nervis.

OBS. Simillimum *Pan. uliginosum* Roth differt spiculis (fuscescentibus) ovalibus, non gibbis; Gluma inferiore obtusa, praeter carinam tenuissime plurinervi, superiore et flosculi masculi valv. inf. 9-nervibus; Hermaphr. sessili, masculo tertiam quartamve partem tantum breviori. — *Pan. strumosum* Presl. (rel. Haenk. I. p. 503.) *Pan. gibbo* affinius videtur, differens glumis 7-nervibus: inferiore flosculis duplo tantum breviori, superiore piloso-hispida.

Panicum leucophaeum Hb. et Kth. Radiis racemiformibus simpliciusculis, contracto-jubatis; Pedicellis brevibus spiculamve aequantibus; Spiculis 2 — 3-linealibus, linear-lanceolatis, acutis, lanatis; Gluma inferiore minuta, superiore 3 — 5 nervi; Hermaphrodito acuminato, tenuissime punctulato; Foliis lanceolato-linearibus, glabris.

Andropogon insularis L. sp. pl. ed. 2.

Milium villosum Sw.

Panicum leucophaeum. Kth. Agr. syn. p. 124. Trin. ic. gr. XIX. t. 220. —

P. insulare Meyer Esseq.

Monachne unilateralis R. et S. II. p. 468. (neque vero PB. Agr. Tab. X. f. 9.)

Trichachne insularis N. ab Es. Agr. bras. p. 86.

β. Spiculis plerumque brevius pedicellatis, foliis angustioribus:

Milium hirsutum PB. Agr. Tab. V. f. 5.

Acicarpa sacchariflora Radd. Agr. bras. p. 31.

Trichachne sacchariflora N. ab Es. Agr. bras. p. 87.

V. spp. Ind. occ. Bras.

Culmus 2 — 5-pedalis. *Folia* lineas 2 — 4 lata, spithamea — ultrape-dalia, in var. α scabriuscula, in β laevia. *Racemi* in α plerumque plurimi, in β pauciores.

Panicum vestitum Kth. Radiis racemiformibus simpliciusculis, contracto-jubatis; Pedicellis, spicula plerumque brevioribus; Spiculis bilinealibus, lanceolato-ovatis, acutis, villosis; Gluma inferiore minuta, superiore (flosculis nonnihil breviori) 7-nervi; Hermaphrodito acuto, obsolete striatulo; Foliis sublan-ceolato-linearibus, pilosis.

Panicum vestitum Kth. Agr. syn. p. 125.

Trichachne velutina N. ab Es. Agr. bras. p. 90.

V. sp. Bras.

Culmus circiter 3-pedalis. *Folia* (in specimine nostro) lineas 2 lata, do-drantalia et breviora, cum *Vaginis* brevi-hirsuta. *Juba* dodrantalis, Radiis (7) subfastigiatis.

OBS. A praecedente, cui similis, praecipue spiculis latioribus, minus acutis, minus longe villosis, hermaphrodito non punctulato et vaginis, praesertim radicalibus, dense hirsutis distinguitur.

Panicum barbinode. Radiis racemiformibus simpliciusculis compositive, alternis jubatisve, patentibus; Pedicellis brevissimis; Spiculis linealibus, ovalibus, acutis, glabris; Gluma inferiore flosculis 3 — 4-plo breviori, subnervi, superiore 5-nervi; Hermaphrodito obtusiusculo, punctulato; Foliis latius-culo-linearibus, glabris (vaginis nodisque subsericeo-pilosis).

Panicum barbinode Trin. ic. gr. XXVII. tab. 318.

V. spp. Bras.

Culmus 3-pedalis, inferne ramosus. *Nodi* dense et candide barbati. *Vagi-nae* compressae, praesertim inferne, dorso et margines versus laxiuscule pilosae. *Ligula* fomentoso-ciliaris. *Folia* lineas 4 — 5 lata, pl. min. spithamea. *Juba* spithamea — dodrantalis. *Racemi* 3 — 4-pollicares, nunc omnes simpliciusculi, nunc infimi racemulos 3 — 6-lineales patulos emittentes. *Spiculae* fasciculato-imbricatae. *Flosc.* neuter 2-valvis.

Panicum fuscum Sw. Radiis subracemiformibus, plerumque a basi compositis, subverticillatis sparsisque, nunc cum racemulis contractiusculis, nunc pl. min. patentibus; Pedicellis brevissimis spiculamve aequantibus; Spiculis linealibus, oblongis, acutiusculis, glabris; Gluma inferiore flosculis subdimidio breviori, 3-, superiore 5-nervi; Hermaphrodito obtusiusculo, ruguloso; Foliis (latiusculo-) lanceolato-linearibus, glabris.

a. Racemulis simplicibus racemisque contractioribus, vaginis glabriusculis l. pilosulis tantum:

Panicum fuscum Sw! R. et S. II. p. 439. Trin. ic. gr. XVIII. tab. 206.

Kth. Agr. syn. p. 94. — *P. fuscorubens Lam.*

V. spp. Ind. occ.

β. Racemulis subcompositis racemisque patentibus, vaginis hirsutioribus:

Panicum fasciculatum Sw. R. et S. II. p. 427. Kth. Agr. syn. p. 94. — *P. fastigiatum Poir.*

V. spp. Bras.

Culmus 1 — 2-pedalis et ultra, erectus l. procumbens, inferne pl. min. ramosus, nodis puberulis barbulatisve. *Folia* lineas 4 — 6 lata, palmaria — spithamea. *Axis comm.* pl. min. palmaris, pubescens l. hirsutus. *Racemuli* 3 — 5 lineales. *Flosc. neut.* 2-valvis.

Panicum compressum Biv. Radiis subracemiformibus simpliciusculis vel a basi compositis, verticillatis, patulis; Pedicellis spicula brevioribus; Spiculis linealibus, elliptico-ovalibus, acutiusculis, sub lente pilosulis; Gluma inferiore flosculis circiter triplo breviori, 1 — 3-, superiore 7-nervi; Hermaphrodito acutiusculo, tenuissime ruguloso; Foliis sublanceolato-linearibus, pubescentibus.

Panicum compressum. Schult. Mant. 2. p. 232. Kth. Agr. syn. p. 97.

V. spp. Panorm.

Culmus ultrapedalis, compressus, nodis barbulatis. *Vaginae* tenui-pubescentes. *Ligula* membranacea, ciliis stipata. *Folia* circiter sesquilineam lata,

2 — 3-pollicaria. *Panicula* 1 — 2-palmaris, strictiuscula, e viridi purpureo-que varia. *Radii* in verticillo plures, plerumque a basi floriferi. *Spiculae* laxae.
 † *Panicum arvense* Kth. Radiis subracemiformibus a basi brevi-compositis, paniculatis, radiolisque patulis; Pedicellis spiculam subaequantibus (pilo uno alterove munitis); Spiculis ultralinealibus, ovato-ellipticis, acutis, pubescentibus; Gluma inferiore flosculis triplo breviori, 5-, superiore 7-nervi; Hermaphrodito mucronulato, ruguloso; Foliis linearis-lanceolatis, glabris.

Panicum arvense Kth. rev. gr. tab. 109. Agr. syn. p. 93.

Senegal.

Culmus 2-pedalis et altior, basi decumbens, nodis barbatis, *Vaginae* glabrae, superne ciliatae. *Ligula* ciliaris. *Folia* basi rotundata, lineas 4 — 6 lata, pollices 4 — 6 longa. *Radii* inferiores subdecompositi. *Spiculae* depressiusculae, geminae. *Flosculus neuter* 2-valvis: valv. inf. 5-nervis.

Panicum trachypus. Radiis subracemiformibus, a basi brevi-compositis, alternis, radiolisque patulis; Pedicellis brevissimis; Spiculis linealibus, obovatis, submucronulatis, pubescentibus; Gluma inferiore flosculis 3 — 4-plo breviori, 3-, superiore 5-nervi; Hermaphrodito mucronato, rugoso; Foliis e basi cordata lanceolatis, glabris.

V. sp. Nepal.

Culmus (abscissus) sesquipedalis, cum ramo axillari florifero. *Vaginae* superne tenui-tuberculosae. *Folia* lineas 6 — 7 lata, 4-pollicaria, cum panicula s. juba 4-pollicari e pallide viridi flaventia. *Racemi* circiter 10. *Racemuli* 4 — 6-lineales, in racemis superioribus breviores. *Spiculae* geminae: altera subsessilis, altera brevi-pedicellata: pedicellis plerumque pilos satis longos emitentibus. *Flosc. neuter* bivalvis: valv. inf. 5-nervis.

Panicum simplex Rottl. Radiis subracemiformibus, paulo superius parce compositis (paucifloris), alternis, radiolisque contractis; Pedicellis spicula plerumque paulo longioribus; Spiculis subsesquilinealibus, ovalibus, acutis, glabris; Gluma inferiore flosculis dimidio aut paulo magis breviori, 5-, superiore

11-nervi; Hermaphroditò (neutro paulo minore) acuto, laevi; Foliis angusto-lanceolato-linearibus, glabris.

Panicum simplex. Trin. Diss. II. p. 216. — Sub *P. attenuato* N. ab Es. Agr. bras. p. 174.

V. spp. Ind. or.

Culmus ultrapedalis, debilis, simplex, compressus. *Ligula* ciliaris. *Vaginae* cum *Foliis*, linea parum latioribus, 5-pollicaribus, glabrae. *Panicula* sublineari-contracta, e *radiis* 4 — 5 composita, albido-virens. *Spiculae* remotae.

Flosc. neuter 2-valvis: valv. inf. 7 — 9-nervis.

Oas. Simillimum sequenti et *P. depauperato*. — A *P. attenuato* diversum panicula depauperata, hermaphroditò neutro paulo minori, pedicellis longioribus, spiculis majoribus et patria.

Panicum diffusum Sw. Radiis subracemiformibus, superius parce compositis (subpaucifloris) alternis, patentibus; Radiolis contractis; Pedicellis spiculam aequantibus l. eadem longioribus; Spiculis linealibus, ovalibus ovatisve, acutis, glabris; Gluma inferiore flosculis dimidio breviori, 5-, superiore 11 — 13-nervi; Hermaphroditò (neutro paulo minore) acutiusculo, laevi; Foliis linearibus, glabris.

Panicum diffusum. R. et S. II. p. 441. Trin. ic. gr. XXII. tab. 263. N. ab Es. Agr. bras. p. 172. (neque *P. debile* Poir. nec *P. divaricatum* Mchx., sub quo nom. mis. b. Sprengel, huc referenda videntur).

V. spp. Ind. occ.

Simillimum *P. simplici* differt nodis inferioribus barbatis; culmo tereti, subfiliformi, ramoso: ramis (interdum fasciculatis) plerumque elongatis, floriferis; Spiculis minoribus, non adeo, ac in illo, remotis. *Flosc.* neut. bivalvis: valv. inf. 9-nervis.

Panicum Petiverii. Radiis aut subracemosis et simpliciusculis; aut subvirgatis et a basi compositis, alternis jubatisve, patentibus; Pedicellis spicula brevioribus; Spiculis linealibus, ovalibus, pl. min. acutis, pubescentibus; Gluma inferiore flosculis duplo breviori, 3-, superiore 5 — 7-nervi; Hermaphro-

dito minute mucronulato, ruguloso; Foliis linear-lanceolatis, pubescentibus glabrisve.

Panicum Petiverii Trin. Diss. II. p. 144. Ic. gr. XV. tab. 176. N. ab Es. Agr. bras. p. 111.

V. spp. Ind. or.

Culmus decumbens, spithameus — sesquipedalis, ramosus, cum *Vaginis* inferioribus saepe pubescens. *Ligula* ciliaris. *Folia* lineas 1 — 3 lata, 1 — 5-pollicaria. *Radii* dissitiusculi, 1 — 2-pollicares. *Spiculae* laxae. *Flosc. neut.* 2-valvis: valv. inf. 5 — 7-nervis.

Panicum megastachyum N. ab Es. Radiis subracemiformi-virgatis, plerumque a basi compositis (dissitifloris), subpaniculatis radiolisque patentibus patentissimisve; Pedicellis spicula brevioribus (cum axi radiisque pubescentibus); Spiculis sub-bilinealibus, ovalibus, acutiusculis; glabris; Gluma inferiore flosculis duplo breviori, 3-, superiore 5-nervi; Hermaphrodito acuto, punctulato; Foliis lanceolato-linearibus, glabris.

Panicum megastachyum N. ab Es! Agr. bras. p. 154. Trin. Diss. II. p. 205.

Ic. gr. XX. tab. 234.

V. spp. Bras.

Totum gilvum. *Culmus* 6 — 8-pedalis, erectus, florifero-ramosus. *Vagineae* glabrae. *Ligula* ciliaris. *Folia* lineas 3 — 6 lata, dodrantalia et breviora. *Paniculae* ultrapedales, lucidissimae. *Gluma* superior flosculis interdum paulo brevior. *Flosc. masc.* 2-valvis: valv. inf. 5-nervis.

† *Panicum Urvilleanum* Kth. Radiis subvirgatis, superne compositis, subpaniculatis, radiolisque patentibus; Pedicellis spicula brevioribus eamve aequantibus; Spiculis sub- 3-linealibus, ovalibus, acutis, sericeo-pubescentibus; Gluma inferiore flosculis duplo breviori, 7-, superiore 15-nervi; Hermaphrodito (masculo minore) acutiusculo, marginibus inferne ciliato; Foliis angusto-linearibus, pilosis.

* *Panicum Urvilleanum Kth.* rev. gr. tab. 115. Agr. syn. p. 99.

Chile.

Totum sericeo- et strigiloso-pubescent. *Culmus* cum panicula circiter sesquipedalis, inferne ramosus. *Ligula* dense ciliaris. *Folia* rigida, lineam lata, dodrantalia. *Panicula* majorem culmi partem oecupans, pedalis, lucidissima. *Radii* inferiores solitarii, superiores terni. *Flosc. masc.* bivalvis: valv. inf. 11-nervi.

† *Panicum subalbidum Kth.* Radiis virgatis, paulo superius compositis, jubatis, patentibus; Radiolis contractis; Pedicellis spiculam pl. min. aequantibus; Spiculis linealibus, ovalibus, acutiusculis, glabris; Gluma inferiore flosculis triplo breviori, sub-1, superiore 7-nervi; Hermaphrodito (neutro parum minore) acutiusculo, laevi; Foliis latiusculo-linearibus, glabris.

Panicum subalbidum Kth. rev. gr. tab. 112. Agr. syn. p. 101.

Senegal.

Culmus elatus, ramosus. *Vaginae* glabrae. *Ligula* brevis, membranacea, ciliolata. *Folia* linea 5 lata, dodrantalia. *Juba* lucida, dodratalis. *Radii* solitarii binive. *Flosculus neuter* 1-valvis, 9-nervis.

Panicum lasianthum. Radiis virgatis, superius compositis, jubatis, patentibus; Radiolis patulis; Pedicellis variae longitudinis (spiculam plerumque aequantibus); Spiculis linealibus, oblongo-obovatis, pl. min. obtusis, tuberculato-hirtulis; Gluma inferiore flosculis fere duplo breviori, 1-, superiore (iisdem parum minori) 3-nervi; Hermaphrodito acuto, tenerrime ruguloso; Foliis e basi compressa et subamplexicauli lanceolatis, glabris l. minutissime pubescentibus.

Panicum lasianthum Trin. ic. gr. XXI. tab. 245.

V. spp. Bras.

Culmus (basi decumbens?) pl. min. 2-pedalis, sub lente minute pubescens.

Vaginae teretes, ad fissurae margines dense et brevicipiliatae, ad collum extus barbulatae. *Ligula* obsolete ciliaris. *Folia* (expansa) circiter pollicem dimi-

dium lata, pollices 2 aut fere 3 longa. *Juba* spithamea — dodrantalis, lucida. *Radii* strictiusculi. *Radioli* laxiflori. *Gluma* inferior haud raro dimidiata spiculam subexcedit. *Flosculus* neuter 2-valvis: valvula inferior 3-nervis. — *Habitus Panici rugulosi.*

OBS. Maxima affinitas *Pan. lasianthi* cum *P. puberulō* et *Sellowii* (qu. v. infra in subdivis. b.); differt ab his iuba multo majori, spiculis majoribus, nervorum in glumis numero; a *puberulo* praesertim gluma inferiore dimidia spicula vix manifeste longiori.

Panicum latifolium L. sp. pl. ed. 1. Radiis interdum subvirgatis, sere a basi compositis, paniculatis, radiolisque aut contractiusculis aut patentibus divaricatis; Pedicellis spiculam aequantibus aut eadem paulo longioribus; Spiculis ultralinealibus, oblongis, obtusis (turgidis) ad palearum apices pl. min. barbulatis; Gluma inferiore flosculis subtriplo duplove breviori 3 — 7 (— 9—), superiore 7 — 9-nervi; Hermaphrodito obtuso, apice pl. min. barbulato; Foliis lanceolatis, glabris l. minute pubescentibus.

Panicum latifolium. R. et S. II. p. 440. Trin. Diss. II. p. 207. — *P. maculatum* Aubl. Schult. Mant. 2. p. 238. — *P. glutinosum* Meyer Esseq. Schult. Mant. 2. p. 248.

* humilius, foliis angustioribus:

Panicum glutinosum Lam. R. et S. II. p. 454.

β. Ramis culmi radiisque paniculae divaricatis:

Panicum divaricatum Lam. (an *L.?*) Hb. et Kth. 1. p. 101. Kth. Agr. syn. p. 120. V. spp. Ind. occ. Guian. Bras.

Culmus 2 — 10-pedalis, ramosus et ramosissimus, saepe lignescens. *Vaginae* nunc glabrae, nunc pl. min. pubescentes, collo extus barbatae (ob quam notam et ob Sloanei iconem optimam de LINNAEI planta dubium nullum). *Ligula* membranacea, interdum ciliatula. *Folia* lineas 3 — 10 lata, digitalia — spithamea. *Radii* solitarii l. aliquot subverticillati. *Spiculae* interdum nutantes. *Flosc. masc.* rarius neut. 2-valvis: valvula inferior 7-nervis: nervis saepissime obsoletis.

OBS. Huc quoque *Pan. ruscifolium* Hb. et Kth. Kth. Agr. syn. p. 121.

Panicum anceps Mchx. Radiis virgatis, a basi compositis, paniculato-jubatis, patulis; Radiolis plerumque contractiusculis; Pedicellis spicula brevioribus; Spiculis subultralinealibus, subarcuato-ovato-lanceolatis, acuminatis, glabris; Gluma inferiore flosculis plus duplo breviori, 3-, superiore (eosdem subexcedente) 7-nervi; Hermaphrodito (neutro $\frac{1}{2}$ minori) obtuso, apice brevissime barbulato, laevi; Foliis (latiusculo-) linearibus, glabris.

Panicum anceps. R. et S. II. p. 444. Mant. 2. p. 241. Kth. Agr. syn. p. 114. — *P. rostratum* Mühlenb. — an *P. pennsylvanicum* Sprgl.
V. spp. Am. bor.

Culmus 3 — 4-pedalis, compressus, simplex. *Vaginae* praesertim superne pilosulae. *Folia* latiora lineas 5 lata, fere 2-pedalia, supremum saépe paniculam subaequans l. excedens. *Panicula* dodrantalis — pedalis. *Radii* solitarii vel aliquot conferti, 3 — 4-pollicares. *Racemuli* semi — sub- 1-pollicares. *Spiculae* pallide virides. *Flosculi* neuter 2-valvis.

Panicum rivulare. Radiis racemoso-virgatis, (exceptis infimis) a basi compositis, paniculato-jubatis, racemulisque contractis; Pedicellis brevissimis; Spiculis sublinealibus, lineari-ellipticis, obtusiusculis, glabris; Gluma inferiore flosculis duplo breviori, 3-, superiore (iisdem paulo minori) 3 — 5-nervi; Hermaphrodito acutiusculo, apice subbarbulato, laevi; Foliis linearibus, glabris (longissimis).

Panicum rivulare Trin. Diss. II. p. 213. Ic. gr. XXII. tab. 264. N. ab Es. Agr. bras. p. 181.

V. spp. Bras.

Culmus 4 — 6-pedalis, simplex. *Vaginae* glabrae. *Folia* herbacea vel subcoriacea: illa plana, lineas 5 lata; haec compresso-concava et multo angustiora; inferiora interdum 3 — 4-pedalia. *Juba panicularis* 1 — 2-pedalis, fuscescendo-virens, satis densa. *Racemi* solitarii l. aliquot pseudoverticillati. *Racemuli* semi — 1-pollicares. *Flosc. neut.* 1 — 2-valvis.

Panicum grumosum N. ab Es. Radiis racemiformi-virgatis, a basi compositis (interdum decompositis), paniculato-jubatis, racemulisque patulis l. patentibus; Pedicellis brevissimis; Spiculis linealibus, ovato-ellipticis, obtusiusculis, glabris; Gluma inferiore flosculis triplo duplove breviori, 3-, superiore 5-nervi; Hermaphrodito acutiusculo, laevi; Foliis attenuato- (latiusculo-) linearibus, glabris.

Panicum grumosum N. ab Es. Agr. bras. p. 182. Trin. ic. gr. XVIII. t. 207.
V. spp. Bras.

Culmus 3 — 4-pedalis, simplex l. superne ramosus. *Vaginae* glabrae. *Folia* satis firma, longe attenuato-acuminata, lineas 4 — 7 lata, culmea inferiora pedalia. *Panicula* spithamea — pedalis. *Racemuli* semi — 1-pollicares. *Spiculae* pallentes l. ex amethystino fuscescentes. *Glumae* carinatae, nervis angulatis. *Flosculus* neuter 2-valvis. *Hermaphr.* lineari-ellipticus.

Panicum auritum Presl. Radiis subracemiformi-virgatis, a basi compositis (decompositisque) alternis, patulis; Racemulis contractis; Pedicellis spicula brevioribus l. eandem aequantibus; Spiculis linealibus, elliptico-lanceolatis, acutis, glabris; Gluma inferiore flosculis plus dimidio breviori, 1 — 3-, superiore 3-nervi; Hermaphrodito acuto, mucronulato, laevi; Foliis (latiusculo-) linearibus, glabris.

Panicum auritum Presl! rel. Haenk. L. p. 305. Kth. Agr. syn. p. 115.
V. spp. Luzon.

Culmus 2 — 3-pedalis. *Vaginae* glabrae. *Folia* basi auriculata subamplexicaulia, lineas 3 — 6 lata, dodrantalia. *Juba* spithamea — pedalis. *Radii* solitarii l. subbini, inferiores in juba majori valde remoti. *Racemuli* (inferiores, saepe compositi) subpollicares. *Spiculae* fusco-virides. *Flosc. neuter.* 1 — 2-valvis.

Panicum polygonatum Schrad. Radiis subracemiformi-virgatis, (plerumque pilis adspersis), a basi compositis decompositisque, subjubato-paniculatis, patentibus; Radiolis patulis; Pedicellis brevissimis; Spiculis parvis l. subminimis,

ovalibus, acutis, glabris; Gluma inferiore flosculis duplo magisve breviori, 1 — 3-, superiore 5-nervi; Hermaphrodito acutiusculo, laevi (apice scabriusculo); Foliis e basi ovata lanceolatis, pilis adspersis.

Panicum polygonatum. Schult. Mant. 2. p. 256. N. ab Es. Agr. bras. p. 185.

Kth. Agr. syn. p. 96.

V. spp. Guian. Bras. Peruv.

Culmus 1 — 3-pedalis, basi repens, ramosus, nodis pl. min. barbatis. *Vaginae* superne hirsutiusculae vel brevi-ciliatae. *Folia* firma, lineas 4 — 5-lata, palmariæ — spithamea, basi ovata potius quam cordata. *Panicula* palmaris — dodrantalis. *Axes partiales* pilis longiusculis adspersi, rarius nudi, 1 — 3-pollicares. *Flosc. neut.* l. *masc.* 1 — 2-valvis. *Hermaphr.* flosculo incompleto saepissime paulo brevior.

OBS. A *Pan. piloso*, cuius mera varietas videtur et cum quo promiscue legit in Brasilia cl. RIEDEL, reapse solis differt racemulis (multo) longioribus. — A sequente *P. potamio* distinguitur panicula saturate viridi (nec flavente), racemis racemulisque minus patentibus, ciliis vaginarum brevioribus et rarioribus, foliis denique duplo longioribus.

Panicum potarium. Radiis racemoso-subvirgatis, (plerumque pilis adspersis) a basi compositis decompositisque, sub-paniculatis, cum racemulis (in flore) patentissimis; Pedicellis brevissimis; Spiculis minimis, ovalibus, obtusiusculis, glabris; Gluma inferiore flosculis duplo breviori, 3-, superiore 5-nervi; Hermaphrodito acuto, laevi; Foliis e basi amplexicauli-cordata lanceolatis, glabris.

Panicum potarium Trin. Diss. II. p. 239.

V. spp. Bras.

Culmus 1 — sesqui-pedalis, inferne decumbens et radicans, ramosus, nodis barbatis. *Vaginae* superne dense et subpectinato-ciliatae. *Folia* inferiora plana, lineas 3 lata, sesquipollucaria; culmea superiora compressa et in hoc statu lineas 2 lata, bipollucaria. *Panicula* l. *Juba digitalis* — spithamea. *Axes partiales* solitarii l. aliquot conserti, plerumque pilis tenuissimis et lon-

giusculis adspersi, 2 — 3-pollicares. *Racemuli* semi — 1-pollicares, valde laxiflori, racemulis secundariis etiam pl. min. patentibus. *Flosculus* neuter 2-valvis.

Obs. Hanc speciem (olim *P. hydrophilum* mibi dictam) amiciss. N. AB Es. in *Agr. bras.* p. 208. refert ad *Pan. dubium* Lam., gramen Indiae orientalis, vel ob *glumas aequales* solas a nostro alienum. Qua vero nota excepta, reliqua illustris Agrostogr. bras. auctoris descriptio exakte ad plantam nostram exhibita videtur.

***Panicum agrostoides* Mühlenb.** Radiis racemoso-subvirgatis, plerumque a basi decompositis, alternis paniculatisque cum racemulis primariis pl. min. patentibus, secundariis contractiusculis; Pedicellis brevissimis brevibusque; Spiculis linea brevioribus, ovalibus, acutis, glabris; Gluma inferiore flosculis dimidio breviori, 3-, superiore 5-nervi; Hermaphrodito obtuso, apice barbulato, laevi; Foliis (sublanceolato-) linearibus, glabris.

Panicum agrostoides. R. et S. II. p. 456. Mant. 2. p. 250. Trin. ic. gr. XXII. tab. 261. — *P. agrostidiforme* Lam. Kth. Agr. syn. p. 94.
V. spp. Am. bor.

Culmus pl. min. 2-pedalis, compressus, erecto- et florifero-ramosus. *Vaginae* glabrae. *Folia* lineas pl. min. 2 lata, inferiora dodrantalia. *Panicula* (terminalis) sesquipalmaris — spithamea, pyramidata. *Radius* 3 — 4-pollicares, solitarii binive. *Racemuli* fere pollicares. *Spiculae* purpurascentes. *Flosc.* neuter 2-valvis. *Hermaphr.* neutro paulo brevior.

***Panicum proliferum* Lam.** Radiis racemoso-subvirgatis, a basi decompositis, paniculato-jubatis, demum cum radiolis primariis patentissimis, tertiaris semper contractis; Pedicellis spiculam plerumque subaequantibus; Spiculis linearibus (l. paulo minoribus), lanceolato-ovalibus, acutis, glabris; Gluma inferiore flosculis triplo quadruplove breviori, subnervi, superiore 3 — 5-nervi; Hermaphrodito (neutro paulo minori) acuto, laevi; Foliis (plerumque lato-) linearibus, glabris.

Panicum proliferum. R. et S. II. p. 431. Mant. 2. p. 231. Kth. Agr. syn. p. 100. (excl. synn. Willd. et Icq.) — *P. miliaceum* Wall. — *P. dichotomiflorum* Mchx. — *P. geniculatum* Mühlb.

V. spp. Am. bor.

Culmus 1 — 2-pedalis, ramosus, ramis jubiferis. *Vaginae* compressiusculae, glabrae. *Ligula* ciliaris. *Folia* in minori planta lineas 2, in altiori et magis vegeta 5 — 10 lata, in illa vix digitum, in hac spithamam — pedem longa. *Jubae* ramorum serius explicatae, contractae. *Flosc. neut.* 1 — 2-valvis: valv. inf. 3-nervis.

Panicum paludosum Roxb. Radiis racemoso-virgatis, paulo superius decompositis, paniculato-jubatis radiolisque contractiusculis; Pedicellis spiculam subaequantibus l. eadem longioribus; Spiculis sesquilinealibus, ovato-lanceolatis, acuminatis, glabris; Gluma inferiore flosculis 5 — 6^{ies} breviori, enervi, superiore 7 — 9-nervi; Hermaphroditio (neutro § minori) acuto, laevi; Folii compressiusculo-linearibus, glabris.

Panicum paludosum. Schult. Mant. 2. p. 245. (excl. syn.) — *P. natans* Koen. Trin. Diss. II. p. 237.

V. spp. Ind. or.

Culmus 2 — 3-pedalis, ramosus, geniculatus, totus vaginatus. *Vaginae* compressae, glabrae. *Ligula* ciliaris. *Folia* in statu comppresso lineas 2 lata, dodrantalia et breviora, glaucescentia. *Panicula* pallida, dodratalis. *Radii* 3 — 4-pollicares; *Radioli* saepe pollicares et ultra. *Spiculae*, praesertim ju-niores, angustae. *Gluma* inferior rotundato-obtusa. *Flosc. neuter* 2-valvis: valv. inf. 7-nervis.

Panicum molinioides. Radiis racemoso-virgatis, a basi decompositis, paniculato-jubatis, patulis, Racemulis pl. min. contractis; Pedicellis aliis brevibus, aliis spicula longioribus; Spiculis minimis, oblongis, acutiusculis obtusiusculis, glabris; Gluma inferiore flosculis fere dimidio breviori, 3-, superiore 5-nervi;

Hermaphroditō obtusinsculo, laevi; Foliis e basi involuta linearibus, glabris (rigidissimis).

Panicum molinoides Trin. Diss. II. p. 238. N. ab Es. Agr. bras. p. 162.

V. spp. Bras.

Culmus 3 — 4-pedalis, strictus. *Vaginae* (in nostris speciminiibus) nitido-glaberrimae, colore aeneo. *Ligula* nil nisi linea transversalis. *Folia* inferne involuta, dehinc plana, lineas 4 — 6 lata, sesqui — 2-pedalia. *Panicula* pedalis, purpureo-fusca. *Radius* spithamei — dodrantales. *Radioli* 1 — 3-pollicares. *Flosc. masc.* 2-valvis.

Panicum maximum Jacq. Radiis virgatis plerumque superius decompositis, paniculatis jubatisve, pl. min. patentibus, Radiolis contractiusculis; Pedicellis brevibus spiculamve aequantibus; Spiculis subsesquilinealibus, ellipticis, acutiusculis, glabris; Gluma inferiore flosculis triplo magisve breviori, e- vel obsolete 3-, superiore (tenui-) 5-nervi; Hermaphroditō acuto, ruguloso; Foliis sublanceolato-linearibus, glabriusculis.

Panicum maximum. R. et S. II. p. 437. — *Pan. polygamum* Sw. — *Pan. jumentorum* Pers. Kth. Agr. syn. p. 101. — *Pan. laeve* LaM. (nodi culmi glabris).

V. spp. Ind. occ. et or. Bras. Mascar.

β. Radice tuberosa, foliis angustioribus, rugis hermaphroditi tenuioribus:

Panicum gonigylodes Ht. Vienn! Icq. Eccl. tab. 21. — Sub *Pan. prolifero*. Kth. l. l. p. 100. — *Pan. altissimum* Brouss. Kth. l. l. p. 103.

Culmus 2 — 5-pedalis, nodis plerumque barbatis. *Folia* lineas 4 — 6 — 10, in β 2 — 3 lata, sesquipedalia. *Radius* strictiusculi, satis tenues. *Pedicelli* saepe pilo uno alterove aucti. *Flosc. masc.* 2-valvis: valv. inf. 3 — 5 — 7-nervi: nervis tenuibus.

Panicum eburneum. Radiis subvirgatis, a basi (de-) compositis, jubatis paniculatisve Radiolisque patulis; Pedicellis spiculam pl. min. aequantibus; Spiculis subultra'linealibus, ovali-ellipticis, mucronulato-acutis, glabris; Gluma

inferiore flosculis triplo breviori, subobsolete 3-, superiore 7-nervi; Hermaprodito (neutro paulo minori) mucronulato, laevi (tenuissime striato); Foliis linearibus, glabris.

V. sp. Nepal.

Culmus videtur 2-pedalis et altior, ramosus. *Vaginae* glabrae. *Folia* basi amplexicaulia, lineas 4 lata, pedalia et ultra, supremum paniculam aequans. *Panicula* spithamea, multiflora. *Spiculae* e viridi et fusco-purpureo variae, deciduae. *Flosc. neut.* 2-valvis: valv. inf. 7-nervis. *Hermaphr.* eburneus.

Panicum chloroticum N. ab Es. Radiis racemoso-virgatis, plerumque a basi decompositis, jubato-paniculatis, patulis, Radiolis tertiaris contractis; Pedicellis spicula brevioribus vel eandem aequantibus; Spiculis pl. min. linealibus (interdum linea sublongioribus), ovalibus, acutis, glabris; Gluma inferiore flosculis quadruplo breviori, obsolete 1 — 3-, superiore 7 — 9-nervi; Hermaprodito (neutro paulo minori) mucronato, laevi; Foliis sub lanceolato-linearibus, glabris basive pilosis.

Panicum chloroticum N. ab Es! Agr. bras. p. 164. Trin. Diss. II. p. 236.

α , agreste *N. ab Es*: Panicula densiori, spiculis linealibus, foliis latioribus, basi pilosis.

β , *sylvestre N. ab Es*: Panicula lucidiori, spiculis pl. min. ultralinealibus, foliis angustioribus, glabris.

Sub *Setaria brachiatia Kth.* Agr. syn. p. 155.

γ , *pingue N. ab Es*: multiflorum, spiculis minoribus.

V. spp. Bras.

Culmus ultrapedalis, ramosus. *Vaginae* compressae, glabrae. *Ligula* ciliaris. *Folia* basi compressa, in α lineas 4 — 5, in β 2 lata; pl. min. semi-pedalia. *Juba* sesquipalmaris. *Spiculae* virides. *Gluma* inferior subrotundata. *Flosc. neut.* 2-valvis: valv. inf. 5 — 7-nervis.

Panicum arenarium Brot. Radiis virgatis, paulo superius decompositis, sub paniculatis, patulis, Radiolis plerumque pl. min. contractis; Pedicellis brevibus;

Spiculis linealibus, ovalibus, acutis, glabris; Gluma inferiore flosculis subquadruplo breviori, enervi, superiore 7-nervi; Hermaphrodito (neutro paulo minori) acuto, laevi; Foliis angusto-linearibus, glabris (rigidis).

Panicum repens Trin. Diss. II. p. 233. (an *L?*) Kth. Agr. syn. p. 103.

V. spp. Monsp. Sic. Cors. Cret. Aeg. Ting. Teneriff. Mader.

Culmus sesqui — bi-pedalis, basi repens et emittens stolones ramosque foliorum brevium, sensim longiorum, planiuscotorum, patentium, inferne, ut vaginæ, pilosorum. *Ligula* ciliaris. *Folia* culmea non nisi ipsa basi pilosula: longiora, subinvoluto-compressa, erecta et subadpressa. *Panicula* palmaris — spithamea, plerumque parum aperta. *Spiculae* glaucescentes. *Gluma* inferior obtusa. *Flosculus* neuter 2-valvis: valv. inf. 7-nervis.

Panicum coloratum L. Mant. 1. Radiis subvirgatis (filiformibus), plerumque paulo superius decompositis, paniculatis, patentibus vel cum radiolis patulis tantum; Pedicellis brevibus l. spiculam aequantibus; Spiculis subultralinealibus, ovalibus, acutis, glabris; Gluma inferiore flosculis triplo breviori, 1 — 3 — 5-, superiore 7-nervi; Hermaphrodito acutusculo, laevi; Foliis linearibus, subglabris, (Vaginis teretibus).

Panicum coloratum. R. et S. II. p. 431. Kth. Agr. syn. p. 104. (excl. syn. Mühlens.)

V. spp. Aeg. sup. et cc.

Culmus 1 — 2-pedalis, basi geniculato-procumbens, ex ipsa radice ramosus. *Vaginae* (in planta spontanea) glandulis adspersae, pilosulae. *Ligula* ciliaris. *Folia* inferne pilis adspersa, lineas 2 — 3 lata, sesquipalmaria l. subspithamea. *Paniculae* subspithameæ *radii* solitarii binive, filiformes sed angulati, laxiusculi, radiolis brevibus. *Flosc. masc.* 2-valvis: valv. inf. 7-nervis.

Diffr. a sequente culmo sub panicula multo longius libero, spiculis turgidioribus, coloratis, nervis paucioribus notatis, foliis acuminatissimis (nec acutis tantum), vaginis teretibus.

Panicum attenuatum Willd. Radiis virgatis, plerumque a basi decompositis, paniculato-jubatis, patulis, Radiolis secundariis contractis; Pedicellis brevibus vel spiculam aequantibus; Spiculis linealibus, ovalibus, acutis, glabris; Gluma inferiore flosculis triplo vel fere dimidio breviori, 1 (— 3-), superiore 9 — 11 — 13-nervi; Hermaphrodito acuto, laevi; Foliis sublanceolato-linearibus, glabris (Vaginis compressis).

Panicum attenuatum. R. et S. II. p. 434. Trin. Diss. II. p. 226. Icq. Eccl. t. 33.

V. spp. Guian. et cc. •

Culmus bipedalis, (in culta planta?) ramosus: ramis jubiferis. *Vaginae* glabrae. *Ligula* ciliaris. *Folia* lineas 2 — 4 lata, pl. min. spithamea. *Juba* subspithamea. *Radii* strictiusculi. *Flosculus neuter* 2-valvis: valvula inferior 7 — 11-nervis.

OBS. A *Panico proliquo Lam.*, cum quo jungit cel. KUNTH, distinguitur gluma inferiore majori et hermaphrodito flosculum neutrum aequante. — A *Panico attenuato N. Es. Agr. bras.* p. 173. (*P. milieri Lam.*), Spiculis brevioribus, panicula densiori, non „subflaccida“ Lam. et patria.

Panicum junceum N. ab Es. Radiis virgatis, fere a basi decompositis, jubato-paniculatis, patulis, Radiolis contractiusculis; Pedicellis brevibus (apice barbatis); Spiculis linealibus, ovatis l. ovato-oblongis, acutiusculis l. subacuminatis, glabris; Gluma inferiore flosculis duplo breviori (vel ob cuspidem suam nonnihil longiori), 3 — 5-, superiore 5 — 7-nervi; Hermaphrodito acutiusculo, laevi; Foliis linearibus, glabris (rigidis).

Panicum junceum N. ab Es! Agr. bras. p. 159.

V. spp. Bras. •

Totum subcoriaceo-firmum. *Culmus* 3 — 5-pedalis, erecto-ramulosus. *Vaginae* hiantes, subinvolutae, glabrae. *Ligula* brevis, membranacea, ciliatula. *Folia* saepe involuta, plana lineas 3 et qu. exc. lata, spithamea — pedalia. *Panicula* spithamea — ultrapedalis, nunc strictiuscula, nunc superne nutans, pl. min. densa. *Radii* aliquot pseudoverticillati. *Radioli* 1 — 2-pollicares.

Glumae pl. min. cuspidato-acutae, interdum acuminatae. *Flosculus masculus*? bivalvis: valv. inf. 5 — 7-nervis.

Obs. *Panici virgati* varietati illi, cui gluma inferior dimidia spicula vix longior, quoad spiculas, perquam simile, ita, ut ejusdem varietas videri possit. Tamen *junceo* pedicelli apice constanter villis barbati, paleae minus acuminatae, et panicula densior. — *Panicum virgatum*, cum gluma ej. inferior plerumque spiculam dimidiad excedat, in sectione sequente recensebitur.

† *Panicum laetum Kth.* Radiis subvirgatis a basi decompositis, paniculatis Radiolisque patentibus; Pedicellis spicula longioribus; Spiculis ultralinealibus, ovalibus, acutis, glabris; Gluma inferiore flosculis dimidio breviori, 5 — sub- 7-, superiore 9-nervi; Hermaphrodito acutiusculo, laevi; Foliis sublanceolato-linearibus, subtus pubescenti-pilosulis.

Panicum laetum Kth. rev. gr. tab. 113. Agr. syn. p. 115.

Senegal.

Culmus sesquipedalis, procumbens, florifero-ramosus. *Vaginae* patentissimo-pilosae. *Ligula* ciliaris. *Folia* lineas $2\frac{1}{2}$ lata, pollices 3 — 5 longa. *Paniculae* plures, lucidae, 4 — 5-pollicares. *Radii* solitarii, vel aliquot pseudo-verticillati. *Radioli* 1 — sesqui-pollicares. *Flosculus neuter* 2-valvis; valv. inferior 9-nervis.

Panicum elephantipes N. ab Es. Radiis virgatis, plerumque a basi decompositis, paniculato-jubatis, Radiolisque patulis; Pedicellis spiculam aequantibus vel eadem paulo longioribus; Spiculis fere bilinealibus, ovali-lanceolatis, acuminatis, glabris; Gluma inferiore flosculis quadruplo breviori, 1-, superiore 5-nervi; Hermaphrodito (neutro parum minori) acuminato, laevi; Foliis lato-linearibus, glabris.

Panicum elephantipes N. ab Es! Agr. bras. p. 165. Trin. Diss. II. p. 206.

V. spp. Bras.

Culmus orgyalis, crassus, subsimplex. *Vaginae* teretes, glabrae. *Ligula* ciliaris. *Folia* fere pollicem lata, sesquipedalia. *Juba* sesquipedalis, densiuscula. *Flosc. masc.* 2-valvis; valv. inf. 7-nervis.

Panicum ligulare N. ab Es. Radiis subvirgatis, fere a basi decompositis (rari-floris), verticillatis, patentibus vel, cum Radiolis elongatis, patulis; Pedicellis spicula brevioribus l. eandem pl. min. aequantibus; Spiculis bilinealibus, ovali-lanceolatis, acuminatis, glabris; Glumis 5 — 7-nervibus: inferiore flosculis duplo breviori; Hermaphrodito (masculo $\frac{1}{2}$ minori) obtusiusculo, striatulo; Foliis (sublanceolato-) linearibus, glabris vel supra pubescentibus. (Ligula longa, acuminato-laciniata).

Panicum ligulare N. ab Es! Agr. bras. p. 196. — Sub *P. scaberrimo* Lag.
Kth. Agr. syn. p. 105.

V. sp. Bras.

Culmus ultra-tripedalis, simplex. *Vaginae* teretes, glabrae. *Ligula* 4-li-nealis, firma; bilaciniata. *Folia* patentia (imo reflexa), subcoriacea, lineas 2 lata, spithamea et longiora. *Panicula* ultrapedalis. *Radii* terni — quini, basi barbati. *Radioli* elongati (inferiores 5-pollicares), rariflori: inferiorum spiculae saepe abortientes. *Spiculae* purpurascentes, deciduae. *Flosc. masc.* 2-valvis: valv. inf. 7 — 9-nervis.

Panicum effusum Br. Radiis virgatis, inferioribus a basi-, superioribus superne decompositis, paniculatis Radiolisque patulis; Pedicellis variae longitudinis; Spiculis linea subbrevioribus, ovalibus, mucronato-subacuminatis, glabris; Gluma inferiore flosculis dimidio breviori, 3-, superiore 5 — 7-nervi; Hermaphrodito (neutro paulo minori) obtuso, laevi; Foliis linearibus, hirtis.

Panicum effusum. R. et S. II. p. 461. Trin. ic. gr. XXI. tab. 244.

V. spp. N. Holl.

Culmus (cum panicula) 2-pedalis, simplex, nodo praesertim infimo barbato. *Vaginae* teretes, e glandulis pusillis hirtae. *Ligula* ciliaris. *Folia* lineas 2 lata, spithamea aut longiora, firmula. *Panicula* pedalis et ultra, inferne sub-contracta. *Radiorum* (infimorum) radioli inferiores saepe flosculis abortientibus. *Flosc. neuter* 2-valvis: valv. inf. 5 — 7-nervis.

b) *Gluma inferiore dimidia spicula longiori.*

Panicum amarum Ell. Radiis racemiformibus, simpliciusculis, alternis, contractis; Pedicellis brevibus; Spiculis ultralinealibus, ovatis, acuminatis, glabris; Gluma inferiore flosculos subaequante l. iisdem paulo (ad $\frac{1}{2}$) breviori, 5 — 7-, superiore 7-nervi; Hermaphrodito obtusiusculo, laevi; Foliis attenuato-linearibus, glabris.

Panicum amarum. Schult. Mant. 2. p. 257.

V. spp. Am. bor.

Culmus sesquipedalis, totus vaginatus. *Vaginae* teretes, glabrae, margine ciliatulae, fauce barbulatae. *Folia* subcoriacea, glauca, aut tota aut margine tantum involuta, lineas 2 lata, dodrantalia: supremum racemos superans. *Juba* angustata, spithamea. *Racemi* 6 — 8, adpressi, solitarii l. subbini. *Gluma* superior flosculos paulo excedens.

Panicum latissimum Mik. Radiis racemiformibus, simpliciusculis, dense jubatis, contractiusculis, demum patentibus; Pedicellis brevissimis; Spiculis linealibus, ovalibus, acutiusculis obtusiusculisve, glabris l. pl. min. puberulis (pisulosulis hirtulisve); Gluma inferiore flosculis pl. min. tertiam partem (interdum minus) breviori, 5-, superiore 5 — 7-nervi; Hermaphrodito acuto, laevi; Foliis lato-lineari- vel (latissimo-) ovato-lanceolatis, glabris.

Panicum latissimum Mik! in Sprgl. n. Entd. II. p. 87. Trin. ic. gr. XVIII. tab. 208. N. ab Es. Agr. bras. p. 152. Kth. Agr. syn. p. 129.

Varietas foliis angustioribus, lato-lineari-lanceolatis:

Panicum secundum Trin. ic. gr. XXVII. tab. 324.

V. spp. Bras.

Culmus 3 — 5 pedalis. *Vaginae* teretiusculae, glabrae aut superne hirtulae. *Folia* amplexicaulia, nunc (in var. angustifolia) pl. min. pollicem, nunc pollices 3 lata: culmea ultrapedalia. *Juba* pedalis et longior, lanceolata, pl. min. densa. *Racemi* non nisi desflorati patentissimi. *Racemuli* 3 — 5-flori.

Spiculae nunc scabrae tantum, nunc pubescentes adspersae vel hinc inde pilosulae aut fere totae hirtulae. *Gluma* superior saepe flosculis nonnihil brevior. *Flosculus* *masculus* bivalvis.

Panicum unguiculatum. Radiis a basi interrupte compositis, subpaniculatis, Radiolisque (brevibus) patulis; Pedicellis spicula brevioribus vel eam subaequantibus; Spiculis bilinealibus, ellipticis, obtusiusculis, glabris; Glumis 5-nervibus: inferiore flosculis circiter quartam partem breviori; Hermaphrodito subadunco-obtusiusculo, laevi; Foliis compresso-linearibus, glabris (firmis).

V. sp. Cap. b. sp.

Culmus videtur 2-pedalis, subsimplex, ad nodos puberulus. *Vaginae* teretes, glabrae, sulcato-striatae, superiores ad margines tenui-villosulae. *Ligula* vix ulla. *Folia* erecta, in statu compresso lineam et qu. exc. lata, dodrantalia. *Panicula* (in specimine nostro superne deflecta) videtur ultrapalmaris, lucidula. *Radii* solitarii binique. *Radioli* 2 — 3-flori. *Spiculae* deciduae, e viridi-albo et atropurpureo variae: omnes apice macula atropurpurea quasi unguiculatae. *Flosc. masc.* 2-valvis: valv. inf. sub- 7-nervis. *Hermaphr.* apice interne tenuissime barbulatus.

Panicum leptocaulon: Radiis a basi parce compositis, subpaniculato-alternis, patulis; Radiolis contractis; Pedicellis spicula brevioribus l. eam subaequantibus; Spiculis bilinealibus, ovatis, acutis, glabris; Gluma inferiore flosculis quartam tertiamve partem breviori, 5-, superiore 7-nervi; Hermaphrodito acuto, laevi; Foliis e basi cordato-amplexicauli sublanceolato-linearibus, glabris.

V. sp. Afric. oriental.

Culmus sesquipedalis, obliquus l. decumbens? tenuis, ad nodos puberulus, ramosus: ramis elongatis, contractiusculis, strictis, in specimine nostro subfastigiatis, floriferis. *Vaginae* teretes, glabrae, sauce tenui-villosulae. *Ligula* brevissima, membranacea, ciliolata. *Folia* patentia, plana, lineas 2 — 3 lata, pl. min. palmaria. *Paniculae* subpauciflorae, pl. min. 3-pollicares, pallide

virides. *Radius* tenues, flexuosuli, strictiusculi. *Radioli* inferiores 6 — 9-linnae et 4 — 5-flori, superiores sub- 1-flori. *Flosc. neut.* vel *masc.*? bivalvis: valv. inf. 7-nervis. *Hermaphr.* apice tenuissime barbulatus.

Panicum tenellum Lam. Radiis (tenuissimis) simpliciusculis vel a basi parce compositis, alternis, patentibus, Radiolis patulis; Pedicellis spiculam aequantibus vel eadem paulo longioribus; Spiculis minimis, ovalibus, obtusiusculis, glabris; Glumis sub- 5-nervibus, flosculos aequantibus: superiore caduca; Hermaphrodito acuto, laevi; Foliis angusto- lanceolato-linearibus, glabris (brevibus).

Panicum tenellum. R. et S. II. p. 436. N. ab Es. Agr. bras. p. 225. (vix Sprengelii syn. alterum).

V. spp. Ind. occ.

Culmus semi — 1-pedalis, tenuis (prostratus?), florifero-ramulosus. *Vaginae* internodio multo breviores, glabrae. *Ligula* brevis, membranacea. *Folia* subdistiche alterna, lineam lata, pl. min. pollicaria. *Paniculae* 1 — sesquipollicares, tenerae, pauciflorae. *Gluma* (in speciminibus a me visis semper superiore, plerumque una cum hermaphrodito) delapsa, spiculae hiant.

Panicum zizanioides Hb. et Kth. Radiis subvirgatis, a basi compositis simpliciusculisve, alternis Radiolisque patentibus, hisve contractiusculis; Pedicellis brevissimis 1. brevibus; Spiculis ultrabilinealibus (turgidis) ovalibus, pl. min. acutis, glabris; Gluma inferiore flosculis tertiam quartamve partem breviori, 3 — sub- 5-, superiore 5-nervi; Hermaphrodito aciculato, laevi; Foliis e basi cordata lanceolatis, glabris basive ciliatis.

Panicum zizanioides. R. et S. II. p. 440. N. ab Es. Agr. bras. p. 143. Kth. rev. gr. tab. 28. Agr. syn. p. 118.

V. spp. Jam. Guian. Bras.

Culmus 2 — 5-pedalis; basi repens, patulo-ramosus. *Vaginae* teretes, ciliatae et superne saepe hirsutulae. *Ligula* brevissima, membranacea. *Folia* in majori planta pollicem $1\frac{1}{2}$, in minori lineas 8 — 10 lata, 4 — 7-pollicaria,

(etiam compressa occurunt, et in hoc statu vix lineas 2 lata, pollices 2 — 3 longa). *Panicula* spithamea — pedalis, lucida. *Radii* solitarii, remoti. *Radioli* nunc brevissimi, plerumque biflori, nunc longiores (sere sesquipolligares), pluriflori. *Nervi* palearum tenues. *Flosc. neut.* 2-valvis: valv. inf. sub- 5-nervis. *Cuspis* hermaphroditi suberistata.

Panicum ovuliferum. Radiis virgatis, plerumque a basi parce compositis, subpaniculatis Radiolisque patentibus, hisve contractiusculis; Pedicellis spiculam subaequantibus vel eadem longioribus; Spiculis ultralinealibus, obovato-ellipticis, pl. min. obtusis (vix acutiusculis), glabris; Gluma inferiore flosculis circiter tertiam partem breviori, 3-, superiore 7-nervi; Hermaphrodito obtuso (interdum mucronulato), laevi; Foliis lanceolatis pl. min. pilosulis, (Vaginis hirsutis hirsutissimisque).

Panicum ovuliferum Trin. Diss. II. p. 191. Ic. gr. XIX. tab. 222. N. ab Es.: Agr. bras. p. 218.
V. spp. Bras.

Culmus 3-pedalis, (florifero-) ramulosus. *Vaginae* e glandulis pusillis hirsutae. *Ligula* brevissima, membranacea. *Folia* lineas 3 — 6 lata, 2-pollicaria — ultra-digitalia. *Panicula* palmaris — dodrantalis, axi glabro l. 'pl. min. hirsuto. *Radii* 2 — 5ⁿⁱ, fasciculati. *Radioli* pauciflori. *Flosc. neuter* 1 — 2-valvis, 7-nervis.

Panicum puberulum. Radiis subvirgatis, superne compositis, subpaniculatis, patulis patentibusve, Radiolis (brevibus) contractis; Pedicellis brevissimis; Spiculis linea brevioribus (parvis), obovatibus, submucronulatis, tuberculato-pubescentibus; Gluma inferiore dimidia spicula longiori, 3-, superiore (flosculis saepe parum minori) 5-nervi; Hermaphrodito mucronulato, laeviusculo; Foliis lanceolatis, pubescentibus glabriusculisve.

an *Panicum Sellowii* N. ab Es. Agr. Bras. p. 153.?

V. spp. Bras.

Culmus sesqui — 2-pedalis, obliquus, ramosus. *Folia* lineas 3 — 5 lata, 2 — 3-pollicaria, plerumque cum *Vaginis* pubescentia. *Panicula* pl. min. palmaris. *Radii* solitarii binive, ad medium usque nudi. *Radioli* inferiores lineas circiter 3 longi. *Flosc. neut.* 2-valvis. *Hermaphr.* gilvescens aut fuscus, sub lente obsolete rugulosus.

Obs. Gramen Neesianum, a cl. Sellowio in Bras. merid. lectum mecumque ab am. Chamissoe benevole communicatum Spiculas obtusas et magis ellipticas (nec submucronulatas et obovatas), pedicellis ipsas aequantibus (nec brevissimis) incidentes, glumam inferiorem flosculis dimidio breviorem (nec dimidia spicula longiorem), paniculam denique vagina supremam inferne involucratam (nec longe exsertam et liberam) habet. Ceterum spiculae parvae, tuberculato-pubescentes, radioli breves contracti, radii inferne anauthi, folia etc. convenient.

Panicum discolor. Radiis virgatis, inferioribus superius sub-decompositis, jubato-paniculatis, patentibus patulisve, Radiolis contractiuseulis; Pedicellis spiculam aequantibus vel eadem longioribus; Spiculis subultralinealibus, ovalibus, obtusiusculis, glabris (apice minute barbulatis); Gluma inferiore flosculis paulo (parum) breviori, 3-, superiore 5-nervi; Hermaphroditto submucronulato, minutissime punctulato; Foliis lanceolatis, glabris, subiuss pruinoso-glaucis.

Panicum penicillatum Trin. Diss. II. p. 196. — *P. discolor* Trin. ic. gr. XX. tab. 231. N. ab Es. Agr. bras. p. 194. Kth. Agr. syn. p. 101. — *P. phragmites* N. ab Es. Agr. bras. p. 190. (fide speciminis Sellowiani ex herb. Reg. Berol.)

Oplismenus discolor Kth. rev. gr. p. 45,

V. spp. Bras.

Culmus altissimus. *Vaginae* glabrae aut pilis adspersae. *Ligula* obsoleta. *Folia* lineas 5 — 7 lata, 6 — 7-pollicaria. *Panicula* fere pedalis. *Radii* strictiusculi. *Radioli* pertenues, pl. min. remote floriferi, inferiores saepe elongati. *Flosc. neuter* 1-valvis, 5-nervis.

Panicum rugulosum. Radiis virgatis, superne compositis, jubatis, Radiolisque patentibus; Pedicellis spiculam aequantibus vel eadem longioribus; Spiculis linealibus, obovato-oblongis, obtusis, glabris; Gluma inferiore flosculis quartam tertiamve partem breviori, 3-, superiore 5-nervi; Hermaphrodito apice adunco, tenui-ruguloso; Foliis ovato-lanceolatis, pubescentibus glabrisve.

Panicum rugulosum Trin. Diss. II. p. 195. Ic. gr. XX. tab. 238. N. ab Es. Agr. bras. p. 204. — *P. Beyrichii* Kth. rev. gr. tab. 27. Agr. syn. p. 118. (foliis glabris).

V. spp. Bras.

Culmus 2 — 3-pedalis, basi procumbens. *Vaginae* marginibus apiceque pubescentes. *Ligula* brevissima, minute ciliata. *Folia* lineas 8 — 10 lata, subamplexicaulia, infra subvelutinosa et glaucescentia. *Juba* dodrantalis. *Radii* basi brevibarbarati, strictiusculi, tenues, cum axi comm. glabri aut pubescentes, *Radioli* breviusculi, pauciflori. *Spiculae* fere subrotundae. *Flosc. neut.* 2-valvis: valv. inf. 5-nervis.

Panicum virgatum L. sp. pl. ed. 1. Radiis virgatis, nunc superius, nunc fere a basi lucide decompositis, (interdum subjubato-) paniculatis, patentibus, Radiolis primariis patulis; Pedicellis spiculam pl. min. aequantibus; Spiculis linea longioribus, ovalibus, acuminatis, glabris; Gluma inferiore dimidia spicula (plerumque) longiori l. flosculos subaequante, 3 — sub- 5-, superiore 5 — 7-nervi; Hermaphrodito (incompleto paulo minori) pl. min. obtuso, laevi; Foliis linearibus (l. sublanceolato-lin.), glabris.

Panicum virgatum. R. et S. II. p. 443. Trin. ic. gr. XIX. tab. 228. Kth. Agr. syn. p. 100.

β, Radiis paniculae magis jubatis (subsoltariis), minus strictis, gluma inferiore vix spicula dimidia longiori:

Panicum elongatum Pursh. R. et S. II. p. 452. Kth. Agr. syn. p. 127.

V. spp. Am. bor.

Culmus 2 — 3-pedalis, simplex. *Nodi* glabri l. barbati. *Vaginae* teretes, glabrae. *Ligula* membranacea, brevissima, nuda, vel dorso villis, interdum praelongis, stipata. *Folia* lineas 2 — 3 lata, satis firma, spithamea — pedalia. *Panicula* spithamea — pedalis. *Radii* solitarii, aut plures semiverticillati, strictiusculi, in β magis laxi. *Radioli* 1 — 2 — 3-pollicares. *Spiculorum* (saepe sesquilinealium) paleae pl. min. longe, in β saepe brevius acuminatae. *Flosc. neut.* vel *masc.* 2-valvis: valv. inf. 5 — 7-nervis.

Obs. *Panicum elongatum* Parsh. certissime nil est nisi *virgati* varietas; Gluma inferior in *P. virg.* culto etiam minus acuminata est, flosculorumque dimidium vix excedit. A *Pan. agrostoides*, quocum jungit ill. N. ab Es., alienum; radii enim nil racemiformis habent.

Panicum cayennense LaM. Radiis a basi compositis vel subdecompositis, subpaniculatis. Radiolisque patentibus patentissimisve (divaricatis); Pedicellis spicula (plerumque multo) longioribus; Spiculis ultralinealibus, obovato-ovalibus, mucronato acutis, hirsutiusculis glabrisve; Gluma inferiore flosculis quartam tertiamve partem breviori, 3 — 5-, superiore 7-nervi; Hermaphroditio (masculo $\frac{1}{4}$ minori) obtuso, laevi; Foliis linearibus, glabris l. pl. min. hirsutis.

Panicum cayennense. N. ab Es. Agr. bras. p. 195. (var. minor.) — *P. scoparium* Rudge (*P. Rudgei* R. et S. II. p. 44.) var. major. — *P. pilosissimum* Roth et *dasytrichum* Sprgl. (ex sententia NEESII).

V. spp. Guian. Bras.

Culmus 1 — 5-pedalis, conseruo-ramosissimus: ramis vaginis involucratis. *Vaginae* teretes, hirsutae. *Ligula* ciliaris. *Folia* stricta, patula l. patentissima, lineas 3 — 4 lata, pedalia vel breviora. *Paniculae* in summo culmo plures, axillares, palmates — spithameae, strictae, pl. min. densae, plerumque squarroso-patentissimae. *Radii* solitarii, bini ternive. *Radioli* pauciflori: tertiarii s. pedicelli uniflori, plerumque satis longi, stricti. *Flosc. masc.* 2-valvis. *Hermaphr.* brevissime pedicellatus.

Panicum proboscideum. Radiis non longe supra basin subdecompositis, subpaniculatis Radiolisque patulis, hisve contractis; Pedicellis spiculam subaequantibus (interdum brevissimis); Spiculis trilinealibus, lanceolato-ovalibus, acuminatis, glabris; Gluma inferiore flosculis tertiam quartamve partem breviori, 9-, superiore (eosdem subexcedente) 13 — 15-nervi; Hermaphrodito (neutro $\frac{1}{3}$ minori) obtuso, basi utrinque squamuoso-tomentoso; Foliis lanceolato-linearibus, glabris.

Panicum proboscideum-Trin. Diss. II. p. 184. Ic. gr. XXVII. tab. 322. N. ab Es. Agr. bras. p. 134.

V. spp. Bras.

Culmus tripedalis, stricto-erectus, nodis pubescentibus. *Vaginae* inferiores aut totae aut versus marginem hirsutae. *Ligula* satis longo-ciliaris. *Folia* erecta, stricta, lineas 4 — 6 lata, marginibus involuta, dodrantalia — pedalia: supremum spithameum paniculam involucrans. *Panicula* spithamea — pedalis, stricto-erecta, pl. min. contracta. *Radii* terni vel plures subverticillato-conferti. *Glumae* acuminatae, firmae. *Flosculus* neuter 1-valvis, 11-nervis. *Squamulae*, tomentum Hermaphroditi laterale formantes, lineares, planae, pellicidae, apice mucronulatae.

Panicum campestre N. ab Es. Radiis a basi decompositis, paniculatis Radiolisque pl. min. patentibus; Pedicellis spicula plerumque longioribus; Spiculis linealibus, ovalibus, acutissimis, superne hirsutiusculis; Gluma inferiore flosculis plerumque tertiam partem breviori, 5 — 7-, superiore 7 — 9-nervi; Hermaphrodito (neutro subbreviori) obtusiusculo, striatulo; Foliis linearibus, pubescendo-pilosis.

Panicum campestre N. ab Es. Agr. bras. p. 197. Trin. ic. gr. XX. tab. 229. (gluma inf. flosculos subaequante).

V. spp. Bras.

Culmus geniculato-decumbens, sesquipedalis, pubescens, contracto-ramosus. *Vaginae* pl. min. pubescendo-pilosae. *Ligula* ciliaris. *Folia* lineis 2 sub-

latiora, rigidiuscula, spithamea — dodrantalia, subtus piloso - pubescentia.
Radii cum axi pilis adspersi, bini solitariique, pauciflori, tenues, strictiusculi.
Gluma inferior caudulato - mucronata. *Flosculus neuter* bivalvis: valv. inferior
 5 — 7-nervis.

Panicum dispersum. Radiis subvirgatis, pl. min. longe supra basin decompositis,
 subpaniculatis Radiolisque patentibus; Pedicellis spiculam aequantibus l.
 eadem paulo longioribus; Spiculis sublinealibus, obovato-oblongis, obtusius-
 culis, glabris; Gluma inferiore flosculis circiter tertiam partem breviori,
 sub- 1-, superiore 3-nervi; Hermaphrodito acuto, tenuissime ruguloso;
 Foliis lanceolato-ovatis, glabris (dorso pilis adspersis).

V. spp. Bahiens.

Culmi decumbentes, circiter pedales, patenti-ramosi: ramis floriferis. Va-
 ginae teretes, superne ciliatae. Ligula brevissima, dense ciliaris. Folia num-
 rosa, pl. min. amplexicaulia, lineas 4 — 8 lata, sesqui — sub-ultrabipollisaria,
 fusco-viridia. Panicula palmaris — fere spithamea, diffuso-lucidissima, fusca.
Radii plerumque solitarii, sed et 2 — 3 subfasciculati. Radioli subpauciflori,
 circiter 8-lineales. *Flosculus neuter* 2-valvis: valv. inf. 5-nervis. Hermaphr.
 fulvus.

Panicum miliaceum L. sp. pl. ed. 1. Radiis superius subdecompositis, subjubato-
 paniculatis, patulis, Radiolis contractiusculis; Pedicellis brevibus; Spiculis
 subbilinalibus, ovatis, acuminatis, glabris; Gluma inferiore dimidia spicula
 longiori, 5 — 7-, superiore 7 — 9 — 11-nervi; Hermaphrodito (neutro-
 paulo breviori) acutiusculo, laevi; Folii lanceolate-linearibus (vel linearis-
 lanceolatis) glabriusculis hirtisve.

Panicum miliaceum R. et S. II. p. 434. Trin. ic. gr. XIX. tab 221. Kth.
 Agr. syn. p. 104. — *P. aspernum* Lag. Schult. Mant. 2. p. 237. Kth.
 Agr. syn. p. 105. (radiis asperimis).

V. spp. Ind. or. et cc.

Culmus sesqui — bi-pedalis, inferne pubescens et pl. min. erecto-ramosus. *Vaginae* subcompressae, hirsutae. *Ligula* ciliaris. *Folia* lineas 3 — 6 lata, pl. min. spithamea, nunc margine tantum hispida, nunc pl. min. hirta. *Panicula* ultrapalmaris — dodrantalis, quo densior eo magis apice nutans. *Axis* comm. glaber aut pilosus. *Radii* solitarii binive. *Flosc. neuter* bivalvis: valv. inf. 7 — 13-nervis.

Panicum antidotale Retz. Radiis virgatis, inferioribus non longe supra basin decompositis, jubato-paniculatis Radiolisque patulis; Pedicellis brevibus brevissimisque; Spiculis linealibus, ovatis, acutis, glabris; Gluma inferiore dimidia spicula plerumque longiori, 3 — 5-, superiore 7-nervi; Hermaphrodito (fl. incompl. paulo minori) acutiusculo, laevi; Foliis (latiusculo-) linearibus, glabris.

Panicum antidotale. R. et S. II. p. 453. N. ab Es. Agr. bras. p. 201.

V. spp. Ind. or.

Culmus 8-pedalis, ramosissimus. *Vaginae* ore (interdum obsolete) barbulatae. *Ligula* brevis, membranacea, ciliata. *Folia* glaucescentia, lineas 3 — 6 lata, dodrantalia — pedalia. *Panicula* contractiuscula, flaccidula, fere pedalis. *Radii* 2 — 4 subverticillati. *Spiculae* in radiolis breviusculis subimbricatae. *Flosc. masc. l. neut.* 2-valvis: valv. inf. 9-nervis.

Panicum pellitum. Radiis a basi decompositis, paniculatis Radiolisque (in densiori panicula secundis) patulis (lanatis nudiusculis); Pedicellis spiculam aequantibus l. eadem longioribus; Spiculis linea brevioribus, ovalibus, acutis, lanatis glabris; Glumis flosculos aequantibus, 5-nervibus; Hermaphrodito (neutro paulo minori) acutiusculo, laevi; Foliis linearibus, pl. min. villosis (rarius glabris).

Panicum pellitum Trin. Diss. II. p. 198. Ic. gr. XX. tab. 237. (var. humilior, minus dense villosa). N. ab Es. Agr. bras. p. 148. — *Pan. montanum* Gaudich. in Freycin. it. — *Pan. nubigenum* Kth. Agr. syn. p. 98.

Eriachne montana Gaudich. General. tab. 26.

V. spp. ex O-Waahu.

Gramen villositate maxime varians: lanatum albo-canescens; pilosulum e flavo viride; glabrum fuscescens. *Culmus* semi — ultra- sesqui-pedalis, pl. min. contracto-ramosus, ramis floriferis, nunc molliter lanatus, nunc pilosulus, nunc glaberrimus. Idem valet de *Vaginis*, quae tamen fere semper pl. min. pilosae. *Ligula* ciliaris. *Folia* in majoribus lineas 4 lata, spithamea; in minoribus lineas 2 lata, digitalia, villositate culmi in^{star} variantia. *Panicula* pro magnitudine plantae spithamea vel minor, densior lucidiorve, (quo densior et major eo magis cum reliquis partibus lanata). *Radii* solitarii — quaterni, pl. min. villosi glabrine. *Flosc.* neuter 2-valvis: valv. inf. subobsolete 5-nervis.

Obs. Varietatis glabrae syn. est *Pan. pseudagrostis* Trin. Diss. II. p. 187. vitiouse descriptum.

Panicum muscarium. Radiis a basi decompositis, paniculatis Radiolisque (subcapilaribus) patentibus; Pedicellis spicula pl. min. longioribus; Spiculis minimis, (dum clausae sunt) lanceolato-ovalibus, acutis, glabris; Glumis flosculos aequantibus, 3-nervibus; Hermaphrodito (flosc. incompl. paulo minori) obtuso, laevi; Foliis linearibus, pilis adspersis.

Panicum muscarium Trin. ic. gr. XX. tab. 235. Kth. Agr. syn. p. 105.

V. spp. Sierr. Leon.

Culmus pl. min. semipedalis, adscendens, filiformis, florifero-ramosus. *Vaginae* ad fissuram pilosae. *Ligula* longo-ciliaris. *Folia* vix lineam dimidiata lata, e glandulis pusillis pilis satis longis adspersa, circiter digitalia. *Paniculae* tenerae, 2 — 4-pollicares. *Radii* infimi plures, superiores solitarii binive, basi callosi. *Radioli* pauciflori. *Spiculae* plerumque late hiantes. *Gluma* inferior subcaudato-acuminata. *Flosculus* neuter 2-valvis: valvula inferior 3 — 5-nervis.

X. *Miliaria.*

a) *Gluma inferiore flosculis dimidio magisve breviori, l. minima, interdum nulla.*

a. *Radiis subangulosis.*)*

Panicum aciculare Poir. Pedunculis intra folia solitariis, simplicissimis, 1 — 3-floris; Pedicellis spiculam aequantibus; Spiculis linea brevioribus, obovato-oblongis, obtusis (cum mucronulo), sub lente puberulis; Gluma inferiore flosculis 3 — 4-plo breviori, sub- 3-, superiore 5-nervi; Hermaphrodito obtusiusculo, tenuissime striato; Foliis setaccis, glabris.

Panicum aciculare. R. et S. II. p. 883. Trin. Diss. II. p. 229. N. ab Es.

Agr. bras. p. 235. (an synon.?)

V. sp. Ind. or.

Culmus palmaris, erectus, tenuissimus sed firmus, superne erecto-ramosissimus. *Folia* stricta, erecta, laete viridia, pollicaria, pedunculis, e vaginis tuberculatis emergentibus, longiora. *Flosc. neut.* 1-valvis, 5-nervis.

Panicum caricoïdes N. ab Es. Pedunculis fasciculatis, simpliciusculis, paucifloris; Pedicellis (apice barbatis) spiculam pl. min. aequantibus; Spiculis linea brevioribus, ovalibus, obtusiusculis, glabris; Gluma inferiore flosculis dimidio breviori, 3 — 5, superiore sub- 7-nervi; Hermaphrodito acuto, laevi; Foliis subulato-linearibus, glabriusculis.

Panicum caricoïdes N. ab Es! Agr. bras. p. 108. Trin. Diss. II. p. 149.

V. spp. Bras.

Culmus dodrantalis, filiformis, in ramos aliquot simpliciusculos et contractos divisus. *Folia* lineam dimidiata, rigidula, praesertim basin versus pilis minutis adspersa, 1 — 2-pollicaria, infima brevissima. *Pedunculi* aliquot e

**) Species enumeratae secundum radios, simplices — magis magisque compositas.*

vaginis supremis, 3 — 4-lineales, radiolis (pedicellis) alternis, 1 — 2-floris, adpressis. *Flosc. neut.* 2-valvis: valv. inf. 5-nervis.

Panicum depauperatum Mühlenb. (?) Radiis subsimplicibus, paucifloris, alternis, pl. min. contractis; Pedicellis spicula plus duplo longioribus; Spiculis sesquilinealibus, ovatis, acuminatis, glabris; Gluma inferiore flosculis triplo breviori, 3 — 5-, superiore 9-nervi; Hermaphrodito (neutro paulo minori) submucronulato-obtusiusculo, laevi (interdum striatulo et subruguloso); Foliis linearibus, glabris.

Panicum depauperatum. Schult. Mant. 2. p. 239. (Obstant „rami paniculae gemini“, qui in nostris solitarii; gluma inferior „obtusa“, quae in nostris acuta; reliqua satis convenient). — A *Panico dichotomo* Sprgl., quocum jungit *N. ab Es.* in Agr. Bras. p. 231., planta nostra diversissima. — *P. junceum* Trin. Diss. II. p. 220.

V. spp. Nov. Ebor.

Culmus vix pedalis, erectus, simplex l. ex ima basi florifero-ramosus. *Nodi* barbulati. *Ligula* ciliaris. *Folia* erecta, 4 — 3-pollicaria, plana (medio lineam lata) l. compressa (aut subinvoluta). *Panicula* simplicissima, e radiis 4 — 5 solitariis, dissite 3 — 2-floris formata, circiter sesquipollucaris, plerumque foliis pl. min. brevior. Tota planta satis laete viridis, interdum sub-glaucescens.

Panicum clandestinum L. sp. pl. ed. 1. Radiis simpliciusculis l. a basi parce compositis, alternis jubatisve, patulis (intra vaginam pl. min. occultis); Pedicellis spicula plerumque brevioribus; Spiculis sesquilinealibus, obovato-ellipticis, acutiusculis, puberulis; Gluma inferiore flosculis dimidio breviori, 1 — sub-3-, superiore 9-nervi; Hermaphrodito acutiusculo, laevi; Foliis e basi cordata (lato-) lanceolatis, glabris.

Panicum clandestinum. R. et S. II. p. 442. Mant. 2. p. 239.

Milium clandestinum Mönch.

V. spp. Am. bor. et cc.

Culmus 3 — 4-pedalis, ramosus, ramis plerumque floriferis, nodis glabris. *Vaginae* glabrae vel e glandulis hirtae. *Ligula* brevissima, subobsoleta. *Folia* latiora pollicem et quod excedit lata, 6-pollicaria, superiora angustiora et breviora. *Juba* non nisi serius, nec tota exserta, 1 — 2-pollicaris. *Flosc. neut.* 2-valvis: valv. inf. 9-nervis. *Nervi* tenues.

Panicum WAlleri Poir. Radiis fere a basi compositis, jubatis Radiolisque pl. min. patentibus; Pedicellis spicula plerumque brevioribus; Spiculis sesquilinealibus, obovatis (turgidis), pl. min. obtusis, pubescentibus; Gluma inferiore flosculis fere triplo breviori, 1 — 3-, superiore (hermaphrodito subminori) 7 — 9 — (11-) nervi; Hermaphrodito acutiusculo, laevi; Foliis e basi cordata (ovato-) lanceolatis, ciliolatis.

α . Foliis latioribus, radiis glabris:

Panicum WAlleri. R. et S. II. p. 885. Kth. Agr. syn. p. 117. — *P. latifolium* WAlt. Mchx. et Torr.!

β . Foliis angustioribus, radiis pubescentibus:

Panicum scoparium Mchx. R. et S. II. p. 444. Mant. 2. p. 241. Kth. Agr. syn. p. 115.

V. spp. Am. bor.

Culmus circiter sesquipedalis, simplex l. ramosulus, in β pubescens. *Nodi* nudi vel (praesertim in β) barbati. *Vaginae* in α glabrae vel tenui-pubescentes, in β sublanatae. *Ligula* ciliaris. *Folia* in α interdum sesquipollis lata, in β haud raro multo angustiora; in α ciliata tantum, in β subtus canescendo-pubescentia; 3 — 5-pollicaria. *Juba* in α e vagina supra brevis, in β longius exserta, circiter 3-pollicaris, lucidissima. *Radii* solitarii l. aliquot subconferti, in β cum *Axi comm.* pubescentes. *Flosc. neut.* 2-valvis: valv. inf. 7 — 9-nervis.

Panicum lineatum. Radiis a basi compositis, paniculatis Radiolisque contractiusculis; Pedicellis spicula paulo brevioribus; Spiculis linealibus (vel parum longioribus), elliptico-ovatis, acutis, glabris; Gluma inferiore flosculis sub-

duplo breviori, sub- 5-, superiore 7 — 9-nervi; Hermaphroditō (neutro nonnihil minori) mucronulato-acutiusculo, laevi; Foliis lanceolatis, pubescentibus.

Panicum lineatum Trin. ic. gr. XX. tab. 233, Kth. Agr. syn. p. 109.

V. spp. Senegal.

Culmus circiter sesquipedalis, prostratus, ramosus, superne pubescens, nodis puberulis. *Vaginae*, praesertim jūniores, pubescentes. *Ligula* ciliaris. *Folia* satis numerosa, lineas 4 — 5-lata, pl. min. 2-pollicaria. *Panicula* circiter bipollicaris. *Axis comm.* pilis brevibus (clavulatis, quasi pedicellis abortivis) adspersus et cum radiis pubescens. *Pedicelli* nudi aut pilos raros emittentes. *Flosc. neut.* 2-valvis: valv. inf. 5 — 7-nervis.

Panicum rostellatum. Radiis a basi compositis, paniculato-jubatis, pl. min. patentibus, Radiolis patulis; Pedicellis spiculam subaequantibus; Spiculis sublinealibus, ovalibus, (hermaphrodito prominente) mucronatis, glabris (sub lente interdum puberulis); Gluma inferiore flosculis duplo triplove breviori, 1-, superiore 7-nervi; Hermaphrodito mucronato (mucrone paleas plerunque excedente), laevi; Foliis e basi cordata lanceolatis l. ovato-lanceolatis, hirtulo-puberulis, ciliatulis.

V. sp. Bras.

Culmus decumbens, radicans, ramosus, ramis fere dodrantibus, floriferis, infra paniculam pilosulis. *Vaginae* inferiores glabriusculae, superiores hirtulopubescentes. *Ligula* inter pilos faucis breves obsoleta. *Folia* (praesertim jūniora amplexicaulia) lineas 4 — 6 lata, sesqui — ultra- bi-pollicaria. *Panicula* l. juba circiter bipollicaris, strictiuscula, lucida. *Axis comm.* et pars radiorum inferior pilosi. *Radius* tenues, solitarii, aut bini ternive, flexuosuli. *Gluma* inferior longitudine varians, interdum (rarius) dimidiata spiculam subexcedens; superior flosculis nonnumquam paulo brevior. *Flosc. neut.* bivalvis: valv. inf. pl. min. obtusa, 7-nervis. Mucro hermaphroditi praesertim in spiculis adulterioribus exsertus.

Obs. Affine *P. demiso*, qu. v. infr.

Panicum stigmosum. Radiis a basi decompositis, paniculatis jubatisve, cum Radiolis pl. min. patentibus; Pedicellis spicula paulo nunc brevioribus nunc longioribus; Spiculis linealibus, obovatis, obtusis, glabris puberulisve; Gluma inferiore flosculis subdupo breviori, 3 — 5-, superiore 7 — 9-nervi; Hermaphrodito acutiusculo, laevi; Foliis lanceolatis, glabris pilisve brevibus adspersis.

Panicum stigmosum *Trin.* Diss. II. p. 194. *Ic. gr. XIX.* tab. 225. (var. culmo simplici). N. ab Es. Agr. bras. p. 219.

V. spp. Bras.

Culmus circiter sesquipedalis, geniculato-adscendens et plerumque patentiramosus. *Vaginae* brevi-pilosae. *Ligula* ciliaris. *Folia* lineas 4 — 7 lata, sesquipollucaria — ultrapalmaria. *Juba* *panicularis* circiter digitalis, lucida. *Radii* solitarii l. aliquot conferti. *Gluma* inferior interdum dimidiata spiculam subexcedit. *Flosculus* neuter 2-valvis: valv. inf. 7-nervis.

Panicum viscidum *Ell.* Radiis a basi subdecompositis, jubatis, patentibus, Radiolis patulis; Pedicellis spiculam aequantibus eave longioribus; Spiculis linealibus, obovatis, submucronato-acutiusculis, pubescentibus; Gluma inferiore flosculis 4 — 5-plo breviori, subnervi, superiore 7-nervi; Hermaphrodito acutiusculo, laevi; Foliis sublineari-lanceolatis, undique (culmoque, infra nodos annulatim glabro) pubescentibus.

Panicum viscidum. Kth. Agr. syn. p. 107.

V. sp. Am. bor.

Totum canescens. *Culmus* ultrapedalis, obliquus? crassiusculus, ramosulus, infra nodos tantum spatio linearis glaber. *Vaginae* pubescentes, dorso superne glabratae. *Ligula* dense ciliaris. *Folia* adultiora lineas 4 — 5 lata, attenuato-acuminata, ultra- 4 — 3-pollicaria: supremum jubam basi involucrans. *Juba* circiter tripollucaris. *Axis* comm. pilosus. *Radii* bini, solitarii, sparsi, flexuosi, crassiores pilosuli. *Flosc. neut.* sub-bivalvis: valv. inf. 7-nervis.

Panicum psilopodium. Radiis paulo superius compositis et decompositis, paniculatis Radiolisque patulis; Pedicellis spiculam aequantibus l. plerumque eadem longioribus; Spiculis linealibus, ovalibus, mucronatis, glabris; Gluma inferiore flosculis subtriplo breviori, 3 — 5, superiore 11-nervi; Hermaphroditum mucronulato, laevi; Foliis linearibus (vel sublanceolato-linearibus), glabris.

Panicum psilopodium Trin. Diss. II. p. 217. Kth. Agr. syn. p. 100. — *P. virgatum* Roxb! — *P. ramosum* Koen. in hbio Banks.

V. spp. Ind. or.

Culmus ultrapedalis, geniculatus, foliifero-ramulosus. *Vaginae* glabrae. *Ligula* brevis, ciliari-lacera. *Folia* lineas 2 — 3 lata, ultrapalmaria. *Panica* spithamea, superne patula. *Radii* pertenues. *Radioli* subcapillares. *Spiculae* spadicescentes. *Flosculus neuter* 2-valvis: valv. inf. 9-nervis.

Panicum brevifolium L. sp. pl. ed. 1. Radiis a basi subdecompositis, jubatis Radiolisque patentibus; Pedicellis spicula (multo) longioribus; Spiculis minimis, obovatis, acutiusculis, (tenui-interdum obsolete) pubescensibus; Gluma inferiore flosculis duplo breviori, 1-, superiore 3 (5-) nervi; Hermaphroditum acuto, laevi; Foliis ovali-lanceolatis, glabriusculis, ciliatulis aut minute pubescensibus.

Panicum brevifolium. R. et S. II. p. 449. Trin. Diss. II. p. 240. — *P. trichantium* N. ab Es! Agr. bras. p. 210. (culmo paulo altiori et firmiori). — an *P. trichoides* Sw.? N. ab Es. l. l. p. 205.? Kth. Agr. syn. p. 112. — an *P. capillaceum* Lam? *

V. spp. Ind. occ. Bras.

Culmus 1 — 2-pedalis, florifero-ramosus, erectus l. inferne pl. min. repens. *Vaginae* plerumque hirsuto-pubescentes. *Folia* lineas 3 — 7 lata, 1 — 3-pollicaria. *Juba* in minoribus dimidiata graminis longitudinem efficit, spithamea l. brevior. *Axis comm.* saepissime pilis densioribus rarioribusve adspersus, nec minus saepe nudus. *Flosc. neuter* 1-valvis.

Panicum capillare L. sp. pl. ed. 1. Radiis virgatis, plerumque paulo superius decompositis, paniculatis Radiolisque superne patentibus; Pedicellis spicula plerumque (multo) longioribus; Spiculis linealibus, ovalibus, acuminatis, glabris; Gluma inferiore flosculis duplo breviori, 3 — 5-, superiore sub-7-nervi; Hermaphrodito (neutro fere $\frac{1}{4}$ minori) acutiusculo, laevi; Foliis sublinearibus, pilosis.

Panicum capillare. R. et S. II. p. 435. Kth. Agr. syn. p. 114. Host gr. Austr. IV. tab. 16.

* Minus, panicula rara:

Panicum philadelphicum Bernh! N. ab Es. Agr. bras. p. 198. (excl. synn. Purshii et R. et S.)

V. spp. Amer. bor. Bras.

Culmus 1 — 2-pedalis, inferne paniculifero-ramosus. *Vaginae* compressae, hirsatae. *Folia* lineas 2 — 3 lata, in majoribus pl. min. spithamea, strictissimula. *Panicula* spithamea — semipedalis. *Flosc.* neut. 1-valvis, 7-nervis.

Panicum Melinis. Radiis a basi decompositis, paniculatis, contractiusculis, Pedicellis spicula plerumque brevioribus; Spiculis sublinealibus, elliptico-lineariibus, e flosculi neutrī apice bidentato plerumque setam emitentibus, glabris; Gluma inferiore minima, superiore (emarginata) 7-nervi; Hermaphrodito acuto, laevi; Foliis sublanceolato-linearibus, hirsuto-pubescentibus.

Melinis minutiflora PB. R. et S. II. p. 495. N. ab Es. Agr. bras. p. 407.

Agrostis glutinosa Hl. Gor!

Tristegis glutinosa N. ab Es. Hor. phys. p. 47. tab. 7.

Suardia pieta Schrk. ht. Monac. 3. tab. 58.

V. spp. Br̄as. et cc.

Culmus plantae spontaneae sesqui — bi-pedalis, decumbens. *Vaginae* cum *Foliis* compressiusculis, lineas plerumque 3 latis, digitalibus, dense pubescentes et viscidæ. *Panicula* ultrapalmaris — spithamea. *Spiculae* angustæ. *Flos-*

ulus neuter 1-valvis, 5-nervis, rarius muticus, plerumque e fissura apicis setam emittens pl. min. elongatam.

Obs. Flosculo neutrō, sic ut haud raro occurrit, constanter inermi concepto, nemo foret, qui hoc grāmen Panici speciem esse negaret. Seta autem illa (ut in *Echinochloa*, *Orthopogone*, *Oryza* al.) vaga ad genus constituendū nequitiam sufficit. *Zodicula* marginibus valvulae superioris inferne subalato-prominulis suppletur, ita ut ipsi potius adnata videatur. *Caryopsis* (intra valvulas demum subcoriaceo-chartaceas, arcte clausas, libera, scutello suo duplo longior) Panici.

Panicum subeglume. Radiis virgatis, fere a bāsi subdecompositis, paniculatis, contractis, Radiolis patulis; Pedicellis spicula (multo) longioribus; Spiculis vix linealibus, lineari-l. sublanceolato-ellipticis, obtusiusculis, sub lente pubescentibus; Gluma inferiore nulla, superiore pusilla l. obsoleta; Hermaphrodito acuto, laevi; Foliis lanceolato-linearibus, pubescendo-pilosulis.

Milium capillare Roth! R. et S. II. p. 320. Mant. 2. p. 178. — *M. tomentosum* Rottl.? R. et S. II. p. 321.

V. sp. Ind. or.

Culmus (abscissus) bipedalis? *Vaginae* superne glandulis adspersae. *Ligula* membranacea, brevis. *Folium* (supremum) spithameum, pilis adspersum et margine pubescens. *Panicula* semipedalis. *Radii* subcapillares, inferiores verticillati, ultrapalmates, inferne non longe nudi. Barba axillarum in specimine, quod ex ipsius cel. ROTHI manu profectum vidi, nulla. *Radioli* et *pedicelli* capillares. *Spicularum* organisatio ut in *Digitariis*. *Gluma* unica (superior), pusilla, rotundato-obtusa, glabra. *Flosc. neut.* 1-valvis, hermaphroditum ita obvolvens, ut margines sui inferne invicem contingant, 7-nervis, inter nervos pilosulo-pubescens. *Hermaphr.* lanceolato-ellipticus, neutrū aequans.

Panicum prionitis N. ab Es. Radiis superne (dense) decompositis, paniculato-jubatis, patulis, Radiolis tertiaris contractis; Pedicellis spicula (multo) brevioribus; Spiculis sublinealibus ovalibus, acutis, glabris; Gluma inferiore flosculis triplo duplove breviori 3 — 5-, superiore 5-nervi; Hermaphrodito

acuto, laevi; Foliis angusto-linearibus, (canaliculatis, rigidissimis, margine argute serratis) glabris.

Panicum prionitis N. ab Es. Agr. bras. p. 162.

V. spp. Bras.

Culmus orgyalis, cylindricus, strictissimus, farctus, nodis albopruinosis, aequis. *Vaginae* glaberrimae et laeves. *Ligula* nulla. *Folia* coriaceo-indurata, strictissima, subtrigono-concava, lineas 2 — 3 lata, sesqui — bi-pedalia. Ex *vaginis* superioribus emergunt paniculae semi-inclusae, adpressae, breves. *Panicula* terminalis pedalis et altior, superne densissima. *Radii* aliquot conferti et solitarii, compressi, subangulati, vix scabriusculi. *Radioli* pertenues: inferiores superne dense et fere thyrsiformi-floriferi. *Gluma* inferior plerumque paulo patens. *Flosc.* neuter 2-valvis.

*β. Radiis pl. min. teretibus.**

Panicum acariferum. Radiis superius decompositis, dense jubatis Radiolisque patulis: tertiaris Pedicellisque brevissimis; Spiculis pusillis, lanceolato-ovalibus, acutissimis; Glumis flosculis duplo brevioribus, 5-nervibus; Hermaphroditio acuminato, margine longe ciliato; Foliis latissimo-lanceolatis, glabris.

Panicum acariferum Trin. ic. gr. VIII. tab. 87. Kth. Agr. syn. p. 125.

Melica latifolia Roxb. Schult. Mant. 2. p. 297.

V. spp. Ind. or.

Culmus orgyalis, simplex. *Vaginae* glabrae. *Folia* basi subauriculata amplectentia, pollices 1½ — 2½ lata, ultrapedalia. *Juba* ampla, densissima, sesquipedalis, pallide canescendo-fuscescens. *Racemi* palmares — ultrapedales. *Racemuli* primarii* 2-pollicares — dodrantales, ob secundarios brevissimos totidem thyrsos angustissimos interruptos referentes. *Spiculae* in glomerulis circiter 2-linealibus, nitidulae. *Flosculi* intra glumas, parum inaequales, bre-

*) Species enumeratae secundum pedicellos sensim longiores.

vissime stipitati: *neuter* 1-valvis, inferne e margine pilos brevissimos emittens.

Hermaphr. chartaceus, aciculato-acutus: pili e margine glanduloso patentes.

Panicum milioides N. ab Es. Radiis superius compositis, alternis, pl. min. patentibus, Radiolis contractis Pedicellisque brevissimis; Spiculis fere linealibus, sublanceolato-ovalibus, acutiusculis, glabris; Gluma inferiore flosculis triplo duplove breviori, 3-, superiore 5-nervi; Hermaphrodito (neutro pauculum minori) acuto, punctulato; Foliis linearibus, glabris.

Panicum milioides N. ab Es. Agr. bras. p. 175. (an synn?) Trin. Diss. II. p. 225. — Sub *P. melicario* Mchx. Kth. Agr. syn. p. 113.

V. spp. Bras.

Culmus ultrapedalis, simplex, compressus. *Vaginae* glabrae. *Ligula* membranacea, brevissima. *Folia* lineas 1—2 et qu. exc. lata, digitalia — subspithamea. *Panicula* palmaris. *Radii* distantes. *Radioli* thyrsiformes, breves. *Flosculus* *neuter* 2-valvis: valv. inferior 5-nervis, superior in nonnullis longior et acutissima.

Panicum angustum. Radiis simpliciusculis, brevissimis, in thyrum angustum coarctatis; Pedicellis spicula brevioribus; Spiculis vix linealibus, elliptico-ovatis, acutis, superne pilis adspersis; Gluma inferiore flosculis dimidio breviori, 3-, superiore 7-nervi; Hermaphrodito (neutro parum minori) acutiusculo, laevi; Foliis linearibus, glabris.

Panicum angustum Trin. ic. gr. XXVIII. tab. 334.

V. spp. Nepal.

Culmi erecti, digitales — dodrantales, simples l. inferne contracto-ramosi.

Vaginae glabrae. *Folia* maximam partem atro-purpurascens, linea angustiora, pollicaria — palmaria. *Thrysus* semi — 2-pollicaris, ex atropurpureo, fusco et viridi varius. *Glumae* inferioris nervi laterales marginales. *Flosc.* neut. bivalvis: valv. inf. 5-nervis.

Panicum indicum L. Mant. 2. p. 184. Radiis simplicibus brevissimis (s. potius Pedicellis ipsis) spicula brevioribus, thyrum angustissimum constituentibus;

Spiculis ultralinealibus, ovatis, acutis, glabris l. superne strigilosis; Gluma inferiore flosculis dimidio breviori, 3-, superiore (eosdem nonnihil excedente) 7 — 11-nervi; Hermaphrodito (neutro quartam partem minori) adunco-mucronato, laevi; Foliis linearibus, glabris (superne pilis adspersis).

Aira spicata L. sp. pl. ed. 1. no 1.

Panicum indicum. R. et S. II. p. 429. (sub *P. conglomerato*, quod, cum syn. *Airae indicae L.*, ob „spicam secundam“ huc non pertinet). Trin. Diss. II. p. 170. (excl. synn. Linnaei altero et tertio). Ic. gr. XVII. tab. 197. — *P. microstachyum LaM.*

V. spp. Ind. or. Philipp.

Culmus prostratus, semi — 2-pedalis, tenuis, ramosus. *Vaginae* glabrae. *Folia* pl. min. lineam lata, in minori gramine digitalia vel breviora, in majori fere spithamea. *Thrysus* semi — ultra-pollicaris, subglaucescens. *Spiculae* compressiusculae, hinc arcuatae, deciduae. *Gluma* inferior marginem versus membranacea, medio 3-nervis; superior valde convexa, in varietate minori glabra, in majori marginem versus superne strigiloso-ciliata. *Flosculus neuter* 1-valvis, 7-nervis.

Panicum decipiens N. ab Es. Radiis fere a basi compositis, in paniculam (brevem) cylindraceam contractis Pedicellisque brevissimis; Spiculis linealibus, sublanceolato-ovalibus, acutis, glabris; Gluma inferiore flosculis triplo breviori, 1-, superiore iisdem paulo minori, 3-nervi; Hermaphrodito mucronulato, laevi; Foliis sublanceolato-linearibus, glabris.

Panicum decipiens N. ab Es! Agr. bras. p. 193. Trin. Diss. II. p. 227. —

P. fallax Klh. Agr. syn. p. 95.

V. spp. Bras.

Culmus ultrapedalis, basi repens, simplex, compressus. *Vaginae* glabrae. *Ligula* brevissima, membranacea. *Folia* lineas 2 — 3 lata, 2 — 3-pollicaria. *Panicula* lineari-angusta, sesqui — bi-pollicaris. *Radii* solitarii breves: ra-

diolis brevissimis, subfasciculatis. *Spiculae* hinc purpurascentes. *Flosc. neut.* vel *masc.* 2-valvis: valv. superior inferiorem hermaphroditumque excedens.

Panicum Pterigodium. Radiis fere a basi compositis (brevibus) in paniculam sublinearem (brevem) contractis; Pedicellis spiculam plerumque aequantibus; Spiculis parvis, rotundato-oblongis, obtusiusculis, glabris; Glumis flosculis 3 — 4 plo brevioribus, subencervibus; Hermaphroditio acutiusculo, laevi; Foliis involutis, glabris.

Panicum Pterigodium Trin. Diss. II. p. 227. Kth. Agr. syn. p. 131.

Otachyrium junceum N. ab Es. Agr. bras. p. 272.

V. spp. Bras.

Culmus pl. min. pedalis, tenuis. *Vaginae* oris barbatae. *Ligula* ciliata. *Folia* digitalia. *Panicula* sesqui — 2-pollicaris, angustata. *Radius* solitarii binive. *Glumae* subaequales: inferior obsolete 1-, superior sub- 3-nervis. *Flosc. masc.* 2-valvis: valv. inferior sub- 3-nervis; superior latior et paulo longior.

Panicum macranthum. Radiis simplicibus, superne floriferis, verticillatis, patentibus (dēnum contractis); Pedicellis spicula brevioribus brevissimisve; Spiculis trilinealibus, ovalibus, acutiusculis, glabris; Gluma inferiore flosculis quadruplo duplove breviori, 1 — 3-, superiore (iisdem subminori) 5-nervi; Hermaphroditio acutiusculo, pubescente; Foliis sublanceolato-linearibus, glabris l. piloso-pubescentibus.

Panicum macranthum Trin. Diss. II. p. 209. — *P. vaginatum N. ab Es!* Agr. bras. p. 156. Kth. rev. gr. tab. 166. Agr. syn. p. 119.

V. spp. Bras.

Culmus 3-pedalis, simplex aut ramosulus (decumbens RIEDEL). *Vaginae* glabrae. *Ligula* nulla. *Folia* lineas 4 et qu. exc. lata, pollices 4 — 7 longa, firma. *Radius* in verticillo infimo 5, tenues, fere racemiformes. *Flosc. masc.* 2-valvis: valv. inf. 5-nervis.

Panicum Teneriffae Br. Radiis a basi decompositis, paniculatis, cum Radiolis partitulis l. patentibus patentissimisque; Pedicellis spicula brevioribus l. eandem aequantibus; Spiculis ultralinealibus, sublanceolato-ovalibus, acutis, sericeo-villosis; Gluma inferiore obsoleta, superiore subenervi; Hermaphrodito (masculo paulo breviori) acuto, laevi; Foliis linearibus, subinvolutis, glabris.

Panicum Teneriffae. Kth. Agr. syn. p. 98. — *P. villosum Presl.*! — *P. saccharoides Trin.* Diss. II. p. 245.

Saccharum Teneriffae L. fil. R. et S. II. p. 285. Jacq. Eccl. tab. 34.

Tricholaena micrantha Schrad. Schult. Mant. 2. p. 163.

Agrostis plumosa Ten.!

V. spp. Canar. Calabr. Sic. Mont. Sinai.

Culmus sesqui — bi-pedalis, inferne ramosus et pubescens, rigido-firmus.

Folia longiora vix digitalia. *Panicula* plerumque sesquipalmaris. *Radii* tenuissimi. *Pedicelli* nunc longe villosi, nunc nudi. *Spiculae* deciduae.

Obs. Hermaphroditus, ut in *Urachne*, apice satis longe aristatus depingitur a SIBTHORPIO in Fl. Graeca.

Panicum capense Lichtenst. Radiis a basi compositis, paniculatis Radiolisque patentibus; Pedicellis spiculam pl. min. aequantibus; Spiculis ultralinealibus, ovalibus, obtusis, villosis; Gluma inferiore flosculis plus dimidio breviori, enervi, superiore 5-nervi; Hermaphrodito (masculo minori) acuto, laevi; Foliis lanceolato-linearibus, glabris suprave tenui-pubescentibus.

Panicum capense. R. et S. II. p. 457. N. ab Es. in Linnaea 1832. p. 275.

V. sp. Cap. b. sp.

Culmus ultrapedalis, basi rigido-firmus, ramosus, ascendens. *Vaginae* teretes, glabrae. *Ligula* ciliaris. *Folia* rigida, lineas circiter 2 lata, 2 — 3-pollicaria. *Panicula* 3-pollicaris. *Radii* tenuissimi. *Radioli* subcapillares, flexuosi. *Spiculae* deciduae. *Flosc. masc.* l. neut. bivalvis: valv. inf. 5-nervis.

Panicum sciurotis. Radiis a basi decompositis, paniculato-jubatis Radiolisque pl. min. patentibus; Pedicellis spicula brevioribus l. eandem aequantibus; Spi-

culis parvis, obovato-ovalibus, nunc obtusiusculis nunc acutiusculis, glabris l. tenerrime pubescentibus; Gluma inferiore flosculis triplo breviori, 1-, superiore 5-nervi; Hermaphrodito mucronato, laevi; Foliis ovatis, amplexicaulibus, hirtis.

Panicum sciurotis. Trin. Diss. II. p. 228. N. ab Es. Agr. bras. p. 209. Kth. Agr. syn. p. 112. rev. gr. tab. 210.

V. spp. Bras. (Bahiens. et Ins. Cathar.)

Culmus pl. min. *pedalis*, ramosissimus, ramis diffusis, glabris hirtisve. *Vaginae* glabrae l. hirtae. *Folia* numerosa, 1—2-pollicaria, majora pollicem dimidium et ultra lata. *Panicula* 2—3-pollicaris, subturbinata, folio supremo involucrata. *Ax̄is comm.* pilosus. *Radii* delapsis spiculis patentissimi. *Flosc. neut.* 1-valvis, 3—5-nervis.

† *Panicum coriophorum* Kth. Radiis fere a basi subdecompositis, paniculatis Radiolisque patulis; Pedicellis spiculam pl. min. subaequantibus; Spiculis (cernuis) linealibus, ovalibus (hinc gibbis), acutiusculis, glabris; Gluma inferiore minima, superiore 11-nervi; Hermaphrodito (neutro subduplo minori) acutiusculo, laevi; Foliis linearis-lanceolatis, glabris.

Panicum coriophorum Kth. rev. gr. tab. 107. Agr. syn. p. 88.

Madagascar.

Culmus sesquipedalis. *Vaginae* glabrae. *Folia* basi rotundata, lineas 2—3 lata, 2—3-pollicaria. *Panicula* 5—6-pollicaris, lucidula. *Radii* solitarii, filiformes. Nervi *glumae* superioris cucullatae distinctissimi. *Flosc. neut.* 2-valvis: valv. inf. 7-nervis.

Panicum umbellatum. Radiis (subracemiformi), simpliciusculis l. paulo superius compositis, subverticillatis sparsisque, patulis (subfastigiatis, pilis adspersis); Pedicellis spiculam pl. min. aequantibus; Spiculis sublinealibus, ovalibus, mucronulato-acutis, glabris; Gluma inferiore minima, superiore 3-nervi; Hermaphrodito obtuso, laevi; Foliis (brevibus, patentissimis) lanceolatis, inferioribus marginem versus pilosulis.

Panicum umbellatum Trin. Diss. II. p. 238. — *P. repens* N. ab Es. Agr. bras.

p. 171. (excl. syn. LaM. et, ut videtur, Linn.)

V. spp. Mascar.

Obs. Vid. descr. ap. N. ab Es. — LINNAEI definitio *Panici repens* sui brevissima, et descriptio, ob Folia superiora (culmea) in planta nostra non longiora racemusque „tribus quatuorve“ semper plures, non quadrans, synon. LINNAEI, majori jure ad *Pan. arenarium* Brot. (cui etiam patria, Hispania L., respondet) referendum, dubium reddunt. — *Pan. multinode* LaM. ab ill. N. ab Es. ad plantam nostram relatum, vel ob solam glumam inferiorem, flosculis duplo tantum breviorem, huc duci nequit.

Panicum chnoodes. Radiis superius compositis, paniculatis, patentibus, Radiolis contractiusculis patulisve; Pedicellis spiculam aequantibus l. eadem paulo longioribus; Spiculis linealibus, oblongis, obtusiusculis, glabris; Gluma inferiore flosculis duplo breviori, 3-, superiore 5-nervi; Hermaphrodito acuto, laevi; Foliis sublanceolato-linearibus, mollissime refracto-vilosissimis. (Ligula membranacea).

Panicum chnoodes Trin. Diss. II. p. 211. Ic. gr. XXI. tab. 247. N. ab Es. Agr. bras. p. 216.

V. spp. Bras.

Culmus sesquipedalis. Quoad paniculam et spiculas sequentibus 2 simillimum; differt vaginis, foliis (erectis), culmo (superne) axique communī molissime lanatis, foliis rigidulis quidem sed magis herbaceis, ligula manifesta.

Panicum pungens. Radiis superius compositis, paniculatis Radiolisque patulis hisve contractiusculis; Pedicellis spiculam aequantibus vel eadem paulo longioribus; Spiculis linealibus, oblongis, acutiusculis (obtusiusculisve), glabris; Hermaphrodito (masculo paulo minori) acutiusculo, striatulo; Foliis linearibus, glabris (coriaceis, squarrosis; Ligula nulla).

Panicum pungens Trin. Diss. II. p. 210. Ic. gr. XXI. tab. 248. N. ab Es. Agr. bras. p. 160.

V. spp. Bras.

Culmus sesquipedalis, simplex, erectus. *Vaginae* infimae imbricatae, hiantes, lanatae. *Folia* subconcavo-plana l. marginibus involuta, lineas 2 — 4 lata, glabra, dura, pungentia, glauca: radicalia subrecurvo-squarrosa, dodrantalia l. longiora, culmea breviora. *Panicula* palmaris. *Radix*, basi. saepe barbati, tenues. *Flosc. masc.* bivalvis: valv. inf. 5 — 7-nervis.

Panicum loereum. Radiis superius compositis, paniculatis Radiolisque pl. min. patentibus hisve contractiusculis; Pedicellis spicula longioribus; Spiculis linearibus, oblongis, obtusiusculis, glabris; Gluma inferiore flosculis duplo breviori 1 — 3-, superiore 3 — 5-nervi; Hermaphrodito acuto, laevi; Foliis linearibus, glabris (coriaceis, erectis; Ligula nulla).

Panicum loereum. Trin. Diss. II. p. 211. Ic. gr. XXI. tab. 246. N. ab Es. Agr. bras. p. 217.

V. spp.. Bras..

Simillimum praecedenti, vix differens nisi culmo altiori, panicula majori, pedicellis paulo longioribus, hermaphrodito neutrum aequante. *Vaginae* radicales squamiformes, villosulae..

Panicum acuminatum Sw. Radiis fere a basi compositis, (brevi-) jubato-paniculatis (foliis pl. min. dense ovallatis) Radiolisque patentibus; Pedicellis spicula paulo longioribus; Spiculis linea brevioribus, ovalibus, obtusiusculis, brevi-pilosis; Gluma inferiore flosculis 3 — 4 — 5-plo breviori, sub- 3-, superiore 9-nervi; Hermaphrodito obtusiusculo, laevi; Foliis (brevibus) lineari-lanceolatis, viloso-pubescentibus.

Panicum acuminatum. R. et S. II. p. 453.

V. spp. Ind. occ..

Culmus circiter spithameus, decumbens, ramosissimus: ramis brevibus, confertis, subfastigiatis, erecto-foliosissimis. *Vaginae* pl. min. viloso-pubescentes. *Folia* stricta, semi — ultra-pollicaria, inferiora interdum lineas 2 et qu. exc., superiora lineam lata. *Panicula jubalis* pollice pl. min. minor, paupercula, foliis plerumque brevior.

Panicum madagascarens Sprgl. Radiis superne decompositis, paniculatis, patentibus, Radiolis patulis; Pedicellis spicula longioribus; Spiculis sublinealibus, elliptico-ovalibus, acutiusculis, glabris; Gluma inferiore minutissima, superiore 5-nervi; Hermaphroditio acuto, laevi; Foliis linearibus, glabris.

Panicum madagascarens Sprgl. S. V. I. p. 317. Kth. Agr. syn. p. 131. — *P. airoides* Flügg! N. ab Es. Agr. bras. p. 175. — *P. coloratum* Willd. hb. V. sp. Mascaren.

Culmus circiter 2-pedalis, geniculato-adscendens, erecto-ramosus. *Vaginae* inferiores teretes, glabrae. *Ligula* ciliaris. *Folia* strictiuscula, compressa l. plana, lineas 1 — 2 lata, inferiora semipedalia. *Panicula* florens patens et patentissima, spithamea et longior. *Radii* tenuissimi. *Spiculae* ex amethystino viridique variae. *Gluma* inferior vix nisi lenti ope conspicua. *Flosc. neut.* l. masc. 2-valvis: valv. inf. 5-nervis. *Nervi* palearum pertenues.

Panicum hebotes. Radiis pl. min. a basi compositis, jubato-paniculatis Radiolisque patentibus; Pedicellis spicula paulo longioribus; Spiculis parvis (l. vix linealibus), ovalibus, acutiusculis, glabris; Gluma inferiore flosculis subduplo (magisve) breviori, sub-3-, superiore 7-nervi; Hermaphroditio acuto, laevi; Foliis lanceolatis, glabris.

V. spp. Bras.

Habitus aliquantum *P. brevifolii*. — *Culmus* sesqui — bi-pedalis, adscendens? ramulosus, satis tenuis, compressus, pubescens. *Vaginae* pubescentes. *Ligula* brevissima, subciliaris. *Folia* dissita, patentia, lineas 3 — 5-lata, digitata — ultrapalmaria. *Panicula* palmaris et longior, satis tenera. *Axis* comm. Radiorumque crassiores pubescentes. *Radii* aliquot conferti l. solitarii. *Gluma* inferior dimidiata, spiculam interdum paulo excedit; superior flosculis nonnihil brevior. *Flosc. neut.* 2-valvis: valv. inf. 5 — 7-nervis.

Panicum pubescens Mchx. (*Polymorphum*). Radiis a basi compositis l. decompositis, paniculatis Radiolisque pl. min. patentibus; Pedicellis spicula plerumque (paulo multo) longioribus; Spiculis nunc subultralinealibus nunc

linealibus aut parvis, obovatis, obtusis acutiusculisve, pubescentibus; Gluma inferiore flosculis subtriplo quadruplove breviori, 1 — 5-, superiore 7 (— 9-) nervi; Hermaphroditio obtusiusculo (interdum submucronulato), laevi; Foliis lanceolatis l. lanceolato-linearibus, pl. min. pilosis (intimis saepe ovato-lanceolatis, brevioribus, confertis).

a) Spiculis subultralinealibus; culmo simplici l. ramuloso:

α. Foliis lanceolatis, ciliatis nudiusculisve, circiter digitalibus:

Panicum pubescens. R. et S. II. p. 446. Mant. 2. p. 242. Kth. Agr. syn. p. 108. — *P. Enslini* Trin. Diss. II. p. 230. N. ab Es. Agr. bras. p. 227. Kth. Agr. syn. p. 128. sub *P. macro* (an synn?).

(Hujus var. specimen bipedale, foliis spithameis, pollicem lati vaginisque subnudis mis. cel. TORREY s. n. *Pan. nitidi*, *latifolii*. Ipsae spiculae hinc inde nudiusculae).

β. Foliis lanceolato-linearibus, nudiusculis; Pedicellis plerumque longis:

Panicum angustifolium Ell. Schult. Mant. 2. p. 257. — *P. nitidum*, *debile* (gracile?) Torr?

γ. Foliis rigidioribus, angustis, dense pubescentibus:

Panicum villosum Ell? (*P. consanguineum* Kth. Agr. syn. p. 106).

V. omn. varr. spp. Am. bor.

b) Spiculis vix linealibus, parvis l. subminimis:

α. Culmo ramoso:

Panicum lanuginosum Ell. Kth. Agr. syn. p. 107. — *P. velutinum* Bosc. in hb. Willd. — *P. laxiflorum* Lam. R. et S. II. p. 455. Trin. Diss. II. p. 231. Kth. Agr. syn. p. 111. (panicula patentissima). — SPRENGEL mis. s. n. *Pan. villosi* Ell. — *P. nitidum*, no. 5. Torr. ms.

V. spp. Ind. occ. Am. bor.

β. Culmo simplici:

Panicum heterophyllum Bosc. N. ab Es. Agr. bras. p. 227. — *P. ovale* Ell? —

P. discolor Sprgl. Mant. — *P. laxiflorum* Sprgl. in Mém. Petrop. — *P. unciphyllum* Trin. Diss. II. p. 242.

γ. Gluma inferiore flosculis saepissime dimidio tantum breviori:

Panicum leucoblepharis Trin. Diss. II. p. 219. N. ab Es. Agr. bras. p. 229.
(excl. syn. Mühlb.)

V. spp. Am. bor.

Culmus pl. min. pedalis, praecipue in β , α , ramosus, plerumque villis rarioribus densioribus adspersus, rarius glaber. *Vaginae* patenti-villosae, rassisime glabriuscule. *Folia*, quoad pubescentiam variabilia, ubi lanceolata sunt, biplicaria, rarius longiora, communiter lineas 3 lata; ubi linear-lanceolata tantum, spithamea l. fere dodrantalia, lineas vix 2 lata; in α , γ , angusta, margine subinvoluta. *Panicula* circiter 2-pollicaris, rarius major, in α , β et γ subpauciflora. *Axis* comm. cum radiis plerumque villis adspersus. *Spiculae* in α pyriformes, in β magis ovales; interdum non nisi lineam dimidiata longae. *Flosc. neut.* bivalvis: valv. inf. 7-nervis.

Obs. Folia radicalia fere in omnibus varr. breviora et ovato-lanceolata occurunt.

Panicum nitidum LaM. Radiis fere a basi (parum) compositis, paniculatis jubatusve, patentibus, Radiolis patulis; Pedicellis spicula longioribus; Spiculis linealibus l. sublinealibus, elliptico-obovatis, obtusiusculis, glabris; Gluma inferiore flosculis subtriplo breviori, 1-, superiore 7-nervi; Hermaphroditio obtusiusculo, laevi (tenuerrime striatulo); Foliis (linear-) lanceolatis, glabris.

Panicum nitidum. Trin. Diss. II. p. 220. (nec N. ab Es. Agr. Bras. p. 229. nec Kth. Agr. syn. p. 107, cui ex PURSHIO, spiculae pubescentes dicuntur. — Nec, ut videtur, Mchx., R. et S. II. p. 446.) — *P. angustifolium* Trin. Diss. II. p. 234. N. ab Es. Agr. bras. p. 226. — *P. lancearium* Trin. Diss. II. p. 223. (Spiculis magis obovatis, foliis brevioribus).

V. spp. Am. bor.

Culmus pl. min. pedalis, tenuis, erecto-foliifero-ramosus, *Vaginae* fauce tantum minute barbulatae. *Ligula* brevissima, lacera. *Folia* lanceolata l. li-

neari-lanceolata, sesqui — 3-pollicaria: infima (ut praecedentis) interdum ovato-lanceolata, breviora. *Panicula* 2 — 3-pollicaris, lucida. *Spiculae* plerumque purpurascentes. *Flosc. neut.* 2-valvis: valv. inf. 7-nervis.

OBS. Specimina nostra exakte descriptioni LAMARCKI respondent, qui de nodis barbulatis sileat. Attamen exemplum asservo angustifolium, nodis barbulatis, ceterum genuino *nitidum* ex toto si millimum: anne hoc *Pan. barbulatum* Mchx.? — *Pan. nitidum* a *Pan. pubescente* glabritie sola distinguitur.

Panicum verrucosum Mühlenb. Radiis paulo superius compositis, paniculatis, patulis l. pl. min. patentibus, Radiolis contractiusculis; Pedicellis spiculam aequantibus l. eadem paulo longioribus; Spiculis parvis, ovalibus, acutis, verrucosis; Glumis obsolete nervosis l. e-nervibus: inferiore glumis quadruplo breviori; Hermaphrodito mucronato-acuto, laevi; Foliis sublanceolato-linearibus, glabris.

Panicum verrucosum. Trin. Diss. II. p. 235. N. ab Es. Agr. bras. p. 226. — *P. umbrorum* Le Conte? — *P. rugosum* Bosc. ined. — Sub *P. ramuloso* Mchx. (certo alieno) Schult. Mant. 2. p. 243. Kth. Agr. syn. p. 105.
V. spp. Philad.

Culmus debilis, simplex aut ramulosus. *Vaginae* teretiusculae, internodio dimidio breviores. *Ligula* brevissima, ciliaris. *Folia* sesquilineam lata, digitalia et breviora. *Panicula* palmaris — spithamea, lucida. *Radii* subcapillares. *Radioli* pauciflori. *Spiculae* linea breviores, subsuscendo-virides. *Flosculus* neuter 1-valvis.

Panicum chamaelonche. Radius paniculae (minutae) a basi parum compositis Radiolisque (simplicibus) patulis; Pedicellis spicula plerumque longioribus; Spiculis pusillis, ovalibus, obtusiusculis, glabris; Gluma inferiore flosculis subtriplo breviori, 1-, superiore 5-nervi; Hermaphrodito mucronulato, laevi; Foliis linear-lanceolatis, glabris (brevibus).

Panicum chamaelonche Trin. Diss. II. p. 242.

V. spp. Am. bor.

Plantula circiter digitalis, culmo tenuissimo, inferne erecto-ramoso. Folia semipollicularia, inferiora interdum lineam lata, strictiuscula. *Panicula* folio ipsam aequante involucrata, tenera, semipollicularis. *Flosc. neut.* 1-valvis? 5-nervis.

Panicum nodiflorum LaM. Radiis a basi decompositis, paniculatis Radiolisque patulis l. patentibus; Pedicellis spicula multo longioribus; Spiculis pusillis, oblongis, acutiusculis, pubescentibus; Gluma inferiore flosculis subtriplo breviora, enervi, superiore 5-nervi; Hermaphrodito acutiusculo, laevi; Folii linearis-lanceolatis, pubescentibus.

Panicum nodiflorum, N. ab Es. Agr. bras. p. 231. — Sub *P. dichotomo*, R. et S. H. p. 430. — *P. strictum* Bosc! — *P. ramulosum* Mchx.

V. spp. Am. bor.

Culmus spithameus l. vix dodrantalis, subsfiliformis, ramosissimus: ramis floriferis. *Folia* numerosissima, pl. min. semipollicularia aut pollicularia, lineam dimidiata l. lineam lata, omnia subaequalia. *Ligula* longe barbata. *Flosc. neuter* 1-valvis? 5-nervis.

† *Panicum ignoratum Kth.* Radis paniculae (sublinearis) a basi compositis. Radiolisque contractiusculis; Pedicellis spicula longioribus; Spiculis sesquilinealibus, obovato-ellipticis, obtusiusculis, sericeo-pubescentibus; Gluma inferiore nulla, superiore 5-nervi; Hermaphrodito acutiusculo, apice ciliatulo; Folis linearibus, glabris.

Panicum ignoratum Kth. rev. gr. tab. 20. Agr. syn. p. 98.

Phalaris villosa Mchx.

Anthenantia villosa PB.

Aulaxanthus ciliatus Ell.

Aulaxia ciliata Nutt.

Carolina,

Culmus subbipedalis, simplex. *Folia* vix sesquilineam lata, subdodrantalia. *Ligula* ciliaris. *Panicula* 4 — 6-pollicaris, lucidula. *Radii* solitarii, filiformes. *Flosc. masc.* 2-valvis: valv. inf. 5-nervis.

Panicum Monachne. Radiis superius subdecompositis, paniculatis Radiolisque pl. min. patentibus; Pedicellis spicula longioribus; Spiculis linealibus, ovalibus, obtusiusculis, glabris; Gluma inferiore nulla l. minutissima; superiore enervi, Hermaphrodito acuto, laevi; Foliis linearibus, glabris (firmis).

Panicum Monachne Trin. in Sprgl. n. Entd. II. p. 86. Kth. Agr. syn. p. 127.

V. sp. Mascaren.

Culmus pede longior, ramosus. **Vaginae** glabrae. **Ligula** ciliaris. **Folia** inferne plana, superne subinvoluta, subspithamea. **Panicula** spithamea, strictiuscula. **Radius** bini. **Radioli** capillares. **Flosculus** masculus bivalvis: valvula inferior membranacea, enervis. **Flosc. superior** an mere semineus? cartilagineo-chartaceus.

Panicum polycomum. Radiis fere a basi compositis, paniculato-jubatis Radiolisque patentibus; Pedicellis spicula (multo) longioribus; Spiculis pusillis, obovatis, mucronulato-obtusiusculis, glabris; Gluma inferiore flosculis duplo triplove breviori, 3-, superiore (iisdem plerumque paulo breviori) 7-nervi; Hermaphrodito acutiusculo, laevi; Foliis sublinearibus, (junioribus) hirsutis.

V. spp. Guian.

Culmi caespitosi, spithamei — dodrantales, erecti, filiformes, longe plerumque erecto- et paniculifero-ramosi. **Vaginae** hirsutae, rarius glabrae. **Folia** sublanceolato-linearia, medio lineam dimidiata, lineas 6 — 8 longa, pleraque hirsuta, alia (praesertim vetustiora) glabra. **Paniculae** sesquipollicares, lucidae, tenerae. **Radius** plerumque solitarii. **Spiculae** pallide virides. **Flosc. neut.** 1-valvis? 7-nervis.

Panicum radicans Retz. Radiis superius decompositis, paniculatis Radiolisque patentibus; Pedicellis spicula pl. min. longioribus; Spiculis minimis, subrotundis (hinc gibbis), obtusiusculis, glabris; Glumis 3-nervibus: inferiore flosculis subdimidio-, superiore iisdem quartam partem breviori; Hermaphrodito subadunco-mucronato, laevi; Foliis lanceolatis, basin versus ciliatis.

Panicum radicans. R. et S. II. p. 449. N. ab Es. Agr. bras. p. 206. — *P. obliquum* Roth. R. et S. II. p. 433. Mant. 2. p. 232. — *P. multinode* Lam. (R. et S. II. p. 454)? — *P. accrescens* Trin. ic. gr. VIII. t. 88. — *P. patens* Sprgl. S. V. p. 322. (vix Linn. sp. pl. ed. 1.)

V. sp. Nepal.

Culmus procumbens, radicans, florifero-ramosus. *Vaginae* superne ad margines satis longo-pilosae. *Ligula* membranacea, brevis. *Folia* medio lineas 3 — 4 lata; basin versus e glandulis longiuscule ciliata, in pagina inferiore punctulis pusillis, in superiore interdum pilis brevissimis adspersa, sesqui — 3-pollicaria. *Panicula* semipedalis, lucidissima, subpauciflora. *Axis* comm. tenuissimus. *Radii* bini solitariique, basi callosi, cum *Radiolis* capillares. *Spiculae* vix lineam dimidiata longae, e ferrugineo, viridi et fusco variae (in nostro specimine glabrae). *Flosculus* neuter 1 — 2-valvis: valv. inf. 3-nervis.

Panicum commelinæfolium Rudge. Radiis a basi decompositis, paniculatis Radiolisque patentissimis; Pedicellis spicula multo longioribus; Spiculis pusillis, obovato-ovalibus, acutiusculis, glabris; Gluma inferiore minima, superiore 3 — 5-nervi; Hermaphroditio acutiusculo, tenerrime striatulo; Foliis e basi cordata lanceolatis, tenerrime pubescentibus.

Panicum commelinæfolium Rudge. Guian. tab. 28. R. et S. II. p. 435. Kth. Agr. syn. p. 114.

Milium capillare Rottb.

V. spp. Bras.

Culmus 2 — 3-pedalis. *Vaginae* glabrae 1. superne ciliatae. *Folia* lineas 4 — 7 lata, circiter 4-pollicaria, praesertim inferne pubescentia, patentia. *Panicula* pedalis et ultra, diffusissima. *Radii* basi callosi et barbulati. *Radioli* et pedicelli capillares.

Panicum chaetophorum R. et S. Radiis Paniculae (omnium subtilissimæ) superius parce compositis Radiolisque (subsimplicibus, longissime capilliferis) patentibus; Pedicellis spicula multo longioribus; Spiculis subminimis, turbinato-

sabrotundis, superne hirsutis; *Gluma* inferiore flosculis dimidio breviori, 3-, superiore (iisdem paulo breviori) 2- (?) nervi; *Hermaphroditum* (gibbo) oblique mucronato, punctulato; *Foliis* lanceolatis, glabris.

Panicum chaetophorum R. et S. II. p. 884. — *P. setigernm PB!* Fl. d'Oware I. p. 82. tab. 49. (figura minus bona).

V. sp. ex Oware.

Culmus repens, ramis adscendendo-erectis, satis tenuibus. *Nodi* barbulati. *Vaginae* superne et foliorum basis ciliatae. *Folia* medio circiter lineas 4 lata, pl. min. digitalia. *Panicula* pl. min. dodrantalis, rara. *Radii* subsolitarii, delicatissimi, elongati. *Radioli* (s. Pedicelli) inferne ciliato-pilosi, e glandulis pusillis sparsim emittentes pilos praelongos quidem, tamen vix nisi lentis operae distinguendos. *Gluma* superior et *Flosc. neutrius* valv. inf. praesertim superne pilis inaequalibus densiuscule adspersi.

OBS. Pessime a Palisotio comparatur, cum *Pan. fuscobrunte* et *numidianae*, quorum nulla prorsus analogia.

Panicum truncatum N. ab Es. Radis a basi compositis l. subdecompositis, jubato-paniculatis Radiolisque pl. min. patentibus; Pedicellis spicula plerumque (multo) longioribus; Spiculis ultralinealibus, ovato-oblongis, obtusis, glabris; Glumis flosculis plus duplo brevioribus: inferiore 3-, superiore 5 — 7-nervi; Hermaphroditum acutiusculo, laevi; Foliis linearibus (sebris hirsutisve).

Panicum truncatum N. ab Es. Agr. bras. p. 215. (ubi vid. descr.)

V. spp. Bras.

Specimina nostra a descriptione Neesiana quidquam ab ludunt, tamen omnino ejusdem speciei, nec nisi varietas censenda. *Folia* (in nostris) pedalia et stricto-erecta, compressa, explicata lineas 4 lata, utrinque hirsuta. *Spiculae* basi hinc gibbae. *Flosculi masculi* valvula inferior, ut in *Thrasys* Kl., medio longitudinaliter profunde exarata l. subfissa. *Gluma* inferior paulo brevior, flosculis 3 — 4-plo, superior iisdem triplo duplove brevior, utraque truncato-obtusissima.

b) *Gluma inferiore dimidia spicula longiori.* *

a. *Radius subangulosus.*

Panicum rigidifolium. Radiis a basi compositis, in thyrum densum confertis, contractis Pedicellisque brevissimis; Spiculis bilinealibus, ovalibus, acutiusculis, pilis adspersis; Gluma inferiore flosculis parum breviori, 3 — 5-, superiore 5-nervi; Hermaphrodito acutuseculo, laevi; Foliis sublanceolato-linearibus, glabris (rigidis).

Panicum rigidifolium Trin. ic. gr. XVIII. tab. 214. — *Pan. Trinii* Kth. Agr. syn. p. 88.

V. spp. Bras.

Siccum totum fuscescendo-stramineum. *Culmus* ultrapedalis, erectus, simplex, nodis pubescentibus. *Vaginae* cum foliis sulcato-striatae: radicales sericeo-pubescentes, altiores margine tantum pilosulae. *Ligula* dense ciliaris. *Folia* stricto erecta, firmissima, latiora lineas 6 lata, margine saepissime involuta, inferiora dodrantalia. *Thyrsus* cylindraceus, ultrapalmaris, lineas 3 — 4 latus. *Axis* comm. et *glumae* pilis teneris adspersi. *Flosc. neut.* bivalvis: valv. inf. 5-nervis. *Hermaphr.* pedicellatus, saepe apice obsolete barbulatus.

Panicum turgidum Forsk. Radiis a basi compositis, paniculato-alternis Radiolisque patulis; Pedicellis brevissimis brevibusque; Spiculis sesquilinealibus, ovatis ovatisve, acutiusculis, glabris; Glumis flosculos aequantibus: inferiore 5-, superiore 9-nervi; Hermaphrodito (masculo paulo minori) apice subadunco; laevi; Foliis involutis, glabris (brevissimis, pungentibus).

Panicum turgidum. R. et S. II. p. 889. Trin. ic. gr. XIX. tab. 227.

V. spp. Aegypt.

*) Ordo specierum secundum pedicellos, sensim longiores.

Culmus sesquipedalis, decumbens, ramosissimus, subcoriaceus; glaberrimus, cum rel. part. flavendo-pallens. *Vaginae* amplae, ad ramificationes squamiformi-confertissimae. *Ligula* ciliaris, obsoleta. *Panicula* sesquipollucaris — palmaris. *Radii* solitarii. *Radioli* perbreves. *Spiculae* turgidulae, satis distincte nervosae. *Flosc. masc.* 2-valvis: valv. inf. 7 — 9-nervis.

Panicum racemosum Sprgl. Radiis simpliciusculis vel fere a basi subcompositis, alternis, contractis; Pedicellis brevissimis brevibusque; Spiculis ultrabilinealibus, oblongis, obtusis, tomentoso-villosis (turgidis); Gluma inferiore flosculis circiter $\frac{1}{4}$ breviori, 7 — 9-, superiore 13-nervi; Hermaphrodito acuto, laevi; Foliis involutis, glabris.

Panicum racemosum Sprgl. S. V. I. p. 313. N. ab Es. Agr. bras. p. 112. —
P. reptans Kth. rev. gr. tab. 21.

Saccharum reptans Lam.

Monachne racemosa PB. R. et S. II. p. 469.

Eriyolymum junceum DesV.

Thalassium montevidense Sprgl. cur. post. Schult. Mant. 3. p. 551.

V. sp. Bras. merid.

Culmus basi repens, simplex, dodrantalis — pedalis. *Vaginae* brevi-villosae, villis deorsum versis. *Ligula* ciliaris. *Folia* subdisticha, rigidula, palmaria — dodrantalia. *Radii* breves, ob spiculas turgidas dense floriferi. *Glumae* ventricoso-concavae. *Flosc. neut.* l. *masc.* valv. inf. glumae superiori simillima. *Hermaphr.* basin versus ad flexurae angulos pilis aliquot ciliatus.

Panicum demissum. Radiis a basi compositis, jubatis, patentissimis cum Radiolis patulis axique hirto-pubescentibus; Pedicellis brevissimis; Spiculis linealibus, ovalibus, obtusiusculis, glabris; Gluma inferiore flosculis circiter $\frac{1}{4}$ breviori, 5-, superiore 7 — 9-nervi; Hermaphrodito acutiusculo, laevi; Foliis e basi subovata linearis-lanceolatis, glabriusculis.

Panicum demissum Trin. ic. gr. XXVII. tab. 319.

V. spp. Brasil.

Culmus decumbens, spithameus, diffuso-ramosus, pubescendo-pilosus, ad jugam usque vaginis tectus. *Vaginae* subcarinatae, pubescendo-hirtae. *Ligula* ciliaris. *Folia* patentia, subamplectentia, lineas 2 — 3 lata, firma, glabra vel ciliatula, ultra- 1 — 2-pollicaria. *Paniculae* fere bipollicares. *Axis* comm. pubescenti-hirtus. *Radii* bini solitariique, demum refracti. *Radioli* breves, densiuscule floriferi. *Flosc. neut.* 2-valvis: valv. inf. 7-nervis.

Panicum incomtum. Radiis a basi decompositis, subpaniculatis Radiolisque complexo-patentibus et patentissimis; Pedicellis spieula brevioribus; Spiculis linea brevioribus, ovalibus, obtusiusculis, glabris; Gluma inferiore flosculis circiter tertiam partem breviori, 3-, superiore 5-nervi; Hermaphrodito acutiusculo, laevi; Foliis lato-linearibus, glabris.

Panicum incomtum Trin. Diss. II. p. 200. Ic. gr. XX. p. 232. N. ab Es. Agr. bras. p. 207.

V. sp. Manill.

Culmus (abscissus) fortasse bipedalis, infra paniculam puberulus. *Vaginae* glabrae, in extremo apice pubescentes. *Ligula* ciliaris. *Folia* circiter lineas 6 lata, dodrantalia. *Panicula* subjubalis, spithamea, densiuscula, fuscescendo-viridis, implexa. *Axis* comm. pubescens. *Radii* bini ternive conferti, basi subcallosi, inferiores pubescentes. *Radioli* plerumque rectis angulis patentes. *Gluma* superior apice obsolete pubescens. *Flosc. neuter* bivalvis: valv. inferior 5-nervis.

Panicum trinerve. Radiis superius subdecompositis, paniculatis Radiolisque patulis; Pedicellis spicula plerumque brevioribus; Spiculis linea majoribus, ovalibus, acutiusculis, glabris; Glumis 3-nervibus: inferiore flosculis circiter tertiam partem, superiore iisdem paulo breviori; Hermaphrodito (neutrū subexcedente) acutiusculo, laevi; Foliis linearibus, glabris.

Panicum trinerve Trin. ic. gr. XIX. tab. 226. Kth. Agr. syn. p. 101.

V. spp. Bras.

Culmus tripedalis, gracilis, simplex. *Vaginae* glabrae. *Ligula* membranacea, lineam longa. *Folia* erecta, firma et rigidula, asperiuscula, lineas vix 2 lata, pl. min. pedalia. *Panicula* dodrantalis, lucida. *Radii* bini, pertenues, scabri. *Radioli* pauciflori. *Flosc. neut.* bivalvis: valv. inf. 3-nervis.

Panicum ramosissimum. Radiis a basi compositis l. decompositis (pubescentibus), jubatis, patentibus (demum reflexo-patentissimis), Radiolis contractiusculis patentibusve; Pedicellis brevibus spiculamve aequantibus; Spiculis sublinealibus, ovalibus, acutiusculis, glabris; Gluma inferiore dimidia spicula longiori (vel flosculis $\frac{1}{2}$ breviori), 3 — 5-, superiore 7 — 9-nervi; Hermaphrodito acutiusculo, laevi; Foliis lanceolato-linearibus, glabris pilisve adspersis.

Panicum parvifolium γ, 2, N. ab Es. Agr. bras. p. 225.

V. sp. Bras. merid.

Culmus decumbens, dense et contracto-ramosissimus, ramis pedalibus, iterum contracto- et florifero-ramosissimis et foliosissimis, glabris l. pube rariuscula adspersis. *Vaginae* villosulae. *Ligula* ciliaris, villis stipata. *Folia* numerosissima, sesquilineam l. lineas 2 lata, 1 — ultra- bi-pollicaria. *Jubae* numerosae, sesqui- vel sub-tripollicares, lucidissimae, e vagina ramulorum suprema emergentes, folio suo nunc subbreviores nunc longiores. *Flosc. neut.* bivalvis: valv. inf. 7-nervis.

OBS. Habitus *Pan. acuminati* Sw. potius quam *parvifolii*, a quo differt spiculis magis ovalibus, majoribus, 7 — 9-nervibus.

Panicum parvifolium Lam. Radiis a basi compositis decompositisve, jubato-sparsis Radiolisque patentibus; Pedicellis spiculam plerumque aequantibus; Spiculis parvis l. subminimis, oblongis, obtusiusculis, glabris; Gluma inferiore flosculis circiter tertiam partem breviori, 3-, superiore 5-nervi; Hermaphrodito acutiusculo, laevi; Foliis e basi subcordata lanceolatis, pubescentibus glabrisve (parvis).

α . Panicula decomposita, spiculis subminimis, foliis subtus pubescentibus:

Panicum parvifolium. R. et S. II. p. 445. N. ab Es. Agr. bras. p. 224. α . Kth. Agr. syn. p. 109. Trin. ic. gr. XX. tab. 236. — *Pan. brasiliense* Sprgl. S. V. I. p. 321.

V. spp. Bras. Guian.

β . Panicula minori, composita tantum, spiculis parvis, foliis glabris:

an *Panicum granuliferum* Hb. Kth.? Agr. syn. p. 109.

V. spp. Bras.

Culni obliqui vel decumbendo-adscendentis, palmari — *spithamei*, tenues, simplices l. pl. min. ramosi. *Vaginae* glabrae aut marginibus pilosae. *Ligula* ciliaris. *Folia* satis numerosa, lanceolata l. ovato-lanceolata, lineas 1 — 3 lata, 5 — 9 — 12 longa. *Juba* semi — sesqui-pollicaris, ovata, lucidissima. *Radii* plerumque solitarii. *Gluma* superior flosculis nonnihil brevior. *Flosc. neut.* bivalvis: valv. inf. 5-nervis.

Obs. Specimina dantur ad *P. cyanescens* transiuntia, non nisi culmo prestrato et radiis magis angulosis dignoscenda.

Panicum malaccense. (Pusillum.) Radiis a basi compositis, jubatis Radiolisque patentibus; Pedicellis spiculam subaequantibus; Spiculis pusillis, ovalibus, acutiusculis, pubescentibus; Gluma inferiore flosculis paulo breviori, 3-, superiore sub- 5-nervi; Hermaphroditio (neutro paulo minori) obtusiusculo, laevi; Foliis cordato-ovatis, glabris. *

Panicum malaccense Trin. Diss. II. p. 204. N. ab Es. Agr. bras. p. 212.

Agrostis malaccensis Willd. hb.

V. sp. Ind. or.

Culmus repens, basi ramosus, vix 3 — 4-pollicaris. *Vaginae*. praesertim basia versus, hirsutae. *Folia* satis numerosa, lineas 3 — 4 longa, inferiora fere totidem lineas lata. *Juba* semipollicaris, obovata. *Gluma* inferior glabra, decidua. *Flosc. neut.* 1-valvis.

Panicum calvescens N. ab Es. Radiis a basi decompositis, fasciculato-verticillatis Radiolisque pl. min. patentibus; Pedicellis spicula paule longioribus; Spiculis ultralinealibus, elliptico-ovalibus, obtusis, glabris; Gluma inferiore flosculis vix breviori, 3-, superiore 5-nervi; Hermaphrodito (nervis subminori) obtuso, laevi; Foliis sublineari-lanceolatis, adultioribus glabris.

Panicum calvescens N. ab Es! Agr. bras. p. 189. Trin. Diss. II. p. 193. Kth. Agr. syn. p. 123.

V. sp. Bras.

Culmus 1 — 2-pedalis, gracilis, ramulosus, basi radicans. *Turiones* juniores villosi. *Folia* turionum latiora, culmea lineas 5 — 6 lata, 6 — 7-pollicaria, utrinque longe attenuata. *Ligula* brevis, ciliatula. *Panicula* dodrantalis. *Radū* basi barbati, inferiores sesquipalmates, principales s. fortiores semi tereti-angulosi, tenuiores filiformes. *Radioli* capillares. *Spiculae* flavescentes. *Flosc.* neut. bivalvis: valv. inf. obsolete 5-nervis.

Panicum rupestre. Radiis a basi aut sere a basi compositis, jubato-paniculatis Radiolisque patentibus; Pedicellis spicula (plerumque multo) longioribus; Spiculis linealibus, oblongis, obtusiusculis, pubescentibus; Gluma inferiore flosculis quartam tertiamve partem breviori, 3 — 5-, superiore 5-nervi; Hermaphrodito acuto, laevi; Foliis involutis, glabris pubescentibusve (strictis).

Panicum rupestre Trin. Diss. II. p. 109. Ic. gr. XX. tab. 259. N. ab Es. Agr. bras. p. 222.

V. spp. Bras.

Culmus dodrantalis — sesquipedalis, erectus, strictus, simplex aut contracto-ramosus. *Vaginae* teretes, glabrae, rarius cum foliis pilosae. *Ligula* in planta glabra membranacea, brevissima, in pilosa ciliaris. *Folia* subuliformi-involuta, erecta, subpungentia, 2 — 4-pollicaria (fasciculorum longiora). *Panicula* ovata, patens, circiter palmaris. *Radī* solitarii binive, basi barbati, tenuissimi. *Fosc.* neut. bivalvis: valv. inf. 5-nervis.

Panicum glutinosum Sw. Radiis (compresso-teretiusculis) superne compositis, paniculatis Radiolisque patentibus; Pedicellis spicula (pleremque multo) longioribus; Spiculis ultralinealibus, obovatis, obtusiusculis, glutinosis; Gluma inferiore flosculis vix breviori, 5-, superiore 7 — 9-nervi; Hermaphrodito apice obsolete pubescente; Foliis e basi ovata lanceolatis, glabris.

Panicum glutinosum. R. et S. II. p. 154. (excell. synn.) N. ab Es. Agr. bras. p. 202. (excell. synn. LaM., Hb. et Kth. et Meyeri, ad *Pan. latifolium L.* referendis.)

V. spp. Bras.

Culmus 3 — 6-pedalis, subsimplex. *Folia* pl. min. pollicem lata, spithamea — pedalia. *Panicula* pedalis, lucidissima. *Radii* basi brevi-barbati, distantes: inferiores verticillati, elongati (sere fastigiati), superiores hini l. solitarii. *Radioi* tenuissimi, flexuosi, 2 — 3-flori, 1 — 1½-pollicares. *Flosc. neuter* bivalvis: valv. inf. 5-nervis.

β. *Radiis teretibus.*

Panicum procurrens N. ab Es. Radiis medio brevi- et contracto-compositis, apice unifloris, paniculatis, patulis; Pedicellis brevissimis; Spiculis sesquilinealibus, ovalibus, acutiusculis, superne hirsutis; Gluma inferiore flosculis circ. tertiam partem breviori, 3-, superiore 5-nervi; Hermaphrodito (neuto breviori) obtusiusculo, laevi; Foliis sublanceolato-linearibus, hirsutis.

Panicum procurrens N. ab Es! Agr. bras. p. 130. Trin. ic. gr. XIX. p. 224.

Echinolaena? procurrens Kth. Agr. syn. p. 173.

V. spp. Bras.

Culmus pl. min. pedalis, prostratus, tenuis, versus medium interdum pubescens, inferne ramosulus. *Vaginae* e glandulis pilosae. *Ligula* ciliaris. *Folia* lineas 2 lata, ultrapollicaria, laete viridia. *Panicula* pl. min. pollicaris. *Axis* comm. tenuis, patenti-pilosus. *Radioi* tenuissimi. *Glumae* superne et e nervis

lateralibus hirsutae. *Flosc. masc.* bivalvis: valv. inf. 5-nervis. *Hermaphr.* brevissime pedicellatus.

Panicum hirtum Lam. Radiis simpliciusculis l. basi subcompositis, jubatis, patentibus, Radiolis (Pedicellis, spicula plerumque longioribus) contractiusculis patulisve; Spiculis minimis, (plerumque superne gibbo-) ovalibus, acutiusculis, hirsutis (cernuis); Glumis flosculos aequantibus: inferiore 3-, superiore 7-nervi; Hermaphrodito (neutro paulo minori) apice adusco, laevi; Foliis cordato-lanceolatis, basi ciliatis.

Panicum hirtum. R. et S. II. p. 456. N. ab Es. Agr. bras. p. 208. Kth. rev. gr. tab. 24. Agr. syn. p. 111.

V. spp. Bras.

Culmus pl. min. pedalis, basi repens, ramosus, nodis barbatis. *Vaginæ* pilosae. *Ligula* ciliaris. *Folia* lineas 5 — 6 lata, 1 — 2-pollicaria. *Paniculae* pl. min. 2-pollicares, lucidae. *Axis comm.* piliferus. *Radii* dissite subracemiflorae. *Gluma* inferior interdum glabra, superior subcucullata, e glandulis pusillis hirsuta. *Flosc. neut.* bivalvis: valv. inf. 5-nervis.

Panicum tumescens. Radiis a basi l. paulo altius compositis, paniculatis Radiolis que patulis hisve contractis; Pedicellis spiculam aequantibus l. eadem paulo longioribus; Spiculis circiter 3-linealibus, sublanceolato-ovalibus, acutis, glabris; Glumis flosculos aequantibus l. subsuperantibus, 7-nervibus; Hermaphrodito (neutro paulo minori) obtusiusculo, laevi; Foliis compressis, e basi cordata latinsculo-linearibus, margine ciliatulis.

V. spp. Bras.

Culmus pl. min. bipedalis, patulo-ramosulus. *Vaginæ* lanceolato-ampliatae (medio tumentes), carinato-compressae, glabrae aut margine ciliatulae. *Ligula* margo angustissimus, ciliolatus. *Folia* amplectentia, carinato-compressa et in hoc statu lineas 3 — 4 lata, 4 — 8-pollicaria. *Panicula* 3 — 4-pollicaris, lucidula, spadiceo-fuscescens. *Axis comm.* tenuis. *Radii* solitarii l. aliquot

fasciculato-semiverticillati, tenuissimi. *Radix* plerumque biflori. *Flosc.* neut. bivalvis: valv. inf. sub- 7-nervis.

Panicum longiflorum. Radiis simpliciusculis, superne floriferis aut fere a basi parce compositis, paniculatis, contractiusculis; Pedicellis spiculam aequantibus vel eadem paulo longioribus; Spiculis 4-linealibus, lanceolato-ovalibus, acutiusculis, viloso-marginatis; Glumis flosculos aequantibus: inferiore (latiori) 7 — 9-, superiore 5-nervi; Hern aphrodito acuto, laevi; Foliis linearibus, glabris l. basin versus villositis.

V. spp. Bras.

Culmus basi subbulboso-tumens et squamatus, circiter tripedalis, gracilis, simplex, nodis glabris. *Vaginæ* compressae, radicales confertae: aliae molliter villosae, aliae glabrae. *Ligula* ciliaris. *Folia* erecta et rigidula, compressa, explanata sesquilineam lata, lacte viidia: inferiora dodrante longiora. *Panicula* spithama brevior, contractiuscula. *Radix* semiverticillati, pertenues, simpliciores apicem versus 2 — 3-flori. *Radioli* capillares. *Spiculae* virides. *Glumae* membranaceo-marginatae, utraque aut superior sola circumcirca ad nervum marginalem subamethysteo-villosa. *Flosc. masc.* bivalvis: valv. inf. 5-nervis, viloso-marginata. *Hermaphr.* lanceolatus, subchartaceus, pallens.

Obs. Habitū quodammodo accedit ad *P. aturense* Hb. Kth.

Panicum arnacites. Radiis simpliciusculis l. pl. min. a basi parce compositis, paniculato-alternis Radiolisque (Pedicellis, spicula longioribus) contorto-patentibus; Spiculis bilinealibus, ellipticis, obtusis, lanatis; Gluma inferiore flosculis circiter tertiam partem breviori, 3 — 5-, superiore 5-nervi; Hermaphrodito (sæpe adunco-) acuto, laevi; Foliis angustissimis, canaliculato-subinvolutis, inferioribus pilosis.

Panicum arnacites Trin. ic. gr. XXVII. tab. 317.

V. spp. Bras.

Culmus ultrapedalis, erectus, tenuissimus, simplex, nodis barbatis. *Vaginae* radicales squamiformes, culmeae inferiores pilosae. *Ligula* ciliaris, utrinque membranaceo-aurita. *Folia* erecta, rigidula, fasciculorum fere spithamea, culmea superiora brevissima. *Panicula* 2 — 3-pollicaris, laevidissima. *Radii* alii patentes, alii contracti, solitarii, capillares. *Radioli* simplicissimi (Pedicelli) 2 — 4, tortuosi, apice clavati. *Spiculae* deciduae. *Flosculus* masc. l. neut. 2-valvis: valv. inf. 5 — 7-nervis.

Panicum auricomum N. ab Es. Radiis superius subdecompositis, (tenero-) paniculatis Radiolisque patulis; Pedicellis spicula longioribus; Spiculis minimis, ellipticis, acutiusculis, hirtulo-pubescentibus; Gluma inferiore flosculis $\frac{1}{4}$ breviori, 3-, superiore 5-nervi; Hermaphrodito mucronato, laevi; Foliis angustissimo-linearibus, glabris.

Panicum auricomum N. ab Es! Agr. bras. p. 221.

V. sp. Bras.

Culmus pedalis, tenuis, medio contracto- et florifero-ramosus. *Vaginae* glabrae. *Ligula* brevis, membranacea, villis cincta. *Folia* 1 — ultra- bi- pollicaria. *Panicula* e vagina suprema prodit 1 — sesqui-pollicaris, subcapillaris, lucida, fulvescens. *Flosc. masc. l. neut.* bivalvis: valv. inf. 5-nervis.

Panicum subulatum Sprgl. Radiis nunc simpliciusculis, nunc fere a basi compositis l. decompositis, paniculato-alternis sparsive, cum Radiolis pl. min. patentibus; Pedicellis spicula longioribus; Spiculis parvis, subrotundo-ovalibus, obtusis, glabris (interdum puberulis); Gluma inferiore flosculis pl. min. tertiam partem breviori, 3-, superiore 5-nervi; Hermaphrodito subadunco, laevi; Foliis linearibus, saepissime setaceo-involutis, glabris.

Panicum subulatum Sprgl. S. V. I. p. 319. Kth. Agr. syn. p. 129. — *Pan. stenocladum* Trin. Diss. II. p. 200. Ic. gr. XX. tab. 240. — *P. distichophyllum* N. ab Es. Agr. br. p. 234. — *P. setifolium* N. ab Es. l. l. p. 233. (var. spiculis pubescentibus).

Aira distichophylla Sprgl! nov. prov. Schult. Mant. 2. p. 379.

V. spp. Bras.

Culmus sesquipedalis, adscendens, plurinodis: latifolius minus-, tenuifolius magis et a basi sensim ramosior, superne ramosissimus: ramis contractis, subfastigiatis, floriferis. *Vaginae* glabrae. *Ligula* nil nisi margo angustissimus. *Folia* copiosissima, nunc setaceo-involuta, nunc plana et lineam 1 — 1½ lata, 1 — 2-pollicaria vel parum longiora. *Paniculae* satis tenerae, lucidae, in gramine angustifolio 1 — sesqui-, in latifolio (longius exsertae) 3-pollicares. *Radii* tenuissimi, longe plerumque solitarii, in planta angustifolia simpliciores. *Spiculae* linea dimidia pl. min. longiores. *Flosc. neut.* 2-valvis: valv. interior 5-nervis.

Panicum cyanescens N. ab Es. Radiis (inferioribus) pl. min. superius compositis, iubatis. Radiolisque nunc patentibus nunc contractis; Pedicellis spicula (plerumque multo) longioribus; Spiculis parvis l. subminimis, subrotundo-oblongis, obtusis obtusiusculisve, glabris; Gluma inferiore floreulis circiter tertiam partem breviori, 3-, superiore 5-nervi; Hermaphroditio acutiusculo, laevi; Foliis lineari-lanceolatis (l. lanceolato-linearibus), glabris vel pubescentibus.

Panicum cyanescens N. ab Es! Agr. bras. p. 220. Trin. ic. gr. XX. t. 250.

V. spp. Bras.

(Varietates notabiles: α , Panicula patente, lucida, β Panicula contracta, satis densa, γ Foliis subhirsuto-pubescentibus).

Culmus pedalis, erectus? simplex vel contracto-ramosulus. *Vaginae* glabrae, in var. γ pilosulae. *Ligula* membranacea, brevissima, interdum obsoleta. *Folia* erecta, lineas 2 — 4-lata, sesqui — ultra- 3-pollicaria, rigida et firma. *Juba* in α et γ patens, 3-pollicaris, in β linearis-contracta (radiolis non nisi aliquot patentibus productis), vix 2-pollicaris. *Radii* tenuissimi, solitarii l. aliquot conserui. *Flosc. neut.* 2-valvis: valv. inf. 5-nervis.

Obs. Affinitas magna *Panici purifolii*, a quo differt culmum cum reliquis partibus robustiore, Folium non nisi versus culni basin numerosis, longioribus, Radiis magis filiformibus.

XI. I c h n a n t h u s.*

Panicum nemorosum Sw.! Radiis simpliciusculis (brevibus, paucifloris); Spiculis pl. min. brevipedicellatis, sesquilinealibus, ovalibus, acutis, glabris; Glumis trinervibus: inferiore flosculis parum breviori; Hermaphrodito masculo quartam partem minori, laevi, basi utrinque scrobiculato; Appendicibus nullis; Foliis ovali-lanceolatis, glabriusculis.

Panicum nemorosum. R. et S. II. p. 439. Trin. ic. gr. XVIII. tab. 210.

Milium nemorosum Mönch.

Echinolaena nemorosa Kth. Agr. syn. p. 172.

V. spp. Ind. occ.

Culmus decumbens, 1 — 2-pedalis, ramosus. *Vaginae* pilis teneris adspersae, ciliatae. *Folia* medio lineas 6 lata, sesqui — bi-pollicaria, praesertim supra pilis rariusculis e tuberculis pusillis enatis adspersa. *Spiculae* compres-siusculae. *Gluma* inferior acuminata, superior superne ad carinam denticulata. *Flosc. masc.* rarius pistillum foveat.

Panicum pallens Sw.! Radiis compositis; Spiculis pl. min. aequaliter brevi-vel longiusculo-pedicellatis, subsesqui — ultra- bilinealibus, dum clausae sunt lanceolato-ovalibus et acuminatis, glabris; Gluma inferiore (saepe caudata) flosculis circiter quartam partem breviori (aut cauda, si adest, iisdem longiori), 5-, superiore (flosculos superante) 5 — 7 nervi; Hermaphrodito neutro quartam partem minori, laevi, basi utrinque scrobiculato; Appen-dicibus nullis; Foliis ovato-lanceolatis l. lanceolatis tantum, glabris.

Panicum pallens. R. et S. II. p. 443. Trin. Diss. II. p. 174. (excell. varr. ♂ et ♀).

Kth. Agr. syn. p. 89.

Apluda Zeugites Aubl.

*) Species recensitae secundum longitudinem appendiculum (in prioribus speciebus nullarum).

α . Culmo pl. min. pedali, Spiculis subsesquilinealibus, Gluma inferiore acutissima l. acuminata flosculo incompleto breviori, Foliis latioribus: Trin. ic. gr. XVIII. tab. 211.

V. spp. Ind. occ. Guian.

β . Spiculis ultrabilinealibus, laxioribus; Gluma inferiore caudulata, Foliis angustioribus: Trin. l. l. tab. 212. A.

V. spp. Bras.

γ . Culmo 4 — 6-pedali; Spiculis subultra- bi-linealibus, Cauda glumae inferioris flosculum incompl. aequante l. superante, Foliis magis lanceolatis, paulo longioribus.

V. spp. Bras.

Culmus repens, ramosus. *Vaginae* ciliatae. *Ligula* brevis, lacero-ciliaris. *Folia* numerosa, basi ovata l. subcordata amplectentia, medio lineas 4 — 12 lata, 2 — 5-pollicaria. *Juba* 2 — 4-pollicaris. *Flosc.* *inferior* masculus vel neuter.

OBS. Specimen vidi, (nisi fallor, ex Ind. occ.), quoad inflorescentiam et spiculas *pallenti* soli adnumerandum, sed vaginis foliisque hirsutis.

Panicum candicans N. ab Es. Radiis (subracemiformibus) compositis (cum axi pubescentibus); Spiculis aequaliter pl. min. brevipedicellatis, bilinealibus, dum clausae sunt lanceolatis et acuminatis, ad glumas superne hirsutis; Glumis (superiore saltem) flosculos excedentibus: inferiore 3 — 5-, superiore 5-nervi; Hermaphrodito neutro paulo minori, laevi, basi utrinque scrobiculato; Appendicibus nullis vel brevibus et angustissimis; Foliis lanceolatis, pubescentibus.

Panicum candicans N. ab Es! Agr. bras. p. 133. (an syn. Bert. et Radd.? — *P. pallens* δ , Trin. Diss. II. p. 176. Ic. gr. XVIII. tab. 212. fig. B.

Sub *Echinolaena?* *loliacea*, Kth. Agr. syn. p. 173.

V. spp. Bras.

Culmus ramosus, superne puberulus. *Vaginae* pubescentes. *Ligula* membranacea, brevissima. *Folia* satis numerosa, lineas 4 — 6 lata, sub- 3 — 4-pollicaria. *Panicula* circiter 4-pollicaris.

Panicum planotis. Radiis compositis, (cum axi Radiolisque pubescentibus); Spiculis parum inaequali-brevipedicellatis, bilinealibus, ovalibus, acutiusculis aut obtusiusculis, glabris l. (plerumque) pilis adspersis; Gluma inferiore flosculis dimidio breviori, 3-, superiore 5-nervi; Hermaphrodito masculum subaequante, laevi; Appendicibus aut nullis aut floscalo quadruplo duplōve brevioribus; Foliis lanceolatis, glabris l. (subtus) pubescentibus.

- α. *Panicula* subdodrantali, Radiis solitariis, Spiculis apice tomentoso-barbulatis; Append. nullis, Foliis utrinque (praesertim subtus) pilosulo-pubescentibus.
- β. *Panicula* subdodrantali, Radiis congesto-subverticillatis, Glumis pilis adspersis, Append. hermaphrodito quadruplo brevioribus, Foliis glabris aut infra tenuissime pubescentibus.
- γ. *Panicula* brevi, Radiis solitariis, Spiculis apice tantum pilosis, Append. hermaphrodito dimidio minoribus, Foliis utrinque rariusculo-piliferis.

V. spp. Bras.

Culmus sesqui — 2-pedalis, erectus? pl. min. ramosus, pubescens. *Vaginae* undique pilosulo-pubescentes. *Ligula* ciliaris. *Folia* lineas 6 — 8 lata, 4 — 6-pollicaria. *Axis*, *Radii*, *Radiolique* pl. min. molliter s. villosulo-pubescentes.

Panicum inconstans. Radiis simpliciusculis compositis; Spiculis parum inaequali-brevi- l. breviusculi pedicellatis, 2-linealibus, dum clausae sunt ovalibus et acutis, glabris; Gluma inferiore flosculis pl. min. tertiam partem breviori, 3 — 5-, superiore 5-nervi; Hermaphrodito neutro vix vel parum minori, laevi; Appendicibus brevissimis; Foliis linear-lanceolatis, glabris l. infra pubescentibus.

Panicum inconstans *Trin.* ap. N. ab Es. Agr. bras. p. 132. — *P. pallens* 5, *Trin.* Diss. II. p. 176.

α. dumetorum: Culmo 4-pedali, florifero-ramoso et foliosissimo, Radiis simpliciusculis. (Trin. ic. gr. XXVII. tab. 320).

β. montanum: Culmo circiter 2-pedali, subramoso, Radiis distinctius compositis. (Trin. l. l. tab. 321).

V. spp. Bras.

Vaginae juniores (et in β radicales) pubescentes, adultae glabrae. *Ligula* membranacea, brevissima, ciliata. *Folia* in α ramorum plurima, lineas 2—4-, in β lineas 6 lata, in α pollices 1—2, in β poll. 3—5 longa. *Panicula* in α ultrabipollicularis, in β interdum spithamea. *Gluma* inferior in uno eodemque radio inconstans: nunc obtusiuscula, nunc acuminata; flosculis modo tertiam quartamve partem vel parum tantum, modo duplo brevior.

Panicum bambusiflorum. Radiis compositis l. decompositis; Spiculis confertis, subaequaliter brevissime pedicellatis, subultrabilinealibus, dum clausae sunt ovalibus et acutiusculis, superne hirsutis glabrisve; Glumis aut 5-nervibus, aut inferiore (caudulata) flosculis vix l. parum breviori, 3—5-superiore 5—7-nervi; Hermaphrodito neutrum l. masculum subaequante vel eodem parum minori, laevi; Appendicibus brevissimis; Foliis lanceolatis, utrinque asperis.

Panicum bambusiflorum Trin. Diss. II. p. 188. — *P. penicillatum* N. ab Es. Agr. bras. p. 145. Kth. Agr. syn. p. 102.

Oplismenus? *penicillatus* Kth. rev. gr. p. 45.

V. spp. Bras.

Priori robustius. *Culmus* 4—6-pedalis, erectus, superne ramosus. *Vaginae* glabrae. *Ligula* membranacea, brevissima, crenulata. *Folia* lineas 8—12 lata, palmaria — dodrantalia, graminis fuscescentis infra pruinosa-glaucia. *Juba* palmaris — dodratalis, interdum patentissima, in varietate viridi et spiculis glabris densior magisque contracta.

Obs. Nomen *P. penicillati*, in Agr. bras. ter proveniens (p. 144. 145. 212), melius supprimendum.

Panicum Hoffmannseggii R. et S. Radiis decompositis (Radiolisque hirsutissimis); Spiculis in α laxis, longo-, in β brevi-pedicellatis, linealibus vel sesqui-linealibus, ovalibus, pl. min. acutis, patenti-pilosis; Glumis flosculos subaequantibus vel inferiore iisdem paulo breviori, 3-, superiore 5-nervi; Hermaphrodito neutro paulo vel quartam partem minori, laevi; Appendicibus ipso triplo quadruplove brevioribus; Foliis lanceolatis, praesertim infra pubescentibus.

Panicum Hoffmannseggii R. et S. II. p. 450. — *Pan. villosum Hoffmannseg-* ined.

- α . Culmo pedali, Radiis pertenuibus, superne compositis, Spiculis linealibus.
- β . Culmo sesquipalmari, Radiis crassioribus, a basi compositis, Spiculis sesquilinealibus. (Trin. ic. gr. XIX. tab. 219).

V. spp. Bras.

Culmus a basi florifero-ramosus, ramis in α iterum floribundo-ramosis, in β simplicioribus et simpliciter paniculiferis. *Vaginae* in α patenti-villosae, in β pubescentes. *Folia* lineas 3 — 5 lata, pollices 1 — $2\frac{1}{2}$ longa. *Paniculae* axillares et terminales (in β terminales tantum), palmares — spithameae. *Radix* in α plerumque plures subverticillato-conseriti, in β magis solitarii et manifestius angulosi.

Panicum lejocarpum (Sprgl.) N. ab Es. Radiis compositis; Spiculis laxis, altera brevius altera longo-pedicellata, bilinealibus, dum clausae sunt ovalibus et acutis, glabris; Gluma inferiore flosculis tertiam partem l. subdimidio breviori, 3-, superiore 5-nervi; Hermaphrodito neutro paulo minori, laevi; Appendicibus ipso tri-quadruplove brevioribus; Foliis lanceolatis, praesertim subtus pilosulo-pubescentibus (Vaginis mollissime denseque lanatis).

Panicum lejocarpum Spreng. S. V. p. 317? N. ab Es. Agr. bras. p. 147.

Navicularia lanata Raddi Agr. bras. p. 40.

Ichnanthus lejocarpus Kth. Agr. syn. p. 135. (an rev. gr. tab. 168?)

V. spp. Bras.

Culmus (in nostris) basi repens, ramis obliquis l. erectis, 1 — 2-pedalibus. *Folia* (in nostris) pollicem dimidium (pollicem *Nees*) lata, pollices 3 (8, *Nees*) longa, superne pilis raris adspersa, inferne densius et appresso-molliterque (sed tenuissime) villosula. *Panicula* dodrantalis — ultrapedalis. Saepe *Axis* et interdum etiam *radii* villosulo-pubescentes, hi basi barbati. .

OBS. a *Panici Martiani* varietate vaginis totis lanatis diversum spiculis acutis, hermaphrodito neutrō manifeste breviori.

Panicum cynotis. Radiis (tenuibus) compositis; Spiculis laxiusculis, altera brevius altera paulo longius pedicellata, sesqui-l. subbilinealibus, dum clausae sunt ovalibus et acuminatis, glabris; Gluma inferiore flosculis circiter quartam partem breviori, 3-, superiore (eosdem subexcedente) 5-nervi; Hermaphrodito neutrō paulo minori, laevi; Appendicibus ipso triplo brevioribus; Foliis lanceolatis, glabris.

V. spp. Bras.

Culmus circiter sesquipedalis, decumbens, inferne radicans, exceptis vaginis aliquot infimis e reliquis omnibus pedunculos exserens, pertenues, laxos, superne floriferos. *Vaginae* inferiores totae, superiores margine pubescentes. *Folia* lineas 4 — 5 lata, sesqui — 3-pollicaria. *Panicula* 2 — 3-pollicaris. *Radioli* breves, plerumque biflori. *Gluma* inferior caudulata.

Panicum Martianum N. ab Es. Radiis compositis; Spiculis laxis, altera brevi-altera longe pedicellata, bilinealibus, dum clausae sunt linear-ovalibus, obtusiusculis (rarius acutis), glabris; Gluma inferiore flosculis tertiam quartamve partem breviori, 3-, superiore 5-nervi; Hermaphrodito masculum aequante (nec nisi in spiculis acutis eo paulo minori), laevi; Appendicibus ipso triplo l. plus dimidio brevioribus; Foliis lanceolatis l. lanceolato-ovatis vaginisque glabris, illisve obsolete pubescentibus, his (villoso-) ciliatis, rarius totis tomentoso-lanatis.

Panicum Martianum N. ab Es. Agr. bras. p. 138. — *P. almadense N. Es. ms.* Trin. Diss. II. p. 186. Ic. gr. XIX. t. 217. — *P. lejocarpum Sprgl.* ms. —

P. nemorale Schrad. Schult. Mant. 2. p. 255. Kth. Agr. syn. p. 129. —

P. naviculare N. ab Es. Agr. bras. p. 136.

Navicularia glabra Radd. Agr. bras. p. 39.

Ichnanthus almadensis Kth. Agr. syn. p. 135. — *I. lejocarpus* Kth. rev. gr. tab. 168? (huc potius spectat quam ad *P. lejocarpum*).

V. spp. Bras.

Culmus 1 — 3 — 5-pedalis, erectus vel adscendens, saepe inferne ramosus. *Ligula* nunc perbrevi- nunc longius biaurita. *Folia* pro plantae statura pollices nunc vix dimidium, nunc 1 l. $1\frac{1}{2}$, nunc 2 lata, palmaria — ultra-dodrantalia. *Panicula* palmaris — pedalis. *Radii* bini, terni l. solitarii. *Radioi* fere pollicares, pl. min. patentes. *Spiculae* in radiolis paucae, inferiores saepe abortientes. — Cf. Obs. sub *P. lejocarpo*.

Panicum lagotis. Radiis simpliciusculis l. parce compositis; Spiculis laxis, altera perbrevi- altera longius pedicellata, trilinealibus, dum clausae sunt linearioribus, acutis, glabris; Gluma inferiore flosculis dimidio breviori, 3-, superiore 5 — 7-nervi; Hermaphrodito neutrum subaequante, laevi; Appendicibus ipso dimidio brevioribus; Foliis lanceolato-ovatis, glabris.

V. spp. Bras.

Culmus erectus? bipedalis, simplex l. ramosus. *Vaginae* ciliatae. *Ligula* ciliaris. *Folia* lineas 9 — 20 lata, 3 — 4-pollicaria. *Pedunculi* terminales vel e vaginis superioribus axillares cum axi radiisque (hi tamen minus) pubescentes. *Panicula* simplex, subdepauperata.

Panicum Ichnanthus N. ab Es. Radiis subcompositis; Spiculis laxiusculis, inferioribus parum inaequali- brevi-pedicellatis, 4-linealibus, dum clausae sunt lanceolato-ovalibus, subacuminatis, glabris; Gluma inferiore flosculis circ. tertiam partem breviori, 7 — 9-, superiore 9 — 11-nervi; Hermaphrodito neutrum subaequante, villoso; Appendicibus dimidio flosculo longioribus; Foliis ovalibus, glabris.

— *Panicum Ichnanthus N. ab Es. Agr. bras. p. 149.*

Ichnanthus panicoides PB. Kth. Agr. syn. p. 135. Rev. gr. tab. 34.

V. sp. Guian.

Culmus 2-pedalis? simplex, puberulus. *Vaginae* glabrae vel puberulae. *Ligula* brevissima, membranacea, lacera. *Folia* pollices $1\frac{1}{2}$ — 2 lata, pollices 3 — 6 longa, reticulata. *Juba* palmaris — spithamea. *Hermaphr.* praecipue inferne apiceque villosulus. *Flosculi neutr.* valv. inf. 7-nervis.

Obs. Lodiculae squamas genuinas in omnibus, quotquot examinavi, spiculis eodem, quo in reliquis Panici speciebus, loco collocatas, eademque, qua in illis, forma inveni; numquam autem, ut cel. KUNTHIO dicuntur et depinguntur, *externas*. Plantam nostram vero exacte eandem esse ac Kunthianam, nullum dubium est. — Appendices hermaphroditæ fronti adpressas, in hac specie et sequente maximas, non possumus quin cum PALISOTIO pro flosculo vel flosculis abortivis habeamus; quod vel ob squamulam pusillam, basi obliquae stipiti s. pedicelli Hermaphroditæ ita quidem adnatant, ut non nisi extremo apice (emarginato) libera extet, judicare fas est, quippe quam squamulam fasciculi palearum amorphi, e lateribus Hermaphroditæ torosi excurrentis, paleam tertiam sistere censere licet. Pingue enim et carnosum hermaphroditæ Panicorum corpus materia florali, in Ichnanthis tandem imperfecto modo expansa, utique praegnare, non solum appendicibus illis, sed etiam villis hermaphroditum Panici Ichnanthi obtentibus, in aliis autem hujus subdivisionis speciebus scrobiculis probatur, qui, marginem valvulae coriaceae excavantes, receptacula (ut v. gr. in Stenotaphro) pro flosculis exserendis sistunt.

Panicum Riedelii. Radiis compositis; Spiculis laxiusculis, altera brevi- altera longius pedicellata, lineas 2 cum dimidia longis, dum clausae sunt linear-ovalibus, obtusiusculis, glabris; Glumis 7-nervibus: inferiore flosculis parum vel fere tertiam partem breviori; Hermaphroditæ neutrum aequante, laevi; Appendicibus ipso tertiam quartamve partem (interdum vix) brevioribus; Foliis (petiolatis) lanceolatis, glabris.

Panicum Riedelii Trin. ic. gr. XXVII. tab. 323.

V. spp. Bras.

Culmus cum juba fere sesquipedalis, erectus, simplex, compressus, nodis villosis. *Vaginae* inferiores plerumque dense canescendo-villosae, reliquæ glabrae l. marginem versus villosulae. *Ligula* satis longe ciliaris. *Folia* in pe-

tiolum attenuata compressum, saepe semi — 1-pollicarem, graminis debilioris lineas 3 — 4, vegetoris 7 — 9 lata: radicalia pollices 2 — 4, superiora poll. 5 — 6 longa. *Juba* interdum dimidium culmi partem occupans, in gramine debiliori brevior. *Radii* in planta latifolia stricto-erecti, contracti et fortiores, in angustifolia debiliores, laxiores. *Glumae* interdum basi et e marginibus pilo uno alterove munitae.

XII. I s a c h n e.

a) *Flosculo utroque glabro.*

Panicum antipodum Sprgl. Jubae (2 — 3-pollicaris) radiis teretiusculis; Pedicellis spicula plerumque paulo longioribus; Spiculis linealibus, obovatis l. obovato-subrotundis; Glumis laeviusculis l. superne substrigilosо-asperis; Flosculo utroque glabro; Foliis lanceolato-linearibus, asperis.

a. Pallidum, glaucescens, Glamis laevibus l. parum exasperatis:

Panicum antipodum Sprgl. S. V. I. p. 314.

Isachne australis Br. R. et S. II. p. 476.

V. spp. nov. Holl.

β. Atrovirens, glumis asperioribus, saepe superne strigilosо:

Panicum atrovirens Trin. in Sprgle n. Entd. II. p. 88. Kth. Agr. syn. p. 127.

Isachne atrovirens Trin. Diss. II. p. 251.

Aira ischaemoides Koen. in hb. Banks.

V. sp. Ind. or.

Culmus ultrapedalis, pl. min. ramosus. *Vaginae* superne ciliatulae. *Ligula* ciliata. *Folia* lineas 2 — 3 lata; sesqui — 3 — 4-pollicaria. *Radii* solitarii binive, non longe supra basin compositi. *Flosculus* superior in gramine indicо hermaphroditus. *Glumae* obsolete 7-nerves.

Panicum rigens Sw. Jubae (sesqui — 2-pollicaris) radiis angulatis, rigidis pedicellisque brevibus; Spiculis parvis, obovatis; Glumis superne sub lente strigilosis; Flosculo utroque glabro; Foliis (sublanceolato-) linearibus, laeviusculis (distichis, rigidis).

Panicum rigens. R. et S. II. p. 439. Kth. Agr. syn. p. 111.

Isachne rigens Trin. Diss. II. p. 252.

V. spp. Martin. (Sieb. Herb. Mart. no. 265.)

Gramen nostrum a descriptione Swartzii et definitione Kunthii aliquantum discrepat. *Culmus* prostratus, pl. min. pedalis, ramosus. *Vaginae* superne ciliatae. *Ligula* brevissima, ciliaris. *Folia* sub-semiamplexicaulia, circiter sesquilineam lata, pl. min. sesquipollicaria, subpungentia, praesertim superne in ramis conferto-disticha, patentissima, supra laete viridia, subtus glauca, sulcata, in nostris speciminibus plane laevia. *Juba panicularis* patens. *Radii* satis stricti (non „capillares“), breves, glabri et laeves, secundo-ramulosi, cum spiculis atropurpurei.

Panicum arundinaceum Sw. Jubae (spithameae) radiis teretibus, tenuibus; Pedicellis brevissimis; Spiculis pusillis, obovato-subrotundis; Glumis laevibus l. superne pilo uno altero ve substrigilosis; Flosculo utroque glabro; Foliis lanceolatis, laevibus (acuminatissimis).

Panicum arundinaceum. R. et S. II. p. 448. — *P. dispermum Lam.*

Isachne panicea Trin. Diss. II. p. 253. — *J. dubia Kth. Agr. syn.* p. 157.

V. spp. Martin.

Culmus 4 — 6-pedalis, erectus, pl. min. ramosus. *Vaginae* glabrae l. superne ciliatulae. *Ligula* ciliaris. *Folia* lineas circiter 8 — 10 lata, spithamea, subtus glaucescentia. *Juba panicularis* densiuscula.

Panicum Meneritana Sprgl. Paniculae jubalis (spithamea) radiis teretiusculis Pedicellisque elongatis subcapillaribus; Spiculis parvis, obovatis; Glumis laeviusculis; Flosculo utroque glabro; Foliis lanceolato-linearibus, glabris vel scabris subtusque hirtis.

Panicum Meneritana Sprgl. S. V. I. p. 321.

Isachne Meneritana Poir. Kth. Agr. syn. p. 136. R. et S. II. p. 475. (sub *Neurachne*). — *J. miliacea* Trin. Diss. II. p. 252.

V. spp. Mascar. (Sieb. herb. Maurit. no. 32.)

Bipedalis? adscendens? *Vaginae* glabrae aut tuberculatae et superne hirsutae. *Ligula* in var. glabra obsoleta, in aspera satis longe ciliaris. *Folia* lineas circiter 3 lata, pollices 4 — 5 longa, glaucescentia, glabra vel supra scabra et infra hirta. *Panicula* patula (fortasse demum diffusa), subcapillaris. *Radii* et *pedicelli* in var. aspera scabri, in glabra laevissimi.

OBS. Specimina nostra figurae Burmannianae (Thes. Zeyl. tab. 47. f. 5.) bene congruunt. — Fortasse huc etiam *Isachne mauritiana* Kth. rev. gr. tab. 53. Agr. syn. p. 136, excell. synn. LaM. (*panicula* divaricata, depauperata).

b) *Flosculo superiore pubescente.*

Panicum trachyspermum N. ab Es. Jubae (1 — 2-pollicaris) radiis terciusculis pedicellisque breviusculis; Spiculis linealibus, subrotundis; Glumis junioribus pl. min. hirsutis, adultis laevigatis; Flosculo superiore pubescente; Foliis ovali-lanceolatis, strigiloso-asperis; Vaginis tuberculato-hirsutis.

Panicum trachyspermum N. ab Es! Agr. bras. p. 212.

V. spp. Bras.

Culmus circiter pedalis, basi repens, ramosus. *Ligula* ciliaris. *Folia* amplexicaulia, lineas 4 — 5 lata, pollicaria l. paulo longiora, praesertim supra, ubi profundius striata, ad nervos setulis pusillis hirta. *Juba* basi vagina supra subinvoluta. *Pedicelli* apice incrassati. *Spiculae* pallidae, deciduae. *Gluma* inferior 5, superior 7-nervis. *Flosculus* inferior masculus? chartaceus, viridulus, acutiusculus, superiore hermaphroditum albentem obtusum sub-excedens.

Panicum dispar. Jubae panicularis (subbipollicaris) radiis teretiusculis pedicellisque breviusculis; Spiculis linealibus, elliptico-obovatis; Glumis laevibus l. superne hispidulis; Floculo superiore pubescente; Foliis cordato-ovatis, scabriusculis, albo-marginatis; Vaginis glabris.

Isachne dispar Trin. ic. gr. VIII. tab. 86. Kth. Agr. syn. p. 136.

V. sp. Nepal.

Culmus semipedalis, basi repens, valde ramosus: ramis floriferis. *Vaginae* glabrae aut marginem versus ciliatulae. *Ligula* membranacea, brevissima, ciliatula. *Folia* amplexicaulia, lineas 4 — 5, lata, lineas 6 — 11 longa. *Jubae* paniculares prope supra folium supremum exsertae, adultae subbipollicares. *Gluma* inferior 5-, superior 7 — 9-nervis. *Flosc. inferior* masculus, herbaceo-chartaceus.

Panicum minutulum Gaudich. Paniculae jubaris (1 — 2-pollicaris) radiis teretiusculis pedicellisque brevibus; Spiculis semilinealibus, obovato-subrotundis; Glumis laevibus l. sub lente superne puberulis; Floculo superiore pubescente; Foliis lanceolatis, hirto-pilosulis; Vaginis glabris, ciliatis.

Panicum minutulum Gaudich. in it. Freycin.

Isachne minutula Kth. Rev. gr. tab. 117. Agr. syn. p. 137.

V. spp. e Guahan (Marian.)

Culmus tenuis, repens, ramos exserens plures floriferos, simplices l. ramosos, palmares — subspithameos. *Vaginae* superne ciliatae. *Ligula* ciliata. *Folia* lineam — lin. 2 lata, lin. 4 — 6 — 12 longa.

c) *Flosculo utroque pubescente.*

Panicum albens. Jubae (subspithameae) radiis tenuissimis; Pedicellis brevibus; Spiculis serallinealibus, subrotundis; Glumis laevibus; Floculo utroque pubescente; Foliis lanceolatis, asperiusculis, (albo-marginatis).

Isachne albens Trin. ic. gr. VIII. tab. 85. Kth. Agr. syn. p. 137.

V. sp. Nepal.

Culmus 3-pedalis, basi repens, ramosus, ramis aliquot floriferis. *Vaginæ* glabrae. *Ligula* brevissima, rigido-ciliata. *Folia* pallide glaucescentia, lineas circiter 5 lata, sesquipalmaria, palmaria et breviora. *Juba* flavescendo-albens. *Radioli* dissitiuscule secundi-flori. *Flosculus* uterque hermaphroditus.

A R U N D I N E L L A Raddi.

Panicula composita. *Spiculae* (1 — 3-lineales) solitariae. *Flosculus fructiferus* basi pilis cinctus, apice aristatus.

Gramina utriusque orbis tropica l. regiones tropicas gradus paucos excedentia, pl. min. erecta, arundinacea, 1 — 6-pedalia, culmo plerumque simplici.

Folia linearia l. sublanceolato-linearia.

Ligula ciliaris, rarius membranacea, brevissima.

Panicula plerumque contractiuscula et longa. *Radii* verticillati, semiverticillati l. fasciculati; rarius pauci (solitarii binive), radiolis saepissime racemiformibus. *Spiculae*, dum clausae sunt, lanceolato-ovatae, teretiusculae, hemiologamae, rarius hemigamae. *Glumae* herbaceo-membranaceae l. herbaceo-chartaceae, 3 — 5-nerves, plerumque acuminatae: inferior brevior. *Flosculus* inferior fere semper masculus (interdum cum pistillo, ut v. gr., Kunthio teste, in *Brandtia* sua *holcoide*), rarius neuter, bivalvis, substantia glumarum, muticus. *Flosculus* superior hermaphroditus l. femigeus, eoriaeetus, ovato-lanceolatus, e callo subiecto brevissimo pilis brevibus cinctus, superne exasperatus l. pilosulus, apice, nunc integro nunc bisido l. biseto, aristatus, arista longe plerumque torta et geniculata. *Valvula* inferior superiorem arcte amplectens.

Lodiculae squamae 2, subquadrato-euneatae, emarginatae.

Ovarium ovale, glabrum. *Styli* 2. *Stigmata* plumosa.

Stamina 3. *Antherae* lineares.

Fructus caryopsis ovalis, teretiuscula, intra valvulas arcte clausa libera, eberbis, scutello suo duplo longior.

a) *Perianthio fructifero apice juxta aristam bifido l. biseto.*

Arundinella flammida. Radiis verticillatis, paniculato-compositis; Pedicellis sub spicula subtrilineali brevi-, obsolete l. vix barbulatis; Hermaphrodito piloso, bifido, gluma sua, inferiore dimidio longiori, paulo minori, masculo sua duplo majori; Arista aequa, flexuosa, valvulis quater longiori.

Arundinella flammida *Trin.* ic. gr. XXIII. tab. 267.

V. spp. Bras.

Culmus 4 — 7-pedalis, stricto-erectus, nodis barbatis. *Vaginae* nunc glabrae, nunc brevi-pilosae. *Ligula* ciliaris. *Folia* inferiora lineas 4 lata, in majori planta bipedalia, fronte seabriuscula. *Panicula* sesqui — bi-pedalis, contracta, pl. min. densa, flavescens. *Radii* verticillorum intermedii a medio-, laterales a basi compositi, tenuissimi. *Glumae* acutae, 3-nerves: inferior infra apicem utrinque e nervo lateral i emittens pilos (2), satis longos. *Flosc. masculi* l. neutrius valv. inf. 3-nervis. *Hermaphroditus* a medio pilis longis laxe vestitus. Arista circiter pollicaris.

Arundinella setosa. Radiis subsolitariis, subcompositis et subracemosis; Pedicellis sub spicula bilineali piliferis; Hermaphrodito hispidulo, biseto, gluma sua, inferiore fere quartam partem longiori; duplo-, masculo sua paulo minori; Arista torta, valvulis sub-triplo longiori.

Arundinella setosa *Trin.* Diss. II. p. 63.

V. sp. Nepal.

Culmus (abscissus) videtur sesqui — 2-pedalis, satis tenuis. *Vaginae* pilosulae. *Ligula* brevissima, ciliaris. *Folia* (suprema) angusta (vix lineam lata), digitalia et breviora, praesertim supra pilis adspersis hirta. *Panicula* speciminis nostri palmaris, contractiuscula, lucidula, subfuscescens. *Glumae* acuminatissimae, 5-nerves. *Flosc. masculi* valv. inf. 3-nervis. *Flosc. superior* filamentis tamen evolutis.

b) *Perianthio fructifero apice integro.*

Arundinella brasiliensis Radd. Radiis verticillatis, racemoso-compositis; Pedicellis sub spicula subultralineali barbulatis; Hermaphrodito scabro, gluma sua, inferiore paulo longiori, quartam partem minori, neutro sua totidem majori; Arista torta, geniculata, valvulis subsesqui-longiori.

Arundinella brasiliensis. Trin. Diss. II. p. 62. Ic. gr. XXIII. tab. 266. — *Ar. Mikani N. ab Es!* Agr. bras. p. 465. — *Ar. pallida* Id.! ibid. (non diversa).

Andropogon hispidus Willd. — *And. virens* Sprgl. S. V. p. 287.

Aira brasiliensis Sprgl. ibid. p. 278.

Goldbachia Mikani Trin. in Sprgl. n. Entd. II. p. 81.

Ischaemum hispidum Hb. et Kth. Kth. rev. gr. tab. 110. Agr. syn. p. 515. (excl. syn. Presl.)

V. spp. Bras.

Culmus 3 — 4-pedalis. *Vaginae* superne. hirtae. *Ligula* membranacea. *Folia* modo angustia, modo pollice dimidio fere latiora, ultrapedalia, nunc scabra tantum, nunc hispida l. pl. min. hirsuta. *Panicula* sesquipedalis, e glauco fuscoque varia, aut tota viridis. *Radii* inferiores superius, superiores a basi compositi. *Glumae* acutae, 3- vel sub- 5-nerves. *Flosc.* neutrius valvula inf. 3-nervis.

Arundinella martinicensis. Radiis verticillatis, racemoso-compositis; Pedicellis sub spicula subultralineali hispidis; Hermaphrodito gluma sua, inferiore tertiam quartamve partem longiori, duplo-, neutro suo quartam partem minori; Arista torta, geniculata, valvulis bis longiori.

Arundinella martinicensis Trin. Diss. II, p. 62.

Thysanachne scoparia Presl. rel. Haenk. I. p. 253.

V. spp. Martin. (Sieb. herb. Martin. no. 262 et 264.)

Culmus videtur 3 — 4-pedalis, stricto-erectus, *Vaginae* hirtulae, *Ligula* longo-ciliaris. *Folia* (superiora) lineas 3 lata, siccitate marginibus involuta, dodrantalia, supra pilis brevibus hirta, *Panicula* ultrapedalis, contracta, densa, fuscescendo-viridis. *Radii* tenuissimi, a basi divisi. *Glumae* 3-nerves. *Flosculi* inferioris valv. inf. 3-nervis.

Arundinella nepalensis. Radiis binis solitariisve, subracemoso-compositis; Pedicellis sub spicula bilineali nudiusculis; Hermaphrodito gluma sua, inferiore parum longiori, duplo minori; masculo suam subaequante; Arista torta, geniculata, valvulis bis longiori.

Arundinella nepalensis Trin. Diss. II. p. 62. Ic. gr. XXIII. tab. 268.

Acratherum miliaceum Lk. hort. reg. berol. I. p. 230. Kth. Agr. syn. p. 521.
V. spp. Nepal.

Culmus 2 — 3-pedalis, erectus, basi ramosus. *Vaginae* glabrae l. glabrusculae. *Ligula* membranacea, brevissima, dorso pilis stipata. *Folia* plana l. margine involuta, lineas 2 — 3 lata, satis firma, glabra: infima pedalia, sensim minora. *Panicula* spithamea — ultrapedalis, pallide fuscescens, demum pl. min. patens, lucida. *Radii* tenues, a basi divisi, laxe floriferi. *Gluma* inferior 3-, superior et *Flosc. masc.* valv. inf. 5-nerves.

Arundinella agrostoides. Radiis fasciculato-semiverticillatis, subpaniculato-compositis; Pedicellis sub spicula sublineali nudis; Hermaphrodito gluma sua, inferiore tertiam partem l. fere dimidio longiori, duplo minori, neutro suam subexcidente; Arista torta, geniculata, valvulis plus triplo longiori.

Arundinella agrostoides Trin. ic. gr. XXIII. tab. 265.

V. spp. ex. Inss. Philipp. et Sandw.

Culmi caespitosi, dodrantales — ultrapedales, erecti l. obliqui, simplices. *Vaginae* glabrae. *Ligula* brevissima, ciliaris. *Folia* linearia l. lanceolato-linaria, lineas 2 — 3 lata, glabra, inferiora sesquipalmaria, sensim breviora. *Panicula* 3 — 6-pollicaris, contractiuscula, lucidula, viridis, demum fusces-

cendo-gilvescens. *Radii* pertenues, a basi compositi. *Glumae* acuminatissimae, aut utraque aut superior sola medio e nervo dorsali pilis (2) longiusculis mutinæ: inferior 3-, superior, apice truncato subfimbriata, 5-nervis. *Flosc. neut.* valv. inf. 3-nervis.

Obs. Hujc affinis species *Brandtia holcoides* Kth. rev. gr. tab. 170. Agr. syn. p. 510., differt glumis, vaginis foliisque pilosis, flosculo inferiore hermaphrodito (au et seminifero?) superiore semineo.

T R I S T A C H Y A N. ab Es.

Panicula simplicissima. *Spiculae* (7 — 20-lineales) ternatae. *Flosculus fructiferus* basi pilis cinctus, apice aristatus.

Gramina utriusque orbis tropica, campos graminos habitantia, 3 — 4-pédalia, erecta, culmo simplici.

Folia angusta, pl. min. involuta et hirta, firma.

Ligula ciliaris.

Panicula simplicissima: Radiis solitariis, alternis, aut simplicissimis aut semel divisis, apice discedentibus in stipites 3 brevissimos et fasciculum spicularum ferentibus. *Spiculae* maximæ, ternæ, fastigiatae, sublineari-lanceolatae, hemiologamae. *Glumæ* membranaceæ, 3-nerves, inferior brevior. *Flosculus inferior* masculus l. neuter, substantia glumarum, sessilis, muticus, bivalvis: valv. inf. 3 — 5-nervis, *Flosc. superior* hermaphroditus, demum coriaceus, incompleto brevior, teretiusculus, stipiti villoso insidens, glaber vel villosus: valv. inf. 7 — 11 — 13-nervis, apice bifida, e sinu laciniarum aristata: arista tortili. Valvula inferior superiore amplectens.

Lodiculae squamæ 1 — 2, subquadratae, emarginatae, ovario sublongiores.

Ovarium cylindraceo-oblongum, glabrum- l. apice barbatum. *Styli* 2. *Stigmata* plumosa.

Stamina 2 — 3. *Antherae* lineares.

Fructus Caryopsis cylindracea, depresso-sculpta, libera, eberbis (an constanter?), dorso sulco exarata, scutello suo 3 — 4-plo longior.

Tristachya chrysothrix N. ab Es. Glum's. subsemipollicaribus, fulvo - hirsutis; Hermaphrodito viloso; Ovario nudo.

Tristachya chrysothrix N. ab Es. Agr. bras, p. 460.. Kth. rev. gr. tab. 141.

Agr. syn. p. 308.

V. spp. Bras.

Culmus bipedalis et ultra, nodis barbatis. *Vaginae* cum *Foliis* angustissimis, planis, radiisque paniculae parum compositis fulvo- l. aureo-pilosae. *Stamina* in utroque flosculo 2.

Tristachya leucothrix. Glumis pollicaribus: inferiore albo-hirsuta, superiore ciliata; Hermaphrodito glabro; Ovario barbato.

Tristachya leucothrix Trin. ap. N. ab Es. Agr. bras. p. 460.

Avena hispida Thbg. prodr. R. et S. II. p. 673. (non *Av. capensis* L. sppl.)

Anthistiria hispida Thbg. Fl. Cap.

Danthonia hispida Sprgl. S. V. p. 331.

V. sp. Cbsp.

Culmus (abscissus) videtur bipedalis, pilis raris adspersus. *Vaginae* cum *Foliis* involutis canescendo-pilosae. *Paniculae* 3-pollicaris axis glaber, emitens (in specim. nostro) radios 3, solitarios, simplicissimos, superne pilosulos et glanduliferos, apice discedentes in stipites s. pedicellos 3 aequales, lineam et qu. exc. longos, singulos ferentes spiculam suam. *Gluma* inferior in subulam brevissimam attenuata, ad nervos 3 fusco-glandulosa et e glandulis albo-pilosa; superior paulo longior, ad nervum medium nuda, ad laterales ciliata. *Flosc. masculi* valv. inferior substantia et forma glumarum, 5-nervis, nervis extimis tenero-ciliatis; valv. superior duplo brevior. *Hermaphr.* primum membranaceus, valvula masculi superiore paulo longior: valv. inf. 7-nervis: nervis

binis exterioribus utrinque confluentibus in subulam tenuem, bilinealem; tribus mediis in aristam bipollicarem, glabram. *Lodicula* in utroque flosculo squama 1 (2 connatae), quadrata; filamentorum brevium longitudine. *Stamina* 3. *Tristachya lejostachya* N. ab Es. Glumis ultra-sesquipollicularibus, glabris; Hermaphrodito villoso; Ovario nudo.

Tristachya lejostachya N. ab Es. Agr. Bras. p. 459. Kth. rev. gr. tab. 140. Agr. syn. p. 308. (cum *Tr. mexicana*).

Monopogon avenaceus Presl. rel. Haenck. I. p. 325. tab. 44. (Spiculis paulo brevioribus).

(V, spp. Bras.)

Culmus 3—4-pedalis, simplex, nodis barbulatis. *Vaginae* dorso pubescentes. *Folia* involuta, glabra. *Panicula* pl. min. semipedalis. *Axix* cum radiis simplicibus vel scindit divisus glaber. *Spiculae* e viridi-flavo et amethystino variae. *Arista* 4—5-pollicaris. *Stamina* 3.

ADDENDA ET EMENDANDA.

- Pag. 111. lin. 7. ab inf. post: *glabris*, adde: *l. ciliatulis*.
— 113. — 1. — — — *dodrantalia*, adde: *l. pedaliq.*
— 113. — 4. — — loco: *apice truncato brevissime fimbriato, denticulata, pone: laciniata.*
— 132. *Paspalo obtusifolio Raddi* adjunge syn: *Pasp. hyalinum Beyrich ms.*
(e *Georgia Amer.*)
— 136. lin. 2. ab inf. loco: *orbiculare lege orbiculatum.*
— 137. *Paspalum caespitosum* hoc loco deleatur, et inseratur pag. 157. post
Pasp. mandiocanum; Spiculae enim non *subminimae*, sed *parvae tantum*.
— 139. *Paspalum malacophyllum*, ob eandem causam, rectius pag. 154, post
Pasp. coryphaeum ponatur.
— 152. *Paspalo denso Axis* potius *sub* —, et spiculae inaequaliter *sub-brevi-pedicellatae*. — Aegre a *Pasp. densi* var. *axibus nudis*, distinguitur
Pasp. purpurascens Ell. (*Bot. of S. Car. and Georg.* I. p. 108.)
quod ita definitum foret: Bi-tripedale, *adscendens*. Racemis
3 — 12 alternis (jubatisve); *Axi* —, glabro; Spiculis linealibus,
4-serialibus, inaequaliter brevipedicellatis, subrotundo-obovatis, gla-
bris; Foliis linearibus (longis), facie inferne pilosis. V. sp. Georg. —
Culmus *vaginaeque compressae*: inferiores cum culmo purpureae.
Ligula membranacea, sere lineam longa. • *Folia* inferne compressa,
lineas 2 — 3 (5 — 6, Ell.) lata, margine hispida, purpurascens, in-
feriora pedalia et longiora. *Racemi* basi villis aliquot barbati. *Axes*
partiales glauci. *Spiculae* pallide fuscantes. *Glumae* 3-nerves.

- Pag. 156. *Paspalo setaceo* add. Syn. *Pasp. ciliatifolium* Mchx. et Ell! — Hujus varietas, Racemo solitario, gracili, Spiculis parvis, Foliis sublanceolatis, hirsutis, est *Pasp. debile* Mchx. (*P. infirmum* R. et S. II. p. 307). Varietati * autem, sive *Paspalo supino* Bosc., addatur syn. *Pasp. dasyphyllum* Ell. *Bot. of S. Car. and Georg.* I. p. 105. (foliis hirsutioribus).
- 160. *Paspali laevis* Mchx. duae fortasse distinguenda erunt varietates: altera foliis glabris; altera foliis, praesertim inferne, pilosis: ad quam tum referendum videtur *Pasp. floridanum* Mchx. R. et S. II. p. 310. Mant. 2. p. 174.
- 175. lin. 5. ab inf. dele ad finem lineae: *super-*
- 206. Sub *Panico cuyabensi* deleatur *Observatio*, et ante *Panicum connivens* inseratur:
- Panicum violascens* Kth. Decumbens. Racemis (2—) 8—13, subfasciculato-l. conferto-jubatis, pl. min. laxiuscule floriferis; Spiculis geminis, parvis, lanceolato-ellipticis, acutis, ad nervos villosulis; Gluma inferiore nulla, superiore flosculos aequante; Foliis linearibus (vaginisque) glabris.
- Panicum violascens* Kth. Agr. syn. p. 84.
- Digilaria violascens* Lk.! hort. reg. I. p. 229.
- Paspalum fuscum* Presl.? rel. Haenk. I. p. 214. Kth. Agr. syn. p. 46.
- V. spp. Peruv? et cc. •
- Culmus* sesqui — bi-pedalis, in spp. nostris parum ramosus. *Vaginae* (inferiores) in spontanea planta superne pilosae, in culta glabrae. *Folia* inferiora breviora, culmea circ. 5-pollicaria. *Racemi* tenuis. *Axis partialis* latitudine spiculae. *Gluma* 3-nervis. *Flosc.* neut. 7-nervis. *Herm.* demum fuscus aut subviolascens.
- 217. lin. 2. ab inf. ante *huc parenthesis claudatur.*

Pag. 220. *Panici sulcati* thýrsus non sémpér *densiissimus* sed saepe *densiusculus* tantum.

- 240. *Panicum uncinatum* vénit: α , Racemis sub- 4, intersuttiis brevioribus l. eosdem aequantibus, Spiculis minus distantibus: quo pertinent synn. Radd. et N. ab Es. — β , Racemis pluribus (6 — 12), interstutiis longioribus, Spiculis dissitis: cuius v. spp. Peruv., et quo spectant synn. Hb. et Kth. et *P. heteropithum* Lk.
- 241. *Panico paspaloidi* Pers. anteponatur:

Panicum tenerum Beyr. Racemis 5 — 3-linearibus, alternis, interstitia aequantibus; Spiculis solitariis, laxiusculis, (sub-) linealibus, ovali-lanceolatis, acutis, glabris (basi villis aliquot stipatis); Gluma inferiore flosculis fere dimidio breviori; Hermaphrodito acutiusculo, laevi (neutro breviori); Foliis angustissimis (planis l. subinvolutis), glabris.

V. spp. Georg. Amer. (in paludibus nemorum cresc.) BEYRICH ms.

Culmus circiter sesquipedalis, filiformis, tamen satis tenax, aequus, cum nodis glaberrimus, simplex, inferne atropurpurascens. *Vaginae* teretes, glabrae l. fauce villosulae. *Ligula* brevissima. *Folia* erecta, firmula: ubi plana, lineam circiter dimidiā lata. *Axis* comm. fere bipollicaris, tenuissimus, 4 — 5-parus; partiales angulati, erecti, tenues. *Spiculae* virides. *Gluma* inferior paulo minus quam dimidio brevior, 1- vel subtrinervis; superior 5-nervis. *Flosculus neut.* bivalvis.

- 251. lin. 2. ab init. post *ovato-lanceolatis* adde: *vel oratis.*
- 253. — 13. — — Racemi dicantur: solitarii *vel fasciculati.*
- 260. Post *Panicum megastachyum* inseratur:

Panicum cognatum Schult. Radiis subsimplicibus, virgatis (subfastigiatis), paniculatis Radiolisque (s. potius Pedicellis longissimis)

patentibus; Spiculis linealibus, ovali-lanceolatis, acutis, (junioribus) villosum; Gluma inferiore minima l. nulla, superiore 5 — 7-nervi; Hermaphrodito acuto, laevi; Folius angusto-lanceolato-linearibus, glabris.

Panicum cognatum Schult. Mant. II. p. 285. — *P. divergens* Mhlbg. —

P. fragile et *cognatum* Kth. Agr. syn. p. 105.

V. sp. Carol.

Graminis nostri culmus quidem minus fragilis, tamen absque dubio ad plantam Mühlenbergianam et Elliottianam (*Bot. of S. Car. and Georg.* I. p. 130) referendum. Culmus contracto-ramosus, adscendens, geniculato-plurinodis, satis tenuis, cum panícula sesqui — bi-pedalis. Nodi glabri. Vaginae teretes, internodio sublongiores, glabrae. Ligula membranacea, breviuscula, obtusa. Folia patentia, circiter digitalia, strictiuscula, subulato-attenuata, medio lineam et quā exc. lata. Panicula circiter dodrantalis. Radii in verticillis per interstitia minus longa ab invicem remotis minusque regularibus bini + quatēni, strictiusculi, angulato-compressi, sub lente (vix tactu) scabri, ad axillas barbati, radiolos (pedicellos) emittentes longissimos, unifloros, alternos. Spiculae viridiulae, demum pl. min. glabratae. Gluma inferior, si adest, minuta, angusta. Flosc. neut. 1-valvis, 7-nervis. Hermaphr. tandem fuscescens.

Pag. 262. *Panicum latifolium* L. melius ita dividitur: α , Vaginis ore extus barbatis; β , Vaginis ore extus glabris. Varietati priori. Ligula est brevis, ciliata; posteriori plerūmque (nam et in hac rarijs brevem et ciliarem inveni) membranacea; interdum satis exserta. Ceterum utriusque varietatis radii et radioli occurunt nunc erecti, nunc divaricati.

- Pag. 269. *Panici chlorotici var. α; agrestis, simillima est Panico attenuato W.*
 (p. 271. quod non nisi gluma inferiore paulo longiori, et gluma superiore saepe plurinervi differt). Var. β, (cui quidem radii etiam superius compositi occurunt), a cel. BEYRICH nom. *Pan. miliaris Lam.* (e Guiana), et *Pan. proliferi Lam.* (e Virginia) missa.
- 271. Post *Panicum attenuatum* ponatur *Panicum milioides* (p. 294), cui radii superiores triangulares.
- 283. Ante *Pan. pellitum* inseratur:

Panicum carinatum Presl. Radiis paulo superius decompositis, alternis Radiolisque (pilis adspersis) patulis; Glumis 3-nervibus: inferiore spicula dimidia paulo longiori; Hermaphrodito acutiusculo, laevi; Foliis lanceolatis, (demum?) glabris.

Panicum carinatum Presl.! rel. Haenk. I. p. 309. Kth. Agr. syn.
 p. 112.

V. sp. Luzon.

Culmus pl. min. pedalis, inferne prostratus, nodis (pluribus) barbulatis. Tam *vaginae*, quam *folia*, quae patentia, pol. 2 longiora, lin. 4 et qu. exc. lata, in specimine a cel. PRESL misso glabra. *Ligula* membranacea, brevis, truncata. *Panicula* palmaris, fusca. *Radii* solitarii, pilis adspersi. *Radioli* et *pedicelli* basi plurumque fasciculo pilorum barbati. *Spiculae* compressiusculae, dorso paulo convexiores, distinctissime nervatae, in specim. nostro (adulterio) totae glabrae. *Glumae* dissitiusculae. *Flosc. neut.* bivalvis: valv. inferiore 3-nervi, superiore parva et angusta.

- 294. *Panicum milioides* inseratur supra pag. 271, post *Pan. attenuatum*. Hujus etiam specimina vidi in Georgia lecta, et a cel. BEYRICH sub nom. *Panici hiantis Ell.* missa, quod (*Bol. of S. Car. and Georg.* I. p. 118., an cum syn. Michauxii?) omnino huc referendum, tum vero nomen *milioidis* suppressendum videtur.

Pág. 302. *Panici pubescens* Michx. varietatem *a.*, *γ.* (*Pan. villosum* Ell.) misit cl.
 BEYRICH subi nom. *Panici dichotomi* L., certo Sprgl. (in *Mém. de
 St. Pet.* II., p. 290, tab. 5.) → Alia, hujus graminis maxime poly-
 morphi, varietas, eaque *b.*, erit; spiculis linealibus, culmo ramoso,
 foliis angusto-lanceolatis, brevibus, pl. min. ciliatis; quam mis. cl.
 BEYRICH s. n. *Pan. nitidum* Ell. (cum!, quod tamē ob spiculas
 non „minutas“, vix crederem), → Varietatis *b.*, quae nunc *c.*, syno-
 nymis subjungendum etiam *Panicum sphaerocarpon* Ell. l. l. p. 125.

I N D E X.

	Pag.		Pag.		Pag.
<i>Achnatherum miliaceum</i> PB.	125	<i>Anthenanilia villosa</i> PB.	305	<i>Cenchrus australis</i> Br.	175
<i>Acicarpa sachariflora</i> Radd.	255	<i>Anthephora elegans</i> Schreb.	174	— <i>carolinianus</i> Walt.	174
<i>Acratherum miliaceum</i> Lk.	335	— <i>villosa</i> Spr.	174	— <i>ciliaris</i> L.	181
<i>Agrostis caerulescens</i> Poir.	125	<i>Anthistiria hispida</i> Thbg.	337	— <i>echinatus</i> L.	175
— <i>cimicina</i> Poir.	208	<i>Apluda Zeugites</i> Aubl.	320	— <i>geniculatus</i> Thbg.	179
— <i>effusa</i> Lam.	121	<i>Arrozia micrantha</i> Schrad.	119	— <i>hordeiformis</i> Thbg.	177
— <i>glutinosa</i> ht. Gor.	291	<i>Arundinella</i> Radd.	102	— <i>inflexus</i> Poir.	231
— <i>holciformis</i> MB.	126	— <i>agrostoides</i> Tr.	335	— <i>laevigatus</i> Tr.	174
— <i>lenta</i> ht. Kew.	204	— <i>brasiliensis</i> Radd.	334	— <i>linearis</i> Lam.	171
— <i>malaccensis</i> W.	313	— <i>flammida</i> Tr.	335	— <i>macrocarpus</i> ht. Erf.	173
— <i>miliacea</i> L.	125	— <i>martinicensis</i> Tr.	334	— <i>marginalis</i> Rde.	231
— <i>Milium comosum</i> Poir.	125	— <i>Mikani N. Es.</i>	334	— <i>microcarpus</i> ht. Erf.	173
— <i>monandra</i> ht. Hafn.	125	— <i>nepalensis</i> Tr.	335	— <i>muricatus</i> L.	189
— <i>monostachya</i> Poir.	253	— <i>pallida</i> N. Es.	334	— <i>myosuroides</i> Hb. Kth.	172
— <i>montis aurei</i> Delarbr.	125	— <i>setosa</i> Tr.	333	— <i>pungens</i> Hb. Kth.	173
— <i>myuros</i> Lam.	253	<i>Aulaxanthus ciliatus</i> Ell.	305	— <i>purpurascens</i> Thbg.	176
— <i>oseroensis</i> Seen.	125	<i>Aulaxia ciliata</i> Nutt.	305	— <i>racemosus</i> L.	171
— <i>paradoxa</i> L.	126	<i>Avena hispida</i> Thbg.	337	— <i>setosus</i> Sw.	183
— <i>plumosa</i> Ten.	297	<i>Axonopus cimicinus</i> PB.	208	— <i>spinifex</i> Cav.	174
— <i>punctata</i> Lam.	131	— <i>corymbosus</i> Schult.	200	— <i>tribuloides</i> L.	175
— <i>ramosa</i> Poir.	130			— <i>villosus</i> Spr.	174
— <i>vernalis</i> Poir.	121	<i>Brachiaria</i> Tr.	194. 255	<i>Ceresia elegans</i> Pers.	165
<i>Aira brasiliensis</i> Spr.	334	<i>Brandtia holcoidea</i> Kth.	336. adn.	— <i>fluitans</i> Ell.	159
— <i>distichophylla</i> Spr.	319			<i>Chamaeraphis abortiva</i> Poir.	218
— <i>indica</i> L.	295	<i>Cabrera</i> Lag.	193. 195	— <i>hordeacea</i> Br.	217
— <i>ischaemoides</i> Koen.	328	<i>Caryochloa</i> Spr.	119. adn. 125	— <i>paradoxa</i> PB.	217
— <i>spicata</i> L.	295	<i>Caryochloa</i> Tr.	101. 119	<i>Colladoa monostachya</i> Pers.	174
<i>Alopecurus hordiformis</i> L.	177	— <i>brasiliensis</i> Tr.	119	<i>Dactylon sanguinale</i> Vill.	201
<i>Amphicarpum Purshii</i> Kth.	121	— <i>chilensis</i> Spr.	123	<i>Dauhonia hispida</i> Spr.	337
<i>Andropogon hispidus</i> W.	334	— <i>refracta</i> Spr.	124	<i>Digitaria Hall.</i>	193. 198
— <i>insularis</i> L.	255	<i>Cenchrus</i> L.	101. 171	— <i>aegyptiaca</i> W.	201
— <i>squarrosum</i> L. herb.	218	— <i>agrimonioides</i> Tr.	174	— <i>affinis</i> R.S.	241
— <i>undatus</i> Icq.	211	— <i>alopecuroides</i> Prsl.	172	— <i>aureus</i> Spr.	196

	Pag.		Pag.		Pag.
<i>Digitaria australis</i> W.	201	<i>Echinolaena hirta</i> Desv.	231	<i>Ichnanthus panicoides</i> PB.	327
— <i>biformis</i> W.	202	— <i>loliacea</i> Kth.	321	<i>Isachne</i> Br.	195. 328
— <i>ciliaris</i> Koel.	201	— <i>nemorosa</i> Kth.	520	— <i>albens</i> Tr.	331
— <i>composita</i> W.	211	— <i>polystachya</i> Hb. Kth.	240	— <i>atrovirens</i> Tr.	328
— <i>cuspidata</i> Schult.	214	— <i>procurrens</i> Kth.	315	— <i>australis</i> Br.	328
— <i>debilis</i> W.	205	— <i>scabra</i> Hb. Kth.	230	— <i>dispar</i> Tr.	331
— <i>denudata</i> Lk.	199	<i>Elymus caput-Medusae</i> Forsk.	173	— <i>dubia</i> Kth.	329
— <i>eriogona</i> Schrd.	201	<i>Eriachne montana</i> Gaudich.	281	— <i>mauritiana</i> Kth.	330. adn.
— <i>fascicularis</i> Lk.	199	<i>Eriochloa annulata</i> Kth.	150	— <i>Meneritana</i> Poir.	330
— <i>filiformis</i> Koel.	205	— <i>distachya</i> Kth.	135	— <i>miliacea</i> Tr.	330
— <i>filiformis</i> PB.	204	— <i>pulchella</i> Kth.	236	— <i>minutula</i> Kth.	331
— <i>glabra</i> PB.	205	— <i>punctata</i> Hamilt.	151	— <i>panicea</i> Tr.	329
— <i>horizontalis</i> W.	202	— <i>succincta</i> Kth.	151	— <i>ricens</i> Tr.	329
— <i>humifusa</i> Pers.	203	<i>Eriocoma cuspidata</i> Nutt.	126	<i>Ischaemum hispidum</i> Hb. Kth.	334
— <i>inaequalis</i> Lk.	202	<i>Eriolytrum junceum</i> Desv.	510	— <i>involutum</i> Forst.	187
— <i>longiflora</i> Pers.	205				
— <i>marginata</i> Lk.	202	<i>Goldbachia</i> Mikani Tr.	534	<i>Lappago</i> Schreb.	101. 170
— <i>mollissima</i> Schrad.	207	<i>Gymnothrix caudata</i> Schrd.	178	— <i>aliena</i> Spr.	171
— <i>pilosa</i> Mchx.	204	— <i>cenchroides</i> R. S.	177	— <i>biflora</i> Roxb.	171
— <i>sanguinalis</i> Scop.	201	— <i>hordeiformis</i> N. Es.	178	— <i>racemosa</i> W.	171
— <i>serotina</i> Mchx.	205	— <i>japonica</i> Kth.	176	<i>Latipes</i> Kth.	171. adn.
— <i>setigera</i> Roth.	202	— <i>latifolia</i> Schult.	180	<i>Leptocoryphium lanatum</i> N. Es.	122
— <i>sienistica</i> ht. Ber.	201	— <i>macrostachys</i> Brong.	178	<i>Lithachne</i> PB.	117
— <i>stricta</i> Gaudich.	199	— <i>nervosa</i> N. Es.	177	— <i>axillaris</i> PB.	118
— <i>umbrosa</i> Lk.	201	— <i>purpurascens</i> Schrd.	179	<i>Luziola</i> Juss.	101. 118
— <i>umbrosa</i> Pers.	246	— <i>purpurascens</i> Sw.	176	— <i>mexicana</i> Hb. Kth.	119
— <i>villosa</i> ht. Vienn.	199			— <i>peruviana</i> Juss.	119
— <i>villosa</i> Pers.	207				
— <i>violascens</i> Lk.	206. adn. 540	<i>Harpastachys</i> Tr.	194. 227		
		<i>Helopodius barbatus</i> Tr.	?		
		— <i>brachystachys</i> Tr.	132		
		— <i>grandiflorus</i> Tr.	133	<i>Melica latifolia</i> Roxb.	293
		— <i>laevis</i> Tr.	130	<i>Melinis minutiflora</i> PB.	291
		— <i>pilosus</i> Tr.	131	<i>Miliaria</i> Tr.	195. 285
		<i>Holcus serratus</i> Thbg.	234	<i>Miliarium effusum</i> Mönch.	121
		— <i>spicatus</i> L.	184	<i>Milium</i> L.	101. 120
		<i>Hymenachne fluvialis</i> N. Es.	254	— <i>amphicarpon</i> Pursh.	121
		— <i>myuros</i> PB.	253	— <i>arundinaceum</i> Sibth.	125
<i>Echinochloa</i> PB.	194. 213	<i>Ichnanthus</i> PB.	195. 320	— <i>caerulescens</i> Schousb.	125
— <i>commutata</i> Schult.	215	— <i>almadensis</i> Kth.	326	— <i>capillare</i> Roth.	292
— <i>crus galli</i> PB.	214	— <i>lejocarpus</i> Kth.	324. 326	— <i>capillare</i> Rottb.	307
— <i>echinata</i> PB.	215			— <i>ciliatum</i> Mhlbg.	121
— <i>erythrosperma</i> R. S.	223			— <i>cimicinum</i> L.	208
— <i>intermedia</i> R. S.	224				
— <i>lanceolata</i> PB.	212				
— <i>setigera</i> R. S.	246				
— <i>stagnina</i> PB.	216				
— <i>subcordata</i> R. S.	247				
<i>Echinolaena</i> brachystachya Kth.	235				

	Pag.		Pag.	Pag.	
<i>Milium clandestinum</i> Mönch.	286	<i>Olyra capillata</i> Tr.	114	<i>Opismenus sylvaticus</i> R. S.	212
— <i>compressum</i> Sw.	146. 147	— <i>cordifolia</i> W.	111	— <i>undulatifolius</i> PB.	211
— <i>crus-galli</i> Mönch.	215	— <i>fasciculata</i> Tr.	113	<i>Orthopogon</i> Br.	194. 209
— <i>cuspidatum</i> Spr.	126	— <i>filiformis</i> Tr.	115	— <i>Burmanni</i> Br.	209
— <i>effusum</i> L.	120	— <i>floribunda</i> Radd.	117	— <i>compositus</i> Br.	211
— <i>filiforme</i> Sess.	207	— <i>floribunda</i> Tr.	114	— <i>imbecillus</i> Br.	210
— <i>frutescens</i> Sieb.	125	— <i>hirsuta</i> Tr.	116	— <i>remotus</i> Tr.	211
— <i>geditanum</i> ht. Gor.	125	— <i>humilis</i> N. Es.	115	— <i>setarius</i> Spr.	210
— <i>hirsutum</i> PB.	255	— <i>latifolia</i> L.	111	<i>Oryzopsis asperifolia</i> Michx.	127. 128
— <i>lanatum</i> R. S.	121	— <i>micrantha</i> Hb. Kth.	116	— <i>melanocarpa</i> Mhlbg.	127
— <i>latifolium</i> Cav.	152	— <i>paniculata</i> Sw.	111	— <i>paradoxa</i> Nutt.	126
— <i>minutiflorum</i> Tr.	121	— <i>pauciflora</i> Sw.	118	— <i>parviflora</i> Nutt.	127
— <i>multiflorum</i> Cav.	125	— <i>polypodioides</i> Tr.	117	— <i>selacea</i> Rich.	125
— <i>natans</i> Spr.	119	— <i>pubescens</i> Radd.	111	<i>Otachyrium junceum</i> N. Es.	296
— <i>nemorosum</i> Mönch.	320	— <i>ramosissima</i> Tr.	116		
— <i>paniceum</i> Sw.	204	— <i>semiovata</i> Tr.	111		
— <i>paradoxum</i> Scop.	126	— <i>ventricosa</i> N. Es.	115	<i>Panicum</i> L.	102. 191
— <i>pauciflorum</i> ht. Madr.	125	<i>Opismenus africanus</i> PB.	212	— <i>abortivum</i> Br.	218
— <i>punctatum</i> L.	151	— <i>albus</i> R. S.	209	— <i>acariferum</i> Tr.	295
— <i>pungens</i> Torr.	127	— <i>brasiliensis</i> Radd.	212	— <i>accrescens</i> Tr.	307
— <i>purpureum</i> LaPeyr.	125	— <i>Burmanni</i> PB.	209	— <i>aciculare</i> Poir.	285
— <i>racemosum</i> Sm.	127	— <i>colonus</i> Hb. Kth.	213	— <i>acuminatum</i> Sw.	300
— <i>ramosum</i> Retz.	130	— <i>composite</i> PB.	211	— <i>adhaerens</i> Forsk.	225
— <i>scabrum</i> Mirl.	121	— <i>crus galli</i> Kth.	215	— <i>adspersum</i> Tr.	245
— <i>setosum</i> Koen.	154	— <i>crus pavonis</i> Kth.	215	— <i>aegyptiacum</i> Retz.	201
— <i>tomentosum</i> Rottl.	292	— <i>cuspidatus</i> Kth.	214	— <i>affine</i> N. Es.	241
— <i>velutinum</i> DC.	207	— <i>discolor</i> Kth.	278	— <i>agrostidiforme</i> LaM.	266
— <i>vernale</i> MB.	120	— <i>echinatus</i> Kth.	215	— <i>agrostidiforme</i> Radd.	252
— <i>villosum</i> Sw.	255	— <i>frumentaceus</i> Kth.	214	— <i>agrostoides</i> Mhlbg.	266. 280
<i>Monachne racemosa</i> PB.	310	— <i>hirsutus</i> Schult.	258	adn.	
— <i>unilateralis</i> R. S.	255	— <i>hirtellus</i> Radd.	215	— <i>airoides</i> Flügg.	301
<i>Monopogon avenaceus</i> Presl.	338	— <i>Humboldtianus</i> N. Es.	209	— <i>albens</i> Tr.	351
<i>Nassella</i> Tr.	125	— <i>imbecillus</i> R. S.	210	— <i>album</i> LaM.	209
<i>Navicularia glabra</i> Radd.	526	— <i>javanicus</i> R. S.	243	— <i>almadense</i> Tr.	525
— <i>lanata</i> Radd.	324	— <i>lanceolatus</i> N. Es.	212	— <i>alopecuroides</i> Koen.	221
<i>Oedipachne punctata</i> Lk.	151	— <i>latifolius</i> Haenk.	215	— <i>alopecuroides</i> L.	176
<i>Olyra</i> L.	101. 110	— <i>loliaceus</i> PB.	215	— <i>alopecurus</i> LaM.	185
— <i>arundinacea</i> Hb. Kth.	111	— <i>penicillatus</i> Kth.	523	— <i>altissimum</i> Brouss.	268
— <i>axillaris</i> LaM.	118	— <i>sabulicola</i> Kth.	215	— <i>altissimum</i> Meyer.	248
		— <i>setarius</i> R. S.	210	— <i>amarum</i> Ell.	274
		— <i>spectabilis</i> Kth.	216	— <i>ambiguum</i> Tr.	245
		— <i>stagninus</i> Kth.	216	— <i>americanum</i> L.	184

	Pag.		Pag.		Pag.
<i>Panicum amplexicaule</i> Rdge.	253	<i>Panicum Burmanni</i> Retz.	209	<i>Panicum crus corvi</i> Auctt.	214
— <i>anceps</i> Mchx.	265	— <i>caespitosum</i> Spr.	245	— <i>crus galli</i> L.	214
— <i>angustifolium</i> Ell.	302	— <i>caespitosum</i> S.v.	246	— <i>crus pavonis</i> N. Es.	215
— <i>angustifolium</i> Tr.	303	— <i>calvescens</i> N. Es.	314	— <i>ctenodes</i> Tr.	251
— <i>angustum</i> Tr.	294	— <i>campestre</i> N. Es.	281	— <i>cultratum</i> Tr.	228
— <i>ansatum</i> Tr.	229	— <i>candidans</i> N. Es.	321	— <i>eupidatum</i> Roxb.	214
— <i>antidotale</i> Retz.	285	— <i>capense</i> Lichtenst.	297	— <i>cuyabense</i> Tr.	206
— <i>antipodum</i> Spr.	328	— <i>capillaceum</i> Lam.	290	— <i>cyanescens</i> N. Es.	313 adn.
— <i>arenarium</i> Brot.	269, 299, adn.	— <i>capillare</i> L.	291		319
— <i>arenarium</i> MB.	205	— <i>caricoides</i> N. Es.	285	— <i>cylindricum</i> Lk.	226
— <i>argenteum</i> Br.	235	— <i>carinatum</i> Presl.	345	— <i>cynotis</i> Tr.	325
— <i>aristatum</i> Retz.	210, 212, adn.	— <i>cartilagineum</i> N. Es.	257	— <i>dasytrichum</i> Spr.	280
— <i>arnacites</i> Tr.	317	— <i>caucasicum</i> Tr.	237	— <i>dasyurum</i> W.	221
— <i>arundinaceum</i> Sw.	329	— <i>caudatum</i> Lam.	236	— <i>debile</i> Desf.	205
— <i>arvense</i> Kth.	258	— <i>eayennense</i> Lam.	280	— <i>debile</i> Poir.	259
— <i>asiaticum</i> hort.	224	— <i>chaetophorum</i> R. S.	307	— <i>decipiens</i> N. Es.	295
— <i>asperinum</i> Lag.	282	— <i>chamaelonche</i> Tr.	304	— <i>decumbens</i> R. S.	227
— <i>asperum</i> Lam.	225	— <i>Chamaeraphis</i> Tr.	217	— <i>demissum</i> Tr.	310
— <i>attenuatum</i> hort.	224	— <i>chinense</i> Tr.	225	— <i>denudatum</i> Kth.	199
— <i>attenuatum</i> N. Es.	271, adn.	— <i>chloroticum</i> N. Es.	269	— <i>depauperatum</i> Mhlbg.	286
— <i>attenuatum</i> W.	259, adn. 271	— <i>chnoodes</i> Tr.	299	— <i>diandrum</i> Kth.	252
— <i>atrovirens</i> Tr.	328	— <i>chrysodactylon</i> Tr.	197	— <i>dichotomiflorum</i> Mchx.	267
— <i>aureum</i> Tr.	196	— <i>chrysostachyum</i> Tr.	196	— <i>dichotomum</i> Forsk.	182
— <i>auricomum</i> N. Es.	318	— <i>ciliare</i> Retz.	201	— <i>dichotomum</i> Sprgl.	286, 305
— <i>auritum</i> Presl.	264	— <i>cimicinum</i> Retz.	208	— <i>diffusum</i> Sw.	259
— <i>australe</i> Spr.	204	— <i>elandestinum</i> L.	286	— <i>dimidiatum</i> L.	190
— <i>bambusiflorum</i> Tr.	323	— <i>cognatum</i> Schult.	341	— <i>discolor</i> Spr.	305
— <i>barbatum</i> Lam.	246	— <i>colonum</i> L.	213	— <i>distolor</i> Tr.	278
— <i>barbinode</i> Tr.	256	— <i>coloratum</i> L.	270	— <i>dispar</i> Tr.	351
— <i>barbulatum</i> Mchx.	304, adn.	— <i>coloratum</i> W. hb.	301	— <i>dispermum</i> Lam.	329
— <i>beckmanniaeforme</i> Mik.	241	— <i>commelinaefolium</i> Rdge.	307	— <i>dispersum</i> Tr.	282
— <i>Beyrichii</i> Kth.	279	— <i>compactum</i> Kit.	325	— <i>dissectum</i> L.	157
— <i>bifasciculatum</i> Tr.	199	— <i>compositum</i> L.	211	— <i>distans</i> Tr.	239
— <i>brachyclados</i> Rchbch.	251	— <i>compositum</i> N. Es.	227	— <i>distichophyllum</i> N. Es.	318
— <i>brachystachys</i> Tr.	235	— <i>compositum</i> Tr.	211, 212, bis.	— <i>distichophyllum</i> Tr.	237
— <i>brasiliense</i> Spr.	313	— <i>compressum</i> Biv.	257	— <i>divaricatum</i> Lam.	262
— <i>brevifolium</i> L.	290	— <i>conglomeratum</i> L.	295	— <i>divaricatum</i> Mchx.	259
— <i>brizaeforme</i> Presl.	259	— <i>connivens</i> Tr.	206	— <i>divergens</i> Ell.	542
— <i>brizoides</i> Lam.	241	— <i>consanguineum</i> Kth.	302	— <i>divergens</i> Mhlbg.	342
— <i>brizoides</i> Tr.	259	— <i>coriophorum</i> Kth.	298	— <i>dubium</i> Lam.	266, adn.
— <i>bromoides</i> Lam.	209	— <i>corymbosum</i> Roxb.	200	— <i>eburneum</i> Tr.	268
— <i>Burmanni</i> MB.	210	— <i>costatum</i> Roxb.	249	— <i>echinatum</i> W.	215

	Pag.		Pag.		Pag.
Panicum Echinolaena N. Es.	250	Panicum gibbum Ell.	254	Panicum immersum Tr.	197
— effusum Br.	275	— glabrum Gaudin.	205	— incomtum Tr.	511
— elatius Kth.	248	— glandulosum N. Es.	240	— inconstans Tr.	522
— elephantipes N. Es.	272	— glaucescens N. Es.	202	— indicum hort.	224
— Elliottianum Schult.	255	— glaucum L.	221	— indicum L.	294
— elongatum Poir.	220	— glaucum Tr.	222	— insulare Meyer.	255
— elongatum Pursh.	279	— glomeratum Mönch.	224	— intermedium Horn.	224
— Euslini Tr.	322	— glumare Tr.	244	— Isachne Roth.	236
— eriochryseoides N. Es.	251	— glutinosum Lam.	262	— ischaemooides Koen.	152
— erythrospermum Horn.	223	— glutinosum Meyer.	262	— Ischaemum Schreb.	205
— exaratum Tr.	232	— glutinosum Sw.	315	— italicum L.	223
— excelsum N. Es.	250	— gongylodes ht. Vien.	268	— italicum W.	224
— excurrens Tr.	219. 249 adu.	— granulare Lam.	239	— javanicum Poir.	245
— falciferum Tr.	236	— granuliferum Hb. Kth.	315	— jubiflorum Tr.	239
— fallax Kth.	295	— grossarium Auctt.	246	— jumentorum Pers.	268
— fasciculare ht. Gött.	199	— grumosum N. Es.	264	— junceum N. Es.	271
— fasciculatum Sw.	257	— hebotes Tr.	301	— junceum Tr.	286
— fastigiatum Poir.	257	— Helopus Tr.	238	— Koenigii Spr.	238
— ferrugineum Kth.	208	— heteranthum Lk.	240. 341	— laetum Kth.	272
— ferrugineum Tr.	252	— heterophyllum Boe.	302	— laeve Lam.	268
— filiforme L.	204	— heterophyllum Spr.	252	— laevigatum Lam.	221. 222
— filiforme Poir.	205	— hians Ell.	345	— lagotis Tr.	526
— fimbriatum Presl.	202	— hirsutum Koen.	238	— lancearium Tr.	303
— flavescens Mönch.	221	— hirtellum All.	210	— lanuginosum Ell.	302
— flavidum Retz.	239	— hirtellum Burm.	209	— lappaceum W.	209
— flavum N. Es.	221	— hirtellum Mchx.	210	— lasianthum Tr.	261
— floridanum Tr.	248	— hirtum Lam.	316	— latifolium L.	262. 315. 342
— fluitans Delil.	241	— hispidulum Lam. Retz.	216	— latifolium Walt.	287
— fragile Kth.	342	— hispidum Mhlbg.	215	— latissimum Mik.	274
— frondescens Meyer.	251	— Hoffmannseggi R. S.	324	— laxiflorum Lam.	302
— frondescens Tr.	251	— holoides Igq.	221	— laxiflorum Spr.	303
— frumentaceum Roxb.	214	— holochrysum Tr.	195	— laxum Sw.	352
— fuscorubens Lam.	257	— holosericeum Br.	233	— Leandri Tr.	242
— fuscum Sw.	257	— hordeiforme Thbg.	156. 177	— lejocarpum N. Es.	324
— Gaudichaudii Kth.	198	— horizontale Meyer.	202	— lejocarpum Spr.	324. 325
— Gayanum Kth.	207	— Hostii MB.	215	— leptocalon Tr.	275
— geminatum Forsk.	241	— humifusum Kth.	205	— leucites Tr.	207
— geniculatum Mhlbg.	267	— hydrophilum Tr.	266	— leucoblepharis Tr.	303
— geniculatum Poir.	222	— Ichnanthus N. Es.	326	— leucophaeum Hb. Kth.	255
— geniculatum Thbg.	179	— ignoratum Kth.	305	— ligulare N. Es.	273
— germanicum W.	223	— imbecille Tr.	210	— limosum Presl.	216
— gibbosum Br.	207	— imberbe Poir.	222	— lineare Krock.	203

	Pag.		Pag.		Pag.
<i>Panicum lineatum</i> Tr.	287	<i>Panicum myuros</i> Kth. (Rich?)	255	<i>Panicum penicillatum</i> Tr.	278
— <i>Linkianum</i> Kth.	202	— <i>natans</i> Koen.	267	— <i>penicillatum</i> W.	221
— <i>loliaceum</i> LaM.	212	— <i>naviculare</i> N. Es.	326	— <i>peninsylvanicum</i> Spr.	265
— <i>Lolium</i> N. Es.	252	— <i>Neesii</i> Kth.	202	— <i>perforatum</i> N. Es.	234
— <i>longiflorum</i> Gmel.	205	— <i>nemorale</i> Schrd.	326	— <i>Perrottetii</i> Kth.	121
— <i>longiflorum</i> Tr.	317	— <i>nemorosum</i> Sw.	320	— <i>Petiverii</i> Tr.	259
— <i>longisetum</i> Poir.	183. adn.	— <i>nepalense</i> Spr.	249. adn.	— <i>Petiverii</i> , β	257
— <i>loreum</i> Tr.	300	— <i>nervosum</i> Roxb.	249. adn.	— <i>petrosum</i> Tr.	229
— <i>lutescens</i> Weig.	221	— <i>neurodes</i> R. S.	249. adn.	— <i>phaeothrix</i> Tr.	208
— <i>macranthum</i> Tr.	296	— <i>nitidum</i> Ell.	344	— <i>philadelphicum</i> Bernh.	291
— <i>macrochaetum</i> Lk.	223	— <i>nitidum</i> LaM.	303	— <i>P̄kragmites</i> N. Es.	278
— <i>macrostachyum</i> N. Es.	227	— <i>nitidum</i> Torr.	302. (ter.)	— <i>pictum</i> Koen.	216 adn.
— <i>macrourum</i> Tr.	227	— <i>nodiflorum</i> LaM.	305	— <i>pilisparsum</i> Meyer.	252
— <i>macrum</i> Kth.	302	— <i>nubigenum</i> Kth.	285	— <i>pilosissimum</i> Roth.	280
— <i>maculatum</i> Aubl.	262	— <i>numidianum</i> LaM.	244	— <i>pilosum</i> Sw.	252. 265. adn.
— <i>madagascarens</i> Spr.	301	— <i>numidianum</i> Presl.	215	— <i>planotis</i> Tr.	322
— <i>malaccense</i> Tr.	315	— <i>obliquum</i> Roth.	307	— <i>plantagineum</i> Lk.	242
— <i>marginatum</i> Br.	250	— <i>obseptum</i> Tr.	247	— <i>platycarpum</i> Tr.	198
— <i>maritimum</i> Poir.	223	— <i>obtusum</i> Hb. Kth.	243	— <i>plicatum</i> LaM.	249
— <i>Martianum</i> N. Es.	325	— <i>olymphaefolium</i> Radd.	251	— <i>Poiretianum</i> Schult.	220
— <i>maximum</i> Icq.	268	— <i>onurus</i> W.	226	— <i>polycomum</i> Tr.	306
— <i>megastachyum</i> N. Es.	260	— <i>ornithopus</i> Tr.	201	— <i>polygamum</i> Sw.	268
— <i>megistion</i> Schult.	248	— <i>oryzinum</i> Gmel.	215	— <i>polygonatum</i> Schrd.	264
— <i>mel frugum</i> hort.	224	— <i>oryzoides</i> Ard.	215	— <i>polyphyllum</i> Br.	242
— <i>melicarium</i> Mchx.	294	— <i>ovale</i> Ell.	302	— <i>polystachyum</i> L.	183. adn.
— <i>Melinis</i> Tr.	291	— <i>ovuliferum</i> Tr.	277	— <i>polystachyum</i> Presl.	254. adn.
— <i>Meneritana</i> Spr.	329	— <i>pallens</i> Sw.	320. (321. 322)	— <i>potassium</i> Tr.	265
— <i>microstachyum</i> LaM.	295	— <i>palmifolium</i> Koen.	220	— <i>prionitis</i> N. Es.	292
— <i>miliaceum</i> L.	282	— <i>palmifolium</i> Poir.	249	— <i>proboscideum</i> Tr.	281
— <i>miliaceum</i> Walt.	267	— <i>paludicola</i> N. Es.	251	— <i>procumbens</i> N. Es.	246
— <i>miliare</i> LaM.	271. adn.	— <i>paludosum</i> Roxb.	267	— <i>procurrens</i> N. Es.	315
— <i>milioides</i> N. Es.	294. 345	— <i>palustre</i> Tr.	251	— <i>proliferum</i> LaM.	266. 271. adn.
— <i>minutulum</i> Gaudich.	331	— <i>paractaenoides</i> Tr.	219	— <i>prostratum</i> LaM.	246
— <i>molinioides</i> Tr.	267	— <i>paradoxum</i> Br.	217	— <i>pruriens</i> Tr.	200
— <i>mollissimum</i> Kth.	207	— <i>parvifolium</i> LaM.	312 (bis.)	— <i>pseudagrostis</i> Tr.	284
— <i>Monachne</i> Tr.	306		319. adn.	— <i>pseudocolonum</i> Roth.	215
— <i>monostachyum</i> Hb. Kth.	228	— <i>parvulum</i> Tr.	205	— <i>psilopodium</i> Tr.	290
— <i>montanum</i> Gaudich.	285	— <i>paspalooides</i> Pers.	241	— <i>Pterigodium</i> Tr.	296
— <i>multinode</i> LaM.	299. adn. 307	— <i>patens</i> Spr.	307	— <i>puberulum</i> Tr.	262. adn. 277
— <i>muricatum</i> Mchx.	216	— <i>pellitum</i> Tr.	285	— <i>pubescens</i> Mchx.	301
— <i>muscarium</i> Tr.	284	— <i>penicillatum</i> N. Es.	325	— <i>pulchellum</i> Radd.	236

	Pag.		Pag.		Pag.
<i>Panicum pumilum</i> Lk.	223	<i>Panicum scoparium</i> Mchx.	287	<i>Panicum subulatum</i> Spr.	318
— <i>pungens</i> Tr.	299	— <i>scoparium</i> Rudg.	280	— <i>sulcatum</i> Aubl.	220
— <i>purpurascens</i> Opiz.	222	— <i>scopuliferum</i> Tr.	234	— <i>sylvaticum</i> LaM.	211
— <i>pyramidalis</i> LaM.	245	— <i>secundum</i> Tr.	274	— <i>tejucense</i> N. Es.	221
— <i>racemosum</i> Spr.	310	— <i>Sellowii</i> N. Es. 262. <i>adn.</i>	277	— <i>tenacissimum</i> N. Es.	225
— <i>radicans</i> Retz.	506	— <i>semialatum</i> Br.	208	— <i>tenellum</i> LaM.	276
— <i>ramosissimum</i> Tr.	312	— <i>semirugosum</i> N. Es.	224	— <i>Teneriffae</i> Br.	297
— <i>ramosum</i> Koen.	290	— <i>serotinum</i> hort.	223	— <i>tenerum</i> Beyr.	541
— <i>ramulare</i> Tr.	204. <i>adn.</i>	— <i>serotinum</i> Tr.	205	— <i>tenuiculnum</i> Meyer.	252
— <i>ramulosum</i> Mchx.	304. 305	— <i>serratum</i> Spr.	254	— <i>tetrastrichon</i> Forsk.	213
— <i>rarum</i> Br.	238	— <i>setarium</i> hort.	224	— <i>Thrasya</i> Tr.	228
— <i>repandum</i> N. Es.	230	— <i>setarium</i> LaM.	210	— <i>thrasyoides</i> Tr.	229
— <i>repens</i> Burm. Roxb.	246	— <i>setifolium</i> N. Es.	318	— <i>trachypus</i> Tr.	258
— <i>repens</i> N. Es.	299	— <i>setigerum</i> PB.	508	— <i>trachyspermum</i> N. Es.	350
— <i>repens</i> Tr. (L?) 270. 299. <i>adn.</i>		— <i>setigerum</i> Retz.	246	— <i>trachystachyum</i> N. Es.	255
— <i>reptans</i> Kth.	310	— <i>setosum</i> hort.	224	— <i>trichanthum</i> N. Es.	290
— <i>rescissum</i> Tr.	218	— <i>setosum</i> Sw.	226. 227	— <i>trichoides</i> Sw.	290
— <i>Riedelii</i> Tr.	327	— <i>setosum</i> , β. N. Es.	226	— <i>trichophorum</i> Schrd.	252
— <i>rigens</i> Sw.	329	— <i>sibiricum</i> hort.	223	— <i>trichostachyum</i> ht. Gor.	202
— <i>rigidifolium</i> Tr.	309	— <i>Sieberi</i> Lk.	247	— <i>trinerve</i> Tr.	311
— <i>rivulare</i> Tr.	263	— <i>simplex</i> Rottl.	258	— <i>Trini</i> Kth.	309
— <i>rostellatum</i> Tr.	288	— <i>speciosum</i> N. Es.	220	— <i>triticoides</i> Poir.	183
— <i>rostratum</i> Mhlbg.	263	— <i>spectabile</i> N. Es.	216	— <i>truncatum</i> N. Es.	308
— <i>rottbölloides</i> Hb. Kth.	232	— <i>sphaerocarpum</i> Ell.	344	— <i>truncatum</i> Tr.	241
— <i>Rudgei</i> R. S.	280	— <i>spicatum</i> Roxb.	185	— <i>tuberculatum</i> Presl.	248
— <i>rugosum</i> Bosc.	304	— <i>Sprengelianum</i> Schult.	252	— <i>tumescens</i> Tr.	316
— <i>rugulosum</i> Tr.	279	— <i>squarrosum</i> Retz.	189	— <i>turgidum</i> Forsk.	309
— <i>rupestre</i> Tr.	314	— <i>stagninum</i> Host.	215	— <i>uliginosum</i> Roth.	255. <i>adn.</i>
— <i>ruscifolium</i> Hb. Kth. 262. <i>adn.</i>		— <i>stagninum</i> Koen.	216	— <i>umbellatum</i> Tr.	298
— <i>sabulicolum</i> N. Es.	215	— <i>stagninum</i> Sieb.	215	— <i>umbrosum</i> Lecont.	304
— <i>saccharoides</i> Kth.	149	— <i>stenocladium</i> Tr.	318	— <i>umbrosum</i> Retz.	246
— <i>saccharoides</i> Tr.	297	— <i>stigmosum</i> Tr.	289	— <i>uncinatum</i> Radd.	240
— <i>sanguinale</i> Burm.	243	— <i>stoloniferum</i> Poir.	250. 251	— <i>unciphyllum</i> Tr.	303
— <i>sanguinale</i> L.	200	— <i>striatum</i> Br.	204	— <i>undulatifolium</i> Ard.	210
— <i>sanguinale</i> Poll.	203	— <i>strictum</i> Bosc.	305	— <i>unguiculatum</i> Tr.	275
— <i>scaberrimum</i> Lag.	273	— <i>strictum</i> Br.	240	— <i>unisetum</i> Tr.	217. <i>adn.</i>
— <i>scabrifolium</i> N. Es.	227	— <i>strumosum</i> Presl.	255. <i>adn.</i>	— <i>Urvilleanum</i> Kth.	260
— <i>scabrum</i> LaM.	216. <i>adn.</i>	— <i>subalbidum</i> Kth.	261	— <i>vaginatum</i> N. Es.	296
— <i>scandens</i> Tr.	224	— <i>subcordatum</i> Roth.	247	— <i>velutinosum</i> N. Es.	237
— <i>Schraderi</i> Kth.	199	— <i>subeglum</i> Tr.	292	— <i>velutinum</i> Bosc.	302
— <i>sciurotis</i> Tr.	297	— <i>subquadriparum</i> Tr.	241	— <i>verrucosum</i> Mhlbg.	304
— <i>Sclerochloa</i> Tr.	231	— <i>subtile</i> N. Es.	202	— <i>verticillatum</i> L.	225

Pag.		Pag.	
Panicum vestitum Kth. . . .	256	Paspalum carinatum Flgg. . . .	163
— <i>villosum</i> Ell. . . .	302	— <i>chrysostachyum</i> Schrd. . . .	196
— <i>villosum</i> Hoffmseg. . . .	324	— <i>ciliare</i> Dec. . . .	201
— <i>villosum</i> Presl. . . .	297	— <i>ciliatifolium</i> Mchx. . . .	339
— <i>vilvooides</i> Tr. . . .	254	— <i>ciliatum</i> Hb. Kth. . . .	159
— <i>violascens</i> Kth. . . .	340	— <i>ciliatum</i> LaM. . . .	143
— <i>virgatum</i> L. 272. <i>adn.</i> 279		— <i>Commersonii</i> LaM. . . .	145
— <i>virgatum</i> Roxb. . . .	290	— <i>Commersonii</i> Zucc. . . .	165
— <i>viride</i> L. . . .	222	— <i>commutatum</i> N. Es. . . .	168
— <i>viride</i> Poll. . . .	221	— <i>complanatum</i> N. Es. . . .	147
— <i>viscidum</i> Ell. . . .	289	— <i>compressicaule</i> Radd. . . .	139
— <i>vulpinum</i> W. . . .	181	— <i>compressum</i> N. Es. . . .	146
— <i>Walteri</i> Poir. . . .	287	— <i>conjugatum</i> Berg. . . .	142
— <i>zizanioides</i> Hb. Kth. . . .	276	— <i>corcovadense</i> Radd. . . .	155
— <i>zonale</i> Guss. . . .	215	— <i>coryphaeum</i> Tr. . . .	154
<i>Paractaenium</i> PB. . . .	194	— <i>cristatum</i> Tr. . . .	152
<i>Pariana</i> Aubl. . . .	101. 105	— <i>ctenostachyum</i> Tr. . . .	133
— <i>lanceolata</i> Tr. . . .	107	— <i>cujabense</i> Tr. . . .	164
— <i>juncea</i> N. Es. . . .	106	— <i>curvistachyum</i> Radd. . . .	227
— <i>mollis</i> N. Es. . . .	106	— <i>dactylon</i> LaM. . . .	204
— <i>parviflora</i> Tr. . . .	105. <i>adn.</i>	— <i>dasyphyllum</i> Ell. . . .	340
— <i>scabra</i> N. Es. . . .	106	— <i>debile</i> Mchx. . . .	340
<i>Paspalum</i> L. . . .	101. 128	— <i>debile</i> Mhlbg. . . .	157
— <i>abstrusum</i> Tr. . . .	135	— <i>debile</i> Poir. . . .	205
— <i>ambiguum</i> DeC. . . .	204	— <i>décumbens</i> Sw. . . .	227
— <i>ammodes</i> Tr. . . .	158	— <i>densum</i> Poir. . . .	152
— <i>angustifolium</i> N. Es. . . .	145	— <i>denticulatum</i> Tr. . . .	156
— <i>anulatum</i> Flgg. . . .	130	— <i>dilatatum</i> Poir. . . .	162
— <i>arenarium</i> Schrd. . . .	137	— <i>dissectum</i> L. . . .	157
— <i>aspidiotes</i> Tr. . . .	140	— <i>dissectum</i> Tr. . . .	168
— <i>aureum</i> Hb. Kth. . . .	197	— <i>dissitiflorum</i> Tr. . . .	147
— <i>aureum</i> Tr. . . .	196	— <i>distachyon</i> Poit. . . .	142
— <i>barbatum</i> N. Es. . . .	150	— <i>distans</i> N. Es. . . .	202
— <i>barbatum</i> Schult. . . .	152	— <i>distichophyllum</i> Hb. Kth. . . .	145
— <i>barbigerum</i> Kth. . . .	150	— <i>distichum</i> Sw. . . .	141
— <i>blepharophorum</i> R. S. . . .	158	— <i>elegans</i> Flgg. . . .	155
— <i>brachystachyum</i> Tr. . . .	135	— <i>erianthum</i> N. Es. . . .	159
— <i>brevisolium</i> Flgg. . . .	205	— <i>eucomum</i> N. Es. . . .	143. 165
— <i>caespitosum</i> Flgg. . . .	137. 359	— <i>excavatum</i> Tr. . . .	197
— <i>campestre</i> Tr. . . .	144	— <i>fasciculatum</i> W. . . .	151
— <i>canescens</i> N. Es. . . .	197	— <i>fastigiatum</i> N. Es. . . .	143
— <i>capillare</i> LaM. . . .	135		

	Pag.		Pag.	Pag.	
<i>Paspalum marginatum</i> Tr.	147	<i>Paspalum ramosissimum</i> N. Es.	196	<i>Pennisetum dichotomum</i> Delile.	182
— <i>maritimum</i> Tr.	148	— <i>saccharoides</i> N. Es.	149	— <i>fasciculatum</i> Tr.	181
— <i>membranaceum</i> LaM.	165	— <i>sanguinale</i> Poir.	201	— <i>geniculatum</i> Icq.	222
— <i>mucronatum</i> Mhlbg.	139	— <i>sanguinolentum</i> Tr.	159	— <i>glaucum</i> Br.	221
— <i>Neesii</i> Kth.	146	— <i>scalare</i> Tr.	138	— <i>hordeiforme</i> Spr.	177
— <i>notatum</i> Flgg.	141	— <i>scrobiculatum</i> L.	144. (458)	— <i>japonicum</i> Tr.	176
— <i>nutans</i> LaM.	227	— <i>scutatum</i> N. Es.	161	— <i>latifolium</i> Spr.	180
— <i>obtusifolium</i> Radd.	152	— <i>serotinum</i> Flgg.	205	— <i>macrostachyum</i> Tr.	177
— <i>orbiculare</i> Forst.	157	— <i>serpens</i> N. Es.	136	— <i>macrorurum</i> Tr.	178
— <i>orbiculare</i> Poir.	136	— <i>setaceum</i> Mchx.	144. adn.	— <i>myosuroides</i> Spr.	172
— <i>ovatum</i> N. Es.	162	— <i>stellatum</i> Flgg.	164	— <i>nervosum</i> Tr.	177
— <i>pallidum</i> Hb. Kth.	167. adn.	— <i>stellatum</i> Tr.	163	— <i>parviflorum</i> Tr.	179
— <i>paniculatum</i> L.	138	— <i>stoloniferum</i> Bosc.	152	— <i>pedicellatum</i> Tr.	184
— <i>papillosum</i> Spr.	134	— <i>strictum</i> Pers.	159	— <i>phalaroides</i> Schult.	182
— <i>parviflorum</i> Rhod.	137	— <i>sucentrum</i> Tr.	151	— <i>purpurascens</i> Hb. Kth.	183
— <i>patulum</i> Horn.	204	— <i>suffultum</i> Mik.	149	— <i>purpurascens</i> Sw.	183
— <i>pectinatum</i> N. Es.	140	— <i>supinum</i> Bosc.	156	— <i>Richardi</i> Kth.	183
— <i>pedunculatum</i> Poir.	227	— <i>Swarzianum</i> Flgg.	135	— <i>scandens</i> ht. Vien.	224
— <i>pellitum</i> N. Es.	151	— <i>tenax</i> Tr.	160	— <i>setosum</i> Rich.	182
— <i>plantagineum</i> N. Es.	155	— <i>tenellum</i> ht. Par.	155	— <i>triticoides</i> R. S.	183
— <i>platense</i> Spr.	162	— <i>tenue</i> Gaertn.	145	— <i>typhoides</i> Rich.	184
— <i>platycaule</i> Poir.	146. 148. adn.	— <i>tridentatum</i> Tr.	132	— <i>uniflorum</i> Hb. Kth.	183
— <i>plicatulum</i> Mchx.	161	— <i>tristachyum</i> LaM.	146	— <i>uniflorum</i> Sieb.	183
— <i>plicatum</i> Pers.	161	— <i>umbrosum</i> Tr.	155	— <i>verticillatum</i> Br.	225
— <i>polyphyllum</i> N. Es.	145	— <i>undulatum</i> Poir.	161	— <i>violaceum</i> hort.	183
— <i>praecox</i> Walt.	160	— <i>vaginatum</i> PB.	142	— <i>viride</i> Br.	223
— <i>protensum</i> Tr.	156	— <i>vaginatum</i> Sw.	141	<i>Perotis latifolia</i> Ehl.	178
— <i>pruinosum</i> Tr.	154	— <i>velutinata</i> Kth.	207	<i>Phalaris muricata</i> Forsh.	171
— <i>pubescens</i> hort.	154	— <i>virgatum</i> L.	153	— <i>setacea</i> Forsh.	182
— <i>pubescens</i> Lag.	153	— <i>virgatum</i> Walt.	161	— <i>velutina</i> Forsh.	201
— <i>pubescens</i> Mhlbg.	156	<i>Penicillaria Plukeneti</i> Lk.	185	— <i>villosa</i> Mchx.	305
— <i>pulchrum</i> W.	196	— <i>spicata</i> W.	185	<i>Pharus</i> L.	101. 108
— <i>punctatum</i> Flgg.	131	<i>Pennisetum</i> Rich.	102. 175	— <i>brasiliensis</i> Radd.	109
— <i>purpurascens</i> Ell.	539	— <i>alopecuroides</i> Steud.	178	— <i>glaber</i> Hb. Kth.	109
— <i>purpureum</i> Rz. et Pav.	152	— <i>articulare</i> Tr.	179	— <i>lappulaceus</i> Aubl.	109
— <i>pusillum</i> Vent.	136	— <i>borbonicum</i> Kth.	185. adn.	— <i>latifolius</i> LaM.	109
— <i>pyramidalis</i> N. Es.	166	— <i>breve</i> N. Es.	183	— <i>latifolius</i> L.	109
— <i>quadrifarium</i> ht. Ber.	153	— <i>cenchroides</i> Rich.	181	— <i>micranthus</i> Schrd.	109
— <i>quadrifarium</i> LaM.	167	— <i>cereale</i> Tr.	185	— <i>pubescens</i> Spr.	109
— <i>racemosum</i> Icq.	152	— <i>ciliare</i> Lk.	181	— <i>scaber</i> Hb. Kth.	109
— <i>radiatum</i> Tr.	195	— <i>compressum</i> Br.	176	<i>Piptatherum annulatum</i> Radd.	131

	Pag.		Pag.		Pag.
<i>Piptatherum caerulescens</i> PB.	126	<i>Setaria italica</i> PB.	224	<i>Stipa membranacea</i> Parsh.	126
— <i>comosum</i> R. S.	125	— <i>longiseta</i> PB.	218	— <i>ovata</i> Tr.	125
— <i>frutescens</i> Lk.	125	— <i>macrochaeta</i> Igq.	225	— <i>panicoides</i> LaM.	124-125
— <i>holciforme</i> R. S.	126	— <i>macrostachya</i> Hb. Kth.	226	— <i>setifolia</i> Kth.	124
— <i>multiflorum</i> PB.	125	— <i>maritima</i> R. S.	225	— <i>spinifex</i> L.	104
— <i>nigrum</i> Torr.	127	— <i>megapotamica</i> Spr.	226	— <i>trichotoma</i> N. Es.	124
— <i>paradoxum</i> PB.	126	— <i>Meyeri</i> Kth.	252	— <i>villosa</i> Wall.	126
— <i>punctatum</i> PB.	151	— <i>nubica</i> Lk.	225	<i>Strephium distichophyllum</i> Schrd.	117
<i>Piptochaetium setifolium</i> Presl.	124	— <i>pilosa</i> Kth.	252	<i>Suardia picta</i> Schrk.	291
<i>Pollinia undata</i> Spr.	211	— <i>Poiretiana</i> Kth.	220	<i>Syntherisma cilare</i> Schrd.	201
		— <i>polystachya</i> Schrd.	227	— <i>glabrum</i> Schrd.	203
		— <i>pumila</i> Schult.	225	— <i>serotinum</i> Walt.	203
		— <i>purpurascens</i> Hb. Kth.	222	— <i>vulgare</i> Schrd.	201
<i>Raddia brasiliensis</i> Bertol.	117	— <i>rariflora</i> Mik.	226		
<i>Reimaria Flgg.</i>	101. 169	— <i>scandens</i> Schrd.	224		
— <i>acuta</i> Flgg.	169	— <i>Schraderi</i> Kth.	252	<i>Thalamus montevidense</i> Spr.	510
— <i>conferta</i> N. Es.	170	— <i>semirugosa</i> Kth.	224	<i>Thouarea P. Th.</i>	102. 186
<i>Rottböllia complanata</i> Sw.	190	— <i>setosa</i> PB.	226	— <i>involucrata</i> Eschsch.	187
— <i>dimidiata</i> L. f.	190	— <i>sulcata</i> Bert.	220	— <i>media</i> Br.	187
— <i>dimidiata</i> Sw.	190	— <i>tejucensis</i> Kth.	221	— <i>sarmentosa</i> Pers.	187
— <i>stolonifera</i> Poir.	190	— <i>tenacissima</i> Schrd.	225	<i>Thrasya cultrata</i> N. Es.	228
— <i>tripsacoides</i> LaM.	190	— <i>Trinitii</i> Kth.	224	— <i>hirsuta</i> N. Es.	229
		— <i>Ventenatii</i> Kth.	221	— <i>paspaloides</i> Hb. Kth.	228
<i>Saccharum polystachyum</i> Sw.	149	— <i>verticillata</i> PB.	225	<i>Thysanachne scoparia</i> Presl.	334
— <i>repans</i> LaM.	310	— <i>viridis</i> PB.	222	<i>Trachys</i> Pers.	102. 188
— <i>Teneriffae</i> , L. f.	297	<i>Sorghum serratum</i> R. S.	234	— <i>muricata</i> Pers.	189
<i>Setaria PB.</i>	194. 217.	<i>Spinifex L.</i>	101. 103	<i>Tragus alienus</i> Schult.	171
— <i>alopecurus</i> ht. Gor.	227	— <i>hirsutus</i> LaB.	104	— <i>Berteroianus</i> Schult.	171
— <i>brachiata</i> Kth.	269	— <i>squatrosus</i> L.	104	— <i>biflorus</i> Schult.	171
— <i>caudata</i> R. S.	226	<i>Stenotaphrum</i> Tr.	102. 189	— <i>muricatus</i> Mönch.	171
— <i>composita</i> Hb. Kth.	227	— <i>americanum</i> Schrk.	190	— <i>occidentalis</i> N. Es.	171
— <i>compressa</i> Kth.	176	— <i>complanatum</i> Schrk.	190	— <i>racemosus</i> Hall.	171
— <i>corrugata</i> Schult.	221	— <i>dimidiatum</i> Brongn.	190	<i>Trichachne ferruginea</i> N. Es.	208
— <i>flava</i> Kth.	221	— <i>glabrum</i> Tr.	190	— <i>insularis</i> N. Es.	255
— <i>geniculata</i> PB.	222	— <i>Königii</i> Schrk.	190	— <i>sacchariflora</i> N. Es.	255
— <i>germanica</i> PB.	225	— <i>sarmentosum</i> N. Es.	190	— <i>velutina</i> N. Es.	256
— <i>glauca</i> PB.	221	— <i>subulatum</i> Tr.	190	<i>Tricholaena micrantha</i> Schrd.	297
— <i>gracilis</i> Hb. Kth.	222	<i>Stipa bicolor</i> , β. N. Es.	125	<i>Tripsacum hermaphroditum</i> L.	174
— <i>gracilis</i> Spr.	226	— <i>canadensis</i> Poir.	127	<i>Tristachya</i> N. Es.	102. 336
— <i>hirsuta</i> Kth.	238	— <i>hymenodes</i> R. S.	126	— <i>chrysothrix</i> N. Es.	337
— <i>imberbis</i> R. S.	222	— <i>junccea</i> Mchx.	127	— <i>lejostachya</i> N. Es.	338

	Pag.		Pag.	Pag.	
Tristachya leucothrix Tr.	357	Urachne lanata Tr.	126	Urochloa glabra Brongn.	244
— mexicana Kth.	358	— leucosperma Lk.	128	— panicoides PB.	243
Tristegis glutinosa N. Es.	291	— melanosperma Lk.	127	— paspaloides Presl.	245
		— multiflora Lk.	125	— pubescens Kth.	238
		— panicoides Tr.	124	— semialata Kth.	209
Urachne Tr.	101. 122	— parviflora Tr.	125	— uniseta Presl.	217. adn.
— asperifolia Tr.	128	— racemosa Tr.	127		
— brevicaudata Tr.	127	— setosa Tr.	124	Virgaria Tr.	194. 247
— caerulescens Tr.	125	— trichotoma Gr.	124		
— chilensis Tr.	125	— virescens Tr.	126	Xerochloa Br.	102. 186
— frutescens Lk.	125	Urochloa PB.	193. 208	— barbata Br.	186
— grandiflora Tr.	126	— cimicina Kth.	208	— imberbis Br.	186



A

CATALOGUE OF BOOKS

RELATING TO

FERNS,

THE MOST OF WHICH ARE GENERALLY ON SALE (EITHER NEW
OR SECOND-HAND) BY WILLIAM PAMPLIN.

- Agardh, J. G. Recensio specierum generis Pteridis. 4s. - Lundæ, 1840
- Agardh, J. G. De Pilularia, &c. 2s. - - - - 1833
- Bauer and Hooker's Genera Filicum.
- Blume, C. L. Enumeratio plantarum Javæ, fasciculus 2dus (being the part which contains the Ferns of Java exclusively). 6s. - - - Hagæ, 1830
- Bolton, J. Filices Britanniæ. 4to. - - - - - Leeds, 1785-1790
- Don, D. Remarks on some British Ferns. 4to, 1s. 6d. *From Linn. Trans.*
- Dryander, J. Lindsæa, a new Genus of Ferns. 4to, five Plates, 3s. 6d. *From Linn. Trans.*
- Francis, G. W. British Ferns and their Allies. 2nd edit. 8vo. cloth. Lond. 1843
- Gopperti, H. R. Systema Filicum Fossilium, with 44 plates. 4to, £1. 11s. 6d. Bonn, 1836
- Greville, R. K. Some Account of a Collection of Cryptogamous Plants from the Ionian Islands. 3s. 6d. 4to plates. *From Linn. Trans.*
- Hedwig, R. A. Filicum Genera et Species, analytice descripta, iconibus coloratis illustrata. Folio, cold. plates, 10s. 6d. - - - - - Lips. 1799
- Hooker et Greville. Icones Filicum. 2 vols. folio.
- Kaulfuss, G. F. Enumeratio Filicum quas in itinera circa terram legit cl. Ad. de Chamisso, in omnia genera permultasque species animadvers. &c. &c. Two plates, 5s. 6d. - - - - - Lips. 1824

CATALOGUE OF BOOKS (*continued*).

- Kaulfuss, G. F. Das Wesen der Farnkräuter, &c. 4to, plates, 5s. Lips. 1827
- Kunze, G. Die Farnkräuter in Kolorirten Abbildungen oder Supplement zu Schkuhr's Farnkräuter. 4to. 1ste, 2te und 3te lieferungen. 30 fine coloured plates of Ferns. £1. 10s. - - - - Leipzig, 1840
- Langsdorff et Fischer. Plantes recueillies pendant le voyage des Russes autour du monde. Première partie : Icones filicum, T. 1—10. Folio, 10s. Tubing. 1810
- Lindsay, J. On the Germination and raising of Ferns from Seed. 2s. 4to plates. *From Linn. Trans.*
- Link. Filicum Species, &c. Sewed, 4s. - - - - Berlini, 1841
- Newman. History of British Ferns, with eighty-seven Illustrations. 10s. 1840
- Newman. History of British Ferns. 2nd ed. Part I. with 59 Illustrations. 8s. 1844
- Plumier. Déscriptions des Plantes de l'Amérique. Folio. £1. 7s. 6d. Paris, 1697
- Plumier. Tractatus de Filicibus Americanis. Folio. £2. 2s. - Paris, 1705
- Presl. Pteridographiæ Tentamen, &c. 12 plates, sewed, 14s., or half calf, lettered, 16s. 6d. - - - - - 1836
- Salisbury, R. A. On the Germination of Lycopodium denticulatum. 1s. 6d. 4to plate. *From Linn. Trans.*
- Schlechtendal. Adumbrationes plantarum. Adumbrationes flicum in Promontorio Bonæ Spei provenientium. Cum tab. æn. 4to. Several fasciculi, at 3s. 6d. each. - - - - - Berol. 1825
- Sadler. De Filicibus Hungariæ, &c. Sewed, 3s. - - - - Buda, 1830
- Swartz. Synopsis Filicum, &c. Plates. 12s. sewed or 14s. half calf. Killiæ, 1806
- Schott. Genera Filicum. Plates. 4to. The Four Parts, all published. Vienna, 1834, &c.
- Schkuhr, C. Farnkräuter (Ferns). Large 4to, complete, with 219 fine coloured plates.
- Vaucher, J. P. Monographie des Prêles, (Equisetum). 4to. 14 plates, 9s. Geneva, 1822
- Weber und Mohr. Kryptogamische Gewachse, Filices, &c. 24mo. Col. plates, 6s. 6d. Same with plain plates, 4s. 6d. - - - - Kiel, 1807





Digitized with financial assistance from the
Government of Maharashtra
on 02 April, 2016

