





活陳皮一例參。

丹參 紅花 烏藥 赤芍 桃仁 澤蘭 延胡  
獨活 陳皮 温服

土八 養血和中

吐衄便紅推土八。歸身續斷與丹參。青紅茜赤檀翹壳。養  
血和中力自深。

歸身 繼斷 丹參 青皮 紅花 茜草 赤芍  
檀肉 連翹 枳壳 微溫服

革一 治痧氣血阻塞

革一同前。血阻明肝心肺部患非輕。蒺藜荆荷赤青陳等案有銀翹膝益名。

白蒺藜末。荆芥炒黑。薄荷。赤芍。青皮。陳皮等分。微冷服。溺血案加銀花連翹牛膝益母。

## 革二

眼目奇瘳。革二方。梔翹丹決斛銀涼。壳牛芍茜加童便。外有當歸可酌量。原歌夾列當歸

黑梔。連翹。丹皮。草決明。石斛。銀花。枳壳。牛膝。赤芍。茜草。臨服加童便。

革三

目症革三須穀精。連通菊賊芍羌荆。羚羊生地兼生草。更有將軍望月明。

穀精

黃連

木通

甘菊

木賊

赤芍

羌活

荆芥

羚角

生地

生草

大黃

望月沙

煎服

革四

革四牙疳中白主。官硼粉黛共肩差。二茶荷草黃連等冰  
片珠牛拭腐吹。原歌缺雨前茶。

人中白

三錢官硼

花粉

青黛各錢

兒茶

雨前茶

薄荷 甘草 黃連各五分 冰片一分 珠子 牛黃各半分 研無聲濃茶拭淨去腐吹。

革五 行經痧散

倒經革五婦人科腹脹痧攻血衄多。桃附青紅楂獨細放痧煎用便沖和。

桃仁 香附 青皮 紅花 山楂 獨活 細辛

水煎加童便飲

革六

胎前革六解痧虞。益附紅荆葛麪俱。桑寄難求辛略減。煎

成沖服與砂須。

紅花亦少用

益母 香附 紅花 荆芥 菖子 神麌 桑寄生

細辛 沖砂仁末服

革七

革七原知產後虛散瘀須是帶消瘀。櫨銀丹益柴牛獨烏  
斛陳辛綬痛除。

山櫨 銀花 丹參 益母 柴胡 牛膝 獨活

烏藥 石斛 陳皮 細辛 水煎

革八

革八仍前產痘求。櫧銀丹益獨柴牛別加桃艾蘇薑附縱  
有諸邪不用憂。

山櫧 銀花 丹參 益母 獨活 柴胡 牛膝  
桃仁 艾葉 蘇木 薑黃 香附

木一

痘前木一看筋先翹壳荆防用必兼芳桔青紅櫧葛子散。  
痧發痘自安全。

連翹 枳壳 荆芥 防風 牛蒡 桔梗 青皮

紅花 山櫧 葛子 牛蒡原歌有方無

木二 治痧後熱毒流連不已。

木二瘡瘍熱毒攻。羌藥歸膝穗翹通。青皮蟬退紅花合腫痛都隨痧氣空。

羌活 牛蒡 當歸 牛膝 荆穗 連翹 木通

青皮 蟬蛻 紅花等分 温服

木三 消痧後餘毒竊發

紅腫純陽用木三。荆勞土貝菊銀甘。翹通紅紫兼桃肉。竊發無虞痧毒酣。原歌少紅花

荆芥 牛蒡 土貝 甘菊 銀花 甘草 連翹

木通 紅花 紫花地丁等分 胡桃肉一枚 温服

木四 治痧後餘毒。流連氣血不能卽潰者。

本四流瘟毒潰遲。銀紅歸草貝參芪芷檀角膝胡桃肉。莫使流連氣血移。原歌少膝

銀花 紅花 當歸 甘草 貝母 人參 黃芪  
白芷 山楂 角刺 擣牛膝 加桃肉一個煎七分空心溫服

木五 痘後熱毒瘡疔。疼痛不已。

木五瘡疔芍大黃粉連乳沒貝雄勞穿山甲與生甘草研

末五分調蜜湯。

原歌少粉蓼草

赤芍二錢 大黃炒一錢 花粉 黃連 乳香淨 没藥淨

川貝去心炒 雄黃 牛蒡炒一錢

穿山甲土炒八分

生甘草七分

共研末蜜湯調服五分。

木六 痘氣退盡。氣血虛弱者。用木六七方補之。

木六防邪痘後滋。芎歸地芍補虛羸。參苓术草陳芪并好。  
待瘳清應候施。

川芎 當歸 熟地 白芍 人參 茯苓 白术

生甘草 陳皮 黃芪 水煎空心服。

木七 痘退調理

木七再商痧後藥。銀蒡貝藥扁歸櫨。人參甘草無多用。蓮肉胡桃作引加。

銀花 牛蒡 土貝 山藥 白扁豆 當歸 山楂

錢各一 人參 四分 甘草 三分 蓮肉 六枚 桃肉 一個

空心服

木八 治數患痧者必待全愈然後服之以絕其根。

若痧氣未除則不可服恐甘者作脹熱者助邪耳。

木八能教痧絕根待他全愈妙方存。鹽礬甘草乾薑共米

飯爲丸湯帶溫。

食鹽炒明礬火飛各兩川烏炒甘草各五錢乾薑三錢

共爲細末米飯爲丸每服一錢白湯溫下新犯痧者一二服卽愈久犯痧者十服全愈蓋甘草以助胃薑烏以充胃明礬以解毒食鹽以斷痧誠爲良方人屬虛寒必加培多服方能有效

八丸金七八石一七絲一匏一土五木八

九末石二四五絲一二三四五竹五木五

兩次竹一革四

四十六湯內附溫方 加減法金一五絲八

應用羣方第十七

玉樞丹 治癰氣蠱毒。解惡藥服砒毒。菌河豚死牛馬肉。  
狐狸鼠蟻之毒。蛇犬惡蟲所傷。一切瘡疽發背。瘡癰赤  
腫諸瘤。不服水土。隨手取應。

山茨姑 俗名金燈籠葉似韭花似燈籠色白上有黑點

結子三稜二月苗三月花四月枯於苗時記地秋冬空

得之上有毛裏此味不真則不效去皮焙二兩

文蛤 卽

五焙子搘破洗焙乾秤三兩

紅芽大戟 去蘆焙乾兩半

千金子 卽續隨子去壳研去油取霜兩  
麝香 研末三錢

上三味爲末入千金麝香研勻和糯米濃飲木臼內杵  
千餘分爲四十錠宜當午七夕重陽淨室修製毋令女  
人孝子鷄犬見每用一餅薑汁薄荷湯研服井華水冷  
磨亦得通利兩次無妨用溫粥補孕婦不可服

瘡疽發背未破時用涼水磨塗並服良久覺痒卽消

陰陽二毒傷寒心悶狂亂胸滿邪毒未發并瘟疫嵐障  
纏喉風痧脹腹疼冷水入薄荷一小葉同磨下

急中風顛鬼胎鬼氣用無灰酒下

縊溺心頭暖者驚死鬼迷未隔宿者並井水磨灌

蛇犬蜈蚣傷冷水磨塗。

新久諸瘡當日桃柳枝煎湯磨下。

小兒急慢驚風五疳一爛蜜水薄荷葉同磨下。牙關緊急磨塗并服。

牙痛含少許吞下。

湯火傷東流水磨塗。

跌打傷損炒松節無灰酒下。

頭疼太陽痛酒磨。爛塗紙貼。太陽穴。

諸癰口喎斜。唇眼掣反。夜睡多涎言語蹇澁。卒中風口

噤筋攣。肢節腫痛並用酒磨下。

牛黃八寶丹 治痧發斑發狂。渾身赤紫。痧後毒癘隨消。

元參 瓦焙 明雄黃 各五錢 羌活 炒川黃連 土炒犀角

羚羊角 川貝母 炒去心 乳香 淨沒藥 各三錢 青黛 水

澄二錢 珍珠 四分劈砂水飛五錢 牛黃 冰片 各二錢

右法製細末外將揀淨銀花、甘菊、紫地丁 各一二兩

甘草 五錢 長流水五碗。砂鍋慢火煎至半取汁絞瀘清

桑柴熬膏。入煉蜜蓋許再熬粘箸和前末丸。每丸三分。  
幼一丸長二丸蜜湯調服。牛黃冰片過多擬用二分。

仙方腦麝丸 治嵐瘴。解茶痰酒渴。除伏暑。退心熱。止喉疼。開目霧及赤白痢。一切火症神效。

黃藥子 白藥子各三兩 天花粉二兩 川連兩 用心擇  
過研末篩細。止用頭末。廣木香三錢 沉香二錢 麝香五分  
片腦三分 猪胆調蒸爲丸。每丸一分。

瘴氣痰渴老年痰火。臨卧噙化三丸。暑路常噙一丸。止渴消暑。如感大熱。用五七丸同好茶一撮。鹽梅一個。擂碎。井華水調下。心熱頭疼目霧。噙化三五丸。赤痢用茅根汁擂七丸。白痢用茶梅擂服。痧脹面赤身熱。喘急昏

迷者服下卽甦、

鬱金丸 隨常痧症腹痛者。二服見功。且治九種心疼。

五靈脂

醋炒兩

一延胡索

八錢

砂仁

炒生明礬

各五錢

木

香

不見火

真鬱金

勿用薑黃代

雄黃爲衣

各三錢

香不見火

真鬱金

勿用薑黃代

雄黃爲衣

各三錢

神麴糊丸

葛子大

每卅五六丸

唾津咽下

須少用溫水

煉石丹

痧脹通用

水不可丸

竟用神麴糊亦得

千年石

卽陳石灰水飛兩

松根石

卽真琥珀三錢

水骨

石

卽白滑石水飛二錢

水滴

爲丸表熱煩燥者青黛

爲衣眩暈心悶者硃砂

爲衣每二錢垂頭蘆粟湯下

爲衣眩暈心悶者硃砂爲衣每二錢垂頭蘆粟湯下

硫礬九 硫黃 明礬 各四兩 同入罐用豆腐漿煮一日  
夜去腐渣。再慢火熬至乾燥連罐埋地三尺三日取出  
成紫金色。下一層有泥渣不用。茯苓 山藥 各三兩

二味同蒸晒乾露一宿 當歸

酒洗炒燥四兩

白蒺藜

酒浸一宿炒燥四兩 烏藥 略炒三兩

半夏 水浸一宿入

薑汁二兩明礬五錢角刺切碎兩同煮多用水煎乾三

兩 杏仁 去皮尖焙兩半 陳皮

去白二兩

小茴 炒燥一

共細兩

末同製硫礬。用膠棗肉丸。菜豆大。每清晨鹽湯下。錢半

臨卧白湯下一錢。

有人病痧十年發則叫喊暈死。或用醋灰熏鼻。或鹽湯探吐。并用華陀危病方畧得解醒後服此丸全愈除根。予屢行多效真神方也。

附華陀危病方

吳茱萸

木瓜

食鹽

各五錢同炒焦

砂罐水三碗煮百沸隨病人冷熱任意服之卽甦

潤下丸

治大腸燥實二便秘結。痧毒壅盛者。

大黃

酒製四兩

黑丑炒

頭末二兩

牙皂煎汁丸鳳仙子

大每服一錢多至二錢止燈心湯下。不獨潤腸兼利

小便

治膨香圓丸 或水或食或氣俱治。

蘿蔔子炒六兩陳香圓四兩醋製香附三兩廣皮去白

荆三稜

醋炒

蓬莪遠

醋炒

澤瀉

茯苓各二兩

山楂去

核青皮去瓢各兩

神麴糊丸

豌豆大

每服五六十丸米

飲下

大恙活湯 經云兩感者死不治。一曰太陽與少陰俱病。

頭痛發熱惡寒口乾煩懣而渴太陽者府也。自背俞而

入人所共知少陰者藏也。自鼻息而入人所不知也。鼻

氣通于天。故寒邪無形之氣從鼻而入腎爲水。水流濕。

故腎受之。又云天之邪氣感則害人五臟。以是知內外兩感臟腑俱病。欲表之。則有裡。欲下之。則有表。表裡既不能一治。故死矣。然所稟有虛實。所感有淺深。虛而感之深。必死。實而感之淺。猶或可治。

羌活 獨活 防風 防已 黃芩 黃連 蒼朮  
白朮 細辛 炙草各等分 知母 川芎 生地倍之  
俱片每服兩半煎一大盞熱飲之。不解再服。  
此解利兩感神方也。若涉症與此彷彿。亦以是方加減  
而選用之。

加減聖效散。治傷寒時疫風濕陰陽兩感。表裡未辨。或外熱內寒。或外寒內熱。肢節拘急。頭項腰脊疼痛。發熱惡寒。嘔逆喘咳。鼻塞聲重。及飲食生冷。傷在胃腕胸膈飽憊。腸脇脹痛。心下痞結。手足逆冷。腸鳴泄瀉。水穀不消。小溲不利等症。東坡蒞杭多疫。設劑活衆。原名聖散子。今有痧症相類。療之悉效。

葛子 炒砂仁 炒研 檳榔 陳皮 延胡 各八錢 厚朴  
防風 蒼朮 藜本 蕁香葉 柴胡 獨活 石菖蒲  
澤瀉 枳壳 細辛 各五錢 草豆蔻 去壳十個

共粗末每五錢水盞半煎一盞去滓溫服不計時候取遍身微汗卽愈時氣不和空心飲之可辟邪疫如聖散治當心而痛遍身骨節牽疼或嘔吐惡心不時發作者兼治疝氣勞根此方可補疝脹所不逮

枳壳麪炒三兩小茴微炒三錢鹽磚錠上燒紅三分

爲細末每服二錢溫酒調下如不止再服一錢

失笑散治血迷心竅不知人事婦人產後心腹絞痛及腹中瘀積血作痛者男婦慣發疝脹服此永不再犯

靈脂去砂炒蒲黃炒等分爲末每一二錢溫酒調下

普濟消毒飲。泰和間疫癘初憎寒壯熱體重次傳頭面腫盛目合喉喘舌乾口燥俗云大頭傷寒諸藥莫治東垣云身半以上天之氣也邪熱客於心肺上攻頭面而爲腫耳製方活衆刻石以傳。醫方集解此方微有不同。

黃芩

黃連

各酒炒五錢牛蒡

大黃各三錢陳皮去

白元參

生甘草

連翹

板藍根

各二錢

馬勃

一錢川

芎

防風

各八分殭蠶炒

升麻

柴胡各七分

薄荷五

分桔梗三分

共細末半用湯調頻服半用蜜丸噙化

盡劑而愈或水煎食遠溫服原無大黃便秘功用酒煨

祛瘧辟瘟丹 治時疫瘧瘧老幼男婦皆同者

厚朴 蒼朮 羌活 防風 陳皮 枳實 香附

牛蒡子各一錢 檳榔 白芷各八分 藿香 川芎各五

分細辛四分 甘草三分 薑葱煎服

無汗加蘇葉薄荷口渴花粉葛根身重汗出防已石膏

溫瘧

柴胡半夏遍身疙瘩腫痛

藍葉大黃殭蠶

肌肉發

紅黑紫斑

元參大青連翹大便秘結大黃先中熱又中

暑加白虎香薷

頭疼川芎風溫身體灼熱

芩連枳子咳

嗽涕唾頭目昏眩

荆芥金沸草 金沸草卽旋覆花

白虎湯。治溫病身熱。自汗口乾。脈來洪大。霍亂傷暑發。  
痧神妙。

石膏 煥五錢 知母 三錢 甘草 一錢 米一撮

病在陽明肌肉。則巨陽之表邪已解。故外不惡寒。又無頭痛身疼之症。但自汗而發熱也。經日熱淫所勝。佐以苦甘。以知母甘草解其熱。蓋熱則傷氣。用粳米甘草之甘。以益其氣。且治不眠煩躁也。煩者肺躁者腎也。以石膏爲君。佐知母之苦。以清腎之源。因石膏體堅而重墜。

知母沉寒而走下。故用米草之甘以緩之。使不速達于下焦也。白虎金神司秋者也。暑火至秋而衰。且知母苦寒又能保太陰肺金之氣。故名白虎以爲三陽經一解表藥耳。雖是三陽解表藥。切記有汗當施。無汗當戒。蓋無汗者。必須柴葛升麻以解表邪。不可見其身熱誤用白虎以鬱遏其熱。使不能外越也。

汾嘗驗溫病久而無汗。有必兼白虎乃解者。溫瘡宜桂枝白虎。醫方集解明言之矣。至于柴葛升麻亦自各有所宜。傷寒論注等書自悉。

記異症方案一條

清江劉姓年四旬遇疫遭數喪自外

歸母病旋卒遂成驚悸不寐略睡去卽叫跳其心如蕩

如撞服天王補心丹之類半月不效予用奇方製就琥珀丸三服遂定

每服三分三厘共一錢

又變怪症飲食如

故忽然目翻涎流喊如羊其頭側過左肩手亦向左反

張突起旋走面如土色食頃稍甦日夜百番或曰羊癇

曰痓病然癇症當見怪脈今無脈非五癇可知若作痓

治用麻黃發汗續命驅風恐立斃耳予書原載角弓痧

症畧相似卽投煉石丹一服日夜各減半二服日全不

發晚止數次。三服全愈。但面色不正。另立丸方調理而痊。

真琥珀 同燈心研四錢辰砂研細取猪心血和仍放入

心內濕紙包煨心熟爲度取出晒乾五錢整大半夏一

洗淨同薑汁半盞牙皂白礬各三錢煮透心極熟晒乾

用八錢胆星六錢石菖蒲 灸草各五錢

一兩 杓仁二兩遠

志肉 白茯神 橘紅 歸身 柏子仁 山藥 麥

冬各一煮棗肉丸梧子大金箔爲衣每服三十丸臨卧

圓眼灯心湯下。此丸兼治怔忡健忘驚悸顛癇等症。

加味活命飲 一切痧後留滯熱毒發爲瘡腫發背疔疽

穿山甲 土炒銀花 大黃 各三錢 歸尾 陳皮 各錢半

花粉 赤芍 生地 薄荷 防風 白芷 貝母

甘草節

乳香

各一錢

沒藥

淨

角刺

各五分

以上三味後下

毒在背 加角刺

錢半

在腹 加白芷

在胸 加

蔓仁二錢

在頭面手足 加銀花五錢 水入大瓦瓶封口煎溫服側睡

忌鉄器酸味諸毒物

一方無軍地荷好酒煎大潰勿服

六一散 降火利竅解煩渴

無濕者多服反耗津液加渴

水飛滑石

六兩

粉草末

一兩

夏月涼水調飲加硃砂名益

元散 治小兒身熱咳嗽微帶驚風。灯心湯調服屢效。  
治腹痛法 取大公雞一隻其人仰卧放肚上。鷄卽伏好。  
疼止卽跳下而愈此法試過亦驗。

又法 凡痧屬肝經者多肝附于背第七骨節間遇犯痧者先循其七節骨縫中將大指甲重掐入候內骨節响方止以鹽塗之如不响卽將鹽重擦必使透入遂能止疼。

補原本未列方 五苓胃苓六和正氣見論吐下瀉痧

霍亂痧水腹痛痧

五苓散加減。去桂卽四苓白术換蒼术加末二味。

猪苓 茯苓 澤瀉 蒼术 泔浸車前 木通

胃苓湯。去白术桂草卽前上四味加製厚朴陳皮去白

六和湯。

厚朴

錢五分

赤苓

藿香

扁豆

木瓜

蒼

术各一

砂仁

半夏

人参

杏仁

甘草

各五分

暑加香薷冷加紫蘇一方無蒼术一方有白术

藿香正氣散

藿香

紫蘇

白芷

茯苓

腹皮

各三

錢桔梗

紫蘇

陳皮

白术

土炒

半夏麴

各二錢

甘

草

一每五錢水煎

此與六和薑棗引勿輕用

或加

木瓜 傷食重者加消食藥 元氣虛弱人慎用

續附絡痛方案 一客匠年十六發熱久之胸脇痛脈細弱或作勞怯治嘔噦便閉小腹脹急或參用左金便溺通而痛愈繁夜尤甚小便赤色投痧症藥亦未效儒醫孫敬承云脈無變而胸前不可手近其痛在絡用金鈴子肉一個元胡錢一錢皮錢一錢生香附錢半陳大麥仁三錢煎飲一服而愈金鈴入絡佐以元胡氣血俱通似於痧宜而書中未收附記於此

又海浮石治瘓甚妙並附後

金鈴子

卽川棟子

苦寒能導小腸膀胱之熱因引心

包相火下行通利小便

脾胃虛寒者忌 肉與核

不並用

海石

一名浮石

鹹軟堅寒潤下止噦止渴通淋化上

焦老痰消結核

原敘言康熙庚戌有滌莎丸引刻于毘陵此書症案中

屢言滌莎散而方竟失載續當訪補。

附景岳刮痧新按

向余荆人年及四旬。於八月終初寒之時。偶因暴雨後。中陰寒沙毒之氣。忽於二鼓時。上爲嘔惡。下爲胸腹攬痛。勢不可當。當時值暮夜。藥鉗不及。因以鹽湯探吐之。痛不爲減。遂連吐數次。其氣愈升。則其痛愈劇。因而上塞喉嗌。甚至聲不能出。水藥毫不可入。危在傾刻間矣。余忽憶先年曾得秘傳刮痧法。乃擇一光滑細口磁碗。另借熱湯一鍾。入香油一二匙。却將碗口蘸油湯內。令其緩而且滑。乃兩手覆執其碗。於病者背心輕輕向下刮之。

以漸加重。碗乾而寒。則再浸再刮。良久覺胸中脹滯漸有下行之意。稍見寬舒。始能出聲。頃之忽腹中大響。遂大瀉如傾。其痛遂減。幸而得活。瀉後得睡一飯。頃復遍身搔癢之極。隨發出疣瘡。風餅如錢。大者不計其數。至四鼓而退。愈後細窮其義。蓋以五臟之繫。咸附於背。故向下刮之。則邪氣亦隨而降。凡毒氣上行。則逆。不行。則順。改逆爲順。所以得愈。雖近有兩臂刮痧之法。亦能治痛。然毒深病急者。非治背不可也。至若風餅疣瘡之由。正以寒毒之氣充塞表裡。經臟俱閉。故至危劇。今其臟

毒既解然後經氣得行而表裡俱散也可見寒邪外感之毒凡臟氣未調則表亦不解表邪未散則臟必不和此其表裡相關義自如此故治分緩急權衡在人矣繼後數日一魏姓者亦於二鼓忽患此症治不得法竟至五鼓痛極而斃遇與不遇此其所以爲命也

又鍼灸法

刺委中穴出血或刺十指頭出血皆是良法今西北人凡病傷寒熱入血分而不解者悉刺兩手膕中出血謂之打寒益寒隨血去亦卽紅汗之類也故凡病後寒霍亂

者亦宜此法治。今東南人有刮痧之法。以治心腹急痛。蓋使寒隨血去。則邪達於外。而臟氣始安。此亦出血之意也。

霍亂吐瀉不止。炎天樞氣海中腕三穴。立愈。

霍亂危急將死。用鹽填臍中。炙二七壯。立愈。

轉筋十指拘攣不能屈伸。炙足外踝骨尖上七壯。

### 救急良方

霍亂絞腸痧。以針刺其手指近甲處一分半許。出血即安。仍先自兩臂捋下。令惡血聚於指頭後刺之。