

不利加茯苓二錢如腹疼漸已泄下漸少宜  
訶子散主之

寒泄者太便完穀不化或口不渴而小水清利腹  
中鳴時常喜熱手按摩或過食涼藥所致

調中散

治虛寒停食嘔吐腸鳴泄瀉

砂仁

蓬术

乾姜炮

桂心

茴香

炒草葉

麥芽

炒橘紅

益智仁

藿香葉各一錢

蒼朮

神曲

炒桔梗各一錢半

甘草炙三分

姜棗煎

臨服加鹽

大藿香散

治一切脾胃虛寒嘔吐霍亂心腹搊

痛如泄瀉不已最能取効藿香兩

陳皮

厚朴

姜汁炒

青皮木香人參肉荳蔻煨

良姜炒

大麥芽炒神曲

訶子炮五錢

天

白茯

苓去皮甘草炒各一兩乾姜炮五錢

為末呑逆泄瀉不下食或嘔酸苦水用一  
水一大盞煨生姜半塊

益一撮煎服

養胃湯

治脾胃虛寒嘔逆惡心腹脹脹疼腸鳴

泄瀉

方出瘧門

理中湯

寒而虛者

卷之三

卷之三

三

蕤花丸 赤石脂 乾姜 胡椒

扶脾丸

脾胃虛寒，腹中痛，泄瀉無度，飲食不化。

白术

茯苓 甘草 炙芍子 半夏 烏毒肉

各二錢

紅荳 乾姜 肉桂 各五錢 麥芽 神曲

各四錢

陳皮 一錢 右為末，荷葉燒飯為丸，如梧

桐子

大每服五十丸，溫湯下，一方加藿香一錢。

乾姜散

治水瀉無度，乾姜為末，粥飲調下，可

待義云：「人太腸寒，小便精出，諸熱藥服至一斗

升，不効。後教服

赤石脂、乾姜各一兩，胡椒五錢，可

錢同為末，醋糊為丸，如梧桐子大，空心及食前米飲下，五七十丸，服四劑，遂愈。

本事方

訶子丸 脾胃不和，泄瀉不止，諸藥不効。

訶子皮

乾姜 肉荳蔻 龍骨 木香 附

子

赤石脂 各等分，為末，糊丸，每服四五十丸，米飲下。

漿水散

治暴泄如水，周身汗出，一身盡冷，脉沉

弱氣少，而不能語，甚者加吐，此為噤病。

右為末，每服五錢，水煎，熱服，甚者三四服。

若下痢為驚瘓，太腸不能禁固，大便欲了不

了，小便清些寒也宜溫之春夏桂枝湯秋冬  
白术散 羅謙甫云驚濤者太便如水其中  
有少結糞是也

桂枝湯

桂枝

芍藥

白术

各五錢

粉草炙一錢

分四服水煎服

小白术散

白术

芍藥

各三錢

乾姜炮五錢

甘草

炙二錢

錢如前煎服甚者除乾姜加附子十二錢謂辛能發散也

熱瀉 口渴小水短赤糞如糜

益元散

燈心湯

或井花水調下

白芍

黃芩木通湯

治水瀉小水短赤

白芍

錢二

黃芩

錢二木通分八

白术

錢一澤瀉

錢一茯苓

七分

水煎

服三

厚腸散

治腹疼瀉黃及瀉久不

止熱藥不効者

及治酒積泄

川黃連

好酒煮乾炒

日

為末

每服

用二錢空心米飲下

荳蔻香連丸

治泄瀉不問寒熱陰陽不調下痢

赤白腹脹攻痛

其効如神

黃連

錢二肉荳蔻

木香

各一右為末粟米飲為丸如米粒大

每服

錢一

右為末

粟米飲為丸如米粒大

每服

錢一

十九米飲下漸加二三十丸日夜各四五服

清六丸 去三焦溫熱泄瀉，兼治產後腹痛或自  
痢者，能補脾，亦治血痢。六一散兩紅麵炒五  
錢用此活酒糊為丸。多與清化丸同服，並不單  
虛瀉 脈弱無力，飲食少，四肢倦足，背浮腫  
口渴皆所當補。

錢氏白术散 治瀉久虛弱，清氣下陷，口渴或腹  
中氣不轉運，或不思食，或恶心。人参、白术、  
茯苓、粉草、葛根、木香、藿香俱為末。

每服二錢米飲調下。  
參苓白术散 脾虛泄瀉浮腫。人参二斤半白术  
二斤薏苡仁一斤半扁莖二斤半山藥 桔梗各一錢肉  
二斤半砂仁一斤茯苓一斤半甘草炒半斤為末，每服二  
錢米飲調下。

人參升胃湯 大便一日三四次溏，而不多有時  
腹鳴泄瀉，小便黃。黃芩二錢甘草半錢升麻  
六分柴胡 歸身 陳皮 益智各二錢紅花少許  
人參六分水煎，食前熟服。

一味白术散 治久瀉脾虛泄如神

土白术

米泔水洗淨切片每斤用陳皮半斤入罐一層上間隔蒸一日炒乾去陳皮

為末每服二錢米飲調下

理中湯 虛寒作瀉或吐瀉不止精神虛憊甚者

加大附子名附子理中湯

方在寒門

參苓滑石湯

治泄而困倦小便不利脉數有虛

熟白术

滑石

各二錢

黃芩 人參 茯苓

各五錢

木通 陳皮

各二錢

乾姜 甘草

各一錢

分八帖水煎服

桂香丸

臟腑虛為風寒所搏冷滑注下不禁老

人虛人危篤累効

大附子

炮去皮

肉荳蔻 炮白茯

苓各一兩

桂心 乾姜

木香

泡各五錢

丁香一分

糊丸梧桐子大米飲下五十丸

固中丸 治脾久泄去後與氣不快者

蒼术

肉荳蔻

煨各一兩

粥丸桐子大每服五十丸

固下丸 治腎久泄即前方加破故帛一兩炒

東垣白术神麴丸

老人奉養太過飲食傷脾常

時脾泄

白术

炒二兩

白芍

酒炒一兩

神麴

炒一兩半

山楂

國家圖書館  
NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

二 半夏製一 黃芩炒五 右為末用青荷葉燒飯  
兩

為丸菉荳大每服百丸

實泄

泄瀉腹疼或有積滯雖明新久新者

以消導之劑久者以前久泄門按寒熱調治

枳實導滯丸

木香換柳丸

七聖丸

腎泄丸早晨瀉丸下次者也

愚謂亦不止丸此曾記一老人脾泄二十年一日夜三五次夜多日少以破故帛鹽水炒白朮

五錢

錢炒二杜仲

益水炒澤潤二錢

水煎空心服二帖

即愈緣腎者胃之閔腎虛則下焦不約故也

東坡四神丸

治腎泄

下元虛寒丸宜

破故帛炒四

肉蔻麵煨二兩

木香

錢五小茴香

炒一兩

以生姜四兩煮紅棗肉為丸如梧桐子大每

空心鹽湯吞下五六十九

金鎖正元丹 腎虛泄瀉小便頻數盜汗遺精一切虛冷之症

龍骨

煅朱砂

另研各

茯苓

八兩

紫巴戟去心

肉從蓉洗

葫蘆巴

培各

補骨脂

浸酒

炒十  
兩

五倍子八  
兩

右為末酒糊丸

桐子大每服

三十丸空心溫酒鹽湯下

五味子丸治下元虛寒火不生土及腎中之土不足以致閑門不閉名曰腎泄亦名脾腎泄人參五味子破故帛炒白朮各二山藥炒白茯苓各一吳茱萸川巴戟去肉荳蔻各龍骨錢五右酒為丸如梧桐子大每服七十九空心鹽湯下

○痢門

色前諸公皆釋名滯下經書又云腸澼

泄痢二症前綱中病機要論寒熱虛實治法甚詳陳無擇朱丹溪劉宗厚王節齋諸公又各有發明今摘其緊要逐一詮次以便按治內經曰飲食不節起居不時者陰受之陰受之則入五臟膜滿閉塞下為飧泄久為腸澼是也內經曰腸澼便血身熱則死寒則坐腸澼下白沫膝沉則生淫則死腸澼之屬身不熱膝不懸絕滑大者生懸澼者死以臘期之脉經曰腸澼下膿血脉沉小留連者生數疾且大

有熱者死又腸澼筋挛其脉小細安靜生

寒死

脉訣舉

要無積不痢脉宜滑大浮絃急死細沉無

秘藏云假令

傷寒飲食膜脹滿而傳飧泄者宜溫

熱之劑以消導之

傷溫熱之物而成膿血者宜

苦寒之劑以內鍊之

風邪下陷升舉之溫氣內

勝者分利之裏急者下之後重者調之腹痛者

和之

洞泄腸鳴無力不足拉衣其脉絃細而弱

者溫之收之

膿血稠粘數至圊而不能便其脉

洪大而有力者寒之下之

陳無擇

云滯下之症內經所載血溢血泄血便注

下古方則有

清膿血近世呼為痢疾其實一也

多由脾

胃不和飲食過度停積於腸胃不能化

又為風寒暑溫之氣干之故為此

疾傷熱則赤

傷冷則白傷風則純

下清血傷濕則下如豆汁

治法當先用通利之藥鍊調臟腑

原病式曰或言下痢白為寒者悞也若果為寒則

不能消穀何由反化為膿也

所謂下痢穀反化

為膿血如穀肉

菜兼湿甚則自化腐爛潰發化

為膿血也其熱為赤熱屬心火故也其溫為黃  
濕屬脾土故也燥鬱為白屬肺金也然諸瀉痢  
皆屬於濕熱甚於腸胃之內而腸胃怫鬱以致氣液不得宣通而成腸胃之燥使煩渴不止  
也假如下痢赤白俗言寒熱相兼其說尤悞豈  
知水火陰陽寒熱者猶權衡也一高則必一下  
一盛則必一衰豈能寒熱俱甚於腸胃之間而  
同為痢乎如熱瘡瘍而出白膿者亦可以白為  
寒歟其在皮膚之分屬金故色白也次在血分

屬心火故為血也在肌肉屬脾土故作黃膿者  
筋部屬肝木故其膿色帶蒼深至骨屬腎水故  
紫黑血出也各隨五臟而見五色是其標也本  
則一出於熱但分淺深而已大法下迫窘痛後  
重裡急小便赤澁皆屬於燥熱而下痢白者必  
多有之然則為熱明矣

玉機微義云河間謂赤白不當分冷熱乃屬心火  
肺金之化也五色各屬五臟本則一出於熱其  
論甚當緣心主血肺主氣白屬肺金此氣受病

也赤屬心火此血受病也赤白相雜氣血俱受病也知此則肝青脾黃腎黑之說亦可得而互明矣

舟溪謂赤自小腸而来自自太陽而來

愚謂大小腸亦心肺之腑也但不若劉宗厚以氣血言尤為明白

銓旨曰河間發明痢本於溼熱最為詳切及行血則便膿自愈調氣而後重自除誠哉至言也又謂痢雖有赤白而一本之於熱此足以破局方

好行辛熱者之弊也然痢之白者不可盡歸之於熱亦有因於寒者痢如凍膠或如臭涕明是冷症此緣多啖生冷脾胃受傷氣微而滯下生焉非姜桂之辛熱不可也又其日久而不愈腸胃氣虛始為熱而未變寒或過服冷藥以致脾胃中寒此亦宜有以溫之也

○滯下亦有挾虛挾寒

舟溪曰或問河間之言滯下似無挾虛挾寒者然乎否平弔曰瀉利之病水穀或化或不化並無

勞閑惟覺困倦者，滯下則不然。或膿或血或膿血相雜，或腸垢或無糟粕，或糟粕相混，雖有痛不痛大痛之異然，皆裏急後重逼迫惱人，似乎皆熱症實症也。予近年涉歷亦有太虛太寒者，不可不知。如治予從叔姿長官等皆用參木及乾姜姜汁之類是也。

劉宗厚曰：按滯下之症，古人多與瀉鴻同論，至因方始能另立條目。蓋實有不同，病有從外感而得者，須分六氣之異。外既受傷，腸胃鬱結

遂成赤白等症，當隨其寒熱溫涼以調之。肴因臟氣發動，干犯腸胃，而得者，湏察其何臟相兼，以平治之。又有因飲食失節而得者，則又審其何物所傷，以消尅之。但其受病之後，腸胃怫鬱，膿血稠粘，裏急後重諸方，雖有寒熱虛實之論，劉河間則以為一出於熱，然考之內經似亦熱多而寒少也。我丹溪先生則以為亦有挾虛挾寒之症，深戒學者湏宜識此。世之局方不辨三因，專用瀉熱之藥，其失甚矣。至河間立說專用

苦寒驟下之藥則亦未甚為當何則蓋病有虛寒治有先後若病氣暴至元氣虛實積滯膠固須宜下之病久氣脫腸胃虛滑不禁者亦宜溫之溢之大抵治痢當從仲景河間之法可溫則溫可下則下或解表或利小便或待其自己劉河問分在裡在表挾風挾熱挾寒等症後之作者無越於斯但氣血一條未嘗表出立論其於芍藥湯下有曰行血則便膿自愈調氣而後重自除蓋謂便膿血是血之滯也故曰行血自

愈蓋迫後重氣之實也故曰調氣自除誠哉是言但膿血赤白亦有氣病血病之分後重裡急亦有氣實血實之異學者尤不可不察。

○裏急後重有寒熱虛實及在氣在血之異  
滑伯仁曰裏急謂腹內急迫後重謂肛門下墜惟其裏急後重故數至圊而不能便也

愚謂此皆脾胃不和或為風寒暑濕令氣所干或為積滯膠固纏墜或病久陽氣下陷舟溪曰後重本因邪壓太腸不能升上而重墜也

用大黃換榔藥者乃瀉其所墜之邪也及久痢與通蕩之後而後重仍在者知太腸虛滑不能自收而重是以用御米穀訶子五倍子等瀆劑收其氣而固其滑也然太腸為邪壓下之重其重至圓後不減虛滑不收之重其重至圓後隨減以此辨之百發百中也

愚謂氣虛下陷而重者雖用收瀆之劑仍必以升補藥兼之

又云有服升消藥不効者用秦艽皂角子大黃當

歸梔仁枳殼黃連等劑若太腸風盛者可作腹綱目云自古治裏急後重但用換榔木香調氣及大黃下積至丹溪始用梔仁滑石滑其死血如鼓應桴實發前人所未發也

又云下墜在血活之後此為氣滯宜前藥加換榔一枚蓋後重者當和氣積與氣墜下者當兼升兼消升謂升麻之類消謂木香換榔之類

○發熱

丹溪曰發熱惡寒身首俱痛此為表症宜微汗和

解蒼术川芎陳皮芍藥粉草生姜

又云有外感者小柴胡湯去人參 又云下痢發熱久不止者屬陰虛用寒涼藥必兼升散并熱藥姜桂之屬是也 又云下痢初發熱必用承氣湯下後參症用藥發熱不惡寒脉洪者宜太承氣湯若惡寒者忌下

愚謂發熱而小便不利者柴芩湯加滑石木通夏秋發熱惡心胸腹飽悶不思飲食藿香正氣散不飽悶者倉廩湯

○令氣及時疫痢

綱目

云夏月痢疾用黃連香薷飲加甘草芍藥生

姜神効者

蓋夏月之痢多屬於暑濕古治處暑

后秋冬間下痢

用厚朴湯大効者蓋秋冬之痢

多屬寒

大全良方云有一境內上下傳染長幼相似是疫毒痢也治法雖當參運氣之相勝亦不可狎泥當先審虛實冷熱首用敗毒散加入人參甘草陳皮姜隨症用之

○身重

身重不知穀味及下如豆汁者皆是足太陰脾經受濕也東垣升陽除湿防風湯升陽益胃湯和中益胃湯出蘭室秘藏湿熱中

○腹痛

病機機要云腹痛者宜和劉宗厚云和之一字總言之耳因氣鬱結不行宜行氣開鬱挾寒者溫中湯太熟者黃芩芍藥湯積滯者木香導氣湯血虛者當歸芍藥湯亦有因肺金之氣鬱在木

腸之間以苦梗發之

舟溪云下痢腹痛用姜桂溫散之法如建中湯加姜是也

內經云寒氣客於小腸小腸不得成聚故腹痛泄文云太陽病冬月感寒則泄當脐而痛是以今之用溫散者良以此也  
仲景治痢不分赤白久新但腹痛甚其脉絃急或瀦浮大按之空虛或舉按皆無力以建中治之甚効

白膿

王機微義曰白屬肺金此氣受病也  
統旨曰痢如凍膠或如鼻涕者為冷非姜桂之辛  
熱莫効

丹溪方 治白痢 蒼术 白术 神曲 茯苓  
地榆 甘草 水煎服

又方 治白痢腹脹飲水過度者 蒼术 白术  
厚朴 茯苓 滑石 神曲 粉草 水煎食  
前服飲食不思吞 保和丸三五十丸

蒼术芍藥湯 痘疾痛甚者

方在泄瀉

戊己丸 治脾經受濕泄痢不止米穀不化臍腹  
刺痛 黃連 吳茱萸 白芍藥各三右為末

麵糊為丸梧桐子大每空心米飲吞下三十九

升麻去溫防風湯 如太便閉或裏急後重數至  
圓而不能便或少有白膿或少有血慎勿剝之  
升舉其陽則陰自降矣 蒼术四兩米泔製 防風三錢

白术一錢芩一錢白芍一錢  
术以水二盞半煎至二盞納諸藥同煎至一

赤水玄珠 卷之二

盞空心稍熱服

胃風湯 治風入腸胃作痢或白或赤或如豆汁  
方在下血

溫中湯 治白痢腹疼飽脹不思飲食 蒼朮  
木香 乾姜 炮各一厚朴 砂仁 青皮 芍  
藥炒各一分 加煨姜二片水煎食前服  
又方治大人小兒白痢如魚凍 白鴨血用好酒  
泡乘熱服下立止

○赤膿

王機徵義曰赤屬心火此血受病也

○治赤白痢

香連丸 治冷熱不調下痢赤白膿血相雜裏急  
後重

黃連 去蕊二十兩吳茱萸十兩煎湯浸同炒赤色去茱萸不用見火五兩不右為細末醋糊為丸如梧桐子大每空心米飲下秘法以生姜細茶濃煎吞下妙

導氣湯 治下痢赤白裏急後重日夜無度

白芍藥一錢 當歸五錢 大黃二錢 黃連一錢  
黃芩二錢 木香一錢 檳榔一錢

每服一兩水煎食前溫服

木香枳殼湯 治痢疾裡急後重，開胃膈，進飲食。  
破滯氣散內熱 木香 檳榔 陳皮去白  
連 蓬术 煥 當歸 枳殼炒去穰青皮去穰各  
香附 黃柏各一 黑牽牛取頭末  
滴水為丸梧桐子大每服五十丸或七十九丸  
姜湯下如腫毒加至二三百丸  
利五七行立消入

木香檳榔丸 治症同前 木香 檳榔 青皮  
蓬术 枳殼 黃柏 大黃各五香附二黑丑

右為末滴水為丸梧桐子大每服五六十丸白湯下

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

黃連阿膠丸 治冷熱不調下痢赤白裏急後重  
臍腹疼痛口燥煩渴小便不利 阿膠炒二錢  
黃連三錢 茯苓三錢 右黃連茯苓為末水化阿膠為丸如梧桐子大每服三五十丸米飲下  
木香導滯湯 木香二錢 白芍 當歸 枳殼各一錢  
分 檳榔一錢 大黃二錢 黃連一錢  
水煎食前溫服

○純鮮血

傷風而下清血者宜祛逐之風傷肝肝藏血故下清血者為風也

右謂下痢純血者死此亦要著兼症及以脉參之未必盡死予嘗治數人皆生方用佛手散加阿膠秦羌炮姜地黃黃連地榆蒲黃之類或以四物湯擇前所加藥一二味增入不必盡加也又不可純用寒涼衍義云有一男子患血痢醫用寒涼藥遂制專用黃連木香治之此藥始感便

用則可病久腸虛者不宜服戒之云地榆性沉寒苦惟下熱血痢則可用若寒人及水瀉白痢皆未可輕用

王好古曰血痢當服胃風湯膠艾湯之類仲景治下痢便膿血者杏花湯主之丹溪云杏花湯為下血虛且寒者而用非乾姜之溫石脂之滷且重不能止其血也用糯米之甘以引入腸集驗方治血痢用乾姜燒黑存性出火毒為末每服一錢米飲下

黃連香茹飲

治感暑下痢純血

清暑益氣湯

治暑病內傷下痢不思飲食發熱

六合湯

治伏熱煩悶或成痢疾

俱見中暑

出附餘

已上治因暑下痢之劑

敗毒散

加石蓮肉 治下痢熱毒不進飲食

倉廩湯

即敗毒散加陳倉米姜東 治下痢赤

白或先因寒邪中臟腑致發熱者

防風芍藥湯

治泄痢飧泄身熱脈弦腹痛而渴

及頭疼微汗

防風

白芍

黃芩

各四錢

水煎食前通口服 已上治痢疾身熱者之劑  
丹溪治血痢 乾姜一錢 當歸二錢 乌毒三錢 黃

柏一錢

黃連三錢

水煎食前服 或加枳殼

丹溪治血痢後重熱盛者

大黃

黃連

黃芩

黃柏

枳殼

當歸

白芍

滑石

杏仁

甘草

白朮

右各等分為末或作丸用麵糊

或神麪糊丸服

又云悞服熱藥及滻藥毒

氣犯胃者當明審以祛其毒

當歸導氣湯

治膿血痢無度腹中痛

當歸

芍藥

各一錢

甘草

一錢

青皮

七分

槐花

七分

生地

酒洗  
二錢

水二鐘煎至一鐘

食前溫服

若後重加木香檳榔末各三分澤瀉五分小便利去澤瀉

茜根丸

治一切毒痢及蠱注下血如鷄肝心煩

腹痛

茜根

升麻

犀角

地榆

當歸

黃連

枳殼

炒

白芍

右等分

為末

醋米糊

為

元梧桐子大

每服七十丸空心

米飲下

紫古蒼术地榆湯

治脾經受溫

下血痢

分量

右

合

之

之

蒼术

西

地榆

西

右

每服一兩水二鐘煎至

一鍾

食遠溫服

丹溪青六丸

治血痢清濕熱補脾消瘀血用此

止痛活血消食酒糊為丸

方在泄瀉門

當歸芍藥湯

治血虛而下血痢

當歸

川芎

各一分

芍藥酒炒

三分

生地

黃連酒炒

木香各一

水煎

食前服

黃芩芍藥湯

治火熱下痢膿血

黃芩

五錢甘草

錢一

芍藥

炒三

水煎

食前服

## 大黃湯

治泄痢久不愈，膿血稠粘，裏急後重。日夜無度。久不愈者，用此微利。

大黃一兩，用好酒二錢，浸半日煎至一鍾去大黃分為二服。

如未止，再服盡以利為度。後服芍藥湯和之，利止再服黃芩芍藥湯，以徹其毒也。

劉宗厚云：此乃陽明經蕩滌之藥，用酒煎者欲其上至項顙外徹皮毛也。

芍藥湯治腹痛下痢，膿血日夜無度，裏急後重。是以行血則便，膿自愈。調氣而後重自除。

右每服五錢水煎食遠，溫服如痢不減，加黃芩。

劉宗厚云：此行血調氣不熟之藥也。大凡用藥之雜與用藥之多者，難以細分。經絡當觀其太陰如何。此太陽桂枝例藥也。

## 附禁方

木香散治腹痛下痢，膿血裏急後重。木香錢五克，地榆一兩，黃連錢七克，赤芍，青皮，枳殼，乳

白芍一兩

當歸

黃連各五錢

檳榔

木香各二錢

錢桂二錢

大黃

錢三

黃芩

錢五

甘草

錢二錢

香

甘草 錢各五

右為末每服二錢白湯下

延胡止痛散 治血痢疼痛飲食不進

延胡 炒

為末每用二錢米飲調下三服全愈

木香甘連湯 治血痢如神

黃連一兩

甘草 錢

木香 錢

水二錢煎至一錢食前服先一日

預服五參散三帖次早服即止

又方

薤菜連根取自然汁和好酒一盞溫飲

又治婦人心痛及治淋散氣行血故也

黃連烏梅丸

治濕熱痢不瘥

烏毒肉 炒

黃連

各四兩  
淨為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十丸米飲下

車前湯 治熱痢不止及小便不利

車前子搗爛取汁一錢入蜜一合煎服

已上治濕熱傷血赤痢之劑

苦參丸

治血痢 苦參不拘多少炒焦為末滴

水為丸如梧桐子大每服五十丸米飲下

黃柏丸

下痢純血 黃柏蜜炙令香黃色一

兩為末每服三錢空心溫漿水調下

一方地錦草不以多少晒乾為末每服二錢空心

米飲調下

加劑四物湯保命集治下痢 川芎 當歸 白

芍

生地

槐花

黃連

御米殼

分等水煎

樗皮丸

治痢清血腹中刺痛

樗根白皮

不

拘多少炒

為末米醋糊為丸如梧桐子大空心

米飲下三四十九丸

地榆散

治中暑昏迷不省人事欲死并治血痢

暑痢

地榆

赤芍

黃連

青皮

去白等分為

朱每服三錢湯水調下血痢煎服

烏毒丸

治熱留腸胃腑腹病痛下痢純血或服

熱藥過多毒蘊於內滲成血痢

烏毒肉

兩

黃連

兩當歸

枳殼

去白二兩

右為末

醋糊

分

血痢極効方

當歸錢一

赤芍

地榆

黃連

生地

甘草

嬰粟殼

各五分

石榴皮

三分水

腹煎

五香散

治血痢脉滑

五倍子

炒焦存性

香白芷

炒

等分

為末每服二錢白湯調服

一日三次

○紫黑血

丹溪云其或下墜異常積滯中有紫黑血而又痛甚者此為死血証當以杏仁滑石行之或口渴及肛門燥辣是挾熱加黃芩或口不渴身不熱喜熱手熨盪者是挾寒即加干姜下痢身熱舌黑下如煤色或去瘀血用犀角人參湯草丹皮水煎服

○臟毒下血

草丹皮人參黃連白芍生地甘

待義云曾治洛陽一婦年近五十飲無度多食魚蟹攝理之方蔑如也後以飲啖過常蓄毒在臟日夜二三十度大使與膿血雜下大腸連肛門痛難忍醫以治血痢藥不効又以腸風藥則益甚蓋腸風則有血而無膿又如此已半年餘氣血漸弱食漸減肌肉漸瘦稍服熱藥則腹愈痛血愈下稍服涼藥則泄注氣羸粥愈減服溫平藥則病不知將朞歲醫告技窮垂命待盡或有人教服人參散病家亦不敢主當謾與服之

陳無擇云傷濕則下如豆汁嚴用和云傷濕而下  
陳無擇云傷濕則下如豆汁嚴用和云傷濕而下  
白礬二錢燒存性為末米飲空心調下  
逐瘀血治赤痢血痢應驗如響病雖垂殆一服  
即愈阿膠炒珠枳殼炒茯苓川芎  
蓬术白芷木通茯神去木生地生甘  
草赤芍五靈芝炒烟各一錢大黃杏仁去皮各  
五分水鍤半盞三茶匙煎七分去渣入大黃  
仍煎一沸空心溫服

○豆汁

才一服二服減三服膿皆定自此不十服其疾  
遂愈後問其方云治太腸風虛飲酒過度挾熱  
下痢膿血疼痛多日不差樗根白皮人參各一  
兩為末空心米飲調下二錢忌油膩湿麵青菜  
果子甜物鷄魚蒜等  
槐花散治血痢久不止腹中不疼不裏急後重  
此膿毒也青皮槐花荆芥穗  
各等分為末水煎空心熱服  
又方治腸風血痢鯽魚一具破開去腸膽入  
又方治腸風血痢鯽魚一具破開去腸膽入

豆汁者分利之劉宗厚云湿喜傷脾胃為五穀之海無物不受常兼四臟蓋豆汁之色如五色之相雜故下豆羹汁者濕也

泄痢作嘔

病機要云如痢或洩而嘔者胃中氣不和也且焦不和治以生姜橘皮中焦不和治以芍藥當歸下焦寒不和治以輕熱藥甚以重熱藥劉宗厚謂亦有胃火冲上而嘔者有陰虛而嘔者有胃虛而嘔者有積滯毒氣上攻而嘔者

統言謂痢而嘔者乃胃氣不和用生姜橘皮白朮湯因火上逆而嘔者加姜汁炒黃連胃虛加人參倍朮積滯毒氣上攻而嘔者木香導滯湯陰虛者四物加參朮芩柏陳皮下痢吃逆同治

○禁口痢

百一選方云禁口痢是毒上冲心肺所致用石蓮子以通心氣便覺思食

玉機微義云痢而能食知胃床病也若脾胃濕熱之毒薰蒸清道而上以致胃口閉塞而成禁口

之症理宜除胃口之邪熱而此云毒氣上冲心肺其毒不知指何者之邪然亦有脾胃虛而得者有悞服利劑毒藥犯胃者又有服瀉熱之劑太早而邪氣閉遏於胃口者必當求責

丹溪曰禁口痢胃中熱甚大虛大熱故也用人參二錢黃連姜斗炒一錢濃煎汁終日細細呷之如吐再服但得一呷下咽便開又宜引熱下行用田螺肉搗碎罨臍中入射香少許又云黃連與參各一錢加砂仁三粒煎服

統旨云毒氣上冲心肺用人參茯苓石蓮肉入些小菖蒲以通心氣胸次一開自然思食有脾胃虛弱不能納穀用參术以健脾胃或參苓白朮散之類加石菖蒲陳倉米

濟世方云治癆疾不納飲食者謂之禁口癆或肺症辨之如脾胃不弱而知其頭疼心煩手足溫熱未嘗多服涼藥者此乃毒氣上冲心肺所以嘔而不食宜用敗毒散每服四錢陳倉米百粒姜三片棗一枚水煎溫服又方加石蓮子白朮丸妙

君其脉微弱或心腹膨脹手足厥冷初病則不嘔  
因服嬰粟烏毒苦澁涼藥太過以致聞食先嘔  
者此乃脾胃虛弱用山藥一味一半生一半炒  
為末米飲調下虛寒甚脉微弱者理中湯  
治噤口痢 枇杷葉蜜炙一兩砂仁蜜炒五錢為  
末蜜調抹口中噙下

石蓮肉 日乾為末每服二錢陳倉米飲調下便覺  
思食或以受日陳壁土炒橘紅為末姜棗畧煎  
佐之

又方 黃連半觔生姜四兩切片與黃連同炒待  
姜焦黃色去姜只取黃連為末以陳米飯搗為  
丸如梧桐子大每服七八十九丸赤者陳米飲下  
白者陳皮湯下赤白相雜者陳皮米飲下

又方 獨核肥皂一枚去核用鹽填實其內火燒  
存性為末先煮白米粥用少許入在粥內食之

又方 梨子一枚去心入好蜜一匙蒸熟食之

○下痢吃逆 俗名發呃

舟溪曰吃逆病氣後下冲上屬火之象古方悉以

胃弱言之殊不知胃弱者陰弱也虛之甚也滯下之久多見此症乃因久下而陰虛也詳見吃人年五十質弱多怒暑月因飢索食不遂後得瀉痢口乾七八日後發吃遂以人參白朮煎湯調益元散數日安此虛熱之治痢倘未止者將此藥蜜丸服之數日全止

### ○下痢大乳痛

大孔痛暴病身熱或脉洪大此熱沉於下也宜清之若久病身冷自汗脉沉小宜溫之

○又方 治大孔痛熱流於下者 檳榔木香黃連黃芩加乾姜

丹溪治一人年二十性好酒色奉養過厚適有事多憂恐患瘡發寒熱忽一日大發熱大便下皆是積滯極臭大孔極痛呻吟不絕其孔陷入囑付後事予曰此大虛也脉皆弦大而浮遂以瓦片令敲如銅錢員樣燒紅投入童便中急乘熱取起令乾以紙裹安痛處其時寒恐外寒乘虛而入也以人參當歸陳皮作濃湯飲之食淡味

至半月而安文有用瓦斤燒紅投入下赤白木孔痛不可忍炒鹽熨之又灸枳實熨之日華子云，痢久木孔急痛亦有寒熱者熟艾薰蠟訶子燒薰之

治痢大便不禁其木孔開如空洞不閑者用花椒為末葱搗爛塞谷道中併服酸收滯腸之劑如御米殼訶子皮之類收之神効

○痢疾肛脫

初起裏急後重脫肛此為邪壓大腸其氣不得宣

通而脫下也宜木香導滯湯內有木香檳榔調其氣黃芩清上熱木黃下其積滯歸芍活其血而愈也

若用推積滯調氣之後而脫肛者此為氣虛宜補而升之

痢久氣血俱虛虛中有寒滑下不收者補中加溫澁之劑如真人養臟湯之類

有濕熱在木腸因裏急後重而脫肛者宜清之如保命集地榆芍藥湯之類是也

○虛坐努圓

東垣曰：虛坐而不得大便者，皆因血虛也。血虛則裏急，加當歸身，凡後重逼迫而得大便者，為有物而然。今虛坐努圓而不得大便，知其血虛也。故用當歸為君，生血藥佐之。

○痢而小便少

劉河間治身發熱，下痢赤白，小水不利，以益元散，盪胃中積聚，又泄熱從小便中出也。

丹溪治一老人，年七十，面白，脉弦數獨，胃沉滑因

飲白酒，作痢下血，如淡膿水，腹痛小便不利，裏急後重，以參术為君，甘草滑石，枳榔木香，蒼朮為佐，下保和丸二十五粒，第二日，前症俱減，惟小便不利，以益元散服之，安。

○糟粕不實

痢疾已愈，惟糟粕不實，此腸胃虛弱或有濕，參苓白朮散，錢氏白朮散，吞，樗根白皮丸，或荳子皮散，槐花丸之類擇而用之，異功散加肉豆蔻，亦可。又痢滑泄，不固，有寒有熱有虛。

濟世方治熱滑側柏葉一錢甘草三錢御米殼蜜炒二錢久者倍之水煎服

仲景治寒滑不禁蕊花湯止之

王好古曰大凡痢疾乃心腹之患老年人尤非所宜若果有尾用平和之劑決難作劫必致危篤雖急服此則已晚矣其秦艽地榆黃柏木通之類其性苦寒却難輕服白痢當服理中湯血痢當服胃風湯若五色雜下泄瀉無常用熟烏頭一兩厚朴乾姜甘草各等分生姜煎服

今之治痢多用駐車丸黃連阿膠丸之類其中止有黃連肥腸其性本冷若所感積輕及餘痢休息不已則服取效若病稍重則非此可療予嘗用斷下湯加減調治百發百中

易簡斷下湯

治下痢無問新久赤白老幼

白朮一

茯苓一

甘草分

草薢一枝連子

御米殼十四枚去筋膜醋炒

箇水煎服

赤痢

加黑豆二粒

白痢加乾姜

五分

又云御米殼治痢如神但性緊濶多令

久嘔逆既以醋製加以烏梅不致為害然嘔吐則不可服 又云大率痢疾古方謂滯下多因

腸胃素有積滯而成此疾始得之時不可遽止先以巴豆感應丸十餘粒白梅湯下令大使微痢仍以前藥服之無不應手作効若脾素弱用橘紅豆蔻粟殼各等分煮麵糊為丸桐子大每服五十丸烏梅湯下兼治泄瀉暴下不止一服即愈更令藥力相倍為佳如覺惡心却以理中湯四物湯加豆蔻木香輩調其胃氣仍以二陳

湯水煮木香膏等定其嘔逆

又方治冷痢腸滑頻併泄瀉服之神妙

白术

炒两

乾姜

炒三

甘草

炙各

一

木香

粟殼

蜜炙

荊子

去核一两

各

肉荳

生

十

右為末糊丸梧子大每服五十丸米湯下入  
錢氏白术散 治氣血俱虛神氣衰弱或瀉或痢  
脾虛口渴惡心等症 方在泄瀉

一方 治白痢久不效乃寒滑症也治當溫瀉  
酸石榴皮半個 草菓一个 陳皮一个 烏梅一个

甘草

乾姜

水煎食前服

遇仙立効散 治諸惡痢或赤或白或膿淡相雜  
裏急後重臍腹結痛或下五色或如魚腦日夜  
無度或禁不食不問大人小兒虛弱老人產婦  
並宜服之 御米穀去蒂蓋當歸各二 甘草

地榆

赤芍

酸石榴皮

兩

右每服一兩水煎食前服忌生冷油膩

神効參香散 治大人小兒臟氣虛怯冷熱不調  
積而成痢或鮮血或豆汙或如魚腦或下紫黑

療血或赤白相雜裏急後重日夜無度不問新  
久並治 白扁豆 人參 木香 各一 疦苓

肉荳

煨各四兩

橘紅

御米穀

去蒂各十

兩

右為末每服三錢米飲下

水煮木香丸 治一切下痢赤白膿血相雜裏急  
後重 御米穀 去穰二兩一錢 青皮 去白二  
炙三兩 當歸 詞子肉 木香 不見火各六兩  
朱煉蜜為丸如彈子大每服一丸水一鍾煎  
化至六七分空心食前服

真人養臟湯

治大人

小兒冷熱不調下痢赤白

膿血或如魚腦髓裏急後重躊腹疼痛或脫肛

墜下酒毒便血並治

御米殼

去蒂蜜炒三兩六錢

人參

當歸各六錢

肉桂八錢

御米殼

去蒂醋炙三兩

白芍一錢

當歸甘草各一錢

肉蓴五錢

白芍一錢

御米殼

去蒂醋炙三兩

白芍一錢

甘草一錢

右每服六七錢水煎食前服

膿寒者加大

附子

白芍一錢

當歸甘草各一錢

固腸湯三因方治

冷熱不調下痢赤白

御米殼去蒂醋炙三兩

白芍一錢

陳皮

白芍一錢

當歸甘草各一錢

陳皮

白芍一錢

陳皮

白芍一錢

當歸甘草各一錢

固腸湯三因方治

冷熱不調下痢赤白

御米殼去蒂醋炙三兩

白芍一錢

陳皮

白芍一錢

當歸甘草各一錢

右每服五六錢水煎七分食前服

益翫固腸丸治脾胃虛弱臟腑頻滑下痢赤白

木香赤石脂乾姜砂仁厚朴

肉蓴

各三兩為末

麵糊

為丸梧桐子大

每服五十

丸米飲食前服

白术安胃散東垣治一切漏痢膿血相雜裏急後

重日夜無度又治男子小腸氣痛婦人躊虛冷

并產後兒枕塊痛亦治產後虛弱寒熱不止

白茯苓白术

車前子

各

一五味子

烏梅

各五錢

御米穀

蜜炙二兩

右每服一兩水煎服

仲景杏花湯

治下便膿血不止

赤石脂

乾姜

粳米

水煎服

異功散

治久痢脾胃虛弱

四君子湯各一錢

加陳皮二錢

水二鍾煎八分加姜棗食前服

○休息痢

休息痢者愈後數日又復痢下時作時止積年累月不肯斷根者是也此因始得之時不曾推下就以中調理之劑因循而致也又或用兜瀝藥太

早以致邪不盡去綿延於腸胃之間而作者或痢愈之後而腸胃虛弱復為飲食所傷而作者當看輕重調理或熱或寒或消導或耳推下然後以異攻散等補劑加收澁之藥

張文仲治痢久下經時不愈者此名休息痢取虎骨炙焦為末日服三次每服二錢

縮砂散

止休息痢

砂仁炒為末空心米飲下錢

木香飲

治隔年痢不止並治血痢尤佳

木香

黃連各五錢

味同妙

右為末入射香少許

每服二錢米飲下

芎粟散

治禁口

紅白久不愈者

川芎

嬰粟

殼各一兩

去蒂膜

為末空心

審湯調下分

○虫痢

濟世方治似痢非痢挾熱者苦棟根皮  
朱糯米飲為丸米飲下

○瘡痢

瘡末色因食生冷痢作人參白朮  
陳皮半夏甘草生姜草梞烏毒

用蓋

少許淹少時以厚  
紙裹水溫煨熱水煎未發前服  
荆芥愈繼之以瘡十味六和湯藿香厚朴  
赤茯苓人參木瓜香茹扁豆杏仁  
甘草砂仁

○丹溪治痢活套

舟溪曰下痢初得之時元氣未虛必推蕩之此通  
因通用之法稍以氣虛則不可下壯實初病宜  
下虛弱衰老久病宜升之其或下積腹痛後  
重小水短此為裏症宜和中疎氣用炒枳殼製

厚朴為藥陳皮滑石甘草其或在下則纏佳  
在上則嘔食此為毒積未化胃氣未平寒則溫  
乏熱則清乏虛則用參术補之毒解積下飲食  
自進其或身倦自覺氣少惡食此為扶虛証  
宜加白术當歸身尾甚者加人參又十分重者  
止用此一條加陳皮補之虛回而痢自止其  
或氣行積少但虛坐努責此為無血症倍用常  
歸身尾却以生芍藥生地桑仁佐之陳皮和之  
血生自安其或纏墜減退十之七八穢積已

盡糟粕末實當炒芍藥炒白朮炙甘草陳皮茯  
苓煎湯下固腸丸三十粒然固腸丸性燥恐尚  
有滯氣未盡行者但當單飲此湯固腸丸未可  
遽用蓋固腸丸有去湿實腸之功其或痢後  
糟粕未實或粥食積多或飢甚方食腹中作痛  
切不可驚恐當以陳皮白朮各半煎服和之而  
安其或久痢後體虛氣弱滑下不止又當以  
藥澀之可用詞子皮肉豆蔻白朮半夏甚者牡  
礪可擇用之然須用陳皮為佐恐太澀亦能作

「痛又甚者，灸天樞氣海。」

右前方用厚朴專瀉。

凝滯之氣，然厚朴性太溫，而散氣又服大能虛。

久滯氣稍行，則去之餘滯未盡，則用炒枳殼陳。

皮然枳殼亦能耗氣，比之厚朴稍緩，比陳皮稍

重滯氣稍退，亦當去之。只用陳皮以和衆藥，然

陳皮去白，有補瀉之功，若為參术之佐，亦純作

補藥用。凡痢疾腹痛，必以白芍甘草為君，當

歸白朮為臣，惡寒者加桂，惡熱者加黃柏，適者

更能參以歲氣時令用藥，則萬舉萬全，豈在乎

執方而已哉。

禁方

乳香止痛散 治下痢赤白疼痛不已

御米殼

去穢蜜  
炒五錢

橘紅五錢

炙甘草五錢

乳香二錢另  
為末

沒藥二錢另  
為末

水煎去渣入乳沒食前服，如白

痢熱服紅痢，冷服如痢不止，加青皮四錢治男婦老幼赤白痢。

紅花 胡椒 等分為末

赤痢，煮肉搗為丸，如梧桐子大，白麵為衣，先

通為度次早空心再服三十丸不拘紅白俱以滾水下即愈

○不治症及危症

○下如魚腦者半生半死下如塵腐色死下如屋漏水者死下如竹筒注者不治下痢純血身熱而脈洪數者死

玉節齋治例

痢乃是湿熱食積三者別赤白青黃黑五色以屬五臟白者湿熱傷氣分赤者湿熱傷血分赤

白相雜氣血俱傷黃者食積治法瀉腸胃之濕熱開鬱結之氣消化積滯通因通用其初只是正之下症未愈隨症調理稍久者不可下胃虛故也痢多屬熱亦有虛與寒者虛者宜補寒者宜溫年老及虛弱人不宜下

主方

黃芩

炒二錢

五分

黃連

炒一錢

白芍

炒二錢

上已

三味痢疾必用之藥

木香

枳殼

炒一分

枳榔

三分

甘草

炙三分

若腹痛

加當歸

五分

砂仁

一錢

再加

木香芍藥

各五分

若後重

加活石

五分

再加

枳殼檳榔各五分

芍藥生用再加五分

條芩亦加五分

若白痢加白术茯苓炒滑石陳皮各一錢

初欲下之加大黃五錢兼食積加山楂枳實各一錢

若紅痢加當歸川芎杏仁各五分一錢

初欲下之再加大黃五錢

若紅白相雜加當歸杏仁川芎各一錢以理血酒

石陳皮蒼术各五分一錢以理氣有山楂枳實

若白痢久胃弱氣虛或下後未愈減連芩芍藥各分加白术一分一錢黃芪茯苓陳皮各一錢仁五分

去檳榔枳殼再加乾姜炮五分

若紅痢人虛弱血虛或下後未愈減芩連各五分

當歸川芎熟地黃阿膠陳皮各一錢白术

五錢

若色赤黑相雜此溫勝也小便赤澁少加木通澤

鴻荻苓各一錢山梔炒五分以分利之

若血痢加當歸生地杏仁炒槐花各一錢不愈減

芩連各七去檳榔枳殼再加阿膠炒側柏葉各

五分乾姜炒黑一錢白术一錢五分陳皮二錢

若痢已久而後重不去此太陽墜下去檳榔枳殼各五分

用條參一加升升麻一錢以升提之

若嘔吐食不得下大加升升加軟石膏一錢五分陳皮一錢

山梔仁炒五分入生姜汁緩呷之以瀉胃口之熱

有一樣氣血虛而痢者四物湯加人參白朮陳皮黃連黃芩阿膠之類補之而痢自止

朴肉桂之類

若得痢而悞服溫熱止瀉之藥則雖稍久亦宜用前法以下之後方補之

若得痢便用前正法下之而未愈又用前調理法治之而久不愈此屬虛寒而滑脫可於前虛補寒溫二條擇用更加龍骨赤石脂御米殼烏毒肉等收瀉之藥

○胎前痢疾

本事方 治婦人胎前產後不拘赤白生姜二觔搗取自然汁以鴨子一枚打碎入姜汁內攪匀煎之至八分入蒲黃三錢丹煎五七沸空心溫服立効

大全良方

治姪娘素弱下痢頻併腹痛瘦甚而色痿黃不進飲食

厚朴半兩

白术 川芎

白芍

熟地黃 當歸 干乾 人參各二兩

訶子錢三

甘草錢一右服五六錢 姜三片水煎服

黃芪當歸湯

治姪娘下痢腹痛小便澀

當歸

黃芪各一糯米合右和勻水煎分四服

羅太無大寧散

治姪娘下痢赤白灰色泄瀉疼痛者

痛垂死者

黑荳五十粒

甘草生半炒

右加姜三片水煎食前服神效

粟殼一兩半炒

大全良方 治姪娘挾熱下痢亦治男子常痢

黃連 黃柏各二

梔子各二十

右每服六七錢水

煎濃服若嘔者加陳皮一兩半生姜三兩

黃連湯 治姪娘下痢赤白膿血不止

黃連八分

厚朴 阿膠

當歸 乾姜各

分艾葉

黃柏各四

右為末空心米飲調下

寸七日三服

厚朴散 治姪娘下痢黃水不絕

厚朴

姜蜜

黃連 三肉豆蔻皮一枚連

右為粗末水煮頓服

肉菜飲

治姪娘臟氣本虛，脾胃衰弱，臟腑虛滑

臍腹疼痛，日夜無度。

厚朴

姜製二兩

肉荳蔻

一枚

煨

右咬咀，每服五錢，姜三片水煎服。

阿膠湯

治姪娘腹中絞痛，心下急痛，及療產後血暈崩中久痢。

阿膠

二兩

酒二升半煎

取一升

取

宣明白朮湯

白朮

黃芩

當歸

各等分水煎，食前服。

### ○產後痢

救急散 治產後赤白痢，腹中絞痛。

白芍

炒好酒

阿膠

艾葉

熟地

各二兩

甘草

當歸

各二兩

每服二兩

水煎濃空心

服

當歸芍藥散

治姪娘腹中絞痛，心下急痛，及療

產後血暈崩中久痢。

方見姪娘腹痛

經驗方

治產後胎前痢疾。

龜甲

一枚

米醋炙為末，醋湯調下。

丹溪治婦人患墮胎後，膈滿食少，痢不止，脉虛，左

手尤甚。

上滑石

白芍

蒼朮

各五錢

白朮

半錢

乾姜

四錢

茯苓

一錢

诃子

二錢

為末，水煎，下保。

和丸四五十粒

雲箕子治產後血癆

金

腹疼痛

四物湯加槐花棗

連御米殼等藥

仲景白頭翁甘草阿膠湯

脉經

謂新產重下虛極

熱病

白頭翁 阿膠各三

廿

黃連 黃柏

秦皮各三

甘草二分

廿

三服水煎食遠服

產後血痢小便不通

廿

臍腹疼痛

生馬齒莧搗汁二合

金

煎一二沸下蜜一合調頓

服

廿

大宮詹少溪吳馭閻校

終

赤水玄珠氣門第十一卷目錄

氣

九氣見症

血

嘔吐血

咳血

咯血唾血痰涎血

鼻血舌衄

齒衄

肌衄

小便血



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

赤水玄珠第十一卷

新安生生子孫一奎著輯

氣門

內經曰百病皆生于氣、一也因所觸而為九怒喜悲恐寒熱驚思勞也故怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒則氣收思則氣耗思則氣結勞則氣耗

九氣見症

怒氣所至為嘔血為飧泄為煎厥為薄厥為陽厥



為胃滿脇痛食則氣逆而不下為喘渴煩心為消  
痺為肥氣為目暴盲耳暴閉筋繼發于外為癰  
喜氣所至為笑不休為毛革焦為肉病為陽氣所  
收甚則為狂

悲氣所至為陰縮為筋攣為肌痺為脈痿男為數  
溲血女為血崩為酸鼻辛頰為目昏為少氣不能  
報息為泣則臂麻

恐氣所至為破脢脫肉為骨瘦瘻厥為暴下綠水  
為面熱膚急為陰瘻為懼而脫願

驚氣所至為潮涎為目眾為口咷為痴癪為不省  
人事為僵仆久則為瘡痺瘡音裙

勞氣所至為嘔病為喘促為嗽血為腰痛骨痿為  
肺鳴為高骨壞為陰痿為嘔血為鼻瘻為耳閉男  
為少精女為不月

思氣所至為不眠為嗜卧為昏目為中痞三焦閉  
塞為咽嗌不利為癰疽嘔苦為筋痿為白淫為不

嗜食

寒氣所至為上下所出水液澄澈清冷

鬼氣所至為喘嘔吐酸暴注下迫

凡此九氣內經以五行相勝之理治之故悲可以治怒以愴惻苦楚之言感之喜可以治悲以譴浪襄狎之言娛之恐可以治喜以遽迫死亡之言怖之怒可以治思以汚辱欺罔之言觸之思可以治恐以慮彼忘此之言奪之五者之外鬼可以治寒可以治寢逸可以治勞習可以治驚要在審証察脉而施治之不可執一也脈沉實者宜下絃急者宜溫虛細微弱者宜補痛虛斯實此之謂也

在上者宜散痛在下者宜利氣虛者宜鎮墜氣結者宜蹠順

夫治氣之法惟在適中氣積于中固宜蹠順蹠導過劑則又反耗元氣元氣走泄則下虛中滿之証生焉故曰蹠啓于中峻補于下中滿既除下虛斯實此之謂也

治有餘之症脉沉實而中滿大便秘按之疼則宜下法當用大黃然亦須入桂皮以辛溫和其氣以苦寒泄其實氣得泄越痛亦隨愈