

醫方類聚卷之一百八十二

痔漏門 一 附腸風 脫肛

論

千金方

五痔

槐子圓 小槐實圓 槐子酒 猬皮圓

槐皮膏

脫肛

豬肝散 壁土散



千金月令

海上仙方

脫肛不上

痔漏脫肛

痔漏

痔疾

聖惠方

治五痔諸方

艾葉散

龜甲散

蜜陀僧散

硫黃散

蝟皮丸

黃耆丸

槐子丸

槐黃散

治痔肛邊生鼠乳諸方

皂莢丸

穿山甲散

鼈甲散

槐子丸

槐白皮膏

藜蘆膏

虎骨膏

治痔肛邊生核寒熱諸方

丹參散

葫荇子散

鼈甲散

蝟皮丸

皂莢丸

天靈蓋散

坐藥

治痔生瘡腫痛諸方

地榆散

槭藤散

黃耆散

鼈甲散

蝸牛散 露蜂房散 檳榔丸 馬齒煎

治痔肛邊痒痛諸方

枳殼散 蛇牀散 薏苡散 桑木耳散

皂莢刺丸 露蜂房丸 救急髮

治痔下血不止諸方

椿根散 沒石子散 麝香散 槿藤子

散 皂莢子散 神效桑雞丸

治氣痔諸方

桃人散 當歸散 神效散 硫黃丸

訶梨勒丸 續斷丸

治酒痔諸方

大黃散 黃耆散 赤小豆散 黃耆丸

治久痔諸方

桐子丸 朱砂丸 小槐子丸 白礬散

黃耆膏 烏蛇膏 槐枝酒 白礬丸

治痔瘻諸方

香墨散 臭樗皮散 內補丸 硫黃丸

麝香丸 硃砂丸 蝟皮丸 黃礬丸

木賊丸 露蜂房散

治腸風下血諸方

卷栢散 內補散 內補黃耆散 五香

散 蝟皮散 牛膝散 側栢葉散 白

花蛇丸 蝟皮丸 阿膠丸 野狸骨散

內補散

治積年腸風下血不止諸方

皂椿皮散 牛角鯁散 木賊湯 菡萏

丸 綠礬丸 黃耆丸 附子丸

大治腸風痔疾失血後虛損諸方

內補散 黃耆散 白朮散 內補黃耆

丸 白朮丸 鹿茸丸 鹿茸丸 鹿茸丸

治疔瘻諸方

苦參湯 麝香丸

川大治濕蠶諸方 千辯 蘇麻散

兔頭散 薰黃散 丁香散 青箱子散

治脫肛諸方

豬肝散 鼈頭散 臥鞞散

治肛門有蟲恒痒諸方

曉蝦丸

治肛門赤痛諸方

川大黃散 牛蒡子散 檳榔散

痔漏門二

和劑局方

乳香圓 釣腸圓 槐角圓 腸風黑散

神應黑丹

大全本草

如聖散 聖散 聖散 聖散

三因方

脫肛證治

香劑散 鐵粉散 蘇合香散 蘇合散

五痔證治 白芷膏 龍甲水 龍黃

五灰散 熏法 洗法 貼藥

腸風全式散

烏連湯 酒連丸 加味四君子湯 荆

芥散 白玉丹

衛生十全方

傳痔神膏

神巧萬全方

諸痔方

露蜂房丸

槐白皮膏

鼈甲丸

地黃

丸 木香散

葛花散

黃耆丸

蛇脫

散

助道方

治男子婦人五痔方

前是齋醫方

心腸風痔漏

脫肛

荆芥散

地榆湯

枳實三百元

厚朴

煎餅如神丹石散

烏玉丹

神丹

不瑣碎錄

蘇簡易方

水調散

槐花散

黃耆圓

椿皮圓

玉屑圓

蒜連圓

直指方

陽風證治

敗毒散 不換金正氣散 地榆散 酒
 蒸黃連圓 黃連阿膠丸 附子理中湯
 理中湯 芎歸湯 小烏沉湯 烏荊圓
 不換金正氣散 四君子湯 猪臟圓
 橄欖散 蒜連圓 黑玉丹 腸風黑散
 木賊散 槐角圓 真人養臟湯 黑聖
 散 鯽魚方 震靈丹 玉華白丹 黃
 龍圓 消風散

諸痔證治

清心湯 黃連阿膠元 追風毒剉散
 清涼飲 聖圓子 鷄峯烏金散 蝟皮
 圓 收痔圓 藥蠟攀圓 猪甲散 坐青蛙
 圓 穿山甲散 地榆散 皂刺圓 皂
 角煎圓 芎歸圓 乾葛湯 橘皮湯
 代赭石圓 荆枳湯 芎歸湯 逐瘀湯
 五聖丹 黃連阿膠丸 黃連阿膠丸 黃連
 脫肛證治 蠟攀圓 猪甲散 坐青蛙

蝟皮散 鼈頭散 磁石散 香荆散

釣腸圓 縮砂湯 黃連阿膠元 蒲黃

膏 桑螺膏 橡斗膏 獨虎散

朱氏集驗方

腸風

枳殼湯 芍藥丸 黃連丸 如聖散

橡斗散 洗心散 黃連飲 聚珍丸

栢葉飲 當歸丸 四神丸

五痔

荆芥散 石膏熟艾散 木鼈散 厚朴

丸 二妙散 血竭散 黃耆四君湯

弔腸丸 劉寄奴湯 墨雪膏 倍香膏

蝟牛膏 麻蕪林藥膏 排茶齒 煎不

嚴氏濟生方 貝氏

五痔 蠟絲 藥膏 不渴 七聖膏

蝟皮圓 黃耆圓 枯礬散

腸風 臟毒丸

加減四物湯 香梅圓 蝟皮圓 斷紅

圓

嚴氏濟生續方

椿皮圓

修月魯般經後錄

秘傳痔漏良方

水澄膏

神靈枯藥膏

荆芥湯

龍石

散

雙金散

導赤散

散

國老湯

換痔藥

宣明論

木鱉頭

痔

香殼丸

榼藤子丸

黃耆葛花丸

連散

乳香沒藥散

木香厚朴湯

東垣試効方

痔漏論

秦艽白朮圓

秦艽蒼朮湯

秦艽防風湯

當歸郁李仁湯

秦艽羌

活湯 紅花桃仁湯

御藥院方

歲靈仙散 地榆散 枳殼散 愈痔散
槐荆丸 結陰丹 槿藤子丸 金鉞散
木香枳殼丸 管仲散 止血散 淋瀝
藥 乾上藥 槐角丸 雞冠散 寸金
錠子 麝香散 熊膽散

得效方

失血

酒蒸黃連圓 槐角圓 人參敗毒散
防風散 黃連阿膠圓 加減四物湯

腸風黑散 黑玉丹 加味雙和湯 卷
柏散 聖金圓 神丹 小烏沉湯 震
靈丹 玉華白丹 理中湯 香梅圓
斷紅圓 黃連香薷散 香連圓 芎歸
湯 真人養臟湯 消風散

脫肛

文蛤散 釣腸圓

諸痔

釣腸圓 黑玉丹 橘皮湯 立效圓

黑圓子 逐瘀湯 白玉丹 黃連阿膠

圓 槐角圓 乾葛湯 寬腸圓 五灰

膏 五灰膏 蓮子散 熊膽膏 枯礬

散 消石散 蝸牛散

澹軒方

腸風下血

臟毒下血

腸風臟毒

脫肛

香薷圓 苦楝

痔痛

熏痔

傳痔

繫鼠竅痔并小肉瘤

肘後方

治患五痔及脫肛諸方

五痔散 龜甲散 槐皮膏 葇荂煎

槐澹寮方

痔疾

枳殼除痔圓

失血

衛生寶鑑

腸風痔漏

神應黑玉膏

蒲黃散

椿皮散

必用全書

痔漏證諸方

拔粹方

痔疾證

蒼朮澤瀉丸 白朮丸 升陽去熱和血

湯

王氏集驗方

獨行虎散

黃連丸

黃連湯

連藥湯

梨花散

醫方大成

痔漏

槐角圓

脫肛

紫葳膏

南北經驗方

下血

黃連胃衆散、當歸和血散、地骨皮散

痔漏門 三

袖珍方

痔漏

辰砂錠子 生肌散 辰砂膏 玉紅散

代針膏 薰痔法 烏玉丸 雲臺散

四效散

脫肛 清血水香膏 黃髮散 齊散

二靈散

永類鈴方

腸風下血

腸風黑散 敗毒散 震靈散 玉華白

丹 真人養臟湯 芫酒蒸黃連元 示理中

湯 芫歸湯 小烏沈湯 烏梅先 聚

金元 槐角散 伏竜肝湯

五痔

龜石散 導赤散 雙金散 國老湯
 洗法 貼法 薰法 黃連阿膠元 加
 減四君湯 脫肛

經驗秘方

腸風痔漏

枳殼丸 黃連木香湯 黃連丸 香連
 丸 吊腸丸

經驗良方

腸風痔漏諸證

神應圍 椿皮圓 槐花散 絲瓜散

烏雞圓 烏金散 洗法 三黃圓 立

効散 枳殼黃芪圓 鼈甲圓 蛇床散

地榆湯 槐花散

鳳煙霞聖効方

搜風丸 龍石散

裝壽親養老書

芸香元

施圓端效方

鳳眼丹

吳氏集驗方

精熱

麝香散

痔漏

異功散 燒丹散 雄黃散

神効名方

神應散

温白丸 坐藥 淨固丸 黃

連貫衆散 槐荆丸 薰潔藥

獄事林廣記

車山居四要

物理傷續斷方

雙山秘傳李防禦五痔方

水澄膏 荆芥湯 潤腸丸 龍石散

導赤散 雙金散 內補散 國老湯

熨法 水澄膏 紅肉膏 金花散 龍
 骨海蛤散 乳香膏 當歸飲 通真煨
 姜丸 下鬲散 犀角散 麥煎散 黑
 神黃耆散 宣風散 木通散 收膿膏
 車前散 注青膏 金花散 山甲散
 解腸散 洗藥

急救仙方

塗洗藥

秘傳外科方

外科精義

寸金錠子 薰痔散 三神丸

禁壽域神方

痔漏部

衛生易簡方

痔漏

脫肛

下血

金匱鈞玄

備預百要方

痔漏腸風脫肛等諸病方

簡奇方

黃連木香湯

餘藥無名者散見本方

食治

禁忌

鍼灸

導引

痔漏門

一

附腸風

脫肛

諸疔候

巢氏病源

心蟻候

心蟻者由藏虛諸虫在腸胃間因虛而動攻

食心謂之心蟻初不覺他病忽忽嗜睡四支

沉重此蟻或食心則心煩悶懊痛後乃侵食

餘處診其脉沉而細手足冷內濕蟻在心也

五疔緩者則變成五蒸五蒸者一曰骨蒸二

日脉蒸三日皮蒸四曰肉蒸五曰血蒸其根
源初發形候雖異至於蒸成爲病大體略同
皆令人腰疼心滿虛乏無力日漸羸瘦或寒
熱無常或手足煩熱或逆冷或利或澀或汗
也五蒸別自有論與虛勞諸病相從也
千金方

肛門論

肛門者主大行道肺大腸候也號爲通事令
吏重十二兩長壹尺二寸廣二寸三分應十

二時若臟傷熱則肛門閉塞人行不通或腫
縮入生瘡若腑傷寒則肛門開大行洞寫肛
門凸出良久乃入熱則通之寒則補之虛實
和平依經調理

五痔論

夫五痔者一曰牡痔二曰牝痔三曰脉痔四
曰腸痔五曰血痔牡痔者肛邊如鼠乳時時
潰膿血出牝痔者肛腫痛生瘡脉痔者肛邊
有瘡癢痛腸痔者肛邊核痛發寒熱血痔者

大便清血隨大便污衣又五痔有氣痔寒溫
勞濕卽發蛇蛻皮主之牡痔生肉如鼠乳在
孔卞頗出見外妨於更衣鼈甲主之牝痔集
作酒從孔中起外腫五六日自潰出濃血獮
皮主之腸痔更衣挺出久乃縮母豬左足懸
蹄甲主之脉痔更衣出清血蜂房主之五藥
皆下篩等分隨其病倍其主藥爲三分旦以
井花水服半方寸匕病甚者旦暮服之亦可
四五服禁寒冷食猪肉生魚菜房室性得食

乾白肉病瘥之後百日乃通房內又用藥導
下部有瘡內藥瘡中無瘡內孔中又用野葛
燒末刀圭內藥中服藥五日知二十日若三
十日愈痔痛通忌葷菜
三因方

五痔證治

經云腸癖爲痔如大澤中有小山突出爲痔
人於九竅中凡有小肉突出者皆曰痔不特
於肛門邊生亦有鼻痔眼痔牙痔等肛門中

證狀不一方書分出五種曰牡曰牝曰赤曰
腸曰氣牡痔者肛邊腫痛突出壹枚五六日
後潰出膿血自愈牝痔者肛邊發癰數个如
鼠乳狀脉痔者無頭脉中送小竅注下清血
腸痔者生在腸內更衣時非按搦不入氣痔
者遇憂怒則發肛門腫疼氣散則愈治之之
法切勿用生砒毒氣入腹反至奄忽近見貴
人遭此痛不忍言因書以戒後學

辯腸風論

夫有五痔人登園則下血或點滴或淋箭或
清或濁面黃唇白心忪脚弱頭目眩暈此因
飽食坐久腸癖所為亦旬飲酒房室過度所
致世醫多指此為腸風臟毒然腸風臟毒自
屬滯下門藏毒卽是藏中積毒腸風卽是邪
入藏純下清血謂之風利今五痔下血乃是
酒痔脉痔其血自肛門邊別有一竅如針孔
大滴淋而下與洩物不共道不可不知
神巧萬全方

諸痔方論

痔有五種其名不同其證亦異肛邊生鼠乳者名牡痔出血而生瘡仍腫痛者名牡痔肛邊生核疼痛下血腫硬或不消令人寒熱者名腸痔肛邊或癢或痒乃生瘡時時下血者名脉痔因便而清血隨出者名血痔五痔所發皆本傷於風濕飲食過度房室勞損血氣流溢滲入大腸衝發於下而成痔也又有氣痔酒痔若藏府虛冷或憂忿勞傷陰陽不和

風邪之氣壅積腸間澁不通血逐便下或卽脫肛者名曰氣痔飲食過度傷於脾胃肛邊腫痛時時下血斷酒卽止飲酒又發者名曰酒痔治法各隨形候爲之方也治左痔有氣痛寒濕勞卽發蛇脫主之牡痔生肉如鼠乳在孔中頭見外妨於更衣鼈甲主之酒痔從孔中起外腫五六日自潰出膿血蝟皮主之腸痔更衣挺出久乃縮母猪右足懸蹄甲主之脉痔更衣出清血蜂房主之藥皆下篩等

分隨其病倍其主藥爲三分且以井花水服
半方寸匕病甚者暮服之亦可四五服禁冷
食豬肉生魚房內唯得食乾白肉病差之後
百日令通房內又用藥導之下部有瘡內藥
瘡中無瘡內孔中及用野葛末刀圭內藥
中服藥五日知二十日瘥愈痔病通忌葷菜
也

直指方

脫肛

脫肛壹證氣聚不散也裏急而不得出外脹
而不得入先以枳殼散作劑又以枳殼燒灰
存性細末摻傅或津唾調傅氣散則腫消矣
仍用生薑汁調五苓散如膏入新水研散略
煎吞黃連阿膠圓雖然此論肛門挾熱而腫
脹也其或腸中虛薄不收則理中湯鈎腸圓
養臟湯輩主治烏賊骨木賊草傅之
脫肛方論
四十八難曰病之虛實出者爲虛入者爲實

肛門之脫非虛無故然哉蓋惟實則溫溫則
內氣充而有所蓄惟虛則寒寒則內氣餒而
不能收而況大腸之厚薄膏脂之瘠肥亦視
夫內氣之虛實何如耳大凡脫肛須以溫湯
澆令和軟然後摩挲而入治法以溫斂行之
其有產婦用力過多及小兒呼號努氣久痢
不止風邪襲虛亦有此證凡腸頭作癢卽
是腹中有虫生艾苦練根煎湯薰洗仍以乾
艾生薑煎服其脫肛腸風痔漏者登溷不可

用舊紙若包裹湯藥雜物尤不可用纔有壹
毫染污其間立見痛腫如此急以溫湯滌之
患在肛腸登溷後須用壹洗

腸風論

腸胃不虛邪氣無從而入人惟坐卧風濕醉
飽房勞生冷停寒酒麪積熱以致榮血失道
滲入大腸此腸風臟毒之所出作也挾熱下
血清而色鮮腹中有痛挾冷下血濁而色黯
腹內略疼清則爲腸風濁則爲臟毒有先便

而後血者其來也遠有先血而後便者其來也近世俗糞前糞後之說非也治法大要先當解散腸胃風邪熱者與敗毒散冷者與不與金正氣散風邪既去然後隨其冷熱而對治之或曰血遇熱則行止血多用涼藥如地榆散藥皮易黃連阿膠丸酒蒸黃連丸等施之熱證固可然爾其或陽虛陰走正氣不得歸元則用木香理中湯陷子理中湯震靈丹黑石丹輩如之何而廢之要之芎歸湯壹劑

又調血之上品熱者加伏苓槐花冷者加伏苓木香此則自根自本之論也雖然精氣血氣生於穀氣靖惟大腸下血大抵以胃藥收功真料四君子湯參苓白朮散以枳殼散小烏沉湯和之胃氣一回血自循於經絡矣抑曾有說焉腸風之與虫痔特介乎毫芒之間腸風之血自腸中來虫痔之血肛門邊傍別壹小竅射如血線是也迨夫肛門既脫腐血浸淫於其間則俱化為虫蠹蝕腸口滴血淋

滴自此又不能約而收之矣善調理者尤當以蕪荑艾葉苦練根輩爲之化虫血屬於心雖曰川芎當歸主血當以伏苓伏神佐之前輩止血亦不用甘草但增棗入藥用

諸痔論

臟腑本虛外傷風濕內蘊熱毒醉飽交接多慾自戕以故氣血下墜結聚肛門宿滯不散而衝突爲痔也肛邊發露肉珠狀如鼠乳時時滴潰膿血曰牡痔肛邊生瘡腫痛突出壹

枚數日膿潰卽散曰牝痔腸口顆顆癢癩且痛且癢出血淋漓曰脉痔腸內結核有血寒熱往來登溷脫肛曰腸痔若血痔則每遇大便清血隨下而不止若酒痔則每遇飲酒發動瘡腫而血流若氣痔則憂恐鬱怒適臨乎前立見腫痛大便艱難強力則肛出而不收矣此諸痔之外證然也治法總要大抵以解熱調血須氣先之蓋熱則血傷血傷則經滯經滯則氣不運行氣與血俱滯乘虛而墜入

大腸此其所以為痔也諸痔出血肛門間別
 有小竅下如血線不與便物共道痔久不愈
 必至穿穴瘡口不合漏無已時此則變而為
 瘻矣前手治法之外抑猶有說焉腸風臟毒
 之與痔瘻同出而異名也歲積月累淫蝕腸
 頭濕爛可畏此果有物致然哉虫是也其間
 孰劑又當為之化虫不然古書可以謂之虫
 痔氣血下墜衝突為痔既不能坐又不容
 行立則愈則其墜矣惟高枕偃仰心平氣定

其腫自收

嚴氏濟生方

五痔論治

痔凡有五卽牡痔牝痔腸痔脉痔血痔是也
 素問云因而飽食筋脉橫解腸澀為痔多由
 飲食不節醉飽無時恣食肥膩久坐濕地情
 慾耽著久忍大便遂使陰陽不和關格壅塞
 風熱下衝乃成五痔肛門生妬或左或右或
 內或外或狀如鼠竅或形似櫻桃或膿或血

或痒或痛或軟或硬或舉或腫久而不治則
或漏矣治之之法切不可用以毒藥亦不可
輕易割取多致淹忽惟當用以穩重湯劑徐
徐取效不可不知

腸風臟毒論治

夫腸風臟毒下血者皆由飽食過度房室勞
損坐臥當風恣養生冷或啖炙煇或飲酒過
度或榮衛氣虛風邪冷氣進襲臟腑因熱乘
之使血性流散積熱壅遏血滲腸間故大便

下血血清而色鮮者腸風也濁而色黯者臟
毒也肛門射如線血者蟲蛀也又有陽氣不
升血隨氣降而下血者下虛也下血之脈脈
多洪大而芤蓋弦者勞也芤者下血也治療
之法風則散之熱則清之寒則溫之虛則補
之治法合宜無不效者矣
管見大全良方
若腸風藏毒下血者宜與黃連阿膠圓濃磨

木香湯吞下及腸風黑散或四物湯加防風
荆芥煎服有熱者可與龜腦鷄蘇圓薄痔煎
作小圓酒飲吞服若熱而大便不通肛門腫
痒時時便血者宜服四順清涼飲或小三黃
圓諸痔發作肛門腫痛甚者脫肛或瘦可與
釣腸圓乳香圓黑玉丹槐角元枳殼煎圓未
破者驅毒散塗之更以豬膽汁潤之
治病百法

藏毒下血

夫藏毒下血可用調胃承氣湯加當歸瀉訖
次用芍藥藥皮丸黃連解毒湯五苓益心各
停調下五七錢服之內經曰腸澼使血何如
答曰澼者腸間積水也身熱則死寒則生熱
爲血氣敗故死寒爲榮氣在則生七日而死
者死於火之成數也

痔漏腫痛

夫痔漏腫痛內經曰因而大飽筋脉橫解腸
澼爲痔痔而不愈變而爲漏同治濕法而治

之可先用導水丸禹功散瀉訖次服枳殼丸
木香檳榔丸更加以葵羹菠菜猪羊血等通
利腸胃大忌房室雞魚酒醋等物
十形三療

濕慝瘡

穎臯韓吉卿自髀至足生濕慝瘡人者如錢
小者如豆痒則搔破水到則浸淫狀類虫行
袴鞮愈而復生癩痕成凹瘡余年不瘥戴人
晒之曰此濕慝瘡也山水濕而得故多在足

下以舟車濟川大下十余行壹去如掃渠素
不信戴人之醫至此大服不愈以非藥素問

痔瘡藥效以成血虧身燥亦不試明效

趙君玉常病痔鳳眼草刺蝟皮槐根狸首之
類皆用之或以乾薑作末塗猪肉炙食之大
便燥結不利且痛後數日因病黃大涌瀉數
次不言痔作麻先生偶記而書之君玉自識
戴人之後痔更不發耳太劍平國民醫以藥
宣明論

痔

夫腸風痔病者所發乎太陰手陽明經以應
動脈謂肺與大腸為表裏主為傳道以行糟
粕腸風痔病有五種其證亦異蓋因陽氣虛
而玄腑疎風邪乘而熱自生風濕邪熱攻於
腸中致使大便澀而燥熱鬱血熱散而流溢
衝浸滲腸裏故以先血後便熱在下先便後
血熱在上先血後便久而不愈乃作痔素問
云因而飽食筋脈橫解房室勞傷腸癖為痔

風熱蒸散穀氣流溢傳於下部故令肛門腫
滿結如梅李核其者而變成瘻也五臟切宜
保護勿令受邪毒亦內難由而夫必宜再
醫方大成云云云云云云云云云云云云
門淋痔漏為之者久而不愈血滲其源
痔之五種牡痔腸痔血痔牝痔脈痔是也究
其所因皆是素蘊熱毒或過食燒炙新酒久
坐血脈不流或因比情之氣鬱結乎臟腑之
間其毒不能消散發而為痔或藏於肛門之

內或突出於外大者如蓮花鷄冠核桃之狀
小者如牛妳雞心鼠尾櫻桃之類名狀更多
其實皆由臟毒所致故蘊毒深者其狀大蘊
毒小者其形小或流膿水或出鮮血行坐之
門病者殊爲之苦久而不治血氣衰弱必然
成漏今之治法多用刀線割剔其痔雖有藥
可以封固然其毒在內無由而去必有再作
之理否則成漏轉而爲難治之證諸方多有
服食敷貼之藥今人用之少見有效揆度其

理其病既有形於外非服藥之能愈必須用
去毒消痔之藥點之俟其毒盡痔消方可爲
愈切不可用砒霜等毒藥恐致人奄忽慎之
慎之又無痔者肛門左右別有壹竅流出
膿血名爲單漏治之須用溫煖之藥補其內
又以生肌肉之藥敷於外其竅在皮膚者易
愈臟腑有損而生竅者未易治也
八竅脫肛
肺與大腸爲表裏故肺臟蘊熱則肛門閉結

肺臟虛寒則肛門脫出此三因之論又有婦人產育用力過多及小兒久痢後臟寒皆能使肛門突出治之必須溫肺臟補腸胃久則自能收矣

永類鈴方

腸風下血

腸風臟毒下血皆由飽食炙煇生冷酒色并傷坐卧當風榮衛氣虛風邪冷氣進襲臟腑因熱乘之血滲腸間腸風是邪氣入

臟臟毒是臟中積毒風則散之熱則清之寒則溫之虛則補之停滯則疎滌之巢氏云腸虛下血表虛則汗血

脉病證

血

治

局方敗毒散腸風黑散

浮	腸風	下血必在
	近血色清	而鮮
	湯香梅元	五痔內
	御院楹藤元	簡易

			<p>沉滯毒臟 血在糞後 是名遠血 而積血黯 而濁</p>
<p>烏荆元水調散 本事槐花散加大便 痛蘇梅湯米飲調下 黃連元嚼薄荷煎</p>	<p>三因伏竜肝湯 槐花散槐角散玉屑 元濟生蒜連元香 梅元香連元 宜姜桂溫則血歸經也</p>		

<p>沉微</p>	<p>洪數 血步</p>	<p>臟寒 下血無痛 經云陽虛 陰必走</p>	<p>積熱 純下鮮血 其則兼痛</p>
<p>胃風湯槐角散 生斷紅元</p>	<p>三黃湯及元敗毒散黃 連香如散茆根湯下 香連元獨連湯楊 氏聚金元五痔門 濟生枯凡散 胃風湯 濟生蒜連元五痔門</p>	<p>沉遲 下血</p>	<p>傷濕 下血如豆</p>

類聚

三

之脉
多洪
大而
芤者
血也

虫蛀
如血線
如血線

皮元桃皮與水銀膏

腸虛
陽氣不升
血隨氣降

加減四物湯下養氣丹

震靈丹五痔內黃芪

元養氣湯下香連元

胃風湯濟生斷紅

元簡易玉屑元

敗毒散用巴豆炒黃連

加仍去巴葛花黃連

元冷熱不調養藏湯

酒毒

食毒

小兒下紅

五痔

敗毒散加黃連用巴豆

炒連仍去巴

百壹選入霍香正氣散

五疳保童元和小香連

元或三黃元米飲下

經云腸癖為痔皆因素蘊熱毒或過食燒
炙生酒肥膩久坐濕地耽著情慾久忍大
便遂使陰陽不和關格壅塞風熱下冲

成五痔久不治則成漏矣切不宜用毒藥
刀線割剔

脈病證治

腸痔 肚門腫痛 釣腸元黑玉丹和服磨

下濃 日後潰愈 京墨和真龍腦茶煮

血脈 小兒疳積 櫻笋淹食效

沉小 牝痔 數筒如鼠 稍秘枳殼湯下香連元

留連 牝痔 數筒如鼠 姊狀

者生 局方槐角元槐白皮膏

數疾

而大

有熱

者死

生在腸內 御院榼藤元 三四

腸痔 更衣時非 五灰散 簡易集椿

按搦不入 皮元玉屑元

脈痔 無頭脈中 濟生蠟皮元 黃芪元

逆小竅注 集成五灰膏 黑元

下清血 子 寬腸元

氣痔 憂怒則發 腫疼氣散 則愈

用後灸法

千金方

類聚良方

三

五痔

治五痔衆醫所不能愈者方

秦艽 白芷 厚朴 紫參 亂髮 紫

菴各一兩 雷丸 藁本各二兩 石南 麝蟲各半

兩貫衆三兩 蟲蟲升 猪後懸蹄拾四枚

右十三味合搗下篩以羊髓脂煎和先如

梧子大空腹飲下十五丸日二若劇者夜

壹服四日肛邊癢止八日膿血盡鼠乳悉

瘡滿六十日終身不復發久服益善忌魚

猪肉等

槐子圓治燥濕痔痔有雄雌皆主之方

槐子 乾榛 吳茱萸根白皮各四兩 秦艽

白芷 桂心 黃芩 黃耆 白欬 牡

蘘 龍骨 雷丸 丁香 木香 蒺藜

附子各二兩

右十六味爲末蜜丸如梧子大飲服二十

丸日三十金翼無白欬深師無黃耆云治

苦暴有乾燥腫痛者有崩血無數者有鼠

乳附核者有腸中煩癢者三五年皆殺人
主忌飲酒及作勞犯之即發

小槐實圓治疔疔十年者方

槐子三斤白糖二斤礬石 硫黃各壹斤大黃

乾漆 龍骨各十兩

右七味四味搗篩其二種石及糖並細切
內銅器中壹石米下蒸之以絲絞取汁和
藥末併手丸如梧子大陰乾酒服二十九
日三稍增至三十九

槐子酒治同前

槐子二斗槐東南枝細切槐東南根細切

右三味內大釜中以十六升水煮取五斛

又澄取清更煎取壹石六斗炊兩斛黍米上
麴二十斤釀之攪令調封泥七日酒熟取
清飲適性常令小小醉合時更煮滓取汁
淘米及洗器不得用水須知此事忌生水

故也

又方時後方治五拾年疔不差塗熊膽取瘡

止神良衛生易簡方同壹切方皆不及此

又方七月七日多採槐子熟二擣取汁內銅器中重繇密蓋著宅中高門上曝二十日已上煎成如鼠屎大內穀道中日三亦主瘰及百種瘡

又方取生槐白皮十兩熟擣丸如彈丸繇裹內下部中附後方同此病宜常食篇竹葉及煮羹粥大佳

又方神巧萬全方治陽風積年不差羸弱至甚宜服此方取鯉魚腸三

具以火炙令香繇裏內穀道中壹食久蟲當出食魚腸數數易之盡三具瘡壹方炙腸令香坐上蟲出經川有效

又方虎頭犀角右二味為末和不中水猪脂大如雞子塗瘡上取瘡

治五痔及脫肛方蠟白皮猪脂斤半榛子斤桃人各拾枚巴豆各半野葛兩甘草兩白芷兩薰草七枚辛夷

六錄

右十味咬咀煎三上三下去滓以絲沾膏塞孔中日四五過蟲死瘥止癢痛大佳

治五痔方

蝟皮

方三指大切

熏黃

康大末

熟艾

雞子大

煨干

煎

右三味穿地作孔調和取便熏之口中熏

黃煙氣出為佳火氣消盡即停停三日將

息更薰之凡三度永瘥勿犯風冷羹臠將

補慎猪雞等

衛生易簡方忌生魚冷二十日若痔破以蝟皮煨灰傅

又方取槐根煮洗之

又方用桃根煮洗○聖惠方治痔瘻有頭疼

痛下膿血在桃根煮汁日二上洗之項

又錄

獾皮圓治痔方亦治漏

獾皮

具書

礬石

十當歸

日連翹

乾姜

三附

子

續斷

黃耆

各二兩

槐子

三兩

乾地黄

五兩

右十味為末蜜丸如梧子大

日服十五丸

日再加至四十九集驗人無礬石地黃○

日再加至四十九集驗人無礬石地黃○

肘後方蝟皮壹具細切熬令焦黑燔燒使
 汁盡當歸黃連附子炮續斷黃耆各二兩
 乾地黄五兩槐子三兩乾薑二兩上物搗
 下蜜和飲服十五丸日再服稍加至三十
 丸療癩大驗

又方治崩中及痔方

獾皮 人參 茯苓 白芷 禹餘糧
 乾地黄 槐耳 續斷各五兩 蒲黃 黃耆
 當歸 艾葉 橘皮 白欬 甘草各二兩

白馬蹄酒浸壹宿 牛角觶各四兩 鰻魚頭

二十枚 猪懸蹄甲二十壹枚熬

右十九味為末蜜丸如梧子大酒服二十

丸日再稍加

治痔方取槐耳赤雞壹斤卽是槐樞為末飲服方

寸七日三

又方以蒲黃水服方寸七日三良妙衛生易簡方同

外臺云治腸痔每大便常有血者肘後方同

治痔下血及新產漏下方

附子 好礬石 各壹兩

右二味為末白蜜丸如梧子大酒服二九日三稍加不過數日便斷百日服之終身不發崔氏方有干姜壹兩

治外痔方亦治惡瘡癢瘡

真珠 雄黃 雌黃 各壹兩 竹茹 三兩 猪膏 壹斤

右五味為末內猪膏中和調又切亂髮半鷄子大和東向煎三上三下髮焦出其痔先用塩湯洗拭乾後傅之

治痔下部出膿血有虫傍生孔竅方槐白皮壹擔剉內釜中煮令味極出置大盆中適寒溫坐其中如浴狀虫悉出冷又易之不過二三度瘥

治穀道癢痛繞緣腫起裏許欲生肉突出方

大豆 三升以水七升急火煮取四升 槐白皮 三升 甘草 三兩

右三味以豆汁煮取二升浸故帛薄之冷則易日三五度

槐皮膏治穀道癢痛痔瘡方 和劑局方名槐白皮膏治內外

諸痔腫核結硬或痒發無時或痛不可忍或
肛邊生瘡赤爛侵潰或鼠乳附核久不消散

槐皮局方槐棟實各五兩外甘草刪繁用

白芷各二當歸三桃人六十赤小豆二

右七味咬咀以成煎猪膏壹斤微火煎白

芷色黄膏成取摩瘡上醫方大成集成補

局方日再并導下部刪繁方無當歸治腎

勞虛或酒醉當風所損腎藏病所為肛門

腫生瘡因酒勞傷發瀉清血肛門疼痛蜂

房膏

治穀道痛方菟絲子熬黃黑和雞子黃以傅

之川二度肘後方塗

又方取杏人熬令黃搗作脂以傅之肘後方

要方

治大便孔卒痛如鳥啄方以大小豆各壹斗

肘後方衛生易簡方和搗肉兩袋中蒸令

備預百要方各膏升和搗肉兩袋中蒸令

極熱更互坐之瘥秋潤陰四而味那○

肛門主肺肺熱應肛門熱則閉塞大行不通

腫縮生瘡兌通方白蜜三升煎令燥冷水
中調可得為丸長六七寸內肛門中到身
向上頭向下少時取烊斯須即通洞泄○
刑後方白蜜壹升猪膽壹枚相和微火煎
令可丸丸長三寸作挺塗油肉下部腫令
後重須臾通泄

猪肝散肛門主大腸大腸寒應肛門寒則洞

瀉肛門滯出

猪肝壹斤熬黃連叁阿膠味葶藶各仁艾兩

藥壹烏梅肉五

右二味治下節溫清酒壹升服方寸匕半

日再若不能酒與清白米飲亦得

壁土散治肛門滯出方

故屋東壁土壹升皂莢三尺各長二寸

又右二味先擣上為散挹粉肛頭出處次取

皂莢炙暖更遞熨取入則止

又方灸故麻履底按令入頻按令入永瘥後

方

又方鼈頭 故敗麻履底 各壹枚

右二味燒鼈頭痔為散傅肛門滯出頭次

將履底按入即不出矣 肘後方同

又方磁石 四兩 梓心 壹尺 蝟皮 壹枚

右三味治下節飲服方寸七日壹服即縮

慎舉重及急帶衣斷房室周年乃佳肘後

方云治女人陰脫出外用鼈頭壹枚為四

味○三因方蝟皮散治肛門或因洞泄或

因州力脫出不收蝟皮 燒存性 壹斤 磁石 半兩 煨碎

桂心 兩半 右為末飲方寸匕 得効方醫方大成集成南北經

驗方袖珍方衛生易簡方 每服二錢米餘空心調下 忌舉重及房室

肘後治女人陰脫加鼈頭壹枚燒灰研入

又方女萎 衛生易簡方切作片 壹升以器中燒坐上熏

之即入

治脫肛方蒲黃二兩以猪脂和傅肛上內之

二三度即愈 備預百要方同

治腸隨肛出轉廣不可入方生栝萋根為粉

以猪脂膏溫塗隨手抑按自得縮入 肘後方同

治積冷利脫肛方枳實壹枚石上磨令滑澤

鑽安柄蜜塗炙令暖熨之冷更易取縮入

止肘後方衛生易簡方備預百要方同

又方鐵精粉內上按令入即愈

治脫肛歷年不愈方生鐵三斤聖惠方以水

壹斗煮取五升出鐵以汁洗日再肘後方同聖惠

方日三度洗之

又方死鼈頭膏枚燒令煙絕治作屑以傅肛

門上進以手按之肘後方壽域神方同

千金月令

治腸痔大便常血方

大麻仁蘇大黃枳殼桑

右各二兩搗篩蜜和為丸每日空心芸薑

湯下十二丸水

又方石取葱白三五斤煮作湯盆中坐立差

肘後方衛生易簡方同

海上仙方

脫肛不上

脫肛不上久難安此个仙方遇有緣尋取蜘蛛燒得爛櫓為肛上應時痊

痔漏脫肛

痔漏脫肛人受苦疼痛交人叫苦天急取川椒口內目空心水送服二錢

痔漏

蠶蛾半張紙碗內燒成灰衛生易簡方好酒調來喫服了自然除

痔疾

痔疾

痔病葫荽子半碗研熬強每服三錢重酒下

最宜良

衛生易簡方 瘡以河水洗

聖惠方

治五痔諸方

夫痔者謂牡痔牝痔脉痔腸痔血痔也其形證各條如章又有酒痔肛邊生瘡亦有血出又有氣痔大便難而血出肛亦出外良久不入諸痔皆由傷於風濕飲食不節醉飽過度房室勞傷損於血氣致經脉流溢滲漏腸間

衝發下部以壹方而治之者名為諸痔非為

諸痔共成一痔痔久不差變為瘻也

治五痔下血不止宜服艾葉散方

艾葉半兩炒黃耆一兩白龍骨一兩地榆一兩

枳殼炒白芍藥一兩熟乾地黄一兩

右件藥搗籠羅為散每服三錢以水壹中

盞煎至六分去滓每於食前溫服

治五痔結硬愀痛不止宜服龜甲膏方

龜甲二兩塗醋蛇蛻皮一兩露蜂房一兩

麝香一分猪後懸蹄甲一兩炙

右件藥搗細羅為散每於食前以溫粥飲

調下壹錢

治五痔下血疼痛不可忍蜜陀僧散方

蜜陀僧半兩橡實半兩肉荳蔻半兩地竜一兩

檳榔一兩右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下壹錢

治五痔出血疼痛久不差硫黃散方

硫黃一兩蛇黃一兩金星者一兩白礬一兩鰻鱺

魚頭一頭鮑魚大者一頭開肚取却腸却入

皮纏縛泔泥裏之候乾入炭上燒令烟盡取出去泥

右都研如粉每於食前以粥飲調二錢服

之

治五痔下血疼痛裏急不可忍

蝟皮二兩槐子人二兩龍骨二兩榭葉一兩

微乾薑半兩炮乾地黃一兩附子一兩

當歸一兩御醫撮要三分

一兩炮裂去皮齊。芎藭半兩檳榔一兩

萬全方大川烏炮吳茱萸半兩湯浸七

右件藥搗羅為末鍊蜜和膏五七作丸

如梧桐子大每於食前以粥飲下三十丸

治痔下血不止疼痛壅塞不通宜服黃耆

丸方

黃耆一兩蝟皮二兩當歸一兩桂心一兩

三槐子人二兩白礬一兩麝香一分細樹

殼二兩麩炒附子一兩炮裂去皮白石蛇肉一兩

酒浸微黃炙

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每於食前煎柏葉湯下三十丸

治五痔腫硬發歇疼痛久不著宜服此方

雷丸一兩紫參兩半當歸兩一白芷兩半槐子人兩

微亂髮為一兩貫衆三分黃耆六兩廣蟲一分

炒令蜜蟲一分石南二分蒙本一兩猪

後脚懸蹄甲七枚黃炙

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每於食前粥飲下三十丸

治五痔及腸風瀉血等方

鷹頭草兩半甘菊花兩半地榆兩半黃耆一兩

金蘿藤兩半黃藥兩半槿藤子兩半煨

右件藥搗羅為末以軟飯和丸如梧桐子

大每於食前以粥飲下三十丸

治五痔下血疼痛不止槐子丸方

槐子人兩微炒龜骨兩槲葉三分乾薑炮裂

判當歸三分判茜根三分附子一兩炮裂黃

耆三兩判川大黃壹兩判亂髮壹兩吳茱萸

半兩湯浸七猪後懸蹄甲七枚炙

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗五七百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以溫粥飲下

三十九

治五痔下血不止衆治無効宜服此方

石南壹兩槐實壹兩半黃耆壹兩貫衆壹兩

微附子壹兩炮裂蝟皮壹枚黃礬壹兩烏

蛇正兩酒浸去皮白礬壹兩亂髮壹兩露

蜂房壹兩炙枳殼壹兩麩壹兩麩壹兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸

如梧桐子大每於空腹及晚食前煎桑枝

湯下三十九

治五痔必効方

枳殼二兩麩二兩炒胡荽子壹合皂莢壹合

皮壹兩微黃去穢壹兩微炒壹兩皂莢壹合

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每於食前煎黃耆湯下三十丸

治五痔有頭疼痛不可忍宜用此藥熏之神效方

槐膠

二兩用水煎成膏

皂莢

二兩去皮子

麝香

壹分細研

鱧魚

半兩

雄黃

半兩

丁香

半兩

菘荈子

半兩

右件藥搗羅為末都研令勻用槐膠膏和分為五丸取壹淨瓶內著炭火燒壹炷以物蓋之於蓋子上鑽壹孔子掘地理瓶與地面平於上止坐當痔上熏之日可二度

痔上汗出便差

治五痔槐黃散方

槐黃

二兩

附子

壹兩炮裂去皮臍

右件藥搗細羅為散每於食前以溫粥飲

又調下壹錢

治五痔熨藥方

桃葉

切二升

槐花

壹升

胡麻

壹升

右件藥合搗蒸之以熱熟為度旋取壹升以絛裹熨痔上冷即頻換熨之

治五痔悉主之方

蛇蛻皮二兩

右件藥燒為灰入麝香壹錢同研令細每

於食前以粥飲調下二錢瑣碎錄同

又方桑耳二兩

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢瑣碎錄同

又方臘月牛脾一具

右煮令熟食之令盡瑣碎錄同肘後方此下云勿與塩醬未差

再作

又方蒼耳莖葉二兩五月五日採陰乾者○壽域神方五月五日午時採

右件藥搗細羅為散每於食前以清粥飲

調下二錢肘後方寸七立効

又方牛角觮壹兩炙令黃焦

右件藥搗細羅為散每於食前以温粥飲

調下壹錢

又方蒲黃二兩微炒

右件藥搗細羅為散每於食前以温粥飲

右件藥細羅為散每於食前以粥飲調下
膏錢

又方芫荇子壹合水淘去浮者生用

右件藥擣羅為末以飭和丸如蓮子大懸

裏內下部中日三四度易之

又方槐根五兩艾葉三兩

右以水壹斗煎至五升去滓冷暖得所洗

下部日二用之

又方蝟皮一枚細剉

右入於瓶內燒煙熏痔上差瑣碎錄同

又方葇荇根中指大○衛生易簡方寸餘

右以濕紙裹煨令熟去紙以蜜塗內下部

中衛生易簡方壹二分冷即出之有蟲下

便差

又方右取槐脂捏作丸半棗許大每日內下

部中不過十上差

治痔肛邊生鼠乳諸方

夫痔肛邊生鼠乳者由人臟腑風虛內有積

熱不得宜洩流傳於大腸之間結聚所成也
 此皆下元虛冷腎藏勞傷風邪毒熱在內不
 散蘊積日久因茲生疾亦由飲食不節醉飽
 無恒恣食鷄豬久坐濕地情慾耽著久忍大
 便使陰陽不和關格壅塞風熱之氣下衝肛
 腸故令腸頭生肉如鼠乳或似櫻桃或如大
 豆時時下血往往出膿亦曰牡痔也
 治痔肛邊生鼠乳及大腸疼痛坐卧不得皂
 莢丸方

皂莢拾挺不坤肥長壹尺者湯浸黃耆壹兩
 剉枳殼壹兩微黃耆去穢麝香半兩細當歸壹兩
 炒桂心兩槐耳壹兩槐子壹兩附子二兩
 去皮白礬二兩燒灰兩蝟皮壹兩烏蛇二兩
 去皮骨槓榔兩鼈甲壹兩醋炙川大黃壹兩
 微炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗五七百杵丸
 如梧桐子大每日空心及晚食前以溫粥
 飲下三十丸

治痔生肛邊如鼠乳及成瘡痛楚至甚穿山甲散方

穿山甲 二兩炙 麝香 壹分

右件藥搗細羅為散入麝香同研令勻每

於食前煎黃耆湯調下二錢

治痔肛邊生鼠乳氣壅疼痛宜服鼈甲散方

鼈甲 二兩塗醋炙 檳榔 二

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

治痔疾鼠乳生肛邊煩熱疼痛槐子丸方

槐子 八 一兩 黃芩 一

右件藥搗羅為末以水浸蒸餅和丸如梧

桐子大每於食前煎桑耳湯下二枚丸

治痔疾下部痒痛肛邊生肉結如鼠乳腫硬

疼痛宜用槐白皮膏塗

槐白皮 五兩 赤小豆 五合 白芷 二兩 甘草 二兩

棟子 三兩 槐子 三兩 常歸 三兩 木鼈 二兩

右件藥細剉以猪膏壹斤半以慢火煎候

白芷黃赤色絲濾去滓取膏塗摩痔上
治大腸久積風毒痔下血不止肛邊生鼠乳
疼痛久不差宜用熏方

欒樹十菌子一兩縵鱓魚頭壹黃牛角鯁兩

訶荖子壹蝦蟆壹肉桂壹鼠乳壹

木作藥搗羅為末以水煎白膠香和丸如

彈子大於瓶內加裝香法燒壹炷熏下部

差

治痔疾有頭生於肛邊如鼠乳及生瘡痛痒

不止宜用此方

菩薩草三分黃連三分黃蘗三分膩粉壹

燒半兩地竜三分麝香壹錢

右件藥搗細羅為散入膩粉麝香和勻光

以塩漿水洗痔後以散傅之日三四度用

治痔疾肛邊生鼠乳宜用藜蘆膏塗方

藜蘆半兩去半兩川大黃半兩黃連半兩棟

子壹桃人壹去壹巴豆三

研心將藥以水煎去皮尖雙人去皮

右件藥以豬脂五合煎二三十沸，去滓放冷以塗痔上。

治痔下部痒痛痔邊生鼠乳腫起欲突出，宜用此熨之。

黑豆三升以水七升槐白皮二升甘草三兩

右件藥入大豆汁內煮至壹升，旋漬故帛

以熨患處，冷即換之。

治痔疾肛邊生鼠乳痛痒不可忍，宜用此虎

骨膏方

虎頭骨

壹兩炙犀角屑壹兩

右件藥擣細羅為散，以豬脂和如膏塗痔

上日三五度用之。

又方大鯉魚腸

三條

夫右炙令香，以絲裹壹條，更互熨下部中壹

炊久，蟲當自出。

又方豬牙皂莢

壹兩去黑皮炙微黃

右擣羅為末，以豬脂和丸如棗核大，上以

赤錫裹壹丸，內入穀道中，當下積滯惡血。

有頭者自消

又方右用蜘蛛絲纏繫痔鼠乳頭不覺自落

瑣碎錄同

治痔肛邊生核寒熱諸方

夫痔肛邊生核寒熱者由天腸風虛中臆積熱蘊稽既久不得宣通下攻肛腸結聚生核疼痛下血腫硬或有頭不消故令寒熱亦曰腸痔也

治痔肛邊生結核發寒熱及疼痛不止丹參

散方

丹參

三錢 蝟皮

壹兩 炙

蛇蛻皮

壹兩 當歸

三錢

剉微 露蜂房

壹分 木香

壹分 豬後懸蹄甲

壹兩

壹兩

壹兩

炙令 龍甲

壹分 醋炙

壹分 醋炙

壹分 醋炙

壹分 醋炙

壹分 醋炙

右件藥搗細羅為散每於食前以黃耆湯

調下二錢

治痔肛邊生結核腫硬疼痛發歇寒熱胡荽

子散

胡荽子

壹兩

枳殼

壹兩

當歸

壹兩

壹兩

壹兩

皂莢子人壹兩微炒○神巧萬全 郁李人壹兩湯浸去皮

壹兩湯浸去皮 微炒別研入

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

治痔肛邊生結核疼痛寒熱鼈甲散方

鼈甲壹兩塗醋炙 蝟皮壹兩炙 蛇蛻皮叁分

煇蜂露房叁分 檳榔叁分 麝香壹分 甲壹兩

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

治痔疾肛邊生核有頭牽引疼痛寒熱蝟皮

丸方

蝟皮壹兩炙 槐木耳壹兩 附子壹兩炮裂

當歸壹兩 赤芍藥壹兩 桑根白皮壹兩 白

礬壹兩 楮樹根白皮壹兩 天靈

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每於食前以粥飲下三十丸于大便後食

治痔疾肛邊有結核寒熱疼痛日夜不歇皂

莢丸方

皂莢四挺去黑皮及子 菰蘆壹枚 蝟皮二兩 白礬二兩

右件藥都剉碎入瓷瓶子內燒令煙盡冷

子研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每於食

前以溫水下二十丸神巧萬全方同

治痔疾肛門邊結核寒熱疼痛不可忍天靈

蓋散貼方

天靈蓋半兩 桃人半兩湯浸去尖雙入研 薰陸香半兩

麝香一分

右件藥搗細羅為散以猪脂取蔓葱根壹

分研調如膏塗於故帛上貼之

治痔疾肛邊生結核楚痛寒熱不可忍坐藥

方

當歸一兩到 杏仁三分煮軟片 白芷一兩 桂

心三分 薑壹兩 子壹兩 微炒

右件藥搗細羅為散以醋麪和作餅子坐

之五七度差

治肺藏虛寒勞損腸中生痔肛邊有結核疼

痛發作增寒壯熱腸多挺出良久乃縮宜服

此膏方

猪後懸蹄甲三枚炙梧桐白皮二兩龍膽一兩

去蘆桑根白皮一兩蛇蛻皮一兩雄黃一分

細青竹茹三分栢白皮一兩露蜂房三分

椒半兩去目及閉去汗蛸皮一兩炙一兩附子一兩

法去根人尖雙人壽如膏

右件藥都細剉用絲都苞裝以醞醋三升

浸壹宿出之以成鍊猪脂三升入藥絲苞

子及蛇皮雄黃杏仁微火煎之可減壹半

已來瀝乾藥苞子收膏於不津器中每於

食前以温粥飲調下半匙

又方鼈頭一分炙鐵精一分麝香半錢

右件藥都研如粉日三五度貼於痔上

又方砒霜一分神巧萬甜葶塵一分微炒萬

全方蟻蜋一兩微炙取腹下肉

右件藥都研為末鍊蜜和丸如蓮子大絲

裹膏丸內下部中覺急逼但且忍之待苦

急可上盆子瀉下惡膿去病根本

治痔生瘡腫痛諸方

夫痔生瘡腫痛者由大腸久虛為風熱留滯腸胃否澁津液不流邪熱之氣上攻肺藏下注疝腸不能宣散故成斯疾也此皆恣食生冷飲酒過度酒食之毒停滯藏腑傳留腸間故令下血生瘡腫痛亦名牝痔疾也

治痔疾生瘡腫痛下血不止地榆散方

地榆剉黃耆剉枳殼麩炒微黃去穢檳榔當歸
炒剉微黃芩已上各赤芍藥壹兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹盞煎至六分去滓每於食前溫服

治痔下血不止生瘡腫痛槁藤散方

槁藤子一兩取人龜甲壹兩塗醋令黃當歸三分剉
黃耆一兩剉槐子一兩微炒川大黃兩剉露蜂房三分蛇蛻皮一兩燒灰藁木半兩桂心半兩豬後懸蹄甲七枚炙藥黃芩三對木且

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調下二錢

治痔下部生瘡腫痛膿血不止黃耆散方

黃耆二兩赤小豆一兩附子一兩槐木一兩

欽兩桂心兩赤芍藥三黃芩三槐木一

微兩枳實兩炒微黃微右件藥擣細羅為散每於食前以溫粥飲

調下三錢

治痔下部生瘡腫下血不絕腹痛不止鼈甲

散方

鼈甲一兩塗醋炙黃耆一兩枳殼一兩炒微

黃去當歸一兩切桔梗三分去赤芍藥三

槐子二兩炒桑木耳一兩生薑屑半兩

右件藥擣細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

治痔生瘡腫痛下血不止蝸牛散方

蝸牛五枚炙蟻三枚炙螻蛄三枚炙赤

石脂一白龍骨一麝香一分細

右件藥擣細羅為散每於食前用粥飲調

下壹錢

又方白花蛇二兩酒浸去皮骨炙微黃 槿藤子一兩取人羌活

三分判 當歸微炒 右件藥搗細羅為散每於食前以溫粥飲

調下壹錢

治痔疾風熱毒氣攻下部生瘡腫痛露蜂房

散方

露蜂房二兩微炙 槐花二兩微炒 黃耆二兩

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下壹錢

治痔疾下部生瘡腫痛宜服此方

蝟皮壹枚炙 牛蒡子壹合微炒

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下壹錢

治痔疾生瘡破後恐成瘻宜服此方

鵝鴿糞半兩麝香半兩細研

右件藥以鵝糞於淨地上周迴用火燒令

煙盡取麝香同細研為散每於食前以粥

飲調下二錢

治痔疾生瘡破後恐成瘻宜服此方

鵝鴿糞半兩麝香半兩細研

右件藥以鵝糞於淨地上周迴用火燒令

煙盡取麝香同細研為散每於食前以粥

飲調下二錢

治痔疾大腸疼痛生瘡檳榔丸方

檳榔二兩白礬二兩黃丹壹分

右件藥將白礬黃丹入堯瓶子內以五斤

火燒令通赤候冷取出細研入檳榔末相

拌令勻鍊蜜和丸如梧桐子大每於食前

以粥飲下二十九

又方朱砂壹分麝香壹分蛇蛻皮壹分

右件藥都細研為散每用先以鹽湯洗瘡

拭乾以蜜和塗之

又方濕生蟲壹百枚五倍子半兩

右件藥搗羅為末用新口脂調藥塗於有

頭處疼當便止

治痔疾生瘡腫下血馬齒煎方右取馬齒莧

洗去土熟搗絞取汁緩火煎成膏停冷每

日取少許作丸內所患處驗錄同

又方右塗熊膽於痔瘡上日三五度神効神

萬全方瑣○直指方水浸熊膽汁以筆傅

治痔肛邊痒痛諸方

夫痔肛邊痒痛者由臟腑久積風熱不得宣
通毒熱之氣留滯於大腸衝發於下陪故令
肛邊或痛或痒或乃生瘡時時下血亦曰脉
痔也

治痔疾下部腫結痒痛不止枳殼散方

枳殼

二兩麩炒
微黃去穢

槐子

二兩炒
令香

防風

壹兩去
蘆頭

羌活

一兩
黃耆剉

白蒺藜

壹兩微
炒去刺

甘草

半兩

炙微
赤坐

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

治痔疾大腸久積風毒下部痒痛不歇似有

蟲蛟蛇牀散方

蛇牀子

壹兩

芎藭

壹兩

黃耆

壹兩

苦參

壹兩

白

桐葉

壹兩

附子

壹兩炮裂
去皮臍

右件藥搗細羅為散食前粥飲調下二錢

治痔疾久不差肛邊痒痛不止薏苡散方

薏苡根

二兩

獨活

二兩

枳實

二兩麩
炒微黃

莽草

一兩

微黃

猪後懸蹄甲

二兩炙
黃樵

右件藥搗細羅為散每於食前以黃耆湯調下二錢

治痔疾肛邊痒痛桑木耳散方

桑木耳壹兩槐木耳壹兩蟬皮壹兩黃耆兩枳殼二兩

當歸一兩羌活一兩

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

治痔疾肛邊痒痛不止皂莢刺丸方

皂莢刺二兩梲皮壹兩防風壹兩蘆頭壹兩

赤芍藥壹兩枳殼壹兩

右件藥搗羅為末用醞醋壹升熬壹半成

膏次下餘藥和丸如小豆大每於食前煎

防風湯下二錢

治痔疾肛邊痒痛發歇不止露蜂房丸方

露蜂房壹兩威靈仙壹兩枳殼二兩皂莢壹兩

篇蓄壹兩薏苡根壹兩卷柏壹兩桑花壹兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每於食前以槐子湯下三十丸

治痔疾風毒攻注肛門痒痛不止宜用此方

枳殼兩壹蛇床子兩壹防風兩壹葶藶兩壹獨活兩壹羌活兩壹桑

根白皮兩壹苦參兩壹藁本兩壹柳枝兩壹勞根

右件藥都細剉以水壹斗煎取五升去滓

於避風處用軟帛蘸湯承熱熨痔上煎

治痔疾肛門邊腫硬痒痛不可忍救急熨方

芫花兩三風化石灰兩三竈突內黑煤兩二

右件藥擣羅為末分作兩分於銚子內點

醋炒候稍熱以帛裹熨之冷則再換自然

腫消痒痛俱息

又方胡粉兩半水銀兩半

右件藥以棗瓢和研令星盡捏如蓮子大

以絳裏夜卧時內於下部中

又方白礬三分

以童子熱小便三盞化白礬以洗痔上

日不用効

預碎

同

同

治痔下血不止諸方

夫痔下血不止者由大腸風冷肺藏積熱熱毒留滯乘於經絡血性得熱則流散後遇大腸虛寒血乃妄行故令因便而清血隨出亦曰血痔也

治痔疾大腸風冷下部疼痛血不止宜服椿根散方

臭椿樹根壹兩 地榆壹兩 黃耆壹兩 伏龍肝壹兩 當歸三分 微炒

右作藥搗細羅為散每於食前以粥飲調下二錢

治痔疾下血無度或發或歇没石子散方

没石子三枚 樗根白皮二兩 益母草三 神麴二兩 栢葉壹兩 桑耳壹兩

右作藥搗細羅為散每於食前以溫粥飲

調下一錢

治痔疾風毒流注大腸下血不止宜服麝香

散方

麝香壹錢 乾漆半兩 炭皮半兩 椶櫚皮半兩

半兩 荆芥子半兩 燒灰半兩 右件藥搗細羅為散每於食前以温粥飲

調下壹錢

治痔疾下血無時者宜服椶藤子散方

椶藤子二枚 皂莢子壹百枚 牛

角鯁灰五兩 醋三兩 榴皮灰三兩 右件藥搗細羅為散每於食前以温粥飲

調下壹錢

治痔疾下血日夜無定久不差者宜服皂莢

子散方

皂莢子壹百枚 槐壹兩 牛角尖壹兩

壹兩 露蜂房壹兩 微炙

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

又方葫荑子一兩 黃耆二兩 槐花一兩

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

又方

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

又方

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每於食前以粥飲下十九

治痔疾下血日夜不斷神効方

白礬五兩綠礬三兩伏龍肝二兩黃丹二兩蝟皮二兩

右件藥搗碎入瓷瓶子內用炭火五七斤

燒炭盡為度候冷取出研如粉以麪糊和

丸如梧桐子大每於食前以粥飲下十九

又方皂莢刺二兩檇根白皮二兩微剉荆芥子一兩

赤芍藥半兩槐兩鵝兩

右件藥搗羅為末一半以陳醋壹升熬成

膏壹半拌和丸如菉豆大每於食前以粥

飲下二十九

又方黃耆壹兩附子一兩炮裂一兩桂心一兩枳殼一兩

剉一兩麩炒皂莢三挺去黑皮塗酥微黃去穢

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每於食前以荆芥湯下之十九

治氣痔諸方

夫氣痔者由藏腑風有虛冷或憂恚勞傷使

陰陽不知三焦氣滯風邪之氣壅積腸間致結澁不通腹脇脹滿血隨便下或即脫肛故曰氣痔也

治氣痔脫肛腸胃久冷腹脇虛脹不思飲食

桃人散方

桃人一兩湯浸去皮尖陳橘皮一兩浸湯去白瓢焙

桂心一兩厚朴薑汁一兩去麤皮塗生肉苳蔻兩

夫木香兩半皂莢人二兩炒白芍藥兩

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢血氣不...

治氣痔肛腸疼痛當歸散方

當歸三分木香兩桂心三分枳殼三分

去附子半兩炮裂乾薑兩炮鱉板兩

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下壹錢

治氣痔神效散方

槐鵝壹兩皂莢壹兩人壹兩香壹兩

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下壹錢

治大腸積冷氣痔不差大腸結澁疼痛腹脇
脹滿硫毒丸方

硫黃壹兩 猪牙皂莢半兩 川大黃壹兩

微炒木香兩 桃人壹兩 雙兩 湯浸 去皮 尖微 炒黃

右件藥搗羅為末入硫黃研勻鍊蜜和搗

三五百杵丸如梧桐子大每於食前以溫

粥飲下二十丸當見效

治氣痔下血疼痛不止訶梨勒丸方

訶梨勒壹兩 煨槐子二兩 當歸一兩

乾薑壹兩 陳橋壹兩 去白 瓜煨

右件藥搗羅為末以湯浸蒸餅和丸如梧

桐子大每於食前以枳殼湯下二寸丸

治氣痔下血肛邊疼痛腫續斷丸方

續斷壹兩 皂莢子壹兩 黃耆兩 蝟皮壹

炙令 熟乾地黃二兩 乾薑半兩 附子壹兩

劑皮 白糝壹兩 鱧甲壹兩 枳實壹兩

黃槐子壹兩 當歸壹兩 微炒枳實

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗二五百杵丸
如梧桐子大每於食前煎丹參湯下三十
丸

又方夜合葉二兩乾者枳殼二兩微貴去穢訶梨勒二兩

煨用皮

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

又方硫黃壹兩細研木香壹兩末

右件藥同研令勻每於食前以粥飲調下

一錢益蘇蘇小用文經大細效

又方地榆壹兩檳榔壹兩

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下壹錢

又方槐木耳二兩微炙乾薑壹兩炮

右件藥搗羅為散每服三錢以漿水壹

中盞煎至六分去滓每於食前溫服

又方枳殼樹根白皮壹兩微炒槐花壹兩

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下壹錢

又方雞冠花

二兩枳殼

二兩麩炒

梟椿樹皮二兩

微炙

右搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每於

食前以黃耆湯下二十九

下治酒痔諸方

夫酒痔者由人飲酒過度傷於腸胃之所成也夫酒性酷熱而有人毒酒毒漬於藏腑使血脉充溢積熱不散攻壅大腸故令下血肛

邊腫痛復遇飲酒便即發動故名曰酒痔也

治酒痔下血如雞肝肛邊生瘡疼痛因醉飽

氣壅即發大黃散方

川大黃

壹兩剉碎微炒

枳殼

壹兩麩炒微黃去穢

甘草

半兩

赤

生乾地黄

壹兩

桑根白皮

壹兩

黃香

壹兩

羚羊角屑

壹兩

赤小豆花

壹兩

當歸

壹兩

右作藥搗篩為散每服四錢之水壹中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治酒痔肛腸腫痛下血不止黃耆散方

黃耆

剉一兩

赤芍藥

剉一兩

枳殼

剉一兩

剉一兩

槐子

剉一兩

桑雞

剉一兩

烏蛇

去皮骨塗酥炙令黃

右件藥搗細羅為散每於食前煎黃耆湯

調下二錢

治酒痔大腸中久積熱毒下血疼痛赤小豆

散方

赤小豆

壹兩

黃耆

壹兩

白欬

半兩

赤芍藥

半兩

桂心

半兩

黃芩

三分

生乾地黃

壹兩

當歸

三分

八炒

大右件藥搗細羅為散每於食前以槐子人

血湯調下二錢

治酒痔肛邊腫痛及下血不止方

夫鵝不食草

半兩

雞冠花

半兩

鬱金

半兩

香

二錢

當歸

三分

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每於食前以粥飲下二十九丸

又方杏仁

四兩

湯浸去皮

皂莢

五兩

皮子

生為末

右件藥都以漿水內浸壹宿入鍋內以真酥二兩熬令稠可丸即此如梧桐子大每於食前煎栢葉湯下二十九丸

治久痔諸方

夫久痔者由藏腑久積風虛熱毒流注於大腸乃成斯疾也復遇下元冷憊腎藏勞傷氣血不調三焦壅寒熱毒留滯而搏於血入於大腸故令下血肛邊腫痒或生瘡癩連滯經久差而復發故名久痔也

治燥濕痔痔有雌雄者有腫痛有鼠乳附核者有腸中痛痒者如久不差皆能損人宜服此槐子丸方

槐子二兩 乾漆一兩 秦艽半兩
微炒 木香半兩 牡蠣半兩 龍骨一兩
半兩 白斂半兩 雷丸半兩 白芷半兩 白
兩 附子壹兩 雞舌香半兩 棟樹根白皮
壹兩 茯苓半兩 雞舌香半兩 棟樹根白皮
壹兩 右件藥搗羅爲末鍊蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每於食前以粥飲下三十丸

治久痔有頭疼痛化為瘡口膿水不絕朱砂
丸方

朱砂三分細研砒霜半分巴豆壹粒去皮心研麝

香壹分細研乳香壹分細研阿魏壹分麩裏煨安息

香壹分

右件藥搗羅為末以湯浸蒸餅和丸如棗

豆大每日空心以枳殼湯下壹丸不過十

日差

治大腸積冷久痔不差小槐子丸方

槐子人三兩微炒壹龍骨兩白礬二兩燒壹

細壹枳實二兩麩壹乾漆兩燒壹硫黃兩

微壹研壹桑木兩耳壹

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每於食前以粥飲下二十九

治久痔腸胃風冷及瘦膿血不止等白礬散

方

白礬灰兩硫黃壹兩研壹乳香兩黃連壹兩

為黃蠟壹分

右用大鯽魚壹頭不去鱗除腹內物入諸藥末在內以濕紙裹又以麻纏了鹽泥固際於糖灰火內煨令熟取出却以慢火炙焦擣細羅為散每於食前以粥飲調下二錢

治痔疾有頭數年不差宜用此方

鰻鱺魚頭壹兩 木香壹兩 麝香壹兩 砒霜壹兩
炙 黃粉壹兩 白礬壹兩 猪牙皂三分 煨三分
細研 脚壹兩 白礬壹兩 猪牙皂三分 煨三分
細研 脚壹兩 白礬壹兩 猪牙皂三分 煨三分

右件藥擣羅為末鍊黃蠟和化如蓮卜是
 用絲裹一丸內下部中覺腹內欲轉但且
 忍之待忍不及即上盆子當下惡物每出
 用之以痔頭消為度

治痔瘻年月深遠兼殺蟲黃耆膏方

黃耆壹兩 漏蘆壹兩 黃蘗壹兩 槐子壹兩
半 木通壹兩 苦參壹兩 狸骨三兩 雄黃壹兩
半 虎骨三兩 硫黃壹兩 麝香壹兩 蠟末壹兩
細研 虎骨三兩 硫黃壹兩 麝香壹兩 蠟末壹兩

右件藥以臘月猪脂三斤鍊諸藥二十餘沸以布絞去滓更入鎊鈇壹兩沸又以絲絞過以瓷合盛之下雄黃等攪令勻於故帛上貼之日三四度換蟲即愈矣人

治痔疾年月深遠傍生孔竅有頭膿血出瘡

痒痛難忍烏蛇膏方

烏蛇壹兩 馬齒壹兩 蝟皮壹兩 亂髮三
燒黃梨一分 斑一分 猫三分 去翅足糯 杏人拾
九枚 皮麝香 細一分 猪脂一月 者臘猪 牙皂

茨一分 水銀三分 入少胡粉點水研令星盡

右件藥都研令極細先煎猪脂候鎔濾去滓入諸藥煎三二十沸欲成入麝香攪令勻更煎三兩沸入黃蠟三兩候冷置於瓷合內每以少許帖於痔上日三四度用之

治痔疾數年不差宜服此槐枝酒方

槐枝葉二斗 槐子人二升 蒼耳莖葉細剉
細研 右件藥入於釜中以水一碩煮取五斗去滓澄清看冷煖入麴末五斤糯米五斗蒸

令熟都拌和入甕如法蓋覆候酒熟任性
溫溫飲之常令似醉久服神效

治痔疾多年不差下部腫硬疼痛宜服白礬

丸方

白礬二兩燒令汁盡附子壹兩炮裂去皮臍桑黃一兩剉

右件藥搗羅為末以溫水浸蒸餅和丸如

梧桐子大每於食前以粥飲下十五丸加

至二十九

又方乾薑二兩炮裂剉

右件藥搗羅為末以軟飯和丸如梧桐子
大每於食前煎黃耆枳殼湯下二十九以
差為度

又方白礬二兩燒令汁盡黃礬三兩燒赤附子二兩炮裂去皮臍

右件藥搗羅為末以軟飯和丸如梧桐子

大每於食前以粥飲下十九

治痔疾有頭多年不差頻發疼痛坐立不得
宜用熨方

臭黃一分醋一分石榴皮一分皂莢一分莽草壹分杏仁

壹分浸湯去柳藥蘆壹分去蘆頭柳艸屑叁分

右件藥搗麤羅為散以油拌炒令熟絲裹
敷痔上日五七度差

治痔瘻積年不可者神驗熏藥方

鰻鱺魚半斤五月五日採曝乾搗為末蟻垤三枚為末

右件藥取成熟艾和藥末以青布卷之安

瓷瓶中著火燒坐向瓶上熏之其虫及惡
汁並出不復再發

治痔瘻諸方

夫痔瘻者由諸痔毒氣結聚肛邊有瘡或作
鼠乳或生結核穿穴之後瘡口不合時有膿
血腸頭腫疼經久不差故名痔瘻也

治痔瘻下膿血不止香墨散方

香墨三分枳實壹兩麩壹兩黃耆壹兩代赭壹兩

歸壹兩麝香一分白芍藥三分

右件藥搗細羅為散入麝香更研令勻每
於食前以粥飲調下壹錢

治痔瘻下膿血不止臭樗皮散方

臭擣皮壹兩微炙醋石榴皮壹兩地榆壹兩黃

連壹兩艾葉三分阿膠壹兩擣碎去鬚炒令黃燥

右件藥擣細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

又方何首烏壹兩枳殼二兩麩炒去瓢葳靈仙壹兩

右件藥擣細羅為散每於食前以溫粥飲

調下二錢

又方木賊壹兩蝟皮壹兩炙令焦黃

右件藥擣細羅為散每於食前以粥飲調

下壹錢

又方遠志壹兩櫻欄皮二兩燒灰

右件藥擣細羅為散每於食前以粥飲調

下壹錢

治痔瘻積年不差內補丸方

黃耆三分槐耳一兩苦參半兩白桐葉三分

龍骨三分狸睛一兩漏蘆半兩蝟皮一兩黃炙芎

蓄半兩敗醬半兩續斷半兩木香半兩厚朴二兩去

石薑汁炙硫黃一兩猪後懸蹄甲一兩黃炙

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每於食前以粥飲下二十九

治痔瘻腫痛膿水不絕硫黃丸方

硫黃一兩細研水飛過

白礬一兩燒灰

附子一兩炮裂去皮

皂莢針為灰

麝香細研

蠟皮為灰

皂莢針為灰

皂莢針為灰

皂莢針為灰

蕪二兩去黑皮塗

右件藥搗羅為末入麝香研令勻以醋煮麵糊和丸如梧桐子大每於食前以溫粥飲下十五丸

治痔瘻瘡腫疼痛膿血不止麝香丸方

麝香半兩

細研

蝸牛子二兩炒

令微黃

竈突墨二兩

道人

頭

漢椒二兩去目及閉口者微炒去汗

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每於食前以粥飲下三十九

治痔瘻下血不止肌體黃瘦四肢無力硃砂丸方

硃砂一兩

黃丹一兩

砒霜半兩

右件藥都細研入瓷盞子內歇口小火燒

令煙出為度停冷又細研再入火燒如此
 七遍了入麝香壹分同研令細以麵糊和
 丸如梧桐子大每於食前以枳殼湯下五
 丸忌食熱物

治痔瘻涓涓出膿血疼痛日夜不止漸加羸
 瘦宜服此方
 磁石二兩 白礬二兩 綠礬四兩
 右件藥都搗細入瓷瓶子內盛以大火燒
 令通赤候冷將出紙襯攤於地上經宿細

研如粉煮棗窠和丸如棗豆大每於食前
 以粥飲下二十九

治痔瘻膿血不絕發歇疼痛蝟皮丸方

蝟皮壹兩 白礬半兩 皂莢壹兩 硫黃壹兩
燒灰 令汁盡 燒 燒
 半兩 附子半兩 棗壹兩 藤子壹個
細研 去皮 裂 去殼

右件藥擣羅為末以醋煮麵糊和丸如梧
 桐子大每於食前以溫粥飲下二十九

治痔瘻腫痛膿血不止黃礬丸方

黃礬三兩 烏蛇六兩 黃耆三兩 枳殼
兩 酒浸去 骨皮 令黃 剉

二兩蘇炒駱駝骨前毛三兩半微黃去鹹

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每於食前煎黃耆湯下三十

治一切痔瘻不論淺深必驗方

黃耆二兩枳實壹兩半麩革薢二兩白蔘二兩

藥三兩微剉免絲子二兩酒浸三日烏蛇三

酒浸去皮骨微炙

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸

如梧桐子大每日空心及晚食前以溫粥

飲下十五丸

治痔瘻痛不可忍木賊丸方

木賊一兩榼藤子二枚塗酥炙黃烏賊魚骨二兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以溫粥飲下二十九

治痔瘻久不差宜服此方

碯砂半兩綠青半兩白龍骨壹兩

右件藥搗羅為末煮麵糊和丸如棗豆大

每於空心及晚食前煎黃芩湯下十九以差為度

治痔瘻疼痛腫硬不消宜用此熏方

葇荑子 韭子 雄黃 吳茱萸 猪牙

皂莢已上並生用 油頭髮炒 驢蹄炙黃已上各半兩

右件藥擣羅為末黃蠟和丸如彈子大用

小口瓶子內燒一丸熏痔瘻上日可兩度

用之

又方蛇床子半兩 荆芥半兩 蝸牛三七枚

右件藥一處爛研塗在紙上每發時先用

白熟蕪水洗痔頭了後用被褥上安藥紙

坐三兩上差

治痔瘻下膿血有瘡竅疼痛宜用此方

砒霜半分 黃蠟半分

右件藥以銚子先鎔蠟作汁後入砒霜攪

和令勻看瘡口大小撚為條子每發時用

絲裹內瘡竅子中良久却取或未有竅子

即內下部中良久却取出日三兩度用即

效內一消十其八取單用此法兩試其明

治痔瘻有頭腫痛下膿血宜用此方

麝香壹錢雄鴿糞壹兩

右件藥消黑錫二兩和担作餅子當於瘡

上貼之神效

治痔瘻膿血出不止露蜂房散方

露蜂房半兩蝟皮半兩麝香壹錢

右件藥都細研令勻每日三五度半錢傳

之

治痔瘻有頭疼痛下膿血宜用此方

苘荬子一合

右擣羅爲末以牛皮膠煎油調和如膏攤

中於帛上貼痔瘻處其痛立止如有頭即漸

大漸消落

又方行用吐虫蛔蟲壹枚炙乾擣羅爲末貼

瘻頭上常斷膿血貼五七度差

又方右以硫黃末少許內瘡孔中以艾煙熏

之美瑣碎錄同

又方啄木鳥一枚

右燒為灰細研每服以溫酒調下二錢又
膽治瘡蟲出死血服五寸引蓋

治腸風下血諸方

夫腸風下血者由藏腑勞損氣血不調大腸
中久積風冷中膈有虛熱冷熱相攻毒氣留
滯傳於下部致生斯疾由坐臥當於風
濕醉後房勞恣食猪雞菓實羊麪酒食之毒
滯於藏腑藏腑停留毒氣日久不能宣通風

冷熱毒搏於大腸大腸既虛時時下血故名
腸風也

治腸風腹痛下血不止卷栢散方

卷栢一兩當歸三分黃耆一兩白朮三分

枳殼二兩芍藥二兩乾薑半兩甘草一分

芍藥三分芎藭三分熟乾地黄一分

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

煎至六分去滓溫服日三四服

治腸風下血不止黃瘦虛羸內補散方

蒲黃二兩當歸壹兩白芷壹兩甘草壹兩

黃連壹兩芎藭壹兩白石脂壹兩熟乾地黄二兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

煎至六分去滓溫服日再四服

治腸風下血不止面色萎黃氣力全少肉補

黃耆散方

黃耆二兩當歸壹兩芍藥壹兩甘草壹兩

赤龍骨二兩槐子二兩附子壹兩炮裂壹兩白芍

藥二兩到二兩藥二兩藥二兩藥二兩藥二兩藥二兩藥二兩藥二兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入錫一分煎至六分去滓每於食前溫服

治腸風氣滯流注下部致生腫結牽引臍藏

不和時發疼痛經久下血太多虛乏羸瘦五

香散方

沉香壹兩麝香半兩木香三分藿香三分乳香壹兩

黃耆壹兩檳榔三分當歸三分枳殼壹兩

白茯苓三分白蒺藜三分川人黃三分

白芍藥三分卷栢二分芎藭三分熟乾地

黃壹兩

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調下二錢

治腸風下血久不差面色萎黃蝟皮散方

蝟皮燒蒜莖燒乾薑炮裂牡蠣燒為粉黃

牛角燒枳殼麩炒醋石榴皮炙令微

各壹兩

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

治腸風下血不止風毒氣流注發歇疼痛牛

膝散方

牛膝壹兩側柏壹兩荊芥穗壹兩椶櫚皮

壹兩黃牛角壹隻燒灰

右件藥持細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

治大腸風虛積冷下血不止側柏葉散方

側柏葉壹兩椶櫚皮壹兩防風中兩

附子壹兩槐花半兩羌活半兩當歸半兩

劉微白朮三錢 附子二錢 右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調下二錢

治腸風下血疼痛不止宜服此方

道人頭壹兩 荆芥穗兩 皂莢三寸 黑皮塗酥炙 煇黃去子

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下壹錢

治腸風下血立效方

鷄冠花壹兩 煇兩 椶櫚皮二兩 羌活兩

右件藥搗細羅為散空心以粥飲調下二錢

治腸風下血久不止大腸虛冷宜服此方

附子壹兩 炮裂去皮 白礬壹兩 煇兩

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

治腸風下血日夜不絕疼痛至甚白花蛇丸

方

白花蛇二兩 酒浸去皮 杏仁半兩 湯浸去皮 微黃去皮 骨尖 雙人 麩炒 微

黃黃者壹兩 葫荽子壹兩 微炒 蝟皮壹兩 黃魚壹兩 炙

參壹兩 去蘆頭 鯉魚皮壹兩 附子壹兩 炮裂 枳

殼二兩 去黃 蘇二兩 炒 男兒髮二兩 肉桂二兩 去

青兩 皂莢樹耳壹兩 微炒

右件藥搗羅為末 鍊蜜和搗 三百杵 丸

如梧桐子大 每於食前 煎人參湯下 三十

丸 治大腸風毒下血疼痛 蝟皮丸方

蝟皮壹兩 微炒 營實壹兩 枳實壹兩 微炒 黃耆二兩

槐子二兩 微炒 桑木耳壹兩 地榆壹兩 當歸壹兩

烏賊魚骨壹兩 右件藥搗羅為末 鍊蜜和搗 二百杵 丸

如梧桐子大 每於食前 以粥飲下 三十九

治大腸風毒瀉血不止 腹內疼痛 不欲飲食

萎黃羸瘦 阿膠丸方

阿膠壹兩 炒 令黃燥 蝟皮壹兩 營實三兩 槐子壹兩

地榆壹兩 龍骨壹兩 赤石脂壹兩 訶梨勒

枳殼二兩 微炒 黃耆壹兩 黃牛角壹兩

用皮 枳殼二兩 微炒 黃耆壹兩 黃牛角壹兩

用皮 枳殼二兩 微炒 黃耆壹兩 黃牛角壹兩

用皮 枳殼二兩 微炒 黃耆壹兩 黃牛角壹兩

鯢二兩

燒灰當歸

壹兩到

微炒

右件藥搗羅為末以軟飯和搗三二百杵

丸如梧桐子大每於食前以粥飲下三十

丸

治大腸風毒下血不止心神虛煩野狸骨散

方

野狸骨

壹兩塗酥炙微黃

防風

半兩去蘆頭

益母草

半兩

膩粉

壹錢

右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調

下半錢

治腸風下血不止腹痛日漸疔羸宜服此方

椶櫚皮

二兩燒灰

艾葉

二兩燒灰

雞子

三枚炒令焦

右件藥都研如粉每於食前以粥飲調下

壹錢

又方菰蘆

壹枚生者

槐花

壹兩

白麩

壹兩

皂莢

壹挺不

右件藥都搗作壹團担作片子燒令黑色

擣羅為末每於食前以溫粥飲調下壹錢

治大腸風毒下血不止內補散方

黃耆一兩枳殼一兩側柏葉一兩

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

又方枸杞子二兩槐子二兩桑木耳二兩

右件藥搗細羅為散每於食前以黃耆粥

飲調下二錢

又方枳殼壹兩麩炒何首烏一兩乾薑一兩

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下壹錢

又方釜下墨 椶櫚皮燒訶梨勒

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下一錢

又方薄荷壹握麥蘖二兩

右件藥搗羅為末不計時候如茶點服

又方藜蘆子半兩甘草半兩

右件藥搗細羅為散每服二錢以水壹中

盞煎至五分食前溫服

又方牛角鯁 椶櫚皮 乾薑已上各壹兩

右件藥細研令勻每於食前以冷粥飲調

下二錢正分食前調服

又方槐耳

二兩燒炙

乾漆

壹兩燒碎炒令煙出

以水壹斗

右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調

下壹錢

又方附子

一枚炮裂去皮臍

生薑

半分

右件藥搗碎以水壹大盞煎至五分去滓

食前溫服

又方椶櫚皮

半斤燒灰

菰蘆

壹枚燒灰

右件藥同研令細每於食前以粥飲調下

二錢

又方牛角鯁

壹對

黃雄

二塊子如棊子大

麝香

壹分細研

右件牛角鯁每隻各安雄黃一塊子在內

以稠泥封閉下面用桑柴火燒令熟細研

為散入麝香和勻又用菰蘆壹對亦用桑

柴火燒令熟細研為散每服取菰蘆末二

錢牛角鯁末壹錢相和令勻每於食前以

粥飲調服之

治腸風下血發歇不定宜服此方

荆芥穗一兩薄荷一兩枳殼一兩微黃去瓢炒

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下壹錢

又方皂莢三兩不三兩不不菰蘆一枚白礬二兩

右件藥都入瓶子內以搗泥固濟候乾以

炭火燒令通赤候冷細研令勻每於食前

以粥飲調下二錢

又方膽子礬二兩菰蘆一枚上

細研開一

右件礬入於菰蘆內坐於慢火中更入米

醋壹小盞煨泣盡醋令乾却入罐子內以

大火燒令通赤取出放冷細研用糯米飯

和丸如梧桐子大每於食前以粥飲下二

十九

治腸風下血不止下部冷疼宜服此方

釜底煤四兩漢椒二兩去目及閉

右件藥搗羅為末以軟飯和丸如梧桐子

大每於食前以粥飲下三十九

治大腸風毒下血方

蛭皮一故炙皂莢三挺去黑皮塗酥炙黃燻去子

右件藥擣羅為末以軟粟米飯和丸如梧

桐子大每於食前以粥飲下十五丸

又方白礬二兩燒令汁盡乾蠍二兩微炒

右件藥擣細羅為散每於食前以粥飲調

下半錢

又方益母草端午藕節六月六日採並

右件藥擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每於食前以溫粥飲下二十九

治腸風下部腫悶疼痛宜服此方未黑也

皂莢水浸去黑皮曝乾

右擣羅為末以棗肉和丸如梧桐子大每

於食前以粥飲下十五丸

治大腸風毒瀉血不止宜服此方

側柏葉青斤淨洗曝乾炙微黃

右件藥擣細羅為散每於食前以枳殼湯

調下二錢

又方槿藤子三枚厚重者

右以七八重濕紙裹煨良久腹起取去殼用肉細切碾羅為散每於食前以黃耆湯調下壹錢

又方五倍子擘破一半燒令熟一半生用分兩不限多少

右件藥搗羅為末用陳米軟飯和凡如梧桐子大每於食前以粥飲下二十九

又方皂莢五挺不蛀可長一尺者去黑皮塗酥炙用酥三兩炙盡為度

白羊精肉十兩細切

右件藥光搗皂莢為末後與肉同搗令熟丸如梧桐子大每於食前以溫水下二十

又方何首烏二兩

右搗細羅為散每於食前以溫粥飲調下

治腸風瀉血不定甚者面黃瘦弱方

用烏頭十兩去臍皮生用

右件藥搗節為散每服三錢以水一盞

入生薑半分黑豆一百粒煎至五分去滓
每於食前温服

治積年腸風下血不止諸方

夫積年腸風下血不止者由人氣血衰弱藏
腑虛憊或飲食勞損或毒氣風邪蘊積在藏
腑流注於大腸大腸既虛下血致面色萎黃
四肢消瘦或繫月連年諸醫不差故曰積年
腸風下血也

治積年腸風瀉血穀食不消肌體黃瘦臭椿

皮散方

臭椿樹白皮

二兩微炙到

乾薑

三分炮裂到

甘草

三分

炙微雞冠花

一兩炙微黃

附子

壹兩炮裂去皮臍

槐鵝

令黃

右件藥搗細羅爲散每於食前以枳殼湯
調下二錢

治積年腸風或發或歇不止牛角鰓散方

牛角鰓

二兩燒灰

槐耳

二兩微炙

臭椿根

二兩微炙

屋松

二兩微炙

右件藥擣細羅為散每於食前以温粥飲調下壹錢

治積年腸風瀉血百藥無効宜服此方

敗皮巾子壹兩人指甲壹分炒壹分乾薑二兩炮裂為末

麝香壹分白礬壹兩燒灰

右件藥相和細研如麵每於食前以温粥飲調下壹錢

治腸風積年瀉血不止神效方

黃丹兩白礬兩菰蘆壹枚去頭入二味在內

右以物蓋菰蘆頭以塩泥固濟安罇上以大火燒令通赤放冷取出擣細羅為散每於食前煖刺薊汁調下壹錢
治腸風積年下血不止方

野狸頭壹枚桑樹西枝壹握附子壹枚木通壹枚

右件藥都入瓶子內以塩泥固濟候乾以

炭火燒令通赤候冷取出擣細羅為散每

於食前以温粥飲調下二錢

又方鹿角膠二兩炙令黃燥沒藥兩食前以温粥飲

右件藥搗細羅為散每於食前以温粥飲
調下壹錢

治積年腸風下血不止神効方

醋石榴皮

二兩慢火焙令黃

側柏葉

二兩慢火焙令黃

右件藥搗細羅為散每於食前以木賊湯

調下二錢

又方蜜陀僧

一兩

白礬

兩

槐子

人

一兩微炒

皂莢

一兩燒灰作末

右件藥將蜜陀僧白礬入瓷罐子內燒令

通赤候冷取出搗羅為末入槐子末皂莢

灰相和研令勻以粳米飯和丸如梧桐子

大每於食前以粥飲下十五丸

治積年腸風下血不止面色萎黃肌體枯悴

菰蘆丸方

菰蘆

二枚割去蓋子

硫黃

兩

附子

一兩炮裂去皮膚

乾

薑

一兩炮裂到

猪牙皂莢

一兩去皮生搗碎

右件藥都搗為散入菰蘆內却以蓋子蓋

之用竹簽子刺定以麪厚裹慢火烧麪黃

焦為度候冷取出重研令細以軟飯和丸
如梧桐子大每於食前以黃者湯下十五

丸

又方皂莢

七挺不蚱肥者去黑皮塗酥炙黃熟去子寒食蒸餅兩

烏龜尾

兩二

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗壹二百杵丸
如梧桐子大每於食前以溫粥飲下二十

丸

又方槐耳

半斤切皂莢十挺剝桐砂一兩

右件藥用米醋三升煎取壹升去滓後再
入鎔中以文火養成膏入硃砂和丸如梧

桐子大每於空心及晚食前以溫粥飲下

十丸

治積年腸風下血疼痛宜服此方

竈突墨

二荆芥一木香

右件藥搗羅為末以水浸蒸餅和丸如梧

桐子大每於食前以槐子湯下三十丸

治積年腸風下血肛門腫疼肌體羸劣宜服

此方

蛇黃壹枚 醞醋五合

不以炭火燒蛇黃通赤即入醋中燂重疊

燒燂醋盡為度搗細研為散每於食前以

粥飲調下半錢

治積年腸風下血面色萎黃下部腫疼或如

鼠跡或如雞冠常似蟲咬痛痒不絕宜服

此綠礬丸方綠礬四兩搗碎安瓶子內以

瓦子蓋口川大火燒一食間候冷取出細

研如粉更用白塩一兩硫黃一兩合研而

入瓶內准前燒一食間候冷取出研令極

細入附子末一兩都研令勻用粟米飯和

丸如梧桐子大每日空心及晚食前煖生

地黃汁下二十九丸當日瀉血便定一月全

除根本

又方綠礬二兩 燒

釜底墨

壹兩

烏賊魚骨

壹兩

微

煇

右件藥搗羅為末用粟米飯和丸如梧桐

于大每於食前煎赤糙米湯下三十九

又方皂莢壹兩去黑皮塗酥炙焦黃去子蠶壹兩蠶子壹兩枳殼壹兩

二兩麩炒微黃去瓢

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每於食前煎枳殼湯下二十九

治腸風積年不差轉加羸困黃耆丸方

黃耆二兩附子二兩炮裂去皮臍白礬二兩硫黃二兩

壹兩細研水飛槿藤子二枚去殼以酥蜜塗炙黃蝟皮壹兩炙

虎眼皮壹兩炙菰蘆一兩皂莢二挺去黑皮塗酥蒸壹遍

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每於食前以粥飲下二十九

治積年腸風瀉血面色萎黃附子丸方

附子二兩炮裂去皮臍食塩壹兩當歸壹兩乾薑壹兩

壹兩炮裂制杏仁壹兩湯浸去皮尖皂莢壹兩

皮塗酥炙令黃去子

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每於食前以陳米粥飲下二十九

二十九

又方鯽魚

壹枚長五寸者去腸肚及淨洗白礬末兩

右件藥將白礬入魚腹內以線縫合入於

瓦瓶內蓋定以炭火燒為灰取出細研以

軟飯和丸如梧桐子大每於食前以粥飲

下二十九

治腸風積年不差羸弱至其宜服此方

葇苳子

壹升淨淘去淨生薑半斤搗熟乾

地黃

半斤搗羅為末

右照葇苳子令乾擣細羅為散與薑汁相

和銀鍋中以無灰好酒二升以文火煎如

稍減卽旋添酒都約五月已來熬之如餒

卽止入乾地黃末和丸如梧桐子大每於

食前以溫粥飲下十九

治腸風痔疾失血後虛損諸方

夫人氣血不足藏腑勞傷風邪毒氣留滯腸

胃遂成斯疾因其下血時多肌體羸瘦飲食

無味面色萎黃四肢乏力故謂之虛損也

治腸風痔疾失血過多虛乏羸困不欲飲食

內補散方

續斷二兩人參一兩去附子一兩炮裂當歸

一兩熟乾地黃二兩芎藭一兩黃耆一兩白

芍藥一兩白芷三分桂心一分麥門冬一兩白茯苓

苓一兩乾薑一兩炮五味子一兩甘草三分炙

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入棗三枚煎至六分去滓溫服日三四服

治腸風痔疾失血後虛損皮膚乾燥四肢黃

瘦心神虛煩少得眠卧不能飲食黃耆散方

黃耆一兩酸棗人三分麥門冬三分枸杞

子三分熟乾地黃一兩人參一兩去柴胡一兩

白茯苓一兩防風半兩去白木半兩甘草半兩

赤白入生薑半兩棗二枚煎至六分去滓不計

時候溫服

治腸風痔疾失血後虛損羸瘦飲食無味面

色萎黃四肢乏力白木散方

色萎黃四肢乏力白木散方

白朮三分石斛三分去黃耆壹兩桂心半熟

乾地黃兩續斷三分人參壹兩去肉蓯蓉兩

酒浸青宿剉牛膝壹兩天門冬三分白茯苓兩

去皴皮炙乾兩去苗壹兩天門冬三分白茯苓兩

苓兩甘草兩微赤到右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中蓋

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候溫服

治腸風痔疾下血太多虛羸無力內補黃耆

丸方

黃耆二兩白茯苓兩烏蛇肉壹兩

黃槐子人微炒鹿茸酥炙微黃附子壹兩

地裂去蝟皮壹兩炙枳殼二兩製炒當歸兩

壹兩剉沉香兩檳榔兩厚朴壹兩去麤皮

合香熟右件藥搗羅為末鍊蜜和搗五七百杵丸

如枳桐子大每於食前煎桑枝湯下三十

丸

治久積虛冷腸風痔瘻下血太多面色萎黃

日漸羸瘦白朮丸方

白朮二兩陳橘皮白兩湯去人參一兩去甘

草半兩熟乾地黃一兩當歸微炒黃耆

壹兩微赤熟乾地黃一兩當歸微炒黃耆

右件藥搗羅為末鍊蜜和擣五七杵丸如

梧桐子大每於食前以粥飲下二十九

治藏腑久虛腸風痔瘻下血太多面色萎黃

日漸羸瘦鹿茸丸方

鹿茸壹兩去毛塗附子壹兩炮裂續斷壹

側柏葉兩厚朴壹兩薑汁去令香熟黃耆兩

剉阿膠壹兩擣碎當歸壹兩剉

右件藥搗羅為末鍊蜜和擣五七百杵丸

如梧桐子大每於食前以粥飲下三十丸

治疳蠱諸方

夫疳蠱者由人有嗜甘味多而動腸胃間諸

蟲致令侵蝕腑藏此是蠱也凡食五味之物

皆入於胃其氣隨其腑藏之味而歸之脾與

胃為表裏俱象土其味甘而甘味柔潤於脾

胃脾胃潤則氣緩則蟲動蟲動則侵蝕成疔也但蟲因甘而動故名之爲疔也其初患之狀手足煩疼腰脊無力夜卧煩躁昏昏喜妄嘿嘿眼澁夜夢顛倒飲食無味而失顏色睡起卽頭眩體重脛脛痠疼其上蝕五藏則心內恍惚出蝕咽喉及齒齦皆生瘡出黑血齒色紫黑下蝕腸胃不利黑血出蝕肛門牛瘡爛開胃氣逆則變嘔噦急者數日便死亦有緩者止沉嘿肢節疼重食飲減少面無顏色

在內侵蝕乃至數年方上蝕口齒生瘡下至肛門傷爛乃死又云五疔壹是白疔令人皮膚枯燥面失顏色二是赤疔內蝕五藏令人頭髮焦枯三是蟻疔蝕人脊脊遊行五藏體重四是疔蠶令人下部痒腰脊攣急也五是黑疔蝕人五藏多下黑血數日卽死凡五疔白者輕赤者次蟻疔又次之疔蠶又次之黑者最重皆從腸裏上蝕咽喉齒斷並生瘡下至穀道傷爛下痢膿血嘔逆手足心熱腰痛

嗜睡秋冬可春夏劇又云面青頰赤眼無精
光唇口焦燥腹脹有塊日漸瘦損者是疔蝕
人五藏至死不覺又云疔緩者則變成五蒸
也

治疔膿上唇內生瘡如粟口中懊澁腹痛面

色枯白好睡體重蟲蝕五藏苦參湯方

苦參

壹兩

桃白皮

三分

槐白皮

三分

右件藥細剉以水三大盞煎至二盞去滓

食前分溫三服

治疔膿蟲蝕下唇裏生瘡多睡而黔時腫下
部痒痛不止方

鷄子

壹枚破

好漆

壹合

又右件藥相和令勻空腹仰頭頓服令盡當
吐蟲出即愈

治疔膿時久下部生瘡麝香丸方

麝香

半兩

乾薑

壹兩

炮

蠱蟲糞

壹兩

葵莖

半兩

白礬

一兩

燒

蝦蟆

壹枚

塗酥

燉

右件藥搗羅爲末以醋煮麵糊和丸如梧

桐子大每於食前以艾湯下二十丸服此方
治疔瘰腸頭挺出宜服此方

黃連

一兩

去鬚 蚬蛇膽

一兩

蕪黃

二兩

去鬚

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如菉豆大每
服隨年以溫水下

又方桃葉

二兩

腐犬骨

二兩

燒灰

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

又方丁香

半兩

麝香

半兩

黃連

一兩

去鬚

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

又方黃礬

一兩

乾薑

一兩

葛勒蔓

一兩

燒赤

右件藥搗細羅為散鎔黃蠟和如棗核大

以薄絲裹內下部中日三易効

又方乾蝦蟆

一枚

兔糞

半兩

微炒

右件藥細研為散用絲裹蓮子大內下部

日中三易効

治濕腫諸方

夫濕蠶病者由脾胃虛弱爲水濕所乘腹內
蟲動侵蝕成蠶也多因下痢不止或時病之
後客熱結於腹內所爲其狀不能飲食忽忽
喜睡絲絲微熱骨節沉重齒無光色舌上盡
白細瘡如粟若上唇生瘡是虫蝕五藏則心
煩懊若下唇生瘡是疳蝕下部則肛門爛開
甚者腑藏被蝕齒上下斷悉生瘡者齒色紫
黑利血而濕水氣也脾與胃合俱象土胃爲
水穀之海脾氣磨而消之水穀之精化爲血

氣以養腑藏若脾胃虛弱則土氣衰微或受
於冷乍傷於熱使水穀不消化糟粕不實則
成下痢翻爲水濕所傷若時病之後腸胃虛
熱皆令三尸九蟲因虛動作侵蝕五藏上出
唇口下至肛門胃虛氣逆則變嘔噦蟲蝕腑
藏傷敗痢出瘀血如此者死其因脾胃虛微
土氣衰弱爲水濕所侵蟲動成蠶故名濕蠶
也又云天行之濕初得不覺行坐不癢恒少
氣力或微痢或不痢病成則變嘔吐卽是蟲

內蝕於藏又云有急結濕先因腹痛下痢膿血相兼出成病也翻火小便不通頭項皆痛小腹急滿起坐安然亦有內蝕五藏凡如此者雖初證未發於外而心腹亦常煩懊至於臨困唇口及肛門方復生瘡即死也

治蟲蝕肛門赤爛下血疼痛名曰濕蠶宜用

此兔頭散方
 兔頭壹分 狐骨一分 甜葶一分 葶一分 炒蛇頭一分
 壹枚 蝦蟆一分 百草霜一分 蛻蝦一枚 青黛微炙

一分 晚蠶蛾一分 苧葉一分 苧葉一分 苧葉一分 丁香一分
 麝香一分 荜薹一分 故緋五分 苦參一分
 黃蘗半斤 乾薑半斤 角蒿半斤 丹參半斤
 川芒消一分 鐵衣壹分 朱砂壹分 印成壹分 救
 月杖半斤 桂心半斤 蝸蟲糞半斤 牀中栲木半斤
 右件藥搗細羅為散人研了藥令勻每用壹錢以絲裏內下部中日再用良

治瘡濕蠶下赤黑血肛門蟲蝕赤爛日夜疼

痛薰黃散方

薰黃

壹分

朱砂

壹分

食鹽

壹分

青黛

壹分

白礬

壹分

鐵衣

壹分

梔子

壹分

麝香

壹分

芫荽子

細辛

上瓜根

乾薑

炮裂

葶藶

菖蒲

蝦蟆

燒川椒

去目及閉口

各微炒去汗

故靴底

燒灰已上

各一錢

髑髏骨

壹分炙黃

朴骨者

右件藥搗細羅為散每用壹錢以膠裏內

下部中日再易有瘡傅其上

治疔濕蟹洗熨下部丁香散方

丁香末

壹錢

麝香

壹錢

犀角屑

三分

甘草末

三分

右件藥同研以塩三合椒三合豉壹合水

三升都煎至壹升去滓令稍熱用絲蘸洗

熨下部冷即再煖用之

治疔濕蟹蝕口齒及下部方

飛廉

三兩

右燒為灰細研每用壹錢傅病處痛甚忍

之若不痛則非疔也

又方苦參

剉

青箱子

甘草

各二兩

生用剉

右件藥搗細羅為散每於食前煖生地黃汁調下壹錢

治疳濕墜殺蟲青箱子散方

青箱子 雄黃細研 硫黃細研 蕪荑 雷丸已

各半 苦參三分 狼牙三分 藜蘆壹蘆頭 去

右件藥搗羅為末以絲裏壹錢內下部中

日再易之

又方青黛壹兩 丁香半兩 黃連壹兩

右件藥搗羅為末以泔淀和丸如棗核大

以絲裏內下部中日再易之

治下部疳墜瘡經年不差宜用此方

丁香半兩 青黛半兩 木香半兩 黃連半兩 石灰

半兩 麝香壹錢 蚬蛇膽兩

右件藥搗細羅為散每用半錢傅瘡壹日

三兩易

又方白礬兩 桂心兩 徐長卿兩

右件藥搗細羅為散每用半錢日二三上

傅瘡

又方文蛤燒灰以臘月猪脂和塗之大効
又方蘭香曝乾搗末傅瘡上神效

治脫肛諸方

夫脫肛者為肛門出也多因久痢大腸虛冷
所為肛門為大腸之候大腸虛而傷於寒痢
而用氣嘔其氣下衝則脫出因謂之脫肛也

治大腸虛寒肛則洞出猪肝散方

猪肝一片薄切黃連二兩去鬚阿膠一兩兩搗碎芎
藭一兩烏梅肉二兩半艾葉一兩
微炒

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

治大腸虛冷每大便後脫肛洞出宜服此方

鼈頭一枚塗醋鐵精一兩細研苒若子一兩水
者水煮芽出候乾炒令黃黑色

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調
下二錢肛上更灸故麻鞋底熨之

治大腸風冷肛兼腰痛不可忍者宜服此方

石灰一兩白礬一兩黃丹一兩

右件藥同研以油和為餅子於新瓦上燒令通赤放令細研又和又燒如此三度即燒羅為末入麝香末壹分更研令勻每於食前以艾葉粥飲調下壹錢

治大腸虛冷脫肛宜服此方

乾蝸牛子

壹百枚微炒

磁石

二兩得碎淘去赤汁

右件藥以水壹大盞煎磁石五錢至五分

去滓調蝸牛末壹錢服之日三服

又方右用鐵粉傅肛上以物按入每出傅之

以差為度

治大腸久積虛冷每因大便脫肛收不能入

宜用此方右熬石灰令熟以故帛裹坐其

上冷即換之

衛生易簡方同肘後方此方云并醬清合酒塗之

又方蝸牛子

壹兩燒灰

右以猪脂和塗之立縮

又方屋東壁土

壹合細研

右以土傅肛頭出處取皂莢三挺炙熱更

替熨之以入為度

類聚卷五

百九

又方鼈頭口枚燒灰

右細研如粉傅肛門頭出處三指大熱生

治大腸風冷下血不止脫肛疼痛宜服此方

野狸頭壹

右以大瓷瓶壹所可容得者內於瓶中以

厚泥固濟候瓶乾以大火燒之纔及煙盡

住火候冷取出入麝香末半兩研令勻於

瓷器中收之每於食前以溫粥飲調下六

錢

治脫肛出在外者宜服此鼈頭散方

鼈頭壹枚炙磁石二兩燒醋淬七遍細研水飛過蝟皮壹枚

炙令黃桂心壹兩

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

治脫肛不差宜用此方

鼈頭壹枚燒灰蒲黃半兩白斂壹兩

右件藥搗細羅為散傅於肛上接抑令入

日三四度差

治脫肛瀉血不止宜服此方

石耳

五兩微炒

白礬

壹兩燒灰

蜜陀僧

一兩細研

右件藥擣羅為末以水浸蒸餅和丸如梧

桐子大每於食前以粥飲下二十九

又方附子

一兩燒令熟地上用盞蓋出於火毒

桑黃

一兩微炙

右件藥擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每於食前以粥飲下二十九

治脫肛不縮方

石榴根

一握

茜根

一握

右件藥細剉用好酒壹大盞煎至七分去滓分溫二服

又方右取生韭壹斤細切以酥拌炒令熟分

為兩處以軟帛裹更牙慰之冷即再易以

入為度

又方五花構葉

不限多少陰乾

右擣細羅為散每於食前以粥飲調下二

錢兼塗腸頭亦差

又方蛇牀子壹兩微炒擣羅為末貼之効

又治肛門有蟲恒痒諸方
夫肛門有蟲者由胃弱腸虛而燒蟲下乘之也
也肛門為大腸之候燒蟲者九蟲內之壹蟲也
現在於腸間若腑藏氣實則蟲不妄動胃弱
腸虛則蟻蟲乘之重者成瘡或蟲從肛門溢
出輕者侵蝕肛門但痒也
治肛門痒或出膿血有蟲傍生孔竅內蟻
丸方

蟻 七枚五月五日收新牛糞兩好肥羊
去足翅微炙搗末

肉 一兩炒
令香

右件藥都搗如膏丸如蓮子大炙令熟以
新絲薄裹內下部中半日少喫飯即大便
中蟲俱出三五度即永差

又方白蒺藜半兩硫黃一分猪牙皂莢一兩
微炒

右件藥搗羅為末入硫黃同研令勻用葱
薤汁和丸如蓮子大以絲裹壹丸內下部

中日二三易

又方雄黃半兩粉胡半兩

又右件藥細研以棗肉和丸如蓮子大以絛
裹壹丸內下部中日再易之

治下部痒如蟲行方

朱砂一分白礬一分燒灰一兩藟苒兩半

又右件藥擣羅為末每用絛裹壹錢內下部

中日再易之

又方死蛇壹條如指麤者

右掘地作坑置蛇於中燒之取有孔板覆

坵土坐薰之其蟲盡出

治肛門赤痛諸方

夫肛門為大腸之候其氣虛為風熱所乘熱
氣擊搏故令肛門赤痛也

治大腸風熱所攻肛門赤痛川大黃散方

川大黃劉碎黃芩劉黃耆劉玄參已上各

丹參三分赤芍藥兩半枳殼一兩麩炒

右件藥擣細羅為散每於食前以溫粥飲

調下二錢

治大腸風毒攻肛門赤痛令人煩熱坐臥不

安牛蒡子散方

牛蒡子一兩 微炒 黃耆三分 白蒺藜三分 微炒 刺

大黃一兩 碎微炒 當歸半兩 微炒 枳殼三分 微炒 黃去瓢

芎藭半兩 甘草半兩 微赤到

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

煎至六分去滓每於食前溫服

治大腸風壅氣毒攻肛門赤腫疼痛檳榔散方

檳榔壹兩 沉香半兩 枳殼三分 微炒 赤芍藥半兩

川大黃壹兩 碎微炒 防風半兩 去蘆頭 芎藭半兩 犀角

屑半兩 甘草半兩 微赤到

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

煎至六分去滓每於食前溫服

又方皂莢樹白皮壹兩 塗酥 甘草半兩 炙枳殼三分 微炒

殼三分 微炒

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

又方枳殼半兩 微炒 川朴消壹兩 芎藭半兩 沉香

半兩川大黃壹兩判甘草壹分炙微炒
 右件藥擣細羅為散每於食前以清粥飲
 調下二錢

醫方類聚卷之一百八十二

