



外科正宗卷七

海甯許 楣辛木訂

明崇川陳實功著 吳江徐大椿靈胎評

海甯蔣光焞寅昉校

流注論第三十二

夫流者行也。乃氣血之壯。自無停息之機。注者住也。因

氣血之衰。是有凝滯之患。楣案流注者其毒流走而竄注也此解似非其

形漫腫無頭。皮色不變。毋論穴道。隨處可生。凡得此

者。多生於體虛之人。勤勞之輩。不慎調燮。夏秋露卧。

縱意取涼。熱體當風。圖身快爽。或中風邪。發散未盡。或慾後陰虛。外寒所侵。又或惱怒傷肝。鬱結傷脾。榮氣不從。逆於肉裏。又或跌打損傷。瘀血凝滯。或產後惡露未盡。流宿經絡。皆成斯疾。既成之後。當分表裏寒熱虛實。邪正新久而治之。初因風寒所中。表症發散未盡者。人參敗毒散散之。房慾之後。體虛寒氣外侵者。五積散加附子溫之。附子徐勒勞傷鬱怒。思慮傷脾而成者。歸脾湯加香附青皮散之。跌撲傷損。瘀血凝滯而成者。復元活血湯逐之。產後惡露未盡。流注經

絡而成者。木香流氣飲導之。此皆初起將成治法。一服至三四服皆可。外俱用琥珀膏敷貼。其中亦有可

消者。十中五六。如服前藥不得內消者。法當大養氣

血。徐日尤當消痰培助脾胃。溫暖經絡。通行關節。木香流氣

飲。十全大補湯。俱加熟附子香附。熟附子徐勒培助根本。

如此。則未成者自消。已成者自潰。已潰者自斂。而終無殘敗破漏不斂之症。如有膿。宜急開之。患者又當慎起居。戒七情。遠寒就溫。庶可保全。若悞用寒涼剋伐內消等藥。終至不救者多矣。

徐曰。流注有虛痰實痰兩種。

又曰。流注一證。由風寒入膜所致。膜在皮中。旁通四達。初無定處。所以隨處作患。此真脈絡之病。故古人製大活絡丹以治之。其餘煎丸皆非正治。蘇州一小兒甫九歲。患流注。肩背腰脅十餘處。百端醫治無效。余曰。此惟大活絡丹能愈。服至三十餘丸。未破者消。已破者收口。更服補氣血之藥而愈。

此條從洄溪醫案采入

流注看法

初起漫腫。皮色光亮。微熱微疼。筋骨不牽強者順。已成身體微熱。飲食有味。疼痛有時。腫生紅色者順。已潰膿稠而黃。腫消痛止。身體輕便。起坐如常者順。潰後內肉易生。膿水易止。精神易復。膿口易合者順。初起身體發熱。脈細而數。皮色微腫。痛徹筋骨者險。已成飲食少思。口乾作渴。身體疼痛。四肢沉重者險。已潰膿水清稀。腫仍不消。虛熱不退。疼痛不減者逆。潰後膿穢不止。肌膚瘦削。飲食不滄。發熱皮粗者死。

徐曰。看法亦與諸症同。

流注治法

初起風寒表散未盡。而後復生腫痛者。再宜和解之。表邪已盡。而後復生流注者。宜清熱消腫。行散氣血。暴怒所傷。抑鬱所致。胸膈痞悶。中氣不舒。宜順氣寬中。腫硬已成。而不得內消者。宜和氣血。更兼補助脾胃。跌撲閃胸。瘀血凝滯為患者。宜調和氣血。通行經絡。寒邪所襲。筋攣骨痛。及徧身疼痛者。溫經絡。行氣血。產後敗血流注關節。致生腫痛者。當散敗瘀。養氣血。潰後膿水不止。而形衰食少者。宜滋氣血。峻補脾胃。

徐曰。亦與諸症同。

流注治驗

一男子風寒表散未盡。兩腮腫痛。微熱不退。用小柴胡

湯加川芎天花粉。

天花粉徐勒

桔梗連翹二服。熱頓退。又

以二陳湯加桔梗黃芩牛蒡子連翹四服。十日而安。

徐曰。此乃風痰。非流注也。

一男子勞傷受寒。背生三腫。皮色不變。寒熱交作。至夜尤甚。先以萬靈丹洗浴發汗。寒熱頓退。惟腫硬不消。以琥珀膏敷之。三次。腫消痛止。漸平。

徐曰。此亦風痰所聚。

一婦人因怒脇下結腫。將近半年方痛。此肝氣鬱結之症。用木香流氣飲四服。其腫漸紅。蓋病久必欲作膿。不可內消。又以十全大補湯徐曰加木香香附青皮十餘服。腫漸高。又以本方加阜角刺五服。其膿乃潰。清而且多。此元氣已經虧損所致。服人參養榮湯加熟附子。此味徐勒月餘。膿始稠少。本方倍參耆歸朮。兩月而愈。

一男子元氣素虛。因暴怒膊生腫塊。疼痛牽強。寒熱往

來。飲食日減。以補中益氣湯

此五字徐勒批曰不切

加香附貝

母十餘服。寒熱漸止。又服益氣養榮湯。月餘而腫潰。

間服八珍湯。外用香附餅日灸二次。

徐曰亦不妥

脾胃健

而安。

一孀婦項間乳上各腫一塊。將近一年。漸大而痛。診之脈細數而無力。此思慮過傷之症。用歸脾湯加桔梗香附十餘服。腫漸高。以琥珀膏敷之。色漸紅。欲其作膿。以十全大補湯加桔梗貝母服之。半月膿熟。針之。頭腐膿清。虛熱復作。食少不睡。仍以歸脾湯間逍遙

散服之。三月而愈。

一男子平素怯弱。腰後微腫一塊。飲食少思。口乾發熱。

此腎傷也。治當朝以附桂八味丸。以上七字徐勒批日大誤午用

人參養榮湯。扶植根本為要。彼以口乾發熱為內有

火。徐曰既有此症何得又用熱藥欲投清涼之劑解之。徐曰其死亦不以徒用涼

藥之。故余辭不治。彼請內科治之。以退熱為主。正合其

意。投藥三劑。腹痛作瀉。又以豬苓澤瀉厚朴。此三味徐勒批

日大泄氣等藥投之。大熱發作。形體更變。復請余治。

余曰。死期速矣。因虛致病。法當滋補。況腫在腰間。內

腎受傷。口乾作渴。腎水枯竭。發熱不退。陰虛血少。今

以有餘之藥。而療不足之症。豈有不死者哉。又半月

而死。

徐曰。以上所載五案。皆係痰毒。並非流注之病。流

注者。纏綿不已。或五或七或九。愈者愈。發者發。變

態萬端。若初生一兩箇。旋即消潰。皆非真流注也。

流注主治方

調和榮衛湯

調和榮衛湯芎歸赤芍白芷併烏藥

獨活甘草者大茴牛膝紅花兼陳皮

治流注初起。氣血凝聚。結腫不散。已成未成。並服。

川芎

當歸

陳皮

獨活

各一錢

赤芍

白芷

烏藥

大茴香

黃耆

各八分

甘草

炙

紅花

各五分

牛膝

下部加

水二茶鍾煎八分。入酒一杯。量病上下服。

徐曰。通治之方。但少痰藥。

楣案大茴香一味。徐勒批曰。此味不解。

木香流氣飲

木香流氣飲。芎歸枳殼。檳榔。防枳實。

蘇桔青陳烏澤耆。膝甘半芎大腹皮。

治流注瘰癧。及鬱結為腫。或血氣凝滯。遍身走注。作痛。或心胸痞悶。咽噎不利。脇腹膨脹。嘔吐不食。上氣

喘急。咳嗽痰盛。或四肢面目浮腫者。

川芎

當歸

紫蘇

桔梗

青皮

陳皮

烏藥

黃耆

枳實

茯苓

防風

半夏

白芍

各一錢

甘草節

大腹皮

木香

檳榔

澤瀉

枳殼

各五分

牛膝

下部

加一錢

水三茶鍾。薑三片。棗一枚。煎八分。食遠服。

徐曰。此流注主方。藥味太雜。宜擇用。

楣案青皮烏藥大腹皮木香檳榔徐圈。

六鬱湯

六鬱湯內用川芎
甘柅蒼朮砂仁等

半夏陳苓香附同
溼痰流注即時通

治諸鬱結腫及左右二搭相串溼痰流注等症。

川芎

半夏

茯苓

香附

陳皮

山柅

各一錢

蒼朮

砂仁

甘草

各五分

水二茶鍾薑三片煎服。

附子八物湯

附子八物湯芎芎
甘草肉桂當歸等

熟地人參朮茯苓
木香薑棗效如神

治房慾後陰虛受寒致生腫塊又或徧身腿腳疼痛。

不能步履。

川芎

白芍

熟地

人參

白朮

茯苓

當歸

附子

各一錢

肉桂

五分

木香

甘草

各三分

水二茶鍾薑三片棗一枚煎八分食遠服。

徐曰此通治虛寒之方非流注之方凡立方總當

兼顧本症一二不可全不照應。

瘡科流氣飲

瘡科流氣飲芎歸
防風枳殼香烏藥

甘桔蘇檳芎桂耆
白芷人參厚朴隨

治流注及一切鬱怒凝滯氣血作腫疼痛或胸膈痞

悶或風寒溼毒搏於經絡結成腫塊者。

當歸

甘草

紫蘇

人參

白芍

官桂 黃耆 防風 枳殼 烏藥

桔梗 厚朴各七分 檳榔 木香 川芎

白芷各五分

水二茶鍾煎八分。食前服。

徐曰。此亦流注通治之方。與前義同。

通經導滯湯

通經導滯湯香附 赤芍芎歸熟地隨 陳丹枳蘇甘草節 牛膝紅花獨活宜

治婦人產後敗血流注經絡結成腫塊疼痛者。

香附 赤芍 川芎 當歸 熟地

陳皮 紫蘇 牡丹皮 紅花 牛膝

枳殼各一錢 甘草節 獨活各五分

水二茶鍾煎八分。入酒一小杯。食前服。

徐曰。亦與前方相同。皆重出。

香附餅香附餅用香附末 酒和調成患上安 熨斗將來乘熱熨 兼資火力散風寒

治風寒流注襲於經絡結成腫痛。用香附為末。酒和。

量瘡大小做餅。覆患處。熱熨斗。熨藥上。未成者自消。

已成者自潰。風寒溼毒。宜薑汁作餅。

徐曰。外治良法。

醒脾湯

醒脾湯中參朮者 黃連酸棗地骨皮 茯神遠志柴甘桔 木香香附龍眼宜

治懷抱鬱結。思慮傷脾。致脾氣不行。逆於肉裏。乃生
壅腫。疼痛不眠。心煩不安。神氣不清。

白朮 黃耆 人參 茯苓 神 各一錢 酸棗仁

地骨皮 遠志 各七分 柴胡 甘草 桔梗

黃連 木香 香附 各五分 龍眼肉 七箇

水二茶鍾。薑三片。棗二枚。煎八分。不拘時服。

徐曰。卽歸脾湯意。

調中大成湯 調中大成湯朮附 苓歸芍藥藿參耆 砂仁遠志丹陳草 黑棗二枚薑用煨

治流注潰後。膿水清稀。飲食減少。不能生肌收斂。

白朮 茯苓 歸身 白芍 陳皮

山藥 牡丹皮 黃耆 各一錢 人參 二錢 藿香

砂仁 遠志 甘草 各五分 附子 肉桂 各八分

水二茶鍾。煨薑三片。棗二枚。煎八分。食遠服。

徐曰。此病後調養方。

黃耆六一湯 黃耆六一湯參草 三味同煎功不小 流注膿多併作渴 更兼煩躁煎嘗好

治流注潰後。膿水出多。口乾作渴。煩躁不甯。

黃耆 六錢半生 甘草 一錢五分 人參 一錢

水二茶鍾煎八分。食遠服。

散血葛根湯

散血葛根湯半夏甘草細辛併蘇葉

芎防羌葛芷升麻桔梗香附與紅花

治跌撲損傷瘀血凝滯結成流注身發寒熱者。

乾葛

半夏

川芎

防風

羌活

升麻

桔梗

各八分

白芷

甘草

細辛

蘇葉

香附

紅花

各六分

水二茶鍾葱白三枚薑三片煎八分不拘時服。

徐曰。如果敗血當更加血分藥。此方尚未到。

先天大造丸

先天大造丸歸杞烏茅巴骨故紙膝

杞地參苓菟菴黃車志青鹽棗二香

治風寒溼毒襲於經絡初起皮色不變。漫腫無頭。或

陰虛外寒侵入。初起筋骨疼痛。日久遂腫潰後膿水

清稀久而不愈。漸成漏症者。

紫河車

一具酒煮搗膏

熟地黃

四兩酒煮搗膏

歸身

茯苓

人參

枸杞

菟絲子

肉苁蓉

酒洗搗膏

黃精

白朮

何首烏

去皮用黑豆同蒸搗膏

川牛膝

骨碎補

去白微炒

仙茅

浸去赤汁蒸熟去皮搗膏各二兩

川巴戟

去骨

破故紙

炒遠志

去心炒

木香

用文

青鹽

各五錢

丁香

三錢

黑棗肉

二兩

右爲細末。煉蜜丸如桐子大。每服七十九。空心溫酒送下。此方非獨流注成漏者可用。又補一切氣血虛羸。勞傷內損。及男婦久無嗣息。並有奇功。

徐曰。此通治補藥。病後調養法。

又曰。此虛人潰後補藥。初起禁用。

琥珀膏

琥珀膏中用大黃同蒜搗稠敷患處

南星白芷鬱金香提毒之法此爲良

治一切皮色不變。漫腫無頭。氣血凝滯。結成流毒。母

論身體上下。年月新久。但未成膿者。

大黃 二兩

鬱金

南星

白芷

各一兩

共爲細末。用大蒜頭去殼搗爛。入上藥再搗稠。入酒一二匙調勻。徧敷腫上。紙蓋。或卽熱痛。或不痛。俱待藥乾便效。次日又有起泡。又有不起泡者。如有泡起。挑去泡中黃水。膏貼之自效。

徐曰。此弔毒法。亦有必當用之法。

又曰。此提毒之法。毒淺者自消。凡一切無頭腫痛之症俱效。

對楣案余所製消核膏流注初起。貼之可消。

附錄大活絡丹

治一切中風癱瘓。痿痺痰厥。拘攣疼痛。癰疽流注。跌撲損傷。小兒驚癇。婦人停經。

白花蛇 烏梢蛇 威靈仙 兩頭尖俱酒浸 草烏

天麻煨 全蝎去毒 首烏黑豆水浸 龜板炙 麻黃

貫仲 炙草 羌活 官桂 藿香

烏藥 黃連 熟地 大黃蒸 木香

沈香各二兩 細辛 赤芍 沒藥去油 丁香

乳香去油 僵蠶 天南星薑製 青皮 骨碎補

白蔻 安息香酒熬 黑附子製 黃芩蒸 茯苓

香附酒浸焙 元參 白朮各一兩 防風二兩五錢 葛根

虎脛骨炙 當歸各一兩半 血竭七錢 地龍炙 犀角

麝香 松脂各五錢 牛黃 片腦各一錢半 人參三兩

右藥各研稱準。合和再研。蜜丸如桂圓核大。金箔爲衣。陳酒送下。須用白蠟爲匱收藏。以免泄氣。

徐曰。頑痰惡風。熱毒瘀血。入於經絡。非此不能透

達。乃治肢體大症必備之藥。他書活絡丹祇用地

龍乳香等四五味。乃治藜藿人實邪之方。不可用。

流注應用方

十全大補湯

人參養榮湯

補中益氣湯

歸脾湯

益氣養榮湯

八珍湯

俱見潰瘍門

萬靈丹

見腫瘍門

小柴胡湯

二陳湯

俱見癰瘡門

乳癰乳岩論第三十三

夫乳病者。乳房為陽明胃經所司。乳頭為厥陰肝經所屬。乳子之母。不能調養。以致胃汁濁而壅滯為膿。又有憂鬱傷肝。肝氣滯而結腫。初起必煩渴嘔吐。寒熱交作。腫痛甚者。宜牛蒡子湯主之。厚味飲食。暴怒肝火。妄動結腫者。宜橘葉散散之。又憂鬱傷肝。思慮傷

脾。積想在心。所願不得。致經絡痞澀。聚結成核。初如豆大。漸若圍棊子。半年一年。二載三載。不疼不癢。漸而大。始生疼痛。痛則無解。日後腫如堆粟。或如覆碗。紫色氣穢。漸漸潰爛。深者如岩穴。凸者若泛蓮。疼痛連心。出血則臭。其時五臟俱衰。四大不救。名曰乳岩。凡犯此者。百人必百死。知覺若早。姑用清肝解鬱湯。或益氣養榮湯。患者再加清心靜養。無望無礙。服藥調理。尚可苟延歲月。若中年已後。無夫之婦。得此其死尤速。故曰。夫乃婦之天也。惟初生核時。急用艾

灸核頂待次日起泡挑破用披針針入四分此句徐

必更腫此法用冰蠶散條插入核內此四字糊紙封

蓋至十三日其核自落用玉紅膏生肌斂口再當保

養庶不再發又男子乳癰與婦人微異女損肝胃男

損肝腎蓋怒火房慾過度以致肝虛血燥腎虛精怯

血脈不得上行肝筋無以榮養遂結腫痛治當入珍

湯加山梔牡丹皮入珍湯口乾作渴者加減入味丸

八味丸腎氣素虛者腎氣丸已潰作膿者十全大補

湯徐勒懷孕之婦乳疾日內吹因胎氣旺而上衝致陽明

乳房作腫宜石膏散清之此句徐勒批亦可消散遲

則遷延日久將產出膿乳汁亦從膿竅流出其口難

完有此者純用補托生肌其口亦易完矣

徐勒曰乳病有數種種種各別須知之

又曰乳腫不同俱係陽明結氣結痰各有專方一

槩瞎藥皆有損無益也

乳癰乳岩看法

初起紅赤腫痛身微寒熱無頭眩無口乾微疼者順已

成掀腫發熱疼痛有時一囊結腫不侵別囊者輕已潰

膿黃而稠。腫消疼痛漸止。四邊作癢。生肌者順。潰後膿水自止。腫痛自消。新肉易生。膿口易合者順。初起一乳通腫。木痛不紅。寒熱心煩。嘔吐不食者逆。已成不熱不紅。堅硬如石。口乾不眠。胸痞食少者逆。已潰無膿。正頭腐爛。腫勢愈高。痛勢愈盛。流血者死。潰後肉色紫黑。痛苦連心。腕氣日深。形體日削者死。

徐曰。乳癰與乳岩各有看法。此乃乳癰看法也。

乳癰乳岩治法

初起發熱惡寒。頭眩體倦。六脈浮數。邪在表。宜散之。發

熱無寒。惡心嘔吐。口乾作渴。胸膈不利者。宜清之。憂鬱傷肝。思慮傷脾。結腫堅硬微痛者。宜疎肝行氣。已成掀腫發熱疼痛。有時已欲作膿者。宜托裏消毒。膿已成而脹痛者。宜急開之。脾胃虛弱。宜更兼補托。潰而不斂。膿水清稀。腫不消。疼不止。宜大補氣血。結核不知疼痛。久而漸大。破後惟流污水。宜養血清肝。

徐曰。此亦是乳癰治法。乳岩無治法。不過使之遷延歲月。不致痛苦惡具而已。

乳癰乳岩治驗

一婦人因怒。左乳腫痛。寒熱交作。服人參敗毒散一劑。
人參敗毒散徐勒批曰不切表症已退。又用牛蒡子湯二服。腫消
 漸安。

一婦人憂思過度。久鬱成癆。左乳結核如桃。
徐曰此半名乳核

本年似痛非痛。咳嗽生痰。身發潮熱。診之脈微數而無力。此真氣雖弱。而邪火尙未有餘。如用藥合理。尙堪調治。先用逍遙散加香附貝母十餘服。而咳嗽漸止。寒熱間作。又用八珍湯加香附牡丹皮柴胡遠志十餘服。身熱去其八九。又服益氣養榮湯加青皮木香。

兩月餘。胸膈得利。噯氣得舒。飲食漸進。肌膚漸澤。外腫以阿魏化痞膏貼之。半年餘而消。

一婦人右乳疼痛。腫如覆碗。診之脈數有力。此有餘症。欲作膿也。用托裏消毒散數服。而脹痛針之。出膿碗許。又用十全大補湯加香附十餘服而安。

徐曰。此是乳癰實症。如乳子之時有此。乃是外吹也。

一婦人暴怒。左乳結腫疼痛。自服仙方活命飲二劑。疼痛稍止。結腫不消。仍服清涼敗毒之劑。
清涼二字徐勒腫痛

更作形體日弱。診之脈浮數而無力。此真氣虛而邪氣實也。非補不可。用益氣養榮湯四五服。其腫始高。寒熱亦退。又十餘服而膿潰。兼服十全大補湯。兩月而痊。此症非純補豈能得愈。純補二字徐勒批曰外症無純補

一男子年過五旬。因妻喪子不成立。憂鬱傷肝。左乳結腫。半年痛甚。作腐。肝脈弦數。先用小柴胡湯加青皮。山梔。遠志。貝母。數服。而肝脈稍平。又用八珍湯。仍加前藥十餘服。其腫漸腐為膿。更服益氣養榮湯。庶保收斂。彼為內醫所惑。謂鬱怒傷肝。肝經有火。不必用

補。更服降火流氣寬中等劑。致食少便秘。發熱作渴。復請余治。肝脈復弦。口乾作渴。邪火內淫。飲食減少。脾土受傷。便秘發熱。陰血竭而為燥。為熱。已上俱內損症也。辭不治。後月餘果死。

徐曰。此卽男子乳岩。本屬難治。

一婦人左乳結核。三年方覺腫痛。診之脈緊數而有力。此陽有餘而陰不足也。況結腫如石。皮肉紫色不澤。乃真乳岩症。辭不治。又一婦左乳結腫。或小或大。或軟或硬。俱不作痛。至半年餘。腫如覆碗。堅硬木痛。近

乳頭纍纍徧生疙瘩。時痛時癢。診之脈弦而數。腫色慘黑不澤。此氣血已死。亦辭不治。又一婦已潰。腫如泛蓮。流血不禁。亦辭之。後果俱死。

徐曰。此段所述。皆真乳岩。無愈理。

楣案余所製消核膏。凡乳核初起。無內症。貼之無不消者。但除根甚難耳。因循不治。變爲乳岩。則難治。乳岩潰後。宜貼陽和解凝膏。近見刻本經驗良方載以鴉片灰作糝藥。亦有得愈者。附記于此。

又案全生集乳岩治法。初起用犀黃丸。每服三錢。

酒送十服全愈。或以陽和湯加土貝五錢煎服。數

日可消。倘誤以膏貼藥敷。

楣案貼余消核膏無弊說見瘰癧門後

定

主日漸腫大。內作一抽之痛。已覺遲治。倘皮色變異。難以挽回。勉以陽和膏日服。或以犀黃丸日服。或二藥每日早晚輪服。服至自潰而痛者。外用大蟾六隻。分作三日。每日早晚取蟾破腹連雜。蟾身刺孔。貼於患口。內服千金托裏散。方見瘰癧門註中三日後。接服犀黃丸。可救十中三四。潰後不痛而癢極者。無一毫挽回。大忌開刀。開則翻花最慘。萬無一

活男女皆有此症。

乳癰主治方

牛蒡子湯

牛蒡子湯瓜蒌仁黃芩連翹柴花粉

銀花山梔甘草陳青皮牛蒡阜角針

治乳癰結腫疼痛。毋論新久。但未成膿者。

陳皮

牛蒡子

山梔

金銀花

甘草

瓜蒌仁

黃芩

天花粉

連翹

角針

各二

錢

柴胡

青皮

各五分

水二茶鍾。煎八分。入酒一杯和勻。食遠服。

徐曰。此乳症通治方。

楣案瓜蒌仁青皮徐圈。

橘葉散

橘葉散內用柴陳石膏連翹一錢等

川芎山梔青皮芩橘葉廿片草五分

治婦人有孕胎熱為內吹。有兒喫乳名外吹。致乳結

成腫痛。寒熱交作。甚者惡心嘔吐。

柴胡

陳皮

川芎

山梔

青皮

石膏

黃芩

連翹

各一錢

甘草

五分

橘葉

十二片

水二茶鍾。煎八分。食遠服。

徐曰。亦通治方。

楣案橘葉徐圈。

清肝解鬱湯

清肝解鬱湯白芍
青皮生地併蘇葉

桔半芎歸貝志陳
通草香附梔茯神

治一切憂鬱氣滯乳結腫硬不疼不癢久漸作疼或
胸膈不利肢體倦怠面色萎黃飲食減少。

陳皮

白芍

川芎

當歸

生地

半夏

香附

青皮

遠志

茯神

貝母

蘇葉

桔梗

甘草

山梔

木通

各四分

水二茶鍾薑三片煎八分食遠服。

徐曰與前法重。

鹿角散

鹿角散用角三寸
研服三錢酒調下

炭火煨之令微紅
乳癰新起散無蹤

治乳癰新起結腫疼痛憎寒發熱但未成者俱效。鹿
角尖三寸用炭火煨稍紅存性碾末每服三錢食後
熱酒一茶鍾調服甚者再用一服必消。

徐曰此單方。

回乳四物湯

回乳四物湯四物
加上麥芽能散乳

芎歸地芍不可缺
自然腫脹消無跡

治產婦無兒喫乳致乳汁腫脹堅硬疼痛難忍。

川芎

當歸

白芍

熟地

各二錢

麥芽

二兩

炒爲粗末

水二茶鍾煎八分。食遠服。用腳布束緊兩乳。以手按揉。其腫自然消散。甚者再用一服。

徐曰。此治乳脹消乳之法。宜再加豬苓澤瀉茯苓等以利其水。

楣案熟地徐改生地。麥芽一味徐圈。

灸乳腫妙方

灸乳腫痛方法高將碗覆於患上灸

惱怒勞傷氣不調諸般腫痛寂然消

治氣惱勞傷或寒熱不調。乳內忽生腫痛。用碗一隻。內用粗燈草四根。十字排勻。碗內燈草頭各露寸許。

再用平山粗紙裁成一寸五分闊紙條。用水溼紙貼蓋碗內燈草上。紙與碗口相齊。將碗覆於腫乳上。留燈草頭在外。將艾大圓於碗足底內點火灸之。艾盡再添。灸至碗口流出水氣。內痛覺止方住。甚者次日再灸一次。必消。

保安萬靈丹

見腫瘍門

治乳癰初起發熱惡寒。頭眩肢體作痛者。

益氣養榮湯

見瘰癧門

治鬱怒傷肝。七情內結。以致乳中生核。不疼不癢。日

久方痛。甚者胸膈不利。吞酸嘔吐。頭目昏眩。四肢倦怠。或已破潰。膿水清稀。不能收斂。飲食減少。口淡無味。自汗盜汗。肢體羸瘦者。

治乳便用方

治乳蒲公英最良。葱湯一盞催微汗。

酒煎熱服。卽眠。腫痛全消。身便康。

治乳癰初起。腫痛未成膿者。用蒲公英。春秋間開黃。花似菊者。取連根帶葉二兩。搗爛。用好酒半斤。同煎。數沸。存渣敷腫上。其酒熱服。被蓋睡一時許。再用連鬚葱白湯一茶鍾催之。得微汗而散。此方鄉村偏僻。無藥之所。用之極妙。亦且簡便。

徐曰。此單方。

下乳天漿散

下乳天漿四物同。王不留行併山甲。

茯苓花粉麥門冬。漏蘆甘草與木通。

治乳母元氣虛弱。乳汁微少。或生兒日久乳少。

川芎

當歸

白芍

熟地

茯苓

天花粉

甘草

王不留行

炒

麥門冬

漏蘆

穿山甲

炒

通草

各一錢

用健豬前蹄一隻。煮爛。取汁二碗。同藥煎至碗半。二次頓熱。食遠服之。以熱木梳梳其乳房。其汁如泉湧而來。

徐曰。此催乳法。

楣案王不留行漏蘆穿山甲通草及健豬前蹄徐俱圈。

木香餅

木香餅用生地黃氣滯腫疼併閃胸

二物和勻患上裝用之一熨自無殃

治一切氣滯結腫成核或痛或閃胸風寒所傷。

木香

五錢

生地黃

一兩搗膏

右木香為末。同地黃和勻。量患處大小。作餅貼上。以熱熨斗熨之。堅硬木痛者。間日熨之。

徐曰。外治良法。

乳癰應用方

十全大補湯

八珍湯

見潰瘍門

逍遙散

冰蠶散

小柴胡湯

見癰瘰癧門

托裏消毒散

見腫瘍門

阿魏化痞膏

見痞疾門

附骨疽論第三十四

附鶴膝風

夫附骨疽者。乃陰寒入骨之病也。人之氣血壯實。雖遇

寒冷而邪不入骨。凡入者。皆由體虛之人。夏秋露臥。

寒溼內襲。或房慾之後。蓋覆單薄。寒氣乘虛入裏。遂

成斯疾。初起則寒熱交作。稍似風邪。隨後臀腿筋骨

作痛不熱不紅。疼至徹骨甚者。曲伸不能轉側。日久陰變為陽。寒化為熱。熱甚而腐肉為膿。此疽已成也。凡治此症。初起寒熱作痛時。便用五積散加牛膝紅花。發汗散寒。通行經絡。或萬靈丹發汗亦可。次以大防風湯行經活血。滲溼補虛。又有生於尻臀部位。漫腫作疼者。徐曰此非真骨癰宜內托羌活湯。腿內近膝股漫腫木痛者。內托者柴湯。腿外側者內托酒煎湯。初起通用人參敗毒散。人參徐勒加木瓜牛膝蘇木紅花。虛者十全大補湯。加羌活防已牛膝。已成欲作膿者。附子

八珍湯。膿成脹痛者。即針之。膿稠而黃。體實者。十全大補湯。膿清色白。體虛者。保元大成湯。食少體倦者。香砂六君子湯。脾虛寒熱者。補中益氣湯。以此調理可也。又有風溼相乘之症。初起寒熱交作。次傳腿腫作痛。其形光亮微紅發熱。按之如泥。不即起者。宜當歸拈痛湯。或茯苓佐經湯。間服萬靈丹和之。以上之症。皆由元氣不足中來。不可悞用損脾泄氣敗毒等藥。外禁寒涼等法。如悞用之。必致氣血冰凝。內肉癰腐。日久化為污水。敗膿流而不禁。終死。又有房慾勞

傷寒熱互變。氣血乖違。經脈橫解。受病日深。以成斯疾者。徐曰此溼毒之症其患大腿漸漸腫如冬瓜。上過胯腹。

下至足底。牽連漫腫。皮色不紅。日久潰膿。色白腥穢。腫仍不消。痛仍不減。元氣日衰。身體縮小。唇舌乾焦。

二便枯秘。諸藥不效。飲食不進。終為不治。又有鶴膝風。乃足三陰虧損之症。徐曰又初起寒熱交作時亦是一病

宜五積散加牛膝紅花。或萬靈丹發汗。俱可。如汗後腫痛仍不消滅。此陰寒深伏。以大防風湯溫暖經絡。

重者兼灸膝眼二穴。敷以琥珀膏。亦可漸漸取效。如

以上之法俱不效者。終成痼疾。不必強藥消之。只宜先天大造丸。史國公藥酒。終年常服。亦可轉重就輕。

徐圖步履也。
附骨疽看法

初起身微寒熱。飲食如常。結腫微紅。疼不附骨者順。已

成舉動自便。結腫成囊。疼痛有時。膿易成者吉。已潰膿

稠。腫消痛減。身體輕便。睡穩不熱者吉。潰後元氣易復。飲食易進。內肉易實。膿水易乾者吉。初起身發寒熱。漫

腫色白。肢體牽強。疼痛附骨者險。已成舉動不便。通腿

漫腫。不熱不紅。不作膿者險。已潰膿水清稀。氣穢腥臭。腫痛不消。形體日削者死。潰後脾胃虛弱。飲食無味。口渴不止。脣白皮枯者死。

徐曰。看法亦與諸症同。

附骨疽治法

初起發熱惡寒。身體拘急。腿腳腫痛。脈浮緊者散之。已成腿腳腫痛。皮色不變。上下通腫者散寒溫經絡。寒熱作腫。色白光亮。按之如泥不起者宜健脾滲溼。身體無熱惡寒。脈遲而濇。腿腫不熱者養血溫經絡。暑中三陰。

脈洪而數。腿腳掀腫。口乾便燥者宜下之。已潰膿水清稀。飲食減少。形體消瘦者補中健脾胃。潰後腫痛不減。膿水不止。虛熱不退者溫中養氣血。愈後筋骨牽強。屈伸不便者宜滋養氣血。通利關節。

徐曰。亦與諸症同法。

附骨疽治驗

一男子中寒。發散未盡。大腿腫痛。脈浮數而無力。此風寒未盡。內虛故也。用五積散去麻黃加牛膝二服。疼痛稍減。又用內托黃耆酒煎湯四服。全腫俱消。惟腿

夕和工宗卷七
外側結腫一塊不退。此瘀血凝滯欲作膿也。用托裏藥候膿熟針之。更服十全大補湯而斂。

徐曰。此腿癰也。非骨疽。

一男子勞碌遇寒每發腿痛。發則寒熱嘔吐。胸痞不食。此因氣惱飲食不節。脾胃受傷。故不能運化。痰滯中脘。溼熱動而下注爲腳氣。投以開結導引丸二服。行去停痰。又用半夏佐經湯數服。嘔止膈利。更服附子六物湯數劑。消而不發。

徐曰。此寒溼也。

一老人年六旬。過慾腎虛。致筋攣痺縮。腳膝無力。不能步履。外貼追風逐溼膏。內服三因勝駿丸而愈。

一男子右腿腫痛兩月餘。余曰。膿成已久。何不開之。彼曰。二老醫同治。俱稱內消無膿。再請二老決之。俱曰。無膿。但病者昏沈不醒。命在危篤。余強開之。出膿盈許。以獨參湯連進二服而甦。後以十全大補湯調理。百日外而安。

徐曰。此亦腿癰。

一男子房事後受陰寒。大腿無形作痛。至夜尤甚。不能

步履醫以散寒除溼消痰止痛藥治之。其疼益增。余診其脈細澀而無力。此氣血不足。寒氣所乘之故。投以大防風湯二劑。疼痛頓減。又四劑而痊。

徐曰。此亦寒溼。

一男子暑月慾後當風睡臥。寒氣襲於左腿。遂致腫痛。寒熱交作。胸痞不食。以保安萬靈丹葱湯化服。洗浴發汗。以散骨髓寒毒。後以大防風湯去羌活加紅花破故紙。溫暖腎經。通行經絡。腫痛漸消。血脈漸和。又以三因勝駿丸間服。調理兩月而愈。

徐曰。此外感風寒也。

一監生慾後受寒。致成腿痛。余以暖腎氣溫經絡散寒邪藥治之。彼以爲緩。請內醫投表散之劑。外邪散而內虛。又以小柴胡湯等藥調理。小柴胡湯徐勒致虛熱發作。口燥咽乾。煩渴不已。又以知母石膏湯清其上。防風

木瓜威靈仙等劑攻其下。此三字徐勒致病愈劇。仍請余

治。其時患腿愈腫。其形縮小。楣案既云愈腫。又云縮小必有誤。余斷

以必死。此症原屬腎經受寒。非附子破故紙不能通達關節。非羌活防風牛膝不能通行閉滯。非人參白

朮炙甘草不能使脾氣行達四肢。非川芎當歸白芍
熟地紅花不能養血活血。凡病從虛而入者。先補其
虛。後攻其病。以上八字徐×批曰。先補則邪何從而出。今此症不加溫補。
而發散解肌。以正風寒有餘之法治之。不死何待。後
果死。

徐曰。以上說症皆非附骨疽。名實相背。

附骨疽主治方

五積散

五積芎歸朴桂心枳殼乾薑併桔梗

蒼半麻陳芍茯苓白芷甘草共薑行

治風寒溼毒客於經絡。致筋攣骨痛。或腰腳酸疼。或

徧身拘急。或發熱惡寒頭痛者。

蒼朮

二錢

陳皮

桔梗

川芎

當歸

白芍

各一錢

麻黃

枳殼

桂心

乾薑

厚朴

各六分

白芷

半夏

甘草

茯苓 各四分

水二茶鍾。薑三片。煎八分。不拘時服。頭痛惡寒者。加
連鬚葱頭三根。蓋汗為效。下部加木瓜牛膝。

徐曰。此方雜亂不切。

內托羌活湯

內托羌活黃柏蒼紅花甘草當歸尾

桂翹藁朮陳耆防通治下體用此方

外科正宗卷七

附骨疽

三

治尻臀患癰。堅硬腫痛。兩尺脈緊數。按之無力。

羌活 黃柏 防風 歸尾 藁本

肉桂 各一錢 黃耆 一錢 連翹 甘草 蒼朮

陳皮 各六分 紅花 五分

水酒各一茶鍾。煎八分。食前服。

徐曰。此下體通治之方。

當歸拈痛湯 當歸拈痛湯二朮 羌活防芩澤瀉苓

治溼熱下注。腿腳生瘡。赤腫作痛。或腰腳酸痛。或四

肢徧身重痛。或下部頑麻作癢。或成血風。

羌活 當歸 防風 茵陳 蒼朮 各

錢 苦參 升麻 白朮 各七 葛根

甘草 黃芩 知母 澤瀉 豬苓

人參 各五分 黃柏 三分

水二茶鍾。煎八分。食前服。

徐曰。此治溼毒之方。可擇而用之。

內托黃耆湯 內托黃耆湯黃柏 當歸生地兼羌活

治溼熱。腿內近膝股患癰。或附骨癰。初起腫痛。此太

陽厥陰之分也。脈細而弦。按之洪緩有力。

黃耆鹽水拌炒當歸柴胡木瓜連翹各

錢羌活肉桂黃柏各五分

水酒各一茶鍾煎一半空心服。

徐曰與前法相近。

相案木瓜羌活肉桂三味徐圈。

內托酒煎湯

內托酒煎湯桂耆柴胡連翹黃柏歸
甘草升麻牛蒡子水酒同煎治溼宜

治寒溼發於腿外側少陽經分患癰或附骨癰堅硬

漫腫作痛或流至足陽明經作腫。

黃耆當歸各二錢柴胡一錢五分連翹肉桂

升麻牛蒡子各一錢黃柏甘草各五分

水酒各一茶鍾煎一半食前服。

徐曰意重前。

茯苓佐經湯

茯苓佐經湯半夏二朮陳皮草葛根
藿香澤瀉柴胡等木瓜厚朴共薑行

治足少陽經為四氣所乘以致腰腿發熱疼痛頭目

昏眩嘔吐不食胸膈不利心煩熱悶等症。

茯苓陳皮半夏白朮蒼朮各

錢藿香澤瀉甘草葛根

柴胡厚朴木瓜各五分

水二茶鍾。薑三片。煎八分。食前服。

徐曰。義重前方。

附子六物湯

附子六物湯甘草加薑三片水煎服

桂枝白朮防己苓何慮太陰足腫疼

治四氣流注於足太陰經。骨節煩痛。四肢拘急。自汗短氣。小便不利。手足或時浮腫。

附子

甘草 各一錢

防己

白朮

茯苓

各八錢

分 桂枝 五分

水二茶鍾。薑三片。煎八分。食遠服。

徐曰。此治寒溼之方。

麻黃佐經湯

麻黃佐經湯葛根桂辛甘草各減半

羌活二防蒼朮苓更加薑棗效如神

治風寒暑溼流注足太陽經。腰足攣痺。關節重痛。憎寒發熱。無汗惡寒。或自汗惡風頭痛等症。

麻黃

葛根

羌活

防風

蒼朮

茯苓

防己 各一錢

桂心

細辛

甘草

各五分

水二茶鍾。薑三片。棗二枚。煎八分。食前服。

徐曰。此亦治寒溼之方。義重前。

楣案蒼朮桂心細辛徐圈。

小續命湯小續命湯芎白朮 防風防已共人參

治寒溼之氣中於三陽致身不熱所患煩疼或腳轉

筋或腫或不腫或膝腿頑痺或時緩縱不隨或徧身

百節攣痛或小腸疝氣攻衝

川芎 白朮 防風 人參 防已

附子生用 麻黃有汗去之 桂心 黃芩 白芍各一

錢 甘草五分

水二茶鍾煎八分入薑汁一匙和勻食前服又暑中

三陰所患必熱去附子減桂枝一半

徐曰此散風寒溼之總方諸方之祖也

大防風湯大防風湯朮附歸 參芍川芎杜仲者 羌活牛膝併甘草 熟地還加薑引宜

治三陰之氣不足風邪乘之兩膝作痛久則膝愈大

而腿愈細因名曰鶴膝風乃敗症也非此方不能治

又治附骨疽皮色不變大腿通腫疼痛無奈及痢後

腳痛緩弱不能行或腿膝腫痛

人參二錢 防風 白朮 附子 當歸

白芍 川芎 杜仲 黃耆 羌活

牛膝 甘草 熟地各一錢

水二茶鍾。薑三片。煎八分。食前服。

徐曰。與前方亦相近。

檳蘇散

檳蘇散內用木瓜羌活木香薑作引

香附陳皮大腹加何愁風溼腳酸麻

治風溼流注。腳腫酸痛。或麻痺不仁。嘔吐不食。

檳榔

紫蘇

木瓜

香附

陳皮

大腹皮

各一錢

木香

三分

羌活

五分

水二茶鍾。薑三片。葱白三莖。煎一鍾。空心服。

徐曰。此方專治腳氣。

相案檳榔紫蘇木瓜大腹皮木香徐圈。

獨活寄生湯

獨活寄生湯茯苓秦艽杜仲兼牛膝

芎歸防芍細辛參熟地甘草并桂心

治肝腎虛弱。風溼內攻。足脛緩縱。或膝痺攣重。

獨活

二錢

茯苓

川芎

當歸

防風

白芍

細辛

人參

桂心

杜仲

秦艽

牛膝

熟地

桑寄生

真者各一錢

甘草

五分

水二茶鍾。薑三片。煎八分。食前服。

徐曰。此亦公共之方。

又曰。此治下焦風寒溼痰雜犯之方。雖藥味不純。

而於義無害。

楣案熟地徐改生地。

神應養真丹

神應養真丹木瓜川芎熟地菟絲子

當歸羌芍共天麻蜜丸酒服效堪誇

治厥陰經為四氣所襲。腳膝無力。左癱右瘓。半身不遂。手足頑麻。言語蹇澀。氣血凝滯。徧身疼痛者。

當歸

川芎

白芍

天麻

羌活

熟地

搗膏

木瓜

菟絲子

各等分

右為細末。入地黃膏。加蜜丸。如桐子大。每服百丸。空心溫酒鹽湯任下。

徐曰。此緩治之方。亦無甚妙義。

三因勝駿丸

三因勝駿乳麝香戟甘沒薜櫚蒼蝎

歸麻二木棗羌防故紙菴蓉熟地黃

治元氣不足。真氣虛弱。及諸虛被寒。溼氣侵襲。手足拳攣。腳指連脚面拘急。走注疼痛。筋脈不伸。行步不隨。常服益真氣。壯筋骨。黑髭鬚。滑皮膚。一切足弱。鶴膝風症並治。

附子

一枚要一兩以外者製

當歸

明天麻

牛膝

酸棗仁

熟地

搗膏

防風

各三兩

木瓜

四兩

全蝎

淨身

麝香

一錢

乳香

沒藥

木香

羌活

甘草

炙各五錢

檳榔

萆薢

肉蓯蓉

破故紙

巴戟

去心

蒼朮

各一兩

右爲細末。煉蜜丸。桐子大。每服七十九。空心淡鹽湯溫酒任下。病近者七日。年深者半月見效。

徐曰。此緩治之法。作丸方不外此。

健步丸

健步丸中用川烏生甘滑石兼花粉

苦參羌活澤柴胡防已防風桂酒糊

治生平好飲燒酒。傷於脾肺。膝中無力。伸不能屈。屈不能伸。膝脊腿腳沈重。行步艱難者。

苦參

酒洗

防已

酒浸微焙

羌活

柴胡

滑石

炒

花粉

甘草

各五分

防風

肉桂

各三錢

澤瀉

一兩

五錢

川烏

泡二錢

右爲細末。酒糊爲丸。如桐子大。每服三十丸。空心溫酒送下。

徐曰。義重前。

大腹子散

大腹子散蘇木瓜獨活桑皮併枳殼

羌荆赤芍木通加甘草青皮效可誇

治風毒腳氣上攻寒熱交作。肢節煩疼。心神壅悶。

大腹子

紫蘇

木瓜

羌活

荆芥

赤芍

木通

獨活

桑白皮

青皮

各五

分 枳殼 一錢 甘草 二分

水一茶鍾。薑五片。葱白三莖。煎入分。空心服。

徐曰。此亦治腳氣之方。重前義。

楣案煎藥加薑。方書皆言幾片。而不言銖兩。蓋以

此物非取諸藥肆。窮僻小戶。不皆有戩也。然薑有

大小。片有厚薄。味又極辛。能掩諸藥。三片已覺其

多。此方各藥銖兩甚輕。而薑至五片。是薑為政矣。

余願後之著方書者。酌改銖兩為安。不獨此方然

也。

加味敗毒散

加味敗毒散人參 木瓜枳桔甘蒼朮

羌獨前柴芎茯苓 風溼方中此最靈

治足三陽經溼熱毒氣流注腳踝。掀赤腫痛。寒熱如
瘧。白汗惡風。或無汗惡寒。或惡聞飲食者。

人參

羌活

獨活

前胡

柴胡

川芎

桔梗

茯苓

枳殼

甘草

木瓜

蒼朮 各八分

水二茶鍾。薑三片。煎入分。食前服。便秘加炒大黃。

徐曰。此治風溼之方。

千里健步散

千里健步散有功 草烏加上研為末

細辛白芷共防風 瞬息長安路可通

治遠行兩腳腫痛。若用之。輕便可行千里。甚妙。

細辛 防風 白芷 草烏

右等分爲末。糝在鞋底內。如底乾。卽以水微溼過。糝藥著腳。行走自不費力。再不作腫。

徐曰。此風溼外治之方。

雷火神鍼

雷火神鍼功最奇。紙筒丁麝和蘄艾。

風寒溼毒總相宜。急用針之不可遲。

治風寒溼毒。襲於經絡爲患。漫腫無頭。皮色不變。筋骨疼痛。起坐艱難。不得安臥者。

蘄艾 三錢 丁香 五分 麝香 二分

丁麝研末。與蘄艾揉和。先將夾紙作筒。如指粗大。以艾藥灌入筒內。疊實。臨用以蕭山紙七層平放。患上將筒點著一頭。隔紙捺實針之。待不痛。方起針。病甚者再針一次。七日後火瘡大發。自取功效矣。

徐曰。外治用處甚多。然藥味亦尚多。此未全。

追風逐溼膏

逐溼膏中羌獨活 川草二烏辛芷朮 稀桂麻藤星夏歸 大黃甘草同熬入

治風寒暑溼所傷。致骨節疼痛。筋攣不能步履。或麻木溼痺等症。

豨薟草 麻黃 川烏 草烏 海風藤

半夏

南星

羌活

草麻子

切桂枝各

兩獨活

細辛

當歸

白芷

蒼朮

大黃

各一兩

以上藥各切片。用葱汁薑汁各二碗拌藥。先浸一宿。

次日用香油半觔。

楣案諸藥共有數觔之多。而香油止半觔半字必誤。

先將藥

入鍋內。慢火煎至葱薑二汁將乾不爆時。方下油與

藥相煎。渣枯為度。細絹濾清。每油一觔。配飛過炒丹

十兩為準。將前油入鍋內煎滾。至滴水成珠不散。方

下黃丹。徐徐攪入。其膏已成。再下碾淨松香淨末一

觔四兩同熬化。取下鍋來。將盆頓穩。再下乳香木香

胡椒輕粉各末二兩。白芥子細末四兩。漸入攪勻。傾

入鉢內盛貯。用時熱湯頓化。綾緞攤貼。七日後。諸病

可痊。百發百中。

徐曰。膏藥方勝此者甚多。不足取。

楣案油已煎至滴水成珠。而每油一觔。下炒丹十

兩。則不待再熬而已。堅不可攤。再下松香一觔。四

兩。及各藥末十二兩。其堅如石矣。此蓋著書者忘

卻熬膏時分兩。隨筆填註也。

附骨疽應用方

保安萬靈丹 見腫瘍門

十全大補湯 見潰瘍門

小柴胡湯 見瘰癧門

外科正宗卷七終

外科正宗卷八

海甯許 楣辛木訂

明崇川陳實功著

吳江徐大椿靈胎評

海甯蔣光焞寅昉校

腸癰論第三十五

夫腸癰者。皆溼熱瘀血流入小腸而成也。又由來有三。男子暴急奔走。以致腸胃傳送不能舒利。敗血濁氣壅遏而成者。一也。婦人產後體虛多卧。未經起坐。又或坐草艱難。用力太過。育後失逐敗瘀。以致停積腸

胃而成者二也。飢飽勞傷。擔負重物。致傷脾胃。又或醉飽房勞。過傷精力。或生冷並進。以致氣血乖違。溼動痰生。腸胃痞塞。運化不通。氣血凝滯而成者三也。總之初起外症發熱惡寒。脈芤而數。皮毛錯縱。腹急漸腫。按之急痛。大便墜重。小便澀滯若淋。甚者臍突腹脹。轉側水聲。此等並見。則內癰已成也。初起未成時。小腹殷殷作痛。儼似奔豚。小便淋瀝者。當大黃湯下之。瘀血去盡自安。體虛脈細。不敢下者。活血散瘀湯和利之。已成腹中疼痛。脹滿不食。便淋刺痛者。薏

苡仁湯主之。腹濡而痛。小便急脹。時時下膿者。毒未解也。用牡丹皮湯治之。如膿從臍出。腹脹不除。飲食減少。面白神勞。此皆氣血俱虛。宜八珍湯加牡丹皮肉桂黃耆五味子斂而補之。五味子 徐勒如日久因循不

識此症。悞作脹病治之。

徐曰庸醫往往如此

以致毒攻內臟。腸

胃受傷。或致陰器攻爛。腐靨黑斑。色敗無膿。每流污水。腹連陰痛。煩躁不止。身熱口乾。衾幃多臭。臥房難進者。俱爲不治。宜斟酌之。

腸癰看法

初起小腹疼痛小便不利六脈微緩不作寒熱者輕已
成小腹腫而堅硬小便數而不利六脈洪數者險已潰
時時下膿裏急後重日夜無度疼痛不減者重潰後膿
腥臭穢或流敗水濁瘀虛熱更增不食者死

腸癰治法

初起小腹疼痛或軟或硬脈芤數者瘀血也宜下之小
腹作痛有塊大便秘澀小便如淋者宜和而利之已潰
時時下膿腹痛不止飲食無味者宜托而補之產婦惡
露不盡流注小腸作痛脈數者宜和而導之腹脹日久

臍高突出轉側響如水聲膿內蓄急針之

徐曰實見如此可用針

腸癰治驗

一男子小腹脹痛裏急後重時時下膿醫作痢疾治之

愈重

醫字徐入

余診其脈芤而數此小腸癰也投以薏苡

仁湯一服下膿升許即不後重更用牡丹皮散六服
而安

一幼婦產後月餘腹中漸痛腫脹如蠱內醫紛紛認為
蠱病又月餘沈重昏憤已棄不治適其家童稚患瘡
請余往視偶言及此余自請診之人雖昏憤不甦而

脈細數有力。余曰：此內癰也。尚可治。其家不信。余曰：請視其腹。一決生死。何如？視之，則腫皮緊急，光亮臍下大熱。以上十字徐密點批曰：辨症全在此產後極多。余曰：確係內癰。治之萬無一失。其家乃喜。因命先備淨桶，用滾湯半桶，蓋之聽用。先以薏苡仁湯薏苡仁湯徐密點加酒炒大黃二錢。徐徐灌服。此二句徐斷圈待腹中覺痛，扶起患者坐桶上，熱氣薰蒸。此四字徐密點其膿下如湧泉，連湯與膿約共滿桶。病者即甦。更服八珍湯加牡丹皮、五味子，調理月餘而安。

一婦人小腹腫痛，小便如淋。診之，脈緩而芤。此得之行經時，誤食生冷，又兼惱怒，肝火急迫，瘀血而成內癰。膿尚未成也。以大黃湯下之，瘀血出盡而安。

一婦人小產，瘀血未盡，勞動太早，小腹內外腫痛，月餘大便秘燥，小便澀滯，口燥咽乾，煩悶不睡。內醫調理其病日重。余偶往診之，脈數實而有力。謂曰：此腸癰已成也。用薏苡仁湯加大黃一服，下膿數碗，脹痛頓退。外腫堅硬不散，仍作掀痛。此餘膿尚欲外泄也。投以十全大補湯三服。十全大補湯徐勒批曰：蠻方膿脹痛而針之。

更服八珍湯加牡丹皮五味子。五味子徐入月餘而斂。
一婦人腹脹如鼓。臍突寸許。小水澀滯。轉側腹有水聲。
此內膿已成。用針刺臍上突頂。出膿盈許。服牡丹皮
散五六劑。其膿漸少。朝以八味丸。暮以八珍湯加澤
瀉牡丹皮黃耆破故紙。此一服之月餘而愈。

腸癰主治方

大黃湯 大黃湯中用朴硝 丹皮白芥共和調 加上桃仁水煎服 腸癰腹痛自然消

治腸癰小腹堅硬如掌而熱。按之則痛。肉色如故。或
掀赤微腫。小便頻數。汗出憎寒。脈緊實而有力。日淺

未成膿者。

大黃 炒 朴硝 各一錢 牡丹皮 白芥子 桃仁 去皮

尖各二錢

水二茶鍾。煎八分。食前或空心溫服。

徐曰。此實症主方。

活血散瘀湯 活血散瘀湯赤芍 瓜萸枳殼桃仁等 檳榔蘇木與芎歸 大黃加上粉丹皮

治產後惡露不盡。或經後瘀血作痛。或暴急奔走。或
男子杖後瘀血流注。腸胃作痛。漸成內癰。及腹痛大
便燥者。

川芎 歸尾 赤芍 蘇木 牡丹皮

枳殼 瓜萸仁去殼 桃仁去皮尖 檳榔六分

大黃酒炒二錢

水二茶鍾煎八分空心服渣再煎服。

徐曰即前方義。

牡丹皮散丹皮散內用參歸 薏苡茯苓共黃耆 甘草白芷川芎芍 桃仁官桂木香宜

治腸癰腹濡而痛以手重按則止或時時下膿。

人參 牡丹皮 白芍 茯苓 黃耆

薏苡仁 桃仁 白芷 當歸 川芎各一

錢 甘草 官桂各五分 木香三分

水二茶鍾煎八分食前服。

徐曰即前方義。

又曰王不留行冬瓜子全瓜萸枳殼穿山甲廣膠

槐米番木鱉阜茨蝎子俱可參用。

七賢散七賢散內淮山藥 萸肉丹皮熟地黃 茯苓參耆合成七 薑棗同煎理內傷

治腸癰潰後疼痛淋瀝不已或精神減少飲食無味。

面色萎黃四肢無力自汗盜汗睡卧不甯。

茯苓 山藥 牡丹皮 山茱萸 熟地

人參各一錢 黃耆二錢

水二茶鍾。煨薑三片。大棗二枚。煎八分。食前服。

徐曰。不切病。

失笑散 失笑散用五靈脂 加上蒲黃一味宜 醋調末服或丸服 瘀血諸痛均堪醫

治產後心腹絞痛欲死。或血迷心竅。不省人事。及尋常腹內瘀血。或積血作痛。又婦人血氣為病。作痛之聖藥也。及治男子諸疝疼痛不已者。

五靈脂 俱炒 蒲黃 等分

右為細末。每服三錢。醋一合。調稠。熬數滾。入水一茶

鍾。煎七分。食前連藥服。如用醋為丸。每服二錢。淡醋湯下。治前症亦妙。

徐曰。此非治腸癰之方。乃治婦人瘀血作痛之方也。

又曰。此消瘀血之要方。

相案此二味徐俱圈。

排膿散 排膿散內用黃耆 川芎山甲與當歸 銀花白芷瓜蒌等 防風加上效神奇

治腸癰小腹痛。脈滑數。裏急後重。時時下膿。

黃耆 當歸 金銀花 白芷 穿山甲

防風

川芎

瓜蒌仁

各一錢

蜜山甲

水二茶鍾煎八分食前服。或為末每服二三錢。食遠蜜湯調下亦可。

徐曰。此通利膿水之法。

瓜蒌子湯

瓜蒌子湯。薏苡仁。產後惡露併瘀血。

桃仁丹皮相共行。腸胃停滯用此清。

治產後惡露不盡。或經後瘀血停滯。腸胃作痛。縱非是癰。服之亦效。

薏苡仁

四錢

桃仁

牡丹皮

瓜蒌仁

各一錢

水二鍾煎八分。食前併空心服。

徐曰。後有薏苡仁湯。不必存此。

薏苡仁湯

薏苡仁湯。功力奇。桃仁加上瓜蒌子。

腸癰腹痛。總堪醫。更兼白芍與丹皮。

治腸癰腹中疼痛。或脹滿不食。小便澀滯。婦人產後多有此病。縱非癰。服之尤效。

薏苡仁

各三錢

瓜蒌仁

各三錢

牡丹皮

桃仁

去皮尖。各二錢。

白芍

一錢

水二茶鍾煎八分。空心服。

徐曰。此腸癰主方。與前方相同。

腸癰應用方

八珍湯

十全大補湯

八味丸

俱見潰瘍門

臟毒論第三十六

夫臟毒者。醇酒厚味。勤勞辛苦。蘊毒流注肛門。結成腫塊。其病有內外之別。虛實之殊。發於外者。多實多熱。脈數有力。肛門突腫。大便秘結。肚腹不寬。小水不利。甚者。肛門肉泛如籬。孔頭緊閉。此為外發。屬陽易治。宜四順清涼飲。內消沃雪湯。通利大小二便。痛甚者。珍珠散人中白散。搽之。膿脹痛者。針之。發於內者。屬陰虛。溼熱滲入肛門。內臟結腫。刺痛如錐。小便淋瀝。

大便虛秘。咳嗽生痰。脈數虛細。寒熱往來。遇夜尤甚。此為內發。屬陰難治。宜四物湯加黃柏知母天花粉甘草。兼以六味地黃丸調治。候內臟膿出則安。又有生平情性暴急。縱食膏粱。或兼補術。蘊毒結於臟腑。火熱流注肛門。結而為腫。其患痛連小腹。肛門墜腫。二便乖違。或瀉或秘。肛門內蝕。串爛經絡。汙水流通。大孔飲食不滄。作渴之甚。犯此未有見其生者。又有虛勞久嗽。痰火結腫。肛門如粟者。破必成漏。瀝盡氣血必亡。徐曰亦非不治之症。調養氣血無害。此二症乃內傷之故。非藥

夕和...卷八
九
可療不必強治也。

臟毒看法

初起腫痛。紅色光亮。疼痛有時。肛門不墜。便和者順。已成掀赤腫痛。發熱不渴。小便不數。展轉自便者順。已潰膿稠。色鮮不臭。掀腫漸消。疼痛漸減。能食者順。潰後膿水漸止。新肉易生。不疼多癢。瘡口易乾者順。初起堅硬。漫腫。內臟閉痛。小便頻數。大便秘結者險。已成疼痛日甚。腫連小腹。肛門閉緊。下氣不通者重。已潰臭水淋漓。疼痛不減。腫仍不消。身熱唇焦者逆。

徐曰。看法同別症。

臟毒治法

初起寒熱交作。大便墜痛。脈浮數者。宜用輕劑解散。已成內熱口乾。大便秘結。脈沈實而有力者。當下之。肛門腫痛。常欲便而下墜作痛者。導溼熱。兼瀉邪火。肛門掀腫疼痛。小便澀滯。小腹急脹者。清肝利小水。出膿腥臭。疼痛不減。身熱者。養血健脾胃。更兼滲溼。膿水清稀。脾胃虛弱。不能收斂者。滋腎氣。急補脾胃。

徐曰。亦同別症。

臟毒治驗

夕和山卷八

一男子肛門腫突紅紫痛甚。投以內消沃雪湯二服。大便數次。疼痛稍減。腫突處以珍珠散清蜜調搽。早晚二次。其腫漸消。更以涼血地黃湯服之。全愈。

徐曰。此大腸偶成熱火之輕症。

一婦人產後用力太過。肛門墜腫。疼痛之甚。先以枳殼紫蘇煎湯熏洗。後以珍珠散加冰片豬背髓調搽。內以四物湯加升麻蒼朮丹皮枳殼服之。而消。

徐曰。產後脫肛與肛癰不同治。

一男子夏月好飲火酒。熱毒流入肛門。結腫堅硬。形色紫黑。墜痛便秘。用黃連解毒湯加大黃枳殼二劑。便通。疼痛稍止。又用四物湯合前湯數劑。其腫漸消。惟存粟大堅腫不散。以臟連丸服至月餘而愈。

一婦人肛門腫突堅硬。痛極。用攻利解毒藥。俱不應。以神燈照法照之。早晚二次。其疼方減。以蟾酥錠磨濃塗之。堅硬漸腐爲膿。仍服內消沃雪湯二劑。便通。疼痛減其大半。內服四物湯加黃柏知母厚朴蒼朮。外以珍珠散加冰片豬髓調搽。月餘而平。

一男子素有內痔。便血常欲脫肛。一朝肛門墜重不收。腫痛突起。光亮紫色。此溼熱流注結腫。故難收入。內服黃連除溼湯一劑。外用珍珠散加冰片清蜜調塗。腫痛漸減。後以補中益氣湯加生地黃連蒼朮花粉丹皮服至數劑。漸平。

徐曰。果係內痔。愈則復發。不除根也。

一監生素性急暴。每縱膏粱積毒。流於大腸。內如針刺。外肛不腫。常欲後重。便則秘結。診之脈空數而無力。此真氣不足。邪火有餘。內臟虧損症也。辭以不治。請

他醫用藥。月餘肛門內腐。敗水無禁。復請余視。余曰。決不可療。脈來虛數。邪勝正也。手掌不澤。脾氣敗也。至夜發熱。陰虛火旺。敗水無禁。幽門已壞。面若塗脂。此四字徐勒批元氣走散。鼻如煙煤。肺氣將絕。口乾舌燥。腎水已竭。豈有不死之理。他醫仍強用解毒滋陰藥。不效而死。

徐曰。此症從元氣虛竭而生。乃外科之內症。治法變化無窮。果能得法。尚可得生。尋常醫者非所能也。

臟毒主治方

黃連除溼湯

黃連除溼湯芩朴
防風甘草硝黃等

蒼朮芎歸枳殼翹
臟毒懸癰此可消

治臟毒初起溼熱流注肛門結腫疼痛小水不利大便秘結身熱口乾脈數有力或裏急後重。

黃連

黃芩

川芎

當歸

防風

蒼朮

厚朴

枳殼

連翹

甘草

大黃

朴硝

各二錢

水二茶鍾煎八分空心服。

徐曰。此臟毒之主方。惟大黃朴硝不宜輕用。

涼血地黃湯

涼血地黃湯連芎
茯苓花粉山梔草

生地芎歸朮地榆
加上人參可治虛

治臟毒已成未成。或腫或不腫。肛門疼痛。大便墜重。或泄或秘。常時便血。頭暈眼花。腰膝無力者。

川芎

當歸

白芍

生地

白朮

茯苓

各一錢

黃連

地榆

人參

山梔

天花粉

甘草

各五分

水二茶鍾煎八分。食前服。

徐曰。此方頗穩。

又曰。此治虛症為宜。然不甚切。

相案徐於此方後另疏枳殼槐米大黃槐角土貝
秦艽桃仁白芷瓜子九味蓋如前牡丹皮散例以
備參用者。

內托黃耆散

內托黃耆散芍歸
角針白朮檳榔等

川芎山甲共陳皮
臟毒將成此藥醫

治臟毒已成。紅色光亮。已欲作膿。不必內消。宜服此
藥潰膿。

川芎

當歸

陳皮

白朮

黃耆

白芍

穿山甲

皂角針

各一錢

檳榔

三分

水二茶鍾煎八分。食前服。

徐曰。此托膿之方。

相案穿山甲皂角針檳榔徐圈。

黃連解毒湯

見腫
瘍門

治平生好飲。縱食膏粱。積熱流入大腸。致肛門結成
腫痛。疼刺如鑽。堅硬如石。

金液戊土膏

見脫
疽門

治口腹習於奢侈。情性慣於急暴。烈火猖狂。思不如
願。水已枯竭。火不發泄。旺而又鬱。鬱而又旺。以致肛
門結腫。毒攻內臟。痛如芒刺。熾如火炕。臭水淋漓。生

命難望。宜服此藥。

珍珠散

見下疳門

治肛門腫泛如籬。紅紫急脹。堅硬痛極。本方加冰片。研極細。豬脊髓調塗。早晚日用二次。

臟毒應用方

六味地黃丸

見肺癰門

四順清涼飲

見湯潑火燒門

內消沃雪湯

神燈照法

蟾酥錠

俱見腫瘍門

四物湯

補中益氣湯

俱見潰瘍門

人中白散

珍珠散

俱見下疳門

臟連丸

見痔瘡門

痔瘡論第三十七

夫痔者。乃素積溼熱。過食炙博。或因久坐而血脈下行。又因七情而過傷。生冷以及擔輕負重。竭力遠行。氣血縱橫。經絡交錯。又或酒色過度。腸胃受傷。以致濁氣瘀血。流注肛門。俱能發痔。不論老幼男婦皆然。有生於肛門之內。有突於肛外之旁。大者若蓮花蜂巢。翻花雞冠菱角珊瑚等狀。小者如櫻珠鼠尾牛奶雞心核桃蜆肉之形。毒深者其形異而頑惡。毒淺者其

形正而平常。久則崩潰成漏。新則墜重刺疼。甚者糞從孔出。血從竅流。氣血日有所傷。形容漸有所削。若不早治。終至傷人。尋常多用針刀砒礪線壘等治法。

此句徐勒批曰誤治者多至傷生戒之

患者受之苦楚。聞此因循。都不

醫治。予療此症。藥味數品。從火煨煉。性即純和。百試百驗。凡療內痔者。先用通利藥蕩滌臟腑。然後用喚

痔散塗入肛門。

徐曰此亦良法。但亦須善用。非親傳恐無大效。

片時。內痔自

然泛出。即用蔥湯洗淨。搽枯痔散。早午晚每日三次。每次溫湯洗淨。搽藥。輕者七日。重者十一日。其痔自

然枯黑乾硬。痔邊裂縫流膿。停止枯藥。換用起痔湯。日洗一次。待痔落之後。換搽生肌散。或鳳雛膏等藥。生肌斂口。虛者兼服補藥。其口半月可完。外痔用消毒散煎洗。隨用枯痔散照內痔搽法用之。完口百日入房乃吉。至於穿腸久漏者。此則另有二方。亦具於後。患者服之。不用針刀挂線。效如拾芥。

痔瘡看法

初起形如牛奶。不腫不紅。無掀無痛。行走不覺者。輕。已成腫痛。有時遇勞而發。或軟或硬。頭出黃水者。輕。久如

外科正宗卷八
雞冠蜂窠蓮花翻花等狀。流膿出血不止者重。久漏竅通臀腿。膿水淋漓。疼痛不已。糞從孔出者逆。

痔瘡治法

初起及已成漸漸大而便澀作痛者。宜潤燥及滋陰。肛門下墜。大便出血。時或疼痛堅硬者。宜清火滲溼。紫色疼痛。大便虛秘。兼作癢者。涼血祛風。疎利溼熱。腫痛堅硬。後重墜刺。便出難者。外宜薰洗。內當宣利。內痔出血。登廁脫肛而難上收者。當健脾升舉中氣。便前便後下血。面色萎黃。心忪耳鳴者。宜養血健脾。諸痔欲斷其根。

必須枯藥。

四字徐圈

欲完其竅。必杜房勞。乃愈。

痔瘡治驗

一男子患痔六年。每遇酒色勞役。痔則發腫。堅硬疼痛。十餘日方得稍可。彼欲斷其根。以枯痔散敷上。至七日外。其痔漸黑裂縫。至十六日。痔枯脫落。孔若雞心。以生肌散逐日用之。內服養血健脾藥而愈。

一男子患痔。掀腫作痛。大便結燥。脈數有力。投以內疏黃連湯二服。便行痛止。又服四物湯加芩連枳殼花粉數劑而腫消。更服臟連丸一料而不復發。

徐曰。此輕病也。

一男子患痔。遇勞則發。腫作痛。外以枳殼湯熏洗。內服防風秦艽湯數劑。腫痛俱減。令彼煎湯常洗。每日五六次。又與六味地黃丸加黃柏知母服之。不發。

一男子好飲多慾。內痔虛墜下血。服四物湯加芩連升麻葛根數服。虛墜乃止。又服當歸郁李仁湯二劑。痔腫亦消。更服臟連丸月餘。便血亦止。兼節酒色。遂不發。大抵醉飽入房。經脈橫解。精氣一泄。脈絡必虛。酒食之毒。乘虛流結。或淫極強。固精氣。以致敗精濁血。

遂傳大腸。又或飲食厚味。燥溼流注。俱成斯疾。所受病者。燥氣也。為病者。溼氣也。初宜瀉火和血。潤燥疏風。久宜養血滋陰。健脾滲溼。自愈。若不節酒色。不慎起居。不戒口味。破必成漏。久則穿腸串臀。穢從孔出。臭水淋漓。雖不傷生。每苦瘵汗。可為歎息。

一男子患痔十餘年。頭已穿潰。未至通腸。每發疼痛。以三品一條槍插至七日。

此十字徐勒批曰。此法不如枯痔為妥。

痔變黑

色瘡邊漸漸裂縫。至十五日脫落。以鳳雛膏搽至半月。口斂而平。

一男子怯弱。內痔便血。面色萎黃。自服涼血止血藥不
應。診之。脾脈虛而無力。此中氣不足。不能統血。服補
中益氣湯十餘劑。精神頓倍。便血亦止。又以加味四
君子湯兼前湯間服月餘不發。大抵此症所致之由
不同。當究其因治之。如元氣有餘。形黑氣盛。先糞而
後紫血。更兼脈實有力者。此屬有餘。用涼血止血藥
自效。至若形體瘦弱。面色萎黃。先鮮血而後糞。更兼
脈虛無力者。此屬不足。豈可反用涼藥止之。致傷脾
胃。此人脈症。若不溫中健脾。升舉中氣。則其血不得

歸原。安能取效。

痔瘡主治方

防風秦艽湯

防風 秦艽 湯 芍 歸 地黃 槐角 檳 翹 枳

榆 芎 赤 苓 兼 山 梔 白 芷 甘 草 蒼 朮 宜

治痔瘡不論新久。肛門便血。墜重作疼者。

防風

秦艽

當歸

川芎

生地

白芍

赤茯苓

連翹

各一錢

檳榔

甘草

梔子

地榆

枳殼

槐角

白芷

蒼朮

各六分

水二茶鍾煎八分。食前服。便秘者加大黃二錢。

徐曰服藥不外此方。但久痔非煎藥所能治。

楣案地榆枳殼槐角徐圈。

提肛散

提肛散內用芎歸升柴芩連併白芷

人參白朮生黃耆還有甘草和陳皮

治氣虛肛門下墜及脫肛便血脾胃虛弱等症。

川芎

歸身

白朮

人參

黃耆

陳皮

甘草

各一錢

升麻

柴胡

黃芩

黃連

白芷

各五分

水二茶鍾煎八分食遠服。

徐曰亦有用處。

加味四君子湯

加味四君子湯朮扁豆還同薑棗煎

參苓甘草黃耆炙痔漏脾虛均可啜

治痔瘡痔漏下血不止面色萎黃心忪耳鳴腳弱氣

乏及一切脾虛口淡食不知味又治中氣虛不能攝

血致便血不禁者。

人參

白朮

茯苓

白扁豆

黃耆

炙

甘草

炙各一錢

水二茶鍾薑一片棗二枚煎八分食前服。

徐曰不切病。

當歸郁李湯

當歸郁李湯生地麻仁枳實併蒼朮

大黃澤瀉共秦艽皂角相兼功最饒

下斗正宗卷八 痔瘡

三

治痔大便結燥。大腸下墜出血。苦痛不能忍者。

當歸 郁李仁 澤瀉 生地 大黃

枳實 蒼朮 秦艽 火麻仁 各一錢 研一錢 五分

阜角 一錢

水二茶鍾煎八分。空心服。

芎歸湯

芎歸湯內川芎歸婦人產後虛煩熱

失血虛羸服最宜眩暈盜汗並堪施

治便血。或失血過多。兼婦人產後血虛煩熱。頭眩昏

暈盜汗等症。

川芎 三錢

當歸

酒拌五錢

水二茶鍾煎八分。食前服。自汗手足冷者。加人參二

錢。

徐曰。不切病。

三黃二地湯

三黃二地湯兼甘草人參防風

厚朴陳皮白朮歸地榆澤瀉共烏梅

治腸風諸痔。便血不止。及面色萎黃。四肢無力。

生地 熟地 各二錢 半 蒼朮 厚朴 陳皮

黃連 黃柏 黃芩 歸身 白朮

人參 各一錢 甘草 血脈 防風 藥 澤瀉 聚 地榆 各六

水二分 烏梅 二錢

水二茶鍾煎八分食前服。

徐曰此方乃痔血通治之藥。荷葉蒂粟殼亦可採

入。

楣案黃連地榆烏梅徐圈。

粟殼散

粟殼散內用歸者參芩厚朴陳皮草

二地升蒼黃柏宜荷蒂秦艽地骨皮

治諸痔作疼及腸風下血諸藥不止者。

粟殼

溫湯泡去內穰去蒂切絲蜜水拌炒二錢

當歸

陳皮

秦艽

黃耆

生地

熟地

各一錢

黃柏

黃芩

人參

蒼朮

厚朴

升麻

各六

分

荷葉蒂

七箇

甘草

五分

地骨皮

一錢二分

水二茶鍾煎八分食前服。或為細末。每服二錢。空心

溫酒調服。

徐曰與前相同。

洗痔枳殼湯

洗痔枳殼湯枳殼用此煎湯洗痔瘡

癩蝦蟆草二味足無論新久俱消縮

治痔瘡腫痛肛門下墜無論新久洗之腫自消。

枳殼

二兩

癩蝦蟆草

一名荔枝草四季常有面青背白麻紋纍纍者是二兩

河水三大碗。同上二味煎數滾。先薰後洗。良久再將

湯煎熱薰洗。甚者三次即消。洗淨當搽後藥。

徐曰。外治之法。

五倍子散

五倍子散。蝦蟇草。加上輕粉。冰片好。痔瘡腫痛及墜疼。用之。糝上跡如掃。

治諸痔舉發堅硬疼痛難忍。或臟毒肛門泛出腫硬不收。五倍子大者。敲一小孔。用陰乾癩蝦蟇草揉碎。填塞五倍子內。用紙塞孔。溼紙包煨。片時許取出。待冷去紙。碾為細末。每一錢。加輕粉三錢。冰片五釐。共研極細。待前湯洗後。用此乾搽痔上。即睡勿動。其腫痛即除。凡外痔用二方搽洗。亦可除根。永不再發。極效極效。

徐曰。亦外治之法。

田螺水

田螺水用田螺一脫肛諸痔久難愈。冰片加之水。自生將來一掃。效如神。

治痔瘡堅硬作痛及脫肛腫泛不收者。以大田螺一枚。用大冰片五釐研末。用尖刀挑起螺蓋。將冰片入內。平放片時。待螺滲出漿水。用雞翎蘸搽患上。勤勤掃之。其腫痛自然消散。

徐曰。熱痔用此外治。

喚痔散

喚痔散。煨刺蝟皮。草烏鹽麝搗如泥。枯礬冰片同研末。津唾調搽痔出齊。

凡醫內痔不得出。用此藥填入肛門。其痔即出。

草烏生用一錢刺蝟皮一錢燒存性枯礬五錢食鹽炒三錢

麝香五分冰片二分

右碾細末先用溫湯洗淨肛門。隨用津唾調藥三錢。填入肛門。片時痔即當出去。藥上護痔膏。

徐曰以後四方連用。

護痔膏護痔膏中用白芨黃連石膏共研末冰麝還須加一分雞蛋清調功最烈

用喚痔散痔出之後先用此藥圍護四邊好肉。此六字徐

圈

白芨 石膏 黃連各二錢 冰片 麝香各一

分

共研細末。雞蛋清調成膏。護在四邊好肉。方上枯痔散。

枯痔散枯痔散內用白礬再加童子天靈蓋 蟾酥輕粉白砒參

凡痔瘡泛出。即用此藥塗之。年淺者五七日。年深者八九日。待痔乾黑後。不用此藥。每日用落痔湯洗之。

白礬二兩 蟾酥二錢 輕粉四錢 砒霜一兩徐日金頂砒為妙

天靈蓋此物徐入批日此藥傷天和不可用去之換他藥

共研極細末。入小新鐵鍋內。上用粗瓷碗密蓋。鹽泥

封固炭火煨至二炷京香待冷取開將藥研末搽痔
上每日辰午申三時用溫湯洗淨上藥三次上至七
八日其痔枯黑堅硬住藥裂縫待其自落換洗起痔
湯。

徐曰天靈蓋斷不可用其方甚多選用可也。

起痔湯

起痔湯中芩柏連
防風甘草山梔等

大黃荆芥苦參兼
朴硝槐角共相煎

治諸痔上枯藥之後黑色堅硬裂縫宜此藥洗。

黃連

黃柏

黃芩

大黃

防風

荆芥

梔子

槐角

苦參

甘草

各一

兩

朴硝 五錢

已上藥分作三次用水煎洗待痔落之後換搽生肌

散。

生肌散

生肌散乳香沒藥
赤石脂輕粉熊膽

海螵蛸龍骨黃丹
珍珠麝香冰片須參

治痔上枯藥之後脫落孔竅不收者宜用此糝。

乳香

沒藥

各一兩

海螵蛸

水煮五錢

黃丹

飛炒四錢

赤石脂

煨七錢

龍骨

煨四錢

血竭

三錢

熊膽

四錢

輕粉

五錢

冰片

一錢

麝香

八錢

珍珠

煨二錢

共研極細末。瓷罐收貯。早晚日糝二次。蓋膏漸斂而

平。

徐曰。此生肌法。更有佳者。

洗痔腫痛方

洗痔腫痛方法高。還有瓦花馬齒莧。

苦棟魚腥草朴硝煎湯薰洗痔疼消。

魚腥草

苦棟根

朴硝

馬齒莧

瓦松花

各一兩

水五大碗。煎三碗。先薰後洗。諸痔腫痛可消。

徐曰。此外治法。

楣案魚腥草徐圈。

人中白散

見牙疳門

治諸痔腫痛堅硬墜重脫肛等症。先用溫湯洗淨。隨後搽藥。即卧勿動。其腫痛漸減。

三品一條槍

見瘰癧門此方徐入

治十八種痔漏。用藥線插入痔孔內。早晚二次。初時每次插藥三條。四日後每次插藥五六條。至七八日藥力滿足。痔變紫黑。方住插藥。候痔四邊裂縫流膿。至十四日期滿。痔落。用甘草湯洗淨。換搽鳳雛膏。或玉紅膏。俱可生肌收斂。虛弱者兼服養血健脾之藥。徐曰。此不可用。近世惡醫殺人無數。

又曰。用以枯痔。已令人大痛無聲。況治他瘡。無不哀號求死。毒入攻心。

生肌鳳雛膏

生肌雞卵鳳雛膏
血竭同熬傾入盞

輕粉乳香龍骨調
雞毛塗上效堪操

用雞蛋煮熟去白。用黃十餘個。銅杓內熬油。傾入盞內。約油三錢。加輕粉細末一錢。乳香血竭龍骨末各五分。共入油內和勻。每日早午晚雞翎蘸塗孔內。膏蓋避風。深者半月可以完口。

徐曰。此膏用處極多。

煮線方

煮線方中用壁錢
白絲扣線投湯內

芫花二味共相煎
諸痔瘻瘤用此痊

治諸痔及五癭六瘤。凡蒂小而頭面大者。此入字用

此線纏繫其根。

芫花

錢五

壁錢

錢二

用白色細扣線三錢。同上二味。用水一碗。盛貯小瓷罐內。慢火煮至湯乾為度。取線陰乾。凡遇前患。用線一根。患大者二根。雙扣繫于根蒂。兩頭留線。日漸緊之。自然紫黑冰冷不熱。輕者七日。重者十五日。後必枯落。後用珍珠散收口。至妙。

徐曰。凡氣血不到惡症可用。否則恐有害。

臟連丸 臟連丸內用黃連 灌入公豬大臟煎

治痔無論新久。但舉發便血作痛。肛門墜重者。黃連

淨末八兩。用公豬大臟盡頭一段。長一尺二寸。溫湯

洗淨。將黃連末灌入臟內。兩頭以線扎緊。用生酒二

斤半。砂鍋內煮酒將乾為度。取起臟藥。共搗如泥。如

藥爛。再晒一時許。復搗丸如桐子大。每服七十九。空

心溫酒送下。久服除根。

徐曰。實火可用。

胡連追毒丸 胡連追毒丸甚奇 痔漏通腸此可醫

治痔漏不拘遠年近日。有漏通腸。污從孔出者。先用

此丸追盡膿毒。 此四字 服後丸藥自然取效最穩。

胡黃連 一兩切片 薑汁拌炒 刺蝟皮 二兩炙切片 再炒黃為末 麝香 二分

軟飯為丸。麻子大。每服一錢。食前酒下。服藥後膿水

反多是藥力到也。勿懼。

徐曰。一方有山甲槐米。

楣案胡黃連刺蝟皮二味徐圈。

黃連閉管丸 胡連閉管藥四般 不用針刀不苦難

胡黃連 淨末 穿山甲 麻油內 石決明 煨

槐花 微炒各末五錢

煉蜜丸如麻子大。每服一錢。空心清米湯送下。早晚日進二服。至重者四十日而愈。此方不用針刀挂線。不受苦楚。誠起痼疾之良方也。如漏之四邊有硬肉突起者。加蠶繭二十個炒末。和入藥中。凡徧身諸漏亦效。

楣案石決明徐圈。

痔瘡應用方

內疎黃連湯 見腫瘍門 補中益氣湯 俱見潰瘍門 四物湯

六味地黃丸 見肺癰門

下疳論第三十八

下疳者。邪淫慾火鬱滯而成。其來有三。一由男子慾念萌動。陽物興舉。淫火猖狂。而未經發泄。以致敗精濁血。流滯中途。結而為腫。初起必小便澀淋作痛。次流黃濁。敗精。陽物漸損。甚則腫痛腐爛。法當疎利肝腎。邪火。如入正散。清肝導滯湯之類是也。二由婦人陰器。瘀精濁氣未淨。便與交媾。以致淫精傳襲而生。初起皮腫光亮。甚如水晶。皮破流水。腫痛日生。癢麻時

外科正宗卷八
發治當解毒消風。龍膽瀉肝湯兼平胃散合而用之。
三由房術熱藥塗抹玉莖。洗搽陰器。興助陽火。煽動
陰精。僥倖不衰。久頓不泄。以致火鬱未發而成。初起
陽物癢痛。堅硬紫色。疙瘩漸生。腐爛漸作。血水淋漓。
不時興舉。治當瀉火解毒。如黃連解毒湯。蘆薈丸之
類是也。外治之法。皆以銀粉散。珍珠散。人中白散。選
用。又有先發時瘡。悞用薰條擦藥。結毒於此者。詳註
結毒門。

六下疳看法

初起不紅不腫。睡不舉陽。玉莖微損。小水自利者。輕。已
成微熱微腫。皮色光亮。小便赤色。更兼白濁者。平。已損
肉色紅活。掀無堅腫。小便不疼。大便不秘者。順。初起小
便淋漓。次損陽物。堅硬作疼。腐爛漸開者。險。已成腐潰
內攻。傷損玉莖。色紫無膿。疼如針刺者。重。

下疳治法

初起腫痛發熱。小水澀滯。肝經溼熱也。宜瀉肝滲溼。腫
痛堅硬。掀發寒熱。口燥咽乾。大便秘者。通利二便。玉莖
腫痛。小便如淋。自汗盜汗。時或尿血者。清心滋腎。莖竅

外科正宗卷八
三
作癢時出白濁發熱口乾津液少者益腎清心潰後腫痛小便赤澀日則安靜夜則疼甚者滋陰瀉火潰爛不已腫硬又作疼痛日深穢氣不回者清肝解毒
徐曰與諸症同。

下疳治驗

一童子十五歲玉莖腫痛外皮浮腫粗大一倍他醫治之以解毒清肝等藥愈腫愈痛予用瀉火清熱滲溼等劑亦不見效診其脈細數而無力知爲中氣不足脾經溼水乘虛流注停聚不散當行從治法也用四物湯合平胃散加木香熟附子人參各五分一服腫痛頓退四五服而全消。

徐曰二方合一不通已極其有效者藥未嘗與病相反亦能奏功但無法度爲可笑耳譬如烹炮食物魚肉菜飯并作一碗豈成庖人乎然食之亦能飽也惟不可食之物雖烹炮得法亦能害人。

一男子腫痛發寒熱用荆防敗毒散二服而退又服龍膽瀉肝湯腫痛亦減更服四物湯加黃柏知母而消。
徐曰此小疾不足立案此類甚多俱可刪。

一男子年四十。色慾過度。小便澀痛。出如白漿。結煉成塊。此腎傷溼熱為患。朝以八味丸。八味丸 徐入午用八珍湯加山萸牡丹皮黃柏知母服之。徐曰八珍湯內月何得加此等物餘而澀腫退。小便漸清。但竅中常有滑精。不時滲出。久致腰彎脚膝無力。偶用三因勝駿丸。服至月餘。前症悉愈。

一男子莖頭腐爛。小水澀痛。外糝珍珠散。內服木通湯四劑。澀痛漸止。更服四物湯加黃柏花粉而痊。
徐曰。此似下疳初起。

一男子初婚。玉莖傷損。出血疼甚。先以葱湯浸洗良久。隨用珍珠散加冰片糝之。腐皮漸乾。痛亦漸止。內服四物湯加木通山梔。四劑而愈。

一男子皮腫光亮。發熱疼甚。外敷如意金黃散。內服龍膽瀉肝湯加大黃。便痛稍愈。去大黃。再服而消。
徐曰。以上諸條。並非真下疳症。真下疳當用靈妙

糝藥。

下疳主治方

清肝導滯湯 清肝導滯湯瞿麥 滑石甘草併扁蓄 大便若秘加大黃 燈心為引空心服

治肝經溼熱。玉莖腫痛。小水澀滯。作疼者。

扁蓄四錢 瞿麥一錢 滑石二錢 甘草一錢 大黃二錢

加便秘

水二茶鍾。燈心二十根。煎八分。空心服。

徐曰。此利水之方。即入正散少三味。可刪。

又曰。凡大黃同滑石共服。則專走小便而不作瀉。

龍膽瀉肝湯 龍膽瀉肝湯木通 地黃澤瀉車前子 溼用黃連秘大黃 芩梔翹草當歸尾

治肝經溼熱。玉莖患瘡。或便毒懸癰。小便赤澀。或久

潰爛不愈。又治陰囊腫痛。紅熱甚者。

龍膽草 連翹 生地黃 澤瀉 各一錢 車前子

木通 歸尾 山梔 甘草 黃連

黃芩 各五分 大黃 一錢 秘加

水二茶鍾。煎八分。食前服。

徐曰。凡瀉下焦溼火之藥。不外諸味。但與下疳不

甚切。

梔案龍膽草澤瀉山梔黃連大黃徐圈。

清肝滲溼湯 清肝滲溼二朮功 芩朴昆陳粉木通 山梔澤瀉瀉川芎等 木香甘草當歸同

治陰囊玉莖溼腫如豬肚。小水不利。墜重作痛。

命蒼朮 王莖 白朮 茯苓 木 山梔 厚朴

澤瀉 陳皮 木通 天花粉 昆布 各一

錢 甘草 五分 木香 三分 黃川芎 當歸 各六分

作熱紅色加黃連龍膽草 各七分

水二茶鍾煎八分空心服

徐曰此泛治方

清心蓮子飲 清心蓮子飲黃耆 赤茯苓人參地骨皮 黃芩甘草併澤瀉 麥冬加上水煎宜

治心經蘊熱小便赤澀玉莖腫痛或莖竅作疼及上

盛下虛心火炎上口苦咽乾煩躁作渴或虛陽口乾

小便白濁夜則安靜晝則發熱者

石蓮肉 黃耆 黃芩 赤茯苓 人參 各一

錢 炙甘草 澤瀉 麥門冬 地骨皮

各五分

水二茶鍾煎八分空心併食前服

徐曰此通治清心火之方亦與下疳不切

八正散 八正散中用木通 車前瞿麥大黃同 扁蓄山梔併滑石 加之甘草有殊功

治肝經積熱小便淋閉不通及一切淋病

大黃 車前子 瞿麥 扁蓄 山梔

木通

甘草

各一錢

滑石

二錢

水二茶鍾煎八分食前服。

徐曰。此利水主方。亦非治下疳藥。

解毒木通湯

解毒木通湯柏連瞿麥滑石知母草

膽草山梔蘆薈全還用燈心作引煎

治男婦房術熱藥所傷致玉莖陰戶癢痛小水澀滯。

白濁滑精。至夜陽物興舉不得眠者。

木通

黃連

龍膽草

瞿麥

滑石

山梔

黃柏

知母

各一錢

蘆薈

甘草

各五分

水二茶鍾。燈心二十根煎八分。食前服。

徐曰。同前意。

蘆薈丸

蘆薈丸中用二連青皮麝木香同等

蕪荑鶴蝨共雷丸餅糊丸服病安痊

治下疳潰爛作痛。又治婦人陰蝕瘡作癢。及小兒肝

積發熱。口鼻生瘡。牙齦蝕爛等症。

胡黃連

黃連

蘆薈

白蕪荑

青皮

白雷丸

鶴蝨草

各一兩

麝香

一錢

木香

三錢

右為末。蒸餅糊丸如麻子大。每服一錢。空心清米湯

送下。

徐曰。此殺蟲之方也。內有溼熱生蟲者宜服。

楣案胡黃連蘆薈白蕪黃白雷丸鶴蝨草徐圈。

銀粉散

銀粉散用錫化開去砂留錫更投汞

硃砂研末攪成堆杭粉輕粉隨後攪

治下疳母論新久。但腐爛作痛及楊梅瘡薰後結毒。

玉莖腐爛。或陽物半傷半全者。好錫六錢化開。下硃

砂末二錢攪炒。砂枯去砂留錫。再化開。投水銀一兩

和勻。傾出聽用。杭粉一兩研細。鋪夾紙上。捲成一條。

一頭點火。煨至紙盡為度。吹去灰。用粉與汞錫同煎。

加真輕粉一兩。共成一家。研細。凡遇前患。先用甘草

湯淋洗。泥乾。隨用此藥。糝上。止痛生肌。收斂。極妙。

徐曰。此殺蟲收溼糝藥。或加寒水石礪砂。

珍珠散

珍珠散效實堪誇諸腫諸瘡諸痛腐

輕粉還兼缸子花用之一糝自然瘥

治下疳皮損腐爛。痛極難忍。及諸瘡新肉已滿。不能

生皮。又湯潑火燒。皮損肉爛。疼痛不止者。

青缸花

五分如無用頭刀靛花輕虛色翠者代之終不及缸花為妙

珍珠

一錢不論大小以新白為上入豆腐內煮數滾研至極細無聲方用

真輕粉

一兩

右三味。共研千轉。細如飛麪。方入罐收。凡下疳初起。

外科正宗卷八
皮損。搽之即愈。腐爛疼痛者。甘草湯洗淨。豬脊髓調搽。如諸瘡不生皮者。用此乾糝。即可生皮。又婦人陰蝕痛。或新嫁內傷痛甚者。亦可搽此。極效。湯潑火燒痛甚者。用玉紅膏調搽之。

徐曰。輕淡之品。

疔瘡簡便方

用油透羅緞舊帽沿燒灰。杭粉瓦上煨黃色。各等分。共研極細。瓷罐收貯。先用紅棗十五枚。甘草三錢。煎湯溫洗患上。泥乾搽藥。即效。

太乙膏

見腫瘍門

治玉莖皮損。疼痛不止者。用此貼之。其疼即止。

下疳應用方

四物湯

八味丸

此方徐勒

八珍湯

俱見潰瘍門

三因勝駿丸

見附骨疽門

魚口便毒論第三十九

夫魚便者。左爲魚口。右爲便毒。總皆精血交錯。兩胯合縫之間。結腫是也。小腹之下。陰毛之傍。結腫。名曰橫疔。又名外疔。是也得之入房。忍精強固不洩。或慾念

外科正宗卷八
已萌。停而不遂。以致精血走動凝滯。結而爲腫。治當散滯行瘀。通利大小二便。九龍丹山甲內消散是也。七日已後服之。根本堅固。恐其作膿。宜用火針法刺之。亦妙。已出膿者。服十全大補湯。庶易收斂。遲則恐生別症難愈。

魚口便毒看法

初起結腫不紅微熱。行走利便。無寒熱交作者。輕。已成紅赤腫痛。發熱掀疼。舉動艱辛。至夜尤甚者。順。已潰膿稠。肉色紅活。腫消痛止。新肉易生。作癢者。順。初起結腫堅硬如石。牽強刺疼。起坐不便。寒熱者。重。已潰腐爛。腫痛不減。膿水清稀。孔深口大不斂者。險。

魚口便毒治法

初起漫漫結腫疼痛。兩胯牽強。身發寒熱。宜散表邪。已成堅硬。發熱疼痛。內熱口乾。大小便秘。宜通利之。發散疎利之後。腫痛仍作。欲作膿。宜用托裏消毒散。掀腫發熱。疼痛日久。急脹若甚。內膿已成。宜急開之。已潰之後。膿水不乾。新肉生遲不斂。宜健脾胃。補氣血。

徐曰。看法治法。與諸症同。

魚口便毒治驗

一男子左胯腫痛。身發寒熱。脈弦而數。用人參敗毒散一劑。表症悉退。次用山甲內消散二劑而痊。

徐曰。此初起輕症。

一男子橫痃腫痛堅硬。二便澀滯。以九龍丹一服通利大便。腫痛稍減。間日又用一服。二便通利而消。

一男子患此十餘日。形勢已成。腫痛日甚。因公事急欲出而不能行。以火針法針之。出紫血鍾許。外用膏貼。拔出微膿。服托裏消毒散而可行。且速愈。

徐曰。此是實症。

一男子潰而口大不斂。此先時泄藥之過也。用十全大補湯加澤瀉丹皮十餘劑。外搽玉紅膏。月餘而斂。

一男子先出疔瘡。久而不愈。後發橫痃。十餘日始覺腫痛。余欲托裏潰膿以泄毒氣。彼欲內消。自服槐花酒。

蜈蚣全蝎等藥。

蜈蚣全蝎徐入

腫未得消。元氣已損。轉致筋

骨疼痛。舉動艱辛。仍請余治。形體瘦弱。脈虛而數。此真氣受傷。邪氣隨入。雖宜補養。必發時瘡。乃愈。彼不之信。仍服敗毒消風等藥。元氣愈虛。飲食不進。筋骨

疼甚徹夜不睡。又復請治。先用補中益氣湯補中益氣湯徐

勒倍參耆六服。元氣稍醒。惟疼不大減。此內虛瘡毒

下陷之故。朝服六味丸。午用十全大補湯。十餘服。徧

身方發紅點。此瘡毒欲出。仍服前藥。紅點漸高。始成

瘡形。瘡毒一出。疼痛頓減。元氣漸復。更服八珍湯八珍

湯徐勒。加米仁銀花土茯苓。服至半年。方得漸愈。彼悔

執方治病之誤。始信因病用方之妙。

徐曰。一味蠻補。自然難愈。

又曰。凡外症用補中益氣八味六味十全大補諸

內科之方。其藥味全與外科無涉者。皆薛立齋之惡習也。此老全不知醫。而竊當時之盛名。死有餘辜。

魚口便毒主治方

山甲內消散

山甲內消散大黃黑牽牛與甘草節

當歸用梢蠶用僵土鼈太寒須熟商

治魚口便毒騎馬癰橫痃等症。初起未成膿者。

當歸梢 甘草節

大黃

各三錢

穿山甲

炒三錢

僵蠶

黑牽牛

各一錢

土木鼈

三箇徐曰此味太寒不可輕用

水酒各一碗。煎八分。空心服。渣再煎服。大便行三四

次方喫稀粥淡味飲食為妙。

徐曰此便毒之主方。但藥味太烈宜酌用。

又曰此症堅硬難消。故用藥宜重。

楣案大黃穿山甲黑牽牛土木鱉徐圈。

九龍丹

九龍丹用茶血竭生蜜為丸酒下之

巴豆木香兼乳沒便毒橫疔滅無跡

治魚口便毒騎馬癰橫疔初起未成膿者。

兒茶

血竭

乳香

沒藥

木香

巴豆

油不去

右各等分為末。生蜜調成一塊。瓷盒盛之。旋丸寒豆

大。每服九丸。空心熱酒一杯送下。行四五次。方喫稀

粥。腫甚者。間日再用一服自消。

徐曰。巴豆必當去油。亦不宜輕用。

紅花散瘀湯

紅花散瘀湯蘇木歸尾大黃角針等

翹貝僵蠶乳決明牽牛山甲酒煎行

治入房忍精強固不泄。以致瘀精濁血凝結兩胯。或小腹之旁。結成腫痛。小水澀滯者。

當歸尾

阜角針

紅花

蘇木

僵蠶

連翹

石決明

穿山甲

乳香

土貝

各一

錢

大黃

三錢

牽牛

二錢

水酒各一碗煎八分空心服行五六次方喫稀粥補之。

徐曰義同前

楣案阜角針蘇木石決明乳香土貝徐圈。

黃耆內托散

黃耆內托散芎歸花粉角針與甘草

白朮銀花澤瀉隨魚口便毒此能醫

治魚口便毒橫痃等症已成不得內消者

川芎

當歸

黃耆

各二錢

白朮

金銀花

天花粉

阜角針

各一錢

甘草

澤瀉

各五分

水二茶鍾煎八分食前服

徐曰法重出

楣案全生集載橫痃生于小腹兩旁大腿界中形

如腰子皮色不異硬如結核按之微痛五月初旬

取新鮮角刺數斤搗爛入鍋煮湯湯濃瀝出易水

再煮二三度出渣將汁共歸一鍋慢火煎至成膏

日取二錢同糯米煮粥日食可消如無新鮮角刺

取乾者六錢為末布袋同糯米煮粥食亦可或以

控涎丹三分淡薑湯日送三次全愈乃止大忌開

刀開則刀口無膿惟出白膩漿三百日內死自潰

者亦然。

玉紅膏

見潰瘍門

治魚口便毒橫痃。腐潰口不合者。用此搽之。

火針法

火針之法。勝服藥。刺入瘡根。膿血行。

針蘸桐油。火上灼。腫消痛止。成歡樂。

治魚口便毒橫痃等症。用行藥不得內消者。用粗線針二條。將竹筯一頭劈開。將針離分半許。夾在筯頭內。以線扎緊。用桐油燈盞內貯之。燈草五根。排入油內。點著。將針蘸油燒紅。向患頂重手刺入五六分。隨出或血或膿。以膏蓋貼。即得輕便。以後漸愈。虛者兼

服十全大補湯完口。

徐曰。血寒氣壯人方可用。膏梁虛弱人不宜。

相案血寒疑是血實之誤。然所見鈔本皆作寒。今仍之。

魚口便毒應用方

托裏消毒散

見腫瘍門

十全大補湯

補中益氣湯

八珍湯

俱見潰瘍門

六味地黃丸

見肺癰門

外科正宗卷八終



