

名醫類案卷九

淋閉

秘結

黃疸

癰癧

風痺

癟風

癰腫

龐贅

癰

腫瘻

翻花癟

疔瘻

瘻

四

名醫類案卷第九

新都篁南江瓘集

後學

錢塘魏之琇玉橫
仁和沈煥敷曾重校

欵

鮑廷博以文

淋門

壺仙翁治瓜州趙按察病腹脹不能食溲遺血衆醫以爲熱下以大黃之劑神乏氣脫而不能寐召翁診其脈告曰病得之勞傷心血久則脾胃俱受傷耳所以知按察之病者切其脈左寸沉右寸過左一倍兩關弦濶尺反盛蓋煩勞不勝則逆鬱而不通不通則不能升降而作腹脹腹脹則

不食肉沸而不下。則關橐閉而溲且不輸。故溲遺血。乃和

以八補之劑。兼五鬱之藥。不數日而愈。越三月復作。如前

治立除。

此案重見第
四卷腫脹門

陝人高文病淋一日。口噤厥逆。

見症奇一日之淋而口噤厥逆耶

他醫以爲

風翁曰誤矣。此熱客膀胱。故難溲耳。投以八正散二服而溲大行。病且愈。所以知文之病者。診其脈尺沉而大。按之而堅。知病之在下也。膀胱者津液之府。氣化則能出。此蓋由於熱淋而更接內。故移熱於膀胱而使溲難也。

東垣治一人病小便不利。目睛突出。腹脹如鼓。非鼓脹因小便不出而脹膝以上堅硬皮膚欲裂。飲食且不下。服甘淡滲泄之藥皆

不效李曰疾深矣非精思不能處思之半夜曰吾得之矣
內經有云膀胱者津液之府必氣化乃能出焉今服淡滲
之藥而病益甚者是氣不化也啟元子云無陽則陰無以
生無陰則陽無以化甘淡氣薄皆陽藥獨陽無陰其欲化
得乎明日以滋腎丸羣陰之劑投之再服而愈方見丹溪

長安王善支病小便不通漸成中滿腹大堅硬如石壅塞之
極腿脚堅脹裂出黃水雙睛凸出晝夜不得眠飲食不下
獨爲關痛苦不可名狀伊戚趙謙甫詣李求治視歸從夜至
旦耿耿不寐究記素問有云無陽則陰無以生無陰則陽
無以化又云膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣

此病小便癃閉。是無陰而陽氣不化也。凡利小便之藥皆淡味滲泄爲陽止。是氣藥陽中之陰。非北方寒水陰中之陰所化者也。此乃奉養太過。膏粱積熱。損北方之陰。腎水不足。膀胱腎之室久而乾涸。小便不化。火又逆上而爲嘔。嘔非膈上所生也。獨爲關非格病也。潔古云。熱在下焦。填塞不便。是關格之法。今病者內關外格之病悉具。死在旦夕。但治下焦可愈。隨處以稟北方寒水所化大苦寒之味者。黃柏知母桂爲引用。丸如桐子大。沸湯下二百丸。少時來報。服藥須臾。如刀刺前陰火燒之痛。溺如瀑泉湧出。卧具皆濕。床下成流。顧盼之間。腫脹消散。李驚喜曰。大哉聖。

人之言。豈可不遍覽而執一者也。其症小便閉塞而不渴。時見躁者是也。凡諸病居下焦皆不渴也。非先生不能道此語二者

之病。一居上焦在氣分而必渴。一居下焦在血分而不渴。血中有濕故不渴也。二者之殊至易別耳。

治下焦

羅謙甫治劉太保淋疾。問曰。近夏月來。同行人多有淋證。氣運使然。抑水土耶。羅曰。此間別無所患。獨公所有之殆非氣運水土使然。繼問公近來多食何物。曰宣使賜木瓜。百餘對。遂多蜜煎之。每客至。以此待食。日三五次。曰淋由此也。內經曰。酸多食之令人癃凡治小便不利不可用酸奪飲則已。曰醋味致淋。其理安在。曰。小便主氣。經云。酸入于胃。其氣滯。以

收上之兩焦弗能出入也。不出則留胃中。胃中和濕則下注膀胱之胞。胞薄以懦。得酸則縮。踰約而不通。水道不行。故癃而濇。乃作淋也。果如言而愈。

黃明之六月中小便淋。莖中痛不可忍。相引脇下痛。以川練子生甘草一錢。元胡索七分。人參五分。茯苓四分。琥珀澤瀉。柴胡當歸稍各三分。作一服。名曰參苓琥珀湯。用長流水三盞煎至一盞溫服。空心食前大效。此方可法

中書右丞合刺合孫病小便數而少。日夜約至二十餘行。臍腹脹滿。腰脚沉重。不得安卧。至元癸未季春。羅奉旨治之。診視脈得沉緩。時時帶數。常記小便不利者有三。不可一

槩而論。若津液偏滲於腸胃。大便泄瀉而小便澁少。一也。
宜分利而已。若熱搏下焦津液。則熱濕而不行。二也。必滲
泄。則愈。若脾胃氣滯。不能通利水道。下輸膀胱而化者。三
也可順氣令施化而出也。分利滲泄順氣三法。治之不可不記。今右丞平素

膏粱濕熱內蓄。不得施化。膀胱竅滯。是以起數而見少也。
非滲泄分利。則不能快利。遂處一方。名曰茯苓琥珀湯。內
經曰。甘緩而淡滲。熱搏津液內蓄。臍腹脹滿。當須緩之。泄
之。必以甘淡爲主。遂以茯苓爲君。滑石甘寒。滑以利竅。猪
苓琥珀之淡。以滲泄而利水道。故用三味爲臣。脾惡濕。濕
氣內蓄。則脾氣不治。益脾勝濕。必用甘爲助。故以甘草白

术爲佐鹹。八腎鹹味下泄爲陰澤瀉之鹹。以瀉伏水。腎惡燥。急食辛以潤之。津液不行。以辛散之。桂枝味辛散濕潤。此爲因用。故以二物爲使。煎用長流甘爛水。使下助其腎氣。大作湯劑。令直達于下而急速也。此方尤妙于五苓散五苓散加滑石琥珀君臣佐兩服減半旬日良愈。

丹溪治一老人。因疝疼二十年。多服蒼朮烏附等藥。疝稍愈。又患淋十餘年。其間服硝黃諸淋藥。不效。忽項右邊發一大疽。連及缺盆。不能食。淋痛愈甚。叫號困憊。時當六月。脈短濶。左微似弦。皆前烏附積毒所致。凝積滯血蓄滿膀胱。脈澁爲敗血。濶爲血虛而斷爲。敗血亦今症而云。短爲血耗。忍痛傷血。叫號。

傷氣知其溺後有如敗膿者詢之果然遂先治淋令多取
土牛膝根莖葉濃煎湯行
并四物湯大劑與三日後痛與

敗膿漸減五七日淋止瘡勢亦定蓋四物能生血也但食
少瘡未收斂用四物加參芪白朮、熬膏以陳皮半夏砂仁
木香煎取清汁調膏與之遂漸能食一月瘡安先行瘀生
新後調元

補胃行氣開瘀故曰非
開瘀不足以行氣也

一人小便不通醫用利藥益甚脉右寸頗弦滑此積瘀在肺
肺爲上焦膀胱爲下焦上焦閉則下焦塞如滴水之器必
上竅通而後下竅之水出焉以藥大吐之病如失
一婦脾疼後大小便不通此瘀隔中焦氣聚下焦二陳加木

通煎服再一服探吐之

沈宗常治黎守溺不下或竄以藥益閉常曰結絡不解痰成
癬法當吐果吐而溲如故

孫琳路鈴本殿前司健兒善醫寧宗爲郡王病淋日夜凡三百起國醫罔措有薦之者光宗時在東宮亟召之至孫求二十錢買大蒜淡豉蒸餅三物爛研合和爲丸令以溫水下三十丸且曰今日進三服病當退三分之一明日再進如之三日則病除已而果然奏官右列或問其說孫曰小兒何緣有淋只是水道不通利蒜豉皆通利無他巧也

滑伯仁治一婦病艱於小溲中滿喘渴一醫投以瞿麥梔苓

諸滑利藥而秘益甚。診其脈三部皆弦而濶。日經云：膀胱者州都之官，津液藏焉。氣化則能出矣。所謂水出高源者也。膻中之氣不化，則水液不行。病因於氣，徒行水無益也。

法當治上焦。乃製朱雀湯。

朱雀湯

雄雀肉一隻

赤小

一兩

大棗肉一兩

小麥一兩

紫石英一兩

紫菀

五錢

遠志五錢

丹參五錢

甘草三錢

和勻爲粗

末每服三錢水煎食遠溫服

河間朱雀丸

參湯下倍以枳桔

茯神二兩

沈香五錢

硃砂五錢

參湯下

煎用長流水一飲而溲再飲氣平數服病已

東垣案渴此案不渴分在

氣在血合前東垣案看之方知其妙

一婦年六十餘病小溲閉若淋狀小腹脹口渴。診其脈沉且澀。曰此病在下焦血分陰火盛而水不足。法當治血。血

與水同血有形而氣無形。有形之疾當以有形法治之。卽以東垣滋腎丸服之而愈。兩案一弦而濤一沈而濤以渴者屬氣分不渴者屬血分

韓悉治一人淋素不服藥。教以專啖粟米粥。絕他味。旬餘減

月餘痊

虞恒德治一人年七十秋間患小便不通二十餘日。百方不效。後得一方。取地膚草搗自然汁。服之遂通。地膚草單方葉名鍊歸等雖至微之物而有迴生起死之功故并載之

吳菱山治一婦患淋瀝數而疼痛。身煩燥。醫以熱淋治之。用

八正散。連子飲服之。愈劇。吳診脈沉數無力。沉數爲熱在在氣總歸虛熱知氣與火轉鬱於小腸故也遂與木通麥

稿節車前子淡竹葉麥冬燈心甘草稍大腹皮之類服之而安。蓋小腸乃多氣少血之經。今病脈係氣鬱。反用大黃梔芩味厚苦寒之藥。故寒極傷氣病轉加矣。殊不知血中有熱者。乃有形之熱爲實熱也。氣中有熱乃無形之熱爲虛熱也。同一熱也。而分在氣在血。血中之熱爲實。氣中之熱爲虛。大有至理。可悟建中老人治痘之法。凡氣中有熱者。當行清涼薄劑。無不獲效。更分氣血多少之經。須辨溫涼厚薄之味。審察病機。斯無失也。

程沙隨苦血淋。百藥無效。偶閱本草。因見白冬瓜治五淋。於是日煮食之。至七日而愈。

唐與正治吳巡檢病。不得前溲。卧則微通。立則不能涓滴。醫

遍用通小腸藥不效。唐因問吳常日服何藥。曰常服黑錫丹。問何人結砂。曰自爲之。唐洒然悟曰。是必結砂時鉛不死。硫黃飛去鉛砂入膀胱。卧則偏重。猶可溲。立則正塞水道。以故不能通。令取金液丹三百粒。分爲十服。煎瞿麥湯下之。膀胱得硫黃。積鉛成灰。從水道下。猶累累如細砂。病遂愈。夷堅志

夫硫黃之化鉛。經方所載。苟不察病源。而以古方從事。未見其可也。

鄞縣尉耿夢得妻。苦砂石淋十三年。每溺時器中剝剝有聲。痛楚不堪。一醫命採苦杖根。俗呼爲杜牛膝者。淨洗碎之。

凡一合用水五盞煎耗其四而畱其一去滓以射乳香末少許研調服之一夕愈

本事方

元戎載一人小溲不通一切利小溲藥不效以其服附子太過消盡肺陰氣所不化師用黃連芩解毒而得通

劉子安病腦疽服內托散後泄不止小便大不通亦消肺陰之過諸藥不效郭子明輩用木通五苓導之愈秘劉用陳皮茯苓生甘草之類肺氣下行遂通若止用利小便藥其不知本甚矣

醫壘元戎

王仲陽治一土人弱冠未婚病遺瀝日久每作虛寒脫泄治之益甚王診得六脈弦數難記至數形骨立不能支王曰

此三焦不利膀胱蓄熱爲五淋也患者曰膏血砂垢每溺則其痛不可言乃用局方五淋散加山梔子赤芍藥用木通瞿麥穗珂皴衣草滑石末作大劑入燈心二十莖煎服五七日全愈無奈頻發旣而九日便溲俱不通秘悶欲死王卽令用細灰於患人連臍帶丹田作一泥塘徑如碗大小令用一指厚灰四圍高起以新汲水調朴硝一兩餘令化漸傾入灰塘中勿令漫溢須臾大小便逬然而出溺中血條皆如指大若非熱解氣使則其如龜竅之小何由連出三四日惡物復得回生再令服黃連解毒丸前後二三載不下三四斤矣至今安然不發

一男子患淋久。囊大如毬。莖如槌。因服利藥多痛甚。服微弱如線。以參芪歸朮加肉桂元胡各一錢。木通山梔赤芍赤茯苓甘草稍等藥。一服痛稍減。二服小溲利。四服愈。

程明祐治昌江一人。新娶夏日患淋濁澁痛。投藥清利。遂苦楚眼痛。再服瀉心涼肝。口苦下泄。久之盜汗潮熱。程診之脈緩弱無力。左濇而微。曰：脈之緩而弱。脾虛也。濇而微者血不足也。投以益元氣養血之劑。病良已。

薛立齋治大尹劉天錫。內有溼熱。大便滑利。小便滯滯。服淡滲之劑。愈加滴瀝。小腹腿膝皆腫。兩眼脹痛。此腎經虛熱。在下焦。淡滲導損陽氣。陰無以化。遂用地黃滋腎。二丸。小便如故。更以補中益氣。加麥冬五味兼服而康。

一儒者失於調養飲食難化。胸膈不利。或用行氣消導藥。咳嗽喘促。服用氣化痰藥。肚腹漸脹。服行氣分利藥。睡臥不能兩足。浮腫小便不利。大便不實。脉浮大按之微細。兩寸皆短。此脾腎虧損。朝用補中益氣加薑附。夕用金匱腎氣丸。加骨脂肉果各數劑。諸症漸愈。再佐以八味丸。兩月乃能步履。却服補中八味半載而康。搏按以上二案舊刻前案佚其尾後案佚其首并作一案石山治一人形肥蒼白。年五十餘病淋沙石澁痛。醫用五苓或琥珀八政散之類。病益加澀。診脈皆濡弱而緩近駛。曰此氣血虛也。經曰膀胱者津液之府。氣化出焉。今病氣虛不惟不能運化蒸滲。而亦氣餒。不能使之出也。經又云血主濡。之血少則莖中枯澁。水道不利。安得不淋。醫用通利。

血愈燥氣愈傷矣。遂用大補湯加牛膝煎服。月餘病減。仍服八味丸除附子加黃芪。服半月餘安。

程仁甫治孚潭汪尙新之父。年五十餘六月間忽小便不通。更數醫已五日矣。予診其六脈沉而細。曰夏月伏陰在內。因用冷水涼藥過多。氣不化而愈不通矣。用五苓散倍加內桂。桂屬龍火使助其化也。外用葱白煎水熱洗一劑頓通。

江篁南治一人。年三十餘。患淋數年。每飲酒或勞役卽發。小溲紅。日夜數十行。點滴頻數。且痛。素嗜酸。久藥不效。診左手浮小而快。右沉大近濇。曰此氣血虛也。經曰膀胱者津液之府。氣化出焉。今病氣虛。不惟不能運化蒸滯。而亦氣

餒不能使之出也。經又云：血主濡之，血少則莖中枯澁，水道不利，安得不淋？况多服通利血愈，燥氣愈傷矣。又素嗜酸，酸入于胃，其氣滯以收，上之兩焦弗能出入也。不出則留，胃中和濕則下注膀胱之胞，胞薄以濡，得酸則縮捲約而不通，水道不行，故癃而滯。內經曰：酸多食之，令人癃，是也。爲用大補湯加牛膝煎服，數劑稍愈，乃製八味丸除附子加黃芪，更以生甘草川練子、人參、立胡、茯苓相間服而愈。秀按此全襲石山謙甫兩案爲一

張文學道卿傳治血淋方：獨蒜一枚、山梔子七枚、鹽少許三物共搗如泥，貼患人臍上，所親患血淋二年餘，殊甚。諸醫

治之罔效。一日張過視。謾試以前方。卽時去紫黑血片碗。
許遂愈。

濮陽傳云。有便血淋者。取旱蓮草水煎服隨愈。

少微述。季父守信州時。年五十餘。值憂勞。患身熱作嘔。月餘。
脫肉破膿。小便淋瀝白如膏飴。官醫凌生檢。一按名曰膏
淋。用六君加遠志。一服有奇功。果依方一七而起。

秘結

丹溪治一老人。因內傷挾外感。自誤汗後。以補藥治愈。脈尙
洪數。朱謂洪當作大。論年高誤汗後。必有虛症。乃以參木

歸芪陳皮甘草等。自言從病不會更衣。今虛努逆痛不堪。

欲用利藥。朱謂非實秘。爲氣因誤汗而虛。不得充腹。無力

可努。仍用前藥。間以肉汁粥。瑣陽粥啜之。

丹溪本草謂瑣陽味甘可食者

煮粥尤佳。補陰氣治虛而大便結燥。又謂內蕊蓉峻補精血。驟用動大便滑。

濃煎葱椒湯浸下

體下軟塊五六枚。脈大未歛。此血氣未復。又與前藥二日

小便不通。小腹滿悶煩苦。仰卧則點滴而出。朱曰。補藥未

至。倍參芪服二日。小便通。至半月愈。

虛秘用補法

一婦產後秘結脈沉細。服黃柏知母附子愈。

丹溪治其母年老多痰飲。大便燥結時以新牛乳猪脂和糜粥中進之。雖得暫時滑利。終是膩物積。多次年夏時鬱爲

黏痰發爲脇瘡。作楚甚。因苦思而得節養之說。時進參术等補胃。補血之藥。隨天令加減。遂得大府不燥。面色營潔。因成一方。用參术爲君。牛膝芍藥爲臣。陳皮茯苓爲佐。春加川芎。夏加五味。黃芩。麥冬。冬加當歸。身倍生薑。一日一貼。或二貼。小水纔覺短少。便進此藥。小水之長如舊。卽是郤病捷法。

一婦年五十。患小便澀。治以八正散等劑。小腸脹急不通。治裏不身如芒刺。朱以所感霖澑雨濕邪。尙在表。此症脈必浮效。然身如芒刺屬濕火居多。何以斷之爲濕邪。濡而不數。不在表耶。立齋一案時或身如芒刺亦作濕治。因用蒼术爲君。附子佐之。發表一服卽汗。小便隨通。汗

一人年八旬。小便短濇。分利太過。致涓滴不出。蓋飲食過傷其胃。氣陷於下焦。用補中益氣湯。一服卽通。升法○秀按此當入淋秘

史載之治蔡元長苦大便秘。國醫用藥。俱不能通利。蓋元長不肯服大黃。故也。時史未知名。往謁之。闇者齟齬久之。乃得見。旣而診脈。史欲出奇。曰。請求二十文錢。元長問何爲。曰。

欲市紫菀耳。史遂以紫菀末之而進。須臾大便遂通。元長驚異問故。曰。大腸肺之傳送。今之秘結無他。以肺氣濁耳。

紫菀能清肺氣。是以通也。自是醫名大著。氣秘用清法
北窓灸裸

饒醫熊彥誠。年五十餘病。前後閉便洩不通。五日腹脹如鼓。同輩環視。皆不能措力。與西湖妙果僧慧月善。遣書邀致。

訣別月驚馳而往過釣橋逢一異客丰姿瀟洒揖之曰方
外高士何子子走趨如此月曰一善友久患秘結勢不可
療急欲往問耳客曰此易療也待奉施一藥卽脫靴入水
探一大螺而出曰事濟矣持抵其家以鹽半七和殼生搗
碎置病者臍下一寸三分用寬布緊繫之仍辦觸器以須
其通熊昏不知人妻子聚泣曾未安席砉然暴下而愈月
歸訪異人無所見矣熟秘用清法

類編

王克明治胡秉妻便秘腹脹號呼踰旬克明視之時秉家方
會食王曰吾愈之使預會可乎以半硫丸碾生薑調乳香
下之俄起對食如常冷秘用半夏製硫磺老人便祕法宜之溫法

虞恒德治一婦年五十餘身材瘦小得大便燥結不通飲食少進小腹作痛。虞診之六脈皆沉伏而結濇作血虛治用四物湯加桃仁麻仁煨大黃等藥數服不通反加滿悶與東垣枳實導滯丸及備急大黃丸等藥下咽片時卽吐出蓋胃氣虛而不能久留性速之藥耳。遂以備急大黃丸外以黃蠟包之又以細針穿一竅令服三丸。蓋以蠟匱者制其不犯胃氣故得出幽門達大小腸也。明日下燥屎一升許繼以四物湯加減作湯使吞潤腸丸如此調理月餘得大便如常飲食進而安。血秘用下法

一男子因出痘大便閉結不通兒醫云便實爲佳兆自病至

痘瘡愈後不如廁者凡二三五日肛門連大腸痛甚。叫號聲徹四鄰。用皂角末及蜜煎導法服以大小承氣湯及枳實導滯丸。備急丸皆不效。計無所出。虞曰此痘瘡餘毒鬱熱結滯於大小腸之間而然。以香油一大盞令飲。自朝至暮亦不效。乃令婢者口含香油。以小竹筒一箇套八肛門。以油吹入過半時許。病者自云其油入腸內如蚯蚓漸漸上行。再過片時許。下黑糞一二升止。因睡而安。秘

薛已治一儒者。大便素結。服搜風順氣丸。后胸膈不利。飲食善消。面戴陽色。左關尺脈洪大而虛。薛曰此足三陰虛也。彼不信。乃服潤腸丸。大便不實。肢體倦怠。與補中益氣六味。

地黃丸。月餘而驗。年許而安。若肺脾氣虛者。用補中益氣湯。若脾經鬱結者。用加味歸脾湯。若氣血虛者。用八珍湯。加肉蓯蓉。若脾經津液涸者。用六味丸。若發熱作渴飲冷者。用竹葉黃芩湯。若燥在直腸。用猪膽汁導之。若肝膽邪侮脾者。用小柴胡加山梔郁李枳殼。若膏粱厚味積熱者。用加味清胃散。亦有熱燥風燥陽結陰結者。當審其因而治之。若復傷胃氣多成敗症。

一老儒素有風熱。飲食如常。大便十七日不通。肚腹不脹。兩尺脈洪大而虛。此陰火內燦。津液用六味丸二十餘劑。至三十二日始欲去用猪膽潤而通利如常。

一婦年七十三。痰喘內熱。大便不通。兩月不寐。脈洪大。重按微細。此屬肝肺腎虧損。朝用六味丸。夕用逍遙散。各三十餘劑。計所進飲食百餘碗。腹始痞悶。乃以猪膽汁導而通之。用十全大補調理而安。若間前藥飲食不進。諸症復作。一男子年五十餘。因怒少食。大便不利。服潤腸丸。大便秘結。胸脇作痛。欲兼服脾約丸。肝脾腎脈浮而濶。薛曰。此足三陰精血虧損之症也。東垣先生云。若人胃強。強爲邪。脾弱。約束津液。不得四布。但輸膀胱。小便數而大便難者。用脾約丸。若人陰血枯槁。內火燔灼。肺金受邪。土受木傷。脾肺失傳。大便秘而小便數者。用潤腸丸。今滋其化源。則大便自

調矣。如法果驗。

一儒者懷抱憂鬱。大便秘結。食少。乃傷脾之變症也。

博按薛氏原本

云一儒者懷抱鬱結復因場屋不遂發熱作渴胸膈不利飲食少思服清熱化痰行氣等劑前症益甚肢體倦怠心脾二脈滯乃鬱結傷脾之變症也遂用加味歸脾湯治之。飲食漸進諸症

漸退。但大便尚滯。兩頰赤色。此肝腎虛火內傷陰血用八

珍湯加茺蔚麥冬五味至三十餘劑。大便自潤。

一男子患症同前。服大黃等藥泄瀉便血。遍身黑黯。薛視之曰。此陰陽二絡俱傷也。經曰。陽絡傷則血外溢。陰絡傷則血內溢。此不治也。已而果然。

職方陳莪齋年踰六旬。先因大便不通。服內疏等劑後。飲食

少思胸腹作脹。兩脇作痛。秀按脇痛必形體倦怠。兩尺浮大。左關短濇。右關弦濇。尺當沈今浮。大右關當微洪而反弦濇。左關當弦而反濇。症斷不起時五月請治。薛曰：此命門火衰。不能生脾土。而肺金又尅肝木。恐金旺之際難起矣。果然。

汪石山治一婦。因改醮乘轎勞倦。加以憂懼成婚之際。遂病小腹脹痛。大小便祕結不通。醫以硝黃三下之。隨通隨閉。病增胸膈胃脘脹痛。自汗食少。汪診之脈皆濡細近駛。心脈頗大。右脈覺弱。汪曰：此勞倦憂懼傷脾也。蓋脾失健運之職。故氣滯不行。以致秘結。今用硝黃。但利血而不能利氣。遂用人參二錢。歸身錢半。陳皮枳殼黃芩各七分。煎服。

而愈

江汝潔治一人患前後閉三四日。且不能食。甚危急。江視之曰。頭痛耳鳴。九竅不利。腸胃之所生也。經曰。北方黑色。入通于腎。開竅於二陰。藏精於腎。精不足。則二便難。以瑣陽三錢酒洗焙乾爲末。煮粥。強與服之。是晚二便俱利。飲食亦進。

江應宿治從姪婦患秘結。因產後月餘。如廁忽跨痛如閃。大小便不通。已經四五日。雜進通利淡滲之藥。罔效。予適歸。倉惶告急云。前後脹腫。手不敢近。近之則愈痛。雖不見脈。知其形氣病氣俱實。與桃仁承氣湯加紅花一劑。暴下而

愈

黃疸

秀按是病多謂濕熱蒸鬱脾胃而成然有肝熱傳胆者肝熱移脾者又有燥火便秘宜下者

東垣治一人年六十二素有脾胃虛損病目疾時作身面目
睛俱黃小便或黃或白大便不調飲食減少氣短上氣怠
惰嗜卧四肢不收至六月中目疾復作醫以瀉肝散下數
行而前疾增劇李謂大黃牽牛雖除濕熱而不能走經絡
妙下咽不入肝經先入胃中大黃苦寒重虛其胃牽牛其
味至辛味辛者爲金用尅肝木則可經日肺病無多食辛能瀉氣重虛肺本嗽大
作蓋標實不去本虛愈甚加之適當暑雨之際素有黃症

之人所以增劇也。此當于脾胃肺之本臟瀉外經中之濕熱製清神益氣湯主之。茯苓升麻各二分。澤瀉蒼朮防風各三分。生薑四分。瀉濕熱而補脾胃此藥能走經除濕熱而不守故不瀉本臟。經臟二字妙絕當熟玩補肺與脾胃本臟中氣之虛弱。秀江氏元本止此今考東垣脾胃論此方凡分作三段江或誤認爲三方故節去下二段耳爲補刊于後青皮一分。橘皮、生甘草、白芍藥、白朮各二分。人參五分。此藥皆能守本而不走經。不走經者不滋經絡中邪。守者能補臟之元氣。黃蘆一分。麥冬二分。人參二分。五味子三分。秀按段已用人參五分此段復用人參二分似悞然觀後發明云救以生脉散則配方本意如此非重出也江氏或緣此悞認爲三方耳此藥去時令浮熱濕蒸。右件剉如麻豆大都作一

服水二盞煎至一盞去粗稍熱空心服火熾之極金伏之
際而寒水絕體於此時也故急救以生脉散除其濕熱以
惡其太甚肺欲收心苦緩皆酸以收之心火盛則甘以瀉
之故人參之甘佐以五味子之酸孫思邈云夏月常服五
味子以補五臟氣是也麥門冬之微苦寒能滋水之源於
金之位而清肅肺氣又能除火刑金之嗽而斂其痰邪復
微加黃蘖之苦寒以爲守位滋水之流以鎮墜其浮氣而
除兩足之痿弱也

羅謙甫治兀顏正卿二月間因官事勞役飲食不節心火乘
脾。火生土火甚。脾亦能侮土。脾氣虛弱又以恚怒氣逆傷肝。心下痞滿。

澤瀉陳皮漢防已各二分。青皮去白一分作一服。以長流
水三盞煎至一盞。名曰茯苓梔子茵陳湯。一服減半。二服
良愈。內經云。熱滯於內。治以鹹寒。佐以苦甘。又濕化于火。
熱反勝之治。以苦寒以苦泄之。以淡滲之。以梔子茵陳苦
寒。能瀉濕熱而退其黃。故以爲君。難經云。苦主心下滿。以
黃連枳實苦寒。泄心下痞滿。肺主氣。今熱傷其氣。故身體
麻木。以黃芩苦寒瀉火補氣。故以爲臣。二木苦甘溫。青皮
苦辛溫。能除胃中濕熱。泄其壅滯。養其正氣。漢防已苦寒。
能去十二經畱濕。澤瀉鹹平。茯苓猪苓甘平。導膀胱中濕
熱。利小便而去癃閉也。

至元丙寅六月時雨霖霪人多病溼瘧。真定韓君祥因勞役過度渴飲涼茶及食冷物遂病頭痛肢節亦疼身體沉重。胸滿不食自以爲外感內傷用通聖散二服添身體困甚。醫以百解散發其汗。汗越四日以小柴胡湯二服復加煩熱躁渴又六日以三一承氣湯下之。下躁渴尤甚又投白虎加入參柴胡飲子之類。清病愈增又易醫用黃連解毒湯。硃砂膏至寶丹之類。至十七日後病勢轉增傳變身目俱黃肢體沉重背惡寒皮膚冷心下痞硬按之則痛。痛按之硬手少陰受寒足少陰血滯執按之而痛爲實則誤了了懶言語自汗小便利大便了而不了。此痞痛按之痛爲陰症故小便

利大便了而未了理中湯佳

羅診其脈緊細

寒按之空虛

下焦無陽也

兩寸

脈短不及本位此證得之因時熱而多飲冷加以寒涼寒藥過度助水乘心反來侮土先囚其母後薄其子經云薄所不勝乘所勝也時值霖雨乃寒濕相合此爲陰症發黃

明也。

身無汗際頸而還小便不利則發黃今身自汗小便利而發黃明屬寒濕

羅以茵陳附子

乾薑湯主之。

茵陳附子乾薑湯

附子乾薑

半夏

陳使生薑

內經云寒淫於內治以甘熱佐以苦辛濕淫所勝

平以苦熱以淡滲之以苦燥之附子乾薑辛甘大熱散其

中寒故以爲主半夏草荳蔻辛熱白朮陳皮苦甘溫健脾燥濕故以爲臣生薑辛溫以散之澤瀉甘平以滲之枳實

苦微寒。泄其痞滿。茵陳苦微寒。其氣輕浮。佐以薑附。能去膚腠間寒濕。而退其黃。故爲佐使也。煎服一兩。前症減半。再服悉去。又與理中湯服之。數日氣得平復。或者難曰。發黃皆以爲熱。今暑隆盛之時。又以熱藥治之。而愈何也。此辨不
可少羅曰。主乎理耳。成無己云。陰症有二。二者始外傷寒邪。陰經受之。或因食冷物。傷太陰經也。一者始得陽症。以寒治之。寒涼過度。變陽爲陰也。今君祥因天令暑熱。冷物傷脾。過服寒涼。陰氣太勝。陽氣欲絕。加以陰感寒濕。相合發而爲黃也。仲景所謂當於寒濕中求之。李思順云。解之而寒涼過劑。瀉之而逐寇傷。君正以此耳。聖賢之制。豈敢。

越哉。或曰潔古之學有自來矣。

劉宗厚治趙顯宗病傷寒。至六七日。因服下藥太過。致發黃。其脈沈細遲。無力皮膚涼。發躁陰極。欲于泥中卧。喘嘔小便赤澁。先投茵陳橘皮湯。次第用藥之法。喘嘔止。次服小茵陳湯半劑。脈微出。脈微出者生。不欲于泥中卧。次日又服茵陳附子湯半劑。四肢發熱。小便二三升。用附子而小便長。當日中大汗而愈。似此治愈者。不一一錄。凡傷寒病黃。每遇太陽或太陰。司天歲。若下之太過。往往變成陰黃。蓋辰戌太陽。寒水司天。水來犯土。丑未太陰。濕土司天。土氣不足。卽脾胃虛弱。亦水來侵犯。多變此證也。

虞恒德治一人。年三十餘。得穀疸症。求治。以胃苓湯去桂。加茵陳數十貼。黃退。自以爲安。不服藥。十數日後。至晚。目盲不見物。虞曰。此名雀目。蓋濕痰盛而肝火有餘也。用獐猪肝煮熟。和夜明砂作丸服之。目明如故。來謝。虞曰。未也。不早服。制肝補脾消痰之劑。必成蠱。脹。痘成伊不信。半月後。腹漸脹痞滿。復求治。仍以胃苓湯倍二味。加木通。麥冬。煎湯下。褪金丸。一月而安。

江篁南治一人。夏月患食疸。面目俱黃如金。頭痛如破。小溲澁難。多汗。用車前草搗汁。調益元散服之。小溲即利。先瀉濕熱乃與補中益氣湯一貼。汗少止。後補元氣繼以人參白虎湯。竹

葉石膏湯合服之頭痛亦止。諸症多平。惟黃未盡退。乃以流氣清熱之劑治之愈。

猶子三陽患瘧症。皮膚目睛皆黃。小溲赤。左脈弦而數。右三部原不應指。今重按之。隱隱然指下証見。午後發熱。濕熱變瘧

五更方退瘧

兼陰

以茵陳五苓散除桂。加當歸梔子黃柏柴

胡數服。繼用八物除芎。加茵陳皮五味薑

棗兼人乳童溲熱退三日已而復作。

間日發於午後。肌熱

灼指。脈近弦。乃作瘧治之而愈。

後數年復患目睛黃。午飯

難尅化。則小溲黃。

以黃芪建中湯除桂。加白朮、陳皮、茯苓、

半夏、神曲、麥芽、薑少許而退。

充山汪充渠之內。年十八。因以冷水洗澡。帶濕臥簾。坐冷石。
致腹痛甚。腹痛爲寒。醫疑經滯。用破血行經之藥。不效。更醫。用

附子理中湯加桂。痛稍定。次日躁擾。譖言不知人。醫以補
中加寒涼藥二三服。乃覺身熱。面目發黃。頭暉小溲黃如
金色。濕月事如常。但少耳。所苦午後發熱。咽喉不清。常作
聲咳嗽。初秋江診之。脈左右皆浮。大而駛。而右尤躁。疾方
以蒼白术、茵陳、澤瀉、茯苓、猪苓、柴胡、黃芩、梔子、薑皮等藥。
次日脈稍平。以陳皮、桔梗、元參、併前方、出入增損數服而
愈。

揚州吳世德。患胸腹作滯。小溲黃澁。目睛黃甚。惡風鼻塞。飲

食作惡暑月江診左脈沉小而緩右頗大而弦牌部帶滑。乃食傷太陰爲食疸症也兼風寒外襲法宜躁利消導以防風蒼朮茵陳蘇葉陳皮茯苓猪苓澤瀉枳實薑葱煎服夜來小溲頗長早因驚悸出汗一時許乃用五苓去桂加滑石茵陳合平胃散四服胸膈寬小溲色漸淡而長面目皮膚黃漸退臨卧喉口作乾大便燥口臭前方減厚朴蒼朮加白朮數服而愈。

痘 疹

丹溪治一乳孩因胎毒兩腋生癰後腹脹發赤疹如霞片以

剪刀草汁調原蠶砂敷之愈。

滄洲翁二條滑伯仁一條見傷寒類

完顏小將軍病寒熱間作。腕後有癰三五點。鼻中微血出。兩手脈沉濇。胸膈四肢按之殊無大熱。無大熱此內傷寒也。問

之。因暑臥殿角。傷風。又渴飲冰酪水。此外感者輕。內傷者重。從內病俱爲陰也。見斑鼻衄斷爲陰甚妙故先癰。衄後顯內陰寒。熱間作。脾亦有之。非往來少陽之寒熱也。與調中湯數服而愈。

調中湯治內傷外感而發陰癰。蒼朮一錢五分。陳皮一錢。砂仁藿香白芍炙甘草桔梗半夏白芷羌活枳殼各一錢。川芎麻黃桂枝各五分。

生薑三片水煎服方見玉機微義

江篁南治章祁一入年五十。因伐木受溼。夏間裁遇熱汗衣。

則皮膚發紅疹。隱隱如布粟狀。少取涼汗收。則疹漸沒。素有鳴腸之症。自患前恙。則腸不復鳴矣。江曰。此症雖有陰陽輕重。俱從火化。此無根失守之火。聚於胸中上。獨熏肺蓋。肺主氣。主皮毛。遇熱汗衣傷之。則傳於皮膚而爲疹矣。取涼汗收而疹沒者。火散而疹自退。承乃制之義也。腹中鳴。乃火擊動其水。昔有而今無者。火從中達外也。若不節食。絕慾。早拔其根。他日恐成癘風也。其人食慾不能節已。而果成癘風不治。

風 瘡

唐與正治姪女年數歲得風癰疾先發於臆迤邐延上赤腫痛痒醫以上膈風熱治之亦不效唐診之曰是肝肺風熱盛極耳以升麻羌活荆芥鼠黏子赤芍藥淡竹葉桔梗

遠

不效唐診之曰是肝肺風

乾葛八物治之自下漸退而腫聚於頂其高數寸雖飲食寢處無妨而疾未去也唐母吳夫人曰此女乳母好飲熱酒至并歎其糟疾殆因是歟唐方悟所以至頂不消之由思之惟乾葛消酒且能療火毒乃以先方加葛三倍使服之二日腫盡去夷堅志

齊王太后病召臣意八診脈曰風癰客脬注云脬膀胱也言風癰之病客居在膀胱難於大小溲腎主二便與溺赤濕生臣意飲以火齊湯

卽黃連解毒湯或云

川連一味爲火齊湯

一飲卽前後溲再飲病已濁如故病

得之流汗出滲

音

滲者去衣而汗晞也

去衣汗晞風濕應調水道而移于膀胱故曰客也

所以知齊王太后者臣意診其脈切其太

陰之口

肺部

溼然風氣也脈法曰

沈之而大堅浮之而大緊

者病主在腎腎切之而相反也脈大而躁大者膀胱氣也

躁者中有熱而溺赤

史記

四肢病

秀按經曰脾病則四支不用諸案所列類多瘍症

華佗別傳曰瑯琊有女子右股上有瘡癩而不痛愈而復作
佗曰當得稻糠色犬繫馬頓走出五十里斷頭向瘡乃從

之須臾有蛇在皮中動以鐵橫貫引出長三尺許七日愈

獨異志

羅謙甫治真定張大年近三十素嗜酒至元辛未夏間病手指節腫痛屈伸不利膝臍亦然心下痞滿身體沉重不欲飲食食即欲吐面色瘞黃精神減少病近月餘羅診其脉沉而緩緩者脾也難經云肺主體重節痛肺者脾之所主四肢屬脾蓋其人素飲酒加之時助溼氣大勝流於四肢故爲腫痛內經云諸溼腫滿皆屬脾土仲景云溼流關節肢體煩痛此之謂也宜以大羌活湯主之内經云溼淫於內治以苦溫以苦發之以淡滲之又云風能勝溼羌活獨

活苦溫透關節而勝溼故以爲君升麻苦平威靈仙防風
蒼朮苦辛溫發之者也故以爲臣血壅而不流則痛當歸
辛溫以散之甘草甘溫益氣緩中澤瀉鹹平茯苓甘平導

溼而利小便以淡滲之也使氣味相合上下分散其溼也
一人兩足心凸如腫硬如釘脛骨生碎孔流髓身發寒戰惟
思飲酒症見寒戰飲酒亦奇此肝腎氣冷熱相呑用川烏炮爲末傅
之行之內煎韭菜湯服之愈行瘀溫散

一人四肢節脫但有皮連不能舉動名曰筋解症奇用黃蘆酒
浸一宿焙爲末酒下二錢多服而安

一人手指彎曲骨節間痛不可忍漸至斷落以草麻子去殼

二兩碎者不用黃連四兩貯瓶內水二升浸之春夏三日
秋冬五日每早面東以此水吞下草麻子一粒漸加至四
五粒微泄無害忌食動風物屢效症奇治亦奇

葛可久治同郡富人女年可十七八病四肢痿痺不能自食
目瞪衆醫莫能治葛視之笑曰此不難治乃令悉去房中
香匱流蘇之屬發地板掘土爲坎界女子其中局其扉戒
家人俟其手足動而作聲當報我久之手足果動而呼投
藥一丸明日自坎中出矣蓋此女平日嗜香而脾爲香氣
所蝕故也吹劍續錄

趙宜真曰予一故人曾患鼓椎風往來寒熱數月伏枕諸藥

不能療。最後一醫士診之曰：雖成痼疾，而有客邪在少陽，經未解。若曾服五積散，則誤矣。詢之果然。因投小柴胡湯數服，寒熱頓除。却用本料追風丸等藥理其風證，而全瘳矣。趙宜真
明初人

徐文中以醫名吳中鎮。南王妃臥病不可起。文中入診視王曰：疾可爲乎？對曰：臣以針石加於玉體，不痊其安？用臣遂請妃舉手足，妃謝不能。文中因請診候，按手合谷曲池而針隨以入。妃不覺知少選，請舉如前。妃復謝不能。文中曰：針氣已行，請舉玉手。妃不覺爲一舉，請舉足。足舉，王大悅。明日妃起坐，王大設宴，賜聲震廣陵。

一女子十六歲。四腕軟皮處。生惡物如黃豆大。半在肉內紅紫色痛甚。諸藥不效。方士教買水銀四兩。以白綿紙二張。揉熟。蘸水銀擦之。三日愈。

一人發寒熱。四肢堅硬如石。擊之有鐘磬聲。日黃瘦。用茱萸木香等分。水煎一二服愈。

有人患人面瘡。多在股上。其形似人面。有口眼。傅藥上卽食之。與飲食亦然。一日將貝母末傅卽密口不受。遂拉之瘡口數次。遂愈。

江左有商人。左膊上有瘡如人面。亦無他苦。商人戲滴酒瘡口中。其面亦赤色。以物食之。亦能食。食多則覺膚內肉脹。

起或不食之則一臂瘡。有善醫者教其歷試諸藥。金石草木之類悉無所苦。至貝母其瘡乃聚積閉口。其人喜曰。此藥可治也。因以小葷筒投其口灌之數日成痂。遂愈。本事方

薛立齋治一婦人素清苦。四肢患血風瘡。誤用敗毒寒涼。哺熱內熱。自汗盜汗。月經不行。口乾咽燥。此鬱結傷脾。四肢者脾主之。用歸脾湯數劑後。兼逍遙散五十餘劑而愈。

一人手十指斷壞。惟有筋連無節。肉內蟲出如燈心長數尺。遍身綠毛。名血餘。用茯苓胡黃連煎服愈。作溼熱治兼殺蟲

有人患脚瘡。冬月頓然無事。夏月臭爛疼痛不可言。一道人視之曰。爾因行草上。惹著蛇交遺。瘡中有蛇兒。冬伏夏

出故疼痛也以生蝦蟆搗碎傅之日三四換凡三日有一

小蛇自瘡中出以鐵鉗取之其病遂愈

撫青雜記

一人左手無名指爪角生一小瘡初起麻粒大用小刀挑開瘡頭血出如溺不止一日長出肉瘤如菌裏指頂內開一孔如眼目轉動此疔毒也以艾灸四十壯不知疼痛痒復烙之翦去肉瘤敷拔疔散外以膏藥貼之內服解毒七日全愈

一人手足甲忽然長倒生肉刺如錐食葵菜自愈

荊州處士侯又元嘗出郊廁于荒塚上及下趺傷其肘創甚行數百步逢一老人問何所苦也又元具言且見其肘老

人言偶有良藥可封之十日不開必愈如言及解視遂落
又元兄弟五六人互病病必出血月餘兄兩臂忽病瘡六
七處小者如榆錢大者如錢皆成人面酉陽雜俎

程山人孺文見一人手生丫枝痛苦無奈一醫用通草爲末
以雞蛋清調塗上卽消

馬嗣明從駕往晉陽至遼陽山中數處見榜云有人家女病
若有能治瘥者購錢十萬名醫多至問病狀不敢下手惟
嗣明獨治之其病由云曾以手捋一麥穗卽見一赤物長
三寸似蛇入其手指中因驚怖倒地卽覺手臂疼腫漸及
半身俱腫疼不可忍呻吟晝夜不絕嗣明爲處方服湯比

嗣明從駕還女平復

北齊書

正德間神樂觀陸道士生人面瘡在足外臙瘡口似唇而有舌無齒能言且索食但開口時必大痛垂絕口閉復甦飲之以酒則四周皆紅啖以脂膏亦能消爍食畢則閉瘡乃稍可但流膿血不止每日一度或二度其發無常極受苦楚貝母亦不能療如是者一年人問故答曰年十七時夜與本房老僕忿爭毆之死房後地曠而風烈吾師急聚薪焚之天明無知者今經十年瘡自言僕也忽七日不言以爲將瘥矣有兄在牛首寺爲僧因往訪之在寺幾半月忽復言痛絕尤甚曰我纔出數日汝卽避我使我尋之苦也

雖然寃亦解矣汝明日下山遇一樵者可拜求治之明日
果遇樵者懇焉樵者厲聲怒曰業畜敢言我也去半夜療
汝忽不見恍然回觀夜夢金甲神人胸挂赤心忠良四字
謂曰藥在案上可煎湯服以左手持藥查出水西門外第
二十家門首有婦人潑水者卽棄于道而返覺起視案有
物如亂髮而無端者江云如亂髮者疑是青遂如戒果見婦人棄之
歸瘡遂愈自後屢探本婦竟無他不知此何故也見聞紀訓
吳江一農夫兩股赤腫痛甚不能坐立一醫與之剖開中有
小蛤蜊四箇取出遂愈五湖漫聞

有人腋下體氣五更時用精肉二片以甘遂末一兩拌之挾

腋下至天明以生甘草一兩煎湯飲之良久瀉出穢物須在荒野之處恐傳他人依法三五次卽愈虛弱者間爲之外用搽藥枯礬一兩二錢輕粉五錢麝香一錢蜜陀僧二兩童便一碗浸蝦便盡爲度各爲細末津液調傅兩腋下無輕粉以海螵蛸代

癩風

李東垣治一人病癩風滿面連鬚極痒。眉毛脫落。須用熱水沃之稍緩。或砭刺亦緩。風論中云。夫癩者。榮衛熱附。其氣不清。故鼻柱壞而色敗。皮膚瘍潰。風寒客於脉而不去。名

曰癘風當刺其腫上先以銳針刺其處按出惡氣腫盡乃

止宜蔬食爛飯用藥當破血去熱升陽去痺瀉榮以辛冷散之甘溫升之行陽明經瀉心火補肺氣乃治之正也升麻連翹各六分蘇木當歸全蝎黃連地龍黃芪各三分生

黃芩四分甘草五分人參二分生地黃四分桃仁三枚桔梗五分麝香少許胡桐淚一分蟲蟲去翅足微炒水蛭二箇炒令烟盡去子杵碎用石灰炒紫黃色去灰用○水蛭慎用製不得法入腹生子

右剉除連翹另剉胡桐淚研白豆蔻二分爲細末二味另放麝蟲蟲水蛭三味爲細末另放外都作一服水二大盞酒一匙入連翹煎至一盞六分再入白豆蔻二味并麝等三味再煎一二沸去渣稍熟早飯後午飯前服

忌酒溼麪生冷硬物博按此案舊刻脫悞

張子和治一人病癘風十餘年。曰足有汗尚可治。當發汗。其汗當臭涎當腥。以三聖散吐之。大吐汗果臭痰腥如魚涎。次以舟車丸。瀦川散下五七次數服乃安。

一人病風爬搔不已。眉毛脫落。刺其面大出血如墨。刺三次血變色。每刺自額至頤。銹針上下俱刺。間日一次。至二十餘日方已。

呂滄洲治一女子病癘。診其脉來疾去遲。上虛下實。蓋得之酒醉接內而風毒乘之。今雖髮禿。眉墮然。鼻根幸未陷。肌肉幸未死。遂以防風通聖散。加以下藥。下瘀血數升。及蟲穢青黑等物。并進斬蛇長松等湯丸。復佐以雄黃大楓子。

油作膏摩之逾月瘥

丹溪治一貧婦，寡居病癩，曰：是疾世號難治者，不守禁忌耳。是貧婦而無厚味，寡而無慾，庶幾可療也。卽自具藥治之，後復投四物湯數百劑，遂不發動。

一人面浮油光，微腫色變，眉脫庠，二世癘風死者三人，與醉仙散出涎水如盆，而愈。秀按此趙以德案

一人面腫，色變黑燥，痒，眉髮脫落，手足皮燥，厚折痛痒，無全膚，有時痒入骨髓，爬至血出，稍止復作，晝夜不眠，與醉仙丹再造丸二藥而愈。

一婦兩足脛瘡潰，眉落，與再造散一服愈，年少不能斷慾忌。

口一年復發其前二人不發者亦非能如法調攝由病得之未深鼻柱未壞瘡未潰腐故耳故人抱病不可不早治也

羅謙甫治段庫使春初病大風滿面連頸極痒。眉已脫落。須以熱湯沃之則稍緩。晝夜數次沃之。或砭刺亦緩。先師曰。脈風者癘風也。榮衛熱附其氣不清故使鼻柱壞皮膚色敗。大風者風寒客於脉而不去治之當刺其腫上以銳針針其處。按出其惡氣腫盡乃止。瀉心火補肺氣。方見東垣治案

釋普明齊州人久止靈巖晚遊五臺得風疾。眉鬚俱墮。百骸腐潰。哀號苦楚。忽有異人教服長松明不知識復告之云。

長松生古松下取根餌之皮色如薺莧長三五寸味微苦
類人參清香可愛無毒服之益人兼解諸蟲毒明採服旬
日毛髮俱生顏貌如故今并代間土人多以長松雜甘草
乾山藥爲湯煎服甚佳然本草及諸方書皆不載獨釋慧
祥作清涼傳始序之

澠水燕談

泉州有客盧元欽染大風惟鼻根未倒屬端午官取蚺蛇膽
欲進或言肉可治風遂取一截蛇肉食之三五日頓漸可
百日平復

朝野僉載

商州有人患大風家人患之山中爲起茅舍有烏蛇墜酒罷
中病人不知飲酒漸瘥罷底見蛇骨方知其由

一僧得病狀如白癩卒不成瘡但每旦取白皮一升許如蛇
蛻醫者謂多啖炙燙所致與局方解毒雄黃丸三四服愈
趙瞿病癩歷年醫不愈乃齎糧送棄於山穴中瞿自怨不幸
吁嗟歎泣經月有仙人經穴見而哀之具問其詳瞿知其
異人叩頭自陳乞命於是仙人取囊中藥賜之教其服百
餘日瘡愈顏色悅肌膚潤仙人再過視之瞿謝活命之恩
乞遺其方仙人曰此是松脂彼中極多汝可煉服之長服
身轉輕力百倍登危涉險終日不困年百歲齒不墮髮不
白夜臥常見有光如鏡

抱朴子

高駢鎮維揚之歲有術士之家延火燒數千戶主者錄之當

死臨刑謂監刑者曰某之愆一死何以塞責然某有薄技
可以傳授一人俾其救濟後人死無恨矣時駢延待方士
如飢渴監刑者卽緩之馳白於駢駢召入親問之曰某無
他術唯善醫大風駢曰何以覈之對曰但於福田院選一
最劇者可以試之遂如言乃置患者於隙室中飲以乳香
酒數升則懵然無知以利刀開其腦縫挑出蟲可盈掬長
僅二寸然後以膏藥封其瘡口別與藥服之而更節其飲
食動息之候旬餘瘡盡愈纔一月眉髮已生肌肉光淨如
不患者駢禮術士爲上客

玉堂閒話

真臘國人尋常有病多入水浸浴及頻頻洗頭便自痊可然

多病癩者比比道途間土人雖與之同臥同食亦不核或謂此中風土有此疾曾有國主患此疾故人不之嫌以愚意觀之往往好色之餘便入水澡浴故成此疾聞土人色慾纔畢入水澡洗其患癩者十死八九亦有貨藥於市者與中國不類不知其爲何物更有一等師巫之屬與人行持尤可笑說選○江雲南人或因縱酒居處卑溼或以蓋酒甕被以蓋身一夜遂成是疾者有之不可不知也

癩 肿

汪石山治一人肥短紫淡年逾三十因勞感溼兩腿膝間結

核痛甚。醫用蒜片艾灸。又針大敦肝穴、三陰交脾穴。又以藥水

肝

脾

洗之。遂致陰囊腫脹如升葦皮腫如水泡。復進人參敗毒散。皆不中病。汪診之脉。皆濡緩而弱。畧駛濡緩弱爲陽爲虛駛爲熱宜石山之變例治也。○若見弦數大之脉。又當別論。不可執此一案爲法也。曰。此溼氣乘虛而入。

鬱而爲熱成結核也。理宜補中行溼。可免後患。月餘。左腿

內廉厥陰經分腫痛如碗。惡寒發熱。復用蒜灸六日。後腫潰膿出。體倦頭面大汗。手足麻木。瘡下又腫如碗。寒熱大作。始信用人參三錢。黃芪三錢。白朮錢半。歸身尾牛膝。茯苓各一錢。青皮黃柏各七分。甘草節五分。煎服五六貼。右額羊矢穴分腫痛長五寸許。亦作寒熱。醫謂補塞太過。欲

改前方。彼不信。銳意服前藥。月餘。腫皆膿潰成瘻而愈。惟左脚委中筋急短縮。艱於行步。彼以爲覽。汪曰。膿血去多。筋失所養故也。藥力足。曰當不斃矣。果驗。後覺陰囊腫。縛他醫加茴香吳茱萸治瘻等藥。不效。汪適至。彼令守前方。減去治瘻等藥。加升麻一錢。服一二貼。囊卽縮。彼願詳言之。汪曰。經云。營氣不從。逆於肉理。乃生癰腫。又云。受如持虛。蓋謂氣餒。行遲。血少。留滯。則阻逆肉理。乃作癰腫也。久則鬱而爲熱。化肉腐筋而成膿矣。腫在厥陰。雖曰多血。亦難供給。日之所耗。夜之所損。故邪乘虛。畱結不散。如持虛器而受物也。身之氣血。如風與水。風疾水急。則頽陂潰隄。

莫之能禦風息水細則沙障石壅多所阻礙矣故今補其氣血使氣壯而行健血盛而流通又何腫之不散結之不行哉彼曰理也

龐贊

狄仁傑并州太原人性好醫藥尤妙鍼術顯慶中應制入關路傍有榜云有兒鼻端生贊如拳石綴鼻根蒂如筋痛楚危亟能療之者酬千金狄公爲腦後下鍼龐贊應手而落其父母輦千縑爲壽此條已見前鼻門

薛已治一老儒眉間患此二年後其狀如紫桃下隊蓋目按

之如水囊刺出膿血。目卽開張。以炒黑膽草。山梔萼。歸芍。藥柴胡。白朮。茯苓等類而愈。

一婦左項腫如雞卵。不作痛。不變色。勞則發熱。怒則寒。熱經候不調三年矣。用加味逍遙散加味歸脾湯間服間以削之佐以海藻散堅丸。年許而消。

一男子鬱怒房勞。左脇腫贅如赤桃。服流氣化痰之藥。其大愈甚。虛症悉具此。肝腎過虛也。用前藥及地黃丸而消。

儒者朱宏仁。年二十餘。右手背近中指患龐五枚。中一大者。如黃豆。餘皆如聚黍。拔之如絲。長三四寸許。此血燥筋縮。用清肝益榮湯五十餘劑而愈。

一婦人左手背并次指患五六枚如熟椹薛曰此因肝經血熱也果月經素不及期當生血涼血爲主不信乃用艾灸手脹發熱手指皆攣兩腋項兼胸乳間皆患癰經行無期薛用加味道遙散加黃連十餘劑各患漸愈乃去黃連百餘劑經行如期再用地黃丸三料而全消

有人患此用蜘蛛絲纏七日消爛屢驗焦氏筆乘

瘤

臨川有人瘤生頰問痒不可忍每以火烘炙則差止已而復然苦甚一醫告之曰此真虱瘤也當剖而出之取油紙圍

頂上然後施砭，瘤方破，小虱湧出無數，最後一白一黑兩大虱皆如豆殼，中空空無血，與頰了不相干，畧無瘢痕，但瘤所障處正白耳。丁志

浮梁李生得背痒疾，隱起如覆盆，無所痛苦，惟奇痒不可忍，飲食日減，無能識其爲何病。醫秦德立見之曰：此虱瘤也。吾能治之，取藥傅其上，又塗一綿帶繞其圍，經夕瘤破出虱斗許，皆蠶蠕能行動，卽日體輕，但一竅如箸端不合，時虱湧出不勝計，竟死。唐小說載賈魏公鎮滑臺日，州民病此，魏公云：世間無藥可療，惟千年木梳燒灰及黃龍浴水，乃能治耳，正與此同。

處士蒯亮言其所知額角患瘤醫爲剖之得一黑石碁子巨斧擊之不傷缺復有足脛生瘤者因至親家爲獵犬所斷正齧其瘤其中得針百餘枚皆可用疾亦愈稽神錄

薛己治一男子小腹患此膿水淋漓用補中益氣加麥冬五味以培脾土六味地黃丸以生腎水更用蘆薈丸以清肝火而斂

腫 瘻

安康伶人刁俊朝其妻巴嫗項癰初若雞卵漸巨如升積五年大如數斛之鼎重不能行有聲如音樂積數年癰外生

小穴如針芒者，不知幾千億。每天陰欲雨，則穴中吹白烟。霏霏如絲縷，漸高布散，結爲屯雲。雨則立降。其家少長懼之，咸請遠送巖穴。妻懼送，請決拆之。俊朝卽淬利刃，將及之中，軒然有聲。遂四分披裂，有一大猱跳躍而去。卽以白絮裹之，瘻疾頓愈。時大定中也。後猶有說，不具論。

續元怪錄

汝州人多病頸瘻。其地饒風沙，沙入井中，飲其水則生瘻。故金房人家，井以錫爲欄，皆以夾錫錢鎮之。或沉錫其中，則飲者免此患。

華亭有一老僧，昔行脚河南管下，寺僧童僕無一不病瘻。時有洛僧共寮，每食取攜行苦脯，同餐經數月，僧頂贅盡消。

若未嘗病寺徒僕歎訶乃知海崖鹹物能除是疾癸志

倪仲賢治顧顯卿妻年五十餘患癰始生如塊近三年如盆一首痛楚不可忍羣醫視之投藥不效老人曰是少陽經爲邪所攻耳卽投以其藥服之月餘而愈

江應宿治一婦人頸癰知其爲少陽厥陰肝膽因鬱怒痰氣所成治以海藻三兩昆布一兩五錢海帶一兩俱水洗淨半夏製小松蘿枯礬蛤粉通草各一兩龍膽草洗三兩小麥麪炒去溼四兩共爲細末食後用酒調下三錢去枕睡片時或臨臥服以消止藥不必盡劑一月愈

瘡瘍

東垣治一人家貧形志皆苦時冬寒於手陽明大腸經分出癰第四日忽腫幼少有癩瘡其臂外皆腫痛甚先腫在陽明脈左右寸皆短中得之皆弦按之洪緩有力此癰得自八風之變以脈斷之邪氣在表然其症大小便如故飲食如常腹中知飢口知味知不在裏也不惡風寒止熱躁脉不浮知不在表也表裏既和邪氣在經脈之中也故凝于經絡爲瘡癰出身半已上故風邪上受之故知是八風之變爲瘡止經脈之中也治其寒邪調和經脈中血氣使無凝滯

則已也。炙甘草一分升麻桔梗五分白芷七分當歸尾生地一錢生芩一錢五分連翹一錢黃芪二錢中桂紅花各少許酒水各半同煎至稍熱臨臥服二服而愈。

呂滄洲治一僧偶搔腋中疥忽自血出汨汨如湧泉竟日不止。醫治之不效。請呂往視。履時已困極無氣可語及持其脉惟尺部如蛛絲他部皆無。卽告之曰夫脉血氣之先也。今血妄溢故榮氣暴衰然兩尺尚可按惟當益榮以瀉其陰火乃作四神湯加荆芥穗防風不間晨夜併進。明日脉漸出更服十全大補一劑遂痊。

羅謙甫治牛經歷病頭面赤腫耳前後尤甚疼痛不可忍發

熱惡寒。牙關緊急。涕唾稠黏。飲食難下。不得安臥。一瘍醫
於腫上砭刺四五百針。腫赤不減。其痛益甚。不知所由。羅診
視其脉浮緊。按之洪緩。此症乃寒。覆皮毛鬱遏經絡。熱不
得升聚。而赤腫。經云。天寒則地凍。水冰人氣在身中。皮膚
緻密。腠理閉。汗不出。血氣強。肉堅濶。當是之時。善行水者。
不能行冰。善穿地者。不能鑿凍。善用針者。不能取四厥。必
待天溫。冰泮凍解。而後水可行。地可穿。人脉亦如是也。又
云。冬月閉塞。用藥多而少針石也。宜以苦溫之劑。溫經散
寒。則已。所謂寒緻腠理。以苦發之。以辛散之。宜以托裏溫
經湯。麻黃苦溫發之者也。故以爲君。防風辛溫散之者也。

升麻苦平葛根甘平解肌出汗專治陽明經中之邪故以爲臣血留而不行者則痛以香白芷辛溫當歸身辛溫以和血散滯溼熱則腫蒼朮苦甘溫體輕浮力雄壯能瀉膚腠間溼熱人參甘草甘溫白芍藥酸微寒調中益氣使托其裏故以爲佐依方服之以薄衣覆其首厚被覆其身臥於暖處使經血溫腠理開寒乃散陽氣發大汗出後腫減八九分再服去麻黃防風加連翹黍黏子痛腫悉去經言汗之則瘡愈信哉衛生寶鑑

丹溪治一人年近五十質弱憂患右一作左 脳外側生核紅腫如粟脉浮大弦數重似濤此憂患傷血宜用補以防變症

以人參膏下竹瀝。他工以十宣五香間與。後值大風核高
大有膿。中起紅線過肩脊及左右一作右。脇下急作參膏入芎
术湯薑汁飲之。盡參三片瘡潰。又多與四物加參术芍歸
陳皮甘草半夏生薑服之而愈。

一人面白神勞。脇下生一紅腫如桃。或教用補劑不信。乃用
流氣飲。十宣散雜進。血氣俱憊而死。

一人左絲竹空穴壅出一角如雞距。此少陽經氣多血。少朱
戒其斷酒肉解食毒。須針灸以開發壅滯。他工以大黃硝
腦等冷藥貼之一夜裂開如蚶肉。血濺出長尺餘而死。此
冷藥外逼熱不得發故也。

一士人於背癱腿節次生疽用五香連翹湯十宣散而愈後
脚弱懶語肌上起白屑如麩脈洪稍鼓時冬月朱作極虛
處治令急作參芪歸朮膏以二陳湯化下盡藥一觔半白
屑沒大半呼吸有力其家嫌效遲自作風病治之服青礞
石等藥因致不救故書以爲戒

一老婦形實性急嗜酒腦生疽十五日脉緊急且濇用大黃
細切酒炒爲末以人參酒炒入薑煎湯調末一錢服少時
再服得睡上身汗出而愈用大黃人參此案重見
以汗解奇 腦項疽門

橘泉翁治一人年八十餘有瘍發左耳後寒熱間作晝夜呼
不可忍瘍醫欲與十宣散補托之翁曰此有餘之火無俟

於補與防風通聖散加柴胡白芷下之。腫消痛止。

皇祐中學究任道腿間患一瘡始發赤腫復絕便變黑後穴則有黃水出四邊浮漿起累治不瘥醫王通看之此瘡狹長似魚臍下瘡也遂以大針針四向并中隨針有紫赤水汁出如豆汁言此一因風毒蘊結而成二因久坐血氣凝濁而至三因食肉有人汗落其間也道曰某素好讀書而久坐此疾數歲前夏月道中買猪脯味水飯疑似人肉食已後得此疾通曰與誤食人汗不遠矣以一異味散子用雞子清調傅其瘡日三易數日得愈道堅求其方通曰止用雪元一味自後累訪名醫皆莫識雪元爲何物道因至

許鄭間會醫郝老曰嘗記聖惠有一方治此疾用臘月猪頭燒灰以雞子清調傅此方是也雪元之名非郝老博學多記後醫豈不惑耶

名醫錄

南豐市民嚴黃七兩足生瘡臭氣潰膿衆皆驅斥不容迹出售角器於村野而旅舍又不容至京潛投宿於五夫人祠下夜半遭黃衣吏訶逐曰何人敢以腐穢脚觸汚此間謝曰不幸纏惡疾無處見容冒死來此紛拏次夫人出抗聲令勿逐且呼使前曰吾授汝妙方用漏藍子一枚本草又名野蘭生乾爲末入膩粉少許井水調塗當效嚴拜謝依而治之

果愈

類編

陳斗嵒治金臺僧嗣真遍體生瘡癟歲久藥罔效陳曰此太陰之經蘊風邪風化爲蟲病也初猶未信翌日僧持瘡痂數片內有蟲如虱泣拜求治乃教以百部蛇牀子草烏頭練樹葉煎湯一缸令僧坐湯中浴一二時落瘡痂蟲無數一月凡數浴僧遍體如白癩風狀而愈

吳菱山治一男子年近三十病後遍發癰毒醫以敗毒散久服其毒遂收惟有瘡瘍而已忽一日食羊肉遂嘔過一夜滿口發瘡狀如膿窠寒熱時作羸瘦憔悴諸醫皆曰早間毒敗不盡故耳仍行敗毒涼劑渴熱轉生越數旬飲食減少因請吳治曰脉浮無力此乃虛陽若用涼劑不久危矣

遂用附子理中湯服之。少頃燥煩口開舉家歸咎於附子。
曰此無妨。彼人虛甚。況熱藥熟服。故燥耳。仍進一服。此理貫通服藥之法。

其症遂安。連進二次。次早口瘡俱收。寒熱已定。病
遂愈。此蓋虛陽染患。不可不察也。

趙子固先生母劉氏。年近八十。左足面一瘡。下連大指。上延
外踝。以至廉骨。每歲輒數發。發必屢月。昏暮痒甚。爬搔移
時。出血如泉。呻吟痛楚。殆不可忍。夜分卽漸已。明日復然。
每一更藥。則瘡轉大而劇。百試不驗。如是二十餘年。淳熙
間。趙爲大府丞。一夕。母病大作。相對悲泣。無計。困極就睡。
夢四神僧。默坐一室。旁有長榻。先生亦坐。因而發歎。一僧

問其故先生答之以實僧云可服牛黃金虎丹又一僧云
硃砂亦可既覺頗驚異試取藥半粒強服之良久腹大痛
舉家且悔俄而下礮魂物如鐵石者數升是夕瘡但徹痒
不痛而無血數日成痂自此遂愈硃砂之說竟不復試先
生因圖僧像如所夢者而記其事金虎丹方出和劑本治
中風痰涎壅塞所用牛黃龍膽膾粉金箔之類皆非老人
所宜服今乃服竒效意此疾積熟藏府而發於皮膚歲久
根深未易蕩滌故假涼劑以攻之不可以常瘡論也神僧
之夢蓋誠孝感所致百一選方

有人遍身生熱毒瘡痛而不痒手足尤甚至頸而止黏著衣被

曉夕不得寐。痛不可忍。有人教以石菖蒲三升剉口乾之。
春羅爲末。布席上。使患者恣臥其間。仍以衣被覆之。既不
黏著。又復得睡。五七日間。其瘡如失。後以此治患此者。應
手效。其石菖蒲根絡石生者。節密入藥須此等。本草衍義

有人患遍身風熱細疹。痒痛不可任。連胸脇臍腹及近陰處。
皆然。痰涎亦多。夜不得睡。以苦參末一兩。皂角二兩。水一
升。揉擗取汁。銀石器熬成膏。和參末爲丸。梧桐子大。二三
丸。溫水下食後。次日便愈。本草衍義

有婦人患臍下腹上下連二陰。遍滿生溼瘡。如馬爪瘡。他處
並無。痒熱而痛。大小便濇出黃汁。飲食已減。身面微腫。醫

作惡瘡治用鰻鱺魚松脂黃丹之類藥塗上瘡愈熱痛愈甚治不對故如此問之此人嗜酒貪唱喜魚蝦發風之物急令用溫水洗拭去膏藥尋以馬齒莧四兩爛研細入青黛一兩再研勻塗瘡上卽時熱減痒痛皆去仍服八正散日三服分散客熱每塗藥得一時久藥已乾燥又再塗新溼藥凡如此二日減三分之一五日減三分之二自此二十日愈或問曰此瘡何緣至此曰中下焦蓄風熱毒氣若不出當作腸癰內痔乃須當禁酒及發風物然不能禁後果患內痔

本草衍義

一人遍身忽然肉出如錐痒痛不能飲食名血擁用赤皮葱

燒灰水淋汁洗內服淡豆豉湯數盞而愈

一人渾身生泡如甘棠梨破則出水內有石一片如指甲大
其泡復生抽盡肌肉不可治矣急用三棱莪术各五兩爲
末分三貼服酒調下

一人頂上生瘡如櫻桃有五色瘡破則頂皮斷逐日飲牛乳
自消

一人患此瘡脚膝攣痛有人取蝦蟇治如食法令食之敗毒而
攣痛自愈此亦偶中也

又一人患此瘡脚痛而腫或令採馬鞭草煎湯薰洗妙此方湯
氣纔到患處便覺爽快後溫洗之痛腫隨減

一人患此瘡，愈後數年，通身筋骨疼痛，遇一道流問曰：神色憔悴，有病耶？曰：因瘡遍身痛也。道流曰：輕粉毒也。遂示一方藥，味不過數品，但每貼入鉛五錢，打扁，同煎服之。果驗薛已治四明屠壽卿，孟夏當門齒如有所擊，痛不可忍。脉洪大，而弦。薛曰：弦洪相搏，欲發瘡毒也。先用清胃散加白芷、金銀花連翹一劑，痛即止。至晚，鼻上發一瘡，面腫黯痛，更用前藥加犀角一劑，腫至兩額，口出穢氣，脈益大，惡寒，內熱。此毒熾血瘀，藥力不能驟敵，乃數砭。患處出紫血，服犀角解毒之劑，翌日腫痛尤甚，又砭。患處與唇上并刺，口內赤，脈各出毒血，再服前藥，至數劑而愈。若泥瓦神不行砭

刺或全仗藥力鮮不誤矣

翰林屠漸山年逾四十患溼毒瘡誤用輕粉之劑虧損血氣久不愈一日將晡診其肝脉忽洪數而有力薛告之曰何肝脉之如此侵晨瘡出紫血三四碗許體倦自汙雖甚可畏所喜血黯而脈靜此輕粉之熱血受其毒而妄行其毒亦得以泄矣但邪氣去真氣虛也當急用獨參湯主之屠惑於他言以致邪氣連綿不已竟不起

一婦人性躁寒熱口苦脇痛耳鳴腹脹溺濇踰年矣症屬肝火用四君加柴胡炒山梔炒龍膽數劑乃與逍遙散兼服而瘡愈又與六味丸及逍遙散七十餘劑諸症悉退若有

愈後身起白屑，搔則肌膚如帛所隔。此氣血虛不能營于腠理。用大補之劑。若有愈後發熱。身起疙瘩痒痛。搔破膿水淋漓。經候不調。此肝火血熱。用四物加柴胡山梔白朮茯苓丹皮甘草。此二種亦要知之

一婦人日晡身痒，月餘口乾，又月餘成瘡，服祛風之劑，膿水淋漓，午前畏寒，午後發熱，殊類風症。薛謂此肝經鬱火外邪所搏，用補中益氣肝火未平參芪宜緩加山梔鉤藤，又以逍遙散加川芎貝母而愈。

一男子年十六夏作渴發熱，吐痰唇燥，遍身生疥，兩腿尤多，色黯作痒，日晡愈熾，仲冬腿患瘡尺脉洪數。薛曰：疥腎疳。

也。瘡骨疽也。皆腎經虛症針之。膿出其氣氤氳薛謂火旺之際必患瘡症。遂用六味地黃十全大補不二旬。諸症愈而瘡症具仍用前藥而愈。抵冬娶妻正春其症復作。父母憂之。俾其外寢。雖其年少謹疾亦服地黃丸數劑煎藥三百餘劑而愈。

石山治一人色蒼黃瘦年三十餘病遍身惡瘡因服輕粉而脚拘攣手指節腫額前神庭下腫如雞卵大方士令服孩兒膏謂能補也。汪診視脉皆濡緩而弱。虛熱。曰病已三年。毒已盡矣。但瘡潰膿血過多以致血液衰少筋失所養故脚爲之拘攣。況手指節間頭上額前皆血少運行難到之。

處故多滯而成腫理宜潤經益血行滯散腫今服孩兒猛火炮炙燥烈殊甚且向所服輕粉性亦躁急丹溪曰血難成易虧今外被瘡膿所涸內被輕粉所燥以難成易虧之血其何以當內外之耗不惟腫不能消恐天年亦爲之損也時正仲夏乃用十全湯去桂附加紅花牛膝黃柏薏苡仁木香火麻仁羌活煎服百貼空心常服東垣四神丹加黃柏又少加蜀椒以其能采水銀然後脚伸能行指腫亦消惟額腫傅膏而愈煩按此案并下案當依石山醫案入楊梅瘡門

一人年三十餘因患此瘡服輕粉致右腹脇下常有痞塊右眼黑珠時有疔子努出如雀屎許間或又消身有數瘡未

瘡一醫爲治瘡毒而用硝黃一醫爲治瘡塊而用攻劑一
醫爲治眼疔而用寒涼諸症不減反加腹痛腸鳴大便滑
泄胸膈壅悶不思飲食嘔氣吐沫身熱怠倦夜臥不安季
冬汪往視脈皆浮濡近駛曰誤於藥也前藥多係毒劑胃
中何堪遂令棄去更用人參四錢黃芪二錢白朮三錢茯
苓炒芍藥各一錢陳皮神曲升麻各七分甘草肉豆蔻各
五分煎服五貼爲腹痛定減去升麻又服五貼膈寬食進
減去豆蔻再服五貼諸症皆除月餘痞塊亦散眼疔亦消
一婦瘦長面紫每遇春末夏初兩脚生瘡膿泡根紅艱於行
步經水不調汪診視脈皆濡弱而駛兩尺稍滑曰血熱也

醫用燥劑居多故瘡不癢合用東垣四神丹加黃柏蜜丸服之瘡不復作

江篁南治旃田張氏子年二十餘因坐臥溼地遍身發瘡如血風狀醫與宣熱敗毒祛風之劑過多瘡雖稍愈而氣血侵損多矣身發寒熱步履艱難秋間輿來就治脉濡弱不任尋按疮殊甚腹內作膨作瀉午後發寒熱至五更汗出而退初爲滋補氣血兼扶脾清熱消導二劑膨去瀉止四服寒熱退但脾傷氣虛四肢無力泄瀉時作乃以參芪歸朮陳皮枳實黃柏麥冬等藥出入加減遣歸二月而愈因以煮酒水洗手足致瘡瘻復大發脈浮細而數初與防

風通聖散二服及與去風溼藥洗之瘡痍漸瘳繼與托裏健脾清熱之劑月餘而安

淞江一人生天泡瘡遍體越數日每泡中放出石子一箇隨其泡形爲之大小

吳城一人腰間生一癩膿中流出蛻蟲四條醫亦甚駭耳目所未經者癩後自愈不致傷生楓橋瘍醫龔生目覩人小腹生癩流出蛻蟲二條俱長六七寸後亦自愈五湖漫聞

翻花瘡

薛已治判官張承恩內股患癩將愈翻出一肉如菌薛曰此

屬肝經風熱血燥當清肝熱養肝血彼不信乃內用降火外用追蝕蝕而復翻翻而復蝕其肉益大元氣益虛始信薛言治之而痊

一男背瘡斂如豆許翻出肉一寸餘恪用消蝕藥并繫法屢去屢大三十許矣用加味道遙散三十餘劑外塗藜蘆膏而消瘡口將斂乃用八珍散倍用參芪歸朮峻補而斂

一婦人素善怒臂患癰瘍口出肉長二寸許用加味道遙散藜蘆膏而愈後因怒患處脹悶遍身汗如雨此肝經風熱風能散氣而然耳仍用前散并八珍湯而愈

一儒者項患腫硬乃用散堅行氣化痰破血之劑腫硬愈甚

喘氣發熱、自汗盜汗、形體倦怠、飲食少思。薛曰：此屬足三陰虧。當滋化源，彼惑衆論，乃用追蝕。患處開翻六寸許，巉巖色赤，日出鮮血，三月餘矣。肝脉弦洪緊實，薛用十全大補湯加麥冬五味五十餘劑，諸症稍得血止三四復因怒飲食頓少，血自湧出。此肝傷不能藏血，脾傷不能攝血，乃用補中益氣爲主，加五味麥冬，飲食漸進，其血頓止。再以六味丸加五味，常服瘡口漸斂。

疔瘡

徐嗣伯嘗聞屋中呻吟，徐曰：此疾甚重，乃往視之。見一老姥

稱體痛而處處有黯黑無數張還煮斗餘湯送令服之服訖痛勢愈甚跳投牀者無數須臾所黯處皆拔出釘長寸許以膏塗瘡口三日而復云此名釘疽也

郭氏治驗云一婦年近六十右耳下天窗穴間小腸患一疔瘡其頭黑蹙四邊泡起黃水時流渾身麻木發熱譫語時時昏沉六脉浮洪用烏金散汗之就以鍛針先刺瘡心不痛周遭再刺十餘下紫黑血出方知疼痛就將寸金錠子紝入瘡內外用提疔錠子放於瘡上膏藥貼護次日汗後精神微爽却用破棺丹下之病卽定其疔潰動後用守效散貼塗紅玉錠子紝之八日其疔自出矣茲所謂審脉症汗

下之間治以次第如此。視彼不察脉症但見發熱譖語便投涼藥與下。或兼以香竈之藥。遂致誤人者徑庭矣。

薛已治一婦。左手指患疔。麻痒寒熱惡心。左半體皆麻。脉數不時。見曰凡瘡不宜不痛。不可大痛。煩悶者不治。今作麻痒。尤其惡也。用奪命丹二服。不應。又用解毒之劑。麻痒始去。乃作腫痛。薛曰。勢雖危。所喜作痛。但毒氣無從而泄。乃針之。諸症頓退。又用解毒之劑而瘥。

蘇庠盛原博掌後患疔。紅絲至腕。惡寒發熱。勢屬表症。與奪命丹一服。紅絲頓消。又用和解之劑。大勢已退。彼又服敗毒藥。發渴發熱。紅絲仍見。脉浮大而虛。此氣血受傷而然。

以補中益氣湯主之而愈。紅絲再見而用補亦須細審。蓋奪命旣服瘡

邪已散而復用敗毒之劑是誅伐無過失內經之旨矣。

一儒者患疔元氣素弱薛補其氣血出膿而愈後因勞役瘡
痕作痒乃別服敗毒散一劑以致口噤舌強手足搐搦痰
涎上湧自汗不止虛症悉見此氣血復傷而復瘡也用十全大

補加附子一錢灌服而甦。

一男子患疔服奪命湯汗不止瘡不痛熱不止便不利此汗
多亡陽而真氣傷矣用參芪歸朮芍防五味二劑諸症悉
退惟以小便不利爲憂薛曰汗出不利小便汗止則陽氣
復而自利矣仍用前藥去防風加麥冬倍用黃芩當歸四

劑而便行瘡潰而愈

一老婦手大指患疔爲人針破出鮮血手背俱腫半體俱痛神思昏憒五日矣用活命飲二劑始知痛在手瘡勢雖惡元氣復傷不宜大攻用大補湯及活命飲各一劑外用隔蒜灸喜其手指皆赤腫而出毒水又各一劑赤腫漸潰又用托裏藥而瘥

表甥居富右手小指患疔色紫或云小瘡鍼刺出血敷以涼藥掌指腫三四倍黯而不痛神思昏憒煩燥不寧此真氣虛而邪氣實也先以奪命丹一服活命飲二劑稍可薛偶他往或遍刺其手出鮮血碗許腫延臂腕大如瓠手指

腫數倍不能潰。薛用大劑參芪歸朮之類。及頻灸遍手而腫漸消。但大便不實。時常泄氣。以元氣下陷。以補中益氣加骨脂。肉蔻。吳茱。五味。大便實而氣不泄。又日以人參五錢。麥冬三錢。五味二錢。水煎代茶飲之。又用大補藥五十餘劑而漸愈。此症初若不用解毒之劑。後不用大補之藥。欲生也難矣。

一人年二十。脣患疔四日矣。有紫脉自瘡延至口內。將及于喉。薛曰。此真氣虛而邪氣實也。若紫脈過喉。則難治矣。須針紫脉。併瘡頭出惡血。以泄其毒。則可。乃別用解毒之劑。頭面俱腫。求治甚篤。薛曰。先日之言不誣矣。診其脉洪數。

按之如無口內腫脹針不能入爲砭面與脣出黑血碗許勢雖少退畧進湯終至不起

都憲張恒山左足指患之痛不可忍急隔蒜灸三十餘壯卽能行步欲速愈或用涼藥敷貼遂致血凝肉死毒氣復熾再灸百壯服活命飲出紫血毒纔得解脚底通潰腐筋爛肉甚多將愈誤用生肌藥反助其毒元氣虧損而不能愈

薛治以托裏藥喜其稟實客處三月餘方愈大凡疔患于肢節灸法有回生之功設投以涼劑收斂腠理隧道壅塞邪氣愈甚多致不起若毒未盡驟用生肌輕者反增潰爛重者必致危亡琇按與熱病新愈

驟用溫補之誤同

名醫類案卷第九終

一男子足指患疔，腫焮痛赤。用隔蒜灸人參敗毒散加金銀花白芷大黃二劑，痛止。又用十宣散加天花粉、金銀花去桂數劑而愈。外科樞要有論宜考。

濮陽傳云：萬歷丁亥，金臺有婦人以羊毛遍鬻於市，忽不見繼而都人身生泡瘤，漸大痛死者甚衆。瘤中惟有羊毛道人傳一方，以黑豆、蕎麥爲末，塗擦毛落而愈。名羊毛疔。