

五

醫宗必讀

醫宗必讀卷之九

雲間李中梓士材父著

門人董爾正季方父叅

姪孫李廷芳蘅伯父訂

大便不通

經曰。北方黑色入通于腎。開竅于二陰。

腎主五液。津液

盛則大便調和。若饑飽勞役。損傷胃氣。及過于辛熱。厚味。則火邪伏下血中。耗散真陰。津液虧少。故大便燥結。又有年老氣虛。津液不足。而結者。腎惡燥急。食辛以潤之。是也。

愚按內經之言。則知大便秘結專責之少陰一

經證狀雖殊。總之津液枯乾。一言以蔽之也。分

而言之。則有胃實胃虛。熱秘冷秘。風秘氣秘之

分。胃實而秘者。善飲食。小便赤。麻仁丸十宣丸之類胃虛

而秘者。不能飲食。小便清利。厚朴湯熱秘者。面赤

身熱。六脉數實。腸胃脹悶。時欲得冷。或口舌生

瘡。四順清涼飲潤腸丸木香檳榔丸。實者承氣湯。冷秘者。面白或黑。六

脈沉遲。小便清白。喜熱惡冷。藿香正氣散加官桂枳殼。吞半硫丸。

氣秘者。氣不升降。穀氣不行。其人多噫。蘇子降氣湯。加

枳殼。吞養正丹。未效。佐以木香檳榔丸。風秘者。風搏肺藏。傳于大

腸瀝。小續命湯去附子。倍芍藥加竹

更有老年津

瀝。吞潤腸丸。或活血潤腸丸。

液乾枯。婦人產後亡血。及發汗利小便。病後血

氣未復。皆能秘結。法當補養氣血。使津液生。則

自通。誤用硝黃利藥。多致不救。而巴豆牽牛。其

害更速。

八珍湯加蘇子廣橘紅杏仁蔻仁倍用當歸。

若病證雖屬陰

寒。而脈實微躁。宜溫緩藥中。畧加苦寒。以去熱

躁。躁止勿加。如陰躁欲坐井中者。兩尺按之必

虛。或沉細而遲。但煎理中湯。待極冷方服。或服

藥不應。不敢用峻猛之藥者。宜蜜煎導之。

用鹽五分。

皂角末五分。入蜜煎中。其功更捷。

冷秘者。醬生薑導之。

或于蜜煎中加

草烏頭末

有熱者。猪膽汁導之。久虛者。如常飲食法。

煮猪血臘湯。加酥食之。血仍潤血。臘仍潤臘。此

妙法也。每見江湖方士輕用硝黃者。十傷四五。

輕用巴丑者。十十傷七。不可不謹也。

或久而愈結。或變爲

肺瘻吐膿血。或飲食不進而死。

醫案

少宰蔣恬庵。服五加皮酒。遂患大便秘結。四日以來。腹中脹悶。服大黃一錢。通後復結。余曰腎

氣衰少。津液不充。誤行疎利。是助其燥矣。以六
嚙丸。料煎成。加人乳一鍾。白蜜五錢。三劑後即
通十日而康復矣。

文學顧以貞。素有風疾。大便秘結。經年不愈。始
來求治。余曰。此名風秘。治風須治血。乃大法也。
用十全大補湯。加荳蔻。麻仁。杏仁。防風。煨皂角
仁。半月而效。三月以後。永不復患。以手書謝曰。
不肖道力僻處窮鄉。日與庸人爲伍。一旦擾非
常之疾。困苦經年。靡劑不嘗。反深沉痼。遂不遠

溫水下。大便通利即止。

七宣丸 治風氣結聚。實邪秘結。

桃仁

去皮尖
炒六兩

柴胡

各伍兩

調子皮

枳實

炒炒
十五兩

木香

各伍兩

甘草

炙四兩

大黃

麵裹煨
十五兩

右爲末。煉蜜丸如桐子大。每服二十丸。食前臨臥各一服。米飲下。以利爲度。

厚朴湯 治胃虛秘結。

厚朴

薑汁浸
炒透

陳皮

甘草

各三兩

白木

五兩

半夏麴

枳實

麸炒各

二兩

右爲龜末。每服五錢。水一鍾半。薑三片。棗一枚。煎至八分。食前大溫服。

四順清涼飲 治血燥內熱。大便不通。

大黃

蒸

甘草

炙

當歸

酒洗

芍藥

各一錢

水鍾半。薄荷十葉。煎至七分服。

潤腸丸

治風結血秘。胃中伏火。

羌活

歸尾

大黃

煨各五錢

麻仁

桃仁

去皮尖各一兩

右爲末。除麻仁桃仁另研如泥。外爲細末。煉蜜丸如桐子大。每服伍拾丸。空心白湯送下。

木香檳榔丸

疎導三焦。快氣化痰。消食寬中。

木香

檳榔

枳殼

麸炒

杏仁

去皮尖炒

青皮

去瓢一兩各半

夏麴

皂角

酥炙

郁李仁

各二兩

膏更入熟蜜少許。和丸桐子大。每服五十丸。

右爲末。別以皂角四兩。用漿水一碗。搓揉熬

食後薑湯下。

大承氣湯

大黃

芒硝

厚朴去皮

枳實

各二錢

水二鍾生薑三片。煎至九分。內硝煎服。

藿香正氣散

小續命湯

養正丹

八珍湯

俱見中風

蘓子降氣湯

治氣滯妨悶。痰盛便秘。

蘇子

炒

半夏

湯泡各三錢半

前胡

甘草 炙

厚朴

薑汁
浸炒

陳皮

各一
錢

當歸

一錢
二分

沉香

七分

水二鍾。薑三片。煎一鍾服。虛人加桂五分。黃耆一錢。

半硫丸 治老人虛人冷秘。

熟半夏

爲細硫黃

研極細用柳木槌子殺過

以生薑自然汁同熬。入乾蒸餅末攪和勻。入相內杵數百下。丸如桐子大。每服十五丸。至二十丸。溫酒或薑湯下。婦人醋湯下俱空心。

服。

橘杏湯

治脉浮氣秘。

若脈沉爲血秘。
以桃仁代杏仁。

杏仁

湯泡去皮尖炒黃五錢

橘紅

去白淨二錢半

水一鍾。生薑三片。煎七分服。

益血潤腸丸

熟地黃

六兩

杏仁

去皮尖炒

麻仁

各三兩

以朱俱

杵枳殼

麸炒

橘紅

各二兩五錢

阿膠

炒

肉蓯蓉

各一兩半

蘇子

荆芥

各兩

當歸

三兩

爲末。以前三味膏同杵千餘下。仍加煉蜜丸。
桐子大。每服六十丸。空心白湯下。

穿結藥 治大實大滿。心胸高起。便秘

蟾酥

輕粉

麝香

各一錢

巴豆

五分
另研

右研極細末。用孩兒茶乳汁和丸。如黍米大。
每服三丸。薑湯送下。

無期三承薑鳴矣

卷下

古海琳琳未用蘇兒茶飛升味此吸黍米大

巴豆

民齊
正名

譏宿

躰健

齋香

餘
一

罕詩藥

皆大實大蕭心嘲高歌更跡

麻子大無期六十生空心白鳴矣

為末以前三和膏同朴于翁子。以吹嗽之。

小便不禁

經曰。督脈生病爲遺溺。又曰。肝所生病爲遺溺。
督與肝二經並循陰器。繫廷孔。病則營衛不至。
氣血失常。莫能約束水道之竅。故遺失不禁。

又曰。膀胱不約爲遺溺。又曰。手太陰之別。名曰

列缺。其病虛則欠欬。小便遺數。

由此二節觀之
不獨病在陰器

廷孔而已。三焦爲決瀆之官。失其常則遺溺。何
也。三焦之脉。從缺盆布膻中。下鬲循屬三焦。膀
胱之脉。從肩膊內挾脊抵腰中。入循膂。屬膀胱。
凡三焦虛。則膀胱亦虛。故不約也。肺從上焦通
調水道。下輸膀胱。而腎又上連于肺。兩藏爲子
母。母虛子亦虛。此言上中下三焦氣虛。皆可以

致遺
溺也。

愚按世俗之治小便不禁者。但知補瀨而已。不知內經論肝督膀胱之病。不指爲何邪。所于則知七情六氣皆能爲病也。又言手太陰虛者爲子母相關之病。則知所生所勝所不勝之五邪。皆足以爲病也。總其大要而言。肺者主氣以下降。生水以下輸。膀胱者津液藏焉。氣化則能出。水泉不止者。膀胱不藏也。此兩經者實爲總司。

肺虛者爲上虛。當補氣。補中益氣湯。不愈當以黃蘖生地麥門冬清其熱。膀胱虛者爲下虛。當瀉脫。桑螵蛸雞膾腎之類。挾寒者家韭子。

左固脾丸。白茯苓散。兎絲子散之類。滑脫者牡蠣丸。挾熱者白薇散。或雞腸散。更有睡則遺尿。皆責之虛。所以嬰兒脾氣未固。老人下元不足。多有此證。在嬰兒挾熱者十居七八。在老人挾寒者十居七八。此又不可不辨也。宜大兔子丸。猪脬灸研碎煎湯送下。

用白礬牡蠣爲末。酒調服二錢。

或雞毛灰末酒服一七。或灸桑螵蛸益智仁爲末。米飲下。薛立齋云。此證若脬中有熱。加味逍遙散。若肺脾氣虛。補中益氣湯。加益智。若肝腎

陰虛六味丸。

產後小便不禁

此氣血虛不能制故也。薛立齋

云。若因穩婆損胞者。入珍湯。兼進補脬飲。若膀胱氣虛。而小便頻數。當補肺脾。若膀胱陰虛者。須補肺腎。

醫案

方伯張七澤夫人。患飲食不進。小便不禁。余曰。六脉沉遲。水泉不藏。是無火也。投以八味丸料。兼進六君子。加益智肉桂。二劑減。數劑而安。

文學俞玄倩憂憤經旬忽然小便不禁。醫皆以固脬補腎之劑投之。凡一月而轉甚。余謂之曰。六脉舉之則軟。按之則堅。此腎肝之陰有伏熱也。用牡丹皮白茯苓各二錢。苦參八分。甘草稍六分。黃連一錢。煎成調黃雞腸與服。六劑而安矣。適有吳門醫者云。旣愈當大補之。數日後。仍復不禁。再來求治。余曰。肝家素有鬱熱。得溫補而轉熾。遂以龍膽瀉肝湯加黃雞腸服之。四劑即止。更以四君子加黃連山枝。一月而痊。

家韭子丸

治遺溺。夢遺白濁。

家韭子

炒陸兩

鹿茸

四兩酥炙

肉蓯蓉

酒浸去甲

牛膝

酒浸

熟地黃

當歸

各二兩

兔絲子

酒浸

巴戟

各一兩五錢

杜仲

炒

石斛

去苗浸

桂心

乾薑

各二兩

右爲末。酒糊丸。桐子大。每服五十丸。加至百丸。空心食前。鹽湯溫酒任下。

固脬丸

兔絲子

製二兩

茴香

一兩

附子

泡去皮臍

桑螵蛸炙各五錢
戎鹽二錢五分

右爲細末。酒糊丸。梧子大。每服三十丸。空心
米飲送下。

白茯苓散

白茯苓

龍骨

乾薑

炮

附子

炮去皮臍

續斷

桂心

甘草

炙各一兩

熟地黃

桑螵蛸

微炒各二兩

右剉碎。每服四錢。水一盞。煎六分。食前服。

鹿茸散 治小便不禁。陰痿脚弱。

鹿茸

二兩去毛酥炙

韭子

微炒

羊躑躅

酒拌炒乾

附子

炮

澤瀉

桂心

各一兩

右爲細末。每服貳錢。食前粥飲調服。

兔絲子散 治小便不禁。或過多。

兔絲子

二兩。酒浸三日。晒乾。另搗爲細末。

牡蠣

附子

炮皮去

五味子

各二兩

鷄肝

炒黃皮

肉蓯蓉

各二兩

右爲末。每服二錢。粥湯送下。

牡蠣丸

牡蠣 白者三兩入磁瓶鹽泥固濟。
炭伍斤，煖半日取出研細。

赤石脂 三兩。搗碎。醋拌勻濕于生鐵鑊內慢火炒令乾。二味各研如粉。

酒糊丸。梧子大。每服伍拾丸。空心鹽湯下。

白薇散

白薇

白斂

白芍藥

各等分

右爲末。每服二錢。粥飲下。

雞腸散

黃雞腸

雄者四具切破

黃連

去鬚

肉蓯蓉

酒洗切焙

赤石脂

另研

白石脂

另研

苦參

各五兩

右爲末每服二錢。食前酒下。日二夜一。

大兎絲子丸

治腎虛小便不禁。

兔絲子

淨洗酒浸

澤瀉

鹿茸

去毛酥炙

石龍芮

去上宿

肉桂

去龜皮

附子

炮去皮各一兩

石斛

去根

熟地黃

白茯苓

去皮核

牛膝

酒浸宿焙乾一續斷

山茱萸

去核

肉蓯蓉

酒浸切焙

防風

去蘆

杜仲

去龜皮炒去絲

補骨脂

去衣酒炒

草澄茄

沉香

巴戟 去心

茴香 炒各

三兩

五味子

桑螵蛸

酒浸炒

覆盆子

枝葉各半

芎藭

各半

右爲細末。酒煮麵糊丸如桐子大。每服二十丸。空心溫酒。或鹽湯任下。

逍遙散 治血虛小便不禁。

白茯苓

白术

土炒

當歸身

白芍藥

酒炒

柴胡

各一錢

甘草

五分

水一鍾。煨薑三分。煎至六分服。

補

氣湯

八珍湯

六味丸

俱見
虛勞

小便不禁

補脬飲 治產時傷脬。小便漏出。

生黃絲絹

一尺剪碎

白牡丹

根皮用子葉者

白芨

各一錢

右爲末。水一碗。煮至絹爛如錫空心頓服。服

時不得作聲。作聲即不效。

桑螵蛸散 治陽氣虛弱。小便不禁。

桑螵蛸

三十箇炒

鹿茸

酥炙

黃耆

各三兩

牡蠣殼

人參

赤石脂

各二兩

右爲末。每服二錢。空心粥飲調服。

遺精夢與女交爲夢遺不因夢而自遺者爲精滑

經曰。怵惕思慮者。則傷神。神傷則恐懼。流滛而不止。而兼之以怵惕。則神傷而心怯。心怯則恐懼。而傷腎。腎傷則精不固。此心腎不交故不能收攝也。

又曰。恐懼而不解。

則傷精。精傷則骨痠痿厥。精時自下。

即上文之意而申言

之。又曰。五藏主藏精者也。傷則失守。

此言五藏各主藏精

非腎之一藏。獨有精也。五藏一有所傷。則失其藏精之職。而不能自守。所以精不能固。時有遺漏之

患也。又曰。腎者主水。受五藏六府之精而藏之。

食氣入胃。散精于五藏。又水飲自脾肺而輸之于腎。水精四布。五經並行。此水穀日生之精也。

後天日生之精與先天生來之精互化生成。又總論于腎故曰受五藏六府之精而藏之。

曰厥氣客于陰器則夢接內。

陰器者宗筋之所繫也。足太陰陽明

少陰厥陰之筋皆結聚于陰器與衝任督三脈之所會然厥陰主筋故諸筋皆統屬於厥陰也。腎爲陰主藏精肝爲陽主疏泄陰器乃泄精之竅是故腎之陰虛則精不藏肝之陽強則氣不固若遇陰邪客于其竅與相火強陽相感則夢寐之間精氣漏泄矣。

愚按古今方論皆以遺精爲腎氣衰弱之病若與他藏不相干涉不知內經言五藏六府各有精腎則受而藏之以不夢而自遺者心腎之傷居多夢而後遺者相火之強爲害若乎五藏各

得其職則精藏而治苟一藏不得其正甚則必害心腎之主精者焉。治之之法獨因腎病而遺者治其腎由他藏而致者則他藏與腎兩治之如心病而遺者必血脈空虛本縱不收肺病而遺者必皮革毛焦喘急不利脾病而遺者色黃肉消四肢懈惰肝病而遺者色青而筋痿腎病而遺者色黑而髓空更當以六脉參詳昭然可辨然所困更自多端。有用心過度心不攝腎而失精者宜遠志丸佐以靈砂丹。有色慾不遂而致精泄者

四十湯。吞白丸子。甚者耳聞目見。其精即出。名曰白淫。玆香散。吞玉華白丹。

過度。精竅虛滑。

正元散。加牡蠣粉肉蔻各半錢。吞靈砂丹。仍佐以鹿茸丸。山

藥丸。大兔絲子丸。固陽丸之類。

有壯年久曠。精滿而溢。

清心丸。

飲酒厚味。痰火濕熱。擾動精府。

蒼朮白朮半夏橘紅。俟芩甘草

升麻柴胡。俾清升濁降。脾胃健運。則遺滑自止。

有脾虛下陷者。

補中益氣湯

有腎虛不固者。

五倍子貳兩。茯苓四兩。爲丸。服之神驗。

然其證狀

亦復不同。或小便後出多不可禁者。或不小便而自出。或莖中癢痛。常如欲小便者。或夢女交

者。並從前法分別施治。或實有鬼魅相感。其狀

不欲見人。如有對晤時。獨言笑。時常悲泣。脉息乍大乍小。乍有乍無。及脉來綿綿。不知度數。而顏色不變。乃其候也。

宜珠砂。雄黃。麝香。鬼箭虎頭骨之類。或但服蘇合丸。

效。更有久曠之人。或縱慾之人。與女交合。泄而不止。謂之走陽。其女須抱定勿使陰莖出戶。急呷熱氣于口中。以指捻住尾閭。即救矣。若女人驚而脫去者。十有九死。亟以童女接氣灌以大劑。獨參湯亦有活者。總其大綱。言之精滑。宜潤之澀。而不效。即瀉心火。瀉而不效。即以補中益

氣用升麻柴胡至一二錢舉其氣上而不下。往
往有功。詎可補之不效。澀之無靈。遂委之命也哉。

醫案

文學顧以功科試勞神。南都歸即患精滑。小便後及夢寐間俱有遺失。自服金櫻子膏。經月不驗。問治于余。余曰。氣虛而神動。非遠志丸不可。服十日而減半。一月而全愈。

武科張寧之稟質素強。縱飲無度。忽小便畢。有

白精數點。自以爲有餘之疾。不肯醫治。經三月以來。雖不小便。時有精出。覺頭目眩。運醫者以固精澀脫之劑。治療兩月。畧不見功。迎余治之。但見六脈滑大。此因酒味濕熱。下于精藏。遂以白术茯苓橘紅甘草乾葛白蔻加黃柏少許。兩劑後即效。不十日而康復如常。

儒者錢用賓。色慾過度。夢遺精滑。先服清相火之劑。不效。繼服固澀之劑。又無效。求余治之。余以玉華白丹濃煎。人參湯送貳錢。兩服後稍固。

兼進六味地黃丸加蓮鬚芡實遠志五味子。凡
一月而愈

遠志丸 治心腎不足。夢遺精滑

茯神去皮木 白茯苓去皮膜 人參

龍齒各一兩

遠志去木薑汁浸

石菖蒲各二兩

右爲末。蜜丸桐子大辰砂爲衣。每服七十丸。
空心熟鹽湯下。

靈砂丹治上盛下虛。痰涎壅盛。最能鎮墜。
升降陰陽。調和五藏。補助元氣。

水銀

一斤

硫黃

四兩

右二味用新銚內炒成砂子入水火悞煅爲末糯米糊丸如麻子大每服三丸空心米湯米湯參湯任下忌猪羊血菉豆粉冷滑之物

茯神湯 治慾心太熾夢遺心悸

茯神

去皮木一錢半

遠志

去心

酸棗仁

炒各一錢二分

石菖蒲

人參

白茯苓

各一錢

黃連

生地黃

各八分

當歸

酒洗一錢

甘草

四分

水二鍾。蓮子七粒。槌碎煎八分。食前服。

四七湯

治七情鬱結痰氣妨悶
嘔吐惡心神情不快

半夏

一錢
伍分

茯苓

去皮一錢
二分

紫蘇葉

六分

厚朴

薑製
九分

水一鍾。薑七片。紅棗二枚。煎八分服。

青州白丸子

治風痰壅盛。癱瘓。嘔吐涎沫。氣不舒暢。悶悶不寧。

半夏

生七兩
水浸洗

南星

生三兩

白附子

生二兩

川烏

生半兩
去皮臍

右爲末。以生絹袋盛於井花水內揉出滓。再

研再操以盡爲度置磁盆中日晒夜露至曉去舊水別用井水攪又晒至來日早再換新水攪春五日夏三日秋七日冬十日去水晒乾以糯米粉煎粥清丸菉豆大薑湯下二十丸

妙香散 安心神閉精氣

龍骨五色者

益智仁

人參

各一兩

白茯苓去皮

遠志去心

茯神

去皮木各半兩

硃砂

水飛

甘草

炙各貳錢五分

右爲末。每服二錢。空心溫酒調服。

玉華白丹

清上實下。助養本元。最治二便不固。夢遺精滑等證。

鍾乳粉

煉成者一兩

白石脂

淨瓦上煅通磁罐中研細水飛

陽起

石

淬放陰地上令通紅。取出酒

左顧牡蠣

七兩

洗用韭菜搗汁鹽泥固濟火煅取白者。

右四味各研令極細。拌和作一處研一二日。以糯米粉煮糊爲丸。如芡實大。入地坑。出火毒一宿。每服一粒。空心濃煎人參湯待冷送下。不滯不燥。可以久服。大補真元。最祛宿疾。

婦人無姪者。當歸地黃浸酒送下。凡服藥後。
以少少白粥壓之。忌猪羊血菉豆粉。

正元散

治下元虛。臍腹脹痛。泄利嘔吐。陽虛自汗。夢遺精滑。手足厥冷。一切虛寒。

紅豆

炒

乾薑

炮

陳皮

去白各三錢

茯苓

去皮

人參

白朮

甘草

炙各二兩

肉桂

去龕皮

川烏

炮去皮各半兩

附子

炮去皮尖

山藥

薑汁浸炒

川芎

烏藥

乾葛

各一兩

黃耆

炙一兩五錢

右爲細末。每服三錢水一盞。薑三片。棗一枚。

鹽少許煎七分。食前溫服。

鹿茸益精丸 治心腎虛冷漏精白濁。

鹿茸

去毛
酥炙

桑螵蛸

尾上
焙

肉蓯蓉

巴戟

去心

菟絲子

酒浸
杜仲

去皮
薑

杜仲

益智仁

禹餘糧
火煅

川棟子

去皮
核

當歸

各三
兩

韭子

微炒

補骨脂

炒

山茱萸

去核

赤石脂

另研各

五錢

滴乳香

二錢
五分

爲末酒煮糯米糊爲丸。桐子大。每服七十丸。

食前白茯苓煎湯送下。

山藥丸 治諸虛百損。夢失精滑。

赤石脂

煅

茯神

去木皮

山茱萸

去核

熟地黃

酒浸

巴戟

去心

牛膝

酒浸

澤瀉

各一兩

杜仲

去皮薑炒

菟絲子

酒浸

山藥

各三兩

五味子

大兩

肉蔻

四兩

右爲末。蜜丸桐子大。每服三錢。鹽湯送下。

大菟絲子丸

見小便不禁

固陽丸

附子

炮

三 川烏頭

炮

二 白龍骨

一兩

補骨脂

舶上茴香

川棟子

各一兩
七錢

右爲末。酒糊丸桐子大。每服五十丸。空心酒

下

補中益氣湯

方見
疊瘍

蘇合香丸

方見
中風

秘真丸

固精安神

龍骨

一兩

訶子皮

五枚

砂仁

五錢

殊砂

水飛一兩

右爲末。麵糊丸。豆大。每服三錢。空心酒下。

赤白濁

經曰。思想無窮。所願不得。意淫于外。入房太甚。
宗筋弛縱。發爲筋痿。及爲白淫。此已見遺精條矣。茲復收者爲濁病。仍在精竅。與淋病之在溺竅者不同也。每見時醫治濁多以淋法治之。五苓八正雜投。不已而病反增劇。不知經論祇屬精病也。

愚按經文及細考前哲諸論。而知濁病即精病。非溺病也。故患濁者。莖中如刀割火灼而溺自清。惟竅端時有穢物。如瘡之膿。如目之眵。淋漓不斷。與便溺絕不相混。大抵由精敗而腐者。十

之六七。由濕熱流注與虛者十之二三。其有赤白之分者何也。精者血之所化。濁去太多。精化不及。赤未變白。故成赤濁。此虛之甚也。所以少年天癸未至。強力行房。所泄半精半血。壯年施泄無度。亦多精血雜出。則知丹溪以赤屬血。白屬氣者。未盡然也。又以赤爲心虛有熱。由思慮而得。白爲腎虛有寒。因嗜欲而得。亦非確論。總之心動于欲。腎傷于色。或強忍房事。或多服淫方。敗精流溢。乃爲白濁。虛滑者。氣變。乃爲

赤白濁

經曰。思想無窮。所願不得。意淫于外。入房太甚。
宗筋弛縱。發爲筋痿。及爲白淫。此已見遺精條矣。茲復收者爲濁病。仍在精竅。與淋病之在溺竅者不同也。每見時醫治濁多以淋法治之。五苓八正雜投不已。而病反增劇。不知經論祇屬精病也。

愚按經文及細考前哲諸論。而知濁病即精病。非溺病也。故患濁者。莖中如刀割火灼而溺自清。惟竅端時有穢物。如瘡之膿。如目之眵。淋漓不斷。與便溺絕不相混。大抵由精敗而腐者。十

赤濁。挾寒。則脈來沉遲無力。小便清白。

草薢分清飲入

味丸、內補鹿茸丸之類

挾熱。則口渴便赤。脉必滑數有力。

清心蓮子飲香苓散

有胃中濕痰流注。

蒼白二陳湯加升麻柴胡

有屬

虛癆。

六味地黃丸加蓮鬚芡實菟絲五味龍骨牡蠣

有因伏暑。

四苓散加香薷

麥門冬人參石蓮肉之類。

有稠粘如膠澀痛異常。乃精塞竅

道。

香苓散送八味丸或金匱腎氣丸

有熱者草薜分清飲茯菟丸。有思想太過。

心動煩擾。則精敗下焦。

加味清心飲瑞蓮丸之類如上數端。

此其大畧也。若夫五藏之傷。六淫之變。難以枚舉。臨症之頃。慎無輕忽。

舉臨症之頃。慎無輕忽。

濇爲虛尺脉虛浮急疾者皆難治遲者易治

醫案

歸德郡侯李易齋患白濇服五苓散數劑無功。余診之兩尺大而濇是龍火虛炎精闕竅道用牛膝茯苓黃芩麥門冬山藥遠志細生甘草十劑而安。

光祿卿吳伯玉閉精行房時有文字之勞患白濇莖中痛如刀割自服清火疎利之劑不效改

服補腎之劑。又不效。商治于余。余曰。敗精久蓄。
已足爲害。况勞心之餘。水火不交。坎離順用也。
用草薢分清飲。加茯神。遠志。肉桂。黃連。四劑即
效。兼服補中益氣。六味地黃丸。半月而安。後因
勞復發。但服補中益氣。一二劑即愈。

清心蓮子飲 治心虛有熱。小便赤濁

黃芩

麥門冬

去心

地骨皮

車前子

甘草

炙各一錢五分

石蓮肉

白茯苓

黃耆

蜜炙

人參

各七分半

遠志

石菖蒲各一錢

水二鍾煎一鍾空心溫服。發熱加柴胡薄荷。
草薢分清飲 治真元不固。赤白二濁。

益智仁

川草薢

石菖蒲

烏藥

各一錢

水一鍾入鹽一捻煎七分。食前服。一方加茯苓甘草

蒼白二陳湯

治濕痰下注爲白濁。

蒼朮

揀炒

白术

土炒各一錢半

橘紅

一錢

半夏

二錢

茯苓

一分一錢半

甘草

四分

水二鍾薑三片煎一鍾服。

四苓散

茯苓去皮

猪苓去皮

白朮土炒

澤瀉各等分

右爲細末。每服三錢。空心長流水調服。

玄兔丹

治三消渴利神藥。禁止遺濁。

兔絲子

酒浸通軟乘濕研、焙乾別取末十兩

五味子

酒浸別爲末淨

七兩白茯苓去皮

乾蓮肉名三兩

右爲末。別碾乾山藥末六兩。將所浸酒添酒。

醫宗必讀 卷之九
煮糊搜丸如桐子大。每服五十丸。空心食前
米飲下。

六味地黃丸 八味地黃丸 補中益氣湯

見盧勞

金匱腎氣丸

見腫脹

內補鹿茸丸 補益精氣。善止白淫。

鹿茸

酥炙

兔絲子

酒浸蒸焙

蒺藜炒

沙苑蒺藜

肉蓯蓉

紫菀

鰐床子

酒蒸浸

黃耆

桑螵蛸

陽起石

附子

炮

官桂

各等分

右爲細末。蜜丸桐子大。每服三十九。食前溫酒送下。

香芩散

即五芩散與辰砂炒香散合用。

山藥

薑汁炒

茯苓

去皮

茯神

去皮木

遠志

去心炒

黃耆

各一兩

人參

桔梗

去蘆

甘草

炙各半兩

木香

煨二錢五分

辰砂

三錢另研

麝香

一錢另研

猪苓

去皮

白术

土炒

澤瀉

各八錢

肉桂

二錢

右爲細末。每服二錢。用天麥二門冬去心。前

湯空心調服。日三服。頓愈。

茯兎丸

治思慮太過。心腎虛傷。真陽不固。
溺有餘瀝。小便白濁。夢寐頻泄。

兔絲子

酒浸五兩

石蓮子

去殼二兩

白茯苓

去皮三兩

右爲細末。酒糊丸如桐子大。每服五十丸。空

心鹽湯下。

加味清心飲 治心中煩熱。赤濁肥脂。

白茯苓

去皮

石蓮肉

各一錢半

益智仁

麥門冬

去心

人參

去蘆

遠志

去心

薑

石菖蒲

車前子

白朮

炒

汁炒

澤瀉

甘草

炙各一錢

水二鍾。燈心二十莖。煎至一鍾。食前服。有熟。

加薄荷少許。

瑞蓮丸 治思慮傷心。赤白二濁。

白茯苓 去皮 石蓮肉 去心 龍骨 生用

炒

天門冬 去心 麥門冬 去心 柏子仁

研

紫石英 火煅 研細 遠志 甘草水 當歸 去蘆
煮去心 當歸 酒浸

酸棗仁 炒

兩

龍齒 各

兩

乳香 半

兩 另研

右爲細末。蜜丸梧子大。硃砂爲衣。每服七十

丸。空心温酒或棗湯送下。

遠志丸 治赤濁如神。

遠志

入兩
去心

茯神

去皮
木

益智仁

各二
兩

右爲細末。酒煮麵糊爲丸梧子大。每服五十

丸。臨臥棗湯送下。

鎖精丸 治赤白濁。

補骨脂

炒

青鹽

各四
兩

白茯苓

五倍子

各二
兩

右爲細末。酒煮糊爲丸如梧子大。每服三十

丸空心鹽湯送下。

水陸二仙丹 治赤白濁。

金櫻子

去子及毛淨蒸熟慢火熬成膏

芡實肉

研爲細粉各等分

右以前膏同酒糊爲丸梧子大每服三十丸

食前溫酒下。一方用乳汁丸鹽湯下。

赤腳道人龍骨丸 治白濁

龍骨

牡蠣

各半兩

右研爲末入鯽魚腹內濕帛裹入火內炮熟。

取出去紙將藥同魚肉丸如桐子大每服三

十丸。空心米飲下。鯽魚不拘大小。只以着盡
上件藥爲度。更加茯苓遠志各半兩。尤佳。

水鹽二味散。常赤白膿。

武空心米飲卷下

痰飲

稠濁者爲痰。清稀者爲飲。

經曰。太陰在泉。濕淫所勝。民病飲積。又曰。歲土太過。雨濕流行。甚則飲發。又土鬱之發。太陰之復。皆病飲發。

接痰之爲病。十嘗六七。而內經叙痰飲四條。皆因濕土爲害。故先哲云。脾爲生痰之源。又曰。治痰不理脾胃。非其治也。夫飲入于胃。游溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸于肺。通調水道。下輸膀胱。水精四布。五經並行。何痰之有。惟脾土虛。

濕清者難升。濁者難降。雷中滯禹淤而成痰。故治痰先補脾。脾復健運之常。而痰自化矣。拆而言之。痰有五。飲亦有五。而治法因之而變。在脾經者。名曰濕痰。脉緩面黃。肢體沉重。嗜臥不收。腹脹食滯。其痰滑而易出。二陳湯、白朮丸、挾虛白蔻乾葛、挾食者保和丸、挾暑者消暑丸、驚者妙應丸。在肺經者。名曰燥痰。又名氣痰脉澀面白。氣上喘促。洒淅寒熱。悲愁不樂。其痰澀而難出。利金湯、潤肺飲在肝經者。名曰風痰。脉弦面青。四肢滿悶。便溺秘澀。時有躁怒。其痰。

青而多泡

水煮金花丸防風丸川芎丸

在心經者名曰熱痰

脈洪面赤煩熱心痛口乾唇燥時多喜笑其痰

堅而成塊

小黃丸天黃湯

在腎經者名曰寒痰脉沉面

黑小便急痛足寒而逆心多恐怖其痰有黑點

而多稀

薑桂丸八味丸胡椒理中丸

其人素盛今瘦水走腸

間轆轤有聲名曰痰飲心下冷極以溫藥和之

桂苓甘术湯主之

飲後水流在脇下咳嗽引痛名曰懸

飲

十棗湯

飲水流于四肢當汗不汗身體疼重

名曰溢飲

大青龍湯汗之

欬逆倚息短氣不得臥其形

如腫名曰支飲

五苓散澤瀉湯利之

膈滿嘔吐喘欬寒熱。

腰背痛目淚出其人振振惡寒身瞞悶者名曰

伏飲

倍术丸

更有一種非痰非飲時吐白沫不甚

稠粘此脾虛不能約束津液故涎沫自出宜用

六君子湯加益智仁以攝之嗟乎五痰五飲證

各不同治法迥別

稍或不詳妄投藥劑非徒無

益而又害之至如肺肺二家之痰尤不可混脾

爲濕土喜溫燥而惡寒潤故二术星夏爲要藥

肺爲燥金喜涼潤而惡溫燥故二母二冬地黃

桔梗爲要藥。二者易治。鮮不危因。每見世俗惡半夏之燥。喜貝母之潤。一見有痰便以貝母投之。若是脾痰。則土氣益傷。飲食忽減矣。即使肺痰。毋過于涼潤。以傷中州。稍用脾藥。以生肺金。方爲善治。故曰治痰不理脾胃。非其治也。信夫。

脈候

經曰。肝脉弦而散色澤者當病溢飲。

偏弦爲飲。浮而滑爲飲。沉而滑者懸飲。飲脉皆弦微沉滑。左右關脉實者。膈上有痰可吐之。眼胞及眼下如烟煤者痰也。痰得濇

醫案少言 卷之六

脉難愈

醫案

刑部主政徐凌如勞且怒後神氣昏倦汗出如浴。語言錯亂危困之極迎余療之診其脈大而滑且軟此氣虛有痰也用補中益氣湯料併四貼爲一劑用參至壹兩加熟附子壹錢熟半夏三錢四日而稍甦更以六君子加薑汁一鍾服數日兼進八味丸調理兩月而康。

郡侯王敬如患痰嗽輒服清氣化痰丸漸至氣

促不能食。余曰。高年服土不足故有是證。若服前丸。則脾土益虛矣。投以六君子湯加煨薑三錢。益智一錢五分。十劑而痰清。更以前方煉蜜爲丸。約服一觴。飲食乃進。

翰林李集虛。勞而無度。醉而使內汗出多痰。服寬膈化痰之藥。轉覺滯悶。診其脈沉而濇。兩尺尤甚。余謂其婿楊玄潤曰。痰得濇脉。一時難愈。况尺中濇甚。精傷之象也。在法不治。玄潤強之。投劑。勉用補中益氣加半夏茯苓。兩劑有小效。

衆皆喜余曰。濟象不減。脉法無根。死期近矣。果十餘日而歿。

文學朱文哉。遍體如蟲螯。口舌糜爛。朝起必見二鬼。執盤食以獻。向余慟哭曰。余年未滿三十。高堂有垂白之親。二鬼旦暮相侵。決無生理。倘邀如天之力。得以不歿。即今日之秦越人矣。遂叩頭流血。余診其寸脉乍大乍小。意其爲鬼祟。細察兩關。弦滑且大。遂斷定爲痰飲之病。投滾痰丸三錢。雖微有所下。而病患如舊。更以小胃

丹二錢與之。復下痰積及水十餘碗。遍體之痛減半。至明早。鬼亦不見矣。更以人參三錢。白朮二錢。煎湯服。小胃丹三錢。大瀉十餘行。約有二十碗。病若失矣。乃以六君子爲丸。服四効而痊。

白朮丸 治濕痰咳嗽

南星

半夏

各一兩
俱湯洗

白朮

一兩
五錢

右爲細末。湯浸蒸餅爲丸。梧子大。每服四錢。食後生薑湯下。

二陳湯 治脾胃不和。一切痰證。

半夏

湯洗七次

橘紅

各五兩

白茯苓

三兩

炙甘草

一兩五錢

每服五錢水二鍾。薑七片烏梅一枚煎八分。
不拘時熟服。

六君子湯

人參

去蘆

白术

土炒

茯苓

各一錢

半夏

橘紅

各一錢五分

炙甘草

五分

水二鍾。薑五片煎至一鍾溫服。

理中化痰丸

治虛寒嘔吐泄瀉飲食難化。

人參

白术

炒

茯苓

甘草

乾薑

半夏

薑製

等分爲末。水丸桐子大。每服三錢。白湯送下。

八味丸

補中益氣湯

方見虛癆

導痰湯

治痰涎壅盛。痞塞不通。

半夏

湯洗七次四兩

南星

炮去皮

枳實

去瓢麸炒

赤茯苓

去皮橘紅

各一兩

甘草

炙半兩

每服四錢。水一盞。薑十片。煎八分。食後服。

保和丸 治食積酒積。

山楂肉

二兩

半夏

薑製

橘紅

神麴

炒

麥芽

炒

白茯苓

各一
兩

連翹

萊菔子

炒

黃連

各半
兩

右爲末。滴水爲丸。加白术三兩。名大安丸。

消暑丸

中暑藥。皆不及此。人所未知。

半夏

一碗煮乾。一觔醋五

甘草

生用

茯苓

去皮各半觔

右爲末。薑汁煮糊丸。忌見生水。如桐子大。每服五十丸。熱湯送下。有痰生薑湯下。入夏後不可缺此。

妙應丸

一名控涎舟

甘遂

去心

紫大戟

去皮

白芥子

各等分

右爲末。煮糊丸如桐子大。晒乾。臨臥淡薑湯下。七丸至十丸。氣實痰猛加丸數不妨。加硃砂二錢。全蝎三錢。治驚痰極效。

利金湯

新製

治氣壅之痰。

桔梗

炒

貝母

薑炒

陳皮

去白各三錢

枳殼

錢炒一分五分

茯苓

二錢

甘草

五分

水二鍾。薑五片。煎一鍾。不拘時服。

潤肺飲

新製

貝母

糯米
拌炒

天花粉

各二錢

桔梗

一錢

甘草

五分

麥門冬

去心

橘紅

去白

茯苓

去皮各一錢半

生地黃

二錢半

知母

酒炒七分

水二鍾薑三片煎七分食後服。

水煮金花丸

南星

半夏

各一兩俱生用

天麻

五錢

雄黃

二錢

白麵

三兩

右爲細末滴水爲丸每服五十丸至百丸先

煎漿水令沸。下藥煮至藥浮爲度。濾出淡漿。
水浸。另用生薑湯送下。

防風丸 治一切風痰

防風

川芎

天麻

酒浸
二宿

甘草

炙各
二兩

硃砂

半兩
研
水飛

右爲末。煉蜜丸。每丸重一錢。硃砂爲衣。每服
一丸。荆芥湯化服。

川芎丸 消風化痰。清上利膈。

川芎

薄荷葉

焙乾各
十
兩半

桔梗

十兩

甘草 炙三
兩半

防風 去苗二
兩半 細辛 洗五
錢

右爲細末。煉蜜丸。每丸重三分。每服一丸。食

後臨臥。細茶囁下。

小黃丸 治熱痰咳嗽。

南星

湯洗

半夏

湯洗

黃芩

各一
兩

右爲細末。薑汁浸蒸餅爲丸。桐子大。每服七
十丸。食後生薑湯下。

天黃湯

天花粉

黃連

各十
兩

竹葉煎湯爲丸。菉豆大。每服三錢。薑湯下。

薑桂丸 治寒痰咳嗽。

南星

洗

半夏

洗

官桂

去皮各一兩

右爲末。蒸餅丸。桐子大。每服五十丸。食後生

薑湯送下。

胡椒理中丸 治虛寒。痰多食少。

款冬花

去梗

胡椒

甘草

炙

牽撥

良薑

細辛

去苗

陳皮

去白

乾薑

各四兩

白术

五兩

右爲細末。蜜丸梧子大。每服三十丸。加至五十丸。米飲下。日二服。

桂芩术甘湯

茯苓四錢 桂枝 白术各五錢

甘草二錢

水二鍾煎一鍾溫服。

牛棗湯

見傷寒

小胃丹

神芎導水丸

舟車神

祐丸

大聖瀉川散

重見腫

五苓散

見傷寒

青州白

尤子

見遺精

大青龍湯

麻黃

去節六錢

桂枝

去皮二錢

甘草

炙二錢

杏仁

去皮一錢

生薑

三錢

大棗

二枚去核

石膏

二錢

水三鍾先煮麻黃減一鍾去上沫。內諸藥者。
取一鍾服。

澤瀉湯

澤瀉

二兩半

白朮

一兩

水二鍾煎一鍾服。

倍术丸 治五飲。

白术二兩

桂心

乾薑各一
兩

右爲末。蜜丸每服三十丸。米飲下。

滚痰丸 治一切痰。百種惱證。

大黃

蒸少頃不可過

黃芩

各八兩

青礞石

硝煅金色

沉香

百藥煎

以上各五錢

右爲末。水丸梧子大。白湯空心服三錢。此藥但取痰積自腸次第而下。並不刮腸大瀉。爲

痰家聖藥。

茯苓丸 治痰滿膈間兩臂抽痛如神

半夏二兩 茯苓一兩 枳殼去瓢舞

炒五錢

朴硝

二錢五分。以硝散在竹盤中，少時盛水置當風處，即乾如芒硝，刮取用。

右爲末，生薑汁煮麵糊爲丸，桐子大，每服三

十九薑湯送下。

清氣化痰丸 順氣消食化痰

半夏

南星

去皮臍

白礬

皀角

乾薑

各四兩

右丸將白礬等三味用水五碗煎三碗，却入

半夏南星浸兩日。再煮至半夏南星無白點。

晒乾。

橘紅

青皮

去穰

紫蘇子

炒

蘿蔔子

炒另研

杏仁

去皮尖

葛根

神麴

炒

麥蘖

炒研

山楂

香附

各二兩

右爲末。蒸餅丸。桐子大。每服七十丸。食後茶

湯下。

薛新甫曰。有一人素厚味。胸滿痰盛。內多積熱。服之而愈。彼見有效。脩合餽送。

脾胃虛者。

無不受害。

欬

有聲無痰曰欬。肺由火燥。有痰無聲曰嗽。

脾受濕侵。有痰有聲曰欬嗽。

于濕見于二篇。一篇只有欬字。一篇兼

有嗽字。則知此篇舉欬而嗽在其中矣。

此言欬而不言嗽者。省文也。如秋傷

黃帝問曰。肺之令人欬何也。

此言欬而不言嗽者。省文也。如秋傷

于濕見于二篇。一篇只有欬字。一篇兼

有嗽字。則知此篇舉欬而嗽在其中矣。

岐伯對曰。五藏六府皆令人欬。非獨肺也。

皮毛者。肺之

合也。肺主皮毛。肺爲內應。而皮毛爲外合也。

皮毛先受邪氣。邪氣

以從其合也。其寒飲食入胃。從肺脈上至于肺。

則肺寒。

肺脉起于中焦。下絡大腸。還循胃口。上

膈屬肺。故胃受寒。則從肺脉上至于肺

也。肺寒則外內合邪。因而客之。則爲肺欬。

外則皮毛

受邪。內則肺經受寒。內應外合。故五藏各以其

數所謂形寒飲冷。則傷肺是也。

時受病非其時各傳以與之。

各以時者。如春肝夏心。長夏脾。秋肺

冬腎是也。非其時而病者。乃他藏相傳也。

人與天地相參。故五藏各

以其時治。時感於寒則受病微則爲欬甚則爲

泄爲痛。

各以時治者。四時所傷不同。法因之而別也。欬外證也。泄裏證也。寒在表則身

痛。寒在裏則腹痛。惟其外

內合邪。故爲病亦兼內外。乘秋則肺先受邪。乘

春則肝先受之。乘夏則心先受之。乘至陰則脾

先受之。乘冬則腎先受之。

四藏各以其時受病日先受之者則大便

及乎肺而爲欬矣。

肺欬之狀欬而喘息有音。甚則唾血

肺屬金。主音聲。肺自病。故喘息有音。唾血者

隨欬而出。其病在肺。與嘔血咯血不同也。

心

欬之狀。欬則心痛。喉中介介如梗狀。甚則咽腫。
喉痺。心承起于心中。出屬心系。上挾于咽。故病喉間如梗。咽腫喉痺。介介如有所梗。妨礙之意。肝欬之狀。欬則兩脇下痛。甚則不可以轉轉。

則兩脇下滿。肝脉布脇肋。故病如此。肺者。腋下脇也。音區。脾欬之狀。

欬則右脇下痛。陰陰引肩背。甚則不可以動。動

則欬劇。脾脈上膈挾咽。隸于右。故爲右脇下痛。陰陰然痛引肩背者。脾土體靜。故不可

以動也。脾欬。則右脇下痛者。陰土之氣應于坤。

出西南也。觀平人氣象論曰。胃之大絡。名曰虛里。貫鬲絡肺。出于左乳下。豈非陽土之氣應于

艮而出東北乎。人與天地相參。理有無往不合

者。腎欬之狀。欬則腰背相引而痛。甚則欬涎。

腎

于腰背。其脉貫脊。故相引而痛。腎主五液。且其脈直者。入肺循喉。嗌。欬甚。則欬涎也。五藏

之久欬。乃移于六府。

藏病日久。乃移于府。各因其合。而表裏相移也。脾

欬不已。則胃受之。胃欬之狀。欬而嘔。嘔甚。則長

蟲出。

脾欬不已。胃必受之。胃不能容。氣逆而嘔。長蟲。蛲蟲也。居腸胃之中。嘔甚。則隨氣而

上出矣。

肝欬不已。則膽受之。膽欬之狀。欬嘔膽汁。

膽汁苦。汗也。

肺欬不已。則大腸受之。大腸欬狀。欬而

遺失。

遺失。甲乙經作。遺矢。矢。屎同。

心欬不已。則小腸受之。小

腸欬狀。欬而失氣。氣與欬俱失。

小腸之下。則大腸也。大腸之氣。

中於小腸之化。故小腸。腎欬不已。則膀胱受之。下奔失氣。

受邪而欬。則

下奔失氣。

膀胱歟狀。歟而遺溺。

膀胱爲津液之府。故邪氣干之。歟而遺溺。久歟

不已。則三焦受之。三焦歟狀。歟而腹滿。不欲食。

飲。久歟。則土中下三焦俱病。出納升降皆失其和。且三焦火衰。不能生土。故腹滿不能飲食。

此皆聚于胃。關于肺。使人多涕唾。而面浮腫氣

逆也。

此總結諸歟之證也。諸歟皆聚于胃。關於肺者。胃爲藏府之本根。肺爲藏府之華蓋。

如上文所云。皮毛先受邪。及寒飲食入胃者。皆

肺胃之候也。陽明之脈。起于鼻。會于面。出于口。

故多涕唾而面浮腫。肺生氣。故今人氣逆。

帝曰。治之奈何。岐伯曰。治

藏者治其俞。治府者治其合。浮腫者治其經。此治

法也。脉之所注者爲俞。所入者爲合。所行者爲經。諸藏府皆然也。乃刺法也。

未從容篇曰。欬嘯煩寃者。腎氣之逆也。

腎虛而龍火亢

上則乘金而爲欬嘯。煩
熱寃苦。此虛癆之候也。

按欬雖肺病。五藏六府。皆能致之。析其條目。經文尚有漏義。總其綱領。不過內傷外感而已。風寒暑濕傷其外。則先中于皮毛。皮毛爲肺之合。肺邪不解。他經亦病。此自肺而後傳于諸藏也。勞慾情志傷其內。則藏氣受傷。先由陰分而病及上焦。此自諸藏而後傳于肺也。自表而入者。病在陽。宜辛溫以散邪。則肺清而欬愈。自內而

生者。病在陰。宜甘以壯水潤以養金。則肺寧而
欬愈。大抵治表者。藥不宜靜。靜則留連。不解。變
生他病。故忌寒涼收斂。如五藏生成篇。所謂肺
欲辛。是也。治內者。藥不宜動。動則虛火不寧。燥
癢愈甚。故忌辛香燥熱。如宣明五氣篇。所謂辛
走氣。氣病無多食。辛是也。然治表者。雖宜動以
散邪。若形病俱虛者。又當補中氣而佐以和解。
倘專于發散。恐肺氣益弱。腠理益疎。邪乘虛入
病。反增劇也。治內者。雖宜靜以養陰。若命門火

衰。不能歸元。則參耆桂附。在所必用。否則氣不化水。終無補于陰也。至夫因于火者宜清。因于濕者宜利。因痰者消之。因氣者理之。隨其所見之證而調治。在老人虛人。皆以溫養脾肺爲主。稍稍治標可也。若欲速愈而亟攻其邪。因而危困者多矣。可不謹諸。

分條治效法

肺欬

麻黃湯

心欬

桔梗湯

肝欬

小柴胡湯

脾欬

升麻湯

腎欬

麻黃附子細辛湯

胃欬

烏梅丸

膽欬

黃芩加半夏湯

小腸欬

芍藥甘草湯

夏生湯

大腸欬

赤石脂禹餘糧湯

止用猪苓分水散

小腸欬

芍藥甘草湯

湯

膀胱欬

茯苓甘草湯

三焦欬

錢氏異攻散

感風者惡風

自汗

鼻流清涕

脈浮

桂枝湯加防風杏仁前胡細辛

感寒者惡

寒無汗

鼻流清涕

脈緊

二陳湯加紫蘇乾葛杏仁桔梗

春月風

寒所傷

頭痛聲重

金沸草散

夏月喘嗽

面赤

脈洪

連

湯解毒

秋月身熱

自汗口乾便赤

脈虛大

白虎湯

冬

月風寒

形氣病氣俱實者加減麻黃湯

感濕者身體重痛

白朮酒

熱嗽

咽喉乾痛鼻出熱氣

痰濃腥臭

金沸草散

去麻黃半夏加薄荷枇杷葉五味杏仁桑白皮貝母茯苓桔梗

乍寒亦嗽

乍熱亦嗽

杏仁七湯加

金沸草散消風散并二方煎服

七情饑飽邪氣上逆

杏仁五味

子桑皮人參阿膠

飲冷致嗽

紫菀飲

嗽吐痰食俱

一

麥門冬枇杷葉

杏仁細辛枳殼

食積痰嗽

二陳湯加木香

一

瘞聲啞

外感寒包熱者細辛半夏生薑辛以散之內傷火來犯金者爲壞證宜壯水清

金經年久嗽服藥不瘥餘無他證與勞嗽異

一

百部膏

咳嗽煩冤

八味丸安腎丸暴嗽諸藥不效

大菟絲子丸不

可以其暴嗽而

疑遽補之非

欬而上氣喉中水雞聲

射干麻黃湯

醋捨而嗽

用猪膽汁五枚浸三日火炙爲末蜜

丸茶清吞二錢

食鹹哮嗽

白麵二錢砂糖二錢糖餅灰汁捻作餅子

臨臥時服之

爐內燂熟刻出加輕粉四錢另炒將餅切作四

搘摻輕粉在內令病人吃盡吐出病根即愈

肺脹欬而上氣。鼻扇。擗肩。脉浮大者。

越婢加半夏湯主之

無外邪而內虛之肺脹。

宜訶子海石香附瓜蔞仁青黛半夏杏仁薑汁

爲末蜜調噙之。肺脹躁喘。脉浮。心下有水。

小青龍湯加石膏

脹而左右不得眠。此痰夾瘀血。碍氣而病。

四物湯加

桃仁訶子青皮竹瀝韭汁

脉出魚際。爲逆氣喘息。欬而脉虛必

苦。胃浮直而濡者易治。喘而氣逆。脉數有

熱。不得臥。難治。上氣喘嗽。面腫。有息。脉浮大

者死。久嗽脉弱者生。實大數者死。

上氣喘

醫案少言 卷之五
歎低昂。脈滑。手足溫者生。脈濇四肢寒者歟。

然而脫形。身熱脈小。堅急以疾爲逆。不過十五日死。咳嗽羸瘦。脈形堅大者死。咳嗽脈沉緊者歟。浮直者生。浮軟者生。小沉伏匿者死。欬而嘔。腹瀉泄瀉。弦急欲絕者死。

醫案

文學金伯倉。欬而上氣。凡清火潤肺。化痰理氣之劑。幾無遺用。而病不少衰。余診其腎脉大而軟。此氣虛火不歸元。用人參三錢煎湯送八味

丸五錢。一服而減。後于補中益氣湯加桂一錢附子八分。凡五十劑及八味丸二斤而瘥。

太學史明麟。經年欬嗽。更醫數十人。藥不絕口。而病反增劇。自謂必成虛癆。余曰。不然。脈不數不虛。惟右寸浮大而滑。是風痰未解。必多服酸收。故久而彌甚。用麻黃杏仁半夏前胡桔梗甘草橘紅蘇子五劑知十劑已。

張遠公。三年久嗽。服藥無功。委命待盡。一日以他事造予居。自謂必不可治。姑乞診之。余曰。饑

時胸中痛否。遠公曰。大痛。視其上唇。白點如粞者十餘處。此蟲噉其肺。用百部膏一味。加烏梅。檳榔。與服。不十日而痛若失。咳頓止矣。令其家人從淨桶中覓之。有寸白蟲四十餘條。自此永不復發。

麻黃湯 小柴胡湯 升麻湯 烏梅丸 黃芩加半夏生薑湯 赤石脂禹餘糧湯 麻黃附子細辛湯 荀苓甘草湯 桂枝湯 黃連解毒湯 白虎湯 小青龍湯以主並見傷寒二陳湯

見痰

異功散

四物湯

補中益氣湯

見虛
夢

金沸草散

治肺感寒邪鼻塞聲重欬嗽。

旋覆花

去梗

麻黃

去節

前胡

去蘆各七分

荆芥穗

一錢

甘草

炒

半夏

湯炮七次

赤芍藥

各五錢

水一鍾半。生薑三片。棗一枚。煎八分。溫服。

加減麻黃湯 治感寒欬

麻黃

去節二錢

杏仁

半夏

姜製各一錢

桂枝

甘草

炙

紫蘇葉

各五錢

橘紅
錢

水二鍾。薑四片。煎一鍾服。

射干麻黃湯

射干

細辛

紫菀

款冬花

各三
兩

麻黃

各半
升

生薑

各四
兩

五味子

半夏

各半
升

大棗

七枚

水一斗二升。先煮麻黃兩沸。去上沫。納諸藥。
煮取三升。分溫三服。

麻黃附子細辛湯 治腎藏發欬腰背引痛。

麻黃

細辛

各二錢

附子

一錢

水一鍾煎七分服。

四七湯 治七情氣鬱上逆爲欬。

半夏

湯泡五次二錢

茯苓

去皮一錢五分

紫蘇

淨葉八分

厚朴

薑製一錢

水二鍾生薑七片。紅棗二枚煎一鍾服。

大兔絲子丸

治腎虛上逆欬嗽。

兔絲子

洗淨酒浸澤瀉

鹿茸

去毛酥炙

石龍芮

去去肉桂

去皮

附子

泡去皮

各一兩

石斛 去根

熟地黃

白茯苓 去皮

牛膝

酒浸宿培乾

續斷

山茱萸

去核

肉蓯蓉

酒浸切培

防風

去蘆

杜仲

去龐皮炒去絲

補骨脂

酒炒去毛

蕷澄茄

沉香

巴戟

去心

茴香

炒各三兩

五味子

桑螵蛸

酒浸炒

覆盆子

去枝葉蔓

芎藭

各半兩

右爲末。酒煮麵糊丸如桐子大。每服三錢。空心鹽湯送下。

安腎丸 治腎虛效逆煩冤。

肉桂

去龐皮勿見火

烏頭

炮去皮各一觔

桃仁

麸炒

白蒺藜

炒刺去

巴戟

去心

山藥

茯苓

去皮

肉蓯蓉

酒浸去甲

石斛

去根灸

草薢

白术

炒

補骨脂

各三觔

右爲末。蜜丸梧子大。每服三錢。空心鹽湯下。

越婢加半夏湯 治肺脹喘嗽。鼻扇肩擡。

麻黃

六兩

石膏

半斤

生薑

三兩

甘草

一兩

半夏

半升

大棗

十五枚

水六升。先煮麻黃去上沫。內諸藥煮取三升。

醫宗必讀 卷之九
分溫三服

白术酒 感濕欬嗽身體重痛。

白术

三兩 淬浸一宿土蒸
切片慢火炒黃用

酒二鍾煎八分服。

觀音應夢飲 定喘止嗽。

人參

一錢

胡桃

二枚去殼留衣

水一鍾薑五片棗二枚臨臥煎服。

清音丸 蜜丸龍眼大每服用一丸噙化

桔梗

荳子

各一兩

甘草

五錢

硼砂

青黛

各三錢

冰片

三分

保和湯 治久嗽成癆。

知母

鹽水

貝母

去心

天門冬

去心

麥門冬

去心

款冬花

各一錢

天花粉

薏苡仁

炒

杏仁

去皮尖各五分

五味子

十二粒

馬兜鈴

紫苑

桔梗

百合

阿膠

蛤粉

當歸

百部

各六分

甘草

炙

紫蘇

薄荷

各四分

水二鍾。薑三片。煎七分。入飴糖一匙。食後服。
吐血。加炒蒲黃生地黃小薊。
痰多。加橘紅
茯苓。瓜蔞仁。
喘。去紫蘇薄荷。加蘇子桑皮
陳皮。

本事鼈甲丸 治虛癆咳嗽。耳鳴眼花。

五味子

二十兩

鼈甲

地骨皮

各三十兩

右爲末。蜜丸梧子大。空心食前。鹽湯下四錢。

婦人醋湯下。

此方服者必效不可忽也。

寧肺湯 治營衛俱虛。發熱自汗。喘嗽。

人參

當歸

白术

熟地黃

川芎

白芍藥

五味子

麥門冬去心

桑白皮

白蒺藜

去皮

甘草

炙各一錢

阿膠

蛤粉炒半錢

水二鍾。生薑五片。煎一鍾。食後服。

治嗽補虛方

牛骨

一副
取髓

白蜜

八兩

杏仁

四兩去皮尖研

乾山藥

兩
研細

胡桃肉

四兩去皮另研

右將牛骨髓白蜜砂鍋內熬沸。以絹帛濾去。

渣。盛在磁瓶內。將山藥杏仁胡桃參味入瓶攬和。以紙密封瓶口。重湯煮一日一夜。每日早晨白湯化一匙服。

紫金散 治久嗽。日夜不得眠。

天南星

去皮
臍

白礬

甘草

各五
錢

烏梅

淨肉
二兩

右爲龜散。用慢火于銀石器內炒令紫色放冷。研爲細末。每服二錢。臨臥時身體入被內。用薑汁七分。溫湯三分。煖令稍熱調前藥末。

服之嚥下便仰臥低枕想藥入于肺中須臾得睡其嗽立止。

救急方

杏仁

三升去皮尖及雙仁者炒研如泥

白蜜

一升

牛酥

二升

右將杏仁於磁盆中。用水研取汁五升。淨磨銅鑄勿令脂垢。先傾三升汁于鑄中。刻木記其深淺。又傾汁二升。以緩火煎減。至于所記處。即內蜜酥等煎。還至木記處。貯于不津磁。

器中。每日三度。煖酒服一大匙。和粥服亦可。
一七唾色變白。二七唾稀。三七欬斷。

薰方 風寒久嗽。非此不除。

天南星

款冬花

鶯管石

佛耳草

雄黃

等分爲末。拌艾以薑一厚片置舌上。次于艾
上燒之。須令烟入喉中爲妙。

人參清肺湯 治肺胃虛寒。欬嗽喘急

地骨皮

人參

去蘆

阿膠

炒

杏仁去皮尖
炒

桑白皮去皮
知母

知母

桑白皮去
核

桑白皮去
蒂蜜

知母

烏梅

去核

炙甘草

炙甘草

炙甘草

右各一錢。水二鍾。棗子一枚。煎一鍾。臨臥服。
通聲煎 治咳嗽氣促。滿悶失音。

杏仁

一升去皮尖及雙
仁者炒另研如泥

木通

五味子

人參

桂心

細辛

款冬花

菖蒲

竹茹

酥已上各
三兩

白蜜

生薑汁

各一升
升一
升二

水五升。微火煎七沸。去渣。內酥蜜薑汁棗肉。
再煎令稠。每服一匙。噙化。

附辛

正枳子

人參

甘心

杏子

音妙。民所吸氣也。

木鼈

驗德。涼。皆如之。燒取灰。置臘頭。大吉。

古名。一鑿木。二鑿棗子。一株。謂相媚。

烏柏

去核

炙甘草

頭皮。去毛。去帶皮。

去皮。去核。去帶皮。

古今良方

卷之三

桑白皮

去毛

甘草

喘

喘者。促促氣急。喝喝痰聲。張口擡肩。搖身擴肚。

短氣者。呼吸雖急。而不能接

續。似

喘而無痰聲。亦不擡肩。但肺壅而不下。

哮者。

與喘相類。但不似喘。閉口出氣

之多。而有

呀呷之音。呷者。口開。呀者。口閉。

開口閉口。盡有音聲。

呷呀二音。合成哮字。

以痰結喉間。與氣相繫。故呷

呀作聲。

三證極當詳辨。

經曰。諸病喘滿。皆屬於熱。

火盛爲夏熱。火衰爲冬寒。故寒病則氣衰。

而息微。熱病則氣盛。而息龐。

又寒爲陰。主乎遲。熱爲陽。主乎急。數故寒則息遲。氣微。熱則息緩。

爲喘也。

五藏生成篇曰。欬嗽上氣。厥在胸中。

過在手陽明太陰。

上氣喘急也。胸中者。手太陰肺之分也。手陽明大腸爲肺

之表。二經之氣逆于胸中。則爲喘嗽也。

○秋脈不及。則令人喘呼。

吸少氣

秋脉不及。肺金虛也。肺虛則短氣。

○勞

則喘息汗出。

疲勞過度。則陽氣動于陰分。故上奔于肺。而喘外達于表。而汙。

邪入六府。則身熱不時臥。

上爲喘呼。外傷于邪。則陽受之。

而入府。陽邪在表。故身熱不時臥者。不能以時臥也。邪盛則實。故爲喘呼。

○二陽之

病發心脾。其傳爲息責。

二陽者。陽明也。爲胃與大腸也。心脾爲子母。故

胃府病必傳于脾藏。脾受傷必竊母氣以自救。則心亦病也。土不能生金。而心火復刑之。則肺傷。故息上

貴而喘急。○肝脉若搏。因血在腸下。令人喘逆。

肝爲血海。血瘀則脉搏。本病則氣上。故爲喘逆。

○腎者水藏。主津液。主

人與喘也。腎主納氣。腎水不足。虛火上越。則不得靜而臥。乃動而喘也。

○喘

欬者。是水氣并陽明也。

土虛不能制水。則水邪泛溢。并于胃府。氣道不利。故爲

○夜行則喘出于腎。淫氣病肺。

此下四條。言喘

屬氣。病在陽也。陰受氣于夜。主靜。夜行則勞動。腎主陰氣。故喘出于腎。陰傷陽勝。故病肺。有

所墮恐。喘出于肝。淫氣害脾。

墮恐者。傷筋損血。故喘出于肝。木淫

乘上。故害脾也。有所驚恐。喘出于肺。淫氣傷心。

驚恐。則神氣散

亂。肺藏氣。故喘出于肺。

度水跌仆。喘出于腎與

骨。

水氣通于腎。跌仆傷于骨。故喘出焉。

愚按內經論喘。其因衆多。究不越于火逆。上而氣不降也。挾虛者亦有數條。非子母情牽。即仇

譬。肆。虐。害。乎。肺。金。之。氣。使。天。道。不。能。下。濟。而。光。
明。者。孰。非。火。之。咎。耶。雖。然。火。則。一。而。虛。實。則。分。
丹。溪。曰。虛。火。可。補。參。耆。之。屬。實。火。可。瀉。芩。連。之。
屬。每。見。世。俗。一。遇。喘。家。純。行。破。氣。于。太。過。者。當。
矣。于。不。及。者。可。乎。余。嘗。論。證。因。虛。而。外。者。十。九。
因。實。而。外。者。十。一。治。實。者。攻。之。即。效。無。難。也。
治。虛。者。補。之。未。必。即。效。須。悠。久。成。功。其。間。轉。摺。
進。退。良。非。易。也。故。辨。證。不。可。不。急。而。辨。喘。證。爲。
尤。急。也。巢。氏。嚴。氏。止。言。實。熱。獨。王。海。藏。云。肺。氣。

果盛則清肅下行。豈復爲喘。皆以火爍真氣。氣衰而喘。所謂盛者。非肺氣也。肺中之火也。斯言

高出前古。惜乎。但舉其端。未能縷悉。請得而詳之。氣虛而火入於肺者。補氣爲先。六君子湯。補中益氣湯。

陰虛而火來乘金者。壯水爲亟。六味地黃丸。

解其邪。三拗湯。濕氣者利其水。滲濕湯。暑邪者滌

其煩。白虎湯。肺熱者清其上。二冬二母湯。

消之。二陳湯。氣鬱者疎之。四七甘桔梔芩湯。痰壅者

吐之

不愈

飲停者吐之。瓜蔞仁

枳殼黃芩神效。

肺癰而

術防已湯主之

火實者清之。白虎湯。加瓜蔞仁

枳殼黃芩神效。

肺癰而

喘保金化毒

苡仁甘草節桔梗貝母防風金銀花橘紅門冬

肺脹而喘

利水散邪

肺脹之狀欬而上氣喘而煩躁目如脫狀脉浮大者越婢加半夏湯脉浮

者心下有水小青龍湯加石膏主之

腎虛火不歸經導龍入海

八味

丸主

腎虛水邪泛濫逐水下流

金匱腎氣丸

別有哮

證似喘而非呼吸有聲呀呷不已良由痰火鬱

于內風寒束其外或因坐臥寒濕或因酸鹹過

食或因積火薰蒸病根深久難以卒除避風寒

節厚味禁用涼劑恐風邪難解禁用熱劑恐痰

火易升理氣疏風勿忘根本爲善治也

宜蘇子枳殼桔

梗

防風半夏瓜萎茯苓甘草

如冬月風甚加

麻黃

夏月痰多加石膏

挾寒者多用生薑

芩草

如冬月風甚加

麻黃

夏月痰多加石膏

挾寒者多用生薑

芩草

證發于冬初者多先于八九月未寒之時用大

承氣下其熱至冬寒時無熱可包此爲妙法如

上諸款皆其大綱若五藏六府七情六氣何在

非致喘之由須知舉一隅即以三隅反方不媿

爲明通可以司人之命矣

脉候

喘逆上氣脈數有熱不得臥者死上

氣面浮腫肩息脈浮大者危上氣喘息低昂

脈滑手足溫者生脈澀四肢寒者死右寸沉

實而緊。爲肺感寒邪。亦有六部俱伏者。宜發散。
則熱退而喘定。喘脉宜浮遲。不宜急疾。

醫案

太學朱寧宇。在監時。喘急多痰。可以坐。不可以
臥。可以俯。不可以仰。惶急求治。余曰。兩尺獨大
而軟。爲上盛下虛。遂以地黃丸一兩。用桔梗三
錢。枳殼二錢。甘草一錢。半夏一錢。煎湯送下。不
數劑而安。

給諫黃健庵。中氣大虛。發熱自汗。喘急。余診之。

脉大而數。按之如無。此內有真寒。外見假熱。當以理中湯冷飲舉家無主。不能信從。惟用清火化痰之劑。遂致不起。

方伯葉震瀛夫人。喘急痞悶。肌膚如灼。汗出如洗。目不得瞑。余診之。六脈皆大。正所謂汗出如油。喘而不休。絕證見矣。辭不治。越三日而歿。

社友宋敬夫令愛。中氣素虛。食少神倦。至春初忽然喘急悶絕。不知人。手足俱冷。咸謂立斃矣。余曰。氣虛極而金不清肅。不能下行。非大劑溫

補。決無生理。遂以人參一兩。乾薑三錢。熟附子
三錢。白朮五錢。一服即甦。後服人參七劑。餘薑
附各二劑。遂全愈。不復發。

社友孫芳其令愛。久嗽而喘。凡順氣化痰。清金
降火之劑。幾于遍嘗。絕不取效。一日喘甚。煩躁。
余視其目。則脹出。鼻則鼓扇。脈則浮。而且大肺
脹無疑矣。遂以越婢加半夏湯投之。一劑而減。
再劑而愈。余曰。今雖愈。未可恃也。當以參朮補
元。助養金氣。使清肅令行。竟因循月許。終不調

補再發而不可救藥矣。

文學顧明華。十年哮喘。百藥無功。診其兩寸數
而濇。余曰。濇者。痰火風寒。久久盤踞。根深蒂固
矣。須補養月餘。行吐下之法。半年之間。凡吐下
十次。服補劑百餘。遂愈。更以補中益氣爲丸。加
鷄子秋石。服年許。永不復發。

補中益氣湯

見類中風

六君子湯

六味丸

八味

丸

見虛勞

金匱腎氣丸

見水服

白虎湯

香薷湯

見暑

二陳湯

三拗湯

見痰

治寒燠不常。暴嗽喘急。鼻塞痰壅。

麻黃

不去節

杏仁

不去尖

甘草

不炙各等分

每服五錢。水一鍾。薑五片。煎服取汗。

華蓋散

治肺風痰喘。

麻黃

去根節

紫蘇子

炒

杏仁

炒去皮尖各一錢

桑白皮

炒去皮

赤茯苓

去皮橘紅各一錢

甘草

五分

水一鍾。生薑五片。紅棗一枚。煎一鍾服。

滲濕湯

治濕傷。身重而喘。

蒼术

白术

甘草

炙各一兩

茯苓去皮

乾薑炮各二兩

橘紅

丁香

各二錢半

每服四錢。水一盞。棗一枚。薑三片。煎七分服。

越婢加半夏湯

麻黃

六兩

石膏

半觔

生薑

三兩

甘草

一兩

半夏

半升

大棗

十五枚

分溫三服。

水陸升先煮麻黃去上沫。內諸藥煮取三升。

小青龍加石膏湯

麻黃

芍藥

桂枝

細辛

甘草

乾薑

五味子

半夏

各半升

石膏

二兩

水一斗。先煮麻黃去上沫。內諸藥煮取三升。
強人服一升。羸者減之。日三服。

四七湯

見款
嗽

加減瀉白散

桑白皮

一兩

地骨皮

知母

陳皮去白

桔梗各五錢

青皮去白

黃芩

炙甘草各三錢

每服五錢。水二鍾。煎一鍾。食後服。

木防已湯

木防已

三兩

石膏

鷄子大一塊

桂枝

二兩

人參

四兩

水六升。煮取二升。分溫再服。

千繕湯 治喘急。有風痰。

半夏

七個
製熟

皂角

去皮
弦

甘草

炙各一寸

水一碗。煮減半。頓服。

半夏丸 傷風痰喘。兀兀欲吐。惡心欲倒。

半夏

一兩

檳榔

雄黃

各三錢

右爲細末。薑汁浸蒸餅爲丸。桐子大。每服五十丸。薑湯下。

定喘奇方 治稠痰壅盛。體肥而喘。

橘紅

二兩。明礬五錢。
同炒香去用。

半夏

一兩
五錢

杏仁

麸炒

瓜蔞仁

去油兩

炙甘草

七錢

黃芩

酒炒五錢

皂角

去皮弦子燒存性三錢。

右爲末。淡薑湯打蒸餅糊爲丸。菉豆大。每食後自湯下一錢。日二次。五日後下痰而愈。虛人每服七分。

簡易黃丸子 消痰定喘。及齁蛤

雄黃

研細水飛

雌黃

研細各三錢

山梔仁

七枚

菉豆

四十粒

明砒

二分細研並生用

右爲末。稀糊丸。菉豆大。每服一二丸。薄荷綑

茶湯臨臥服。

清金丹 治食積痰哮。喘遇厚味即發。

蘿蔔子

淘淨蒸熟晒乾爲末。一兩。

猪牙皂角

燒存性三錢

右以生薑汁浸蒸餅丸。菉豆大每服三五十

丸嚥下。

水哮方

芫花爲末

大氷上浮浮

瀝過

大米粉

右三味搜爲棵。清水煮熟恣意食之。

壓掌散 治男婦哮喘。

麻黃

去節二錢五分

炙甘草

一錢

白果

五個打碎

右水煎臨臥服。

九卷終

醫學必讀卷之十

雲間李中梓士材父著

莊

昇初賜父

陸光

起永自父

顧

行雲路父

門人

蔣起鳳孟蘊父

張大啓魯開父

李廷傑佐之父

范恒如九如父

徐化鰲神諸父

全參

痺 行痺 痛痺 着痺

內經曰。風寒濕三氣雜至合而爲痺也。痺者閉也。風寒濕三氣雜合。則壅閉經絡。血氣不行。則爲痺也。其風氣勝者爲行痺。風者。

善行而數變。故爲行痺。行而不定。凡走注歷節疼痛之類。俗名流火是也。寒氣勝者爲痛痺。寒氣凝結。陽氣不行。故痛楚異甚。俗名痛風。是也。濕氣勝者爲着痺。肢體重着不移。或爲疼痛。或爲不仁。濕從土化。病多發于肌肉。俗名麻木。是也。以冬遇此者爲骨痺。以春遇此者爲筋痺。以夏遇此者爲脉痺。以至陰遇此者爲肌痺。以秋遇此者爲皮痺。凡風寒濕所爲行痺。痛痺。着痺。又以所遇之時。所客之處。而命其名。非行痺。痛痺。着痺之外。別有骨筋脉肌皮痺也。骨痺不已。復感于邪。內舍于腎。筋痺不已。復感于邪。內舍于心。肌痺不已。復感于邪。不

內舍于脾。皮痺不已。復感于邪。內舍于肺。各以其時重感于風寒濕也。舍者邪人而居之也。時者氣王之時。五藏各有所應也。病久不去。而復感于邪氣。必更深。故內舍其合而入于藏。肺痺者。煩溌喘而嘔。肺在上焦。其脉循胃口。故爲煩溌喘而嘔也。心痺者。脉不通。

煩則心下鼓。暴上氣而喘。嗌乾善噫。厥氣上則恐。心合脰而痺氣告之。故脉不通。心脉起于心中。其支者下挾咽。其直者却上肺。故其病如此。厥氣陰氣也。心火衰則邪乘之。故神怯而恐。肝痺者。夜踴則驚。多飲數小便。上爲引如懷。肝藏魂。肝氣痺則魂不安。故夜臥則驚。肝脈下者過後。上入頸頬。故爲病如此。腎痺者。善脹尻以

代踵。脊以代頭。腎者。胃之關。腎氣痺。則陰邪乘

胃。故善脹。尻以代踵。足攣不能伸也。

中上。膾內出。膾內廉。貫脊屬腎。故爲是病。脾痺

者。四支解惰。發欬嘔汗。上爲大塞。

脾主四肢。故爲解惰。其脉

屬脾絡胃。上鬲挾咽。氣痺不行。故發欬。嘔汗。甚則上焦否隔。爲大塞不通也。

腸痺者。

數飲而出。不得中氣喘爭。時發飧泄。

腸者。兼大小腸而言。

腸間病痺。則下焦之氣不化。故雖數飲而小便不得出。小便不出。則本末俱病。故與中氣喘爭。蓋其清濁不分。故時發飧泄。

胞痺者。少腹膀胱按之內痛。若

沃以湯。澀於小便。上爲清涕。

胞者。膀胱之脬也。

內痛。水閉則畜而爲熱。故若沃以湯。澀于小便也。膀胱之脉從顛入絲腦。故上爲清涕。

愚按內經論痺。四時之令。皆能爲邪。五藏之氣。各能受病。六氣之中。風寒濕居其半。卽其曰雜至。曰合。則知非偏受。一氣可以致痺。又曰。風勝爲行痺。寒勝爲痛痺。濕勝爲着痺。卽其下一勝字。則知但分邪。有輕重。未嘗非三氣雜合爲病也。皮肉筋骨脉。各有五藏之合。初病在外。久而不去。則各因其合。而內舍于藏。在外者祛之猶易。入藏者攻之實難。治外者散邪爲亟。治藏者養正爲先。沿行痺者。散風爲主。禦寒利濕。仍不

可廢大抵參以補血之劑。蓋治風先治血。血行
風自滅也。治痛痺者。散寒爲主。疎風燥濕。仍不
可缺。大抵參以補火之劑。非大辛大溫。不能釋
其凝寒之害也。治着痺者。利濕爲主。祛風解寒。
亦不可缺。大抵參以補脾補氣之劑。蓋土强可
以勝濕。而氣足自無頑麻也。提其大綱約略如
此分條治法。別列于左。

筋痺卽風痺也。游行不定。上下左右。隨其虛邪。
與血氣相搏。聚于關節。或赤或腫。筋脉弛縱。古

稱走注。今名流火。

防風湯主之、如意通聖散、桂心散、淡藥散、虎骨丸、十生丹、

一粒金丹、乳香應痛丸、

脉痺卽熱痺也。

藏府移熱復遇外

邪客搏經絡留而不行。

故瘡痺肌肉熱極唇口

反裂皮膚色變。

升麻湯主之、

肌痺卽着痺濕痺也。

留而不移汗多四肢緩弱。

皮膚不仁精神昏塞今

名麻木

神效黃耆湯主之、

皮痺者邪在皮毛癰癧風瘡。

搔之不痛宜

黃血風

骨痺卽寒痺痛痺也痛苦切

心四肢攀急關節浮腫

五積散主之、

腸痺者五苓散加桑皮

木通麥胞痺者

腎着湯、五藏痺、

五痺湯、肝痺加仁柴胡、心痺

加達志茯神麥門冬犀角。脾痺加厚朴枳實砂仁神麴。肺痺加半夏紫苑杏仁麻黃。腎痺加獨活。宮桂杜仲牛膝黃耆草薢。

脉候

大而濇爲痺。脉急亦爲痺。肺脉微爲肺痺。心脉微爲心痺。右寸沉而遲濇爲皮痺。左寸結不流利爲血痺。右關脉舉按皆無力而濇爲肉痺。左關弦緊而數浮沉有力爲筋痺。

醫案

文學陸文湖兩足麻木。自服活血之劑不效。改

服攻癆之劑。又不效。經半載後。兩手亦癆。左脇
下有尺許。不知痛癢。余曰。此經所謂着脾也。六
脈大而無力。氣血皆損。用神效黃耆湯。加茯苓。
白朮。當歸。地黃。十劑後。小有效。更用十全大補。
五十餘劑。始安。

孝廉王春卿。久患流火。靡藥弗嘗。病勢日迫。商
之。余曰。尚可療否。余曰。經年之病。且痛傷元氣。
非大補氣血不可。春卿曰。數月前。曾服參少許。
痛勢大作。故不敢用。余曰。病有新久之不同。今

大虛矣。而日從事于散風清火。清火則脾必敗。
散風則肺必傷。言之甚力。竟不能決。遂致不起。
鹽賈葉作舟。遍體疼痛。尻髀皆腫。足膝攣急。余
曰此寒傷榮血。筋脈爲之引急。內經所謂痛痺
也。用烏藥順氣散。七劑而減。更加白朮桂枝。壹
月而愈。

防風湯

防風

當歸

酒洗

赤茯苓

去皮

杏仁

去皮尖各一錢

黃芩

秦艽

葛根各二錢羌活八分

桂枝

甘草冬伍分

水二鍾薑三片煎七分入好酒半鍾食遠服如意通聖散治走注疼痛

當歸

去蘆

陳皮

去白

麻黃

去節

甘草

炙

川芎

御米殼

去頂
蒂
膈

丁香

各等分

右用慢火炒令黃色每服五錢水二鍾煎一鍾服如腰脚痛加虎骨乳香沒藥心痛加

乳香良薑此治癰痛之仙藥也。

桂心散

桂心

漏蘆

威靈仙

芎窮

白芷

當歸

去蘆

木香

白殼蠶

炒

地龍

炒去土各半兩

右爲細末。每服二錢。溫酒下。

沒藥散

治遍身百節走注疼痛。

沒藥

另研二兩

虎骨

四兩醋炙

右爲細末。每服五錢。酒下。日再服。

小烏犀丸

烏犀角

乾蝎

白僵蠶

炒

地龍

去土

硃砂

水飛

天麻

煨

羌活

去蘆

芎藭

防風

去蘆

甘菊花

去蒂

蔓荆子

各半兩

乾薑

炮

麝香

另研

牛黃

各半兩
另研

虎脰骨

醋炙

敗龜

白花蛇

酒浸

天南星

薑製

肉桂

去龐皮

附子

炮去皮

海桐皮

木香

忌火去皮

人參

去蘆

當歸

各七錢半去

蘆

右爲細末研匀。煉蜜丸彈子大。每服一丸。溫酒或薄荷湯嚼下。

虎骨丸

虎骨

四两
醋炙

五靈脂

醋淘去沙

白殭蠶

炒

地龍

去土
炒

白膠香

另研

威靈仙

各一两

川烏頭

三两
炮

胡桃肉

二两半
去衣研

爲末。酒糊丸梧子大。每服十丸。空心酒下。日

二服。

十生丹

天麻

防風

去蘆

羌活

去蘆

獨活

去蘆

川烏

草烏

去蘆

鵝首鳥

當歸

去蘆

川芎

海桐皮

各等分俱生用

蜜丸。每丸重一錢。每服一丸。茶湯磨服。

粒金丹

草烏頭

剉炒

五靈脂

各一兩

地龍

去土炒

木鼈子

各半兩

白膠香

一兩

當歸

去蘆各一兩

麝香

另研

右爲細末。糯米糊丸。桐子大。每服三丸。溫酒
下服藥後。微汗爲效。

乳香應痛丸

乳香半兩
另研

五靈脂

赤石脂各一
兩研

草烏頭半兩
另研

沒藥五錢

右爲末。醋糊丸。雞豆大。每服十五丸。空心溫
酒送下。日二服。

升麻湯

升麻三錢

茯神木去皮

人參

防風

犀角 鎊

麝羊角 鎊

羌活

各

一錢

官桂

三分

水二鍾煎八分入竹瀝半酒鍾服。

神效黃耆湯

黃耆

二錢

人參

去蘆

白芍藥

炙甘草

各一錢

蔓荆子

二分

陳皮

去白五分

水二鍾煎一鍾去渣臨臥服小便澀加澤瀉有熱加酒炒黃檗麻木雖有熱不用黃檗再加黃耆一錢眼縮小去芍藥忌酒醋濕麵葱

蒜韭及生冷。

人參益氣湯 治夏月麻木倦怠嗜臥。

黃耆 八錢

人參

生甘艸 各五
錢

炙甘草 二錢

五味子

百二十粒

升麻 二錢

柴胡 半二錢

芍藥 二錢

每服半兩。水二鍾。煎一鍾。空心服。服後眠穩。
于麻痺處。按摩屈伸。午前又一服。

第二次藥。煎服如前。

黃耆 八錢

紅花 五分

陳皮 一錢

陳皮 一錢

錢

澤瀉五分

第三次服藥。

黃耆六錢

黃檗一分

陳皮三錢

澤瀉

升麻各二錢

白芍藥五錢

甘艸生四錢

五味子一百粒

生黃芩八錢

炙甘草一分

每四服。煎服如前法。秋去五味子。冬去黃芩。

大效

此方

五積散

治感冒寒邪。頭疼身痛。寒痺太痛。
無問內傷生冷。外感寒邪。皆效。

白芷

茯苓

半夏

湯洗
七次

當歸

川芎

甘艸

灸

肉桂

芍藥

各三
兩

枳殼

去穰
炒

麻黃

去根
節

陳皮

去白各
六兩

桔梗

去蘆
拾
二兩

厚朴

去龐皮
薑製

乾薑

各四
兩炮

蒼术

泔浸去皮
二十四兩

每服四錢。水一鍾。薑三片。葱白三根。煎七分。
熱服。挾氣加吳茱萸。調經催產。用艾醋。

五苓散

瀉
見泄

腎着湯

見腰
痛

腎瀝湯

麥門冬

去心

五加皮

犀角

各一錢半

杜仲

薑汁炒去絲

桔梗

赤芍藥

煨

木通

各一錢

桑螵蛸

一箇

水一鍾。入羊腎少許煎八分食前服。

五痺湯

治五藏痺

人參

茯苓

當歸

酒洗

白芍藥

煨

川芎

各一錢

肝心腎三
痺當倍用之

五味子

十五粒

白朮

一錢

脾
痺倍之

細辛

七分

甘艸

五分

水二鍾。薑一片。煎八分。食遠服。

一錢。飴。略辛。甘氣。

白芷藥

川芎

各一錢。當歸。小茴。三

人參

芥菜

當歸

王華散

鄧正輝藥

米一鍾。人羊腎心。苦煎八分。食前服。

木郁

各一錢。

桑葉

一箇。

卦卦

去絲。薑半錢。

苦附

赤芍藥

點。

麥門冬

去心。去火。

王肺丸

銀頭半

各一錢。

痺 手足痺軟而無力。百節緩縱而不收。證名曰痺。

經日肺熱葉焦。則皮毛虛弱急薄。著則生痺。蹙而上。上則下脉虛。虛則生脉痺。樞折挈。脰縱而不任地也。
心痺者。脈痺也。心熱則火炎。故三陰在下之脉亦皆厥逆而上。上逆則下
蹙乃生脉痺者。四肢關節之處。如樞紐之折。而不能提挈。足脰縱緩而不能任地也。肝氣熱。則膽泄。口苦。筋膜乾。則筋急而攣。發爲筋痺。

肝痺者。筋痺也。膽附于肝。肝熱則膽泄。故口苦。筋膜受熱。則血液乾。故拘攣而爲筋痺也。脾

氣熱。則胃乾而渴。肌肉不仁。發爲肉痠。脾痠者。肉痠也。脾與胃以膜相連。而開竅于口。故脾熱則胃乾

而渴。脾主肌肉。熱畜于內。則精氣耗傷。故肌肉不仁。發

爲肉痠。骨痠者。骨痠也。腎氣熱。則腰脊不舉。骨枯而髓減。發爲

骨痠。骨痠者。骨痠也。腰者。腎之府。其脈貫

脊。其主骨髓。故腎熱則見證若此。此言五藏之痠。皆因肺熱最高。故爲藏長。覆于心上。故肺者。

藏之長也。爲心之蓋也。此言五藏之痠。皆因肺熱最高。故爲藏長。覆于心上。故

爲心蓋。有所失亡。所求不得。則發肺鳴。鳴則肺

熱葉焦。火。故呼吸有聲。發爲肺鳴。金藏病。則失

其清肅之化。故熱而葉焦。肺主行營衛。爲相傳以節制五藏。則一身皆治。故五

藏之痠。皆因于肺氣熱。則五藏之陰皆不足。此

痿躄所以生于肺也。論痿者獨取陽明何也。陽五痿雖異總名痿躄。

明者五藏六府之海。主潤宗筋。宗筋主束骨而利機關也。

陽明者胃也。主納木穀化精微以資養表裏故爲五藏六府之海而下潤宗筋。宗筋者前陰所聚之筋也。爲諸筋之會。凡腰脊谿谷之筋皆属于此。故主束骨而利機關也。

衝脉經脈之海也。主滲灌谿谷。陽明合于宗筋。

衝脈爲十二經之海。故主滲灌谿谷。衝脉起于氣街。並少陰之經夾臍上行。陽明脉亦夾臍旁去中行二寸下行。故皆會于宗筋。

陰陽總宗筋之會。會于氣街。而陽明爲之長。皆屬於帶脈。而絡于督脈。

宗筋聚于前陰。前陰者足之三陰陽明少陽及衝任督蹻九脉之所會也。九者之中陽明爲藏府之

醫學卷之二
海衝爲經脈之海。此一陰一陽總乎其間。故曰。
陰陽總宗筋之會也。會于氣街者。氣街爲陽明
之正脉。故陽明獨爲之長。帶脈者。起于季脇。圍
身一周。督脈者。起于會陰。分三岐爲任衝而上
行。腹背故諸經者。皆聯屬于帶脈。支絡于督脈也。故陽明虛。則宗筋縱。
帶脈不引。故足痿不用也。陽明虛。則血氣少。不足。痿不用。所以當治陽明也。

愚按痿者重疾也。故內經疊出諸篇。而前哲之
集方論者。或附見于虛勞。或附見于風濕。大失
經旨。賴丹溪特表而出之。惜乎言之未備也。經
言病本雖五藏各有。而獨重太陰肺經。經言治
言病本雖五藏各有。而獨重太陰肺經。經言治

法雖諸經各調而獨重陽明胃經此其說何居乎肺金體燥居上而主氣化以行令于一身畏火者也五藏之熱火薰蒸則金被尅而肺熱葉焦故致疾有五藏之殊而手太陰之地未有不傷者也胃土體濕居中而受水穀以灌漑于四肢畏木者也肺經之受邪失正則木無制而侮其所勝故治法有五藏之分而足陽明之地未有或遺者也夫旣曰肺傷則治之亦宜在肺矣而岐伯獨取陽明又何也靈樞所謂真氣所受

於天與穀氣并而克身。陽明虛則五藏無所稟。不能行血氣。濡筋骨。利關節。故百體中隨其不得受水穀處。不用而爲痿。不獨取陽明而何取哉。丹溪所以云。瀉南方。則肺金清。而東方不實。何胃傷之有。補北方。則心火降。而西方不虛。何肺熱之有。斯言當矣。若胃虛減食者。當以芳香辛溫之劑治之。若拘于瀉南之說。則胃愈傷矣。藿香養胃湯。誠能本此施治。其于痿也。思過半矣。至于七情六淫。挾有多端。臨病製方。非筆舌所能。

聲耳。

心氣熱則脉痿。

鐵粉、銀箔、黃連、若參、龍膽草、石蜜半黃、龍齒、秦

花白、蘚皮、牡丹皮、地骨皮、雷丸、犀角之屬

肝氣熱則筋痿。

生地黃、天門冬、百合

紫葳、白蒺藜、杜仲、萆薢、菟絲子、川牛膝、防風

黃芩、黃連之屬

脾氣熱則肉痿。

二术二陳、霞天膏之屬

腎氣熱則骨痿。

金剛丸、牛膝丸、加味四斤丸、煨腎丸、加

肺熱痿。

黃耆、天麥門冬、石膏斛通、艸桔梗、枯芩、山梔

杏仁、秦艽之屬

濕熱。

健步丸、加黃檗、蒼朮

湯、濕痰。

二陳、二妙合、二妙散

氣虛。

四君子湯、十全大補湯、氣血俱虛。

湯、二妙散、氣血俱虛。

補陰丸。

桃仁、紅花、蓬術、穿山甲、四物湯、實而有積

三化湯、承

積。

木香、橘丸

氣湯下數十遍而愈。腎肝下虛。陰丸補益丸。虎潛丸。

醫案

太學朱脩之。八年痿廢。更醫累百毫末無功。一日讀余頤生微論。千里相招。余診之。六脉有力。飲食若常。此實熱內蒸。心陽獨亢。證名脈痿。用承氣湯下六七行。左足便能伸縮。再用大承氣。又下十餘行。手中可以持物。更用黃連黃芩各一觔。酒蒸大黃八兩。蜜丸日服四錢。以人參湯送。一月之內去積滯不可勝數。四肢皆能展舒。

余曰。今積滯盡矣。煎三才膏十斤與之。服畢而應酬如故。脩之家世金陵嗣後遂如骨肉。歲時通問餽遺越十載不懈。

崇明文學倪君儔。四年不能起于牀。延余航海治之。簡其平日所服。寒涼者十六補腎肝者十三診其脉大而無力。此營衛交虛以十全大補加秦艽熟附各一錢。朝服之夕用八味丸。加牛膝杜仲遠志草薢虎骨龜板黃柏。溫酒送七錢。凡三月而機關利。

藿香養胃湯 治胃虛不食筋無所養而成瘧。

藿香

白朮 炒透

人參

茯苓

苡仁

半夏麴

烏藥

神麴 炒

縮砂 炒各半錢

華登茄

甘艸 炒各一錢

水二鍾。生薑五片。棗二枚。煎一鍾服。

二陳湯

見痰

霞天膏

卽倒倉法
見積聚

清燥湯 見類中

金剛丸

治腎虛。精敗骨痿。

草薢

杜仲

炒去絲

肉蓯蓉

酒浸

兔絲子

酒浸各等分

右爲末。酒煮猪腰子。和丸梧子大。每服五錢。
空心温酒送下。

牛膝丸 治腎肝虛。骨痠筋弱。

牛膝

酒

草薢

杜仲

炒去絲

白蒺藜

防風

兔絲子

酒浸減半

肉蔻

酒浸等分

官桂

減半

製服全金剛丸

加減四物丸 治腎肝虛筋骨痠。

內 蔊 蓉 酒 浸

牛 膝 酒 浸

天 麻

木 爪

鹿 草

去毛切
酥培

熟 地 黃

五 味 子

酒 浸

兎 緣 子

酒 浸 另 研
各等分

右爲末。蜜丸梧子大。每服五錢。空心酒下。
煨腎丸 治肝脾腎傷。宜緩中。消穀。益精。

牛 膝

草 薛

杜 仲

炒去絲

白 荚 藜

防 風

兎 緣 子

酒 浸

肉 蔊 蓉

酒 浸

葫 蘆 巴

補 骨 脂

酒 炒
等 分

肉 桂

減 等

右爲末。將猪腰子。製同食法。和蜜杵丸。梧子大。每服五錢。空心酒送。治腰痛甚效。

徒步丸

羌活

柴胡

各五錢

防風

三錢

川烏

一錢

滑石

炒五錢

澤瀉

三錢

防已

酒洗一兩

苦參

酒洗一錢

肉桂

甘艸

灸

瓜蔞根

酒製各五錢

右爲末。酒糊丸。梧子大。每服二錢。煎愈風湯。

空心送下。

見中風

虎潛丸

龜板

黃檗

各四兩

知母

熟地黃

各二錢

牛膝

三兩半

芍藥

一兩半

瓊陽

虎骨

酥炙

當歸

各一兩

陳皮

七錢半

乾薑

半兩

補陰丸

爲末。酒糊丸。加附子更妙。

黃檗

知母

俱鹽酒拌炒

熟地黃

敗龜版

四兩

白芍藥

煨

陳皮

牛膝

酒浸各二兩

虎脰骨

酥炙

瑣陽

酒浸酥炙

當歸

酒洗各一兩半

冬加乾薑

五錢

右爲末酒煮羯羊肉爲丸鹽湯下

四物湯

四君子湯

十全大補湯

俱見虛勞

三化

湯

見中風

大小承氣湯

見傷寒

補益腎肝丸

柴胡

羌活

生地黃

苦參

炒

防已

炒各五分

附子

炮

肉桂

各二錢

當歸

二錢

右細末熟水丸如芡實大。每服四錢。溫水送
下。

神龜滋陰丸 治足廢。名曰痿厥。

龜版

酒炙四兩

黃檗

炒

知母

炒各二兩

枸杞子

五味子

鑽陽

各兩

乾薑

半兩

爲末。豬脊髓爲丸。梧子大。每服五錢。

補益丸

白术

二兩

生地

酒浸兩半

龜版

酒浸二兩

鎖陽 酒浸

歸身 酒浸

陳皮

杜牛膝

各一兩

乾薑

七錢

黃檗

炒

虎脰骨

酒炙

茯苓

各半兩

五味子

二錢

甘草

炙一錢

白芍藥

酒煨

菟絲子

如糊入酒蒸研

餘藥末

晒一兩。

右末紫河車爲丸。每服五錢。

本末紫阿車參水無銀五錢

算各一兩

翁藥水 醉

甘草

炙

一

白芷藥

酌

熟

象絲千

吸

勝

人

蒸

頭

東翹骨

酌

大

芥芩

兩

各半

正杞子

二

錢

牀半熟

兩

各一

薜荔

半

錢

黃葉

炒

人

頭

頭

頭

發

酒

葛

龍骨

酌

量

量

劑

丈

驚

經曰。東方青色入通於肝。其病發驚駭。肝應東方于卦爲震。于象爲風。風木多振動。故病爲驚駭。又曰。足陽明之脈病。惡人與火。聞木音則惕然而驚者。土惡木也。陽明多氣。多血。厥則爲憂驚。故惡人之煩擾也。

愚按。外有危險。觸之而驚。心膽强者。不能爲害。心膽怯者。觸而易驚。氣鬱生涎。涎與氣搏。變生諸證。或短氣。或自汗。並溫膽湯。嘔則以人參代竹茹。眠多異夢。隨卽驚覺。溫膽湯加棗仁蓮子。以金銀煎下。或鎮心丹。遠志丸。妙香散。琥珀養心丹。

定志丸。卧多驚魘。口中有聲。真珠母丸。外物卒驚。

宜行鎮重。

蜜陀僧細末茶調一錢或黃連安神丸。

或熱鬱生痰水。

石散或氣鬱生痰七湯加味四

丹溪曰。驚則神出于舍。

舍空得液。痰涎永繫于胞絡之間。

控涎丹加辰砂遠志。

脉候

寸口脈動爲驚。驚者其脉止而復來。

其人目睛不轉不能呼氣。

溫膽湯治心膽虛怯觸事易驚或夢寐不祥。心驚膽憚氣鬱生痰或短氣或自汗。

半夏

湯洗

枳實。

竹茹

各一兩

橘皮

一兩半去白

甘艸

炙四錢

白茯苓

七錢

每服五錢水一碗。薑七片。棗一枚。煎服。

鎮心丸 治心血不足。怔忡多夢。如墮崖谷。

酸棗仁

炒二錢半

車前子

去土

白茯苓

去皮

麥門冬

去心

五味子

茯神

去木

肉桂

各一兩
二錢半

熟地黃

酒浸蒸

龍齒

天門冬

去心

遠志

甘艸水
煮去心

山藥

薑製各
一兩半

人參

硃砂

水飛各半兩

右爲末。蜜丸梧子大。每服三錢。空心米湯下。

達志丸

遠志

去心薑汁淹

菖蒲

各五錢

茯苓

茯苓

人參

龍齒

各一兩

爲末。蜜丸梧子大。辰砂爲衣。熟水送三錢。

妙香散

見痰

琥珀養心丹

治心跳善驚

琥珀

另研二錢

龍齒

煅另研一兩

遠志

甘艸湯煮去木

石菖蒲

茯神

人參

酸棗仁

炒各五錢

當歸

生地黃

各七錢

黃連

三錢

柏子仁

五錢

硃砂

另研三錢

牛黃另研一錢

右爲末。猪心血丸。黍米大金箔爲衣。燈心湯。

送五錢。

定志丸

菖蒲

炒

遠志

去心各二兩

茯神

人參

各三錢

真珠母丸

治肝虛受風。卧若驚狀。

珠母

研細七錢五分

當歸

熟地黃

各一兩半

人參

酸棗仁

柏子仁

犀角

茯苓

各一兩

龍齒

谷半錢

沉香

右爲末。煉蜜丸。桐子大。辰砂爲衣。每服三錢。
金銀薄荷湯下。

黃連安神丸

治心亂煩熱。胸中氣亂。
兀兀欲吐。膈上伏熱。

硃砂

一錢水飛

黃連

酒炒一錢半

甘艸

炙五分

生地黃

當歸頭

各一錢

右爲極細末。蒸餅丸。黃米大。每服十丸。津下。

獨活湯

獨活

羌活

人參

前胡

細辛

半夏

五味子

沙參

白茯苓

酸棗仁

炒

甘艸

各一兩

右爲末。每服四錢。水一鍾。薑三片。烏梅半箇。
煎七分服。

寒水石散

寒水石 煅

滑石 水飛各一兩

水飛各一兩

生甘艸 二錢

半錢

爲末。每服二錢。薑棗湯下。

加味四七湯

半夏

薑製二錢五分

厚朴

薑製一錢

茯苓

去皮各一錢半

蘇葉

茯神一錢

遠志

去心各半錢

菖蒲

甘草各半錢

水二鍾。薑三片。紅棗一枚。煎一鍾服。

控涎丹

甘遂

去心去皮

紫大戟

去皮去心

白芥子

各等分

右爲末。煮糊丸桐子大。臨卧淡薑湯下七丸。

悸心忪也。築築然跳動也。

經曰。心痺者。脉不通。煩則心下鼓。

閉而不通。病熱鬱而爲涎。

涎成則煩。心下鼓動。鼓者。跳動如擊鼓也。五痺湯加茯神遠志半夏。

愚按經文及原病式云。水衰火旺。心胸躁動。

王天

補心丹。傷寒論曰。心爲火而惡水。水停心下。築築然跳動。不能自安。

半夏麻黃丸。茯苓飲子。

亦有汗吐下。

後正氣虛而悸。不得卧者。

溫膽湯。

丹溪責之虛與

痰。辰砂遠志丸。有證狀不齊。總不外于心傷而飲者。控涎丹。

不外于心傷而

火動。火鬱而生涎也。若夫虛實之分。氣血之辨。

卷之十
痰與飲寒與熱外傷天邪內傷情志是在臨證者詳之。

五痺湯

見痺

控涎丹

溫膽湯

俱見驚

天王補心丹

壯水補心清熱化痰定驚悸。

人參

五錢

當歸

酒浸

五味子

麥門冬

去心

天門冬

去心

柏子仁

酸棗仁

各兩

白茯苓

玄參

丹參

桔梗

遠志

各五錢

生地黃

四兩

黃連

酒洗炒二兩

爲末。蜜丸桐子大。硃砂爲衣。每服三錢。燈心
竹葉煎湯送下。

半夏麻黃丸

半夏

麻黃

各等分

爲末。蜜丸如桐子大。每服一錢。日三服。

茯苓飲子 治痰飲伏于心胃。悸動不已。

赤茯苓

去皮

熟半夏

白茯神

去木

麥門冬

去心

橘紅

各二錢

檳榔

沉香

忌火

甘草

炙一錢

二分

水二鍾。薑三片。煎八分。食遠服。

辰砂遠志丸 安心神化風痰。

石菖蒲 去毛遠志 去心

人參

茯神 去木 辰砂 各半

兩

川芎

山藥 鐵粉

麥門冬 去心

細辛 天麻

半夏麴

南星 炒黃 白附子 生各

一兩

爲末。生薑五兩。取汁入水。煮糊丸如棗豆大。
別以硃砂爲末。每服一錢。臨卧薑湯服。

恐

經曰。在藏爲腎。在志爲恐。又云。精氣併于腎則。

恐者。腎之情志。下章之言。

恐。他藏者。亦莫不繇于腎也。肝藏血。血不足則。

恐。肝者。腎之子也。水強則膽。

壯水薄則血虛。而爲恐矣。

○胃爲恐。胃屬土。

土邪傷水。水薄則血虛。而爲恐矣。○心怵惕思慮則傷神。神傷則恐懼。

則爲恐也。○心怵惕思慮則傷神。神傷則恐懼。

心怯則怯。

所以

自失。心藏神。神傷則心怯。

恐懼自失。火傷畏水之故。

恐懼自失。火傷畏水之故。

按經文論。恐有腎。肝。心。胃四藏之分。而肝膽于腎。乙癸同源者也。胃之于腎。侮所不勝者也。心之于腎。畏其所勝者也。故恐之一證。屬腎之本。

志而旁及于他藏治法則有別焉。治腎傷者宜

味厚。

枸杞遠志地黃山茱萸

治肝膽者宜養陰。

棗仁

茯苓

山茱萸

牡丹皮

白芍藥

甘草

龍齒

之屬

杜仲

志地黃

治肝膽者宜養陰。

荳蔻仁

治心君者鎮其神

犀角

砂子

琥珀

金銀箔

四君子湯

治陽明者壯其氣

犀角

龍齒

之屬

人參散

治肝腎虛而多恐不能獨卧。

人參

枳殼

五味子

桂心

甘菊花

茯神

山茱萸

枸杞子

各七錢半

柏子仁

熟地黃

各一兩

右爲細末。每服二錢。溫酒調下。

茯神散 治膽胃不足。心神恐怯。

茯神

一兩

遠志

防風

細辛

白术

前胡

人參

桂心

熟地黃

甘菊花

各七錢半

枳殼

半兩

右爲麩末。每服三錢。水一鍾。薑三片。煎至六分。溫服。

補膽防風湯

治膽虛。目暗眩。眉夢。

見鬪訟。

恐懼。

面色變。

夢。

防風一錢 人參七分 細辛

細辛

芎芻

茯神

獨活 前胡 各八分

各八分

爲末。每服四錢。水鍾半。棗二枚煎。八分服。
一儒者久困塲屋。吐衄盈盆。庭羸骨立。夢鬪爭
恐怖。遇勞卽發。補心安神。投之漠如。一日讀素
問。乃知魂藏于肝。肝藏血。作文苦。衄血多。則魂
失養。故交睫卽魘。非峻補不可。而艸木力薄。以
酒溶鹿角膠。空腹飲之。五日而安卧。一月而神

寧鹿角峻補精血血旺神自安也。

寧陽東坡蘇公集

健忘

經曰。上氣不足。下氣有餘。腸胃實而心氣虛。虛則營衛留於下。久之不以時上。故善忘也。

者心

家之清氣也。下氣者。腸胃之濁氣也。營衛留于下。則腎中之精氣不能時時上交于心。故健忘。

○腎盛怒而不止。則傷志。志傷則喜忘其前言。

怒求肝之志。而亦傷腎者。肝腎爲子母。氣相通也。腎藏志。志傷則意失而善忘其前言也。血

併於下。氣併于上。亂而喜忘。

血併于下。則無以養其心。氣併于上。

則無以充其腎。水下火上坎離不交。亂其揆度。故喜忘也。

愚按內經之原健忘。俱責之心腎不交。心不下。

交于腎。濁火亂其神明。腎不上交于心。精氣伏而不用。火居上則因而爲痰。水居下則因而生躁。擾擾紜紜。昏而不寧。故補腎而使之時上。養心而使之善下。則神氣清明。志意常治。而何健忘之有。

治法

思慮過度。

歸脾湯

精神衰倦。

人參養榮湯

痰迷

心竅。

導痰湯 寶星丸 送朱雀丸

心腎不交。

朱雀丸

歸脾湯

治思慮傷心脾。健忘怔忡。

人參

茯神

龍眼肉

黃耆

酸棗仁

炒研

白术

各二錢半

當歸

遠志

各一錢

木香

甘艸

各三分

水二鍾。薑五片。紅棗一枚。煎一鍾服。

人參養榮湯

見虛癆

導痰湯

見痰飲

寧志膏

人參

酸棗仁

各二兩

辰砂

五錢

乳香

二半錢

爲末。蜜丸彈子大。每服一丸。薄荷湯送下。

壽星丸

南星

一斤。掘坑深二尺。炭五斤。坑內燒紅。掃淨。酒澆。南星下坑。懸蓋密。一宿。焙

琥珀

四兩。另研。

硃砂

一半。水飛。一兩。

猪心血三個。生薑汁打麪糊丸如梧子大。每服三錢。人參湯空心送下。日三服。

朱雀丸

沉香

一兩。

茯神

四兩。

爲末。蜜丸。小豆大。每服三十丸。人參湯下。

不得卧

經曰。衛氣不得入于陰。常留于陽。留於陽。則陽氣滿。陽氣滿。則陽躋盛。不得入于陰。則陰氣虛。故目不瞑矣。行陽則寤。行陰則寐。此其常也。失其常。則不得靜而藏魂。所以目不得瞑也。

胃者。六府之海。其氣下行。陽明逆。不得從

其道。故不卧。下經曰。胃不和。則卧不安。此之謂

也。寤從陽而主上。寐從陰而主下。胃氣上逆。則壅于肺。而息有音。不得從其陰降之道。故卧不安也。

又曰。卧則喘者。水氣之客也。夫水者。循津

液而流。腎者。水藏。主津液。主卧與喘也。卧則喘者。亦不

得卧也。水病者其本在腎。其末在肺。

故爲不得卧。卧則喘者。標本俱病也。

愚按內經及前哲諸論詳考之。而知不寐之故。

大約有五。一日氣虛。

六君子湯加酸棗仁黃耆

血少。

一日陰虛。

心煩。酸棗仁一兩。生地黃五錢。米二合。煮粥食之。

一日痰滯。

溫膽湯加南星酸棗

仁雄黃未。一日水停。

輕者六君子湯加菖蒲。重者控涎丹。

一日胃

不和。

橘紅甘草石斛茯苓半夏神麴山楂之類。

大端雖五。虛實寒熱。

互有不齊。神而明之。存乎其人耳。

六君子湯

見虛

溫膽湯

控涎丹

俱見驚

酸棗湯。治虛癆。虛煩不得眠。

酸棗仁一兩
甘艸一錢

知母

茯苓

芎藭

各二錢

水二鍾煎八分服。

鼈甲丸

治四肢無力。膽虛不眠。

鼈甲

酸棗仁

羌活

牛膝

黃耆

人參

五味子

各等分

爲末蜜丸梧子大每服三錢溫酒送下。

羌活勝濕湯治卧而多驚邪在少陽厥陰。

羌活

獨活

藁本

防風各一錢
蔓荆子三錢
川芎二分

甘艸灸五分

水二鍾煎一鍾食後服

羌活

芎藶各二錢

防風一兩
甘艸一錢

川芎

不能食

東垣云。胃中元氣盛。則能食而不傷。過時而不饑。脾胃俱旺。能食而肥。脾胃俱虛。不能食而瘦。
縣是言之。則不能食皆作虛論。若傷食惡食。心下痞滿。自有治法。不在此例。羅謙甫云。脾胃弱而食少。不可尅伐。補之自然能食。許學士云。不能食者。不可全作脾治。腎氣虛弱。不能消化飲食。譬之釜中水穀。下無火力。其何能熟。嚴用和云。房勞過度。真陽衰弱。不能上蒸脾土。中州不運。以致飲食不進。或脹滿痞塞。或

溼痛不消。須知補腎。腎氣若壯。丹田火盛。上蒸脾土。脾土溫和。中焦自治。膈開能食矣。

愚按脾胃者。具坤順之德。而有乾健之運。故坤德。或慙補土。以培其卑監。乾健稍弛。益火以助其轉運。故東垣謙甫。以補土立言。學士用和。以壯火垂訓。蓋有見乎土強。則出納自如。火強。則轉輸不息。火者。土之母也。虛則補其母。治病之常經。每見世俗。一遇不能食者。便投香砂枳朴。

迺苟全其生。而用黃連山梔。以爲開胃良方。而

天枉者多矣。不知此皆實則瀉子之法。因脾胃
閒有積滯。有實火。元氣未衰邪。氣方張者設也。
虛而伐之。則愈虛。虛而寒之。遏真火。生化之元。
有不敗其氣而絕其穀乎。且誤以參术爲滯悶
之品。畏之如砒酈。獨不聞經云。虛者補之。又云。
塞因塞用乎。又不聞東垣云。脾胃之氣實則枳
實黃連瀉之虛則白术陳皮補之乎。故不能食。
皆屬脾虛四君子湯補中益氣湯。補之不效。當補其母。入味

地黃丸。挾痰宜化。六君子湯。挾鬱宜開。育氣湯。佐木宜

安。其功散。加木香。沉香。予金宣顧。肺金虛。則盜竊土母之精。參苓。夫脾爲五藏之母。土爲萬物之根。安穀之屬。夫脾爲五藏之母。土爲萬物之根。安穀則昌。絕穀則亡。關乎人者至爲切亟。慎母少忽。

醫案

文學倪念嵐。累勞積鬱。胸膈飽悶。不能飲食。服消食之劑不效。改而理氣。又改而行痰。又改而開鬱。又改而清火。半載之間。藥餘百劑。而病勢日增。惶懼不知所出。始來求治于余。余先簡其方案。次診其六脉。喟然嘆曰。脈大而軟。兩尺如

絲明是火衰不能生土。反以伐氣寒涼投之。何異于人旣入井。而又下石乎。遂以六君子湯。加益智乾薑肉桂各一錢。十劑而少甦。然食甚少也。余勸以加附子一錢。兼用八味丸調補。凡百餘日。而復其居處之常。

新安程幼安。食少腹悶。食粥者久之。偶食蒸餅。遂發熱作渴。頭痛嘔逆。或以傷寒治之。或以化食破氣之藥投之。俱不效。勢甚危迫。及余診之。謂其兄季涵曰。脉無停滯之象。按之軟且濇。是

脾土大虛之診也。法當以參术理之。衆皆不然。予曰。病勢已亟。豈容再誤。遂以四君子湯加沉香炮薑與之。數劑而減。一月而安。

和中丸 開胃進食。

人參 白术 各三兩
乾薑

甘艸 陳皮
木瓜 去穰各一兩

爲末水丸。白湯送三錢。

七珍散 開胃養氣補脾進食。

人參 白术 酒炒各一兩半 黃耆 蜜炙

白茯苓

陳黃米

炒焦

砂仁

炒各
一兩

甘艸

薑汁炒五錢

爲末。每服三錢。薑棗湯送。

二神丸

破故紙補腎爲癸水。肉豆蔻補脾爲戊土。戌癸化火進食炒方。

破故紙

炒四兩。肉豆蔻生二兩

爲末。肥棗四十九枚。生薑四兩。切片同煮爛去薑取棗。剝皮核研膏爲丸。桐子大。每服三錢。鹽湯下。

育氣湯

木香

丁香

藿香

人參

白术

茯苓

砂仁

白豆蔻

草澄茄

炙甘艸

各半兩

山藥

一兩

橘紅

青皮

去白各二錢半

白檀香

半兩

爲末。每服二錢。木瓜湯調下。

資生丸

白术

泔浸土蒸九次。晒九次切片炒黃。三兩。

人參

蒸熟。三兩。

茯苓

去皮飛去筋。乳拌飯上蒸。乾一兩五錢。

橘紅

山楂肉 蒸

神麴 炒各

二兩

川黃連 炒

薑汁去
汁

白豆蔻

澤瀉 炒

去毛各三錢

桔梗 炒

炒去
汁

藿香

洗

甘艸 炒

蜜灸各五錢

白扁豆 炒

炒去
殼

蓮肉

去心各一兩

薏苡仁 淘

炒各三兩

山藥 炒

炒去
殼

麥芽

炒

芡實 炒

各兩五錢

爲末蜜丸。每丸二錢。每服一丸。淡薑湯磨服。

熟末蜜丸每丸二錢每服一丸水薑湯送服

麥芽

炒

芙蓉實

兩正瓣各一

蠶肉

去殼一兩

薏苡仁

三兩

山藥

炒

藿香

封

甘草

正瓣去殼各三錢

白扁豆

炒去皮

白豆蔻

封

瞿寧

各二錢去殼

葛麻

炒

山楂肉

蒸

慄鱗

各二兩

川黃芩

炒去皮

汗睡則汗出。醒則倏收。日盜汗。不分寤寐。不因勞動。自然汗出。日自汗。

經云。陽氣有餘。爲身熱無汗。陰氣有餘。爲多汗。
身寒。陽有餘者陰不足。故身熱無汗。陰有餘者陽不足。故多汗。身寒。以汗本屬陰也。○

飲食飽甚。汗出於胃。驚而奪精。汗出於心。持重
遠行。汗出於腎。疾走恐懼。汗出於肝。搖體勞苦。
汗出於脾。○血之與氣異名同類。故奪血者無
汗。奪汗者無血。血與汗同奪。則重傷其陰。主死。奪者。迫之使出。○腎病
者。寢汗憎風。腎傷則陰虛。故寢而盜汗出也。

愚按心之所藏在內者爲血。在外者爲汗。汗者。

心之液也。而腎主五液故汗證未有不繇心腎虛而得者。心陽虛不能衛外而爲固。則外傷而自汗。腎陰衰不能內營而退藏。則內傷而盜汗。然二者之汗各有冷熱之分。因寒氣乘陽虛而發者。所出之汗必冷。因熱氣乘陰虛而發者。所出之汗必熱。雖然。熱火過極亢則害承乃制。反兼勝已之化。而爲冷者有之。此又不可不察也。至夫肺虛者固其皮毛。黃耆六一湯
玉屏風散。脾虛者壯其中氣。補中益氣湯
四君子湯
當歸六黃湯

肝虛者禁其疏泄。白芍棗仁烏梅腎虛者助其封藏。味山茱萸龍骨地骨皮牡蠣遠志五倍子何首烏五藏之內更有宜溫宜清宜潤宜燥豈容膠一定之法以應無窮之變乎。

脉候
肺脉硬而散者當病灌汗。肺脉緩甚爲多汗。尺濇脉滑謂之多汗。尺膚濇而尺脉滑主陰傷也。
若汗出如膠之粘。如珠之凝。或淋漓如雨。揩拭不逮者難治。

黃耆建中湯 治血氣虛而自汗。

黃耆

桂各一錢

白芍藥三錢

甘草 一錢

水二鍾。煨薑五片。棗二枚。煎一鍾。入稠餳一
大匙。再煎一沸服。薑有微溏。或嘔者。不用餳。
耆附湯 治氣虛陽弱。自汗體倦。

黃耆去蘆
蜜炙 附子炮去皮
臍等分

每服四錢。水一鍾。生薑十片。煎八分服。

參附湯

人參 三錢 附子炮去皮
臍一錢

水一鍾。薑三片。煎六分服。

黃耆六一湯

黃耆

六兩去
蘆蜜炙

甘艸

一兩
炙

每服五錢。水一鍾。棗一枚。煎七分服。

玉屏風散

防風

黃耆

各一兩

白术

二兩

每服三錢。水一鍾。薑三片。煎六分服。

白术散

治虛風多汗少氣。不治將成消渴。

牡蠣

煅三
錢

白术

一兩半
錢

防風

二兩半
兩

爲末。每服一錢。溫水調下。

安胃湯 治汗出日久虛風瘓痺。

黃連

去鬚

五味子

烏梅肉

生甘艸

各五分

熟甘草

三分

升麻稍

二分

水二杯煎一盃服。

正元散

治下元虛冷。自汗厥逆。嘔吐痛瀉。

紅豆

炒

乾薑

炮

陳皮

去白各三錢

人參

白术

甘艸

炙

茯苓

去皮各二兩

肉桂

去龐皮

川烏

炮去皮各半兩

附子

炮去皮尖

山藥

薑汁浸炒

川芎

烏藥

去木

乾薦

各一錢

黃耆

灸兩半

爲細末。每服三錢。水一鍾。薑三片。棗一枚。鹽

少許。煎七分。食前服。

牡蠣散 治自汗盜汗。

黃耆

麻黃根

牡蠣

研各等分

每服三錢。水一杯。小麥一百粒。煎六分服。

大補黃耆湯

黃耆

蜜炙

防風

山茱萸

川芎

白朮

炒

肉桂

炙甘草

五味子

人參

各一兩

白茯苓

半兩

熟地黃

二兩

肉蓯蓉

三兩酒浸

每服五錢。水二鍾。薑三片。棗二枚。煎八分服。
當歸六黃湯 治盜汗之聖藥。

當歸

生地黃

熟地黃

黃檗

黃芩

黃連

各一錢

黃耆

二錢

水二鍾。煎一鍾。臨卧服。

盜汗良方

麻黃根

牡蠣

煅爲粉各三兩

黃耆

人參

各二兩

龍骨

打碎

地骨皮

各四兩

大棗

七枚

水六鍾。煎二鍾半。分六服。一日飲盡。

茯苓湯 治虛汗盜汗。

白茯苓

去皮及膜研細末

每服二錢。煎烏梅陳艾湯調服。

柏子仁丸

柏子仁

半夏麴

各二兩

牡蠣

煅七次
醋淬

人參

麻黃根

微炙去汗

白术

五味子

各一兩

淨麴

炒半兩

爲末。棗肉丸。梧子大。空心米飲下三錢。

止汗法

川鬱金研細末。臨卧以津調塗乳上。

止汗紅粉

麻黃根

牡蠣

各二兩

赤石脂

龍骨

各五錢

爲細末。以絹包撲于身上。

黃疸

經曰。溺黃赤安卧者黃疸。

論色微黃齒垢黃爪甲

黃黃疸也。溺黃赤安卧。脉小而寒。不嗜食。正理論謂其得之女勞也。

已食如饑者。脉小而清。不嗜食。寒也。治痘者須知寒熱之別。

胃疸。

消穀善饑。胃有熱也。論疾尺診篇曰。脉小而清。不嗜食。寒也。治痘者須知寒熱之別。

目黃者曰黃疸。

目者。宗脈所聚。諸經有熱。上薰於目。故黃疸者目黃。

愚按黃者中央戊己之色。故黃疸多屬太陰脾

經。脾不能勝濕。復挾火熱。則鬱而生黃。譬之龕

龕相似。以濕物而當暑月。又加覆蓋。濕熱相搏。

其黃乃成。然濕與熱。又自有別。濕家之黃色暗

不明。熟家之黃。色光而潤。亦有脾腎虛寒。脉沉而細。身冷自汗。瀉利溺白。此名陰黃。茵陳薑附湯。理中湯。

八味。汗出染衣。色如檗汁。此名黃汗。黃耆湯。耆丸。

湯。挾表者肺浮。汗之而愈。桂枝加黃耆湯。挾裏者腹脹。下之而安。大黃硝石湯。

食傷有穀疸之名。茯苓茵陳梔子湯。

酒傷有酒疸之治。葛花解醒湯。

則膀胱急而小便自利。微汗出而額上色黑。手足心熱。發以薄暮。加味四君子湯。

熟導濕爲之主方。茯苓湯。

假令病久。脾衰胃薄。東垣腎疽湯。清

必以補中。參术健脾湯

脉洪泄利而渴者死。脉小溺利不渴者生。寸口近掌處無脉。口鼻冷者死。疽毒入腹。喘滿者死。年壯氣實。脉大易愈。老人氣虛。脉微難瘥。

茯苓滲濕湯 清濕熱利小便。

茵陳 七分 白茯苓 六分 木猪苓

澤瀉

白术

陳皮

蒼术

泔浸宿炒透

黃連

各五分

山梔炒

秦艽

防已

葛根 各四分

水二杯煎七分。食前服。

耆芍桂苦酒湯

黃耆

五兩

白芍藥

桂枝

各三兩

苦酒一升。水七升。煮三升。溫服一升。當心煩至六七日解。若心煩不止。苦酒阻故也。

桂枝加黃耆湯 脉浮而腹中和者汗之。

桂枝

白芍藥

生薑

各三兩

黃耆

甘艸

各二兩

大棗

十二枚

水八升。煮取三升。服一升。須臾飲熟稀粥一升。以助藥力。取微汗。若不汗。更服。

黃耆湯 治黃汗身腫。發熱不渴。

黃耆

去蘆
蜜炙

赤芍藥

茵陳蒿

各二兩

石膏

四兩

麥門冬

去心

淡豆豉

各一兩

甘艸

炙半兩

每服四錢。水一杯。生薑五片。煎七分服。

大黃硝石湯

一方加梔子十五枚

大黃

黃檗

硝石

各四兩
作滑石

水六升。煮取二升。內硝煮取一升。頓服。

加減五苓散

茵陳

猪苓去皮

白术

赤茯苓去皮

澤瀉各二錢

水二鍾煎一鍾服

茯苓茵陳梔子湯

茵陳葉一錢

茯苓去皮五分

梔子仁

蒼术

去皮炒

白术

各三錢

黃芩生六分

黃連

去鬚

枳殼

炒

豬芩去皮

炒

澤瀉

陳皮

漢防已 各二分

青皮

去白一分

水二杯煎一杯服。

葛花解醒湯

見泄瀉

八味丸

理中湯

並見虛勞

加味四君子湯

治色疽及久疽不愈。

人參

白术

白茯苓

白芍藥

黃耆

炙

白扁豆

炒各

二錢

甘草

炙一錢

水二鍾。生薑五片。紅棗二枚。煎一鍾服。

腎疽湯 治女勞成疽。

升麻根 半兩 蒼朮 一錢

防風根

獨活根

白朮

柴胡根

羌活根

葛根

各五分

茯苓

猪苓

澤瀉

甘艸根

各三分

黃檗

二分

人參

神麴

各六分

水二杯煎一杯食前服。

參术健脾湯 治久黃脾虛食少。

人參

白朮

各一分

白茯苓

陳皮

白芍藥

煨

當歸

酒洗各一錢

炙甘艸

七分

水二鍾。棗二枚。煎八分服。

色疽黃耆

白扁豆

茵陳薑附湯

治陰黃。脉沉微。小便利。或瀉。

附子

炮去皮
三錢

乾薑

炮二錢

茵陳

一錢
二分

艸豆蔻

煨一錢

白朮

四分

枳實

麪炒

半夏

製

澤瀉

各五分

白茯苓

橘紅

各三分

水二鍾。生薑五片。煎八分。待冷服。

蔓菁散 治陰黃汗染衣涕唾黃。

蔓菁子 爲細末。平旦以井華水服一匙。
日再加至兩匙。以知爲度。每夜小便中浸少
許帛子。各書記日色漸白則瘥。不過服五升
而愈。

灸甘腴

子卷

白芷藥

驗

當醣

一錢

副制各

霍亂

經曰。太陰所至。爲中滿。霍亂吐下。又曰。土鬱之
餐。民病嘔吐。霍亂注下。此二條言受濕霍亂也。宜五苓散。理中丸之類。
歲土不及。風乃大行。民病霍亂餐泄。此言風木勝土而爲
霍亂。宜桂苓白朮散。熱至則身熱。霍亂吐下。此言火熱霍亂。宜香薷散。
足太陰之別。名曰公孫。去本節後一寸。別走陽
明。其別者入絡腸胃。厥氣上逆。則霍亂。實則腸
中切痛。虛則蠶脹。取之所別。○清氣在陰。濁氣
在陽。營氣順脈。衛氣逆行。清濁相干。亂于腸胃。

則爲霍亂。此言厥氣上逆。清濁不分。飲食不節。乃爲霍亂。

愚按霍亂者。揮霍變亂。起于倉卒。心腹大痛。嘔

吐瀉利。憎寒壯熱。頭痛眩暉。先心痛則先吐。先

腹痛則先瀉。心腹俱痛。吐瀉並作。甚者轉筋。入

腹則斃。

轉筋者。以陽明養宗筋。屬胃與大腸。吐下頓亡津液。宗筋失養。必致攣縮。甚則

囊縮舌卷爲難治。

卷

陰陽反戾。清濁相干。陰陽否隔。上下

奔迫須遵內經。分濕熱風暑虛實而爲施治。乾

霍亂者。心腹脹滿攬痛。欲吐不吐。欲瀉不瀉。躁

亂昏憤俗名攬腸沙。此繇脾土鬱極。不得發越。

以致火熱內擾。不可過于攻。過攻則脾愈虛。不
可過于熱。過熱則火愈熾。不可過于寒。過寒則
火必捍格。須反佐以治。然後鬱可開。火可散。古
方用鹽蒸。調以童便。不獨降火。兼能行血。極爲
穩妥。霍亂多起于夏秋之間。皆外受暑熱。內傷
飲食所致。縱冬月患之。亦 胡湯。厥冷唇青。兼寒氣。建中加附子乾薑湯 身熱煩渴。渴氣。桂苓白朮散 髒。兼暑熱。或香薷散 體重骨節煩疼。兼濕化。

除濕
湯

風暑合病。

石膏理中湯

暑濕相搏。二香散

多食寒

冷。

六和湯倍霍香煎熟調蘇合丸

或通

茱萸湯

合丸

指探

三碗。指探

一盞。仍飲一

碗。不吐再服一盞。仍飲一

盞。吐利不止。元氣耗散。病勢危篤。或

此法極良。

吐利不止。元氣耗散。病勢危篤。或

此法極良。

口渴喜冷。或惡寒逆冷。或發熱煩躁。欲去衣被爲熱。
理中湯。甚者附子理中湯。不效。四逆湯。並宜冰冷與服。
霍亂已透。餘吐餘瀉未止。腹有餘痛。
宜一味報秋豆葉煎服。乾者尤佳。
保命集云。有從標而得者。有從本而得者。有從標本而得者。

六經之變治各不同。細察色脉知犯何經。隨經標本活法施治。此大法也。

霍亂。遍身轉筋。肢冷。腹痛欲絕。脉洪易治。脉微。舌卷囊縮者死。霍亂後。陽氣已脫。或遺尿不知。或氣少不語。或膏汗如珠。或大躁欲入水。或四肢不收。皆不可治。

理中湯

人參

乾薑

白朮

各三錢

甘艸 炙一錢

水二杯煎一杯服。加附子。名附

人參

獐耳

白朮

金

各三

聖中丹

人水毒。四肢不伸。皆不可用。

數日不眠。更甚。少不嚙。更嘔。至成瘧。或大瘧。或

小瘧。古參。麋鹿。牛膝。雷鳴。發物。麻旦。知母。知

雪。蜀。蘇。良。轉。痛。如。令。更。羸。谷。參。根。共。湯。

驗。本。治。移。治。出。大。去。也。

大。歸。之。始。治。治。不。同。參。食。色。頭。汗。骨。頭。頭。聲。

二香散 治暑濕相搏。霍亂轉筋。煩渴悶亂。

藿香

白术

厚朴

橘紅

茯苓

半夏

紫蘇

桔梗

白芷

香薷

黃連

扁豆

各一錢

大腹皮

甘草 各五分

水二杯。薑五片。葱白三根。煎一杯服。

香薷散 霍亂諸證皆宜服之。

厚朴

去皮薑
汁炒

黃連

薑汁炒
各二兩

香薷

四兩

甘草

五錢

爲末。每服四錢。水煎。不犯鐵器。井中沉冷服。

桂芩白术散

暑食兩傷。濕熱霍亂。轉筋。

桂枝

人參

白术

白茯苓

各半兩

澤瀉

甘艸

石膏

寒水石

各一兩

滑石

二兩

爲細末。每服三錢。薑湯下。

一方有木香薑
香葛根。各半兩。

五苓散

見泄

見風

蘇合香丸

見中風

除溼湯

見風

五苓散

見風

蘇合香丸

見中風

七氣湯 治七情鬱結。霍亂吐瀉。

半夏 湯洗

厚朴

白芍藥

茯苓 錢各二

桂心

紫蘇

橘紅

人參 錢各一

水二鍾生薑七片。紅棗一枚。煎一鍾服。

吳茱萸湯

治胃暑。或傷冷物。或忍飢。或大怒。
或乘舟車傷動胃氣。轉筋逆冷。

吳茱萸

木瓜

食鹽

各半兩

同炒焦水三升。煮令百沸。入藥煎至二升服。
如無藥用鹽一撮。醋一鍾。煎八分服。

脉四逆湯

附子

大者一枚生用

乾薑

三兩強者四兩

甘草

炙二兩

水三升。煮取一升。

分溫再服。

建中加木瓜柴胡湯

桂枝

二兩半

芍藥

二兩半

甘草

一兩半

膠餚

半升半

生薑

一兩半

大棗

六枚

木瓜

各五錢

柴胡

錢各五

每服一兩水三杯。煎杯半去渣下餚兩匙服。

六和湯

香薷 二錢

砂仁

半夏

湯洗七次

杏仁 去皮
尖炒

人參 去蘆

甘艸

炙各五分

赤茯苓 去皮

藿香 去土

白扁豆

薑汁炒畧

厚朴 炒

木瓜 各一錢

水二杯。薑五片，紅棗一枚。煎一杯服。

藿香正氣散

見中風

厚朴湯 治乾霍亂。

厚朴 炒

薑汁 治霍亂

去瓢

枳殼 麝炒

大黃 炒二兩

檳榔

朴硝 各半錢

半

大黃

炒二兩

爲末。每服三錢水。杵半煎一杯服。

冬葵子湯 治乾霍亂。二便不通。煩熱悶亂。

冬葵子

滑石

研

香薷

各二兩

木瓜

一枚去皮瓢

爲末。每服五錢水二杯煎一杯服。

日服五次

地漿法 於牆陰掘地。約二尺許。入新汲水攪之。澄清。服一杯。旣取土氣。又取牆陰及新汲水。蓋陰中之陰。能治陽中之陽也。

水。蓋。劍中之金。鑿石。鐵中之銀也。

六。劍。前。頭一林。猶。東土。豪。更。重。觀。念。又。淮。死。

此。樂。去。外。都。劍。鼎。盤。耳。一。尺。指。大。驚。天。水。舞。

爲。未。每。朋。玉。鑑。水。二。林。頭。一。林。頭。

正。火。日。頭。

木。八。

丸。唐。去。

冬。葵。子。

部。口。

音。譜。

兩。合。二。

不。葵。子。愚。余。諱。書。圖。一。禽。不。與。豚。燕。闕。圖。

水。未。哥。羅。三。鑿。木。齊。半。頭。十。林。頭。

嘔 吐 嘈

有聲有物爲嘔
有聲無物爲嘈

有物無聲爲吐

經曰。諸逆衝上。皆屬於火。諸嘔吐酸。皆屬於熱。

火性炎上。故逆上皆屬於火。然諸藏諸經各有
逆氣。則陰陽虛實。各自不同。實火可瀉。芩連之
屬虛火。可補參耆之屬。不可不察也。胃熱則
嘔。而酸者。肝之味也。火盛金傷。不能制木。則肝
木自甚。在素問。則以爲熱。東垣又以吐酸爲寒。
何也。經言始受熱中。東垣言未傳寒中。摠之壯
盛人多熱。虛弱人多寒。若不
以虛實形證爲辨。非醫矣。

○寒氣客于腸胃。

厥逆上出。故痛而嘔。此經之言嘔。
亦主于寒客。食則嘔者。物
盛滿而上溢。脾不能運化精微。則
食滿而嘔。蓋虛證也。足太陰病。舌
本強。食則嘔。脾脉連于舌本。故舌強而嘔也。故寒氣與新穀氣。

出於胃。故爲嘔。東垣以有聲無物爲嘔。蓋指乾嘔也。而內經所爲嘔者。蓋呃逆者。卽其論鍼刺者有云。病深者其聲嘔。又曰。嘔驚之亦可已。此皆治呃逆之法。每試而必效者也。

愚按古人以嘔屬陽明。多氣多血。故有聲有物。氣血俱病也。吐屬太陽。多血少氣。故有物無聲。血病也。嘔屬少陽。多氣少血。故有聲無物。氣病也。獨東垣以嘔吐嘔俱屬脾胃虛弱。或寒氣所生。或飲食所傷。致上逆而食不得下也。索古老

人從三焦分氣積寒三因。上焦在胃口。上通天氣主納而不出。中焦在中脘。上通天氣。下通地氣。主熟腐水穀。下焦在臍下。下通地氣。主出而不納。故上焦吐者皆從于氣。氣者天之陽也。其脈浮而洪。其證食已卽吐。渴欲飲水。治當降氣和中。中焦吐者皆從于積。有陰有陽。氣食相假。其脉浮而弦。其證或先痛後吐。或先吐後痛。法當去積和氣。下焦吐者皆從于寒。地道也。其脉大而遲。其證朝食暮吐。暮食朝吐。小便清利。大

復不通。法當通其閉塞。溫其寒氣。後世更爲分
別。食剝則吐。謂之嘔。剝者頃刻也。食纔入口。即便吐出。用小半夏湯。食
入則吐。謂之暴吐。食纔下咽。即便吐出。生薑橘皮湯。食已則吐。
謂之嘔吐。食畢然後吐。橘皮半夏湯。食久則吐。謂之反胃。食久則既入于胃矣。胃中不能別清濁化精微。則復反而出。水煮金花丸。食再則吐。謂
之翻胃。初食一次。不吐也。第二次食下。則吐。直至從胃之下口。翻騰上出。易老紫沉丸。
旦食暮吐。暮愈朝吐。積一日之食。至六時之久。然後吐此下焦病。半夏生薑大黃湯。以上諸證。吐愈速。則愈在上。吐愈久。則愈
在下。陰陽虛實之間。亦易黑白判也。古方通以

半夏生薑爲正劑。獨東垣云。生薑止嘔。但治表實氣壅。若胃虛。穀氣不行。惟當補胃。推揚穀氣而已。故服小半夏湯不愈者。服大半夏湯立愈。

挾寒者。喜熱惡寒。肢冷脉小。

或二陳湯。加丁香炮薑。或理中湯。加

枳實。並須冰冷與服。冷則不吐。諸藥不效者。紅豆丸神效。

挾熱者。喜冷惡熱。

躁渴脉洪。

二陳湯。加黃連。梔子。竹茹。枇杷葉。乾葛。生薑。蘆根汁。

氣滯者。脹滿不通。

一陳湯。加枳

實。沉香。木香。涎泛。先

以薑蘿湯下靈砂丹。繼以順氣之藥。

食積者。消導乃安。

枳實厚朴。蒼朮。神曲。靈砂。養

麥芽。山楂。砂仁。

吐而諸藥不效者。必假鎮重以墜之。

正吐而中氣久虛。必借穀食以和之。

宜白米炒焦黑色陳

皮。茯苓半夏甘艸陳倉米。苡仁穀藥。時時呷陳米飲。先吐後瀉。身熱腹悶。

名曰漏氣。

此因氣內着。麥門冬湯。

二便不通。氣逆不

續。名曰走哺。

此下焦實熱。人參湯主之。

乾嘔氣逆

橘皮生薑等分

惡

心胃傷。

虛者人參橘紅。茯苓甘艸半夏生薑。實者枳殼砂仁橘紅半夏白蔻藿香。

苦邪在膽經。

黃連甘艸生薑橘皮柴胡。

吐酸責之肝藏。

挾熱者。左

金丸加白蔻生薑竹茹梔子。挾寒者。左金丸加白蔻生薑竹茹梔子。挾寒者。左金丸加丁香乾薑白朮沉香。

嘔清水者多

氣虛。

六君子湯。加赤石脂。加川椒五粒。檳榔五分。吞。

詳別其因。對證用藥。不膠于一定之跡。

烏梅丸。

五分。呑。

方可應無窮之變耳。

脉候

陽緊陰數爲吐。陽浮而數亦爲吐。

寸

緊尺濇。胸滿而吐。寸口脉數者吐。緊而濇

者難治。緊而滑者吐逆。脉弱而嘔。小便復

利。身有微熱。是厥者死。嘔吐大痛。色如青菜

葉者死。

兵尊高玄圃。久患嘔吐。閱醫頗衆。病竟不減。余
診之曰。氣口大而軟。此穀氣少而藥氣多也。且
多犯辛劑。可以治表實不可以治中虛。可以理

氣壅不可以理氣弱投以熟半夏五錢人參三
錢陳倉米一兩白蜜五匙甘瀾水煎服二劑減
十劑安。

屯院孫瀟湘。夏月食瓜果過多。得食輒嘔。十日
弗止。舉家驚惶千里迎余。比至署中已二十日
矣。因頓床褥。手足如冰。余曰。兩尺按之有神。胃
氣縷縷不絕。祇因中氣本弱。復爲寒冷所傷耳。
遂用紅豆丸。連進三服。至明日便能食粥。兼與
理中湯。加丁香沉香。旬日之間飲食如常矣。

小半夏湯 止嘔定吐。開胃消食。

半夏 洗 生薑 留皮各
三錢

水一鍾煎六分服。加橘皮名橘皮半夏湯。
大半夏湯 治胃虛嘔吐。

半夏五錢
湯洗 人參 三錢 白蜜 二錢

水二碗和蜜揚之二百四十遍煮八分溫服

薑橘湯

橘皮去白 生薑留皮各
三錢

水一鍾煎六分服。

水煮金花丸

二陳湯

俱見
瘧

理中湯

見傷
寒

紫沉香

治中焦吐食積寒氣作痛。

砂仁

半夏麴

各三錢

烏梅去核

丁香

檳榔

各二錢

沉香

杏仁

去皮
尖炒

白术

木香

各一錢

陳皮

五錢

白豆蔻

巴豆霜

各五分
另研

爲細末。醋糊丸黍米大。每服五十丸。食後薑湯下。反胃用橘皮去白。裏生薑麴裹紙封燒令熟。麪煎湯下。紫沉丸一百粒。一日二服。

半夏生薑大黃湯

半夏

大黃

各二兩

生薑

半兩

水五升。煮取三升。分溫再服。

紅豆丸 治嘔逆膈氣。反胃吐食。

丁香

胡椒

砂仁

紅豆

各二十
一粒

爲細末。薑汁糊丸。皂角子大。每服一丸。以大

棗一枚。去核填藥。麪裹煨熟。去麪細嚼。白湯

下。日三服。

靈砂丹

治上盛下虛。痰盛吐逆。此丹最能鎮
墜。升降陰陽。調和五藏。補養元神。

水銀

一觴

硫黃

四兩

右二味用新銚內炒成砂子。入水火鼎煅煉
爲末。糯米糊丸。麻子大。每服三丸。空心棗湯
米飲。井花水。人參湯任下。忌猪羊血。菉豆粉
冷滑之物。

養正丹

見中風

六君子湯

見虛勞

烏梅丸

見傷寒

麥門冬湯

治漏氣。上焦傷風。腠理開經。氣失道。
邪氣內着。身背熱。肝臂痛。悶而吐瀉。

麥門冬

去心

生蘆根

竹茹

白术

各五兩

甘艸

炙

茯苓

各二兩

人參

陳皮

葳蕤

各三兩

每服四錢。水鍾半。薑五片。陳米一撮。煎七分
服。

走哺人參湯 治大小便不通。下焦實熱。

人參

黃芩

知母

蘆薈

各二錢

蘆根

竹茹

自术

梔子仁

陳皮

各半兩

石膏

煅二兩

每服四錢水鐘半煎七分服

左金丸

治肝火吐酸水。續左金養德
金令左行。則肝木有制也。

黃連

吳茱萸

各一兩同
拌湯研末。

爲細末。粥九煎白术陳皮湯下二錢。