


SOC. PHARM LOND
GUL. DALRYMPLE
SEPTEMB. 7^{MO} 1789





Francis Bertram Dalrymple.

29, 576/B/2

2 vols in 1

Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b30540604_0002

GULIELMI HUDSONI,

Regie Societatis Socii et Pharmacopæi Londinensis,

F L O R A

A N G L I C A;

E X H I B E N S

P L A N T A S

P E R

Regnum BRITANNIÆ sponte crescentes,

D I S T R I B U T A S

Secundum Systema Sexuale:

C U M

DIFFERENTIIS SPECIERUM,

SYNONYMIS AUCTORUM,

NOMINIBUS INCOLARUM,

SOLO LOCORUM,

TEMPORE FLORENDI,

OFFICIALIBUS PHARMACOPÆORUM.

T O M U S I.

EDITIO ALTERA, EMENDATA ET AUCTA.

L O N D I N I,


Impensis AUCTORIS:

Prostant Venales apud J. NOURSE, in the Strand.

M.DCC.LXXVIII.



NOBILISSIMO VIRO
HUGONI DUCI
NORTHUMBRIÆ,
ORDINIS PERICELIDIS EQUITI, &c.
ARTIUM TUM UTILIUM
TUM ELEGANTIORUM
JUDICI ET PATRONO,
HOC OPUS HUMILLIME DEDICAT
GULIEL. HUDSON.



P R A E F A T I O.

PAUCIS lectorem præfari necessarium duxi, tum ut eum admonerem quid in hac Florâ expectare debeat, tum ut notas quasdam compendi gratiâ usurpatas explicarem.

Fundamentum hujus operis quoad *Catalogum Plantarum Raii synopsis* agnoscitur, et agnosci debet; quantulum enim intactum reliquit vir ille diligentissimus, accuratissimus, et addere licet, sagacissimus, confitentibus tum popularibus suis, tum exteris; qui floram ejus inter optimas et perfectissimas uno ore numerant? si nullum igitur post ejus tempora augmentum accepisset ipsa scientia botanica, nihil pene pro plantis Anglicanis dignoscendis ulterius desideraretur, quam nova synopseos editio, cuius exemplaria hodie apud bibliopolas omnino non inveniuntur. At exortum est his diebus novum fidus, quod orbi botanico lucem affudit ne in somnis quidem antea

P R A E F A T I O.

vifam; magnus scilicet ille Linnæus, qui partes plantarum minutissimas, vel prius neglectas, vel non omnino observatas in conspectum producendo, plene illustrando, et rite nominando fundatum jecit novæ methodo simplici, compendiosæ, certæ; quam et constantiâ plane admirandâ toti regno vegetabili adhuc cognito feliciter applicuit.

Hunc igitur virum egregium quoad *methodum* per omnia, quatenus licuit, secutus sum.

Essentiales characteres ex Systemate Naturæ, edit. XII. adduxi; quando autem novum genus occurrebat, characterem naturalem ad ejus exemplar, prout in *Genera Plantarum* exhibetur, adjunxi.

Quoad Synonyma, ut vocantur, sive Characteres Specificos, primo loco eos adhibui quos idem author in *Species Plantarum* dedit; quotiescumque certum fuit eum plantam descriptisse; aliter novum characterem, ejus vestigiis insistens construxi; postea synonyma adjeci ex Bauhini pinace, Raio, Gerardo, Parkinsono et variis authoribus hodieris deprompta.

Nomina plerumque Anglicæ ex Raio, Gerardo, &c. apposui, quædam mutavi exemplo et hortatu Domini Stillingfleet motus, ut generica obtinerem, quod optandum esset per omnia, ut confusione, quæ hodie regnat, finis aliquando impo-

natur;

natur; quando autem nulla occurrebant meo jure, ut opinor, imposui.

Quoad loca natalia plantarum satis duxi indicasse solum, quo maxime vulgares sponte proveniunt; locum verò rariorū semper notavi ex Raii Synopsi ultima editione et ex observationibus, sive propriis, sive amicorum.

Plantarum naturam quoad durationem indicavi signis sequentibus; viz. ☽ annum, ♂ biennem, ♀ perennem innuit.

Hoc signum ♂ fruticem vel arborem designat.

Numeri I, II, III, &c. tempus florendi indicant, viz. Januarium, Februarium, Martium, &c.

Plantas cultas non autem indigenas omnino omisi, ut Avenam sativam, Triticum sativum, Solanum tuberosum, &c.

Plantæ quæ sine culturâ non raro inveniuntur extra hortorum pomæria, sed quæ ab origine propagationem eorum rejectamentis debeat asterisco * distinguuntur.

Hanc occasionem lubens amplector gratias agendi amicis, qui mihi plantas pro eorum benevolentia suppeditarunt inter quos nominandi sunt Domini Alchorne, Bolton, Collinson, Lyons, Miller, Pultney, Watson, M. D. Wilmer, M. D. præcipue vero D. Stillingfleet, qui et hoc et aliis amicitiæ privatim et publice functus est.

Cæterum quamvis nihil sciens prætermisſi quod conferre potuit elucidando rem subjectam, non la-

P R A E F A T I O.

borei pepercī, nullam occasionem neglexi libros consulendi, Herbaria sicca evolvendi et Plantas vivas examinandi et desecandi, ut opus omnibus numeris absolutum prodiret; conscius sum tamen me nullo modo scopum attigisse, præsertim quoad classem cryptogamiam, quæ ad hæc usque tempora quantum scio, obscura manet, et mihi plurimum molestiæ creavit. In uno istius ordine, viz. Fungorum me multum deficere agnosco; nec sine aliis Dilleniis, aliis Micheliis extricare se quisquam poterit, cum hunc ordinem experientia edoctus affirmare possum, ut Linnæi verbis utar, etiamnum Chaos esse, nescientibus Botanicis in his, quid sit Species, quid varietas.

In hac secunda editione plurima emendavi et plantas a me noviter detectas vel ab amicis communicas in propriis locis inserui.

TERMINI

TERMINI BOTANICI.

RADIX organum nutriendis plantam.

- | | |
|---------|---|
| Durati- | 1. <i>Annua</i> intra annum emoritura. |
| one. | 2. <i>Biennis</i> altero anno florens et dein peritura. |
| | 3. <i>Perennis</i> per pluros annos regerminans. |
| Figura. | 4. <i>Fibrosa</i> tota constans filamentis. |
| | 5. <i>Ramosa</i> in fibras subdivisa. |
| | 6. <i>Fusiformis</i> simpliciuscula attenuata. |
| | 7. <i>Præmorsa</i> apice quasi truncata. |
| | 8. <i>Repens</i> longe excurrens, hinc inde germinans. |
| | 9. <i>Articulata</i> geniculis intercepta. |
| | 10. <i>Dentata</i> noniliformis ex articulis concatenatis. |
| | 11. <i>Globosa</i> subrotunda (156) radiculis lateralibus. |
| | 12. <i>Tuberosa</i> e partibus carnosis filo basi connexis. |
| | 13. <i>Fascicularis</i> e partibus carnosis basi sessili (150) con- |
| | nexis. |
| | 14. <i>Palmata</i> carnosa lobata (182). |
| | 15. <i>Bulbosa</i> radix bulbo (648) instructa. |
| | 16. <i>Granulata</i> particulis carnosis adspersa. |

TRUNCUS organum multiplicans plantam.

- | | |
|---------|---|
| Specie. | 17. <i>Caulis</i> , truncus elevans et fructificationem et folia; |
| | 18. <i>Culmus</i> graminibus proprius. |
| | 19. <i>Scapus</i> elevans fructificationem, nec folia. |

TERMINI BOTANICI.

- | | |
|----------|--|
| Durati- | 20. <i>Stipes</i> truncus in folia transiens.
21. <i>Herbaceus</i> etiamnum annuus (non lignosus)
22. <i>Suffruticosus</i> basi permanens, ramis quotannis marcescens.
23. <i>Fruticosus</i> perennis cum caudicibus pluribus.
24. <i>Arboreus</i> pereennis caudice simplici.
25. <i>Solidus</i> interne farctus.
26. <i>Inanis</i> interne medulla spongiosus.
27. <i>Fistulosus</i> interne tubulosus. |
| Directi- | 28. <i>Erectus</i> fere ad perpendicularum se attollens.
29. <i>Strictus</i> omnino perpendicularis absque flexura.
30. <i>Rigidus</i> flexionis impatiens.
31. <i>Laxus</i> libere in arcum flexibilis.
32. <i>Obliquus</i> a perpendiculari horizontali linea discedens. |
| one. | 33. <i>Adscendens</i> arcuatim sursum versus.
34. <i>Declinatus</i> arcuatim descendens.
35. <i>Incurvatus</i> introrsum nutans.
36. <i>Nutans</i> apice extrorsum reflexus.
37. <i>Diffusus</i> ramulis patentibus.
38. <i>Procumbens</i> debilis terra innitens.
39. <i>Stoloniferus</i> turiones ad radicem edens.
40. <i>Sarmentosus</i> filiformis geniculis radicantibus.
41. <i>Repens</i> terræ incumbens radiculaque agens.
42. <i>Radicans</i> altis se affigens radiculis lateralibus.
43. <i>Geniculatus</i> internodiis interceptus.
44. <i>Flexuosus</i> a gemina ad gemmam horsum versus aëtus.
45. <i>Scandens</i> alta petens, aliis sustinendus.
46. <i>Volubilis</i> spiraliter adscendens per alia corpora.
<i>Dextrorsum</i> a dextra ad sinistram.
<i>Sinistrorsum</i> a sinistra ad dextram. |
| Figura. | 47. <i>Teres</i> angulis destitutus.
48. <i>Semiteres</i> hinc planus; inde teretiusculus.
49. <i>Compressus</i> duobus lateribus oppositis planis.
50. <i>Anteps</i> angulis duobus oppositis acutiusculus.
51. <i>Angulatus</i> pluribus quam duobus angulis cavis longitudinaliter excavatus.
<i>Acutangulus</i> figura angulorum.
52. <i>Trigonus</i> , &c. angulis tribus prominentibus longitudinalibus. |

BOTANICI TERMINI.

vii

- | | |
|--------------------|---|
| | 53. <i>Triqueter</i> lateribus tribus exakte planis. |
| Vestitu. | 54. <i>Nudus</i> oppositus 5, 199. (55, 56, 57, 58, 59). |
| | 55. <i>Aphyllus</i> foliis destitutus. |
| | 56. <i>Foliatus</i> foliis instructus. |
| | 57. <i>Vaginatus</i> foliorum vaginis cinctus. |
| | 58. <i>Squamulosus</i> squamis adspersus. |
| | 59. <i>Imbricatus</i> tectus, ut nudus non appareat. |
| Superfi-
cie. | 60. <i>Suberosus</i> cortice exteriore molliore, sed elastico in-
dutus. |
| | 61. <i>Rimosus</i> cortice exteriore fissuras sponte agens. |
| | 62. <i>Tunicatus</i> membranis vestitus. |
| | 63. <i>Lævis</i> superficie æquali. |
| | 64. <i>Striatus</i> lineis tenuissimis excavatis inscriptus. |
| | 65. <i>Sulcatus</i> lineis profundis exaratus. |
| | 66. <i>Glaber</i> (213). |
| | 67. <i>Scaber</i> (239). |
| | 68. <i>Muricatus</i> punctis subulatis adspersus. |
| | 69. <i>Tomentosus</i> . (234) |
| | 70. <i>Villosus</i> . (223) |
| | 71. <i>Hispidus</i> . (240) |
| | 72. <i>Aculeatus</i> . (241). |
| | 73. <i>Spinosus</i> spinis (382) armatus. |
| | 74. <i>Urens</i> stimulis (389) adspersus. |
| | 75. <i>Stipulatus</i> stipulis (289) notatus. |
| | 76. <i>Membranaceus</i> complanatus more folii. |
| | 77. <i>Bulbiferus</i> bulbos (648) gerens. |
| Compo-
sitione. | 78. <i>Enodis</i> continuus absque articulis. |
| | 79. <i>Simplicissimus</i> ramis vix ulti. |
| | 80. <i>Simplex</i> continua serie versus apicem extensus. |
| | 81. <i>Integer</i> simplicissimus ramis vix angustatis. |
| | 82. <i>Articulatus</i> internodiis geniculatus. |
| | 83. <i>Prolifer</i> ex apicis centro tantum emittens ramos. |
| | 84. <i>Dichotomus</i> bifariam semper divisus. |
| | 85. <i>Brachiatus</i> ramis decussatim oppositis. |
| | 86. <i>Subramosus</i> ramis paucissimis lateralibus. |
| | 87. <i>Ramosus</i> ramis pluribus lateralibus. |
| | 88. <i>Ramosissimus</i> ramis multis absque ordine cumula-
tus. |
| | 89. <i>Virgatus</i> ramusculis debilibus inæqualibus. |
| | 90. <i>Paniculatus</i> ramis varie subdivisis. |
| | 91. <i>Fastigiatus</i> ramis æqualis altitudinis. |

TERMINI BOTANICI.

92. *Patens* (131).93. *Divaricatus* (103).

RAMI partes caulis.

94. *Alterni* (113).95. *Distichi* (114).96. *Sparsi* (116).97. *Conferti* (117).98. *Oppositi* (124).99. *Verticillati* plures truncum ad genicula circumdantes.100. *Erecti* (127).101. *Coarctati* versus summitatem fere incumbentes.102. *Divergentes* a trunco ad angulum rectum descendentes.103. *Divaricatis* ad angulum obtusum a trunco descendentes.104. *Deflexi* in arcum deorsum inclinati.105. *Reflexi* perpendiculariter dependentes.106. *Retroflexi* horsum versus divaricati.107. *Fulcrati fulcris* (287) instructum.

FOLIA organa motus plantæ.

Determinatio: 108. *Radicale* radici insidens.natione: 109. *Caulinum* cauli insertum.loco. 110. *Rameum* ramis insidens.111. *Axillare* sub rami basi insertum.112. *Florale* flori proximum.Numero. 113. *Unicum, duo, tria, pauca, plurima.*Situ 113. *Alterna* per gradus circum ramum exorta.114. *Disticha* duo latera rami respicientia, licet undique inserta.115. *Bifaria* ad latera rami opposita tantum enata.116. *Sparsa* absque certo ordine constituta.117. *Conferta* plurima totum fere occultantia ramum vel caulem.118. *Imbricata* qua dimidiata partem invicem testa.119. *Fasciculata* plura ex eodem punto ad genicula ramorum.120. *Bina, tria, quina, &c.* de numero ad genicula ramorum.121. *Confluentia*

TERMINI BOTANICI.

ix

- 121. *Confluentia* ad basin inter se cohærentia.
- 122. *Approximata* ad se invicem proxime accedentia.
- 123. *Remota* spatio a se invicem distantia.
- 124. *Opposita* per paria decussatim collocata.
- 125. *Decussata* ita disposita opposite, ut rami, apice inspecto, quatuor ordines referant.
- 126. *Stellata* plura quam duo folia caulem ambiente.
- Directi-** 127. *Erectum* fere ad perpendicularum constitutum.
- one.**
- 128. *Strictum* omnino perpendicularare absque flexura.
- 129. *Rigidum* flexionis impatiens.
- 130. *Adpressum* disco cauli approximatum.
- 131. *Patens* ad angulum acutum cauli insidens.
- 132. *Horizontale* ad angulum rectum a caule descedens.
- 133. *Affurgens* arcuatim erectum, primum declinatum deinde apice erectum.
- 134. *Inflexum* sursum arcuatum versus apicem.
- 135. *Reclinatum* deorsum flexum, ut arcus sit basi inferior, apice adscendente.
- 136. *Recurvatum* deorsum, ut arcus superiora spectat.
- 137. *Revolutum* in spiram recurvatum.
- 138. *Dependens* terram recta spectans.
- 139. *Obliquum* basi cœlum, apice horizontem spectans.
- 140. *Adversum* paginam superioremeridiei (non cœlo) obvertens.
- 141. *Verticale* obversum, ut regio basis angustior evadat regione apicis.
- 142. *Resupinatum* pagina superiore inferiore et contra inferiore superiore facta.
- 143. *Submersum* intra aquæ superficiem absconditum.
- 144. *Natans* superficie aquæ incumbens.
- Insetti-** 145. *Radicans* radices agens.
- one.**
- 146. *Petiolatum* petiolo (288) ad basin inserto.
- 147. *Peltatum* petiolo disco folii inserto.
- 148. *Sessile* immediate cauli (absque petiolo) insidens.
- 149. *Adnatum* pagina superiore basi rami adnexum.
- 150. *Coadunatum* plura inter se connata.
- 151. *Decurrentis* basi folii deorsum per caulem extensa.
- 152. *Amplexicaule* basi caulem ambiente.
- 153. *Perfoliatum* basi transversim cingente (nec antice dehiscente) caulem.

154. *Connata*

BOTANICI TERMINI.

154. *Connata* oppositorum paribus basi utrinque coadunatis.
- Stru^{ctu}ra. Figura** 155. *Vaginans* basi formante tubum caulem vestientem.
156. *Subrotundum* figura orbicularæ (157) proxima.
157. *Orbiculatum* peripheria circinnata (diameter longitudinalis æqualis transversali).
158. *Ovatum* cuius diameter longitudinalis superat transversalem, basi segmento circuli circumscripta, apice angustiore.
159. *Ovale* ex orbiculato oblongo utraque extremitate rotundata æquali.
160. *Oblongum*, diametro longitudinali aliquoties superante transversalem.
161. *Parabolicum* versus apicem sensim angustius rotundatum.
162. *Cuneiforme* sensim versus basin angustatim.
163. *Spathulatum* subrotundum (156) basi angustiore linearie (167).
164. *Rotundatum* angulis orbum.
165. *Lanceolatum* oblongum ab utraque extremitate attenuatum.
166. *Ellipticum* lanceolatum, latitudine oyati folii.
167. *Lineare* æquali ubique latitudine.
168. *Acerosum* lineare (167) persistens (271)
- Angulis.** 169. *Integrum* indivisum, omnique sinu destitutum.
170. *Triangulare*, &c. a numero angulorum.
171. *Deltaideum* rhombeum (172) ex quatuor angulis, e quibus laterales minus a basi distant, quam reliqui.
172. *Rhombeum* forma rhombi.
173. *Trapeziforme* forma trapezii.
- Sinubus.** 174. *Cordatum* subovatum basi sinu exsculpta absque angulis posticis..
175. *Reniforme* subrotundum basi sinu exsculpta absque angulis posticis.
176. *Lunatum* subrotundum basi sinu divisa angulis posticis acutis.
177. *Sagittatum* triangulare, angulis posticis acutis sinu divisis.
178. *Hastatum* sagittatum (177) angulis posticis sinu divisis ad latera prominentibus.

179. *Runcinatum*

TERMINI BOTANICI.

xi

- 179. *Runcinatum* pinnatifidum (187) ita, ut lobi antice convexi, postice sint transversi. e. g. *Leontodon*.
- 180. *Panduriforme* oblongum lateribus inferne coarc-tatum.
- 181. *Fissum* divisum sinubus linearibus, marginibus rectis.
- 182. *Lobatum* ad dimidium divisum in partes distantes.
- 183. *Bi-Quinquefidum* pro numero fissurarum (181).
- 184. *Partitum* ad basin fere divisum.
- 185. *Palmatum* divisum ultra dimidium in lobos sub-æquales.
- 186. *Lyratum* transversim divisum in lacinias, quarum inferiores minores remotiores.
- 187. *Pinnatifidum* transversim divisum in lacinias hori-zontales oblongas.
- 188. *Sinuatum* a lateribus sinubus dilatatis.
- 189. *Laciniatum* varie et indeterminate in partes sectum
- 190. *Squarrosum* divisum in lacinias elevatas, nec plano parallelas.
- Margine. 191. *Integerimum* ipso margine linearis, nec minimum secto.
- 192. *Crenatum* margine incisuris sine respectu extremi-tatis secto.
- 193. *Serratum* margine omnibus incisuris respicientibus extremitatem.
- 194. *Ciliatum* margine setis parallelis longitudinaliter digestis.
- 195. *Dentatum* margine acuminibus patentibus remotis.
- 196. *Spinosum* margine acuminibus subulatis rigidis pun-gentibus.
- 197. *Cartilagineum* margine subosseo.
- 198. *Repandum* margine flexuoso, tamen plano.
- 199. *Lacerum* margine varie divisum, segmentis diffor-mibus.
- 200. *Erosum* sinuatum (188) sinubus minimis obtusis laciniisque inæqualibus.
- 201. *Dœdaleum* una flexuosum lacerumque (199).
- 202. *Obtusum* intra segmentum circuli terminatum.
- 203. *Emarginatum* terminatum crena.
- 204. *Retusum* terminatum sinu obtuso.
- 205. *Præmorfum*

TERMINI BOTANICI.

205. *Præmorsum* terminatum obtuse incisuris inæquilibus.
 206. *Truncatum* terminatum linea transversali.
 207. *Acutum* terminatum angulo acuto.
 208. *Acuminatum* terminatum apice subulato (266).
 209. *Cuspidatum* terminatum apice setaceo.
 210. *Mucronatum* terminatum mucrone extante.
 211. *Cirrhosum* cirrho (290) terminatum.
- Superficie.** *Pagina* superior vulgo cælum, inferior terran spectat.
212. *Nudum* setis et pilis deſtitutum.
 213. *Glabrum* superficie lubrica.
 214. *Nitidum* glabricie lucente.
 215. *Lucidum* quasi illuminatum.
 216. *Coloratum* alio corpore quam viridi.
 217. *Nervosum* vasis simplicissimis a basi ad apicem.
 218. *Trinerve* tribus nervis in basi folii supra basin concurrentibus.
 219. *Triplinerve* nervosum tribus nervis pone basin folii concurrentibus.
 220. *Enerve* nervoso (217. 219) oppositum.
 221. *Lineatum* nervis depressis.
 222. *Striatum* lineis parallelis leviter excavatum.
 223. *Sulcatum* lineis profundis excavatum.
 224. *Venosum* vasis multifariam divisum.
 225. *Rugosum* rugis refertum.
 226. *Bullatum* ex rugoso (225) venis contractis, ab altera parte concavis.
 227. *Lacunosum* disco depresso inter venas interjectas.
 228. *Avene* venoso (224) oppositum.
 229. *Punctatum* adspersum punctis excavatis.
 230. *Papillatum* tectum punctis carnosis.
 231. *Papulosum* tectum punctis vesicularibus.
 232. *Viscidum* oblinatum tenaci humore.
 233. *Vilosum* tectum pilis molibus.
 234. *Tomentosum* villis intertextis nec discernendis obductum.
 235. *Sericeum* tectum pilis adpressis mollissimis.
 236. *Lanatum* indutum quasi tela araneæ (pilis sponte curvatis).
 237. *Barbatum* pilis parallelis obsitum.

238. *Pilosum*

238. *Pilosum* pilis distinctis elongatis tectum.
 239. *Scabrum* punctis eminentibus rigidiusculis exasperatum.

240. *Hispidum* setis rigidis adspersum.

241. *Aculeatum* aculeis (376) armatum.

242. *Strigosum* aculeis lanceolatis (165) rigidis (30).

- Expan-** 243. *Planum* superficie æqualis.
sione. 244. *Canaliculatum* supra sulco profundo longitudinaliter excavatum.
 245. *Concavum* margine disco arctiore, ut deprimatur discus.
 246. *Convexum* margine disco arctiore, ut elevatur discus.
 247. *Cucullatum* lateribus ad basin conniventibus apice vero dilatatis.
 248. *Plicatum* disco plicis acutis alteratim flexo.
 249. *Undatum* disco plicis obtusis alternatim flexo.
 250. *Crispum* margine luxuriante, ut discus evadat longior sua rachi.

- Substan-** 251. *Membranaceum* substantia propria folii.
tia. 252. *Scariosum* substantia sicca arida tactu sonora.
 253. *Gibbum* utraque superficie convexa mediante copiosiore palpa.
 254. *Teres* fere cylindricum.
 255. *Depressum* pulposum (260) disco magis, quam lateribus complanato.
 256. *Compressum* pulposum lateribus magis, quam disco complanatis.
 257. *Carinatum* parte prona disci prominente longitudinaliter.
 258. *Compactum* substantia solida constans.
 259. *Tubulosum* interne concavum vel inane.
 260. *Pulposum* materia tenaci fractum.
 261. *Carnosum* interne pulpa solidiuscula refertum.
 262. *Triquetrum* 3 lateribus longitudinalibus in folio subulato (266).
 263. *Anceps* duobus angulis prominentibus longitudinalibus, disco convextiore.
 264. *Lingulatum* lineare (167) carnosum (261) subtus convexum (246).

265. *Ensiforme*

TERMINI BOTANICI.

265. *Ensiforme* anceps (263) a basi ad apicem sensim attenuatum.
266. *Subulatum* ad basin lineare, versus apicem attenuatum.
267. *Acinaciforme* compressum (256) carnosum (260) altero margine convexo angusto, altero rectiore crassiore.
268. *Dolabriliforme* compressum subrotundum, extrorsum gibbum (253) acie acuta inferne teretiuscula.
- Durati-** 269. *Deciduum* peracta unica æstate casurum.
- one.** 270. *Caducum* brevi decidens, nec per integrum æstatem permanens.
271. *Persistens* peracta æstate non casurum.
272. *Perenne* per aliquot annos virens.
- Compo-** 273. *Sempervirens* per omnia tempora anni virens.
- sitione.** *Compositum* petiolo (288) plura quam unum proferente folia.
274. *Articulatum*, folio ex apice folii excrescente.
275. *Conjugatum*, pinnatum (279) tantum binis foliolis lateralibus.
276. *Digitatum* petiolo simplici apice adnectante foliola.
277. *Binatum* digitatum (276) foliolis duobus terminatum, &c.
278. *Pedatum* petiolo bifido, latere tantum interiore adnectente foliola plura.
279. *Pinnatum* petiolo simplici lateribus adnectente foliola plura.
280. *Bijugum* sic *trijuga*, *quadrijuga*, *quinquejuga*, *sejuga*, &c. pinnatum, sed foliolis tantum quatuor, &c.
- cum *impari* pinnatum, foliolo unico (*impari*) terminatum.
- abrupte* pinnatum, nec cirrho, nec foliolis, terminatum.
- cirrhosum* cirrho (290) terminatum.
- Foliolis oppositis* (124) *alternis* (113).
- ruptis* foliolis alternis minoribus.
- decurvis* foliolis petiolo decurrentibus.
- Decom-** 281. *Bigeminum* petiolo dichotomo (84) apice adnectente foliola plura.

282. *Biternatum*

TERMINI BOTANICI.

xv

- 282. *Biternatum* duplicito-ternatum (277).
- 283. *Bipinnatum* duplicito pinnatum (279).
- 284. *Tergeminum* triplicato geminatum. *Petiolus bifidus* utroque apice foliola 2-ferens, et insuper foliola 2 ad divaricationem petioli communis.
- 285. *Triterнатum* triplicato ternatum.
- 286. *Triplinatum* triplicato pinnatum.
- 287. *FULCRA* adminicula plantæ pro commodiore sustentatione.
- 288. *Petiolus* fulcrum sustinens folium.
- 289. *Stipula* squama basi petiolorum enascentium adstans.
- 290. *Cirrus* vinculum filiforme spirale, quo planta alii corpori alligatur.
- 291. *Pubes* hirsuties omnis in planta.
- 292. *Arma* mucrones arcentes animalia, ne lœdant plantam.
- 293. *Bractea* folium florale (112) facie a ceteris foliis recedens.
- 294. *Pedunculus* fulcrum sustinens fructificationem.

PETIOLUS

- | | |
|--------------|---|
| Figura. | 295. <i>Linearis</i> (167). |
| | 296. <i>Alatus</i> lateribus dilatatus. |
| | 297. <i>Clavatus</i> versus apicem incrassatus. |
| | 298. <i>Membranaceus</i> , complanatus. |
| | 299. <i>Teres</i> (254). |
| | 300. <i>Semiteres</i> (48). |
| | 301. <i>Triqueter</i> (53). |
| Magnitudine. | 302. <i>Brevissimus</i> , qua magnam partem non attingens longitudinem folii. |
| | 303. <i>Brevis</i> nondum longitudinem folii attingens. |
| | 304. <i>Mediocris</i> longitudine folii. |
| | 305. <i>Longus</i> superans longitudinem folii. |
| | 306. <i>Longissimus</i> , aliquoties superans longitudinem folii. |
| Insertione. | 307. <i>Insertus</i> perpendiculariter ramo insdens. |
| | 308. <i>Adnatus</i> (149). |
| | 309. <i>Decurrentis</i> (151). |
| | 310. <i>Amplexicaulis</i> (152). |

311. Appen-

TERMINI BOTANICI.

311. *Appendiculatus*, ramentis foliaceis ad basin.
- | | |
|-------------|--|
| Directione. | 312. <i>Erectus</i> (127). |
| | 313. <i>Patens</i> (131). |
| | 314. <i>Affurgens</i> . (133). |
| | 315. <i>Recurvatus</i> (136). |
| Superficie. | 316. <i>Glaber</i> (213). |
| | 317. <i>Aculeatus</i> (241). |
| | 318. <i>Nudus</i> (212). |
| | 319. <i>Articulatus</i> (82). |
| | 320. <i>Spinescens</i> indurescens et pungens. |
- STIPULÆ.** 321. *Geminæ* duæ et duæ per paria.
- LÆ.** 322. *Solitariæ* simplices sparsæ.
323. *Laterales* lateribus insertæ.
324. *Extrafoliaceæ* infra folium collocatæ.
325. *Intrafoliaciæ* supra folium collocatæ.
326. *Oppositifoliæ* in latere folii opposito-collocatæ.
327. *Caducæ* (270).
328. *Deciduæ* (269).
329. *Persistentes* post defoliationem restantes.
330. *Spinescentes* (320).
331. *Sessiles* (148).
332. *Adnatæ* (149).
333. *Decurrentes* (151).
334. *Vaginantes* (155).
335. *Subulatæ* (266).
336. *Lanceolatæ* (165.)
337. *Sagittatæ* (177).
338. *Lunatæ* (176).
339. *Erectæ* (127).
340. *Patentes* (131).
341. *Integerrimæ* (191).
342. *Serratæ*. (193).
343. *Ciliatæ* (194).
344. *Dentatæ*. (195).
345. *Fissæ* (181).
- CIR-** 346. *Axillaris* (111).
- RHUS.** 347. *Foliaris* folio insidens.
348. *Petiolaris* petiolo (288) insidens.

349. *Peduncularis*

TERMINI BOTANICI.

xvii

PUBES.

- 349. *Peduncularis* pedunculo (294) insidens.
- 350. *Simplex* indivisus.
- 351. *Trifidus* in tres partes divisus.
- 352. *Multifidus* multoties divisus.
- 353. *Convolutus* in annulos contortus.
- 354. *Revolutus* spira dimidio itinere retorta.
- 355. *Pili ductus excretorei* plantæ setacei.
- 356. *Lana pili* curvi densi.
- 357. *Barba pili* paralleli.
- 358. *Tomentum*, villi intertexti vix conspicui.
- 359. *Strigæ* pili rigidiusculi planiusculi.
- 360. *Setæ*, pili rigidiusculi teretiusculi.
- 361. *Simplices*, continuo extensæ longitudinaliter.
- 362. *Hamosæ*, animalibus facile adhærentes.
- 363. *Ramosæ*, subdivisæ quasi in ramulos.
- 364. *Plumosæ*, villosæ compositæ.
- 365. *Stellatæ*, decussatim dispositæ.
- 366. *Hami*, mucrones acuminati curvati.
- 367. *Glochides*, mucrones apice retrorsum multidentati.
- 368. *Glandula papilla* humorem excernens.
- 369. *Utriculus*, vasculum liquore secreto repletum.
- 370. *Foliaceæ* foliis insertæ.
- 371. *Petiolares* (348).
- 372. *Pedunculares* (349).
- 373. *Stipulares* stipulis (289) insertæ.
- 374. *Viscositas* qualitas humoris tenacis.
- 375. *Glutinositas* qualitas humoris lubrici.

ARMA.

- 376. *Aculei* mucrones puñgentes plantæ cortici tantum affixi.
- 377. *Recti*, flexuis destituti.
- 378. *Incurvi*, introrsum flexi.
- 379. *Recurvi* extrorsum reflexi.
- 380. *Furca* aculeis divisis in plures.

b

381. *Bifidæ*

TERMINI BOTANICI.

381. *Bifidæ et Trifidæ* a numero divisionis.

382. *Spina*, mucro e ligno plantæ protrusus.

383. *Terminalis* ad apicem plantæ posita.

384. *Axillaris* (111).

385. *Calycina Calyci* (491) insidens.

386. *Foliaris* (347).

387. *Simplex* (361).

388. *Divisa* apice partita.

389. *Stimuli* mucrones puncturas exflammatorias efficientes, unde pruriginosæ evadunt partes.

BRACTEÆ folia sequentis anni.

390. *Coloratæ* (216).

391. *Caducæ* (270)

392. *Deciduæ* (269).

393. *Persistentes* (271).

394. *Coma* Bracteæ caulem terminantes magnitudine insignes.

PEDUNCULUS. 395. *Partialis*, aliquot flores pedunculi communis proferens.

396. *Communis*, communis pluribus floribus.

397. *Pedicellus*, proprius floribus in Pedunculo communi.

398. SCAPUS pedunculis radicatis caulis faciem induens.

Loco. 399. *Radicalis* (108).

400. *Caulinus* (109).

401. *Rameus* (110)

402. *Petiolaris* (348).

403. *Cirrhiferus* (290).

404. *Terminalis* (383).

405. *Axillaris* (111).

406. *Oppositifolius* (326).

407. *Lateriflorus* (323).

408. *Interfoliaceus* (325).

409. *Extrafoliaceus* (324).

410. *Alterius* (113).

411. *Sparsus* (156).

Situ.

412. *Oppositu*

TERMINI BOTANICI.

xix

Numero.

- 412. *Oppositus* (124).
- 413. *Verticillatus* (99).
- 414. *Solitarius* (322).
- 415. *Geminatus* (321).
- 416. *Umbellula sessilis*, plures pedunculi ex eodem centro ambitu æquali prodeuntes.

Directione. 417. *Adpresso* (130).

- 418. *Erectus* (127).
- 419. *Patens* (131).
- 420. *Cernuus* apice terram spectat.
- 421. *Resupinatus* (142).
- 422. *Declinatus*. (34).
- 423. *Nutans* (36).
- 424. *Flaccidus*, debilis, ut a proprio floris pondere dependeat.
- 425. *Adscendens* (33).
- 426. *Pendulus*, laxus, ut cum folio deorsum tendat.
- 427. *Strictus* (29).
- 428. *Flexuosus* a flore ad florem flexus.
- 429. *Retrofractus* vi quasi ad dependentiam redactus.

Multiflorus pro numero florum, quos profert Pedunculus.

Structura.

- 430. *Teres* (47).
- 431. *Triqueter* (53).
- 432. *Tetragonus* (52).
- 433. *Filiformis* æquabili ubique crassitie.
- 434. *Attenuatus* versus apicem crassitiem perdens sensim.
- 435. *Clavus* (297).
- 436. *Incrassatus*, apice sensim majorem mollem acquirens.
- 437. *Nudus* (212).
- 438. *Squamofus* (58).
- 439. *Foliatus* (56).
- 440. *Bracteatus* Bracteis (293) instructus.
- 441. *Geniculatus* (43).
- 442. *Articulatus* (82).

TERMINI BOTANICI.

443. INFLORESCENTIA est modus, quo flores pendunculo plantæ adnectuntur.
444. VERTICILLUS floribus pluribus caulem annulatim ambientibus.
445. *Sessilis* absque pedicellis manifestis.
446. *Pedunculatus* pedunculis flores elevantibus.
447. *Nudus* (448, 449) oppositus.
448. *Involucratus* involucro (518) instructus.
449. *Bracteatus* (440).
450. *Confertus* pedunculis approximatis.
451. *Distans*, pedunculis remotis.
452. CAPITULUM floribus pluribus in globum congestis.
453. *Subrotundum*, fere globosum (452).
454. *Globosum*, ab omni parte rotundum.
455. *Dimidiatum* ab altera parte rotundatum, ab altera planum.
456. *Foliosum*, foliis intermixtis floribus.
457. *Nudum* foliis et setis destitutum.
458. *Fasciculus* colligens flores erectos, parallelos, fastigiato approximatos.
459. SPICA, flores sessiles alterni in pedunculo communis simplici.
460. *Simplex*, continua indivisa.
461. *Composita*, pluribus spicillis pedunculo insidentibus.
462. *Glomerata* spicillis varie congesta.
463. *Ovata* (158).
464. *Ventricosa*, a lateribus gibba (253).
465. *Cylindrica* teretiuscula. *Secunda* vero dimidiata.
466. *Interrupta* spicis minoribus alternis distantibus.
467. *Imbricata* (118).
468. *Articulata* (82).
469. *Ramosa*, varie divisa.
470. *Linearis* (167).
471. *Ciliata* (194).
472. *Foliacea* foliis interstincta.
473. *Comosa* terminata foliolis.
474. CORYM-

TERMINI BOTANICI.

xxi

474. CORYMBUS fit ex *spica* (459) dum singuli flores petiolis propriis instruuntur, situ elevato proportionali.
475. THYRSUS, *Panicula* (487) coarctata in formam ovatam.
476. RACEMUS pedunculo ramis lateralibus instructo.
477. *Simplex* indivisus.
478. *Compositus*, divisus in plures.
479. *Unilateris*, flores ad alterum latus omnes inserti.
480. *Secundus* flores omnes ad alterum latus flexi.
481. *Pedatus* (278)
482. *Conjugatus* (275).
483. *Erectus* (127).
484. *Laxus* (31).
485. *Nudus* (456).
486. *Foliatus* (56).
487. PANICULA flores sparsi, in pedunculis diverse divis.

Trunci Structura.

488. FRUCTIFICATIO vegetabilium pars tempora-
ria Germinationi dicata.
489. *Simplex* paucis floribus constans.
490. *Composita*, pluribus flosculis conflu-
tibus.
491. CALYX, Cortex plantæ in Fructificatione præ-
fens.
492. Perianthium, calyx fructificationi con-
tiguus.
493. *Fructificationis* stamina Germen-
que includens.
494. *Floris* stamina absque Germine
continens.
495. *Fructus* Germen absque stamini-
bus continens.
496. *Proprium* quemlibet florem respi-
ciens.

b 3

497. *Monophyllun,*

TERMINI BOTANICI.

497. *Monophyllum*, unico foliolo absolutum
 498. *Polyphyllum*, pluribus foliis constans.
 499. 2-5 *fidum* (181).
 500. 2-5 *Partitum* (184).
 501. *Integrum* (169).
 502. *Tubulosum* (259).
 503. *Patens* (131).
 504. *Reflexum*, partibus retrorsum flexis.
 505. *Inflatum*, instar vesicæ cavum.
 506. *Abbreviatum* longitudinem tubi non attingens.
 507. *Obtusum* (202).
 508. *Acutum* (207).
 509. *Spinosum* (73).
 510. *Aculeatum* (241).
 511. *Superum*, cui germen sub Receptaculo.
 512. *Inferum*, cui germen supra Receptaculum.
 513. *Commune* plures flores congregatos continens.
 514. *Imbricatum*, squamis variis superimpositis.
 515. *Squarrosum*, squamis undique divaricatis. *Scariosum* squamis margine membranaceis avidis fororis.
 516. *Turbinatum* obverse conicum.
 517. *Calculatum*, calyce quasi alio minore calyce ad basin cincto.
 518. *Involucrum*, calyx a flore remotus.
 519. *Universale* umbellæ universali subjectum.
 520. *Partiale* umbellæ partiali subjectum.
 521. *Proprium*, cui libet flori subjectum.
 522. *Gluma Calyx Graminis*; valvis amplexantibus.
 523. *Uniflora* unicum florem amplectens.
 524. *Multiflora* plures flores includens.
 525. *Univalvis*

525. *Univalvis* unica constans squama.
 526. *Bivalvis* duabus constans squamis.
 527. *Multivalvis* pluribus quam duabus squamis.
 528. *Colorata* (216).
 529. *Glabra* (213).
 530. *Hispida* (240).
 531. *Arista*, mucro subulatus Glumæ insidens.
 532. *Mutica* mucrone destituta.
 533. *Terminalis* apice glumæ affixa.
 534. *Dorsalis* lateri exteriori glumæ imposita.
 535. *Recta* perpendiculariter exiens.
 536. *Tortilis* flexa funis instar.
 537. *Geniculata* (43).
 538. *Recurvata* (136).
 539. *Amentum* ex *Receptaculo* (629) communi paleaceo gemmaceo.
 540. *Spatha* Calyx longitudinaliter ruptus.
 541. *Univalvis* uno latere dehiscens.
 542. *Dimidiata* latere tantum interiore Fructificationem obvestiens.
 543. *Calyptra* Calyx MUSCI cucullatus antheræ superimpositus.
 544. *Recta* undique æquales.
 545. *Obliqua* ad aliquod latus flexa.
 546. *Volva* Calyx FUNGI membranaceus.
 547. *Approximata* ad capitulum accedens.
 548. *Remotissima* a capitulo spatio recedens.
 549. COROLLA Liber plantæ in flore præsens.
 550. *Petalum* pars corollæ in plures divisæ.
 551. *Tubus* Corollæ monopetalæ pars inferior.
 552. *Unguis* Corollæ polypetalæ pars inferior receptaculo affixa.
 553. *Limbus* Corollæ pars superior dilatata.
 554. *Lamina* Corollæ monopetalæ pars superior patula. Monopetala; vel polypetala a numero petalorum.

TERMINI BOTANICI.

555. *Regularis* æqualis figura, magnitudine et proportione partium.
556. *Irregularis* Limbi partibus, figura, magnitudine et proportione partium diversa.
557. *Inæqualis* partibus non magnitudine sed proportione respondentibus.
558. *Globosa* globum referens.
559. *Campanulata* ventricosa (464) tubo destituto.
560. *Infundibuliformis*, conica tubo imposita.
561. *Rotata* plana nulli tubo imposta.
562. *Ringens* irregularis in duo labia hians.
563. *Galea Ringentis* Labium superius.
Labium pro ringentis labio inferiore
sæpius sumitur.
564. *Faux* hiatus inter lacinias corollæ, ubi tubus terminatur.
565. *Personata* Ringens (562) sed inter labia palato clausa.
566. *Cruciata* petalis quatuor æqualibus patens.
567. *Concava* (249).
568. *Patens* (131).
569. *Papilionacea* irregularis, petalo inferiore cymbiformi (*carina*), superiore adscendente (*vexillum*) lateribus solitariis (*alæ*).
570. *Composita* pluribus constans flosculis intra commune perianthium, supra receptaculum commune.
571. *Ligulata* Corollulis flosculorum omnibus planis versus exterius latus.
572. *Tubulosa* corollulis flosculorum omnibus tubulosis subæqualibus.
573. *Radiata* corollulis disci tubulosus ambitus vero ligulatis difformibus Color notetur.
574. *Nectarium* pars mellifera flori propria.
575. *Proprium* a petalis & ceteris partibus distinctum.
576. *Petalinum* Petalis insertione.
577. STAMEN Viscus pro Pollinis præparatione.
578. *Filamentum*

TERMINI BOTANICI.

xxv

578. *Filamentum* pars elevans adnectensque *Antheram* (organum genitale masculum).
579. *Æqualia* eandem servantia longitudinem.
580. *Inæqualia* aliquot majoribus vel minoribus.
581. *Connata* in unum corpus coalita.
582. *Anthera* pars floris grava polline, quod matura dimittit.
583. *Distinctæ* nec inter se cohærentes.
584. *Connatæ* in unum plures concretæ.
585. *Pollen*, pulvis floris, humore rumpendus, atomosque elasticos ejaculans, (genitura plantarum).
586. PISTILLUM, viscum fructui adhærens pro polinis receptione (organum genitale femineum).
587. *Germen*, rudimentum fructus immaturi in flore.
588. *Superum* corollæ inclusum.
589. *Inferum*, infera corollam positum.
590. *Stylus*, pars pistilli elevans stigma a germine.
591. *Stigma*, summitas pistilli madida humore.
592. PERICARPIUM, viscus plantæ gravidum seminibus, quæ matura dimittet.
593. *Capsula* pericarpium cavum determinate dehiscens.
594. *Valvula*, paries, quo tegitur fructus externe.
595. *Loculamentum*, concameratio cava pro seminum loco.
596. *Dissepimentum*, paries, quo fructus interne distinguitur in concamerationes plures.
597. *Bicapsularis* a numero capsularum.
598. *Bilocularis* a numero loculamentorum.
599. *Tricocca* capsula tribus nodis protuberans, intusque in tria locula-menta divisa,
600. *Didyma*.

TERMINI BOTANICI.

600. *Didyma*, Capsula duobus nodis extus gibba.
601. *Siliqua*, Pericarpium bivalve affigens semina secundum utramque suturam.
602. *Compressa* lateribus oppositis proxime ad se invicem accendentibus.
603. *Torulosa* prominentibus hinc inde gibba.
604. *Articulata* geniculis coarctatis intercepta.
605. *Parallelum dissepimentum* latitudine et diametro transversali ad valvulas accedens.
606. *Transversum dissepimentum* angustius ubi valvulae coarctatæ evadunt concavæ.
607. *Legumen*, pericarpium bivalve affigens semina secundum alteram tantum.
608. *Isthmis interceptum*, in varia locula menta interne transversim distinctum.
609. *Folliculus*, pericarpium univalve altero latere longitudinaliter dehiscens, nec suturæ semina affigens.
610. *Drupa* pericarpium farctum evalve continens nucem.
611. *Succulenta*, humorem continens.
612. *Sicca* præcedenti opposita.
613. *Pomum*, pericarpium farctum evalve continens capsulam.
614. *Bacca*, pericarpium farctum evalve, semina ceteroquin nuda continens.
615. *Nidulantia*, semina per pulpam sparsa.
616. *Strobilus*, ex Amento factum, squamis induratis.
617. *Corculum*, primordium novæ plantæ intra semen.
618. *Corona*

618. *Corona* Calyculus supra adhærens, quo volitat.
619. *Pappus* Corona pennacea pilosave volitans.
620. *Stipitatus* filo elevante et adnectente pappum et semen.
621. *Capillaris*, pilis indivisis.
622. *Plumosus* pilis pennatis constans.
623. *Cauda* semen terminatum filo.
624. *Hamus*, quo adhæret animalibus.
625. *Calculus* tegmentum feminis proprium.
626. *Nux* semine tecto epidermide osseo,
627. *Arillus*, tunica propria exterior feminis sponte secedens.
628. RECEPTACULUM, basis qua partes Fructificationis connectuntur.
629. *Commune* plures flores eorumque fructus continens.
630. *Punctatum*, punctis excavatis adspersum.
631. *Pilosum* (238).
632. *Paleaceum* lamellis innatis distinguens flosculos.
633. *Planum* (243).
634. *Convexum* (246).
635. *Conicum*, teres versus apicem attenuatum.
636. *Subulatum* (266).
637. *Compositus Flos*, receptaculo dilatato integro, Flosculis sessilibus.
638. *Aggregatus Flos*, receptaculo dilatato, Flosculis subpetiolatis.
639. *Umbella*, receptaculum ex eodem centro elongatum in pedunculos filiformes proportionatos.
640. *Simplex*, pedunculis omnibus ex uno eodemque receptaculo ortis.
641. *Composita* omnibus pedunculis apice umbellulas gerentibus.
642. *Universalis*, ex pluribus simplicibus facta composita.
643. *Partialis* umbellula pars universalis.
644. *Prolifera*

TERMINI BOTANICI.

644. *Prolifera*, umbella plus quam decomposita.
645. *Cyma*, receptaculum ex centro eodem universalis, partialibus vero vagis, elongatum, in pedunculos fastigiatos.
646. *Rachis*, receptaculum filiforme flosculos longitudinaliter adnectens in spicam.
647. *Spadix* receptaculum PALMÆ enatum intra spatham, in ramulos fructicantes divisum.
648. **BULBUS**, hybernaculum plantæ e rudimento foliorum præteriorum.
649. *Solidus carnosus* intus indivisus.
650. *Tunicatus*, bulbus tunica extra tunicas.
651. *Squamatus*, squamis imbricatis.
652. *Caulinus* cauli insidens.
petiolaris, e petiolorum rudimentis.
stipularis e stipulis confecta.
corticalis e corticis ramentis.
foliaris, folia continens, non flores.
floralis, flores non folia continens.
communis, et folia et flores continens.
653. **GEMMA**, hybernaculum plantæ ex rudimentis foliorum futurorum.
654. **VERNATO** foliorum dispositio intra gemmam.
655. *Conduplicata*, foliorum lateribus parallele approximatis.
656. *Convoluta*, cuculi in modum spiralis.
657. *Involuta*, lateribus versus paginam superiorem utrinque spiraliter contortis.
658. *Equitantia*, marginibus conniventia situ opposito, ut alterum includat alterum.
659. *Obvoluta*, pagina superiore lateribus approximatis, ita ut alterum latus distinguat alterum folium.
660. *Plicatum* in plicas varias coarctatum.
661. *Circinnale* in spiram transversalem coarctatum, ut apex centrum obtineat.

Mensura.

Mensura.

662. *Linearis*, longitudinaliter lunulæ, ab unguis radice versus unguem (non in Pollice).
663. *Unguicularis*, longitudine unguis.
664. *Pollicaris*, longitudine extimi articuli Pollicis.
665. *Palmaris*, longitudine manus transversæ.
666. *Spithamæus*, spatium inter apicem Pollicis et indicis extensum.
667. *Dodratalis*, spatium inter apicem Pollicis et digiti minimi extensum.
668. *Pedalis* a flexuosa cubitis ad basin Pollicis.
669. *Orgyalis*, longitudine hominis,

NOMINA

NOMINA AUCTORUM
EXPLICATA.

- ACT. Lond.* Acta Philosophica Regiae Societatis Londinensis. Lond. 4to.
- Aet. Paris.* Memoires de l'Academie Royale des Sciences. Paris. 4to.
- Aet. Ups.* Acta Regiae Societatis Upsaliensis. Holmiæ. 4to.
- Allion. Stirp. rar.* Caroli Allioni Specimen Stirpium rariorum Pedeimontii. Turin. 1755. 4to.
- Allion. pl. Nic.* Ejusdem Catalogus Plantarum Agri Niceni. Paris. 1757. 8vo.
- Amm. Stirp. rar. Ruth.* Joannis Ammani Stirpium rariorum in Imperio Ruthenico, &c. Petrop. 1739. 4to.
- Ard. Obs.* Petri Arduini Observationum Botanicarum Specimen. Batav. 1759, 1764. 4to.
- Barr. Icon.* Jacobi Barrelieri Iiones Plantarum per Galliam, Hispaniam et Italiam Observatarum. Paris. 1714. fol.
- Bast. Opusc.* Jobi Basteri Opuscula Subseciva 2. Harlem. 1761. 4to.
- Battar. fung.* A. J. Antonii Battaræ Fungorum Agri Ariminensis Historia. Favent. 1755. 4to.
- B. pr. et pin.* Caspari Bauhini Prodromus et Pinnax. Theatri Botanici. Basil. 1671. 4to.

B. th.

- B. th.* Ejusdem Theatrum Botanicum. Ibid. 1658.
fol.
- B. hist.* Joannis Bauhini Historia Plantarum universalis.
3. Ebrod. 1650. fol.
- Besl. Hort. Eyst.* Basilius Besleri Horti Eystettensis Descriptio. Norimb. 1613. fol.
- Blackf. spec. bot.* Joannis Blackstone Specimen Botanicum. Lond. 1746. 8vo.
- Blackf. cat. pl.* Ejusdem Catalogus Plantarum circa Harefield. Lond. 1737. 8vo.
- Boch. Lips.* Georgii Rudolphi Boehmeri Flora Lipsiae Indigena. Lips. 1750. 8vo.
- Boeh. ind.* Hermanni Boerhaave Index alter Plantarum. Lugdb. 1720. 4to.
- Bocc. mus.* Pauli Boccone Musæum Plantarum rariorum et Fisica, &c. 2. Venet. 1697. 4to.
- Bocc. pl. rar.* Ejusdem Plantarum rariorum Siciliæ Icones et Descriptiones. Oxon. 1674. 4to.
- Breyn. cent.* Jacobi Breynii Centuria Plantarum Gedani. 1678. fol.
- Breyn. pr.* Ejusdem Prodromus Fasciculus Plantarum. Ibid. 1689. 4to.
- Burm. Ger.* Nicolai Laurentii Burmanni Specimen Botanicum de Geraniis. Lugdb. 1759. 4to.
- Buxb. em.* Joannis Christiani Buxbaum Enumeratio Plantarum in Agro Hallensi. Halæ Magd. 1721. 8vo.
- Buxb. cent.* Ejusdem Plantarum minus cognitarum Centuriæ V. Petrop. 1728—1740. 4to.
- Buddl. hort. sic.* Adami Budleii Hortus Siccus Plantarum Angliæ.
- Camer. epit.* Joachim Camerarii Epitome utilissima de Plantis. Franc. 1586.
- Cæsalp.* Andræas Cæsalpinus de Plantis Florent. 1583. 4to.
- Clus. hist.* Caroli Clusii Atrebatis rariorum Plantarum Historia. Antw. 1601. fol.
- Col. eph.* Fabii Columnæ Ecphrasis I. et II. minus cognitarum rariorumque Stirpium. Romæ. 1616. 4to.
- Col. phytob.* Ejusdem Phytobasanos. Neapol. 1592. 4to.
Comm.

NOMINA AUCTORUM EXPLICATA.

- Comm. cat.* Joannis Commelini Catalogus Plantarum Hollandiæ. Anstel. 1685. 12mo.
- Cord. hist.* Valerii Cordii Historiæ Stirpium. Liber IV. Argent. 1561. fol.
- Crantz. aust.* Henrici Joh. Nepomuceni Crantz Stirpium Austriae. 2. Vien. 1762. 4to. et 8vo.
- Dalech. hist.* Jacobi Dalechampii Historia generalis Plantarum. Lugd. 1584. fol.
- Daleb. Paris.* Dionys. Dalibordi Floræ Parisiensis prodromus. Paris. 1750. 8vo.
- Deer. nott.* Caroli Deering Catalogus Plantarum circa Nottinghamiam. Nottingh. 1738. 8vo.
- Dill. gis.* Joannis Jacobi Dillenii Catalogus Plantarum circa Gissam. Gissæ. 1719. 8vo.
- Dill. elth.* Ejusdem Hortus Elthamensis. 2. Lond. 1732. fol.
- Dill. musc.* Ejusdem Historia Muscorum. Oxon. 1741. 4to.
- Dod. pempt.* Remberti Dodonæi Stirpium Historiæ Pemptades sex f. Libri xxx. Antw. 1616. fol.
- Fabric. en. pl.* Philippi Conradi Fabricii Enumeratio Methodica Plantarum Horti Medici Helmstadiensis. Helmst. 1763. 8vo.
- Fl. dan.* Flora Danica. Haffniæ. 1761, &c.
- Fuchs. hist.* Leonardi Fuchsii Historia Plantarum. Basil. 1542.
- Ger. em.* Joannis Gerardi Historia Plantarum, a Thoma Johnson Emaculata. Lond. 1633. et 1636. fol.
- Ger. gallopr.* Ludovici Gerardi Flora Gallo-provincialis. Paris. 1761. 8vo.
- Gesn. ic.* Conradi Gesneri Opera Botanica. Neuremb. 1752. fol.
- Gled. fung.* Joannis Gottlieb Gleditchii Methodus fungorum. Berol. 1753. 8vo.
- Gmel. fib.* Joannis Georgii Gmelini Flora Siberica. 4. Petrop. 1750—1769 4to..
- Gmel. fuc.* Samuelis Gottlieb Gmelini Historia Fuco-rum. Petrop. 1768. 4to.
- Gmel. enum.* Joannis Frederici Gmelini enumeratio Stirpium

- Stirpium Agro Tubingensi Indigenarum. Tubing.
1776. 8vo.
- Gort. Belg. Davidi De Gorteri Flora Belgica. Traj.
ad Rhenum. 1767. 8vo.
- Gouan. monsp. Antonii Gouan Flora Monspeliaca.
Lugd. 1765. 8vo.
- Gouan. Hort. monsp. Ejusdem Hortus Regius Monspe-
liensis. Lugd. 1766. 8vo.
- Gron. virg. Joannis Fred. Gronovii Flora Virginica.
2. Leid. 1739. 8vo.
- Guett. stamp. D. Guettard Observations sur les Plantes.
2. Paris. 1747. 8vo.
- Gunn. Norveg. J. Ernesti Gunneri Flora Norvegica.
Nidros. 1766. fol.
- Hall. hist. Alberti v. Haller Historia Stirpium Indi-
genarum Helvetiae. 3. Bern. 1768. fol.
- Hall. nomencl. Ejusdem Nomenclator. Bern. 1769.
8vo.
- Hall. opusc. Ejusdem Opuscula Botanica. Gotting.
1749. 8vo.
- Hall. orch. Ejusdem Orchidum Classis Constituta.
- Herm. paradis. Pauli Hermanni Paradisus Batavus.
Lugd. 1698.
- Hist. Ox. Roberti Morisoni et Jacobi Bobarti Historia
Plantarum Oxoniensis. 3. Oxon. 1680. fol.
- Hunt. Ev. sylv. Sylva, or a Discourse of Forest-Trees,
by John Evelyn, Esq. with Notes by A. Hunter,
M. D. F. R. S. York. 1776. 4to.
- Jacq. enum. Nicolai Jacquin Enumeratio Stirpium in
agro Vindobonensis sponte nascentium. Vind. 1762.
8vo.
- Jacq. obs. Ejusdem Observationes Botanicæ. Vind.
1764, &c. fol.
- Jacq. austri. Ejusdem Floræ Austriacæ sive Plantarum
selectarum in Austriae Archiducatu sponte crescen-
tium Icones. 4. Vindob. 1773. fol.
- Jacq. hort. vindeb. Ejusdem Hortus Botanicus Vindo-
bonensis. 2. Vindob. 1770. fol.
- Johns. merc. bot. et it. Thomæ Johnsoni Mercurius et
Itinera Botanica. Lond. 1632, 1634. 8vo.

NOMINA AUCTORUM EXPLICATA.

- Kram elench.* Guil. Henrich. Kramer Elenchus Vegetabilium et Animalium Austriæ inferioris. Vien. 1756. 8vo.
- Krasch. Ingr.* Stephani Krascheninnikof Flora Ingrica. Petersb. 1761. 8vo.
- Leys. hal.* Frederici Wilhelm. Leyser Flora Halensis. Hal. 1761. 4to.
- Lin. gen. pl.* Caroli Linnæi Genera Plantarum. Holm. 1764.
- Lin. sp. pl.* Ejusdem Species Plantarum. 2. Holm. 1762.
- Lin. syst. nat.* Ejusdem Systema Naturæ. 3. Holm. 1766, &c.
- Lin. mantiss.* Ejusdem Mantissa Plantarum, ad finem Tomi 2di Systematis Naturæ et Mantissa altera Plantarum. Holm. 1771. 8vo.
- Lin. Fl. lapp.* Ejusdem Flora Lapponica. Amstel. 1737. 8vo.
- Lin. Fl. suec.* Ejusdem Flora Suecica. Stockh. 1755. 8vo.
- Lin. Hort. cliff.* Ejusdem Hortus Cliffortianus. Amstel. 1737. fol.
- Lin. virid. cliff.* Ejusdem Viridiarum Cliffortianum. Amstel. 1737. 8vo.
- Lin. hort. upf.* Ejusdem Hortus Upsaliensis. Holmiæ. 1748. 8vo.
- Lin. mat. med.* Ejusdem Materia Medica. Holmiæ. 1749. 8vo.
- Lin. it. oeland.* Ejusdem Iter Oelandicum. Holmiæ. 1745. 8vo.
- Lin. it. W-goth.* Ejusdem Iter Westrogothicum. Holmiæ. 1745. 8vo.
- Lin. it. scan.* Ejusdem Iter Scanicum. Holmiæ. 1751. 8vo.
- Lin. Amœn. acad.* Ejusdem Amœnitates Academicæ. I. Lips. 1749. II. Holm. 1751. III. Amstel. 1756. IV—VII. Lugdb. 1760, 1764, 1769. 8vo.
- Lob. ic.* Matthiæ Lobelii Icones Plantarum. Antw. 1580. 4to.
- Lob. ob. et adv.* Ejusdem Adversaria et Observationes. Lond. 1605.

NOMINA AUCTORUM EXPLICATA.

xxxv

- Loef. it.* Petri Loefling Iter Hispanicum. Stockh.
1758. 8vo.
- Loef. pruss.* Joannis Loefelii Flora Prussica. Regimont.
1703. 4to.
- Lyons fasc.* Israelis Lyons Fasciculus Plantarum circa
Cantabrigiam. Lond. 1763. 8vo.
- Magn. bot. monsp.* Petri Magnol Botanicum Monspeli-
ense. Monspel. 1686. 8vo.
- Magn. hort. reg. monsp.* Ejusdem Hortus Regius Mons-
peliensis. Monspel. 1697. 8vo.
- Mart. cent.* Joannis Martyn Centuria Plantarum.
Lond. 1728. fol.
- Mart. tourn.* Ejusdem Tournefort's History of Plants.
2. Lond. 1732.
- Mart. plant. Cant.* Thomæ Martyn Plantæ Cantabri-
giensis. Lond. 1763. 8vo.
- Meez. fris.* Davidi Meeze Flora Frisica. Frank. 1760.
8vo.
- Menz. pug.* Christiani Mentzelii Index Nominum
Plantarum multilinguis et Pugillus rariorū Plantarū.
Berol. 1682. fol.
- Merr. pin.* Christophori Merret Pinax rerum Natura-
lium Britannicarum. Lond. 1667. 8vo.
- Mich. gen.* Petri Antonii Michelii Nova Plantarum
Genera. Florent. 1729. 4to.
- Mont. prod.* Josephi Monti Catalogi Stirpium Agri
Bononiensis Prodromus. 1719. 4to.
- Mull. frid.* Ot. Friderici Muller Flora Friderichsdali-
na. Argent. 1767. 8vo.
- Murr. gott.* Joannis Andreæ Murray Prodromus De-
signationis Stirpium Gottingensium. Gottingæ.
1770.
- Nec. delic. gallob.* Natalis Josephi de Necker Deliciæ
Gallobelgice sylvestres. 2. Argent. 1748. 8vo.
- Nec. musc.* Ejusdem Methodus Muscorum. Mannh.
1771. 8vo.
- Pall. elench.* P. S. Pallas Elenchus Zoophytorum.
Hagæ. 1766. 8vo.
- Park. th.* Joannis Parkinsoni Theatrum Botanicum.
Lond. 1640. fol.

NOMINA AUCTORUM EXPLICATA.

- Park. par.* Ejusdem *Paradisus terrefris.* Lond. 1629.
fol.
- Penn. Tour.* *A Tour in Scotland, and Voyage to the
Hebrides,* by Thomas Pennant. 2. Chester. 1774,
&c. 4to.
- Pet. herb. brit.* Jacobi Petiveri *Herbarium Britannicum,*
Lond. 1702. fol.
- Pet. conc. gr.* Ejusdem *Concordia Graminum.* Lond.
- Pet. gaz.* Ejusdem *Gazophylaceum.* 2. Lond. 1711.
fol.
- Pet. mus.* Ejusdem *Musæum.* Lond. 1703. 8vo.
- Pluk. alm. et phyt.* Leonardi Pluknetii *Almagestum
Botanicum et Phytographia.* Lond. 4to. diverso
tempore edita.
- Phyt. br.* *Phytologia Britannica.* Lond. 1650.
- Pont. Julii.* Pontideræ *Compendium Tabularum Bo-
tanicarum.* Patavii. 1720. 4to.
- Raii syn.* Joannis Raii *Synopsis Methodica Stirpium
Britannicarum.* ed. I. 1690. II. 1695. III. Lond.
1724. 8vo.
- R. cat. pl. angl.* Ejusdem *Catalogus Plantarum Angliæ.*
Lond. 1688. 12mo.
- R. hist.* Ejusdem *Historia Plantarum.* 3. Lond. 1686.
et 1704. fol.
- R. meth.* Ejusdem *Methodus Plantarum emendata et
aucta.* Lond. 1703. 8vo.
- Renealm spec.* Pauli Renealmi *Specimen Historiæ Plan-
tarum.* Paris. 1611. 4to.
- Riv. irr. mon. ic.* Augusti Quirini Rivini *Ordines
Plantarum Flore Irregulari Monopetalō, Tetra-
petalo et Pentapetalō.* Lipsiæ. 1691, et 1699.
fol.
- Royen. Leyd.* Adriani Van Royen *Floræ Leydensis Pro-
dromus.* Lugdb. 1740. 8vo.
- Rupp. Jen.* Henrici Bernardi Ruppii *Flora Jenensis.*
Jenæ. 1745. ed. Haller. 8vo.
- Schœff. fung.* Jacobi Christiani Schœfferi *Fungorum
qui in Bavaria et Palatinatum circa Ratisbonam
nascuntur Icones.* 4. Ratisb. 1762, &c. 4to.

NOMINA AUCTORUM EXPLICATA.

xxxvii

- Sauv. monsp.* Fran. Sauvages Flora Monspeliensis.
Hagæ. 1751. 8vo.
- Sch. agr.* Joannis Jacobi Scheuchzeri Agrostographia
Tigurii. 1719, et 1775. 4to.
- Sch. it. alp.* Ejusdem Itinera Alpina. 2. Lond. 1708.
4to.
- Schmid. icon.* Cassimir Christopheri Schmidel Icones
Plantarum et Analyses æri incisæ. Norimb. 1748.
fol.
- Schmid. jung.* Ejusdem de Jungermannia. 1761. 4to.
- Schreb. gram.* Joannis Christiani Schreber Descriptio-
nes et Icones Graminum. Lips. 1769. fol.
- Schreb. spic.* D. Joannis Christiani Dan. Schreberi Spi-
cilegium Floræ Lipsicæ. Lips. 1771. 8vo.
- Scop. carn.* Joannis Antonii Scopoli Flora Carneolica. 2.
Vindob. 1772. 8vo.
- Seg. pl. Veron.* J. Franc. Seguier Plantæ Veronenses. 3.
Veronæ. 1745. 8vo.
- Sib. scot.* Roberti Sibbaldi Scotia Illustrata. Edinb.
1684. fol.
- Spig. isag.* Andreæ Spigelii Isagoge in Rem Herbariam.
Lugdb. 1633.
- Sterb. fung.* Francisci Van Sterbeck Theatrum Fun-
gorum. Antw. 1675. 4to.
- Still. misc.* Traet. Benjamin Stillingfleet's Miscellane-
ous Tracts. Lond. 1762. 8vo.
- Tab. ic.* Jacobi Theodori Tabernæmontani Icones
Plantarum. Franc. 1690. 4to.
- Thal. herc.* Joannis Thalii Hercynia Sylvia. Franc.
1588. 4to.
- Tourn. inst.* Josephi Pitton Tournefort Institutiones
Rei Herbariæ. 3. Paris. 1700. 4to.
- Trag. hist.* Hieronymi Tragi Stirpium Historia. Ar-
gentor. 1552. 4to.
- Turn.* Gulielmi Turneri Historia Plantarum. Lond.
1551. fol.
- Vaill. paris.* Sebastiani Vaillant Botanicon Parisiense.
Lugdb. et Amstel. 1727. fol.
- Volk. Norib.* Joannis Georgii Volckameri Flora Nori-
bergensis. Noribergæ. 1700. 4to.

Warn.

NOMINA AUCTORUM EXPLICATA.

Warn. pl. Woodf. Richardi Warner Plantæ Woodfordienses. Lond. 1771. 8vo.


Weis. crypt. D. Friderici Gulielmi Weis Plantæ Cryptogamiæ Flora Gottingensis. Gotting. 1770. 8vo.

Wulff. boruss. Christoph. Wulff Flora Borussica Reigim. 176. 8vo.

Zan. hist. Giacom. Zanoni Historia Botanica. Bologn. 1675, 1742. fol.

E R R A T A.

Page 26, line 30, *pro* ramosis, *lege* ramosus.—45, 24. ericetis.—49, 22. squarrosus.—56, 1. gluma.—58, 11. *adde* ix.—64, 27. *adde* Park.—66. 11. quinquefida—75, 1. crispum—81, 15. glaucophyllum—85, 35. globosa.—93, 33. Dwale.—96, 36. Trachelium.—101, 14. *adde* Anglis, sea Glaux.—103, 4. *Amarella*.—107, 18. CHENOPODIUM.—110, 21. Petala. 23. peltatis.—115, 25. inflexo.—117, 31. LIGUSTICUM—118, 12. cornubiæ.—128, 22. petiolato. 26. partiales.—150, 9, ramosa. —157, 19. iridis.—169, 27. salicis.—172, 17. moschatellina.—178, 7. patulis. 31. et—179, 6. CHRYSOSPLENIUM.—183, 18. saponaria. 24. colledge.—189, 7. striatis.—200, 9. myosotis.—203, 39. surrey.——207, 33. peplos.—207, 20. SPIRÆA.—232, 12 et 24. exstipulati. —253, 6. salicifolius. 17. fugacissima.—235, 14. Swaffham.—236, 24. acuminati—258, 28. BETONICA.—268, 4. odontites.—276, 14. peltatis. —293, 14. colledge.—301, 20. pedunculis.—329, 37. foot.—336, 6. pedunculis.—340, 23. nudo.—344, 14. flores.—367, 35. incanis. —378, 18. stinging.—395, 18 et 24. pedicellatis.—306, 4 et 5. pedicellatus.—456, 20. saxatilis—520, 1. æquæ.—526, 23. farinaceis—593, 19 et 21. bombycina, 22, bombycinus.



MONANDRIA MONOGYNIA.

Classis I.

MONANDRIA

MONOGYNIA.

SALICORNIA. Lin. Gen. pl. 10.

Calyx ventriculosus, integer. *Petala* nulla. *Semen* unicum.

1. SALICORNIA articulis apice crassioribus com-europaea.
pressis emarginato-bifidis.

Salicornia patula, articulis apice compressis emarginato-herbacea-
nato-bifidis. Lin. Spec. pl. 5. Mat. med. 8.
Bast. op. subsec. 105. Fl. dan. 303.

Salicornia geniculata annua. Tourn. 51. R. syn.
136.

Salicornia s. Kali geniculatum. Ger. em. 535.

Kali geniculatum sive Salicornia. Park. 280.

Kali geniculatum annum. B. pin. 289.

β Salicornia erecta, foliis brevibus cupressiformibus.
R. syn. 137.

γ Salicornia caule erecto fruticoso. Lin. spec. pl. 5. fruticosa.
Kali geniculatum perenne fruticosius procumbens.
R. syn. 137.

δ Salicornia myosuroides procumbens, surculis longis-
simis. R. syn. 137.

ε Salicornia ramosior procumbens foliis brevibus pur-
purascens. R. syn. 137.

Anglis, marsh Sampire, Jointed Glasswort or Salt-
wort.

Habitat in littoribus maritimis frequens. Θ. Θ. 4.
VIII. IX.

MONANDRIA MONOGYNIA.

HIPPURIS. *Lin. Gen. pl. II.*

Calyx nullus. *Petala* nulla. *Stigma* simplex. *Semen* unicum.

vulgaris. I. HIPPURIS. *Lin. Fl. lapp. I. suec. 2. dan. 87.*
Sp. pl. 6.

Limnopeuce. *Cord. bist. 150. R. syn. 136.*

Equisetum palustre, brevioribus foliis, polyspermum.

Bauh. pin. 15.

Equisetum palustre alterum, brevioribus foliis. *Park.*
1200.

Cauda equina fœmina. *Ger. em. 1114.*

Anglis, Mare's-tail.

Habitat in fontibus, paludibus, solo profundo limoso.

In stagnis prope Hornsey. *4. V. V.*

Classis

DIANDRIA MONOGYNIA.

Classis II.

D I A N D R I A

MONOGYNIA.

* *Flores inferi, monopetalii, regulares.*

LIGUSTRUM. Lin. Gen. pl. 18.

Corolla quadrifida: Bacca tetrasperma.

i. LIGUSTRUM. Ger. em. 1394. Park. 1446. *vulgare.*
R. syn. 465. Fl. suec. 5. Spec. pl. 10. germani-
cum. B. pin. 475.

Anglis, Privet, or Prim.

Habitat in sylvis et sepibus. h. V.

** *Flores inferi, monopetalii, irregulares. Fructus cap-*
sulares.

VERONICA. 25.

Cor. quadrifida rotata; lacinia infima angustiore.

Capsula bilocularis.

* *Spicatae.*

i. VERONICA spica terminali, foliis oppositis cre-
spicatae.
natis obtusis; caule adscendente simplicissimo.
Sp. pl. 14. Fl. suec. 10. Fl. dan. 52.

Veronica foliis ellipticis serratis, conjugatis, floribus
spicatis. *Hall. helv. 542.*

Veronica spicata minor. *B. pin. 247. R. syn. 279.*

Veronica recta minima. *Ger. em. 627.*

Veronica recta angustifolia. *Park. 550.*

2 Veronica spica terminali, foliis oppositis obtuse serra-
hybrida.
tis scabris, caule erecto. *Sp. pl. 14. Fl. suec. 11.*

Veronica spicata cambroritannica, bugulæ subhir-
suto folio. *R. syn. 278. t. 11.*

DIANDRIA MONOGYNIA.

Anglis, spiked Speedwell. β welsh Speedwell.
Habitat in pratis et pascuis montosis. In several closes adjoining to Newmarket heath, beyond Bottefham.
R. syn. in pascuis circa Horseheath Hall, in comitatu Cantabrigiensi. D. Miller, prope Snowdon in Wallia. β *Ad latera montis cuiusdam, Craig Wreidhin dicti in comitatu Montis Gomerici Walliae, D. Lhwyd invenit.* 24. VI. VIII.

officinalis. 2. VERONICA spicis lateralibus pedunculatis, foliis oppositis, caule procumbente. Sp. pl. 14. Fl. dan. 248.

Veronica mas supina et vulgatissima. B. pin. 246.
R. syn. 281.

Veronica verà et major. Ger. em. 626.

Veronica mas vulgaris supina. Park. 550.

Anglis, male Speedwell.

Habitat in pascuis sterilibus et ericetis. 24. V. VI.
Pharm. Veronicæ Herba.

** *Corymbo-racemosæ.*

fruticolo- 3. VERONICA corymbo terminali, foliis lanceolatis obtusiusculis, caulis fruticosis. Sp. pl. 15. Fl. dan. 34?

Veronica caulis fruticosis declinatis, foliis glabris ellipticis, dentatis, floribus in summitate confertis, petiolatis. Hall. hist. 545. t. 16?

Veronica tertia fruticans. Clus. hist. 347? Park. 551?

Veronica frutescens serpyllifolia. Ger. em. 628?

Veronica alpina frutescens. B. pin. 247? Hist. Ox. II. 318. f. 3. t. 22. f. 5?

Veronica saxatilis. B. hist. III. 284? R. hist. 848?
Anglis, shrubby Speedwell.

Habitat in montibus, in monte Ben Nevis dicto in Scotia. &c. B. V. VI.

Serpyllifo- 4. VERONICA racemo terminali subspicato, foliis ovatis glabris crenatis. Sp. pl. 15. Fl. dan. 492.

Veronica caule recto, foliis ovatis glabris crenatis, petiolis ex aliis unifloris, brevissimis. Hall. hist. 546.

Veronica

DIANDRIA MONOGYNIA.

5

- Veronica pratensis serpyllifolia. *B. pin.* 247.
 Veronica pratensis minor. *Park* 551. *R. syn.* 279.
 Veronica minor. *Ger. em.* 627.
Anglis, smooth Speedwell, or Paul's Betony.
 Habitat in pratis et pascuis. 4. V. VI.

5. VERONICA racemis lateralibus, foliis ovatis pl- becabun-
 nis, caule repente. *Sp. pl.* 16. *Mat. med.* 12. *ga.*
Fl. dan. 511.

Veronica aquatica rotundifolia, Becabunga dicta mi-
 nor. *R. syn.* 280.

Anagallis aquatica minor, folio subrotundo. *B. pin.*
 252.

Anagallis aquatica vulgaris, f. Becabunga. *Park.*
 1236.

Anagallis sive Becabunga. *Ger. em.* 620.

Anglis, common Speedwell, or Brooklime.

Habitat in fossis et rivulis. 4. VI.

Pharm. Becabungæ herba.

6. VERONICA racemis lateralibus, foliis lanceolatis *anagallis.*
 serratis, caule erecto. *Sp. pl.* 16. *Fl. suec.* 13. Δ.

Veronica foliis lanceolatis, serratis, glabris, ex alis
 racemosa. *Hall. hist.* 533.

Veronica aquatica longifolia media. *R. syn.* 280.

Anagallis aquatica minor folio oblongo. *B. pin.* 252.

Anagallis aquatica folio oblongo crenato. *Park.* 1237.

Anagallis aquatica major. *Ger. em.* 620.

Anglis, water Speedwell.

Habitat in fossis et rivulis. 4. VII.

7. VERONICA racemis lateralibus, pedicellis pendu- *scutellata.*
 lis, foliis linearibus integerrimis. *Sp. pl.* 16. *Fl.*
dan. 209.

Veronica foliis linear-lanceolatis; racemis ex alis
 paucifloris. *Hall. hist.* 532.

Veronica aquatica angustifolia minor. *R. syn.* 280.

Veronica aquatica angustifolia scutellata. *B. pin.* 252.

Anglis, marsh Speedwell.

Habitat in palustribus. 4. VI.

B 3

8. VERO-

DIANDRIA MONOGYNIA.

chamædrys. 8. VERONICA racemis lateralibus, foliis ovatis rugosis dentatis sessilibus, caule debili. *Sp. pl.* 17. *Fl. dan.* 448.

Veronica foliis cordaris, subrotundis, hirsutis, nervosis, ex alis racemosa. *Hall. hist.* 536.

Chamædrys sylvestris. *Ger. em.* 657. *R. syn.* 282.

Chamædrys spuria sylvestris. *Park.* 107.

Chamædrys spuria minor rotundifolia. *B. pin.* 249.

Anglis, wild Speedwell or Germanander.

Habitat in pratis et pascuis. 24. V.

montana. 9. VERONICA racemis lateralibus paucifloris, calycibus hirsutis, foliis ovatis rugosis crenatis petiolatis, caule debili. *Sp. pl.* 17. *Jac. aust.* II. 6. t. 109.

Veronica caule procumbente, foliis hirsutis, cordatis, racemis paucifloris. *Hall. hist.* 539.

Veronica chamædryoides, foliis pediculis oblongis insidentibus. *R. syn.* 281.

Chamædrys spuriae affinis rotundifolia scutellata. *Bauh. pin.* 242.

Anglis, mountain Speedwell. *Pet. H. Br.* t. 51. f. 4.

Habitat in sylvis et sepibus opacis. In Charlton Wood, the lower part plentifully. *Mr. J. Sherard.* *R. syn.* 24. V. VI.

*** *Pedunculis unifloris.*

ervensis. 10. VERONICA floribus solitariis, foliis cordatis incisis sessilibus. *Fl. angl.* 6. *dan.* 515.

Veronica floribus solitariis, foliis cordatis incisis, pedunculo longioribus. *Sp. pl.* 18. *Fl. suec.* 19.

Veronica caule erecto, foliis ovatis, subhirsutis, dentatis, petiolis brevissimis. *Hall. hist.* 548.

Veronica flosculis singularibus, cauliculis adhærentibus. *R. syn.* 279.

sine veronicæ foliis, flosculis cauliculis adhærentibus. *Bauh. pin.* 250.

Alsine foliis veronicæ. *Ger. em.* 613.

Alsine foliis subrotundis veronicæ. *Park.* 762.

DIANDRIA MONOGYNIA.

7

Anglis, corn Speedwell, or Chickweed.
Habitat in arvis et muris antiquis. Ⓛ. V.

11. VERONICA floribus solitariis, foliis cordatis incisis, petiolatis. *Fl. angl.* 6. *dan.* 449.

Veronica floribus solitariis, foliis cordatis incisis, pedunculo brevioribus. *Sp. pl.* 18. *Fl. suec.* 20.

Veronica floribus singularibus, in oblongis pediculis chamædryfolia. *R. syn.* 279.

Veronica caule procumbente, foliis petiolatis, ovatis, crenatis. *Hall. hist.* 549.

Al sine foliis Triflaginis. *Ger. em.* 616. *Park.* 764.

Al sine chamædryfolia flosculis pediculis oblongis insidentibus. *Bauh. pin.* 250.

Anglis, Germaner-Speedwell, or Chickweed.

Habitat in arvis, ruderatis, cultis frequens. Ⓛ. V.

12. VERONICA floribus solitariis, foliis cordatis hederiforme planis quinquelobis. *Sp. pl.* 19. *Fl. suec.* 21. *dan.* lia. 428.

Veronica flosculis singularibus, Hederulæ folio, Morsus gallinæ minor dicta. *R. syn.* 280.

Al sine Hederulæ folio. *B. pin.* 250. minor. *Park.* 760.

Al sine hederacea. *Ger. em.* 616.

Anglis, Ivy-leaved Speedwell, or small Henbit.

Habitat in agris, ruderatis, cultis frequens. Ⓛ. IV, V.

13. VERONICA floribus solitariis, foliis digitato-par-trifolios. titis pedunculo brevioribus. *Sp. pl.* 19. *Fl. dan.* 627.

Veronica foliis ovatis, tripartitis et quinquepartitis, floribus longe petiolatis. *Hall. hist.* 551.

Veronica flosculis singularibus, foliis laciniatis, erecta. *R. syn.* 280.

Al sine trifolios cærulea. *Bauh. pin.* 250.

Al sine trifolios s. lacinata. *Park.* 760.

Al sine recta. *Ger. em.* 612.

Anglis, trifid Speedwell.

Habitat in arvis arenosis; at Rowton in Norfolk, betwixt the town and the highway; and at Methwold in Suffolk, between the two windmills and the warren.

DIANDRIA MONOGYNIA.

warren-lodge, &c. T. Willisel. *R. syn. in arvis prope Rossington in comitatu Eboracensi.* D. Tofield. ♂. IV. V.

- verna.* 14. VERONICA floribus solitariis, foliis digitato-partitis pedunculo longioribus. *Sp. pl.* 19.
Veronica foliis ovatis, tripartitis et quinquepartitis, floribus brevissime petiolatis. *Hall. hist.* 552.
Anglis, vernal Speedwell.
Habitat in arvis arenosis, circa Bury in comitatu Suffolk. D. Cullum. ♂. IV.

PINGUICULA. 30.

Cor. ringens, calcarata. Cai. bilabiatus, 5-fidus.
Caps. unilocularis.

- vulgaris.* 1. PINGUICULA nectario cylindraceo longitudine petali. *Fl. lapp.* 11. *suec.* 25. *dan.* 93. *Sp. pl.* 25.
Pinguicula calcare floris longitudine. *Hall. hist.* 292.
Pinguicula Gesneri. *B. hist.* 111. 546. *R. syn.* *281.
Pinguicula f. Sanicula Eboracensis. *Park.* 532. *Ger. em.* 788.
Sanicula montana, flore calcari denato. *B. pin.* 243.
Anglis, common Butterwort, or Yorkshire Sanicle.
Habitat in uliginosis in comitatibus Eboracensi, Westmorlandico, Cumberlandico, &c. ♀. V.

- villoso.* 2. PINGUICULA scapo villoso. *Fl. lapp.* 13. t. 12.
f. 2. Sp. pl. 25.
Pinguicula flore minore carneo. *R. syn.* *281.
Anglis, hairy Butterwort.
Habitat in palustribus in comitatibus Hantoniensi, Dorsetiensi, Devoniensi, et Cornubiensi frequens. Prope Air et in insula Lamlash in Scotia. D. Hope.
♀. VI. VII.
Obs. Folia tenella, marginibus conniventibus; venis purpurascientibus.

UTRICULARIA. 31.

Cal. diphyllus, æqualis. Cor. ringens, calcarata.
Caps. unilocularis.

- vulgaris.* 1. UTRICULARIA nectario conico, scapo paucifloro.
Sp. pl. 26. *Fl. suec.* 28. *dan.* 138.
Lentibularia,

DIANDRIA MONOGYNIA.

9

Lentibularia. *Riv. mon.* 78. *R. syn.* *286.

Millefolium aquaticum flore luteo galericulato. *Baub.*
hist. 111. 783. *Park.* 1258.

Millefolium palustre galericulatum. *Ger. em.* 828.

Anglis, common Hooded-Milfoil.

Habitat in aquis stagnantibus, paludibus et fossis, in eri-
ceto Hounsloweano versus Hampton. 24. VI. VII.

2. UTRICULARIA nectario carinato. *Sp. pl.* 26. *minor.*

Fl. dan. 128.

Utricularia calcare brevissimo. *Hall. hist.* 291.

Lentibularia minor. *R. syn.* 286. *Pet. H. Br. t.* 36.
f. 12.

Millefolium palustre galericulatum minus, flore mi-
nore. *Pluk. ph. t.* 99. *f. 6.*

Anglis, lesser Hooded-Milfoil.

Habitat in fossis et paludibus limosis: found by Mr.
Dent, Faversham-moor, Cambridgeshire; in the
river on Hounslow-Heath, Mr. Dandridge, R. S.
in paludibus turfosis in Westmorlandia, Cumberlan-
dia, et prope Glastenbury in agro Somersetensi
copiose. 24. VI. VII.

*** Flores inferi, monopetali, irregulares. *Fructus gym-
nospermi.*

L Y C O P U S. 33.

Cor. quadrifida: lacinia unica emarginata. *Stam.*
distantia. *Sem.* quatuor retusa.

1. LYCOPUS foliis sinuato-serratis. *Sp. pl.* 30. *Fl. europæus.* *dan.* 220.

Lycopus foliis acute serratis et appendiculatis. *Hall.*
hist. 220.

Lycopus palustris glaber. *Tourn.* 291. *R. syn.* 236.
Marrubium palustre glabrum. *Baub.* *pin.* 230.

Marrubium aquaticum. *Ger. em.* 700. *vulgare.* *Park.*
1230.

Anglis, european Lycopus, or Water Horehound.

Habitat ad ripas fluviorum et lacuum solo sabuloso. 24.
VII. VIII.

SALVIA.

DIANDRIA MONOGYNIA.

S A L V I A . 39.

Cor. inæqualis. Filamenta transverse pedicello affixa.

pratensis. 1. SALVIA foliis cordato-oblongis crenatis: summis
amplexicaulibus, verticillis subnudis, corollis galea
glutinosis. Sp. pl. 35. Fl. suec. 32.

Sclarea pratensis foliis ferratis, flore cæruleo. Tourn.
179. R. syn. 237.

Horminum pratense, foliis ferratis. Bauh. pin. 238.

Horminum sylvestre vulgare. Park. 55.

Horminum sylvestre Fuchsii. Ger. em. 769.

Anglis, meadow Sage, or Clary.

Habitat in septo Cobhamiano in Essexia; à D. Watson
observatus. 4. VI. VII,

verbena- 2. SALVIA foliis ferratis læviusculis, corollis calyce
ca. angustioribus. Sp. pl. 35. Dalib. paris. 9.

Horminum sylvestre. Ger. em. 771.

Anglis, wild Sage or Clary.

Habitat in pascuis et pratis frequens. 4. V. VI.

Pharm. Hormini semina.

**** Flores superi.

CIRCÆA . 24.

*Cal. diphyllus, superus. Cor. dipetala. Sem. 1. bi-
loculare.*

lutetiana. 1. CIRCÆA caule erecto, racemis pluribus, foliis ova-
tis. Syst. nat. 56. Sp. pl. 12. Fl. dan. 210.

Circæa lutetiana. Lob. ic. 266. Ger. em. 351. R. syn.
289. major. Park. 351.

Solanifolia Circæa dicta major. B. pin. 168.

Anglis, common Enchancers-Nightshade.

Habitat in locis umbrosis humidis et ad sepes. 4. VI.
VII.

alpina. 2. CIRCÆA caule prostrato, racemo subunico, foliis
cordatis. Syst. nat. 56. Sp. pl. 12. Fl. suec. 7.
Fl. dan. 256.

Circæa foliis cordatis, acute dentatis. Hall. hist. 814.
Circæa

DIANDRIA MONOGYNIA.

II.

Circæa lutetiana minor. Park. 351.

Circæa minima. Column. Ecphr. 2. p. 79. t. 80.

Solanifolia Circæa alpina. B. pin. 168.

Anglis, mountain Enchanters-Nightshade.

Habitat ad radices montium in comitatibus Westmorlandico, Eboracensi, &c. circa Dallam Tower in agro Westmorlandico. In Hamilton-wood in Scotland.

D. Hope. 24. VI. VII.

D I G Y N I A.

ANTHOXANTHUM. 42.

Cal. Gluma bivalvis, uniflora. *Cor.* Gluma bivalvis, acuminata. *Sem.* unicum.

I. ANTHOXANTHUM spica oblonga, flosculis sub-odoratum. pedunculatis arista longioribus. Sp. pl. 40. Still. misc. t. 1. Schreb. gram. 49. t. 5.

Gramen vernum spica brevi laxa. R. syn. 398.

Gramen pratense spica flavescente. B. pin. 3. Th. 44. Sch. agr. 88.

Gramen Anthoxanthon spicatum. B. hist. II. 466.

Gramen alopecurum vernum, spica flavescente. Hist. Ox. III. p. 193. f. 8. t. 7. f. 25.

Anglis, Vernal, or Spring Grafs.

Habitat in pratis et pasquis. 24. V.

Classis

TRIANDRIA MONOGYNIA.

Classis III.

T R I A N D R I A
M O N O G Y N I A.* *Flores superi.*

VALERIANA. 44.

Cal. nullus. *Cör.* monopetalia, basi hinc gibba, supera.
Sem. unicum.

* *rubra.* 1. VALERIANA floribus monandris caudatis, foliis lanceolatis integerrimis. *Sp. pl.* 44.

Valeriana foliis glaberrimis, floribus calcaratis. *Hall. hist.* 213.

Valeriana rubra. *Dod. purg.* 91. *B. pin.* 165. *Ger. em.* 678. *Park.* 122.

Anglis, red Valerian.

Habitat in muris antiquis et ruderatis, in Devonia et Cornubia frequens. 24. V.—VIII.

officinalis. 2. VALERIANA floribus triandris, foliis omnibus pinnatis. *Sp. pl.* 45. *Fl. suec.* 34. *dan.* 57.

Valeriana sylvestris major. *Ger. em.* 1275. *Park.* 122. *B. pin.* 164. *R. syn.* 200.

3 Valeriana sylvestris major montana. *B. pin.* 164.

Anglis, wild Valerian.

Habitat in sepibus et nemoribus paludosis frequens. 24. VI. *Pharm.* Valerianæ Radix.

dioica. 3. VALERIANA floribus triandris dioicis, foliis radicalibus ovatis, caulinis pinnatis. *Fl. angl.* 12.

Valeriana floribus triandris dioicis, foliis pinnatis integerrimis. *Sp. pl.* 44. *Fl. suec.* 35.

Valeriana foliis radicalibus petiolatis ovatis; caulinis pinnatis, sexu distincta. *Hall. hist.* 208.

Valeriana palustris minor. *B. pin.* 164.

Valeriana

TRIANDRIA MONOGYNIA.

13

Valeriana sylvestris minor. Park. 122. R. syn. 200.

Valeriana minor. Ger. em. 1075. Riv. mon. 3.

ꝝ *Valeriana sylvestris f. palustris minor altera.* R. syn. 200.

Anglis, marsh Valerian.

Habitat in *pascuis humidis.* 4. VI.

4. VALERIANA floribus triandris, caule dichotomo, *locusta.* foliis linearibus. Sp. pl. 47. Fl. suec. 36.

Valerianella foliis oblongis, rariter incisis, corona seminis simplici, acuminata. Hall. hist. 214.

Valerianella arvensis præcox humilis semine compressa. Mor. Umb. R. syn. 201.

Valeriana campestris inodora major. B. pin. 165.

Lactuca agnina. Ger. em. 310. Park. 812.

ꝝ *Valerianella vulgaris species major ferotina.* Mor. prælud. 319.

ꝝ *Lactuca agnina f. valerianella foliis ferratis.* R. syn. 201.

Anglis, corn Valerian or Sallet, Lambs-Lettuce.

Habitat in *arvis et agris.* O. IV—VIII.

CROCUS. 55.

Cor. sexpartita, æqualis. Stigmata convoluta.

1. CROCUS spatha univalvi radicale, corollæ tubo *officinalis.* longissimo. Sp. pl. 50.

Crocus autumnalis foliis angustioribus margine revolutis. Syst. natur. 75.

Crocus. Ger. em. 151. Sativus. B. pin. 65.

ꝝ *Crocus vernalis foliis latioribus margine patulo.* Syst. sylvestris. nat. 75.

Crocus tuba brevissima trifida. Hall. hist. 1257.

Crocus vernus. Ger. em. 153. latifolius purpureus variegatus. B. pin. 65.

Anglis, Saffron. ꝝ Crocus.

Habitat in *agro Cantabrigiensi et Essexiensi;* Saffronwalden oppidum editur. R. syn. in *pratis et pascuis passim.* 4. VIII.

Pharmac. Croci stigma.

IRIS.

TRIANDRIA MONOGYNIA.

I R I S. 59.

Cor. 6-partita. Petalis alternis reflexis. Stigmata petaliformia.

pseud-
acorus. 1. IRIS corollis imberibus; petalis interioribus stig-
mate minoribus, foliis ensiformibus. Sp. pl. 56. Fl.
dan. 494.

Iris palustris lutea. Ger. em. 50. R. syn. 374.
Acorus adulterinus. B. pin. 74.
Acorus palustris, sive Pseudo-iris et Iris lutea palu-
stris. Park. 1219.
β Iris palustris pallida. R. syn. 375.
Anglis, yellow Iris or Flower-de-luce.
Habitat in uidis, fluviis, paludosis frequens. 4. VII.
Pharm. Acori palustris Radix.

fœtidissi-
ma. 2. IRIS corollis imberibus: petalis interioribus pa-
tentissimis, caule unangulato, foliis ensiformibus.
Sp. pl. 57.

Gladiolus fœtidus. B. pin. 30. R. syn. 375.
Xyris. Gen. em. 60. L. spatula fœtida. Park. 256.
Anglis, stinking Iris or Gladwyn.
Habitat in sylvis et ad sepes, prope Hornsey, in sylvula
prope Charlton, in Cantio. 4. VI. VII.
Pharm. Iris fœtidæ Radix.

** Flores Graminei valvulis Glumæ calycinæ.

S C H O E N U S. 65.

Glumæ paliaceæ, univalves, congestæ. Cor. o. Sem.
unicum subrotundum inter glumas.

* Culmo tereti.

mariscus. 1. SCHOENUS culmo tereti, foliis margine dorsoque
aculeatis. Fl. suec. 38. Sp. pl. 62.
Cyperus longus inodorus sylvestris. Ger. em. 29.
Park. 1263. R. syn. 426.
Cyperus longus inodorus germanicus. B. pin. 14.
Cyperus longus inodorus major, foliis et carina ser-
ratis. Hist. Ox. III. 237. t. 11. f. 24.
Pseudo-Cyperus palustris, foliis et carina serratis.
Seb. agr. 375.

Anglis,

TRIANDRIA MONOGYNIA.

15

Anglis, prickly Bog-rush or bastard Cyperus.

Habitat in paludibus; on Hinton-Moor, near Cambridge; near Tamworth, Warwickshire; near Pensans, Cornwall. R. syn. 4. VII. VIII.

2. SCHOENUS culmo tereti nudo capitulo ovato, *nigricans*.
involucri diphylli valvula altera subulata longa.

Sp. pl. 64. Fl. suec. 39.

Cyperus spicis conglomeratis, calyce multifolio. Hall.
Hist. 1347.

Juncus lœvis minor, panicula glomerata nigricante.

R. cat. 174. syn. 430. Hist. Ox. III. 243. t. 10.
f. 28.

Junco affinis capitulo glomerato nigricante. Sch. agr.
349.

Anglis, black Bog-rush.

Habitat in paludibus cæspitosis et turfosis. 4. VI—
VIII.

3. SCHOENUS culmo tereti nudo, spica dupli, in-
volucri vulvula majore spicam æquante. Sp. pl. 64. *ferrugi-*
neus.

Anglis, ferrugineus Bog-rush.

Habitat in paludibus turfosis, in Westmorlandia, in
the island of Skye. D. Hope. 4. VII.

** *Culmo triquetro*.

4. SCHOENUS culmo subtriquetro folioso, spica di-
stica, spiculis multifloris, involucro monophyllo. *compre-*
fus.

Schoenus culmo subtriquetro nudo, spica disticha, in-
volucro monophyllo. Sp. pl. 65.

Gramen cyperoides spica simplici compressa disticha.

Pluk. ph. t. 34. f. 9. Sch. Agrest. 490. Hist. Ox.
III. 245. R. syn. 425.

Anglis, compressed Bog-rush.

Habitat in paludibus cæspitosis in comitatibus Eboracensi,
et Westmorlandico frequens; about Chislehurst in
Kent. R. syn. 4. VI. VII.

5. SCHOENUS culmo subtriquetro folioso, spica sub-
rufus.
ovata, spiculis unifloris, involucro monophyllo.

Anglis, brown Bog-rush.

Habitat

TRIANDRIA MONOGYNIA.

Habitat in paludibus, in insula Skye et prope Glasow
in Scotia. 4. VII.

Desc. Radix perennis, ramosa, horizontalis, repens.
Culmo plures, semipedales, erecti, subtriquetri, basi
foliati, simplices. Folia radicalia linearia, acuta, nu-
da, parum canaliculata, longitudine fere culmi; caulinæ
duo, petiolata, linearia, acuta, culmo dimidio breviora.
Petiolus vaginans, cylindricus, striatus, glaber. Spica
terminalis, subovata, spiculæ quinque aut sex, sessiles,
alternæ, imbricatae, rufæ. Involucrum monophyllum,
acutum, subpersistens, longitudine spicæ. Cal. Gluma
uniflora, bivalvis: valvulis erectis, oblongis, concavis,
persistentibus. Cor. Petala sex, lanceolata, acuta,
membranacea calyce dimidio breviora. Stam. Fila-
menta tria, capillaria corolla breviora. Antheræ ob-
longæ, erectæ, flavæ. Pist. Germen ovatum, triquetrum.
Stylus brevissimus. Stigmata tria, capilla-
ria. Sem. unicum, triquetrum, acuminatum. affinis
præcedenti.

- albus.* 6. SCHOENUS culmo subtriquetro folioso, floribus
fasciculatis, foliis setaceis. Sp. pl. 65. Fl. dan.
320.
Scirpus foliis setaceis, panicula plana, locustis tereti-
bus. Hall. hist. 1341.
- Cyperus minor palustris hirsutus, paniculis albis pa-
laceis. Hist. Ox. III. 239. t. 9. f. 39. R. syn. 427.
Gramen cyperoides palustre, leucanthemum. Park.
1295. Sch. agr. 503.
Gramen junceum leucanthemum. Ger. em. 30.
- fuscus.* β Schoenus culmo tereti folioso, spiculis fasciculatis,
foliis filiformibus canaliculatis. Sp. pl. 1664.
Cyperella palustris, capitulis umbellatis, primum
albis deinde fulvis. Mich. gen. 53.
Cyperus minor angustifolius palustris, capitulis fuscis,
paliaceis. Hist. Ox. III. 239. t. 11. f. 40. R.
syn. 427.
Anglis, white-headed Bog-rush.
Habitat in paluatribus on Bagshot Heath, Mr. Doody;
between Wickham and Croydon, Mr. Petiver.
R. syn. in comitatibus Cornubienſi, Hantonienſi,
Eboracensi

Eboracensi, Westmorlandico, &c. copiose. 4 VII.
IX.

Obs. α . β . Folia subsetacea parum canaliculata; Flores primum albi postea fusi.

C Y P E R U S. 66.

Glumæ paliaciæ, distiche imbricatæ. Cor. o. Sem. unicum nudum.

1. CYPERUS culmo triquetro folioso, umbella foli-longus.
osa supradecomposita; pedunculis nudis, spicis
alternis. Sp. pl. 67. Mat. Med. 29.

Cyperus longus. Ger. Em. 30. odoratus. Park. 145.
R. Syn. 425.

Cyperus odoratus radice longa. s. Cyperus Off. B.
pin. 14. Sch. Agr. 378.

Anglis, sweet Cyperus or English Galingale.

Habitat in paludibus. Found by Mr. Newton in the
Isle of Purbeck, Dorsetshire, near a chapel on the
side that looks towards Portland Island. R. Syn. on
St. Faith's Newton Bogs, near Norwich. Mr.
Humphrys. 4. VII.

S C I R P U S 67.

Glumæ paliaceæ, undique imbricatæ. Cor. o. Sem.
unicum imberbe.

* *Spica unica.*

1. SCIRPUS culmo tereti nudo, spica subovali terminali. Sp. pl. 70. Fl. Carn. 56. dan. 273.

Scirpus equiseti capitulo, major. Tourn. 528. R.
Syn. 429. Sch. agr. 360.

Juncus equiseti capitulis, major. Baub. pin. 12.

Juncus aquaticus, capitulis equiseti. Park. 1196.

Juncus minor, capitulis equiseti. Ger. Em. 35.

Anglis, marsh Club-rush.

Habitat in fossis, paludibus, fluviis, frequens. 4. VII.

2. SCIRPUS culmo striato nudo, spica bivalvi terminali longitudine calycis, radicibus squamula insus.

C terstinctis.

TRIANDRIA MONOGYNIA.

terstinctis. *Fl. Suec.* 43. *Sp. pl.* 71. *Fl. Dan.* t. 167.

Scirpus caule tereti aphylo, spica pauciflora acuminate, calycinæ glumæ longitudine. *Hall. Hist.* 1334.

Scirpus montanus capitulo breviori. *Tourn.* 528. *Sch. agr.* 363. t. 7. f. 18. *R. Syn.* 429.

Juncus parvus palustris, cum parvis capitulis equiseti. *Pluk. ph.* t. 40. f. 6.

Anglis, dwarf club-rush.

Habitat in paludibus cespitosis et ericetis uidis. 4. VII.

acicula-
ris.

3. SCIRPUS culmo quadrangulo nudo, spica ovata terminali.

Scirpus culmo tereti nudo setiformi, spica ovata bivalvi terminali, seminibus nudis. *Sp. pl.* 71. *Fl. dan.* 287.

Scirpus minimus capitulis equiseti. *Cat. Giss.* 165. *R. Syn.* 429.

Juncellus omnium minimus, capitulis equiseti. *Hist.* *Ox.* III. 145. t. 10. f. 37. *Pluk. ph.* t. 40. f. 7.

Anglis least club-rush.

Habitat in palustribus; in ericeto Hounflejano versus Hampton, invenit D. Doody. *R. Syn.* 4. VIII.

fluitans.

4. SCIRPUS culmis teretibus nudis alternis, caule folioso flaccido. *Sp. pl.* 71.

Scirpus foliis linearibus planis alternatim fasciculatis, spica terminali. *Guett. Stampf.* 141.

Scirpus equiseti capitulo minor. *Sch. agr.* 365. t. 7. f. 20. *R. Syn.* 431.

Juncellus, capitulis equiseti, minor fluitans. *B. pin.* 12.

Gramen junceum clavatum minimum. *R. Hist.* 1310. *Hist. Ox.* III. 230. t. 10. f. 31. *Pluk. ph.* t. 35. f. 1.

Anglis, floating Club-rush.

Habitat in fossis et paludibus, in stagnis prope Wands- worth, *ericeto Putnejano et Hounflejano.* 4. VII. VIII.

TRIANDRIA MONOGYNIA.

210

** *Culmo tereti polystachio.*

5. SCIRPUS culmo tereti nudo, spicis ovatis pluri-*lacustris*.
bus pedunculatis terminalibus. *Fl. suec.* 46. *Sp.*
pl. 72.

Scirpus caule tereti, panicula laterali ramosa, locuf-
tis ovatis. *Hall. hist.* 1337.

Scirpus palustris altissimus. *Tourn.* 528. *R. Syn.*
428. Sch. agr. 154.

Juncus maximus f. *Scirpus major.* *B. pin.* 12. *th.* 178.

Juncus lœvis maximus. *Park.* 1191.

Juncus aquaticus maximus. *Ger. Em.* 35.

β *Juncus* f. *Scirpus medius.* *B. pin.* 12. *R. Syn.* 428.

γ *Juncus aquaticus major, caule carinato.* *Dodd.* *R.*
Syn.

Anglis, tall club-rush or Bull-rush.

Habitat *in stagnis, flaviis et lacubus.* *L.* VII. VIII.

Obs. *In a. Involucrum submembranaceum panicula bre-*
vius, Spicæ oblongi sculæ; *in β. Involucrum pani-*
culæ subæquale, Spicæ ovatæ; *in γ. unum latus cul-*
mi subplaniusculum.

6. SCIRPUS culmo tereti nudo, spicis subglobosis *Holo-*
glomeratis pedunculatis, involucro diphylo inæ-*chœnus*.
quali mucronato. *Sp. pl. 72. Fl. dan.* 454.

Scirpus maritimus, capitulis rotundioribus glomera-
tis. *Tourn.* 528. *R. Syn.* 429. *Sch. agr.* 371.

Juncus acutus maritimus, capitulis rotundis. *B.*
pin. II.

Juncus acutus maritimus alter. *Park.* 1196.

Anglis, round-headed Club-rush.

Habitat *in litoribus maritimis.* Found by Mr.
Stephens in Brounton Boroughs in Devonshire;
in Somersetshire and Hampshire. *Pet. conc. Gr.*
R. Syn. 429. VII. VIII.

7. SCIRPUS culmo tereti nudo, capitulo lateralí *romanus*.
conglobato, bractea reflexa. *Sp. pl. 72. Fl.*
Gallopr. 116?

TRIANDRIA MONOGYNIA.

Scirpus capitulo singulari radice tomentosa. Barr.
 rar. 1249. t. 255. f. 3.

Scirpoides acutum maritimum, capitulo solitario. Sch.
 agr. 373. Mich. gen. 52.

Anglis, single-headed Club-rush.

Habitat in palustribus juxta Throgmorton in agro Worcesterensi. Rev. D. Sheffield. 4. VII.

- setaceus.* 8. *SCIRPUS culmo nudo setaceo, spicis lateralibus subgeminis sessilibus.* Sp. pl. 73. Fl. suec. 45.
Scirpus omnium minimus, capitulo breviore. Sch.
 agr. 358.
Scirpus foliaceus humilis. C. Giss. 158. R. Syn.
 430.
Juncellus omnium minimus. Chamæschænus. Lob.
 adv. 44. Hist. Ox. III. 232. t. 10. f. 23.
Gramen junceum minimum capitulo squamoso. B.
 pin. 6. pr. 13.
Gramen junceum maritimum exile Plimmostii.
 Park. 1270. ic. 1271. descr.
Anglis, least Club-rush or Bull-rush.
Habitat in arenosis humidioribus. O. VII. VIII.
Obs. variat numero spicularum, ab uno ad quatuor.

*** *Culmo triquetro, Panicula nuda.*

- mucronata.* 9. *SCIRPUS culmo triquetro nudo acuminato, spicis conglomeratis lateralibus.* Sp. pl. 73.
Scirpus caule triquetro, panicula laterali ramosa, loculis ovatis. Hall. hist. 1338.
Juncus acutus maritimus, caule triangulo. B.
 pin. 11. Th. 175. Park. 1194. Hist. Ox. III.
 232. t. 10. f. 20.
Juncus acutus maritimus, caule triquetro, rigido,
mucrone pungente. Pluk. ph. t. 40. f. 1. R. Syn.
 429.

- triqueter.* β *Scirpus culmo triquetro nudo, spicis subsessilibus pedunculatisque mucronem æquantibus.* Syst. 83.
Juncus acutus maritimus, caule triquetro maximo molli, procerior nostras. Pluk. ph. t. 40. f. 2.
Anglis, pointed Clubrush, or Bull-rush.

Habitat

TRIANDRIA MONOGYNIA.

21

Habitat in litoribus maritimis; ad ripam Thamesis
fluvii tam infra quam supra Londinum. 4. VIII.

**** Culmo triquetro, Panicula foliacea.

10. SCIRPUS culmo triquetro, panicula congregata mariti-
foliacea, spicularum squamis trifidis: intermedia mus.
subulata. Sp. pl. 51.

Gramen cyperoides panicula sparsa, majus. B.
pin. 6.

Gramen cyperoides palustre, panicula sparsa, ma-
jus. Park. 1266. R. syn. 425.

β Cyperus rotundus inodorus anglicus. B. pin. 14.
Anglis, round rooted Club-rush, or Bastard Cype-
rus.

Habitat ad ripas fluviorum et in litoribus maritimis.
4. VIII.

Obs. variat paniculâ simplici et ramosa.

11. SCIRPUS culmo triquetro folioso, umbella folia- *sylvaticus*.
cea pedunculis nudis superadecompositis, spicis
confertis. Sp. pl. 51. Fl. suec. 48. dan. 307.

Scirpus planifolius, panicula ramosissima, loculis
ovatis. Hall. hist. 1340.

Gramen cyperoides miliaceum. B. pin. 6. Th. 90.

Pseudo-cyperus miliaceus. Park. 1171.

Cyperus gramineus. B. hist. II. 504. R. syn. 426.
miliaceus Ger. em. 30.

Anglis, wood Club-rush, or Millet Cyperus Grass.

Habitat in aquosis et in sylvis humidis; prope Hamp-
stead; by the Thame side, near Tamworth, War-
wickshire; near Haverford-West, Pembrokeshire;
near Bocking, Essex. Mr. Dale. R. syn. 4.
VII.

ERIOPHORUM. 68.

Glumæ paleaceæ, undique imbricatæ. Cor. O.
Sem. I. lana longissima cinctum.

I. ERIOPHORUM culmis teretibus, foliis planis, polysta-
spicis pedunculatis. Sp. pl. 76. Dalib. paris. 18. chion.
Eriophorum foliis planis, spicis pendulis, Hall.
hist. 1331.

TRIANDRIA MONOGYNIA.

Gramen prætense tomentosum, panicula sparsa. B.
pin. 4.

Gramen junceum lanatum, vel juncus bombycineus
vulgaris. Park. 1271.

Gramen tomentarium. Ger. em. 29.

Linagrostis. Tab. hist. 599 R. syn. 435. Pani-
cula ampliori. Vaill. paris. t. 16. f. 1. Sch.
agr. 306.

Anglis, common Cotton-Grass.

Habitat in pratis uidis, paludibus, cespitosis. 4. VI.
VII.

vagina-
tum. 2. ERIOPHORUM culmis vaginatis teretibus, spica
scariosa. Sp. pl. 76. Dalib. paris. 18.

Juncus capitulo lanuginoso. s. Schoenolaguros. B.
pin. 12. Sch. agr. 302. pr. t. 7.

Juncus alpinus cum cauda leporina. B. hist. II. 514.

Gramen juncoides lanatum alterum danicum. Park.
1271.

Anglis, mountain Cotton-grass, or Hairs-tail-rush.

Habitat in paludibus turfosis alpinis, in comitatibus
Westmorlandico, Cumberlandico, &c. frequens;
on the great bog beyond Joan Cole's, towards Croy-
don. Mr. Sherard. R. syn. 4. II.—IV.

NARDUS. 69.

Calyx nullus. Cor. bivalvis.

striata. 1. NARDUS spica setacea recta secunda. Sp. pl. 77.
Holl. hist. 1410. Schreb. græm. 65. t. 7.

Gramen sparteum juncifolium. B. pin. 5. R. syn.
393. Sch. agr. 90.

Spartum parvum Batavicum et Anglicum. Park.
1199.

Spartum nostras parvum Löbelio. Ger. em. 43.

Anglis, Mat-grass.

Habitat in ericetis humidiusculis, frequens. 4. VI.—
VIII.

DIGYNIA.

D I G Y N I A.

PHALARIS. 74.

Cal. bivalvis, carinatus, longitudine æqualis, corollam includens.

*1. PHALARIS panicula ovata spiciformi, glumis *canariensis*.
ventricosis pilosis, carina glabra. *Sp. pl.* 79.

Phalaris panicula subovata spiciformis : glumis carinatis. *Sp. pl.* 79.

Phalaris *Ger.* em. 86. major semine albo. *Bauh.*
pin. 28. *Hist. Ox.* III. 186. t. 3. f. 1. *Sch. agr.*
52.

Anglis, manured Canary-grass.

Habitat in ruderatis et ad vias. ☽. VI.—IX.

2. PHALARIS panicula oblongo-lanceolata spiciformi, *arenaria*.
lanceolatis, carina ciliata.

Phleum spica ovata ciliata, culmo ramoso. *Sp. pl.*
88.

Gramen typhinum maritimum minus. *R. syn.* 398.
Pluk. ph. t. 33. f. 8. *Sch. agr.* 63.

Gramen typhinum Danicum minus. *Park.* 1170.

Anglis, sea Canary-grass.

Habitat in arenosis maritimis. ☽. VII. VIII.

3. PHALARIS panicula oblonga glomerata, glumis *arundinacea*.
ovatis, carina scabra. *Fl. dan.* 259.

Phalaris panicula oblonga ventricosa. *Sp. pl.* 80.

Arundo locustis unifloris, fasciculatis, imbricatis ;
glumis floralibus nitentibus, subhirsutis. *Hall.*
hist. 1524.

Gramen arundinaceum acerosa gluma nostras. *Park.*
1273. *Hist. Ox.* III. 233. t. 6. f. 14. *R. J.* 400.

Gramen miliaceum aquaticum, phalaridis semine.
Sch. 126.

Gramen aquaticum paniculatum latifolium. *B.*
pin. 6.

Gramen arundinaceum acerosa gluma, Jersejanum
D. Sherard. *R. syn.* 400.

TRIANDRIA DIGYNIA.

Anglis, reed Canary-grass.

Habitat ad ripas fluviorum et in paludibus. 24. VII.

PANICUM. 76.

Cal. trivalvis; valvula tertia minima.

viride. 1. PANICUM spica tereti, involucellis bifloris fasciculato-pilosis, seminibus nervosis. Sp. pl. 83.

Panicum spica unica, flosculis sessilibus solitariis, setis numerosis. Hall. hist. 1542.

Gramen paniceum spica simplici lævi. R. syn. 394.

Gramen panici effigie spica simplici. Ger. em. 17.

Gramen paniceum spica simplici. B. pin. 8. Park. 1154. Sch. agr. 46.

Anglis, green Panick-grass.

Habitat in arvis arenosis; prope Battersea copiose, et circa Martha's Chapel duobus millearibus, à Guildford distans. ①. VII.

verticilla- 2. PANICUM spica verticillata, racemulis quaternis, tum. involucellis unifloris bisetis, setis scabris, culmis diffusis. Sp. pl. 82.

Panicum spica unica paniculata, setis paucioribus. Hall. hist. 1543.

Gramen paniceum spica aspera. B. pin. 8. Th. 139. Sch. agr. 97. R. syn. 394.

Anglis, rough Panick-grass.

Habitat in arvis, inter Putney et Roughampton. R. syn. ①. VI. VII.

erugalli. 3. PANICUM spicis alternis conjugatisque, spiculis subdivisis, glumis aristatis hispidis, rachi quinangulari. Sp. pl. 83.

Gramen paniceum spica divisa. B. pin. 8. R. syn. 394.

Panicum vulgare. Ger. em. 85.

Panicum sylvestre Herbariorum. Park. 1154.

Anglis, loose Panick-grass.

Habitat in arvis, prope Battersea; et circa Martha's Chapel, prope Guildford. ①. VII.

4. PANICUM spicis digitatis basi interiore nodosis, sanguinoflosculis geminis muticis, vaginis foliorum pun-
le. Etatis. Sp. pl. 84. Schreb. gram. 119. t. 16.
Digitaria foliis subhirsutis, caule debili, spicis ver-
ticillatis, scapo ancipiti. Hall. hist. 1526.
Gramen daëtylon latiore folio. B. pin. 8. Sch. agr.
101. R. syn. 399.
Ischæmon sylvestre latiore folio. Park. 1178.
Ischæmon vulgare. Ger. em. 27.
Anglis, Cock's-foot Panick-grass.
Habitat in arvis; about Eilden, Suffolk; at Witching-
ham near Norwich, R. S. prope Battersea; et prope
Martha's Chapel, juxta Guildford. O. VII. VIII.
5. PANICUM spicis digitatis patentibus; basi inte- daëtylon.
riore villosis, floribus solitariis, farmentis repenti-
bus. Sp. pl. 85.
Digitaria stolonibus teretibus, foliis patulis glabris,
spicis digitatis. Hall. hist. 1527.
Gramen daëtylon, folio arundinaceo, majus aculea-
tum. B. pin. 7.
Gramen daëtyloides radice repente. Ger. em. 28.
Gramen canarium ischæmi paniculis. Park. 1179.
Gramen repens cum panicula graminis Mannæ. B.
hist. II. 459. R. syn. 399.
Anglis, creeping Panick-grass.
Habitat in arenosis, inter Penzance et Marketjeu in
Cornubia D. Newton. R. syn. 4. VII.

PHLEUM. 77.

Cal. bivalvis, sessilis, linearis, truncatus, apice bicus-
pidato. *Cor.* inclusa.

1. PHLEUM spica cylindrica longissima, glumarum pratense.
carina ciliata.
- a. Phleum spica cylindrica longissima ciliata, culmo
erecto. Sp. pl. 87. Schreb. gr. 102. t. 14.
Gramen typhoides maximum, spica longissima. B.
pin. 4. Th. 49. Hist. Ox. III. 188. t. 4. f. 1.
Sch. agr. 65.
- Gramen typhinum majus seu primum. Ger. em. 11.
R. syn. 398.

Gramen

TRIANDRIA DIGYNIA.

Gramen typhinum medium s. vulgatissimum, Park.
1170.

B Gramen typhinum minus. Ger. em. II. Park.
1170.

nodosum. **γ** Phleum spica cylindrica, culmo adscendente, foliis
obliquis, radice bulbosa. Syst. nat. 88. Sp. pl.
88.

Gramen nodosum spica parva. B. pin. 2. pr. 3.
Anglis, a Meadow Cat's-tail-grass. γ. Bulbose Cat's-
tail-grass.

Habitat in pratis et pascuis, et γ in pascuis sterilibus,
et ad vias. L. VII. VIII.

Obs. α. et β. Radix subbulbosa, Culmus erectus; glu-
mæ carinatæ, rectæ, carinis ciliatis. γ Radix bul-
bosa, Culmus adscendens. Glumæ carinatæ, carinis
glumarum ciliatis; at in horto culta, Radix fibrosa et
Culmus erectus evadit.

panicula- 2. **P**HLEUM panicula cylindrica spiciformi, glumis
nudis, culmo subramoso. Fl. Angl. 23.

Phleum culmo recto, spicis cylindricis, glabris, ca-
lycibus brevissime mucronatis. Hall. hist. 1536.

Phalaris panicula cylindrica spiciformi. Sp. pl. 80.
Gramen typhoides asperum primum. B. pin. 4.

Tb. 51.

Anglis, bulbose Cat's-tail-grass.

Habitat in pratis, infra King's Weston prope Brif-
tolium; on Newmarket-heath. D. C. Miller.
L. VII.

Desc. Radix fibrosa, Culmus pedalis, subobliquus,
teres, glaber, geniculatus, ramosis. Folia plurima,
alterna, erecta, petiolata, ensiformia, acuta, nervosa,
scabra. Petiolus cylindricus, longissimus, vaginans,
scaber. Stipula solitaria, intrafoliacea, vaginans,
obtusa, membranacea. Panicula cylindrica, longissi-
ma, spiciformis, ad alterutrum flexa in lobos divisi-
bilis. Gluma sessilis, imbricata, bivalvis uniflora,
acuminata, superne ventricosa, nuda. Corolla bi-
valvis mutica, glumis brevior.

ALOPECURUS. 78.

Calix bivalvis. Corolla univalvis.

- 1.** ALOPECURUS culmo erecto, panicula cylindrica *pratensis*, spiciformi, glumis villosis.

Alopecurus culmo spicato erecto, glumis villosis.

Sp. pl. 88. corollis muticis. Syst. nat. 89. Schreb. gr. 133. t. 19. f. 1.

Gramen alopecuroides majus. *Ger. em. 18.*

Gramen phalaroides majus. *f. Italicum. B. pin. 4.*

Park. 1164. Hist. Ox. III. 191. t. 4. f. 8.

Anglis, Meadow Fox-tail-grass.

Habitat in pratis et pastuis. *4. V.*

- 2.** ALOPECURUS culmo erecto, spica linear-lan-agrestis, cœlata, glumis subnudis.

Alopecurus culmo spicato erecto, glumis nudis. *Sp. pl. 89. Schreb. gr. 140. t. 19. f.*

Gramen myosuroides majus, spica longiore, aristis rectis. *R. syn. 397.*

Gramen typhoides spica angustiore. *B. pin. 4.*

Gramen alopecuroides, spica longa, majus et minus. *Park. 1169.*

Gramen alopecurinum minus. *Ger. em. 11.*

- 3.** Gramen myosuroides minus, spica breviore, aristis recurvis. *R. syn. 397.*

Anglis, field Fox-tail-grass.

Habitat in arvis et ad vias. *4. VII. VIII.*

- 3.** ALOPECURUS culmo adscendente, spica cylindrica, glumis apice divergentibus pilosis. *tus.*

Alopecurus culmo spicato infacto, *Sp. pl. 89. corollis muticis. Syst. nat. 89.*

Gramen aquaticum geniculatum spicatum. *B. pin.*

3. Th. 41. Sch. agr. 72. R. syn. 396.

Gramen fluviatile spicatum. *Ger. em. 14.*

Gramen aquaticum spicatum. *Park. 1273.*

- 3.** Alopecurus spica cylindrica, culmo erecto, radice bulbosus, bulbo. *F. Angl. 24. Sp. pl. 1665.*

Gramen myosuroides nodosum. *R. syn. 397. t. 22.*

f. 2.

Anglis,

TRIANDRIA DIGYNIA.

Anglis, Flote β bulbose Fox-tail-grass.

Habitat in aquosis et stagnis. β In the first field next the road before you go into Northfleet. Dr. Wilmers. R. syn. V.—VIII.

Obs. *A. bulbosus* in aquosis degenerat in *geniculatum*, cuius varietas est.

aristatus. 4. ALOPECURUS culmo suberecto, panicula coarctata spiciformi, glumis aristatis, aristis longissimis.

monspeliensis. Alopecurus panicula subspicata, glumis scabris, corollis aristatis. Sp. pl. 89.

Alopecuros maxima anglica. Park. 1166. R. syn. 396. Alopecuros altera maxima anglica paludosa. Ger. em. 88. Hist. Ox. III. 191. t. 4. f. 3.

Phleum crinitum, calycibus linearibus basi subventricosis hispidis aristatis, aristis capillaceis longissimis. Schreb. gram. 151. t. 20. f. 3.

Gramen alopecuroides anglobritannicum maximum. B. pin. 4.

paniceus. β Alopecurus panicula subspicata, glumis villosis, corollis aristatis. Sp. pl. 90.

Anglis, bearded Fox-tail-grass.

Habitat in pratis humidiusculis. β aridis, in riguis herbidis Comitatus Southamptonæ proxime salinas et antiquas ædes Drayton vocatas, cis mare, duobus millearibus anglicis a Portsmouth ex adverso Vectis insulæ plurima; at Purfleet, over against the mill towards Raynam on the other side of the great ditch, Mr. Newton. R. Syn. circa Clay in Norfolk. D. Humphrey. ♂. VI.—VIII.

Obs. Gluma bivalvis, valvulis linearibus, apice divergentibus aristatis; arista terminali longissima; Corolla minima aristata; arista dorsali brevi.

ventricosus. 5. ALOPECURUS culmo obliquo, panicula lanceolata spiciformi, glumis basi ventricosis, acuminatis.

Milium panicula subspicata, floribus aristatis. Sp. pl. 91. Schreb. gram. II. 14. t. 23. f. 3.

Agrostis calycibus inferne ventricosis, valvula exteriore acuminata longitudine aristæ. Gouan Hort. Monsp. 39. t. I.

TRIANDRIA DIGYNIA.

29

Panicum serotinum arvense, spica pyramidata.

Tourn. 515. R. Syn. 394.

*Gramen serotinum spica laxa pyramidali. R.
hist. 1288.*

*Gramen alopecuro accedens, ex culmi geniculis
spicas cum petiolis longiusculis promens. Pluk.
ph. t. 33. f. 6.*

Anglis, panick Fox-tail-grass.

*Habitat in pratis et pascuis. In Insula Shepey co-
piose. O. VII.—VIII.*

*Obs. Gluma bivalvis, inæqualis, basi ventricosa, a-
cuminata; Corolla brevissima, ovata, aristata;
arista infra apicem longitudine glumæ.*

STIPA. 90.

*Cal. bivalvis, uniflorus. Cor. valvula exteriore
arista terminali: basi articulata.*

I. STIPA aristis lanatis. *Sp. pl. 125. Hall. hist. 1514. pennata.*

*Gramen sparteum pennatum. B. pin. 5. R. Syn.
393. Sch. 153.*

*Spartum austriacum pennatum. Clus. hist. II. 221.
Ger. em. 42.*

Anglis, Feather-grass.

*Habitat in montosis. Found by Dr. Richardson in
company with T. Lawson, on the limestone rocks
hanging over a little valley called Longsleadale, about
six miles north of Kendal, Westmoreland. 4.
VII. VIII.*

MILIUM. 79.

*Calix bivalvis, uniflorus. Cor. brevissima. Stigmata
penicilliformia.*

I. MILIUM floribus paniculatis dispersis muticis. *Sp. effusum.
pl. 90. Fl. suec. 61. Dalib. par. 23.*

*Milium paniculatis rarissime petiolatis. Hall.
hist. 1525.*

*Gramen miliaceum. Lob. ic. 3. Ger. em. 6. B.
hist. II. 462. R. Syn. 402.*

*Gramen sylvaticum, panicula miliacea sparsa. B.
pin. 8. Sch. agr. 133.*

Gramen

TRIANDRIA DIGYNIA.

Gramen miliaceum vulgare. Park. 1153.

Anglis, Millet-grass.

Habitat in sylvis humidiusculis frequens. O. VI. VII.

AGROSTIS. 80.

Cal. bivalvis uniflorus: valvulis acutis æqualibus.

Cor. bivalvis inæqualis, glumja paulo minor.

Stigmata plumosa.

* *Aristatæ.*

Spica-ven- I. **AGROSTIS** petala exteriore arista recta stricta
ti. longissima, panicula patula. *Sp. pl.* 90.

Avena monantha, panicula adscendente, multiflora,
calyce levi, florali arista longissima. *Hall. hist.*
1480.

Gramen segetum panicula arundinacea. *B. pin.* 3.

Gramen arundinaceum. *Ger. em.* 5.

Gramen agrorum venti spica. Park. 1151.

*Gramen miliaceum majus, glumis aristatis, spadiceis
et pallidis.* *Pet. conc. gr.* n. 122. 123. *R.*
Syn. 405.

Anglis, silky Bent-grass.

Habitat in arvis solo arenoso. *passim.* O. VI. VIII.

canina. 2. **AGROSTIS** panicula patente, corolla nuda, val-
vula altera dupla longiore aristata, arista dorsali
rectiuscula.

* *Agrostis calycibus elongatis, petalarum arista dorsali
recurva, culmis prostratis subramosis.* *Sp. pl.* 92.
foliis planis. *Syst. nat.* 90.

Avena monantha, panicula diffusa, multiflora, ad-
scendente, gluma calycina exasperata. *Hall.*
hist. 1479.

*Gramen supinum caninum paniculatum, folio va-
rians.* *B. pin.* 1. *Tb.* 12.

*Gramen paniculatum supinum, ad infima culmorum
genicula, foliorum capillarium fasciculis donatum.*
Sch. agr. 141. *t. 3. f. 9. C.*

3 *Agrostis foliis radicalibus filiformibus; caulinis pla-
nis, culmo suberecto.*

*Avena monantha, paniculata, gluma calycina exas-
perata arista flori æquali.* *Hall. hist.* 1477.

Gramen

TRIANDRIA DIGYNIA.

31

- Gramen parvum paniculatum, panicula spadicea aristata. *Sch. agr. 140. pr. t. IV.*
- γ Agrostis foliis setaceis rigidis glaucis; culmo erecto. Avena monantha paniculata, foliis setaceis, gluma calycina exasperata, arista flore duplo longiore. *Hall. hist. 1478.*
- Gramen paniculatum, capillaceo folio, locustis spadiceofuscis, aristatis. *Sch. agr. 141.*
Anglis, brown Bent-grass.
- Habitat in pratis, pascuis et ericetis humidiusculis. β in ericetis aridiusculis γ in ericetis montosis aridis. supra Hall Down prope Exeter et alibi in Devonia. η. VII. VIII.
- Obs. Culmus nunc semipedalis nunc tripedalis, subramosus. Folia radicalia et ad basin culmi subinde filiformia fasciculata, lœvia et scabra. Panicula elongata nunc laxa nunc coarctata. Carinæ glumarum scabré in omnibus. β. et γ. solo humidiusculo illata, secundo anno, in α mutantur.
- ** *Muticæ.*
3. AGROSTIS panicula patente, carina glumarum scabra, corolla mutica; valvula altera brevissima. *pha.*
- α Agrostis panicula capillari patente, calycibus subulatis capillæqualibus hispidiusculis coloratis, flosculis muticis. *ris.*
Sp. pl. 93. Roy. lugd.b. 59. Dalib. paris. 23.
- Poa monantha, caule erecto, panicula diffusa, calycibus exasperatis. *Hall. hist. 1475.*
- Gramen montanum panicula spadicea delicatiore. *B.*
pin. 3.
- Gramen miliaceum locustis minimis, panicula fere arundinacea. *R. meth. em. 177. Syn. 402.*
- β Gramen miliaceum angustifolium, glumis pere exiguis. *Pet. conc. Gr. 117. R. Syn.*
- γ Agrostis panicula mutica subsecunda, culmis fasciculata, latis erectis. *Lin. Mantiss. I. 31.*
- Gramen minimum palustre, panicula spadicea delicata, tenuifolium. *Sch. agr. 131.*
- δ Agrostis paniculæ ramulis divaricatis muticis, culmo stolonirepente, calycibus æqualibus. *Sp. pl. 93. Fl. fera.*
dan. 564.

TRIANDRIA DIGYNIA.

- Poa stolonifera monantha, calycibus leviter exasperatis. *Hall. hist.* 1473.
- Gramen montanum miliaceum minus, radice repente, *R. Syn.* 402.
- Gramen caninum supinum minus. *B. pin.* 1. *Sch.* agr. 128.
- Gramen miliaceum folio angustissimo. *Pet. conc.* gr. 116.
- palustris.* ζ Agrostis panicula coarctata mutica, calycibus æquilibus hispidiusculis coloratis, culmo repente. *Fl. Angl.* 27.
- Agrostis (*alba*) panicula laxa, calycibus muticis æqualibus. *Roy. lugdb.* 50. *Sp. pl.* 93.
- Gramen miliaceum majus, panicula spadicea. *Pet. conc.* gr. 118. *R. Syn.* 464.
- Gramen miliaceum majus, panicula viridi. *Pet. conc.* gr. 118. *R. Syn.* 464.
- sylvatica.* η Agrostis panicula coarctata mutica, calycibus æquilibus corolla ante florescentiam calyce breviore, posteā duplo longiore. *Fl. Angl.* 28.
- Agrostis panicula coarctata mutica, calycibus æqualibus : virgineis corolla brevioribus, foecundatis duplo longioribus. *Sp. pl.* 1665.
- Gramen miliaceum sylvestre, glumis oblongis. *Pet. conc.* gr. 121. *R. Syn.* 404.
- Anglis*, fine, γ little, δ creeping, ζ marsh η wood Bent-grass.
- Habitat in pratis et pascuis ξ in fossis et uliginosis η in sylvis humidiusculis. in Bishops Wood Hampstead. Mr. Buddle. *R. syn.* in *sylvula* Hornsey-Wood dicta. Υ. VI.—VIII.
- minima.* 4. AGROSTIS panicula mutica filiformi. *Sp. pl.* 93.
Nardus panicula spicata, floribus solitariis alternis. *Guett. Stamp.* 155. *Dalib. paris.* 153.
- Gramen minimum paniculis elegantissimis. *B. pin.* 2. *Sch. agr.* 40. *Hist. Ox.* III. 200. t. 2. f. 10.
- Gramen minimum. *B. hist.* II. 465. *Dalech. hist.* 425. *anglo-britannicum.* *Lob. ill.* 29. *R. Syn. pl. dub.* *Anglis*, small Bent-grass.
- Habitat in Wallia, D. Stillingfleet invenit. ⊙. VII.

A I R A. 81.

Cal. bivalvis, biflorus. Flosculi absque interjecto rudimentum.

* *Muticæ.*

1. AIRA panicula spicata, calycibus pedunculo longi- *cristata*.
oribus, petalis subaristatis inæqualibus. *Sp. pl.* 94.

Poa panicula spicata, calycibus subpilosis subquadri-
floris pedunculo longioribus, petalis aristatis. *Syst.*
Nat. 94.

Festuca locustis bifloris, mucronatis, confertis, im-
bricatis paniculatis, in spicam congestis. *Hall.*
hist. 1444.

Gramen spica cristata, subhirsutum. *B. pin.* 2. *Hist.*
Ox. III. 194. t. 4. f. 7. *Sch. agr.* 166.

Gramen pumilum, spica purpuro-argentea molli. *R.*
syn. 396.

Anglis, cristed Hair-grass.

Habitat in pratis montosis sterilibus. 4. VII. VIII.

2. AIRA panicula coarctata, floribus pedunculatis muti- *cærulea*.
cis convoluto-subulatis, foliis planis. *Sp. pl.* 95.

Poa spiculis subulatis, panicula rara contracta. *Fl.*
lapp. 29. *Roy. lugdb.* 61.

Gramen pratense serotinum, panicula longa purpu-
rascente. *R. Syn.* 404. *Hist. Ox.* III. 201. t. 5.
f. 22.

Gramen pratense spica Lavendulæ. *Merr. pin.*

Anglis, purple Hair-grass.

Habitat in pratis et pascuis uliginosis, sterilissimis frequens.
4. VII. VIII.

3. AIRA panicula patente, floribus muticis lœvibus ob- *aquatica*.
tusis calyce longioribus, foliis planis. *Sp. pl.* 95.

Aira culmo inferiore repente, flosculis muticis calyce
longioribus: altero pedunculato. *Roy. lugdb.* 60.

Gramen miliaceum aquaticum. *R. syn.* 402. *Sch. agr.*
176. *Vaill. paris.* 89. t. 17. f. 7.

Gramen caninum supinum paniculatum dulce. *B.*
pin. 1.

TRIANDRIA DIGYNIA.

Gramen exile tenuifolium Canario simile. s. Gramen dulce. Park. 1174.

distans. β Poa panicula ramis subdivisis, floribus quinquefloris, flosculis distantibus obtusis. Mant. I. 32. Syst. Nat. 94.

Anglis, water Hair-grass.

Habitat in aquosis et ad ripas fluviorum. β in arenosis prope Exmouth; circa Northfleet; in agro Cantiano; in comitatibus Eboracensi et Lancasterensi passim. 4. VI. VII.

Desc. β. Radix fibrosa. Culmi plures, obliqui et erectiusculi, teretes, glabri. Folia radicalia, pauca ensiformia, erecta, obtusa, nuda. caulina petiolata, obtusa, subinde involuta, glauca. Petiolus vaginans, cylindricus, striatus, glaber. Stipula membranacea, brevissima, obtusa. Panicula diffusa patens, ramosa, ramis subquaternis. Spiculæ lineares. Flosculi a tribus ad sex vel septem, remoti obtusi quasi truncati, subinde purpurei, margine albo. Gluma bivalvis, inæqualis, valde obtusa.

cæspitosa. 4. AIRA foliis planis, panicula patente, petalis basi villosis aristatisque: arista recta brevi. Sp. pl. 96. Fl. dan. 24.

Avena diantha, panicula amplissima, patula, bicolore, Hall. hist. 1487.

Gramen segetum altissimum panicula sparsa. B. pin. 3. Hist. Ox. III. 199. t. 5. f. 1.?

Gramen segetum panicula speciosa. Park. 1158.

Gramen segetale. Ger. em. 5.

Gramen miliaceum segetale majus. Pet. conc. gr. 114. R. syn. 403.

Anglis, turfy Hair-grass.

Habitat in pratis et sylvis humidis. 4. VII.

flexuosa. 5. AIRA foliis setaceis, culmis subnudis, panicula patente, pedunculis flexuosis, flosculis basi pilosis aristatis: arista tortili longiore.

Aira foliis setaceis, culmis subnudis, panicula divaricata, pedunculis flexuosis. Sp. pl. 96. Fl. dan. 157.

Gramen alpinum nemorosum paniculatum, foliis angustissimis, loculis splendentibus aristatis. Sch. agr. 218. pr. t. 6. f. 1.

Gramen

Gramen nemorosum paniculis albis, capillaceo folio.

*B. pin. 7. pr. 14. th. 97. Hist. Ox. III. 300. f. 8. t.
7. f. 9. R. syn. 407.*

Gramen paniculatum locustis parvis purpuro-argenteis, majus et perenne. R. syn. 407.

Avena diantha; paniculis flexuosis, floribus basi villosis, locustis ovatis. Hall. hist. 1486.

Anglis, heath Hair-grass.

Habitat in ericetis, sylvis et pascuis sterilibus. 4. VII.

VIII.

Obs. variat floribus fusco-purpureis et virescentibus.

6. *AIRA* foliis setaceis, panicula erecta angusta subse-montana. cunda, flosculis basi pilosis aristatis; arista tortili longiore.

Aira foliis setaceis, panicula angusta, flosculis basi pilosis aristatis: aristis tortili longiore. *Sp. pl. 96.*

*Gramen avenaceum capillaceum minoribus glumis. B.
pin. 10.*

*Gramen avenaceum paniculatum alpinum, foliis capil-
laceis brevibus, locustis purpureo-argenteis et aris-
tatis. Sch. agr. 216. pr. t. 4. f. 4.*

8 *Aira* foliis setaceis, panicula secunda coarctata, arista-setacea-
tis flosculis duplo-longioribus recurvis. *Fl. angl. 30.*

Anglis, mountain Hair-grass.

*Habitat in ericetis et pascuis sterilibus et arenosis; in ericeto
Strattoniensi in comitatu Norfolk, D. Stillingfleet;
in ericetis arenosis in comitatibus Eboracensi et
Lancasterensi passim. 4. VII. VIII.*

*Desc. Radix perennis, fibrosa. Culmi plures, semipedales et sesquipedales erectiusculi, teretes, laeves, bis triarticulati. Folia radicalia plurima, fasciculata, setacea, nuda, glauca, rigidiuscula; caulinis duo aut tria parentia, petiolata, involuta, ut setacea apparent, rigida. Petiolus cylindricus; longissimus, vaginans, striatus, nudus. Stipula intrafoliacea, persistens, membranacea, erecta, acuta. Panicula angusta, erecta secunda, coarctata ramosa; Ramis flexuosis, scabris, Spiculae bi-
florae; Flosculo altero sessili altero pedunculato. Receptaculum pilosum. Cal. Gluma bivalvis oblonga, con-
cava, acutiuscula, nuda, purpurascens; valvulis aequalibus, corolla longioribus, Corolla bivalvis; valvulis oblongis, aequalibus, concavis, acutis, glabris, valvula exteri-*

TIRANDRIA DIGYNIA.

ore basi aristata: aristा corolla duplo longior, medio flexa.
Stam. Filamenta tria capillaria, brevia. Antheræ
bastatæ purpuræ Stig. villosa.

canescens. 7. AIRA foliis setaceis, panicula coarctata erecta, flosculis aristatis gluma duplo brevioribus.

Aira foliis setaceis : summo paniculam inferne obvolvente. *Fl. suec.* 74. *Sp. pl.* 97.

Avena diantha, foliis setaceis, panicula stricta, aristis clavatis. *Hall. hist.* 1483.

Gramen foliis junceis, radice jubata. *B. pin.* 5. *Th.* 72. *Sch. agr.* 243.

Gramen miliaceum maritimum molle. *Pet. Conc.* gr. 126. *R. Syn.* 405.

Anglis, grey Hair-grass.

Habitat in arenosis maritimis. V. VII. VIII.

Desc. Rad. perennis, fibrosa; Culmi plures, semipedales, obliqui, glabri. Folia radicalia fasciculata, setacea, scabra, rigida, glauca; caulina erecta, petiolata, involuta, acuta, scabra. Petiolus cylindricus vaginans scaber fere longitudine internodii: supremus spathaceus paniculam inferne obvolvens. Panicula oblonga, erecta, coarctata, ramosa; Spiculæ bifloræ, flosculo altero sessili, altero pedunculato, gluma duplo breviore. Gluma bivalvis: valvulis æqualibus, oblongis, acutis, carinatis, carina scabra. Corolla bivalvis: valvulis inæqualibus oblongis concavis acutiusculis, glabris; valvula exteriore media aristata; Aristæ longitudine glumæ, in medio cincta denticulis, infra crassior fusca, supra subclavata albida.

præcox. 8. AIRA foliis setaceis : vaginis anglutatis, floribus paniculato-spicatis, flosculis basi aristatis. *Sp. pl.* 97.

Gramen parvum præcox, panicula (potius spica) laxa canescente. *R. Syn.* 407. *Pluk. ph. t.* 33. *f.* 9.

Anglis, early Hair-grass.

Habitat in arenosis et sterilibus frequens. O. V. VI.

caryophyl- 9. AIRA foliis setaceis, panicula trichotoma, floribus aristatis divergentibus.

Aira foliis setaceis, panicula divaricata, floribus aristatis distantibus. *Sp. pl.* 97.

Aira

Aira foliis subulatis, aristis e basi flosculorum tortili-
bus, flosculo altero pedunculato. *Roy Lugdb.* 60.

Gramen paniculatum, locustis purpuro-argenteis, an-
num. *R. Syn.* 407.

Gramen paniculatum purpuro-argenteum, locustis
parvis, annum. *Hist. Ox. III.* 200. t. 5. f. 11.

Caryophyllus arvensis glaber minimus. *B. pin.* 210.
pr. 105.

Anglis, silver Hair-grass.

Habitat in *pascuis arenosis frequens.* ☽. VII.

MELICA. 82.

Cal. bivalvis, biflorus, Rudimentum floris inter flos-
culos.

1. MELICA petalis imberibus, panicula secunda nu- *nutans.*
tante, gluma uniflora.

Gramen avenaceum locustis rarioribus. *B. pin.* 10.

Gramen avenaceum spica mutica rariole gluma. *Hist.*
Ox. III. t. 7. f. 49.

Gramen avenaceum nemorensis, glumis rarioribus ex
fusco zerampelinis. *R. Syn.* 403.

Anglis, wood Melic-grass.

Habitat in *sylvis et sepibus frequens.* ♀. VI. VII.

2. MELICA petalis imberibus, panicula coarctata, se- *montana.*
cunda, erecta, subsimplici, floribus pendulis.

Melica petalis imberibus, panicula nutante simplici.
Sp. pl. 98. *Schreb. gram.* 62. t. 6. f. 1.

Melica floribus sub culmo pendulis. *Fl. lapp.* 36.

Gramen avenaceum, locustis rubris, montanum. *B.*
pin. 10. *pr. 20.*

Gramen locustis rubris. *B. hist.* 11. 434. *Park.* 1151.

Gramen avenaceum gluma mutica montanum, lo-
custis rubris. *Hist. Ox. III. t. 7. f. 48.*

Anglis, mountain Melic-grass.

Habitat in *nemoribus montosis in comitatibus Eboracensi,*
Westmorlandico et Cumberlandico frequens. ♀.
VI. VII.

TRIANDRIA DIGYNIA.

BRIZA. 84.

Cal. bivalvis, multiflorus. *Spicula disticha*: *valvulis cordatis*, obtusis: interiore minore.

- media.* 1. *BRIZA* spiculis ovatis calyce flosculis breviore. *Fl. suec.* 86. *dan.* 258. *Sp. pl.* 103.
Gramen tremulum. *B. hist.* II. 469. *majus.* *B. pin.* 2.
R. Syn. 412. *Sch. agr.* 204.
Gramen tremulum s. phalaris media anglica prima an-
secunda. *Park.* 1165.
Phalaris pratensis. *Ger. em.* 86.
Anglis, middle Quaking-grass, Cow-quakes and La-
 dies-hair.
Habitat in pratis et pascuis. 4. VI.
- minor.* 2. *BRIZA* spiculis triangulis, calyce flosculis longiore.
Hort. cliff. 23. *Roy. lugdb.* 63. *Sp. pl.* 102.
Gramen tremulum minus, panicula parva. *B. pin.* 2.
Hist. Ox. III. 208. t. 6. f. 47.
Gramen tremulum minus, panicula ampla, locustis
 parvis triangulis. *R. Syn.* 412.
Anglis, small Quaking-grass.
Habitat in pascuis. In Jersey. Dr. Sherard. *R. Syn.*
 prope Bath. D. Alchorne. 4. VII.

POA. 83.

Cal. bivalvis, multiflorus. *Spicula ovata*: *valvulis*
ovato-acuminatis.

- aquatica.* 1. *POA* panicula erecta ramosa, spiculis ovato-lineari-
 bus, culmo erecto.
Poa panicula diffusa, spiculis sexfloris linearibus. *Fl.*
suec. 81. *Sp. pl.* 98.
Poa altissima, foliis latissimis, panicula amplissima,
 locustis distichis multifloris. *Hall. hist.* 1454.
Gramen paniculatum aquaticum latifolium. *B. pin.*
 3. *Hist. Ox.* III. 201. t. 6. f. 25.
Gramen aquaticum majus. *Ger. em.* 6. *R. Syn.* 411.
Anglis, water Meadow-grass.
Habitat in paludibus et ad ripas fluviorum. 4. VII. VIII.
Desc. Culmus quadripedalis et sexpedalis, erectus, an-
 ceps, glaber. Folia ensiformia erecta, acuta, cari-
 nata,

TRIANDRIA DIGYNIA.

39

nata, margine carinaque scabra. Petiolus vaginans, cylindricus striatus glaber. Stipula solitaria intrafoliacea, membranacea obtusa. Flores a quinque ad decem.

2. POA panicula diffusa ramosa, spiculis ovatis globose-*pratensis.*
ratis, flosculis basi lanatis, foliis obtusis, culmo
suberecto stolonifero.

Poa panicula diffusa, spiculis quinquefloris glabris,
culmo erecto tereti. Sp. pl. 99.

Gramen pratense paniculatum majus latiore folio,
Poa Theophrasti. B. pin. 2. th. 28. R. Syn. 409.
Sch. agr. 117.

Gramen pratense. Ger. em. 2. vulgatius. Park. 1156.

3 Poa panicula diffusa ramosissima, spiculis sexfloris cor-*alpina.*
datis. Sp. pl. 99.

Poa latifolia, culmo debili, locustis quadrifloris, caly-
cis glumis æqualibus, floralium dorso sericeo.
Hall. hist. 1156.

Gramen alpinum paniculatum majus, panicula spe-
ciosa variegata. Sch. agr. 186. pr. t. 3.

γ Gramen alpinum latifolium, panicula laxa foliacea, vivipara.
foliolis in panicula paucioribus et majus crispis.
Sch. agr. 212. t. 4. f. 14.

Anglis, great Meadow-grass β. γ. alpine Meadow-
grass.

Habitat in pratis et pascuis, β in montibus Westmor-
landicis, Cumberlandicis, &c. γ in monte Snow-
don. U. VI. VII.

Desc. Radix fibrosa repens, Culmi plures, erecti et
subinde parum adscendentes, anticipites, glabri, stolo-
niferi, stolonibus subrepentibus. Folia ensiformia, mar-
gine scabra, obtusa, nuda, glauca, Petiolus vaginans
carinatus striatus, glaber; Stipula intrafoliacea mem-
branacea, obtusa. Spiculæ glomeratæ subpeduncula-
tæ; flosculi a duobus ad sex basi et inferiore parte
carinæ lanati.

3. POA panicula diffusa ramosa, spiculis ovatis globose-*trivialis.*
ratis; flosculis basi lanatis, foliis acutis scabris,
culmo suberecto.

D 4

Poa

TRIANDRIA DIGYNIA.

Poa panicula diffusa; spiculis subtrifloris basi pubescentibus, culmo erecto tereti. *Sp. pl.* 99.

Poa panicula diffusa, locustis trifloris, glabris. *Hall. hist.* 1465.

Gramen pratense paniculatum medium. *B. pin.* 2.
R. Syn. 409. *Sch. agr.* 180.

Gramen pratense minus. *B. hist. II.* 542. *Ger. em.* 2.
Park. 1156.

palustris. β Poa panicula diffusa, spiculis subtrifloris pubescentibus, foliis subtus scabris. *Sp. pl.* 98.

Gramen paniculatum aquaticum angustifolium, panicula speciosa. *Sch. agr.* 184.

Gramen palustre panicula speciosa. *B. pin.* 3. pr. 7.
Hist. Ox. III. 201. t. 6. f. 27.

setacea. γ Poa panicula diffusa, spiculis trifloris pubescentibus, foliis radicalibus-setaceis. *Fl. Angl.* 34.

Anglis, common Meadow-grass, β. marsh Meadow-grass, γ. hair-leav'd Meadow-grass.

Habitat in pratis et pascuis, β. in aquosis inter *Arundines* et *Poam aquaticam* frequens. 4. VI. VII.

Desc. Radix fibrosa; Culmi plures a semi ad quadrupedales erecti, subinde adscendentibus, ancipites, glabri. Folia petiolata ensiformia acuminata, scabra, in aridis involuta ut setacea apparent. Petiolus vaginans carinatus striatus, scaber; Stipula intrafoliacea membranacea, acuminata. Panicula patens ramosa: ramis triangulis scabris; Spiculæ ovatæ bis. triflores raffissime quatuor, glomeratæ, subpedunculatæ, pedunculis brevissimis, flosculi acuti, basi et parte inferiore carinæ lanati.

angustifo- 4. *POA panicula diffusa erectiuscula*, spiculis ovatis pendunculatis, pedunculis divaricatis, flosculis basi pilosis, foliis acutis, culmo erecto.

Poa panicula diffusa, spiculis quadrifloris pubescentibus, culmo erecto tereti. *Sp. pl.* 99. *Fl. suec.* 81.

Poa foliis duris se convolventibus, locustis quadrifloris villosis. *Hall. hist.* 1460.

Gramen pratense paniculatum majus angustiore folio.
B. pin. 2. pr. 5. *Hist. Ox. III.* 201. t. 5. f. 19.
Sch. 178.

TRIANDRIA DIGYNIA.

4r

3 Poa panicula attenuata, spiculis subbifloris mucrona- nemora-
tis scabris, culmo incurvo. *Sp. pl. 102.* lis.

Poa culmo debili panicula nutante, locustis bifloris,
folliculis subvillosois. *Hall. hist. 1469.*

Gramen paniculatum angustifolium alpinum, locustis
rarioribus et angustioribus non aristatis. *Sch. agr.
164. pr. t. 2.*

Anglis, narrow-leaved, β. wood Meadow-grass.

Habitat in sylvis et sepibus frequens. 4. VI. VII.

Desc. Radix repens, Culmi plures erecti, ancipites, ge-
niculati, glabri, nitidi. Folia petiolata, ensiformia, a-
cuta, scabriuscula; Petiolus vaginans carinatus, gla-
ber, nitidus. Stipula intrafoliacea brevissima, obtusa.
Panicula diffusa, erectiuscula, ramosa, ramis angu-
latis divaricatis, scabris. Spiculæ ovatæ, acutæ, pe-
dunculatæ; Flosculi ab uno ad sex acuti basi pilosi.

5. POA panicula secunda patente, spiculis ovatis, flo- *bulbosa.*
culis acutis glabriusculis, culmo erecto basi bulbofo.

Poa panicula secunda patentiuscula, spiculis quadri-
floris. *Sp. pl. 102.*

Poa foliis bulbosis, panicula diffusa, locustis quadri-
floris folliculis subvillosois. *Hall. hist. 1461.*

Gramen arvense panicula crispa. *B. pin. 3. pr. 6.
Barr. ic. 730. longiore nostras. Pluk. alm. 176.*

Gramen vernum, radice ascalonitis. *Vaill. paris. t. 17.
f. 8.*

Anglis, bulbose Meadow-grass.

Habitat in pratis et pascuis. 4. V. VI.

Desc. Radix fibrosa, Culmi plures erecti, teretes, basi
bulboſi. Folia ensiformia, acutiuscula, nuda, glauca.
Panicula ramosa, ramis angulatis, scabriusculis, spi-
culis ovatis acutis, flosculi tres, quatuor subinde quin-
que acuti, basi subpilosi.

6. POA panicula coarctata secunda erecta, culmo ad- *compressa.*
ſcendente compresso.

Poa panicula coarctata secunda, culmo obliquo com-
presso. *Fl. suec. 84. Sp. pl.*

Poa culmo compresso declinato, locustis distichis, sex-
floris. *Hall. hist. 1455.*

Gramen

TRIANDRIA DIGYNIA.

Gramen pratense medium, culmo compresso. *Bud. H.*
S. R. syn. 409.

Gramen murorum, radice repente. *B. pin. 2. pr. 2.*

Gramen paniculatum radice repente, culmo compresso. *Vaill. paris. 91. t. 18. f. 5.*

Anglis, creeping Meadow-grass.

Habitat in locis siccis, tectis, muris. *γ. VI. VII.*

annua. 7. POA panicula secunda patente, ramis binatis, culmo obliquo ancipi.

Poa panicula diffusa, angulis rectis, spiculis obtusis, culmo obliquo compresso. *Sp. pl.*

Poa culmo infracto, panicula triangulari, loculis trifloris glabris. *Hall. hist. 1466.*

Gramen pratense minus s. vulgatissimum. *R. syn. 408.*

Gramen pratense paniculatum minus. *B. pin. 3.*

Gramen pratense minimum album et rubrum. *Ger. em. 3. Park. 1156.*

Anglis, annual Meadow-grass.

Habitat in pratis et pascuis ubique. *○. II—X.*

mariti- 8. POA panicula coarctata secunda ramosa, ramis bina-
ma. tis, spiculis oblongis; flosculis obtusis, foliis involu-
tis acutis, culmo obliquo tereti.

Gramen paniculatum maritimum vulgatissimum. *R. syn. 409.*

Gramen caninum maritimum paniculatum. *R. syn. 410.*

Anglis, sea Meadow-grass.

Habitat in littoribus maritimis frequens. *γ. VI. VII.*

Desc. Radix perennis repens. Culmus obliquus semipe-
dalis & pedalis, teres, glaber. Folia petiolata ensi-
formia, patentia, involuta, acuminata, nuda. Panicula
secunda oblonga, coarctata, erecta, ramosa; Ramis bi-
natis, infimis subinde patentiusculis. Spiculae oblongae.
Flosculi a tribus ad septem vel octo, obtusiusculi
glabri.

xigida. 9. POA panicula lanceolata secunda ramosa, ramis soli-
tariis, spiculis linearibus, culmo suberecto.

Poa panicula lanceolata, subramosa secunda: ramulis
alternis secundis. *Syst. Nat. 93. Sp. pl. 101.*

Gramen

- Gramen panicula multiplici. *B. pin.* 3. *Park.* 1157.
 Gramen loliaceum murorum duriusculum, spica erecta
 rigida. *Hist. Ox.* III. 182. t. 2. f. 9.
 Gramen exile duriusculum in muris et aridis proveni-
 ens. *R. Syn.* 410.
Anglis, hard Meadow-grass.
Habitat in muris, tectis et arenosis frequens. ♂. VII.
*Obs. Numerus flosculorum in spiculis a tribus ad novem
 variat.*
 10. *POA spicata*; spiculis secundis erectis sessilibus. *loliacea.*
Triticum maritimum, calycibus multifloris mucrona-
 tis, spica ramosa. *Syst. Nat.* 102.
 Gramen pumilum loliaceo simile. *R. syn.* 395.
 Gramen exile duriusculum maritimum, foliolis cir-
 cumvolutis, veluti juncis brevibus. *Pluk. phyt.* 32.
 t. 7.
 Gramen maritimum, panicula loliacea. *B. pin.* 8: pr.
 19. *Hist. Ox.* III. t. 2. f. 6.
Anglis, spiked Meadow-grass.
Habitat in arenosis maritimis frequens. ♂. VI. VII.
*Obs. Spica subsecunda basi subinde ramosa, ramis bre-
 viissimis erectis, Spiculæ ovatæ; Flosculi a tribus ad
 decem, glabri.*

D A C T Y L I S. 86.

*Cal. bivalvis, compressus: altera valvula majore ca-
 rinata.*

1. *DACTYLIS spicis sparsis secundis scabris numero- cyno-
 sis. Læfl. hisp. 115. Sp. pl. 104. furoides.*
 Gramen sparteum serotinum, capite bifido vel gemino.
Merr. pin.
 Sparteum Essexianum, spica gemina clausa. *Pet. conc.*
gr. 35. R. Hist. III. App. 248. Syn. 393.
Anglis, smooth Cocks-foot-grass.
Habitat in palustribus maritimis paßim. ♀. VII. VIII.

2. *DACTYLIS panicula secunda glomerata. Sp. pl. glomera-
 tus. 105. Schreb. gram. 72. t. 8. f. 2.*
Poa flosculis confertis uno versu dispositis. Hort.
Cliff. 28. Roy. lugdb. 62.

Bromus

TRIANDRIA DIGYNIA.

Bromus locustis tetranthis fasciculatis imbricatis. Hall.
hist. 1512.

Gramen spicatum folio aspero. B. pin. 3. pr. 59.
th. 45.

Gramen pratense spica multiplici rubra. Park. 1161.

Gramen asperum. J. Baub. hist. II. 496. R. syn. 400.

Gramen panicula torosa pratense asperum. Hist. Ox.
III. 202. t. 6. f. 38.

Anglis, rough Cocks-foot-grass.

Habitat in pratis et pascuis. 4. VI—VIII.

FESTUCA. 88.

Cal. bivalvis. Spicula oblonga teretiuscula, glumis acuminatis.

* *Panicula secunda.*

ovina. 1. FESTUCA panicula secunda coarctata subaristata,
glumis acuminatis, culmo tetragono nudiusculo,
foliis setaceis. Sp. pl. 108.

Festuca foliis perangustis, panicula stricta, locustis
quinquefloris, hirsutis. Hall. hist. 1442.

Gramen capillaceum, locustellis pennatis non aristatis.
Pluk. ph. t. 34. f. 2. R. syn. 410.

Gramen loliaceum, foliis brevibus junceis, minus.
Hist. Ox. III. 182. t. 3. f. 13.

Gramen, foliolis junceis brevibus, majus, radice nigra.
B. pin. 5. Sch. agr. 276.

vivipara. β Festuca spiculis viviparis. Fl. Suec. 94.

Gramen sparteum-montanum, spica foliacea graminea,
majus et minus. R. syn. 410. t. 22. f. 1.

Anglis, sheeps Fescue-grass. Still. misc. t. 8.

Habitat in pratis et pascuis siccioribus, praesertim glareos. β in montibus Cambro-britannicis, Eboracensis,
Westmorlandicis. 4. VI. VII.

Obs. Numerus flosculorum in singula spicula a tribus ad sex. Flosculi frequentissime acuminati sive acuminato-aristati, rariissime aristati.

durius- 2. FESTUCA panicula secunda oblonga ramosa, ra-
cula. mis subbinatis, spiculis oblongis aristatis, foliis ra-
dicalibus setaceis.

Festuca

Festuca panicula secunda, oblonga, spiculis sexfloris oblongis lœvibus, foliis setaceis. Sp. pl. 108.

Festuca foliis hirsutis latiusculis, locustis paniculatis quinquefloris, aristatis, glabris. Hall. hist. 1435.

Gramen pratense panicula duriore laxa unam partem spectante. R. syn. 413. t. 19. f. 1. Sch. agr. 285.

β *Festuca panicula spiciformi pubescente, foliis filiformibus.* Sp. pl. 109? dumetorum.

Anglis, hard Fescue-grass.

Habitat in pratis et pascuis siccis β in sylvis et ad sepes.

¶. VI. VII.

Obs. Variant *Foliis radicalibus setaceis et filiformibus, scabriusculis, caulinis planis et canaliculatis, nudis; Spiculis a quatuor ad decem flores; glabris et pubescens.*

3. *FESTUCA* panicula secunda scabra, spiculis sexfloris *rubra*. aristatis, flosculo ultimo mutico, culmo semitereti. Sp. pl. 109.

Festuca foliis perangustis, locustis teretibus, quinquefloris, aristatis oris membranaceis. Hall. hist. 1440.

Gramen alpinum pratense, panicula duriore laxa spadicea, locustis majoribus. Sch. agr. 287. t. 6. f. 9.

Anglis, purple Fescue-grass.

Habitat in erectis et pascuis montosis in comitatu Westmorlandico. ¶. VII.

4. *FESTUCA* panicula secunda oblonga erecta ramo-*cambrica*. *cambrica*. spiculis aristatis lœvibus, foliis planiusculis, nudis.

Anglis, welsh Fescue-grass.

Habitat in summis montibus circa Llanberis copiose. ¶. VII. VIII.

Desc. Radix perennis fibrosa. Culmus subpedalis obliquus, teres, foliatus, glaber, bis. triarticulatus. Folia radicalia erectiuscula, ensiformia, acutiuscula, canaliculata nuda; caulinata duo aut tria, petiolata, acutiuscula plana, nervosa, nuda. Petiolus vaginans, cylindricus striatus, hirsutus. Stipula membranacea, vaginans, obtusa. Panicula secunda, oblonga, subcoarcata basi ramosa. Spiculæ pedunculatæ, subsexfloræ, ovatæ subulato-aristatæ, lœves; aristis brevibus. Pedunculi

TRIANDRIA DIGYNIA.

dunculi longitudine fere Spiculæ. affinis Festucæ duris
usculæ.

bromoides. 5. FESTUCA panicula secunda, spiculis erectis lœvibus, calycis altera valvula integra, altera acuminate. *Sp. pl.* 110.

Festuca foliis setaceis, panicula erecta, locustis glabris, longius aristatis. *Hall. hist.* 1443.

Gramen paniculatum bromoides minus, paniculis aristatis unam partem spectantibus. *R. syn.* 415. *hist.*

1287. *Pluk. phyt. t.* 33. *f.* 10. *Sch.* 297.

Anglis, barren Fescue-grass.

Habitat in muris et pascuis arenosis. ○. VI. VII.

myurus. 6. FESTUCA panicula secunda linearis scabra, ramis subsolitariis adpressis, glumæ altera valvula brevissima mutica, floribus aristatis; aristis longis.

Festuca panicula spicata nutante, calycibus minutissimis muticis, floribus scabris; aristis longis. *Sp. pl.* 109. *Roy. lugdb.* 68.

Gramen murorum spica longissima. *Ger. em.* 31. *Hist. Ox. III.* 215. *t.* 7. *f.* 43. *R. syn.* 415.

Gramen spica nutante longissima. *Park.* 1162.

Anglis, wall Fescue-grass.

Habitat in muris et locis agrorum sterilioribus et siccioribus. ○. VI.

fluitans. 7. FESTUCA panicula secunda erecta subramosa, ramis solitariis binatisque, spiculis teretibus linearibus muticis; foliis planis; culmo ancipiti. *Fl. dan.* 237.

Festuca panicula ramosa erecta, spiculis subsessilibus teretibus muticis. *Sp. pl.* 111. *Schreb. gram.* 37. *t.* 3.

Poa locustis teretibus multifloris, glumis floralibus exterioribus truncatis, interioribus bifidis. *Hall. hist.* 1453.

Gramen fluvatile. *Ger. em.* 14. *Park.* 1275.

Gramen aquaticum fluitans, multiplici spica. *B. pin.* 2.

Gramen aquaticum cum longissima panicula. *B. hist.* II. 490. *R. syn.* 412.

TRIANDRIA DIGYNIA.

47

§ Festuca spicata, spiculis alternis, sessilibus, compressis, loliacea.
muticis. *Fl. Angl.* 38.

Poa locustis distichis, spiculis muticis. *Hall. hist.* 1452. pratensis.
Festuca panicula secunda, erecta, spiculis linearibus sis.
muticis, foliis planis. *Fl. angl.* 37.

Poa foliis latis asperis, locustis teretibus, muticis, glumam
marum oris membranaceis. *Hall. hist.* 1451.

Gramen paniculatum elatius, spicis longis muticis et
squamosis. *R. syn.* 411.

Anglis, flote β spiked, γ . meadow Fescue-grass.

Habitat in aquosis et fossis. β . γ . in pascuis. 4. VI. VII.

Obs. *Spiculæ lineares subinde* γ *in locis aridis, ovatæ.*
Flosculi numero variant a quatuor ad decem in α . *et* β .
obtusi in γ *in locis aridis acuminati.* α . *sata in hor-*
tis mutatur in β *et* γ . *primo anno in* β *secundo in* γ .

8. FESTUCA panicula secunda erecta ramosa, ramis *elatior*,
binatis, spiculis ovatis subaristatis; foliis planis.

Festuca panicula secunda ramosa erecta, spiculis sub-
aristatis; exterioribus teretibus. *Sp. pl.* III. Schreb.
gram. 34. t. 2.

Festuca locustis teretibus multifloris, glumis semimem-
branaceis, breviter aristatis. *Hall. hist.* 1433.

Gramen loliaceum, spica divisa, pratense majus. *Hist.*
Ox. III. 184. t. 2. f. 15.

Gramen paniculatum nemorosum, latiore folio, gla-
brum panicula nutante non aristata. *R. syn.* 411.

Gramen arundinaceum aquaticum, panicula avenacea.
R. syn. 411.

Anglis, tall Fescue-grass.

Habitat in pratis et pascuis et ad sepes. 4. VI. VII.

Obs. *habet multa communia cum præcedente: an distincta*
sit species? merito dubitatur.

** *Panicula æquali.*

9. FESTUCA panicula erecta, spiculis subovatis muti- decum-
cis, calyce flosculis majore, culmo decumbente. *Sp. bens,*
pl. 110. *Fl. suec.* 93.

Festuca locustis teretibus muticis, octofloris, flosculis
alternis imperfectis. *Hall. hist.* 1434.

Gramen

TRIANDRIA DIGYNIA.

Gramen avenaceum parvum procumbens, paniculis non aristatis. *R. syn.* 408. *Pluk. ph. t.* 34. *f. 1.*
Gramen triticeum palustre, humilius, spica mutica breviore. *Hist. Ox. III.* 177. *t. 1. f. 6.*
Anglis, decumbent Fescue-grass.
Habitat in pascuis sterilibus subhumidis. *4. VIII.*

pinnata. 10. **FESTUCA** spicata, subdisticha; spiculis alternis, teretibus, aristatis.

Bromus culmo indiviso, spicis alternis subsessilibus teretibus flosculis arista longioribus. *Fl. Angl.* 41.
Bromus culmo indiviso, spicis alternis, subsessilibus teretibus. *Fl. suec.* 100. *Sp. pl.* 115.

Triticum spicis distichis, locustis teretibus hirsutis, aristatis, duodecimfloris. *Hall. hist.* 1431.

Gramen spica brizæ majus. *B. pin.* 9. *pr.* 19. *th.* 133. *R. Syn.* 392.

sylvatica. β **Festuca** spicata, spiculis alternis subdistichis sessilibus aristatis. *Fl. Angl.* 38. *Danic.* 164.

Triticum locustis remotis, hirsutis, teretibus exiguis, culmis floriferis gracilibus. *Hall. hist.* 1432.

Festuca dumetorum. *B. pr.* 69. *th.* 148.

Gramen avenaceum dumetorum spicatum. *R. Syn.* 394.

Anglis, spiked Fescue-grass.

Habitat in pratis, solis cretaceo et calcareo: β in sylvis et sepibus. *4. VII.*

Obs. α . *Planta glabra, luteo-viridis, Folia inferiora subinde parum pilosa, arista flosculis breviore,* β . *Planta pilosa, arista flosculis longiore. Flores in α . et β . α , sex ad duodecim.*

B R O M U S. 89.

polymor- *phus.* **Cal.** bivalvis. **Spicula** oblonga, teres, disticha; aristis infra apicem.

mollis. 1. **BROMUS** panicula erectiuscula subsimplici, spiculis ovatis, floribus obtusis, aristis rectis.

α **Bromus** panicula erectiuscula, spicis ovatis aristis rectis, foliis mollissime villosis. *Sp. pl.* 112. *Schreb. gram.* 60. *t. 6. f. 2.*

Bromus hirsutus, locustis septifloris, ovato-conicis. *Hall. hist.* 1504.

Festuca

Festuca avenacea hirsuta, paniculis minus sparsis. *R.*

Syn. 414.

Gramen avenaceum pratense, panicula squa nata et villosa. *Hist. Ox. III. 213. t. 7. f. 18.*

♂ *Festuca avenacea spicis strigosioribus*, & glumis glabris compactis. *R. Syn. 414.*

γ *Bromus panicula patente*, spiculis ovatis, aristis rectis. *secalinus.* *Sp. pl. 112.*

Bromus foliis glabris, locustis duodecimfloris. *Hall.* *hist. 1502.*

Festuca avenacea spicis habitioribus, glumis glabris. *R. Syn. 414.*

Gramen avenaceum segetale majus, gluma turgidiore. *Hist. Ox. 3. III. 212. t. 7. f. 16.*

♂ *Gramen avenaceum pratense*, gluma tenuiore glabra. *Hist. Ox. III. 213. t. 7. f. 19.*

Anglis, field Brome-grass.

Habitat in pratis et pascuis, γ. δ. in arvis. ♂. V. VI.

Obs. α. *Tota plana mollissime hirsuta.* β. *Foliis hirsutis, panicula glabriuscula.* γ. *Tota planta glabra.* δ. *Foliis inferioribus parum hirsutis, panicula glabra.*

2. **BROMUS** panicula simplici subnutante, spicis ova- *squarrofisis* tis, floribus obtusis ; aristis divaricatis.

Bromus panicula nutante, spicis ovatis : aristis divaricatis. *Sp. pl. 112.*

Festuca graminea, glumis vacuis. *Sch. agr. 251. t. 5.* *f. 11.*

Gramen phalaroides acerosum, nutante spica. *Bar. ic.* *24. f. 1.*

Anglis, corn Brome-grass.

Habitat in arvis prope Glastenbury, in comitatu Somersetensi et Marshfield in Sussexia. ♂. VII.

3. **BROMUS** panicula subsimplici erecta, spiculis ovato- *erectis* oblongis, floribus acuminato-aristatis glabris.

Bromus racemo simplicissimo, pedunculis unifloris, floribus subsexfloris laevibus aristatis. *Sp. pl. 114?*

Festuca avenacea sterilis spicis erectis. *R. Syn. 413.* *Pluk. ph. t. 299. f. 2.*

Festuca avenacea sterilis, pediculis brevibus et spicis erectis. *Hist. Ox. III. 212. t. 7. f. 13.*

- arvensis.* β *Bromus panicula* nutante, spiculis ovato-oblongis.
Sp. pl. 113. Fl. suec. 97?
Festuca elatior paniculis minus sparsis, locustis oblongis strigosis, aristis purpureis splendentibus. *R.*
Syn. 414.
Anglis, upright Brome-grass.
Habitat in pratis et pascuis cretaceis frequens $\beta.$ *in arvis.*
4. VI. VII.
Obs. Folia plana, et in locis siccioribus involuta, pilosa;
Panicula simplex β basi subramosa glabra, Spiculis ovato-oblongis lœvibus, flosculi a quinque ad octo aristati;
aristis rectis brevibus.
- muralis.* 4. *BROMUS* panicula patulo-erecta simplici, spiculis linearibus, floribus acuminatis scabris, aristis longis.
Bromus panicula patulo-erecta, spiculis linearibus: intermediis geminis, pedicellis incrassatis. *Amæn.*
ac. IV. 265. Sp. pl. 114.
Bromus sterilis, erecta panicula major. *Barr. ic. 76.*
f. I.
Gramen bromoides pumilum, locustis erectis majoribus aristatis. *Sch. agr. 260.*
Anglis, wall Brome-grass.
Habitat in muris antiquis; circa Londinum et Oxonium. $\odot.$ V.
Desc. Radix annua, fibrosa; Culmi plures pedales erecti, teretes, villosi. Folia petiolata, ensiformia, villosa; Petiolus vaginans, villosus. Stipula membranacea, obtusa. Panicula subsimplex, parte florente patula, deflorata erecta. Pedunculi subunispiculi, scabri. Spiculæ lineares; Gluma multiflora, bivalvis, inæqualis carinata, carina scabra. Corolla bivalvis, inæqualis; Valvula exterior, aristata, villosa-scabra, acuta carinata, arista longa, scabra. Valvula interior oblonga, ciliata, obtusa, plana; variat colore, viridi et rubente.
Conf. *Bromus rubens?*
- sterilis.* 5. *BROMUS* panicula nutante ramosa, ramis quaternis, spiculis oblongis, glumis subulato-aristatis.
Bromus panicula patula, spiculis oblongis distichis, glumis subulato-aristatis. *Sp. pl. 113.*

Festuca

TRIANDRIA DIGYNIA.

51

Festuca avenacea sterilis elatior seu Bromos Dioscoridis. *B. pin.* 9. *Th.* 146. *Hist. Ox.* III. 212. *t.* 7. *f.* 11. *R. Syn.* 412.

Bromos herba sive avena sterilis. *Park.* 1147.

Bromos sterilis. *Ger. em.* 76.

Anglis, barren Brome-grass.

Habitat in sylvis, sepibus et ad margines agrorum frequens. *Θ.* VI. VII.

6. **BROMUS** panicula ramosa nutante, ramis binatis, *giganteus.* spiculis subquadifloris, arista brevioribus.

Bromus panicula nutante, spiculis quadrifloris aristis brevibus. *Fl. suec.* 99. *It. scan.* 394. *Sp. pl.* 114. *Schr. gr.* 88. *t.* 11.

Bromus glaber, loculis quadrifloris nutantibus, aristis longissimis. *Hall. hist.* 1510.

Gramen sylvaticum glabrum panicula recurva. *Vaill. parif.* 93. *t.* 18 *f.* 3.

Gramen avenaceum glabrum, panicula e spicis raris strigosis composita, aristis tenuissimis. *R. Syn.* 415.

Gramen bromoides aquaticum latifolium, panicula sparsa tenuissime aristata. *Sch. agr.* 264. *t.* 5. *f.* 17.

Anglis, tall Brome-grass.

Habitat in sylvis et sepibus subhumidis. 4. VII. VIII.

Obs. habet multa communia cum sequente; an species distincta?

BROMUS panicula ramosa nutante scabra, ramis bi-*nemoralis.* natis, spiculis linearibus teretibus arista longioribus.

Bromus foliis hirsutis, per oras asperrimis, loculis glabris, teretibus, novemfloris. *Hall. hist.* 1503.

Festuca graminea nemoralis latifolia mollis. *B. pin.* 9. *Th.* 144.

Gramen avenaceum dumetorum, panicula sparsa. *R. syn.* 415.

Gramen avenaceum dumetorum, juba longiore, spica divisa. *Hist. Ox.* III. 213. *t.* 7. *f.* 27.

Anglis, wood Brome-grass.

Habitat in sylvis et sepibus frequens. Θ. VII. VIII.

A V E N A. 91.

Cal. bivalvis, multiflorus; arista dorsali contorta.

E 2

1. AVENA

TRIANDRIA DIGYNIA.

- nuda.* 1. AVENA paniculata, calycibus trifloris, receptaculo calycem excedente, petalis dorso aristatis. *Sp. pl.* 118.
Avena nuda. *B. pin.* 23. *hist. II.* 433. *Ger. em.* 75.
Park. 1134. *R. Syn.* 389.
Anglis, naked Oats or Pilcorn.
Habitat in arvis sed rarius. *In extrema Cornubia prope Belerium, promontorium copiose seritur.* *R. Syn.* in Staffordshire, Dr. Plot. *O. VII.*
- fatua.* 2. AVENA paniculata, calycibus trifloris, flosculis basi pilosis: aristis totis lœvibus. *Sp. pl.* 118. *Fl. suec.* 101.
Avena sylvestris pilosa, aristis recurvis. *Hist. Ox. III.* 209. *t. 7. f. 5.*
Avena triantha, locustis patulis, folliculis villosis.
Hall. hist. 1495.
Festuca utriculis lanagine flavescentibus. *B. pin.* 10.
Ægilops quibusdam aristis recurvis, s. Avena pilosa.
B. hist. II. 433. *R. Syn.* 489.
Ægilops bromoides. *Ger. em.* 77. Belgarum. *Park.* 1148.
Anglis, bearded Oat-grass.
Habitat in arvis. *O. VII. VIII.*
- pratensis.* 3. AVENA pânicula simplici, glumis quinquefloris, foliis involutis nudis.
Avena subspicata, calycibus quinquefloris. *Sp. pl.* 119.
Avena petiolis unifloris, brevibus, locustis teretibus quinquefloris, basi pubescentibus. *Hall. hist.* 1499.
Gramen avenaceum montanum, spica simplici, aristis recurvis. *R. syn.* 405. *t. 21. f. 1.*
Anglis, meadow Oat-grass.
Habitat in ericetis, pratis montosis præsertim solo cretaceo.
4. VII.
- pubescens.* 4. AVENA panicula ramosa, glumis subtrifloris, receptaculis barbatis, foliis planis pubescentibus.
Avena calycibus subtrifloris basi pilosis, foliis planis pubescentibus. *Fl. angl.* 42. *Sp. pl.* 1165.
Avena triantha, locustis teretibus erectis, petalis se- riceis, gluma exteriori lacera. *Hall. hist.* 1498.
Gramen avenaceum hirsutum, pânicula purpuro-ar- gentea splendente. *R. Syn.* 406. *t. 21. f. 2.*
Anglis,

Anglis, rough Oat-grass.

Habitat in pratis et pascuis cretaceis, prope Northfleet et supra Banstead Downs copiose. 4. VI.

5. AVENA panicula laxa, calycibus trifloris brevibus, flavescentes.
flocculis omnibus aristatis. Sp. pl. 118. Schreb. gram.
76. t. 9.

Avena triantha, locustis teretibus, calycina gluma altera minima, petiolo villoso. Hall. hist. 1497.

Gramen avenaceum pratense elatius, panicula flavescente, locustis parvis. R. Syn. 407. Sch. agr. 223.

Gramen avenaceum, spica sparsa flavescente, locustis parvis. Hist. Ox. III. 215. t. 7. f. 24.

Anglis, yellow Oat-grass.

Habitat in pratis et pascuis. 4. VII.

Obs. variat gluma biflora.

6. AVENA paniculata, calycibus bifloris, flocculo her- elatior.
maphrodito submutico, masculo aristato. Sp. pl. 116.
Schreb. gram. 25. t. 1.

Avena diantha, folliculis basi villosis, majoris arista geniculata. Hall. hist. 1492.

Gramen caninum nodosum. Ger. em. 23. f. bulbosum vulgare. Park. 1175.

Gramen nodosum avenacea panicula. B. pin. 2. pr. 3.
R. Syn. 406.

Gramen avenaceum elatius, juba longa splendente.
R. meth. 179.

Anglis, tall Oat-grass.

Habitat in pratis et pascuis. 4. VI.—VIII.

ARUNDO. 93.

Cal. bivalvis. Flocculi congesti, lana cincti.

1. ARUNDO calycibus quinquefloris, panicula laxa. phragmites.
Roy. lugdb. 66. Gron. virg. 137. Sp. pl. 120. tes.

Arundo foliis secantibus, locustis trifloris, papposis,
muticis. Hall. hist. 1515.

Arundo vulgaris s. phragmites Dioscoridis. B. pin. 17.

Arundo vallatoria. Ger. em. 36. R. Syn. 401.

Arundo vulgaris sive vallatoria. Park. 1208.

TRIANDRIA DIGYNIA.

Anglis, common Reed-grass.

Habitat in fluviis, lacubus, fossis. 4. VII.

Calama- 2. ARUNDO calycibus unifloris lœvibus, corollis
grostis. lanuginosis, culmo ramoso. Sp. pl. 120. Fl. dan.
280.

Arundo locustis unifloris, muticis, panicula alterne
contracta. Hall. hist. 1519.

Gramen arundinaceum, panicula molli spadicea, ma-
jus. B. pin. 7. Sch. agr. pr. t. 5. R. Syn. 401.

Gramen tomentosum arundinaceum. Ger. em. 9.

Calamagrostis s. gramen tomentosum. Park. 1182.

Anglis, wood Reed-grass.

Habitat in sylvis et sepibus subhumidis. Inter Newing-
ton et Hornsey. 4. VI. VII.

Obs. nunquam vidi culmo ramoso.

epigejos. 3. ARUNDO calycibus unifloris, panicula erecta, fo-
liis subtus glabris. Sp. pl. 120. Fl. suec. 106.

Arundo locustis unifloris, sericeis, muticis, panicula
stricta. Hall. hist. 1520.

Gramen arundinaceum paniculatum montanum, pa-
nicula spadiceo-viridi, semine papposo. Sch agr. 124.

Calamagrostis minor glumis rufis et viridibus. Pet.
conc. gr. n. 69. R. Syn. 401.

Anglis, small Reed-grafts.

Habitat in sylvis et sepibus humidis, circa Oundle in co-
mitatu Leicesterensi. R. syn. circa Ranaugh in Nor-
folk. 4. VI. VII.

arenaria. 4. ARUNDO calycibus unifloris, foliis involutis mu-
cronato-pungentibus. Sp. pl. 121.

Gramen sparteum spicatum, foliis mucronatis longio-
ribus vel spica fecalina. B. pin. 5. th. 67. R. Syn.
393.

Spartum marinum nostras. Park. 1198.

Spartum anglicanum. Ger. em. 42.

Anglis, sea Reed-grass.

Habitat in littoribus maritimis arenosis. 4. VI. VII.

LOLIUM. 95.

Cal. monophyllus, fixus, multiflorus.

1. LOLIUM spica mutica, spiculis calyce longioribus. *perenne.*

Lolium spica mutica : spiculis compressis multifloris.

Sp. pl. 122.

Lolium radice perenni, locustis contiguis, octofloris.

Hall. hist. 1416.

Gramen loliaceum angustiore folio et spica. *B. pin. 9.*

R. Syn. 395. Sch. agr. 255.

Lolium rubrum. *Ger. em. 78. f. Phœnix. Park. 1145.*

β Lolium spica mutica tereti, spiculis trifloris. *Sp. pl. 122. tenue.*

δ Gramen loliaceum paniculatum. *R. syn. 595.*

Anglis, perennial Darnel-grass.

Habitat in pratis et pascuis, et ad vias. 4. VI.

2. LOLIUM spica subaristata, spiculis calyce æqualibus. *temulen-*

Lolium spica aristata : spiculis compressis multifloris. *tum.*

Sp. pl. 122.

Lolium annum, locustis diffitis. *Hall. hist. 1420.*

Lolium album. *Ger. em. 78. Park. 1146. R. Syn.*

396.

Gramen loliaceum spica longiore. *B. pin. 9. th. 121.*

Anglis, annual Darnel-grass.

Habitat in arvis. 0. VII.

3. LOLIUM panicula secunda simplici, spiculis aristatis. *bromoides.*

Festuca avenacea sterilis paniculis confertis erectioribus aristis brevioribus. *R. Syn. 413. t. 16. f. 2.*

Festuca avenacea sterilis humillima, spica unam partem spectante. *Pet. Conc. gr. n. 101.*

Anglis, sea Darnel-grass.

Habitat in littoribus maritimis, in arena mobili. 0.

V. VI.

Desc. Radix annua fibrosa. Culmi plures a semiper-
dales ad pedalem, obliqui, tereti, glabri, subramosi.
Folia petiolata ensiformia subinvoluta, acuta, nuda,
petiolo valde breviora. Petiolus vaginans, ventricosus,
nudus. Stipula membranacea obtusiuscula. Panicula
secunda, simplex; Spiculæ pedunculatæ, lineares, a
quatuor ad octo flores. Pedunculis brevibus incrassa-
tis,

TRIANDRIA DIGYNIA.

tis, scabris. Guma univalvis, linearis, concava, aristata. Corolla bivalvis, inæqualis : Valvula exterior major linearis, carinata, aristata, scabra, Valvula interior brevior, linearis, plana, mutica. Aristæ flosculo duplo longior.

ELYMUS. 56.

Cal. lateralis, bivalvis, aggregatus, multiflorus.

arenari- 1. *ELYMUS* spica erecta arcta, calycibus tomentosis flosculo longioribus. *Spec. pl. 122.*

Elymus foliis mucronato-pungentibus. *It. scan. 336.*
Gramen sparteum spicatum latifolium. *B. pin. 5.*
th. 67?

Spartum herba IV. *Batavicum.* *Clus. hist. 221?*
Anglis, sea Lyme-grass.

Habitat in littoribus maritimis, in arena mobili, in Insula Bute; et prope Exmouth, in Devonia. *¶. VII.*
VIII.

HORDIUM. 98.

Cal. lateralis, bivalvis, uniflorus, ternus.

murinum. 1. *HORDEUM* flosculis lateralibus masculis aristatis, involucris intermediis ciliatis. *Sp. pl. 126.*

Hordeum spica crassa, longe aristata, calycinis glumis aristatis. *Hall. hist. 1536.*

Hordeum spureum vulgare. *Park. 1147.*

Gramen secalinum et secale sylvestre. *Ger. em. 73.*
R. Syn. 391.

Gramen hordeaceum minus et vulgare. *B. pin. 9.*

Anglis, wall Barley-grass, or Way-bennet.

Habitat ad vias et muros. *◎. IV.—VIII.*

pratense. 2. *HORDEUM* flosculis lateralibus masculis muticis, involucris setaceis scabris. *Sp. pl. 126.*

Hordeum spica disticha, foliculo brevi, glumis calycinis aristatis. *Hall. hist. 1538.*

Gramen secalinum. *Ger. em. 73.* *R. Syn. 392.* *majus et minus.* *Park. 1144.*

Gramen secalinum minus pratense. *Hist. Ox. III.*
179. t. 2. f. 6.

Anglis, meadow Barley-grass.

Habitat in pratis et pascuis humidiisculis. 4. VI.

3. HORDEUM flosculis lateralibus masculis aristatis, marinum.
involucro interno florum lateralium semiovato.

Gramen secalinum palustre et maritimum. R. syn. 392.

Gramen secalinum maritimum minus. Hist. Ox. III.

179. t. 6. f. 5.

Anglis, sea Barley-grass.

Habitat in pratis et pascuis. O. V. VI.

4. HORDEUM flosculis omnibus hermaphroditis ari-sylvati-
statis; involucris basi connatis arista brevioribus. cum.

Elymus spica erecta: spiculis bifloris involucro æqua-europæ-
libus. Mantiss. I. 35. us.

Gramen secalinum majus sylvaticum. R. syn. 392.

Hist. Ox. III. 180.

Gramen secalinum maximum. Park. 1144. Merr.

Gramen hordeaceum montanum. f. majus. B. pin. 9.

Gramen hordeaceum montanum, spica istrigosiore,
brevius aristata. Sch. agr. 16. pr. t. 1. f. bona.

Anglis, wood Barley-grass.

Habitat in sylvis, solo calcareo. In Stoken-Church
Woods, Oxfordshire, circa Marlow et Henley.

4. VI.

Obs. Pedicellus in omnibus speciebus elongatus in fulco
longitudinali florum reconditus, ut alteram foliolam in-
volucri appareat, et subinde florem abortivum sustinet.

TRITICUM. 99.

Cal. bivalvis, solitarius, subtriflorus. Flos obtusius-
culus, acutus.

I. TRITICUM calycibus subulatis multifloris, floscu-repens.
lis mucronatis.

Triticum calycibus quadrifloris subulatis acuminatis
foliis planis. Sp. pl. 128. Schreb. grām. II. 24.
t. 26.

Gramen caninum. Ger. em. 23. vulgatius. Park. 1173.
Hist. Ox. III. 178. t. 1. f. 8.

Gramen caninum arvense. f. Gramen Dioscoridis.
B. pin. 1. th. 7.

Gramen

TRIANDRIA DIGYNIA.

Gramen spica triticea repens vulgare, caninum dictum. *R. syn.* 390.

Triticum radicibus repentibus vaginosis, foliis hirsutis, loculis quinquefloris. *Hall. hist.* 1426.

β Triticum radicibus repentibus, vaginosis, foliis hirsutis, loculis octofloris. *Hall. hist.* 1427.

γ Gramen caninum maritimum, spica triticea nostras. *R. syn.* 390.

Anglis, common Wheat-grass; Dog's-grass, Quick-grass, or Couch-grass.

Habitat in agris. γ in littoribus maritimis. 4. VI.—
Pharmac. Graminis canini Radix.

Obs. variat calycibus a tribus ad octo flores flosculis acuminatis, in γ mucronato-aristatis et subinde aristatis. Foliis in γ glaucis, rigidis, pungentibus.

caninum. 1. TRITICUM calycibus subulatis subquadrifloris, flosculis aristatis.

Triticum radice fibrosa, foliis hirsutis, loculis quinquefloris aristatis. *Hall. hist.* 1429.

caninus. Elymus spica nutante arcta, spiculis rectis involucro destitutis: infimis geminis. *Sp. pl.* 124. *Fl. suec.* 122.

Gramen caninum aristatum radice non repente, sylvaticum. *R. syn.* 390.

Gramen caninum non repens elatius, spica aristata.

Hist. Ox. III. 177. t. I. f. 2.

Anglis, bearded Wheat-grass.

Habitat in sylvis et sepibus, inter Greenwich et Woolwich. 4. VI. VII.

junceum. 3. TRITICUM calycibus truncatis quinquefloris, foliis involutis. *Sp. pl.* 128. *Cent. pl.* 13.

Gramen maritimum, spica loliacea foliis pungentibus nostras. *Pluk. ph. t.* 33. f. 4. *R. syn.* 391.

Gramen phænicoides foliis convolutis, junceis ac pungentibus alterum. *B. hist.* II. 478.

β Gramen loliaceum maritimum supinum, spica foliacea. *R. Syn.* 391.

γ Gramen caninum maritimum, spica foliacea. *R. f.* 391.
Anglis, sea Wheat-grass.

Habitat in littoribus maritimis passim. 4. VI. VII.

CYNO-

CYNOSURUS. 87.

Cal. bivalvis, multiflorus; Receptaculum proprium unilaterale, foliaceum.

1. CYNOSURUS bracteis pinnatifidis. *Sp. pl.* 105. *cristatus.*
Fl. suec. 88. *Roy lugdb.* 64. *Screb. gram.* 69. *t.* 8.
f. 1.

Gramen cristatum. *B. hist.* II. 468. *Ger.* em. 29.
R. syn. 328. *anglicum.* *Park.* 1159.

Gramen pratense cristatum, f. Gramen spica cristata
læve. *B. pin.* 3. *th.* 43.

2. Gramen cristatum quadratum, f. quatuor cristatum
glumarum versibus. *R. syn.* 399.

Anglis, crested Dog-tail-grass.

Habitat in pratis et pascuis. 4. VII. VIII.

2. CYNOSURUS bracteis pinnato-paleaceis aristatis. *echinatus.*
Sp. pl. 105. *Roy. lugdb.* 64.

Gramen alopecuroides spica aspera. *B. pin.* 4. *brevi.*
Park. 1168. *R. syn.* 397.

Anglis, rough Dog-tail-grass.

Habitat in arenosis. Common on all the sandy grounds in
Jersey; Mr. J. Sherard. prope Sandwich. ①. VII.

3. CYNOSURUS bracteis integris. *Sp. pl.* 95. *cæruleus.*

Selleria cærulea. *Scop.* *Fl. carn.* 63. *Adans. fam.*
Pl. II. 496. culmo simplici, spica subcylindrica.

Ard. Spec. II. *t.* 6. *f.* 3, 4, 5.

Selleria locustis trifloris imbricatis, flore tricorni. *Hall.*
hist. 1446.

Gramen glumis variis. *B. pin.* 10. *pr.* 21. *Sch.* 83.

Gramen parvum montanum, spica crassiore purpureo-
cæruleo brevi. *R. syn.* 399.

Anglis, blue Dog-tail-grass.

Habitat in pratis montosis, in comitatibus Eboracensi,
Westmorlandico et Cumberlandico paſſim. 4. V.
VI.

TRIANDRIA TRIGYNIA.

TRIGYNA.

MONTIA. 101.

Cal. diphyllus. *Cor.* monopetala, irregularis, *Caps.* unilocularis, trivalvis.

- fontana.* 1. MONTIA. *Sp. pl.* 129. *Fl. lapp.* 30. *Suec.* 115.
Hall. hist. 301. *aquatica minor.* *Mich. gen.* 18. t. 13.
f. 2.
Cameraria arvensis minor. *Dill. giss.* 46.
Alsine parva palustris tricoccos, *portulacæ aquaticæ*
similis. *R. Syn.* 352.
Portulaca arvensis. *B. pin.* 282.
Anglis, Water-chickweed.
Habitat ad fontes et scaturigines. ○. IV. V.

POLYCARPON. 105.

Cal. pentaphyllus. *Petala quinque,* minima, ovata ;
Caps. unilocularis, trivalvis.

- tetraphyl-* 1. POLYCARPON. *Sp. pl.* 131. *Gouan. Fl. mons.* 211.
lum. *Mollugo* *foliis quaternis obovatis,* *paniculis dichoto-*
mis. *Hort. cliff.* 28.
Anthyllis marina alsinefolia. *B. pin.* 282.
Anthyllis alsinefolia polygonoides major. *Barr. car.*
103. t. 534.
Anglis, four-leaved Polycarpon.
Habitat in pratis aridis et locis arenosis, circa Lymston
prope Exeter, in Devonia; et in Insula Portlandica.
○. V.—VIII.
Obs. variat floribus apetalis.

Classis

Classis IV.

TETRANDRIA
MONOGYNIA.

* Flores monopetali, monospermi, superi. Aggregati.

DIPSACUS. 114.

Cal. communis polyphyllus; proprius superus. Receptaculum paleaceum.

1. DIPSACUS foliis sessilibus serratis. *Sp. pl. 140. fullonum.*
Dipsacus foliis sessilibus serratis, aristis fructus erectis. sylvestris.
Fl. angl. 49.

*Dipsacus capitulis ovatis, foliis arcuatis circumvallatis,
aristis squamarum rectis. Hall. hist. 198.*

*Dipsacus sylvestris. Ger. em. 1167. Park. 984. R. syn.
192. aut Virga pastoris major. B. pin. 385.*

β *Dipsacus foliis sessilibus serratis, aristis fructus recurvatis.*
vis. *Fl. angl. 49.*

*Dipsacus sativus. Ger. em. 1167. Park. 983. B. pin.
385. R. syn. 192.*

Carduus fullonum. Lob. ic. 17.

Anglis, wild β manured Teasel.

Habitat ad sepes. J. & VII.

Pharmac. Dipsaci sativi Radix.

2. DIPSACUS foliis petiolatis appendiculatis. *Sp. pl. pilosus.
141.*

*Dipsacus foliis biauribus, capitulis hemisphaericis.
Hall. hist. 199.*

*Dipsacus sylvestris capitulo minore, vel Virga pastoris
minor. B. pin. 385.*

*Dipsacus minor s. virga pastoris. Ger. em. 1168. R.
syn. 192.*

Virga Pastoris. Park. 984. Cam. epit. 433.

Anglis,

TETRANDRIA MONOGYNIA.

Anglis, small Teasel.

Habitat in aquosis et ad sepes. 4. VIII.

SCABIOSA. 115.

Cal. communis polyphyllus; proprius duplex superus.
Receptaculum paleaceum s. nudum.

succisa. 1. SCABIOSA corollulis quadrifidis æqualibus, caule simplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis integerrimis. *Mat. Med.* 41. *Sp. pl.* 142. *Fl. dan.* 279.

Succisa caule trifloro, floribus convexis, foliis radicibus ovatis, caulinis lanceolatis. *Hall. hist.* 201.

Succisa glabra et hirsuta. *B. pin.* 269.

Scabiosa radice succisa, flore globoſo. *R. syn.* 191.

Morsus Diaboli. *Ger. em.* 726. vulgaris flore purpureo. *Park.* 491.

Anglis, Devil's-bit Scabious.

Habitat in pratis, pascuis et sylvis. 4. VI—VIII.

arvensis. 2. SCABIOSA corollulis quadrifidis radiantibus, caule hispido, foliis pinnatifidis: lobis distantibus. *Sp. pl.* 143. *Fl. Suec.* 117. *dan.* 447.

Scabiosa foliis petiolatis, ovato-lanceolatis dentatis, superioribus semipinnatis. *Hall. hist.* 206.

Scabiosa major vulgaris. *Ger. em.* 719.

Scabiosa vulgaris pratensis. *Park.* 484.

Scabiosa major communior folio laciniato. *B. hist.* III. 2. *R. syn.* 191.

Anglis, field Scabious.

Habitat in pratis et arvis. 4. VIII.

Pharmac. Scabiosæ Herba.

columba- 3. SCABIOSA corollulis quinquefidis radiantibus, foliis radicalibus ovatis, crenatis, caulinis pinnatis setaceis. *Sp. pl.* 143. *Fl. suec.* 118. *dan.* 314.

Scabiosa minor. *Cam. epit.* 711. s. Columbaria. *Ger. m.* 719.

Scabiosa minor campestris. *Park.* 484. *R. syn.* 191.

Scabiosa capitulo globoso major et minor. *B. pin.* 270.

Succisa foliis imis ovatis, superioribus pinnatis, pinnis semipinnatis acutis, ciliis flosculorum longitudine.

Hall. hist. 202.

Anglis,

TETRANDRIA MONOGYNIA.

63

Anglis, small Scabious.

Habitat in pratis et pascuis, solo calcareo. 4. VI.—VIII.

** *Flores monopetali, monocarpi, inferi.*

CENTUNCULUS. 145.

Cal. quadrifidus. *Cor.* quadrifida, patens. *Stam.* brevia *Caps.* unilocularis, circumscissa.

1. CENTUNCULUS. *Cat. giss.* 161. t. 5. *R. syn.* I. *minimus.*

Sp. pl. 169. *Hall. hist.* 627. *Fl. Dan.* 177.

Anagallis paludosa minima, foliis subrotundis alternis.

Vaill. paris. 12. t. 4. f. 2.

Alpine palustris minima, flosculis albis, fructu corian-
dri exiguo. *Menz. pug.* t. 4. f. 5.

Anglis, small Centunculus.

Habitat in locis arenosis subhumidis. Hounslow-heath.

D. Watson. in pascuo ante vicum Chiszelhurst. *R.*
syn. prope Hampton-court. ○. VI.

PLANTAGO. 142.

Cal. quadrifidus. *Cor.* quadrifida: limbo reflexo. *Sta-*
mina longissima, *Caps.* bilocularis, circumscissa.

1. PLANTAGO foliis ovatis glabris, scapo tereti, spica major.

flosculis imbricatis. *Sp. pl.* 163. *Fl. dan.* 461.

Plantago foliis petiolatis, ovatis, glabris, spica cylindrica. *Hall. hist.* 660.

Plantago latifolia. *Ger. em.* 419. sinuata. *B. pin.* 189.

Plantago latifolia vulgaris. *Park.* 493. *R. syn.* 314.

β Plantago latifolia glabra minor. *B. pin.* 189. *R. syn.*
314.

γ Plantago major panicula sparsa. *B. hist.* III. 503. *R.*
syn. 314.

δ Plantago latifolia rosea, foliis quasi in spica disposi-
tis. *B. pin.* 181.

Anglis, great γ besom δ rose Plantain.

Habitat in pratis et ad vias ubique. ○. V—VIII.

Pharmac. Plantaginis Herba, Semina.

2. PLANTAGO foliis ovato-danceolatis pubescentibus, media.
scapo

TETRANDRIA MONOGYNIA.

scapo tereti, spica cylindrica. Sp. pl. 163. Hall. 472.
Fl. dan. 581.

Plantago major incana. Park. 493. R. syn. 314.

Plantago incana. Ger. em. 419.

Plantago latifolia incana. B. pin. 189.

Anglis, hoary Plantain.

Habitat in pascuis et pratis; solo calcareo. 4. V—VIII.

lanceola- 3. PLANTAGO foliis lanceolatis, spica subovata nuda,
ta. scapo angulato. Sp. pl. 164. Hall. hist. 656. Fl. dan.
437.

Plantago quinquenervia. Ger. em. 422. R. syn. 314.
major. Park. 495.

Plantago angustifolia major. B. pin. 189.

β Plantago angustifolia minor. Tab. ic. 732. Ger. 420.
Anglis, Ribwort-plantain.

Habitat in pratis et pascuis. 4. VI.

mariti- 4. PLANTAGO foliis linearibus subintegerrimis basi
ma. lanatis, spica cylindrica, scapo tereti.

Plantago foliis semicylindraceis integerrimis basi la-
natis, scapo tereti. Sp. pl. 165. Fl. dan. 243.

Coronopus. Ger. em. 425. maritima major. B. pin.
190.

lœflin- β Plantago foliis linearibus subdentatis, scapo tereti,
gia. spica cylindrica, bracteis carinatis membranaceis.
Fl. angl. 52. Sp. pl. 166. Lœfl. hisp. 124.

Plantago marina. Ger. em. 423. R. syn. 315. vulgaris.
498.

γ Plantago alpina angustifolia. B. hist. III. 506. R. syn.
315.

Anglis, sea, β narrow, γ . mountain Plantain.

Habitat in littoribus maritimis. γ in rupibus Tryghfyl-
chau prope Llanberis R. Syn. in montibus prope Set-
tle in comitatu Eboracensi. 4. VII. VIII.

Obs. Folia in α linearia crassa subinde subtus convexa.
in γ Folia subinde rariter dentata in δ rigidiuscula acu-
ta et in aridis involuta. Spica variat in aridis oblonga
et in plantis minimis subrotunda.

Carono- PLANTAGO foliis linearibus pinnato-dentatis, scapo
pus. tereti. Fl. angl. 52. Dan. 272.

Plantago

TETRANDRIA MONOGYNIA.

65

Plantago foliis linearibus dentatis, scapo tereti. *Sp. pl.*

166. *Fl. Suec.* 134.

Plantago foliis subhirsutis, semipinnatis, pinnis raris lanceolatis. *Hall. hist.* 658.

Plantago foliis laciniatis, Coronopus dicta. *R. syn.* 315.

Coronopus vulgaris s. Cornu cervinum. *Park.* 502.

Coronopus sylvestris hirsutior. *B. pin.* 190.

Cornu Cervinum. *Ger. em.* 316.

β Plantago coronopus dicta, foliis hirsutioribus magis lacinatis, capitulis brevibus laxis. *Blackf. spec.* 76.

γ Plantago graminea folio hirsuto minor, capitulo rotundo brevi. *R. syn.* 316.

Anglis, Buckshorn-plantain, Star of the Earth.

Habitat in glareosis, γ in pratis aridis maritimis. ○.
VI—VIII.

Pharmac. Coronopi *Herba*.

Obs. Folia in γ. linearia integerrima, hirsuta, spica subrotunda.

*** Flores monopetali, monocarpi superi.

SANGUISORBA. 146.

Cal. diphyllus. *Germen* inter calycem corollamque.

1. SANGUISORBA spicis ovatis. *Sp. pl.* 169. *Fl. officinalis.* Dan. 97.

Sanguisorba major flore spadiceo. *B. hist.* III. 120.
R. syn. 203.

Pimpinella tetrastemon, spica brevi. *Hall. hist.* 705.

Pimpinella sylvestris. *Ger. em.* 1045.

Pimpinella major vulgaris. *Park.* 582.

Pimpinella sanguisorba, major. *B. pin.* 160.

Anglis, meadow sanguisorba, or Burnet-saxifrage.

Habitat in pratis et pascuis subhumidis. 4. VII. VIII.

**** Flores monopetali, dicocci, superi. Stellatæ.

RUBIA. 127.

Cor. monopetala, campanulata. *Baccæ* duæ, monospermæ.

1. RUBIA foliis perennantibus ellipticis, supra lævibus. *peregrina.*
Syst. nat. 119.

Rubia foliis quaternis. *Sp. pl.* 158. *Fl. angl.* 54.
F Rubia

TETRANDRIA MONOGYNIA.

Rubia foliis ellipticis, asperis, quinis senisque. *Hall.*
hist. 708.

Rubia sylvestris. *Park.* 274.

Rubia sylvestris aspera, quæ *sylvestris* *Dioscoridis.* *R.*
syn. 223.

Anglis, wild Madder.

Habitat in rupe S. Vincentii propè Bristolium et in De-
vonia frequens. *R.* *syn.* *prope Exmouth copiose.* 4.
VI. VII.

Obs. *variat* Foliis a quatuor ad octo lanceolatis. Co-
rolla pentaphylla; *Staminibus quinque;* *nimis affinis*
Rubiæ tinctorum. *an vere distincta sit species?*

SHERARDIA. 120.

Cor. monopetala infundibuliformis. Semina duo, tri-
dentata.

arvensis. 1. *SHERARDIA* foliis omnibus verticillatis, floribus
terminalibus. *Sp. pl.* 149. *Fl. dan.* 439.

Sherardia foliis senis, lanceolatis, floribus sessilibus,
umbellatis. *Hall. hist.* 734.

Rubeola arvensis repens cærulea. *B. pin.* 334. *R. syn.*
225.

Rubia minor pratinis cærulea. *Park.* 276.

Anglis, little Sherardia or Field-madder.

Habitat in arvis. ○. V—VIII.

ASPERULA. 121.

Cor. monopetala, infundibuliformis, sem. duo. globosa.

odorata. 1. *ASPERULA* foliis octonis lanceolatis, florum fasci-
culis pedunculatis. *Sp. pl.* 150. *Dalib. paris.* 46. *F.*
dan. 562.

Asperula caule erecto, foliis octonis; petiolis ramo-
sis erectis, seminibus hirsutis. *Hall. hist.* 728.

Asperula. *Ger. em.* II. 24. *R. syn.* 224. *odorata.*
Park. 563. flore albo. *Dod. pempt.* 355.

Asperula f. *Rubeola montana* *odorata.* *B. pin.* 334.

Anglis, sweet Woodroof.

Habitat in sylvis et umbrosis. 4. V.

Pharmac. *Asperulæ odoratæ* *Herbæ.*

cynanchi- 2. *ASPERULA* foliis quaternis linearibus: superioribus
oppositis;

oppositis; caule erecto; floribus quadrifidis. Sp. pl. 151.

Asperula caule flaccido, foliis linearibus quaternis, umbellulis petiolatis. Hall. hist. 729.

Asperula repens Gesneri s. *Saxifraga altera* Cæsalpini. Park. 453.

Rubia cynanchica. B. pin. 333. hist. III. 723.

Rubiola vulgaris quadrifoliâ lævis, floribus purpurantibus. Tourn. 130. R. syn. 225.

Anglis, small Woodroof or Squinancy-wort.

Habitat in pratis montosis siccioribus, præsertim cretaceis. 4. VI. VII.

G A L I U M. 125.

Cor. monopetala plana. *Sem.* duo, subrotunda.

* *Fructu glabro.*

1. *GALIUM* foliis inferioribus quaternis, obovatis, superiorebus senis linearibus, caule diffuso.

Galium foliis quaternis obovatis inæqualibus, caulis diffusis. Sp. pl. 153. Fl. suec. 126. dan. 423.

Galium caule radicato diffuso, foliis ovatis, obtusis, quaternis. Hall. hist. 719.

Gallium album. Ger. em. 1126. B. hist. III. 721.

Gallium palustre album. B. pin. 335.

Molluginis vulgatioris varietas minor. R. syn. 224.

Anglis, white Ladies Bedstraw.

Habitat in pratis et pascuis humidioribus et ad ripas fluviorum. 4. VII. VIII.

2. *GALIUM* foliis senis obovatis mucronatis glabris, monte caule prostrato, pedunculis trichotomis. Fl. angl. num. 56.

Galium caule angulosum, foliis senis, subasperis, aristatis. Hall. hist. 715.

Gallium album minus. Pet. Herb. br. t. 30. f. 6.

Mollugo montana minor Gallio albo similis. R. hist. I. 482. syn. 224. Hist. Ox. III. 331.

Anglis, mountain Ladies Bedstraw.

Habitat in ericetis, montosis. 4. VII. VIII.

TETRANDRIA MONOGYNIA.

- spurium.* 3. **GALIUM** foliis senis lanceolatis carinatis scabris retrorsum aculeatis, geniculis simplicibus, fructibus glabris. *Sp. pl.* 154.
Aparine femine læviore. *R. Syn.* 225. *hist.* 484.
Aparine lævis. *Park.* 567.
Anglis; corn Ladies Bedstraw.
Habitat in arvis in Insula Thanet. prope Leatherhead et alibi in comitatu Surriensi. et prope Stamford. ♂.
VI. VII.
- uligino-* 4. **GALIUM** foliis senis lanceolatis retrorsum serrato-aculeatis mucronatis rigidis, corollis fructu majoribus. *Fl. Suec.* 127. *Sp. pl.* 153.
Aparine palustris minor parisiensis, flore albo. *Vaill. par.* 14. *R. syn.* 225.
Rubia quædam minor. *B. hist.* III. 2. 716.
Anglis, marsh Ladies Bedstraw.
Habitat in pratis, pascuis et ericetis humidiusculis. ♀.
VII.
Obs. Variat foliis septenis et octonis.
- erectum.* 5. **GALIUM** foliis suboctonis lanceolatis aculeato-serrulatis mucronatis, paniculis trichotomis, caule scabro flaccido.
Galium austriacum. *Jac. Fl. aust.* I. 51. t. 80.
Anglis, upright Ladies Bedstraw.
Habitat in pratis et pascuis subhumidis. ♀. VI. VII.
Desc. Radix perennis ramosa; Caules plures flaccidi, erectiusculi, geniculati: geniculis tumidis; quadranguli angulis scabriusculis; parum hirsuti, ramosi, ramis oppositis floriferis. Folia verticillata, octona, subinde sena, sessilia lanceolata et linearis-lanceolata, aculeato-serrulata, mucronata, nuda. Panicula terminalis trichotoma. Flores albi quadridi. Semina glabra, parva.
- Mollugo.* 6. **GALIUM** foliis octonis ovato-linearibus subserratis patentissimis mucronatis, caule flaccido, ramis patentibus. *Sp. pl.* 155. *Fl. dan.* 455.
Galium foliis octonis ellipticis, caule angulofo. *Hall. hist.* 711. *Scop. earn.* 104.
Mollugo vulgatior. *Park.* 565. *R. syn.* 223.
Rubia sylvestris. *Ger. em.* 1118. *lævis.* *B. pin.* 333.
Anglis,

TETRANDRIA MONOGYNIA.

69

Anglis, great Ladies Bedstraw, or bastard Madder.
Habitat in sepibus et ericetis frequens. 24. VI—VIII.

7. **GALIUM** foliis octonis hispidis linearibus acumina- *pusillum*.
tis subimbricatis, pedunculis dichotomis. Sp. pl. 154.
Rubeola saxatilis. B. pin. 334. pr. 145.
Aparine minima s. Rubia saxatilis minima. Mag.
mons. 291.

Anglis, least Ladies Bedstraw.

Habitat in montibus calcareis. prope Kendal, in comitatu
Westmorlandico. 24. VIII.

Desc. Radix ramosa perennis. Caules plures, digitales,
ramosi, quadranguli, angulis aculeato-scabris; Folia ver-
ticillata octona et septena lanceolata et linearia, scabra,
inferioribus imbricatis. Panicula subdichotoma. Flores
albi. Semina parva glabra. affinis Galio ulginoso.

8. **GALIUM** foliis subsenis, lanceolatis, aculeato-cili- *anglicum*.
atis acuminatis, reflexis, caulis diffusis retrorsum
aculeato-scabris, fructibus glabris.

Aparine minima. R. syn. 225. t. 9. f. 1.

Anglis, small Ladies Bedstraw, or Goose-grass.

Habitat in muris et pratis arenosis. inter Dartford et
Northfleet, et supra murum in oppido Farningham in
agro Cantiano. ○. VI. VII.

Desc. Radix annua ramosa. Caules pedales et sesquepe-
dales diffusi, tetragoni, angulis retrorsum aculeato-sca-
bris; geniculati ramosi, ramis alternis, floriferis opposi-
tis. Folia verticillata sena et septena reflexa lanceolata
et linear-lanceolata, margine aculeato-ciliata, acumina-
ta, nuda. Panicula terminalis, pedunculi trichotomi,
Flores viridi-lutei, tetrapetalii, parvi. Semina duo,
corolla majora, glabra.

9. **GALIUM** foliis octonis linearibus sulcatis, ramis verum.
floriferis brevibus. Sp. pl. 155. Mat. med. 46.

Galium foliis linearibus perangustis, octonis, racemis
multifloris spicatis. Hall. hist. 710.

Galium luteum. Ger. em. 1126. Park. 565. B. pin.
335. R. syn. 224. Mill. Ic. 125.

Anglis, yellow Ladies Bedstraw, or Cheese-rening.

TETRANDRIA MONOGYNIA.

Habitat in pratis et ad margines viarum agrorumque frequens. 4. VII. VIII.

Pharmac. Galii Herba.

** Fructu hispido.

boreale. 10. **GALIUM** foliis quaternis lanceolatis trinerviis glabris, caule suberecto, seminibus hispidis. Sp. pl. 156. Hall. hist. 722. Scop. carn. 102.

Rubia pratensis lœvis, acuto folio. B. pin. 333.

Mollugo montana erecta quadrifolia. R. syn. 224.

Anglis, cross-leaved Ladies Bedstraw.

Habitat in pratis montosis, in Westmorlandia et Cambria; prope Kirby-Lonsdale, supra Pontem, in rupibus prope Llanberys. 4. VII. VIII.

aparine. 11. **GALIUM** foliis octonis lanceolatis carinatis scabris retrorsum aculeatis, geniculis villosis, fructu hispido. Sp. pl. 157. Fl. dan. 495.

Galium caule ferrato, foliis senis linearibus, ferratis, petiolis unifloris. Hall. hist. 723.

Aparine. Ger. em. 1122. Dod. pempt. 353. R. syn. 225. vulgaris. Park. 567. B. pin. 334.

Anglis, common Ladies Bedstraw, Goose-grass or Cleavers.

Habitat in cultis et ruderatis frequens. O. V.—VIII.

Pharmac. Aparines Herba.

Flores tetrapetali superi.

CORNUS. 149.

Involucrum tetraphyllum sæpius. Petala supera quatuor. Drupa nucleo biloculari.

sanguinea. 1. **CORNUS** arborea, cymis nudis. It. W-goth. 32. Sp. pl. 171. Hall. hist. 816. Fl. dan. 481.

Cornus femina. Ger. em. 1467. Park. 1521. B. pin. 447. R. Syn. 460.

Anglis, female Cornel, Dog-berry, Gatter or Prickwood Tree.

Habitat in sylvis et sepibus. h. VI.

TETRANDRIA MONOGYNIA.

71

2. CORNUS herbacea, ramis binis. *Fl. lapp. 65. t. 5. herbacea.*
f. 3. Sp. pl. 171. Fl. dan. 5.
Cornus pumila herbacea, Chamæpericlymenum dicta.
Dill. elth. 108. t. 19.
Chamæpericlymenum. *Ger. em. 1296. Park. 1461.*
R. Syn. 261.
Periclymenum. humile. *B. pin. 302.*
Anglis, herbaceus Cornel.
Habitat in pratis et pascuis; in Northumbriæ montibus
Chevioticis dictis. *R. Syn. in Pickering-moor, et*
prope Tadcaster in comitatu Eboracensi. 4. VI. VII.
Flores incompleti, inferi.

ALCHEMILLA. 165.

Calyx octofidus. Cor. O. Sem. unicum.

1. ALCHEMILLA foliis lobatis. *Sp. pl. 178. vulgaris.*
Alchemilla foliis ferratis, palmatis, seminovemfidis.
Hall. hist. 1566.
Alchemilla. *Ger. em. 499. R. Syn. 158. vulgaris.*
B. pin. 319.
Alchemilla major vulgaris. *Park. 538.*
β Alchemilla foliis lobatis pubescentibus. *minor.*
Alchemilla alpina pubescens minor. *Tourn. 508.*
Pluk. ph. t. 240. f. 1.
Anglis, common β least Ladies Mantle.
Habitat in pratis et pascuis montosis. *4. VI.—VIII.*
Pharmac. Alchemillæ Herba.

2. ALCHEMILLA foliis digitatis ferratis. *Sp. pl. 179. alpina.*
Fl. dan. 49.
Alchemilla alpina pentaphyllos. *R. syn. 158.*
Pentaphyllum petrosum, Heptaphyllum, Clusii. *Ger.*
em. 988.
Tormentilla alpina folio sericeo. *B. pin. 326.*
Tormentilla argentea. *Park. 393.*
Anglis, cinquefoil Ladies Mantle.
Habitat in montosis. *In rupibus juxta stagnum Hul-*
water dictum inveni, non longe a Penrith Cumber-
landiæ oppido; non procul a Kendal in Westmor-
F 4 landia,

TETRANDRIA DIGYNIA.

landia, in vallicula umbrosa Longsledale dicta. D.
Richardson. *R. syn.* 4. VII.

APHANES. 166.

Cal. quadrifidus. Cor. O. Pist. unicum. Sem. duo,
nuda.

arvensis. 1. APHANES. *Fl. suec.* 143. *Sp. pl.* 179. *Gron.*
vir. 17.

Alchemilla hirsuta, foliis trilobatis, lobis bipartitis et
tripartitis. *Hall. hist.* 1569.

Percepier anglorum. *Lob.* 727. *Ger. em.* 1594. *R.*
syn. 159.

Polygonum selinoides. *Park.* 449.

Chærophyllo nonnihil similis. *B. pin.* 152.

Anglis, Pursley-pierl.

Habitat in arvis et pascuis glareofis. ○. V.—VIII.

DIGYNIA.

BUFONIA. 168.

Cal. tetraphyllus. Cor. tetrapetala. Caps. unilocularis disperma.

tenuifolia. 1. BUFONIA. *Sp. pl.* 179. *Sauv. monsp.* 141. *Gouan.*
Fl. monsp. 145. *Læft. it.* 44.

Alsine polygonides tenuifolia, flosculis ad longitudinem caulis velut in spicam dispositis. *Pluk. ph. t.*
75. f. 3. *R. syn.* 346.

Herniaria angustissimo gramineo folio erecta. *Magn.*
hort. 97. *t.* 97.

Anglis, small Buffonia.

Habitat in maritimis circa Bostoniam agri Lincolniensis.
R. syn. ○. V. VI.

TETRAGYNIA.

SAGINA. 176.

Cal. tetraphyllus. Petala quatuor. Caps. quadrilocularis, quadrivalvis.

1. SAGINA ramis procumbentibus, petalis brevissimis. *procum-*
Sp. pl. 185. Ard. sp. II. 23. t. 8. f. 2. *bens.*
Alfine tetraestemon, foliis connatis, lanceolatis. Hall.
hist. 861.
Alfinella muscosa flore repens. Cat. giss. 81. R. syn.
345.
Saxifraga anglicana alfine folio. Ger. em. 568.
Caryophyllum minimus muscosus nostras. Park. 1340.
 2. *Sagina caule erectiusculo pubescente, floribus alternis apetala.*
apetalis. Mantiss. II. 559.
Sagine caulibus erectis, radice annua, floribus apeta-
lis. Ard. spec. II. 22. t. 8. f. 1.
Saxifraga anglica alfinisfolia annua. Plot. Ox. t. 9.
f. 7. R. syn. 345.
Alfine saxifraga graminifolia, flosculis tetrapetalis
herbidis et mucosis. Pluk. ph. t. 74. f. 2.
Anglis, procumbent Pearl-work.
Habitat in muris et pratis arenosis ubique. ⊖. V.—VIII.
Obs. variat floribus apetalis.

 2. *SAGINA caule erecto unifloro triflorove. Sp. pl. 185. erecta.*
Alfinella foliis caryophylleis. Cat. giss. 47. R. syn.
344. t. 15. f. 4.
Alfine verna glabra. Vaill. parf. 6. t. 3. f. 2.
Anglis, upright Pearl-wort or least Stickwort.
Habitat in pascuis et ericetis glareosis. ⊖. V.

TILLÆA. 177.

Cal. tripartitus. Petala tria, Caps. tres, polyspermæ.

1. *TILLÆA procumbens. Sp. pl. 186.* *muscosa.*
Tillæa muscosa annua perfoliata. Mich. gen. 22. t. 20.
Craspula foliis sessilibus connatis, floribus aggregatis
in foliorum alis. Guett. stamp. I. 97.
Polygonum

TETRANDRIA TETRAGYNIA.

Polygonum muscosum minimum. Bocc. sic. 59? t. 29.
Anglis, procumbent Tillæa.

Habitat in pratis et ericetis arenosis; in ericetis Drayton
 et Mushold in comitatu Norfolk. D. Rose. circq;
 Bury in comitatu Suffolkiensi. D. Cullum. 4. V.
 VI.

POTAMOGETON. 174.

Cal. O. Petala quatuor. Stylus nullus. Sem. quatuor,
natans.

1. POTAMOGETON foliis oblongo-ovatis petiolatis
 natantibus. Sp. pl. 182. Fl. suec. 145.

Potamogeton foliis firmis, petiolatis; ovatis natanti-
 bus. Hall. hist. 843.

Potamogiton rotundifolium. B. pin. 193. R. syn. 148.
 Potamogiton latifolium. Ger. em. 821.

Fontinalis major latifolia vulgaris. Park. 1254.
Anglis, broad-leaved Pondweed.

Habitat in fluviis et stagnis frequens. 4. VII.

*perfolia-
 tum.* 2. POTAMOGETON foliis cordatis amplexicaulibus.
 Sp. pl. 182. Fl. suec. 145. dan. 196.

Potamogiton perfoliatum. R. hist. 181. syn. 149.

Potamogiton foliis tenuibus, cordatis, amplexicauli-
 bus. Hall. hist. 845.

Potamogiton foliis latis splendentibus. B. pin. 193.

Potamogeton tertium. Dod. 582. Ger. em. 122.

3. Potamogiton rotundifolium alterum. Lofel. fl. pr. 205.
 t. 65. Hall. hist. 844.

Anglis, perfoliate Pondweed.

Habitat in fluviis frequens. 4. VI. VIII.

lacens. 3. POTAMOGETON foliis lanceolatis planis in pe-
 tiolos desinentibus. Sp. pl. 183. Fl. dan. 195.

Potamogeton foliis tenuibus, longissime lanceolatis.
 Hall. hist. 847.

Potamogiton longis acutis foliis. Ger. em. 822.

Potamogiton foliis angustis splendentibus. B. pin. 193.

Potamogiton aquis immersum folio pellucido, lato,
 oblongo acuto. R. syn. 148.

Anglis, shining Pondweed.

Habitat in fluviis et lacubus. 4. VI. VII.

4. POTA-

TETRANDRIA TETRAGYNIA.

75

4. POTAMOGETON foliis lanceolatis alternis undulatis serratis. *Sp. pl.* 183. *Hall. hist.* 848.
Potamogiton s. *Fontinalis crispa*. *B. hist.* III. 788.
R. syn. 149.
Potamogiton foliis crispis s. *Laetula ranarum*. *B. pin.*
 193.
Tribulus aquaticus minor *Quercus floribus*. *Ger. em.*
 824.
Tribulus aquaticus minor prior. *Park.* 1248.
Anglis, curled Pondweed, or greater Water-caltrops.
Habitat in fluviis, fossis et stagnis. 24. V. VI.
5. POTAMOGETON foliis lanceolatis oppositis sub-serratum.
 undulatis, serrulatis. *Sp. pl.* 183.
Potamogeton foliis lanceolatis obscure undulatis, caulis longe ramosis. *Guett. Stamp.* I. 102.
Potamogeton foliis tenuibus ellipticis, nervis convergentibus. *Hall. hist.* 846.
Potamogeton folio angusto pellucido fere gramineo.
Doody. R. Syn. 148.
Potamogiton altera. *Dod.* 582.
Potamogiton longo serrato folio. *B. pin.* 193.
Anglis, serrated Pondweed.
Habitat in fluviis et stagnis. 24. VI.
Obs. Foliis superioribus oppositis, subinde inferioribus alternis. nimis affinis praecedenti.
6. POTAMOGETON foliis ovatis acuminatis oppo-*densum*:
 sitis confertis, caulis dichotomis, spica quadiflora.
Sp. pl. 182.
Potamogeton caule dichotomo, foliis conjugatis ellipticis, complicatis imbricatis. *Hall. hist.* 849.
Potamogiton s. *Fontalis media lucens*. *B. hist.* III.
 777? *R. syn.* 149.
Potamogiton foliis crispis s. *Laetula ranarum*. *B. pin.* 193.
Tribulus aquaticus minor Muscatellæ floribus. *Ger. em.* 823.
Tribulus aquaticus minor alter. *Park.* 1248.
Anglis, dichotomus Pondweed.
Habitat in fossis, stagnis, fluviis. 24. V. VI.
7. POTAMOGETON foliis linearibus obtusis, caule *compre-*
presso. *Sp. pl.* 183. *Fl. suec.* 149. *Dan.* 203. *sum.*
Potamogeton

TETRANDRIA TETRAGYNIA.

Potamogeton caulis compressis, foliis gramineis lanceolatis, spicis paucifloris. *Hall. hist.* 851.

Potamogiton caule compresso, folio graminis canini.
R. syn. 149. *Hist.* 189.

Anglis, flat Pondweed.

Habitat in fluviis leniter fluentibus et fossis: prope Cambridge. *R. syn. circa* Stains, Middlesex copiose. 4. VI. VII.

gramine- 8. **POTAMOGETON** foliis linear-lanceolatis alternis sessilibus stipula latioribus. *Sp. pl.* 184. *Fl. dan.* 222.

Potamogeton foliis gramineis, petiolis erectis, vaginis laxis, numerosissimis. *Hall. hist.* 850.

Potamogiton gramineum latiusculum, foliis et ramificationibus densissime stipatis. *Buddl. Hort. Sic. Vol.* 27. *R. syn.* 149. t. 4. f. 3.

Potamogiton gramineum latifolium. *Fl. pr.* 206. t. 66. *R. syn.* 149.

Potamogiton gramineum latum. *Pet. H. br.* t. 5. f. *Anglis,* grassy Pondweed.

Habitat in fluviis et fossis. prope Deptford. 4. VII.

pectina- 9. **POTAMOGETON** foliis setaceis parallelis approximatis distichis. *Sp. pl.* 183. *Fl. suec.* 150.

Potamogiton millefolium, seu foliis gramineis ramosum. *R. syn.* 150.

Potamogiton gramineum ramosum. *B. pin.* 193. *pr.* 101.

Potamogiton fluviatile longissimo gramineo folio nostras. *Pluk. Mant.* 155. *Amalth.* 177. *R. syn.* 150.

Millefolium tenuifolium. *Ger. em.* 828.

Anglis, fine Pondweed.

Habitat in fluviis. 4. VI. VII.

setaceum. 10. **POTAMOGETON** foliis lanceolatis oppositis acuminate. *Roy. lugdb.* 213. *Sp. pl.* 184.

Potamogiton ramosum angustifolium. *B. pin.* 193.
Anglis, setaceous Pondweed.

Habitat in fossis turfossis in comitatu Lancastriensi. 4. VII. VIII.

marinum. 11. **POTAMOGETON** foliis linearibus alternis distinctis

tinctis inferne vaginantibus. *Sp. pl. 184. Fl. dan.*
186.

Potamogeton caule tereti, foliis linearibus planis,
spica multiflora, senescente longissima et interrupta.
Hall. hist. 853.

Potamogeton ingens gramineo folio longiori. *Vaill.*
paris. t. 32. f. 3.

Potamogiton maritimum ramosissimum, grandiusculis
capitulis, capillaceo folio nostras. *Pluk. ph. t. 216.*
f. 5. R. syn. 150.

Anglis, sea Pondweed. *Pet. H. br. t. 5. f. 13.*

Habitat in fossis maritimis. In insula Shepey abunde.
4. VII. VIII.

12. POTAMOGETON foliis linearibus oppositis al- *pusillum*.
ternisque distinctis : basi patentibus, caule tereti.
Sp. pl. 184. Gouan. Fl. monsp. 148.

Potamogeton caule tereti, foliis perangustis, spicis
paucifloris minimis. *Hall. hist. 852.*

Potamogiton pusillum, gramineo folio, caule tereti.
R. syn. 150. hist. 190.

Potamogiton minimum capillaceo folio. *B. pin. 193.*

Potamogiton pusillum, gramineo folio breviore. *Vaill.*
paris. t. 32. f. 4.

Anglis, small Pondweed. *Pet. h. br. t. 5. f. 11.*

Habitat in fossis et stagnis. 4. VI—VIII.

R U P P I A. 175.

Cal. o. Cor. o. Sem. quatuor pedicellata.

I. RUPPIA. *It. W-goth. 186. Sp. pl. 184. Fl. suec. 154. maritima.*

Buccaferra maritima foliis acutissimis. Mich. gen. 72.

t. 35.

Potamogiton maritimum gramineis longioribus foliis
fructu fere umbellato. *Pluk. Alm. 305. R. syn. 135.*

Potamogiton maritimum pusillum alterum, seminibus
singulis longis pediculis insidentibus. *Pluk. ph. t.*
248. f. 4.

Anglis, sea Ruppia.

Habitat in fossis maritimis, in insula Shepey copiose. 4.
VII. VIII.

Classis V.

P E N T A N D R I A
M O N O G Y N I A.

* *Flores monopetali, inferi, tetraspermi. Asperifoliæ.*

M Y O S O T I S. 180.

*Cor. hypocrateriformis, quinquefida, emarginata :
fauce clausa fornicibus.*

- scorpioi-* 1. MYOSOTIS seminibus nudis, foliorum apicibus cal-
des. *Sp. pl.* 188. *Vir. cliff.* 149. *Fl. dan.* 583.
arvensis. Myosotis foliis hirsutis. *Hort. cliff.* 46.
Myosotis scorpioides hirsuta. *Ger. em.* 337. *Park.*
691. *R. syn.* 229.
Scorpiurus annuus, radice exigua. *Hall. hist.* 590.
Echium scorpioides arvense. *B. pin.* 254.
β. Myosotis scorpioides hirta minor. *Mer. pin.* *R. syn.*
229.
Echium scorpioides minus flosculis luteis. *B. pin.* 254.
γ. Myosotis scorpioides latifolia hirsuta. *Mer. pin.* *R. syn.*
229. t. 9. f. 2.
palustris. δ. Myosotis foliis glabris. *Hort. cliff.* 46.
Myosotis scorpioides palustre. *Ger.* 337. *R. syn.* 229.
Scorpiurus radice longa fibrata perenni. *Hall. hist.*
591.
Echium scorpioides palustre. *B. pin.* 254.
Anglis, mouse-ear Scorpion-grass.
Habitat in pratis aridis, δ in fossis, et ad scaturigines et
fontes. 24. IV—VIII.

L I T H O S P E R M U M. 181.

*Cor. infundibuliformis fauce perforata, nuda. Cal.
quinquepartitus.*

1. LITHOS-

1. LITHOSPERMUM seminibus lœvibus, corollis vix *officinale*.
calycem superantibus, foliis lanceolatis. Sp. pl.
189.

Lithospermum caule erecto, ramosissimo, floribus vix
calycem superantibus. Hall. hist. 595.

Lithospermum minus. Ger. em. 609. Matth. 918.

Lithospermum vulgare minus. Park. 432.

Lithospermum majus erectum. B. pin. 258.

Lithospermum s. milium solis. B. hist. III. 590. R.
syn. 228.

Anglis, common Gromwell or Greymill.

Habitat in nemorosis et locis aridis, solo calcareo, in sylva
Charlton Wood dicta in Cantio; D. Wilmer; 4.
V. VI.

Pharmac. Lithospermi Semina.

2. LITHOSPERMUM seminibus lœvibus, corollis *purpureo-*
calycem multoties superantibus. Sp. pl. 190. *Fac. cæruleum*.
Austr. I. t. 14.

Lithospermum caulibus decumbentibus radicatis, ra-
mis floralibus erectis. Hall. hist. 596.

Lithospermum majus. Ger. em. 609.

Lithospermum vulgare majus. Park. 258.

Lithospermum minus repens latifolium. B. pin. 258.

Lithospermum majus. Dodon. 83. flore purpureo, se-
mine Anchusæ. B. hist. III. 572. R. syn. 229.

Anglis, creeping Gromwell.

Habitat in pascuis montosis et nemorosis. On the top of a
bushy hill near Denbigh in Wales, near Taunton in
Somersetshire. R. syn. 4. V.

3. LITHOSPERMUM seminibus rugosis, corollis vix *arvense*.
calycem superantibus. Sp. pl. 190. Fl. dan. 456.

Lithospermum arvense radice rubra. Park. 432. B.
pin. 258. R. syn. 227. Fl. lapp. 73.

Heliotropium foliis lingulatis, floribus tubulosis. Hall.
hist. 594.

Anchusa degener facie milii solis. Ger. em. 610.

Anglis, corn Gromwell or bastard Alkanet.

Habitat in arvis frequens. 4. V—VII.

ANCHUSA. 182:

Cor. infundibuliformis fauce clausa fornicibus. *Sem.* basi insculpta.

semper-virens. I. ANCHUSA pedunculis diphyllis capitatis. *Sp. pl.* 192.

Buglossum latifolium semperfurens. *B. pin.* 256. *R.* *syn.* 227.

Borago semperfurens. *Ger. em.* 797.

Anglis, evergreen Alkanet.

Habitat in ruderatis. Near Hornsplace, near Rochester. *R. syn.* *Juxta Vauxhall prope Londinum, circa Norwich.* *D. Rose.* 4. V. VI.

CYNOGLOSSUM. 183.

Cor. infundibuliformis, fauce clausa fornicibus. *Sem.* depressa, inferiore tantum latere stylo affixa.

officinale. I. CYNOGLOSSUM staminibus corolla brevioribus, foliis lato-lanceolatis tomentosis sessilibus. *Sp. pl.* 192.

Cynoglossum foliis ellipticis, lanceolatis sericeis, caule folioso. *Hall. hist.* 587.

Cynoglossum majus vulgare. *Ger. em.* 804. *Park.* 511. *B. pin.* 257. *R. syn.* 226.

β *Cynoglossum foliis planis, sessilibus elliptico-lanceolatis, asperis.* *Hall. hist.* 588.

Cynoglossum folio vidente. *B. hist.* III. 600. *R. syn.* 225.

Anglis, common Hound's-tongue.

Habitat in ruderatis et ad vias β in Essexia frequens. In a hedge facing the road on Stamford-hill near Tottenham. *R. syn.* 4. VI.

Pharmac. Cynoglossi Radix.

PULMONARIA. 184.

Cor. infundibuliformis, fauce pervia. *Cal.* prismatico-pentagonus.

I. PULMO-

1. PULMONARIA foliis radicalibus ovato-cordatis *officinalis*,
scabris. Sp. pl. 164. Hall. hist. 597. Fl. dan. 482.
Pulmonaria foliis Echii. Ger. em. 808. R. Syn. 226.
Pulmonaria latifolia. Park. par. 248.
Symphytum maculosum f. Pulmonaria latifolia. B. pin.
259.
Anglis, common Bugloss-cowslip.
Habitat in nemorosis. In a Wood by Holbury-house, in
the new forest, Hampshire. R. Syn. 24. V.
2. PULMONARIA calycibus abbreviatis, foliis ovatis, mariti-
caule ramoso procumbente. Sp. pl. 195. Fl. Dan. ma.
25.
Cerinthe maritima procumbens. Dill. elth. 75. t. 65.
Echium marinum. Phyt. br. R. syn. 228.
Cynoglossum procumbens gloucophyllum maritimum
nostras, floribus purpuro-cæruleis, seminibus lævi-
bus. Pluk. ph. t. 172. f. 3.
Buglossum dulce ex Insulis Lancastriæ. Park. 765.
Anglis, sea Bugloss-cowslip.
Habitat in littoribus maritimis arenosis. Near White-
haven and against Bigger in the Isle of Walney, in
Lancashire, Mr. Lawson; near Threfarthen An-
glesea, and by the River Ewyfni, between Dinardinell
and Clynog in Carnarvonshire, Mr. Llhyd. R.
Syn. In Scotia frequens. D. Hope. 24. V. VI.

S Y M P H Y T U M . 185.

Corollæ limbus tubulato-ventricosus: fauce clausa ra-
diis sublatus.

1. SYMPHYTUM foliis ovato-lanceolatis decurrenti- *officinale*,
bus. Sp. pl. 125. Mat. med. 61. Hall. hist. 600.
Symphytum majus vulgare. Park. 523.
Symphytum, consolida major. B. pin. 259. Ger. 806.
Symphytum flore purpureo. Merr. pin.
Anglis, common Comfrey.
Habitat ad ripas fluviorum et in aquosis. 24. VII.
Pharmac, Consolidæ majoris. Radix.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

B O R A G O. 188.

Cor. rotata: fauce radiis clausa.

officinalis. * I. BORAGO foliis omnibus alternis, calycibus patentibus. *Sp. pl.* 197.

Borago hortensis. *Ger. em.* 797. *R. syn.* 228.

Buglossum latifolium, Borago. *B. pin.* 256.

Anglis, common Borage.

Habitat in ruderatis et muris frequens. 24. VI—VIII.

Pharmac. Boraginis Folia, Flores.

A S P E R U G O. 189.

Cal. fructus compressus, lamellis plano-parallelis, finuatis.

procumbens. I. ASPERUGO calycibus fructus compressis. *Sp.* 198.
Hall. hist. 606. *Fl. dan.* 552.

Buglossum sylvestre, caulis procumbentibus. *B. pin.* 257. *Hist. Ox.* III. 439. t. 26. f. 13.

Borago minor sylvestris. *Park.* 765.

Aparine major Plinii. *Ger. em.* 1122.

Anglis, great Goose-grass, or German Madwort.

Habitat in ruderatis pinguibus. By Boxley in Sussex,
and in Holy Island. *R. syn.* 228. *prope* Purfleet in
Essex. D. Alchorne. ♂. IV. V.

L Y C O P S I S. 190.

Corollæ tubo incurvato.

arvensis. I. LYCOPSIS foliis lanceolatis hispidis, calycibus florifercentibus erectis. *Sp. pl.* 199. *Fl. dan.* 435.

Lycopsis foliis asperrimis, undulatis, ferratis, linguliformibus. *Hall. hist.* 605.

Buglossum sylvestre minus. *B. pin.* 256. *Park.* 765.

Buglossa sylvestris minor. *Ger. em.* 799. *R. syn.* 227.

Anglis, small Bugloss.

Habitat in arvis et ad vias frequens. ♂. VI—IX.

E C H I U M. 191.

Corolla irregularis, fauce nuda.

I. ECHIUM

1. ECHIUM caule tuberculato-hispido, foliis caulinis *vulgare*.
lanceolatis hispidis, floribus spicatis lateralibus. *Sp.*
pl. 200. Scop. carn. 129. Fl. dan. 445.

Echium caule simplici erecto, foliis caulinis lanceola-
tis hispidis, floribus spicatis lateralibus, staminibus
corollam æquantibus. *Mill. Diet. ed. 6. Fl. angl.*
69.

Echium foliis asperis, lingulatis, calycibus hirsutis ex
singulis alis spiciferum. *Hall. hist. 603.*

Echium. *Matth. 969. vulgare. Ger. em. 802. Park. 414.*
B. pin. 254. R. syn. 227.

2. Echium caule simplici erecto, foliis lanceolato-line-angli-
aribus hispidis, floribus spicatis lateralibus, stamini- cu-
bus corolla longioribus. *Mill. Diet. ed. 6. Fl. angl.*
70.

Echium alterum s. *Lycopsis anglica. Merr. R. syn.*
228.

Anglis, common Vipers-bugloss.

*Habitat in arvis et ad vias in pratis et pascuis solo ferti-
liori. 4. VI—VIII.*

Pharmac. Echii Herba, Flores.

3. ECHIUM caule erecto piloso, spicis hirsutis, corollis *italicum* subæqualibus, staminibus longissimis. *Sp. pl. 200.*

Echium foliis hirtis, lingulatis, calycibus pungentibus,
spicis laxis, paniculatis. *Hall. hist. 604.*

Echium flore albo. *Camer. ep. 758.*

Lycopsis. Ger. 802. Park. 519. B. pin. 255. R. syn.
227.

Anglis, wall Vipers-bugloss.

*Habitat in pratis et pascuis arenosis. On the sandy ground
near S. Hilary, in Jersey. 4. VII.*

** *Flores monopetali inferi, angiospermi.*

P R I M U L A. 197.

*Involucrum umbellulæ. Corollæ tubus cylindricus: ore
patulo.*

1. PRIMULA foliis dentatis rugosis, scapo subunifloro, *vulgaris*.
limbo corollarum plano. *Fl. dan. 194.*

PENTANDRIA MONOGYNIA.

Primula foliis dentatis rugosis. scapo nullo. *Sp. pl.* 205.

Primula foliis hirsutis, rugosis, dentatis, scapis unifloris. *Hall. hist.* 608.

Primula veris minor. *Ger. em.* 781.

Primula veris vulgaris. *Park.* 539. *R. syn.* 284.

Verbasculum sylvarum majus singulari flore. *B. pin.* 241.

β *Primula* foliis rugosis dentatis, scapis multifloris, floribus exterioribus nutantibus. *Hall. hist.* 609. *Fl. dan.* 433.

Primula pratensis inodora lutea. *Ger. em.* 780. *R. syn.* 284.

Verbasculum pratense aut sylvaticum inodorum. *B. pin.* 241.

Anglis, common Primrose β Oxslips.

Habitat in sylvis, sepibus et ericetis. 4. IV. V.

veris. 2. **PRIMULA** foliis dentatis rugosis, scapo multifloro, limbo corollarum concavo. *Sp. pl.* 204. *Fl. dan.* 434.

Primula foliis rugosis, dentatis hirsutis, scapis multifloris, floribus omnibus nutantibus. *Hall. hist.* 610.

Primula veris major. *Ger. em.* 781. *R. syn.* 284.

Verbasculum pratense odoratum. *B. pin.* 241.

Paralyfis vulgaris pratensis, flore flavo simplici odoreto. *Park. th.* 535. *Par.* 244.

Anglis, common Cowslips or Pagils.

Habitat in pratis et pascuis. 4. IV. V.

Pharmac. Paralyfis Flores.

farinosa. 3. **PRIMULA** foliis crenatis glabris, florum limbo plano. *Sp. pl.* 205. *Fl. suec.* 172. *Fl. dan.* 125.

Primula veris flore rubro. *Ger. em.* 783.

Aretia foliis glabris, ellipticis, rugosis, subtus farinosis, floribus umbellatis. *Hall. hist.* 625.

Verbasculum umbellatum alpinum minus. *B. pin.* 247. *R. syn.* 285.

Paralyfis minor flore rubro. *Park. par.* 246.

Anglis, Bird's-eye.

Habitat in paludibus montosis in comitatibus Westmorlano-Cumberlandico et Eboracensi. 4. V. VI.

MENYANTHES.

MENYANTHES. 202.

Cerolla hirsuta. Stigma bifidum. Caps. unilocularis.

1. MENYANTHES foliis ternatis. *Sp. pl. 208. Hall. trifoliata.
hist. 633. Fl. dan. 551.*

Menyanthes palustre triphyllum latifolium et angusti-folium. *Tourn. 117. R. syn. 285.*

Trifolium palustre. *B. pin. 327. Cord. hist. 96.*

Trifolium paludosum. *Ger. em. 1194. Park. 1212.*

Anglis, marsh Trefoil or Buckbean.

Habitat in palustribus et aquosis frequens. 24. VI. VII.

Pharmac. Trifolii paludosi Herba.

2. MENYANTHES foliis cordatis integerrimis, corol-lis ciliatis. *Sp. pl. 207. Fl. dan. 339. Nymphoi-des.*

Nymphæa lutea minor flore fimbriato. *B. pin. 194.
hist. II. 772. R. syn. 368.*

Anglis, fringed Buckbean.

Habitat in fluviis et fossis majoribus. circa Kingston et Hampton. 24. VII.

HOTTONIA. 203.

Corolla hypocrateriformis. Stamina tubo corollæ im-posita. Caps. unilocularis.

1. HOTTONIA pedunculis verticillato-multifloris. *Sp. palustris.
pl. 208.*

Hottonia florum verticillis spicatis. *Hall. hist. 632.*

Hottonia Boerb. ind. alt. 207. *R. syn. 285. Fl. dan.
484.*

Millefolium aquaticum s. Viola aquatica caule nudo. *B. pin. 141.*

Millefolium aquaticum floridum s. Viola aquatica. *Park. 1256.*

Viola palustris. *Ger. em. 826.*

Anglis, Water-violet.

Habitat in fossis et paludibus frequens. 24. VII. VIII.

LYSIMACHIA. 205.

Cor. rotata. Caps. glabosa, mucronata, decemvalvis.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

* *Pedunculis multifloris.*

vulgaris. 1. LYSIMACHIA paniculata, racemis terminalibus.

Sp. pl. 209. Scop. Carn. 138.

Lysimachia foliis ovato-lanceolatis, spicis paniculatis.

Hall. hist. 630.

Lysimachia lutea. *Ger. em. 474. Hort. æst. Ord. X.*

t. 6. f. 3. R. syn. 282. major. B. pin. 246. vulgaris. Park. 545.

β Lysimachia lutea foliis brevioribus et obtusis, floribus in summitate congestis. *R. syn. 282.*

Anglis, yellow Loosestrife or Willow-herb.

Habitat in paludibus nemorosis et ad ripas fluviorum. 24. VI. VII.

Pharm. Lysimachiæ Herba.

thyrsiflora. 2. LYSIMACHIA racemis lateralibus pedunculatis.

Sp. pl. 209. Fl. dan. 517.

Lysimachia ramis densissimis, alaribus, folio brevioribus. *Hall. hist. 631.*

Lysimachia lutea flore globo. *Ger. em. 475. Park. 544. R. syn. 283.*

Lysimachia bifolia, flore globo luteo. *B. pin. 245.*

Anglis, tufted Loosestrife.

Habitat in paludibus et ad ripas fluviorum sed rarius.

Near York. Dr. White. Anglesea. Mr. Llwyd. By Kings-Langley in Hertfordshire. Ph. br. R. syn. 24. VI.

** *Pedunculis unifloris.*

nemorum. 3. LYSIMACHIA foliis ovatis, acutis, floribus solitariis, caule procumbente. *Sp. pl. 211. Fl. dan. 174.*

Lysimachia caule decumbente, foliis ovato-lanceolatis petiolis alaribus unifloris. *Hall. hist. 628.*

Anagallis lutea. *Ger. em. 618. R. syn. 282. nemorum. B. pin. 252.*

Anagallis flore luteo. *Park. 558.*

Anglis, wood Loosestrife or Pimpernel.

Habitat in sylvis et umbrosis humidis. 24. V—VII.

4. LYSIMACHIA foliis subcordatis, floribus solitariis, *Nummularia* caule repente. *Sp. pl. 211. Fl. suec. 117. dan. 493. laria.*

Lysimachia caule prostrato, foliis subrotundis, petiolis alaribus unifloris. *Hall. hist. 629.*

Nummularia. Ger. em. 630. R. syn. 283. vulgaris. Park. 555.

Nummularia major lutea. B. pin. 309.

Anglis, creeping Loosestrife or Moneywort.

Habitat in pratis et pascuis humidis. 24. VI. VII.

5. LYSIMACHIA foliis ovatis acutiusculis, pedunculis *tenella.*

folio longioribus, caule repente. *Sp. pl. 211.*

Nummularia minor flore purpurascente. B. pin. 310.

Park. 555. Ger. em. 630. R. syn. 283.

Anglis, purple Loosestrife, or Moneywort.

Habitat in ericetis et pratis humidis. 24. VII. VIII.

A N A G A L L I S. 206.

Cor. rotata. Caps. circumscissa.

1. ANAGALLIS foliis indivisis, caule procumbente. *arvensis.*

Sp. pl. 211. Fl. carn. 139. Dan. 88.

Anagallis caule procumbente, foliis ovato-lanceolatis calycis segmentis lanceolatis. Hall. hist. 625.

Anagallis flore phœnico. B. pin. 252. Park. 558. R. syn. 282.

Anagallis mas. Ger. em. 617. Cam. epit. 394.

2. Anagallis phœnica foliis amplioribus ex adverso quaternis. *Pluk. alm. 29. R. syn. 282.*

3. Anagallis terrestris flore albo. *R. syn. 282.*

4. Anagallis caule procumbente, foliis ovato-lanceolatis, petalis ferratis, calycis foliolis subulatis. *Hall. hist. 626.*

Anagallis foemina. Ger. em. 617. R. syn. 282. cœruleo flore. B. pin. 252.

Anglis, male ♂ female Pimpernel.

Habitat in arvis et locis arenosis, ♂ inter Stockwell et Camberwell. ○. V--VIII.

Pharmac. Anagallidis maris, et foeminis Herba.

AZALEA. 211.

Cor. campanulata. Stamina receptaculo inserta. Caps. quinquelocularis.

- procum-
bens.* 1. AZALEA ramis diffuso-procumbentibus. *Fl. lapp.
90. t. 6. f. 2. Sp. pl. 215. Fl. carn. 140. Dan. 9.
Penn. voy. 43. t. 5.*
Azalea caule procumbente foliis ovatis, margine in-
troverso. *Hall. hist. 666.*
Chamæcistus serpyllifolia flore carneo. *Park. 657. B.
pin. 466.*
Chamæcistus serpyllifolius. *Ger. em. 1284.*
Anglis, procumbent Azalea.
Habitat in montibus. Glen Criven, D. Hope, Ben.
Croachan Argyleshire; Ben-more, Bredalbane;
near Arnisdale, *Pennant's Voy.* b. VI. VII.

CONVOLVULUS. 215.

*Cor. Campanulata, plicata. Stigmata duo. Caps. bilo-
cularis: loculis dispermis.*

- arvensis.* 1. CONVOLVULUS foliis sagittatis utrinque acutis,
pedunculis unifloris. *Sp. pl. 218. Fl. dan. 459.*
Convolvulus foliis sagittatis, latifolientibus, petiolis
unifloris stipulis remotis, subulatis. *Hall. hist. 664.*
Convolvulus minor vulgaris. *Park. 171. R. syn. 275.*
Convolvulus minor arvensis. *B. pin. 294.*
Smilax laevis minor. *Ger. em. 861. Dod. purg. 213.*
β Convolvulus arvensis minimus. *D. Dent. R. syn. 276.*
γ Convolvulus flore minimo ad unguem fere secto. *R.
Syn. 276.*
Anglis, small Bindweed.
Habitat in arvis et ad vias ubique. 4: VI. VII.

- sepium.* 2. CONVOLVULUS foliis sagittatis postice truncatis,
pedunculis tetragonis unifloris. *Sp. pl. 218. Fl. dan.
458.*
Convolvulus foliis sagittatis, hamis emarginatis angu-
lofis, petiolis unifloris, stipulis cordatis maximis.
Hall. hist. 663.

Convolvulus

Convolvulus major albus. Park. 163. B. pin. 294. R.
syn. 275.

Smilax laevis major. Ger. em. 861. Dod. purg. 210.
Anglis, great Bindweed.

Habitat in *sepibus subhumidis.* 24. VII. VIII.

3. CONVOLVULUS foliis reniformibus, pedunculis *Soldanella*-
unifloris. Sp. pl. 159. Fl. Carn. 142.

Convolvulus maritimus Soldanella dicta. R. syn. 276.

Soldanella marina. Ger. em. 838.

Soldanella vulgaris. Park. 168.

Soldanella maritima minor. B. pin. 295.

Anglis, sea Bindweed, or Scottish Scurvy-graft.

Habitat in *litoribus maritimis.* 24. VII. VIII.

POLEMONIUM. 216.

Cor. quinquepartita. Stam. squamis basin corollæ
claudentibus inserta. Stigma trifidum. Caps. trilo-
cularis.

1. POLEMONIUM foliis pinnatis, floribus erectis, ca- cærule-
lycibus corollæ tubo longioribus. Sp. pl. 230. Fl. um.
Dan. 255.

*Polemonium foliis pinnatis, floribus erectis, elliptico-
lanceolatis.* Hall. hist. 665.

Polemonium vulgare cæruleum. Sch. It. 460. Tourn.
146. R. syn. 288.

Valeriana cærulea. B. pin. 164.

Valeriana græca. Ger. em. 1076. Park. 122.

Anglis, blue Polemonium, or greek-Valerian.

Habitat in *dumetis infra Malham-cove.* Dr. Richard-
son. R. syn. 24. VI.

VERBASCUM. 244.

Cor. rotata, subinæqualis. Caps. bilocularis, bivalvis.

VERBASCUM foliis decurrentibus utrinque tomen- *Thapsus*.
tosis, caule simplici. Sp. pl. 252. Hall. hist. 681.
Fl. dan. 631.

Verbascum. Cam. ep. 878. mas latifolium luteum.
B. pin. 239. R. syn. 287.

Verbascum

PENTANDRIA MONOGYNIA.

Verbascum album vulgare, sive Thapsus barbatus communis. Park. 60.

Thapsus barbatus. Ger. em. 773.

Anglis, great Mullein, or High-taper.

Habitat in locis cretaceis et glareosis. 6. VII. VIII.

Pharmac. Verbasci. Folia.

Thapsoides. 2. VERBASCUM foliis decurrentibus, caule ramosa. Sp. pl. 1670.

Verbascum angustifolium ramosum, flore aureo, folio crassiore. B. hist. III. 856.

Verbascum album mas, flore luteo. Dalech. hist. 1301.

Verbascum angustius. Dod. pempt. 143.

Verbascum foliis viridibus crassioribus. Hist. Ox. II. 436.

Anglis, bastard Mullein.

Habitat in pratis et pasuis cretaceis et arenosis, in comitatu Cantiano passim. 8. VII. VIII.

Lychnitis. 3. VERBASCUM foliis cuneiformi-oblongis. Sp. pl. 253. Fl. dan. 586.

Verbascum spica ramosa, foliis ovato-lanceolatis inferioribus petiolatis. Hall. hist. 583.

Verbascum Lychnitis Matthioli. Ger. em. 775.

Verbascum Lychnitis flore albo parvo. B. pin. 240.

Verbascum mas foliis longioribus. Park. 60.

Verbascum flore albo parvo. B. hist. III. 813. R. syn. 287.

3 *Verbascum pulverulentum flore luteo parvo.* B. hist. III. 872. R. syn. 287.

Anglis, white Mullein.

Habitat in pratis et pasuis cretaceis et arenosis in agro Cantiano frequens; β circa mœnia Nordovici urbis; et ad Buriam oppidum. R. syn. 8. VII.

nigrum. 4. VERBASCUM foliis oblongo-cordatis petiolatis. Sp. pl. 253.

Verbascum foliis imis petiolatis, cordato-lancelatis, superioribus sessilibus, ovatis, acutis. Hall. hist. 584.

Verbascum nigrum. Ger. em. 775. vulgare. Park. 61.

Verbascum nigrum flore ex luteo purpurascente. B. pin. 240.

Verbascum

PENTANDRIA MONOGYNIA.

91

Verbascum nigrum, flore parvo, apicibus purpureis.

B. hist. III. 870. R. syn. 288.

Anglis, black Mullein.

Habitat in *glareosis et ad vias*; in *agro Cantiano passim.*

24. VII.

5. **VERBASCUM** foliis amplexicaulibus oblongis gla- *Blatta-*
 bris, pedunculis unifloris. *Sp. pl. 254.* *ria.*
Verbascum spica rarissimā, foliis glabris serratis, cor-
 dato lanceolatis, imis semipinnatis, superioribus am-
 plexicaulibus. *Hall. hist. 285.*
Blattaria Plinii. Ger. em. 776.
Blattaria flore luteo. *Park. 64.*
Blattaria lutea folio oblongo laciniato. *B. pin. 240.*
Blattaria lutea. B. hist. III. 874. R. syn. 288.
Anglis, moth Mullein.
 Habitat in *glareosis passim. Circa Plymouth, et Asbur-*
 ton in *Devonia frequens. O. VI. VII.*

V I N C A. 295.

Cor. Contorta. Folliculi duo, erecti. *Sem.* nuda.

1. **VINCA** caulibus procumbentibus, foliis lanceolato- *minor.*
 ovatis, floribus pedunculatis. *Sp. pl. 304.*
Vinca Pervinca minor. Ger. em. 894. R. syn. 268.
Vinca Pervinca vulgaris. Park. 380.
Clematis daphnoides minor. B. pin. 301.
Pervinca caulibus procumbentibus, foliis ovato-lance-
 olati, petiolis unifloris. *Hall. hist. 572.*
Anglis, lesser Periwinkle.
 Habitat in *sylvis et sepibus. sed rarius. 24. V.*
Pharmac. *Vincæ Herba.*
2. **VINCA** caulibus erectis, foliis ovatis, floribus pedun- *major.*
 culatis. *Sp. pl. 304.*
Pervinca caulibus erectis, foliis ovato-lanceolatis cili-
 atis, petiolis unifloris. *Hall. hist. 573.*
Clematis daphnoides major. B. pin. 302. R. syn. 268.
Clematis daphnoides f. Pervinca major. Ger. em. 894.
Clematis daphnoides latifolia, f. Vinca Pervinca ma-
jor. Park. 380.
Anglis, greater Periwinkle.

Habitat

PENTANDRIA MONOGYNYA.

Habitat in sylvis et sepibus. 24. V. VI.

HYOSCYAMUS. 246.

Cor. infundibuliformis, obtusa. *Stamina* inclinata.
Caps. operculata, bilocularis.

niger.

1. HYOSCYAMUS foliis amplexicaulibus sinuatis, floribus sessilibus. *Sp. pl.* 257. *Hall. hist.* 580.

Hyoscyamus vulgaris. *B. hist.* III. 627. *R. syn.* 274.

Hyoscyamus niger. *Ger. em.* 353. f. *vulgaris.* *B. pin.* 169. *Park.* 362.

Anglis, common Henbane.

Habitat ad pagos, vias, ruderata. 24. VI.

Pharmac. *Hyoscyami Radix, Herba, Semina,*

DATURA. 245.

Cor. infundibuliformis plicata. *Cal.* tubulosus, angulatus, deciduus. *Caps.* quadrivalvis.

Stramoni-
um.

1. DATURA pericarpis spinosis erectis ovatis, foliis ovatis glabris. *Sp. pl.* 255. *Fl. dan.* 460.

Stramonium foliis angulosis, fructu erecto, muricato, calyce pentagono. *Hall. hist.* 586.

Stramonium spinosum. *Ger. em.* 349.

Solanum foetidum, pomo spinoso oblongo, flore albo, *B. pin.* 164.

Solanum pomo spinoso oblongo, flore calathoide, *Stramonium vulgo dictum.* *R. syn.* 266.

Anglis, common Datura, or Thorny Apple.

Habitat in fmetis, et ruderatis passim. 24. VII.

Pharmac. *Stramonii Herba.*

SOLANUM. 250.

Cor. rotata. *Antheræ* subcoalitæ, apice poro gemino dehiscentes. *Bacca* bilocularis.

nigrum.

1. SOLANUM caule inermi herbaceo, foliis ovatis dentato-angulatis, umbellis nutantibus. *Sp. pl.* 266. *Hall. hist.* 576. *Fl. dan.* 460.

Solanum hortense. *Ger. em.* 339. f. *vulgare* baccis nigris. *B. hist.* III. 608.

Solanum vulgare. *Park.* 346. *R. syn.* 264.

Solanum

Solanum officinarum. *B. pin.* 166.

β *Solanum hortense* s. *vulgare* baccis luteis. *B. hist.* III.
608.

Anglis, common or garden Nightshade.

Habitat in ruderatis et finetis. *O.* VI. VII.

Pharmac. Solani Herba, Fructus.

2. SOLANUM caule inermi frutescente flexuoso, foliis *dulcama-*
superioribus hastatis, racemis cymosis. *Sp. pl.* 264. *ra.*

Fl. dan. 607.

Solanum caule flexuoso, frutescente, foliis supre-
mis tripartitis et cordato-lanceolatis. *Hall. hist.*
576.

Solanum lignosum s. *Dulcamara.* *Park.* 350. *R. syn.*
65. *Blakw.* 34.

Solanum scandens s. *Dulcamara.* *B. pin.* 167.

Amara dulcis. *Ger. em.* 350.

β *Solanum lignosum* s. *Dulcamara marina.* *R. syn.* 265.
Anglis, woody Nightshade, or Bitter-sweet.

Habitat in *sepibus humidis*, β in *littoribus maritimis pas-*
sim. 4. VI. VII.

Pharmac. Dulcamarae Radix, Folia, Cortex.

Obs. variat flore albo. β foliis hirsutis.

A T R O P A. 248.

Cor. campanulata. *Stamina distantia.* *Bacca globosa,*
bilocularis.

1. ATROPA caule herbaceo, foliis ovatis integris. *Belladon-*
na. *Sp. pl.* 260.

Belladonna. *Clus. hist.* II. 86. *R. syn.* 265. caule
herbaceo, brachiatu, foliis ovato-lanceolatis inte-
gerrimis. *Hall. hist.* 579.

Solanum lethale. *Ger. em.* 340. *Park.* 346.

Solanum melanocerasus. *B. pin.* 166.

Anglis, common Devale or deadly Nightshade.

Habitat in *sepibus et ruderatis.* In Chuckstone, near
Rochester, about Fulborn, Cambridgeshire. Sutton
Cofield, Warwickshire. *R. syn.* Among the box going
down to Dorking, Surry, Dr. Wilmer. By the
Park wall between Temsford-mills and Weil-
wyn,

PENTANDRIA MONOGYNIA.

wyn, Herts. Dr. Watson. *Bl. spec. bot.* 93. 24.
VI.

*** *Flores monopetali superi.*

SAMOLUS. 221.

Cor. hypocrateriformis. *Stamina munita squamulis*
corollæ. *Caps.* unilocularis.

- valerandi.* 1. SAMOLUS. *Sp. pl.* 243. *Fl. dan.* 148. *Hall.* 707.
Samolus valerandi. *B. hist.* III. 791. *R. syn.* 283.
Anagallis aquatica rotundo folio non crenato. *B. pin.*
 252.
Anagallis aquatica rotundifolia. *Ger. em.* 620.
Anagallis aquatica 3. *Lobeli.* *folio subrotundo non*
crenato. *Park.* 1237.
Anglis, water Samolus or Pimpernel.
Habitat in palustribus, in pratis humidis; inter Greenwich et Woolwich. 24. VI.

LONICERA. 232.

Cor. monopetala, irregularis. *Bacca polysperma,* bi-
locularis.

- periclyme-* 1. LONICERA capitulis ovatis imbricatis terminalibus,
num. foliis omnibus distinctis. *Sp. pl.* 247. *Hall. hist.* 673.
Caprifolium Germanicum. *Dod. pent.* *R. syn.* 458.
Periclimenum. *Ger. em.* 891. *Fuchs. hist.* 646. *f.* *Ca-*
prifolium vulgare. *Park.* 1460.
Periclymenum non perfoliatum germanicum. *B. pin.*
 302.
 2. *Periclymenum* foliis quernis. *Merr. pin.*
Anglis, common Honeysuckle or Woodbine.
Habitat in sepibus. *H. V.* VII.
Pharmac. *Caprifolii.* *Folia, Flores.*

CAMPANULA. 217.

Cor. campanulata fundo clauso valvis staminiferis.
Stigma trifidum. *Caps.* infera, poris lateralibus
 dehiscens.

* *Foliis lævioribus angustioribus.*

1. CAMPANULA foliis radicalibus reniformibus, rotundifolius caulinis linearibus. Sp. pl. 232. Fl. suec. 184. lia. dan. 189.
Campanula foliis serratis, radicalibus cordatis, caulinis lanceolatis. Hall. hist. 701.
Campanula rotundifolia. Ger. em. 452. R. syn. 277.
Campanula minor rotundifolia vulgaris. B. pin. 93.
Campanula minor sylvestris rotundifolia. Park. 651.
 β *Campanula* foliis radicalibus cordatis serratis, caulinis linearibus. Hall. hist. 702.
Campanula minor rotundifolia alpina. B. pin. 93. pr. 34.
 γ *Campanula* alpina linifolia cærulea. B. pin. 93.
Anglis, round-leaved Bell-flower.
Habitat in ericetis et pascuis sterilibus frequens. β in montibus, γ in summis alpibus in Wallia et Westmorlandia. 24. VIII.
2. CAMPANULA foliis undulatis: radicalibus lanceo-rapunculato-ovalibus, panicula coarctata. Sp. pl. 232. lus.
Campanula foliis ellipticis, serratis, subhirsutis, caule aspero, floribus paniculatis. Hall. hist. 699.
Rapunculus esculentus. B. pin. 92. R. syn. 276.
Rapunculus esculentus vulgaris. Park. 648.
Rapantium parvum. Ger. em. 453.
Anglis, esculent Bell-flower or Rampions.
Habitat in aggeribus fossarum et arvis, prope Croydon et Esher in agro Surriensi. 25. VIII.
3. CAMPANULA foliis strictis: radicalibus lanceolato-ovalibus, panicula patula. Sp. pl. 232. Fl. dan. 378.
Campanula caule brachiato, foliis lanceolato-linearibus, glabris, petiolis paucifloris nudis. Hall. hist. 698.
Campanula esculentæ facie, ramis et floribus patulis. Dill. eth. 68. t. 58. f. 68.
Anglis, spreading Bell-flower.
Habitat in sylvis et sepibus. In Buddon Wood, near Loughborough, Leicestershire. Dr. Pultney. inter Litchfield

PENTANDRIA MONOGYNIA.

Litchfield et Meriden copiose; prope Worcester. 3.
VII.

** *Foliis scabris latioribus.*

latifolia. 4. CAMPANULA foliis ovato-lanceolatis, caule simplicissimo tereti, floribus solitariis pedunculatis, fructibus cernuis. Sp. pl. 234. Vir. cliff. 17. Fl. dan. 85.

Campanula foliis ovato-lanceolatis ferratis, petiolis unifloris, calycibus glabris. Hall. hist. 691.

Campanula maxima foliis latissimis. B. pin. 94. R. syn. 276.

Trachelium majus Belgarum. Lob. ic. 278. Park. 643. sive gigantium. Ger. em. 448.

Anglis, giant Bell-flower, or Throatwort.

Habitat in dumetis et sepibus. In the mountainous part of Derbyshire, Staffordshire, Yorkshire, and elsewhere in the north of England plentifully. R. syn. prope Holywell, Flintshire. 24, VII.

trachelium. 5. CAMPANULA caule angulato, foliis petiolatis, calycibus ciliatis, pedunculis trifidis. Sp. pl. 235.

Campanula foliis cordato-lanceolatis, acute serratis, hirsutis, petiolis ex alis paucifloris, calycibus hispidis. Hall. hist. 690.

Campanula vulgarior foliis Urticæ, vel major et asperior. B. pin. 94. R. syn. 276.

Trachelium majus. Ger. em. 448. flore purpureo. Park. 354.

Anglis, great Bell-flower, or Canterbury-Bells.

Habitat in sylvis et sepibus. 24. VII. VIII.

glomerata. 6. CAMPANULA caule angulato simplici, floribus sessilibus, capitulo terminali. Sp. pl. 235.

Campanula caule simplici, aspero, foliis amplexicaulis, floribus capitatis. Hall. hist. 685.

Campanula pratensis flore conglomerato. B. pin. 94. R. syn. 277.

Trachelium minus. Ger. em. 449. Park. 644.

Anglis, lesser Bell-flower, or Canterbury-Bells.

Habitat

Habitat in pascuis montosis, cretaceis frequens. 4. VII.

*** Caule subdiviso.

7. CAMPANULA caule basi subramoso stricto, foliis *hybrida*. oblongis crenatis, calycibus aggregatis corolla longioribus, capsulis prismaticis. Sp. pl. 239.

Campanula caule erecto, fructibus prismaticis, floribus rotatis, sessilibus, congestis. Hall. hist. 704.

Campanula arvensis erecta, vel speculum Veneris minus. Park. 1331. Ger. em. 439. R. syn. 278.

Campanula arvensis minima erecta. Hist. Ox. II. 457. t. 2. f. 22.

Anglis, corn Bell-flower.

Habitat in arvis cretaceis passim. ①. VI. VII.

8. CAMPANULA foliis cordatis quinquelobis petiola-hederacea: glabris, caule laxo. Sp. pl. 240. Fl. dan. 330.

Campanula Cymbalariae foliis. Ger. em. 452. Park. 652. R. syn. 277. vel folio hederaceo. B. pin. 93.

Anglis, ivy-leaved Bell-flower.

Habitat in locis umbrosis humidis, in Cornubia et Devonia frequens. In Bagley Wood, near Oxford. R. syn. In Wallia frequens, D. Stillingfleet. prope Halifax, D. Bolton. prope Bayly, Marshfield et alibi, in Sussexia. 4. VI.—VIII.

PHYTEUMA. 219.

Cor. rotata laciniis linearibus, quinquepartita. *Stigma* trifidum. *Caps.* trilocularis.

1. PHYTEUMA capitulo subrotundo, foliis serratis: *orbicularis*. radicalibus cordatis. Sp. pl. 242.

Rapantium foliis imis cordatis, caulinis sessilibus acutis, bracteis ovato-lanceolatis. Hall. hist. 681.

Rapunculus corniculatus montanus. Ger. em. 455. R. syn. 278.

Rapunculus alopecuroides orbiculatus. Park. 648.

Rapunculus folio oblongo, spica orbiculari. B. pin. 92. Hist. Ox. II. 463. t. 5. f. 47.

Anglis, horn'd Rampions.

Habitat in pascuis cretaceis. On the downs of Sussex

H and

PENTANDRIA MONOGYNIA.

and Hampshire. *R. syn.* prope Leatherhead in comitatu Surriensi. 24. VI. VII.

Obs. variat spica oblonga.

* *Flores pentapetalii inferi.*

RHAMNUS. 264.

Cal. tubulosus: squamis stamina munientibus. Cor. nulla. Bacca.

catharticus. 1. RHAMNUS spinis terminalibus, floribus quadrifidis, dioicis, foliis ovatis, caule erecto. *Sp. pl.* 279. Rhamnus spinosus, foliis ovato-lanceolatis ferratis. *Hall. hist.* 824.

Rhamnus catharticus. *B. pin.* 478. *R. syn.* 466.

Rhamnus solutivus. *Ger. em.* 1337. s. *spina infectoria vulgaris.* *Park.* 243.

Anglis, purging Rhamnus, or Buckthorn.

Habitat in sylvis et sepibus. *H.* IV. V.

Pharmac. Spinæ cervinæ Baccae.

frangula. 2. RHAMNUS inermis, floribus monogynis hermaphroditis, foliis integerrimis. *Sp. pl.* 280. *Fl. dan.* 278.

Rhamnus inermis, foliis ovato-lanceolatis, integris, floribus quinquefidis, androgynis. *Hall. hist.* 821.

Frangula s. Alnus nigra baccifera. *Park.* 240. *R. syn.* 465.

Alnus nigra s. Frangula. *Ger. em.* 1469.

Alnus nigra baccifera. *B. pin.* 428. *Hist. I.* 560.

Anglis, common Rhamnus, or berry-bearing Alder.

Habitat in sylvis et sepibus. *H.* IV. V.

Pharmac. Frangulæ Cortex.

EUONYMUS. 270.

Cor. pentapetala. Caps. pentagona, quinquelocularis, quinquevalvis, colorata. Sem. calyprata.

europaeus. 1. EUONYMUS floribus plerisque quadrifidis. *Sp. pl.* 286. *Fl. suec.* 204.

Euonymus foliis ovato-lanceolatis ferratis, ramis teragonis. *Hall. hist.* 829.

Euonymus vulgaris. *Park.* 241. *R. syn.* 468.

Euonymus

Euonymus vulgaris granis rubentibus. *B. pin.* 428.

Euonymus Theophrasti. *Ger. em.* 1468.

Anglis, common Spindletree or Prickwood.

Habitat in sepibus et nemorosis. *H. IV.* V.

** *Flores pentapetali superi.*

R I B E S. 278.

Petala quinque et stamina calyci inserta. Stylus bifidus. Bacca polysperma.

* 1. RIBES inerme, racemis glabris pendulis, floribus *rubrum*, planiusculis. *Sp. pl.* 290. *Fl. suec.* 205.

Ribes inerme, floribus planiusculis, stipulis minimis. *Hall. hist.* 818.

Ribes vulgaris fructu rubro. *Clus. pann.* 119. *hist.* 119. *Ger. em.* 1593. *R. syn.* 456.

Ribes fructu rubro. *Park.* 1561.

Grossularia vulgaris rubra. *B. pin.* 455.

2 Grossularia vulgaris fructu dulci. *B. pin.* 455.

γ Ribes fructu parvo. *Merr. pin.*

Anglis, common Currants.

Habitat in sylvis et sepibus. In sylvis in septentrionali comitatus Eboracensis parte, inque Dunelmensi Episcopatu et Westmorlandia. D. Johnson. *R. syn.* *H. V.*

Pharmac. Ribum *Baccæ.*

2. RIBES inerme, racemis erectis: bracteis flore longioribus. *Sp. pl.* 291. *Jac. aust.* I. 29. t. 47.

Ribes inerme, floribus planis, bracteis florum longitudine. *Hall. hist.* 817.

Ribes alpinus dulcis. *B. hist.* II. 98. *R. syn.* 456.

Grossularia distinctis baccis. *B. pin.* 45.

Anglis, mountain Currants.

Habitat in sylvis et sepibus. In agro Eboracensi invenit.

D. Dodsworth; *in sepibus juxta Bradford abundat.*

D. Richardson. *R. syn.* IV. V.

3. RIBES inerme, racemis pilosis, floribus oblongis. *nigrum.* *Sp. pl.* 291. *Fl. dan.* 556.

Ribes inerme oolidum, calyce oblongo, petalis ovatis.

Hall. hist. 819.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

*Ribes nigrum vulgo dictum, folio olente. B. hist. II.
98. R. syn. 456.*

Ribes fructu nigro. Park. 1562. Ger. em. 1593.

Grossularia non spinosa fructu nigro. B. pin. 455.

Anglis, black Currants, or Squinancy Berries.

*Habitat in sylvis humidis et ad ripas fluviorum. At
Abington, Cambridgeshire; Blunham, Bedford-
shire; in Warwickshire, Westmorland and Cum-
berland; and by the Hoppet Bridge near Braintree,
Essex. R. syn. h. V.*

H E D E R A. 280.

*Petala quinque, oblonga. Bacca quinquesperma, ca-
lyce cincta.*

helix.

i. *HEDERA* foliis ovatis lobatisque. *Sp. pl. 292.*

*Hedera foliis sterilis trilobatis, fructiferis ovato-lan-
ceolatis. Hall. hist. 826.*

Hedera helix. Maih. 627. Ger. em. 858.

*Hedera communis major et minor. B. hist. II. III.
R. syn. 459.*

Hedera arborea, et major sterilis. B. pin. 305.

*Hedera arborea sive scandens et corymbosa communis.
Park. 678.*

Anglis, common Ivy.

Habitat in sylvis et sepibus. h. X.

Pharmac. Hederæ Folia, Baccæ, Gummi.

* *Flores incompleti superi.*

I L L E C E B R U M. 287.

*Cal. pentaphyllus, cartilagineus. Cor. ♂. Stigma
simplex. Caps. quinquevalvis, monosperma.*

*verticil-
latum.* i. *ILLECEBRUM* floribus verticillatis nudis, caulis
procumbentibus. *Sp. pl. 298. Fl. dan. 335.*

Corrigiola. Cat. giss. 169. R. syn. 160.

*Polygonum serpyllifolium verticillatum, R. f. ed. I.
160.*

*Polygala repens. Park. 1333. nivea. B. pin. 215.
Paronychia*

PENTANDRIA DIGYNIA.

101

Paronychia serpyllifolia palustris. *Vaill.* 157. t. 15.

f. I.

Anglis, marsh Illecebrum.

Habitat in palustribus, udis et humidioribus pascuis circa Pensans oppidum et alibi versus extremum Cornubiæ angulum. *R. syn.* 24. VII.

GLAUX. 288.

Cal. monophyllus. Cor. o. Caps. unilocularis, quinquevalvis, pentasperma.

I. GLAUX. *Sp. pl.* 301. *Fl. suec.* 210. *dan.* 269.

Glaux maritima. B. pin. 215. *R. syn.* 285. *minor. mariti-*
Park. 1283. *ma.*

Glaux exigua maritima. Ger. em. 562.

Habitat in palustribus maritimis frequens. 24. VI. VII.

** *Flores incompleti inferi.*

THESIUM. 289.

Cal. monophyllus, cui stamina inserta. Sem. unicum.

I. THESIUM panicula foliacea, foliis linear-lanceola-tis. *Sp. pl.* 301. *Fl. suec.* 207. *dan.* 328. *Linophyl-lum.*

Thesium caule erecto, paniculato, foliis lanceolatis.

Hall. hist. 1573.

Linaria adulterina. Ger. em. 555. *R. syn.* 202.

Linaria montana flosculis albicantibus. B. pin. 213.

Pseudo-linaria montana alba. Park. 459.

Anglis, common Thesium or bastard Toad-flax.

Habitat in pascuis montosis praesertim solo cretaceo. Gog-magog Hills, Newmarket Heath. *R. syn.* prope Basingstoke in Hampshire, et prope Croydon et alibi in agro Surriensi. 24. VI. VII.

DIGYNA.

* *Flores monopetali inferi.*

SWERTIA. 318.

Cor. rotata. Nectariferi pori ad basin laciniarum corol-læ. Caps. unilocularis, bivalvis.

H 3

I. SWERTIA

perennis. 1. SWERTIA corollis quinquefidis, foliis radicalibus ovalibus. *Sp. pl.* 329. *Jac. aust.* III. 25. t. 243.
Gentiana foliis radicalibus petiolatis, ovatis, floribus paniculatis, rotatis, spicatis. *Hall. hist.* 636.
Gentiana palustris latifolia. *B. pin.* 188.
Gentiana XII. punctato flore. *Clus. hist.* I. 316.
Gentiana Pennei minor. *Ger. em.* 433.
Anglis, marsh Swertia.
Habitat in Wallia. D. Richardson *invenit.* 24. VII.
VIII.

GENTIANA. 319.

Cor. monopetala. *Caps.* bivalvis, unilocularis. *Receptaculis* duobus longitudinalibus.

* *Corollis quinquefidis subcampaniformibus.*

Pneumo- 1. GENTIANA corollis quinquefidis campanulatis oppositis pedunculatis, foliis linearibus. *Sp. pl.* 330. *Fl. suec.* 328. *Dan.* 269.
Gentiana alis floriferis, foliis linearibus. *Hall. hist.* 641.
Gentiana palustris angustifolia. *B. pin.* 118. *R. syn.* 274.
Gentiana autumnalis Pneumonanthe dicta. *Park.* 406.
Pneumonanthe. *Cord. hist.* I. 162. *Ger. em.* 438.
Anglis, marsh Gentian or Calathian Violet.
Habitat in pratis humidioribus, in pratis Strattoniensibus in Norfolk, D. Stillingfleet; *prope Tunbridge*, Dr. Wilmer. *prope Doncaster*, D. Tofield; *prope Milthorpe in coniunctu Westmorlandico et in Lancashire passim.* 24. VIII.

** *Corollis quinquefidis infundibuliformibus.*

Centauri- 2. GENTIANA corollis quinquefidis infundibuliformibus caule dichotomo. *Sp. pl.* 332. *Fl. dan.* 617.
Centaurium minus. *Cam. epit.* 428. *B. pin.* 278. *R. syn.* 286. *vulgare.* *Park.* 272.
Centaurium parvum. *Ger. em.* 547.
Anglis, Centory Gentian.

Habitat

Habitat in pascuis siccioribus et sterilioribus. ♂. VII,

Pharmac. Centaurii minoris Herba, Flores.

Obs. variat flore quadrifido: laciniis acutis.

3. GENTIANA corollis quinquefidis hypocrateriformi- *Aamorel-*
bus fauce barbatis. Sp. pl. 334. Fl. suec. 229. dan. la.
328.

Gentiana faucibus barbatis, calycis segmentis quinis
æqualibus. Hall. hist. 651.

Gentianella pratensis flore lanuginoso. B. pin. 188.
R. syn. 275.

Gentianella fugax minor. Ger. em. 437.

- 3 Gentianella fugax autumnalis elatior, centaurii mi-
noris foliis. R. syn. 275.

Anglis, autumnal Gentian.

Habitat in pascuis siccioribus. ♂. VIII.

*** Corollis quadrifidis.

4. GENTIANA corollis quadrifidis fauce barbatis. Sp. *campes-*
tris. pl. 334. Fl. suec. 230. dan. 367.

Gentiana faucibus barbatis, calycis foliis quaternis,
alterne majoribus. Hall. hist. 650.

Gentiana purpurea minima. Column. ecphr. I. 232. t.
221. Barr. ic. 97. f. 2.

Gentianella alpina verna minor. B. pin. 188.

Gentianella fugax verna seu præcox. R. syn. 275.

Anglis, field Gentian.

Habitat in pascuis montosis. circa Kendal in Westmor-
landia, prope Llanberys in Wallia, circa Perian
round, in Cornubia. ♂. VIII.

5. GENTIANA corollis quadrifidis imberbibus, caule filiformis.
dichotomo filiformi. Sp. pl. 335. Fl. dan. 324.

Centaurium pusillum luteum. B. pin. 278.

Centaurium palustre luteum minimum. R. syn. 286.
Vaill. paris. 32. t. 6. f. 3.

Anglis, least Gentian.

Habitat in palustribus, in comitatibus Hantoniensi, De-
voniensi, et Cornubiensi passim. ♂. VII.

PENTANDRIA DIGYNIA.

CUSCUTA.

Cal. quinquefidus. *Cor.* monopetala quinquefida. *Caps.* bilocularis. *Sem.* duo.

europaea. 1. CUSCUTA floribus sessilibus. *Sp. pl.* 180. *Hall. hist.* 654. *Fl. dan.* 427.

Cuscuta major. *B. pin.* 219. *R. syn.* 281. f. Cassuta. *Ger. em.* 577. *Park.* 10.

Anglis, europæan Dodder or Hellweed.

Habitat in arvis et ericetis passim. ☽. VI—VIII.

Pharmac. Cuscutæ f. Epithymi Herba.

* Flores incompleti.

CHENOPODIUM. 306.

Cal. pentaphyllus, pentagonus. *Cor.* o. *Sem.* unicum lenticulare, superum.

* Foliis angulosis.

Bonus Henricus. 1. CHENOPODIUM foliis triangulari-sagittatis integrerrimis, spicis compositis aphyllis. *Sp. pl.* 318. *Fl. dan.* 579.

Chenopodium foliis triangularibus, undulatis, integrerrimis, subtus farinosis. *Hall. hist.* 1578.

Blitum perenne Bonus Henricus dictum. *Hist. Oxf.* II. 599. t. 30. f. I. *R. syn.* 156.

Bonus Henricus. *B. hist.* II. 965. *Ger. em.* 329.

Lapathum unctuosum. *Park.* 1225.

Lapathum sylvestre latifolium f. unctuosum folio triangulo. *B. pin.* 115.

Anglis, triangular Goosefoot, or English Mercury.

Habitat in ruderatis, et ad vias et muros passim. 24. VII. VIII.

urbicum. 2. CHENOPODIUM foliis triangularibus subdentatis, racemis confertis strictissimis caule approximatis longissimis. *Sp. pl.* 318. *Fl. suec.* 215.

Chenopodium latifolium minus ramosum, petiolis longissimis ex foliorum alis confertim nascentibus. *Buxb. hall.* 69 t. I.

Chenopodium

Chenopodium erectum, foliis triangularibus dentatis,
spicis e foliorum alis plurimis longis erectis tenui-
bus. *R. syn.* 155.

Anglis, upright Goosefoot.

Habitat in fmetis et ruderatis. ☽. VII. VIII.

3. **CHENOPODIUM** foliis cordato-triangularibus ob- *rubrum*.
tusiusculis dentatis, racemis erectis compositis sub-
foliosis caule brevioribus. *Sp. pl.* 318.

Chenopodium erectum, foliis subtriangularibus anti-
ce sinuato-dentatis, racemis erectis foliosis laterali-
bus. *Hort. cliff.* 85. *Roy. lugdb.* 219.

Blitum Pes anserinus dictum. *R. syn.* 154.

Atriplex sylvestris latifolia. *B. pin.* 119.

Pes anserinus. *Dalech. hist.* 542. *t. 542.* *Fuchs. hist.*
653. *Ger. em.* 328. *B. hist. II.* 975. *Park.* 749.

β *Blito Pes anserinus dicto similis*. *R. syn.* 154.

Anglis, red Goosefoot or Sowbane.

Habitat in fmetis, ruderatis, cultis. ☽. VIII.

Obs. an eadem cum priore?

4. **CHENOPODIUM** foliis ovatis acutis dentatis, ra- *murale*.
cemis ramosis nudis. *Fl. suec.* 216. *Sp. pl.* 318.

Blitum Pes anserinus acutiore folio. *R. syn.* 154.

Atriplex sylvestris latifolia acutiore folio. *B. pin.* 119.

Atriplex sylvestris latifolia altera. *Ger. em.* 328.

Atriplex dicta Pes anserinus alter s. ramosior. *B. hist.*
976. *cum fig. bona*.

β *Blitum Morisono atriplex procumbens folio sinuato*
lucido crasso dictum. *Hort. Blæf.*

Anglis, wall Goosefoot.

Habitat in fmetis et ruderatis. ☽. VII. VIII.

5. **CHENOPODIUM** foliis cordatis angulato-acumi- *hybridum*.
natis, racemis ramosis nudis. *Fl. suec.* 220. *Sp. pl.*
319.

Chenopodium Stramonii folio. *R. syn.* 154. *Vaill.*
paris. 36. *t. 7. f. 2.*

*Chenopodium foliis glabris septangulis, floribus pani-
culatis*. *Hall. hist.* 1581.

Anglis, bastard Goosefoot.

Habitat

PENTANDRIA DIGYNIA.

Habitat in ruderatis cultis, arvis passim; prope Northfleet copiose. ♂. VIII.

album. 6. CHENOPODIUM foliis inferioribus rhomboideis dentato-sinuatis, superioribus oblongis, racemis ramosis subnudis.

Chenopodium foliis rhomboideo-triangulis erosis postice integris: summis oblongis, racemis erectis. Sp. pl. 319.

Blitum atriplex sylvestre dictum. R. syn. 154.

Atriplex folio sinuato candicante. B. pin. 119.

Atriplex sylvestris. Fuchs. hist. t. 119. vulgatior sinuata major. Park. 748.

Atriplex vulgaris. Ger. em. 326.

β Chenopodium foliis rhomboideis dentato-sinuatis, racemis ramosis nudis. Sp. pl. 319.

Chenopodium sylvestre, opuli folio. Vaill. 36. t. 7. f. I.

Blitum folio subrotundo. Pet. h. br. 8. 4. R. syn. 155.

γ Chenopodium foliis integris racemosum. R. syn. 155.

δ Chenopodium crasso et obtuso oleæ folio. R. syn. 156. Anglis, common Goosefoot.

Habitat in finetis antiquis, ruderatis. ♂. VIII.

serotinum. 7. CHENOPODIUM foliis deltoideis sinuato-dentatis rugosis glabris uniformibus, racemis terminalibus. Cent. pl. II. Sp. pl. 319.

Chenopodium foliis glabris trilobatis dentatis. Hall, hist. 1582.

Blitum ficus folio. Pet. h. br. t. 8. f. 3. R. syn. 155.

β Chenopodium erectum Chrysanthemi segetum folio. R. syn. 155.

Anglis, fig-leaved Goosefoot.

Habitat in finetis et ruderatis. ♂. VIII. IX.

glaucum. 8. CHENOPODIUM foliis ovato-oblongis repandis, racemis nudis simplicibus glomeratis. Sp. pl. 320.

Chenopodium angustifolium laciniatum minus. Tourn. 506. R. syn. 155.

Atriplex angustifolia laciniata. B. hist. II. 473.

Anglis, oak-leaved Goosefoot.

Habitat in ruderatis. ♂. VIII.

** *Foliis*

** *Foliis integris.*

9. CHENOPODIUM foliis rhombeo-ovatis integerri- *Vulva-*
mis, floribus conglomeratis. *Sp. pl. 321.* *ria.*

Blitum foetidum *Vulvaria dictum. R. syn. 156.*

Atriplex olida. *Ger. em. 327. f. sylvestris foetida. Park.*

749.

Atriplex foetida. *B. pin. 119. hift. II. 974.*

Anglis, stinking Goosefoot, or Orache.

Habitat in ruderatis et ad vias. ◎. VIII.

Pharmac. Atriplicis olidae Herba.

10. CHENOPODIUM foliis ovatis integerimis, caule polysper-
decumbente, cymis dichotomis aphyllis axillaribus. *mum.*
Sp. pl. 321.

Chenopodium Betæ folio. Tourn. 506. R. syn. 157.

Blitum polyspermum. *B. pin. 118. Park. 753.*

Anglis, round-leaved Goosefoot, or Alseed.

Habitat in cultis fimetis passim. ◎. VII. VIII.

11. CENOPODIUM foliis subulatis semicylindricis. *mariti-*
Sp. pl. 321. Fl. dan. 489. mum,

Blitum Kali minus album dictum. *R. syn. 156.*

Kali minus. *Ger. em. 535. album. Park. 279.*

Kali minus album semine splendente. *B. pin. 289.*

Anglis, sea Goosefoot.

Habitat in littoribus maritimis. ◎. VIII.

S A L S O L A . 308.

Cal. pentaphyllus. Cor. o. Caps. monosperma. Sem.
cochleatum.

1. SAL SOLA herbacea decumbens, foliis subulatis spi- *Kali.*
nosis scabris, calycibus marginatis axillaribus. *Sp.*
pl. 322.

Kali spinosum cochleatum. *B. pin. 289. R. syn. 159.*

Tragum. *Cam. ep. 779. Matthioli. Park. 1034. Ger.*
em. 1117.

Anglis, prickly Saltwort.

Habitat in littoribus maritimis. ◎. VII. VIII.

- fruticosa.* 2. **SALSOLA** *erecta fruticosa*, foliis filiformibus obtusiusculis. *Sp. pl.* 324.
Chenopodium foliis linearibus teretibus, carnosis, caule fruticoso. *Hort. cliff.* 806.
Blitum *fruticosum maritimum*; **Vermicularis** *frutex dictum*. *R. syn.* 156.
Sedum minus fruticosum. *B. pin.* 284.
Vermicularis frutex minor. *Ger. em.* 523.
Vermicularis fruticosa altera. *Park.* 731.
Anglis, shrubby Saltwort.
Habitat in littoribus maritimis Norfolchiæ, Devoniam, Cornubia, &c. *H. VII. VIII.*

B E T A. 307.

Cal. pentaphyllus. *Cor. o.* *Sem. reniforme, intra substantiam baseos calycis.*

- maritima.* 1. **BETA** *caulibus decumbentibus, floribus geminis.* *Sp. pl.* 322.
Beta sylvestris maritima. *B. pin.* 157. *Park.* 750. *R. syn.* 156.
Anglis, sea Beet.
Habitat in littoribus maritimis frequens. *6. VIII.*

HERNIARIA. 305.

Cal. quinquepartitus. *Cor. o.* *Stamina quinque sterilia.* *Caps. monosperma.*

- glabra.* 1. **HERNIARIA** *glabra herbacea.* *Sp. pl.* 317. *Fl. dan.* 529.
Herniaria. *Ger. em.* 569. *R. syn.* 160. *glabra.* *B. hist.* III. 378.
Polygonum minus, f. Millegrana major. *B. pin.* 281.
Millegrana major, f. Herniaria vulgaris. *Park.* 446.
 β *Herniaria lenticulata.* *Sp. pl.* 317.
Polygonum maritimum longius radicatum nostras, serpyllifolia circinato crasso nitente. *R. syn.* 161.
Polygonum minus lenticulatum. *B. pin.* 282. *pr.* 131.
Polygonum folio circinato. *Pet. h. br. t.* 10. *f.* 6.
Anglis, smooth Rupture-wort.
Habitat in glareosis. In promontorio Cornubieni, the Lizard-point dicto inveni. *O. VII.*

2. HERNIARIA

PENTANDRIA DIGYNIA.

109

2. HERNIARIA hirsuta. *B. hist. III.* 379. *R. syn. 161. hirsuta.*

herbacea. *Sp. pl. 312.*

Anglis, hairy Rupture-wort.

Habitat in pratis glareosis; prope Colney-Hatch juxta Barnet. ○. VII. VIII.

ULMUS. 313.

Cal. quinquefidus. Cor. o. Bacca exsucco compresso-membranacea.

1. ULMUS foliis duplicato serratis: basi inæqualibus. *campes-*

Sp. pl. 225. Hunt. Evel. Sylv. 118. Fl. dan. 632. tris.

Ulmus foliis scabris, ovato-lanceolatis, dentibus ser-
ratis. Hall. hist. 1586.

Ulmus. D. pemp. 837. Cam. epit. 70. vulgatissima fo-
lio lato scabro. Ger. em. 1480. R. syn. 468.

Ulmus campestris et Theophrasti. B. pin. 426.

Ulmus vulgaris. Park. 1404.

β *Ulmus minor folio angusto scabro. Ger. em. 1480. R.*
syn. 469.

γ *Ulmus folio latissimo scabro. Ger. em. 1481. R. syn.*
469.

δ *Ulmus folio glabro. Ger. em. 1481. R. syn. 469.*

Anglis, common β Cornish, γ Wych-hazel, δ smooth
Elm.

Habitat in *sepibus*. h. IV.

Pharmac. *Ulni Folia, Cortex, medius.*

* *Flores pentapetalii superi dispermi. Umbellatae.*

A *Involucro universali partialique.*

ERYNGIUM. 321.

Flores capitati. Receptaculo paleaceo.

1. ERYNGIUM foliis radicalibus subrotundis plicatis mariti-

spinosis, capitulis pedunculatis. *Sp. pl. 337. It. œl. mum.*

151.

Eryngium maritimum. B. pin. 386.

Eryngium marinum. Cam. epit. 448. Clus. hist. II.
169. *Ger. em. 1162. Park. 986. R. syn. 222.*

Anglis, sea Eryngo, or Holly.

Habitat in *littoribus maritimis.* 2. VII. VIII.

Pharmac.

PENTANDRIA DIGYNIA.

Pharmac. *Eringii Radix.*

campestre. 2. ERYNGIUM foliis amplexicaulibus pinnato-laci-natis. *Sp. pl.* 337. *Fl. dan.* 554. *Jac. austr.* II. t. 155.

Eryngium foliis semipinnatis, pinnis pinnatis, pin-nulis lobatis, spinosis. *Hall. hist.* 735.

Eryngium vulgare. *B. hist.* III. 85. *pin.* 386. *R. syn.* 222.

Eryngium mediterraneum. *Ger. em.* 1162. f. cam-pestre. *Park.* 986.

Anglis, common Eryngo.

Habitat in pascuis maritimis. near the ferry from Ply-mouth into Cornwall; by the old Roman Way called Watling-Street, by Brookhall near Daventry, Northamptonshire, Mr. Thornton; observed by Mr. Lawson, on the shore called Friar-goose, near Newcastle upon Tyne. *R. syn.*; below Melling in Yorkshire plentifully. *Blackf. Spec. bot.* 24. VII. VIII.

HYDROCOTYLE. 322.

Umbella simplex: *Involucro tetraphyllo*. *Petalla inte-gra*. *Sem. semiorbiculato-compressa*.

vulgaris. I. HYDROCOTYLE foliis pellatis, umbellis quin-quefloris. *Sp. pl.* 338. *Fl. dan.* 90.

Hydrocotyle foliis rotundis, emarginatis, petiolis cen-tralibus, umbellis fastigiatis. *Hall. hist.* 812.

Hydrocotyle vulgaris. *R. syn.* 222. *Tourn.* 328.

Cotyledon palustris. *Ger. em.* 530. *Park.* 1214.

Ranunculus aquaticus, Cotyledonis folio. *B. pin.* 180.

Anglis, marsh Pennywort, or White-rot.

Habitat in palustribus et inundatis. 24. V. VI.

SANICULA. 323.

Umbellæ confertæ subcapitatae. *Fructus scaber*. *Flores disci abortientes*.

europæa. I. SANICULA foliis radicalibus simplicibus, flosculis omnibus sessilibus. *Sp. pl.* 339. *Fl. dan.* 283. Sanicula

Sanicula foliis radicalibus trilobatis, lateralibus lobis tripartitis, umbellis globosis. *Hall. hist. et nom.* 737.

Sanicula s. *Diapensia*. *Ger. em.* 948. *R. syn.* 221.

Sanicula officinarum. *B. pin.* 319.

Sanicula vulgaris s. *Diapensia*. *Park.* 532.

Anglis, common Sanicle.

Habitat in sylvis et nemorosis. 4. V. VI.

Pharmac. *Saniculæ Herba*.

B U P L E U R U M. 325.

Involucra umbellulis majora, pentaphylla. *Petala involuta*. *Fruetus* subrotundus, compressus, striatus.

1. BUPLEURUM involucris universalibus nullis, foliis rotundiliis perfoliatis. *Sp. pl.* 340. *Mat. med.* 136. *folium*.

Bupleurum caule brachiato ramosissimo, foliis ovato-lanceolatis, amplexicaulibus. *Hall. hist.* 767.

Bupleurum perfoliatum rotundifolium annum. *Tourn.* 310. *R. syn.* 221.

Perfoliata vulgaris. *Ger. em.* 536. *Park.* 580.

Perfoliata vulgatissima s. *arvensis*. *B. pin.* 272.

Anglis, common Thorow-wax.

Habitat in arvis. 0. VII.

Pharmac. *Perfoliatæ Herba*.

2. BUPLEURUM umbellis simplicibus alternis pentaphyllis subtrifloris. *Sp. pl.* 343. *tenuissimum*.

Bupleurum caule ramosissimo, umbellis alaribus, paucifloris, involucris pentaphyllis, lanceolatis, petiolis longissimis. *Hall. hist.* 774.

Bupleurum minimum. *Col. ecp.* 247. *Park.* 578. *Hist. Ox.* III. 300. t. 14. f. 4.

Bupleurum angustissimo folio. *B. pin.* 274.

Anglis, least Thorow-wax or Hares-ear.

Habitat in pratis et pascuis. near Ellesley, in the road from Cambridge to St. Neots: on a bank by the northern road, a little beyond Huntington. *R. syn.* in pratis maritimis frequens. In Insulis Shepey et Thanet copiose. 0. VII, VIII.

ECHINOPHORA. 326.

Flores laterales masculi, centrali hermaphrodito. Sem. unicum, involucello immersum.

spinosa. I. ECHINOPHORA foliolis subulato-spinosis integer-rimis. *Sp. pl.* 344.

Echinophora maritima spinosa. *Tourn.* 656. *R. syn.* 220.

Crithmum spinosum. *Ger. em.* 533.

Crithmum maritimum spinosum. *B. pin.* 288. seu Pastinaca marina. *Park.* 1286.

Anglis, prickly Echinophora, or Sampire.

Habitat in littoribus maritimis. Observed by Mr. Lawson at Roosebeck in Low-Furness, Lancashire; on the sea-beach between Feversham and Sea Salter. *Blackf. Spec. bot.* 24. VII.

TORDYLIUM. 327.

Cor. radiatæ. Fruetus orbiculatus, planus, margine crenatus.

officinale. *I. TORDYLIUM involucris partialibus longitudine florum, foliolis ovatis faciniatis. *Sp. pl.* 345.

Tordylium narbonense minus. *Tourn.* 320. *R. syn.* 206.

Seseli creticum minimum. *B. pin.* 161. *Park.* 906. *Ger. em.* 1050.

Anglis, small Tordylium.

Habitat in arvis. Plentifully on the banks of the road to Heddington, about half a mile from Oxford. Mr. J. Sherard. *O. VI.*

CAUCALIS. 328.

Cor. radiatæ. Fruetus subovatus, striatus, setis rigidis hispidus.

daucoides. I. CAUCALIS umbellis trifidis aphyllis, umbellulis trispermis triphyllis. *Syst. nat.* 205. *Jac. aust.* II. 37. t. 157.

Caucalis involucro universali nullo, umbella trifida involucellis triphyllis. *Fl. Gall. prov.* 236.

Caucalis

Caucalis tenuifolia, flosculis subrubentibus, *R. syn.*

219. *hist.* 467.

Caucalis tenuifolia purpurea. *Park.* 920.

Echinophora tertia leptophyllum purpurea. *Col. echp.*

I. 96. *t.* 97.

Anglis, small Caucalis.

Habitat in arvis et sterilibus. Circa Kingston in agro

Cantabrigiensi. *R. syn. prope* Reading. *O.* V. VI.

2. CAUCALIS umbella universali trifida, partialibus *latifolia*:

pentaspermis, foliis pinnatis ferratis. *Hort. cliff.*

91. *Syst. nat.* 205. *Jac. Hort. vind.* II. 59. *t.* 128.

Caucalis involucris et involucellis pentaphyllis, foliis pinnatis. *Ger. gall. prov.* 237.

Caucalis foliis asperis pinnatis, pinnis ferratis, involucris ovato-lanceolatis. *Hall. hist.* 738.

Caucalis arvensis echinata latifolia. *B. pin.* 151. *R. syn.* 219.

Caucalis apii foliis, flore rubro. *Ger. em.* 1021.

Echinophora arvensis latifolia purpurea. *Park.* 920.

Anglis, broad-leaved Caucalis.

Habitat in arvis in agro Cantabrigiensi et alibi. *R. syn.*

circa Crooks Easton in comitatu Hamptoniensi. *O.* VII.

3. CAUCALIS involucro universali monophyllo, umbella conferta, seminibus rotundato-ovatis, foliolis

ovato-lanceolatis pinnatifidis, ramis divaricatis.

Caucalis foliis duplicato-pinnatis, pinnulis longe confluentibus. *Hall. hist.* 742.

Caucalis segetum minor, anthrisco hispido similis.

R. syn. 220. *hist.* 468.

Caucalis arvensis humilior, ramosior. *Hist. Ox.* III.

338.

Scandix umbellulis confertissimis hemisphæricis, semine exteriore hispido. *Syst. nat.* 732. *Jac. Fl. austr.* II. 28. *T.* 46.

Anglis, corn Caucalis.

Habitat in arvis, cretaceis frequens. *O.* VII. VIII.

- anthriscus.* 4. CAUCALIS involucris multifidis, umbella conferta, seminibus oblongis, foliolis ovatis pinnatifidis, ramis erectis.
Tordylium umbella conferta, foliolis ovato-lanceolatis pinnatifidis. Sp. pl. 346. Jac. austr. III. 24. t. 261.
Caucalis foliis duplicato-pinnatis, nervo multoties latioribus. Hall. hist. 741.
Caucalis minor flosculis rubentibus. Ger. em. 1022.
R. syn. 219.
Caucalis minor flore rubente. Park. 921.
Caucalis semine aspero, flosculis rubentibus. B. pin. 153.
Anglis, hedge Caucalis.
Habitat in sepiis. ♂. VIII.
- nodosa.* 5. CAUCALIS umbellis lateralibus simplicibus sessilibus.
Tordylium umbellis simplicibus sessilibus, seminibus exterioribus hispidis. Sp. pl. 346.
Caucalis nodosa echinato semine. B. pin. 153. pr. 80.
Ger. em. 1022. Park. 921. R. syn. 220.
Anglis, knotted Caucalis.
Habitat ad margines agrorum frequens. ♀. V. VII.
- carota.* 6. CAUCALIS involucro universali polyphyllo pinnatifido, umbellis defloratis conniventibus, foliis supradecompositis, petiolis subtus nervosis.
Daucus carota, seminibus hispidis, petiolis subtus nervosis. Sp. pl. 348.
Daucus vulgaris. Clus. hist. II. 198. R. syn. 218.
Daucus involucris cavis, communibus pinnatis, peculiaribus lineari-lanceolatis. Hall. hist. 746.
Pastinaca tenuisolia sylvestris. B. pin. 155. Ger. em. 1028. Park. 902.
Anglis, wild Caucalis, or Carrot or Bird's-nest.
Habitat in pratis et pascuis. ♂. VI.—VIII.
Pharmac. Dauci sylvestris Semina.

CONIUM. 333.

Involucella dimidiata, subtriphylla. Fructus subglobosus, quinquestriatus, utrinque crenatus.

I. CONIUM

PENTANDRIA DIGYNIA.

115

- t. CONIUM seminibus striatis. *Sp. pl.* 349. *Jac. aust.* *macula-*
II. 36. t. 156. *tum.*
Cicuta. Dod. purg. 375. *Lob. ic.* 733. *Ger. em.* 1061.
Dorst. 83. *Fuchs.* 406. *Gesn. Coll.* 68. *R. syn.* 215.
Hall. hist. 766. *major. B. pin.* 160.
Cicuta vulgaris major. Park. 933. *Clus. hist. II.* 200.
Anglis, common Hemlock.
Habitat in sepiibus, ruderatis, cultis. J. VI. VII.
Pharmac. *Cicutæ Herba.*

SELINEUM. 334.

*Fructus ovali-oblongus, compresso-planus, in medio
striatus. Involucrum reflexum: Petala cordata,
æqualia.*

- t. SELINUM sublaetescens radice unica. *Sp. pl.* 350. *palustre.*
Selinum sublaetescens leve, foliis quadruplicato-
pinnatis, linearibus. Hall. hist. 799.
Seseli palustre. Grantz. fasc. III. 87. t. 7. f. 1. lac-
tescens. B. pin. 162. *pr.* 83. *Park.* 905. *Hist.*
Ox. III. 317.
Thysselinum angustifolium. Riv. t. 20.
Anglis, marsh Selinum.
Habitat in paludibus, prope Doncaster. D. Tofield.
24. VII. VIII.

ATHAMANTA. 335.

Fructus ovato-oblongus, striatus. Pet. infexo-emar-
ginata.

- t. ATHAMANTA foliolis divaricatis. *Sp. pl.* 353. *oreoseli-*
Jac. aust. 51. *t. 80.* *num.*
Selinum foliis triplicato-pinnatis refractis. Hall. hist.
803.
Apium petræum seu montanum album. B. hist. III.
105. R. syn. 219.
Apium montanum folio ampliore. B. pin. 153.
Daucus montanus pimpinellæ saxifragæ hircinæ folio
nostras Dubiensis. Pluk. ph. t. 173. f. 1.
Oreoselinum. Clus. hist. II. 169. Riv. pent. 8.
Anglis, mountain Spignel, or stone Parsley.
Habitat in pascuis et pratis siccis. On Gogmagog hills,
I 2 Cambridge-

PENTANDRIA DIGYNIA.

Cambridgeshire. *inter St. Albans et Stoney-Stratford.* 24. VII. VIII.

meum. 2. **ATHAMANTA** foliis capillaribus, seminibus glabris striatis. *Sp. pl.* 353. *Mat. med.* 126. *sauv. monsp.* 182.

Meum. *Dod. pempt.* 305. *Ger. em.* 1052. *R. syn.* 207. *Hall. hist.* 761. *vulgatus.* *Park.* 888.

Anglis, common Spignel, Meu or Bawd-money.

Habitat in pratis montosis in comitatibus Westmorlandico, Cumberlandico, Lancastriensi frequens, near Dolgehle in Merionethshire. *R. syn.* 24. V.

Pharmac. Athamantæ *Radix.*

PEUCEDANUM. 336.

Fructus ovatus, utrinque striatus, ala cinctus. Involucra brevissima.

officinale. 1. **PEUCEDANUM** foliis quinques tripartitis filiformi-linearibus. *Sp. pl.* 353.

Peucedanum. *Ger. em.* 1054. *R. syn.* 206. *germanicum.* *B. pin.* 149.

Peucedanum vulgare. *Park.* 880.

Anglis, common Sulphur-wort, or Hogs-fennel.

Habitat in palustribus maritimis. *Prope Shoreham in Sussexia, Walton non procul ab Harvico in Essexia; about a quarter of a mile below Faversham, by the river side,* Mr. J. Sherard. *R. syn. circa Yarmouth et Clay in Norfolk.* D. Humphrey. 24. VI. VII.

Pharmac. Peucedani *Radix.*

filaus. 2. **PEUCEDANUM** foliis pinnatifidis; laciniis oppositis, involucro universali diphyllo. *Sp. pl.* 354. *Leis. hall.* 232. *Jac. austr. I.* 12. t. 15.

Peucedanum foliis triplicato-pinnatis, pinnulis nervo distinctis, lanceolatis, impari trilobatis. *Hall. hist.* 797.

Seseli pratense. *B. pin.* 162. *Park.* 905. *R. syn.* 216. *Grantz. fasc. III.* t. 6. f. 1. *Riv.* 57.

Saxifraga anglica facie seseli pratensis. *Ger. em.* 1047.

Anglis, meadow Sulphur-wort or Saxifrage.

Habitat in pratis et pascauis humidiusculis. 24. VIII.

CRITH-

CRITHMUM. 337.

Fructus ovalis, compressus. Flosculi æquales.

1. CRITHMUM foliolis lanceolatis carnosis. *Sp. pl. mariti-*
354. Sauv. monsp. 358. Gouan. Fl. monsp. *num.*

Crithmum marinum. Ger. em. 533. Dod. pemp. 705.
R. syn. 217. vulgare. Park, 1286.

Crithmum s. Fœniculum marinum minus. B. pin.
288.

Anglis, sea Sampire.

Habitat in littoribus maritimis. 24. VIII.

Pharmac. Crithmi Herba.

HERACLEUM. 342.

Fructus ellipticus, emarginatus, compressus, striatus,
marginatus. Cor. difformis, inflexo-emarginata.
Involucrum caducum.

1. HERACLEUM foliolis pinnatifidis. *Hort. cliff. sphondy-*
103. Sp. pl. 358. Fl. suec. 243. lævibus, floribus *lium.*
radiatis. Syst. nat. 210.

Sphondylium foliis hirsutis pinnatis, pennis quinque-
lobis. Hall. hist. 809.

Sphondylium. Ger. em. 1009. R. syn. 205.

Sphondylium vulgare. Park. 953. hirsutum. B. pin.
157.

2 *Heracleum foliis cruciato-pinnatis : foliolis linearis angusti-*
bus, corollis flosculosis. Syst. nat. 210. *folium.*

Sphondylium majus aliud laciniatis foliis. Park. 953.

Anglis, common Cow-parsnep.

Habitat in sepibus, pratis et pasquis. 3. VII.

Obs. β variat corollis frequentissime radiatis, rarissime
flosculosis, et in hortis β in α degenerat.

LIGUSTICUM. 343.

Fructus oblongus, quinquesulcatus utrinque. Corolla
æquales. Petalis involutis, integris,

1. LIGUSTICUM foliis biternatis. *Sp. pl. 359. Fl. scoticum.*
dan. 207.

Ligusticum scoticum apii folio. R. syn. 214.

PENTANDRIA DIGYNIA.

Ligusticum humilius scoticum. *Pluk. ph.* 96. *f. 2.*
Seseli maritimum scoticum. *Herm. par.* 227. *t. 227.*
Anglis, scottish Lovage.

Habitat in clivis et littoribus maritimis, sed rarius. *In*
tumulo quodam saxoso et arenoso ad mare sex ab Edin-
burgho milliaribus versus Queens-ferry, et alibi in
Scotia. ♂. VII.

- cornubi-* 2. **LIGUSTICUM** foliis decompositis incisis : radicali-
ense. bus ternatis lanceolatis integerrimis. *Sp. pl.* 359.
Smernium tenuifolium nostras. *R. hist.* III. 254. *syn.*
209. t. 8.
Saxifraga connubiæ. *Pet. h. br.* *t. 26. f. 9.*
Anglis, cornish Lovage.
Habitat in Cornubia. ♀. VII.

ANGELICA. 344.

Fruetus subrotundus, angulatus, solidus, stylis re-
flexis. Corollæ æquales : petalis incurvis.

- sylvestris.* 1. **ANGELICA** foliis æqualibus ovato-lanceolatis fer-
 ratis. *Sp. pl.* 361. *Fl. suec.* 246.
Angelica foliis duplicato-pinnatis, ovatis, ferratis.
Hall. hist. 806.
Angelica sylvestris. *Ger. em.* 999. *Park.* 249. *R.*
syn. 208. *major.* *B. pin.* 145.
Anglis, wild Angelica.
Habitat in sylvis et sepibus paludosis. ♀. VII. VIII.

SIUM. 345.

Fruetus subovatus, striatus. Involucrum polyphyllum,
Petala cordata.

- latifolium,* 1. **SIUM** foliis pinnatis, foliolis oblongo-lanceolatis
 ferratis, umbellis terminalibus.
Siuum foliis pinnatis, umbellis terminalibus. *Sp. pl.*
 361. *Fl. suec.* 235. *Dan.* 246. *Jac. austr.* I. 42.
t. 66.
Siuum foliis pinnatis, argute dentatis, umbellis erectis,
Hall. hist. 777.
Siuum latifolium. *B. pin.* 154. foliis variis. *R. syn.*
 241.

Siuum

Sium majus latifolium. *Ger. em.* 256.

Sium Dioscoridis s. Pastinaca aquatica major. *Park.*

1240.

Anglis, broad-leaved Water-Parsnep.

Habitat in *flaviis et paludosis*; inter Rotherhithe et Deptford. *R. syn.* 24. VII. VIII.

Obs. variat foliolis radicalibus in paludibus profunde incisis et frequenter sub aqua laciniis linearibus.

2. *SIUM* foliis pinnatis, foliolis cordatis lobatis inaequaliter ferratis, umbellis pedunculatis oppositifoliis terminalibusque.

Sium foliis pinnatis, umbellis axillaribus pedunculatis, involucro universali pinnatifido. *Fl. angl.* 103.

Sp. pl. 1672. *Jac. aust.* I. 42. t. 67.

Sium majus angustifolium. *Ger. em.* 256.

Sium s. *apium* palustre foliis oblongis. *B. pin.* 154.

R. syn. 211.

Sium minus alterum. *Park.* 1241.

Sium erectum foliis ferratis. *Doody.* *R. syn.* 211.

Anglis, narrow-leaved Water-Parsnep.

Habitat in *fossis et rivulis.* 24. VII. VIII.

Obs. variat foliolis involucri universalis integris, ferratis et pinnatifidis.

3. *SIUM* foliis pinnatis, umbellis axillaribus sessilibus. *nodiflorum.*

Sp. pl. 361. *Fl. suec.* 248. *dan.* 247.

Sium umbellatum repens. *Ger. em.* 256. *R. syn.* 211.

Sium aquaticum procumbens, ad alas floridum. *Hist.*

Ox. III. 283. t. 5. f. 3.

Anglis, creeping Water-Parsnep.

Habitat in *rivilis ubique.* 24. VI.—VIII.

S I S O N. 346.

Fructus ovatus, striatus. Involucra subtetraphylla.

1. *SISON* foliis pinnatis, umbellis erectis. *Sp. pl.* 362. *amomum.*

Roy. lugdb. 105.

Sison quod *Amomum officinis nostris.* *B. pin.* 154.

Sison vulgare, vel Amomum germanicum. *Park.*

914.

Sium aromaticum *Sison off.* *Tourn.* 308. *R. syn.* 211.

PENTANDRIA DIGYNIA.

Petroselinum macedonicum Fuchsi. *Ger. em.* 1016.
Anglis, field Honewort, or Stone-Parsley.
Habitat in sylvis et sepibus subhumidis. ○. VIII. IX.
Pharmac. Amomi semina.

- segetum.* 2. *SISON* foliis pinnatis, umbellis cernuis. *Sp. pl.* 362.
Hall. hist. 779. *Jac. hort. vind.* II. 63. *t.* 134.
Sium arvense sive *segetum*. *R. syn.* 211. *Tourn.* 308.
Sium terrestre, umbellis rarioribus. *Hist. Ox.* III.
283. t. 5. f. 6.
Selinum sii foliis. *Ger. em.* 1018.
Selinum segetale. *Park.* 932.
Anglis, corn Honewort.
Habitat in arvis et ad sepes solo cretaceo et lutoso. ○.
 VII.

- inunda-* 3. *SISON* repens umbellis bifidis. *Sp. pl.* 363. *Fl.*
Dan. 69.
Sium foliis submersis capillaribus, emersis pinnatis.
Sauv. monsp. 249. *R. lugdb.* 105.
Sium foliis radicalibus capillaribus multifidis, cauli-
 nis pinnatis, ultima pinna trilobata. *Hall. hist.* 780.
Sium minimum, foliis imis ferulaceis. *Hist. Ox.* III.
223. t. 9. f. 5.
Sium pusillum foliis variis. *Pb. br.* *R. syn.* 212.
Anglis, water Honewort.
Habitat in fossis, stagnis et inundatis passim. In ericetis
 Putnejano et Hounsflejano; on Wandsworth common,
 inter Newington et Hornsey. ○. V. VI.

- verticilla-* 4. *SISON* foliolis verticillatis capillaribus. *Sp. pl.* 263.
tum. *Carum* foliolis setaceis verticillatis, radice napiformi,
Sauv. monsp. 168.
Daucus pratensis, *Dalech. hist.* 718. *millefolii palustris*
 folio. *B. pin.* 150.
Anglis, verticillate Honewort.
Habitat in pratis et pasuis. Plentifully in the west of
 Scotland, near Greenock. Mr. W. Houston, prope
 Air in Scotia; in pasuis humidiusculis in Carmar-
 thenshire; inter Treacastle et St. Davids in Pem-
 brokeshire copiose, D. Banks. 4. VIII.

OENAN-

OENANTHE. 349.

Flosculi difformes: in disco sessiles, steriles. *Fructus* calyce coronatus.

1. OENANTHE stolonifera, foliis caulinis pinnatis fistulosa.
liformibus fistulosis. Sp. pl. 365.

Oenanthe foliis radicalibus rotunde lobatis planis,
caulinis fistulosis. Hall. hist. 755.

Oenanthe aquatica. B. pin. 162. R. syn. 210.

Oenanthe. Riv. pent. 66. palustris. Park. 895.

Filipendula aquatica. Ger. em. 1060.

β Oenanthe aquatica triflora, caulibus fistulosis. Hist.
Ox. III. 289. t. 7. f. 8.

Anglis, common Water-dropwort.

Habitat in fossis et palustribus frequens. 24. VII.

2. OENANTHE foliis radicalibus cuneatis fissis; caulinis integris linearibus longissimis canaliculatis. pimpinelloides.
Sp. pl. 367.

Oenanthe foliis radicalibus duplicato-pinnatis linearibus, recurvis. Hall. hist. 756.

Oenanthe apii folio. B. pin. 162.

Oenanthe aquatica pimpinellæ saxifragæ divisura nostras. Pluk. ph. t. 49. f. 4.

Anglis, parsley Water-dropwort.

Habitat in fossis et palustribus, in parochia Quapload agri Lincolnensis non procul ab oppido Spalding; D. Pluk. R. syn. in paludibus maritimis frequens. 24. VII. VIII.

3. OENANTHE foliis omnibus multifidis obtusis subcrocata.
æqualibus. Hort. cliff. 99. Sp. pl. 365.

Oenanthe cicutæ facie Lobelii. Park. 894. R. syn.
210.

Oenanthe chærophylli foliis. B. pin. 162.

Oenanthe cicutæ facie, succo viroso crocante. Lob.
adv. 326. Act. angl. 1747. N. 480. 235. t. 3.

Filipendula cicutæ facie. Ger. em. 1059.

Anglis, hemlock Water-dropwort.

Habitat

PENTANDRIA DIGYNIA.

Habitat in aquosis et ad ripas fluviorum passim. ad ripas Thamesis frequens. 4. VI. VII.

BUNIUM. 332.

Cor. uniformis; Umbella conferta. Fructus ovatus.

- Bulbocastanum. 1. BUNIUM. Sp. pl. 349. Fl. dan. 220. Hall. hist. 783.
 Bulbocastanum. B. hist. III. 30. R. syn. 209.
 Bulbocastanum majus apii folio. B. pin. 1065.
 Bulbocastanum majus et minus. Ger. em. 1065.
 Nucula terrestris. Lob. hist. 429 major. Park. 893.
Anglis, Earth, Kipper, Pig, or Hawk-nut.
 Habitat in pratis, pascuis et sylvis. 4. V. VI.

B. Involucris partialibus: universal nullo.

CICUTA. 351.

Fructus subovatus, sulcatus.

- virosa. 1. CICUTA umbellis oppositifoliis, petiolis marginatis obtusis. Sp. pl. 366. Fl. dan. 208.
 Cicuta aquatica. Gesn. hort. 253. coll. 68.
 Sium foliis duplicato-pinnatis, pinnulis trifidis et simplicibus, acute serratis. Hall. hist. 781.
 Sium alterum. Dod. 589. olusatri facie. Lob. ic. 208.
 Ger. em. 256. R. syn. 212.
 Sium majus alterum angustifolium. Park. 1241.
 Sium erucæ folio. B. pin. 154.
Anglis, water Cicuta.
 Habitat in aquosis et fluviis. In some pools of water at Thistleworth. R. syn. in fluvio Coln dicto prope Colnbrook, Middlesex. 4. VII. VIII.

PHELLANDRIUM. 350.

Flosculi disci minores, Fructus ovatus, lævis, coronatus perianthio et pistillo.

- aquati-
cum. 1. PHELLANDRIUM foliorum ramificationibus divaricatis. Sp. pl. 366.
 Phellandrium foliis refractis. Hall. hist. 757.
 Phellandrium vel Cicutaria aquatica quorundam. B. hist. III. 181. R. syn. 215.

Cicutaria

Cicutaria palustris. *Lob.* *ic.* 735. *Ger. em.* 1065. *te-*
nuiifolia. *B. pin.* 161. *Park.* 933.

Anglis, common Water-hemlock.

Habitat in fluviis et fossis. ♂ VI. VII.

ÆTHUSA. 353.

Involucella dimidiata, triphylla, pendula. *Fructus*
striatus.

- I. *ÆTHUSA.* *Sp. pl.* 367. *Hall. hist.* 765. *Cynapi-*
Cicutaria tenuifolia. *Ger. em.* 1063. *R. syn.* 215. *um.*
Cicuta minor Petroselino, similis. *B. pin.* 160.
Cicuta minor. f. *fatua.* *Park.* 933.
Anglis, Fools-parsley.
Habitat in arvis et inter olera. ☽. VIII. IX.

CORIANDRIUM. 353.

Cor. radiata: *Pet.* *inflexo-emarginata.* *Involucr.* uni-
versale monophyllum. *Partialia dimidiata.* *Fructus*
sphæricus.

- *I. *CORIANDRIUM fructibus globosis.* *Sp. pl.* 367. *sativum.*
Mal. med. 135. *Hall. hist.* 764.
Coriandrum. *Cam. epit.* 523. *Ger. em.* 1012. *R. syn.*
221. *majus.* *B. pin.* 158. *vulgare.* *Park.* 918.
Anglis, Coriander.
Habitat in arvis et ad vias. in arvis prope Ipswick et
alibi in agro Essexiensi. ☽. VI. VII.
Pharmac. *Coriandri semina.*

SCANDIX. 354.

Cor. radiata. *Fructus subulatus.* *Petala emarginata.*
Flosculi disci sæpe masculi.

- I. *SCANDIX seminibus lævibus rostro longissimo.* *Sp. Pecten*
pl. 368. *Jac. aust.* III. 35. t. 263. *veneris.*
Scandix semine rostrato vulgaris. *B. pin.* 152. *R. syn.*
207.
Scandix vulgaris seu Pecten veneris. *Park.* 916.
Pecten veneris. *Cam. epit.* 302. f. *Scandix.* *Ger. em.*
1040.
Anglis,

PENTANDRIA DIGYNIA.

Anglis, corn Cicely or Shepherd's-needle, or Venus's-comb.

Habitat in arvis. ♂. VI. VII.

- odorata*. *2. SCANDIX seminibus fulcatis angulatis. Sp. pl. 368.
Myrrhis major, Cicutaria odorata. B. pin. 160.
Myrrhis. Dodd. pempt. 701. major vulgaris s. cerefolium majus. Park. 935.
Cerefolium magnum s. myrrhis. Ger. em. 1039.
Anglis, sweet Cicely.
Habitat in sepibus et pomariis in comitatibus Westmorlandico, Cumberlandico et Lancasterensi frequens.
♂. VI.

- Antbris-* 3. SCANDIX seminibus ovatis hispidis, corollis uniformibus, caule lævi. Sp. pl. 368. Fac. austr. II.
35. t. 154.
Caucalis vaginis lanuginosis, foliis triplicato-pinnatis, seminibus rostratis. Hall. hist. 743.
Myrrhis sylvestris seminibus asperis. B. pin. 160.
R. syn. 220.
Myrrhis sylvestris neapolitana atque anglicana. Park.
935.
Cerefolium sive Myrrhis nova æquicolorum Columnae. Ger. em. 1038.
Anglis, rough Cicely, or Chervil.
Habitat in aggeribus ruderatis; circa Londinum ubique.
♂. V. VI.

CHÆROPHYLLUM. 355.

Involucrum reflexum, concavum. Petala inflexo-cordata. Fruetus oblongus, lævis,

- sylvestre*. 1. CHÆROPHYLLUM caule lævi striato, geniculis tumidiusculis. Sp. pl. 369. Fac. austr. II. 31. t.
149.
Cerefolium foliis acute dentatis, triplicato pinnatis, glabris, nervis hispitis. Hall. hist. 748.
Cicutaria vulgaris. B. hist. III. 181. R. syn. 207.
Cicutaria alba Lugdunensis. Ger. em. 1038.
Myrrhis sylvestris. Park. 935. seminibus lævibus. B. pin. 160.

Anglis,

PENTANDRIA DIGYNIA.

125

Anglis, wild Chervil, Cicely, or Cow-weed.
Habitat ad sepes. ♂. V. VI.

2. CHÆROPHYLLUM caule scabro : geniculis tumulennis. Sp. pl. 370. umbellis cernuis. ed. I. tum. 258.

Chærophillum sylvestre. B. pin. 152.

Cerefolum sylvestre. Ger. em. 1038. Park. 915.

R. syn. 207.

Myrrhis foliis hirsutis, laciniis obtusis, caule geniculato. Hall. hist. 750.

Anglis, rough Chervil.

Habitat ad sepes frequens. ♂. VII. VII.

C. Involucro nullo ; nec universali, nec partialibus.

PASTINACA. 359.

Fructus ellipticus, compresso planus. Petala involuta, integra.

1. PASTINACA foliis simpliciter pinnatis. Sp. pl. sylvestris. 376. Fl. suec. 259. Gort. Gelr. 60.

Pastinaca foliis pinnatis. Hall. hist. 808.

Pastinaca sylvestris latifolia. B. pin. 155. R. syn. 206.

Pastinaca latifolia sylvestris. Ger. em. 1025. Park. 944.

Pastinaca germanica sylvestris, quibusdam Elaphoboscum. B. hist. III. 149.

- 2 Pastinaca latifolia sativa. Ger. em. 1025. Park. 944.

Anglis, wild Parsnep. β garden Parsnep.

Habitat in marginibus agrorum, solo calcareo. ♂. VII.

PENTANDRIA DIGYNIA.

SMYRNIUM. 360.

Fructus oblongus, striatus. Petala acuminata, carinata.

Olfus-trum. I. SMYRNIUM foliis caulinis ternatis petiolatis serratis. Sp. pl. 376.

Smyrnium. Matth. 773. R. syn. 208.

Hippocelinum. Ger. em. 1019. f. Smyrnium vulgare. Park. 930.

Hippocelinum Theophrasti s. Smyrnium Dioscoridis. B. pin. 154.

Anglis, common Alexanders.

Habitat in fossis et in rupibus maritimis; about Scarborough Castle near Deptford, Battersea, Vauxhall, about Nottingham plentifully. R. syn. 5. V. VI.

Pharmac. Smyrnii Radix, Herba, semina.

ANETHUM 361.

Fructus subovatus, compressus, striatus. Petala involuta, integra.

Foeniculum. I. ANETHUM fructibus ovatis. Sp. pl. 377.

Foeniculum. Cam. epit. 534 vulgare. Ger. em. 1032. Park. 884. R. syn. 217. Germanicum. B. pin. 147.

§ Foeniculum dulce. B. pin. 147.

Anglis, common Fennel, or Finckle.

Habitat in clivis cretaceis frequens. ♂. VII. VIII.

Pharmac. Foeniculi semina.

CARUM. 362.

Fructus ovato-oblongus, striatus. Involucrum monophyllum. Petala carinata, inflexo-emarginata.

Carvi. *I. CARUM. Dod. pempt. 299. Cam. epit. 516. Sp. pl. 378, Hall. hist. 789. vulgare. Park. 910.

Carum seu Careum. Ger. em. 1034. R. syn. 213.

Cuminum pratense Carui officinarum. B. pin. 158.

Anglis, Caraways.

Habitat in pratis et pascuis passim. ♂. V. VI.

Pharmac. Carui semina.

PIMPINELLA: 363.

Fructus ovato-oblongus. Petala inflexa. Stigmata sub-globosa.

1. PIMPINELLA foliis pinnatis: foliolis ovatis, im- major.
pari trilobo. *Fl. angl.* 110.

Pimpinella magna, foliolis omnibus lobatis: impari-trilobo. *Lin. mant. II.* 219.

Pimpinella saxifraga. *Cam. epit.* 775. *Ger. em.* 1044.
R. syn. 213, hircina major. *Park.* 947.

Pimpinella saxifraga major, umbella candida. *B. pin.*
159. *Hist. Ox. III.* 284. t.

Tragofelinum foliis pinnatis, pinnis lanceolatis ferratis, extremis trilobatis. *Hall. hist.* 785. *Fl. Carn.* 209.

2 Pimpinella saxifraga major, degener, seu foliis dissec-tis. *Hist. Ox. III.* 284.

Anglis, greater Pimpinell or Burnet-saxifrage.

Habitat in sylvis et sepibus, solo calcareo. in sylvis agro Can-tabrigiensi, Bedfordiensi, Leicestriensi, Eboracensi, Cantiano, et alibi. 4. VIII.

Obs. variat. foliolis cordato-ovatis, lobatisque, serratis et inciso-serratis.

2. PIMPINELLA foliis pinnatis: foliolis radicalibus *saxifra-*
subrotundis; summis linearibus. *Sp. pl.* 378. *ga.*

Pimpinella saxifraga minor, foliis sanguisorbæ. *R. syn.*
213.

Pimpinella s. Saxifraga minor. *Ger. em.* 1044.

Pimpinella major altera. *B. pin.* 159.

Pimpinella saxifraga major nostras. *Park.* 946.

Tragofelinum foliis pinnatis, pinnatis ovatis. *Hall.*
hist. 786.

3 Pimpinella saxifraga minor. *B. pin.* 160.

Pimpinella saxifraga hirsina minor. *Park.* 947.

Tragofelinum foliis duplicato-pinnatis, pinnulis pro-fundissime lobatis. *Hall. hist.* 787.

Anglis, lesser Pimpinell, or Burnet-saxifrage.

Habitat in pascuis siccioribus et glareosis. 4. VIII.

dioica.

3. PIMPINELLA foliis subbipinnatis: foliolis linearibus simplicibus ternatisque, floribus dioicis.

Pimpinella pumilla umbellis numerosissimis compositis simplicibusque. *Jacq. enum. 52. et 227. austr. I. 19. t. 28.*

Seseli petiolis ramiferis membranaceis oblongis integris, foliolis ternatis linearibus subcarnosis petioli longitudine. *Sp. pl. 373. Fl. gall. prov. 253.*

Fœniculum minimum patulum. *Clus. hist. II. 200.*

Peucedanum pumilum. *Ger. em. 1054.*

Peucedanum minus. *Park. 880. R. syn. 217.*

Daucus montanus, multifido folio, selini semine. *B. pin. 150.*

Anglis, least Pimpinell, or Burnet saxifrage.

Habitat in pratis montosis. On St. Vincent's Rock, near Bristol. *R. syn. supra* Uphill in agro Somersetiensi. 24 V. VI.

Desc. Radix perennis, fusiformis, perpendicularis, basi subramosus, capite villosa. Caulis semicubitalis et cubitalis, erectus, angulatus, striatus, foliatus, glaber, ramosissimus; ramis patulis. Folia inferiora opposita, petiolata, pinnata et bipinnata; foliolis simplicibus, ternatisque, linearibus, canaliculatis, nudis, glaucis. Petiolus membranaceus vaginans oblongus, striatus, integer. Umbellæ pedunculatæ axillares terminalesque, universales radicis circiter sex longis, partiles confertæ, radiis circiter quinque, brevibus. Flores lutescentes vel albidioici. Flo. Mas. Cal. obsoletus. Corolla petala quinque, oblonga, apice inflexa, æqualia. Stam. Filamenta quinque, subulata. Antheræ subrotundæ. Pist. &c. nulla. Flo. Fem. Cal. Cor. ut in masculo. Stam. Filamenta quinque subulata. Antheræ steriles. Pist. gerumen inferum; styli duo distantes. Stigmata globosa. Pericarpium nullum. Fructus ovatus, striatus, bipartibilis. Sem. duo, ovata, hinc convexa, striata, inde plana.

APIUM. 364.

Fructus ovatus, striatus. Involucrum monophyllum. Petala æqualia.

I. APIUM

I. APIUM foliis caulinis cuneiformibus, umbellis ses- graveo-
filibus. Sp. pl. 379. lens.

Apium foliis pinnatis pinnis trilobatis. Hall. hist. 784.

Apium palustre et off. B. pin. 154. R. syn. 214.

Apium vulgare s. *palustre*. Park 926.

Eleoselinum seu *Paludapium*. Ger. em. 1014.

Anglis, smallage Parsley.

Habitat in palustribus et ad fossas. ♂. VIII.

ÆGOPODIUM. 365.

Fructus ovato-oblongus, striatus.

I. ÆGOPODIUM foliis caulinis summis ternatis. Sp. *Podagra-*
ria. pl. 379.

Podagraria. Riv. pent. t. 46. Hall. hist. 759. *vulgare*.
Park. 943.

Angelica sylvestris minor s. *erratica*. B. pin. 155. R.
syn. 208.

Herba Gerardii. Dod. pemp. 320. Ger. em. 1001.

Anglis, Gout-weed, Herb-gerard, or Ash-weed.

Habitat ad sepes et in oleraceis, hortis, frequens. ♀. V.
VI.

TRIGYNIA.

* *Flores superi.*

VIBURNUM. 367.

Cal. quinquepartitus. *Cor.* quinquefida. *Bacca* mo-
nosperma.

I. VIBURNUM foliis cordatis ferratis venosis subtus *Lantana-*
tomentosis. Sp. pl. 381. Hall. hist. 669.

Viburnum. Cam. epit. 122. B. pin. 426. Park. 1448.
R. syn. 460.

Lantana five *Viburnum*. Ger. em. 1490.

Anglis, common *Viburnum*, or mealy or way-faring
Tree.

Habitat in sylvis et sepibus solo calcareo. ♀. V.

Opulus. 2. **VIBURNUM** foliis lobatis petiolis glandulosis. *Sp. pl. 384.*

Opulus. Ruellii 281. *R. syn. 460. Hall. hist. 668.*

Sambucus aquatica, flore simplici. B. pin. 456.

Sambucus palustris. Cam. ep. 977. f. aquatica. Park. 208.

Sambucus aquatilis f. palustris. Ger. em. 1424.

Anglis, water Viburnum, or Elder.

Habitat in sylvis et sepibus humidis. H. V. VI.

S A M B U C U S. 369.

Cal. quinquepartitus. Cor. quinquefida. Baccæ triflora.

Ebulus. 1. **SAMBUCUS** cymis tripartitis, stipulis foliaceis, caule herbaceo. *Sp. pl. 385.*

Sambucus herbacea floribus umbellatis. Hall. hist. 671.

Sambucus humilis f. Ebulus. B. pin. 456. R. syn. 461.

Ebulus. Fuchs. hist. 65. Cam. epit. 979. f. sambucus humilis. Ger. em. 1426. Park. 209.

Anglis, dwarf Elder, or Danewort.

Habitat in sepibus et ad vias. 4. VII.

Pharmac. Ebuli Radix, Folia, Flores, Baccæ.

nigra. 2. **SAMBUCUS** cymis quinquepartitis, caule arboreo. *Sp. pl. 385. Fl. dan. 545.*

Sambucus arborea floribus umbellatis. Hall. hist. 670.

Sambucus. Cam. epit. 975. Ger. em. 1422. vulgaris. Park. 207. R. syn. 461.

Sambucus fructu in umbella nigri. B. pin. 456.

β *Sambucus fructu in umbella viridi. B. pin. 456.*

γ *Sambucus laciniato folio. B. pin. 456.*

Anglis, common Elder, γ Parsley Elder.

Habitat in sylvis et sepibus humidis. H. V.

Pharmac. Sambuci Cortex, Folia, Flores, Baccæ.

** *Flores inferi.*

STAPHYLEA. 370.

Cal. quinquepartitus. *Petala* quinque. *Caps.* inflatæ connatæ. *Sem.* duò globosa cum cicatrice.

* I. STAPHYLEA foliis pinnatis. *Sp. pl.* 386. *Hall. pinnata.*
hist. 831.

Staphylocarpus. *B. hist.* I. 274. *R. syn.* 468.

Nux vesicaria. *Park.* 1417. *Ger. em.* 1437.

Pistacea sylvestris. *B. pin.* 401.

Anglis, Bladder-nut-tree.

Habitat in sepibus circa Pontemfractum comitatus Eboracensis oppidum; in Cantio circa Ashfordiam inveniri apud Parkinsonum legimus. *R. syn.* H. VI.

ALSINE 377.

Cal. pentaphyllus. *Petala* quinque æqualia. *Caps.* unicocularis, trivalvis.

I. ALSINE petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis. *Fl. media.*
lapp. 186. *suec.* 267. *Dan.* 438. *Sp. pl.* 389.

Alsine foliis petiolatis, ovato-lanceolatis, petalis bipartitis. *Hall. hist.* 880.

Alsine media. *B. pin.* 250. f. minor. *Ger. em.* 611.

Alsine vulgaris f. morsus gallinæ. *B. hist.* III. 363.
R. syn. 347.

Anglis, common Chickweed.

Habitat in umbrosis, cultis ubique. ☽. III—X.

TETRAGYNIA.

PARNASSIA. 381.

Cal. quinquepartitus. *Petala* quinque. *Nectaria* quinque cordata, ciliata, apicibus globosis. *Caps.* quadrivalvis.

I. PARNASSIA. *Sp. pl.* 391. *Fl. lapp.* 108. *dan.* 581. *palustris.*
Hall. hist. 832.

PENTANDRIA PENTAGYNYIA.

Parnassia vulgaris et palustris. *Tourn.* 246. *R. syn.* 555.
Gramen parnassi minus. *Ger. em.* 840.
Gramen parnassi vulgare. *Park.* 429.
Gramen parnassi albo simplici flore. *B. pin.* 309.
Anglis, grass of Parnassus.
Habitat in pratis humidis in Wallia, et comitatibus Lancastriensi, Westmorlandico, Cumberlandico, etc.
frequens. 24. VIII.

PENTAGYNYIA.

* *Flores inferi.*

STATICE. 384.

Cal. monophyllus, integer, plicatus, scariosus. Petala quinque. Sem. unicum.

Armeria. 1. STATICE scapo simplici capitato, foliis linearibus.
Sp. pl. 394. Hall. hist. 835.

Statice montana minor. *Tourn.* 341. *R. Syn.* 203.

Limonium majus flore globofo. *Hist. Ox.* III. 601.
t. I. f. 29.

Caryophyllus montanus minor. *B. pin.* 211.

Caryophyllus marinus minimus. *Lob. Ger. em.* 602.

Gramen marinum minus. *Park.* 1279.

Anglis, common Thrift, or sea Gilly-flower.

Habitat in pratis et rupibus maritimis et alpinis, in monte Snowdon et alibi in Wallia et in comitatu Eboracensi prope Settle et Ingleborough. 24. VII. VIII.

Limonium. 2. STATICE scapo paniculato tereti, foliis lœvibus enerviis. *Sp. pl. 394. Fl. dan.* 315.

Limonium. *Ger. em.* 411. *R. syn.* 201. *majus vulgaris.* *Park.* 1234.

Limonium maritimum majus. *B. pin.* 192.

β *Limonium anglicum minus,* caulis ramosioribus, floribus in spicis rarius sitis. *R. hist.* III. 247. *syn.* 202.

γ *Limonium minus.* *R. syn.* 202.

Anglis, sea Thrift, or Lavender.

PENTANDRIA PENTAGYNA.

133

Habitat in *littoribus maritimis*. 4. VII. IX.
Pharmac. Limonii Radix.

3. STATICE scapo paniculato prostrato, ramis sterilibus *reticulata*-
retroflexis nudis, foliis cuneiformibus. Sp. pl. 394. ta.
Limonium minus, virgulis retiformiter se invicem im-
plicatis. Pluk. ph. t. 42. f. 4.
Limonium reticulatum. R. hist. 396. Bocc. sic. 82.
t. 44.

Anglis, matted Thrift or Sea-lavender.

Habitat in *littoribus maritimis* in comitatu Norfolk. 4.
VII. VIII.

L I N U M. 385.

Cal. pentaphyllus. Petala quinque. Caps. quinque-
valvis, decemlocularis. Sem. solitaria.

* Foliis alternis.

1. LINUM calycibus capsulisque mucronatis, petalis *usitatissi-*
crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule subsoli- *mum.*
tario. Sp. pl. 397.

Linum arvense. B. pin. 214. R. hist. 1073.

Linum sylvestre vulgatius. Park. 1334.

- β Linum sativum. Ger. em. 556. R. syn. 362.
Anglis, common Flax.

Habitat in *arvis et pascuis arenosis* in comitatibus Dor-
setiensi et Devonensi *passim*. O. VII.

Pharmac. Lini semina.

2. LINUM calycibus capsulisque obtusiusculis, foliis *perenne*.
alternis lanceolatis integerrimis. Sp. pl. 397. Mill.
fig. t. 166. f. 2.

Linum sylvestre cæruleum perenne erectius, flore et
capitulo majore. R. syn. 362.

Linum perenne majus cæruleum capitulo majore.
Hist. Ox. II. 573.

- β Linum sylvestre cæruleum perenne procumbens, flore
et capitulo minore. R. syn. 362.

Anglis, perennial Flax.

Habitat in *pascuis et pratis solo calcareo*. In agri Can-
tabrigiensis collibus Gogmagog, dictis copiose; at
Crosby Ravensworth, and between Shap and Threap-

PENTANDRIA PENTAGYNYIA.

land, Westmoreland, Mr. Lawson. *R. syn. prope Stamford copiose.* 4. VI. VII.

Obs. variat caule erecto et decumbente ex eadem Radice; Staminibus pistillis longioribus in planta erecta, et Staminibus pistillis brevioribus in planta decumbente.

angustifo- 3. LINUM calycibus capsulisque acuminatis, foliis linearium. LINUM calycibus capsulisque acuminatis, caule basi ramoso sub-declinato.

Linum sylvestre angustifolium floribus dilute purpurascens vel carneis. *B. pin.* 214. *R. syn.* 362.

Linum sylvestre VI angustifolium. *Clus. hist. I.* 318.

Linum foliis linearibus, calycibus longe aristatis. *Hall. hist.* 838.

Anglis, narrow-leaved Flax.

Habitat in pratis et pascuis aridis. In Cornubia et Devonia frequens; prope Minster in insula Shepey, prope Deal, et alibi in Cantio. 4. VI. VII.

** *Foliis oppositis.*

cathartica- 4. LINUM foliis oppositis ovato-lanceolatis, caule dichotomo, corollis acutis. *Sp. pl.*

Linum foliis conjugatis, ovatis, calycibus aristatis patulis, lanceolatis. *Hall. hist.* 839.

Linum sylvestre catharticum. *Ger. em.* 560. *R. syn.* 362.

Linum sylvestre, flosculis exiguis. *B. pin.* 214.

Chamælinum Clusii flore albo, s. Linum sylvestre catharticum. *Park.* 1336.

Anglis, purging Flax.

Habitat in pratis et pascuis siccioribus. ♂. V.—VII. Pharmac. Lini Cathartici Herba.

radiola. 5. LINUM foliis oppositis, caule dichotomo, floribus tetrandris tetragynis. *Sp. pl.* 402. *Fl. dan.* 178.

Linum tetrapetalon, caule ramosissimo, dichotomo. *Hall. hist.* 840.

Chamælinum vulgare. *Vaill. paris.* 33. t. 4. f. 6.

Radiola vulgaris serpyllifolia. *R. syn.* 345. t. 15. f. 3.

Mille-

Millegrana minima. *Ger. em.* 569. f. *Herniaria minor.* *Park.* 447.

Polygonum minimum f. *millegrana minima.* *B. pin.* 282.

Anglis, least Flax or All-seed.

Habitat in ericetis arenosis subhumidis. ☽. VIII.

H E X A G Y N I A.

D R O S E R A. 387.

Cal. quinquefidus. *Petala* quinque. *Caps.* unilocularis trivalvis. *Sem.* plurima.

1. DROSERA foliis orbiculatis, scapis radicatis, floribus hexagynis. *rotundifolia.*

Drosera scapis radicatis, foliis orbiculatis. *Sp. pl.* 402.

Ros solis folio rotundo. *B. pin.* 357. *R. syn.* 356.

Ros solis. *B. hist.* III. 761. major. *Ger. em.* 1557.
Park. 1052.

β *Rorella rotundifolia* perennis. *R. syn.* 356.

Anglis, round-leaved Sun-dew.

Habitat in paludibus. 24. VII. VIII.

Pharmac. Ros solis Herba.

2. DROSERA foliis oblongis, scapis radicatis, floribus *longifolia*. hexagynis.

Drosera scapis radicatis, foliis oblongis. *Sp. pl.* 403.

Ros solis folio oblongo. *B. pin.* 357. *R. syn.* 356.

Ros solis minor. *Ger. em.* 1557.

Ros solis sylvestris longifolius. *Park.* 1052.

Anglis, long-leaved Sun-dew.

Habitat in paludosis cum priore. 24. VII. VIII.

Obs. *Floribus in hac et precedenti hexagynis et capsulis trivalvis.*

3. DROSERA foliis oblongis, scapis radicatis, floribus *anglica*. octogynis.

Rorella longifolia maxima. *R. syn.* 356.

β *Rorella longifolia* perennis. *R. syn.* 356.

Anglis, great Sun-dew.

PENTANDRIA POLYGYNIA.

Habitat in paludosis, in comitatibus Westmorlandico, Cumberlandico, Eboracensi, Lancasterensi, Devonensi, Hantonensi, et Norfolkensi *passim*. 4. VII. VIII.

Obs. *habet multa communia cum precedente, sed major et capsulis quadrivalvis.*

SIBBALDIA. 389.

Cal. pentaphyllus decemfidus. Petala quinque calyce inserta. Styli e latere germinis. Sem. quinque.

procumbens. 1. SIBBALDIA foliis tridentatis. *Fl. lapp. III. suec. 216. Dan. 32. Sp. pl. 406. Pen. voy. II. 43. t. 5.*

Fragaria foliis ternatis, retusis tridentatis, floris calyci equali pentastemon. Hall. hist. III. 6.

Fragariæ sylvestri affinis planta, flore luteo. Sibb. pr. hist. nat. scot. p. II. 25. t. 6. f. I.

Pentaphylloides pumila foliis ternis ad extremitates trifidis. R. syn. 256.

Pentaphylloides fruticosum minimum procumbens, flote luteo, foliis sericeis fragariæ ternis. Pluk. pb. t. 212. f. 3.

Anglis, procumbent Sibbaldia,

Habitat in montosis; in sylvis regionis Jernensis Scotiæ sponte provenit. R. syn. in monte Ben Lomond dicto in Scotia. 4. VII. VIII.

POLYGYNIA.

MYOSURUS. 390.

Cal. pentaphyllus, basi adnatus. Nectaria quinque subulata petaliformia. Sem. numerosa.

minimus. 1. MYOSURUS foliis integris. *Sp. pl. 407. Fl. dan. 406. Myosurus. B. hist. III. 512. R. syn. 251.*

Holosteum affinis, Cauda muris. B. pin. 190.

Holosteum Loniceri, Cauda muris vocatum. Park. 500.

Cauda muris. Ger. em. 426.

Anglis, Mouse-tail.

Habitat in arvis, pratis et pascuis solo glarenso; inter segetes circa Wimbleton, inter Kentish-Town et Hampstead; prope Marylebone copiose. O. IV. V.

Obs. variat foliis hirsutis.

Classis

Classis VI.

HEXANDRIA
MONOGYNIA.

* *Flores Caliculati calyce corollaque instructi.*

BERBERIS. 442.

Cal. hexaphyllus. Petala sex: ad ungues glandulis duobus. Stylus o. Bacca disperma.

I. BERBERIS pedunculis racemosis. *Sp. pl. 541. vulgaris.*
Berberis racemifera, foliis ciliatis. Hall. hist. 828.
Berberis. Park. 1559. dumetorum. B. pin. 454. R.
syn. 465.

Spina acida sive Oxyacantha. Ger. em. 1325.

Anglis, common Barberry, or Pipperidge-bush.

Habitat in sylvis et sepibus. h. V. Vi.

Pharmac. Barberidis Cortex, Baccæ.

FRANKENIA. 445.

Cal. quinquefidus, infundibuliformis. Petala quinque. Stigmata tria. Caps. unilocularis, trivalvis.

I. FRANKENIA foliis linearibus confertis basi ciliatis. *lævis.*
Sp. pl. 473.

Franca maritima supina saxatilis glauca ericoides, sempervirens, flore purpureo. Mich. gen. 23. t. 22. f. 1.

Lychnis supina maritima ericæ facie. R. syn. 338.

Erica supina maritima. Ph. br. anglica. Park. 1484.

Polygonum maritimum minus, foliolis serpylli. B. pin. 281.

Polygonum pusillo vermiculato-serpyllifolio. Ger. em. 567.

Anglis, smooth Frankenia or Sea-Heath.

Habitat in palustribus maritimis solo luto. In Loving-land, just over the water at Yarmouth. R. syn. In insulis Sheppey et Thanet copiose, et in comitatibus Essexiensibus,

HEXANDRIA MONOGYNIA.

Essexiensi, Suffexiensi et Cantiano frequens. 24.
VII. VIII.

- pulveru-* 2. FRANKENIA foliis obovatis retusis subtus pulveru-
lenta. lentis. *Sp. pl.* 474.
Franca maritima quadrifolia supina, chamæsyces folio
et facie. *Mich. gen.* 23.
Alpine maritima supina foliis chamæsyces. *Tourn.*
665. *R. syn.* 352.
Anthyllis valentina. *Clus. hist.* II. 186.
Anthyllis marina, chamæsyces similis. *B. pin.* 282.
Anglis, dusty Frankenia or Sea-heath.
Habitat in littoribus maritimis. Found on the coast of
Suffex, and sent by Mr. Brewer. *R. syn.* In littore
Suffexiæ inter Bognor et Brighthelmston inveni. ○.
VII.

* *Flores spathacei.*

ALLIUM. 409.

Cor. sexpartita, patens. *Spatha* multiflora. *Umbella*
congesta. *Caps.* supera.

* *Foliis caulinis planis.*

- ampelo-* 1. ALLIUM caule planifolio umbellifero, umbella
prafum. globosa, staminibus tricuspidatis, petalis carina
scabris. *Sp. pl.* 423.
Allium radice sobolifera, foliis gramineis, spica sphæ-
rica, staminibus alterne trifidis. *Hall. hist.* 1218.
Allium holmense sphærico capite. *R. syn.* 370.
Allium sphærico capite, folio latiore s. Scorodopra-
sum. *B. pin.* 74. *Rudb. elys.* II. 151.
Scorodoprasum primum Clusii. *Ger. em.* 180.
Anglis, round-headed Garlick.
Habitat in parva quadam insula Holms dicta in Sabri-
næ æstuario copiose, D. Newton. *R. syn.* 24. VII.

- arena-* 2. ALLIUM caule planifolio, vaginis teretibus, spatha
rium. mutica, staminibus tricuspidatis. *Sp. pl.* 426. *It.*
scan. 227. *Fl. dan.* 290.

Allium

Allium foliis ciliatis, umbella bulbifera, staminibus alterne trifidis. *Hall. hist.* 1222.

Allium sylvestre amphicarpon, foliis porraceis, floribus et nucleis purpureis. *R. syn.* 370.

Allium montanum bicorne latifolium, flore dilute purpurascente. *B. pin.* 74.

Porrum planifolium, staminibus alterne trifidis, umbella bulbifera. *Hall. jen.* 154. t. 2. f. 2.

Anglis, sand Garlick.

Habitat in montibus Westmorlandicis, D. Lawson; in Troutbeck-holm by great Strickland. *R. syn.* 24. VI. VII.

3. **ALLIUM** caule planifolia bulbifero, staminibus sub-carinatis. *Sp. pl.* 426. *Fl. suec.* 281. *carn.* 236. tum.

Allium umbella bulbifera, vagina bicorni, foliis carinatis. *Hall. opusc. all.* 27. t. 1. f. 2.

Allium bulbo sobolifero, foliis succulentis, spatha bicorni, umbella bulbifera. *Hall. hist.* 1224.

Allium montanum bicorne purpureum proliferum. *R. syn.* 306.

Ampeloprasum proliferum. *Lob. ic.* 156.

Moly montanum II. *Clus. hist.* 213. 214.

Anglis, mountain Garlick.

Habitat in pratis et pascuis, in rupibus prope Longsle-dale in Westmorland, D. Richardson. *R. syn. prope Ramsgate in insula Thanet, et inter Sandwich et Deal.* 24. VI. VII.

** *Foliis caulinis teretibus.*

4. **ALLIUM** caule teretifolio bulbifero, staminibus tri-vineale. cuspidatis. *Sp. pl.* 428.

Allium radice multiplici, foliis fistulosis, capite sphærico bulbifero, staminibus alterne trifidis. *Hall. hist.* 1221.

Allium sylvestre. *Ger. em.* 179. *Park.* 870. *R. syn.* 369.

Allium campestre juncifolium capitatum purpurascens majus. *B. pin.* 74.

Anglis, crow Garlick.

Habitat in pratis et pascuis, 24. VI.

5. **ALLIUM**

oleraceum. 5. ALLIUM caule teretifolio bulbifero, foliis scabris semiteretibus subtus sulcatis, staminibus simplicibus. *Sp. pl.* 429.

Allium bulbo simplici, foliis fistulosis, spatha bicorni, umbella bulbifera. *Hall. hist.* 1223.

Allium umbella bulbifera, vagina bicorni, foliis teretibus. *Hall. opusc. All.* 26. t. 1. f. 4.

Allium montanum bicorne, flore exalbido. *B. pin.* 75.

Allium sylvestre bicorne flore exherbaceo albicante, cum triplici in singulis petalis stria atro-purpurea.
R. syn. 370.

Anglis, herbaceous Garlick.

Habitat in pratis et pascuis, et inter segetes. In a corn-field in Black-notley in Essex, belonging to the hall called Westfield, adjoining to Leeze-lane plentifully.
R. syn. In arvis in Westmorlandia passim; prope Bristolium copiose. 4. VII.

*** *Foliis radicalibus, scapo nudo.*

ursinum. 6. ALLIUM scapo nudo triquetro, foliis lanceolatis petiolatis, umbella fastigiata. *Sp. pl.* 431.

Allium foliis radicalibus petiolatis, ovato-lanceolatis, floribus umbellatis. *Hall. hist.* 1228.

Allium sylvestre latifolium. *B. pin.* 74. *R. syn.* 370.

Allium ursinum. *Ger. em.* 179. *Park. par.* 514.
Anglis, wild Garlick or Ramson.

Habitat in sylvis et sepibus frequens. 4. V.

GALANTHUS. 401.

Petala tria concava. Nectarium ex petalis tribus, parvis, emarginatis. Stigma simplex.

nivalis. *1. GALANTHUS. *Sp. pl.* 413.

Leucoium bulbosum trifolium minus. *B. pin.* 56.

Leucoium bulbosum præcox minus. *Ger. em.* 147.

Anglis, Snow-drop.

Habitat in pratis, et ad sepes; in pomariis frequens, in comitatibus Westmorlandico, Cumberlandico, Lancasteriensi, Gloucesterensi. 4. III. IV.

NARCISSUS. 403.

Petala sex. *Nectario infundibuliformi, monophyllo.*
Stam. intra nectarium.

*1. NARCISSUS spatha uniflora, nectario rotato bre- *poeticus.*
 vissimo scarioso crenulato. *Hort. upf.* 74. *Sp. pl.*
 414.

Narcissus uniflorus, foliis ensiformibus, scypho bre-
 vissimo. *Hall. hist.* 1250.

Narcissus medio luteus. *Ger. em.* 124. *vulgaris.*
Park. par. 74. *R. syn.* 371.

Narcissus pallidus circulo luteo. *B. pin.* 51.

Anglis, pale *Narcissus* or Daffodil.

Habitat in pratis et ad sepes, sed rarius. 4. V.

2. NARCISSUS spatha uniflora, nectario campanulato *pseude-*
recto crispo æquante petala ovata. *Sp. pl.* 414. *narcissus.*

Narcissus foliis ensiformibus, scapo unifloro, scypho
 undulato, ferrato, petalis æquali. *Hall. hist.* 1252.

Narcissus sylvestris paullidus calyce luteo. *B. pin.* 52.
R. syn. 371.

Pseudo-Narcissus anglicus. *Ger. em.* 133. *vulgaris*
Park. par. 100.

Anglis, common *Narcissus* or Daffodil.

Habitat in sylvis et ad sepes. *In sylvis prope Erith in*
agro Cantiano. 4. IV.

*** *Flores nudi.*

HYACINTHUS. 427.

Cor. campanulata: pori tres melliferi ad apicem ger-
minis.

1. HYACINTHUS corollis cylindraceo-campanulatis *nonscrip-*
sexpartitis apice revolutis, bracteis binatis. *tus.*

Hyacinthus corollis campanulatis sexpartitis apice re-
 volutis. *Sp. pl.* 453.

Hyacinthus anglicus. *Ger. em.* 111. *R. syn.* 373.
belgicus. f. hispanicus. *Park. par.* 122.

Hyacinthus oblongo flore cæruleus major. *B. pin.* 43.
Anglis,

HEXANDRIA MONOGYNIA.

Anglis, common Hyacinth or Harebells.
Habitat in sylvis et ad sepes. 4. V.

SCILLA. 419.

Cor. hexapetala, patens, decidua. Filamenta filiformia.

verna. 1. SCILLA corymbo hemisphærico paucifloro bracteato,
foliis subulato-linearibus canaliculatis.

Ornithogalum hispanicum minus. Clus. hist. 188.

Ger. em. 166. Park. par. 139. R. hist. 1153.

Ornithogalum umbellatum flosculis ex albo subcæru-
leis. B. pin. 70.

Anglis, vernal Squil.

Habitat in pratis et pascuis ; in clivis maritimis in insula
Mona, et in Cambria ; circa St. Ives copiose et alibi
in Cornubia ; hæc planta ex Scotia sub nomine Scillæ
bifoliæ accepi, quæ nec Scotiæ nec Angliæ indigena
est. 4. IV. V.

Desc. Radix bulbosa, tunicata fusca, magnitudine nucis
avelanæ. Scapus a duabus ad sex pollicares, erectus,
teres, aphyllus, lævis, glaber. Folia plurima subu-
lato-linearia, acuta, canaliculata, longitudine fere Sca-
pii. Flores corymbosi a tribus ad octo ; et in hortis a
sex ad sedecim pallide cærulei : Corymbus hemisphæri-
cus. Bractææ persistentes, membranaceæ, concavæ,
acutæ longitudine fere pedunculi.

autumna- 2. SCILLA foliis filiformibus linearibus, floribus co-
rumbosis, pedunculis nudis adscendentibus longitu-
dine floris. Sp. pl. 243.

Hyacinthus autumnalis minor. Ger. em. 110. Park.
par. 132. R. syn. 373.

Hyacinthus stellaris autumnalis minor. B. pin. 47.

Anglis, autumnal Squil or Star-hyacinth.

Habitat in pascuis siccis. In rupe S. Vincentii prope
Bristolium inque promontorio, Lizard Point, dicto co-
piose ; eundem in ericeto nigro in comitatu Cantii inve-
nit D. Plukenet, near Ditton, on Moulsey-Hurst,
over against Hampton-Court. R. syn. 4. VIII.
IX.

ORNITHOGALUM. 418.

Cor. hexapetala, erecta, persistens, supra medium patens. Filamenta alterna basi dilatata.

1. ORNITHOGALUM scapo angulo diphyllo, pedunculis umbellatis simplicibus. *Sp. pl. 439. Fl. dan. 378.*

Ornithogalum luteum. *B. pin. 71. Park. par. 140. R. syn. 372. f. Cepe agraria. Ger. em. 165.*
Phalangium radice bulbosa, stipulis maximis hirsutis, floribus umbellatis, petiolis unifloris. *Hall. hist. 1213.*

Anglis, yellow Star of Bethlehem.

Habitat in pratis et pascuis; in comitatu Eboracensis septentrionali parte prope pontem Greta et Bignal vicum in sylvis ad fluvium Tesam observavit D. Johnson. R. syn. prope Doncaster. D. Tofield, prope Kendal in Westmorlandia. 4. IV.

2. ORNITHOGALUM racemo longissimo, filamentis lanceolatis, pedunculis floriferis patentibus æqualibus: fructiferis scapo approximatis. *Sp. pl. 440. Jac. austr. II. 2. t. 103.*

Ornithogalum angustifolium majus, floribus ex albo virescentibus. *B. pin. 70. R. syn. 373.*

Asphodelus bulbosus. *Ger. em. 97. Galeni f. Ornithogalum majus, flore subvirente. Park. par. 136.*

Phalangium longissime spicatum, filamentis latis lanceolatis. *Hall. hist. 1210.*

Anglis, pyrenean Star of Bethlehem.

Habitat in pratis et pascuis. In the way between Bath and Bradford, not far from little Ashley. Ph. br. On the left hand of a farm, half a mile from Chichester southgate, in a meadow, plentifully. Mr. Manningham. R. syn. 4. VI.

- *3. ORNITHOGALUM floribus corymbosis, pedunculis scapo altioribus, filamentis emarginatis. *Sp. pl. 441. tum.*

Orni-

HEXANDRIA MONOGYNIA.

- Ornithogalum stipulis maximis, petiolis lateralibus longissimis.* *Hall. hist.* 1215.
Ornithogalum umbellatum medium angustifolium.
B. pin. 70. *R. syn.* 372.
Ornithogalum vulgare. *Ger. em.* 165. *Park. par.* 136.
Anglis, common Star of Bethlehem.
Habitat in sylvis, pratis et pascuis, in Norfolk. D. Stillingfleet. 24. IV. V.

FRITILLARIA. 411.

Cor. hexapetala, campanulata, supra unguis cavitate nectarifera. *Stam.* longitudine corollæ.

- meleagris.* *1. FRITILLARIA foliis omnibus alternis, caule unifloro. *Sp. pl.* 436. *Syst. nat.* 141.
Fritillaria caule paucifloro, foliis caulinis gramineis alternis. *Hall. hist.* 1235.
Fritillaria præcox purpurea variegata. *B. pin.* 64.
Fritillaria vulgaris. *Park. par.* 40.
Fritillaria variegata. *Ger. em.* 149.
Anglis, common Fritillary, chequered Daffodil or Snake's-head.
Habitat in pratis et pascuis: In Mawde Fields near Rislip common, Middlesex. Blacks. Spec. bot. 23. prope Bury, D. Cullum; in pratis inter Mortlake et Kew, et prope Enfield. 24. IV. V.

ANTHERICUM. 422.

Cor. hexapetala, patens. *Caps.* ovata.

- serotinum.* 1. ANOTHERICUM foliis planiusculis, scapo unifloro. *Sp. pl.* 444.
Bulbocodium foliis subulato-linearibus. *Roy. lugdb.* 41.
Bulbocodium alpinum juncifolium, flore unico: intus albo extus squalide rubente. *R. syn.* 274. t. 17. f. 1.
Pseudo-Narcissus gramineo folio. *B. pin.* 51. pr. 27.
Phalangium foliis crassulis, scapo unifloro. *Hall. hist.* 1209.
Anglis, bulbous Anthericum.

Habitat

Habitat in excelsis rupibus montis Snowdon, et prope Llanberrys, v. g. Trigvylchau y. Clogwyn du ynhem y Glydir, Clogwyn yr Ardhu, Crib y Distil, &c. D. Lwyd. ad latus occidentale montis Trigvylchau. D. Richardson. R. syn. in rupibus Crib y Distil inveni. 4. IV. V.

NARTHECIUM. Fl. angl. 127.

CAL. nullus.

COR. Petala sex, æqualia, lanceolata, acuta, erectiuscula persistentia.

STAM. Filamenta sex, subulata, lanata, Antheræ parvæ incumbentes.

PIST. Germen triquetrum. Stylus nullus. Stigma obtusum.

PER. Capsula avata, acuta, triquetra, trilocularis, trivalvis.

SEM. numerosa paleacea.

1. NARTHECIUM. Moehr. E. N. C. 1742. 389. offifrat.
t. 5. f. 1. gum.

Anthericum foliis ensiformibus, filamentis lanatis. Sp. pl. 446. Fl. suec. 287. sibir. I. 73. t. 18. f. 1. dan. t. 42.

Phalangium anglicum palustre Iridis folio. R. syn. 375.

Asphodelus Lancastriæ verus. Ger. em. 95.

Pseudo-Asphodelus palustris anglicus. B. pin. 29.

Anglis, yellow Narthesium or Lancashire Asphodel.

Habitat in paludibus cæspitosis et turfosis. 4. VII. VIII.

ASPARAGUS. 424.

Cor. sexpartita, erecta: petalis tribus interioribus apice reflexis. Bacca trilocularis, disperma.

1. ASPARAGUS caule herbaceo suberecto, foliis seta-officinalis,
ceis, stipulis duabus interioribus, una exteriore.
Sp. pl. 448.

Asparagus. Cam. epit. 259. Ger. em. 1110. Park.
454. R. syn. 267. sativus. B. pin. 489.

Asparagus sylvestris, tenuissimo folio. B. pin. 490.

Asparagus maritimus, crassiore folio. B. pin. 490.

L

Anglis,

Anglis, common Sparagus.

Habitat in pratis et rupibus maritimis. Ad promontorium dictum Lizard Point invenimus; in the marshes near Bristol, below Looks Folly; near Gravesend; R. syn. in insula Portlandica. 4. VII. VIII.

Obs. variat caule erecto et prostrato, floribus masculis, feminineis et hermaphroditis; Baccis monospermis et dispermis.

CONVALLARIA. 425.

Cor. sexfida. Baccia maculosa, trilocularis.

majalis.

1. CONVALLARIA scapo nudo. Sp. pl. 451.

Polygonitum scapo diphylo, floribus spicatis, nutantibus, campaniformibus. Hall. hist. 1241.

Lilium convallium. Cam. epit. 618. Ger. em. 410.

R. syn. 264. album. B. pin. 304.

Lilium convallium flore albo. Park. par. 349.

β Lilium convallium angustifolium. R. syn. 264.

Anglis, may Lily-convally or May-lily.

Habitat in sylvis et ericetis frequens. prope Hampstead. 4. V.

Pharmac. Lilii convallii Flores.

*polygona-
tum.*

2. CONVALLARIA foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus subunifloris.

Sp. pl. 451. Phil. bot. 218. Fl. dan. 377.

Polygonatum caule simplici, angulo, cernuo, foliis ovato-lanceolatis, rigidis, alis unifloris. Hall. hist. 1242.

Polygonatum latifolium II. Clusii. Ger. em. 904.

Polygonatum latifolium flore majore odoro. B. pin. 303.

Polygonatum floribus ex singularibus pediculis. B. hist. III. 529. R. syn. 263.

Polygonatum majus flore majore. Park. 696.

β Polygonatum Hellebori albi folio, caule purpurascente.

R. syn. 263.

Anglis, sweet Lily-convally or Solomon's Seal.

Habitat in fissuris rupium prope Settle, Skipton, &c. in comitatu Eboracensi. 4. V. VI.

3. CONVALLARIA foliis alternis amplexicaulibus, *multiflora* caule tereti, pedunculis axillaribus. *Sp. pl.* 452. *ra.*
Fl. suec. 295. *dan.* 152.

Polygonatum caule simplici cernuo, foliis ovato-lanceolatis, petiolis multifloris. *Hall. hist.* 1243.

Polygonatum. *Ger. em.* 903. *R. syn.* 263. *vulgare.*
Park. 696.

Polygonatum latifolium *vulgare.* *B. pin.* 303.

β Polygonatum humile anglicum. *R. syn.* 263.

Anglis, common Lily-convally or Solomon's Seal.

Habitat *in sylvis.* In the woods by Bramdean in Hampshire, Mr. Doody; on Roehill in Kent. Mr. J. Sherard. *R. syn.* in the Beach woods about High Wickham, Bucks. Mr. Hill. Blackf. Spec. bot.
4. V. VI.

Pharmac. *Polygonati Radix.*

P E P L I S. 446.

Perianthium campanulatum: ore duodecimfido. *Petalæ sex*, calyci inserta. *Caps.* bilocularis.

1. PEPLIS floribus apetalis. *Sp. pl.* 474. *Fl. dan.* 64. *portulaca.*

Portulaca. *Dill. giss.* 120. *R. syn.* 368.

Alfine rotundifolia f. Portulaca aquaticæ. *Ger. em.* 614.

Alfine palustris minor, serpyllifolia. *B. pin.* 120.

Alfine aquatica minor folio oblongo f. Portulaca aquatica. *Park.* 1260.

Anglis, water Peplis or Purslane.

Habitat *in palustribus et aquosis.* 4. VIII. IX.

*** *Flores apetali.*

A C O R U S. 434.

Spadix cylindricus, tectus flosculis. *Cor.* hexapetalæ, nudæ. *Stylus nullus.* *Caps.* trilocularis.

1. ACORUS. *Sp. pl.* 462. *Hall. hist.* 1307. *calamus.*

Accrus verus, officinis falso Calamus. *Ger. em.* 62.

Acorus verus f. Calamus aromaticus off. *B. pin.* 34.

Acorus verus f. Calamus off. *Park.* 140. *R. syn.* 437.

Anglis, sweet Acorus or Calamus.

L 2

Habitat

HEXANDRIA MONOGYNIA.

Habitat in fluviis fundo cœnōsis. In the river Yare near Norwich, about Hedley in Surry, and in Cheshire. R. syn. in ericeto Hounsflejano; prope Harefield 4. V. VI.

Pharmac. Calami aromatici Radix.

JUNCUS. 437.

Cal. hexaphyllus. *Cor.* o. *Caps.* unilocularis.

* *Culmis nudis.*

acutus. 1. JUNCUS culmo subnudo tereti mucronato, panicula terminali, involucro diphyllo spinoso. Sp. pl. 463.

Juncus acutus capitulis Sorghi. B. pin. 10. R. syn. 431.

Juncus maritimus capitulis Sorghi. Park. 1192.

β Juncus acutus maritimus anglicus. R. hist. 1303.
Hist. Ox. III. 232. t. 10. f. 15.

Anglis, sea Rush.

Habitat in paludosis maritimis. 4. VII. VIII.

conglomer- 2. JUNCUS culmo nudo stricto, capitulo laterali. Sp. ratus. pl. 464. Fl. suec. 298.

Juncus caule nudo, foliis teretibus mollibus, panicula conglomerata. Hall. hist. 1312.

Juncus lœvis vulgaris panicula compactiore. R. syn. 432.

Juncus lœvis panicula non sparsa. B. pin. 12.

Juncus lœvis glomerato flore. Lob. ic. 84. Park. 1192.
Anglis, common Rush.

Habitat in pratis et ericetis humidiusculis. 4. VII. VIII.

effusus. 3. JUNCUS culmo nudo stricto: panicula laterali. Sp. pl. 464. Fl. 299.

Juncus caule nudo, foliis teretibus striatis, panicula laterali sparsa. Hall. hist. 1311.

Juncus lœvis vulgaris, panicula sparsa nostras. R. syn. 432.

Juncus lœvis. Ger. em. 39. panicula sparsa major.
B. pin. 12. Park. 1191.

β Juncus

3 Juncus acutus. *Ger. em.* 39. *R. syn.* 432. *vulgaris.*
Park. 1193.

Anglis, soft & hard Rush.

Habitat in pratis et pascuis paludosis. 24. VI.—VIII.

4. JUNCUS culmo nudo filiformi nutante, panicula *filiformis.*
laterali. *Sp. pl.* 465. *Gron. virg.* 152.

Juncus caule nudo, foliis teretibus mollibus, panicula
laterali pauciflora. *Hall. hist.* 1313.

Juncus lœvis, panicula sparsa, minor. *B. pin.* 12.
tb. 183. *Sch. agr.* 347. *t.* 7. *f.* 1.

Juncus parvus, calamo supra paniculam longius pro-
ductio. *R. syn.* 432. *Pluk. ph.* *t.* 40. *f.* 8.

Anglis, least Rush.

Habitat in montibus turfosis. Found by Mr. Newton
not far from Ambleside, in Westmorland. 24. VIII.

5. JUNCUS culmo nudo, foliis floribusque tribus ter- *trifidus.*
minalibus. *F. lapp.* 119. *Sp. pl.* 465. *Fl. dan.* *t.*
107. *Schm. Gesn.* *t.* 4. *f.* 16.

Juncus acumine reflexo trifidus. *B. pin.* 12. *pr.* 22.
tb. 186. *Hall. hist.* 1315.

Anglis, trifid Rush.

Habitat in montibus paludosis, ex Scotia recipi. 24. VI.

6. JUNCUS culmo nudo, foliis setaceis, capitulis glo- *squarro-*
meratis aphyllis. *Sp. pl.* 465. *Fl. suec.* 302. *dan.* 430. *sus.*

Juncus rigidus, panicula spicata, floribus cartilagi-
neis. *Hall. hist.* 1317.

Juncus montanus palustris. *R. syn.* 432. *Fl. lapp.* 121.

Gramen junceum maritimum. *Lob. ic.* 18. *Ger. em.*
21. majus. *Park.* 1270.

Gramen junceum, foliis et spica junci. *B. pin.* 5.

Anglis, moss Rush or Goose-corn.

Habitat in ericetis frequens. 24. VI. VII.

** *Culmis foliisis:*

7. JUNCUS foliis nodoso-articulatis, petalis obtusis. *articula-*
Sp. pl. 465. *Fl. suec.* 305. *tus.*

Juncus foliis articulosis, panicula inæquali, capitulis
sessilibus, capsulis subulatis triquetris. *Roy. lugdb.* 43.

HEXANDRIA MONOGYNIA.

Juncus foliis articulatis, compressis, panicula semel ramosa. *Hall. hist.* 1322.

Juncus foliis articulatis, floribus umbellatis. *Tourn.* 247. *R. syn.* 433.

Germen aquaticum. *Tab. ic.* 214. *Ger. em.* 22.

Germen junceum folio articulato aquaticum. *B. pin.* 5.

Germen junceum aquaticum. *Park.* 1270.

β *Juncus* foliis articulatis, teretibus, panicula repetito ramoso. *Hall. hist.* 1323.

Juncus nemorosus folio articulo. *R. syn.* 433.

γ *Juncus* caule brachiato, foliis setaceis, floribus fasciculatis, ad ramas sessilibus. *Hall. hist.* 1320.

Germen junceum minimum, capsulis triangularibus. *R. syn.* 434. *Hist. Ox.* III. 227. t. 9. f. 3.

Graminis juncei varietas minor. *Ger. em.* 4.

Anglis, jointed Rush.

Habitat in pratis et pascuis humidis β in sylvis γ in ericetis arenosis. 24. VII. VIII.

bulbosus. 8. *JUNCUS* foliis linearibus canaliculatis, capsulis obtusis. *Sp. pl.* 466. *Mees. Fl. fris.* 160. *dan.* 431.

Juncus compressus, foliis linearibus canaliculato-concavis, capsulis ovatis, culmo compresso. *Jac. enum.* 235.

Juncus foliis carinatis, panicula sparsa, fructu globoso. *Hall. hist.* 1318.

Juncus parvus cum pericarpiis rotundis. *B. hist.* II. 522. *R. syn.* 433.

Anglis, bulbous Rush.

Habitat in pratis et ericetis humidis. 24. VIII.

biflorus. 9. *JUNCUS* culmo dichotomo, foliis angulatis, floribus solitariis sessilibus. *Sp. pl.* 466. *Fl. suec.* 305.

Juncus caule brachiato, foliis setaceis, floribus solitariis ad ramum sessilibus. *Hall. hist.* 1319.

Juncus palustris humilior erectior. *Tourn.* 246. *R. syn.* 434.

Germen junceum. *Ger. em.* 4. *parvum*, s. *Holosteum Matthioli* et *Germen bufonium Flandrorum.* *Park.* 1190.

Germen nemorosum, calyculis paleaceis. *B. pin.* 7. β *Germen*

β Gramen juncoides minimum, &c. *Lob. ill. 70. R. syn.*

434.

Anglis, toad Rush or Grass.

Habitat in pratis et pascuis arenosis, præcipue ubi aquæ pluviales stagnant. ☽. VII. VIII.

10. JUNCUS foliis planis, gluma triflora terminali. *triglumis.*

Sp. pl. 467. Fl. suec. 306. dan. 120.

Juncus gluma triflora culmum terminante. *Fl. lapp.*

115. t. 10. f. 5.

Juncus caule bifolio, foliis teretibus, floribus terminantibus ternis. *Hall. hist. 1314.*

Juncus exiguus montanus mucrone carens. *B. pin. pr. 22. tb. 183. Rudb. elys. I. 103. f. 8.*

Juncello accedens graminifolia plantula capitulis ameriæ proliferæ Lhwd. *R. syn. 430.*

Gramen cyperoides inminimum caryophylli prolieri capitulo simplici squamato. *Hist. Ox. III. 245. t. 12. f. 40.*

Anglis, three-flowered Rush.

Habitat in paludibus alpinis. On the mountains of Wales Lhwyd. *R. syn. in paludibus, prope rupibus Trigvylchau dictis juxta Llanbery. 24. VI. VII.*

11. JUNCUS foliis planis pilosis, corymbo ramoso, floribus solitariis.

Juncus foliis planis pilosis, corymbo ramoso. *Sp. pl. 468. Fl. suec. 308.*

Juncus foliis gramineis hirsutis, floribus umbellatis solitariis, petiolatis, aristatis. *Hall. nom. et hist. 1325.*

Gramen nemorosum hirsutum. *Lob. ic. 16. Ger. em. 19. majus. Park. 1184. latifolium. B. pin. 7. tb. 101. Hist. Ox. III. 225. f. 8. t. 9. f. 1.*

Gramen nemorosum hirsutum vulgare. *R. syn. 416.*

Anglis, hairy Rush.

Habitat in sylvis frequens. 24. IV. V.

12. JUNCUS foliis planis pilosis, corymbo decomposito-*sylvaticus.* fito, floribus fasciculatis sessilibus.

Juncus foliis gramineis hirsutis, floribus paniculatis, fasciculatis. *Hall. nom. et hist. 1324.*

HEXANDRIA TRIGYNIA.

Gramen nemorosum hirsutum latifolium maximum.

R. syn. 416. Sch. agr. 317.

Gramen Luzulæ maximum. *B. hist. II. 493.*

Anglis, wood Rush.

Habitat in sylvis et sepiibus; prope Hampstead. 4. V.

campes-tris. 13. JUNCUS foliis planis pilosis, spicis sessilibus pendunculatisque. *Sp. pl. 468. Fl. suec. 309.*

Juncus foliis gramineis hirsutis, spicis petiolatis nuntantibus, petalis aristatis. *Hall. nom. et hist. 1330.*

Gramen hirsutum capitulis psyllii. *B. pin. 7. pr. 15.*

Gramen exile hirsutum. *Ger. em. 17.*

Gramen nemorosum hirsutum minus angustifolium. *Park. 1185.*

β Gramen hirsutum elatius, panicula juncea compacta.

R. syn. 416.

Anglis, field Rush.

Habitat in pratis, pascuis et ericetis, β in paludibus turfosis frequens. 4. IV. V.

TRIGYNYIA.

* Flores inferi.

TRIGLOCHIN. 453.

Cal. triphyllus. Petala tria calyciformia. Stylus o. Caps. basi dehiscens.

palustre. 1. TRIGLOCHIN capsulis trilocularibus sublinearibus *Sp. pl. 482. Fl. succ. 321. dan. 490.*

Juncajo palustris et vulgaris. *Tourn. 266. R. syn. 435.*

Gramen juncuum spicatum seu Triglochin. *B. pin. 6.*

Gramen marinum spicatum. *Ger. em. 20. alterum.*

Park. 1279.

Anglis, marsh Triglochin or Arrow-headed Grass.

Habitat in pratis et pascuis uidis. 4. VII. VIII.

mariti-mum. 2. TRIGLOCHIN capsulis sexlocularibus ovatis. *Sp. pl. 483. Fl. suec. 322. dan. 306.*

Gramen marinum spicatum. *Lob. ic. 16. Park. 1278.*

R. syn. 435.

Gramen

Gramen juncum et spicatum alterum. *B. pin.* 6.
Anglis, sea Triglochin, or spiked Gras.
 Habitat in pratis maritimis. 24. V—VIII.

R U M E X. 451.

Cal. triphyllus. *Petala tria, conniventia. Sem. unicum triquetrum.*

* *Hermafroditii*: valvulis granulo notatis.

1. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis integer-sanguine-
 rimis: unica granifera, foliis cordato-lanceolatis. us.
Sp. pl. 476 *Roy. lugdb.* 229.

Lapathum folio acuto rubente. *B. pin.* 115. *R. syn.*
 142.

Lapathum sativum sanguineum. *Ger. em.* 390.
Anglis, blood Dock.

Habitat in sylvis, sed rarius, prope Hampledium, et prope
 Maidston in Cantio. 3. VII.

Pharmac. Lapathi sanguinei Folio, Semina.

2. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis integris *crispus*,
 graniferis, foliis lanceolatis undulatis acutis. *Sp. pl.*
 476.

Lapathum foliis crispis, imis ovatis, supremis lanceo-
 latis, calycibus verrucosis. *Hall. hist.* 1589.

Lapathum folio acuto criso. *B. pin.* 115. *R. syn.*
 141.

Lapathum acutum minus. *Park.* 1226.

Lapathi acuti varietas folio criso. *Ger. em.* 387.

Anglis, curled Dock.

Habitat in pratis, pascuis et ad vias. 24. VI. VII.

3. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis dentatis: *pulcher*.
 subunica granifera, foliis radicalibus panduriformi-
 bus. *Sp. pl.* 477.

Lapathum foliis radicalibus utrinque emarginatis, ca-
 lyribus reticulatis, ciliatis, verrucosis. *Hall. hist.*
 1593.

Lapathum pulchrum bononiense sinuatum. *B. hist.*
 II. 988. *R. syn.* 142.

Anglis,

Anglis, fiddle Dock.

Habitat in ruderatis, pratis siccis et ad vias. 4. VII.
VIII.

paludosus. 4. RUMEX floribus hermaphroditis : valvulis integris
graniferis, foliis ovato-lanceolatis acutiusculis.

Lapathum petiolis latescentibus, foliis longe lanceo-
latis floribus, verticillatis verrucosis. Hall. hist.
1590.?

Lapathum aquaticum minus. B. hist. II. 987?

Lapathum acutum angustifolium non crispum. R. syn.
141.

Anglis, marsh Dock.

Habitat in palustribus et ad ripas fluviorum. 4. VIII.

Desc. Radix perennis ramosa. Caulis erectus quadripe-
dalischistatus, ramosus; ramis alternis erectis. Folia
radicalia, ovata, obtusiuscula, subcrenulata. Caulina
alterna, petiolata, ovato-lanceolata, subcrenulata, acuti-
uscula, plana, nuda, petiolis brevibus. Stipula vagi-
nans, membranacea. Flores verticillati, pedunculati,
verticillis fere distinctis. Valvula exterior florum gra-
num magnum rubrum habet, reliquæ granum minimum
habent.

*Hydro- 5. RUMEX floribus hermaphroditis : valvulis integris
patheum.* graniferis, foliis lanceolatis acutis.

Lapathum foliis longe lanceolatis, paniculis densissi-
mis. Hall. hist. 1588.

Lapathum maximum aquaticum s. Hydrolapathum.
B. hist. II. 986. R. syn. 140.

Lapathum aquaticum folio cubitali. B. pin. 116.

Lapathum longifolium nigrum palustre, s. Britannica
antiquorum vera, vel Hydrolapathum nigrum.
Munt. brit. t. I.

Hydrolapathum magnum. Ger. em. 389.

Hydrolapathum majus. Park. 1225.

Anglis, water Dock.

Habitat in palustribus, et ad ripas fluviorum. 4. VII.
VIII.

Pharmac. Hydrolapathi Radix.

6. RUMEX floribus hermaphroditis : valvulis dentatis *obtusifoli-graniferis*, foliis cordato-oblongis *obtusiusculis*, cre-nulatis. *Sp. pl. 478.*
Lapathum foliis ovatis, circa petiolum emarginatis floribus dense paniculatis, serratis verrucosis. *Hall. hist. 1592.*
Lapathum. *Cam. ep. 228.* vulgare folio obtuso. *B. hist. II. 984.* *R. syn. 141.*
Lapathum sylvestre, folio minus acuto. *Ger. em. 388.*
Lapathum sylvestre, folio subrotundo. *B. pin. 115.*
Lapathum sylvestre vulgatius. *Park. 1225.*
 β *Anglis*, blunt Dock.
Habitat in ruderatis et aquosis. 24. VII. VIII.
7. RUMEX floribus hermaphroditis : valvulis dentatis *acutus*. graniferis, foliis cordato-oblongis acuminatis. *Sp. pl. 478.* *Fl. suec. 316.*
Lapathum petiolo latescente, foliis longe lanceolatis calyce ferrato. *Hall. hist. 1591.*
Lapathum acutum. *Ger. em. 388.* *R. syn. 142.* manus. *Park. 1224.*
Lapathum folio acuto plano. *B. pin. 115.*
 β *Lapathum viride*. *Pet. Herb. br. t. 2. f. 6.* *R. syn. 141.*
Anglis, sharp Dock.
Habitat in pratis, pascuis et ad vias. 24. VII. VIII.
Pharmac. *Oxylapathi Radix.*
8. RUMEX floribus hermaphroditis : valvulis dentatis *maritimus*. graniferis, foliis linearibus. *Sp. pl. 478.* *mus.*
Lapathum folio acuto flore aureo. *B. pin. 115.* *R. syn. 142.*
Lapathum aquaticum angustissime acuminato folio. *Boc. mus. II. 142.* *t. 104.*
Lapathum aureum glomerulis densis. *Pet. herb. br. t. 2. f. 8.*
Anthoxanthon. *B. hist. II. 988.*
 β *Lapathum aureum*. *Pet. herb. br. t. 2. f. 7.*
Anglis, golden Dock.
Habitat in ruderatis et ad vias. 24. VII. VIII.

** *Hermafroditi* :

** *Hermaphroditii* : *valvulis granulo* *destitutis.*

- digynus.* 9. RUMEX floribus hermaphroditis digynis. Sp. pl. 480. Fl. suec. 317. Dan. 14.
Lapathum foliis antice emarginatis. Hall. hist. 1595.
Acetosa cambroritana montana. Park. 745.
Acetosa rotundifolia repens eboracenfis, folio in medio deliquum paciente. Hist. Ox. II. 583. f. 5. t. 36. f. penult.
Acetosa repens Westmorlandica, cochléariæ foliis apicibus nonnihil sinuatis. Pluk. ph. t. 252. f. 2.
Anglis, mountain Dock, or Sorrel.
Habitat in montibus Wallicis, Eboracenibus, Westmorlandicis & Cumberlandicis, frequens. 4. VI. VII.

*** *Floribus dioicis.*

- Acetosa.* 10. RUMEX floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis. Sp. pl. 481.
Lapathum sexubus separatis, foliis sagittatis, hamis retrorsum porrectis. Hall. hist. 1597.
Lapathum acetosum vulgare. R. syn. 143.
Acetosa pratensis. B. pin. 114.
Acetosa vulgaris. Park. 742.
Oxalis seu *Acetosa*. Ger. em. 396.
Acetosa montana maxima. B. pin. 114. R. syn. 143.
Anglis, common Dock, or Sorrel.
Habitat in pratis et pascuis. β in sylvis montosis humidiusculis passim. 4. VI.
Pharmac. *Acetosæ pratensis.* Radix, Folia, Semina.

- Acetosel-*
la. 11. RUMEX floribus dioicis, foliis lanceolato-hastatis. Sp. pl. 481. Fl. lapp. 131. suec. 319.
Lapathum sexubus separatis, foliis sagittatis, hamis acutis, recurvis. Hall. hist. 1596.
Lapathum acetosum repens lanceolatum. R. syn. 143.
Acetosa arvensis lanceolata. B. pin. 114.
Acetosa minor lanceolata. Park. 744.
Oxalis tenuifolia. Ger. em. 397.
Anglis, sheep's Dock or Sorrel.
Habitat in pratis et pascuis arenosis. h. V—VII.
Pharmac. *Acetosæ lanceolatæ* Folia.

TOFIELDIA.

TOFIELDIA.

CAL. nullus.*COR.* Petala sex, æqualia, oblonga, obtusa, concava, persistentia.*STAM.* Filamenta sex subulata, glabra, longitudine petalorum Antheræ parvæ, subrotundæ, incumbentes.*PIST.* Germen trigonum. Styli tres subulati, patentes. Stigmata obtusa.*PER.* Capsula subrotunda, subtrigona, trilocularis, sexvalvis.*SEM.* numerosa, oblonga, subtrigona, parva.

I. TOFIELDIA.

Anthericum, calyculatum, foliis ensiformibus, perianthiis trilobis, filamentis glabris. Sp. pl. 447. Fl. dan. 36.*Anthericum filamentis glabris.* Hall. hist. 1205.*Scheuchzeria Pseudo-asphodelus.* Scop. Carn. 263.*Phalangium scoticum palustre minimum iridis folio.* Tourn. 369. R. syn. 375.*Phalangium alpinum palustre eridis folio.* Segu. ver. II. 61. t. 14.*Pseudo-asphodelus alpinum.* B. pin. 29.*Anglis,* marsh Tofieldia, or Asphodel.*Habitat in palustribus montosis.* Juxta rivulum non procul Bervico in Scotia. R. syn. on Glenmore, Ross-shire and Ben Gruin, Sutherland. D. Hope. 24. VII—IX.

COLCHICUM. 457.

Spatha. Cor. sexpartita; tubo radicato. Caps. tres connexæ, inflatæ.I. COLCHICUM foliis planis lanceolatis erectis. Sp. autum-
pl. 485. Bæhm. Lips. 29.

nale.

Colchicum flore folia longe præcedente, petalis ovatis.
Hall. hist. 1255.*Colchicum commune.* B. pin. 67. R. syn. 373.*Colchicum.* Dod. purg. 371. anglicum purpureum et album. Ger. em. 157. Park. par. 153.*Anglis,* autumnal Colchicum, or meadow-Saffron.*Habitat in pratis tam planis quam montosis, solo pingui in Occidentalib[us] 9*

HEXANDRIA POLYGYNIA.

Occidentalibus ut et Septentrionalibus Angliae. R.
syn. 4. VIII. IX.

POLYGINIA.

ALISMA. 460.

Cal. triphyllus. Petala tria. Sem. plura.

Plantago. Δ. 1. ALISMA foliis ovatis acutis, fructibus obtuse trigonis. *Sp. pl.* 468. *Fl. dan.* 561.

Damasonium foliis ellipticis, lanceolatis, capitulo rotunde triquetro. *Hall. hist.* 1184.

Plantago aquatica. *Cam. epit.* 264. *R. syn.* 257. major. *Ger. em.* 417. *Park.* 1245.

Plantago aquatica latifolia. *B. pin.* 190.

β *Plantago aquatica longifolia.* *Pet. h. br. t.* 43. l. 7.

γ *Plantago aquatica, λεπτομακρόφυλλος.* *Fl. pruf. I.* 99. ic. 66. *R. syn.* 258.

Anglis, greater Water-plantain.

Habitat in aquosis et ad ripas fluviorum. 4. VII.

ranuncu- 2. ALISMA foliis linear-lanceolatis, fructibus globo-squarrofis. *Sp. pl.* 487. *Fl. dan.* 122.

Plantago aquatica minor. *Park.* 1245. *R. syn.* 257.

Plantago aquatica humilis. *Ger. em.* 417.

Plantago aquatica angustifolia. *B. pin.* 190.

β *Plantago aquatica minor, ranunculi flammei majoris folio.* *Pluk. Amalb.* 175. *R. syn.* 258.

Anglis, lesser Water-plantain.

Habitat in aquosis et in paludibus turfosis. 4. VI—IX.

natans. 3. ALSIMA foliis ovatis obtusis, pedunculis solitariis. *Sp. pl.* 487. *Fl. suec.* 324.

Alisma repens, foliis gramineis et subrotundis. Mart. Tourn. 17.

Damasonium repens, potamogetonis rotundifolii folio: Vaill. *Act. paris.* 1719. 29. t. 4 f. 8.

Anglis, creeping Water-plantain.

Habitat in lacubus et fossis majoribus. In the Great Lake, below the old Castle at Llanberys. Mr. Brewer. Mart. Tourn. 4. VII. VIII.

Obs. *Folia submersa linearia; natantia ovata.*

4. ALISMA foliis cordato-oblongis, floribus hexagynis, *Damasonium*
capsulis subulatis. *Sp. pl.* 486. *nium.*
Damasonium stellatum. *Dalech. hist.* 1058. *B. hist.*
III. 789. *R. syn.* 272.
Plantago aquatica minor stellata. *Ger. em.* 417.
Plantago aquatica stellata. *B. pin.* 190.
Plantago aquatica minor muricata. *Park.* 1245.
Anglis, star-headed Water-plantain.
Habitat in fossis et aquis stagnantibus. 24. VI—VIII.

Classis

Classis VII.

HEPTANDRIA

MONOGYNIA.

TRIENTALIS. 461.

Cal. heptaphyllus. *Cor.* septem-partita, æqualis, plana. *Bacca.* exsucca.

europæa. I. TRIENTALIS foliis lanceolatis integerrimis. *Sp.* pl. 488. *Fl.* suec. 326. *dan.* 84.

Alsinanthemos. *Thal. sylv.* 15. *Mocrb. hort.* 8. III. *R. syn.* 286.

Pyrola alsinoides flore europæa. *B. pin.* 191. *Park.* 509.

Pyrola alsinoides flore major. *B. pr.* 100.

Herba trientalis. *B. hist.* II. 506.

Alpine alpina. *Swenk. siles.* 7. *deser.*

Pyrola alsinoides flore Brasiliana. *B. pin.* 191. *pr.* 100.

R. syn. 286.

Anglis, common Trientalis, or Chickweed-Wintergreen.

Habitat in sylvis et ericetis turfosis in comitatibus Eboracen-
si, Northumberlandico, Cumberlandico et West-
morlandico; prope Bingley in comitatu Eboracen-
iæ. 4. VI. VII.

Classis

Classis VIII.

O C T A N D R I A

M O N O G Y N I A.

* *Flores completi : superi.*

E P I L O B I U M . 471.

Cal. quadrifidus. Petala quatuor. Caps. oblonga. Sem. papposa.

* *Staminibus declinatis.*

1. EPILOBIUM foliis sparsis linear-lanceolatis, flori-*angustifo-*
bus inæqualibus. Sp. pl. 493. Fl. dan. 289. *lum.*
Epilobium flore difformi, foliis lanceolatis transversim
nervosis. Hall. hist. 1000.

Lyssimachia Chamænerion dicta angustifolia. B. pin.
245.

Lyssimachia speciosa, quibùsdam Onagra dicta, siliquo-
sa. B. hist. II. 906. R. syn. 310.

Chamænerion flore delphinii. Park. 548.

Anglis, narrow-leaved Epilobium, or Rosebay Wil-
low-herb.

Habitat *in sylvis et sepibus.* In the meadows near Shef-
field, in Yorkshire, and in several other places of the
north, plentifully. R. syn. On Maize-hill, beyond
Greenwich. 4. VII. VIII.

** *Staminibus erectis regularibus, petalis bifidis.*

2. EPILOBIUM foliis lanceolatis serratis subdecurren-*hirsutum.*
tibus ; inferioribus oppositis, caule subsimplici. Fl.
angl. 140.

Chamænerion foliis oppositis lanceolatis serratis sessili-
bus cauleque villosis. Schreb. Spic. Fl. Lips. 146.

M

Lyssimachi

- Lysimachia siliquosa hirsuta, parvo flore. *B. pin.* 245.
R. syn. 311. *Hist. Ox.* II. 270. t. 10. f. 4.
Lysimachia sylvatica. *Ger. em.* 476.
Lysimachia siliquosa sylvestris hirsuta. *Park.* 549.
Anglis, hairy Epilobium, or Willow-herb.
Habitat in aquosis et ad fossas. 24. VII.
Obs. *Caulis villosus, simplex, rarissime ramosus nisi injuc-*
riam recepit; Folia villosa, Flores parvi purpurei.

- ramosum.* 3. EPILOBIUM foliis lanceolatis serratis decurrentibus
inferioribus oppositis, caule ramoso. *Fl. angl.* 141.
Epilobium foliis oppositis lanceolatis serratis decurren-
ti-amplexicaulibus. *Sp. pl.* 494. *Fl. dan.* 326.
Chamænerion foliis oppositis alternisque lanceolatis
glabris serratis basi decurrentibus. *Schreb. Spic. Fl.*
lips. 147.
Lysimachia siliquosa hirsuta magno flore. *B. pin.* 245.
R. syn. 311.
Lysimachia siliquosa. *Ger. em.* 476.
Anglis, branched Epilobium, or Codlings and Cream.
Habitat in sepibus humidis et ad ripas fluviorum. 24.
VII.
Obs. *Caules ramosi foliaque pubescentes; Flores variant*
colore carneo et purpureo.

- monta-*
num. 4. EPILOBIUM foliis oppositis ovatis dentatis. *Sp. pl.*
494.
Epilobium foliis ovato-lanceolatis, glabris, dentatis.
Hall. hist. 996.
Lysimachia campestris. *Ger. em.* 478.
Lysimachia siliquosa glabra major. *B. pin.* 245.
Lysimachia siliquosa major. *Park.* 548.
Anglis, mountain Epilobium, or Willow-herb.
Habitat in pratis humidis glareosis. ♂. VII.

- tetrago-*
num. 5. EPILOBIUM foliis lanceolatis denticulatis: imis
oppositis, caule tetragono. *Sp. pl.* 494.
Epilobium foliis lanceolatis, glabris dentatis. *Hall.*
hist. 998.
Lysimachia siliquosa glabra media s. minor. *Ger. em.*
479. *R. syn.* 311.
Lysimachia siliquosa glabra minor. *B. pin.* 245.
Anglis,

Anglis, square Epilobium, or Willow-herb.
Habitat in palustribus et ad rivulos et fossas. 4. VII.

6. EPILOBIUM foliis oppositis lanceolatis integerrimis, *palustre*.
petalis emarginatis, caule erecto. Sp. pl. 495. Fl.
suec. 330.

Epilobium foliis glabris ellipticis, integerrimis. Hall.
hist. 998.

Lysimachia siliquosa glabra minor angustifolia. Ger.
em. 479. R. syn. 311.

Lysimachia siliquosa glabra angustifolia. B. pin. 245.

Anglis, marsh Epilobium, or Willow-herb.

Habitat in palustribus. 4. VII.

7. EPILOBIUM foliis oppositis ovato-lanceolatis inte- *alpinum*.
gerrimis, siliquis sessilibus, caule repente. Sp. pl.
495. Fl suec. 331. dan. 332.

Epilobium foliis glabris, ovatis. Hall. hist. 999.

Chamænerion alpinum alsines folio. Sch. it. alp. 132.
332.

Lysimachia siliquosa glabra minor latifolia. R. syn. 311.

Lysimachia siliquosa nana, prunellæ foliis. Bocc. mus.
II. 161. t. 108.

Anglis, alpine Epilobium, or Willow-herb.

Habitat ad rivulos alpinos. In the rivulets on the side of
Cheviot-Hills, Northumberland. R. syn. in monti-
bus prope Settle in comitatu Eboracensi. Ben Buy, in
Scotia. D. Hope. 4. VII. VIII.

VACCINIUM. 483.

Cor. monopetala. Filamenta receptaculo inserta. Bac-
ca quadrilocularis polysperma.

* Foliis annotinis s. deciduis.

1. VACCINIUM pedunculis unifloris, foliis serratis o- *Myrti-*
vatis deciduis, caule angulato. Sp. pl. 498. lus.

Vaccinium foliis rugosis, ovato-lanceolatis, serratis,
caule angulato. Hall. hist. 1020.

Vaccinia nigra. Ger. em. 1415. vulgaria. Park. 1455.
Vitis idea, foliis oblongis crenatis, fructu nigricante.

B. pin. 470.

M 2

Vitis

OCTANDRIA MONOGYNIA.

Vitis idæa angulosa. B. hist. I. 520. R. syn. 457;
Anglis, common Bil, Whortle, or Blea-berry.
Habitat in ericetis et sylvis frequens. H. IV.

- uligino-* 2. **VACCINIUM** pedunculis unifloris, foliis integerimis ovalibus obtusis lævibus. *Syst. Nat. 267, Sp. pl. 498. Fl. dan. 231.*
Vaccinium pedunculis unifloris, foliis integerimis o-
vatis venosis. Hall. hist. 1021.
Vaccinia nigra fructu majore. Park. 1455.
Vitis idæa foliis subrotundis major. Ger. em. 1416.
Vitis idæa foliis subrotundis exalbidis. B. pin. 470.
Vitis idæa magna quibusdam, s. Myrtillis grandis. B.
hist. I. 518. R. syn. 457.
Anglis, marsh Bil-berry.
Habitat in ericetis et sylvis humidiusculis; in montosis
Cumberlandiæ medio itinere inter Hexham et Pereth
oppida; sed copiosius prope vicum Gambleby, ad sex-
tum ab oppido Pereth lapidem, via quæ Novum Castel-
lum dicit: utrobique in pascuis palustribus. R. syn.
In Whinfield Forrest, Westmorland; in Septentrio-
nali parte Scotiæ frequens. H. IV.

** *Foliis semper virentibus.*

- Vitis i-* 3. **VACCINIUM** racemis terminalibus nutantibus, fo-
dæa. liis obovatis revolutis integerimis subtus punctatis.
Sp. pl. 500. Fl. dan. 40.
Vaccinium foliis perennantibus ovatis, subtus puncta-
tis, oris contractis. Hall. hist. 1022.
Vaccinia rubra. Dod. 770. Ger. em. 1415. buxeis fo-
liis. Park. 1458.
Vitis idæa foliis subrotundis non crenatis, baccis ru-
bris. B. pin. 470.
Vitis idæa sempervirens fructu rubro. B. hist. I. 522.
R. syn. 457.
Anglis, red Bil-berry, or Whorts.
Habitat in ericetis paludosis et montosis in boreali parte
Angliæ et in Scotia frequens. H. IV. V.
- Oxycoccis.* 4. **VACCINIUM** foliis integerimis revolutis ovatis,
caulibus repentibus filiformibus nudis. Sp. pl. 500.
Fl. suec. 335. dan. 80.

Vaccinium

Vaccinium caule prostrato, foliis ovato-lanceolatis acutis, flore quadripartito. *Hall. hist.* 1023.

Vaccinium palustre. *Park.* 1229.

Vaccinia palustria. *Dod.* 770. *Lob. ic.* 109. *Ger. em.* 1419.

Vitis idæa palustris. *B. pin.* 471.

Oxycoccus s. Vaccinia palustria. *B. hist. I.* 525. *R. syn.* 267.

Anglis, creeping Bil-berry, or Cran-berries.

Habitat in palustribus turfosis in septentrionali parte Angliae copiose. prope Glastenbury. *H. V. VI.*

E R I C A. 484.

Cal. tetraphyllus. Cor. quadrifida. Filamenta receptaculo inserta. Antheræ bifidæ. Caps. quadrilocularis.

* *Antheris aristatis.*

1. ERICA antheris aristatis inclusis, stylo exerto, corollis inæqualibus campanulatis mediocribus, foliis oppositis sagittatis. *Lin. diss. de Erica. I.*

Erica antheris bicornibus inclusis, corollis inæqualibus campanulatis mediocribus, foliis oppositis sagittatis. *Sp. pl.* 501.

Erica foliis imis adpressis simplicibus, floralibus calcaratis. *Hall. hist.* 1012.

Erica vulgaris. *Park.* 1480. *R. syn.* 470. *s. pumila.* *Ger. em.* 1380.

Erica vulgaris glabra. *B. pin.* 485.

2. ERICA antheris cristatis styloque inclusis, corollis *cinerea*.

ovatis, foliis ternis, floribus glomeratis. *Mant. II.* 372. *Fl. dan.* 28.

Erica antheris bicornis inclusis, corollis ovatis racemosis, foliis ternis glabris linearibus. *Sp. pl.* 501.

Erica tenuifolia. *Ger. em.* 1380. *R. syn.* 471.

Erica humiliis, cortice cinereo, arbuti flore. *B. pin.* 486.

OCTANDRIA MONOGYNIA.

Erica virgata f. VI. Clusii. *Park.* 1483.

Anglis, fine-leaved Heath.

Habitat in ericetis et nemorosis siccioribus. H. VI-VIII.

Tetralix. 3. ERICA antheris aristatis, stylo inclusu, corolla ovata, foliis quaternis, floribus capitatis. *Mant. II.* 372.

Erica antheris bicornibus inclusis, corollis subglobosis confertis folio longioribus, foliis quaternis ciliatis patentibus. *Sp. pl.* 502. *Fl. dan.* 81.

Erica major flore purpureo. *Ger. em.* 1381.

Erica ex rubro nigricans scoparia. *B. pin.* 486.

Erica brabantica foliis coridis hirsuto quaterno. *B. hijt.* I. 358. *R. syn.* 471.

Anglis, cross-leaved Heath.

Habitat in ericetis humidis. H. VI-VIII.

** *Antheris muticis obtusis emarginatis.*

multiflora. 4. ERICA antheris muticis styloque exsertis, corolla cylindrica, foliis quinque, floribus sparsis. *Mant. II.* 372.

Erica antheris simplicibus bifidis exsertis, corollis cylindricis, foliis quinque patentibus. *Sp. pl.* 503.

Erica foliis coriaceis multiflora. *B. hijt.* I. 356. *R. syn.* 471.

Erica maxima purpurascens longioribus foliis. *B. pin.* 485.

Erica juniperifolia narbonensis dense fruticans. *Lob.* *hijt.* 620. *Garid. aix.* 160. *t. 32.* *Sauv. monsp.* 46.

Anglis, many-flowered Heath.

Habitat in ericetis. On Goon hilly Downs, going from Helston to the Lizard Point in Cornwall. *R. syn.* H. VI-VIII.

dabocii. 5. ERICA antheris muticis styloque inclusis, corolla ovata, foliis alternis lanceolatis revolutis, floribus racemosis secundis.

Erica racemo terminali, foliis alternis subtus tomentosis. *Sp. pl.* 509.

Andromeda racemis secundis, floribus quadrifidis ovatis, foliis alternis lanceolatis revolutis. *Syst. Nat.* 300.

Erica cantabrica flore maximo, foliis myrti subtus in-canis. *Tourn.* 603. *R. syn.* 472.

Erica St. Dabœcia Hibernis. *D. Lhwyd.* *R. hist.* III. *dendr.* 98.

Erica Hibernica foliis myrti pilosis, subtus in canis. *R. hist.* III. *app.* 244. *Pet. gaz. nat. t.* 27. *f.* 4.

Anglis, irish Heath.

Habitat in montibus Mayo squalido et spongioso solo frequens; ut et per totum Hair-connacht in Gallovidia. *R. syn.* h. VI. VII.

** Flores incompleti.

D A P H N E. 485.

Cal. o. Cor. quadrifida, corollacea, marcescens, stamina includens. Bacca monosperma.

1. *DAPHNE* racemis axillaribus quinquefloris, foliis *Laureola* lanceolatis glabris. *Sp. pl.* 510. *Fac. aust.* II. 49. *la.* t. 183.

Laureola. *Ger. em.* 1405. *Park.* 205. *R. syn.* 465.

Laureola sempervirens flore viridi, quibusdam *Laureola* mas. *B. pin.* 462.

Anglis, common Daphne or Spurge-laurel.

Habitat in sylvis et sepibus. *h.* III. IV.

Pharmac. *Laureolæ Folia, Bacca.*

2. *DAPHNE* floribus sessilibus ternis, foliis caulinis lanceolatis deciduis. *Sp. pl.* 509. *Mezerium.*

Laureola folio deciduo, flore purpureo, officinis *Laureola* femina. *B. pin.* 462.

Chamælea germanica f. *Mezereon.* *Ger. em.* 1403. *vulgo. Park.* 202.

Anglis, purple Daphne, Mezereon or Spurge-olive.

Habitat in sylvis prope Andover copiose. *D. Miller.* *h.* III.

Pharmac. *Mezerei, Cortex, Folia, Bacca.*

D I G Y N I A.

CHLORA. Lin. Mant. 10.

Cal. octophyllus. Cor. monopetala, octofida, Caps. unicocularis, bivalvis, polysperma.

- perfolia-* 1. CHLORA foliis perfoliatis. *Syst. Nat.* 267.
ta. Chlora. *Renealm. Spec.* 80. t. 76.
 Blackstonia perfoliata. *Fl. angl.* 146.
 Gentiana corollis octofidis, foliis perfoliatis. *Sp. pl.* 335.
 Centaureum luteum perfoliatum. *B. pin.* 278. *R. syn.* 287.
 Centaureum parvum luteum Lobelii. *Ger. em.* 547.
 Centaureum minus luteum et perfoliatum non ramo-
 sum. *Park.* 271.
Anglis, perfoliate Yellow-wort.
 Habitat in pratis et pascuis montosis, solo calcareo. ◎.
 VII.

T R I G Y N I A.

POLYGONUM. 495.

*Cal, o. Cor. quinquepartita, calycina. Sem. unicum
 angulatum.*

** Bistortæ spica unica.

- Bistorta.* 1. POLYGONUM caule simplicissimo monostachio,
 foliis ovatis in petiolum decurrentibus. *Sp. pl.* 516.
Fl. dan. 421.
 Polygonum radice lignosa intorta, spica ovata, foliosis
 petiolis alatis. *Hall. hist.* 1559.
 Bistorta major. *Ger. em.* 399. *R. syn.* 147. vulgaris.
Park. 391.
 Bistorta radice minus intorta. *B. pin.* 192.
Anglis, Bistort Knot-grass, or Snakeweed.
 Habitat in pratis humidiusculis in comitatibus Cumber-
 landico, Westmorlandico, Eboracensi etc. frequens;
 prope Battersea. 4. V. VI.
 Pharmac. Bistortæ Radix.

2. POLYGONUM

2. POLYGONUM caule simplicissimo monostachio, viviparo-foliis lanceolatis. Sp. pl. 516. Fl. suec. 340. Dan. rum. 13.

Polygonum radice lignosa intorta, foliis nervosis, radi-calibus ovato-lanceolatis, caulinis linearibus. Hall. hist. 1558.

Bistorta minor. Ger. em. 369. R. syn. 147. nostras. Park. 392.

Bistorta alpina minor. B. pin. 192.

β Bistorta minima alpina, foliis imis subrotundis et minutissime ferratis. R. syn. 147.

Anglis, viviparus Knot-grass, or Bistort.

Habitat in pratis montosis; in several places in Westmoreland, as at Crosby Ravensworth, and near Settle in Yorkshire. β, in pascuis clivosis excelsæ rupis y Crib-gôch diæ supra lacum ffynnon frêch prope Llanberris. R. syn. 24. VI.

** *Perficariæ pistillo bifido*, aut stamina minus 8.

3. POLYGONUM floribus pentandris semidigynis, amphibi-spica ovata. Syst. Nat. 275. staminibus corolla longioribus. Sp. pl. 517. Fl. suec. 341. Dan. 282.

Polygonum foliis ovato-lanceolatis ciliatis, spicis ovatis. Hall. hist. 1565.

Perficaria salicis folio perennis, Potamogiton angustifolium diæta. R. syn. 145.

Potamogiton angustifolium. Ger. em. 821.

Potamogiton salacis folio. B. pin. 131.

Fontalis major longifolia. Park. 1254.

Anglis, amphibius Knot-grass, or Perficaria.

Habitat in fossis, paludibus et lacubus. 24. VI—VIII.

Obs. varietas aquatica staminibus flore brevioribus, terrestris longioribus. Jacq. enum.

4. POLYGONUM floribus hexandris digynis, spicis ovato-oblongis, foliis lanceolatis, stipulis ciliatis. Persicaria. Sp. pl. 518.

Polygonum foliis ovato-lanceolatis, subhirsutis, spicis ovatis, vaginis ciliatis. Hall. hist. 1557.

Perficaria maculosa. Ger. em. 821. R. syn. 145.

Perficaria Dodon. pempt. 108. mitis maculosa et non maculosa. B. pin. 101.

Perficaria

OCTANDRIA TRIGYNYIA.

Perficaria vulgaris mitis seu maculosa. *Park.* 856.

β *Perficaria angustifolia*. *B. pin.* 101. *pr.* 43. ex singulis geniculis florens. *M. P.* 90. *R. syn.* 145.

γ *Perficaria folio subtus incano*. *Tourn.* 510. *R. syn.* 145.

δ *Perficaria maculosa* procumbens foliis subtus incanis. *R. syn.* 146.

ϵ *Perficaria* foliis salicis albæ vulgaris. *Buddl. hort. sic.* IV. 20. *R. syn.* 145. argentea. *Pet. her. br. t.* 3. f. 8.

pensylva- ζ *Polygonum* floribus octandris digynis, pedunculis hispidis, foliis lanceolatis, stipulis muticis. *Sp. pl.* 518.

Perficaria mitis major, foliis pallidioribus. *R. syn.* 145.

η *Perficaria latifolia* geniculata, caulis maculatis. *R. syn.* 145.

Anglis, spotted Knot-grass, *Perficaria* or Arsmart.

Habitat in pratis, pascuis, arvis, simetis et ruderatis humidiusculis ubique. γ . δ . ϵ . in arenosis et glareosis aridis. ○. VII.—IX.

Obs. ζ . Caulis supra geniculos tumidus; Stipulae solitariæ intrafoliaciæ, persistentes, vaginantes, adnatæ, truncatæ, ciliatæ, sed frequentissime evenit; ut in medio abruptæ, et tum mutice apparent; numerus staminum variat a sex ad octo.

hydropiper. 5. *POLYGONUM* floribus hexandris semidigynis, foliis lanceolatis, stipulis submuticis. *Sp. pl.* 517.

Fl. suec. 343.

Polygonum, foliis ovato-lanceolatis, vaginis calvis truncatis. *Hall. hist.* 1554.

Perficaria urens seu *Hydropiper*. *B. pin.* 101.

Perficaria vulgaris acris s. *Hydropiper*. *B. hist.* III. 780. *R. syn.* 144.

Perficaria vulgaris acris seu minor. *Park.* 856.

Hydropiper. *Ger. em.* 445.

β *Polygonum* floribus hexandris digynis, foliis lanceolatis, stipulis ciliatis, caule divaricato patulo. *Fl. angl.* 148.

Polygonum foliis ovato lanceolatis glabris, spicis striatis, vaginis ciliatis. *Hall. hist.* 1555.

Perficaria pusilla repens. *Ger. em.* 446. *R. syn.* 145. *Anglis,*

Anglis, water Knot-grass, Pepper or Arsmart.

Habitat in aquosis, ruderatis et ad rivulos et fossas & in
Tothilfields, Westminster. 4. VII.—IX.

Pharmac. Persicaria non maculata Herba.

*** *Polygona foliis indivisis, floribus octandris.*

6. POLYGONUM floribus octandris trigynis axillari- *aviculare*.
bus, foliis lanceolatis, caule procumbente herba-
ceo. Sp. pl. 519. Fl. suec. 339.

Polygonum mas vulgare. Ger. em. 565. R. syn. 146.
majus. Park. 443.

Polygonum latifolium. B. pin. 281.

♂ *Polygonum brevi angustoque folio*. B. pin. 281.

γ *Polygonum oblongo angustoque folio*. B. pin. 281.

δ *Polygonum folio rotundo*. Pet. H. br. t. 10. f. 2.

• *Polygonum floribus octandris trigynis axillaribus, fo-* mariti-
liis ovali lanceolatis, caule suffruticoso sempervi-
rente. Sp. pl. 519.

Polygonum marinum. B. hist. III. 376. R. syn. 147.
maximum. Ger. em. 564.

Polygonum maritimum latifolium. B. pin. 281.

Anglis, common, & sea Knot-grass.

Habitat in viis plateis, arvis, ubique, & in littoribus are-
nosiis maritimis. O. &. IV.—IX.

Pharmac. *Polygoni s. Centinodiæ Herba*.

**** *Helxine foliis subcordatis.*

7. POLYGONUM foliis cordatis, caule volubili, flo- *convolvu-*
ribus planiusculis. Sp. pl. 522. *lus.*

Polygonum caule volubili, foliis sagittatis. Hall. hist.
1561.

Convolvulus minor semine triangulo. B. pin. 295.

Convolvulus minor atriplicis folio. Park. 171.

Volubilis nigra. Tabern. 876. Ger. em. 863.

Fagopyrum scandens sylvestre. R. syn. 144.

Anglis, climbing Knot-grass or black Bindweed.

Habitat in arvis, cultis, sepibus frequens. O. VI.
—IX.

*8. POLY-

fagopyrum.

*8. POLYGONUM foliis cordato-sagittatis, caule erecto inermi, seminum angulis æqualibus. Sp. pl. 522.

Polygonum caule erecto, foliis sagittatis, valvulis integrimis. Hall. hist. 1563.

Fagopyrum. Dod. pent. 511. cer. 80. R. syn. 144.

Fagopyrum. Ger. em. 89. Park. 1141.

Erysimum Theophrasti folio hederaceo. B. pin. 27.

Anglis, Buck-wheat Knot-grass.

Habitat in arvis cultis passim. ☽. VII. VIII.

T E T R A G Y N I A.

A D O X A. 501.

Cal. bifidus, inferus. *Cor.* quadrifida seu quinquefida, supera. *Caps.* quadrilocularis f. quinquelocularis, calyce coalita.

moschatel- 1. *ADOXA.* Sp. pl. 527. Fl. dan. 94. Hall. hist. 1005. *lina.* Moschatellino foliis fumariæ bulbosæ. B. hist. III. 206. R. syn. 267.

Ranunculus nemorosus Moschatella dictus. Park. 226.

Ranunculus nemorum Moschatellina dictus. B. pin. 178.

Radix cava minima viridi flore. Ger. em. 1091.

Anglis, tuberous Moschatel.

Habitat in sylvis et umbrosis. 4. IV. V.

P A R I S. 500.

Cal. tetraphyllum. *Petala* quatuor angustiora. *Bacca* quadrilocularis.

quadrifo- 1. *PARIS.* Sp. pl. 526. Fl. dan. 139. Hall. hist. 1006. *lia.* Herba paris. Matth. 1193. Ger. em. 405. Park. 390.

B. hist. III. 316. Till. ab. 33. ic. 32. R. syn. 264.

Solanum quadrifolium bacciferum. B. pin. 167.

Anglis, Herb-Paris, True-love or One-berry.

Habitat in sylvis et umbrosis. In sylvula non longe ab Hampstead. C. Miller. 4. V. VI.

Pharmac. Herba Paris Fructus, Radix.

ELATINE.

ELATINE. 502.

Cal. tetraphyllus. Petala quadrilocularis quadrivalvis, depresso.

1. ELATINE foliis verticillatis. *Sp. pl. 527. Fl. suec. alsinastrum. 342. Boem. leps. 127. Hall. hist. 857.*

Elatine foliis emersis linearibus, immersis capillaceis.

Sauv. mons. 1743. p. 50.

Alsinastrum gallii folio. Vail. paris. 6. t. 1. 6.

Alsinastrum gratiolæ folio. Tourn. 244. R. syn. 346.

Equisetum palustre linariæ scopariæ folio. B. pin. 15.

Anglis, Waterwort.

Habitat in fossis et paludibus. Found by Mr. J. Sheppard on the boggy ground, on the common just by the road from Eltham to Chisselhurst. R. syn. 24. VIII.

Classis IX.

E N N E A N D R I A
H E X A G Y N I A.

B U T O M U S. 507.

Cal. o. Petala sex. Caps. sex, polysperma.

- umbella-* 1. BUTOMUS. *Cæsalp.* 556. *R. syn.* 70. *Sp. pl.*
tus. 532. *Fl. suec.* 350. *dan.* 604.
Juncus floridus. *Cam. epit.* 781. *B. hist.* II. 524.
Park. 1197. *major.* *B. pin.* 12.
Gladiolus palustris Cordi. *Ger. em.* 29.
Anglis, Butomus or flowering Rush.
Habitat in fossis limosis et ad ripas fluviorum et stagnorum, 24. VI.

Classis

Classis X.

D E C A N D R I A

M O N O G Y N I A.

* *Flores Polypetali æquales.*

MONOTROPA. 536.

Cal. o. Petala decem; horum quinque exteriora basi excavato-mellifera. Caps. quinquevalvis. Quinta pars numeri quibusdam excluditur.

1. MONOTROPA floribus lateralibus octandris: ter-
minali decandro. *Sp. pl. 555. Fl. dan. 232.*
Hypopitys spica florida nutante. Hall. hist. 1005.
Hypopitys lutea. Dill. giss. 99. App. 134. t. 7. R.
syn. 317.
Orobanche hypopitys. B. pīn. 88. pr. 31. lutea.
Menz. pug. 3. f. 5.
Orobanche verbasculi odore. Plot. Ox. 146. t. 9. f. 6.
Pluk. ph. t. 209. f. 5.
Orobanche flore breviore duplici, verbasculi odore.
Hist. Ox. III. 504. s. 12. t. 16. f. 20.
Anglis, yellow Monotropa or Birds-nest.
Habitat in sylvis, Parasitica radicum: in comitatibus Oxfordiensi, Bedfordiensi, Buckinghamensi, Berkamensi frequens; in fagetiis Sussexiæ, &c. passim.
2. VII.

P Y R O L A. 554.

Cal. quinquepartitus. Petala quinque. Caps. quinquelocularis, angulis dehiscens.

1. PYROLA staminibus adscendentibus, pistillis declinatis. *Sp. pl. 567. Fl. suec. 360. dan. 110.*
Pyrola foliis subrotundis, tubis recurvatis. Hall. hist.
1010.

Pyrola.

DECANDRIA MONOGYNIA.

Pyrola. *Cam. cpit.* 723. *Ger. em.* 408. *R. syn.* 363.
rotundifolia major. *B. pin.* 191.

Pyrola nostras vulgaris. *Park.* 508.

Anglis, common Winter-green.

Habitat *in sylvis et nemoribus.* *In septentrionalibus Angliæ locis reperitur;* *in meridionalibus rarius occurrit;* *near Halifax plentifully, and in Stokenchurch woods, Oxfordshire.* *R. syn.* 24. VI. VII.

- minor.* 2. **PYROLA** floribus racemosis dispersis, staminibus pistillisque rectis. *Sp. pl.* 567. *Fl. dan.* 55.
Pyrola foliis subrotundis, tubis rectis. *Hall. hist.* 1009.
Pyrola minor. *Riv. pent.* 149. *R. syn.* 363.
Pyrola folio minore et duriore. *B. pin.* 191.
Anglis, lesser Winter-green.
Habitat in sylvis; in sylvula prope Clapham in comitatu Eboracensi. 24. VI. VII.

- secunda.* 3. **PYROLA** racemo unilaterali. *Sp. pl.* 567. *Fl. suec.* 362. *dan.* 402. *Hall. hist.* 1008.
Pyrola folio mucronato serrato. *B. pin.* 181. *R. syn.* 363.
Pyrola secunda tenerior. *Clus. hist.* 117. *Ger. em.* 408.
Pyrola tenerior. *Park.* 509.
Anglis, serrated Winter-green.
Habitat in sylvis et nemorosis. *In Haslewood, near Sir Walter Vavasor's park, Yorkshire.* *R. syn.* 24. VI.

** *Flores monopetali æquales.*

A N D R O M E D A. 549.

Cal. quinquepartitus. *Cor.* ovata: ore quinquefido.
Caps. quinquelocularis.

- polifolia.* 1. **ANDROMEDA** pedunculis aggregatis, corollis ova-tis, foliis alternis lanceolatis revolutis. *Sp. pl.* 564.
Fl. suec. 353. *dan.* 54.
Andromeda foliis alternis, linear-lanceolatis. *Fl. lapp.* 163. *t. 1. f. 3.* *Hall. hist.* 1017.

Ledum

Ledum palustre nostras, ardui flore. *R. syn.* 472.
Rosmarinum sylvestre minus nostras. *Park.* 76.
Erica humilis, rosmarini foliis, unedonis flore, capsula cistoide. *Pluk. ph. t. 175. f. 1.*
Anglis, marsh Andromeda or wild Rosemary.
Habitat in paludibus turfosis in comitatibus Eboracensi, Lancastriensi, Westmorlandico, Cumberlandico frequens. 24. VI.

ARBUTUS. 552.

Cal. quinquepartitus. *Cor.* ovata: ore basi pellucida.
Bacca quinquelocularis.

1. ARBUTUS caule arboreo, foliis glabris serratis, *unedo* baccis polyspermis. *Sp. pl.* 566. *Sauv. monsp.* 56.
Arbutus. *Cam. epit.* 168. *Ger. em.* 1496. *Park.* 1489.
R. syn. 464. folio serrato. *B. pin.* 460.
Anglis, common Arbutus or Strawberry-tree.
Habitat in sylvis montosis, in occidentali Hiberniae parte.
R. syn. 5. IX.
2. ARBUTUS caulibus procumbentibus, foliis rugosis *alpinas* serratis. *Sp. pl.* 566. *Fl. dan.* 73. *Hall. hist.* 1019.
Vaccinia rubra, foliis myrtinis crispis. *R. syn.* 457.
Vitis idaea foliis oblongis albicantibus. *B. pin.* 470.
Vitis idaea. *Clus. hist. I.* 61. *pann.* 77. 78.
Anglis, mountain Arbutus.
Habitat in montibus siccis; in that end of Mull next to Eyecolumb-Kill, Mr. Llhyd. *R. syn.* in monte Ben Gribum *dicta, et alibi in comitatu Sutherland.*
D. Hope. 5. V.

3. ARBUTUS caulibus procumbentibus, foliis integerimis. *Fl. lapp.* 162. t. 6. f. 3. *dan.* 33. *Sp. pl.* 566.
Arbutus caulibus procumbentibus, foliis duris integrerrimis. *Hall. hist.* 1018.
Uva ursi. *Clus. hist. I.* 63. *Park.* 1458.
Radix idaea putata et uva ursi. *B. hist.* I. 524.
Anglis, trailing Arbutus or Bearberry.
Habitat in sylvis et ericetis siccioribus. In the Duke of Portland's wood, near Hexham, in Northumberland plentifully. *Wall. N. hist. Northumb.* 148. at

DECANDRIA DIGYNIA.

Drummelzier in Twedale. Sir J. Nasmyth; in ericetis siccioribus in boreali parte Scotiæ copiose D. Hope. H. VI.

D I G Y N I A.

SCLERANTHUS. 562.

Cal. monophyllus. *Cor.* o. *Sem.* duo calyce inclusa.

annuus. 1. SCLERANTHUS calycibus fructus patulus. *Sp. pl.* 580. *Fl. suec.* 377. *dan.* 504.

Scleranthus floribus patulis. *Hall. hist.* 1551.

Knawel. *Trag.* 393. *R. syn.* 159.

Polygonum germanicum, vel Knawel germanorum. *Park.* 446.

Polygonum felinoides sive Knawel. *Ger. em.* 566.

Polygonum gramineo folio majus erectum. *B. pin.* 281.

Anglis, annual Knawel.

Habitat in arvis et locis arenosis. O. VII. VIII.

perennis. 2. SCLERANTHUS calycibus fructus clausis. *Sp. pl.* 580. *Fl. suec.* 378. *dan.* 563.

Scleranthus floris segmentis erectis. *Hall. hist.* 1550.

Knawel incanum flore majore perenne. *R. hist.* 213. *syn.* 160. *t.* 5. *f.* 1.

Alchimilla gramineo folio majori flore. *Tourn.* 509.

Vaill. paris. 4. *t.* 1. *f.* 5.

Anglis, perennial Knawel.

Habitat in arvis arenosis; about Elden in Suffolk, plentifully. 24. VII. VIII.

CHRYSOSPLENIUM. 558.

Cal. quadrifidus s. quinquefidus, coloratus. *Cor.* o.

Caps. birostris, unilocularis polysperma.

oppositifo- 1. CHRYSPLENUM foliis oppositis. *Sp. pl.* 569. *lium.* *Fl. suec.* 365. *dan.* 365. *Hall. hist.* 1549.

Chrysosplenium s. Saxifraga aurea. *Tabern. hist.* 1224.

Saxifraga aurea. *Ger. em.* 841. *Park.* 425. *R. syn.* 158.

Saxifraga

Saxifraga rotundifolia aurea. *B. pin.* 309.

Anglis, opposite Golden-saxifrage.

Habitat in umbrosis humentibus. In Charlton Wood.

Blacks. Spec. bot. in ericeto Hampstediano. 24.

IV.

2. CHRYSOSPLENUM foliis alternis. Sp. pl. 569. *alternifolium*.
Fl. suec. 365. dan. 366. Hall. hist. 1548.

Saxifraga aurea foliis pediculis oblongis insidentibus.

R. syn. 158.

Sedum palustre luteum majus, foliis pediculis longis
insidentibus. Hist. Ox. III. f. 12. t. 8. f. 8:

Anglis, alternate Golden-saxifrage.

Habitat cum priore, sed rarius; prope Bingley et alibi
in comitatu Eboracensi. 24. IV.

SAXIFRAGA. 559.

Cal. quinquepartitus. Cor. pentapetala. Caps. bi-
rostris, unilocularis, polysperma.

* Foliis indivisis, caule subnudo.

1. SAXIFRAGA foliis ferratis, caule nudo ramoso, pe-
stellaris; talis acuminatis. Sp. pl. 572. Fl. dan. 23. carn.
292. t. 13.

Saxifraga foliis rhomboides, acute ferratis, caule nudo
ramoso. Hall. hist. 973.

Geum palustre minus, foliis oblongis crenatis. Tourn.
252. R. syn. 354.

Sanicula myosotis alpina, floribus albicantibus fere
umbellatis. Pluk. ph. t. 58. f. 2. et 222. f. 12.

Sedum montanum hirsutum, mucronato et dentato
folio, flore albo guttato. Hist. Ox. III. 478. f. 12.
t. 9. f. 13.

Anglis, hairy Saxifrage or Kidney-wort.

Habitat in petris et rupibus aqua humentibus et ad rivulos;
on the mountains of Wales, at Snowdon, Carnedd-Llewellyn, Caderidis, &c. R. syn. in montibus in septentrionali parte Angliae et Scotiae frequens.
24. VI. VII.

nivalis. 2. SAXIFRAGA foliis obovatis crenatis subsessilibus, caule nudo, floribus congestis. Sp. pl. 573. Fl. dan. 28.

Saxifraga caule nudo simplici, foliis elliptico-subrotundis crenatis, floribus capitatis. Fl. lapp. 176. t. 2. f. 5. 6.

Saxifraga foliis oblongo-rotundis dentatis, floribus compactis. R. syn. 354. t. 16. f. 1.

Anglis, mountain Saxifrage.

Habitat in summis alpibus Arvoniae e rupibus Clogwyn-y-Garnedd, Crib-y-ddescil, Glyder, etc. juxta Llanberri. D. Lhwyd. R. syn. in monte Ben-Buy dicto, D. Oakes et in insulis Skye et Mull in Scotia. D. Robertson. 24. VII. VIII.

** *Foliis indivisis, caule folioso.*

oppositifo- 3. SAXIFRAGA foliis caulinis ovatis oppositis imbricatis : summis ciliatis. Sp. pl. 575. Fl. suec. 369. dan. 34.

Saxifraga caule repente, foliis quadrifariam imbricatis, cartilagineis ciliatis. Hall. hist. 980.

Saxifraga alpina ericoides, flore cæruleo. Tourn. 253. R. syn. 353. Sch. It. VI. 428.

Sedum alpinum ericoides cæruleum. B. pin. 284. pr. 132. Hist. Ox. III. 480. f. 12. t. 10. f. 36.

Anglis, purple Saxifrage.

Habitat in rupibus et petris. In rupibus montis Ingleborough non ad summitatem, sed ad latus occidentale.

D. Richardson; R. syn. In rupibus circa Llanberis copiose. 24. III. IV.

autumna- 4. SAXIFRAGA foliis caulinis linearibus alternis ciliatis, radicalibus aggregatis. Sp. pl. 575. Fl. carn. 293. t. 14. dan. 72. Facq. enum. 71. et 240.

Saxifraga foliis ellipticis ciliatis, caule simplici folioso, paucifloro. Hall. hist. 971.

Saxifraga alpina angustifolio, flore luteo guttato. R. syn. 353.

Sedum alpinum I. Clus. pan. 484. Ger. em. 516.

Sedum minus VI. s. alpinum I. Clus. hist. II. 60.

Sedum

Sedum alpinum flore pallido. *B. pin.* 284. *Hist. Ox.*

III. 477. *f.* 12. *t.* 7. *f.* 3. *R. hist.* 1042.

Sedum alpinum floribus luteis maculosis. *B. pin.* 284?

Sedum parvum montanum luteum. *B. hist.* *III.* 693.

Sedum minus alpinum luteum nostras. *R. cat. angl.* 263. *hist.* 1042. *Hist. Ox.* *III.* 477.

Sedula montana pulchra. *Gesn. fasc.* 1. *f.* 4.

Anglis, autumnal Saxifrage.

Habitat in montosis; on Ingleborough-hill plentifully, and in Westmorland. R. syn. On Beeston Castle, Cheshire. *Blacks. Spec. bot.* 24. VII. VIII.

5. SAXIFRAGA foliis alternis lanceolatis integerrimis *hirculus*.

acutis nudis, caule adscendente folioso.

Saxifraga foliis caulinis lanceolatis alternis nudis inermibus, caule erecto. *Sp. pl.* 576. *Fl. suec.* 370. *dan.* 120. *Gmel. sib.* IV. *t.* 65. *f.* 3.

Saxifraga foliis ellipticis, caule unifloro. *Hall. hist.* 972. *t.* 11.

Saxifraga angustifolia autumnalis, flore luteo guttato. *Breyn. Cent.* 104. *R. hist.* 1048. foliis florum magis acuminatis. *Breyn. Cent.* 106.

Hirculus frisicus Dortmanni. *Clus. cur. post.* 5.

Hirculus qui chamæcisti genus. *Clus. cur. post.* 5. 6.

Chamæcistus frisicus, foliis nardi celticæ. *B. pin.* 466.

Sedum palustre luteum bicorne nardi celticæ foliis. *Hist. Ox.* *III.* 477. *f.* 12. *t.* 8. *f.* 5.

Sedum angustifolium autumnale, flore luteo guttato.

Hist. Ox. *III.* 477. *f.* 12. *t.* 8. *f.* 6.

Geum angustifolium autumnale, flore luteo guttato.

Tourn. 252. *R. syn.* 355.

Anglis, marsh Saxifrage.

Habitat in palustribus turfosis; on Knutsford-moor, Cheshire. 24. VII. VIII.

*** *Foliis lobatis, caulibus erectis.*

6. SAXIFRAGA foliis radicatis aggregatis linearibus cæspitosa.

integris trifidisque, caule erecto subnudo subifloro.

Sp. pl. 578. *Fl. dan.* 71.

Saxifraga foliis integris et trifidis, caule subnudo,

DECANDRIA DIGYNIA.

paucifloro. *Hall. hist.* 988. *opusc. bot.* 291. *t. I.*
f. I.

Saxifraga foliis partim integris partim trifidis. *Segu. ver.* 1. 451. *t. 9. f. 4.* *Sch. It. II.* 49. VII. 518.

Sedum tridactylites alpinum minus. *B. pin.* 284.
Anglis, matted Saxifrage.

Habitat in montibus supra Ambleside in comitatu Westmorlandico. 4. VII. VIII.

tridaElyli- 7. SAXIFRAGA foliis caulinis cuneiformibus trifidi-
tes. alternis, caule erecto ramoso. *Sp. pl.* 578.

Saxifraga foliis petiolatis, trilobatis, caule erecto, ra-
moso et folioso. *Hall. hist.* 986.

Saxifraga yerna annua humilior. *Tourn.* 252. *R. syn.*
354.

Sedum tridactylites tectorum. *B. pin.* 285.

Paronychia rutaceo folio. *Ger. em.* 624.

Paronychia foliis incisis. *Park.* 556.

Anglis, rue-leaved Saxifrage or Whitlow-grass.

Habitat in muris, teetis, ruderatis. ⊖. IV.

Pharmac. Paronychiæ *Herba.*

*granu-
lata.* 8. SAXIFRAGA foliis caulinis reniformibus lobatis,
caule ramoso, radice granulata. *Sp. pl.* 576. *Fl.*
suec. 372. *dan.* 514. *Mat. med.* 215.

Saxifraga foliis radicalibus reniformibus, obtuse denta-
tis, caulinis palmatis. *Hall. hist.* 976.

Saxifraga rotundifolia alba. *B. pin.* 309. *R. syn.* 354.

Saxifraga alba. *Dod. pempt.* 316. *Ger. em.* 841. *vul-*
garis. *Park.* 424.

Anglis, white Saxifrage.

Habitat in pratis et pascuis siccioribus; prope Wands-
worth copiose. 4. IV. V.

Pharmac. *Saxifragæ albæ Radix, Folia, Flores, Semina.*

**** *Foliis lobatis, caulis procumbentibus.*

bypnoides. 9. SAXIFRAGA foliis caulinis linearibus trifidisve, sto-
lonibus procumbentibus, caule erecto nudiusculo.
Sp. pl. 579. *Fl. dan.* 348.

Saxifraga foliis petiolatis trifidis, caule subfolioso vis-
cido. *Hall. hist.* 989.

Saxifraga muscosa trifido-folio. *Tourn.* 252. *R. syn.* 354.

Sedum alpinum trifido folio. *B. pin.* 284.

Sedum alpinum laciniatis ajugæ foliis. *Park.* 739.

Anglis, trifid Saxifrage.

Habitat in montibus Westmorlandicis, Eboracensibus,
Derbiensisbus, Cambrobritannicis frequens; in ru-
pibus Cheddar-rocks dictis. V.—VII.

SAPONARIA. 564.

Cal. monophyllus, nudus. *Petala* quinque, unguicu-
lata. *Caps.* oblonga, unilocularis.

1. SAPONARIA calycibus cylindricis, foliis ovato-
lanceolatis. *Sp. pl.* 584. *Fl. dan.* 343.

Saponaria foliis ovato-lanceolatis, trinerviis, floribus *officinalis*.
tubulosis, umbellatis. *Hall. hist.* 908.

Saponaria. *Dod. coron.* 75. *Ger. em.* 444. *vulgaris.*
Cam. epit. 152. *Park.* 641. *B. hist.* III. 346.

Saponaria major lœvis. *B. pin.* 206.

Lychnis Laponaria dicta. *R. syn.* 339.

2. Lychnis Saponaria dicta folio convoluto. *R. syn.* 339.
Saponaria concava anglica. *B. pin.* 206. *Hist.*

Ox. II. 548. *f. 5. t. 22. f. 52.*

Anglis, common Sopewort.

Habitat in pratis et ad sepes; in ericeto nigro prope Mor-
den College in Cantio. 24. VII. VIII.

Pharmac. Saponariæ Folia, Radix.

DIANTHUS. 565.

Cal. cylindricus, monophyllus, basi squamis quatuor.

Petala quinque unguiculata. *Caps.* cylindrica, uni-
locularis.

* *Flores aggregati.*

1. DIANTHUS floribus aggregatis fasciculatis, squamis *armeria*.
calycinis lanceolatis villosis tubum æquantibus. *Sp.*
pl. 586. *Fl. suec.* 381. *dan.* 230.

Tunica floribus umbellatis, squamis calycinis hirsutis,
mucronatis tubum æquantibus. *Hall. hist.* 900.

Caryophyllum latifolius barbatus minor annuus, flore
minore. *R. syn.* 337.

Caryophyllum pratense. *Ger. em.* 594. noster major et
minor. *Park.* 1338.

DECANDRIA DIGYNIA.

Caryophyllum barbatus sylvestris. *B. pin.* 209.
Anglis, Deptford Pink.

Habitat in pratis et pascuis glareosis, in sylva Charleton-
wood *dicta et alibi in Cantio; prope Croydon copiose.*
◎. VII.

prolifer. 2. *DIANTHUS* floribus aggregatis capitatis, squamis
calycinis ovatis obtusis muticis tubum superantibus,
Sp. pl. 587. *Fl. dan.* 221

Tunica capitulo compacto, ovali, calyce universali
quadrifido. *Hall. hist.* 901.

Caryophyllum sylvestris prolifer. *B. pin.* 209. *Park.*
1338. *R. syn.* 337.

Armeria prolifera. *Lob. ic.* 449. *Ger. em.* 599.
Anglis, proliferus Pink.

Habitat in pratis et pascuis arenosis. *Found by the Rev.*
Mr. Manninghan *in Selsey island, Sussex.* *R. syn.*
prope Norwich. D. Humphrey. ◎. VII.

** *Flores solitarii plures in eodem caule,*

caryophyl- *3. *DIANTHUS* floribus solitariis, squamis calycinis
subovatis brevissimis, corollis crenatis. *Sp. pl.* 587.

Tunica ramis unifloris et bifloris, petalis levibus, sti-
pulis calycinis brevissimis. *Hall. hist.* 896.

Caryophyllum hortensis simplex, flore major. *B. pin.*
208.

Caryophyllum simplex major. *Ger. em.* 590.

♂ *Caryophyllum simplex flore minore pallido rubente.*
B. pin. 208.

Caryophyllum sylvestris simplex. *Ger. em.* 591.

Anglis, Clove Pink, July-flower or Carnation.

Habitat in muris antiquis; on Rochester, Deal, San-
down, &c, castles, plentifully. 4. VII.

Pharmac. *Caryophylli Flores.*

deltoides. 4. *DIANTHUS* floribus solitariis: squamis calycinis
lanceolatis binis, corollis crenatis. *Sp. pl.* 588.
Fl. dan. 577. *suec.* 382.

Caryophyllum minor repens nostras. *R. syn.* 335. *Dill.*
ethb. 492.

Caryo-

Caryophyllum simplex supinus latifolius. B. pin. 209.
β Tunica ramosior, flore candido cum corolla purpureo.

Dill. elth. 400. t. 298. f. 348.

Anglis, maiden Pink.

Habitat in pratis et ericetis arenosis passim, supra Duppers-hill, prope Croydon. ♂. VI.—VIII.

5. DIANTHUS floribus subsolitariis, squamis calycinis *glaucus.*
lanceolatis quaternis brevibus, corollis crenatis. Sp.
pl. 588.

Tunica rupestris, folio cælio molli, flore carneor.
Dill. elth. 401. tab. 298. f. 385.

Armeriaæ species flore in summo caule singulari. R.
syn. 336.

Caryophyllum sylvestris, alsines holosteæ arvensis glabrae foliis, flore unico, calyce barbato. Pluk. ph.
t. 81. f. 3.

Anglis, mountain Pink.

Habitat in montosis, on Chedder-rocks, in Somersetshire, Mr. Brewer, VI. VII.

*** *Caule unifloro herbaceo.*

*6. DIANTHUS caulis subunifloris, squamis caly- *arenarius.*
cinis ovatis obtusis, petalis multifidis, foliis linearibus. Sp. pl. 589. Fl. suec. 384.

Caryophyllum sylvestris humilis, flore unico, B. pin.
209?

Caryophyllum sylvestris I. Clus. hist. I. 282.

Caryophyllum plumarius albus. Ger. em. 591?

Armerius flos tertius. Dod. pempt. 176.

Anglis, common Pink.

Habitat in muris antiquis. 4. VII. VIII.

TRIGYNIA.

CUCUBALUS. 566.

Cal. inflatus. Petala quinque unguiculata absque corona ad faucem. Caps. trilocularis.

1. CUCUBALUS calycibus campanulatis, petalis dif- *baccifer-*
tantibus, rus.

DECANDRIA TRIGYNIA.

tantibus, pericarpiis coloratis, ramis divaricatis.
Sp. pl. 591.

Cucubalus. *Mill. Ic. t.* 112. *Plinii. Lugd.* 1429.
Tourn. 339. *R. syn.* 267.

Visago baccifera, petalis serratis. *Hall. hist.* 912.

Alpine scandens baccifera. *B. pin.* 250.

Anglis, berry-bearing Campion.

Habitat in sepibus in insula Mona, D. Richardson.
R. syn. VI. VII.

Behen. 2. **CUCUBALUS** calycibus subglobosis glabris reticulato-venosis, capsulis trilocularibus, corollis subnudis. *Sp. pl.* 591.

Viscago caule brachiato, nodoſo, calycibus inflatis venosis. *Hall. hist.* 913.

Lychnis sylvestris, quæ Behen album vulgo. *B. pin.* 205. *R. syn.* 337.

Behen album officinarum. *Ger. em.* 678.

Papaver spumeum sive Behen album vulgo. *Park.* 263.

Anglis, bladder Campion or Spatling-Poppy.

Habitat in arvis, pratis et pasuis siccioribus. 24. VIII.

Obs. variat foliis scabris.

viscosus. 3. **CUCUBALUS** floribus lateralibus undique decumbentibus, caule indiviso, foliis basi reflexis. *Sp. pl.* 592. *Fl. suec.* 386.

Lychnis major noctiflora Dubrensis perennis. *R. syn.* 340. *hist.* 995.

Lychnis montana noctiflora hirsuta latifolia alba, floribus absque appendicibus. *Till. pis.* 105.

Anglis, Dover Campion.

Habitat in montosis. Found on Dover-cliffs, by Mr. Newton. *R. syn.* 24. VII.

ctiies. 4. **CUCUBALUS** floribus dioicis, petalis linearibus indivisis. *Sp. pl.* 594. *Fl. dan.* 518.

Viscago floribus verticillatis, spicatis, sexu distinctis petalis linearibus. *Hall. hist.* 920.

Lychnis viscosa flore muscosa. *B. pin.* 206.

Sesamoides salamanticum magnum. *Ger. em.* 493.

Muscipula salamantica major. *Park.* 636.

Anglis, Spanish Campion or Catchfly.

Habitat.

Habitat in pascuis glareosis. In the gravel-pits on the north side of Newmarket: also by the way-sides from Barton mills to Thetford in Norfolk. R. syn. 4. VII. VIII.

5. CUCUBALUS acaulis. Sp. p. ed. I. 415. Fl. suec. acaulis.
337. dan. 21.

Silene acaulis. Sp. pl. ed. II. 603.

Lychnis alpina pumila folio gramineo. B. pin. 206.
Dill. elth. 206. t. 167. f. 206.

Lychnis alpina minima. R. syn. 341. hist. 1004.

Caryophyllus IX. Clusii, Caryophyllus pumilo alpinus. Ger. em. 593.

Ocymoides muscosus alpinus. Park. 639.

Viscago foliis gramineis caule brevissimo uniflora.

Hall. hist. 919.

Anglis, moss Campion.

Habitat in montibus Arvonie; prope Llanberis copiose;
supra Dartmoor in Devonia; et in insulis Mull et
Skye et boreali parte Scotie frequens. D. Hope. 4.
VI. VII.

S I L E N E. 567.

Cal. ventricosus. Petala quinque unguiculata: co-
ronata ad faucem. Caps. trilocularis.

* Floribus solitariis lateralibus.

1. SILENE hirsuta, petalis subintegerrimis, floribus anglica.
subspicatis pedunculatis alternis erectis, fructibus
divaricato-reflexis.

Silene hirsuta, petalis emarginatis, floribus erectis
fructibus reflexis pedunculatis alternis. Syst. nat.
309. Sp. pl. 594.

Viscago cerastrii foliis vasculis pendulis anglica. Dill.
elth. 417. t. 309. f. 398.

Lychnis sylvestris flore albo minimo. R. syn. 339.
hist. 996.

Lychnis sylvestris hirsuta annua, flore minore alba.
Vaill. parif. 121. t. 16. f. 12.

Anglis, English Catchfly.

DECANDRIA TRIGYNIA.

Habitat in arvis arenosis, passim, prope Coombe in agro surriensi. ♂. VI. VII.

Obs. Petala obtusa non crenata, subinde emarginata; Calyxis fructus maturi horizontaliter reflexi, non penduli, angulati, viscidi, pilosi.

quinque- 2. SILENE petalis integerrimis subrotundis, fructibus erectis alternis. Sp. pl. 595.

Lychnis sylvestris lanuginosa minor. B. pin. 206.

Lychnis hirsuta flore eleganter variegato. R. hist. 997.
Anglis, variegated Catchfly.

Habitat in arvis arenosis juxta Wrotham in Cantio. ♂. VII.

** *Floribus lateralibus confertis.*

nutans. 3. SILENE petalis bifidis, floribus lateralibus secundis eernuis, panicula nutante. Sp. pl. 596. Fl. dan. 242.

Viscago foliis lanceolatis hirsutis, floribus paniculatis nutantibus. Hall. hist. 915.

Lychnis sylvestris alba IX. clusii. Ger. em. 470.

Lychnis montana viscosa alba latifolia. B. pin. 205.

Lychnis sylvestris alba f. ocymoides minus album.
Park. 631.

Anglis, Nottingham Catch-fly.

Habitat in pratis montosis. On the walls of Nottingham-
castle. R. syn. 24. VI. VII.

amœna. 4. SILENE petalis bifidis: coronula subcoadunata, floribus secundis, pedunculis oppositis trifloris, ragnis alternis. Sp. pl. 596.

Lychnis marina anglica. Ger. em. 469. R. syn. 337.

Lychnis marina repens alba. Park. 638.

♂ Lychnis maritima anglica amplioribus foliis D. Brew-
er. Rand. hort. Chels.

Anglis, sea Catchfly.

Habitat in littoribus maritimis arenosis frequens. 24.
VI—VIII.

*** *Floribus*

*** *Floribus ex dichotomia caulis.*

5. SILENE calycibus fructus globosus acuminatis *conoidea*.
striis triginta, foliis glabris, petalis integris. Sp. pl.
598.

Lychnis sylvestris angustifolia caliculis turgidis stria-
tis. B. pin. 205. R. syn. 341.

Lychnis sylvestris altera incana caliculis striatus. Lob.
ic. 338.

Anglis, corn Catchfly.

Habitat in arvis arenosis; A little to the north of San-
down-castle plentifully. R. syn. O. VI. VII.

6. SILENE calycibus decemangularibus: dentibus tu- *noctiflo-*
bum æquantibus, caule dichotomo, petalis bifidis. ra.
Sp. pl. 599. Syst. Nat. 311.

Viscago foliis ovato-lanceolatis hirsutis, caule brachi-
ato, calycibus venosis. Hall. hist. 911.

Lychnis noctiflora. B. pin. 205. Park. 632. R. syn. 340.

Anglis, night-flowering Catchfly.

Habitat in arvis. Found by Mr. Dent among corn, on
the left hand of the road leading from Newmarket to
Canvas-hall in Wood-ditton. R. syn. circa Nor-
wich. D. Rose. O. VII.

7. SILENE floribus fasciculatis fastigiatis, foliis superi- *Armeria*.
oribus cordatis glabris, petalis integris. Syst. Nat.
311. Sp. pl. 601. Fl. dan. 559.

Viscago foliis glabris ovato-lanceolatis, floribus um-
bellatis. Hall. hist. 916.

Lychnis viscosa, purpurea latifolia lœvis. B. pin. 205.
R. syn. 341.

Lychnis sylvestris I. Clus. hist. 288.

Anglis, common Catchfly.

Habitat in arvis et muris antiquis; on the banks of the
river, half a mile below Chester. D. Richardson.
R. syn. O. VII. VIII.

S T E L L A R I A. 568.

Cal. pentaphyllus, patens. Petala quinque, bipartita.

Caps. unilocularis polysperma.

I. STELLARIA

Holosteae. 1. **STELLARIA** foliis lanceolatis ferrulatis, pétalis bifidis. *Sp. pl.* 603. *Fl. suec.* 392.
Alpine foliis gramineis, ciliatis. *Hall. hist.* 884.
Caryophyllum holosteum arvensis glaber, flore majore.
B. pin. 210. *R. syn.* 346.
Gramen leucanthemum. *Ger. em.* 47. *Park.* 1325.
Anglis, greater Stitchwort.
Habitat in sylvis et sepibus frequens. 4. IV. V.

gramineae. 2. **STELLARIA** foliis linearibus integerrimis, floribus paniculatis. *Fl. suec.* 393. *Sp. pl.* 604.
Alpine foliis lanceolatis lineatis, petiolis ramosis. *Hall. hist.* 882.
Caryophyllum holosteum arvensis glaber, flore minore.
B. pin. 210. *R. syn.* 346.
Gramen leucanthemum alterum. *Ger. em.* 47.
Gramen leucanthemum minus. *Park.* 1325.
 β *Caryophyllum holosteum arvensis medius*. *R. syn.* 347.
Fl. dan. 414.
 γ *Alpine* foliis lanceolatis, petalis bipartitis, petiolis unifloris. *Hall. hist.* 881.
Alpine longifolia uliginosum proveniens locis. *B. hist.* III. 565. *R. syn.* 347. *Fl. dan.* 415.
Anglis, lesser Stitchwort.
Habitat in pratis, pascuis & sepibus frequens; β *in palustribus*. γ . *in pratis humidis ad fontes et ad scaturientes frequens.* 4. VIII.

nemorum. 3. **STELLARIA** foliis cordatis petiolatis, panicula pendunculis ramosis. *Sp. pl.* 603. *Fl. dan.* 271.
Myosotis foliis petiolatis, cordatis, tubis ternis. *Hall. hist.* 886.
Alpine montana, folio smilacis instar, flore lacineato.
Hist. Ox. II. 550. f. 5. t. 23. f. 2. *R. syn.* 347.
Alpine altissima nemorum. *B. pin.* 250.
Alpine hederacea montana maxima. *Col. Ecphr.* I. p. 289. t. 290. *Park.* 761.
Anglis, wood Stitchwort.
Habitat in sylvis et sepibus humidis, et ad ripas fluviorum in comitatibus Eboracensi, Lancastriensi, Westmorlandico, Cumberlandico, passim. 4. VII. VIII.

ARENARIA. 569.

Cal. pentaphyllus, patens. *Petala* quinque, integra.
Caps. unilocularis polysperma.

1. ARENARIA foliis ovatis acutis carnosis. *Sp. pl. peploides.*

605. *Fl. lapp.* 140. *suec.* 396. *dan.* 624.

Alpine marina foliis portulaceæ. *Fl. pruss.* 12. t. 2.

R. syn. 351.

Alpine littoralis foliis portulacæ. *B. pin.* 251.

Anthyllis maritima lentifolia. *B. pin.* 282. *Park.*
 282.

Anthyllis lentifolia f. alpine cruciata marina. *Ger. em.*
 622.

Anglis, sea Sandwort.

Habitat in littoribus maritimis frequens. 4. VI. VII.

2. ARENARIA foliis ovatis acutis petiolatis nervosis. *trinervia.*

Sp. pl. 605. *Fl. suec.* 397. *dan.* 629.

Alpine foliis ovato-lanceolatis, trinerviis. *Hall. hist.*
 878.

Alpine plantaginis folio. *B. hist.* III. 364. *R. syn.*
 349.

Anglis, plantain-leaved Sandwort.

Habitat in sylvis et sepibus humidis. ◎. V—VII.

3. ARENARIA foliis subovatis acutis sessilibus, corollæ serpyllifolia calyce brevioribus. *Sp. pl.* 606. *Fl. suec.* 398. *lia.*

Alpine foliis ovato lanceolatis, subhirsutis, petalis calyce brevioribus. *Hall. hist.* 875:

Alpine minor multicaulis. *B. pin.* 250. *R. syn.* 349.

Alpine minima. *Ger. em.* 612. *B. pin.* III. 364.

Alpine aquatica minima. *Park.* 1259.

Anglis, thyme-leaved Sandwort.

Habitat in muris arenosis, aridis frequens. ◎. V—VII.

4. ARENARIA foliis subulatis, caulinis paniculatis verna. calycibus acuminatis striatis. *Lin. Mant.* I. 72.

Alpine foliis linearibus, petalis calyce longioribus. *Hall. hist.* 867.

Alpine pusilla pulchro flore, folio tenuissimo nostras f. *Saxifraga* pusilla carophylloides, flore albo pulchello. *R. syn.* 351.

Alpine

DECANDRIA TRIGYNYIA.

Alpine alpina glabra tenuissimis foliis, floribus albis.
Herm. par. 12. t. 12.

Alpine caryophylloides tenuifolia, flore albo punctato.
Pluk. ph. t. 7. f. 3.

β Arenaria foliis linearibus erectis, subtus striatis, floribus fastigiatis, inaequaliter pedunculatis. Ger. gallop. 405. t. 15. f. 1.

Anglis, mountain Sandwort.

Habitat in montosis Eboracensis circa Settle, ut et Derbiensisibus, copiose; circa Kendal in comitatu Westmorlandico, prope Holywell, et circa Llanberris in Wallia copiose. 24. V—VIII.

laricifo- 5. *ARENARIA* foliis setaceis, caule superne nudiusculo, calycibus subhirsutis. Sp. pl. 607. Fac. austr. III. 39. t. 272.

Alpine foliis linearibus, angustissimis, calycibus tubulosis villosis. Hall. hist. 869.

Alpine alpina junceo folio. B. pin. 251. pr. 118. R. syll. 60. hist. 1031.

Auricula muris pulchro flore, folio tenuissimo. B. hist. III. 360.

Lychnoides juniperi folio perennis. Vaill. paris. 121.

Anglis, larch-leaved Sandwort.

Habitat in montibus Westmorlandicis. 24. VII. VIII.

tenuifo- 6. *ARENARIA* foliis subulatis, caule paniculato, capsulis erectis, petalis calyce brevioribus lanceolatis. Sp. pl. 607. Syst. Nat. 313. Fl. dan. 389.

Alpine foliis linearibus, glabris, petalis calyce brevioribus. Hall. hist. 866.

Alpine tenuifolia. B. hist. III. 364. R. syn. 350. Vaill. paris. 7. t. 3. f. 1. Sigu. ver. I. 418. t. 6. f. 2.

Anglis, fine-leaved Sandwort.

Habitat in pratis et pascuis arenosis; in the corn-fields on the borders of Triplow-heath, Gogmagog-hills, &c. in Cambridgeshire. R. syn. In Cornbury quarry, near Charlbury, Oxfordshire. Blacks. supra murum in oppido Battersea, prope Londinum. 24. VI. VII.

rubra. 7. *ARENARIA* foliis filiformibus, stipulis membranaceis vaginantibus. Sp. pl. 606.

Alpine foliis linearibus, stipulis ovato-lanceolatis, argenteis. Hall. hist. 872.

Spergula

Spergula purpurea. B. hist. III. 722. R. syn. 351.

Saginæ spergula minima. Park. 561.

Alpine, spergulæ facie minor. s. Spergula minor subcæruleo flore. B. pin. 251. pr. 119.

β *Arenaria foliis linearibus carnosis, stipulis membranaceis, caulis pubescentibus. Syst. Nat. 312. Sp. pl. 606.*

Spergula maritima flore parvo cæruleo, semine vario.

Dill. giss. 30. R. syn. 351.

γ *Arenaria foliis linearibus longitudine internodiorum. marina.*

Hort. cliff. 173. Gron. virg. 161. Sp. pl. ed. I. 423.

Alpine spergulæ facie media. B. pin. 251. R. syn. 351.

Spergula marina. Ger. em. 1125. nostras. B. hist. III.

772.

Anglis, purple Sandwort, or Spurry γ Sea Spurry.

Habitat in pratis et arvis arenosis β in pascuis marinis, γ in littoribus marinis. ☉ VI—VIII.

C H E R L E R I A. 570.

Cal. pentaphyllus. Nectaria quinque bifida, petaloidea. Antheræ alternæ steriles. Caps. trilocularis, trivalvis.

I. CHERLERIA. *Sp. pl. 608. Hall. hist. 859. t. 21. Sedoides opusc. 300. t. 1. f. 3. Segu. ver. III. 180. t. 4. f. 3.*

Pen. Voy. t. 33. Jac. austr. III. 46. t. 284.

Sedum montanum perpusillum, luteolis floribus. Park. 738.

Sedum montanum perpusillum luteum. Hist. Ox. III. 471. f. 12. t. 6. f. 14..

Lychnis alpina, muscosis foliis densius stipatis, floribus parvis, calyce duriore. Pluk. ph. t. 42. f. 8.

Anglis, dwarf Cherleria.

Habitat in montibus in boreali parte Scotiæ. D. Hope.

Found on Baikeval in the island of Rum. Penn. Voy. 24. VII. VIII.



P E N T A G Y N I A:

P E N T A G Y N I A.

COTYLEDON. 578.

Cal. quinquefidus. *Cor.* monopetala. *Squamæ nectariæ*
feræ quinque ad basin germinis. *Caps.* quinque.

umbilicus. 1. **COTYLEDON** foliis peltatis crenatis, caule sub-

simplici,
♀

floribus pendulis, bracteis integris.

Cotyledon *Dod. stirp.* 39. vera radice ruberosa. *B.*
bifl. III. 683. *R. syn.* 271.

Cotyledon major. *B. pin.* 285.

Cotyledon umbilicus *veneris.* *Clus. bifl.* II. 63.

Umbilicus repens. *Cam. epit.* 858.

Umbilicus *veneris.* *Ger. em.* 528. *vulgaris.* *Park.* 740.

Sedum luteum murale spicatum, folio umbilicato ro-

tundo. *Hist. Ox.* III. 470. f. 12. t. 10. f. 4.

Anglis, common navel-wort, or Wall Penny-wort.

Habitat in muris antiquis et saxosis humidiisculis passim
in occidentali parte Angliae et in Arvonia frequens, circu-

Troutbeck in Westmorlandia. 24. VI—VIII.

Obs. variat Foliis imis reniformibus.

lutea.

2. **COTYLEDON** foliis peltatis crenatis caule sub-

simplici, floribus erectis bracteis dentatis.

Cotyledon foliis cucullato-peltatis, ferrato-dentatis
alternis, caule ramoso, floribus erectis. *Sp. pl.* 615.

Cotyledon flore luteo radice repente. *Dodart. Mem.*
265. t. 73.

Cotyledon radice tuberosa longa repente. *R. bifl.*
1878.

Cotyledon luteum umbilicatum spicatum, radice re-

pente majus. *Hist. Ox.* III. 471.

Anglis, yellow Navel-wort.

Habitat in muris et saxosis humidiisculis, in occidentali
parte comitatus Eboracensis, D. Tofield. in hort.

D. Clement, qui recepit ex agro Somersetensi, vidi.
24. VI.

SEDUM 579.

Cal. quinquefidus. *Cor.* pentapetala. *Squamæ* nectari-
feræ quinque, ad basin germinis. *Caps.* quinque.

* *Planifolia.*

1. SEDUM foliis planiusculis ferratis, corymbo folioso, *Telephi-*
caule erecto. *Sp. pl.* 616. *um.*

Sedum androgynum foliis confertis, ferratis, floribus
dense umbellatis. *Hall. hist.* 954.

Telephium. *Cam. epit.* 112. *vulgare.* *B. pin.* 287.

Telephium f. *Crassula major vulgaris.* *Park.* 726.

Crassula f. *Faba inversa.* *Ger. em.* 518.

Anacampseros, vulgo *Faba crassa.* *B. hist.* III. 681.
R. syn. 269.

- 2 Telephium purpureum majus. *B. pin.* 287.

- γ Telephium album. *Fuchs. hist.* 800.

Anglis, common Stonecrop, Orpine, or Live-long.

Habitat in muris, pascuis et ad sepes. 24. VIII.

Pharmac. *Telephii Herba.*

** *Teretifolia.*

2. SEDUM foliis subulatis sparsis basi solutis: inferio- *reflexum:*
ribus recurvatis. *Sp. pl.* 618. *Fl. suec.* 1296. *dan.*

113.

Sedum foliis semiteretibus, acutis, aristatis, caule su-
premo multifido umbellato. *Hall. hist.* 967.

Sedum minus luteum ramulis reflexis. *B. pin.* 283.

R. syn. 270.

Aizoon scorpioides. *Ger. em.* 513.

Vermicularis scorpioides. *Park.* 733.

- 2 *Sedum minus hæmatoides.* *Ger. em.* 512. *R. syn.* 269.

Sedum minus luteum folio acuto. *B. pin.* 283.

Anglis, yellow Stonecrop, or Prick-madam.

Habitat in muris, tectis et rupibus frequens. 24. VII.

3. SEDUM foliis subulatis quinquefariam confertis basi *rupestre,*
solutis, floribus cymosis. *Sp. pl.* 618. *Fl. suec.*

318. *dan.* 59.

Sedum rupestre repens foliis compressis. *Dill. elth.*

343. *t.* 256. *f.* 333.

O 2

Sedum

DECANDRIA PENTAGYNYIA.

Sedum minus e rupe s. Vincentii. R. syn. 271.

Sedum minus vincentii. Pet. H. br. t. 41. f. 8.

Anglis, rock Stonecrop.

Habitat in rupibus St. Vincentii prope Bristolium; in rupibus Hysfæ valleculæ Nantphrancon imminentibus. R. syn. VIII.

album. 4. **SEDUM** foliis oblongis obtusis teretiusculis sessilibus patentibus, cyma ramosa. *Sp. pl. 619. Fl. dan. 66.*

Sedum caule glabro, foliis teretibus, umbellis ramosis, floribus petiolatis. Hall. hist. 959.

Sedum minus officinarum. Ger. em. 512.

Vermicularis flore albo. Park. 733.

Anglis, white Stonecrop.

*Habitat in muris, tectis, passim. On a wall just beyond the Chapel Kentish-town. Blacks. 4. VI. VII.
Pharmac. Vermicularis Herba.*

acre. 5. **SEDUM** foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis alternis, cyma trifida. *Sp. pl. 619.*

Sedum foliis conicis confertis, caulis ramosis, summis trifidis. Hall. hist. 966.

*Sedum parvum acre flore luteo. B. hist. III. 694.
R. syn. 270.*

Sempervivum minus vermiculatum acre. B. pin. 283.

*Vermicularis seu Illecebra minor acris. Ger. em. 517.
Illecebra minor s. Sedum III. Dioscoridis. Park. 735.*

β Sedum foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis sexfariam imbricatis. Sp. pl. 620.

Sedum foliis teretibus, ternatis, caulis simplicibus trifidis. Hall. hist. 965.

*Sempervivum minus vermiculatum insipidum. B. pin.
284.*

Sempervivum minimum. Cam. epit. 856.

Anglis, wall Stonecrop, or Pepper.

*Habitat in muris tectis, rupibus et pascuis siccioribus prope Northfleet et Sheerness; in insula Sheppey copiose VI. VII.
Pharmac. Sedi minoris Herba.*

anglicum. 6. **SEDUM** foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis alternis, cyma ramosa bifida.

Sedum

Sedum minimum non acre flore albo. R. syn. 270. t. 12. f. 2.

Sedum minimum, flore mixto ex albo et rubro. Merr. pin.

Anglis, English Stonecrop.

Habitat in rupibus, saxosis et arenosis vitrescentibus in comitatibus Westmorlandico, Cumberlandico, Lancasterensi, Devonensi et Cornubiensi, copiose in Wallia frequens; prope Deel in Cantio. 4. VII. VIII.

Desc. Radix ramosa perennis. Caulis procumbens, teres, foliatus, glaber, ramosus, rubescens; ramis alternis. Folia alterna, subtrifariam imbricata, adnato-seffilia, subovata, acutiuscula superne planiuscula, subitus gibba, pulposa, nuda. Cyma ramosa, bifida, subrecurva. Flores sessiles secundi; Corolla alba seu purpurascens-alba. Capsulæ purpurascentes.

7. SEDUM foliis oppositis ovatis obtusis carnosis, caule dasypyllo infermo, floribus sparsis. Sp. pl. 618. Fac. Hort. lum. vind. II. 71. t. 153.

Sedum foliis conicis obtusis glaucis, reticulatis, caule ramoso viscido. Hall. hist. 961.

Sedum minus circinato folio. B. pin. 283. Hist. Ox. III. 473. f. 12. t. 17. f. 35. R. syn. 271.

Sedum minus VII. Clus. hist. I. I. 60.

Aizoon dasypyllo. Dalech. hist. 1133.

Anglis, round-leaved Stonecrop.

Habitat in muris et tectis, plentifully on the houses and walls at Market-eit, near Market-street. Mr. Th. Knowlton. R. syn. in muris prope Hammersmith et Kew prope Londinum, et in muris apud Bugden in agro Huntingtonensi. O. VII.

8. SEDUM caule erecto, foliis planiusculis, pedunculis-villosum que subpilosum. Sp. pl. 620. Fl. dan. 24.

Sedum hirsutum et viscidum, foliis linearibus obtusis planiusculis. Hall. hist. 962.

Sedum purpureum pratense. B. hist. III. 692. R. syn. 270.

Sedum palustre subhirsutum purpureum. B. pin. 285.

Sedum minus palustre. Ger. em. 515.

Sedum arvense s. palustre flore rubente. Park. 734.

DECANDRIA PENTAGYNYIA.

Anglis, hairy Stonecrop.

Habitat in pratis et pascuis montosis, humidis, on the moist rocks about Ingleborough-hill, on Hartside-hill, near Gambleby, in the way to Osten in Cumberland; in et juxta montem Hincklehew prope Settle. Dr. Richardson. R. syn. In Scotia frequens. ♂. VI. VII.

OXALIS. 582.

Cal. pentaphyllus. Petala unguibus connexa. Caps. angulis dehiscens, pentagona.

- Acetosel-* 1. *OXALIS* scapo unifloro, foliis ternatis, radice squa-
la. moſo articulata. Sp. pl. 620. Hall. hist. 928.
Oxys alba. Ger. em. 1201. R. syn. 281.
Trifolium acetosum vulgare. B. pin. 330. Park. 746.
β *Trifolium acetosum vulgare, flore purpureo.* Merr.
Anglis, common Wood-sorrel.
Habitat in sylvis, sepibus, ericetis umbrosis. 24. IV.
Pharmac. Lujulæ Folia.

AGROSTEMA. 583.

*Cal. monophyllus, coriaceus. Petala quinque ungu-
culata: Limbo obtuso, indiviso. Caps. unilocularis.*

- Githago,* 1. *AGROSTEMA* hirsuta calycibus corollam æquan-
tibus, petalis integris nudis. Sp. pl. 624. Fl. dan.
576.
Lychnis calycibus longissime caudatis. Hall. hist. 926.
Lychnis segetum major. B. pin. 204. R. syn. 338.
Lychnoides segetum f. Nigellastrum. Park. 632.
Pseudo-melanthium. Dalech. hist. 438. Ger. em. 1087;
B. hist. III. 341.
Anglis, corn Cockle.
Habitat in arvis frequens. ♂. VI, VII.

LYCHNIS. 584.

*Cal. monophyllus, oblongus, laevis. Petala quinque
unguiculata: Limbo subbifido. Caps. quinquelocu-
laris.*

LYCHNIS

1. LYCHNIS petalis quadrifidis, fructu subrotundo. Sp. *Flos cuculi.*
pl. 625. Fl. dan. 590.

Lychnis petalis quadrifidis. Hall. hist. 921.

Lychnis plumaria sylvestris simplex. Park. par. 253.
R. syn. 338.

Caryophyllus pratensis, laciniato flore simplici, five
Flos cuculi. B. pin. 210.

Armerius pratensis mas et foemina. Ger. em. 600.

Anglis, meadow Lychnis, Pinks, Wild-williams, or
Cuckow-Flower.

Habitat in pratis et pascuis humidis. 4. VI.

2. LYCHNIS petalis integris. Sp. pl. 625. Viscaria.

Lychnis foliis lanceolatis, floribus verticillatis, spica-
tis. Hall. hist. 927.

Lychnis sylvestris viscosa rubra angustifolia. B. pin.
205. Park. 636. R. syn. 340.

Muscipula angustifolia. Ger. em. 601.

Anglis, viscous Lychnis, or Catchfly.

Habitat in pratis montosis. Found by Mr. Lhwyd on the
sides of Craig Wreidhin-hill, in Montgomeryshire.

R. syn. 4. V. VI.

3. LYCHNIS floribus dioicis. Sp. pl. 626. dioica.

Lychnis floribus sexu distinctis. Hall. hist. 923.

Lychnis sylvestris rubello flore. Ger. em. 469. R. syn. mas.
339.

Lychnis sylvestris flore rubro. Park. 631.

Lychnis sylvestris f. aquatica purpurea simplex. B. pin.
204.

4. *Lychnis sylvestris albo flore.* Ger. em. 468. Park. foemina.

630. R. syn. 339.

Lychnis sylvestris alba simplex. B. pin. 204.

Anglis, red & white Lychnis, or Campion.

Habitat in sylvis, et sepibus et pratis ubique. 4. V—
VIII.

Obs. variat Floribus hermaphroditis, et tum Petala car-
nea sunt.

CERASTIUM. 585.

Cal. pentaphyllus. *Petala bifida.* *Caps.* unilocularis,
apice dehiscens.

* *Capulis oblongis.*

vulga-
tum. 1. CERASTIUM foliis ovatis, panicula dichotoma,
petalis calyce æqualibus, caulis diffusis.

Cerastium foliis ovatis, petalis calyce æqualibus cauli-
bus diffusis. *Sp. pl.* 627.

Myositis foliis ovato-lanceolatis, petalis calycis longi-
tudine. *Hall. hist.* 893.

Myosotis arvensis hirsuta, parvo flore albo. *Vaill.*
paris. 142. *t.* 30. *f.* 1.

Alpine hirsuta, magno flore. *B. pin.* 251.

Alpine hirsuta myosotis. *Lob. adv.* 195. *R. syn.* 349.

Anglis, common Cerastium, or Mouse-ear-chickweed.
Habitat in pratis, pascuis et muris. ☽. VI.

viscosum. 2. CERASTIUM erectum villoso-viscosum, panicula
dichotoma, floribus pedunculo longioribus.

Cerastium erectum villoso-viscosum. *Sp. pl.* 627.

Myosotis hirsuta et viscosa. *Hall. hist.* 895.

Myosotis hirsuta altera viscosa. *Vaill. paris.* 142. *t.*
30. *f.* 3.

Alpine viscosa. *Park.* 764.

Alpine hirsuta altera viscosa. *B. pin.* 251.

Alpine hirsuta myosotis latifolia precosior. *R. syn.* 348.

Anglis, viscous Cerastium, or Mouse-ear-chickweed.

Habitat in pratis, pascuis et muris. ☽. IV. V.

semide-
candrium. 3. CERASTIUM floribus pentandris, petalis emarginata-
tis. *Sp. pl.* 627. *Hort. cliff.* 173. *Fl. suec.* 416.

Cerastium hirsutum minus, parvo flore. *Dill. giss.* 80.
R. syn. 348. *t.* 15. *f.* 1.

Myosotis caule simplici, foliis ovatis hirsutis, tubis ter-
nis. *Hall. hist.* 894.

Myosotis arvensis hirsuta minor. *Vaill. paris.* 142. *t.*
30. *f.* 2.

Alpine hirsuta minor. *B. pin.* 251.

Anglis,

Anglis, least Cerastrum, or Mouse-ear-chickweed.
Habitat in muris et pascuis frequens. Ⓛ. IV.

4. CERASTIUM foliis linear-lanceolatis obtusis gla- arvense.
bris, corollis calyce majoribus. Sp. pl. 628. Fl. suec.
417. dan. 626.

Myosotis foliis linearibus lanceolatis, petalis calyce
duplo longioribus. Hall. hist. 889.

Myosotis arvensis hirsuta, flore majore. Vaill. paris.
141. t. 50. f. 4.

Caryophyllus arvensis hirsutus, flore majore. B. pin.
210. R. syn. 348.

Caryophyllus holosteus. Ger. em. 595. arvensis hir-
sutus. Park. 1339.

Anglis, Corn Cerastrum, or mouse-ear-chickweed.

Habitat in arvis, pratis et pascuis arenosis supra Dup-
per's-hill prope Croydon. 4. V.

5. CERASTIUM foliis ovato-lanceolatis, caule diviso, alpinum.
capsulis oblongis. Sp. pl. 628. Fl. dan. 6.

Myosotis foliis ovato-lanceolatis subhirsutis, petalis
calyce duplo longioribus. Hall. hist. 888.

Alpine myosotis facie, Lychnis alpina, flore amplio ni-
veo repens. R. syn. 349. t. 15. f. 2.

Anglis, alpine Cerastrum, or Mouse ear-Chickweed.

Habitat in montibus, et juxta scaturigines, ad latera mon-
tis Snowdon. Nullibi frequentius quam juxta scaturi-
gines aquarum montis excelsi Wyddfa boream versus.

Dr. Richardson. R. syn. in monte Clogwyn dû yn
yr Arddu dicto prope Llanberris. 4. VI. VII.

** Capsulis subrotundis.

6. CERASTIUM foliis ovatis, floribus umbellatis, peta- umbella-
lis subintegris, fructibus pendulis. tum.

Holosteum floribus umbellatis. Læft. it. 120. Sp. pl.
130.

Holosteum caryophyllæum arvense. Tabern. ic. 233.

Caryophyllus arvensis umbellatus, folio glabro. B.
pin. 210.

Caryophyllus holosteus arvensis. Ger. em. 595.
Alpine

DECANDRIA PENTAGYNIA.

Alsine floribus umbellatis, petalis serratis. *Hall. hist.*
878.

Anglis, umbellated *Cerastrum*.

Habitat in muris et arvis arenosis, in muris antiquis et aggeribus circa Norwich. D. Rose, *et circa Bury in Suffolkia.* D. Cullum. O. IV. V.

Obs. variat floribus triandris, tetrandris et pentandris trigynis, et floribus decandris pentagynis.

*latifoli-
um.*

7. **CERASTIUM** foliis ovatis subtomentosis, ramis subunifloris, capsulis globosis. *Sp. pl.* 629.

Myosotis foliis tomentosis ovatis. *Hall. hist.* 887.

Caryophyllus holosteus alpinus latifolius. *B. pin.* 210.
pr. 104.

Alsine myosotis lanuginosa alpina grandiflora, seu Auricula muris villosa, flore amplio membranaceo. R. syn. 349.

Herba facie auriculæ muris. *Mart. Spitz. T. G. f. d.*
Anglis, mountain *Cerastrum*.

Habitat in rupe prope Clogwyn y Garnedd. totius Cambriæ altissima juxta Llanberris in Arvonia copiose.
R. syn. 24. V. VI.

*aquati-
cum.*

8. **CERASTIUM** foliis cordatis sessilibus floribus solitariis, fructibus pendulis. *Sp. pl.* 628.

Alsine foliis ovato-cordatis, imis petiolatis, tubis quinis. *Hall. hist.* 885.

Alsine aquatica major. *B. pin.* 251.

Alsine major repens perennis. *B. hist.* III. 362. R. syn. 347.

Alsine major. *Cam. epit.* 851. *Tabern.* 707. *Ger. em.* 611. *et maxima.* *Park.* 759.

Anglis, water *Cerastrum*.

Habitat in aquosis et ad ripas fluviorum. 24. VII.

SPERGULA. 586.

Cgl. pentaphyllum. Petala quinque integra. Caps.
ovata, unilocularis, quinquevalvis.

ervensis. 1. **SPERGULA** foliis verticillatis, fructibus pendulis.
Spergula foliis verticillatis, floribus decandris. *Sp. pl.* 630.

Spergula. *Dod. pempt.* 527. *B. hist.* III. 722.

Al sine foliis verticillatis, seminibus rotundis. *Hall.*
hist. 873.

Al sine Spergula dicta major. *B. pin.* 251. *R. syn.*
351.

Saginæ Spergula. *Ger. em.* 1125. major. *Park.* 562.

§ Spergula foliis verticillatis floribus pentandris. *Sp. pl.* pentan-
630. dria.

Spergula annua semine foliaceo nigro, circulo mem-
braceo albo cincto. *Dill. giss.* 46. *Ep. Nat. cur.*
cent. V. 75. *t. 4.* *R. syn.* 351. *Hist. Ox. II.* 551.

Anglis, corn Spurrey.

Habitat in arvis et arenosis. ○. VII. VIII.

Obs. variat floribus pentandris et decandris in eadem
planta.

2. SPERGULA foliis oppositis subulatis lævibus, cau- *nodosæ*.

libus simplicibus. *Sp. pl.* 630. *Fl. dan.* 96.

Al sine foliis superioribus fasciculatis. *Hall. hist.*
871.

Al sine palustris foliis tenuissimis, seu Saxifraga palus-
tris anglica. *Ger. em.* 567. *R. syn.* 350.

Al sine palustre ericæ folio, polygonoides, articulis cre-
brioribus, flore albo pulchello. *Pluck. t. 7. f. 4.*

Al sine nodosa germanica. *B. pin.* 251.

Saxifraga palustris anglica. *Park.* 427.

Anglis, knotted Spurrey, or English marsh Saxifrage.

Habitat in arenosis et pascuis humidiusculis, ad ripas
Thamesis juxta Nine-elms prope Londinum. 24.
VII. VIII.

3. SPERGULA foliis oppositis subulatis ciliatis fasci- *laricina*.
culatis, floribus pentandris.

Spergula foliis oppositis ciliatis subulatis fasciculatis.
Sp. pl. 631.

Al sine foliis oppositis linearibus, rigidis fasciculatis,
basi ciliatis, petalis integris, calyce æqualibus.
Gmel. fib. IV. 155.

Saxifraga anglica pusilla foliis brevioribus, crassioribus
et succulentioribus. *R. syn.* 345.

Anglis ciliated Spurney. Habitat

DECANDRIA PENTAGYNIA.

Habitat in pratis et ericetis arenosis passim; prope Cobham et Esher in comitatu Surriensi; in Devonia et Cornubia frequens. ℥. VI. VII.

Desc. Radix perennis, ramosa, repens. Caules plures ramosi procumbentes. Folia opposita, connata, subulata, ciliata, acuta, nuda in axillis foliorum, foliis minoribus fasciculatis. Pedunculi laterales, ad apicem rami, solitarii, longissimi uniflori, teretes. Flores cernui albi, Stamina quinque raris decem.

Classis

*Classis XI.***DODECANDRIA***Stamina inter XI. et XIX. inclusive***M O N O G Y N I A.****A S A R U M. 589.**

Cal. quadrifidus, germini insidens. *Cor.* o. *Caps.* coriacea, coronata.

1. ASARUM foliis reniformibus obtusis binis. *Sp. pl. europæ-*
633. *Fl. suec.* 421. *dan.* 633. *um;*

Asarum foliis reniformibus subhirsutis. *Hall. hist.*

1547.

Asarum. *B. pin.* 197. *hist.* III. 548. *R. syn.* 158.

Asarum vulgare. *Ger. em.* 836. *Park.* 266.

Anglis, common Asarabacca.

Habitat in nemorosis. In a hedge on the left hand, as soon as you are in the gate, the first field from Charnell's green, going to Sir Thomas Seabright's beach-wood, Th. Knowlton; in several woods in Lancashire. *R. syn.* 4. V.

Pharmac. Asari Radix, Folia.

L Y T H R U M. 604.

Cal. duodecim-fidus. *Petala* sex, *calyci* inserta.
Caps. bilocularis, polysperma.

1. LYTHRUM foliis oppositis cordato-lanceolatis, flo-*salicaria.*
ribus spicatis dodecandris. *Sp. pl.* 640.

Salicaria foliis lanceolatis, subhirsutis, floribus spicatis. *Hall. hist.* 854.

Salicaria vulgaris purpurea, foliis oblongis. *Tourn.* 253. *R. syn.* 367.

Lysimachia

DODECANDRIA MONOGYNIA.

Lysimachia purpurea. *Ger. em.* 476. *Park.* 546.

Lysimachia spicata purpurea. *B. pin.* 246.

3 *Lysimachia purpurea trifolia, caule hexagono.* *Spig.*
isag. *R. syn.* 367.

Anglis, purple Loosestrife.

Habitat in paludibus et ad ripas fluviorum. 24. VII.
VIII.

hyssopifo- 2. *LYTHRUM* foliis alternis linearibus, floribus hex-
andris. *Sp. pl.* 642. *Jac. austr.* II. 20. t. 133.

Salicaria foliis linearibus, floribus per alas sessilibus.
Hall. hist. 855.

Salicaria hyssopifolia latiore et angustiore. *Tourn.*
253. *R. syn.* 367. *Hall. jen.* 147. t. 6. f. 3.

Hyssopifolia. *B. pin.* 218. *aquatica.* *B. hist.* III.
792.

Gratiola angustifolia. *Ger. em.* 581. f. minor. *Park.*
220.

Anglis, hedge Loosestrife or hyssop.

Habitat in aquosis et ubi aquæ per hyemem stagnarunt,
sed rarius, in ericeto Hounsflejano. ①. VIII.

D I G Y N I A.

AGRIMONIA. 607.

Cal. quinquedentatus, altero obvallatus. *Petala quin-*
que. *Sem.* duo infundo calycis.

eupatoria. 1. *AGRIMONIA* foliis caulinis pinnatis : impari petio-
lato, fructibus hispidis. *Sp. pl.* 643.

Agrimonia foliis pinnatis, pinnulis alterne minimis.
Hall. hist. 991.

Agrimonja. *Ger. em.* 712. *R. syn.* 202. *vulgaris.*
Park. 594.

Eupatorium. *Fuchs. hist.* 244. *Cam. ep.* 759. *vete-*
rum s. Agrimonia. *B. pin.* 321.

Anglis, common Agrimony.

Habitat in marginibus agrorum et nemorosis. 24. VI.
VII.

Pharmac. *Agrimoniæ Herba.*

TRIGYNIA.

TRIGYNIA.

RESEDA. 608.

Cal. monophyllus, partitus. Petala laciniata. Caps. ore dehiscens, unilocularis.

1. RESEDA foliis lanceolatis integris basi utrinque unilobata, dentatis, calycibus quadrifidis. *Syst. nat. 329. Sp. pl. 643.*

Reseda foliis ellipticis, obtuse lanceolatis undulatis, calycibus quadrifidis. *Hall. hist. 1058.*

Luteola. *Ger. em. 494. R. syn. 366. vulgaris. Park. 602.*

Luteola herba salicis folio. *B. pin. 100.*

Anglis, dyers Reseda or Weed.

Habitat in pratis et pascuis, locis sterilioribus et incultis.
○. VI.

2. RESEDA foliis omnibus trifidis : inferioribus pinna- lutea. tis. *Sp. pl. 645. Gort. Gelr. 310.*

Reseda hexapetala, foliis pinnatis undulatis, calyce sexfido. *Hall. hist. 1056.*

Reseda vulgaris. *B. pin. 100. R. syn. 366.*

Reseda minor s. vulgaris. *Ger. em. 277. Park. 823.*

Reseda crispa gallica. *Bocc. pl. rar. 76.*

Anglis, yellow Reseda or Base-rocket.

Habitat in arvis, pratis et pascuis praesertim solo calcaro. ○. VI.—VIII.

EUPHORBIA. 609.

Cor. tetra s. pentapetala, calyce incidens. Cal. monophyllus, ventricosus. Caps. tricocca.

* *Dichotomæ (umbella bifida aut nulla.)*

1. EUPHORBIA dichotoma, foliis integerrimis semi-peplis. cordatis, floribus solitariis axillaribus, caulis pro- cumbentibus. *Sp. pl. 653. Amoen. Acad. III. 117.*

Tithymalus maritimus supinus annuus, Poplis dictus. *R. syn. 313.*

Peplis. *B. hist. III. 668. Ger. em. 503. Park. 194.*
Peplis

DODECANDRIA TRIGYNIA.

Peplis maritima folio obtuso. *B. pin.* 293.

Anglis, purple Spurge.

Habitat in littoribus maritimis arenosis; inter Pensans et Marketjeu in Cornubia; prope Exmouth in Devonia copiose. ☽. VII. VIII.

** *Umbella trifida.*

peplus.

2. **EUPHORBIA umbella trifida**: dichotoma, involucellis ovatis, foliis integerrimis obovatis petiolatis.

Sp. pl. 653. *Amœn. Acad.* III 115.

Tithymalus foliis rotundis, stipulis floralibus cordatis, petalis argute corniculatis. *Hall. hist.* 1049.

Tithymalus parvus annuus, foliis subrotundis non crenatis, *Peplus* dictus. *R. syn.* 313.

Peplus f. *Esula rotunda.* *B. pin.* 292. *Ger. em.* 503.

Anglis, petty Spurge.

Habitat in cultis oleraceis. ☽. VII. VIII.

exigua.

3. **EUPHORBIA umbella trifida**: dichotoma, involucellis lanceolatis, foliis linearibus. *Sp. pl.* 654.

Amœn. Acad. III. 118. *Fl. dan.* 592.

Tithymalus foliis linearibus, stipulis lanceolatis aristatis. *Hall. hist.* 1048.

Tithymalus f. *Esula exigua.* *B. pin.* 295.

Tithymalus leptophyllus. *Park.* 193. *R. syn.* 313.

Esula exigua *Tragi.* *Ger. em.* 502.

Anglis, dwarf Spurge.

Habitat in arvis. ☽. VII.

*** *Umbella quinquefida.*

portlandi- 4. **EUPHORBIA umbella quinquefida**: dichotoma, involucellis subcordatis concavis, foliis linearilanceolatis acutis glabris patentibus. *Sp. pl.* 656.

Tithymalus maritimus minor, *Portlandicus.* *R. syn.* 313. t. 24. f. 6.

Anglis, Portland Spurge.

Habitat in arenosis maris littoribus. Found by the Rev. Mr. Stonestreet in the narrow neck of land which joins Portland to Devonshire. R. syn. prope Exmouth,

mouth, *in Devonia*; *in littoribus Cornubiæ passim*;
prope Carnarvon in Wallia, &c. ♂. VII. VIII.

5. EUPHORBIA umbella subquinquefida; bifida, in-*paralias*.
 volucellis cordato-reniformibus, foliis sursum im-
 bricatis. *Sp. pl.* 657. *Amœn. Acad.* III. 129.

Tithymalus maritimus. *B. pin.* 291.

Tithymalus paralius. *Ger. em.* 498. *R. syn.* 312.

Tithymalus paralius s. maritimus. *Park.* 184.

Anglis, sea Spurge.

Habitat *in littoribus maritimis.* ♀. VII. VIII.

6. EUPHORBIA umbella quinquefida: trifida: dicho-*heliosco-*
toma, involucellis obovatis, foliis cuneiformibus *pia*,
 serratis. *Sp. pl.* 658. *Amœn. Acad.* III. 124.

Tithymalus foliis petiolatis, subrotundis serratis, sti-
pulis rotundis serratis. *Hall. hist.* 1050.

Tithymalus helioscopius. *Cam. epit.* 963. *Ger. em.*
 498. *B. pin.* 291. *R. syn.* 313.

Anglis, sun Spurge or Wart-wort.

Habitat *in cultis oleraceis.* ♂. VII. VIII.

7. EUPHORBIA umbella quinquefida: subtrifida: bi-*verrucosa*,
 fida, involucellis ovatis, foliis lanceolatis ferrulatis
 villosis, capsulis verrucosis. *Sp. pl.* 658. *Amœn.*
Acad. III. 120.

Tithymalus foliis ellipticis serratis, stipulis umbel-
laribus quinis, floralibus obtuse quadrangulis, fruc-
tibus undique exasperatis. *Hall. hist.* 1052.

Tithymalus myrsinites fructu verrucæ simili. *B. pin.*
 291.

Tithymalus verrucosus. *B. hist.* III. 673. *Park.* 181.
R. syn. 312.

Anglis, warty Spurge.

Habitat *in arvis.* Found by Mr. Dale in Essex; and
 by Dr. Robinson near York. *R. syn.* ♂. VIII.

8. EUPHORBIA umbella quinquefida: trifida: dicho-*platyphyl-*
toma, involucellis catina pilosis, foliis ferratis lan-
 ceolatis, capsulis verrucosis. *Sp. pl.* 560.

Tithymalus foliis lanceolatis ferratis, stipulis florali-
 bus

DODECANDRIA TRIGYNIA.

bus cordatis, capsulis asperis lineis levibus divisis.

Hall. hist. 1053.

Tithymalus platyphyllus. *Fuchs. hist.* 813. *B. hist.* III. 670. *R. syn.* 312.

Tithymalus arvensis latifolius germanicus. *B. pin.* 291.

¶ Tithymalus segetum longifolius. *Cat. Cant. app. R.* *syn.* 312.

Anglis, corn Spurge.

Habitat in arvis; at Black Notley in Essex. *R. syn.*

In the corn-fields between Harefield-common and Battle's-Well. Blackf. Sp. bot. prope Northfleet. Oct. VII. VIII.

Obs. in § Folia fere integerrima, basi tantum minutissima ferrulata.

**** Umbella multifida.

hyberna. 9. EUPHORBIA umbella sexfida: dichotoma, involucellis ovalibus, foliis integerrimis, ramis nullis, capsulis verrucosis. *Sp. pl.* 662.

Tithymalus latifoliis hispanicus. *Tab. hist.* 987. *B. pin.* 291.

Tithymalus hybernicus. *Mer. pin.* *R. syn.* 312. *vasculis muricatis erectis. Dill. elin.* 387. t. 290. f. 374.

Anglis, Irish Spurge.

Habitat in arvis; amongst the corn near Twittenham-park, against Richmond; and near Otterspool. Mr. Dood. *R. syn. inter* Feversham et Sittingborn in Cantio. 4. VIII.

*amygdalo-
ides.* 10. EUPHORBIA umbella multifida: dichotoma, involucellis perfoliatis orbiculatis, foliis obtusis. *Sp. pl.* 662.

Tithymalus characias amygdaloides. *Ger. em.* 500. *B. pin.* 290. *R. syn.* 312.

Tithymalus sylvaticus toto anno folia retinens. *B. hist.* III. 671.

Tithymalus characias vulgaris. *Park.* 186.

Anglis, wood Spurge.

Habitat in sylvis et sepibus frequens. 4. IV. V.

II. EU-

- ii. EUPHORBIA umbella multifida: bifida, involu- *characias*.
 cellis perfoliatis emarginatis, foliis lanceolatis in-
 tegerrimis, caule perenni. *Sp. pl.* 662.
Tithymalus characias monspeliensium. Ger. em. 499.
Park. 186. *R. syn.* 312.
Tithymalus characias rubens peregrinus. B. pin. 290.
Anglis, red-Spurge.
Habitat in sylvis et sepibus, sed rarius. On the paper-
mill pool-dam in Haywood-park, in Staffordshire.
D. Plot. R. syn. h. VI.

DODECAGYNYIA.

SEMPERVIVUM. 612.

Cal. duodecim-partitus. *Petala* duodecim. *Caps.*
 duodecim, polysperma.

- i. SEMPERVIVUM foliis ciliatis, propaginibus pa- *tectorum*.
 tentibus. *Sp. pl.* 664. *Fl. dan.* 601.
Sempervivum foliis radicalibus carnofis ciliatis, cau-
 linis imbricatis membranaceis, corymbo racemoso
 reflexo. *Hort. cliff.* 179. *Mat. med.* 222.
Sempervivum majus. Ger. em. 510. *R. syn.* 269.
Sedum majus vulgare. B. pin. 283. *Park.* 730.
Sedum rosulis glabris ciliatis, petalis conglutinatis,
lanceolatis hirsutis, quatuordenis. Hall. hist. 949.
Anglis, common Houseleek.
Habitat in tectis passim. 24. VII.
Pharmac. *Sempervivi majoris Herba.*

Classis XII.

I C O S A N D R I A
M O N O G Y N I A.

P R U N U S. 620.

Cal. quihquefidus, inferus. *Petala* quinque. *Drupæ*
nux futuris prominulis.

communis. 1. PRUNUS pedunculis subgeminis, foliis lanceolato-
ovatis convolutis, ramis submuticis.

insititia. Prunus pedunculis geminis, foliis ovatis subvilloso-
convolutis, ramis spinascentibus. *Sp. pl.* 680.
Hall. hist. 1081.

Prunus sylvestris major. *B. hist. I.* 196. *R. syn.* 462.

Prunus sylvestris præcoccia. *B. pin.* 444.

Prunus sylvestris fructu majore nigro. *R. syn. ed.*
II. 301.

β Prunus sylvestris fructu rubro, acerbo et ingrato. *R.*
syn. 463.

γ Prunus sylvestris fructu majore albo. *R. syn.* 462.

domesti- δ Prunus pedunculis subsolitariis, foliis lanceolato-ova-
ca. tis convolutis, ramis muticis. *Sp. pl.* 680.

Prunus domestica. *Ger. em.* 1497.

Prunus. *B. pin.* 443.

Pruna majora dulcia et parva atro-cæruleo. *B. pin.*
443.

Anglis, common Prunus or Plumb; α. β. γ. Bullace-
tree δ. Plumb-tree.

Habitat in sepibus. ḥ. IV.

spinosa. 2. PRUNUS pedunculis solitariis, foliis lanceolatis gla-
bris, ramis spinosis. *Sp. pl.* 681. *Fl. suec.* 432.

Prunus sylvestris. *Ger. em.* 1497. *Park.* 1033. *B.*
pin. 444. *hist. I.* 193. *R. syn.* 462.

Anglis, thorny Prunus, Black-thorn or Sloe-tree.

Habitat

Habitat in *sepibus*. h. IV.

Pharmac. *Pruni sylvestris, Cortex, Flores, Fructus.*

3. PRUNUS umbellis subpedunculatis, foliis ovato-*cerasus*.

lanceolatis conduplicatis.

Prunus umbellis subpedunculatis, foliis ovato lanceo-

latis conduplicatis glabris. Sp. pl. 679.

Cerasus foliis glabris ferratis, ovato-lanceolatis, mu-

crone producto. Hall. hist. 1083.

Cerasus sylvestris fructu rubro. B. hist. 1220. R.

syn. 463.

Cerasus sativa rotunda, rubra et acida. B. pin. 449.

Cerasus acida. Tab. ic. 985.

β *Cerasus sylvestris fructu minimo cordiformi.* Ph. brit.

R. syn. 463.

γ *Prunus umbellis sessilibus, foliis ovato-lanceolatis con-*

avium. duplicatis subtus pubescentibus. Sp. pl. 680.

Cerasus foliis ovato-lanceolatis, ferratis, inferne sub-

hirsutis, mucrone producto. Hall. hist. 1082.

Cerasus sylvestris ac major, fructu subdulci nigro co-

lore inficiente. B. pin. 450.

Cerasus sylvestris fructu nigro. B. hist. I. 220. R.

syn. 463.

Cerasus nigra. Tab. ic. 986.

δ *Cerasus sylvestris septentrionalis fructu parvo serotino.*

R. syn. 463.

Anglis, red & black Prunus or Cherry. Hunt. Ev.

sylv. 188.

Habitat in *sylvis et sepibus.* h. V.

Pharmac. *Cerasorum nigrorum Fructus.*

4. PRUNUS floribus racemosis, foliis deciduis basi sub-

padus. tus biglandulosis. Sp. pl. 677.

Padus foliis ovato-lanceolatis, ferratis. Hall. hist.

1086.

Cerasus avium nigra et racemosa. Ger. em. 1504.

R. syn. 463.

Cerasus avium racemosa. Park. 1517.

Cerasus racemosa sylvestris fructu non eduli. B. pin.

451.

Anglis, birds Prunus or Cherry.

Habitat in sylvis et sepibus; in comitatibus Westmorlandico, Cumberlandico, Eboracensi, Lancastrensi, &c. frequens. In the lane going from Temple-mills to Epping forest, Dr. Wilmer. H. V.

D I G Y N I A.

C R A T Æ G U S. 622.

Cal. quinquefidus. *Petala* quinque, *Bacca* infera disperma.

- aria.* 1. CRATÆGUS foliis ovatis incisis serratis subtus tomentosis. *Sp. pl.* 681. *Fl. suec.* 433. *dan.* 302.
Mespilus foliis ovatis serratis, subtus tomentosis. *Hall. hist.* 1089.
Mespilus alni folio subtus incano, *Aria Theophrasti* dicta. *R. syn.* 453.
Aria Theophrasti. *Ger. em.* 1327.
Sorbus sylvestris *Aria Theophrasti* dicta. *Park.* 1421.
Alni effigie, lanato folio major. *B. pin.* 452.
Angls, white Haw or Beam-tree. *Hunt. Ev. sylv.* 181.
Habitat in sylvis et sepibus præsertim montosis et sola calcareo. H. V.
- tormina-* 2. CRATÆGUS foliis cordatis septangulis: lobis infimis divaricatis. *Sp. pl.* 681.
Mespilus foliis serratis, septilobis; lobis primis divergentibus. *Hall. hist.* 1088.
Mespilus apii folio sylvestris non spinosa, seu *Sorbus torminalis*. *B. pin.* 454. *R. syn.* 453.
Sorbus torminalis. *Cam. epit.* 162. *Ger. em.* 1471.
 seu *vulgaris*. *Park.* 1420.
Anglis, wild Haw-tree or Service. *Hunt. Ev. sylv.* 182.
Habitat in sylvis et sepibus. H. IV, V.
- Oxyacan-* 3. CRATÆGUS foliis obtusis subtrifidis serratis. *Sp.*
tha. *pl.* 683. *Fl. suec.* 434. *dan.* 634. floribus mono-
 gynis.

Mespilus

Mespilus spinosa, foliis glabris, serratis, retusis, trifidis. *Hall. hist.* 1087.

Mespilus apii folio sylvestris spinosa s. *Oxyacantha*. *B. pin.* 454. *R. syn.* 453.

Oxyacanthus. *Ger. em.* 1327.

Spina appendix vulgaris. *Park.* 1025.

2 *Mespilus apii* folio sylvestris spinosa, folio et fructu majore. *R. syn.* 454.

Anglis, common Haw-tree or White-thorn. *Hunt.* *Ev. sylv.* 398.

Habitat in sylvis et sepibus. *H. V.*

Pharmac. Spinæ albæ s. *Oxyacanthæ Flores, Fruetus.*

TRIGYNA.

SORBUS. 623.

Cal. quinquefidus. *Petala* quinque. *Bacca* infera trisperma.

1. SORBUS foliis pinnatis utrinque glabris. *Sp. pl. aucuparia.* 683.

Sorbus sylvestris foliis domesticæ similis. *B. pin.* 415. *R. syn.* 452.

Sorbus sylvestris f. *Fraxinus bubula*. *Ger. em.* 1473.

Sorbus aucuparia. *B. hist.* I. 62. *Crantz. fasc. II.* 49. t. 1. f. 4.

Ornus sive *Fraxinus sylvestris*. *Park.* 1419.

Mespilus foliis pinnatis, utrinque glabris. *Hall. hist.* 1096.

Anglis, mountain Service, Ash or Quicken-tree. *Hunt. Ev. sylv.* 218.

Habitat in sylvis et sepibus. *H. V.*

2. SORBUS foliis pinnatis subtus villosis. *Sp. pl.* 684. *domestica.*

Sorbus. *B. hist.* I. 59. *Ger. em.* 1474. *R. syn.* 452. *sativa.* *B. pin.* 415.

Sorbus legitima. *Park.* 1420.

Sorbus domestica. *Crantz. fasc. II.* 49. t. 2. f. 3.

Mespilus foliis pinnatis subtus villosis. *Hall. hist.* 1092.

Anglis, true Service or Sorb-tree.

Habitat in montibus nemorosis. In the mountainous part of Cornwall. Walter Moyle, Esq. In the Morelands in Staffordshire. D. Plot. R. syn. H. V. Pharmac. Sorbi Fructus.

hybrida. 3. SORBUS foliis angulatis semipinnatisque, subtus tomentosis.

Sorbus foliis semipinnatis subtus tomentosis. Sp. pl. 684. Lin. dec. II. t. 6.

Anglis, bastard Service-tree.

Habitat in montosis. On the walls of Castel Dinas brân Denbighshire. Mr. Waring. H. V.

PENTAGYNYIA.

P Y R U S. 625.

Cal. quinquefidus. *Petala* quinque. *Pomum* inferum quinqueloculare, polyspermum,

communis. 1. PYRUS foliis ferratis, pedunculis corymbosis. Sp. pl. 686. Fl. suec. 436.

Pyrus foliis ferratis, pomis basi productis. Hort. cliff. 190.

Pyrus foliis ovato-lanceolatis ferratis glabris. Hall. hist. 1096.

Pyrus sylvestris. Ger. em. 1457. Park. 1500. B. pin. 439.

Pyrauster f. Pyrus sylvestris. B. hist. I. 57. R. syn. 452.

β Pyrus sativa. R. syn. 452.

Anglis, common Pear-tree.

Habitat in sylvis et sepibus. H. IV. V.

malus. 2. PYRUS foliis ferratis umbellis sessilibus. Sp. pl. 686.

Pyrus foliis ferratis, pomis basi concavis. Hort. cliff. 186.

Pyrus foliis ovatis, acuminatis subtus hirsutis, petiolis florigeris brevissimis. Hall. hist. 1097.

Malus sylvestris. Ger. em. 1461. Park. 1502. R. syn. 452.

- Malus sylvestria. *B. pin.* 451.
 Malus sativa. *R. syn.* 451.
Anglis, Crab-tree or Wilding; β Apple-tree.
Habitat in sylvis et sepibus. *H. V.*
Pharmac. Mali sylvestris *Fructus.*

MESPILOUS. 625.

Cal. quinquefidus. *Petala* quinque. *Bacca* infera,
pentasperma.

- *1. MESPILOUS inermis, foliis lanceolatis subtus tomen- *germani-*
tosis, floribus solitariis sessilibus. *Sp. pl.* 684. *ca.*
Mespilus foliis elliptico-lanceolatis ferratis, calycibus
longissimis, persistentibus. *Hall. hist.* 1094.
Mespilus. *Dod.* 801. *Ger. em.* 1453. *R. syn.* 453.
vulgaris. *Park.* 1422.
Mespilus germanica folio laurino non serrato, f. *Mes-*
pilus *sylvestris.* *B. pin.* 453.
Anglis, Medlar-tree.
Habitat in sepibus. *In all the hedges about Minehiville.*
Mr. Du Bois. *R. syn.* *H. V.*

SPIREA. 630.

Cal. quinquefidus. *Petala* quinque. *Caps.* polyf-
perma.

1. SPIRÆA foliis pinnatis: foliolis uniformibus serra- *filipendu-*
tis, caule herbacco, floribus cymosis. *Sp. pl.* 702. *la.*
Fl. suec. 439. *dan.* 635.
Filipendula foliis pinnatis minimis intermisstis, extre-
ma trilobata. *Hall. hist.* 1136.
Filipendula. *Ger. em.* 1058. *Park.* 434. *R. syn.* 259.
vulgaris. *B. pin.* 163.
Anglis, common Spiræa or Drop-wort.
Habitat in pratis et pascuis montosis, solo cretaceo. *Supra*
Dupper's-Hill, prope Croydon. D. Caute; *juxta*
Clapham prope Londinum. *H. VII.*
Pharmac. *Filipendulæ Radix, Folia.*
2. SPIRÆA foliis pinnatis: impari majore lobato, flo- *ulmaria.*
ribus cymosis. *Sp. pl.* 702. *Fl. dan.* 547.
Filipendula foliis pinnatis, acute ferratis, minimis in-
termisstis,

ICOSANDRIA POLYGYNIA.

termistis, extrema trilobata maxima. *Hall. hist.*

1135.

Ulmaria. *Clus. hist. II.* 198. *B. hist. III.* 488. *R. syn. 259.* *vulgaris*. *Park. 592.*

Regina prati. *Ger. em. 1643.*

Barba capri floribus compactis. *B. pin. 164.*

Anglis, meadow *Spiræa* or -sweet.

Habitat in pratis humidis et ad ripas fluviorum. 24.
VI. VII.

Pharmac. *Ulmariæ Herba.*

POLYGINIA.

ROSA. 631.

Cal. urceolatus, quinquefidus, carnosus, collo coartatus. *Petala* quinque. *Sem.* plurima, hysspida, calycis interiori lateri affixa.

* *Germinibus globosis.*

Eglante-
ria.

1. *ROSA germinibus subglobosis petiolisque aculeatis, aculeis recurvis, foliolis ovatis subtus rubiginosis.*

Rosa rubiginosa, *germinibus globosis petiolisque aculeatis, aculeis recurvis, foliis subtus rubiginosis.*

Lin. mantiss. II. 564. *Fac. austr. I.* 31. t. 50.

Rosa spinis aduncis, foliis subtus rubiginosis. *Hall. hist. 1103.*

Rosa sylvestris odora. *Ger. em. 1269.* *R. syn. 454.*
seu *Eglenteria* flore simplici. *Park. par. 418.*

Rosa sylvestris foliis odoratis. *B. pin. 483.*

Anglis, sweet Rose or Briar.

Habitat in sepibus et ericetis. 5. VI. VII.

spinofissi-
ma.

2. *ROSA germinibus globosis glabris, pedunculis hispidis, caule petiolisque aculeatissimis.* *Syst. nat. 348.*

Sp. pl. 705. Fl. dan. 398.

Rosa spinis rectis confertis, foliis novenis glabris, pomis et petiolis subspinosis. *Hall. hist. 1106.*

Rosa pumila, *spinofissima*, *foliis pimpinellæ glabris, flore albo.* *B. hist. II.* 40. *R. syn. 455.*

Rosa

Rosa campestris spinosissima, flore albo odorato. *B.*
pin. 483.

Rosa pimpinella f. *pomifera minor*. *Park.* 1018.

Rosa pimpinellæ folio. *Ger. em.* 1270.

β *Rosa ciphiana* f. *Rosa pimpinellæ foliis minor nostras*,
 flore eleganter variegato. *Scot. ill.* 46.
Anglis, burnet Rose.

Habitat in ericetis et arenosis. *h.* VI. VII.

3. ROSA germinibus globosis pedunculisque glabris, *arvensis*.
 caule petiolisque aculeatis, floribus subcymosis. *Fl.*
angl. 192. *Lin. mantiff. II.* 245. *Fl. dan.* 398.

Rosa sylvestris altera minor, flore albo nostras. *R. syn.*
 455.

Rosa arvensis candida. *B. pin.* 484.

Rosa canina humilior fructu rotundiore. *D. Plot.*

β *Rosa canina sylvestris*, unico flore et fructu. *R. syn.*
Anglis, corn Rose or white Dog-rose,
 Habitat in sepibus et ericetis. *h.* VII.

4. ROSA germinibus globosis pedunculisque hispidis, *villoſa*.
 caule aculeis sparsis, petiolis aculeatis, foliis tomen-
 tosis. *Sp. pl.* 704.

Rosa spinis rectis, foliis quinis tomentosis, pinnis ro-
 tundis, spinosis. *Hall. hist.* 1105.

Rosa sylvestris pomifera major nostras. *R. syn.* 455.

Rosa sylvestris pomifera major. *B. pin.* 484.

β *Rosa sylvestris fructu majore hispido*, *R. syn.* 454.
Anglis, apple Rose.

Habitat in nemorosis et sepibus montosis, in comitatibus E-
 boracensi, Cumberlandico et Westmorlandico;
 β circa Londinum *passim*. *h.* VI.

** *Germinibus ovatis*.

5. ROSA germinibus ovatis pedunculisque glabris, caule *canina*.
 petiolisque aculeatis. *Sp. pl.* 704. *Fl. dan.* 555.

Rosa spinis aduncis, foliis septenis, calycibus tomen-
 tosis, segmentis pinnatis et semipinnatis, tubis bre-
 viissimis. *Hall. hist.* 1101.

Rosa canina inodora, *Ger. em.* 1270.

Rosa

ICOSANDRIA POLYGYNIA.

- Rosa sylvestris inodora f. canina.* Park. 1017. R. syn.
454.
Rosa sylvestris vulgaris flore odorato incarnato. B. pin.
483.
Anglis, dog Rose or Hep-tree.
Habitat in sylvis et sepibus. H. VI.
Pharmac. Rosæ sylvestris, Flores, Spongiolæ (insectorum
niduli) f. Bedeguar, Cynosbati.

R U B U S. 632.

Cal. quinquefidus. Petala quinque. Bacca compo-
sita acinis monospermis.

* *Frutescentes.*

- idæus.* 1. *RUBUS* foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule
aculeato, petiolis canaliculatis. Sp. pl. 706.
Rubus caule spinoso, subrecto, foliis quinatis et ter-
natis, subtus tomentosis, fructibus hirsutis. Hall.
bijt. 1108.
Rubus idæus spinosus. B. pin. 470. fructu rubro.
B. bijt. II. 59. R. syn. 467.
Rubus idæus. Ger. em. 1272. Park. 557.
Anglis, Raspberry-bramble or Framboise.
Habitat in sylvis et sepibus, montibus saxosis et uidis Wal-
liæ, et septentrionalium Angliæ, &c. H. V. VI.
Pharmac. Rubi idæi Fruetus.
- cæsius.* 2. *RUBUS* foliis ternatis subnudis : lateralibus bilobis,
caule aculeato tereti. Sp. pl. 706.
Rubus caule aculeato prostrato, foliis ternatis, subtus
hirsutis. Hall. bijt. 1110.
Rubus repens fructu cæsio. B. pin. 479. Ger. em.
1271.
Rubus minor fructu cæruleo. B. bijt. II. 59. R. syn.
467.
Rubus minor, chamærubus f. Humirubus, Park. 1013.
Anglis, small Bramble, or Dewberry-bush.
Habitat in sylvis et sepibus passim. H. VI. VII.
- fruticosus.* 3. *RUBUS* foliis quinato-digitatis ternatisque, caule
petiolisque aculeatis. Sp. pl. 707. Fl. suec. 444.
Rubus

- Rubus caule spinoso serpente, foliis quinatis et ternatis, subtus subtomentosis, bacca levi. *Hall. hist.* 1109.
- Rubus. *Cam. epit.* 751. *Lob. ic.* II. 211. *vulgaris major.* *Park.* 1013. fructu nigro. *B. hist.* II. 57. *R. syn.* 467.
- Rubus vulgaris s. Rubus fructu nigro. *B. pin.* 479.
- § Rubus vulgaris major, fructu albo. *R. syn.* 467.
Anglis, common Bramble.
Habitat in sylvis et sepibus. h. V—IX.

** *Herbacei.*

4. RUBUS foliis ternatis nudis, flagellis reptantibus *saxatilis.*
herbaceis. *Sp. pl.* 708. *Fl. dan.* 138.
- Rubus caule herbaceo, foliis ternatis, glabris, acinis baccarum distinctis, paucissimis. *Hall. hist.* 1111.
- Rubus saxatilis. *Ger. em.* 1273.
- Rubus alpinus saxatilis. *Park.* 1014.
- Chamærubus saxatilis. *B. pin.* 479. *R. syn.* 261.
Anglis, stone Bramble.
Habitat inter lapides ad latera montium in comitatibus Eboracensi, Cumberlandico et Westmorlandico. 4. VI.
5. RUBUS foliis simplicibus lobatis, caule inermi uni- *chamæmo-*
floro. *Sp. pl.* 708. *Fl. succ.* 449. *dan.* 1. *morus.*
- Rubus caule bifolio unifloro, foliis simplicibus. *Fl.* lapp. 208. t. 5. f. 1.
- Chamæmorus. *Clus. hist.* I. 118. *Ger. em.* 1273. *R. syn.* 260. *anglica.* *Park.* 1014.
- Chamærubus foliis ribes anglica. *B. pin.* 480.
Anglis, mountain Bramble or Cloud-berry.
Habitat in paludibus turfosis supra montes Eboracenses, Westmorlandicos, Cumberlandicos, Lancastrenses, Arvonicos. 4. V. VI.

F R A G A R I A. 633.

Cal. decem-fidus. *Petala* quinque. *Receptaculum* se-minum ovatum, baccatum, deciduum.

1. FRAGARIA flagellis reptantibus. *Sp. pl.* 708. *vesca.*
Fragaria

ICOSANDRIA POLYGYNIA.

Fragaria foliis ternatis, flagellis reptans. *Hall. hist.* 1112.

Fragaria. *Ger. em.* 997. *R. syn.* 254. *vulgaris*. *B. pin.* 758. *Park.* 758. *Fl. lapp.* 209.

♂ *Fragaria* fructu hispido. *Ger. em.* 998.

γ *Fragaria* fructu parvi pruni magnitudine. *B. pin.* 327.

δ *Fragaria* fructu albo. *B. pin.* 326.

Anglis, common Strawberry.

Habitat in sylvis et ad sepes frequens. 4. V. VI.

sterilis. 2. **FRAGARIA** caule decumbente, ramis floriferis laxis. *Syst. nat.* 350.

Fragaria caule decumbente repente. *Sp. pl.* 709.

Fragaria caule prostrato, foliis ternatis retusis sericeis. *Hall. hist.* 1113.

Fragaria sterilis. *B. pin.* 327. *R. syn.* 254.

Fragaria minime vesca. *Park.* 758. f. steriles. *Lob. ic.* 696. *Ger. em.* 998.

Anglis, barren Strawberry.

Habitat in pascuis et ericetis sterilioribus. 4. IV. V.

POTENTILLA. 634.

Cal. decemfidus. *Petala* quinque. *Sem.* subrotunda, nuda, receptaculo parvo exsucce affixa.

fruticosa. 1. **POTENTILLA** foliis pinnatis, caule fruticoso. *Sp. pl.* 709. *Fl. suec.* 451. *Kalm. it.* II. 263.

Pentaphylloides rectum fruticosum. *Hist. Ox.* II. 193. f. 2. t. 23. f. 5. *Hortul. angl.* 54. t. 54.

Pentaphylloides fruticosa. *Cat. pl. angl.* 228. ii. *R. syn.* 256.

Anglis, shrubby Cinquefoil.

Habitat ad ripam meridionalem Tesæ fluvii infra vicum Thorp dictum variis in locis, nec non infra cœnobium Athelstani, vulgo Eggleston-abby, in agro Eboracensi. Mr. Lawson observed thousands of these plants by Mickle-force, in Teasdale. *R. syn.* 5. VI.

anserina. 2. **POTENTILLA** foliis pinnatis serratis, caule repente. *Sp. pl.* 710. *pedunculis unifloris.* *Syst. nat.* 350. *Fl. dan.* 544.

Fragaria

Fragaria caule repente, foliis pinnatis serratis, subtus tomentosis, petiolis unifloris. *Hall. hist.* 1126.

Potentilla. *B. pin.* 321. *Park.* 593. *Cam. epit.* 758.

Pentaphylloides argentina dicta. *R. syn.* 256.

Argentina. *Dod. pent.* 600. *Ger. em.* 993.

Anglis, silver Cinquefoil, Weed, or wild Tansey.

*Habitat ad semitas, vias inque pascuis depresso*s* ubi aquæ præfertim hyemales stagnant frequens.* 4. VI. VII.

3. POTENTILLA foliis pinnatis alternis: foliolis *rupestris.* quinis ovatis crenatis, caule erecto. *Sp. pl.* 171.

Jac. aust. II. 9. t. 114.

Fragaria foliis pinnatis, pinnis septenis, subrotundis serratis. *Hall. hist.* 1127.

Pentaphylloides erectum. *B. hist.* II. 398. *Hist. Ox.* II. 193. f. 2. t. 20. f. 1. *R. syn.* 255.

Pentaphyllum fragiferum. *Ger. em.* 991. *Park.* 397. *Clus. hist.* II. 107.

Quinquefolium fragiferum. *B. pin.* 326.

Anglis, rock Cinquefoil.

Habitat ad latera montis cujusdam Craig Wreidhin dicti in comitatu montis Gomerici Walliae. D. Lhwyd. *R. syn.* 4. VII.

* *Foliis digitatis.*

4. POTENTILLA foliis quinatis cuneiformibus incis- *argentea.* sis subtus tomentosis, caule erecto. *Sp. pl.* 712.

Fragaria caule erecto, foliis quinatis, apice serratis subtus tomentosis. *Hall. hist.* 1124.

Pentaphyllum erectum, foliis profunde sectis subtus argenteis, flore luteo. *B. hist.* II. 598. *R. syn.* 255.

Pentaphyllum rectum minus. *Park.* 400.

Quinquefolium tormentillæ facie. *Ger. em.* 988.

Quinquefolium folio argenteo. *B. pin.* 325.

Anglis, tormentil Cinquefoil.

Habitat in pratis et pascuis solo glareoso passim. 4. VI.

5. POTENTILLA foliis radicalibus quinatis cuneiformibus ferratis, caulinis suboppositis, ramis filiformibus decumbentibus. *Sp. pl.* 713.

Fragaria

ICOSANDRIA POLYGYNIA.

- Fragaria caule suberecto, foliis quinis, septenis, serratis, obtusis.* *Hall. hist.* II. 1120.
Pentaphyllum parvum hirsutum. *B. hist.* II. 598.
R. syn. 255.
Pentaphyllum incanum minus repens. *Ger. em.* 989.
Quinquefolium minus repens lanuginosum. *Park.* 399. *luteum.* *B. pin.* 325.
Quinquefolium IV. flavo flore 2 species. *Clus. hist.* II. 106.
Anglis, hairy Cinquefoil.
Habitat in pascuis, circa Kippax in agro Eboracensi. 24. VI. VII.

- verna.* 6. *POTENTILLA* foliis radicalibus quinatis acute serratis retusis, caulinis ternatis, caule declinato. *Sp. pl.* 712. *Fl. suec.* 455.
Fragaria caule decumbente, foliis quinatis serratis subhirsutis. *Hall. hist.* III. 1119.
Pentaphyllum s. Quinquefolium minus. *Tabern. ic.* 123.
Quinquefolium minus repens luteum. *B. pin.* 325.
Anglis, spring Cinquefoil.
Habitat in pratis et pascuis sterilioribus, prope Preston in comitatu Lancastrensi, D. Tofield; in the King's Park, Edinburgh, Dr. Hope; prope Giggleswick in comitatu Eboracensi. 24. V. VI.
- alba.* 7. *POTENTILLA* foliis quinatis apice conniventis serratis, caulibus filiformibus procumbentibus, receptaculis hirsutis. *Sp. pl.* 713. *Jac. aust.* II. 10. t. 115.
Fragaria foliis ovatis apice serratis, oris sericeis, pappo placentæ longissimo. *Hall. hist.* 1123.
Quinquefolium album majus. *B. pin.* 325.
Quinquefolium sylvaticum majus flore albo. *Ger. em.* 987.
Anglis, white Cinquefoil.
Habitat in Wallia, D. Haviland. 24. VII. VIII.
- reptans.* 8. *POTENTILLA* foliis digitatis, caule repente, pendunculis unifloris. *Sp. pl.* 714. *Fl. dan.* 589.
Fragaria

Fragaria foliis quinatis, serratis, petiolis unifloris, caule repente. *Hall. hist.* 1118.

Pentaphyllum vulgatissimum. *Park.* 398. *R. syn.* 255.
Quinquefolium majus. *Ger. em.* 987. *repens*. *B. pin.*

325.

3 *Tormentilla reptans*, caule repente, foliis petiolatis.
Fl. angl. 198. *Sp. pl.* 716.

Tormentilla reptans. *Pet. h. br. t. 41. f. 10.* *R. syn.* 357.

Pentaphyllum reptans alatum foliis profundius serratis. *Plot. hist. Ox. c. 6. p. 7. t. 9. f. 5.*

Pentaphyllum minus viride, flore aureo tetrapetalō, radiculas in terram e geniculis demittens. *Hist. Ox. II.* 190.

γ *Pentaphyllum aureum* minus, sylvaticum, nostras, foliis tripartito divisis ex caulicorum geniculis radiceſcens. *Pluk. alm.* 285.

Anglis, common Cinquefoil, or Five-leaved-grass.

Habitat in pratis et pascuis et ad vias frequens. β in sylvis et pascuis arenosis et sterilioribus paſſim. 4. VI—VIII.

Pharmac. *Pentaphylli Radix.*

Obs. in β variat floribus tetrapetalis et pentapetalis in eadem planta.

TORMENTILLA. 635.

Cal. octofidus. *Petala* quatuor. *Sem.* subrotunda, nuda receptaculo parvo exfucco affixa.

1. TORMENTILLA caule erectiusculo, foliis ſeffili- *erecta* bus. *Sp. pl.* 716.

Tormentilla. *Gam. epit.* 685. *Ger. em.* 992. *R. syn.* 257. *vulgaris*. *Park.* 394.

Tormentilla sylvestris. *B. pin.* 326.

Fragaria tetrapetala, foliis caulinis ſeffilibus, quinatis. *Hall. hist.* 1117.

Anglis, common Torméntil, or Septfoil.

Habitat in pascuis, et nemorosis sterilioribus. 4. VI—VIII.

Pharmac. *Tormentillæ Radix, Folia.*

G E U M. 636.

Cal. decemfidus. *Petala* quinque. *Sem.* aristata geniculata.

urbanum. I. GEUM floribus erectis, fructu globoso villoso : aristis uncinatis nudis, foliis lyratis. *Sp. pl.* 716.

Geum foliis pinnatis, pinna ultima trilobata, floribus patulis, tubis aduncis. *Hall. hist.* 1130.

Caryophyllata. *Ger. em.* 994. *R. syn.* 253. vulgaris. *B. pin.* 321. *R. syn.* 136.

B. Caryophyllata vulgaris majore flore. *B. pin.* 321.

Anglis, common Aven, or Herb-bennet.

Habitat in sylvis et ad sepes frequens. 4. VI—VIII.

Pharmac. Caryophyllatæ Radix.

rivale. 2. GEUM floribus nutantibus, fructu oblongo : aristis plumosis tortis. *Sp. pl.* 717.

Geum foliis pinnatis, pinnis acutis, extrema maxima trilobata : floribus conniventibus. *Hall. hist.* 1129.

Caryophyllata montana purpurea. *Ger. em.* 995. *R. syn.* 253.

Caryophyllata aquatica nutante flore. *B. pin.* 321.

Caryophyllata montana f. palustris purpurea. *Park.* 136.

Anglis, water Avens.

Habitat in pascuis montosis subhumidis, in septentrionalibus Angliæ circa Settle, Ingleton, &c. Also in Wales, about Snowdon, &c. *R. syn.* 4. VI. VII.

D R Y A S. 637.

Cal. octofidus. *Cor.* octo. *Sem.* caudata, pilosa.

Octopeta- la. I. DRYAS octopetala, foliis simplicibus. *Sp. pl.* 718. *Fl. succ.* 262. *dan.* 31.

Dryas floribus octopetalis, foliis ovatis subtus albiflavis. *Hall. hist.* 1133.

Caryophyllata alpina chamædryos folio. *Hist. Ox. II.* 432. *R. syn.* 253.

Chamædrys alpina, cisti flore. *B. pin.* 248.

Chamædrys spuria montana, cisti flore. *Park.* 106.

Teucrium

Teucrium alpinum cisti flore. Ger. em. 659.

Anglis, mountain Dryas.

Habitat in montibus; found by Mr. Heaton in Ireland, on the mountains between Gort and Galloway. Hujus plantæ speciminibus meditavit D. Lhwyd, in montibus Hibernicis juxta Sligo collectis, quæ et in omnibus altissimis Scotiæ occidentalis montibus abundat, ut mihi retulit idem. R. syn. In monte Baun-shuardal prope Strath, in Insula Skye. Pen. Tour. 24. VI.

C O M A R U M. 638.

Cal. decemfidus. Petala quinque, calyce minora Recept. seminum ovatum, spongiosum, persistens.

1. COMARUM. Fl. lapp. 214. dan. 636. Sp. pl. 718. palustre: Fragaria foliis pinnatis, petalis lingulatis, minimis. Hall. hist. 1128.

Pentaphylloides palustre rubrum. R. syn. 256.

Pentaphylloides rubrum palustre. Ger. em. 987.

Quinquefolium palustre rubrum. B. pin. 326.

2. Pentaphylloides palustre rubrum crassis et villosis foliis Sueicum et Hibernicum. Pluk. alm. 28. t. 212. f. 2.

Anglis, purple Comarum, or Marsh-cinquefoil.

Habitat in palustribus putridis et cœniosis. 24. VI.

Classis XIII.

POLYANDRIA

MONOGYNIA.

* *Flores tetrapetali.*

ACTÆA. 664.

Cal. tetraphyllus. *Cor.* tetrapetala. *Bacca.* unilocularis. *Sem.* semi-orbiculata.

spicata. 1. ACTÆA racemo ovato, fructibus baccatis. *Sp. pl.* 722. *Fl. suec.* 464. *dan.* 498.

Actæa foliis circumferratis, duplicato-pinnatis, pinnula extrema trilobata. *Hall. hist.* 1076.

Christophoriana. *Clus. hist.* II. 86. *Ger. em.* 979. *Till. ic.* 148. *R. syn.* 262. *Weinm. t.* 380. *vulgaris.* *Park.* 379.

Aconitum racemosum. *B. pin.* 182.

Anglis, Herb-christopher, or Bane-berries.

Habitat in sylvis et nemorosis. Prope Malham-cove. *R. syn. in sylvula prope Clapham in agro Eboracensi.* 24. V. VI.

CHELIDONIUM. 647.

Cal. diphyllus. *Cor.* tetrapetala. *Siliqua* unilocularis, linearis.

majus. 1. CHELIDONIUM pedunculis umbellatis. *Sp. pl.* 723. *Fl. dan.* 542.

Chelidonium lobis foliorum subrotundis. *Hall. hist.* 1069.

Chelidonium

- Chelidonium majus.** *Fuchs. hist.* 865. *Ger. em.* 1069.
vulgare. *B. pin.* 144. *Park.* 616.
Papaver corniculatum luteum, *Chelidonia dictum.* *R.*
syn. 309.
3 Chelidonium majus foliis quernis. *B. pin.* 144.
Anglis, common Celandine.
Habitat in ruderatis. *¶. V. VI.*
Pharmac. *Chelidonii majoris Radix, Herba.*
- 2. CHELIDONIUM** pedunculis unifloris, foliis am- *Glauci-*
plexicaulibus sinuatis, caule glabro. *Sp. pl.* 724. *um.*
Glaucium foliis radicalibus semipinnatis, caulinis am-
plexicaulibus. *Hall. hist.* 1060.
Papaver corniculatum. *Cam. epit.* 805. *luteum.* *B.*
pin. 171. *hist. III.* 398. *Park.* 261. *R. syn.* 309.
Papaver cornutum flore luteo. *Ger. em.* 367.
Anglis, sea Celendine, or yellow Horned-poppy.
Habitat in littoribus maritimis arenosis. *◎. VIII.*
- 3. CHELIDONIUM** pedunculis unifloris, foliis sessili- *cornicula-*
bus pinnatifidis, caule hispido. *Sp. pl.* 724. *tum.*
Papaver corniculatum phœniceum hirsutum. *B. pin.*
171.
Papaver cornutum flore rubro. *Ger. em.* 367.
Anglis, red Celendine, or Horned-poppy.
Habitat in arvis arenosis. *D. Stillingfleet ex Nor-*
folchia cum sequente misit. *◎. VII. VIII.*
- 4. CHELIDONIUM** pedunculis unifloris, foliis pinna- *hybri-*
tifidis linearibus, caule lævi, siliquis trivalvibus. *dum.*
Papaver corniculatum violaceum. *B. pin.* 172. *hist.*
III. 393. R. syn. 309.
Papaver cornutum flore violaceo. *Ger. em.* 367.
Papaver corniculatum flore violaceo. *Park.* 262.
Anglis, violet Celendine, or Horned-poppy.
Habitat in arvis arenosis; in agro Cantabrigiensi inter
segetes inter Swafham et Burwel vicos. *R. syn.* *◎*
VII. VIII.

P A P A V E R. 648.

Cal. diphyllus. *Cor.* tetrapetala. *Caps.* unilocularis,
sub stigmate persistente poris dehiscens.

* *Capsulis hispidis.*

hybri-
dum. 1. PAPAVER capsulis subglobosis torofis hispidis, caule
folioso multifloro. *Sp. pl.* 725.

Papaver foliis hispidis, pinnatis, pinnis lobatis, capsu-
lis ellipticis, hispidis. *Hall. hist.* 1061.

Papaver laciniato folio, capitulo hispido rotundiore.
R. syn. 308.

Argemone capitulo torulo. *Ger. em.* 372.

Argemone capitulo breviore. *B. pin.* 172.

Argemone capitulo rotundiore. *Park.* 369.

Anglis, bastard Poppy.

Habitat in arvis passim. ☽. VI. VII.

Agremo-
ne. 2. PAPAVER capsulis clavatis hispidis, caule folioso
multifloro. *Sp. pl.* 725. *Fl. suec.* 466.

Papaver laciniato folio capitulo hispido longiore. *R.*
syn. 308.

Argemone capitulo longiore. *Lob. ic.* 276. *Ger. em.*
273. *B. pin.* 172. *Park.* 370.

Anglis, rough Poppy.

Habitat in arvis passim. ☽. VI. VII.

** *Capsulis hispidis.*

Rhoeas. 3. PAPAVER capsulis glabris globosis, caule piloso
multifloro, foliis pinnatifidis incisis. *Sp. pl.* 726.

Papaver foliis semipinnatis, hispidis, fructu ovato gla-
bro. *Hall. hist.* 1064.

Papaver laciniato folio, capitulo breviore glabro, an-
num Rhoeas dictum. *R. syn.* 308.

Papaver rhoeas. *Ger. em.* 371.

Papaver erraticum rhoeas sive sylvestre. *Park.* 367.

Papaver erraticum majus. *B. pin.* 171.

Anglis, corn, or red Poppy.

Habitat inter segetes. ☽. VI. VII.

Pharmac. Papaveris erratici Flores.

dubium. 4. PAPAVER capsulis oblongis glabris, caule multi-

floro setis adpressis, foliis pinnatifidis incisis. *Sp. pl. 726.*

Papaver foliis hispidis, pinnatis, pinnis lobatis, fructu ovato levi. *Hall. hist. 1063.*

Papaver laciniato folio, capitulo longiore glabro. *R. syn. 309.*

Argemone capitulis longis glabris. *Hist. Ox. II. 279. f. 3. t. 14. f. 11.*

An lis, smooth Poppy.

Habitat in arvis *passim*. ☽. VI. VII.

5. PAPAVER capsulis glabris oblongis, caule multifloro *cambrico* lævi, foliis pinnatis incisis. *Sp. pl. 727. cum.*

Papaver cambricum perenne, flore sulphureo. *Dill. elth 300. t. 223. f. 290.*

Papaver luteum perenne, laciniato folio, *cambrobritannicum*. *R. syn. 309.*

Argemone lutea cambrobritannica. *Park. 369.*

Anglis, yellow or welsch Poppy.

Habitat in montosis cambrobritannicis *frequens*; circa Kendal in Westmorlandia *copiose*. 4. VI—VIII.

6. PAPAVER calycibus capsulisque glabris, foliis amplexicaulibus incisis. *Sp. pl. 726. Hall. hist. 1065. rum.*

Papaver sylvestre. *Ger. em. 370. R. syn. 308.*

Papaver hortense semine albo. *B. pin. 170.*

Anglis, white Poppy.

Habitat in arvis et incultis *passim*. 4. VII.

Pharmac. Papaveris albi Capita, Semina.

** Flores pentapetali.

T I L I A. 660.

Cal. quinquepartitus, *Cor.* pentapetala. *Bacca* sicca globosa, quinquelocularis, quinquevalvis, basi dehiscens.

1. TILIA floribus nectario destitutis. *Sp. pl. 733. europaea.*

Tilia foliis cordato-lanceolatis, spongiolis ad nervorum folii angulos sessilibus. *Hall. hist. 1030.*

Tilia vulgaris platyphyllos. *B. hist. I. 133. R. syn.*

- Tilia fœmina. *Ger. em.* 1483. major. *Park.* 1407.
 Tilia fœmina folio majore. *B. pin.* 426.
 ♂ Tilia fœmina folio minore. *B. pin.* 426.
 ♀ Tilia fœmina foliis molliter hirsutis, viminibus rubris,
 fructu tetragono. *R. syn.* 473.
 ♂ Tilia ulmifolia, semine hexagono. *Merr. pin.*
Anglis, the Lime or Linden-tree. *Hunt. Ev. sylv.* 201.
Habitat in sylvis, sepibus et areis. h. VII.

CISTUS. 673.

Cal. pentaphyllus: foliolis duobus minoribus. *Cor.*
 pentapetala. *Caps.* triquetra, trivalvis.

* *Extipulati herbacei.*

- guttatus.* 1. CISTUS herbaceus exstipulatus, foliis oppositis lan-
 ceolatis, trinerviis, racemis ebracteatis. *Sp. pl.* 741.
 Cistus flore pallido, punicante macula insignito. *B.*
 pin. 465. *R. syn.* 343.
 Cistus annuus flore maculato. *Ger. em.* 1281.
 Cistus annuus flore guttato. *Park.* 661.
 Helianthemum flore maculoso. *Col. ecphr.* II. 78. t.
 77.
Anglis, annual Cistus.
Habitat in pratis arenosis, in monte Llech ddū prope Ho-
lyhead in insula Mona. D. Brewer. O. VI.

** *Extipulati suffruticosi.*

- hirsutus.* 2. CISTUS suffruticosus procumbens exstipitalus, foliis
 oppositis oblongis subrevolutis pilosis, subtus inca-
 nis, floribus racemosis. *Fl. angl.* 206. *Lin. mantif.*
 II. 245.
 Cistus caulibus duris, procumbentibus, foliis ellipticis
 hirsutis, inferne tomentosis, petiolis confertis uni-
 floris, calycibus tomentosis. *Hall. hist.* 1035.
 Helianthemum alpinum folio Pilosellæ minoris Fuch-
 sii. *B. hist.* II. 18. *R. syn.* 342. *Segu. ver.* III.
 196.
Anglis, hairy Cistus.
Habitat in pratis et rupibus montosis; uno circiter mili-
ari a Kendalia, loco saxoso Betham-bank dicto occiden-
 tem

tem versus copiose, D. Richardson. At Buckbarrow-bank-scar, between Brigsteer and Conzick; also on the rocks about Cartmel-Wells in Lancashire. Mr. Fitz-Roberts. R. syn. 24. V.

*** *Stipulati, herbacei.*

3. CISTUS herbaceus patulus villosus stipulatus, flori-*salicifoli-*bus racemosis erectis: pedicellis horizontalibus. um.

Sp. pl. 742.

Cistus folio salicis. B. pin. 465.

Cistus annuus. Ger. em. 1280. folio salicis. Park. 661.

Helianthemum annum humile, foliis ovatis, flore fugaci. Seg. ver. III. 397. t. 6. f. 3.

Anglis, willow-leaved Cistus.

Habitat in pratis et pascuis arenosis. juxta Brean-downs in agro Somersetensi. O. VI. VII.

Obs. Petala lutea calyce minora frugacissima; variat floribus apetalis.

*** *Stipulati suffruticosi.*

4. CISTUS suffruticosus procumbens, stipulis lanceola-*Helian-*tis, foliis oblongis revolutis subpilosis. Sp. pl. 744. themum. Fl. dan. 101.

Cistus foliis conjugatis ellipticis, hirsutis, integerrimis, petiolis unifloris subhirsutis. Hall. hist. 1033.

Helianthemum vulgare. Park. 656. R. syn. 341.

Helianthemum anglicum luteum. Ger. em. 1282.

Chamæcistus vulgaris flore luteo. B. pin. 465.

β Helianthemum foliis majoribus, flore albo. B. hist. II. 16.

γ Helianthemum ampliore folio, flore roseo. D. Sher-
rard.

δ Cistus suffruticosus procumbens stipulatus, foliis ova-*surreja-*to-oblongis subpilosis, petalis lanceolatis. Sp. pl. nus. 743.

Helianthemum vulgare petalis florum perangustis.

R. syn. 341. Dill. elth. 177. t. 145. f. 174.

Anglis, dwarf Cistus, or little Sun-flower.

Habitat in pratis et pascuis montosis, præsertim solo calca-
reo. 24. VI—VIII.

- polifolius.* 6. **CISTUS** suffruticosus procumbens stipulatus, foliis oblongo-ovatis revolutis incanis, calycibus lœvibus, petalis ferratis. *Fl. angl.* 205. *Sp. pl.* 745.
Cistus foliis crassis tomentosis ellipticis, linea exaratis. *Hall. hist.* 1036.
Cistus humilis alpinus durior, polii nostratis folio candicante. *Pluk. ph.* 23. *f. 6.*
Chamæcistus montanus polii folio. *R. syn.* 342.
Helianthemum montanum. polii folio incano, flore candido. *Dill. elth.* 175. *t. 145. f. 172.*
Anglis, mountain Cistus.
Habitat in pratis montosis. On Brean-downs, in Somersetshire, near the Severn-sea. D. Plukenet. *R. syn.* 24. VI.

*** *Flores polypetali.*

NYMPHÆA. 653.

Cal. tetra f. pentaphyllus. *Cor.* polypetala. *Bacca* multilocularis, truncata.

- lutea.* 1. **NYMPHÆA** foliis cordatis integerrimis, calyce pentaphyllo majore. *Sp. pl.* 729. *Fl. dan.* 603.
Nymphæa calyce pentaphyllo, petalis majori, fructu conico. *Hall. hist.* 1066.
Nymphæa lutea. *Ger. em.* 819. *R. syn.* 368.
Nymphæa major lutea. *B. pin.* 193. *Park.* 1252.
Anglis, yellow Water-lilly.
Habitat in fluviis, stagnis, fossis. 24. VII. VIII.
- alba.* 2. **NYMPHÆA** foliis cordatis integerrimis, calyce quadrifido. *Sp. pl.* 729. *Fl. dan.* 602.
Nymphæa calyce quadrifido, petalis minori, fructu sphærico. *Hall. hist.* 1067.
Nymphæa alba. *Cam. ep.* 634. *Ger. em.* 819. *R. syn.* 368. major. *B. pin.* 193. *vulgaris.* *Park.* 1251.
Anglis, white Water-lilly.
Habitat in fluviis et stagnis. 24. VII. VIII.

TRIGYNIA.

DELPHINIUM. 681.

Cal. o. Petala quinque. Nectarium bifidum, postice cornutum.

1. DELPHINIUM nectariis monophyllis, caule sub-*Consolida*.
diviso. *Sp. pl.* 748.

Delphinium unifiliuum, caule brachiato diffuso, flo-
ribus sparsis. *Hall. hist.* 1203.

Delphinium segetum, flore cæruleo. *Tourn.* 426.
R. syn. 273.

Consolida regalis arvensis, flore cæruleo. *B. pin.* 142.

Consolida regalis sylvestris. *Ger. em.* 1083.

Anglis, wild Larkspur.

Habitat in arvis. *Amongst the corn in Swakam-field, in Cambridgeshire*, Mr. J. Sherrard. *R. syn.* O. VI.

AQUILEGIA. 684.

Cal. o. Petala quinque, corniculata, inter Petala.
Caps. quinque distinctæ.

1. AQUILEGIA nectariis incurvis. *Sp. pl.* 752. *vulgaris.*

Aquilegia foliis trilobatis, lobis petiolatis tripartitis subrotundis, obtuse dentatis. *Hall. hist.* 1195.

Aquilegia. *Cæsalp.* 589. *Fuchs. hist.* 102 flore simplici.
B. hist. III. 484. *R. syn.* 273.

Aquilegia sylvestris. *B. pin.* 144.

Aquilegia simplex. *Park.* 1367.

Aquilegia flore cæruleo. *Ger. em.* 1093.

Anglis, common Columbine.

Habitat in sylvis et dumetis. 4. VI.

Pharmac. *Aquilegiæ Herba, Semina.*

2. AQUILEGIA nectariis rectis, petalo lanceolato bre-*alpina*.
vioribus. *Sp. pl.* 752.

Aquilegia foliis trilobatis, lobis tripartitis linearibus,
caule paucifloro. *Hall. hist.* 1196.

Aquilegia montana, magno flore. *B. pin.* 144. *pr.*
75. *hist. III.* 484. *R. hist.* 707.

Anglis,

POLYANDRIA POLYGYNIA.

Anglis, mountain Columbine.

Habitat in sylvis montosis in comitatu Westmorlandico.
24. VI.

Obs. nimis affinis præcedenti, an distincta.

H E X A G Y N I A.

S T R A T I O T E S. 687.

Spatha diphylla. *Perianthium* trifidum. *Petala* tria.
Bacca sexlocularis, infera.

- Aloides.* 1. STRATIOTES foliis ensiformi-triangularis, ciliato-aculeatis. *Sp. pl.* 754. *Fl. dan.* 337.
Stratiotes foliis aloes, semine longo. *Gundesh.* ap. *Johren.* *R. syn.* 290.
Statiotes five militaris aizoides. *Park.* 1249.
Militaris aizoides. *Ger. em.* 825.
Aloe palustris. *B. pin.* 286.
Anglis, common Water-aloe, or fresh-water Soldier.
Habitat in fluentibus pigroribus et palustribus fossis, in
Insula Eliensi copiose. *R. syn.* 24. VI. VII.

P O L Y G Y N I A.

A N E M O N E. 694.

Cal. o. *Petala* sex-novem. *Sem.* plura.

- nemorosa.* 1. ANEMONE seminibus acutis, foliolis incisis, caule unifloro. *Sp. pl.* 762. *Fl. dan.* 514.
Anemone seminibus nudis, caule unifloro, foliis radicalibus nullis, caulinis quinquepartitis, lobis tripartitis, incisis. *Hall. hist.* 1154.
Anemone nemorosa, flore majore. *B. pin.* 176.
Anemone nemorum album. *Ger. em.* 383. *R. syn.* 259.
Ranunculus nemorosus albus simplex. *Park.* 325.
Anglis, wood Anemone.
Habitat in sylvis et ad sepes. 24. IV.

2. ANEMONE

2. ANEMONE seminibus acutis, foliolis incisis, petalis *apennina*. lanceolatis numerosis. *Sp. pl.* 762.
Anemone geranii robertiani folio, cærulea. *B. pin.*
174.
Ranunculus nemorosus flore purpureo-cæruleo. *Park.*
325. R. syn. 259.
Ranunculus nemorosus, flore cæruleo, foliis majoribus apennini montis. *Mentz. pug. t. 8.*
Anglis, mountain Anemone.
Habitat in sylvis et nemorosis. *In Wimbleton woods,*
Mr. Rand; near Harrow-on-the-hill. Mr. Dubois;
in a wood near Luton-hoe, in Bedfordshire, Mr. T.
Knowlton. *R. syn. 24. IV.*
3. ANEMONE seminibus acutis, foliolis incisis, petalis *ranuncu-*
subrotundis, caule sub-bifloro. *Sp. pl.* 762. *Fl. loides.*
dan. 140.
Anemone biflora, seminibus nudis, foliis radicalibus
nullis, caulinis quinquepartitis, lobis tripartitis, in-
cisis. *Hall. hist. 1153.*
Ranunculus nemorosus luteus. *B. pin. 178.*
Anemone nemorosum luteum. *Ger. em. 383.*
Anglis, yellow Anemone.
Habitat in nemorosis et ad sepes. *Prope Kings-Langley*
in comitatu Hertfordiensi; juxta Wrotham in Can-
tio. *24. V.*
4. ANEMONE pedunculo involucrato, petalis rectis, *Pulsatil-*
foliis bipinnatis. *Sp. pl.* 758. *Fl. suec.* 481. *dan. la.*
152.
Anemone tubis caudatis, involucris unifoliis multifidi,
foliis linearibus, hirsutis, duplicato-pinnatis,
pinnis tripartitis et quadripartitis. *Hall hist. 1146.*
Pulsatilla folio crassiore et majore flore. *B. pin. 177.*
R. syn. 260.
Pulsatilla vulgaris. *Ger. em. 385. Park. 341.*
Anglis, Pasque-flower Anemone.
Habitat in pratis montosis; on Gogmagog-hills; on
Berhack-heath, near Stamford; in pasuis montosis
et siccis juxta Leadstone-hall, supra lacum loco the
Close dicto abunde prope Pontem fractum. *D. Rich-*
ardson.

POLYANDRIA POLYGYNIA.

ardson. *R. syn.* in Cornbury park, near Charlbury, Oxfordshire. Blacks. spec. bot. 4. IV.

CLEMATIS. 696.

Cal. o. Petala quatuor. Sem. caudata.

Vitalba. 1. CLEMATIS foliis pinnatis: foliolis cordatis, scandentibus. *Sp. pl.* 766.

Clematis sylvestris latifolia. *B. pin.* 300. f. Viorna. Park. 380.

Clematis latifolia seu Atragene quibusdam. *B. hist.* II. 125. *R. syn.* 258.

Viorna. *Ger. em.* 886.

Anglis, wild Climber, or Travellers-joy.

Habitat in *sepibus et nemorosis*, solo calcareo. *H. VII.* VIII.

THALICTRUM. 697.

Cal. o. Petala quatuor f. quinque. Sem. ecaudata.

alpinum. 1. THALICTRUM caule simplicissimo subnudo, racemo simplici terminali. *Sp. pl.* 767. *Fl. dan.* II.

Thalictrum montanum minimum præcox, foliis splendentibus. *Hist. Ox.* III. 325. f. 9. t. 20. f. 14.

Thalictrum minimum montanum atro-rubens, foliis splendentibus. *R. syn.* 204. *Boerh. ind. alt.* 44. ic.

Anglis, mountain Meadow-rue.

Habitat in *udis scopulis et ad rivulos in alpibus in Arvonia planta est vulgatissima*. D. Lhwyd. *R. syn.* in boreali parte Scotiæ frequens. 4. VI.

minus. 2. THALICTRUM foliis sexpartitis, floribus cernuis. *Sp. pl.* 769. *Fl. dan.* 244.

Thalictrum foliis patulis, imis obtuse trilobis, supremis acutis, paniculis diffusis, floribus nutantibus.

Hall. hist. 1139.

Thalictrum minus. *Ger. em.* 1251. *Park.* 264. *B. pin.* 337. *R. syn.* 203.

β Thalictrum montanum minus, foliis latioribus. *R. syn.* 204.

Anglis, lesser Meadow-rue.

Habitat

Habitat in pratis montosis humidiusculis. On the chalky grounds about Newmarket, Linton, and elsewhere in Cambridgeshire. R. syn. *in rupibus* Chedder-cliff *dicitis in agro* Somersetensi; *in septentrionali parte* Angliae et in Arvonia frequens. 4. VII. VIII.

3. THALICTRUM caule folioso sulcato, panicula *flavum*.
multiplici erecto. Sp. pl. 770.

Thalictrum foliis erectis, lobulis acute trilobis, spica adscendente. Hall. hist. 1138.

Thalictrum s. *Thalictrum majus*. Ger. em. 1251. R.
syn. 203.

Thalictrum majus vulgare. Park. 263.

Thalictrum majus siliqua angulosa aut striata. B. pin.
336.

Anglis, common Meadow-rue.

Habitat in pratis et pascuis humidis et ad ripas fluviorum. 4. VI.

A D O N I S. 698.

Cal. pentaphyllus. *Petala quinis plura absque nectario*. Sem. nuda.

1. ADONIS floribus octopetalis, fructibus subcylindricis. Sp. pl. 771. Hort. upf. 156. autumnalis.

Adonis radice annua, flore octopetalo. Hall. hist. 1158.

Adonis hortensis, flore minore atro-rubente. B. pin.
178.

Flos Adonis. Park. par. 293. R. syn. 251.

Flos Adonis flore rubro. Ger. em. 387.

Anglis, corn Flos-adonis, Pheasant's Eye, red Mai-thes or Morocco.

Habitat in arvis. In Cantio passim; prope Acton. D. Watson. ○. VI. VII.

R A N U N C U L U S. 699.

Cal. pentaphyllus. *Petala quinque intra unguis* polo mellifero. Sem. nuda.

* *Foliis simplicibus*.

1. RANUNCULUS foliis ovato-lanceolatis petiolatis, *flammula*. caule declinato. Sp. pl. 772. Fl. dan. 575.

Ranun-

POLYANDRIA POLYGYNIA.

Ranunculus caule declinato, foliis elliptico-lanceolatis subserratis. *Hall. hist.* 1182.

Ranunculus flammeus minor. *Ger. em.* 951. *R. syn.* 250.

Ranunculus palustris flammeus minor sive angustifolius. *Park.* 1214.

Ranunculus longifolius palustris minor. *B. pin.* 180.

\S Ranunculus flammeus serratus. *Ger. em.* 961. *Park.* 1214.

γ Ranunculus flammeus, latiori plantaginis folio, marginibus pilosis. *Pluk. alm.* 312.

Anglis, procumbent Crowfoot or Spearwort.

Habitat in paludosis ubique. 24. VI.—IX.

lingua. 2. RANUNCULUS foliis lanceolatis, caule erecto.

Sp. pl. 773. *Fl. suec.* 493.

Ranunculus erectus, ramosus, foliis ensiformibus subserratis. *Hall. hist.* 1181.

Ranunculus flammeus major. *Ger. em.* 961. *R. syn.* 250.

Ranunculus palustris flammeus major. *Park.* 1215.

Ranunculus longifolius palustris major. *B. pin.* 180.

Anglis, upright Crowfoot or Spearwort.

Habitat in pascuis udis et ad ripas lacuum. In the bogs

on Iver-heath and near Uxbridge. *Blacks. Spec.*

bot. Inter Rotherhithe et Deptford. 24. VI. VII.

** *Foliis dissectis et divisis.*

repens. 3. RANUNCULUS calycibus patulis, pedunculis suctatis, sarmentis repentibus, foliis compositis. *Sp. pl.* 779.

Ranunculus caule repente radicato, foliis semitrilobatis, lobis petiolatis. *Hall. hist.* 1173.

Ranunculus pratensis. *Ger. em.* 951. *repens.* *Park.* 329. *R. syn.* 247. *hirsutus.* *B. pin.* 179.

\S Ranunculus repens major. *Pet. b. br. t.* 38. *f. 8.* *Anglis*, creeping Crowfoot.

Habitat in pratis, pascuis, et ruderatis. 24. VI.—VIII.

4. RANUNCULUS calycibus retroflexis, pedunculis *bulbosus*.
fulcatis, caule erecto, foliis compositis. *Sp. pl.*
778. Fl. suec. 504. dan. 552.
Ranunculus radice subrotunda, foliis hirsutis semi-
septilobis petiolatis. *Hall. hist. 1174.*
Ranunculus *bulbosus*. *Ger. em. 953. Park. 329. R.*
syn. 247.
Ranunculus *pratensis* radice verticilli modo rotunda.
B. pin. 179.
5. Ranunculus *rectus* foliis pallidioribus hirsutus. *B. hist.*
III. 417. R. syn. 247.
Anglis, bulbous Crowfoot or Butter-cups.
Habitat in pratis et pascuis. 4. V.
Pharmac. Ranunculi bulbosi Herba.
5. RANUNCULUS calycibus patulis, pedunculis te-*acris*.
retibus, foliis tripartito-multifidis : summis linearibus. *Sp. pl. 779.*
Ranunculus foliis hirsutis, semitrilobatis, lobis late-
ralibus bipartitis, foliis caulinis semitrilobis. *Hall.*
hist. 1169.
Ranunculus *pratensis* erectus *acris*. *B. pin. 178.*
R. syn. 248. vulgaris. Park. 329.
Ranunculus *surrectis* caulinis. *Ger. em. 951.*
Anglis, upright Crowfoot.
Habitat in pratis et pascuis. 4. VI. VII.
Obs. variat in summis alpibus, in Arvonia et West-
morlandia, caule uni aut biforo, magno, et calyce
valde hirsuto.
6. RANUNCULUS foliis inferioribus palmatis ; sum-*sceleratus*.
mis digitatis, fructibus oblongis. *Sp. pl. 776. Fl.*
dan. 371.
Ranunculus foliis levibus, semitrilobatis, rotunde ser-
ratis, fructu ovato. *Hall. hist. 1175.*
Ranunculus *palustris* rotundifolius. *Ger. em. 962.*
R. syn. 249.
Ranunculus *palustris* apii folio lævis. *B. pin. 180.*
Ranunculus *palustris* fardonius lævis. *Park. 1215.*
Anglis, marsh Crowfoot.

R

Habitat

POLYANDRIA POLYGYNIA.

*Habitat in aquosis ubique. ♂. V. VI.
Pharmac. Ranunculi palustris Herba.*

- auricomus.* 7. RANUNCULUS foliis radicalibus reniformibus crenatis incisis; caulinis digitatis linearibus, caule multifloro. *Sp. pl. 775.*
Ranunculus foliis radicalibus integris et semitrilobatis, rotunde crenatis, caulinis multipartitis, linearibus, integerrimis. Hall. hist. 1177.
Ranunculus auricomus. Ger. em. 954.
Ranunculus nemorosus dulcis, II. Tragi. Park. 326. R. syn. 248.
Ranunculus nemorosus vel sylvaticus folio rotundo. B. pin. 178.
Anglis, wood Crowfoot or Goldilocks.
Habitat in sylvis, nemorosis, et ad sepes. ♀. IV. V.
- parviflorus.* 8. RANUNCULUS seminibus muricatis, foliis simplicibus laciniatis acutis hirsutis, caule prostrato. *Sp. pl. 780.*
Ranunculus hirsutus annuus, flore minimo. R. syn. 248. t. 12. f. 1. Pluk. ph. t. 55. f. 1.
Ranunculus arvensis annuus hirsutus, floriflore omnium minimo. Hist. Ox. II. 440. f. 4. t. 28. f. 21.
Anglis, small-flowered Crowfoot.
Habitat in arvis et pratis solo glareoso; prope Green-street Green, juxta Dartford in comitatu Cantiano copiose. ♂. V. VI.
- arvensis.* 9. RANUNCULUS seminibus aculeatis, foliis superioribus decompositis linearibus. *Sp. pl. 780. Fl. dan. 219.*
Ranunculus seminibus aculeatis, foliis tripartitis, lobis longe petiolatis, bipartitis et tripartitis, acute incisis. Hall. hist. 1176.
Ranunculus arvorum. Ger. em. 951. Park. 328. R. syn. 249.
Ranunculus arvensis echinatus. B. pin. 179.
Anglis, corn Crowfoot.
Habitat in arvis. ♂. VI.

. RANUNCULUS foliis subrotundis trilobis integer- *heder-*
rimis, caule repente. Sp. pl. 781. *ceus.*

Ranunculus aquatilis hederaceus albus. *R. syn. 249.*

Ranunculus aquaticus hederaceus luteus. *B. pin. 180.*

Hist. Ox. 2. 441. f. 4. t. 29. f. 29.

Ranunculus hederaceus aquaticus. *Park. 1216.*

Ranunculi aquatilis varietas altera. *Ger. em. 830.*

Anglis, ivy Crowfoot.

Habitat in aquosis, fossis, et rivulis lente fluentibus. IV.

V.—VIII.

. RANUNCULUS foliis submersis capillaceis, emer- *aquatilis.*
sis subpeltatis. Sp. pl. 781. Fl. dan. 321.

Ranunculus fluitans, petiolis unifloris, foliis imis ca-
 pillaribus, supremis reniformibus, orbiculatis, pal-
 matis. *Hall. hist. 1163.*

Ranunculus aquatilis. *Ger. em. 829. R. syn. 249.*

Ranunculus aquaticus, hepaticæ facie. *Park. 1216.*

Ranunculus aquaticus, folio rotundo et capillaceo.

B. pin. 180.

Ranunculus fluitans, petiolis unifloris, foliis capillari-
 bus, laciniis divergentibus. *Hall. hist. 1162.*

Ranunculus aquaticus capillaceus. *B. pin. 180.*

Ranunculus foliis omnibus capillaceis, circumscrip-
 tione oblongis. *Roy. lugd. 492.*

Ranunculus fluitans, petiolis unifloris, foliis ca-
 pillaceis longissimis, laciniis parallelis. *Hall. hist.*
1161.

Millefolium aquaticum, foliis scenicali, ranunculi flo-
 re et capitulo. *B. pin. 141.*

Ranunculus foliis omnibus capillaceis, circumscrip-
 tione rotundis. *Roy. lugd. 492. Hort. cliff. 231.*

Ranunculus aquaticus albus, circinatis tenuissimis
 divisus foliis, floribus ex alis longis pediculis innixis.

Pluk. ph. t. 55. f. 2.

Anglis, water Crowfoot.

Habitat $\alpha.$ $\beta.$ $\delta.$ in fossis et stagnis, γ in fluviis. IV.—
 VII.

POLYANDRIA POLYGYNIA.

FICARIA.

CAL. *Perianthium triphyllum: foliolis ovatis, concavis, caducis.*

COR. *Petala circiter octo, lanceolata, nitida. Nectarium fovea in singulo petalo supra unguem squamula emarginata clausum.*

STAM. *Filamenta plurima brevissima. Antheræ rectæ, oblongæ, didymæ.*

PIST. *Germina numerosa, in capitulum collecta, styli nulli. Stigmata reflexa minima.*

PER. *nullum. Receptaculum pedunculis minutissimis semina adnectit.*

SEM. *plurima, oblonga, apice reflexo.*

- verna.* 1. *FICARIA.* *Dill. cat. giss. 39. Hall. hist. 1160.*
Ranunculus foliis cordatis angulatis petiolatis. Sp. pl. 774. caule unifloro. Syst. nat. 378. Fl. dan. 499.
Chelidonium minus. Ger. em. 816. Park. 617. R. syn. 246.
Chelidonia rotundifolia minor. B. pin. 309.
Anglis, common Pilewort or lesser Celandine.
Habitat in pratis et pascuis. 4. IV.
Pharmac. Chelidonii minoris Radix, Herba.

TROLLIUS. 700.

Cal. o. Petala circiter quatuordecim. Caps. plurimæ, ovatæ, monospermæ.

- europæus.* 1. *TROLLIUS* corollis conniventibus, nektariis longitudine staminum. *Sp. pl. 782. Hall. hist. 1189. Fl. dan. 133.*
Ranunculus globosus. Ger. em. 955. Park. par. 218. R. syn. 272.
Ranunculus montanus, aconiti folio, flore globofo. B. pin. 182.
Anglis, Globe-flower or Locker-gowls.
Habitat ad latera montium, inque pratis montosis in septentrionalibus Angliæ et Cambriæ copiosissime. 4. V. VI.

CALTHA.

C A L T H A . 703.

Cal. o. *Petala quinque. Nectaria. o. Caps. plures,*
polyspermæ.

1. CALTHA. *Sp. pl. 784. Fl. suec. 511. Hall. hist. palustris.*
1188.

Caltha palustris. *B. hist. III. 419. flore simplici,*
pin. 276.

Caltha palustris vulgaris simplex. *Park. 1213.*

Caltha palustris major. *Ger. em. 817.*

Populago. *Tab. ic. 753. R. syn. 272.*

Anglis, Marsh-marigold.

Habitat in pratis et pascuis humidis et ad ripas fluviorum. 4. IV. V.

H E L L E B O R U S . 702.

Cal. o. *Petala quinque s. plura. Nectaria bilabiata*
tubulata. Caps. polyspermæ, erectiusculæ.

1. HELLEBORUS caule multifloro folioso, foliis pe-*fœtidus.*
datis. Sp. pl. 784.

Helleborus ramosus, multiflorus, foliis multipartitis
ferratis, stipulis ovato lanceolatis coloratis. Hall.
hist. 1193.

Helleborus niger *fœtidus. B. pin. 185.*

Helleboraster maximus. *Ger. em. 976. R. syn. 271.*
s. Consiligo. Park. 212.

Anglis, stinking Hellebore, Bearsfoot or Setterwort.
 Habitat in pratis, nemorosis et ad sepes. Near Cherryhinton, Cambridgeshire; upon the downs in Sussex,
 towards Chichester. D. Dillenius. R. syn. *in sylvis*
inter Gounsbury et Blackwell in agro Somersetensi
copiose. 4. IV.

2. HELLEBORUS caule multifloro folioso, foliis digi-*viridis.*
tatis. Sp. pl. 784. Jac. aust. II. 4. t. 106.

Helleborus foliis multipartitis, ferratis, caule pauci-
 floro. *Hall. hist. 1192.*

Helleborus niger hortensis flore viridi. *B. pin. 185.*
R. syn. 271.

POLYANDRIA POLYGYNIA.

Helleboraster minor, flore viridente. Park. 212.

Helleborastrum. Ger. em. 976.

Anglis, green Hellebore.

Habitat *in sylvis*. In Bigwyn *closes*, near Cambridge; about Arundel-castel, Sussex; in Sir Narb. D'Aeth's woods at Knowlton, East-Kent; in Stoken-church woods Oxfordshire. R. syn. *circa* Ditton et Whitwell, in comitatu Cantabrigiensi. 24, III. IV.

Classis

Classis XIV.

D I D Y N A M I A
G Y M N O S P E R M I A.* *Calyces quinquefidi.*

T E U C R I U M. 706.

Corollæ labium superius (nullum) ultra basin bipartitum, divaricatum ubi stamina.

1. TEUCRUM foliis oblongis sessilibus dentato ferratis, *scordium*. floribus geminis axillaribus pedunculatis, caule diffuso. *Sp. pl. 790. Fl. suec. 513. dan. 593.*

Chamædrys foliis mollibus, hirsutis ellipticis crenatis, verticillis paucifloris. *Hall. hist. 288.*

Scordium. *B. pin. 247. R. syn. 246. Riv. t. II.*

Scordium majus et minus. *Ger. em. 661.*

Scordium legitimum. *Park. III.*

Anglis, water Germander.

Habitat in palustribus Eliensis insulæ copiose. *R. syn. 4. VII. VIII.*

Pharmac. Scordii Herba.

*?2. TEUCRIUM foliis cuneiformi-ovatis inciso-cre-*chamæ-* natis petiolatis, floribus ternis, caulibus procumben-*dryas.* tibus subpilofis. *Syst. nat. 388. Sp. pl. 790.*

Chamædrys foliis firmis ovatis crenatis, verticillis pau- cifloris. *Hall. hist. 286.*

Chamædrys minor repens. *B. pin. 248.*

Chamædrys major latifolia. *Ger. em. 656,*

Anglis, common Germander.

Habitat on the ruins of Winchelsea castle. *R. syn. 231. VI. VII.*

Pharmac. Chamædryos Herba.

3. TEUCRIUM foliis trifidis linearibus integerrimis, *chamæpi-* floribus sessilibus lateralibus solitariis, caule diffuso. *tys* *Sp. pl. 787. Mat. med. 287.*

Bugula foliis imis linearibus, caulinis tripartitis. *Hall. hist.* 284.
Chamæpitys vulgaris. *Park.* 283. *R. syn.* 244.
Chamæpitys mas. *Ger. em.* 525.
Chamæpitys lutea vulgaris s. folio trifido. *B. pin.* 249.
Anglis, ground-pine Germaner.
Habitat in agris restilibus. *On the lays about the borders of Triplow-heath in Cambridgeshire; about Rochester, Dartford, &c.* *R. syn.* ○. VI. VII.
Pharmac. *Chamæpityos Herba.*

- scorodo-* 4. *TEUCRIUM* foliis cordatis ferratis petiolatis, racemis lateralibus secundis, caule erecto. *Sp. pl.* 789.
nia. *Fl. dan.* 485.
Chamædrys foliis cordatis productis, spicis longissimis nudis heteromallis. *Hall. hist.* 287.
Scorodonia s. *Salvia agrestis.* *Ger. em.* 662. *R. syn.* 245.
Scorodonia s. *Scordium alterum* quibusdam et *Salvia agrestis.* *Park.* III.
Scordium alterum s. *Salvia agrestis.* *B. pin.* 247.
Anglis, wood Germaner or Sage.
Habitat in sylvis, dumetis et ericetis frequens. 24. VII.
Pharmac. *Scorodonæ Herba.*

A J U G A. 705.

Corollæ labium superius minimum. *Stamina labio superiore longiora.*

- reptans.* 1. *AJUGA* glabra, stolonibus reptantibus. *Syst. n.* *Sp. pl.* 785.
Bugula flagellifera, foliis ovatis dentatis. *Hall. no-mencl.* 282. *hist.* 282.
Bugula. *Dod. p.* 135. *Ger. em.* 631. *R. syn.* 245.
Riv. t. 75. *vulgaris.* *Park.* 525.
Confolida media pratensis cærulea. *B. pin.* 260.
Anglis, common Bugle.
Habitat in pratis et pasuis humidis. 24. V.
- pyrami-* 2. *AJUGA* tetragono-pyramidalis. *Sp. pl.* 785. *villofa,*
dalis. *foliis radicalibus maximis.* *Syst. nat.* 387. *Fl. dan.* 185.
Bugula

Bugula foliis angulosis hirsutis calycibus villosis.

Hall. hist. 283.

Bugula cærulea alpina. *Park.* 525. *Pluk. ph. t.* 18.
f. 3. R. syn. 245.

Consolida media cærulea alpina. *B. pin.* 260.

Anglis, mountain Bugle.

Habitat in montibus; on Carnedd-lhewllyn in Carnarvonshire, Dr. Johnson. *R. syn. supra montem Ben-Nevis dictum in Scotia.* D. Hope. 4. VI.

N E P E T A. 710.

Corollæ labium inferius lacinula intermedia crenata:
faux margine reflexo. *Stamina approximata.*

I. NEPETA floribus spicatis, verticillis subpedicellatis, *cataria*.
foliis petiolatis cordatis dentato-serratis. *Sp. pl.*
796. *Fl. suec.* 514. *dan.* 580.

Nepeta major vulgaris. *Park.* 38. *R. syn.* 237.

Cataria foliis cordatis petiolatis, verticillis spicatis.
Hall. hist. 246.

Mentha cataria vulgaris et major. *B. pin.* 228.

Mentha felina f. cataria. *Tabern.* 348. *Ger. em.* 682.

Anglis, common Nep or Cat-mint.

Habitat in pascuis et sepibus solo calcareo. 4. VII.

V E R B E N A. 32.

Cor. infundibuliformis subæqualis, curva. *Calycis*
unico dente truncato. *Sem. quatuor.*

I. VERBENA spicis filiformibus paniculatis, foliis *officinalis*.
multifido-laciñati, caule solitario. *Sp. pl.* 29.
Fl. suec. 30. *dan.* 628.

Verbena foliis tripartitis rugosis, spicis nudis gracilissimis. *Hall. hist.* 219.

Verbena vulgaris. *B. hist.* III. 443. *R. syn.* 236.

Verbena mas f. recta et vulgaris. *Park.* 674.

Verbena communis. *Ger. em.* 664. cæruleo flore.
B. pin. 269.

Anglis, common Vervain.

Habitat in areis et ad vias publicas. ♂. VI. VII.

Pharmac. Verbenæ Herba.

MENTHA.

MENTHA. 713.

Corolla subæqualis, quadrifida: lacinia latiore emarginata. *Stamina* erecta distantia.

* *Spicatæ.*

viridis. 1. MENTHA spicis oblongis, foliis lanceolatis nudis serratis sessilibus, staminibus corolla longioribus. *Sp. pl.* 804.

Mentha foliis elliptico-lanceolatis, spicis cylindricis glaberrimis. *Hall. hist.* 229.

Mentha. *Cam. epit.* 477. *angustifolia* spicata. *B. pin.* 227. *Mentha romana.* *Ger. em.* 680. *angustifolia* s. *cardiaca.* *Park.* 31.

Anglis, spear Mint.

Habitat in aquosis et ad ripas fluviorum; prope Exmouth in Devonia et ad ripas Thamesis. 4. VII. VIII. *Pharmac.* *Menthæ vulgaris Herba.*

villoſa. 2. MENTHA spica oblonga, foliis sessilibus ovato-lanceolatis ferratis acutis villoſis, staminibus corolla brevioribus.

Mentha foliis elliptico-lanceolatis, subtus tomentosis spicis cylindricis, staminibus floris tubo æqualibus. *Hall. hist.* 228?

Mentha angustifolia spicata, glabra, folio rugosiore odore graviore. *R. syn.* 233.

Mentha spicata nostras, cardiacæ sativæ forma et odore æmula, folio rugosiore. *Pluk. mant.* 129.

♂ Mentha spicata angustifolia glabra, spica latiore. *R. syn.* 233.

γ Mentha spicata glabra latiore folio. *R. syn.* 234.

♂ Mentha sylvestris candicans, odore sativi. *Doody. Rand. Hort. Chelf.* 129.

Anglis, hairy Mint.

Habitat in aquosis et ad ripas fluviorum; circa Bocking in Essex, Maidstone in agro Cantiano. 4. VIII.

Obs. variat staminibus corolla brevioribus et æqualibus foliis lanceolatis ovato-lanceolatis et ovatis, villoſis et in ð tomentosis, affinis præcedenti, an distincta sit species?

sylvestris. 3. MENTHA spicis oblongis, foliis oblongis tomentosis ferratis sessilibus, staminibus corolla longioribus. *Sp. pl.* 804.

Mentha

Mentha foliis elliptico-lanceolatis serratis, subtus tomentosis, spicis cylindricis, staminibus flore duplo longioribus. *Hall. hist.* 227.

Mentha sylvestris folio longiori. *B. pin.* 227.

Menthastrum spicatum folio longiore candicante. *B. hist.* III. 2. 221. *R. syn.* 234.

Menthastrum. *Ger. em.* 683. *hirsutum*. *Park.* 34.

β *Menthastrum aquatici* genus *hirsutum*, spica latiore. *B. hist.* III. 2. 222. *R. syn.* 234.

Anglis, horse Mint.

Habitat in palustribus et aquosis. Burwelbeck, Lincolnshire, D. Lister; at Great Yeldham, Essex, Mr. Dale; ad Lewisham in Cantio, inter Ripley et Guildford. 4. VIII.

Pharmac. *Menthastrum Herba*.

Obs. variat staminibus corolla æqualibus.

4. MENTHA spicis oblongis, foliis sessilibus subrotundis crenato-dentatis rugosis villosis, staminibus corolla longioribus. *rotundifolia*.

Mentha spicis oblongis, foliis subrotundis crenatis sessilibus. *Sp. pl.* 805.

Mentha sylvestris rotundiore folio. *B. pin.* 227.

Mentha spicata altera. *Ger. em.* 681.

Mentha spicis cylindricis, foliis ovatis rugosis. *Hall. hist.* 226.

Anglis, round-leaved Mint.

Habitat in aquosis sed rarius, by the river side at Lydbrook near Ross, Herefordshire; in a meadow adjoining to Faulkburn-Hall, Essex; at Sir Fr. Leigh's near Hally, Kent. *R. syn.* In Hornsey and Harefield Church-yards. Blackf. 4. VIII.

** Capitatae.

5. MENTHA spicis capitatis, foliis ovatis serratis petiolatis, staminibus corolla brevioribus. *piperita*. *Sp. pl.* 805.

Mentha spicis brevioribus et habitioribus, foliis menthae fuscæ, sapore servido piperis. *R. syn.* 234. t. 10. f. 2.

Mentha piperata acuta. *Pet. b. br.* t. 13. f. 10.

β *Mentha piperata obtusa*. *Pet. b. br.* t. 13. f. 11.

Anglis, pepper Mint.

Habitat

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

Habitat in aquosis et ad rivulos; inter Newington et Hornsey, D. Alchorne. 4. VIII.

Pharmac. Menthæ piperitæ Herba.

Obs. variat floribus verticillato-spicatis et foliis fere nudis in hortis.

aquatica. 6. MENTHA spicis capitatis, foliis ovatis ferratis petiolatis, staminibus corolla longioribus. Sp. pl. 805.

Mentha foliis ovato-lanceolatis ferratis, verticillis paucissimis terminante maximo. Hall. hist. 225.

Mentha aquatica s. Sisymbrium. Ger. em. 684. B. hist. III. 223. R. syn. 233.

Mentha rotundifolia palustris s. aquatica major. B. pin. 227. Hist. Ox. III. 270. t. 7. f. 6.

Mentha aquatica rubra. Park. 1243.

hirsuta. 7. M. floribus capitatis, foliis ovatis ferratis subsessilibus pubescentibus staminibus corolla longioribus. Syst. nat. 393. Mantiss. I. 88.

Mentha floribus capitatis globosis, foliis ovatis ferratis, staminibus corolla brevioribus. Fl. angl. 223.

Mentha aquatica sive Sisymbrium hirsutius. B. hist. III. 2. 224.

Sisymbrium hirsutum. R. syn. 233.

8. M. sisymbrium dicta hirsuta glomerulis ac foliis minoribus ac rotundioribus. R. syn. 233. t. 10. f. 1.

Anglis, water Mint.

Habitat in aquosis et ad ripas fluviorum. 4. VIII.

Pharmac. Menthæ aquaticæ s. Sisymbrii Herba.

Obs. variat foliis pilosis et hirsutis; staminibus corolla brevioribus, quamvis et longioribus.

*** Verticillatæ.

rubra. 7. MENTHA floribus verticillatis, caulis diffusis, foliis subsessilibus ovato-lanceolatis ferratis acutis subnudis.

Mentha floribus verticillatis, foliis glabris, ovato-lanceolatis, verticillis subhirsutis. Hall. hist. 224.

gentilis. 8. M. floribus verticillatis, foliis ovatis acutis ferratis, staminibus corolla brevioribus. p. pl. 805.

Mentha

Mentha hortensis verticillata ocymi odore. *B. pin.*

227.

Mentha sativa rubra. *Ger. em.* 680.

Mentha fusca sive vulgaris. *Park.* 31. *R. syn.* 232.

8 *Mentha aquatica exigua.* *Trag. lib.* 1. c. 6. ic. *R. syn.* 232.

Mentha hortensis IV. *Fuchs. hist.* 291.

Anglis, red Mint.

Habitat in aquosis et ad rivulos. *In the hop-ground at Bocking, Essex,* Mr. Dale. *R. syn.* 24. VII. VIII.

Obs. *Caulibus diffusis, rubris glabris; variat foliis nudis et parum pilosis; staminibus corolla brevioribus, æquantibus et parum longioribus.*

8. MENTHA floribus verticillatis, caulis diffusis, fo- arvensis.
liis petiolatis ovatis serratis villosis.

Mentha floribus verticillatis, foliis ovatis acutis serratis, staminibus corolla æquantibus. *Sp. pl.* 806. *Fl. dan.* 512.

Mentha floribus verticillatis, foliis hirsutis ovato-lanceolatis, verticillis tomentosis. *Hall. hist.* 222.

Mentha arvensis verticillata. *B. pin.* 229. *hirsuta.*
Hist. Ox. III. 369. f. 11. t. 7. f. 5.

Mentha s. Calamintha aquatica. *Ger. em.* 684. *R. syn.* 232.

Calamintha arvensis verticillata s. aquatica Belgarum.
Lob. ic. 515. *Park.* 36.

8 *Mentha arvensis verticillata folio rotundiore odore aromatico.* *R. syn.* 232.

Anglis, corn Mint.

Habitat in aquosis et arvis humidis frequens. 24. VII.—IX.

Obs. *variat staminibus corolla brevioribus, æquantibus et longioribus.*

9. MENTHA floribus verticillatis, caulis erectis, fo- sativa.
liis petiolatis ovatis serratis acutis villosis.

Mentha floribus verticillatis, foliis ovatis acutiusculis serratis, staminibus corolla longioribus. *Sp. pl.* 805.

Mentha crispa. *Park.* 31. *verticillata.* *B. pin.* 227.
Mentha

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

Mentha verticillata. *Riv. mon. ir. t. 48.* *R. syn.*
232.

Anglis, marsh Mint.

Habitat in palustribus et ad rivulos. 24.VII. VIII.

pulegium. 10. *MENTHA* floribus verticillatis, foliis ovatis obtusis subcrenatis, caulis subteretibus repentibus, staminibus corolla longioribus. *Sp. pl.* 807.

Mentha caule prostrato, foliis subrotundis, obiter dentatis, staminibus exsertis. *Hall. hist.* 221.

Pulegium. *Fuchs. hist.* 199. *B. hist. III.* 256. *Riv. mon. irr. t. 22.* *R. syn.* 235. *latifolium.* *B. pin.* 222.

Pulegium regium. *Ger. em.* 671.

Pulegium vulgare. *Park.* 29.

exigua. *Mentha* floribus verticillatis, foliis lanceolato-ovatis glabris acutis integerrimis. *Sp. pl.* 806.

Anglis, pennyroyal Mint.

Habitat in ericetis et pascuis humidis. 24. VIII. IX.

GLECOMA. 714.

Antherarum singulum par informam crucis connivans. *Cal. quinquefidus.*

Hederaceae. 1. *GLECOMA* foliis reniformibus crenatis. *p. pl.* 807.

Chamæclema caule procumbente radicato, foliis reniformibus rotunde crenatis. *Hall. hist.* 245.

Hedera terrestris. *Ger. em.* 856. *vulgaris.* *Park.* 676. *B. pin.* 306.

Calamintha humilior, folio rotundiore. *Tourn.* 167. *R. syn.* 243.

8 *Hedera terrestris montana.* *B. pin.* 306. *Park.* 677. *Chamæclema majus hirsutius.* *Vaill. paris.* 33. t. 6.

f. 4.

Anglis, common Ground-ivy.

Habitat in umbrosis et ad spes. 24. IV. V.

Pharmac. *Hederæ terrestris Herba.*

LAMIUM.

LAMIUM. 716.

Corollæ labium superius integrum, fornicatum; labium inferius bilobum; faux utrinque margine dentata.

1. LAMIUM foliis cordatis acuminatis serratis petiolatis, verticillis vigintifloris. *Sp. pl. 809. Fl. dan. 594.*

Lamium foliis cordatis acutis serratis, verticillis multi floris. *Hall. hist. 271.*

Lamium album. *Ger. em. 782. R. syn. 240. non fœtens, folio oblongo. B. pin. 931.*

Lamium vulgare album s. Archangelicum flore albo. *Park. 604.*

Anglis, white Archangel, or Dead-Nettle.

Habitat in ruderatis et arvis. 4. V. VI.

Pharmac. Lamii albi Herba, Flores.

2. LAMIUM foliis cordatis obtusis petiolatis. *Sp. pl. purpureum. 809. Fl. suec. 521. dan. 523.*

Lamium foliis cordatis acutis, in summo ramo conges- tis. *Hall. hist. 272.*

Lamium rubrum. *Ger. em. 703. R. syn. 240.*

Lamium vulgare folio subrotundo, flore rubro. *Park. 604.*

Lamium purpureum fœtidum folio subrotundo. s. Ga- leopsis Dioscordis. *B. pin. 230.*

Lamium rubrum minus, foliis profunde incisis. *R. syn. 240.*

Anglis, red Archangel.

Habitat in ruderatis et arvis. 4. V. VI.

Pharmac. Lamii rubri Folia, Flores.

3. LAMIUM foliis floralibus sessilibus amplexicaulibus amplexi- obtusis. *Sp. pl. 809. Hort. cliff. 314. caule.*

Lamium foliis radicalibus petiolatis lobatis, superiori- bus caulem ambientibus rotunde incisis. *Hall. hist. 273.*

Lamium folio caulem ambiente majus et minus. *B. pin. 231. R. syn. 240.*

Alpine hederula altera. *Ger. em. 616.*

Alpine

Alsine hederulæ folio major. Park. 762.
Anglis, perfoliate Archangel, or great Henbil.
Habitat in arvis et cultis. Ⓛ. V. VI.

GALEOPSIS. 717.

Corollæ labium superius subcrenatum, fornicatum :
labium inferius supra bidentatum.

ladanum. 1. **GALEOPSIS** internodiis caulinis æqualibus, verticillis remotis, foliis linear-lanceolatis subnudis.
Galeopsis internodiis caulinis æqualibus, verticillis omnibus remotis. Sp. pl. 810.
Galeopsis foliis linearibus serratis, verticillis diffitis.
Hall. hist. 266.

Sideritis arvensis angustifolia rubra. B. pin. 233.

Sideritis arvensis rubra. Park. 587. R. syn. 242.

Ladanum segetum. Riv. mon. ir. 24.

Anglis, red Dead-Nettle, or Nettle-hemp.

Habitat in arvis solo calcareo frequens. Ⓛ. VI—VIII.

Desc. Caulis erectus tetragonus subhirsutus, brachiatus.
Folia opposita, petiolata, linear-lanceolata et lanceolata,
serrata et integerrima, acuminata nuda, et parum hirsuta,
serraturis utrinque tribus s. quatuor. Flores
rubri villosusculi. Galea dentata; labia crenata;
lacinia intermedia rubra, albaque picta. Calycis den-
tes acuminata s. spinosi.

villosa. 2. **GALEOPSIS** internodiis caulinis æqualibus, verticillis remotis, foliis lanceolatis serratis villosis.

Galeopsis foliis rhomboideis, serratis, sericeis, verticillis diffitis. *Hall. hist.* 267.

Sideritis arvensis latifolia hirsuta lutea. R. syn. 242.

Sideritis lutea. Pet. h. br. t. 33. f. 10.

Ladanum segetum folio latiore. Riv. mon. irr. 24.

Anglis, hairy Dead-Nettle.

Habitat in arvis arenosis in comitatibus Eboracensi et
Lancasterensi etc. frequens; prope Newark in agro
Nottinghamensi; circa Bangor in Wallia. Ⓛ. VII.
 VIII.

Desc. Caulis erectus, tetragonus, ramosus, villus, ramis
 erectis. Folia opposita, petiolata radicalia ovata cau-
 lina lanceolata, serrata, acuminata, villosa aut sericea,
 venosa,

venosa, venis rectis. Calycis dentes spinosi. Corollæ flavæ, villosæ : galea dentata, labia crenata. Habitus præcedentis, sed differt latitudine, serraturis, venis vil- lisque foliorum, et colore florum.

3. GALEOPSIS internodiis caulinis superne incrassatis, tetrabit verticillis summis contiguis. *Sp. pl. 810.*

Galeopsis foliis ovato-lanceolatis serratis, caule hirsuto. *Hall. hist. 268.*

Lamium cannabino folio vulgare. *R. syn. 240.*

Cannabis spuria. *Ger. em. 709. Park. 399. Riv. 3.*

Urtica aculeata, foliis serratis. *B. pin. 232.*

3 Lamium cannabinum, floribus albis, verticillis purpurascenscentibus. *R. syn. 241.*

Cannabis spuria flore albo magno eleganti. *Merr.*

Galeopsis corolla flava, labio inferiore maculato. *Fl. lapp. 193.*

Galeopsis foliis ovato-lanceolatis, serratis, caule hirsuto, flore calycis quadruplo longiore. *Hall. hist. 269.*

Lamium cannabino folio, flore ampio luteo : labio purpureo. *R. syn. 241.*

Anglis, common Dead-Nettle, or Nettle-hemp.

Habitat inter segetes et ad margines agrorum, & in a corn-field, at the bottom of Ribton Lane, near Woodford.

Warn. cat. Woodf. 77. in arvis arenosis in comitatu- bus Eboracensi, Lancasterensi, &c. O. VII. VIII.

GALEOBOLON.

CAL. *Involucrum verticillis subiectum : foliolis linearibus, acutis calyce brevioribus.*

Perianthium monophyllum, tubulatum, campanula- tum, quinquedentatum, acuminatum : *dente superiore erecto distanti ; duobus inferioribus reflexo-patulis.*

COR. monopetala, ringens. *Tubus cylindricus, brevis. Labium superius ovale, fornicatum, subinte- grum, ciliatum, villosum. Lab. inferius brevius, trifidum, inæquale : laciniis lateralibus ovatis, acu- minatis, latere exteriore reflexo ; lacinia media lon- giori recta, acuminata.*

S

STAM.

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

STAM. *Filamenta* quatuor subulata, sub labio superiori recondita, quorum duo longiora. *Antheræ* oblongæ binæ, didymæ, supra convexæ, subtus concavæ.

PIST. *Germen* quadripartitum. *Stylus* filiformis longitudine et situ staminum. *Stigma* bifidum, acutum.

PER. nullum. *Calyx* immutatus, semina infundo calycis.

SEM. quatuor, brevia, triquetra, truncata.

luteum. I. GALEOBDOLON.

Galeopsis verticillis sexfloris, involucro tetraphyllo. Sp. pl. 810.

Leonurus foliis ovatis ferratis acutis. Hort. cliff. 313.

Leonurus foliis cordatis. Scop. carn. 469. 2d. II. 409.

Cardiaca foliis petiolatis, cordatis, verticillis foliosis. Hall. hist. 275.

Lamium luteum. Ger. em. 671. Park. 606. R. syn. 240.

Lamium folio oblongo luteum. B. pin. 231.

Anglis, yellow Galeobdolon or Dead-nettle.

Habitat in nemorosis et ad sepes. 4. V.

Obs. Folia inferiora, cordata; superiora ovata, acuta;

Flores verticillati sessiles: verticilli a sex ad duodecim flores, involucrati. Corolla lutea, lacinia intermedia labii inferioris fulva lineata: lineis tribus.

B E T O M I C A. 718.

Gal. aristatus. *Corollæ* labium superius adscendens planiusculum: tubus cylindricus.

officinalis. I. BETONICA spica interrupta, corollarum lacinia labii intermedia emarginata. Sp. pl. 810.

Betonica foliis petiolatis, imis cordatis, superioribus ovatis crenatis, spica brevi, foliis insidentibus. Hall. hist. 264.

Betonica. Ger. em. 714. R. syn. 234. purpurea. B. pin. 235.

Betonica vulgaris flore purpureo. Park. 614. *Anglis*, wood Betony.

Habitat

Habitat in sylvis et nemorosis. 24. VII. VIII.
Pharmac. Betonicæ Herba, Flores.

STACHYS. 719.

Cirræ labium superius fornicatum; labium inferius lateralibus reflexum: intermedia majore emarginata.
Stamina deflorata versus latera reflexa.

1. STACHYS verticillæ sexfloris, foliis cordatis petiola-*sylvatica*.
tis. Sp. pl. 811. Gouan. Hort. 282.

Galeopsis foliis cordatis, ferratis, verticillæ nudis spica-
tis. Hall. hist. 276.

Galeopsis vera. Ger. em. 709.

Galeopsis legitima dioscoridis. Park. 608. R. syn.
237.

Lamium maximum sylvaticum foetidum. B. pin. 231.

2 Lamium sylvaticum foetidum, folio anguloſo minus.
Pluk. alm. 128.

Anglis, hedge Stachys, or Nettle.

Habitat in sylvis et sepibus. 24. VII. VIII.

2. STACHYS verticillæ sexfloris, foliis linear-lanceo-*palustris*.
latis semiamplexicaulibus. Sp. pl. 811.

Stachys foliis hirsutis elliptico-lanceolatis, breviter
petiolatis, verticillæ spicatis. Hall. hist. 257.

Stachys palustris foetida. B. pin. 236.

Sideritis anglica strumosa radice. Park. 587. R. syn.
242.

Panax coloni. Ger. em. 1005.

Anglis, marsh Stachys, or Clown's Allheal.

Habitat in aquosis et ad ripas fluviorum. 24. VIII.

3. STACHYS verticillæ multifloris, foliorum serraturis germani-
imbricatis, caule lanato. Sp. pl. 812. ca.

Stachys caule tomentoso, foliis imis cordatis superiori-
bus elliptico-lanceolatis, verticillæ densissimis, to-
mentosis. Hall. hist. 255.

Stachys Fuchsii. Ger. em. 795. R. syn. 239.

Stachys major germanica. B. pin. 236.

Anglis, german Stachys, or base Horehound.

Habitat in sepibus; nigh Whitney park, Oxfordshire,
and thereabout plentifully. R. syn. Found by Dr.

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

Richardson, four miles south of Grantham, near the London road, opposite Easton. 24. VII.

- arvensis.* 4. STACHYS verticillaris sexfloris, foliis obtusis nudiusculis corollis longitudine calycis, caule debili. *Syst. nat.* 395. *Sp. pl.* 814. *Fl. dan.* 587.
Glechoma foliis cordatis oblongis crenatis, caule hispido erecto. *Sp. pl. ed. I.* 578.
Trixago foliis ovatis, cordatis, rotunde dentatis hispidis. *Hall. hist.* 231.
Sideritis humilis lato obtuso folio. *Ger. em.* 699. *R. syn.* 242.
Sideritis hederulæ folio. *Park.* 587.
Sideritis alsines trixaginis folio. *B. pin.* 233.
Anglis, corn Stachys.
Habitat in arvis. ☽. VII. VIII.

BALLOTA. 720.

Cal. hypocrateiformis, quinquedentatus, decemstriatus. *Cor.* labium superius crenatum concavum,

- nigra.* 1. BALLOTA foliis cordatis indivisis ferratis, calycibus acuminatis. *Sp. pl.* 814. *Fl. suec.* 529.
Ballote foliis cordatis, ferratis, verticillatis nudis. *Hall. hist.* 259.
Ballote. *Matth.* 825. *Fuchs.* 154. *R. syn.* 244.
Marrubium nigrum. *Ger. em.* 701. foetidum, *Ballote dictum.* *Park.* 1230.
Marrubium nigrum foetidum, *Ballote Dioscoridis.* *B. pin.* 230.
alba. 2. *Ballota* foliis cordatis indivisis ferratis, calycibus subtruncatis. *Sp. pl.* 814. *Fl. suec.* 530.
Ballota flore albo. *Tourn.* 185.
Anglis, stinking Ballote, or black Horehound.
Habitat in ruderatis et sepibus. 24. VII.
Pharmac. *Marrubii nigri Herba.*

MARRUBIUM. 721.

Cal. hypocrateiformis, rigidus, decemstriatus. *Corollæ* labium superius bifidum, lineare, rectum.

1. MARRUBIUM

- I. MARRUBIUM dentibus calycinis setaceis uncina- *vulgare*.
tis. *Sp. pl.* 816. *Hall. hist.* 258.
Marrubium album. *Ger. em.* 693. *R. syn.* 239. vul-
gare. *B. pin.* 230. *Park.* 44.
Anglis, white Horehound.
Habitat in ruderatis et ad vias; in ericeto Hampstediano.
4. VII.
Pharmac. Marrubii albi f. Prassii Herba.

LEONURUS. 722.

Antheræ punctis nitidis adspersæ.

- I. LEONURUS foliis caulinis lanceolatis trilobis. *Sp. Cardiaca*,
pl. 817. *Fl. suec.* 532. *Scop. carn.* 409.
Cardiaca foliis tripartitis lanceolatis. *Hall. hist.* 274.
Cardiaca. *Dorst. bot.* 651. *B. hist. III.* 320. *Park.*
41. *R. syn.* 239.
Marrubium Cardiaca dictum. *B. pin.* 230.
Anglis, common Lion's tail, or Mother-wort.
Habitat in ruderatis et ad sepes. in insula Selfey prope
Chichester; inter Tickhill et Worksop in comitatu
Eboracensi. ♂. VII.
Pharmac. Cardiacæ Herba.

** *Calycis bilabiati.*

CLINOPODIUM. 725.

Involucrum multisetum verticillo subiectum.

- I. CLINOPODIUM capitulis subrotundis hispidis, *vulgare*.
bracteis setaceis. *Sp. pl.* 821.
Clinopodium foliis ovatis, acuminatis obiter dentatis
stipulis setaceis. *Hall. hist.* 239.
Clinopodium origano simile. *B. pin.* 224. *R. syn.*
239.
Acinos. *Ger. em.* 675. f. Clinopodium majus. *Park.*
22.
Anglis wild Basil.
Habitat in pratis et ad sepes præsertim solo calcareo. 4.
VII.

ORIGANUM. 726.

Strobilus tetragonous, spicatus calyces colligens.

vulgare. 1. ORIGANUM spicis subrotundis paniculatis conglobatis, bracteis calyce longioribus ovatis. Sp. pl. 824. Fl. suec. 534. Dan. 638.

Origanum foliis ovatis, umbellis coloratis, staminibus exsertis. Hall. hist. 233.

Origanum anglicum. Ger. em. 666.

Origanum sylvestre. B. pin. 223.

Origanum vulgare spontaneum. B. hist. III. 236. R. syn. 236.

Majorana sylvestris. Park. 12.

Anglis, common Marjoram.

Habitat in dumetis et ad sepes solo calcareo. 4. VII.

Pharmac. Origani vulgaris Herba.

onites. 2. ORIGANUM spicis oblongis aggregatis hirsutis, foliis cordatis tomentosis. Sp. pl. 824.

Origanum onites. B. pin. 223. R. syn. 236.

Majorana major anglica. Ger. em. 664.

Majorana latifolia f. major anglica. Park. 12.

Anglis, pot Marjoram.

Habitat in pratis aridis; On the left hand of the road from Braintree to Raine, beyond the Bridge, Mr. Dale. R. syn. 4. VIII.

THYMUS. 727.

Calycis bilabiati, faux villis clausa.

Serpyllum. 1. THYMUS floribus capitatis, caulis decumbentibus foliis planis obtusis basi ciliatis. Sp. pl. 825.

Thymus foliis ovatis ad basin ciliatis. Hall. hist. 235.

Serpyllum vulgare. Ger. em. 570. B. hist. III. 269. R. syn. 230. B. pin. 220. Park. 8.

β Serpyllum vulgare flore albo. Tourn. 197.

γ Serpyllum vulgare flore ampio. R. syn. 230.

δ Serpyllum vulgare majus. B. pin. 220.

ε Serpyllum citratum. Ger. em. 575.

ζ Serpyllum angustifolium glabrum. B. pin. 220.

η Serpyllum vulgare hirsutum. R. syn. 231.

Serpyllum

2. *Serpyllum villosum fruticosius floribus dilute rubentibus.* R. syn. 231.
Anglis, wild, or Mother of Thyme, & lemon & hoary Thyme.
 Habitat in ericetis et montosis ubique. 4. VII. VIII.
 Pharmac. Serpylli Herba.

2. *THYMUS verticillis sexfloris, caulis erectis subramosis, foliis acutis serratis.* Sp. pl. 826. *Acinos.*
Clinopodium foliis ovatis, dentatis flore foliis breviori. Hall. hist. 237.
Acinos multis. B. hist. III. 259. R. syn. 238.
Ocymum sylvestre. Ger. em. 676.
Clinopodium arvense ocymi facie. B. pin. 225.
Clinopodium minus sive vulgare. Park. 21.
Anglis, corn Thyme, or Basil.
 Habitat in collibus aridis, glareosis et cretaceis passim. 0.
 VII. VIII.

MELISSA. 728.

Cal. aridus, supra planiusculum, labio superiore subfastigiato. Corollæ labium superius fornicateum, bifidum, labii inferioris lobo medio cordato.

1. *MELISSA pedunculis axillaribus dichotomis longitudine foliorum.* Sp. pl. 827. *Calamintha* thq.
Melissa foliis subhirsutis, ovatis acuminatis acute serratis, petiolis ramosis, folia superantibus. Hall. hist. 241.
Calamintha. Cam. ep. 481. vulgaris. Park. 36. R. syn. 243. officinarum, Ger. em. 687. germaniae. B. pin. 228.
Anglis, mountain Calamint.
 Habitat in agrorum marginibus et ad vias. 4. VIII.
 Pharmac. Calaminthæ montanæ Herba.

2. *MELISSA pedunculis axillaribus dichotomis folio nepeta longioribus, caule decumbente.* Sp. pl. 828.
Melissa foliis hirsutis ovatis acuminatis, leniter serratis, petiolis ramosis, folia superantibus. Hall. hist. 240.

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

Calamintha octore pulegii. *Ger. em.* 687. *R. syn.* 243.
Calamintha pulegii odore s. Nepeta. *B. pin.* 228.
Calamintha altera odore pulegii, foliis maculosis.
Park. 36.

Anglis, field Calamint.

Habitat in marginibus viarum agrorumque. 24. VIII.
Pharmac. *Calaminthæ officinalis Herba.*

MELITTIS. 731.

Calyx tubo corollæ amplior. *Corollæ labium superius planum; labium inferius crenatum. Antheræ cruciatæ.*

meliſſo- 1. *MELITTIS.* *Sp. pl.* 832. *Hall. hist.* 224. *Jac. aust.*
phyllum. *I.* 18. *t.* 26.

Melissa Fuchsii. *Lob. ic.* 515. *Ger. em.* 690. *R. syn.*
242.

Melissophyllum Fuchsii. *Park.* 41.

Lamium montanum, melissæ folio. *B. pin.* 231.

Anglis, common Bastard-Balm.

Habitat in sylvis et sepibus. *In several woods in the west of England, about Totness in Devonshire, and Haverford-west, Pembrokeshire.* *R. syn. in novo saltu in comitatu Hantonensi.*

PRUNELLA. 732.

Filamenta bifurca: altero apice antherifera. Stigma bifidum.

vulgaris. 1. *PRUNELLA* foliis omnibus ovato-oblongis petiolatis. *Sp. pl.* 837. *Fl. suec.* 540.

Prunella foliis ovatis oblongis, calycibus superne truncatis. *Hall. hist.* 277.

Prunella. *Ger. em.* 631. *R. syn.* 238. *vulgaris.* *Park.* 1680.

Prunella major folio non dissecto. *B. pin.* 260.

Anglis, common Self-heal.

Habitat in pratis et pascuis. 24. VIII.

Pharmac. *Prunellæ Herba.*

SCUTELLARIA.

SCUTELLARIA. 734.

Calyx ore integro : post florescentiam clauso, operculato.

1. SCUTELLARIA foliis cordato-lanceolatis crenatis *galericul-*
rugosis, floribus axillaribus. *Sp. pl.* 835. *Fl. dan.* *lata.*
637.

Cassida foliis oblonge-cordatis crenatis, verticillis nudis bifloris. *Hall. hist.* 280.

Cassida palustris vulgarior flore cæruleo. *Tourn.* 182.
R. syn. 244.

Lysimachia cærulea galericulata, seu *Gratiola* cærulea.
B. pin. 246.

Lysimachia galericulata. *Ger. em.* 477.

Gratiola cærulea. f. *latifolia* major. *Park.* 221.

Anglis, common Skull-cap, or Hooded-willow-herb.

Habitat in aquosis et ad ripas fluviorum. 24. VIII.

2. SCUTELLARIA foliis cordato-ovatis subintegerri-*minor.*
mis, floribus axillaribus. *Fl. angl.* 232. *Sp. pl.* 835.

Cassida palustris minima, flore purpurascente. *Tourn.*
182. *R. syn.* 244.

Gratiola latifolia. *Ger. em.* 585. f. *nostras minor.*
Park. 221.

Anglis, lesser Skull-cap, or Hooded-Willow-herb.

Habitat in palustribus. 24. VII. VIII.

ANGIOSPERMIA.

* *Calyces bifidi.*

OROBANCHE. 779.

Cal. bifidus. *Cor.* ringens. *Caps.* unilocularis, bivalvis polysperma. *Glandula* sub basi germinis.

1. OROBANCHE caule simplici pubescente, corollis *major.*
quadrifidis.

Orobanche caule simplicissimo pubescente, staminibus
subexsertis. *Sp. pl.* 882.

Orobanche

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

Orobanche caule simplici, stipula unica, calyce quadrifido. *Hall. hist.* 295.

Orobanche major *Garyophyllum olens*. *B. pin.* 87. *R. syn.* *288.

Rapum genistæ. *Ger. em.* 1311. *Park.* 229.

Anglis, common Broom-rape.

Habitat in pratis siccis ad radices genistæ et inter segetes. 24. V. VI.

ramosa. 2. OROBANCHE caule subramoso, corollis quinquefidis.

Orobanche caule ramoso, corollis quinquefidis. *Sp. pl.* 882.

Orobanche caule ramoso, flore quinquepartito. *Hall. hist.* 296.

Orobanche. *Cam. epit.* 311. *ramosa*. *B. pin.* 88, *Park.* 1363. *R. syn.* *288.

3 Orobanche flore minore. *B. hist.* II. 781. *R. syn.* *288.

Anglis, branched Broom-rape.

Habitat in arvis et pascuis siccis. Near Beccles, in Suffolk. J. Sherrard, *R. syn.* In insula Shepey et prope Faversham et Rochester in Cantio; circa Glastonbury; et in comitatibus Devoniensi et Hantoniensi, 24? VI. VII.

Desc. Caulis erectus, angulatus, squamosus, flavescens, basi ramosus, sed frequens simplex; ramis erectis fere longitudine caulis; squamis ovatis, adpresso: Flores spicati, sessiles, fusco-purpurascens, labio superiore subrotunda bifido, inferiore trifido. Bracteæ solitariæ, ovatae, membranaceæ, purpurascens; Stamina corollâ breviora.

** Calyces quadrifidi,

L A T H R Æ A. 743.

Cal. quadrifidus. *Glandula* depressa ad basin suturæ germinis. *Caps.* unilocularis.

squamaria. 1. LATHRÆA caule simplicissimo, corollis pendulis: labio inferiore trifido. *Sp. pl.* 884.

Anblatum. *Cord. hist.* 89. *f. Aphyllo*. *B. hist.* II, 783. *R. syn.* 288.

Orobanchæ

Orobanche radice dentata major. *B. pin.* 88.
Orobanche radice dentata f. *Dentaria major* Matthioli. *Ger. em.* 1322.

Anglis, Tooth-woort.

Habitat in umbrosis et ad radices montium sed rarius; In the woods about Maidstone, in Kent, Mr. J. Sherard. R. syn. in a shady lane leading from Harefield town to the river, plentifully. Blacks. spec. bot. in dumetis infra Conzick-scar prope Kendal, in Westmorlandia. 24. IV. V.

BARTSIA. 739.

Cal. bilobus; lobis bifidis. Corollæ Labium superius erectum, concavum, emarginatum, longius. Labium inferius reflexum trifidum, laciniis obtusis fere æqualibus. Caps. ovata, compressa, bivalvis, bilocularis.

1. BARTSIA foliis oppositis cordatis obtuse serratis. *alpina.*

Sp. pl. 839. Fl. suec. 541.

Stæhelina foliis cordatis amplexicaulibus serratis, floralibus coloratis. Hall. hist. 312.

Clinopodium alpinum hirsutum. B. pin. 225. Pluk. phyt. t. 163. f. 5.

Euphrasia rubra Westmorlandica, foliis brevibus obtusis. R. syn. 285.

Anglis, alpine Bartisia.

Habitat ad ripas fluviorum, locis apricis duris. Prope Orton vicum in Westmorlandia, juxta rivulum qui decurrit secus viam qua inde Crosbeiam itur. R. syn. ipse in eodem loco inveni. 24. VIII.

2. BARTSIA foliis superioribus alternis serratis, floribus lateralibus distantibus. *Sp. pl. 839.*

Euphrasia major lutea latifolia palustris. R. hist. 772. syn. 285. Hist. Ox. III. 432. Pluk. ph. t. 27. f. 5.

Alectrolophis italica luteo-pallida, Barr. rar. 209. t. 665.

Anglis, viscous Bartisia.

Habitat in palustribus, in Cornubia et Devonia passim. circa Latham juxta Ormskirk in comitatu Lancastrense

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

ensi copiose. Near Arncaple, the seat of Lord F. Campbell, near Loch-Gyle. Dr. Hope. ♂. VII.—VIII.

odontitis. 3. **BARTSIA** foliis superioribus alternis lanceolatis serratis, floribus racemosis secundis.

Euphrasia foliis linearibus: omnibus ferratis. *Sp. pl.* 841. *Fl. dan.* 625.

Euphrasia pratensis rubra. *B. pin.* 234. *R. syn.* *284. *major.* *Park.* 1329.

Crataegonon Euphrasina. *Ger. em.* 92.

Odontites bracteis ferratis hirsutis. *Hall. hist.* 304. *Anglis,* red Bartisia.

Habitat in pratis et pascuis. ♂. VII—IX.

RHINANTHUS. 740.

Calyx quadrifidus, ventricosus. *Caps.* bilocularis, obtusa compressa.

Crista galli. 1. **RHINANTHUS** corollarum labio superiore compresso breviore. *Sp. pl.* 840. *Fl. lapp.* 248. *suec.* 542.

Alectorolophus calycibus glabris. *Hall. hist.* 313.

Pedicularis f. *Crista galli lutea.* *Park.* 713. *R. syn.* 284.

Pedicularis pratensis lutea f. *Crista galli.* *B. pin.* 163.

Crista galli. *Ger. em.* 1071.

β *Pedicularis major augustifolia ramosissima,* flore minore luteo, labello purpureo. *R. syn.* 284.

Anglis, common Yellow-Rattle, or Cock's-comb.

Habitat in pratis et pascuis. ♂. VI. VII.

EUPHRASIA. 741.

CAL. *Perianthium monophyllum, tubulatum, campanulatum, angulatum, rectum, quadrifidum: laciniis acuminatis, æqualibus.*

COR. *monopetalla, ringens. Tubus longitudine calycis. Labium superius, concavum, emarginatum.*

Lab.

Lab. inferius patens, semitrifidum : laciniis inæqualibus, bifidis ; **media** majori.

STAM. Filamenta quatuor, filiformia. sub labio superiori recondita. **Antheræ** bilobæ basi bifidæ ; lobis basi aristato-acuminatis.

PIST. Germen oblongum. Stylus filiformis situ et figura staminum. **Stigma** capitatum, obtusum, integrum.

PER. Capsula oblonga, imma quadrangula, supra compressa, emarginata, bilocularis, bivalvis, desipimento valvis contrario, marginibus dehiscens.

SEM. numerosa, oblonga.

I. EUPHRASIA foliis ovatis lineatis argute dentatis. *officinalis.*

Sp. pl. 841. Hall. hist. 303.

Euphrasia. *Tabern. 862. Cam. epit. 767. Ger. em. 663.*

R. syn. 284. vulgaris. Park. 1329.

Euphrasia officinarum. *B. pin. 233.*

Anglis, common Eye-bright.

Habitat in pratis et pascuis. ☽. VII—IX.

Pharmac. *Euphrasiæ Herba.*

M E L A M P Y R U M. 742.

Cal. quadrifidus. **Corollæ** labium superius compressum. margine replicato. **Caps.** bilocularis obliqua, hinc dehiscens. **Semina** duo gibba.

I. MELAMPYRUM spicis quadrangularibus : bracteæ *cristatum.* is cordatis compaetis denticulatis imbricatis. *Sp. pl. 842.*

Melampyrum foliis integerrimis, floribus spicatis, bracteis duplicatis cristatis imbricatis. *Hall. hist. 311.*

Melampyrum cristatum, flore albo et purpureo. *B. hist. III. 440. R. syn. 286.*

Melampyrum luteum angustifolium. *B. pin. 234.*

Melampyrum angustifolium cristatum, spica quadrata, flosculis ex luteo pallescentibus. *Pluk. ph. t. 99. f. 2.*

Anglis, crested Cow-wheat.

Habitat in sylvis Cantabrigiensibus et Bedfordiensibus frequens. ☽. VII.

2. MELAMPYRUM

arvense. 2. MELAMPYRUM spicis conicis laxis : bracteis dentato-setaceis. *Sp. pl.* 842.

Melampyrum foliis integerrimis, bracteis semipinnatis. *Hall. hist.* 310.

Melampyrum purpurascente coma. *B. pin.* 234. *R. syn.* 285.

Anglis, purple Cow-wheat.

Habitat in arvis. In the corn, on the right hand, just before you come to Lycham in Norfolk. *R. syn.* on a hill near Horsley-bath, near Beeston Castle, Cheshire. Blacks. Spec. bot. inter Norwich et Cossey. D. Rose. ⓧ. VII.

pratense. 3. MELAMPYRUM floribus secundis lateralibus, conjugationibus remotis, corollis clausis. *Sp. pl.* 843.

Melampyrum foliis imis integerrimis, mediis dentatis, floralibus hastatis. *Hall. hist.* 308.

Melampyrum luteum latifolium. *B. pin.* 234.

Melampyrum latifolium flore albo : labio inferiore duabus maculis luteis distincto. *R. syn.* 286.

Anglis, meadow Cow-wheat.

Habitat in pratis, pascuis et dumetis. In the wood by Dr. Richardson's house at North Bierley. *R. syn.* ⓧ. VII. VIII.

sylvaticum. 4. MELAMPYRUM floribus secundis lateralibus, conjugationibus remotis, corollis hiantibus. *Sp. pl.* 843. *Fl. dan.* 145.

Melampyrum foliis integerrimis, floribus hiantibus. *Hall. hist.* 307.

Cratægoston album. *Ger. em.* 91.

Cratægoston vulgare. *Park.* 1326.

Anglis, yellow Cow-wheat.

Habitat in sylvis et nemorosis. ⓧ. VI—VIII.

*** *Calycibus quinquefidis.*

P E D I C U L A R I S. 746.

Cal. quinquefidus. *Caps.* bilocularis, mucronata, obliqua. *Sem.* tunicata.

palustris. 1. PEDICULARIS caule ramoso, calycibus calloso-punctatis, corollis labio obliquis. *Sp. pl.* 845.

Pedicularia

Pedicularis caule ramoso, foliis pinnatis, pinnis pinnatis dentatis, calyce bifido. *Hall. hist.* 320.

Pedicularis palustris rubra elatior. *R. syn.* 284.

Pedicularis danica maxima. *Lob. ill.* 147.

Anglis, marsh Louse-wort.

Habitat in pratis et pascuis humidiорibus. 24. VI. VII.

2. PEDICULARIS caule ramoso, calycibus oblongis *sylvatica*.
angulatis lævibus, corollis labio cordato. *Sp. pl.*
845. *Il. W-goth.* 40. *Fl. dan.* 225.

Pedicularis caule ramoso procumbente, foliis pinnatis,
pinnis dentatis. *Hall. hist.* 321.

Pedicularis. *Ger. em.* 1071. pratensis purpurea. *B.*
pin. 163.

Pedicularis pratensis rubra vulgaris. *Park.* 713. *R.*
syn. 284.

Anglis, common Louse-wort.

Habitat in pascuis et ericetis humidis. 24. V.—VII.

ANTIRRHINUM. 750.

Cal. pentaphyllus. *Corollæ* basis deorsum prominens,
nectarifera. *Caps.* bilocularis.

* *Foliis angulatis.*

*1. ANTIRRHINUM foliis cordatis quinquelobis al- *cymbala-*
ternis, caulis procumbentibus. *Sp. pl.* 851. *ria,*

Antirrhinum caule repente, foliis reniformibus quin-
quelobatis. *Hall. hist.* 339.

Linaria hederaceo folio glabro s. Cymbalaria. *R. syn.*
282.

Cymbalaria. *B. pin.* 306. *Cam. epit.* 86.

Anglis, ivy-leaved Toadflax.

Habitat in muris antiquis; circa Londinum frequens.
24. VI.—X.

2. ANTIRRHINUM foliis hastatis alternis, caulis *elatine*.
procumbentibus. *Sp. pl.* 851. *Fl. dan.* 426.

Antirrhinum caule procumbente, foliis hastatis, imis
conjugatis, superioribus alternis. *Hall. hist.* 340.

Linaria Elatine dicta folio acuminato. *R. syn.* 282.

Elatine folio acuminato. *Park.* 553. in basi auricu-
lato, flore luteo. *B. pin.* 253.

Elatine.

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

Elatine. *Cam. epit.* 754. altera. *Ger. em.* 623.

Anglis, sharp-pointed Toadflax or Fluellin.

Habitat in arvis. ○. VII.—IX.

Pharmac. Elatines Herba.

Obs. variat floribus regularibus quinquefidis; calcaribus tribus quatuor aut quinque, ut in Peloria.

spurium. 3. ANTIRRHINUM foliis ovatis alternis, caulis procumbentibus. *Sp. pl.* 851.

Antirrhinum caule procumbente, foliis villosis ovatis, imis conjugatis, superioribus alternis. *Hall. hist.* 341.

Linaria Elatine dicta folio subrotundo. *R. syn.* 282.

Elatine folio subrotundo. *B. pin.* 252. *Park.* 553.

Veronica fœmina. *Cam. ep.* 462. *Dod. pempt.* 42. s. Elatine. *Ger. em.* 625.

Anglis, round-leaved Toadflax or Fluellin.

Habitat in arvis. ○. VII.—IX.

Obs. variat floribus regularibus, &c. ut in præcedenti.

** Foliis oppositis; Florum calcari brevi obtusiusculo.

minus. 4. ANTIRRHINUM foliis plerisque alternis, lanceolatis obtusis, caule ramosissimo diffuso. *Sp. pl.* 852. *Fl. dan.* 502.

Antirrhinum viscidum, foliis inferioribus conjugatis ellipticis obtusis hirsutis, calcare dimidii floris longitudine. *Hall. hist.* 335.

Antirrhinum arvense minus. *B. pin.* 212.

Antirrhinum minimum repens. *Ger. em.* 549.

Antirrhinum sylvestre minimum. *Park.* 1334.

Linaria antirrhinum dicta. *R. syn.* 283.

Anglis, least Toadflax.

Habitat in arvis solo arenoso. ○. VI.—IX.

*** Foliis oppositis; Florum calcari exquisito.

repens. 5. ANTIRRHINUM foliis lanceolato-linearibus confertis; inferioribus verticillatis, caule paniculato, pedunculis spicatis nudis.

Antirrhinum foliis linearibus confertis caule nitido paniculato, pedunculis spicatis nudis. *Sp. pl.* 854.

Linaria

Linaria capillaceo folio, odora. B. pin. 213. pr. 106.

Dill. elth. 199.

Linaria odorata monspessulana. B. hist. III. 456.

*R. syn. *282.*

3 *Antirrhinum foliis linearibus confertis: inferioribus repens.*
quaternis, calycibus capsulæ æqualibus. Sp. pl.
854.

Linaria angustifolia flore cinereo striato. Dill. elth.
198. t. 163. f. 197.

Linaria cærulea foliis brevioribus et angustioribus.
*R. syn. *282.*

Anglis, creeping Toadflax.

Habitat in pratis, pascuis et ad sepes; in Cornubia non
longe ab oppido Penryn occidentem versus; et circa
Henley. R. syn. 4. VII.—IX.

6. **ANTIRRHINUM** foliis sublinearibus: inferioribus *arvense.*
quaternis, calycibus piloso-viscidis, floribus spica-
tis, caule erecto. Sp. pl. 855.

Linaria arvensis cærulea. B. pin. 213. pr. 107. Dill.
elth. 200.

3 *Linaria pumilla, foliolis carnosis, flosculis minimis*
flavis. B. pin. 213. Dill. elth. 200.

Linaria tetraphylla lutea. Col. ecphr. I. 299. t. 300.

Anglis, corn Toadflax.

Habitat in arvis solo arenoso. ○. VI. VII.

7. **ANTIRRHINUM** foliis lanceolato-linearibus con- *linaria.*
fertis, caule erecto, spicis terminalibus sessilibus, flo-
ribus imbricatis. Sp. pl. 858. Fl. suec. 557.

Antirrhinum foliis linearibus adscendentibus congestis,
caule erecto spicato. Hall. hist. 336.

Linaria lutea vulgaris. Ger. em. 550. R. syn. 281.

Linaria vulgaris nostras. Park. 458.

Linaria vulgaris lutea flore majore. B. pin. 212.

2 *Peloria. Amœn. Acad. I. 55. t. 3.*

Anglis, common Toadflax.

Habitat in pratis et pascuis sterilioribus. 4. VII.

Pharmac. Linariæ Herba.

**** *Corollis ecaudatis.*

- majus.* *8. **ANTIRRHINUM** corollis ecaudatis, floribus spicatis, capsulis rotundatis. *Sp. pl.* 859.
Antirrhinum foliis ellipticis obtusis, floribus spicatis, calycibus obtusis, calcare brevissimo. *Hall. hist.* 333.
Antirrhinum purpureum. *Ger. em.* 549.
Antirrhinum majus alterum folio longiore. *B. pin.* 211.
Anglis, greater Toadflax or Snapdragon.
Habitat in muris antiquis; in divis cretaceis prope Dover, et inter Northfleet et Gravesend. ♂. VI. VII.
- erontium.* 9. **ANTIRRHINUM** corollis ecaudatis, floribus subspicatis, calycibus digitatis corolla longioribus. *Sp. pl.* 860.
Antirrhinum foliis ellipticis obtusis, floribus sparsis, calycibus subulatis longissimis, calcare brevissimo. *Hall. hist.* 334.
Antirrhinum angustifolium sylvestre. *B. hist.* III. 464. *R. syn.* 383.
Antirrhinum arvense majus. *B. pin.* 212.
Antirrhinum minus. *Ger. em.* 549.
Antirrhinum sylvestre medium. *Park.* 1334.
Anglis, lesser Toadflax or Snapdragon.
Habitat in arvis, solo arenoso. ♂. VII. VIII.

SCROPHULARIA. 756.

Cal. quinquefidus. *Cor.* subglobosa, resupinata. *Caps.* bilocularis.

- nodosa.* 1. **SCROPHULARIA** foliis cordatis trinervatis, caule obtusangulo. *Sp. pl.* 863.
Scrophularia caule quadrangulari, paniculato, foliis cordato-oblongis. *Hall. hist.* 326.
Scrophularia major. *Ger. em.* 716. *R. syn.* 283.
Scrophularia nodosa fœtida. *B. pin.* 235.
Scrophularia vulgaris. *Park.* 610.

Anglis,

Anglis, common Figwort.

Habitat in sylvis et sepibus humidis. 4. VII.

Pharmac. Scrophulariæ Radix.

2. SCROPHULARIA foliis cordatis petiolatis decurrentibus obtusis, caule membranis angulato, racemis terminalibus. Sp. pl. 864. Fl. dan. 507.

Scrophularia caule quadrangulo alato paniculato, foliis ovato-lanceolatis. Hall. hist. 326.

Scrophularia aquatica major. B. pin. 235. R. syn. 283.

Betonica aquatica. Ger. em. 715. major. Park. 613.

Anglis, water Figwort or Betony.

Habitat in aquosis et ad ripas fluviorum. 4. VII.

Pharmac. Scrophulariæ aquaticæ s. Betonicæ Δ Folia.

3. SCROPHULARIA foliis cordatis duplicato-serratis, scorodonial racemo composito. Sp. pl. 864.

Scrophularia scorodoniae folio. Hort. reg. Bless. Hist. Ox. II. 284. Pet. h. br. t. 35. f. 11. R. syn. 283.

Anglis, balm-leaved Figwort.

Habitat in aquosis et ad sepes, circa St. Ives in Cornubia copiose. 4. VII. VIII.

4. SCROPHULARIA foliis cordatis, pedunculis axillaris vernalibus solitariis dichotomis. Sp. pl. 864. Fl. dan. 411.

Scrophularia foliis longe petiolatis cordatis subhirsutis, petiolis ex alis ramosis. Hall. hist. 327.

Scrophularia flore luteo. Ger. em. 717. B. pin. 236. pr. 112. Park. 610. Riv. 107.

Anglis, yellow Figwort.

Habitat in aquosis et ad sepes; circa Bury, D. Cullum; prope Mitcham in comitatu Surrensi, copiose. 5. IV. V.

DIGITALIS.

Cal. quinquepartitus. Cor. campanulata, quinquefida, ventricosa. Caps. ovata, bilocularis.

1. DIGITALIS calycinis foliolis ovatis acutis, corollis purpureis obtusis: labio superiore integro. Sp. pl. 866. Fl. dan. 74.

T 2

Digitalis

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

Digitalis foliis calycinis ovatis, galea simplici. *Hall. hist.* 330.

Digitalis purpurea. *Fuchs. hist.* 893. *Ger. em.* 790.
R. syn. 283. folio aspero. *B. pin.* 243.

Digitalis purpurea vulgaris. *Park.* 653.

§ *Digitalis* alba folio aspero. *B. pin.* 243.
Anglis, purple Foxglove.

Habitat ad vias et sepes. ♂. VII.

Pharmac. *Digitatis Folia, Flores.*

SIBTHORPIA. 775.

Cal. quinquepartitus. *Cor.* quinquepartita æqualis.

Stam. paribus remotis. *Caps.* compressa, orbicularis, bilocularis: dissipimento transverso.

europaea. I. *SIBTHORPIA* foliis reniformibus subpellatis crenatis. *Sp. pl.* 880. *Læfl. it.* 150.

Chrysosplenium cornubiense. *Pet. h. br. t.* 6. *f.* II.

Alpine spuria pusilla repens foliis saxifragæ aureæ. *R. cat.* *Angl.* *Pluk. ph. t.* 7. *f.* 6. *R. syn.* 352.

Anglis, cornish Sibthorpia or Money-wort.

Habitat in palustribus umbrosis, et ad scaturigines et rivulos in Cornubia et Devonie frequens. Circa Longsledale in Westmorlandia. *Wilf. syn.* 24. VII.—IX.

LIMOSELLA. 776.

Cal. quinquefidus. *Cor.* quinquefida, æqualis. *Stam.* per paria approximata. *Caps.* unilocularis, bivalvis, polyspermia.

aquatica. I. *LIMOSELLA.* *Sp. pl.* 881. *Fl. dan.* 89. *Hall. hist.* 300.

Plantaginella palustris. *B. pin.* 190. *R. syn.* 278.

Spergula perpusilla, lanceolatis foliis. *Læfl. pr.* 261. *ic.* II.

Alpine palustris repens, foliis lanceolatis, floribus perexiguis. *Pluk. ph. t.* 74. *f.* 4.

Anglis, common Mudwort.

Habitat in inundatis et ubi aquæ pluviales stagnant. ♂. VII.—IX.

Classis

Classis XV.

TETRADYNAMIA
SILICULOSA.

* *Silicula integra, nec apice emarginata.*

MYAGRUM. 796.

Silicula stylo conico terminata, loculo submonospermo.

* I. MYAGRUM siliculis obovatis pedunculatis polysativum.
permis. Sp. pl. 894.

Myagrum. Ger. em. 273. R. syn. 302.

Myagrum sylvestre. B. pin. 109. f. Pseudo-myagrum.
Park. 868.

Alyssum foliis sagittatis, siliquis cordiformibus. Hall.
hist. 489.

Anglis, common Myagrum or Gold of Pleasure.

Habitat in agris inter Linum saepe copiose, cum quo ab
exteris terris introducitur; prope Bridport et Lime in
agro Dorsetiensis. O. V. VI.

SUBULARIA. 799.

*Silicula integra, ovata: valvis, ovatis, concavis, dis-
sipimento contrariis. Stylus silicula brevior.*

I. SUBULARIA. Sp. pl. 896. Fl. suec. 566. dan. 35. aquatica
Subularia erecta, junci foliis acutis mollibus. R. syn.

307.

Graminifolia aquatica, thlaspeos capitulis rotundis,
septo medio siliculam dirimente. Pluk. ph. t. 188.
f. 5.

Gramen junceum hybernum, thlaspeos capitulis. Hist.
Oz. III. f. 8. t. 10. f. ult.

Anglis, Awl-wort.

TETRADYNAMIA SILICULOSA.

Habitat *sub aqua*, in lacu Hibernico Lough-Neagh.
R. syn. in *lacubus alpinis circa Llanberis copiose*;
prope Loch Carran in Scotia. D. Hope. ♂. VII.

VELLA. 797.

Silicula dissepimento valvulis duplo majore, extus ovato.

- annua.* 1. VELLA foliis pinnatifidis, siliculis pendulis. Sp. pl. 895.
Nasturtium sylvestre erucæ affine. B. pin. 105. R. syn. 304.
Nasturtium sylvestre valentinum. Clus. hist. II. 130.
B. hist. II. 920. Park. 830.
Eruca nasturtio cognita tenuifolia. Ger. em. 247.
Anglis, annual Cress-rocket.
Habitat on Salisbury-plain, not far from Stonehenge,
Mr. Lawson. R. syn. ♂. VI.

DRABA. 800.

Silicula integra, ovali-oblonga: valvis planiusculis,
dissepimento parallelis. Stylus nullus.

- verna.* 1. DRABA scapis nudis, foliis lanceolatis subincisis.
Sp. pl. 896.
Draba cauliculis nudis, foliis subhirsutis subdentatis.
Hall. hist. 496.
Paronychia vulgaris. Ger. em. 624. R. syn. 292.
Paronychia vulgaris, alines folio. Park. 556.
Bursa pastoris minor loculo oblongo. B. pin. 108.
Anglis, common Whitlow-grass.
Habitat in muris et siccioribus. h. IV.

- muralis.* 2. DRABA caule ramoso, foliis cordatis dentatis amplexicaulibus. Sp. pl. 897. Hall. hist. 499.
Draba minima muralis discoides. Column. ec. 274.
Bursa pastoris major loculo oblongo. B. pin. 108.
pr. 50. R. syn. 292.
Thlaspi veronicæ folio. Park. 843.
Anglis, wall Whitlow-grass.

Habitat

Habitat in fissuris rupium et pascuis montosis et saxosis
principue solo calcareo, in comitatibus Derbiensi, Ebo-
racensi, Westmorlandico, &c. passim. ♂. V.

3. DRABA foliis caulinis numerosis incanis, siliculis incanae.
oblongis obliquis. Sp. pl. 897. Fl. dan. 130.

Lunaria contorta major. Pet. h. br. t. 48. f. 3. R.
syn. 291.

Lunaria vasculo oblongo intorto. Pluk. ph. t. 42.
f. I.

3 Paronychiæ similis sed major, perennis alpina repens.
R. syn. 292.

Anglis, wreathed Whitlow-grass.

Habitat in fissuris rupium calcariarum et pratis montosis
subhumidis, in comitatibus Eboracensi et Westmor-
landico passim et in montibus Arvoniae. ♂. V. VI.

** *Silicula emarginata apice.*

L E P I D I U M. 801.

Silicula emarginata, cordata, polysperma : valvulis
carinatis, contrariis.

1. LEPIDIUM foliis ovato-lanceolatis integris ferratis. *latifolium*,

Sp. pl. 899. Fl. dan. 557. Hall. hist. 505.

Lepidium latifolium. B. pin. 97. R. syn. 304.

Piperitis s. Lepidium vulgare. Park. 855.

Raphanus sylvestris officinarum. Ger. em. 241.

Anglis, broad-leaved Pepperwort or Dittander.

Habitat in pratis et pascuis. Near Hythe, at Colches-
ter; and at Heybridge near Malden, by the water-
side; in the corn betwixt Beningborough and Mitton,
in the north riding of Yorkshire. R. syn. In the
marshes near Grays in Essex. D. Watson; at She-
ringham Cliffs in Norfolk. Mr. Humphrey. 24.
VI. VII.

Pharmac. Lepidii Herba.

2. LEPIDIUM floribus diandris apetalis, foliis radica- ruderale.
libus dentato-pinnatis: ramiferis linearibus inte-
gerrimis. Sp. pl. 900. Fl. dan. 184.

TETRADYNAMIA SILICULOSA.

Nasturtium apetalum; foliis pinnatis, radicalium pin-

nis semipinnatis, caulinis simplicibus. *Hall. hist.* 508.

Nasturtium sylvestre, osyridis folio. *B. pin.* 105.

Park. 829. *R. syn.* 303. capsulis minimis. *Hist.*

Ox. II. 301. *f. 3. c. 19. f. 7.*

Thlaspi minus. *Ger. em.* 269.

Anglis, narrow-leaved Pepperwort or Dittander.

Habitat in maritimis, ruderatis. At Maldon, Essex;

and Yarmouth, Lynne and Clay, in Norfolk. And

Truro, Cornwal. *R. syn.* ♂. VI. VII.

petræum. 3. *LEPIDIUM* foliis pinnatis integerrimis, petalis emar-

ginatis calyce minoribus. *Sp. pl.* 899. *Jac. aust.*

II. 19. t. 131.

Nasturtium foliis pinnatis, radicalibus ovatis, lanceo-

latis, caulinis linearibus. *Hall. hist.* 515.

Nasturtium pumilum vernum. *B. pin.* 105.

Nasturtium petræum annuum. *Pluk. ph.* 206. *f. 4.*

Nasturtiolum montanum annuum tenuissime divisum.

R. syn. 304.

Cardamine pusila saxatilis montana discoides. *Col.*

ec. I. 271. t. 274.

Anglis, mountain Pepperwort.

Habitat in rupibus, saxosis et muris; in rupe St. Vi-

cent's rock dicto et muris circa Bristol passim; ad

Uphill, in agro Somersetsiensi. IV. V.

anglicum. 4. *LEPIDIUM* floribus diandris tetrapetalis, foliis pin-

natifidis, caule procumbente piloso.

Anglis, procumbent Pepperwort.

Habitat in ruderatis, circa Exeter. D. Newbery; circa

Truro et Penryn in Cornubia. ♂. VI. VII.

Desc. Radix annua ramosa. Caules plures, herbacei,

pedales, procumbentes, trigoni, foliati, pilosi, ra-

mosi; Ramis alternis, longis. Folia alterna sessi-

lia, pinnatifida, nuda; Laciniis suboppositis, acutis,

serratis, præcipue margine superiore; dentibus duo-

bus aut tribus. Flores racemosi, minimi, albi, sparsi,

pedunculati; pedunculis horizontalibus, longis.

Racemi laterales, simplices, oppositifolii, folio lon-

giore, pilosi. Cal. Perianthium tetraphyllum, fa-

liolis ovatis, concavis, deciduis, margine tenui. Cor.

tetrapetala. Petala æqualia, ovata, calyce paulo

breviora

breviora. Stam. Filamenta duo, opposita, subulata, calyce longiora. Antheræ subrotundæ, magnæ simplices, flavæ. Pist. Germen obcordatum. Stylus brevissimus; Stigma obtusum. Pericarpium silicula semibifida, lobis subrotundis, compressis, rugosis, bivalvibus. Valvulis navicularibus, carinatis; Dissepimento lanceolato. Sem. solitaria, reniformia utrinque acuta, fusca.

Obs. variat floribus apetalis et subinde tetrandris. Hæc planta *Lepidium bonariense* Lin. Sp. pl. 901. videtur, sed cum *Thlaspi bonariensi*, &c. Dill. elth. 281. t. 286. f. 370. non confundenda, cui folia linearia, serrata.

THLASPI. 802.

Silicula emarginata, obcordata, polysperma: valvulis navicularibus, marginato-carinatis.

1. THLASPI siliculis subrotundis, foliis sagittatis dentatis incanis. *Sp. pl. 903.*

Thlaspi vulgatius. B. hist. II. 921. R. syn. 305.

Thlaspi arvense, vaccariæ folio, majus. B. pin. 106.

Thlaspi vulgatissimum. Ger. em. 262.

Thlaspi mithridaticum s. vulgatissimum, vaccariæ folio. Park. 835.

Anglis, mithridate Bastard-cresse or Mustard.

Habitat in arvis, apricis, solo argilloso et arenoso. ♂.

VI. VII.

Pharmac. Thlaspeos vulgaris semina.

2. THLASPI siliculis subrotundis pilosis, foliis caulinis hirtum. sagittatis villofis. *Sp. pl. 901.*

Thlaspi capsulis hirsutis. B. hist. II. 922.

Thlaspi villosum, capsulis hirsutis. B. pin. 106.

Thlaspi vaccariæ incano folio perenne. R. syn. 305.

Nasturtium foliis imis petiolatis ovatis, caulinis sagittatis dentatis. Hall. hist. 509.

Anglis, hairy Bastard-cresse.

Habitat in montosis Cambrobritanniæ et alibi observavi.

R. syn. ♂. VII.

Obs. habitus præcedenti, sed siliculis villofis.

3. THLASPI siliculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris. *Sp. pl. 901.*

Thlaspi

TETRADYNAMIA SILICULOSA.

- Thlaspi arvense*, siliquis latis. *B. pin.* 105.
Thlaspi *Dioscoridis*. *Ger. em.* 262. *R. syn.* 305.
Thlaspi drabæ folio. *Park.* 836.
Nasturtium siliquis orbiculatis, planis, foliis oblongis
 dentatis glabris. *Hall. hist.* 511.
Anglis, treacle Bastard-cress or Mustard.
Habitat in agris, solo lutoſo paſſim. ○. VI. VII.
Pharmac. *Thlaspeos semina.*

olpestre. 4. *THLASPI* filiculis obcordatis, foliis subdentatis &
 caulinis amplexicaulibus, petalis longitudine caly-
 cis, caule simplici. *Sp. pl.* 903.

Lepidium caule erecto, foliis radicalibus ovatis petiolati,
 caulinis ovatis amplexicaulibus. *Hall. hist.* 519.

Thlaspi vaccariæ folio, bursæ pastoris siliquis. *B. pin.*
 105. *pr.* 47.

Thlaspi minus Clufii. *Ger. em.* 268.

Thlaspi pumilum II. *Cluf. hist.* II. 31.

Anglis, perfoliate Bastard-cress.

Habitat in pratis et paſciuis montofis et ſaxofis ſolo calcareo.
Among the ſtone-pits between Whitney and Burford,
Oxfordshire; on the moist limestone pastures in York-
shire, Westmorland and Cumberland. *R. syn.* ○.
 V. VI.

Obs. Caule erecto simplici in montofis; ramoso in hortis et
ſolo fertiliore. Folia ima petiolata ovata: an Conf.
Thlaspi perfoliatum.

monta-
num. 5. *THLASPI* filiculis obcordatis, foliis glabris, radica-
 libus carnosis obovatis integerrimis, caulinis am-
 plexicaulibus corollis calyce majoribus. *Sp. pl.*
 903. *Jac. aust.* II. 22. t. 237.

Lepidium caule erecto foliis radicalibus petiolatis ova-
 tis, caulinis amplexicaulibus, sagittatis. *Hall. hist.*
 518.

Thlaspi montanum, glasti folio minus. *Park.* 842.

Thlaspi alpinum bellidis cæruleæ folio. *B. pin.* 106.

Thlaspi foliis globulariæ. *B. hist.* II. 926. *R. syn.*
 305.

Thlaspeos albi supini varietas. *Ger. em.* 268.

Anglis, mountain Bastard-cress.

Habitat

Habitat in pascuis montosis. About the ebbing and flowing well, near Settle, and between Malham and Settle; and on Ingleborough-hill, Yorkshire, et in Poco Derbiensi. ♂. f. 4. VI. VII.

6. THLASPI siliculis obcordatis, foliis radicalibus pin-natifidis. Sp. pl. 905. *Bursa pastoris.*
Nasturtium siliquis triangularibus. Hall. hist. 514.
Bursa pastoris. B. hist. II. 936. Ger. em. 276. R. syn. 306. major folio sinuato. B. pin. 108.
Bursa pastoris major vulgaris. Park. 866.
Bursa pastoris minor foliis integris. Cels. upf. 13.
Anglis, common Bastard-cress or Shepherd's-purse.
 Habitat in agris, ruderatis, viis. ♂. III.—IX.
 Pharmac. *Bursæ pastoris Herba.*

C O C H L E A R I A. 803.

Silicula emarginata, turgida, scabra: valvulis gibbis, obtusis.

1. COCHLEARIA foliis radicalibus subrotundis, cau-linis oblongis subsinuatis. Sp. pl. 903. Fl. dan. 135.
Cochlearia. B. hist. II. 942. R. syn. 302. rotundi-folia. Ger. em. 401. f. Batavorum. Park. 285,
Cochlearia folio subrotundo. B. pin. 110.
 β *Cochlearia minor rotundifolia nostras.* Park. 286.
 γ *Cochlearia foliis reniformibus carnosis integerrimis.* groen-Sp. pl. 904. landica.
Cochlearia rotundifolia. Mer. pin. R. syn. 302.
Cochlearia minima ex montibus Walliae. Boerb. ind. alt. 10.
Anglis, common or Garden Scurvy-grass.
 Habitat in littoribus maritimis et in montosis. Near Castleton in the Peak, upon Penigent and Ingleborough-hills, upon Stanemore in Yorkshire, in Cornubia frequens, γ in montibus Arvonie; juxta Llan-berris copiose. ♂. ♂. IV. V.
 Pharmac. *Cochleariae Herba.*

- anglica.* 2. COCHLEARIA foliis omnibus ovato-lanceolatis sinuatis. *Fl. angl.* 248. *Sp. pl.* 903. *Fl. dan.* 329.
Cochlearia folio sinuato. *B. pin.* 110. *R. syn.* 303.
Cochlearia vulgaris. *Park.* 285.
Cochlearia britannica. *Ger. em.* 401.
Anglis, sea Scurvy-grass.
Habitat in littoribus maritimis solo lutoſo. ♂. V.
Pharmac. *Cochleariae marinæ s. britannicæ Herba.*
Obs. *An varietas præcedentis?*
- danica.* 3. COCHLEARIA foliis omnibus deltoidibus. *Fl. dan.* 100.
Cochlearia foliis hastatis angulatis. *Sp. pl.* 905.
Cochlearia marina folio anguloſo parvo. *R. syn.* 303.
Thlaspi hederaceum. *Lob. ic.* 615.
Anglis, danish Scurvy-grass.
Habitat in littoribus marinis. *In insula Walney, Lancastriæ;* near Llanbadrick church in Anglesea. Mr. Llhyd. *R. syn.* ♂. V. VI.
- coronopus.* 4. COCHLEARIA foliis pinnatifidis. *Sp. pl.* 904. *Fl. dan.* 202. *suec.* 579.
Coronopus. *Ruel.* 373. *Ger. em.* 427. *Hall. hist.* 502.
recta vel repens Ruellii. *Park.* 502.
Nasturtium supinum capsulis verrucosis. *R. syn.* 304.
Ambrosia campestris repens. *B. pin.* 138.
Anglis, swine's Scurvy-grass or Cressle.
Habitat in ruderatis et ad vias. ⊖. VI.—VIII.
- armora-* 5. COCHLEARIA foliis radicalibus lanceolatis cre-
cia. natis, caulinis incisis. *Sp. pl.* 904. *Hall. hist.* 504.
Raphanus rusticus. *Ger. em.* 241. *Park.* 860.
B. pin. 96. *R. syn.* 301.
Anglis, horse Scurvy-grass or Radish.
*Habitat in ruderatis et ad fossas; circa Londinum fre-
quens; about Alnwick and elsewhere in Northumber-
land; upon the banks of Skipton-beck, and elsewhere
in Bolland Craven.* *R. syn.* 24. V.
Pharmac. *Raphani rusticani Radix,*

IBERIS.

IBERIS. 804.

Cor. irregularis: petalis duobus exterioribus majoribus. Silicula polysperma emarginata.

*1. IBERIS herbacea foliis lanceolatis acutis subdentatis, *amara*. floribus racemosis. *Sp. pl. 906.*

Iberis foliis dilatatis dentatis, floribus umbellatis. *Hall. hist. 520.*

Thlaspi umbellatum arvense iberidis folio. *B. pin. 106.*

Thlaspi amarum. *Tab. ic. 462. Gér. em. 263.*

Anglis, bitter Candy-tuft.

Habitat in arvis circa Henley et alibi comitatu Oxoniensi. ♂. VI. VII.

2. IBERIS herbacea foliis sinuatis, caule nudo simplici. *nudicaulis.* *Sp. pl. 907. It. øland. 139. Fl. dan. 322.*

Iberis foliis pinnatis, pinnis acutis. *Hall. hist. 521.*

Bursa pastoris minor. *Ger. em. 251. Park. 806. foliis incisis. B. pin. 108.*

Anglis, naked Candy-tuft or Rock-cress.

Habitat in glareosis et ericetis sterilissimis; near Hampton-court, Richmond and Barnes commons. R. syn. in ericeto Putnejano. D. Ph. Miller. ♂. V. et VII.

Obs. variat caule erecto et procumbente nudo et folioso, foliis duobus tribusve oblongis integris.

S. I L I Q U O S A.

* *Calyx clausus: foliolis longitudinaliter conniventibus.*

D E N T A R I A. 811.

Siliqua elastice defiliens valvulis revolutis. Stigma emarginatum. Cal. longitudinaliter connivens.

DENTARIA foliis inferioribus pinnatis, summis bulbifera. simplicibus. *Sp. pl. 912. Fl. dan. 367. Hall. hist. 470.*

Dentaria

TETRADYNAΜIA SILIQUOSA.

Dentaria bulbifera. Ger. em. 984.

Dentaria heptaphylla baccifera. B. pin. 322.

Coralloides. Gord. hist. 151.

Anglis, bulbiferus Coral-wort.

Habitat in sylvis et umbrosis. In old Park wood, near Harefield, Blackf. fasc. 23. in silvis inter Beconfield et Wickham copiose. 4. IV. V.

ERYSIMUM. 814.

Siliqua columnaris exaepte tetraedra. Cal: clausus.

officinale. 1. ERYSIMUM siliquis spicæ adpressis foliis runcinatis. Sp. pl. 922. Fl. dan. 260.

Erysimum foliis pinnatis, pinnis rectangularibus, acutis extrema triangulari maxima, siliquis adpressis. Hall. hist. 878.

Erysimum vulgare. B. pin. 298.

Erysimum Dioscoridis Lobelio. Ger. em. 254.

Irio I. Tabern. 448. f. Erysimum. Dod. pent. 714. Lob. ic. 206. vulgare. Park. 833.

Eruca hirsuta, siliqua caule appressa; Erysimum dicta. R. syn. 298.

Anglis, common Hedge-mustard.

Habitat in ruderatis et ad vias. O. V. VI.

Pharmac. Erysimi Herba.

barbarea. 2. ERYSIMUM foliis lyratis: extimo subrotundo. Sp. pl. 922.

Erysimum foliis pinnatis, pinna extrema maxima subrotunda. Hall. hist. 479.

Eruca lutea latifolia f. Barbarea. B. pin. 98. R. syn. 297.

Barbarea. Dod. pent. 712. Ger. em. 243. B. hist. II. 868. flore simplici. Park. 819.

Barbarea foliis minoribus et frequentius sinuatis. R. syn. 297. hist. 809.

Anglis, winter Hedge-mustard or Cresse.

Habitat in palustribus et ad fossas. 4. V.

alliaria. 3. ERISYUM foliis cordatis. Sp. pl. 922. Hall. hist. 480.

Alliaria.

Alliaria. *Cam. ep.* 515. *Ger. em.* 796. *Park.* 112.
B. pin. 110.

Hesperis alliumredolens. *Hist. Ox.* II. 252. *R. syn.* 293.
Anglis, stinking Hedge-mustard or Sawce-alone.
Habitat in *sepibus et umbrosis*. *q. V.*

4. ERYSIMUM foliis lanceolatis dentatis, siliquis erectis cheiranthoides.

Erysimum foliis lanceolatis integerrimis, siliquis patulis. *Sp. pl.* 923. *Hall. hist.* 477.

Myagro affinis planta siliquis longis. *B. hist.* II. 894.
R. syn. 298.

Myagrum siliqua longa. *B. pin.* 109.

Camelina. *Ger. em.* 273. f. *myagrum* alterum amarum. *Park.* 867.

Anglis, treacle Hedge-mustard or Wormseed.

Habitat in *insula Eliensi*, in *Salicetis prope urbem Ely* copiose; item prope *Ashburn oppidum in Poco Derbyensi dicto*; in the corn-fields about *Elden, Suffolk*, *R. syn.* O. VII.

CHEIRANTHUS. 815.

Germen utrinque denticulo glandulato. *Cal.* clausus: foliolis duobus basi gibbis. *Sem.* plana.

5. CHEIRANTHUS foliis lanceolatis integerrimis siliquis tetragonis. erysimoides.

Cheiranthus foliis lanceolatis dentatis nudis, caule erecto, siliquis tetragonis. *Sp. pl.* 923.

Hesperis foliis linearibus lanceolatis, obiter dentatis, siliquis erectis tetragonis. *Hall. hist.* 450.

Leucojum sylvestre. *Clus. hist.* I. 299. *Ger. em.* 457.

Leucojum luteum sylvestre angustifolium. *B. pin.* 202.

Anglis, wild Stock or Wall-flower.

Habitat in *salicetis circa Godstow, prope Oxford*. D. Perrin; prope East-Grinstead in *comitatu Sussexensi*. ♂. VI. VII.

6. CHEIRANTHUS foliis lanceolatis acutis glabris, ramis angulatis. *Sp. pl.* 924. *carde fruticoso*. *Syst. nat.* 441.

Leucojum

TETRADYNAMIA SILIQUOSA.

- Leucojum foliis glabris lanceolatis, integerrimis. *Hall. hist. 443.*
 Leucojum luteum, vulgo Cheiri flore simplici. *B. hist. II. 872. R. syn. 291.*
 Leucojum luteum vulgare. *B. pin. 202.*
 Viola lutea. *Ger. em. 456.*
 Keira s. Leucojum vulgare luteum. *Park. 625.*
Anglis, wall Stock or Flower.
 Habitat in muris antiquis. *4. V.*
 Pharmac. Cheiri Flores.

- sinuatus.* 3. CHEIRANTHUS foliis tomentosis obtusis subsinuatis : rameis integris, siliquis muricatis. *Sp. pl. 926.*
 Leucojum maritimum sinuato folio. *B. pin. 201.*
 Leucojum marinum majus. *Park. 622. R. syn. 291.*
Anglis, sea Stock.
 Habitat in littoribus maritimis arenosis, Walliae et Cornubiæ. *6. V. VI.*

H E S P E R I S. 817.

Petala oblique flexa. Glandula intra stamina breviora.
Siliqua stricta. Stigma basi bifurca apice connivente.
Cal. clausus.

- inodora.* 1. HESPERIS caule simplici erecto, foliis subhaftatis dentatis, petalis obtusis. *Sp. pl. 927.*
 Hesperis caule hirsuto, foliis subasperis ovato-lanceolatis serratis petiolatis. *Hall. hist. 191.*
 Hesperis sylvestris inodora. *B. pin. 202. R. syn. 293.*
Rupp. jen. 78. t. 1.
 Hesperis pannonica inodora. *B. hist. II. 878. Park. 628.*
Anglis, wild Rocket, or Dame's-violet.
 Habitat in pascuis et ad sepes. *On the banks of the rivers about Dalehead and Grassmire, Westmorland.*
R. syn. 3. V. VI.
 Obs. Foliis ovatis, dentato-serratis, acutis, subsessilibus, hastatis non vidi. nimis affinis *H. matronali.*

R A P H A N U S. 822.

Cal. clausus. Siliqua torosa, subarticulata, teres. Glan-
dulæ

dulæ melliferæ duo inter stamina breviora et pistilum, totidem inter stamina longiora et calycem.

1. RAPHNUS siliquis teretibus articulatis lævibus unicellularibus. *Sp. pl.* 935. *Hist. 463.* *Raphanistrum.*
Raphanus sylvestris. *Ger. em.* 240.
Raphanistrum siliqua articulata glabra, majore et minore. *Hist. Ox. II.* 265. *R. syn.* 296.
Rapistrum album articulatum. *Park.* 863.
Rapistrum flore albo siliqua articulata. *B. pin.* 95.
 2 *Rapistrum flore luteo siliqua articulata.* *R. syn.* 296.
 2 *Raphanus maritimus flore luteo, siliquis articulatis.*
R. syn. 296.

Anglis, corn Radish, or Charlock.

Habitat inter segetes. *◎. VI. VII.*

BRASSICA. 820.

Cal. erectus, connivens. Sem. globosa. Glandula inter stamina breviora et pistillum, interque longiora et calycem.

1. BRASSICA radice caulescente tereti carnosa. *Sp. pl. oleracea.*
932.
Brassica maritima arborea s. procerior ramosa. *Hist. sylvestris.*
Ox. II. 208. *R. syn.* 293.
Brassica radice alba. *Tourn.* 219.
Anglis, sea Cabbage. *Pet. h. br. t. 45. f. 6.*
Habitat in clivis maritimis. *On Dover Cliffs, &c. R.*
syn. prope castellum Harleck in comitatu Mervinia, et
Penzance et alibi in Cornubia. *h. V. VI.*

2. BRASSICA radice caulescente orbiculari depresso carnosâ. *Rapa.*
Sp. pl. 931.
Rapa sylvestris. *B. hist.* 800.
Rapa sativa rotunda. *B. pin.* 89. *R. syn.* 294.
Rapum majus. *Ger. em.* 232.
 2 *Rapa sativa oblonga s. fæmina.* *B. pin.* 90.
Anglis, Turneps.
Habitat in arvis et ad margines agrorum, *♂. IV.*
Pharmac. *Rapi Radix, Semina.*

- Napus.* 3. BRASSICA radice caulescente fusiformi. *Sp. pl.* 931.
Napus sylvestris: *B. pin.* 95. *R. syn.* 295.
Bunias seu Napus sylvestris nostras. *Park.* 865.
Bunias sylvestris Lobelii. *Ger. em.* 235.
Anglis, wild Cabbage, Rape, Nape, or Navew.
Habitat in aggeribus fossarum et inter segetes. ♂. V.
- campestris.* 4. BRASSICA radice cauleque tenui, foliis caulinis uniformibus cordatis sessilibus. *Sp. pl.* 931. *Jac. austr.* III. 45. t. 283.
Brassica campestris perfoliata flore luteo. *Loes prus.* 29.
Eruca foliis ovatis integerrimis amplexicaulibus. *Hall. hist.* 457.
Perfoliata siliquosa. *Ger. em.* 536. *B. hist.* 335.
Perfoliata siliquosa vulgaris f. *Brassica campestris.* *Park.* 580.
Anglis, field Cabbage.
Habitat in arvis et clivis maritimis prope Harvicum oppidum in Essexia, et in clivis juxta Bardsey prope Orford in Suffolcia a D. Dale. *R. syn.* ☽. VI.
Obs. Folia radicalia, oblonga, sinuata, obtusa, scabra;
Flores lutei, aut albi.
- orientalis.* 5. BRASSICA foliis cordatis amplexicaulibus glabris radicalibus scabris integerrimis, siliquis tetragonis. *Sp. pl.* 931. *Jac. austr.* III. 45. t. 282.
Brassica campestris perfoliata flore albo. *B. pin.* 112.
Brassica orientalis perfoliata, flore albo, siliqua quadrangula. *Tourn. cor.* 16.
Anglis, perfoliate Cabbage.
Habitat in arvis et clivis maritimis; inter segetes prope Godstone et Marshfield in Sussexia. ☽. VI.
Obs. nimis affinis praecedenti; Flores albi.
- muralis.* 6. BRASSICA foliis lanceolatis sinuato-serratis læviusculis, caule erecto glabro.
Sisymbrium subacaule, foliis lanceolatis sinuato-serratis læviusculis, scapis subscabris adscendentibus. *Sp. pl.* 918.
Eruca sylvestris. *Ger. em.* 246. *R. syn.* 296. *vulgator.* *Park.* 818.

Eruca

Eruca sylvestris major vulgatior fructens. *Hist. Ox. II.*

230.

Eruca viminea iberidis folio, flore luteo. *Barr. pl. rar. 421. ic. 131.*

Anglis, wall Cabbage, or wild Rocket.

Habitat in muris antiquis; circa Londinum, Exeter, Chester, Bristol, et alibi in Anglia frequens. 4. V. —VII.

7. BRASSICA foliis pinnatifidis, pinnis inciso-ferratis, monensis. caule subnudo procumbente.

Sisymbrium acaule, foliis pinnato-dentatis subpilosus. Sp. pl. 918. Ger. gallopr. 360.

Eruca monensis laciniata lutea. R. syn. 297.

Eruca monensis laciniata flore luteo majore. Dill. elth.

135. t. III. f. 135.

Anglis, procumbent Cabbage, or Rocket.

Habitat in littoribus maritimis arenosis. Found by Mr. Lawson in Sella-field, Seabank, Cumberland; in the isle of Walney; by Mr. Llhwyd, near Abermeny ferry, in Anglesea. R. syn. in littoribus maritimis Scotiæ et in Insulis Bute, Skye, &c. ♂. 4. V.

Obs. Caules Foliaque pilis rari adspersi sunt.

TURRITIS. 819.

Siliqua longissima, angulata. Cal. connivens, erectus.
Cor. erecta.

1. TURRITIS foliis radicalibus dentatis hispidis; cau- glabra. linis integerrimis amplexicaulibus glabris. Sp. pl.

930. Hall. hist. 453.

Turritis. Ger. em. 272. R. syn. 293. vulgatior. B. hist. II. 836.

Brassica sylvestris foliis circa radicem cichoraceis. B. pin. 112.

Anglis, smooth Tower-mustard.

Habita in pratis et pascuis glareosis. prope Charleton, et Lewsham in Cantio, near Colchester, Mr. Newton. ♂. V. VI.

2. TURRITIS foliis omnibus hispidis; caulinis am- hirsuta. plexicaulibus. Sp. pl. 931.

U 2

Turritis

TETRADYNAMIA SILIQUOSA.

- Turritis muralis minor. *Pet. h. br. t. 47. f. 12. R.*
syn. 294.
- Erysimo similis hirsuta, non laciniata alba. *B. pin.*
101. pr. 101. ic.
- Erysimo similis hirsuta planta. *Park. 834.*
Anglis, rough Tower-mustard.
- Habitat in rupibus, saxosis et muris antiquis. In Swi-
 tham-bottom prope Croydon. *q. VI.*

ARABIS. 818.

Glandulæ nectariferæ quatuor, singulæ intra calycis fo-
liola, squamæ instar reflexæ.

- thaliana.* I. ARABIS foliis petiolatis lanceolatis integerrimis. *Sp.*
pl. 929.
- Arabis foliis radicalis petiolatis, ovatis, dentatis, caule
 subnudo ramoso. *Hall. hist. 452.*
- Turritis vulgaris ramosa. *Tourn. 224. R. syn. 294.*
- Bursæ pastoris similis siliquosa major et minor. *B.*
pin. 108.
- Paronychia major et altera minor. *Park. 556.*
- β Turritis minor foliosa. *Pet. h. br. t. 48. f. 2.*
Anglis, common Wall-Cress.
- Habitat in muris, tectis et pascuis arenosis et aridis. *○. V.*

- striata.* 2. ARABIS foliis dentatis hispidis : radicalibus spatula-
 tis, caulinis semiamplexicaulibus oblongis, siliquis
 ancipitibus erectis.

Arabis multicaulis, foliis radicalibus scabris dentatis,
 dentibus ciliatis. *Hall. nom. et hist. 453.*

Hesperis alpina minor, flore albo, siliquis longis. *R.*
syll. Stirp. exter. 296.

Anglis, rough Wall-cress.

Habitat in rupibus et saxosis montosis. In rupe St. Vin-
 centii prope Bristol. *○. V.*

Desc. Radix annua, ramosa. Caules plures, semipedales,
 herbacei, erecti, teretes, basi villosi, supra glabri, sim-
 plices. Folia radicalia plurima, spatulata, dentata et
 inciso-dentata, hispida aut piloso-scabra : pilis longis, al-
 bis. Caulina tria aut quatuor, semiamplexicaulia, ob-
 longa, dentata, hispida. Flores racemosi, pedunculati,
 magni, albi ; pedunculis brevibus. Petala obovata inte-
 gerrim &

gerrima calyce duplo longiora. Siliquæ erectæ, striatæ sesquipolligares, ancipites, basi quadrangulæ, striatæ. Semina subrotunda, fusca.

3. ARABIS foliis amplexicaulibus, siliquis decurvis planis linearibus, calycibus subrugosis. *Turrita.* Sp. pl. 930. Fl. dan. 62.

Brassica sylvestris foliis integris et hispidis. *B. pin.* Hist. Ox. II. 211. f. 3. t. 2. f. 23.

Brassica sylvestris, albido flore, nutante siliqua. *Bocc. mus.* II. 81. t. s. 72. Barr. pl. rar. 353.

Turrita major plateau. *Clus. hist. II.* 126.

Anglis, tower Wall-Cressle.

Habitat in muris antiquis et saxosis. On Trinity and St. John's College Walls, Cambridge. Dr. Martyn. O. VI.

** *Calyx bians* : foliolis superne distantibus.

CARDAMINE. 812.

Siliqua elastice diffiliens valvulis revolutis. Stigma integrum. Cal. subhians. Glandulæ nectariferæ duæ, una utrinque inter stamina breviora et calycem.

* *Foliis simplicibus.*

1. CARDAMINE foliis simplicibus ovatis integerrimis: bellidifolia. petiolis longis. Sp. pl. 913. Fl. dan. 20.

Cardamine pumila bellidis folio, alpina. Ger. em. 260.

Plantula cardamines alterius æmula Clusii. Park. 828.

Nasturtium alpinum bellidis folio minus. B. pin. 105.

Anglis, daisie Ladies-smock.

Habitat in rupibus et saxosis alpinis. In variis locis juxta Rippon ad monasterium ejus et in Denbighshire. Merr. pin. on St. Vincent's-rock, near Bristol. R. syn. circa Denbeigh. R. it. 4. IV. V.

2. CARDAMINE foliis simplicibus oblongis dentatis. petræa. Sp. pl. 913. Fl. dan. 386. suec. 591.

Cardamine petræa cambrica, nasturtii facie. Dill. elth. 70. t. 61. f. 71.

TETRADYNAMIA SILIQUOSA.

Nasturtium petræum. *Merc. bot. Pluk. ph. t. 101. f.*
3. *R. syn. 300.*

Anglis, mountain Ladies-smock.

Habitat in excelsis rupibus Arvoniæ; in rupibus uidis super lacum Llyn-dû copiose. D. Lhwyd. 24. V. VI.

** *Foliis pinnatis.*

pratense. 3. CARDAMINE foliis pinnatis: foliolis radicalibus subrotundis, caulinis lanceolatis. *Sp. pl. 915.* integrimis.

Cardamine foliis pinnatis, radicalibus subrotundis caulinis linearibus. *Hall. hist. 473.*

Cardamine. *Ger. em. 259. R. syn. 299.*

Nasturtium pratense majus s. Cardamine latifolia.
Park. 825.

Nasturtium pratense magno flore. *B. pin. 104.*

Flos cuculi. *Dod. pempt. 592.*

Anglis, common Ladies-Smock, or Cuckow-flower.

Habitat in pratis et pascuis humidiisculis. 24. IV. V.

Pharmac. *Cardamines Herba, Flores.*

amara. 4. CARDAMINE foliis pinnatis, axillis stoloniferis.
Sp. pl. 915.

Cardamine foliis pinnatis, subrotundis angulofisis. *Hall. hist. 474.*

Cardamine flore majore elatior. *Tourn. 224. R. syn. 299.*

Nasturtium aquaticum majus et amarum. *B. pin. 104.*

Anglis, bitter Ladies-Smocks, or Cresse.

Habitat in pratis et pascuis humidis, circa Lewsham D. Alchorne; by the river side at Harefield, and about Uxbridge plentifully. Blackf. *in salicetis prope Battersea.* 24. IV. V.

impatiens. 5. CARDAMINE foliis pinnatis, petiolis basi dilatatis dentatis, foliolis lanceolatis dentatis.

Cardamine foliis pinnatis incisis stipulatis, floribus apetalis. *Sp. pl. 914.*

Cardamine foliis pinnatis, imis obtuse lobatis, caulinis acute dentatis, floribus apetalis, *Hall. hist. 471.*

Cardamine

Cardamine impatiens, vulgo *Sium minus impatiens*.

Ger. em. 260. R. syn. 299.

Sium minimum, *Noli me tangere dictum*. s. *impatiens nasturtii sylvestris folio*. *Park. 1241.*

Anglis, impatient Ladies-smock.

Habitat in pratis montosis ad rivulos et in rupibus et saxosis humidiusculis; in comitatibus Derbiensi, Eboracensi, Westmorlandico, etc. ⊖. V.

Obs. *Foliola radicalia subinde profunde incisa; petiolis communis basi membranaceo-dilatatis, dentatis et incisis, Flores petaliferi, et apetali; Petalis oblongis calyce vix longioribus, albis, fugacissimis.*

6. **CARDAMINE** foliis pinnatis, foliolis radicalibus *hirsuta*, subrotundo-cordatis, caulinis ovatis, dentatis petiolatis.

Cardamine foliis pinnatis, floribus tetrandris. Sp. pl. 915. Fl. dan. 184.

Cardamine foliis pinnatis hirsutis, pinnis subrotundis staminibus quaternis. Hall. hist. 472.

Cardamine impatiens altera hirsutior. R. syn. 300.

Nasturtium aquaticum minus. B. pin. 104.

Sisymbrium aquaticum alterum. Cam. epit. 270.

ε *Cardamine foliis pinnatis exstipulatis, foliolis lanceo-parvifloratis obtusis, floribus corollatis. Sp. pl. 914. ra.*

Cardamine pratensis, parvo flore. Tourn. 224.

Cardamine IV. Dalechampii. Lugd. hist. 654.

Nasturtium pratense parvo flore. B. pr. 44.

Anglis, hairy Ladies-Smock.

Habitat in pratis et pascuis et umbrosis humidis passim. ⊖. 4. IV. V. VI.

Obs. *Caulis villosus præcipue versus basin, Foliola omnia petiolata; radicalia subrotunda; caulina cordato-ovata et ovata, utrinque denticulata uno-alterove dente, pilosa; pilis rarissimis; in β superiora nuda. Flores tetrandri et tetradynamii sunt.*

SISYMBRIUM. 813.

Siliqua dehiscens valvulis rectiusculis. Cal. patens.
Corolla patens.

TETRADYDYNAMIA SILIQUOSA.

- Nasturti-* 1. **SISYMBRIUM** siliquis declinatis, foliis pinnatis,
um. foliolis subcordatis. *Sp. pl.* 916.
aquati- **Sisymbrium** foliis pinnatis, pinnis subrotundis, spicis
cum. sessilibus. *Hall. hist.* 482.
Sisymbrium cardamine f. *Nasturtium aquaticum*. *B.*
hist. II. 884. *R. syn.* 300.
Nasturtium aquaticum supinum. *B. pin.* 104.
Nasturtium aquaticum vulgare. *Park.* 1239.
Nasturtium aquaticum f. *cratevæ* sium. *Ger. em.* 257.
β *Nasturtium aquaticum* pinnulis paucioribus. *R. syn.*
300.
γ *Nasturtium aquaticum* foliis minoribus præcotius.
R. syn. 301.
Anglis, common Water-cress.
Habitat in aquosis et rivulis. σ. VI. VII.
Pharmac. *Nasturtii aquatici Herba*.
- sylvestre.* 2. **SISYMBRIUM** siliquis declinatis, foliis pinnatis, fo-
liolis lanceolatis ferratis. *Sp. pl.* 916.
Sisymbrium foliis pinnatis, pinnis dentatis diffitis.
Hall. hist. 485.
Eruca aquatica. *Ger. em.* 248. *Park.* 1242. *R. syn.*
297.
Eruca sylvestris. *Fuch.* 263. minor, luteo parvoque
flore. *B. pin.* 98.
Anglis, wild Water-cress, or Rocket.
Habitat in palustribus et aquosis et ad ripas fluviorum.
In Tothil-fields. Blacks. ad ripam Thamesis fre-
quens. τ. VI. VII.
- amphibi-* 3. **SISYMBRIUM** siliquis declinatis oblongo-ovatis,
um. foliis pinnatifidis ferratis. *Sp. pl.* 917.
palustre. α **Sisymbrium** foliis pinnatifidis ferratis. *Fl. suec.* 551.
Radicula foliis pinnatis, pinnis dentatis, petalis calyce
brevioribus. *Hall. hist.* 487.
Raphanus aquaticus foliis in profundas lacinias divisis.
B. pin. 97. *pr.* 38. *R. syn.* 301.
aquati- β **Sisymbrium** foliis simplicibus dentatis ferratis. *Fl. suec.*
cum. 550.
Radicula foliis integris aut pinnatifidis, petalis calyce
longioribus. *Hall. hist.* 486.
Raphanus aquaticus alter. *B. pr.* 38. *Park.* 1229.
Rapistrum

TETRADYNAMIA SILIQUOSA.

297

Rapistrum aquaticum. Tab. ic. 408. Ger. em. 240.

✓ *Sisymbrium aquaticum* foliis variis. Vaill. paris. 135. terrestre.
Anglis, amphibious Water-cress, or Radish.

Habitat in aquosis et ad ripas fluviorum. 4. VI—VIII.

4. *SISYMBRIUM* foliis runcinatis dentatis nudis, caule lœvi, siliquis erectis. Sp. pl. 922. *Irio*.

Erysimum latifolium majus glabrum. B. pin. 101.

Erysimum latifolium neapolitanum. Park. 834. R. syn. 298.

Irio lœvis Apulas, erucæ folio. Col. ecphr. I. 264.

Anglis, broad-leave Water-cress, or Hedge Mustard.

Habitat in ruderatis et muris antiquis; circa Londinum frequens. ◎. V—VIII.

5. *SISYMBRIUM* petalis calyce minoribus, foliis de-composito-pinnatis. Sp. pl. 920. Fl. dan. 528. *Sophia*.

Sisymbrium pinnis et pinnulis foliorum pinnatis, laci-niis linearibus subhirsutis. Hall. hist. 484.

Erysimum Sophia dictum. R. syn. 298.

Sophia chirurgorum. Ger. em. 1068. Park. 830.

Nasturtium sylvestre tenuissime divisum. B. pin. 105.

Anglis, Flix-weed.

Habitat in maceriis, ruderatis, frequens. ◎. VII.

Pharmac. Sophiæ Semina.

SINAPIS. 821.

Cal. patens, Cor. unguis recti. Glandula inter sta-mina breviora et pistillum, interque longiora et calycem.

1. *SINAPIS* siliquis glabris apice tetragonis racemo ad-nigra. pressis. Syst. Nat. 448. Sp. pl. 933. Hall. hist. 465.

Sinapi rapi folio. B. pin. 99.

Sinapi sativum secundum. Ger. em. 243. R. syn. 295.

Sinapi siliqua latiuscula glabra, semine rufo s. vulgare. B. hist. II. 885.

Anglis,

TETRADYNAMIA SILIQUOSA.

Anglis, common Mustard.

Habitat in arvis, aggeribus fossarum et juxta vias. ◎ VI.

Pharmac. Sinapis Semina.

alba.

2. SINAPIS siliquis hispidis: rostro obliquo longissimo.

Sp. pl. 933. Hall. hist. 466.

Sinapi apii folio. *B. pin. 99.*

Sinapi album. *Ger. em. 244. siliqua hirsuto, semine albo vel rufo. B. hist. II. 856. R. syn. 295.*

Anglis, white Mustard.

Habitat in agris et ad vias. ◎ VIII.

Pharmac. Sinapis albi Semina.

arvensis.

3. SINAPIS siliquis multangulis toroso-turgidis rostro longioribus. *Sp. pl. 933. Hall. hist. 467.*

Rapistrum arvorum. *Ger. em. 233. Park. 862. R. syn. 295.*

Rapistrum flore luteo. *B. pin. 95. hist. II. 844.*

Anglis, wild Mustard, or Charlock.

Habitat in arvis et marginibus agrorum. ◎ V.

BUNIAS. 823.

Siliqua decidua, tetraëdra, angulis inæqualibus acuminatis, muricata.

cakile.

1. BUNIAS siliquis ovatis lœvibus ancipitibus. *Sp. pl. 936.*

Crambe foliis succulentis linearibus pinnato-dentatis. *Sauv. mons. 280.*

Cakile quibusdam, alijs Eruca marina et Raphanus marinus. *B. hist. II. 867. R. syn. 307.*

Eruca marina. *Ger. em. 248. anglica. Park. 821.*

Eruca maritima italicica, siliqua hastæ cuspidi simili. *B. pin. 99.*

Anglis, sea Bunias, or Rocket.

Habitat in littoribus maritimis passim. ◎ VI.

ISATIS. 824.

Siliqua lanceolata, unilocularis, monosperma, decidua, bivalvis: valvulis navicularibus.

*1. ISATIS

* I. ISATIS foliis radicalibus crenatis : caulinis sagitta- *tinctoria*.
tis, siliquis oblongis. *Sp. pl.* 936.

Isatis foliis radicalibus petiolatis, ovatis, caulinis am-
plexicaulibus. *Hall. hist.* 523.

Isatis sylvestris. *Fuchs hist.* 330. *Cam. epit.* 410. f.
angustifolia. *B. pin.* 113.

Glaustum sativum. *Ger. em.* 491. *Park.* 600. *R. syn.*
370.

Anglis, common Woad.

Habitat in arvis et ad margines agrorum sed rarius. ♂.
VII,

C R A M B E. 825.

Filamenta quatuor longiora apice bifurca : altero an-
therifero. Bacca sicca globosa decidua.

I. CRAMBE foliis subrotundo-ovatis undulatis carnosis *mariti-*
cauleque glabris. *ma.*

Crambe maritima brassicæ folio. *Tourn.* 211. *R. syn.*
307.

Brassica maritima monospermous. *B. pin.* 112.

Brassica marina monospermous. *Park.* 270.

Brassica marina anglica. *Ger. em.* 315.

Anglis, sea Colewort.

Habitat in littoribus maritimis arenosis passim. ♀. V.
VI.

Classis

Classis XVI.

MONADELPHIA

DECANDRIA.

GERANIUM. 832.

Monogynia. Stigmata quinque. Caps. rostrata, pentacocca.

* Staminibus quinque fertilibus.

cicutari- 1. GERANIUM pedunculus multifloris, floribus pentandris, foliis pinnatis incisis obtusis. Sp. pl. 951. Burm. ger. 33.

Geranium petiolis multifloris, caule procumbente, foliis duplicato-pinnatis pinnulis acute incisis. Hall. hist. 944.

Geranium cicutæ folio inodorum. Ger. em. 945. R. syn. 357.

Geranium cicutæ folio, minus et supinum. B. pin. 319.

Geranium moschatum inodorum. Park. 708.

♂ Geranium inodorum album. Ger. em. 946.

♀ Geranium pimpinellæ folio. Cat. giss. 173.
Anglis, hemlock Cranesbill.

Habitat in arenosis ruderatis et muris. ☽. IV—VII.

moscha-
tum. 2. GERANIUM pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis pinnatis incisis, cotyledonibus pinnatifidis. Sp. pl. 951. Ger. em. 29. Jac. Hort. vind. I. 22. t. 55.

Geranium petiolis multifloris, caule diffuso, foliis ovatis pinnatifidis. Hall. hist. 945.

Geranium

MONADELPHIA DECANDRIA.

301

Geranium moschatum. *Ger. em.* 941. *Park.* 706.

Riv. pent. irr. 110. *R. syn.* 358.

Geranium cicutæ folio, moschatum. *B. pin.* 319.

Anglis, musk Cranesbill, or Muscovy.

Habitat in pratis siccoribus in comitatibus Westmorlandico et Eboracensi passim. *O. V.* VI.

Pharmac. Geranii Moschati Herba.

3. GERANIUM pedunculis subtrifloris, floribus pentan-

maritidis, foliis cordatis incisis crenatis scabris, caulis mucum-

procumbentibus. *Sp. pl.* 951.

Geranium pusillum supinum maritimum altheæ aut
betonicæ folio nostras. *R. syn.* 357. *Pluk. ph. t.* 31.
f. 4.

Geranium minimum anglicum procumbens, foliis be-
tonicæ. *Hist. Ox.* II. 512. *f. 5. t. 35. f. 10.*

Anglis, sea Cranesbill.

Habitat in littoribus maritimis arenosis frequens. 8.
 VI. VII.

** *Staminibus decem fertibus.*

4. GERANIUM pedunculus bifloris, foliis caulinis tri-nodosum.

lobis integris serratis : summis subsessilibus. *Sp. pl.*
 953. *Burm. ger.* 7.

Geranium V. nodosum plateau. *Clus. hist.* 2. 101.

Ger. em. 947. *R. syn.* 361.

Geranium nodosum. *B. pin.* 318. *Park.* 704.

Anglis, knotty Cranesbill.

Habitat in montosis Cumberlandiæ D. Archergen. *R.*
syn. 24. VII. VIII.

5. GERANIUM pedunculis bifloris foliisque alternis, phœnum.

calycibus subaristatis, caule erecto, petalis undula-

tis. *Sp. pl.* 953. *Burm. Ger.* II.

Geranium foliis rugosis hirsutis semiseptilobis, lobis
dentatis, petalis serratis acuminatis. *Hall. hist.* 934.

Geranium montanum fuscum. *B. pin.* 318. *R. syn.*
 361.

Geranium maculatum sive fuscum. *Ger. em.* 945.

Geranium pullo flore. *Park.* 704.

Anglis, spotted Cranesbill.

Habitat

MONADELPHIA DECANDRIA.

Habitat in pascuis montosis. Found at Tovel, in the valley by the fulling-mill, by Mr. Drayton, Apothecary of Maidstone. R. syn. circa Clapham et Ingleton in agro Eboracensi. 4. V. VI.

*sylvati-
cum.*

6. **GERANIUM** pedunculis bifloris, foliis subpeltatis quinquelobis inciso-serratis, caule erecto, petalis emarginatis. *Sp. pl. 954. Burm. ger. 12. Fl. dan. 124.*

Geranium caule erecto, foliis rugosis septilobis, lobis acute serratis, petalis emarginatis. Hall. hist. 932.

Geranium batrachoides montanum nostras. Ger. em. 942. R. syn. 360.

Geranium batrachoides minus. Park. 704.

Geranium batrachoides folio aconiti. B. pin. 317.

Anglis, wood Cranesbill.

Habitat in dumetis et pascuis montosis in agris Westmorlandico, Cumberlandico, et Eboracensi frequens. 4. VI. VII.

pratense. 7. **GERANIUM** pedunculis bifloris, foliis subpeltatis multipartitis rugosis acutis, petalis integris. *Sp. pl. 954. Burm. ger. 13.*

Geranium caule erecto, foliis rugosis hirsutis multilobis, lobis trifidis, lobulis semipinnatis, floribus umbellatis. Hall. hist. 931.

Geranium batrachoides. Ger. em. 922. R. syn. 360. flore cæruleo. Park. 704.

Geranium batrachoides, Gratia Dei Germanorum. B. pin. 318.

Anglis, meadow Cranesbill.

Habitat in pratis et pascuis subhumidis prope Battersea. R. syn. 4. VI. VII.

*pyrenai-
cum.*

8. **GERANIUM** pedunculis bifloris, petatis bilobis, foliis inferioribus quinquepartito-multifidis, superioribus trilobis, calycibus apice subglandulosis, caule erecto.

Geranium pedunculis bifloris, petalis bilobis, calycibus apice glandulosis, antheris exterioribus sterilibus. Lin. Mantiss. I. 97.

Geranium pedunculis bifloris, foliis multifidis; lacinias

niis obtusis inæqualibus, petalis bifidis. *Burm.*

Ger. 27. Ger. gallopr. 434. t. 16. f. 2.

Geranium columbinum perenne, *pyrenaicum maximum.* *Tourn. 268.*

Anglis, mountain Cranesbill.

Habitat in pratis et pascuis. *Ad ripam fluvii inter Bingley et Keighley in agro Eboracensi, prope Enfield; et circa Brompton et Chelsea et alibi prope Londonum.* 24. VI. VII.

9. GERANIUM pedunculis bifloris, foliisque floralibus *molles.* alternis, caule ramoso erectiusculo, calycibus muticis. *Sp. pl. 945. Burm. Ger. 21.*

Geranium foliis mollissimis hirsutis reniformibus, semiquinquefidis, lobis semitripartitis obtusis. *Hall. hist. 939.*

Geranium columbinum. *Dod. pempt. 60. Ger. em. 938. R. syn. 359. vulgare. Park. 706.*

Geranium columbinum villosum, petalis bifidis purpureis. *Vaill. paris. 79. t. 15. f. 1.*

β *Geranium* pedunculis bifloris, petalis bifidis, caule diffuso, foliis reniformibus palmatis linearibus acutis *Sp. pl. 957. Burm. ger. 23.*

Geranium foliis hirsutis semiseptilobis, lobis semitrilobis obtusis. *Hall. hist. 490.*

Geranium columbinum humile, flore cæruleo minimo. *R. syn. 359. t. 16. f. 2.*

Anglis, common Cranesbill.

Habitat in arvis pratis et pascuis arenosis. β in pascuis sterilibus et ad vias. ⊖. V. VI.

10. GERANIUM pedunculis bifloris, petalis integris rotundis obtusissimis longitudine calycis, caule prostrato, foliis reniformibus incisis. *Sp. pl. 956. Burm. ger. 20.*

Geranium viscidum, caule decumbente, foliis semiquinquelobis, lobis tridentatis et quinquelobatis. *Hall. hist. 941.*

Geranium folio malvæ rotundo. *B. pin. 318.*

Geranium columbinum majus flore minore cæruleo.

R. syn. 358. Vaill. paris. 79. t. 15. f. 1.

MONADELPHIA DECANDRIA.

Pes columbinum. Dod. pempt. 61.

Anglis, dovesfoot Cranesbill.

Habitat in muris, tectis et pascuis solo arenoso circa Bath et Bristol copiose; inter Battersea et Wandsworth; et inter Mortlack et Kew. ○. VII.

Pharmac. Geranii columbini Herba.

lucidum. II. **GERANIUM** pedunculis bifloris, calycibus pyramidatis angulatis elevato-rugosis, foliis quinquelobis rotundatis. *Sp. pl. 955. Fl. dan. 218. Burm. ger. 19.*

Geranium foliis subrotundis semiquinquelobis, lobis obtusis, calycibus transversim rugosis. Hall. hist. 942.

Geranium saxatile. Ger. em. 938. Park. 707. R. syn. 361.

Geranium lucidum saxatile. B. pin. 318.

Anglis, shining Cranesbill.

Habitat in muris, tectis, umbrosis arenosis. Inter Mortlack et Kew. ○. VI—VIII.

columbi- num. 12. **GERANIUM** pedunculis bifloris folio longioribus, foliis quinquepartito-multifidis, laciniis acutis, arillis glabris, calycibus aristatis. *Sp. pl. 956. Burm. ger. 22.*

Geranium caule procumbente, foliis quinquepartitis lobis trilobis, lobulis trifidis. Hall. hist. 938.

Geranium columbinum, dissectis foliis, pediculis florum longissimis. R. syn. 359. Vaill. par. 79. t. 15. f. 4.

Geranium columbinum annum minus, folio tenuius laciniato, flore pediculo longissimo insistente. Hort. Ox. II. 512. f. 5. t. 15. f. 3.

Anglis, long-stalked Cranesbill.

Habitat in arvis, pascuis et ad sepes. ○. VI—VIII.

difflatum. 13. **GERANIUM** pedunculis bifloris, foliis quinquepartito-trifidis, petalis emarginatis longitudine calycis, arillis villosis. *Sp. pl. 956. Burm. ger. 15.*

Geranium caule erecto; foliis quinquelobis, lobis trifidis acutis. Hall. hist. 937.

Geranium

Geranium columbinum majus dissectis foliis. Ger.
em. 938. R. syn. 359.

Geranium malacoides f. columbinum alterum. Park.
706.

*Geranium columbinum majus foliis imis longe usque
ad pediculum divisis.* Hist. Ox. II. 511. Vaill. par.
79. t. 15. f. 3.

3 *Geranium columbinum maximum foliis dissectis.* Plot.
Ox. 145. t. 9. f. 3. R. syn. 340.

Anglis, jagged Cranesbill.

Habitat in pascuis, arvis et ad sepes. ☽. V—VIII.

14. GERANIUM pedunculis bifloris, calycibus pilosis *robertianum.*
decemangularibus. Sp. pl. 955. Burm. ger. 18. num.

Geranium foliis duplicato-pinnatis, pinnis ultimis
confluentibus, calycibus striatis, hirsutis. Hall. hist.
943.

Geranium robertianum. Ger. em. 939. Dod. pempt.
69. B. pin. 319. R. syn. 358. vulgare. Park.
710.

3 *Geranium lucidum saxatile,* foliis geranii robertiani.
R. syn. 358.

Anglis, stinking Cranesbill, or Herb-Robert.

Habitat in ruderatis, muris, saxosis. ☉. IV—VIII.

Pharmac. Geranii robertiani Herba.

15. *Geranium* pedunculis unifloris, foliis quinque parti- *sanguine-*
tis trifidis orbiculatis. Sp. pl. 958. Fl. suec. 616. um.
Burm. ger. 3.

Geranium pedunculis unifloris, foliis septilobis, peta-
lis bifidis. Hall. hist. 930.

Geranium sanguineum. Ger. em. 955. maximo flore.
B. pin. 318.

Geranium hæmatodes. Park. 705. R. syn. 360.

2 *Geranium hæmatodes,* foliis majoribus pallidioribus
et altius incisis. R. syn. 360.

Geranium hæmatodes Lancastriense flore eleganter
striato. R. syn. 360. Dill. elth. 163. t. 136. f.
163.

Anglis, bloody Cranesbill.

Habitat in rupibus calcareis, saxosis et pascuis siccioribus.
et in Insula Walney. 24. VII. VIII.

POLYANDRIA.

ALTHÆA. 839.

Cal. duplex: exterior novemfidus. *Arilli* plurimi monospermi.

- officinalis.* 1. ALTHÆA foliis simplicibus tomentosis. *Sp. pl.* 966. *Fl. dan.* 530. *Gort. gelr.* 410.
Althæa tomentosa, herbacea, caule erecto, foliis cordato-lanceolatis, obsolete trifido. *Hall. hist.* 1074.
Althæa vulgaris. *Park.* 303. *R. syn.* 252.
Althæa ibiscus. *Ger. em.* 933.
Althæa dioscoridis et plinii. *B. pin.* 315.
 2 *Althæa vulgari similis* folio retuso brevi. *R. syn.* 252.
Anglis, marsh *Althæa*, or Mallow.
 Habitat in palustribus maritimis. 24. VIII.
Pharmac. *Althæa Radix, Herba, Semina.*

LAVATERA. 842.

Cal. duplex: exterior trifidus. *Arilli* plurimi monosperi.

- arborea.* 1. LAVATERA caule arborea, foliis septemangularibus tomentosis plicatis, pedunculis confertis unifloris axillaribus. *Sp. pl.* 972. *Hort. upf.* 202.
Malva arborea minima nostras. *Merr.* *R. syn.* 252.
Malva arborea veneta dicta, parvo flore. *B. pin.* 315.
Anglis, tree Lavatera, or sea-tree Mallow.
 Habitat in littoribus maritimis. At Hurst-castle, over against the Isle of White; in Portland island; on the rocks of Caldey island and Basse island, near Edinburgh. *R. syn.* In Cornubia et Devonia passim. ♂. VII. VIII.

MALVA. 841.

Cal. duplex: exterior triphyllus. *Arilli* plurimi, monospermi.

1. MALVA.

1. MALVA caule erecto herbaceo, foliis septemlobatis *sylvestris*.
acutis, pedunculis petiolisque pilosis. Sp. pl. 969.

Malva caule erecto, foliis lobatis, lobis serratis quinis
et septenis. Hall. hist. 1069.

Malva sylvestris. Ger. em. 930. folio sinuato. B. pin.

314.

Malva vulgaris. Park. 299. R. syn. 251.

Anglis, common Mallow.

Habitat in ruderatis et ad sepes. ♂. V.—X.

Pharmac. Malvæ vulgaris Radix, Herba, Semina.

2. MALVA caule prostrato, foliis cordato-orbiculatis *rotundifolia*.
obsolete quinquelobis, pedunculis fructiferis decli- lia.
natis. Sp. pl. 969. Hall. hist. 1070.

Malva sylvestris pumila. Fuchs. hist. 508. Ger. em.
930.

Malva sylvestris folio rotundo. B. pin. 314.

Malva sylvestris minor. Park. 299. R. syn. 250.

Anglis, dwarf Mallow.

Habitat in ruderatis et ad vias. ♂. VI.—X.

3. MALVA caule patulo, foliis angulatis, floribus ax- *parviflora*.
illaribus sessilibus glomeratis, calycibus glabris pa- ra.
tentibus. Sp. pl. 969.

Malva minor flore parvo cæruleo. R. syn. 251.

Malva sylvestris, foliis sinuatis minoribus, flosculis
minimis, *Anglica*. Boerh. ind. alt. 268.

Malva annua rotundifolia, floribus omnium minimis
albis pentapetalis, verticillatim genicula ambienti-
bus. Hist. Ox. II. 521? R. hist. 598?

Anglis, small-flowered Mallow.

Habitat in ruderatis. Found by Mr. J. Sherard, in
company with Mr. Rand, at Hithe in Kent. R. syn.
♂. VII.

4. MALVA caule erecto, foliis multipartitis scabriuscum *alcea*.
lis. Sp. pl. 971. Fl. suec. 628.

Malva caule erecto, foliis scabris trilobatis, lobis la-
teralibus bipartitis, medio tripartito et quinquepar-
tito. Hall. hist. 1071.

Alcea vulgaris. Clus. hist. II. 25. R. syn. 252.

MONODELPHIA POLYANDRIA.

Alcea vulgaris major. *B. pin.* 316.

Alcea vulgaris f. Málva verbenacea. *Park.* 301.

Malva verbenacea. *Ger. em.* 930.

Anglis, vervain Mallow.

Habitat in sepibus et ad margines agrorum in comitatibus Warwicensi, Leicestrienſi et Nottinghamensi. 24.
VII. VIII.

Pharmac. *Alceæ Herba.*

moschata. 5. **MALVA** foliis radicalibus reniformibus incisis, caulinis quinquepartitis pinnato-multifidis. *Sp. pl.* 971.
Hall. hist. 1072.

Malva montana f. Alcea rotundifolia laciniata. *Col. ephr.* I. 148. t. 147. f. 147.

Alcea folio rotundo laciniato. *B. pin.* 316.

Alcea tenuifolia crispa. *B. hist.* II. ap. 1067. *R. syn.* 353.

Anglis, musk Mallow.

Habitat in pratis, pascuis et ad sepes. ♂. VII. VIII.

Classis XVII.

DIADELPHIA
HEXANDRIA.

FUMARIA. 849.

Cal. diphyllus. *Cor.* ringens. *Filamenta* duo, membranacea, singula.

1. FUMARIA pericarpiis monospermis racemosis, caule *officinalis*.
diffuso. *Sp. pl.* 984. *Fl. suec.* 630.

Fumaria foliis multifidis, lobis subrotunde lanceolatis,
fructibus monospermis. *Hall. hist.* 346.

Fumaria. *Matth.* 1158. *Fuchs.* 338. *Cam. ep.* 890.
vulgaris, *B. hist.* III. 101. *Park.* 287. *R. syn.*
204.

Fumaria purpurea. *Ger. em.* 1088.

Fumaria officinarum et Dioscoridis. *B. pin.* 143.

8 Fumaria pericarpiis monospermis racemosis, foliis *capreola-*
scendantibus subcirthos. *Sp. pl.* 984. *ta.*

Fumaria major scandens, flore pallidiore. *R. syn.* 204.

Anglis, common Fumitory.

Habitat in arvis et sepibus frequens. ◎. V.—VIII.

Pharmac. Fumariæ Herba, Semina.

Obs. nullam differentiam inter α et β observavi; nisi in
colore florum; Flos albus cum apice purpureo in β est;
nunquam folia cirthosa inveni; sed caules scandentes et
petioli contorti sive volubiles sunt.

2. FUMARIA siliquis linearibus, petiolis cirthiferis. *clavicula-*
Fumaria siliquis linearibus, foliis cirthiferis. *Sp. pl.* *ta.*
985. *Fl. dan.* 340.

Fumaria alba latifolia. *Park.* 288. *R. syn.* 335.
claviculata. *Ger. em.* 1088.

DIADELPHIA DECANDRIA.

*Fumaria clavicularis donata. B. pin. 143. Hist. Ox. II.
266. f. 3. t. 12. f. 3.*

Anglis, climbing Fumitory.

*Habitat in sylvis, sepibus subhumidis et arenosis. O. VI.
VII.*

OCTANDRIA.

POLYGALA. 851.

Cal. pentaphyllus : foliolis duobus alæformibus, coloratis. Legumen obcordatum, bilocularē.

vulgaris. 1. POLYGALA floribus cristatis racemosis, caulis herbaceis simplicibus procumbentibus, foliis linearilanceolatis. *Sp. pl. 986. Fl. dan. 516.*

Polygala caule erecto, foliis linearibus acutis. *Hall. hist. 344.*

Polygala. *Ger. em. 563. R. syn. 287. minor. Park. 1332.*

Polygala vulgaris. *B. pin. 215.*

β Polygala major. *B. pin. 215.*

γ Polygala violacea. *Boerb. ind. alt. 236.*

δ Polygala carnea. *Boerb. ind. alt. 236.*

ε Polygala alba. *Tourn. 174.*

ζ Polygala myrtifolia palustris humilis et ramosior. *R. syn. 287.*

Anglis, common Milkwork.

Habitat in pascuis et ericetis. 24. VI. VII.

DECANDRIA.

SPARTIUM. 858.

Stigma longitudinale, supra villosum. Filamenta germini adhærentia. Cal. deorsum productus.

scopari- 1. SCOPARIUM foliis ternatis solitariisque, ramis intermis angulatis. *Sp. pl. 996. Fl. dan. 313.*

Spartium foliis inferioribus ternatis hirsutis, superioribus simplicibus. *Hall. hist. 354.*

Genista angulosa et scoparia. *B. pin. 395.*

Genista.

Genista. *Dod. pempt.* 761. *Ger. em.* 1311. *vulgaris*
et *scoparia.* *Park.* 228.

Genista angulosa trifolia. *B. hist.* I. 388. *R. syn.* 475.
Anglis, common Broom.

Habitat in *pascuis* *siccioribus.* *H. V.* VI.

Pharmac. *Genistæ Herba, Flores, Semina.*

GENISTA. 859.

Cal. bilabiatus: $\frac{2}{3}$. *Vexillum oblongum, a pistillo*
staminibusque deorsum reflexum.

* *Inermes.*

1. GENISTA foliis lanceolatis glabris, ramis striatis *tinctoria.*
teretibus erectis. *Sp. pl.* 998. *Fl. dan.* 526.

Genista inermis, foliis glabris confertis ellipticis lan-
ceolatis, floribus sessilibus spicatis. *Hall. hist.* 350.

Genista tinctoria germanica. *B. pin.* 395.

Genista tinctoria vulgaris. *Clus. hist.* 101. *Park.*
228.

Genistella tinctoria. *Ger. em.* 1316.

Anglis, dyer's Greenweed, Woodwaxen or Base-
broom.

Habitat in *pascuis* et ad agrorum margines. ♂. VII.

2. GENISTA foliis lanceolatis obtusis, caule tubercu- *pilosa.*
lato decumbente. *Sp. pl.* 992. *Jac. aust.* III. 5.
t. 208.

Genista inermis procumbens, foliis duris subhirsutis
spicis floriferis brevibus. *Hall. hist.* 351.

Chamægenista I. *Clus. pann.* 50. *hist.* I. 103.

Chamægenista pannonica. *Ger. em.* 1313? *Park.*
229?

Chamægenista foliis *genistæ vulgaris.* *B. pin.* 395.
Anglis, hairy Greenweed.

Habitat in *pascuis* et ericetis; circa Bury in Suffolk. D.
Dickson. ♂. V. VI.

** *Spinofæ.*

3. GENISTA spinis simplicibus, ramis floriferis iner- *anglica.*
mibus, foliis lanceolatis. *Sp. pl.* 999. *Fl. dan.* 619.

DIADELPHIA DECANDRIA.

Genista minor aspalathoides, f. *Genista spinosa anglica*. *B. pin.* 395. *R. syn.* 475.

Genista aculeata. *Ger. em.* 1320.

Genistella aculeata. *Park.* 1004. *Lob. ic.* 2. t. 93.

Anglis, needle Greenweed, Furze, or Petty-whin.

Habitat in ericetis et pascuis subhumidis. *H. V.* VI.

ULEX. 881.

Cal. diphyllus. *Legumen vix calyce longius.*

europaeus. 1. ULEX foliis villosis acutis, spinis sparsis. *Sp. pl.* 1043. *Fl. dan.* 608.

Genista spinosa vulgaris. *Ger. em.* 1319. *R. syn.* 475: f. *Scoparius Theophrasti*. *Park.* 1003.

Genista spinosa major, longioribus aculeis. *B. pin.* 394.

β *Genista spinosa minor*. *Park.* 1003.

Anglis, common Furze, Whin or Gorse.

Habitat in ericetis et pascuis. *H. IV.—X.*

ONONIS. 863.

Cal. quinquepartitus: laciiniis linearibus. *Vexillum striatum*. *Legumen turgidum sessile*. *Filamenta connata* absque fissura.

spinosa, 1. ONONIS floribus racemosis subsolitariis, foliis ternatis: superioribus solitariis nudis, ramis spinosis glabris.

Anonis floribus racemosis solitariis, foliis ternatis, ramis spinosis. *Syst. nat. ed. XI.* 1159. *Sp. pl.* 1006.

Anonis caule decumbente, ramis senescentibus spinosis. *Hall. hist.* 356.

Anonis spinosa flore purpureo. *B. pin.* 389. *Park.* 994. *R. syn.* 332.

Anonis. *Fuchs. hist.* 60. f. *Resta bovis*. *Ger. em.* 1323.

Anglis, common Restarrow or Cammock.

Habitat in pascuis sterilioribus. *H. VI.—VIII.*

Pharmac. *Anonidis Radix*.

inermis, 2. ONONIS floribus racemosis subgeminis, foliis ternatis: superioribus solitaris, ramisque villosis inermibus.

Ononis

Ononis floribus racemofisis geminis, foliis ternatis: arvensis.
superioribus solitariis, ramis inermibus subvillofisis.

Sp. pl. 1006.

Anonis non spinosa purpurea. *Ger. em.* 1323. *Park.*

993. *R. syn.* 332.

Anonis spinis carens purpurea. *B. pin.* 389.

β *Ononis* caulis diffusis, ramis erectis: foliis superiore- repens.
ribus solitariis, stipulis ovatis. *Sp. pl.* 1006.

Anonis maritima procumbens, foliis hirsutis pubescen-
tibus. *R. syn.* 332. *Dill. elth.* 29. t. 25. f. 28.

Anglis, hairy Restharrow.

Habitat in arvis, pratis et pascuis et littoribus maritimis
arenosis frequens. *H. VI.—VIII.*

Obs. α et β in horto cultæ per quatuor annos, nullam
specificam differentiam præbuerunt. Plantæ villofæ
subviscidæ. Floribus solitariis, geminatis et subinde
ternatis.

ANTHYLLIS. 864.

Cal. ventricosus. *Legumen* subrotundum, te&ctum.

1. ANTHYLLIS herbacea, foliis pinnatis inæqualibus, *vulnera-*
ria. capitulo duplicato. *Sp. pl.* 1012.

Anthyllis leguminosa. *Ger. em.* 1240. *vulgaris. Park.*
1093.

Vulneraria foliis radicalibus ovatis, caulinis pinnatis,
umbellis ovatis. *Hall. hist.* 398.

Vulneraria rustica. *B. hist.* II. 362. *R. syn.* 323.

Loto affinis *Vulneraria* pratenfis. *B. pin.* 332.

β *Vulneraria* supina flore coccineo. *R. syn.* 323. *Dill.*
elth. 431. t. 320. f. 413.

Anglis, common Ladies-finger or Kidney-vetch.

Habitat in pratis et pascuis cretaceis et calcareis $\beta.$ in In-
sula Anglesea. *4. VII.*

PISUM. 870.

Stylus triangulus, supra carinatus pubescens. *Calycis*
laciniæ superiores duæ breviores.

1. PISUM petiolis supra planiusculis, caule angulato, *mariti-*
stipulis sagittatis, pedunculis multifloris. *Sp. pl.* *mum.*
1027. *Fl. dan.* 338. *It. W-goth.* 190.

Pisum

DIADELPHIA DECANDRIA.

- Pisum marinum.* *Ger. em.* 1250. *R. syn.* 319.
Pisum spontaneum maritimum anglicum. *Park.* 1059.
Pisum spontaneum perenne repens humile. *Hist. Ox.*
II. 47. f. 2. t. 1. f. 5.
Anglis, sea Pea.
Habitat in litoribus maritimis. *On the long baick of stones running from Alburgh towards Orford in Suffolk; near Hastings in Sussex; among the stones on the west side of Dengeness, near Lyd in Kent.* *R. syn.* 24. VIII.

OROBUS. 871.

- Stylus linearis.* *Cal. basi obtusus: laciniis superioribus profundioribus, brevioribus.*
- tuberosus.* 1. *OROBUS* foliis pinnatis lanceolatis, stipulis semisagittatis, caule simplici. *Sp. pl.* 1028.
Orobus caule simplici, foliis senis ellipticis, radice tuberosa. *Hall. hist.* 417.
Orobus sylvaticus foliis oblongis glabris. *Tourn.* 393.
R. syn. 324.
Astragalus sylvestris foliis oblongis glabris. *B. pin.* 351.
Astragalus sylvaticus. *Ger. em.* 1237.
Lathyrus sylvestris lignosior. *Park.* 1061.
Anglis, common Orobus or Heath-pea.
Habitat in pratis, pascuis, sylvis et ad sepes. 24. V.
- sylvaticus.* 2. *OROBUS* caulibus decumbentibus hirsutis ramosis.
Cent. pl. 67. *Sp. pl.* 1029.
Orobus sylvaticus nostras. *R. syn.* 324. *hist.* 1892.
A&t. paris. 1706. 87. t. 90.
Anglis, wood Orobus or bitter Vetch.
Habitat in sylvis et sepibus. *At Gamlesby in Cumberland, about six miles from Pereth in the way to Newcastle, observed by Tho. Willisel below Brecknock hills in the way to Caerdyff, and in Merionethshire, near Bala.* *R. syn.* in *Scotia frequens.* *D. Hope.* 24. V. VI.

LATHYRUS. 872.

Stylus planus, supra villosus, superne latior. Cal. laciniae superiores duæ breviores.

* *Pedunculis unifloris.*

1. LATHYRUS pedunculis unifloris, foliis simplicibus *Nyssolia*.
stipulis subulatis. *Sp. pl.* 1021.

Lathyrus pedunculis unifloris, foliis gramineis, stipulis minimus. *Hall. hist.* 441.

Lathyrus sylvestris minor. *B. pin.* 344.

Catanance leguminosa quorundam. *B. hist. II.* 309.
R. syn. 323.

Ervum sylvestre. *Ger. em.* 1249. f. Catanance. *Park.*
1079.

Anglis, crimson Lathyrus or Grass-vetch.

Habitat in agrorum marginibus non infrequens. ♂. V.
Obs. variat pedunculis bifloris.

2. LATHYRUS pedunculis unifloris, cirrhis aphyllis, *aphaca*.
stipulis sagitato-cordatis. *Sp. pl.* 1029.

Lathyrus aphyllus stipulis sagittatis latissimis. *Hall.*
hist. 442.

Aphaca. *Ger. em.* 1250. *Park.* 1067. *R. syn.* 320.

Vicia lutea foliis convolvuli minoris. *B. pin.* 345.

Anglis, yellow Lathyrus or Vetchling.

Habitat in arvis arenosis *passim*. ♂. VII.

** *Pedunculis bifloris.*

3. LATHYRUS pedunculis bifloris, cirrhis diphyllis : *hirsutus*.
foliolis linear-lanceolatis, leguminibus hirsutis,
seminibus scabris. *Sp. pl.* 1032.

Lathyrus foliis geminis ellipticis, floribus solitariis et
geminis, siliquis hirsutis. *Hall. hist.* 437.

Lathyrus angustifolia siliqua hirsuta. *B. pin.* 344.

Lathyrus siliqua hirsuta. *B. hist. II.* 205. *R. syn.*
320.

Anglis, rough Lathyrus or Pease-everlasting.

Habitat in arvis et ad sepes. In the fields about Hockley
and Rayleigh, and elsewhere in Rochford hundred,
Essex.

· DIADELPHIA DECANDRIA.

Essex. R. syn. In the border of a field between the road and Munden church; likewise among the bushes within the gate leading to Laydon-hall, both in Dengy hundred, Essex, Mr. S. Dale. Blackf. Spec. bot. ①. VII.

Obs. variat. pedunculis uni et trifloris.

*** *Pedunculis multifloris.*

latifolius. 4. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis diphyllicis: foliolis lanceolatis, internodiis membranaceis. Sp. pl. 1033. Fl. suec. 645.

Lathyrus caulis alatis, foliis ovato-lanceolatis rigidis, scapis multifloris. Hall. hist. 433.

Lathyrus major latifolius. Ger. em. 1229. R. syn. 319.

Lathyrus latifolius. B. pin. 344.

Lathyrus major perennis. Park. 1061.

Anglis, broad-leaved Lathyrus.

Habitat in sylvis et sepibus in Madingley and other woods near Cambridge; Mr. Lawson observed it on the rocks near Red Neese by Whitehaven, plentifully. R. syn. 24. VII. VIII.

sylvestris. 5. LATHYRUS pedunculis multifloris, cyrrhis diphyllicis: foliolis ensiformibus. Sp. pl. 1033. Fl. dan. 325.

Lathyrus caule alato, foliis geminis ensiformibus. Hall. hist. 434.

Lathyrus sylvestris. Dod. pempt. 523. Clus. hist. II. 129. Park 1061. major. B. pin. 344.

Lathari majoris species flore rubente et albido minore dumetorum s. Germanicus. B. hist. II. 129. R. syn. 319.

Anglis, narrow-leaved or wild Lathyrus.

Habitat in sylvis et sepibus; Mr. Dale observed it in the hedges between Cattle-Campes and Bartlow, in Cambridgeshire; inter Rochester et Northfleet in Cantio; inter Bath et Bristol copiose; circa Conway in Wallia. Æ. VII. VIII.

6. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis poly- *palustris*.
phyllis; stipulis lanceolatis. *Sp. pl.* 1034. *Fl. dan.*

399.

Lathyrus foliis senis, floribus racemosis. *Hall. hist.*

431.

Lathyrus peregrinus, foliis viciæ, flore subcæruleo
pallidive purpurascente. *B. pin.* 344.

Lathyrus viciæ formis s. *Vicia lathyroides nostras*. *R.*
syn. 320.

Vicia Lathyroides s. *Lathyrus viciæ formis*. *Pluk.*
ph. t. 71. f. 2.

Anglis, marsh *Lathyrus*.

Habitat in pratis et pascuis humidis; in a wood near A-
bington, Berkshire. Blackf. upon the bogs in Char-
ley forest, near Bardon hill, Leicestershire. D.
Pultney; near Ranaugh in Norfolk. Mr. Hum-
phry; in comitatibus Lancastrensi et Eboracensi
passim. 4. VII. VIII.

7. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis *pratensis*.
simplicissimis: foliolis lanceolatis. *Sp. pl.* 1033.

Fl. dan. 527.

Lathyrus scapis multifloris, foliis lanceolatis, capreo-
lis simplicibus. *Hall. hist.* 436.

Lathyrus sylvestris flore luteo. *Ger. em.* 1231. *Park.*
1062.

Lathyrus sylvestris luteus. *B. pin.* 344.

Lathyrus luteus *sylvestris dumetorum*. *B. hist.* II.
304. *R. syn. 320.*

Anglis, meadow *Lathyrus*.

Habitat in pratis, pascuis, sylvis. 4. VII. VIII.

V I C I A. 873.

Stigma latere inferiore transverse barbatum.

* *Pedunculis elongatis.*

1. Vicia pedunculis multifloris, floribus imbricatis, *cracca*.
foliolis lanceolatis pubescentibus, stipulis integris.
Sp. pl. 1035. *Fl. suec.* 652.

Vicia

DIADELPHIA DECANDRIA.

Vicia foliis lanceolatis sericeis, racemis multifloris reflexis, stipulis integerrimis. *Hall. hist.* 424.
Vicia multiflora. *B. pin.* 345. f. spicata. *Park.* 1072.
Cracca. *Riv.* 49. *Rupp. jen.* 212. *R. syn.* 322.
Anglis, tufted Vetch.
Habitat in nemorosis et sepibus. 4. VII. VIII.

sylvatica. 2. *VICIA* pedunculis multifloris, foliolis ovalibus, stipulis denticulatis. *Sp. pl.* 1035. *Fl. dan.* 277.
Vicia foliis ovatis, stipulis argute dentatis, siliquis rachemosis pendulis. *Hall. hist.* 426.
Vicia sylvatica multiflora. *Ph. br.* *R. syn.* 322.
Vicia multiflora maxima perennis, tetro odore, floribus albentibus lineis cæruleis striatis. *Pluk. ph. t.* 41. f. 1.
Anglis, wood Vetch.
Habitat in sylvis et sepibus. In a wood near Caerwent, Monmouthshire; in the woods about Greta bridge, Yorkshire, Mr. Johnson; in Smokhall wood, Bath, and about the Devices, Wiltshire, Mr. Goodyer; supra pontem Kirby Londale, in Westmorlandia. Dr. Richardson. *R. syn.* 4. VII. VIII.

** *Floribus axillaribus sessilibus.*

fativa. 3. *VICIA* leguminibus sessilibus erectis, foliis retusis, stipulis notatis. *Sp. pl.* 1037. *Fl. dan.* 522.
Vicia. *Ger. em.* 1227. *R. syn.* 320. *vulgaris sativa*. *Park.* 1072.
Vicia sativa vulgaris, semine nigro. *B. pin.* 344.
 β *Vicia sativa vulgaris*, semine albo. *B. pin.* 344.
Anglis, common Vetch or Tare.
Habitat in agris et inter segetes. 5. V. VI.
Pharmac. *Viciæ semine*.
Obs. variat foliis superioribus lanceolatis; stipulæ maculæ, macula atro-rubescente.

lathyroides. 4. *VICIA* leguminibus sessilibus subsolitariis erectis glabris, foliolis inferioribus retusis, superioribus linear-lanceolatis. *Fl. dan.* 58.

Vicia

*Vicia leguminibus sessilibus solitariis erectis glabris,
foliolis senis, inferioribus obcordatis.* Sp. pl. 1037.

*Vicia foliis imis ovatis, superioribus linearis, scapis
brevissimis bifloris.* Hall. hist. 430.

Vicia semine rotundo nigro. B. pin. 345.

Vicia sylvestris, f. cracca major. Ger. em. 1227. R.
syn. 321.

Vicia lathyroides, purpureo-cæruleis floribus. Herm.
par. 242. t. 242.

Aracus f. Cracca major. Park. 170.

3 *Vicia sylvestris flore ruberrimo, siliqua longa nigra.*
R. syn. 321.

4 *Vicia minima.* Riv. tetr. 169. præcox parisienium.
Tourn. 397. R. syn. 321.

*Vicia pratensis verna f. præcox soloniensis semine cu-
bico, f. hexahedron referente.* Hist. Ox. II. 63.
f. 2. t. 4. f. 14.

Anglis, spring Vetch.

Habitat in pratis, pascuis et arvis siccioribus. ⊖. IV. V.

*Obs. variat foliis imis obcordatis, retusis et obovatis, su-
perioribus linearibus et lanceolatis quaternis senis, octo-
nis et subinde denis; Floribus solitariis et geminis; sti-
pulis maculatis, nimis affinis viciæ sativæ.*

5. VICIA leguminibus sessilibus reflexis pilosis solitariis *lutea*.

pentaspermis, corollæ vexillis glabris. Sp. pl. 1037.

*Vicia foliis subsessilibus obverse ovatis apice emarginatis,
leguminibus solitariis villosis.* Dalib. paris.
219.

Vicia sylvestris lutea siliqua hirsuta. B. pin. 345.

Vicia lutea flore sylvestris. B. hist. II. 313. R. syn.

321.

Anglis, yellow Vetch.

Habitat in pratis et pascuis. On Glastenbury Tor-hill.

R. syn. circa Weymouth in agro Dorsetiensi. ⊖.
VI. VII.

*Obs. variat foliis obcordatis retusis, oblongis, et lanceola-
tis. Floribus solitariis et binis.*

6. VICIA leguminibus sessilibus reflexis pilosis penta- *hybrida*.

spermis, corollæ vexillis villosis. Sp. pl. 1087. Jac.
hort. vind. II. 68. t. 146.

DIADELPHIA DECANDRIA.

Vicia grandiflora. Scop. carn. 65. t. 40.

Anglis, bastard Vetch.

Habitat in pratis et pascuis; circa Weymouth in agro Dorsetiensi. ♂. VI. VIII.

sepium.

7. *VICIA* leguminibus pedicellatis subquaternis erectis, foliolis ovatis integrerriinis: exterioribus decrescentibus. Sp. pl. 1038. Fl. suec. 651.

Vicia foliis ovatis, oblongis, scapis brevibus quadri-floris. Hall. hist. 429.

Vicia maxima dumetorum. Ger. em. 1227. Park. 1072.

Vicia sepium folio rotundiore acuto. B. pin. 345.

Vicia sepium perennis. B. hist. II. 713. R. syn. 320.

8. *Vicia* folio subrotundo, brevi obtuse mucronato, pedunculo brevi insidente, flore viciæ sepium seu dumetorum vulgaris. R. syn. 320.

Anglis, bush Vetch.

Habitat in sylvis, sepibus, pascuis et pratis. ♀. V.

bithynica. 8. *VICIA* leguminibus pedunculatis solitariis erectis, foliolis quaternis ovali-lanceolatis, stipulis dentatis. Sp. pl. 1038. Jac. hort. wind. II. 69. t. 147.

Lathyrus pedunculis unifloris, cirrhis tetraphyllis stipulis dentatis. Roy. lugdb. 363.

Clymenum bithynicum, siliqua singulari, flore minore. Boerb. ind. alt. 43.

Anglis, rough Vetch.

Habitat in arvis et pascuis glareosis, et ad sepes prope Doncaster in agro Eboracensi, D. Tofield. in insula Purbeck. ♂. VII.

E R V U M. 874.

Cal. quinquepartitus, longitudine corollæ.

tetrasper- 1. *ERVUM* pedunculis subbifloris, seminibus globosis
mum. quaternis. Sp. pl. 1039. Fl. dan. 95.

Vicia foliis linearibus, siliquis gemellis glabris. Hall. hist. 423.

Vicia segetum singularibus siliquis glabris. B. pin. 345.

Vicia minor segetum, cum siliquis paucis glabris. Hist. Ox. II. 64. f. 2. t. 4. f. 16.

Cracca

Cracca minor siliquis singularibus, flosculis cæruleo-
centibus. *Hoff. cat. b. alt.* *R. syn.* 322.

Anglis, smooth Tare.

Habitat in arvis, sepibus et ad margines agrorum. ♂.
VI.

2. ERVUM pedunculis multifloris, seminibus globosis hirsutum,
binis. *Sp. pl.* 132.

Vicia foliis linearibus, siliquis racemosis dispermis,
hirsutis. *Hall. hist.* 422.

Vicia segetum cum siliquis plurimis hirsutis. *B. pin.*
345.

Vicia sylvestris f. *Cracca minima*. *Ger. em.* 1228.

Aracus f. *Cracca minor*. *Park.* 1070.

Cracca minor. *Riv. tetr.* 55. *R. syn.* 322.

Anglis, hairy Tare.

Habitat in arvis et pratis arenosis. ♂. VI.

ORNITHOPUS. 884.

Legumen articulatum, teres, arcuatum.

1. ORNITHOPUS foliis pinnatis, leguminibus incur- *perpusil-*
vis. *Syst. nat.* 491. *Sp. pl.* 1049. *lus.*

Ornithopodium caule prostrato, foliis pinnatis, sili-
quias umbellatis, articulatis. *Hall. hist.* 393.

Ornithopodium minus. *Ger. em.* 1241. *B. pin.* 350?

Ornithopodium radice nodosa. *Park.* 1093. *R. syn.*
326.

Ornithopodium majus. *B. pin.* 350. *Park.* 193.

Anglis, common Bird's-foot.

Habitat in pascuis et arenosis. ♂. V.—VIII.

HIPPOCREPIS. 885.

Legumen compressum, altera sutura pluries emargina-
tum, curvum.

1. HIPPOCREPIS leguminibus pedunculatis confertis *comosa*.
arcuatis: margine exteriore repandis. *Sp. pl.*
1050.

Ferrum equinum germanicum siliquis in summitate.
B. pin. 346. *R. syn.* 325.

Y

Ferrum

DIADELPHIA DECANDRIA.

Ferrum equinum comosum. Park. 1091. s. capitatum. Col. ecphr. I. 302. t. 301.

Anglis, tufted Horseshoe-vetch.

Habitat in pratis et pascuis solo calcareo; on the chalky grounds about Gogmagog hills, and elsewhere in Cambridgeshire; in collibus cretaceis in comitatibus Cantiano, Surriensi, Bedfordiensi, &c. passim. &c. VII.

HEDYSARUM. 887.

Cor. carina transverse obtusa. Legumen articulis monospermis.

onobrychis. 1. *HEDYSARUM* foliis pinnatis, leguminibus monospermis aculeatis, corollarum alis calycem æquantiibus, caule elongato. Sp. pl. 1059.

Onobrychis caule erecto ramoso, floribus spicatis. Hall. hist. 396.

Onobrychis. Dod. cereal. 166. hist. 558. s. caput galinaceum. Ger. em. 1243. R. syn. 327.

Onobrychis vulgaris. Park. 1082.

Onobrychis foliis viciæ, fructu echinato major. B. pin. 350.

Polygalon Gesneri. B. hist. II. 335.

Anglis, common Saint Foin or Cock's-head.

Habitat in pratis et pascuis cretaceis. 24. VII.

ASTRAGALUS. 892.

Legumen biloculare, gibbum.

glycyphyllos. 1. *ASTRAGALUS* caulescens prostratus, leguminibus subtriquetris arcuatis, foliis ovalibus pedunculo longioribus. Sp. pl. 1067.

Astragalus caule prostrato foliis ovatis, scapis brevibus racemosis, siliquis subtriquetris incurvis. Hall. hist. 413.

Astragalus luteus perennis procumbens, vulgaris, s. sylvestris. Hist. Ox. II. 107. R. syn. 326.

Hedysarum glycyrrhizatum. Ger. em. 1233.

Glycyrrhiza sylvestris floribus luteo pallentibus. B. pin. 352.

Glaux vulgaris s. *Glycyrrhiza sylvestris.* Park. 1098.

Anglis, common Astragalus or wild Liquorish.

Habitat in pratis, pascuis et ad sepes præsertim solo cretaceo; circa Charleton in Cantio copiose. H. VI. VII.

2. ASTRAGALUS subcaulescens procumbens, flori-arenarius. bus subracemosis erectis, foliis tomentosis. Sp. pl. 1069. Fl. suec. 659. dan. 614.

Astragalus incanus parvus purpureus, nostras. Pluk. ulm. 59. R. syn. 326. t. 12. f. 3.

Glaux montana purpurea nostras. R. hist. 939.

Anglis, purple Astragalus.

Habitat in pratis et pascuis arenosis et cretaceis. On Gogmagog hills, Newmarket, and Roystone heaths, &c. about Haslewood, Yorkshire. Nullibi copiosius quam secus viam agrorum Pigburnensium, non procul Doncastria agri Eboracensis. D. Richardson. R. syn. 4. V. VI. VII.

Obs. variat, foliis pilosis et nudis; Floribus albis. Leguminibus ovalibus erectis villosis.

3. ASTRAGALUS acaulis, scapo erecto foliis longiore, uralensis leguminibus subulatis inflatis villosis erectis. Sp. pl. 1070.

Astragalus scapis aphyllis, foliis ovato-lanceolatis sericeis, siliquis turgidis hirsutis erectis styliferis. Hall. hist. 410.

Astragalus alpinus totus sericeis, foliis acuminatis. Hall. it. helv. 83. t. 2. f. 2.

Astragalus non ramosus villosus et incanus spicatus, floribus purpureo-violaceis. Amm. ruth. 167.

Anglis, hairy Astragalus.

Habitat in pascuis montosis et alpibus Scoticis. At Cromarty, Tarr, &c. D. Hope. 4. VII.

TRIFOLIUM. 896.

Flores subcapitati. Legumen vix calyce longius non dehiscens, deciduum.

* Meliloti leguminibus nudis polyspermis.

1. TRIFOLIUM leguminibus racemosis nudis dispersis rugosis acutis, caule erecto. Sp. pl. 1078. Melilotus officinalis.

DIADELPHIA DECANDRIA.

Melilotus siliquis racemosis, pendulis, rugosis, dispermis acutis. *Hall. hist.* 362.
 Melilotus officinarum germaniae. *B. pin.* 331.
 Melilotus vulgaris. *Park.* 719. *R. syn.* 331.
 Melilotus germaniae. *Ger. em.* 1205.
Anglis, Melilot Trefoil.
 Habitat in arvis et ad sepes. ♂. VI. VII.
 Pharmac. Meliloti Herba.

ornithopo- 2. TRIFOLIUM leguminibus nudis octospermis subdioides. ternis calyce duplo longioribus caule prostrato. *Sp. pl.* 1078. *Fl. dan.* 368.
 Trifolium siliquis ornithopodii. *R. syn. ed. II.* 195.
 Trifolium siliquosum loto affine siliquis ornithopodii. *Pluk. ph. t. 68. f. 1.*
 Fœnumgræcum humile repens ornithopodii siliquis brevibus erectis. *R. syn. 331. t. 14. f. 1.*
Anglis, birdsfoot Trefoil.
 Habitat in pratis et pascuis arenosis. Found by Tho. Willisel among the corn, half a mile on this side Tadcaster towards Sherborn; also near Oxford; on the sandy banks by the sea side, at Tottlesbury, in Essex, plentifully. Mr. Newton; Mr. Doody in Tothil-fields, Westminster. R. syn. on Mushold heath near Norwich, Mr. Pitchford, in ericeto nigro prope Londonum; circa Marazion et Penzance in Cornubia. ♂. VI. VII.

** Lotoidea leguminibus tectis polyspermis.

repens. 3. TRIFOLIUM capitulis umbellaribus, leguminibus tetraspermis, caule repente. *Sp. pl.* 108.
 Trifolium caule repente, spicis depresso, siliquis tetraspermis. *Hall. hist.* 367.
 Trifolium pratense album. *B. pin.* 327. *Park.* 1110.
R. syn. 327.
 Trifolium minus pratense, flore albo f. 2. *Ger. em.* 1185.
hybri- β Trifolium capitulis umbellaribus, leguminibus tetra-
dum. spermis caule adscendente. *Sp. pl.* 1099.
Trifolium.

Trifolium caulinis suberectis, spicis depresso-siliquis dispermis. *Hall. hist.* 368.

Trifoliastrum pratense corymbiferum. *Mich. gen.* 28.
t. 25. f. 2. 6.

Anglis, white Trefoil, or Dutch Clover.

Habitat in pratis et pascuis ubique, & in pratis humidis;
prope Peckham et Battersea observavi. *4. V—IX.*

*** *Lagopoda calycibus villosis monospermis.*

4. TRIFOLIUM spicis villosis globosis, corollis mono- *ochroleu-*
petalis, calycum infimo dente longissimo recto, *cum.*
caule subdeclinato, foliisque villosis infimis obcor-
datis.

Trifolium spicis villosis, caule erecto pubescente, fo-
liis infimis obcordatis. *Syst. Nat.* III. 233. *Jac.*
Austr. I. 26. *t. 40.*

Trifolium caule erecto, foliis hirsutis, supremis conju-
gatis, spicis oblongis. *Hall. hist.* 378.

Trifolium pratense hirsutum majus, flore albo-sulphu-
reо seu ὠχρολύκω. *R. syn.* 328.

Trifolium lagopoides annum hirsutum pallide luteum
seu ochroleucum. *Hist. Ox.* II. 141. *f. 2. t. 12. f. 12.*

Anglis, yellow Trefoil.

*Habitat in pratis et pascuis cretaceis in comitatibus Essexi-
ensi, Cantabrigiensi, Bedfordensi, Hertfordensi co-
piose; prope Stamford; et supra Duppers Hill, Croy-
don.* *♂. VI. VII.*

5. TRIFOLIUM spicis globosis villosis, cinctis stipulis *pratense*
oppositis membraceis, corollis monopetalis. *Sp. pl.*
1032. Fl. suec. 666.

*Trifolium caule obliquo, foliis hirsutis supremis con-
jugatis, vaginis aristatis.* *Hall. hist.* 377.

Trifolium pratense. *Dod. hist.* 365. *Cam. ep.* 582.
Ger. em. 1185. *purpureum.* *B. pin.* 327. *R. syn.*
328. vulgare. *Park.* 1110.

β *Trifolium pratense purpureum minus, foliis cordatis.*
R. syn. t. 13. f. 1.

γ *Trifolium purpureum majus sativum, pratense simile.*
R. syn. 328.

Anglis, purple Trefoil, Honeysuckle, or Clover.

DIADELPHIA DECANDRIA.

Habitat in pratis et pascuis. ♂. V—VIII.
Pharmac. Trifolii pratensis Herba.

alpestre. 6. TRIFOLIUM spicis subglobosis villosis terminalibus sessilibus, caule erecto, foliis lanceolatis serrulatis. Sp. pl. 1082.

Trifolium spicis villosis globosis terminalibus, corollis monopetalis, foliis lanceolatis subintegerrimis, caule erecto. Fl. angl. 284.

Trifolium foliis ovatis nervosis, supremis conjugatis, vaginis lanceolatis. Hall. hist. 376.

Trifolium montanum purpureum majus. B. pin. 328.

Trifolium purpureum majus, foliis longioribus et angustioribus, floribus saturioribus. R. syn. 328.

Anglis, perennial Trefoil, Clover, or Marle-grass.

Habitat in pratis et pascuis montosis. ♀. VII.

stellatum. 7. TRIFOLIUM spicis pilosis globosus, calycibus, patentibus æqualibus, caule obliquo foliisque villosis infimis obcordatis.

Trifolium spicis pilosis, calycibus patentibus, caule diffuso, foliolis obcordatis. Sp. pl. 1083.

Trifolium stellatum. B. pin. 329. pr. 143. glabrum

Ger. em. 1208. Pluck. ph. t. 113. f. 4. R. syn. 329.

Anglis, star Trefoil.

Habitat in pratis et pascuis maritimis. Observed by Dr. Johnson in Dartford salt-marsh; I found it by the waterside at Leigh and at Little-Holland, Essex; at Tilbury-Fort, Mr. Petiver; plentifully about Sheerness. Mr. Doody. R. syn. inter Greenhithe et Northfleet et alibi in Cantio; prope Bristolium copiose; ♀. VI. VII.

arvense. 8. TRIFOLIUM spicis villosis ovalibus, dentibus calycinis setaceis villosis æqualibus. Sp. pl. 1083.

Trifolium caule ramoso, foliis lanceolatis, serratis, spicis villosis ovatis. Hall. hist. 373.

Trifolium arvense humile spicatum s. Lagopus. B. pin. 328. R. syn. 330.

Lagopus. Fuchs. 494. Dod. cer. 212. vulgaris. Park. 1107.

Lagopodium sive Pes leporis. Ger. em. 1193.

β Lagopus

5 *Lagopus perpusillus supinus perelegans maritimis.*

br. R. syn. 330.

Anglis, hare's-foot Trefoil.

Habitat in arvis et pratis arenosis. ♂. VII. VII.

9. TRIFOLIUM capitulis sessilibus sublateralibus ova-*striatum*.
tis, calycibus striatis rotundatis. *Sp. pl. 1085.*

*Trifolium parvum hirsutum, floribus parvis dilute
purpureis in glomerulis mollieribus et oblongis,
semine magno. R. syn. 329. t. 12. f. 3. Vaill. 196.*

t. 33. f. 2.

Anglis, knotted Trefoil.

Habitat in pratis et pascuis siccioribus. ♂. VI.

10. TRIFOLIUM capitulis sessilibus lateralibus ovatis, *scabrum*.
calycum laciniis inæqualibus rigidis recurvis. *Syst.
nat. 503. Sp. pl. 1084.*

*Trifolium caulis prostratis, capitulis ovatis in alis
sessilibus, calycibus rigidis segmentis rectis. Hall.
hist. 371.*

Trifolium capitulo oblongo aspero. B. pin. 329.

*Trifolium flosculis albis, inglomerulis oblongis aspe-
ris, caulinulis proxime adnatis. R. syn. 329. Vaill.
paris. 169. t. 13. f. 1.*

Anglis, scabrus Trefoil.

*Habitat in pascuis cretaceis et arenosis ; in collibus cretaceis
juxta Thamefin, inter Northfleet et Gravesend. R.
syn. prope Chatham et in insula Shepey copiose. ♂.
V. VI.*

11. TRIFOLIUM capitulis sessilibus hemisphericis ri-*glomer-*
gidis, calycibus striatis patulis æqualibus. *Syst. nat. tum.
502. Sp. pl. 1084.*

*Trifolium cum glomerulis ad caulum nodos rotun-
dis. R. syn. 329. Pluk. ph. t. 113. f. 5.*

*Trifolium arvense supinum verticillatum. Barr. ic.
882.*

Anglis, round-headed Trefoil.

*Habitat in pratis et pascuis arenosis ; on Blackheath, and
near Greenhithe in Kent. R. syn. in insula Shepey,
circa Norwich. D. Rose. ♂. VI.*

subterra- 12. TRIFOLIUM capitulis villosis quinquefloris, involucro centerali reflexo rigido fructum obvolvente. *Sp. pl. 1087.*

Trifolium pumilum supinum flosculis longis albis. *Ph. br. R. syn. 327. t. 13. f. 2.*

Trifolium album tricoccum subterraneum reticulatum. *Hist. Ox. II. 138. f. 2. t. 14. f. 5.*

Anglis, dwarf Trefoil.

Habitat in pascuis et ericetis sterilioribus circa Londinum frequens. *Q. V.*

**** *Vesicaria calycibus inflatis ventricosis.*

*fragife-
rum,* 13. TRIFOLIUM capitulis subrotundis, calycibus inflatis bidentatis reflexis, caulis repentibus. *Sp. pl. 1086.*

Trifolium caule repente, spicis glabris, calycibus sericeis ampullescentibus. *Hall. hist. 370.*

Trifolium fragiferum. *Ger. em. 1208. R. syn. 329.
frisicum. B. pin. 329. Clus. cur. app. 38. t. 39.
Park. 1109.*

Trifolium fragiferum purpureum, folio oblongo. *Hist. Ox. II. 144. f. 2. t. 13. f. 2. Vaill. paris. 195. t. 22. f. 2.*

Anglis, strawberry Trefoil.

Habitat in pratis et pascuis humidis. *24. VIII.*

***** *Lupulina vexillis corollæ reflexis.*

*agrari-
um.* 14. TRIFOLIUM spicis ovalibus imbricatis; vexillis deflexis persistentibus, calycibus nudis, caule erecto. *Sp. pl. 1087. Fl. dan. 558.*

Trifolium spicis ovatis densissimis, strepentibus, caulis diffusis. *Hall. hist. 363.*

Trifolium luteum minimum. *Ger. em. 1186. Lob. ic. 29. Park. III.*

Trifolium pratense luteum, capitulo lupuli, vel agrarium. *B. pin. 328. R. syn. 330. Vaill. par. 196.
t. 22. f. 3.*

Anglis, hop Trefoil.

Habitat in pratis et pascuis glarosiss. *Q. VI. VII.*

*procum-
bens.* 15. TRIFOLIUM spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis

deflexis persistentibus, caulis procumbentibus.
Sp. pl. 1088. It. goth. 257.

Trifolium spicis strepentibus paucifloris, caulis erectis. Hall. hist. 364.

Trifolium lupulinum alterum minus. R. syn. 330.
t. 14. f. 3. Hall. opsc. 193.

Anglis, procumbent Trefoil.

Habitat in pascuis et pratis. ⊖. V—VIII.

16. TRIFOLIUM spicis subimbricatis : vexillis deflexis *filiforme*.
persistentibus, calycibus pedicellatis, caulis procumbentibus. Sp. pl. 1088.

Trifolium lupulinum minimum. R. syn. 331. t. 14.
f. 4.

Anglis, small Trefoil.

Habitat in pratis et pascuis arenosis. ⊖. VI.

LOTUS. 879.

Legumen cylindricum strictum. Alæ sursum longitudinaliter conniventes. Cal. tubulosus.

1. LOTUS capitulis depresso, caulis decumbentibus, *corniculatus*. leguminibus cylindricis patentibus. Sp. pl. 1092. tus.

Lotus siliquis umbellatis rectissimis, cylindricis. Hall. nom. 385. hist. 385.

Lotus corniculata glabra minor. B. hist. II. 356.
R. syn. 334.

Lotus s. Melilotus pentaphyllos minor glabra. B. pin. 332.

Trifolium siliquosum minus. Ger. em. 1190.

β Lotus pentaphyllos minor angustioribus foliis fruticosus. R. syn. 334.

Lotus pentaphyllos frutescens tenuissimis glabris foliis. B. pin. 332.

γ Lotus pentaphyllos, flore majore luteo splendente. B. pin. 332.

δ Lotus corniculata major, minus hirsuta. R. syn. 334.

ε Lotus corniculata minor, foliis subtus incanis. R. syn. 334.

Anglis, common Bird's-fool-trefoil.

Habitat in pratis, pascuis et ericetis. γ. in pratis nemorosis et sepibus humidis. 24. VI—VIII.

MEDICAGO.

MEDICAGO. 899.

Ligumen compressum, cochleatum, Carina corollæ a vexillo deflectens.

- sativa.* *1. MEDICAGO pedunculis racemosis, leguminibus contortis, caule erecto, glabro. *Sp. pl.* 1096.
Medica caule recto, foliis oblongis serratis, racemis erectis, siliquis planis, iterato contortis. *Hall. hist.* 382.
Medica legitima. *Clus hist.* II. 242.
Medica sativa. *Hist. Ox.* II. 150. *f. 2. t. 16. f. 2.*
Fœnum burgundiacum. *Lob. ic.* 2. *p. 38.*
Anglis, manured Medick, or Lucern.
Habitat in pratis et pascuis et ad sepes. 24. VI. VII.
- falcata.* 2. MEDICAGO pedunculis racemosis, leguminibus lunate, caule prostrato. *Sp. pl.* 1096. *Fl. dan.* 233.
Medica foliis oblongis serratis, siliquis semilunatis racemosis. *Hall. hist.* 381.
Medica sylvestris. *B. hist.* II. 383. *R. syn.* 333.
Medica frutescens flavo flore. *Clus. hist.* II. 243. *Park.* 1114.
Trifolium luteum siliqua cornuta. *Ger. em.* 1191.
Trifolium luteum sylvestre, siliqua cornuta et *Medica frutescens.* *B. pin.* 330.
Anglis, yellow Medick.
Habitat in aggeribus agrorum et pascuis arenosis in Norfolk; circa Norwich copiose D. Rose; betwixt Watford and Bushyhill, the footway; Mr. Doody. *R. syn.*
- lupulina.* 3. MEDICAGO spicis ovalibus, leguminibus reniformibus monospermis, caulibus procumbentibus. *Sp. pl.* 1097.
Medica caule diffuso, capitulis hemisphæricis, siliquis reniformibus. *Hall. hist.* 380.
Medica polycarpos fructu minore compresso scabro. *R. syn.* 333.
Medica cochleata minor polycarpos annua, capsula nigra minus hispida. *Hist. Ox.* II. 154. *f. 2. t. 15. f. 14.*

Trifolium

Trifolium pratense luteum. *Fuchs. hist.* 819. *capitulo breviore.* *B. pin.* 328.

Trifolium cochleatum polycarpon f. *Medica racemosa.* *Park.* 1114.

§ *Trifolium luteum lupulinum.* *Ger. em.* 1186. *R. syn.* 331.

Anglis, black Medick, or Nonesuch.

Habitat in arvis pratis et pascuis. ☽. V—VIII.

4. MEDICAGO leguminibus cochleatis, stipulis dentatis polymorpha, caule diffuso. *Sp. pl.* 1096.

Medicago pedunculis subbifloris, leguminibus cochleatis spinosis, stipulis dentatis, caule diffuso.

Medica foliis emarginatis serratis racemis paucifloris, filiisque globosis echinatis. *Hall. hist.* 383.

Medica arabica. *Cam. hort.* 97. t. 27. f. *Trifolium cordatum.* *Park.* 1115.

Trifolium cordatum. *Ger. em.* 1190.

Trifolium cochleatum folio cordato maculato. *B. pin.* 329. *R. syn.* 333.

β *Medica echinata minima.* *B. hist.* II. 386. *R. syn.* 333.

γ *Trifolium cochleatum modiolis spinosis.* *R. syn.*

333.

δ *Medica marina supina nostras, foliis viridibus ad summos ramulos villosis.* *Pluk. alm.* 245.

ε *Medicago pedunculis subbifloris, leguminibus inferioribus cochleatis spinosis, superioribus sub arcuatis, stipulis dentatis, caule diffuso.*

Anglis, heart Medick, Trefoil, or Clover.

Habitat in pratis pascuis et arvis; ε prope Charlton in Cantio. ☽. V.

Obs. In ε Legumina inferiora, *cochleata, spinosa, anfractibus quinis; spinis divergentibus, Semina perfecta; superiora linearia, semipollicaria, arcuata s. incurva, subtorulosa.* Semina *imperfecta.*

Classis XVIII.

POLYADELPHIA

P O L Y A N D R I A.

HYPERICUM. 902.

Cal. quinquepartitus. Petala quinque. Filamenta multa in quinque phalanges basi connata. Caps. subrotunda.

- Andro-* 1. HYPERICUM floribus trigynis, fructibus baccatis,
sænum. caule fruticoso ancipiti. *Sp. pl.* 1102.
Hypericum maximum Androsænum vulgare dictum.
R. syn. 343.
Androsænum maximum frutescens. *B. pin.* 280.
Androsæum. *Dod. pempt.* 78. *vulgare.* *Park.* 575.
Clymenum italorum. *Ger. em.* 548.
Anglis, Tutsan Saint-John's-wort.
Habitat in sylvis et sepibus humidis. 24. VII.
- burnif-* 2. HYPERICUM floribus trigynis axillaribus solitariis,
sum. caulis ancipitibus prostratis filiformibus, foliis
glabris. *Sp. pl.* 1105. *Fl. dan.* 141.
Hypericum caule prostrato, foliis ovatis, calycibus fer-
ratis punctatis. *Hall. hist.* 1039.
Hypericum supinum glabrum. *Ger. em.* 541. *B. pin.*
279.
Hypericum minus supinum. *Park.* 572. *R. syn.* 343.
Anglis, trailing Saint-John's-wort.
Habitat in pratis pasuis et ericetis. 24. VII.
- pulchrum.* 3. HYPERICUM floribus trigynis, calycibus ferrato-
glandulosis,

glandulosis, caule tereti, foliis perfoliatis cordatis,
glabris. *Sp. pl.* 1106. *Fl. dan.* 25.

Hypericum foliis amplexicaulibus cordatis, calycibus
ovatis serratis glanduligeris. *Hall. hist.* 1041.

Hypericum minus rectum. *B. pin.* 279.

Hypericum pulchrum Tragi. *B. hist.* III. 383. *R.*
syn. 342.

Hypericum quintum s. pulchrum Tragi. *Ger. em.* 540.

Anglis, upright Saint-John's-wort.

Habitat in *sylvis et ericetis*. 4. VII.

4. *HYPERICUM* floribus trigynis, caule ancipiti, fo- *perfora-*
liis obtusis pellucido-punctatis. Sp. pl. 1104. *tum.*

Hypericum caule tereti alato ramosissimo, foliis ovatis
perforatis. *Hall. hist.* 1037.

Hypericum. *Dod. pent.* 76. *Ger. em.* 540. *R. syn.*
342. *vulgare. B. pin.* 279. *Park.* 572.

Anglis, common Saint-John's-wort.

Habitat in *dumetis et ad sepes*. 4. VII.

Pharmac. *Hyperici Herba, Flores, Semina.*

5. *HYPERICUM* floribus trigynis, calycibus ferrato. *hirsutum.*
glandulosis, caule tereti ereto, foliis ovatis subpu-
bescensibus. *pl.* 1105.

Hypericum foliis ovatis hirsutis, calycibus lanceolatis
serratis glanduliferis. *Hall. hist.* 1043.

Hypericum Androsænum dictum. B. hist. III. 382.
R. syn. 343.

Androsænum hirsutum. B. pin. 280.

Androsænum alterum hirsutum. Column. ephr. I. 74.

Androsænum ascyonon dictum, caule rotundo hirsuto.

Hist. Ox. II. 271. *f. 5. t. 6. f. 11.*

Anglis, hairy Saint-John's-wort.

Habitat in *dumetis et sepibus*. VI. VII.

6. *HYPERICUM* floribus trigynis, calycibus ferraturis *monta-*
glandulosis, caule tereti erecto glabro, foliis ovatis. *num.*
Sp. pl. 1105. *Fl. dan.* 173.

Hypericum foliis ovatis, per oram punctatis, calycibus
lanceolatis, serratis globuligeris. *Hall. hist.* 1042.

Hypericum elegantissimum non ramosum folio lato.
B. hist. III. 383. *R. syn.* 343.

Androsænum

POLYADELPHIA POLYANDRIA.

Androsænum campoclarense. *Col. ephr.* I. 73.

Afcyon Fuchs. *hist.* 74. f. *Hypericum bifolium gla-*
brum non perforatum. *B. pin.* 280.

Anglis, mountain Saint John's-wort.

Habitat in sylvis et dumetis montosis passim. *In Charlton*
Wood. *Blackf. sp. bot.* 24. VII.

quadran- 7. **HYPERICUM** floribus trigynis, caule quadrato her-
gulum. *baceo.* *Sp. pl.* 1104. *Fl. dan.* 640.

Hypericum caule quadrangulari, foliis ovatis perfora-
tis, punctatis. *Hall. hist.* 1038.

Hypericum vulgare minus, caule quadrangulo, foliis
non perforatis. *B. pin.* 279.

Hypericum Afcyon dictum, caule quadrangulo. *B.*
hist. III. 382. *R. syn.* 344.

Afcyon. *Dod. pempt.* 78. *Ger. em.* 542. *vulgare.*
Park. 575.

Anglis, quadrangular Saint-John's wort, or Saint-
Peter's-wort.

Habitat in sepibus et nemorosis humidis. 24. VII.

elodes. 8. **HYPERICUM** floribus trigynis, caule tereti repente
foliisque villosis subrotundis. *Sp. pl.* 1106.

Afcyon supinum villosum palustre. *B. pin.* 280. *Park.*
574. *R. syn.* 344.

Afcyon supinum ελωδες. *Glus. hist.* app. alt. *Ger. em.*
542.

Anglis, marsh Saint-John's-wort, or Saint-Peter's-
wort.

Habitat in palustribus solo putrido et spongioso, passim. 24.
VII.

GULIELMI HUDSONI,

Regis Societatis Socii et Pharmacopæi Londinensis.

F L O R A

A N G L I C A;

EXHIBENS

P L A N T A S

P E R

Regnum BRITANNIÆ sponte crescentes,

DISTRIBUTAS

Secundum Systema Sexuale:

C U M

DIFFERENTIIS SPECIERUM,
SYNONYMIS AUCTORUM,
NOMINIBUS INCOLARUM,
SOLO LOCORUM,
TEMPORE FLORENDI,
OFFICIALIBUS PHARMACOPÆORUM.

T O M U S II.


EDITIO ALTERA, EMENDATA ET AUCTA.

LONDINI,

Impensis AUCTORIS:

Prostant Venales apud J. NOURSE, in the Strand.

M.DCC.LXXVIII.



Classis XIX.

SYNGENESIA:
POLYGAMIA ÆQUALIS.

* *Semiflosculosi Tourn. corollis ligulatis omnibus.*

TRAGOPOGON. 905.

Receptaculum nudum; Cal. simplex, polyphyllus;
Pappus plumosus.

1. TRAGOPOGON calycibus corollæ radio æquanti-pratense,
 bus, foliis integris strictis. *Sp. pl. 1109.*
 Tragopogon foliis gramineis carinatis amplexicauli-
 bus, caudatis subcrispis, calyce flori æquali. *Hall.*
hist. 8.
 Tragopogon luteum. *Ger. em. 735. Park. 412. R.*
syn. 171.
 Tragopogon pratense luteum majus. *B. pin. 274.*
Anglis, yellow Goat's-beard.
 Habitat in pratis et pascuis. ♂. VI.
2. TRAGOPOGON calycibus corollæ radio sesquilon-porrifo-
 gioribus, foliis integris strictis, pedunculis superne
 incrassatis. *Sp. pl. 1110. Hort. upf. 243.*
 Tragopogon foliis gramineis amplexicaulibus, calyce
 florem superantibus. *Hall. hist. 9.*
 Tragopogon purpuro-cæruleum, porrifolio quod Ar-
 tifi vulgo. *B. pin. 274. Hist. Ox. III. 8. f. 1. t. 9.*
f. 5.
 Tragopogon purpureum. *Ger. em. 735. Park. 412.*
R. syn. 172.
Anglis, purple Goat's-beard.
 Habitat in pratis et pascuis. *In many places of Cornwall,*
Dr. Gunthorp; in the fields about Carlisle and Rose-
Castle, Cumberland. R. syn. *In the marshes near*
 VOL. II. begins here. Y Long-

Long-Reach, below Woolwich, and in some meadows near Edmonton. Blacks. spec. bot. ♂. V.

SONCHUS. 908.

Recept. nudum. Cal. imbricatus, ventricosus. Pap-
pus plumosus.

soleraceus. 1. SONCHUS pedunculus tomentosus, calycibus glabris. *Sp. pl.* 1116.

lævis. α Sonchus foliis amplexicaulibus dentatis integris aut semipinnatis, calycibus levibus. *Hall. hist.* 21.
Sonchus lævis. *Ger. em.* 292. *R. syn.* 162. *vulgaris.*
Park. 805.

Sonchus lævis laciniatus latifolius. *B. pin.* 124.

β Sonchus lævis minor paucioribus laciniis. *B. pin.*
124.

γ Sonchus lævis laceratus. *Pet. H. br. t.* 14. *f.* 10.

δ Sonchus foliis amplexicaulibus, rigidiusculis, integris
aut semipinnatis, dentatis, calycibus levibus. *Hall.*
hist. 22.

Sonchus asper laciniatus. *B. pin.* 124. *Park.* 804.

ε Sonchus asper non laciniatus. *B. pin.* 123.

ζ Sonchus subrotundo folio nostras, levissimis spinulis
circa foliorum oras exasperatus. *Pluk. alm.* 354.
t. 61. *f.* 5. *R. syn.* 163.

Sonchus ἀφυλλόκαυλος angusto et oblongo folio nostras,
per foliorum ambitum creberrimis spinulis aspera-
tus. *Pluk. alm.* 354. *t.* 62. *f.* 4.

Sonchus asper dentatus. *Pet. H. br. t.* 14. *f.* 4.

Anglis, common Sow-thistle α—δ smooth δ, &c.
rough Sow-thistle.

Habitat in ruderatis, cultis, arvis. ○. VI.—VIII.
Pharmac. Sonchi Herba.

alpinus. 2. SONCHUS pedunculis squamosis, floribus racemo-
sis, foliis runcinatis. *Sp. pl.* 1117.

Sonchus foliis amplexicaulibus petiolatis triangulari-
bus, petiolo pinnato, floribus spicatis. *Hall. hist.*
20.

Sonchus lævis laciniatus cæruleus, f. Sonchus alpinus
cæruleus. *B. pin.* 124.

Sonchus cæruleus. *Cam. epit.* 284.

Anglis, alpine Sow-thistle.

Habitat in pascuis montosis. On the borders of corn-fields about Willington and Howden-Pans. Wall. Northumb. 186. ♂.

3. SONCHUS pedunculis calycibusque hispidis subum-*arvensis*. bellatis, foliis runcinatis basi cordatis. Sp. pl. 1116.

Fl. suec. 687. dan. 606:

Sonchus foliis amplexicaulibus semipinnatis ferratis, calycibus hispidis. Hall. hist. 23.

Sonchus repens, multis hieracium majus. B. hist. II. 170. R. syn. 163:

Sonchus arborescens. Ger. em. 294.

Hieracium majus folio sonchi. B. pin. 126.

Anglis, corn Sow-thistle.

Habitat in arvis et ad sepes. 24. VIII.

4. SONCHUS pedunculis calycibusque hispidis subum-*palustris*.

bellatis, foliis runcinatis basi sagittatis. Sp. pl. 1116.

Sonchus tricubitalis, folio cuspidato. Merr. pin. R. syn. 163.

Sonchus arborescens alter. Ger. em. 294.

Sonchus asper arborescens. B. pin. 124.

Anglis, marsh Sow-thistle.

Habitat in aquosis et ad ripas fluviorum; ad ripas Thameſis fluvii non procul Greenvico et circa Blackwall.

R. syn. 24. VIII.

L A C T U C A. 909.

Receptaculum nudum. Cal. imbricatus, cylindricus, margine membranaceo. Pappus simplex, stipitatus.

1. LACTUCA foliis horizontalibus carina aculeatis *viroſa*. dentatis. Sp. pl. 119. Gouan. mons. 408.

Lactuca foliis ovatis patulis, nervo spinoso. Hall. hist. 15.

Lactuca sylvestris major odore opii. Ger. em. 309. R. syn. 161.

Lactuca sylvestris odore viroſo. B. pin. 123.

Lactuca viroſa. Park. 813.

Anglis, stinking Lettuce.

Habitat ad sepes et margines agrorum. ♂. VII. VIII.

- scariola.* 2. LACTUCA foliis verticalibus, carina aculeatis. *Sp. pl. 1119.* Lactuca foliis semipinnatis nervo spinoso. *Hall. hist. 14.* Lactuca sylvestris costa spinosa. *B. pin. 123. R. syn. 161.* Lactuca sylvestris foliis dissectis. *Ger. em. 309.* Lactuca sylvestris laciniata. *Park. 814.* β Lactuca sylvestris folio non laciniato. *R. syn. 162.* *Anglis,* prickly Lettuce. Habitat in ruderatis et ad margines agrorum et ad sepes. ♂. VIII.
- saligna.* 3. LACTUCA foliis hastato-linearibus sessilibus carina aculeatis. *Sp. pl. 1119. Jac. austr. III. 28. t. 250.* Lactuca foliis imis semipinnatis, superioribus amplexicaulibus hamatis, nervis spinosis. *Hall. hist. 13.* Lactuca sylvestris altera angusto saligno folio, costa albicante. *Hall. jen. 207. t. 4.* Lactuca sylvestris minima. *R. cat. cant. ; syn. 160.* Chondrilla viscosa humilis. *B. pin. 130. p. 68. Ger. em. 287. Park. 783.* *Anglis,* least Lettuce. Habitat in aggeribus fossarum et pascuis solo cretaceo pastum. ○. VIII.

P R E N A N T H E S. 911.

Recept. nudum. *Cal.* calyculatus. *Pappus simplex,* subsessilis. *Flosculi simplici serie.*

- muralis.* 1. PRENANTHES flosculis quinis, foliis runcinatis. *Sp. pl. 1121. Fl. dan. 509.* Prenanthes foliis serratis pinnatis, pinna suprema triangulari trilobata. *Hall. hist. 18.* Lactuca sylvestris murorum flore luteo. *B. hist. II. 1004. R. syn. 162.* Sonchus laevis muralis. *Ger. em. 293.* Sonchus laevis-laciniatus muralis, parvis floribus. *B. pin. 124.* Sonchus laevis alter parvis floribus. *B. pin. 124.* *Anglis,*

Anglis, wall Prenanthes.

Habitat in muris et sylvis umbrosis. 4: VII.

LEONTODON. 912.

Recept. nudum. Cal. imbricatus, squamis laxiusculis.

Pappus simplex, stipitatus.

1. LEONTODON calyce squamis inferne reflexis, Taraxacum foliis runcinatis denticulatis lœvibus. Syst. nat. 521. cum Sp. pl. 1122. Fl. dan. 574.

Taraxacum calycibus glabris, squamis imis reflexis.

Hall. hist. 56.

Dens leonis. Ger. em. 290. R. syn. 171: vulgaris.

Camer. epit. 286. Park. 780.

Dens leonis latiore folio. B. pin. 126.

2 Dens leonis angustiore folio. B. pin. 126. R. syn. 171.

γ Dens leonis montanus angustifolius. R. syn. 171.

δ Leontodon calyce toto erecto glabro, scapo cavo unipalustre floro. Lyons fasc. 48.

Anglis, common Dandelion.

Habitat in pratis et pascuis δ in humidis umbrosis. 4:

IV.—VI.

Pharmac. Taraxaci Radix, Herba.

Obs. variat Foliis dentatis, et retrorsum-sinuatis; in δ calycis squamis infimis primo erectis postea reflexis.

CREPIS. 914.

Recept. nudum. Cal. calyculatus, squamis deciduis.

Pappus plumosus stipitatus.

1. CREPIS foliis runcinato-pinnatis hirtis, petiolis dentatis. Sp. pl. 1133. Gouan. monsp. 415.

Crepis foliis scabris pinnatis pinnis angulofisis dentatis retroversis, extrema triangulari maxima. Hall. hist. 29.

Hieracium luteum cichorei sylvestris folio, amygdalas amaras olens. Hist. Ox. III. 63. f. 7. t. 4. f. 4.

Hieracium castorei odore, Pet. b. br. t. 12. f. 1. monspelienium. R. syn. 165.

Senecio hirsutus. B. pin. 131.

Anglis, stinking Crepis.

Habitat in pratis et pascuis aridis ; circa Cantabrigiam et alibi sed rarius. R. syn. On Banstead Downs, by the side of the road to Dorking in Surry ; in Northfleet chalk-pits, Kent. Blacks. Spec. bot. prope Greenhithe. 6. VI. VII.

H E D Y P N O I S.

CAL. *Communis* calyculatus, oblongus. *Squamis* exterioribus linearibus, subæqualibus, laxis, brevibus. *Squamis* interioribus linearibus, æqualibus, laxis, conniventibus.

COR. *Composita*, imbricata, uniformis, *Cerollulis* hermaphroditis, numerosis, æqualibus.

Propria monopetala, ligulata, linearis, truncata, quinqaudentata.

STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, brevissima. *Anthera* cylindracea, tubulosa.

PIST. *Germen* ovale. *Stylus* filiformis longitudine staminum. *Stigmata* duo, reflexa.

PER. nullum. *Calyx* connivens, erectus.

SEM. *solitaria*, oblonga, reticulato-sulcata. *Pappus* subplumosus, sessilis.

REC. nudum, punctatum.

hispidum. I. HEDYPNOIS scapo nodo unifloro, foliis lanceolatis dentatis hispidis.

Leontodon calyce toto erecto hispido, foliis dentatis integerrimis hispidis : pilis furcatis. Sp. pl. 1124.

Picris caule nudo unifloro, foliis asperis dentatis. Hall. hist. 25.

Dens leonis hirsutus ἀπτόκαυλος, Hieracium dictus. R. syn. 171.

Hieracium dentis leonis folio hirsutum. Ger. em. 303.

Hieracium asperum flore magno dentis leonis. B. pin. 127.

Hieracium asperum foliis et floribus dentis leonis bulbosi. Park. 788.

hirtum. β Leontodon calyce toto erecto, foliis dentatis hirtis : pilis simplicissimis. Sp. pl. 1123.

Hieracium pumilum saxatile asperum præmorsa radice. B. pin. 128. pr. 66. ic. R. syn. 167.

Anglis,

Anglis, rough Hedypnois.
Habitat in pratis et pascuis. 4. V. VI.

2. HEDYPNOIS caule nudo ramoso, foliis lanceolatis *autumnalis* dentatis nudis.

Leontodon caule ramoso, pedunculis squamosis, foliis lanceolatis dentatis integerrimis glabris. Sp. pl. 1123. Fl. dan. 501.

Picris caule nudo brachiato, foliis glabris semipinnatis. Hall. hist. 28.

Hieracium minus. Fuchs. hist. 320. præmorsa radice. Park. 794. R. syn. 164.

Hieracium minus s. leporinum. Ger. em. 296.

Hieracium chondrillæ folio glabro, radice succisa, majus. B. pin. 127.

β Hieracium præmorsum laciniatum. Pet. h. br. t. 12. f. 2.

γ Hieracium folio acuto minus. Pet. h. br. t. 12. f. 3.

δ Hieracium folio obtuso minus. Pet. h. br. t. 12. f. 4.

ε Hieracium foliis lanceolatis dentatis glabris, scapo subnudo unifloro, calyce hirsuto. Sp. pl. 1125. Taraxaci.

Anglis, autumnal Hedypnois.

Habitat in pratis et pascuis, ε in pascuis montosis in Wallia et Scotia. 4. VII. VIII.

Obs. variat foliis dentatis, sinuato-dentatis et pinnatifidis, dentibus integerrimis. Calyce glabro et hirsuto et in ε hirsutissimo, pilis nigris. Caule simplici et ramoso, nudo et squamoso. In ε caule plerisque unifloro.

3. HEDYPNOIS caule folioso ramoso, foliis runcinatis *tectorum*, nudis, radicalibus lanceolatis, caulinis sagitatis acutis sessilibus.

Crepis foliis lanceolato-runcinatis sessilibus lœvibus: inferioribus dentatis. Sp. pl. 1135.

Crepis foliis ad terram pinnatis, superne amplexicaulis pinnatis hastatis. Hall. hist. 31.

Hieracium luteum glabrum s. minus hirsutum. B. hist. 211. R. syn. 165.

Hieracium aphacoides. Tabern. 182. Ger. em. 297. Cichoreum pratense luteum lœvius. B. pin. 126.

Park. 778.

β Hieracium aphacoides acutum. Pet. h. br. t. 12. f. 7.

SYNGENESIA: POLYGAMIA AEQUALIS.

γ Hieracium lactucæ folio. Pet. b. br. t. 12. f. 5.
Anglis, yellow Hedypnois or Devil's-bit.
 Habitat in pratis, pascuis, muris et tectis. ○. VI.—IX.
 Obs. *Pappus simplex*.

Hieraci- 4. **HEDYPNOIS** caule folioso corymboso, foliis sessili-
oides. bus oblongis integris hispidis,

Picris perianthiis laxis, foliis integris. Sp. pl. 1115.
Picris aspera foliis oblongis dentatis, superioribus am-
 plexicaulibus. Hall. hist. 24.

Hieracium asperum, majore flore, in agrorum limiti-
 bus. B. hist. II. 1029. R. syn. 167.

Hieracium asperum. Ger. em. 298.

Cichoreum pratense luteum hirsutie asperum. B. pin.
 126.

Cichoreum pratense luteum asperum. Park. 777.

Anglis, succory Hedypnois.

Habitat in agrorum marginibus soli calcareo. ○. VII.

biennis.

5. **HEDYPNOIS** caule folioso corymboso, foliis runci-
 natis hispidis basi superne dentatis, calycibus muri-
 catiis.

Crepis foliis runcinato-pinnatifidis scabris basi superne
 dentatis, calycibus muricatis. Sp. pl. 1136.

Crepis foliis subscabris, semipinnatis, pinna extrema
 maxima. Hall. hist. 30.

Hieracium maximum Chondrillæ folio, asperum. B.
 pin. 127. pr. 64. R. syn. 166.

Hieracium, erucæ folio hirsutum. B. hist. II. 1025.

6. *Hieracium cichorei* folio minus. Pet. b. br. t. 12. f. 9.
Anglis, tall Hedypnois.

Habitat in pratis et pascuis soli calcareo; circa North-
 fleet et alibi in Cantio frequens. ♂. VII. VIII.

P I C R I S. 907.

Recept. nudum. *Cal.* duplicatus: exterior pentaphyl-
 lis maximus; interior imbricatus. *Pappus* plomo-
 sus stipitatus.

echioides. 1. **PICRIS** perianthiis exterioribus pentaphyllis interiore
 aristato majoribus. Sp. pl. 1114.

Hieracium

Hieracium echioides capitulis cardui benedicti. B.

pin. 128. R. syn. 166.

Buglossum luteum. Ger. em. 798. f. Lingua bovis.
Park. 800.

Anglis, rough Picris.

Habitat in marginibus agrorum. O. VII. VIII.

HIERACIUM. 913.

Recept. nudum. Cal. imbricatus, ovatus. Pappus simplex, sessilis.

* *Scapo nudo unifloro.*

1. HIERACIUM foliis oblongis integris dentatis, scapo *alpinum*.
subnudo unifloro, calyce piloso. Sp. pl. 1124. Fl.
dan. 27.

Hieracium caule unifloro foliis lingulatis dentatis hirsutis, calyce hirsuto. Hall. hist. 49.

Hieracium alpinum pumilum, folio lanuginoso. B.
pin. 129.

Hieracium villosum alpinum, flore magno singulari.
R. syn. 169. t. 6. f. 2.

Anglis, mountain Hawkweed.

Habitat in montibus. In rupibus in monte Glyder et
Trigfylchau prope Llanberris; in monte Ben Croochin; et prope Loch Awe in Scotia. D. Hope. 4.
VII.

2. HIERACIUM foliis integerimis ovatis, subtus tomentosis, caule repente, scapo unifloro. Sp. pl.
1125. *Pilosella**

Hieracium caule unifloro, stolonibus reptantibus, foliis petiolatis, ovatis, longe pilosis, subtus tomentosis.
Hall. hist. 53.

Pilosella repens. Ger. em. 638. R. syn. 170.

Pilosella major repens hirsuta. B. pin. 262.

Pilosella minor vulgaris repens. Park. 690.

Anglis, mouse-ear Hawkweed.

Habitat in pratis et pascuis siccissimis. O. V.

Pharmac. Pilosellæ s. Auriculæ muris Herba.

** *Sapo nudo multifloro.*

dubium. 3. **HIERACIUM** foliis integris ovato-oblongis, stolonibus repentibus, scapo nudo multifloro. *Sp. pl.* 1125.

Hieracium caule nudo paucifloro, stolonibus reptantibus, foliis longe pilosis lanceolatis. *Hall hist.* 53.

Pilosella major. 1. *Tabern.* 196. *repens minus hirsuta.*
B. pin. 262.

Anglis, creeping Hawkweed.

Habitat in montosis humidiisculis; in monte Fairfield dicta prope Rydall in comitatu Westmerlandica. 24. VII. VIII.

Obs. habet multa communia cum Pilosella; sed major est, et folia subtus pilosa non tomentosa. Scapus a tribus ad sex floris, semipedalis aut dodrantalis glaber.

auricula. 4. **HIERACIUM** foliis lanceolatis integerrimis, scapo nudo multifloro, stolonibus reptantibus. *Sp. pl.* 1126.

Hieracium caule nudo, stolonibus reptantibus, foliis longe pilosis, lanceolatis, floribus umbellatis. *Hall hist.* 52.

Pilosella major erecta altera. *B. pin.* 262.

Pilosella major umbellifera μακροκαυκός montana et pra-tensis. *Col. ephr.* 248. 249.

Anglis, narrow-leaved Hawkweed.

Habitat in montosis; supra Dalehead non longe a Grassmere in Westmorlandia, sed sparsim. 24. VII.

Desc. Radix præmorsa, radiculis numerosis, simplicibus. Stolones repentes foliosæ, Scapus erectus, nudus, sub-pilosus, piis raris. vix semipedalis. Folia lanceolata subintegerrima, acuta, nuda. Flores paniculati a tribus ad sex, lutei. Calycis foliola linearia, pilosa.

*** *Caulē folioso.*

murorum. 5. **HIERACIUM** caule ramoso, foliis radicalibus ovatis dentatis, caulino minori. *Sp. pl.* 1128.

Hieracium caule subnudo paucifloro, foliis ovato-lanceolatis, circa petiolum dentatis. *Hall. hist.* 46.

Hieracium murorum folio pilosissimo. *B. pin.* 129.
R. syn. 168.

Hieracium murorum Bauhini, quod est Pulmonaria Gallorum Lobelii. *Park.* 801.

Pulmonaria gallica s. aurea latifolia. *Ger. em.* 304.
β Hieracium

β Hieracium Pulmonaria dictum angustifolium. *R. syn.*
168.

Pulmonaria gallica s. angustifolia. *Ger. em.* 304.

γ Hieracium macrocaulon hirsutum folio rotundiore. *R. syn.*
169.

Hieracium fruticosum folio subrotundo. *B. pin.* 126.

δ Hieracium λεπτόκαυλον hirsutum folio longiore. *R. syn.*
169.

ϵ Pilosellæ majoris seu Pulmonariæ luteæ species an-
gustifolia. *B. hist. II.* 1034.

Anglis, wall Hawkweed, French or Golden Lung-
wort.

Habitat in sylvis, muris et aggeribus agrorum. 24. VII.

6. HIERACIUM caule paniculato, foliis amplexicau- *paludo-*
libus dentatis glabris, calycibus hispidis. *Sp. pl. sum.*
1129.

Hieracium foliis glabris dentatis, imis petiolatis, su-
perioribus amplexicaulibus, calycibus hirsutis. *Hall.*
hist. 45.

Hieracium montanum latifolium glabrum minus. *B.*
pin. 129. *Hist. Ox. III.* 69. f. 7. t. 5. f. 47.

Hieracium montanum cichorei folio. *R. syn.* 166.

Anglis, marsh Hawkweed.

Habitat in pratis humidis et juxta rivulos Cravoniæ
montosæ abundat. *R. syn.* 3. VII.

7. HIERACIUM caule erecto multifloro, foliis ovato- *sabau-*
lanceolatis dentatis semiamplexicaulibus. *Sp. pl. dum.*
1131. *Hort. upf.* 238.

Hieracium foliis hirsutis dentatis, inferioribus ellipticis,
superioribus ovato-lanceolatis. *Hall. hist.* 35.

Hieracium fruticosum latifolium hirsutum. *B. pin.*
129. *Park.* 802. *R. syn.* 167.

β Hieracium fruticosum latifolium glabrum. *Park.* 168.

γ Hieracium s. Pilosellæ majoris species humilis, foliis
longioribus rarius dentatis plurimis simul, flore sin-
gulari nostras. *R. syn.* 170. *Pluk. ph. t.* 37. f. 3.

Anglis, shrubby Hawkweed.

Habitat in sylvis et sepibus, β in sylvis humidis opacis.
24. VII. VIII.

8. HIERA-

- umbella-* 8. **HIERACIUM** foliis linearibus subdentatis sparsis,
tum. floribus subumbellatis. *Sp. pl.* 1131. *Hist.* 34.
Hieracium fruticosum angustifolium majus. *B. pin.*
129. *Park.* 801. *R. syn.* 298.
Hieracium intibaceum. *Ger. em.* 298.
β Pulmonaria angustifolia glabra. *Pet. h. br. t.* 13. *f.* 11.
γ Pulmonaria graminea. *Pet. h. br. t.* 13. *f.* 12.
Anglis, umbellated Hawkweed.
Habitat in sepibus, nemorosis fccis. 24. VII. VIII.

H Y O S E R I S. 916.

Recept. nudum. *Cal.* subæqualis. *Pappus pilosus vel*
obsoletus.

- minima.* 1. **HYOSERIS** caule diviso nudo, pedunculis incrassatis,
Sp. pl. 1138. *Fl.* *dan.* 201.
Hyoseris mascula. *Ger. em.* 288.
Hieracium minimum. *Clus. hist.* 142. *Hyoseris Ta-*
bernæmontani et Gerardi. *Park.* 791. *R. syn.* 173.
Hieracium minus folio subrotundo. *B. pin.* 127.
Lapsana foliis ovatis, dentatis, caulis nudi sub flore
tumentibus. *Hall. hist.* 4.
Anglis, least Hyoseris or Swine's Succory.
Habitat in pratis et arvis solo glareoso. Circa Hampton-
court copiose. D. Doody. *In the common corn-field,*
Walthamstow, Essex, Dr. Watson. *In Tedding-
ton field, near Hampton.* 24. V. VI.

H Y P O C H Æ R I S. 918.

Recept. paleaceum. *Cal.* subimbricatus. *Pappus plu-*
mösus.

- maculata.* 1. **HYPOCHÆRIS** caule subnudo: ramo solitario, foliis
ovato-oblongis integris dentatis. *Sp. pl.* 1143. *Fl.*
dan. 149.
Hypochæris caule unifloro, foliis dentatis, hirsutis.
Hall. hist. 2.
Hieracium 1. latifolium. *Clus. hist.* II. 139. *R. syn.*
167.
Hieracium alpinum latifolium hirsutie incanum, flore
magno. *B. pin.* 128. *Sch. it.* 11.
Anglis,

Anglis, spotted Hypochæris.

Habitat in pratis et pascuis montosis. Found on the banks of the Devil's ditch near Reche, not far from Newmarket; also on Burnack heath in Northamptonshire. R. syn. 4. VII.

HYPOCHÆRIS foliis runcinatis obtusis scabris, caule radicata. ramoso nudo lævi, pedunculis squamosis. Sp. pl. 1140. Fl. dan. 250.

Hypochæris foliis semipinnatis hirsutis, caule nudo brachiato. Hall. hist. 3.

Hieracium dentis leonis folio obtuso, majus. B. pin. 127. Hist. Ox. III. 66. s. 7. t. 4. f. 27.

Hieracium longius radicatum. Lob. hist. 120. Ger. em. 298. Park. 790. R. syn. 165.

Anglis, long-rooted Hypochæris.

Habitat in pratis et pascuis. 4. V.—VII.

HYPOCHÆRIS glabra, calycibus oblongis imbri-glabra. catis, caule ramoso nudo, foliis dentato-sinuatis.

Sp. pl. 1140. Fl. dan. 424.

Hieracium minus dentis leonis folio oblongo glabro. B. pin. 127.

Hieracium parvum in arenosis nascens, seminum pappis densius radiatis. R. syn. 166.

Hieracium minimum. Col. ecphr. I. 27.

Anglis, smooth Hypochæris.

Habitat in pratis montosis. Found on the gravelly grounds near Middleton in Warwickshire. R. syn. prope Norwich. D. Pitchford; circa Comb et Kingston in comitatu Surriensi. 4. VI.—VII.

L A P S A N A. 919.

Recept. nudum. Cal. calyculatus, squamis singulis interioribus canaliculatis.

LAPSANA calycibus fructus angulatis, pedunculis communis. tenuibus ramosissimis. Sp. pl. 114. Fl. dan. 500.

Lapsana caule brachiato, foliis ovatis longe petiolatis, petiolis pinnatis. Hall. hist. 6.

Lampsana. Dod. pempt. 673. Ger. em. 255. R. syn. 173. vulgaris. Park. 810.

Soncho

SYNGENESIA: POLYGAMIA AEQUALIS.

Soncho affinis Lampsana domestica. *B. pin.* 124.

Anglis, common Nipplewort.

Habitat in *sepibus*, *nemorosis* et *ruderatis*. ♂. VI. VII.

C I C H O R I U M. 921.

Recept. subpaleaceum. *Cal.* calyculatus, *Pappus* subquinquedentatus, obsolete pilosus.

Intybus. 1. CICHORIUM floribus geminis sessilibus, foliis runcinatis. *Sp. pl.* 1142.

Cichorium foliis pinnatis pinnis triangularibus dentatis, floribus sessilibus. *Hall. hist.* 1.

Cichorium sylvestre. *Ger. em.* 284. *Park.* 776. *R.* syn. 172. f. officinarum. *B. pin.* 125.

Anglis, wild Succory.

Habitat ad *margines agrorum*. ♂. VII. VIII.

Pharmac. Cichorei Radix, Herba.

** Capitati.

A R C T I U M. 923.

Cal. globosus: squamis apice hamatis inflexis.

Lappa. 1. ARCTIUM foliis cordatis inermibus petiolatis. *Sp. pl.* 1143. *Fl. dan.* 642.

Lappa. *Hall. hist.* 161, major seu Arctium Dioscoridis, *B. pin.* 198. *R. syn.* 197.

Bardana major. *Ger. em.* 809.

Bardana vulgaris major. *Park.* 1222.

ꝝ Lappa major capitulo glabro maximo. *R. syn.* 196.

ꝝ Lappa major montana, capitulis tomentosis. *B. pin.* 198. *Mill. ic.* 159.

ꝝ Lappa major capitulis parvis glabris. *R. syn.* 197.

ꝝ Lappa major montana, capitulis minoribus, rotundioribus et magis tomentosis. *Tourn.* 450.

ꝝ Lappa major ex omni parte minor, capitulis parvis eleganter reticulatis. *Pluk. alm.* 205.

Anglis, common Burdock or Clot-bur.

Habitat in *viis*, *ruderatis*, *cultis*. ♂. VII. VIII.

Pharmac. Bardanæ Radix.

SERRATULA. 924.

Cal. subcylindricus, imbricatus, muticus.

1. SERRATULA foliis lyrato-pinnatifidis : pinna terminali maxima, flosculis conformibus. *Sp. pl.* 1144.

Fl. dan. 281.

Serratula. *B. pin.* 225. *R. syn.* 196. *purpurea.* *Ger.* *em.* 713.

Serratula vulgaris flore purpureo. *Park.* 474.

Carduus inermis foliis glabris serratis, imis ovatis, superioribus semipinnatis. *Hall. hist.* 163.

2. Serratula flore candido. *Boerb. ind. alt.* 144.

Anglis, common Saw-wort.

Habitat in sylvis et pascuis. 24. VII.

2. SERRATULA calycibus subhirsutis ovatis, foliis *alpina*.
indivisis. *Sp. pl.* 1145. *Fl. dan.* 37.

Cirsium foliis ovato-lanceolatis dentatis subtus tomentosis, calycibus villosis. *Hall. hist.* 179. t. VI.

Cirsium humile montanum cynoglossi folio polyanthemum. *R. syn.* 193. *Dill. elth.* 82. t. 70. f. 81.

Carduo-cirsium minus britannicum, floribus plurimis summo caule congestis. *Pluk. ph.* t. 154. f. 3.

Carduus mollis lapathi folio. *B. pin.* 377.

3. S. *Cirsium montanum polyanthemum salicis* folio angusto denticulato. *R. syn.* 193.

Anglis, mountain Saw-wort.

Habitat in rupibus montosis. On the highest rocks of Snowdon, and Brerecliff, near Burnly, Lancashire.

R. syn. 24. VII.

3. SERRATULA foliis dentatis spinosis. *Sp. pl.* 1149. *arvensis*.
Fl. dan. 644.

Cirsium caule angulo ramoso, foliis semipinnatis, pinnis angulosis, spinosis, calycibus longis inermibus. *Hall. hist.* 171.

Carduus vulgatissimus viarum. *Ger. em.* 1173. *R. syn.*

194.

Carduus vinearum repens, sonchifolio. *B. pin.* 387.

Carduus ceanothos f. viarum et vinearum repens.

Park. 959.

Anglis,

Anglis, corn Saw-wort or Way-thistle.
Habitat in arvis et ad vias. 4. VII.

C A R D U U S. 925.

Cal. ovatus, imbricatus, squamis spinosis. *Receptaculum pilosum.*

* *Foliis decurrentibus.*

lanceola- 1. **CARDUUS** foliis decurrentibus pinnatifidis hispidis, laciniis divaricatis, calycibus ovatis spinosis villosis, caule piloso. *Sp. pl.* 1149.

Cirsium foliis semipinnatis, pinnis bilobatis spinosis, capitulis congestis, tomentosis conicis. *Hall. hist.* 169. *Nom.* 169:

Carduus lanceolatus. *Tabern.* 699. *Ger. em.* 1174.
R. syn. 195. latifolius. *B. pin.* 385. f. majus. *Park.* 982.

♂ **Carduus** lanceatus major. *R. syn.* 195.

♀ **Carduus** lanceatus flore et capite minoribus. *Merr.*
pin. *R. syn.* 195.

Anglis, spear Thistle.

Habitat in ruderatis et marginibus viarum. ♂. VII.

nutans. 2. **CARDUUS** foliis semidecurrentibus spinosis, floribus cernuis, squamis calycinis superne patentibus. *Sp. pl.* 1150.

Carduus foliis semipinnatis, pinnis angulosis spinosis, floribus nutantibus, calycinis squamis pungentibus patulis. *Hall. hist.* 167.

Carduus nutans. *B. hist.* III. 56. *R. syn.* 193.

Carduus muscatus. *Ger. em.* 1174.

Carduus spinosissimus latifolius sphærocephalus vulgaris. *B. pin.* 385.

Anglis, musk Thistle. *Pet. H. br. t.* 21. f. 1.

Habitat in pascuis solo calcareo. ○. VII.

Obs. Flores pedunculati; pedunculi tomentosi, nudi.

crispus. 3. **CARDUUS** foliis decurrentibus sinuatis: margine spinosis, calycibus globosis pedunculatis solitariis erectis.

Carduus

Carduus acanthoides, foliis decurrentibus sinuatis: margine spinosis, calycibus pedunculatis solitariis erectis villosis. *Sp. pl.* 1150. *Jac. austr.* III. 28. t. 249.

Carduus foliis ovatis et semipinnatis, subtus tomentosis spinosis, calycibus molliter spinosis reflexis. *Hall. hist.* 165.

Carduus sylvestris III. *Dod. pempt.* 740.

Polyacanthos. *Ger. em.* 1173.

Carduus caule crispus. *B. hist.* III. 59. *R. syn.* 194.

Carduus spinosissimus angustifolius vulgaris. *B. pin.* 385. *Loef. pruss.* 34. t. 5.

Anglis, curl'd Thistle.

Habitat in ruderatis et ad vias. ○. VII.

Desc. Radix annua. Caulis solitarius, herbaceus, subcavus, tri et quadripedalis, erectus, angulatus; totaliter alatus, marginibus foliorum utrinque decurrentibus; *crispus*, spinosus, tomentosus, ramosus; ramis alternis patentibus. Folia alterna, patentia, utrinque decurrentia, oblonga, sinuata, laciinis oppositis dentatis spinosis, supra subnuaa, subtus tomentosa. Flores terminales, solitari, pedunculati, purpurei. Calyx globosus, tomentosus, squamis oblongis, acuminatis sub-inermibus.

4. *CARDUUS* foliis decurrentibus sinuato-dentatis: margine spinosis, calycibus ovatis terminalibus aggregatis sessilibus, squamis acuminatis erectiusculis. *acanthoides*.

Carduus crispus, foliis decurrentibus sinuatis: margine spinosis, floribus aggregatis terminalibus, squamis inermibus subaristatis patulis. *Syst. nat.* 529. *Sp. pl.* 1150.

Carduus alis caulinis latissimis, foliis semipinnatis, pinnis angulofisis spinosis, floribus fasciculatis oblongis. *Hall. hist.* 166?

Carduus acanthoides. *B. hist.* III. 56.

Carduus polyanthus. *Park.* 982. *R. hist.* 309.

Anglis, welted Thistle.

Habitat in ruderatis et ad margines agrorum. ○. VI. VII.

Desc. Radix annua, ramosa. Caules plures, herbacei, fistulosi, bipedales, erecti, striati, angulati, quadrialati, foliorum marginibus utrinque totaliter decurrentibus; inferne villosi, superne tomentosi, ramosi; ramis alternis, erectis,

SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS.

erectis, axillaribus. Folia alterna utrinque decurrentia, oblonga, sinuato-dentata, lacinii oppositis dentatis; margine spinosa, subtus tomentosa, supra villosa. Flores terminales, aggregati, sessiles, pallide purpurei. Calyx ovatus; subtomentosus; squamis ovatis acuminatis, erectiusculis, persistentibus.

palustris. 5. **CARDUUS** foliis decurrentibus dentatis: margine spinosis, floribus racemosis erectis, pedunculis inermibus. *Sp. pl. 1151.*

Cirsium caule recto subnudo alato, foliis semipinnatis spinosis, calycibus aristatis. *Hall. nom. et hist. 170.*

Carduus palustris. *B. pin. 377. pr. 156. Park. 983.*

R. syn. 194.

β **Carduus palustris** mitior, bardanæ capitulo in summo caule singulari. *Pluk. R. syn. 194.*

Anglis, marsh Thistle.

Habitat in pratis paludosis et nemorosis humidis. 24.
VII.

** *Foliis amplexicaulibus.*

helenio-
des.

6. **CARDUUS** foliis radicalibus lanceolatis, caulinis sessilibus cordatis acutis dentatis spinoso-ciliatis subtus niveis, caule subsimplici.

Carduus foliis amplexicaulibus lanceolatis dentatis, spinulis inæqualibus ciliatis, caule inermi. *S. pl. 1155. Fl. dan. 109. Jac. austr. I. t. 43.*

Cirsium foliis ciliatis subtus tomentosis, radicalibus petiolatis ovato-lanceolatis, caulinis lanceolatis et semipinnatis. *Hall. hist. 180. t. 7.*

Cirsium britanicum clusii repens. *B. hist. III. 46.*

R. syn. 193.

Cirsii anglici alia icon Pennei. *Ger. em. 1183.*

Cirsium aliud anglicum. *Park. 961.*

Cirsium singulari capitulo squamato, vel incanum alterum. *B. pin. 377. Mill. ic. 94.*

Hetero-
phyllus.

β **Carduus** foliis amplexicaulibus lanceolatis ciliatis integris laciniatisque, caule subunifloro, calyce inermi.

Sp. pl. 1154. Gmel. fib. II. 51. Jac. austr. I. 27. 43.

Cirsium maximum asphodeli radice. *B. pin. 377.*

Anglis, melancholy Thistle.

Habitat

Anglis, melancholy Thistle.

Habitat in pascuis montosis agri Eboracensis, Westmorlandici, Cumberlandici et Cambrobritannici passim.
VI. VII.

Obs. Folia in α lanceolata, integra et dentata; in β , folia radicalia dentata et pinnatifida; caulina inferiora pinnatifida, media dentata, suprema, integra, omnia spinoso-ciliata, subtus tomentosa, nivea; Caules subramosi, ab unico ad sex flores; α et β ex eodem radice observavi.

7. CARDUUS foliis sessilibus semiamplexicaulibus lan- pratensis.
ceolatis subdentatis spinulis inæqualibus ciliatis;
caule subunifloro. *Jac. austr. I. t. 42.*

Cirsium pannonicum I. pratense. *Clus. hist. 148.*

Cirsium angustifolium non laciniatum. *B. pin. 377.*

Cirsium montanum anglicum. *Ger. em. 1183.*

Cirsium anglicum. *Lob. ic. 583.* *Park. 961.* radice hellebore nigri modo fibroso, folio longo. *B. hist. III.*

45.

Anglis, meadow Thistle.

Habitat in pratis et pascuis humidis. 4. VI.

Desc. Radix perennis, fibrosa, repens. Caulis solitarius, herbaceus, pedalis et bipedalis, erectus, foliatus, tomentosus, simplex; subinde ramo unico. Folia radicalia pauca, petiolata, lanceolata, subdentata, margine inæqualiter aculeato-ciliata, acuminata, supra hispidiuscula subtus tomentosa; Caulina a tribus ad sex vel septem, alterna, semiamplexicaulia, lanceolata, subintegerrima, margine inæqualiter aculeato-ciliata, supra hispidiuscula, subtus tomentosa, non nivea; Flos terminalis purpureus; Calyx ovatus tomentosus, squamis imbricatis, ovatis, acuminatis, purpurascens.

8. CARDUUS foliis amplexicaulibus hastato-pinnatifidis spinosis, calycibus aphyllis: spinis canaliculatis duplicato-spinosis. *Sp. pl. 1152.*

Silybum nervis foliorum albis. *Hall. hist. 181.*

Carduus mariæ. *Trag. hist. 850.* *Ger. em. 1150.* *R. syn. 195.* *vulgaris*. *Park. 979.*

Carduus albis maculis notatus vulgaris. *B. pin. 281.*

3 *Carduus mariæ hirsutus non maculatus*. *R. syn. 194.*
Anglis, milk Thistle.

SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS.

Habitat in aggeribus fossarum et ruderatis. ♂. VIII.
Pharmac. Cardui mariæ Herba, Semina.

- eriopho-* 9. **CARDUUS** foliis sessilibus bifariam pinnatifidis: la-
rus. tiniis alternis erectis, calycibus globosis villosis.
Sp. pl. 1153.
Cirsium foliis pinnatis, pinnis bilobatis lanceolatis
spinosis, calycibus sphæricis spinosis tomentosis.
Hall. hist. 168.
Carduus eriocephalus. *Dod. purg.* 445. *Ger. em.* 1152.
Carduus tomentosus corona fratrum dictus. *Lob. ic.* 2.
p. 9. Park. 978. *R. syn.* 195.
Carduus capite tomentoso. *B. pin.* 382.
Anglis, globe Thistle.
Habitat in pratis et pascuis montosis, solo calcareo. ♂.
VII.
- acaulis.* 10. **CARDUUS** acaulis, calyce glabro. *Sp. pl.* 1156.
Cirsium floribus acaulis. *Hall. hist.* 178.
Carduus acaulis, minore purpureo flore. *B. pin.* 380.
Ger. em. 1158. *R. syn.* 195.
Carduus acaulis septentrionalium. *Park.* 969.
Anglis, dwarf Thistle.
Habitat in pascuis montosis præcipue solo calcareo. In
Ericeto nigro prope Londinum. ♀. VII.

ONOPORDUM. 927.

Recept. favosum. *Cal.* squamæ mucronatæ.

- Acanthi-* 1. **ONOPORDUM** calycibus squarrosois: squamis pa-
um. tentibus, foliis ovato-oblongis sinuatis. *Sp. pl.*
1158.
Onopordon caule alato, foliis ovatis dentatis, denti-
bus angulosis aristatis. *Hall. hist.* 159.
Carduus tomentosus, Acanthium dictus, vulgaris. *R.*
syn. 196.
Acanthium. *Dod. pem.* 721.-album. *Ger. em.* 1149.
Acanthium vulgare. *Park.* 1149.
Spinæ alba. *Fuchs. hist.* 57, tomentosa latifolia syl-
vestris. *B. pin.* 382. *Loef. pr.* 261. t. 82.
Anglis, woolly Onopordum or Cotton-thistle.
Habitat in ruderatis. ♂. VII.

CARLINA.

CARLINA. 929.

Cal. radiatus squamis marginalibus longis, coloratis.

1. CARLINA caule multifloro corymboso, floribus terminalibus, calycibus radio albis. *Sp. pl.* 1161.

Carlina foliis imis semipinnatis, pinnis angulosis spinosis, superioribus ovato-lanceolatis amplexicaulis. *Hall. hist.* 182.

Carlina sylvestris major. *Ger. em.* 1159.

Carlina sylvestris quibusdam alijs atractylis. *B. hist.* III. 81. *R. syn.* 175.

Cnicus sylvestris spinosior. *B. pin.* 378.

Anglis, wild Carline.

Habitat in pratis et pasuis. ♂. VI.

*** *Discoideæ.*

BIDENS. 932.

Recept. paleaceum. *Pappus* aristis erectis, scabris.

Cal. imbricatus. *Cor.* rarius flosculo uno alterne radiente instruitur.

1. BIDENS foliis trifidis, calycibus subfoliosis, semini-*tripartites* bus erectis. *Sp. pl.* 1165.

Bidens foliis petiolatis trilobatis et quinquelobatis ferratis, floribus circumvallatis. *Hall. hist.* 121.

Verbesina f. Cannabina aquatica flore minus pulchro, elatior et magis frequens. *B. hist.* III. 1073. *R. syn.* 187.

Cannabina aquatica folio tripartito diviso. *B. pin.* 321.

Eupatorium cannabinum foemina. *Ger. em.* 711.

Eupatorium cannabinum duorum generum. *Park.* 595.

2. Bidens foliis lanceolatis sessilibus, floribus seminibus minima-que erectis. *Fl. angl.* 310. *Sp. pl.* 1165. *Fl. dan.* 312.

Verbesina minima. *Dill. giss.* 167. *R. syn.* 188. t. 7.
f. 2.

Anglis, trifid Bidens or Hemp-agrimony.

Habitat in palustribus et aquosis. ☽. VII. VIII.

- ternua.* 2. *BIDENS* foliis lanceolatis amplexicaulibus, floribus cernuis, seminibus erectis. *Sp. pl.* 1165.
Bidens foliis sessilibus serratis, floribus nutantibus circumvallatis. *Hall. hist.* 120.
Verbesina pulchriore flore luteo. *B. hist. III.* 1074.
R. syn. 187.
Cannabina aquatica folio non diviso. *B. pin.* 321.
Eupatorium cannabinum fœminæ varietas altera. *Ger. em.* 711.
Eupatorium aquaticum folio integro. *Park.* 596.
Bidens. β *Coreopsis* foliis lanceolatis serratis oppositis amplexicaulibus. *Sp. pl.* 1281.
Chrysanthemum aquaticum bidens, f. *Hepatorium aquatile* folio non diviso, flore aureis undique petalis radiato. *Triumph.* 65. *Hist. Ox. III.* 17. f. 6. n. 23. f. 22.
Conyza palustris foliis serratis. *Loef. pr.* 54. t. 11.
Anglis, nodding Bidens.
Habitat in fossis et palustribus; β *circa Tapperley et alibi in comitatu Cestriensi.* ☉. VII. VIII.

EUPATORIUM. 935.

Recept. nudum. *Pappus* plumosus. *Cal.* imbricatus, oblongus. *Stylus* semibifidus, longus.

- cannabi-* 1. *EUPATORIUM* foliis digitatis. *Sp. pl.* 1173.
num. *Eupatorium* foliis ovato-lanceolatis tripteris. *Hall. hist.* 136.
Eupatorium cannabinum. *B. pin.* 320. *Park.* 595.
R. syn. 179. mas. *Ger. em.* 711.
β *Eupatorium cannabinum* folio integro, seu non digitato. *R. syn.*
Anglis, common Eupatorium.
Habitat ad ripas fluviorum et rivulorum. 24. VII. VIII.

SANTOLINA. 942.

Recept. paleaceum. *Pappus* nullus. *Cal.* imbricatus, hemisphæricus.

- maritima.* 1. *SANTOLINA* pedunculis unifloris subcorymbosis, foliis oblongis tomentosis.

Athanasia

Athanasia pedunculis unifloris subcorymbosis, foliis lanceolatis indivisis crenatis obtusis tomentosis. Sp. pl. 1182.

Filago tomentosa, corymbo subramoso, foliis oblongis obtusis crenatis. Sp. pl. ed. I. 927. Mill. ic. 135.

Gnaphalium maritimum. B. pin. 263. R. syn. 180.

Gnaphalium marinum. Ger. em. 640. s. Cotonaria. Park. 687.

Anglis, sea Santblina.

Habitat in littoribus maritimis. Near Abermeney ferry in Anglesea; and between Pensans and St. Michael's mount in Cornwall. R. syn. in insula Shepey; prope Pool in comitatu Dorsetiensi. 4. VII.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

* *Discoidei.*

TANACETUM. 944.

Recept. nudum. Pappus submarginatus. Cal. imbricatus hemisphæricus. Cor. radii obsoletæ, trifidæ.

1. TANACETUM foliis bipinnatis incisis ferratis. *Sp. vulgare.*
pl. 1183.

Tanacetum foliis pinnatis, semipinnatis acute dentatis. Hall. hist. 132.

Tanacetum. Ger. em. 650. R. syn. 188. vulgare.
Park. 81. luteum. B. pin. 132.

2. *Tanacetum foliis crispis. B. pin. 132.*

Anglis, common Tansy.

Habitat in pratis et pascuis montosis. 4. VII. VIII.

Pharmac. Tanaceti Herba, Flores, Semina.

ARTEMISIA. 945.

Recept. subvillosum vel nudiusculum. Pappus nullus.
Cal. imbricatus, squamis rotundatis, conniventibus.
Cor. radii nullæ.

* *Procumbentes ante florescentiam.*

1. ARTEMISIA foliis multifidis linearibus, caulis *campestris*, procumbentibus virgatis. *Sp. pl. 1185.*

SYNGENESIA: POLYGAMIA SUPERFLUA.

Artemisia caulis procumbentibus, foliis primis sericeis adultis viridibus pinnatis, pinnis multifidis lanceolatis. *Hall. hist. 131.*

Abrotanum campestre. *Tabern. 16. B. pin. 136.*
Ger. em. 1106. Park. 94. R. syn. 190.
Anglis, field Wormwood or Southernwood.
Habitat in pratis, prope Elden in Suffolk. R. syn. 4.
VII.

maritima. 2. *ARTEMISIA* foliis multipartitis tomentosis, racemis cernuis, flosculis femineis ternis. *Sp. pl. 1186.*

Absinthium marinum album. *Ger. em. 1099. R. syn. 188.*

Absinthium seriphium belgicum. *B. pin. 139.*

β *Absinthium maritimum seriphio belgico simile, latoe folio, odoris grati.* *Pluk. R. syn. 188.*

γ *Absinthium maritimum gallicum.* *B. pin. 139.*

δ *Absinthium seriphium tenuifolium marinum narbonense.* *B. hist. III. 177. R. syn. 189.*

ε *Absinthium maritimum nostras.* *R. syn. 189.*

Anglis, sea Wormwood.

Habitat in littoribus maritimis. *4. VIII.*

Pharmac. Absinthii marini Herba.

** *Erectæ herbaceæ, foliis compositis.*

Absinthium. 3. *ARTEMISIA* foliis compositis multifidis, floribus subglobosis pendulis, receptaculo villoso. *Sp. pl. 1188.*

Absinthium foliis incanis pinnatis, pinnis primis bilobatis, pinnulis incisis lanceolatis, spicis heteromallis, floribus pendulis. *Hall. hist. 124.*

Absinthium vulgare. *Park. 98. R. syn. 188.*

Absinthium latifolium, s. Ponticum. *Ger. em. 196.*

Absinthium ponticum s. romanum officinarum s. diofcoridis. *B. pin. 138. Tourn. 457.*

Anglis, common Wormwood.

Habitat in ruderatis et ad vias. *4. VIII.*

Pharmac. Absinthii vulgaris Herba.

4. ARTEMISIA foliis pinnatifidis planis incisis subtus *vulgaris.*
tomentosis, racemis simplicibus recurvatis, floribus
ovatis, radio quinquefloro. *Sp. pl.* 188.

Artemisia foliis pinnatis inferne tomentosis, pinnis
acute dentatis, spica paniculata erecta. *Hall. hist.*

130.

Artemisia vulgaris. *Park.* 90. *B. hist.* III. 184. *R.*
syn. 190. *major.* *B. pin.* 137.

Artemisia, mater herbarum. *Ger. em.* 1103.

Anglis, Mugwort.

Habitat *ad sepes et in ruderatis.* 24. VIII.

Pharmac. Artemisiæ Herba.

*** *Foliis simplicibus.*

5. ARTEMISIA foliis caulinis lanceolatis integris, ra- *cærules-*
dicalibus multifidis, flosculis femineis ternis. *Sp.* *cens.*
pl. 1189.

Artemisia marina. *Ger. em.* 1104.

Absinthium maritimum, lavendulæ folio. *B. pin.* 139.

Hist. Ox. III. 7. f. 6. t. 1. f. 5.

Anglis, bluish Mugwort.

Habitat *in littoribus maritimis; prope Boston in comitatu*
Lincolniensi. D. Tofield. 24. VIII.

G N A P H A L I U M. 946.

Recept. nudum. *Pappus plumosus.* *Cal.* imbricatus:
squamis marginalibus rotundatis, scariosis coloratis.

* *Herbacea Chrysocoma.*

1. GNAPHALIUM herbaceum, foliis semiamplexicau- *luteo-al-*
libus ensiformibus repandis obtusis utrinque pubes- *bum.*
centibus, floribus conglomeratis. *Sp. pl.* 1196.

Filago foliis mollissimis tomentosis obtusis, umbella
convexa electrina. *Hall. hist.* 147.

Gnaphalium majus lato oblongo folio. *B. pin.* 263.
Pluk. ph. t. 31. f. 6.

Elichrysum sylvestre latifolium capitulis congregatis.
B. pin. 264. *R. syn.* 182.

Anglis, Jersey Cudweed.

A a 4

Habitat

SYNGENESIA: POLYGAMIA SUPERFLUA.

Habitat in muris et aridis; in insula Jersey copiose.
R. syn. O. VII. VIII.

** *Herbacea Argyrocoma.*

margari- 2. **GNAPHALIUM** herbaceum, foliis linear-lanceo-taceum. latis acuminatis alternis, caule superne ramoso, corymbis fastigiatis. Sp. pl. 1198.

Filago foliis lanceolatis viridibus subtus tomentosis, floribus umbellatis. Hall. hist. 146.

Gnaphalium americanum. Clus. hist. 327. Ger. em. 641. R. syn. 182. latifolium. B. pin. 263.

Argyrocome s. **Gnaphalium americanum.** Park. 690. *Anglis*, American Cudweed.

Habitat in pratis et pascuis; in prato prope Bocking, in vicum agri Essexiensis, D. Dale; on the banks of Rymny river, for the space of at least twelve miles, Mr. Lhwyd. R. syn. 24. VIII.

dioicum. 3. **GNAPHALIUM** sarmentis procumbentibus, caule simplicissimo, corymbo simplici, floribus dioicis. Sp. pl. 1199. Syst. nat. 545.

Filago flagellis reptans sexu distincta, flosculis omnibus androgynis. Hall. hist. 157.

Gnaphalium montanum album. Ger. em. 640. R. syn. 181.

Gnaphalium montanum s. **Pes cati.** Park. 690.

Gnaphalium montanum flore rotundiore. B. pin. 263.

Gnaphalium montanum longiore folio et flore. B. pin. 263. R. syn. 182.

Anglis, mountain Cudweed or Cat's-foot.

Habitat in pratis montosis aridis. On Newmarket heath, not far from Bottesham beacon; in boreali parte Angliae frequens, et in Wallia et Cornubia. 24. V. VI.

*** *Filaginoidea.*

sylvati- 4. **GNAPHALIUM** caule herbaceo simplicissimo erecto, floribus sparsis. Syst. nat. 545. Sp. pl. 1200.

Filago foliis linearibus, alis spiciferis. Hall. hist. 148.

Gnaphalium anglicum. Ger. em. 639. R. syn. 180. vulgare majus. Park. 685.

Gnapha-

SYNGENESIA : POLYGAMIA SUPERFLUA.

361

Gnaphalium majus, angusto oblongo folio, alterum,

B. pin. 263.

Anglis, upright Cudweed.

Habitat in *pascuis et sylvis arenosis*. In ericeto Hamp-
stediano, et prope Charleton in Cantio. ♂. VIII.

5. **GNAPHALIUM** caule herbaceo simplicissimo pro- *supinum*,
cumbente, floribus sparsis. *Syst. nat.* III. 234.

Gnaphalium fuscum. *Scop. carn.* 1048. t. 57?

Filago caule simplicissimo, spica pauciflora. *Hall. hist.*
149.

Gnaphalium supinum, lavendulæ folio. *Bocc. mus.*
107. t. 85.

Anglis, dwarf Cudweed.

Habitat in *pascuis et pratis alpinis, aridis*; at the foot
of a hill, about five miles from Fort George, on the
west side of the road leading to Aberdeen. D. Oakes;
et in boreali parte Scotiæ passim. D. Hope. 24. VII.
VIII.

6. **GNAPHALIUM** caule herbaceo ramoso diffuso, flo- *uligino-*
ribus confertis terminalibus. *Syst. nat.* 545. *Sp. pl.* *sum.*
1200.

Filago caule ramosissimo diffuso, umbella sessili ter-
minali. *Hall. hist.* 151.

Gnaphalium longifolium humile ramosum, capitulis
nigris. *R. syn.* 181.

Filago minor. *Park.* 686.

Anglis, marsh Cudweed.

Habitat in *aquosis præcipue ubi aquæ hyemali tempore*
stagnant. ☽. VIII.

7. **GNAPHALIUM** caule herbaceo dichotomo erecto, *gallicum*.
floribus subulatis axillaribus, foliis filiformibus.

Filago caule erecto dichotomo, floribus subulatis axil-
laribus, foliis filiformibus. *Sp. pl.* 1312.

Filago florum acervulis insidentibus, foliis filiformi-
bus. *Hall. hist.* 156.

Gnaphalium parvum ramosissimum foliis angustissimis
polyspermon. *R. syn.* 181.

Gnaphalium minimum alterum nostras, stoechadis ci-
trinæ foliis tenuissimis. *Pluk. ph.* t. 298. f. 2.

Anglis,

Anglis, corn Cudweed.

Habitat in arvis glareosis; among corn in sandy ground about Castle-Heveningham in Essex. D. Dale. R. syn. ♂. VII. VIII.

- monta-* 8. **GNAPHALIUM** caule herbaceo subdichotomo
num. erecto, floribus conicis axillaribus terminalibusque.
Filago caule erecto diviso, floribus conicis lateralibus
terminalibusque. *Sp. pl.* 1311.
Filago caule dichotomo, acervulis spicatis. *Hall. hist.*
155.
Filago caule dichotomo, floribus glomeratis spicatis.
Hall. nom. 155.
Filago minor. *Ger. em.* 641.
Gnaphalium minimum. *Lob. ic.* 481. *B. hist.* III.
159. *R. syn.* 181.
Gnaphalium minus repens. *B. pin.* 363.
Anglis, least Cudweed.
Habitat in pratis et pascuis arenosis. ♂. VII. VIII.

- germani-* 9. **GNAPHALIUM** caule herbaceo erecto ramoso, pa-
cum. nicula dichotoma, capitulis rotundatis axillaribus
terminalibusque.
Filago panicula dichotoma, floribus rotundatis axilla-
ribus hirsutis, foliis acutis. *Sp. pl.* 1311.
Filago caule dichotomo, corymbo sphærico, in angulo
sessili. *Hall. hist.* 153.
Gnaphalium. *Fuchf. hist.* 222. minus s. Herba impia.
Park. 685. *R. syn.* 180.
Gnaphalium vulgare majus. *B. pin.* 263.
Filago s. herba impia. *Ger. em.* 642.
Anglis, common Cudweed.
Habitat in pratis et pascuis sterilioribus et ad vias publicas.
♂. VII. VIII.
Obs. variat caule erecto simplicissimo, floribus axillari-
bus, sessilibus.

C O N Y Z A. 950.

Recept. nudum. *Pappus simplex.* *Cal.* imbricatus
subrotundus. *Cor.* radii trifidæ.

I. CONYZA.

1. CONYZA foliis lanceolatis acutis, caule herbaceo *squarroso*.
 corymboso, calycibus squarrosois. *Syst. nat.* 547.
Sp. pl. 1205. *Fl. dan.* 622.

Conyza foliis ovato-lanceolatis rariter serratis, flori-
 buſ umbellatis. *Hall. hist.* 135.

Conyza major. *Cam. ep.* 612. *vulgare.* *B. pin.* 265.

Baccharis monspeliensis. *Ger. em.* 792. *Park.* 114.
R. syn. 179.

Anglis, greater *Conyza* or *Plowman's Spikenard*.

Habitat in pratis et pascuis montosis et ad vias solo calcareo. ♂. VII. VIII.

** *Radiati.*

E R I G E R O N. 951.

Recept. nudum. *Pappus pilosus.* *Cor.* radii lineares,
 angustissimæ.

1. ERIGERON pedunculis alternis unifloris. *Sp. pl. acrea*
 1211.

Erigeron caule alterne ramoso, petiolis unifloris, se-
 misfusculis pappum æquantibus. *Hall. hist.* 85.

Conyza cærulea acris. *Ger. em.* 484. *B. pin.* 265.

Conyza odorata cærulea. *Park.* 126.

Aster arvensis cæruleus acris. *Tourn.* 481. *R. syn.* 175.

Anglis, blew *Erigeron*.

Habitat in pratis et pascuis siccissimis solo calcareo. ♂.
 VII. VIII.

*2. ERIGERON caule hirto floribusque paniculatis, *canadense*.
 foliis lanceolatis ciliatis. *Sp. pl.* 1210. *Hall. hist.*
 84.

Conyza canadensis annua, acris, alba, linariæ foliis.
Boc. pl. rar. t. 46. *R. syn.* 175.

Conyza annua acris alba, elatior, linariæ foliis. *Hist.*
Ox. III. 115. *f. 11. t. 20. f. 29.*

Anglis, *canada Erigeron*.

Habitat in cultis et ruderatis; circa Londinum frequens.
 ☽. VIII.

TUSSILAGO. 952.

Recept. nudum. Pappus simplex. Cal. squamæ æquales, discum æquantes, submembranaceæ.

Farfara. 1. TUSSILAGO scapo imbricato unifloro, foliis subcordatis angulatis denticulatis. *Sp. pl. 1214. Fl. dan. 595.*

Tussilago. *Cam. ep. 490. 491. Ger. em. 811. Park. 1220. R. syn. 173. vulgaris. B. pin. 197.*

Petasites scapo unifloro, flore radiato. *Hall. hist. 143. Anglis, common Coltsfoot.*

Habitat in pascuis et locis humidiusculis. 4. III. IV.
Pharmac. Tussilaginis s. Farfaræ Herba, Flores.

Petasites. 2. TUSSILAGO thyrso ovato, flosculis omnibus hermaphroditis. *Sp. pl. 1214.*

Petasites floribus dense spicatis, flosculis androgynis. *Hall. hist. 138.*

Petasites. *Dod. pempt. 597. Ger. em. 814. R. syn. 179. vulgaris. Park. 419.*

Petasites major et vulgaris. *B. pin. 197.*

Anglis, greater Coltsfoot or Butter-bur.

Habitat in pratis et pascuis humidis; et ad ripas fluviorum. 4. III. IV.

Pharmac. Petasitidis Radix.

hybrida. 3. TUSSILAGO thyrso oblongo, flosculis femineis nudis plurimis. *Sp. pl. 1214.*

Petasites floribus spicatis pendulis, petiolis multifloris, calycibus æqualibus, flosculis paucissimis androgynis. *Hall. hist. 140.*

Petasites major, floribus pediculis longis insidentibus, *R. syn. 179. Dill. elth. 309. t. 230. f. 297.*

Anglis, stalked Coltsfoot or Butter-bur.

Habitat in pratis humidis; prope Loughborough et alibi in comitatu Leicesterensi passim. 4. IV.

SENECIO. 953.

Recept. nudum. Pappus simplex. Cal. cylindricus, calyculatus; squamis apice sphacelatis.

* *Floribus*

* *Floribus flosculosis.*

1. SENE^CIO corollis nudis, foliis pinnato-sinuatis am- *vulgaris.*
plexicaulibus, floribus sparsis. *Sp. pl.* 1217. *Fl.*
dan. 513. *Hall. hist.* 58.

Senecio vulgaris. *Park.* 671. *R. syn.* 178.

Senecio minor vulgaris. *B. pin.* 131.

Erigeron. *Ger. em.* 278.

Anglis, common Groundsel or Simpson.

Habitat in cultis et ruderatis. ☽. IV—X.

Pharmac. *Senencionis Herba.*

** *Floribus radiatis : radio revoluta.*

2. SENE^CIO corollis revolutis, foliis pinnatifidis denti- *viscosus.*
culatis subviscidis, caule erecto corymboso.

Senecio corollis revolutis, foliis pinnatifidis viscidis,
squamis calycinis laxis longitudine perianthii. *Sp.*
pl. 1217.

Senecio foliis viscidis pinnatis, pinnis semipinnatis an-
gulosis, calycibus hirsutis. *Hall. hist.* 60.

Senecio incanus pinguis. *B. pin.* 131.

Senecio hirsutus viscidus major odoratus. *B. hist.* III.
192. *R. syn.* 178.

Senecio foetidus. *Park.* 671.

Senecio hirsutus viscidus graveolens. *Dil. elth.* 347.
t. 258. f. 336.

Erigerum tomentosum. *Ger. em.* 278.

g *Senecio corollis revolutis*, foliis pinnatifidis denticula- *sylvati-*
tis, caule corymboso erecto. *Sp. pl.* 1217. *cus.*

Senecio foliis pinnatis, pinnis alternis majoribus, se-
mipinnatis angulosis, calycibus levibus, radiis bre-
vissimis revolutis. *Hall. hist.* 59.

Senecio minor, latiore folio sive montanus. *B. pin.*
131. *R. syn.* 178. *Dill. elth.* 258. t. 258. f. 337.

Jacobæa, senencionis folio incano, perennis. *R. hist.*
Rupp. jen. 177. t. 4.

Anglis, stinking β mountain Groundsel.

Habitat in ericetis, nemorosis et sepibus. ☽. VII.

*** *Floribus radiatis : radio patente, foliis pinnatifidis.*

3. SENE^CIO corollis radiantibus, foliis pinnato-lyratis *Jacobæa.*
laciñiis laciñulatis, caule erecto. *Sp. pl.* 1219.
Jacobæa

Jacobæa. Ger. em. 280. vulgaris. B. hist. II. 1057.

R. syn. 177. major. Park. 668.

Jacobæa vulgaris laciniata. B. pin. 131.

Anglis, Ragwort Groundsel.

Habitat in pratis et pascuis et ad vias. 24. VII.

aquaticus. 4. SENEPIO corollis radiantibus, foliis dentatis, radi-

calibus ovatis, caulinis pinnatifidis : lacinia extima
majora. Fl. angl. 317.

Senecio foliis lineatis pinnatis, pinnis dentatis, extre-

ma maxima. Hall. hist. 62.

Jacobæa latifolia. Ger. em. 280. B. hist. II. 1056.

palustris. R. syn. 178.

Jacobæa barbareæ instar laciniata. Fl. prus. 129. t. 35.

Jacobæa latifolia pannonica prima. Park. 668.

Jacobæa alpina laciniata, flore buphthalmi. B. pin.

131.

Anglis, water Groundsel or Ragwort.

Habitat in pratis et pascuis humidis. 24. VII. VIII.

erucifo-
lius. 5. SENEPIO corollis radiantibus, foliis pinnatifidis den-

tatis subhirtis, caule erecto. Sp. pl. 1218.

Jacobæa senencionis folio incano perennis. R. syn. 177.

Jacobæa altissima, foliis erucæ artemisiæve similibus et

æmulis. Rupp jen. 164.

Jacobæa incana altera. B. pin. 131.

Anglis, hoary Groundsel.

Habitat in sylvis et ad sepes. 24. VII. VIII.

**** Floribus radiatis: radio patente, foliis indivisis.

paludosus. 6. SENEPIO corollis radiantibus, foliis ensiformibus

acute serratis, subtus subvillosis, caule stricto. Sp.

pl. 1220. Fl. dan. 385.

Senecio foliis linearibus serratis, floribus umbellatis.

Hall. hist. 66.

Jacobæa foliis longis integris et mucronatis. Hist.

Oz. III. 410. f. 7. t. 7. f. 22.

Virgæ aureæ s. Solidagini angustifoliae affinis, Lingua

avis Dalechampij. B. hist. II. 1063. R. syn. 176.

Conyza palustris. Park. 1231. ferratifolia. B. pin.

266.

Anglis, marsh Groundsel or Bird's-tongue.

Habitat in fossis palustribus earumque aggeribus in insula Eliensi; near Stretham ferry. R. syn. 24. VIII.

7. SENEPIO corollis radiantibus, floribus corymbosis, *saraceni-*
foliis lanceolatis serratis glabriusculis. Sp. pl. 1221. cus.
Jac. austr. II. 52. t. 186.

Senecio foliis lanceolatis serratis glabris, floribus um-
bellatis. Hall. hist. 65.

Solidago sarracenica. Fuchs. hist. 728. Dod. pempt.
141. Ger. em. 429.

Virga aurea angustifolia serrata. B. pin. 268.

Virga aurea maxima radice repente. R. syn. 177.

Anglis, broad-leaved Groundsel.

Habitat in pratis et pasuis humidis et ad sepes. Inter
Wells et Glastonbury et prope Shipton-mallet et ali-
bi in agro Somersetensi copiose; it grows as plenti-
fully in the fields at Salkeld as the vulgaris. R. syn.
circa Clapham et Ingleton in comitatu Eboracensi.
24. VII. VIII.

S O L I D A G O. 955.

Recept. nudum. Pappus simplex. Cor. radiis circiter
quinque. Cal. squamæ imbricatæ, clausæ.

1. SOLIDAGO caule subflexuoso angulato, racemis *Virgau-*
paniculatis erectis confertis. Sp. pl. 1235. *rea.*
Solidago caule anguloso hirsuto, foliis ovato-lanceo-
latis dentatis, racemis multifloris congestis. Hall.
hist. 69.

Virga aurea. Ger. em. 429. R. syn. 176. vulgaris,
Park. 542. latifolia. B. hist. II. 1062.

Virga aurea latifolia serrata. B. pin. 268.

β Virga aurea vulgari humilior. R. syn. 176.
Anglis, common Golden-rod.

Habitat in sylvis, sepibus, ericetis frequens. 24. VIII.
Pharmac. Virgæ aureæ Herba.

2. SOLIDAGO foliis lanceolatis subserratis subincatis, *cambrica-*
paniculis corymbosis terminalibus.

Virga aurea montana, folio angusto subincano, flos-
culis conglobatis. R. syn. 177.

Anglis,

Anglis, Welch Golden-rod. *Pet. h. br. t.* 16. *f.* 11.
Habitat in montibus circa Llanberris copiose. *In montibus in comitatibus Eboracensi et Westmorlandico*.
q. VIII.

Obs. variat pedunculo unifloro in summis montibus; an Solidago minutæ Linnæi.

A S T E R. 954.

Recept. nudum. Pappus simplex. Cor. radii plures decem. Cal. imbricati, squamæ inferiores patulæ.

Tripoli- 1. **ASTER** foliis lanceolatis integerrimis carnosis glabris, ramis inæquatis, floribus corymbosis. *Sp. pl.* 1226. *Fl. dan.* 615.

Aster maritimus cæruleus Tripolium dictus. R. syn.
175.

Tripolium vulgare majus et minus. Ger. em. 413.

Tripolium majus cæruleum et minus. B. pin. 267.

Tripolium majus s. vulgare et minus. Park. 673.

Anglis, sea Starwort.

Habitat in littoribus maritimis, solo lutoſo. *q. VIII.*

I N U L A. 956.

Recept. nudum. Pappus simplex. Antheræ basi in setas duas desinentes.

Heleni- 1. **INULA** foliis amplexicaulibus ovatis rugosis, subtus tomentosis, calycum squamis ovatis. *Sp. pl.* 1236.

Aster foliis ovato-lanceolatis ferratis subtus tomentosis, calycinis ovato-lanceolatis maximis. Hall. hist.
72.

Helenium. Cam. ep. 35. *Ger. em.* 793. *R. syn.* 176.

s. Enula campana. Park. 674. *B. hist.* III. 108.

Anglis, common Elecampane.

Habitat in pratis et pasuis humidis; in Essexia frequens; circa St. Ives in Cornubia et Bugden in comitatu Huntingtonensi; inter Denbigh et St. Asaph. *q. VII. VIII.*

Pharmac. Enulæ campanæ Radix.

dysenteri- 2. **INULA** foliis amplexicaulibus cordato-oblongis subca. tomentosis, caule villoso paniculato, squamis calycinis setaceis. *Sp. pl.* 1237. *Fl. dan.* 410.

Aster

Aster foliis amplexicaulibus undulatis subtus tomentosis. *Hall. hist.* 79.

Conyza media. *Ger. em.* 482. *R. syn.* 174. asteris flore luteo, vel tertia Dioscoridis. *B. pin.* 265.

Herba Dysenterica. *Hoff. altd.*

Anglis, middle Elecampane or Fleabane.

Habitat in pratis et pascuis humidis. 24. VIII.

3. INULA foliis amplexicaulibus oblongis undulatis, *Pulicaria* caule erecto, floribus globosis radio brevissimo.

Inula foliis amplexicaulibus undulatis, caule prostrato, floribus subglobosis radio brevissimo. *Sp. pl.* 1238. *Fl. dan.* 613.

Aster foliis amplexicaulibus undulatis hirsutis, radiis brevissimis. *Hall. hist.* 80.

Conyza minor. *Matth. p. II.* 223. *R. syn.* 174.

Conyza minima. *Dod. pent.* 52. *Ger. em.* 482.

Conyza minor, flore globoſo. *B. pin.* 266.

Anglis, lesser Elecampane or Fleabane.

Habitat ad vias et in locis ubi per hyemem aquæ stagnant. . VIII. IX.

4. INULA foliis linearibus carnosis tricuspidatis. *Sp. crithmoides.* *pl.* 1240.

Aster maritimus flavus, *Crithmum chrysanthemum*, dictus. *R. syn.* 174.

Crithmum chrysanthemum. *Ger. em.* 533. *Park.* 1287.

Crithmum maritimum, flore asteris attici. *B. pin.* 288.

Anglis, golden Elecampane or Sampire.

Habitat in palustribus maritimis, solo lutoſo. 24. VIII.

C I N E R A R I A. 957.

Recept. nudum. *Pappus simplex.* *Cal. simplex*, polyphyllus, æqualis.

1. CINERARIA floribus corymbosis, foliis lato-lanceo-palustris. latis dentato-sinuatis, caule villoſo. *Sp. pl.* 1243. *Fl. dan.* 573.

Othonna foliis lanceolatis dentato-sinuatis. *Sp. pl.* *ed. I.* 924.

SYNGENESIA: POLYGAMIA SUPERFLUA.

Conyza foliis laciniatis. Ger. em. 483. R. syn. 174.

Conyza aquatica laciniata. B. pin. 266.

Conyza helenitis foliis laciniatis. Park. 126.

Anglis, marsh Cineraria or Fleabane.

Habitat in palustribus in comitatu Lincolnensi copiose.

In the fen-ditches about Marsh and Chatteress in the isle of Ely; at Caister near Yarmouth; in the ditches about Pillin-moss, Lancashire; at Aberavon in Merionethshire in Wales. R. syn. 24. VI. VII.

alpina. 2. *CINERARIA umbella involucrata, pedunculo communis nudiusculo, foliis oblongis villosis.* Sp. pl. 1243. Jac. austr. II. 48. t. 179. et 189.

integri-folia. *Othonna foliis lanceolatis subdenticulatis villosis, floribus umbellatis.* Sp. pl. ed. I. 925.

Senecio foliis imis petiolatis cordatis obiter dentatis, caulinis ligulatis sessilibus. Hall. hist. 68.

Jacobaea montana lanuginosa angustifolia non laciniata. B. pin. 131. Hist. Ox. III. 111. t. 7. f. 12.

Jacobaea pannonica folio non laciniato. R. syn. 178.

Jacobaea angustifolia. Ger. em. 280. *pannonica non laciniata.* Park. 668.

Anglis, mountain Cineraria or Ragwort.

Habitat in pratis montosis. On Gogmagog hills, Newmarket heath, &c. R. syn. prope Basingstoke et Andover. 24. VI.

B E L L I S. 962.

Recept. nudum, conicum. Pappus nullus. Cal. hemisphaericus: squamis æqualibus. Sem. obovata.

perennis. 1. *BELLIS scapo nudo.* Sp. pl. 1248. Fl. dan. 503. Hall. hist. 93.

Bellis sylvestris minor. B. pin. 262. R. syn. 184.

Bellis minor sylvestris. Ger. em. 635. simplex. Park. 530.

Anglis, common Daisie.

Habitat in pratis et pajcis. 24. III—IX.

Pharmac. Bellidis minoris Herba, Flores, Radix.

CHRYSANTHEMUM. 966.

Recept. nudum. Pappus marginatus. Cal. hemisphæricus, imbricatus: squamis marginalibus membranaceis.

1. CHRYSANTHEMUM foliis amplexicaulibus: superne segetum.
perne laciniatis, inferne dentato ferratis. Sp. pl.

1254.

Chrysanthemum segetum. Clus. hist. I. 338. Ger.
em. 743. R. syn. 182. nostras. Park. 1370.

Bellis lutea, foliis profunde incisis major. B. pin. 262.

- 2 Chrysanthemum segetum nostras, folio glauco multiscissulo majus, flore minore. R. syn. 183.

- γ Chrysanthemum segetum nostras, calendulae folio glauco, neque secto, neque ferrato. Pluk. alm. 102.
Anglis, yellow Ox-eye or corn Marigold.
Habitat inter segetes. ○. VI. VII.

2. CHRYSANTHEMUM foliis amplexicaulibus oblongis: superne ferratis inferne dentatis. Sp. pl. Leucanthemum. 1251. Fl. suec. 763.

Matricaria foliis radicalibus petiolatis ovatis crenatis,
caulinis amplexicaulibus dentatis. Hall. hist. 98.

Leucanthemum vulgare. Tourn. 492. R. syn. 184.

Bellis major. Fuchs. hist. 148. Cam. ep. 635. Ger.
em. 634. vulgaris f. sylvestris. Park. 528.

Bellis sylvestris caule folioso major. B. pin. 261.

Anglis, common Ox-eye or greater Daisie.

Habitat in pratis et pascuis siccis. 24. V. VI.

Pharmac. Bellidis majoris Herba, Flores.

MATRICARIA. 967.

*Recept. nudum. Pappus nullus. Cal. hemisphæricus,
imbricatus: marginalibus solidis, acutiusculis.*

1. MATRICARIA foliis compositis planis: foliolis Parthenocissus ovatis incisis, pedunculis ramosis. Sp. pl. 1255. nium.

Matricaria foliis pinnatis, pinnis semipinnatis, lacinulis obtusis, floribus umbellatis. Hall. hist. 100.

Matricaria. Dod. cor. 236. Lob. ic. 751. Ger. em.
652. vulgaris. Park. 83. f. sativa. B. pin. 133.

Anglis, common Feverfew.

Habitat in ruderatis et ad sepes. ♂. f. 24. VI. VII.

Pharmac. Matricariæ Herba.

- Chamo-milla.* 2. MATRICARIA receptaculis conicis, seminibus nudis, squamis calycinis margine æqualibus, caule erecto.
Matricaria receptaculis conicis, radiis patentibus, seminibus nudis, squamis calycinis margine æqualibus. *Sp. pl.* 1256.
Matricaria foliis capillaribus duplicato-pinnatis, pinnis lanceolatis bifidis trifidisque, *Hall. nom. et hist.* 101.
Chamæmelum. *Ger. em.* 754. *R. syn.* 184. *vulgare.*
Dod. pempt. 257. *Park.* 85. f. *Leucanthemum* *Dioscoridis.* *B. pin.* 135.
- Suaveo-lens.* β Matricaria receptaculis conicis, radiis deflexis, seminibus nudis, squamis calycinis margine æqualibus. *Sp. pl.* 1256.
Matricaria leucanthemos annua suaveolens, chamæmeli folio, ovariis albicantibus. *Vaill. act. paris.* 1720. 556.
Chamæmelum tenue incisum, foliis floris deorsum protensis : umbone extuberante suavius olens. *Cup. cath. suppl.* 17.
Anglis, corn Feverfew.
Habitat in arvis et ad vias. ⊖. V. VI.
Pharmac. Chamæmeli vulgaris *Herba, Flores.*
- inodora.* 3. MATRICARIA receptaculis hemisphæricis, seminibus coronato-marginatis, squamis calycinis margine obsoletis, caule diffuso.
Chrysanthemum foliis pinnatis multifidis, caule ramoso diffuso. *Sp. pl.* 1253.
Matricaria inodora. *Fl. suec.* 765.
Chamæmelum inodorum annum humilius, foliis obscure virēntibus. *Hist. Ox.* III. 36. *R. syn.* 185.
Chamæmelum inodorum s. Cotula non foetida. *B. hist.* III. 120.
β Chamæmelum majus, folio tenuissimo, caule rubente. *Magn. hort. monsp.* 53. *R. syn.* 18.

Matri-

γ Matricaria receptaculis hemisphæricis, foliis bipinna- mariti-
tis subcarnosis, supra convexis, subtus carinatis. ma.
Sp. pl. 1256.

Chamæmelum maritimum perenne humilius, foliis
brevibus crassis obscure virentibus. *R. syn.* 186. t. 7.
f. I.

Anglis, corn Feverfew.

Habitat in arvis et ad vias. ♂. VII. VIII.

ANTHEMIS. 970.

Recept. paleaceum. *Pappus* nullus. *Cal.* hemisphæ-
ricus, subæqualis. *Flosculi* radii plures quam quin-
que,

* *Radio discolor f. albo.*

1. ANTHEMIS foliis pinnato-compositis linearibus *nobilis*.
acutis subvillofisis. *Sp. pl.* 1260. seminibus nudis.

Chamæmelum foliis subhirsutis, nervo duro, pinnis
pinnatis, pinnulis lanceolatis incisis. *Hall. hist.* 102.

Chamæmelum nobile seu Leucanthemum odoratius.
B. pin. 135.

Chamæmelum odoratissimum repens flore simplici. *B.*
hist. III. 118. *R. syn.* 185.

Chamæmelum romanum. *Ger. em.* 755.

Anglis, common Camomile.

Habitat in pratis et pascuis apicis. ♀. VIII. IX.

Pharmac. Chamæmeli Flores.

2. ANTHEMIS receptaculis conicis, paleis setaceis, *arvensis*.
seminibus coronato-marginatis. *Sp. pl.* 1261. fo-
liis villofusculis.

Chamæmelum inodorum. *B. pin.* 135. *R. syn.* 184.

Bupthalmum album. *Pet. h. br. t.* 19. *f. 8.*

Cotula. *Tab. ic.* 21.

Anglis, corn Camomile.

Habitat in arvis et agris restilibilibus. ♂. VI. VII.

3. ANTHEMIS receptaculis conicis, paleis setaceis, se- *Cotula*.
minibus nudis. *Sp. pl.* 1261. foliis nudis.

Chamæmelum foliis glabris, duplicato-pinnatis, nervo

B b 3 foliaceo,

SYNGENESIA : POLYGAMIA SUPERFLUA.

foliaceo, pinnulis lanceolatis, seminibus exasperatis.
Hall. hist. 104.

Chamæmelum foetidum. *B. pin.* 135. *R. syn.* 185.

Cotula foetida. *Ger. em.* 756. *B. hist.* III. 120.

Anglis, stinking Camomile or May-weed.

Habitat in arvis et ad vias. ☽. VI. VII.

maritima. 4. **ANTHEMIS** foliis pinnatis denticulatis carnosis nudis punctatis, caule prostrato, calycibus subtomentosis. *Sp. pl.* 1259.

Anthemis maritima perennis, foliis crassis et punctatis. *Mich. gen.* 33.

Chamæmelum maritimum. *B. hist.* III. 122. latifolium ramosissimum, flore albo. *Pluk. alm.* 97. *R. syn.* 186.

Matricaria maritima. *B. pin.* 134.

Anglis, sea Camomile.

Habitat in pratis maritimis. 4. VII. VIII.

** *Radio concolore s. luteo.*

tinctoria. 5. **ANTHEMIS** foliis bipinnatis serratis subtus tomentosis, caule corymboso. *Sp. pl.* 1263.

Chamæmelum foliis pinnatis, hirsutis, pinnulis simplicibus, lanceolatis. *Hall. hist.* 105.

Bupthalmum tanaceti minoris folio. *B. pin.* 134.

Bupthalmum vulgare. *Ger. em.* 747. *R. syn.* 182.

Bupthalmuni matthioli f. *vulgare millefolii* foliis. *Park.* 1370.

Anglis, yellow Camomile or Ox-eye.

Habitat in pratis apricis, sed rarius. I found this on a bank near the river Tees, not far from Sogburn in the bishoprick of Durham. *R. syn.* 4. VII. VIII.

A C H I L L E I A. 971.

Recept. paleaceum. *Pappus nullus.* *Cal. cvatus, imbricatus.* *Flosculi radii circiter quinque.*

Millefolium. 1. **ACHILLEA** foliis bipinnatis nudis : laciniis linearibus dentatis, caulibus fulcatis. *Sp. pl.* 1267.

Achillea foliis pinnatis, pinnis longe æqualibus pinnatis, pinnulis trifidis et quinquefidis. *Hall. hist.* 107.

Millefo-

Millefolium vulgare. Park. 693. R. syn. 183. album.

B. pin. 140.

Millefolium terrestre vulgare. Ger. em. 1072.

¶ Millefolium purpureum majus. B. pin. 140.

Anglis, common Yarrow or Milfoil.

Habitat in pratis et pascauis. 4. VI—VIII.

Pharmac. Millefolii Herba.

2. ACHILLEA foliis lanceolatis acuminatis argute ser- Ptarmi-
ratis, Sp. pl. 1266. Fl. dan. 643. ca.

Achillea foliis linearibus lanceolatis acutissime serra-
tis. Hall. hist. 117.

Ptarmica. Cam. ep. 354. Ger. em. 606. R. syn. 183.
vulgaris. Clus. hist. II. 12. Park. 856.

Dracunculus pratensis, serrato folio. B. pin. 98.

Anglis, Sneeze-wort Yarrow or Goose-tongue.

Habitat in pratis et nemorosis humidis. 4. VII. VIII.

Pharmac. Ptarmicæ Herba.

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

C E N T A U R E A . 984.

Recept. setosum. Pappus simplex. Cor. radii infun-
dibuliformes, longiores, irregulares.

* Cyani : calycinis squamis serrato-ciliatis.

1. CENTAUREA calycibus serratis : foliis linearibus Cyanis.
integerrimis, infimis dentatis. Sp. pl. 1289.

Cyanus foliis imis ellipticis, dentatis, supremis linea-
ribus, semiflosculis latissimis. Hall. hist. 191.

Cyanus. B. hist. III. 21. R. syn. 198. vulgaris. Lab.
ic. 546. Ger. em. 732. Park. 482.

Cyanus segetum. B. pin. 273.

Anglis, corn Centaury or Blue-bottle.

Habitat inter segetes. 0. VI—VIII.

Pharmac. Cyani Herba, Flores.

2. CENTAUREA calycibus ciliatis : squamula ovata, nigra.
ciliis capillaris erectis, foliis lyrato-angulatis, flo-
ribus flosculosis. Sp. pl. 1288. Fl. dan. 519.

B b 4

Jacea

Jacea foliis radicalibus semipinnatis, caulinis ovato-lanceolatis. *Hall. hist.* 184.

Jacea nigra. *Ger. em.* 721, *R. syn.* 198, *vulgaris*. *Park.* 468.

Jacea nigra pratensis latifolia. *B. pin.* 272.

β *Jacea nigra minor*, tomentosa laciniata. *R. syn.* 199.

Jacea nigra laciniata. *B. pin.* 271.

Rhaponticum foliis tomentosis radicalibus semipinnatis, caulinis lanceolatis. *Hall. hist.* 195.

γ *Centaurea calycibus ciliatis*, squamula ovata, ciliis capillaribus erectis, foliis lanceolatis dentatis, floribus radiatis.

Cyanus foliis radicalibus semipinnatis, caulinis lanceolatis, squamis calycinis oblongis obtusis. *Hall. hist.* 185.

Anglis, black Centaury or Knapweed.

Habitat in pratis et pascuis. 4. VII. VIII.

Scabiosa. 3. *CENTAUREA* calycibus ciliatis : foliis pinnatifidis, pinnis lanceolatis. *Sp. pl.* 1291.

Cyanus foliis pinnatis, pinnis dentatis obtusis, squamis calycinis triangulis. *Hall. hist.* 186.

Jacea major. *Ger. em.* 727. *R. syn.* 198.

Jacea nigra vulgaris laciniata. *Park.* 470.

Scabiosa major squamatis capitulis. *B. pin.* 269.

Anglis, greater Centaury or Knapweed.

Habitat in arvis et ad margines agrorum. 4. VII.

** *Calcitrapæ* : *calycinis spinis compositis*.

Calcitra. 4. *CENTAUREA* calycibus subduplicato-spinosis sessilibus, foliis pinnatifidis linearibus dentatis, caule piloso. *Sp. pl.* 1297.

Calcitrapa foliis pinnatis, pinnis dentatis, floribus in alis sessilibus. *Hall. hist.* 194.

Carduus stellatus. *Dod. purg.* 448. *Ger. em.* 1166. *R. syn.* 196. f. *calcitrapa vulgaris*. *Park.* 989.

Carduus stellatus foliis papaveris erratici. *B. pin.* 387.

Anglis, star Centaury or Thistle.

Habitat in pratis sterilioribus et ad vias. 5. VIII.

Pharmac. *Calcitrapæ Herba, Semina*.

5. *CENTAU-*

5. *CENTAUREA* calycibus duplicato-spinosis solitariae foliis rameis decurrentibus inermibus lanceolatis, radicalibus lyrato-pinnatifidis. *Sp. pl.* 1297.
Calcitrapa caule alato, foliis tomentosis, radicalibus semipinnatis caulinis lanceolatis dentatis. *Hall. hist.* 193.

Carduus stellatus luteus, foliis cyani. *B. pin.* 387.
R. syn. 196.

Carduus solstitialis. *Ger. em.* 1166, *Park.* 989.

Anglis, St. Barnaby's Centaury or Thistle.

Habitat in arvis et ad sepes. In the hedges not far from Cirencester in Gloucestershire. *D. Bobarb.* *R. syn.* *Juxta Norfleet in Cantio.* ○. VII. VIII.

MONOGAMIA.

JASIONE.

Cal. communis decemphyllus. *Cor.* pentapetala, regularis. *Capsula* infera, bilocularis.

1. JASIONE. *Sp. pl.* 1316. *Fac. enum.* 289. *Fl. dan. montana.* 319.

Rapunculus foliis linearibus subasperis, spica planiuscula, petalis liberis. *Hall. hist.* 678.

Rapunculus scabiosæ capitulo cæruleo. *B. pin.* 92. *Park.* 646. *R. syn.* 723.

Scabiosa. *Dod. pem.* 122. *minima* hirsuta. *Ger. em.* 723.

Anglis, mountain Jasione or Sheep's Scabious.
Habitat in pratis et ericetis. ○. VI. VII.

LOBELIA. 1006.

Cal. quinquefidus. *Cor.* monopetala, irregularis. *Caps.* infera bi-f. trilocularis.

1. LOBELIA foliis linearibus bilocularibus integerrimis, *Dort-* caule subnudo. *Sp. pl.* 1318. *Fl. dan.* 39. *manna.*

Dortmanna palustris, floribus sparsis pendulis. *Rudb.* *act. ups. an.* 1720. *p.* 97. *t.* 2.

Gladiolus

SYNGENESIA MONOGAMIA.

- Gladiolus lacustris* Dortmanni. *Clus. cur. post.* 40.
R. syn. 287.
Gladiolus lacustris Clusii s. *Leucojum palustre*, flore
 subcæruleo. *Park. 1250.*
Leucojum palustre, flore subcæruleo. *B. pin. 41.*
Anglis, water Lobelia or Gladiole.
Habitat in lacubus. *In omnibus Cambriæ montibus.*
 Dr. Richardson. *R. syn. in lacubus Westmorlandiæ,*
Cumberlandiæ et Scotiæ. 24. VII. VIII.

- urens.* 2. *LOBELIA* caule erectiusculo, foliis inferioribus sub-
 rotundis crenatis, superioribus lanceolatis serratis,
 floribus racemosis. *Sp. pl. 1321.*
Rapunculus galeatus blesensis s. solonienfis, flore vio-
 laceo minimo. *Hist. Ox. II. 407. t. 5. f. 56.*
Rapuntium urens soloniense. *Hort. R. bl. 300. Bocc.*
fic. 20. t. 11. R. hist. 746. Monn. obs. 131.
Draba flore cæruleo galeato. *B. pin. 110. pr. 53.*
Anglis, stinking Lobelia.
Habitat in pratis montosis. *Supra Shute common inter*
Axminster et Honiton. D. Newbery, Q. VII.
 VIII,

V I O L A. 1007,

Cal. pentaphyllus. *Cor. pentapetala irregularis, pos-*
tice cornuta. *Caps. supera, trivalvis, unilocularis.*

* *Acaules.*

- odorata.* 1. *VIOLA acaulis*, foliis cordatis, stolonibus reptanti-
 bus. *Sp. pl. 1324. Fl. dan. 309.*
Viola acaulis stolonifera, foliis cordatis. *Hall. hist.*
558.
Viola martia purpurea. *B. hist. II. 542. R. syn. 364.*
flore simplici odoro. *B. pin. 199.*
Viola nigra s. *purpurea.* *Dod. pempt. 156. Ger. em.*
850.
Viola simplex martia. *Park. 755.*
 2. *Viola martia alba.* *B. pin. 199.*
Anglis, sweet Violet.

Habitat in nemorosis, sepibus et aggeribus fossarum. 24.
III. IV.

Pharmac. Violæ Flores.

2. VIOLA acaulis, foliis cordatis piloso-hispidis. Sp. pl. *birta*.
1324. Fl. dan. 618. capsulis villosis.

Viola acaulis foliis cordatis hispidis. Hall. hist. 559.

Viola martia major hirsuta inodora. Hist. Ox. II. 475.

f. 5. t. 35. f. 4. R. syn. 365.

Viola trachelii folio vulgo. R. hist. 1051.

Anglis, hairy Violet.

Habitat in nemorosis et sepibus, solo calcareo. 24. III. IV.

3. VIOLA acaulis, foliis reniformibus. Sp. pl. 1324. *palustris*.
Fl. dan. 83. Hall. hist. 560.

Viola palustris rotundifolia glabra. Hist. Ox. II. 475.

f. 5. t. 35. f. 5. Plot. Ox. 144. t. 9. f. 2. R. syn.
364.

β Viola rubra striata Eboracensis. Park. 755.

Anglis, marsh Violet.

Habitat in pratis humidis, paludibus turfosis, cæspitosis.

In boreali parte Angliae frequens. 24. IV. V.

** *Caulescentes*.

3. VIOLA caule adultiore adscendente, foliis oblongo-*canina*-cordatis. Sp. pl. 1324.

Viola caule procumbente ramoso, foliis petiolatis cordatis. Hall. hist. 562.

Viola martia inodora sylvestris. B. pin. 199. R. syn.
364.

Viola canina sylvestris. Ger. em. 851.

Viola sylvestris. Park. 755.

β Viola canina flore albo. Merr. pin.

γ Viola canina minor. R. syn. 364. t. 24. f. 1.

δ Viola caule subtrifloro, foliis cordatis profunde serra-alpina-tis. Fl. angl. 331.

Viola martia alpina folio tenello circinato. R. syn.
366.

Anglis, dog's Violet.

Habitat in nemorosis, ericetis, et sepibus, δ in rupe Clog-wgn-y-Garnedd supra lacum Ffynnon Lâs. R. syn.
24. IV—VI.

*** *Stipulis*

*** *Stipulis pinnatifidis. Stigmate urceolato.*

tricolor. 5. **VIOLA** caule triquetro diffuso, foliis oblongis dentatis, stipulis dentato-pinnatifidis, lacinia suprema oblonga subpetiolata.

Viola caule triquetro diffuso, foliis oblongis incisis, stipulis pinnatifidis. Sp. pl. 1326.

Viola caule anguloſo diffuso, foliis ovatis dentatis, flore calyce paulo majore. Hall. hist. 569.

Viola bicolor arvensis. B. pin. 200. R. syn. 366.

Viola tricolor sylvestris. Ger. em. 853? Park. 755?

6 *Viola caule anguloſo diffuso, foliis ovatis dentatis, flore calyce duplo longiore. Hall. hist. 568.*

Viola tricolor. Ger. em. 854. R. syn. 365. major et vulgaris. Park. 756.

Viola tricolor hortensis repens. B. pin. 199.

Jacea tricolor f. Trinitatis flos. B. hist. III. 546.

Anglis, pansy Violet Heart's-ease or three Faces under a hood.

Habitat in arvis. ○. V.—IX,

grandiflora. 7. **VIOLA** caule triquetro simplici, foliis subcordatis dentatis, stipulis pinnatifidis.

Viola caule triquetro simplici, foliis oblongiusculis, stipulis pinnatifidis. Syst. nat. 585. Mant, I. 120.

Viola montana lutea grandiflora. B. pin. 200. nostras, R. syn. 356.

Viola lutea. Ger. em. 850. desc. non icon.

Anglis, yellow Violet or Pansies.

Habitat in montosis pascuis. In septentrionalibus et Wallachicis, solo putrido et palustri multaties observavimus. 24. V—IX.

IMPATIENS. 1008.

Cal. diphyllus. Cor. pentapetala, irregularis, nectario cucullato. Caps. supera quinquevalvis.

noli me tangere. 1. **IMPATIENS** pedunculis multifloris solitariis, foliis ovatis, geniculis caulinis tumentibus. Sp. pl. 1329. Fl. dan. 582.

Impatiens caule geniculato, pedunculis ramosis, foliis petiolatis ovatis crenatis. Hall. hist. 557.

Persicaria filiquosa. Gér. em. 446.

Balsamine lutea s. noli me tangere. B. pin. 306.
R. syn. 316.

Balsamita altera, Noli me tangere. Col. ecphr. I. 149:
t. 50.

Mercurialis sylvestris, Noli me tangere dicta sive Persicaria filiquosa. Park. 296.

Anglis, yellow Balsam, Quick in the Hand or Touch-me-not.

Habitat in umbrosis humidis et ad rivulos; on the banks of Winandermere, near Ambleside. R. syn. prope Rydall-hall; et alibi in Westmorlandia. ☽. VII. VIII.

Classis XX.

G Y N A N D R I A
D I A N D R I A.

O R C H I S. 1009.

*Nectarium corniforme pone florem.** *Bulbis indivisis.*

- bifolia.* 1. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio lanceolato integerrimo: cornu longissimo, petalis patentibus.
Sp. pl. 1331. Fl. dan. 235.
Orchis radicibus oblongis, labello linear. *Hall. bist. 1285. t. 35. Orch. 82.*
Orchis alba bifolia minor, calcari oblongo. *B. pin. 83. R. syn. 380. Vaill. par. 151. t. 30. f. 7.*
Orchis psychodes. *Ger. em. 211.*
Orchis sphegodes s. Testiculus vulpinus 1. *Park. 1351.*
g: Orchis hermaphroditica bifolia. *B. bist. II. 772.*
Anglis, butterfly Orchis.
Habitat in pratis, pascuis et dumetis. 4. V. VI.
- pyramidalis.* 2. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio bicorni trifido æquali integerrimo, cornu longo, petalis sublanceolatis. *Syst. nat. 589. Sp. pl. 1332. Fac. aust. III. 37. t. 266.*
Orchis radicibus subrotundis, spica densa, calcare longissimo, labello bicorni æqualiter tripartito. *Hall. bist. 1286. t. 35. Orch. 83.*
Orchis purpurea spica congesta pyramidali. *R. syn. 377. t. 18. Seg. ver. t. 15. f. XI.*
Cynosorchis.

Cynosorchis militaris montana spica rubente conglomerata. *B. pin.* 81. *pr.* 28.

Anglis, pyramidal Orchis.

Habitat in pratis et pascuis solo calcareo. 24. VI. VII.

3. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio trifido reflexo *coriophoroides* crenato: cornu brevi, petalis conniventibus. *Sp. pl.* 1332. *Jac. austr.* II. 14. t. 122.

Orchis radicibus subrotundis, galea connivente, labello trifido reflexo. *Hall. hist.* 1284. t. 34. *Orch.* 76.

Orchis odore hirci minor. *B. pin.* 82. *Vaill. p. t.* 30. f. 30.

Orchis barbata fœtida minor flore albo. *R. syn.* 376.

Tragorchis minor, flore fuliginoso. *R. hist.* 1213.

Anglis, lizard Orchis.

Habitat in pascuis. 24. VI. nondum inveni.

4. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio quadrilobo *maculæ* crenulato: cornu obtuso, petalis dorsalibus reflexis. *Sp. pl.* 1333. *Fl. dan.* 457.

Orchis radicibus subrotundis, petalis lateralibus reflexis, labello trifido, segmento medio longiori bifido. *Hall. hist.* 1283. t. 33. *Orch.* 74.

Orchis morio mas, foliis maculatis. *B. pin.* 81. *Park.* 1346. *R. syn.* 376. *Vaill. par.* 151. t. 31. f. 12.

Cynosorchis morio mas. *Ger. em.* 208.

Anglis, male Orchis.

Habitat in pratis et pascuis. 24. V.

Pharmac. Satyrii Radix.

5. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido *Morio*. crenulato: cornu obtuso adscendente, petalis obtusis conniventibus. *Syst. nat.* 589. *Sp. pl.* 1333. *Fl. dan.* 253.

Orchis radicibus subrotundis, petalis galeæ lineatis, labello trifido crenato, medio segmento emarginato. *Hall. hist.* 1281. t. 33. *Orch.* 72.

Orchis morio femina. *B. pin.* 82. *Park.* 1347. *R. syn.* 377. *Vaill. par.* 149. t. 31. f. 13. 14.

Cynosorchis morio femina. *Ger. em.* 208.

Anglis,

GYNANDRIA DIANDRIA.

Anglis, female Orchis.

Habitat in pratis et pascuis subhumidis. 4. V. VI.

ustulata. 6. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido punctis scabro: cornu obtuso, petalis distinctis.

Spl. pl. 1333. Fl. dan. 103.

Orchis radicibus subrotundis, labello quadrifido, calcare brevissimo. *Hall. hist. 1273. t. 28. Orch. 77.*

Orchis pannonica IV. *Clus. hist. 263. R. syn. 377.*

Cynosorchis militaris pratinis humilior. *B. pin. 81.*

Cynosorchis militaris pannonica. *Park. 1345.*

Cynosorchis minor pannonica. *Ger. em. 207.*

Anglis, dwarf Orchis.

Habitat in pratis et pascuis siccioribus. 4. V. VI.

militaris. 7. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio quinquefido punctis scabro; cornu obtuso, petalis confluentibus.

Sp. pl. 1333.

Orchis bulbis indivisis, nectarii labio quinquefido linearis punctis scabro: petalis confluentibus. *Fl. angl. 335.*

Orchis radicibus subrotundis, spica conica, labello quadrifido, brachiolis et pectore perangustis. *Hall. hist. 1277. t. 28. Orch. 79.*

Orchis galea et alis fere cinereis. *B. pin. II. 755.*
R. syn. 378.

Cynorchis latifolia hiante cuculo major. *B. pin. 80.*

Cynorchis latifolia minor. *Park. 1344.*

Cynorchis major altera. *Ger. em. 205.*

purpurea. 8. Orchis bulbis indivisis, nectarii labio barbato-quinquelobo lateralibus obtusis crenulatis, medio brevissimo acuto, petalis confluentibus. *Fl. angl. 334.*

Orchis radicibus subrotundis, spica longa, labello quadrifido, brachiolis angustis crusculis latis ferratis. *Hall. hist. 1276. t. 31. Orch. 78.*

Orchis magna latis foliis, galea fusca vel nigricante. *B. hist. II. 759. R. syn. 378. t. 19. f. 2.*

Anglis, man Orchis 8 purple man Orchis.

Habitat in pratis et pascuis solo cretaceo. On Cawsham hills by the Thames side near Reading, Berkshire.

Near

Near the old chalk-pit by the paper-mill at Harefield.
Blackf. & in sylvis et dumetis prope Northfleet in Can-
tio. 24. V.

** *Bulbis palmatis.*

8. ORCHIS bulbis subpalmatis rectis, nectarii cornu *latifolia*.
conico: labio trilobo lateribus reflexo, bracteis flore
longioribus. Sp. pl. 1334. Fl. dan. 246.

Orchis radicibus palmatis, caule fistuloso, bracteis
maximis, labello trifido ferrato: medio segmento
obtuso. Hall. hist. 1279. t. 32. Orch. 70.

Orchis palmata pratensis latifolia, longis calcaribus.
B. pin. 85. R. syn. 380. Vaill. par. 152. t. 31.
f. 1—5.

Orchis palmata mas f. Palma Christi mas. Park. 1356.
Palma Christi mas. Ger. em. 220.

Anglis, broad-leaved Orchis.

Habitat in pratis et pascuis. 24. V. VI.

9. ORCHIS bulbis palmatis patentibus, nectarii cornu *maculata*.
germinibus breviore: labio plano, petalis dorsalibus
patulis. Sp. pl. 1335.

Orchis radicibus palmatis, caule solido, labello trifido
ferrato medio segmento acuminato. Hall. hist.
1278. t. 32. Orch. 69.

Orchis palmata pratensis maculata. B. pin. 85. R.
syn. 381.

Orchis palmata foemina f. Palma Christi foemina, fo-
liis maculatis. Park. 1357.

Palma Christi foemina. Ger. em. 220.

Anglis, spotted Orchis.

Habitat in pratis, pascuis et nemorosis humidis. 24. VI.

10. ORCHIS bulbis palmatis, nectarii cornu setaceo ger- *conopsea*.
minibus longiore: labio trifido, petalis duobus pa-
tentissimis. Sp. pl. 1335. Fl. dan. 224.

Orchis radicibus palmatis, calcare longissimo, labello
trifido obtuso unicolor. Hall. hist. 1287. t. 29.
Orch. 84.

Orchis palmato minor calcaribus oblongis. B. pin. 85.
Vaill. par. t. 30: f. 8—10. R. syn.

Orchis palmata minor flore rubro. Park. 1358.

GYNANDRIA DIANDRIA.

Serapias minor nitente flore. Ger. em. 222.

Anglis, sweet Orchis.

Habitat in pratis et pascuis. 4. VI.

** *Bulbis fasciculatis.*

abortiva. II. ORCHIS bulbis fasciculatis filiformibus, nectarii labio ovato integerrimo. Sp. pl. 1336. Jac. austr. II. 55. t. 193.

Epipactis aphylla, nectario longo, labello ovato-lanceolato. Hall. hist. 1288. t. 36.

Orchis abortiva violacea. B. pin. 86.

Limodorum austriacum. Clus. pan. 242. R. syn. 383. *Nidus avis flore et caule violaceo purpureo colore.* Ger. em. 228.

Nidus avis purpureus. Park. 1362.

Anglis, purple Orchis or Birds-nest.

Habitat in pratis siccioribus; in Southamptoniae comitatu prope Alton oppidum invenit. D. Goodyer. R. syn. ? 4. V. VI.

SATYRIUM. 110.

Nectarium scutiforme s. inflato-didymum pone florem.

hircinum. I. SATYRIUM bulbis indivisis, foliis lanceolatis, nectarii labio trifido: intermedia linearis obliqua praemorsa. Sp. pl. 1337.

Orchis radicibus subrotundis, labello longissimo tripartito plicato. Hall. hist. 1268. t. 25. Orch. 62.

Orchis barbata odore hirci, breviore latioreque folio. B. pin. 82. Hist. Ox. III. 491. f. 12. t. 12. f. 9.

Orchis barbata foetida. B. hist. II. 756. R. syn. 376.

Tragorchis maxima et T. vulgaris. Park. 1348.

Tragorchis maximus et T. mas. Ger. em. 210.

Anglis, Lizard Satyrion.

Habitat in pratis et pascuis cretaceis; circa Dartford et Crayford in Cantio sed rarius. R. syn. VI. VII.

viride. 2. SATYRIUM bulbis palmatis, foliis oblongis obtusis, nectario labio linearis trifido: intermedia obsoleta. Sp. pl. 1337. Fl. dan. 77.

Orchis

GYNANDRIA DIANDRIA.

387

Orchis radicibus oblongis, galea connivente, labello trifulco, calcare brevissimo. Hall. hist. 1269. t. 26.

Orch. 67.

Orchis palmata flore viridi. B. pin. 86. pr. 30.

Orchis palmata minor flore luteo-viridi. R. syn. 381.

Serapias batrachites altera. Ger. em. 224.

3. *Satyrion bulbis palmatis, foliis oblongis, nectarii labio trifido æquali:* Fl. angl. 337.

Anglis, frog Satyrion or Orchis.

Habitat in pratis et pascuis. 24. VII. VIII.

3. *SATYRIUM bulbis fasciculatis, foliis lanceolatis, albidum, nectarii labio trifido acuto: lacinia intermedia obtusa.* Sp. pl. 1338. facq. enum. 294.

Orchis radicibus confertis teretibus, calcare brevissimo, labello trifido. Hall. hist. 1270. t. 26. *Orch. 63.*

Orchis palmata thyrso specioso longo dense stipato ex viridi albente. R. syn. 382.

Pseudo-orchis alpina, flore herbaceo. Mich. gen. 80. t. 26.

Anglis, white Satyrion.

Habitat in pratis humidis in Cambria et circa Malham in comitatu Eboracensi. D. Richardson. R. syn. circa Llanberris. D. Davies. 24. VI.

4. *SATYRIUM bulbis fibrosis, foliis ovatis radicalibus, repens, floribus secundis.* Sp. pl. 1339.

Epipactis foliis petiolatis ovato-lanceolatis, floribus tetrapetalis hirsutis. Hall. hist. 1295. t. 22. *Orch. 34.*

Pseudo-orchis. B. pin. 84.

Orchis minor, flore albo, radice geniculata. Cam. hort. III. n^o 35.

Pyrola angustifolia polyanthos, radice geniculata. Loef. pruss. 210. t. 68.

Anglis, creeping Satyrion.

Habitat in pascuis et dumetis. Circa Moy-hall juxta Inverness et alibi in Scotia. 24. VI.

O P H R Y S. 1001.

• *Nectarium subtus subcarinatum.*

C c 2

* *Bulbis*

GYNANDRIA DIANDRIA.

* *Bulbis ramosis.*

- Nidus avis.* 1. OPHRYS bulbis fibroso-fasciculatis, caule vaginato aphylo, nectarii labio bifido. *Sp. pl.* 1339. *Fl. dan.* 181.
Epipactis aphylla, flore inermi, labello bicorni. *Hall. hist.* 1290. *t.* 37. *Orch.* 47.
Nidus avis. *Lob. ic.* 195. *Lugd.* 673. *R. syn.* 382.
Orchis abortiva fusca. *B. pin.* 86.
Orchis abortiva rufa. f. *Nidus avis.* *Park.* 1362.
Satyrion abortivum f. *Nidus avis.* *Ger. em.* 228.
Anglis, bird's nest Ophrys.
Habitat in sylvis et umbrosis. *In sylvis circa Charlton,*
in Cantio. 24. V. VI.
- Corallorrhiza.* 2. OPHRYS bulbis ramosis flexuofisis, caule vaginato, nectarii labio trifido. *Sp. pl.* 1339. *Fl. dan.* 451.
Corallorrhiza. *Hall. hist.* 1301. *t.* 44. *Orch.* 12.
Orobanche radice f. *coralloide.* *B. pin.* 88.
Orobanche spuria f. *Corallorrhiza.* *Rup. gen.* 284. *t.* 2.
Dentaria minor. *Ger. em.* 1585. *Park.* 1387.
Anglis, corall Ophrys.
Habitat in silvis pinetis in boreali parte Scotiæ. 24.
 VIII. IX.
- ovata.* 3. OPHRYS bulbo fibroso, caule bifolio, foliis ovatis, nectarii labio bifido. *Sp. pl.* 1340. *Fl. dan.* 137.
Epipactis foliis binis ovatis, labello bifido. *Hall. hist.* 1291. *t.* 37. *Orch.* 45.
Ophrys bifolia. *Ger. em.* 402. *B. pin.* 87.
Bifolium sylvestre vulgare. *Park.* 504. *R. syn.* 385.
Anglis, common Ophrys or Twayblade.
Habitat in sylvis et nemorosis humidis. 24. V. VI.
- sordata.* 4. OPHRYS bulbo fibroso, caule bifolio, foliis cordatis, nectarii labio bifido.
Ophrys bulbo fibroso, caule bifolio, foliis cordatis. *Sp. pl.* 1340. *Fl. suec.* 809.
Epipactis foliis binis cordatis, labello bifido, postice bidentato. *Hall. hist.* 1292. *t.* 22. *f.* 4. *Orch.* 43.
Ophrys minima. *B. pin.* 87. *pr.* 31.

Bifolium

Bifolium minimum. B. hist. III. 534. R. syn. 385.

Anglis, mountain Ophrys or Twayblade.

Habitat in ericetis montosis humidis, præsertim solo turfo in comitatibus Eboracensi, Lancastriensi et Westmorlandico passim. 4. VI. VII.

5. OPHRYS bulbo fibroso, caule angulato, foliis vagi-paludosa,
natis apice scabris, nectarii labio integro.

*Ophrys bulbo subrotundo, scapo subnudo pentagono,
foliis apice scabris, nectarii labio integro. Sp. pl.
1341.*

Orchis minima bulbosa. R. syn. 375.

Orchis bifolia minor palustris. Pluk. ph. t. 247. f. 2.

Bifolium palustre. Park. 505. R. syn. 385.

Anglis, marsh Ophrys or Twayblade.

*Habitat in paludibus. Found by Mr. Dent and Mr.
Dale, on the boggy grounds near Gamlingay in Cam-
bridgeshire; by Parkinson on the low wet grounds be-
tween Hatfield and St. Albans; in Rumney marsh;
by Mr. Dubois at Hursthill, Tunbridge-wells. R.
syn. prope Norwich. D. Pitchford. 4. VI. VII.*

** *Bulbis rotundis.*

6. OPHRYS bulbis aggregatis oblongis, caule subfolio-spiralis.
so, floribus secundis, nectarii labio indiviso crenato.

Sp. pl. 1340. Fl. dan. 387.

*Epipactis bulbis cylindricis, spica spirali, labello cre-
nulato. Hall. hist. 1294. t. 38. Orch. 36.*

*Orchis spiralis alba odorata. B. hist. II. 769. R. syn.
378.*

*Triorchis. Ger. em. 218. alba odorata minor. B. pin.
87. Park. 1354.*

Anglis, Triple Ophrys or Ladies Traces.

Habitat in pratis et pascuis succis. 4. VII. VIII.

7. OPHRYS bulbo ovato, scapo angulato nudo, fo-lilifolia.
liis lanceolatis, petalis linearibus, nectarii labio
subrotundo integro.

*Ophrys bulbo subrotundo, scapo nudo, foliis lanceo-
latis, nectarii labio integro, petalis dorsalibus linea-
ribus. Sp. pl. 1341.*

GYNANDRIA DIANDRIA.

Epipactis foliis binis ovatis, bulbis piriformibus foliosa vagina cinctis. *Hall. Orch.* 40.

Pseudo-orchis bifolia palustris. *R. syn.* 382. *hist.* 1226.
Chamæorchis lilifolia. *B. pin.* 84.

Chamæorchis lilifolius minor sabuletorum Zeelandiæ,
&c. *Lob. adv. pars. alt.* 506.

Helleborine bifolia, radice ovali, cucullo sparso. *Hall. aet. gott.* 1751. 215. t. xiv.

Lœselii. β *Ophrys* bulbo subrotundo scapo nudo trigono, nectarii labio ovato. *S. pl.* 1341.

Ophrys diphyllos bulbosa. *Lœf. Fl. pruss.* 180. t. 58.
Anglis, dwarf *Ophrys*.

Habitat in palustribus. On Hinton and Teyersham moors near Cambridge. *R. syn.* prope Norwich. D. Pitchford. 4. VI. VII.

Desc: Radix bulbosus, tunicatus, bulbo ovato infra radicato. Scapus semipedalis, erexitus, tri et quinquangularis, nudus, glaber. Folia radicalia duo lanceolata, integerrima, nuda, fere longitudine scapi. Flores racemosi a quatuor ad sex vel septem, luteo-viridi. Petala quinque, tria exteriora linearia, reflexa, viridia; duo interiora lateralia, filiformia subpurpurascens. Nectarii labium magnum, subrotundum integerrimum, subpurpurascens; Capsula erecta, oblonga, angulata. Semina numerosa, parva.

Monor-
chis. 8. *OPHRY'S* bulbo globoſo, scapo nudo, nectarii labio trifido. *Sp. pl.* 1342. *Fl. dan.* 102.

Orchis bulbo unico subrotundo, labello cruciformi. *Hall. hist.* 1262. t. 22. *Orch.* 53.

Orchis odorata moschata, s. monorchis. *B. pin.* 84. *R. syn.* 378.

Orchis pusilla odorata. *Park.* 1354.

Anglis, musk *Ophrys*.

Habitat in paucis sterilibus solo calcareo. 4. VII.

anthropo-
phora. 9. *OPHRY'S* bulbis subrotundis, scapo folioso, nectarii labio linearis tripartito: medio elongato bifido. *Sp. pl.* 1343. *Fl. dan.* 103.

Orchis radicibus subrotundis, spica longa, flore inermi, labello perangusto quadrifido. *Hall. hist.* 1264. *Orch.* 56.

Orchis anthropophora oreades. Col. ec. I. 320. R. syn.

379. *fœmina. Park. 1348.*

Orchis flore nudi hominis effigiem repræsentans, fœmina. B. pin. 82. Vaill. par. 147. t. 31. f. 19. 20. Anglis, man Ophrys.

Habitat in pratis et pascuis cretaceis; prope Northfleet Greenhithe, et alibi in Cantio frequens. 24. VI.

10. OPHRYS bulbis subrotundis, scapo folioso, nectarii *muscifera*.
labio quadrifido.

Orchis radicibus subrotundis, labello sericeo bisulco, brachiolis brevibus subulatis. Hall. hist. 1265. t. 24. Orch. 57.

Orchis myodes galea et alis herbidis. B. hist. II. 767. R. syn. 379.

Orchis muscæ corpus referens minor, galea et alis herbidis. B. pin. 83. Vaill. par. 147. t. 31. f. 17. 18.

Orchis myodes. Ger. em. 213. minor. Park. 1352.

Orchys myodes major. Park. 1351. R. syn. 379. Anglis, fly Ophrys.

Habitat in pratis et pascuis solo calcareo. Prope Croydon et Wrootham copiose, et Greenhithe in Cantio. 24. VI.

Obs. Corolla petala quinque; tria exteriora ovata, integra, glabra, herbacea, patentia; duo interiora linearia, atro-purpurea. Nectarii labium oblongum, quadrifidum, supra atro-purpureum subtus herbaceum, fascia cœrulea infra lobos superiores.

11. OPHRYS bulbis subrotundis, scapo folioso, nectarii *apifera*.
labio quinquelobo, lebis subtus inflexis.

Orchis radicibus subrotundis, labello holosericeo emarginato appendiculato. Hall. hist. 1266. t. 24. Orch. 58.

Orchis fucum referens major, foliolis superioribus candidis et purpurascenscentibus. B. pin. 83. Vaill. par. t. 30. f. 9.

Orchis fuciflora galea et alis purpurascenscentibus. B. hist. II. 766. R. syn. 379.

Orchis s. Testiculus vulpinus, 2 sphegodes. Ger. em. 212.

Orchis

GYNANDRIA DIANDRIA.

Orchis sphegodes seu *fucum referens*. Park. 1350.
Anglis, bee *Ophrys*.

Habitat in pratis et pascuis cretaceis. 4. VII. VIII.
Obs. Corolla petala quinque; tria exteriora patentia oblonga purpurascens, trinervia, nervis viridibus; duo interiora lateralia, linearia, villosa, viridia; Nectarii labium magnum, subrotundum quinquelobatum, coloratum, sericeum, atro-purpureum, lobis subtus inflexis, macula ad basin bilobata luteo variegata, glabra, nitida, utrinque maculæ dente obtuso exerto.

- arani-
ra.* 12. OPHRYS bulbo subrotundo, scapo folioso, nectarii labio subrotundo integro emarginato convexo.
Orchis sive *Testiculus sphægodes* hirsuto flore. B. hist. II. 767. R. syn. 380.
Orchis fucum referens colore rubiginoso. B. pin. 83.
Vaill. par. t. 31. f. 15. 16.
Orchis araneam referens. B. pin. 84. Vaill. par. 146.
t. 30. f. 10.
Orchis sphegodes altera. Park. 1351.
Testiculus vulpinus major sphegodes. Ger. em. 212.
Anglis, spider *Ophrys*.
Habitat in pratis et pascuis cretaceis. 4. IV. V.
Obs. Corolla petala quinque; tria exteriora oblonga, patentia, viridia; duo interiora, lateralia, linearia, herbacea, breviora. Nectarii labium magnum, subrotundum, integrum, emarginatum, convexum, coloratum, sericeum, ad basin macula bilobata, nitida, glabra, et utrinque maculæ dente obtuso exerto, subtus concavo, supra atro purpureo, margine viride, infra herbacea.

C Y P R I P E D I U M. 1015.

Nectarium ventricosum, inflatum, cavum.

- Calceolus.* 1. CYPRIEDIUM radicibus fibrosis, foliis ovato-lanceolatis caulinis. Sp. pl. 1346. Mill. ic. t. 242.
Hall. hist. 1300. Orch. 14.
Calceolus mariæ. Ger. em. 443. R. syn. 385.
Helleborine flore rotundo s. *Calceolus*. B. pin. 187.
Elleborine major seu *Calceolus mariæ*. Park. 217.
Anglis,

Anglis, Ladies-slipper.

Habitat in sylvis et dumetis, sed rarius, in sylvis circa Clapham et Ingleton in comitatu Eboracenfi, sed sparsim. 24. VII.

S E R A P I A S. 1012.

Nectarium ovatum, gibbum, labio ovato.

1. SERAPIAS bulbis fibrosis, nectarii labio obtuso per latifolia.
talibus æquali, fructibus pendulis. Fl. angl. 341.

Serapias bulbis fibrosis, foliis ovatis amplexicaulibus,
floribus pendulis. Syst. nat. 593.

Epipactis foliis amplexicaulibus ovato-lanceolatis, la-
bello lanceolato. Hall. hist. 1297. t. 40. Orch. 28.

Helleborine. Dod. pempt. 387. Ger. em. 442. latifo-
lia montana. B. pin. 186. R. syn. 383.

Elleborine flore viridente. Park. 218.

2 Helleborine altera atro-rubente flore. B. pin. 186.
R. syn. 383.

3 Serapias bulbis fibrosis, foliis ensiformibus sessilibus, palustris.
floribus pendulis. Syst. nat. 593. Fl. dan. 267.

Epipactis foliis ensiformibus caulinis, floribus pendu-
lis, labello obtuso per oras plicato. Hall. hist. 1296.
Orch. 31.

Helleborine palustris nostras. R. syn. 384.

Helleborine angustifolia palustris. B. pin. 87.

Anglis, common y marsh Helleborine.

Habitat in sylvis, nemoreosis et sepibus y in palustribus.
24. VII. VIII.

Obs. y in horto aut solo arido illata, secundo anno in a
evadit.

2. SERAPIAS bulbis fibrosis, nectarii labio obtuso per longifolia:
talibus breviore, fructibus erectis. Fl. angl. 341.

Serapias bulbis fibrosis, foliis ensiformibus, floribus grandi-
erectis, nectarii labio obtuso petalis breviore. Syst. flora.
nat. 594.

Epipactis caule paucifloro, lineis in obtuso labello le-
vibus. Hall. hist. 1298. t. 41. Orch. 25.

Helleborine flore albo. Ger. em. 442. R. syn. 383.
vel Damasonium montanum latifolium. B. pin. 187.

Elleborine minor flore albo. Park. 218.

2 Helle-

GYNANDRIA HEXANDRIÄ.

- β Helleborine latifolia, flore albo clauso. R. syn. 384.
 γ Helleborine foliis prælongis angustis acutis. R. syn. 385.
 δ Helleborine montana angustifolia purpurascens. B. pin. 187.

Anglis, white Helleborine.

Habitat in sylvis et dumetis; in the woods near Stokenchurch, Oxfordshire. R. syn. in sylvis circa Marlow et in sylvis in comitatibus Bedfordiensi, Buckinghamensi, &c. frequens; γ δ in dumetis ad latus montium circa Clapham et Ingleton, &c. in comitatu Eboracensi. 24. VIII.

HEXANDRIA.

ARISTOLOCHIA. 1022.

Hexagynia Cal. o. Cor. monopetala, lingulata, integra. Caps. sexlocularis infera.

clematitis. I. ARISTOLOCHIA foliis cordatis, caule erecto, floribus axillaribus confertis. Sp. pl. 1364. Hall. hist. 1029.

Aristolochia clematitis. Ger. em. 847. Park. 292. recta. B. pin. 307.

Anglis, climbing Birth-wort.

Habitat in sylvis et sepibus; in a wood two miles from Thorndon, Essex; and also in Cambridgeshire. Blackf. spec. prope Maidston et alibi in Cantio. 24. VII.

Pharmac. Aristolochiæ clematitis Radix.

POLYANDRIA.

ARUM. 1028.

Spatha monophylla, cucullata; *Spadix supra nudus*,
inferne femineus, medio stamineus.

1. ARUM acaule foliis hastatis integerrimis, spadice *macula-*
clavato. *Sp. pl.* 1370. *Fl. dan.* 505. *tum.*

Arum foliis sagittatis, spatha recta, clava cylindrica.

Hall. hist. 1302.

Arum. *B. hist. II.* 783. *R. syn.* 266. *vulgare*. *Ger.*
em. 834. *maculatum*. *B. pin.* 195. et non *macula-*
tum. *Park.* 373.

Anglis, Wake-Robin, Cuckow-pint.

Habitat in umbrosis et ad sepes. 24. V.

Pharmac. Ari Radix.

ZOSTERA. 1032.

Spadix linearis, altero latere fructifero. *Cal.* o:
Cor. o. *Stam.* alterna. *Sem.* solitaria, alterna.

1. ZOSTERA pericarpiis oblongis subpedicillatis. *marina.*

Zostera. *It. W-goth.* 166. t. 4. f. 1. *Sp. pl.* 1374.
pericarpiis sessilibus. *Syst. nat.* 605. *Fl. dan.* 15.

Alga. *Ger. em.* 1569. *R. syn.* 52. *angustifolia vitria-*
riorum. *B. pin.* 364. *hist. III.* 794.

Fucus marinus s. *alga marina graminea*. *Park.* 1242.

2 Zostera pericarpiis pedicillatis oliviformibus. *Syst. nat.*
605. *Mantis.* 123.

Fucus s. *alga marina graminea angustifolia feminifera*
ramosior. *R. syn.* 52.

γ *Fucus marinus* seu *alga marina graminea minor*. *R.*
syn. 53.

δ *Potamogiton marinum* in utriculis epiphylospermon
minus. *R. syn.* 53.

ε Alga

GYNANDRIA POLYANDRIA.

Alga angustifolia vitrariorum. R. syn. 53.

Anglis, Grass-wrack.

Habitat in littoribus maritimis. 24. VI—VIII.

Obs. variat seminibus pedicillatis et sessilibus in eodem
spadice sed plerisque pedicillatis.

Classis XXI.

M O N O E C I A

M O N A N D R I A.

ZANNICHELLIA. 1034.

Masculi. *Cal.* o. *Cor.* o. *Stam.* Filamentum unicum longum, erectum. *Anthera* ovata, erecta.

Feminei. *Cal.* monophyllus. *Cor.* o. *Germina* canticula quatuor. *Semina* totidem.

I. ZANNICHELLIA. Sp. pl. 1375. Hall. hist. 1640. *palustris.*
Zannichellia palustris major, foliis gramineis acutis,
&c. Mich. gen. 71. t. 34. f. 1. 2.

Aponogiton aquaticum graminifolium, staminibus singularibus. Pont. anth. 117. R. syn. 135.

Potamogitoni similis graminifolia ramosa et ad genicula polyceratos. Pluk. ph. t. 132. f. 7.

Potamogeton capillaceum, capitulis ad alas trifidis.

B. pin. 193. pr. 101.

Anglis, common Zannichellia.

Habitat in fossis et stagnis frequens. ♂. VII.

Obs. variat seminis dorso integro et dentato.

CHARA. Mantiss. I. 23. syst. nat. 615.

Masc. *Cal.* o. *Cor.* o. *Anthera* germini subiecta.

Fem. *Cal.* tetraphyllus. *Cor.* o. *Stigma* quinquefidum, *Sem.* unicum.

I. CHARA caulis levibus, frondibus interne dentatis. *vulgaris.*
Sp. pl. 1624. Fl. dan. 150.

Chara caule levi fragile. Hall. hist. 1681.

Chara vulgaris foetida. Act. paris. 1719. p. 17. t. 3.
f. 1. R. syn. 132.

D d

Equisetum

MONOECIA MONANDRIA.

Equisetum fætidum sub aqua repens. Ger. em. 1115.

B. pin. 16. pr. 25. hist. III. 731. Park. 1201.

β *Chara minor caulis et foliis tenuissimis.* Aet. paris. 1719. p. 18.

Anglis, common Chara.

Habitat in fossis et stagnis. ⊙. VII. VIII.

tomentosa. 2. CHARA aculeis caulinis ovatis. Sp. pl. 1624.

Chara major subcinerea fragilis. Aet. paris. 1719. p. 18.

R. syn. 132.

Chara caule tomentoso, fragili. Hall. hist. 1683.

Equisetum fragile majus subcinereum aquis immersum.

Hist. Ox. III. 621. t. 4. f. 9.

Equisetum s. Hippuris coralloides. Ger. em. 1115.

Equisetum s. Hippuris lacustris, foliis manu arenosis.

Pluk. ph. t. 21. f. 4.

Anglis, brittle Chara.

Habitat in fossis et stagnis; in fossis turfosis in comitatibus Lancastrensi et Westmorlandico frequens. ⊙.

VI—X.

spinosa. 3. CHARA aculeis caulinis capillaribus confertis. Sp. pl. 1624. Fl. dan. 154.

Chara caule fragili, spinoso. Hall. hist. 1682.

Chara major caulis spinosis. Aet. paris. 1719. p. 18.

t. 3. f. 3. R. syn. 132.

Equisetum s. Hippuris muscosus sub aqua repens.

Pluk. ph. t. 193. f. 6.

Anglis, prickly Chara.

Habitat in fossis et stagnis; in comitatibus Eboracensi, Lancastrensi et Westmorlandico. VI—X.

flexilis. 4. CHARA caule trichotomo diaphano inermi.

Chara caulum articulis inermibus diaphanis superne latioribus. Sp. pl. 1624.

Chara translucens major flexilis. Aet. paris. 1719. p. 18. f. 8.

Chara translucens minor flexilis. Aet. paris. 1719. p. 18. f. 9. R. syn. 133.

Anglis, smooth Chara.

Habitat in fossis et stagnis. In the ponds about Ipswich, Suffolk.

MONOECIA DIANDRIA.

399

Suffolk. In fossis maritimis passim; prope Hornsey.
O. VI—X.

D I A N D R I A.

L E M N A. 1038.

Mas. *Cal.* monophyllus. *Cor.* o.

Fem. *Cal.* monophyllus. *Cor.* o. *Stylus unicus.*
Caps. unilocularis.

1. LEMNA foliis sessilibus, radicibus solitariis. minor.

Lemna foliis sessilibus utrinque planiusculis, radicibus
solitariis. Sp. pl. 1376.

Hydrophace monorrhiza, foliis planis ovatis. Hall. hist.
1900.

Lens palustris. Cam. ep. 852. Ger. em. 829. R. syn.
129. t. 4. f. 1. vulgaris. B. pin. 362.

Lens palustris s. aquatica vulgaris. Park. 1262.

2. Lemna foliis sessilibus subtus hemisphaericis, radicibus gibba.
solitariis. Sp. pl. 1377.

Hydrophace monorrhiza, foliis pulvinatis, inferne con-
vexissimis. Hall. hist. 1898.

Lenticula palustris major, inferne magis convexa,
fructu polyspermo. Mich. gen. 16. t. II. f. 2.

Anglis, least Duck's-meat.

Habitat in stagnis. O. VI—IX.

3. LEMNA foliis petiolatis lanceolatis. Sp. pl. polyrrhi-
za. 1377.

Hydrophace polyrrhiza foliis ovatis planis. Hall. hist.
1899.

Lenticularia major polyrrhiza inferne atro purpurea.
Mich. gen. 16. t. II. f. 1.

Lenticula palustris major. R. syn. 129. t. 4. f. 2.

Anglis, greater Duck's-meat.

Habitat in fossis. O. V—IX.

3. LEMNA foliis petiolatis lanceolatis. Sp. pl. 1376. trifolia.

Hydrophace caule filiformi, foliis elliptico-lanceolatis
viviparis. Hall. hist. 1901.

D d 2

Lenticula

MONOECIA TRIANDRIA.

- Lenticula aquatica.* *P. pin.* 362. *R. syn.* 129.
Hederula aquatica. *Ger. em.* 830.
Ranunculus hederaceus aquaticus. *Park.* 1260.
Anglis, Ivy-leaved Duck's-meat.
Habitat in fossis et stagnis. *O.* VI—IX.

TRIANDRIA.

T Y P H A. 1040.

- Mas.* *Amentum cylindricum.* *Cal.* obsoletus, triphyllus. *Cor.* o.
Fem. *Amentum cylindricum*, infra masculos. *Cal.* capillo villoso. *Cor.* o. *Sem.* unicum, insidens pappo capillari.

- tatifolia.* 1. *TYPHA* foliis subensiformibus, spica mascula femineaque approximatis. *Sp. pl.* 1377.
Typha clava unica. *Hall. hist.* 1205.
Typha, *Cam. ep.* 607. *Ger. em.* 46. *palustris major.*
B. pin. 20. *hist. II.* 539. *R. syn.* 436.
Typha palustris maxima. *Park.* 1204.
Anglis, greater Cat's-tail or Reed-mace.
Habitat ad ripas fluviorum, piscinarum et paludium frequens. 24. VII.

- angustifolia.* 2. *TYPHA* foliis semicylindricis, spica mascula femineaque remotis. *Sp. pl.* 1377.
Typha clava mascula a feminina remota. *Hall. hist.* 1306.
Typha palustris media. *B. hist. II.* 540. *R. syn.* 436.
Typha palustris clava gracili. *B. pin.* 20.
Typha minor. *Park.* 1204.
Typha minor. *Lob. ic.* 81. *B. hist. II.* 540.
Typha palustris minor. *B. pin.* 20. *R. syn.* 436.
Anglis, lesser Cat's-tail or Reed-mace.
Habitat in fossis et stagnis. 24. VII.

SPARGANIUM. 1041.

- Mas.* *Amentum subrotundum.* *Cal.* triphyllus. *Cor.* o.
Fem. *Amentum subrotundum.* *Cal.* triphyllus. *Cor.* o.
Stigma bifidum. *Drupa exsucca, monosperma.*

i. SPAR-

MONOECIA TRIANDRIA.

401

1. SPARGANIUM foliis ensiformibus triquetris, caule *ramosum*.
ramoso.

Sparganium foliis erectis triquetris. *Sp. pl.* 1378. *erectum*.

Sparganium caule foliisque erectis. *Hall. hist.* 1303.

Sparganium. *Cam. ep.* 732. *ramosum*. *Ger. em.* 45.

Park. 1205. *B. pin.* 15. *R. syn.* 437.

Anglis, greater Bur-reed.

Habitat in *fossis*, *paludibus* et ad *ripas fluviorum*. 24.

VII.

2. SPARGANIUM foliis ensiformibus planis, caule *simplex*.
simplici.

Sparganium non ramosum. *B. pin.* 15. *Park.* 1205.

R. syn. 437. sive *latifolium*. *Ger. em.* 45.

3. Sparganium foliis decumbentibus planis. *Sp. pl.* 1378. *natans*.
Fl. dan. 260.

Sparganium foliis planis mollibus decumbentibus.

Hall. hist. 1304.

Sparganium minimum. *R. syn.* 437. *hist.* 1910.

Anglis, lesser Bur-reed.

Habitat in *palustribus* et ad *ripas stagnorum* et *lacuum* 3
in *stagnis*, *lacubus* et *flaviis* leniter fluentibus; circa
Norwich. D. Rose. Circa Llanberis, et in comi-
tatis Eboracensi, Westmorlandico *passim*. 24. VII.

CAREX. 1046.

Mas. *Amentum imbricatum*. *Cal. monophyllus*. *Cor. o.*

Fem. *Amentum imbricatum*. *Cal. monophyllus*. *Cor. o.*

Nectarium inflatum, *tridentatum*. *Stigmata tria-*
Sem. triquetrum, intra *nectarium*.

* *Spica unica simplici*.

1. CAREX spica simplici dioica. *Sp. pl.* 1379. *Fl. dan.* *dioica*,
369.

Gramen cyperoides minimum, spica simplici cassa.
Hist. Ox. III. 244. *f. 8. t. 12. f. 22.*

Gramen cyperoides minus, ranunculi capitulo lon-
giore. *R. syn.* 425.

Cyperoides parvum, caulibus et foliis tenuissimis, tri-
E e angularibus,

MONOECIA TRIANDRIA.

angularibus, spica longiori, capsulis oblongis, in angustum collum vix bifidum attenuatis. *Mich. gen. 56. t. 32. f. 1.*

Anglis, small Carex.

Habitat in paludibus turfosis. 24. VI. VII.

capitata. 2. CAREX spica simplici androgyna: superne mascula, capsulis imbricato-patulis. *Sp. pl. 1379. Fl. dan. 372?*

Carex spica unica subrotunda, seminibus inflatis. Hall. hist. 1351.

Cyperoides parvum, caulis et foliis tenuissimis triangularibus, spica subrotunda, capsulis oblongis in angustum collum vix bifidum attenuatis. *Mich. gen. 56. t. 32. f. 2.*

Gramen cyperoides minimum, ranunculi capitulo rotundo. *Hist. Ox. III. 245. f. 8. t. 12. f. 36. R. syn. 425.*

Anglis, round-headed Carex.

Habitat in paludibus turfosis; in palustribus prope Hinton et Teversham in agro Cantabrigiensi; in Sherley common, prope Croydon. 24. VI.

patula. 3. CAREX spica simplici androgyna oblonga: superne mascula, capsulis oblongis acuminatis patulis.

Anglis, patulous Carex.

Habitat in ericetis montosis; prope Glascow in Scotia. 24. VI.

Desc. Radix perennis ramosa. Culmus quadriplicaris, erectus, triangularis, foliatus, striatus. Folia radicalia pauca, ensiformia, acuta, nuda; caulina duo culmo breviora. Spica terminalis erecta, oblonga, androgyna, superne mascula, bi f. triflora fusca; feminea tri f. quinqueflora virescentia; Capsula oblonga, patula.

pollicaris. 4. CAREX spica simplici androgyna: superne mascula, capsulis divaricatis retroflexis. *Sp. pl. 1380. Fl. dan. 166.*

Carex spica unica terete, seminibus rostratis. Hall. hist. 350.

Carex

MONOECIA TRIANDRIA.

403

Carex minima, caulis et foliis capillaceis, capitulo singulari tenuiori, capsulis oblongis utrinque acuminatis et deorsum reflexis. *Mich. gen.* 66. *t.* 33.

Gramen cyperoides minimum, seminibus deorsum reflexis puliciformibus. *R. syn.* 424. *Hist. Ox.* III. *f.* 1. 244. *f.* 8. *t.* 12. *f.* 21. *Pluk. ph.* *t.* 24. *f.* 10.

Anglis, flea Carex.

Habitat in paludibus turfosis et limosis. 24. VI. VII.

** *Spicis androgynis.*

5. CAREX racemo-composito, spiculis androgynis. *Sp. panicula-*
ta. *pl.* 138.

Carex spica pauciculata. *Hall. hist.* 1368.

Carex radice repente, caule exquisite triangulari, spica multiplicitate ferruginea et fusca. *Mich. gen.* 68. *t.* 33. *f.* 7.

Cyperus alpinus longus incedorus panicula ferruginea minus sparsa. *Sch. agr.* 499. *pr. t.* 8.

Gramen cyperoides palustre elatius, spica longiore laxa.
R. syn. 422. *Hist. Ox.* III. 244. *t.* 12. *f.* 23.

Anglis, panicled Carex.

Habitat in palustribus putridis et aquosis. 24. VI.

6. CAREX spica composita subdisticha, spiculis ovatis *disticha*: subimbricatis androgynis, foliolo longiori instructis, culmo triquetro. *Fl. angl.* 347. *Schreb. spic.* 63.

Carex spicis in summo caule congestis, imis foliolis insidentibus. *Hall. hist.* 1362.

Carex palustris elatior, radice repente, caule trilatero, spica spadicea, capitulis crassioribus, capsulis marginatis. *Mich. gen.* 67. *t.* 33. *f.* 3.

Gramini cyperoidi ex monte Ballon simile, spica totali e pluribus spicis composita. *R. syn.* 423. *Pluk. ph.* *t.* 34. *f.* 7.

Gramen cyperoides elegans multifera spica. *Park.* 1172.

8 *Gramen cyperoides elegans spica composita molli.*
Pluk. ph. *t.* 34. *f.* 4.

Anglis, soft Carex.

Habitat in palustribus. 24. V. VI.

Obs. Spica e spiculis a duodecim ad viginti composita, inferioribus remotioribus, superioribus imbricatis, ovatis.

MONOECIA TRIANDRIA.

orenaria. 7. CAREX spica composita, spiculis subrotundis androgynis : inferioribus remotioribus foliolo longiori instructis, culmo triquetro. *Sp. pl.* 1381.

Carex spicis stipula brevioribus, imis distinctis, superioribus congestis. *Hall. hist.* 1363?

Carex maritima humilis, radice repente, caule trilatero, spica spadicea nonnihil foliosa, capitulis crassioribus capsulis marginatis. *Mich. gen.* 67. t. 33. f. 4.

Gramen cyperoides ex monte Ballon simile humilius, in maritimis et arenosis nascens. *R. syn.* 423. *Pluk. ph.* t. 34. f. 7.

Anglis, sea Carex.

Habitat in arenosis maritimis. 4. VI.

leporina. 8. CAREX spica composita, spiculis ovatis sessilibus approximatis androgynis nudis. *Sp. pl.* 1381. *Fl. dan.* 371?

Carex spicis nudis subrotundis distinctis, in summo caule congestis. *Hall. hist.* 1361.

Carex angustifolia, caule triquetro, spicis pluribus elegantibus parum inter se distantibus. *Seg. ver.* I, 124. t. 1. f. 2.

Gramen cyperoides spica e pluribus spicis brevibus mollibus composita. *R. syn.* 422. *Sib. agr.* 456. t. 10. f. 15.

Gramen cyperoides palustre majus, spica divisa. *B. pin.* 6. *Hist. Ox.* III. 244. f. 8. t. 12. f. 29.

Anglis, naked Carex.

Habitat in palustribus et aquosis. 4. VI.

Obs. Spica e spiculis a tribus ad sex f. septem composita ; foliolo f. bractea, ad spiculam inferiorem spica aequante, caduco.

vulpina. 9. CAREX spica supradecomposita inferne laxiore, spiculis ovatis androgynis glomeratis, superne masculis. *Sp. pl.* 1382. *Fl. dan.* 304.

Carex spicis subrotundis echinatis, supremis confluentibus, capsulis rostratis bifidis. *Hall. hist.* 1364.

Carex palustris major, radice fibrosa, caule exquisite, triangulari,

MONOECIA TRIANDRIA.

405

triangulari, spica brevi, habitiori compacta. *Mich. gen. 69.*

Gramen cyperoides palustre majus. *Park. 1266.* spica compacta. *B. pin. 6.* *R. syn. 423.* *Hist. Ox. III. 244.* f. 8. t. 12. f. 24.

Gramen palustre cyperoides. *Ger. em. 18.*

Anglis, great Carex.

Habitat in palustribus et ad ripas fluviorum. 4. V. VII.

10. CAREX spiculis subrotundis androgynis contiguis, spicata.
capsulis ovatis acutis. *Fl. angl. 349.*

Carex palustris media, radice fibrofa, caule exquisite triangulari, spica brevi compactiori. *Mich. gen. 69.* t. 33. f. 14.

Gramen cyperoides parvum. *Ger. em. 21.*

Gramen cyperoides spicis minoribus minusque compactis. *B. pin. 6. pr. 13. hist. II. 497.*

Gramen cyperoides spicatum minus. *R. syn. 424.*

Anglis, spiked Carex.

Habitat in aquosis et ad margines fossarum. 4. VI.

Obs. variat spica nuda et bracteata.

11. CAREX spica composita, spiculis rotundis remo- *divisa.*
tiisculis androgynis, foliolo longiori instructis, cap-
sulis acutis, culmo teretiusculo. *Fl. angl. 348.* *Fl.*
dan. 371.

Gramen cyperoides palustre spica divulsa. *B. pin. 6.*

Gramen cyperoides ex monte Ballon spica divulsa.
B. hist. II. 498. *R. syn. 423.*

Gramen cyperoides palustre minus. *Park. 1287?*

Anglis, marsh Carex.

Habitat in palustribus maritimis; in the meadows near
the Hithe at Colchester in Essex; by Hithe in Kent.
R. syn. 4. VI. VII.

12. CAREX spiculis subrotundis remotis sessilibus obtu- *canescens.*
sis androgynis, capsulis ovatis obtusifusculis. *Sp. pl.*
1385. *Fl. dan. 285.*

Carex spicis ovatis alternis, supremis se contingenti-
bus. *Hall. hist. 1360.*

MONOECIA TRIANDRIA.

Carex nemorosa, fibrosa radice, caule exquisite triangulari, spica longa divulsa seu interrupta, capitulis solitariis præterquam ultimo. *Mich. gen.* 69. *t.* 23. *f.* 10.

Gramen cyperoides spicatum minus, spica longa divulsa seu interrupta. *R. syn.* 424.

Gramen cyperoides spicis curtis divulsis. *Læs. pr.* 117. *t.* 32.

Anglis, grey Carex.

Habitat in nemorosis humidis. 4. V. VI.

muricata. 13. **CAREX** spiculis subovatis sessilibus remotis androgynis, capsulis acutis divergentibus spinosis. *Sp. pl.* 1382. *Fl. dan.* 284.

Carex spicis ternis echinatis, glumis lanceolatis, capsulae mucrone simplici. *Hall. hist.* 1366.

Carex nemorosa, fibrosa radice, angustifolia minima, caule exquisite triangulari, spica brevi interrupta. *Mich. gen.* 69. *t.* 33. *f.* 12.

Gramen cyperoides spicatum minimum, spica divulsa aculeata. *R. syn.* 424. *Sch. agr.* 485. *t.* 11. *f.* 3.

Gramen cyperoides echinatum minimum. *Park.* 1272.

Gramen nemorosum spicis parvis asperis. *B. pin.* 7. *th.* 100. *Hist. Ox.* III. 344. *f.* 8. *t.* 12. *f.* 26.

Anglis, prickly Carex.

Habitat in aggeribus fossarum et palustribus. 4. VII.

brizoides. 14. **CAREX** spica composita disticha nuda, spiculis androgynis oblongis contiguis, culmo nudo. *Sp. pl.* 1381.

Carex spicis distichis teretibus repandis. *Hall. hist.* 1358.

Carex fibrata radice, angustifolia, caule exquisite triangulari, capitulis pulchellis albicantibus, paululum inter se distantibus. *Mich. gen.* 70. *t.* 33. *f.* 18.

Gramen cyperoides palustre elegans, spica composita asperiore. *R. syn.* 423. *Hist. Ox.* III. 245.

Anglis, rough Carex.

Habitat in palustribus et aquosis, sed rarius. 4. VI.

15. CAREX spicis ovatis subsessilibus remotis androgynis bracteis culmum æquantibus. *Sp. pl.* 1383.
Fl. dan. 370.

Carex spicis androgynis, imis in ala prælongi folii sessilibus, supremis nudis. *Hall. hist.* 1357.

Carex angustifolia, caule triquetro, capitulis pulchellis strigosioribus compactis, inter se distantibus, et in foliorum alis sessilibus. *Mich. gen.* 70. t. 33. f. 16. et t. 33. f. 15.

Gramen cyperoides angustifolium, spicis parvis sessilibus in foliorum alis. *R. syn.* 424. *Hist. Ox.* III. 243. f. 8. t. 12. f. 17. *Pluk. ph. t.* 34. f. 3.

Anglis, remote Carex.

Habitat in sylvis humidis et aggeribus fossarum. VII.

*** *Spicis sexu distinctis : femineis sessilibus.*

16. CAREX spicis confertis subsessilibus subrotundis, *flava*. mascula linearis, capsulis acutis recurvis. *Sp. pl.* 1384.

Carex spicis femininis petiolatis erectis ovatis echinatis. *Hall. hist.* 1380.

Cyperoides palustre aculeatum, capitulo breviore. *Tour.* 529. *Sch. agr.* 426. *Mich. gen.* 58.

Gramen cyperoides aculeatum germanicum vel minus. *B. pin.* 7. *Hist. Ox.* III. 243. t. 12. f. 19.

Gramen palustre echinatum. *Lob. ic.* 14. *Ger. em.* 17. *B. hist.* II. 497. *R. syn.* 421.

Gramen aculeatum germanicum. *Park.* 1187.

8 *Gramen cyperoides echinatum majus.* *Pet. conc. gr.* 169.

Anglis, yellow Carex.

Habitat in palustribus. 4. VI.

17. CAREX spicis femineis sessilibus subsolitariis ovatis *montana*. masculæ approximatis, culmo nudo, capsulis pubescentibus. *Sp. pl.* 1385.

Carex angustifolius, spicis sessilibus teretibus approximatis, capsulis hirsutis. *Hall. hist.* 1373.

Cyperoides angustifolium montanum, folliculis seminum villosis. *Sch. agr.* 423.

Cyperoides montanum vernum, foliis angustis, superna

MONOECIA TRIANDRIA.

perna parte pilosis, caule tenuissimo rotundo-triquetro, spicis parvis atris, squamis obtusioribus, medio nervo tanquam in aristam prolongato, capsulis oblongis crassioribus subhirsutis trilateris turbinatis. *Müh. gen. 64. N. 68. et 69. t. 32. f. 3.*

Gramen spicatum angustifolium montanum. B. pin. 4. th. 47.

Anglis, mountain Carex.

Habitat in pratis et ericetis alpinis; prope Sedberg in comitatu Eboracensi. 4. VI.

Desc. Radix repens; Culmus spithameus, erectus, triquetter, basi foliatus, superne nudus. Folia radicalia plurima, caulina duo vel tria, linearia, margine scabra, nuda, glauca. Spica mascula terminalis, oblonga, atrofusca. Spicæ femineæ duæ vel tres approximatæ, sessiles, ovatae; squamæ atro-purpuræ, obtusifuscæ, nudæ. Capsulæ imbricatae ovatae, triquetrae, obtusifuscæ, pallidæ, herbaceæ, villosæ. Bractea ad infimam spicam femineam longitudine spicæ. Habitus Caricis piluliferæ.

pilulifera. 18. CAREX spicis terminalibus confertis subrotundis: mascula oblonga. Sp. pl. 1385.

Gramen cyperoides tenuifolium spicis ad summum caulem sessilibus globulorum æmulis. R. syn. 422. Pluk. ph. t. 91. f. 8.

Gramen cyperoides spicis brevibus congestis, folia molli. R. syn. 421.

Anglis, round-headed Carex.

Habitat in pascuis et ericetis humidis passim. 4. VI.

saxatilis. 19. CAREX spicis tribus ovatis sessilibus alternis, mascula oblonga. Sp. pl. 1385. Fl. dan. 159.

Carex spicis maribus ovatis, femininis gracilibus erectis, capsulis triquetro-conicis. Hall. hist. 1406.

Gramen cyperoides vernum minimum. R. syn. 421.

Gramen cyperoides spicatum. Ger. em. 22.

Gramen caryophyllatæ foliis, spica divulsa. B. pin. 3. th. 46.

Gramen spicatum foliis caryophylleis. Park. 1160.

Anglis, vernal Carex.

Habitat

Habitat in pratis et ericetis montosis. 4. IV. V.

**** Spicis sexu distinctis: femineis pedunculatis.

20. CAREX spicis androgynis terminalibus pedunculatis: florentibus erectis, fructiferis pendulis. Sp. pl. 1386. Fl. dan. 158.

Carex spicis ovatis petiolatis congestis, senescentibus pendulis. Hall. hist. 1369.

Gramen alpinum pulchrum, foliis caryophyllæis, spicis atris et tumentibus. Sch. agr. 481. t. II. f. 1. 2.

Anglis, black Carex.

Habitat in montibus Cambrobritannicis; circa Llanberis copiose; ex Scotia recepi. 4. VI. VII.

21. CAREX spicis linearibus erectis: mascula breviore digitata, inferioreque, bracteis aphyllis, capsulis distantibus. Sp. pl. 1384.

Carex spicis femininis petiolatis raris masculam superantibus. Hall. hist. 1376.

Cyperoides montanum nemorosum, caule triquetro-compresso, spicis ferrugineis tenuioribus inter se distantibus, capsulis rarius dispositis oblongis turbinatis trilateris. Mich. gen. 65. t. 32. f. 9.

Gramen caryophyllum montanum, spica varia. B. pin. 4. pr. 23. th. 48. Sch. agr. 448.

Gramen caryophyllum polycarpon fructu triangulo. Læs. pruss. 112. t. 17.

Anglis, digitated carex.

Habitat in sylvis et nemorosis; prope Bath. D. Sole. 4. V. VI.

22. CAREX spicis ovatis pendulis: mascula longiore limosa. erectiore, radice repente. Sp. pl. 1386.

Carex spicis femininis pendulis, capsulis ovatis compressis. Hall. hist. 1392.

Cyperoides spica pendula breviore, squamis e spadiceo vel fusco rutilante viridibus. Sch. agr. 443. t. 10. f. 13.

Anglis, brown Carex.

Habitat in paludibus turfosis in comitatibus Eboracensi, Lancastrensi, Westmorlandico, &c. passim. 4. VI.

panicea. 23. CAREX spicis pedunculatis erectis remotis, femineis linearibus, capsulis obtusifusculis inflatis. *Sp. pl.* 1387. *Fl. dan.* 267.

Carex spica mare una pluribusve, femininis petiolatis, erectis, capsulis raris maximis ovato-triquetris bidentatis. *Hall. hist.* 1405.

Gramen cyperoides foliis caryophylleis, spicis e rariobus et tumidioribus granis compositis. *R. syn.* 418. *Pluk. ph.* t. 91. f. 7.

Cyperoides foliis caryophylleis (caule rotundo-triquestro) spicis e rarioribus et tumidioribus vesicis compositis. *Mich. gen.* 61. t. 32. f. 11.

Anglis, pink Carex.

Habitat in pratis et pascuis humidis. 24. VI.

pallens. 24. CAREX spicis pendulis: mascula erecta, femineis ovatis imbricatis, capsulis confertis obtusis. *Sp. pl.* 1386.

Carex spicis femininis pendulis, capsulis ovato-conicis. *Hall. hist.* 1393.

Gramen cyperoides polystachyon flavicans, spicis brevibus prope summitatem caulis. *R. syn.* 419. *Hist. Ox.* III. 243. f. 8. t. 12. f. 16. *Pluk. ph.* t. 37. f. 5. *Mich. gen.* 61. t. 32. f. 13.

Anglis, pale Carex.

Habitat in pratis et pascuis humidis. 24. VI.

Pseudo-cyperus. 25. CAREX spicis confertis pedunculatis pendulis, mascula erecta, femineis cylindricis, capsulis aristatis furcatis.

Carex spicis pendulis, pedunculis geminatis. *Sp. pl.* 1387.

Carex spicis femininis pendulis asperis, capsulis longe rostratis retroversis. *Hall. hist.* 1397.

Gramen cyperoides spica pendula breviore. *B. pin.* 6. th. 86. *Hist. Ox.* III. 242. f. 8. t. 12. f. 5. *R. syn.* 419.

Pseudo-cyperus. *Dod. pent.* 339. *Ger. em.* 29.

Cyperus s. *Pseudo-cyperus* spica pendula breviore. *Perk.* 1266.

Anglis,

Anglis, bastard Carex or Cyperus.

Habitat in nemorosis humidis et ad ripas fossarum. 4.

VI.

26. CAREX spicis subsessilibus pendulis, mascula erecta, pendula, femineis cylindricis longissimis, capsulis subrotundis acuminatis.

Carex spicis femininis pendulis longissimis, capsulis mucronatis ovatis. *Hall. hist.* 1396.

Gramen cyperoides spica pendula longiore. *Park.* 1267. *R. syn.* 420. *Hist. Ox.* III. 242. f. 8. t. 12. f. 4.

Gramen spica pendula longiore et angustiore. *B. pin.* 6. pr. 13. th. 85. *Hist. II.* 497.

Anglis, pendulous Carex.

Habitat in sylvis et sepibus humidis inter Hampstead et Highgate, et inter Marylebon et Kilbourn copiose. 4. V. VI.

27. CAREX spicis pedunculatis pendulis, mascula erecta, *strigosa*, femineis filiformibus laxis, capsulis subrotundis, acuminatis.

Gramen cyperoides polystachyon majuscum, spicis multis, longis et strigosis. *R. syn.* 419.

Anglis, loose Carex.

Habitat in sylvis et sepibus. Found in a lane at Black Notley in Essex. Mr. Dale. *R. syn. prope Oxford.* D. Sheffield. 4. V. VI.

Obs. Spica filiformia Capsulæ imbricatae subrotundæ; Squamæ amenti oblongi sculæ, obtusæ.

28. CAREX spicis pedunculatis pendulis, mascula erecta, *sylvatica*, femineis filiformibus laxis pedunculo brevioribus, capsulis ovatis aristatis furcatis. *Fl. dan.* 404.

Carex spicis femininis pendulis rarissimis prælongis, capsulis rostratis bifidis. *Hall. hist.* 1395.

Gramen cyperoides sylvarum tenuius spicatum. *Park.* 1171. *Hist. Ox.* III. 243. f. 8. t. 12. f. 9. *R. syn.* 419.

Anglis, wood Carex.

Habitat in sylvis. 4. V. VI.

Obs.

MONOECIA TRIANDRIA.

Obs. *Squamæ amenti ovatæ, acuminatæ.*

- distantiæ.* 29. CAREX spicis remotissimis subsessilibus, bractea vaginante, capsulis angulatis mucronatis. *Sp. pl.* 1387.
Carex spicis brevissime petiolatis diffitis. *Hall. hist.* 1482.
Gramen cyperoides palustre, spicis tribus subrotundis vix aculeatis, spatio distantibus. *Hist. Ox.* III. 243.
f. 8. t. 12. f. 18.
Gramen cyperoides spicis parvis longissime distantibus. *R. syn.* 420.
Anglis, loose Carex.
Habitat in palustribus. 4. VI.
- inflata.* 30. CAREX spicis remotis subpedunculatis erectiusculis, mascula erecta lanceolata, capsulis ovatis acuminatis calycis duplo longioribus.
Cyperoides sylvarum angustifolium, caule trilatero, spicis parvis, capsulis rarius dispositis obesis, in angustum collum vix ab una parte, ab altera vero magis bifidum coarctatis. *Mich. gen.* 56. t. 33. f. 5?
Anglis, bottle Carex.
Habitat in palustribus, in Wallia. D. Davies. *In comitatibus Eboracensi et Westmorlandico passim.* 4. VI. VII.
Obs. Affinis Carici distantii. Spica mascula frequentissime solitaria, rarissime duæ.
- cespitosa.* 31. CAREX spicis erectis cylindricis ternis subsessilibus: mascula terminali, culmo triquetro. *Sp. pl.* 1388.
Carex spicis masculis duabus, femininis sessilibus, capsulis ovatis brevissime mucronatis. *Hall. hist.* 1400.
Gramen cyperoides foliis caryophylleis, spicis erectis sessilibus, e seminibus confertis compositis. *R. syn.* 418.
Gramen caryophylleum angustissimis foliis, spicis sessilibus brevioribus erectis non compactis. *Hist. Ox.* III. 243.
Anglis, turfy Carex.
Habitat in pratis, pascuis et nemorosis humidis. 4. V. VI.
- Obs.

Obs. variat frequentissime spicis masculis duabus.

32. CAREX spicis confertis pedunculatis cylindricis sub- *recurva*.
pendulis, mascula terminali, capsulis imbricatis ob-
tusculis.

*Carex spicis maribus una pluribusve, femininis pendulis,
capsulis ovato-triquetris confertis.* Hall. hist. 1408.

Gramen cyperoides foliis caryophylleis, spicis oblon-
gis e pediculis longioribus pendulis. R. syn. 418.

Gramen cyperoides nemorosum, spica subnigra recur-
va. Hist. Ox. III. 243. s. 8. t. 12. f. 14.

Anglis, heath Carex.

Habitat in pratis, pascuis et ericetis. 4. V. VI.

*Obs. Culmus erectus, triquierter, superne nudus; Calyx
obtusiusculus, atro-fuscus. Capsula obtusa pallide her-*
bacea, variat spicis masculis duabus.

***** *Spicis sexu distinctis: masculis pluribus.*

33. CAREX spicis masculis pluribus, femineis subpedun- *acuta*.
culatis erectis, capsulis ovato-lanceolatis aristato-
acuminatis furcatis.

*Carex spicis masculis pluribus, femineis subsessilibus,
capsulis obtusiusculis.* Sp. pl. 1388.

Carex spicis masculis ternis, femininis numerosis erec-
tis, brevissime petiolatis, capsulis bicornibus. Hall.
hist. 1404.

Gramen cyperoides. Ger. em. 12. latifolium spica
rufa s. caule triangulo. B. pin. 6.

Gramen cyperoides cum paniculis nigris. B. hist. II.
494. R. syn. 417.

Gramen cyperoides majus latifolium. Park. 1265.

g *Gramen cyperoides majus angustifolium.* Park. 1265.
Ger. em. 29.

y *Gramen cyperoides minus angustifolium.* Park. 1266.

Anglis, acute Carex.

Habitat in aquosis et ad rivulos. 4. V.

34. CAREX spicis masculis pluribus, femineis subpe- *vesicularia*.
dunculatis, capsulis globosis inflatis acuminatis.

*Carex spicis masculis pluribus, femineis pedunculatis,
capsulis inflatis acuminatis.* Sp. pl. 1388. Fl. dan.
647.

Carex

MONOECIA TETRANDRIA.

Carex spicis maribus una pluribusve, femininis erectis teretibus, capsulis ampullatis rostratis. *Hall. hist.* 1401.

Gramen cyperoides majus præcox, spicis turgidis teretibus flavescentibus. *Hist. Ox. III.* 242. f. 8. t. 12. f. 6. *R. syn.* 420.

Gramen cyperoides polystachyon majus, spicis teretibus erectis. *R. syn.* 419.

Anglis, bladder Carex.

Habitat in palustribus et aquosis. 4. V.

Obs. variat spicis sessilibus et pedunculatis.

birta.

35. CAREX spicis remotis, masculis pluribus, femineis subpedunculatis erectis, capsulis hirtis. *Sp. pl.* 1388. *Fl. dan.* 319.

Carex caule foliis capsulisque hirsutis. *Hall. hist.* 1403.

Gramen cyperoides polystachyon lanuginosum. *R. syn.* 418. *Hist. Ox. III.* 243. f. 8. t. 12. f. 10.

Gramen cyperoides norvegicum parium lanosum. *Park.* 1172.

Anglis, hairy Carex.

Habitat in pratis et pasuis humidis. 4. VI.

T E T R A N D R I A.

N A S M Y T H I A.

CAL. *Perianthium commune hemisphæricum :* foliolis orbiculatis, subæqualibus, appressis; persistens, continens *Florem hemisphæricum, aggregatum, ex flosculis numerosissimis.*

Masculi Flosculi in medio disci.

CAL. *Perianthium proprium diphylum ; foliolis cuneiformibus, concavis.*

COR. Monopetala, infundibuliformis, bipartita, obtusa.

STAM. *Filamenta quatuor, corollulæ inserta, breviora.* *Antheræ subrotundæ.*

Feminei Flosculi in ambitu copiosissimi.

CAL. *Perianthium proprium diphylum : foliolis cuneiformibus, concavis.*

COR.

COR. dipetala, erecta, oblonga, concava.

PIST. Germen superum didymum; Stylus setaceus bipartitus. Stigmata simplicia.

PER. Capsula dicocca.

SEM. solitaria, subrotunda.

REC. nudum.

I. NASMYTHIA.

articula-

Eriocaulon culmo decangulari, foliis ensiformibus. ta.

Sp. pl. 129. Phil. trans. vol. LIX. 241.

Eriocaulon noveboracense, capitulo albo globoso s.

Globularia americana statices haud absimilis, caulinis lano atro-nitente refertis. Pluk. amalb. t. 409. f. 5?

Randalia americana procerior. Pet. gaz. t. 6. f. 2?

Anglis, jointed Nasmythia.

Habitat in lacubus in insula Skye. D. Walker. 4.
VII.

L I T T O R E L L A. Mant. II. 160.

Masc. Cal. tetraphyllus. Cor. monopetala, quadrifida.
Stam. longissima.

Fem. Cal. nullus. Cor. monopetala, obsolete trifida. Stylus filiformis longissimus. Sem. Nux unilocularis.

I. LITTORELLA. Mant. II. 295. Fl. dan. 170. lacustris.

Plantago scapo unifloro. Sp. pl. 167. Hall. hist. 655.

Plantago palustris gramineo folio, monanthos parisiensis. Tourn. 128. R. syn. 316.

Plantago floribus femineis sessilibus ad exortum scapi uniflori maris. Juss. act. paris. 1742. 131. t. 7.

Gramen junceum s. Holosteum minimum palustre capitulis quatuor longissimis staminibus donatis. Hist. Ox. III. 230. t. 9. f. 30. Pluk. ph. t. 25. f. 2.

Anglis, small Littorella.

Habitat in palustribus arenosis passim; in ericeto Hounslowiano prope Witton. 4. VII. VIII.

MONOECIA TETRANDRIA.

B E T U L A. 1052.

Masc. *Cal.* monophyllus, trifidus, triflorus. *Cor.* quadripartita.

Fem. *Cal.* monophyllus, subtrifidus, biflorus. *Sem.* utrinque membrana alata.

- alba.* 1. BETULA foliis ovatis acuminatis serratis. *Sp. pl.* 1393.
Betula foliis cordato-lanceolatis serratis. *Hall. hist.* 1628.
Betula. *B. pin.* 427. *hist. I.* 148. *Ger. em.* 1478. *R.* syn. 443.
Anglis, common Birch-tree. *Hunt. ev. sylv.* 225.
Habitat in sylvis et sepibus humidis. *H.* VII.
- nana.* 2. BETULA foliis orbiculatis crenatis. *Fl. lapp.* 266.
t. 6. f. 4. *Sp. pl.* 1394. *Hall. hist.* 1629. *Fl. dan.* 91.
Betula pumila, foliis subrotundis. *Amm. ruth.* 180.
com. petrop. IX. 319. *t. 14.*
Anglis, dwarf Birch-tree.
Habitat in montosis et ericetis humidis. Found by Sir J. Nasmyth in Twedale. *H.*
- alnus.* 3. BETULA pedunculis ramosis. *Sp. pl.* 1394.
Alnus foliis glabris rotundis, rotunde crenatis, spongiosis ad nervum angulis. *Hall. hist.* 1630.
Alnus. *Cam. ep.* 60. *Ger. em.* 1477. *R.* syn. 442.
vulgaris. *Park.* 1408.
Alnus rotundifolia glutinosa vulgaris. *B. pin.* 428.
Alnus vulgaris, sub conis ligulis membranaceis rubris.
R. syn. 442.
Anglis, common Alder-tree. *Hunt. ev. sylv.* 240.
Habitat in aquosis. *H.* VII.

B U X U S. 1053.

Masc. *Cal.* triphyllus. *Petala duo, Germinis rudimentum.*

Fem.

MONOECIA TETRANDRIA.

417

Fem. *Cal.* tetraphyllus. *Petala* tria. *Styli* tres. *Caps.* triostis, trilocularis. *Sem.* duo.

1. BUXUS. *Cam.* ep. 601. *Ger.* em. 1410. *R. syn.* *sempervirens*.
445. *Hall. hist.* 1610. *Sp. pl.* 1394. *arborescens.* *reens.*
B. pin. 471.

Buxus arbor vulgaris. *Park.* 1428.

2 Buxus angustifolia. *R. syn.* 445.

Anglis, Box-tree.

Habitat in sylvis et sepibus. *H.* IV.

Pharmac. *Buxi Folia, Lignum.*

URTICA. 1054.

Masc. *Cal.* tetraphyllus. *Cor.* nulla. *Nectarium* centrale cyathiforme.

Fem. *Cal.* bivalvis. *Cor.* o. *Sem.* unicum, nitidum.

1. URTICA foliis oppositis ovatis serratis, amentis fructiferis globosis. *Sp. pl.* 1395. *pilulifera.*

Urtica urens pilulas ferens. *B. pin.* 232.

Urtica romana. *Ger. em.* 706. *Park.* 440.

Urticæ pilulifera folio profundius urticæ majoris in modum serrato; semine magno lini. *R. syn.* 140.

Anglis, roman Nettle.

Habitat in ruderatis; plentifully at Yarmouth in Norfolk; Aldborough in Suffolk. *R. syn.* o. VIII.

Pharmac. *Urticæ romanæ Semina.*

2. URTICA foliis oppositis ovalibus. *Sp. pl.* 1396. *urens.*

Urtica sexibus sede disjunctis, foliis ovato-lanceolatis serratis, spicis oblongis. *Hall. hist.* 1615.

Urtica urens minor. *B. pin.* 232.

Urtica minor. *Ger. em.* 707. *R. syn.* 140.

Anglis, lesser Nettle.

Habitat in ruderatis, cultis. o. VII—IX.

3. URTICA foliis oppositis cordatis, racemis geminis. *divisa.*
Sp. pl. 1396.

Urtica stirpibus sexu distinctis, foliis ovato-lanceolatis productis serratis. *Hall. hist.* 1614.

F f

Urtica;

MONOECIA PENTANDRIA.

Urtica. *Cæsalp.* 156. *urens.* *Ger. em.* 706. *maxima.*
B. pin. 232.

Urtica racemifera major perennis. *R. syn.* 139.

Anglis, common Nettle.

Habitat in ruderatis et ad sepes. 4. VII.

Pharmac. *Urticæ Semina, Folia, Cymæ.*

PENTANDRIA.

XANTHIUM. 1056.

Masc. *Cal.* communis imbricatus. *Cor.* monopetalæ, quinquefidæ, infundibuliformes. *Receptaculum* paleaceum.

Fem. *Cal.* involucrum diphyllum, biflorum. *Cor.* o. *Drupa* siccæ muricata, bifida. *Nucleus* bilocularis.

struma-
rium. I. XANTHIUM caule inermi, foliis cordatis trinervatis. *Sp. pl.* 1400.

Xanthium foliis semitribatis, aculeis uncinatis.

Xanthium. *Cam. ep.* 926. f. *Lappa minor.* *B. hist.* III. 572. *Park.* 1222.

Lappa minor Xanthium *Dioscoridis.* *B. pin.* 198.

Bardana minor. *Ger. em.* 809.

Anglis, lesser Xanthium or Burdock.

Habitat in fimetis et pinguibus. ④. VI—IX.

Pharmac. *Strumariæ Herba.*

AMARANTHUS. 1060.

Masc. *Cal.* triphyllus. *Cor.* o. *Stam.* tria f. quinque.

Fem. *Cal.* triphyllus. *Cor.* o. *Styli* tres. *Caps.* unicolaris circumcisa. *Sem.* unicum.

Blitum. I. AMARANTHUS glomerulis lateralibus, floribus trifidis, foliis ovatis retusis, caule diffuso. *Sp. pl.* 1405.

Blitum rubrum minus. *Cam. ep.* 235. *Ger. em.* 321.
B. pin. 118. *R. syn.* 157.

Blitum album minus. *Cam. ep.* 236.

Anglis,

MONOECIA POLYANDRIA.

419

Anglis, least Amaranth or Flower-gentle.

Habitat in ruderatis. ♂. VIII.

P O L Y A N D R I A.

Masc. *Cal.* multipartitus. *Cor.* o. *Stam.* a sedecim
ad viginti.

Fem. *Cal.* multipartitus. *Cor.* o. *Pist.* unicum. *Styl-*
lus o. *Sem.* unicum, nudum.

C E R A T O P H Y L L U M. 1065.

1. CERATOPHYLLUM. *Fl. suec.* 866.

Ceratophyllum foliis dichotomo-bigeminis, fructibus ^{demer-}
trispinosis. *Sp. pl.* 1409. ^{sum.}

Ceratophyllum foliis subspinosis, capsula tricorni.
Hall. hist. 1599.

Hydroceratophyllum folio aspero, quatuor cornibus
armato. *Vaill. act. paris.* 1719. 16. t. 2. f. 1. *R.*
syn. 135.

Millefolium aquaticum equisetifolium, seu *Equisetum*
ramosum aquis immersum. *Cat. cant.*

2. *Ceratophyllum* foliis dichotomo-trigeminis, fructibus submer-
moticis. *Sp. pl.* 1409. ^{sum.}

Hydroceratophyllum folio lævi, octo cornibus armato.
Vaill. act. paris. 1719. 16. t. 2. f. 2.

Anglis, common Hornwort.

Habitat in fossis et aquis pigrioribus. ♀. VIII. IX.

M Y R I O P H Y L L U M. 1066.

Masc. *Cal.* tetraphyllus. *Cor.* o. *Stam.* octo.

Fem. *Cal.* tetraphyllus. *Cor.* o. *Pist.* quatuor. *Styl-*
lus o. *Sem.* quatuor, nuda.

1. MYRIOPHYLLUM floribus masculis interrupte ^{spicatum.}
spicatis. *Sp. pl.* 1409. *Fl. suec.* 867.

Pentapteris spica nuda. *Hall. hist.* 993.

Potamogeton foliis pennatis. *Tourn.* 233. *R.* *syn.*
150.

MONOECIA POLYANDRIA.

- Millefolium aquaticum pennatum spicatum. *B. pin.*
141. pr. 73. Park. 1257.
- β Millefolium aquaticum pennatum minus, foliolis singularibus latiusculis, flosculis subjectis donatum.
Hist. Ox. III. 622. f. 15. t. 4. f. 7.
Anglis, spicked Water-millfoil.
Habitat in fossis, lacubus et aquis quietis. 24. VII.

- verticilla- 2. MYRIOPHYLLUM floribus omnibus verticillatis.
 tum. *Sp. pl. 1410. hermaphroditis. Syst. nat. 628.*
Pentapteris floribus alaribus. Hall. hist. 992.
Myriophyllum aquaticum minus. Clus. hist. II. 252.
Ger. em. 827. Vail. act. paris. 1719. 31.
Millefolium aquaticum minus. Park. 1257.
Millefolium aquaticum flosculis ad foliorum nodos.
B. pin. 141. Læs. pr. 165.
Pentapterophyllum aquaticum flosculis ad foliorum no-
dos. Cat. giss. 112. R. syn. 316.
Anglis, verticillated Water-millfoil.
Habitat in fossis et aquis stagnantibus. 24. VI. VII.

SAGITTARIA. 1067.

- Masc. *Cal. triphyllus. Cor. tripetala. Filamenta fere*
viginti quatuor.
- Fem. *Cal. triphyllus. Cor. tripetala. Pist. multa.*
Sem. multa, nuda.

- sagittifo- 1. SAGITTARIA foliis sagittatis acutis. *Sp. pl. 1410.*
 lia. *Fl. dan. 172.*
- Sagitta foliis acuminatis. *Hall. hist. 1185.*
- β Sagitta. *Cam. ep. 814. B. hist. III. 789. R. syn.*
258. minor latifolia. Park. 1247.
- Sagitta major. *Ger. em. 416.*
- Sagitta aquatica minor latifolia. *B. pin. 194.*
- β Sagitta aquatica omnium minima. *D. Pluk. R. syn.*
258.
- Anglis, common Arrow-head.
- Habitat in fossis et ad ripas fluviorum. 24. VII.

POTERIUM.

MONOECIA POLYANDRIA.

421

P O T E R I U M. 1069.

Masc. *Cal.* tetraphyllus. *Cor.* quadripartita. *Stam.*
a triginta ad quadraginta.

Fem. *Cal.* tetraphyllus. *Cor.* quadripartita. *Pist.* duo.
Bacca e tubo corollæ indurato.

I. POTERIUM inerme, caulis subangulosis. *Sp. pl.* *Sanguisorba.*
1411. *Hort. upf.* 288. *cliff.* 446.

Pimpinella polystemon. *Hall. hist.* 706.

Sanguisorba minor. *B. hist.* III. 113. *R. syn.* 203.

Pimpinella sanguisorba minor hirsuta. *B. pin.* 160.

Pimpinella vulgaris minor. *Park.* 582.

Anglis, common Burnet.

Habitat in pratis et pascuis montosis, solo calcareo. 24.
VII.

Pharmac. Pimpinellæ Herba.

Q U E R C U S. 1070.

Masc. *Cal.* quinquefidus fere. *Cor.* o. *Stam.* a quinque ad decem.

Fem. *Cal.* monophyllus, integerrimus, scaber. *Cor.* o.
Stylus unicus. *Sem.* unicum ovatum.

I. QUERCUS foliis deciduis oblongis superne latioribus: sinubus acutioribus: angulis obtusis. *Robur.*
Sp. pl.
1414.

Quercus foliis glabris semipinnatis, pinnis obtusis, superioribus majoribus. *Hall. hist.* 1626.

Quercus vulgaris. *Ger. em.* 1339.

Quercus latifolia. *Park.* 1385. *R. syn.* 440.

Quercus cum longo pediculo. *B. pin.* 420.

β Quercus latifolia mas quæ brevi pediculo est. *B. pin.*
419.

Anglis, common Oak. *Hunt. ev. sylv.* 69.

Habitat in sylvis et sepibus. 5. IV.

Pharmac. Quercus Cortex, Folia, Glandes, Cupulæ.

MONOECIA POLYANDRIA.

F A G U S. 1072.

Masc. *Cal.* quinquesfidus, campanulatus. *Cor.* o.
Stam. duodecimi.

Fem. *Cal.* quadridentatus. *Cor.* o. *Styli* tres. *Caps.*
(Calyx antea) muricata, quadrivalvis. *Sem.* duo.

sylvatica. I. FAGUS foliis ovatis obsolete serratis. *Sp. pl.* 1416.
Fagus foliis ovato-lanceolatis, oris undulatis. *Hall.*
hist. 1622.

Fagus. *Cam. ep.* 112. *Ger. em.* 1444. *B. pin.* 419.
Park. 1403. *R. syn.* 439.
Anglis, common Beach-tree. *Hunt. ev. sylv.* 136.
Habitat in sylvis et sepibus solo calcareo. *H. h.* IV. V.

Castanea. *2. FAGUS foliis lanceolatis acuminato-serratis subtus
nudis. *Sp. pl.* 1416.

Castanea foliis ovato-lanceolatis, serratis dentibus
aduncis. *Hall. hist.* 1623.

Castanea. *Cam. ep.* 118. *B. hist.* I. 121. *Ger. em.*
1442. *R. syn.* 440. *vulgaris.* *Park.* 1400.

Castanea sylvestris. *B. pin.* 419.

Anglis, Chesnut-tree. *Hunt. ev. sylv.* 159.

Habitat in sylvis et sepibus; in Canticum frequens. *H. V.*
Pharmac. Castanæ Fructus.

C A R P I N U S. 1073.

Masc. *Cal.* monophyllus: squama ciliata. *Cor.* o.
Stam. viginti.

Fem. *Cal.* monophyllus: squama ciliata. *Cor.* o.
Germina duo. *Styli* singulis duo. *Nux* ovata.

Betulus. I. CARPINUS squamis strobilorum planis, *Sp. pl.* 1416.
Carpinus. *Cam. ep.* 71. *Hall. hist.* 1627.
Ostrya ulmo similis, fructu in umbilicis foliaceis. *B.*
pin. 427. *R. syn.* 451.
Ostrya five *Ostrya.* *Park.* 1406.
Betulus five *Carpinus.* *Ger. em.* 1479.

Anglis,

MONOECIA MONODELPHIA.

423

Anglis, Horn or Hard-beam-tree; Horse or Horn-beach-tree. *Hunt. ev. sylv.* 143.

Habitat in *sylvis et sepibus*. H. V.

C O R Y L U S . 1074.

Masc. *Cal.* monophyllus, trifidus, squamiformis, uniflorus. *Cor. o.* *Stam. octo.*

Fem. *Cal.* diphyllus, lacerus. *Cor. o.* *Styli duo.*
Nux ovata.

1. CORYLUS stipulis ovatis obtusis. *Sp. pl.* 1417. *Avellana.*
Corylus sylvestris. *Lob. ic.* 192. *Ger. em.* 1438. *B.*
pin. 418. *R. syn.* 439. *Hall. hist.* 1625.
Corylus f. Nux Avellana sylvestris. *Park.* 1416.
Anglis, common Hasel-nut-tree. *Hunt. ev. sylv.* 220.
Habitat in *sylvis et sepibus*. H. III. IV,
Pharmac. *Coryli f. Avellanæ Fructus.*

M O N O D E L P H I A.

P I N U S . 1077.

Masc. *Cal.* tetraphyllus. *Cor. o.* *Stam. plurimi.*
Antheræ nudæ.

Fem. *Cal.* strobili: squama biflora. *Cor. o.* *Pist.*
unicum. *Nux ala membranacea excepta.*

1. PINUS foliis geminis: primordialibus solitariis gla-*sylvestris.*
bris. *Sp. pl.* 1418. *Fl. suec.* 874.
Pinus foliis binis convexo-concavis, conis masculis
solitariis alaribus. *Hall. hist.* 1660?
Pinus sylvestris, *B. pin.* 491. *Ger. em.* 1356. foliis
brevibus glaucis, conis parvis albentibus. *R. syn.*
442.
Anglis, scotch Fir. *Hunt. ev. sylv.* 266.
Habitat in *alpibus scoticis*. H. V.

- *2. PINUS foliis solitariis emarginatis. *Sp. pl.* 1420. *Picea.*
Pinus foliis solitariis planis pectinatis emarginatis.
Hall. hist. 1658.

MONOECIA MONODELPHIA.

Abies. *Ger. em.* 1363. *Park.* 1539. *conis sursum*
spectantibus, s. mas. *B. pin.* 505.

Anglis, yew-leaved Firr.

Habitat in alpibus Scoticis. *H. V. VI.*

Pharmac. *Abietis Summitates, Resina.*

Abies.

*3. *PINUS* *foliis solitariis subulatis mucronatis lævibus*
bifariam versis. *Sp. pl.* 1421. *Fl. dan.* 193.

Pinus *foliis solitariis, tetragonis mucronatis.* *Hall. hist.*
1656.

Abies mas Theophrasti. *R. syn.* 441.

Picea. *Park.* 1538. *major.* *Ger. em.* 1354.

Picea major, sive Abies rubra. *B. pin.* 493.

Anglis, common Firr or Pitch-tree.

Habitat in alpibus Scoticis. *H. V. VI.*

Pharmac. *Abietis Resina.*

Classis XXII.

D I O E C I A

D I A N D R I A.

S A L I X. 1098.

Masc. *Amenti squamæ. Cor. o. Glandula baseos nectarifera.*

Fem. *Amenti squamæ. Cor. o. Stylus bifidus. Caps. unilocularis, bivalvis. Sem. papposa.*

* *Foliis glabris serratis.*

1. SALIX foliis serratis glabris, floribus hermaphroditis *herma-*
diandris. Fl. suec. 878. Sp. pl. 1442? *phroditica.*
Salix latifolia folio splendente. R. syn. 450.
Anglis, shining Willow.
Habitat in sibibus humidis. About Ashton in Cumber-
land. R. syn. h. III. IV.

2. SALIX foliis serratis glabris, floribus triandris. *Sp. pl. triandria.*

I442.
Salix foliis glabris, elliptico-lanceolatis, serratis, sti-
pulis dentatis, julis gracilibus triandris. Hall. hist.
1637?

Salix foliis elliptico-lanceolatis utrinque glabris ap-
pendiculatis. Gmel. sib. I. 155. t. 34. f. 3.

Salix folio Amygdalino utrinque aurito corticem ab-
jiciens. R. syn. 448?

Anglis, smooth Willow.

Habitat in sylvis sibibus et ad ripas fluviorum. h. IV.

Desc. Truncus arboreus, mediocris. Ramuli virgati,
glabri. Folia alterna, petiolata, lanceolata, ferrata,

acuta, nuda, subtus glauca, policaria et tripolicaria.

Petiolus

DIOECIA DIANDRIA.

Petiolum brevis, cannaliculatus, nudus, nunc stipulatus nunc exstipulatus. Stipulae duæ laterales, sessiles, subrotundæ dentatae. Glandulae duæ ad apicem petioli. Mas. Amentum pedunculatum, lineare, unciale, villosiusculum. Filamenta tria longissima. Antheræ subrotundæ flavæ. Fem. amentum pedunculatum, lineare, unciale, glabriusculum: pedunculis foliaceis. Variat floribus diandris et triandris in eodem Amento.

pentan- 3. **SALIX** foliis serratis glabris, flosculis pentandris.
dria. *Sp. pl. 1442. Fl. lapp. 370. t. 8. f. 3.*

Salix foliis glabris ovato-lanceolatis, petiolis glandulosis, floribus hexandris. *Hall. hist. 1639.*

Salix folio laureo, seu lato glabro odorato. *Ph. br. R. syn. 449.*

Anglis, sweet Willow.

Habitat in sylvis et sepibus; in septentrionali parte Angliae passim; in sylva Coomb-wood dicta in comitatu Surriensi. *H. IV.*

Vitellina. 4. **SALIX** foliis serratis ovatis acutis glabris: serraturis cartilagineis, petiolis calloso-punctatis. *Sp. pl. 1442.*

Salix sativa lutea, folio crenato. *B. pin. 473.*

Anglis, yellow Willow.

Habitat in salicetis passim. *H. V.*

Amygdali- 5. **SALIX** foliis serratis glabris lanceolatis petiolatis, stipulis trapeziformibus. *Sp. pl. 1443.*

Salix stipulis serratis, foliis lanceolatis serratis glabris. *Hall. hist. 1636.*

Salix folio auriculato splendente flexilis. *R. cat. cantab. syn. 448.*

Salix folio amygdalino utrinque virente aurito. *B. pin. 473.*

Anglis, almond-leaved Willow.

Habitat in salicetis et ad ripas fluviorum. *H. IV. V.*

fragilis. 6. **SALIX** foliis serratis glabris ovato-lanceolatis, petiolis dentato-glandulosis. *Sp. pl. 1443.*

Salix fragilis. *B. pin. 474. pr. 159. Park. 1431.*
Salix

Salix folio longo latoque splendente fragilis. R. syn.

448.

Anglis, crack Willow.

Habitat in sylvis, sepibus et ad ripas fluviorum. h.
IV. V.

7. SALIX foliis serratis glabris lanceolatis : inferioribus *purpurea*.

oppositis. Sp. pl. 1444. Fl. suec. 884.

Salix vulgaris nigricans folio non serrato. B. pin. 473.

Salix folio longo subluteo non auriculato viminibus
rubris. R. syn. 450.

Anglis, purple Willow.

Habitat in salicetis. h. IV. V.

8. SALIX foliis serratis glabris lanceolato-linearibus : *Helix*.

superioribus oppositis obliquis. Sp. pl. 1444.

Salix monandra, foliis glabris linear-lanceolatis ser-
ratis, superne conjugatis, julis tomentosis. Hall.
hist. 1640.

Salix humilior, foliis angustis subcæruleis ex adverso
binis. R. cat. cant. 144. Syn. 448.

Salix tenuior folio minore utrinque glabro, fragilis.
B. hist. I. 213. f. 2.

Anglis, rose Willow.

Habitat in sepibus et aquofis. h. IV. V.

9. SALIX foliis serratis glabris ovatis venosis. Fl. lapp. myrsini-

353. t. 8. f. F. et t. 7. f. 6. Sp. pl. 1445. tes.

Salix foliis ovato-lanceolatis venosis serratis, julis to-
mentosis. Hall. hist. 1645.

Salix alpina pumilla myrsinites. Pont. comp. 146.

Salix alpina pumilla repens, foliis oblongis exiguis :
superne splendentibus, inferne cinereis creberrimis
et tenuissimis crenis. Till. hort. pis. 151.

Anglis, mountain Willow.

Habitat in montibus Scoticis, in Breadalbane. D. Mil-
lar. h. V. VI.

10. SALIX foliis serratis glabris orbiculatis. Sp. pl. *herbacea*.

1445. Fl. lapp. 355. t. 8. f. H. et t. 7. f. 3. 4. Dan.
212.

Salix

DIOECIA DIANDRIA.

Salix foliis orbiculatis serratis glabris, julis paucifloris.

Hall. hist. 1649.

Salix alpina alni rotundo folio. *Bocc. mus.* II. 19.

t. 1. R. syn. 448.

Salix saxatilis minima. *B. pin.* 474. *pr.* 159.

Anglis, herbaceous Willow.

Habitat in ascensu montis Snowdon copiose. D. G. Sheppard. *R. syn. et in montibus Westmorlandicis, Eboracensibus et Scoticis.* 24. V.

** *Foliis glabris integerrimis.*

reticula- 11. **SALIX** foliis integerrimis glabris ovatis obtusis.
ta. *Sp. pl.* 1446. *Fl. suec.* 888. *dan.* 212.

Salix foliis integris ovatis subtus reticulatis. *Fl. lapp.*
359. *t. 8. f. 4. et t. 7. f. 1. 2.*

Salix foliis rotundis integerrimis, subtus tomentosis,
julis gracilibus longe petiolatis. *Hall. hist.* 1650.

Salix pumila folio rotundo. *B. hist.* I. 12. *Sch. it.*
alp. 43. 340. *R. syn.* 449.

Anglis, round-leaved Willow.

Habitat in montibus Cambrobritannicis, Eboracensi-
bus, Westmorlandicis *passim*. *H. V.*

rubra. 12. **SALIX** foliis integerrimis glabris linear-lanceolatis
acutis. *Fl. angl.* 364.

Salix minime fragilis foliis longissimis utrinque viridi-
bus, non serratis. *R. syn.* 449.

Anglis, red Willow.

Habitat in salicetis sed rarius. In the Osier-holt between
Maidenhead and Windsor; and near Salisbury. Mr.
Sherard and Mr. Rand. *R. syn.* *H. IV. V.*

*** *Foliis integerrimis villosis.*

repens. 13. **SALIX** foliis integerrimis lanceolatis; subtus villo-
sis nitidis.

Salix foliis integerrimis lanceolatis utrinque subpilosis,
caule repente. *Sp. pl.* 1447.

Salix procumbens, foliis lanceolatis subtus sericeis.
Hall. hist. 1644.

Salix pumila angustifolia inferne lanuginosa. *B. hist.*
I. 212. R. syn. 447.

Salix

Salix humilis angustifolia repens. Park. 1434.

Salix pumila brevi angustoque folio incano. B. pin.

474.

3 *Salix alpina pumila rotundifolia repens, inferne sub-*
cinerea. B. pin. 474. R. syn. 448.

Salix humilis. Ger. em. 1391.

γ *Salix foliis crassis elliptico-lanceolatis integerrimis,*
utrinque sericeis. Hall. hist. 1643.

Salix pumila foliis utrinque candidantibus et lanugi-
nosis. R. syn. 447. t. 19. f. 3.

3 *Salix foliis integerrimis ovatis: subtus villosis nitidis. fusca.*
Sp. pl. 1447. Fl. lap. 364. t. 8. f. 13.

Salix pumila angustifolia prona parte cinerea. B.
hist. 1. 213. R. syn. 447.

Salix pumila linifolia incana. B. pin. 474.

Salix pumila angustifolia recta. Park. 1434.

Chamæitea s. Salix pumila. Ger. em. 1391.

ε *Salix foliis integerrimis lanceolato-linearibus strictis rosmari-*
sefilibus subtus tomentosis. Sp. pl. 1448. nifolia.

Salix oblongo incano aucto folio. B. pr. 159.

Salix humilis repens angustifolia. Lob. ic. p. 2. 137.

Salix pumila rhamni secundi Clusii folio. R. syn. 447.

Anglis, creeping willow.

Habitat in ericetis et paludibus turfosis frequens; γ by
Sandown castle, near Deal. R. syn. h. V.

**** *Foliis subserratis villosis.*

14. SALIX foliis ellipticis subserratis rugosis, supra caprea.
villosis subtus tomentosis.

Salix foliis ovatis rugosis: subtus tomentosis, undatis
superne denticulatis. Sp. pl. 1448.

Salix foliis ovatis rugosis, subtus reticulatis tomen-
tosis, julis ovatis, stipulis amplexicaulibus serratis.
Hall. hist. 1653.

Salix folio ex rotunditate acuminato. B. pin. 474.
R. syn. 449.

Salix caprea latifolia. Ger. em. 1390.

3 *Salix caprea acuto longoque folio.* R. syn. 450.

γ *Salix foliis integerrimis, ovato-lanceolatis subtus se-*
riceis, julis ovatis. Hall. hist. 1651.

Salix latifolia rotunda. B. pin. 474. Park. 1432.
R. syn. 449.

Salix

DIOECIA TRIANDRIA.

- aurita.* Salix caprea rotundifolia. *Ger. em.* 1390.
 ♂ Salix foliis integerrimis utrinque villosis obovatis appendiculatis. *Sp. pl.* 1446. *Fl. lap.* 369. t. 8. f. y.
 - Salix foliis rugosis reticulatis integerrimis, inferne tomentosis, julis ovatis. *Hall. hist.* 1652.
 Salix caprea pumila folio subrotundo, subtus incano. *R. syn.* 450.
 ♀ Salix folio rotundo minore. *R. syn.* 450.
Anglis, common Willow or Sallow.
Habitat in sylvis et sepibus humidis; ♂, ♀ in ericetis montosis siccioribus. *H.* IV. V.
- simina-*
lis. 15. SALIX foliis subintegerrimis lanceolato-linearibus longissimis acutis subtus sericeis, ramis virgatis. *Sp. pl.* 1448.
 Salix foliis prælongis obscure dentatis, subtus tomentosis et albicantibus. *Hall. hist.* 1641.
 Salix folio longissimo. *R. cat. cant.*
 Salix angustis et longissimis foliis crispis subtus albicanibus. *B. hist.* I. 212.
Anglis, osier Willow.
Habitat in sylvis, sepibus et salicetis. *H.* IV. V.
- alba.* 16. SALIX foliis lanceolatis acuminatis ferratis utrinque pubescentibus: ferraturis infimis glandulofis. *Sp. pl.* 1449.
 Salix arborea foliis ellipticis lanceolatis, subtus sericeis, dentibus crassescientibus. *Hall. hist.* 1635.
 Salix. *Ger. em.* 1389. *R. syn.* 447. arborea angustifolia alba vulgaris. 1430.
 Salix vulgaris alba arborescens. *B. pin.* 473.
Anglis, white Willow.
Habitat in sylvis et sepibus. *H.* IV.
Pharmac. *Salicis Folia, Cortex.*

T R I A N D R I A.

E M P E T R U M. 1100.

Mas. *Cal.* tripartitus. *Cor.* tripetala. *Stam.* longa.

Fem.

Fem. *Cal.* tripartitus. *Cor.* tripétala. *Styli* novem.
Sem. 9-sperma.

- I. EMPETRUM procumbens. *Sp. pl.* 1450. *nigrum*
 Empetrum procumbens, foliis ovato-lanceolatis obtu-
 sis. *Hall. hist.* 1605.
 Empetrum montanum, fructu nigro. *Tourn.* 579.
R. syn. 444.
 Erica baccifera. *Cam. ep.* 77. procumbens. *Ger. em.*
 1383. *nigra*. *B. pin.* 486.
 Erica baccifera nigra. *Park.* 1485.
Anglis, black Crow, Crake or Heath-berry.
 Habitat in ericetis montosis in boreali parte Angliæ fre-
 quens. *H.* IV. V.

T E T R A N D R I A.

V I S C U M. 1105.

- Maf. *Cal.* quadripartitus. *Cor.* o. *Filamenta* o. *An-*
theræ calyci adnatæ.
- Fem. *Cal.* tetraphyllus, superus. *Stylus* o. *Cor.* o.
Bacca monosperma.
- I. VIScum foliis lanceolatis obtusis, caule dichotomo, *album*,
 spicis axillaribus. *Sp. pl.* 1451. *Hall. hist.* 1609.
 Viscum. *Cam. ep.* 555. *Ger. em.* 1350. *R. syn.* 464.
vulgare. *Park.* 1392. *baccis albis*. *B. pin.* 423.
Anglis, white Mistletoe.
 Habitat in arboribus; frutex parasiticus. *H.* V.
Pharmac. Visci Folia.

H I P P O P H A E. 1106.

- Maf. *Cal.* bipartitus. *Cor.* o.
- Fem. *Cal.* bifidus. *Cor.* o. *Stylus* unicus. *Bacca*
 monosperma.
- I. HIPPOPHAE foliis lanceolatis. *Sp. pl.* 1452. *Fl. Rhamnoid-*
dan. 265. *des.*
 Hippophae foliis linearibus, subtus rubiginosis. *Hall.*
hist. 1603.

Rhamnoides

DIOECIA PENTANDRIA.

Rhamnoides fructifera, foliis salicis, baccis leviter flavescens. *Tourn. Cor.* 55. *R. syn.* 445.

Rhamnus 2. *Clus. hist.* 110. *Ger. em.* 1334.

Rhamnus salicis folio angusto, fructu flavescente. *B. pin.* 477.

Rhamnus primus *Dioscoridis Lobelio*, sive littoralis. *Park.* 1006.

Anglis, common Sallow-thorn or Sea Buck-thorn.

Habitat in littoribus maritimis arenosis. On the sea-banks on Lindsey-coast, Lincolnshire. About Sandwich, Deal and Folkston in Kent; between Whitby and Lyth, Yorkshire. *R. syn.* in insula Sheepey. *H. IV.* V.

MYRICA. 1107.

Mas. *Amenti squama lunata.* *Cor. o.*

Fem. *Amenti squama lunata.* *Cor. o.* *Styli duo.* *Bacca monosperma.*

Gale. I. *MYRICA* foliis lanceolatis subserratis, caule suffruticoso. *Sp. pl.* 1453. *Fl. dan.* 327.

Gale frutex odoratus septentrionalium, *Elæagnus Cordi.* *B. hist. I.* 223. *R. syn.* 443.

Rhus myrtifolia belgica. *B. pin.* 414.

Rhus sylvestris f. *Myrtus Brabantica vel Anglicæ.* *Park.* 1451.

Myrtus brabantica f. *Elæagnus Cordi.* *Ger. em.* 1414.

Anglis, sweet Gale, Willow or Dutch Myrtle.

Habitat in paludibus, in Cornubia, Devonia, frequens. *H. V.*

PENTANDRIA.

HUMULUS. 1116.

Mas. *Cal. pentaphyllus.* *Cor. o.*

Fem. *Cal. monophyllus, oblique patens, integer.* *Cor. o.* *Styli duo.* *Sem. unicum intra calycem foliatum.*

I. HUMULUS.

- I. HUMULUS. *Sp. pl.* 1457. *Fl. suec.* 908. *Lupulus.*
Lupulus. *Hall. hist.* 1618. mas et femina. *B. hist.*
II. 151. *pin.* 298. *R. syn.* 137.
Lupulus salictarius. *Fuchs. hist.* 124. *Ger. em.* 885.
Lupulus sylvestris. *Park.* 176.
Anglis, Hops.
Habitat in sepibus. 24. VI.
Pharmac. Lupuli strobili.

HEXANDRIA.

TAMUS. 1119.

- Mas. *Cal.* sexpartitus. *Cor.* o.
Fem. *Cal.* sexpartitus. *Cor.* o. *Stylus trifidus.* *Bacca*
trilocularis, infera. *Sem.* duo.
I. TAMUS foliis cordatis indivisis. *Sp. pl.* 1458. *Hall. communis,*
hist. 1620.
Tamus racemosa, flore minore luteo pallescente.
Tourn. 103. *R. syn.* 262.
Bryonia nigra. *Ger. em.* 871.
Bryonia sylvestris nigra. *Park.* 178.
Bryonia lœvis f. nigra racemosa. *B. pin.* 297.
Anglis, common Tamus or black Bryony.
Habitat in dumetis et ad sepes. 24. VI.
Pharmac. Bryoniæ nigræ Folia, Radix.

OCTANDRIA.

POPULUS. 1123.

- Mas. Amenti *Cal.* lamina lacera. *Cor.* turbinata, ob-
liqua, integra.
Fem. Amenti *Cal.* *Cor.* maris. *Stigma quadrifidum.*
Caps. bilocularis. *Sem.* multa, papposa.
I. POPULUS foliis subrotundis dentato-angulatis sub- *alba*
tus tomentosis. *Sp. pl.* 1463. *Hall. hist.* 1634.
G. g. *Populus*

DIOECIA OCTANDRIA.

Populus alba. Cam. ep. 61. Ger. em. 1486. Park. 1410. R. syn. 446. majoribus foliis. B. pin. 429. *Anglis*, white Poplar. Hunt. Ev. sylv. 208. Habitat in sepibus et sylvis. Ḥ. III.

tremula. 2. *POPULUS* foliis subrotundis, dentato-angulatis untrinque glabris. Sp. pl. 1464.
Populus foliis glabris orbiculatis acuminatis laxe serratis. Hall. hist. 1633.
Populus lybica. Plin. lib. XVI. c. 23. Cam. ep. 67. Ger. em. 1487. Park. 1411. R. syn. 446.
Populus tremula. B. pin. 429.
Anglis, trembling Poplar or Aſp.
 Habitat in sylvis humidis. Ḥ. III.

nigra. 3. *POPULUS* foliis deltoidibus acuminatis serratis. Sp. pl. 1464.
Populus foliis glabris cordato-rhomboideis serratis. Hall. hist. 1632.
Populus nigra. Plin. Lib. XVI. c. 23. Cam. ep. 66. Ger. em. 1486. B. pin. 429. Park. 1410. R. syn. 446.
Anglis, black Poplar.
 Habitat in umbroſis humidis et ad fluvios. Ḥ. III.
 Pharmac. Populi nigri Folia, Germinæ.

R H O D I O L A. 1124.

Maf. Cal. quadripartitus. Cor. quadripetala.
 Fem. Cal. quadripartitus. Cor. o. Nectaria quatuor.
 Pist. quatuor. Caps. quatuor, polysperma.

Rosea. 1. *RHODIOLA.* Sp. pl. 1464. Fl. lapp. 378. dan. 181.
Sedum sexu distinctum, foliis serratis, floribus densissime umbellatis. Hall. hist. 953.
Anacampferos radice rosam spirante major. Tourn. 264. R. syn. 260.
Rhodia radix. B. pin. 286. hist. III. 683. Ger. em. 532. Park. 729.
Anglis, Rosewort.

Habitat

Habitat in montibus Westmorlandicis, Cumberlandicis,
Eboracensibus et Cambrobritannicis frequens. 24.
VI. VII.

ENNEANDRIA.

MERCURIALIS. 1125.

Mas. *Cal.* tripartitus. *Cor.* o. *Stam.* a novem ad duodecim. *Antheræ* globosæ, didymæ.

Fem. *Cal.* tripartitus. *Cor.* o. *Styli* duo. *Caps.* dicocca, bilocularis, monosperma.

1. MERCURIALIS caule simplicissimo, foliis scabris. *perennis.*
Sp. pl. 1465. *Fl. dan.* 400.

Mercurialis caule perenni simplici, foliis ovato-lanceolatis hirsutis. *Hall. hist.* 1601.

Mercurialis perennis repens, Cynocrambe dicta. *R.*
syn. 138.

Mercurialis montana spicata et mercurialis montana testiculata. *B. pin.* 122.

Mercurialis sylvestris Cynocrambe dicta vulgaris mas et femina. *Park.* 295.

Cynocrambe mas et femina. *Cam.* 998. *Ger. em.* 333.
Anglis, dog's Mercury.

Habitat in sylvis et ad sepes. 24. IV. V.

2. MERCURIALIS caule brachiato, foliis glabris, flo- annua.
ribus spicatis. *Sp. pl.* 1465.

Mercurialis caule annuo brachiato, foliis conjugatis ovato-lanceolatis glabris. *Hall. hist.* 1600.

Mercurialis annua glabra vulgaris. *R. syn.* 139.

Mercurialis spicata f. femina. *B. pin.* 121.

Mercurialis testiculata f. mas. *B. pin.* 121.

Mercurialis mas et femina. *Ger. em.* 332.

Mercurialis vulgaris mas et femina. *Park.* 295.

Anglis, annual or french Mercury.

Habitat in ruderatis, cultis, circa Londinum frequens.

○: VIII. IX.

DIOECIA MONADELPHIA.

HYDROCHARIS. 1126.

Mas. *Spatha* diphylla. *Cal.* trifidus. *Cor.* tripetala.
Filamenta tria interiora stylifera.

Fem. *Cal.* trifidus. *Cor.* tripetala. *Styli* sex. *Caps.*
sex locularis, polysperma, infera.

Morsus ranæ. I. HYDROCHARIS. *Sp. pl.* 1466. *Hall. hist.* 1068.
Nymphæa alba minima. *B. pin.* 193. f. *Morsus ranæ.*
Park. 1252.

Morsus ranæ. *Ger. em.* 818.
Stratiotes foliis asari, semine rotundo. *R. syn.* 290.
Anglis, Frog-bit.

Habitat in fossis et aquis leniter fluentibus. 24. VI.

MONADELPHIA.

JUNIPERUS. 1134.

Mas. *Amenti* *Calyx* squamæ. *Cor.* o. *Stamina* tria.

Fem. *Cal.* tripartitus. *Petala* tria. *Styli* tres. *Bæcca*
trisperma, tribus tuberculis calycis inæqualibus.

communis. I. JUNIPERUS foliis ternis patentibus mucronatis bac-
ca longioribus. *Sp. pl.* 1470.

Juniperus foliis convexo-concavis aristatis, baccis ala-
ribus. *Hall. hist.* 1662.

Juniperus. *Cam. ep.* 55. *Ger. em.* 1372. *vulgaris.*
Park. 1028. baccis parvis purpureis. *B. hist.* I.
293. *R. syn.* 440.

Juniperus vulgaris fruticosa. *B. pin.* 488.

§ *Juniperus alpina.* *B. hist.* I. 301.

Anglis, common Juniper.

Habitat in ericetis et montosis. 5. V.

Pharmac. *Juniperi Baccæ, Lignum, Resina.*

TAXUS. 1135.

Mas. *Cal.* triphyllus gemmæ. *Cor.* o. *Stamina* multa.
Antheræ peltatae octofidae.

Fem.

Fem. *Cal.* triphyllus gemmæ. *Cor.* o. *Stylus* o. *Sem.* unicum, caliculo baccato, integerissimo.

I. TAXUS foliis approximatis. *Sp. pl.* 1472. *baccata.*

Taxus. *Cam. ep.* 840. *Ger. em.* 1370. *B. pin.* 505. *hist.* I. 241. *Park.* 1412. *R. syn.* 445. *baccifera.* *Hall. hist.* 1663.

Anglis, common Yew-tree. *Hunt. Ev. sylv.* 383.
Habitat in montibus Westmorlandicis, Cumberlandicis, Herefordiensibus, &c. frequens. *h.* III. IV.

S Y N G E N E S I A.

R U S C U S. 1139.

Maf. *Cal.* hexaphyllus. *Cor.* o. *Nectarium centrale,* ovatum, apice perforatum.

Fem. *Calyx*, *Cor.* et *Nectar*: maris. *Stylus unicus.*
Bacca trilocularis. *Sem.* duo.

I. RUSCUS foliis supra floriferis nudis. *Sp. pl.* 1472. *aculeatus.*

Ruscus foliis ovato-lanceolatis pungentibus, petiolis brevissimis vaginosis. *Hall. hist.* 1238.

Ruscus. *B. pin.* 470. *Park.* 253. *R. syn.* 262. f.
Bruscus. *Ger. em.* 907.

Anglis, common Butcher's-broom or Knee Holly.
Habitat in dumetis et ericetis. *h.* III. IV.
Pharmac. *Rusci Radix.*

B R Y O N I A. 1093.

Maf. *Cal.* quinquedentatus. *Cor.* quinquepartita.
Filamenta tria.

Fem. *Cal.* quinquedentatus. *Cor.* quinquepartita.
Stylus trifidus. *Bacca* subglobosa, polysperma.

I. BRYONIA foliis palmatis utrinque calloso-scabris. *alba.*

Sp. pl. 1438. *Jac. aust.* II. 59. t. 199. *Hall. hist.*
574.

DIOECIA SYNGENESIA.

Bryonia alba. *Dod. purg.* 230. *Ger. em.* 869. *R.*
syn. 261. *vulgaris.* *Park.* 178.
Bryonia aspera s. alba, baccis rubris. *B. pin.* 297.
Anglis, white Bryony.
Habitat in sepibus et dumetis. 24. VI.
Pharmac. *Bryoniæ albæ Radix.*

Classis

Classis XXIII.

POLYGAMIA
MONOECIA.

CALLITRICHE. 13.

Masculus flos.

CAL. nullus.

COR. *Petala* duo, opposita, oblonga, concava, conniventia.STAM. *Filamentum* unicum, longissimum rectum.
Anthera subrotunda, simplex.

PIST. PER. SEM. nulla.

Femineus flos in eadem planta.

CAL. COR. ut in mare.

PIST. *Germen* superum compressum. *Styli* duo, filiformes longissimi.PER. *Capsula* obcordata, compressa, bilocularis quadrivalvis.

SEM. solitaria, oblonga.

Hermafroaitus flos in eadem planta.

CAL. COR. STAM. ut in mare.

PIST. PER. SEM. ut in femineo.

1. CALLITRICHE foliis emarginatis *aquatica*
 Callitrichæ foliis superioribus ovalibus: floribus andro- verna
 gynis. Sp. pl. 6. Fl. dan. 129.

Stellaria foliis imis linearibus, superioribus subrotundis. Hall. hist. 554.

Stellaria. Dill. giss. 119. t. 6. R. syn. 289. aquatica. Lob. ic. 792. Park. 1282. B. pin. 141.
Ger. em. 830.

2 Callitrichæ Plinii. Col. ecph. 315.

G g 4

Stellaria

POLYGAMIA MONOECIA.

- autum-
nalis. *y* Stellaria foliis petiolatis subrotundis. *Hall. hist.* 553.
 Stellaria minor et repens. *R. syn.* 289.
Callitricha foliis omnibus linearibus apice bifidis, flo-
 ribus hermaphroditis. *Sp. pl.* 6.
 Stellaria foliis omnibus linearibus. *Hall. hist.* 555.
 Stellaria aquatica longifolia. *R. syn.* 290.
Lenticula aquatica angustifolia, folio in apice dissecto.
Læs. pr. 140. *t.* 38.
Anglis, common Starwort.
Habitat in fossis et aquis quietis, β in aquis fluentibus.
 ○. III—X.

H O L C U S. 1146.

- lanatus.* Hermaphroditus. *Calyx.* Gluma biflora. *Cor.* Gluma
 aristata. *Stam.* tria. *Styli* duo. *Sem.* unicum.
Masc. *Cal.* Gluma bivalvis. *Cor.* o. *Stam.* tria.
 1. HOLCUS glumis bifloris villosis: hermaphrodito
 mutico, masculo arista recurva. *Sp. pl.* 1485.
Schr. gr. 145. *t.* 20. *f.* 1.
 Avena diantha, floribus ovatis, perfecto mutico, im-
 perfecto aristato. *Hall. hist.* 1484.
 Gramen pratense paniculatum molle. *B. pin.* 2. *pr.*
 3. *tb.* 37. *Park.* 1155. *Sch. agr.* 234.
 Gramen miliaceum paniculatum molle. *Pet. conc. gr.*
 124. *R. syn.* 404.
Anglis, meadow Soft-grass.
Habitat in pratis et pascuis. 24. VI. VII.
 2. HOLCUS glumis bifloris nudiusculis: flosculo her-
 maphrodito mutico, masculo arista geniculata. *Sp.*
pl. 1485. *Schr. gram.* 149. *t.* 20. *f.* 2.
 Gramen caninum longius radicatum. *B. pin.* 1.
 Gramen paniculatum molle, radice graminis canini
 repente. *Hist. Ox.* III. 202.
 Gramen miliaceum aristatum molle. *Pet. conc. gr.* 125.
R. syn. 401.
 Gramen caninum paniculatum molle. *R. hist.* 1285.
Sch. agr. 235. *t.* 4. *f.* 25.

Anglis

Anglis, creeping Soft-grass.
Habitat in arvis et ad sepes. 4. VII. VIII.

ÆGILOPS. 1150.

Hermaphrod. *Cal.* Gluma solitaria, bipartita. *Cor.* Gluma calyci contraria. *Stam.* tria. *Styli* duo. *Sem.* unicum.

Masc. *Cal.* et *Cor.* Gluma ut in priore. *Stam.* tria.

i. ÆGILOPS spica subulata mutica lævi incurva, ca- incurva. lycibus unifloris. *Sp. pl.* 1490.

Gramen parvum marinum, spica loliacea. *Ger. em.* 78. *R. syn.* 395.

Gramen loliaceum maritimum, spicis gracilibus articulatis recurvis. *Hist. Ox.* III. 128.

Gramen loliaceum, spicis articulosis erectis. *Sch. agr.*

43.

Gramen loliaceum minus spica simplici. *B. pin.* 9. pr. 19.

Phœnix acerosa aculeata. *Park.* 1145.

Anglis, sea Hard-grass.

Habitat in pascuis maritimis. ②. VI—VIII.

VALANTIA. 1151.

Hermaphrod. *Cal.* o. *Cor.* quadripartita. *Stam.* quatuor. *Stylus* bifidus. *Sem.* unicum.

Masc. *Cal.* o. *Cor.* quadripartita. *Stam.* quatuor. *Pist.* obsoletum.

i. VALANTIA floribus masculis quadrifidis, pedunculis diphyllis. *Sp. pl.* 1491. *Cruciata.*

Galium foliis quaternis hirsutis, petiolis octifloris. *Hall. hist.* 709.

Cruciata. *Dod. tempt.* 257. *Ger. em.* 1123. *R. syn.* 223. *vulgaris*. *Park.* 566.

Cruciata hirsuta. *B. pin.* 335.

Anglis, common Crosswort.

Habitat in dumetis et ad sepes. 4. VI. VII.

Pharmac. Cruciatae Herba.

POLYGAMIA MONOECIA.

PARIETARIA. 1152.

Hermaphrod. *Cal.* quadrifidus. *Cor.* o. *Stam.* quatuor. *Stylus* unicus. *Sem.* unicum, superum, elongatum.

Fem. *Cal.* quadrifidus. *Cor.* o. *Stam.* o. *Stylus* unicus. *Sem.* unicum, superum, elongatum.

officinalis. 1. PARIETARIA foliis lanceolato-ovatis, pedunculis dichotomis, calycibus diphyllis. *Syst. nat.* 672. *Sp. pl.* 1492.

Parietaria foliis hirsutis, elliptico-lanceolatis. *Hall. hist.* 1612.

Parietaria. *Ger. em.* 331. *B. hist.* II. 976. *R. syn.* 158. *vulgaris.* *Park.* 437.

Parietaria officinarum et Dioscoridis. *B. pin.* 121. *Anglis,* common Pellitory of the Wall.

Habitat in ruderatis et muris. 4. V—IX.

Pharmac. Parietariæ Herba.

ATRIPLEX. 1153.

Hermaphrod. *Cal.* pentaphyllus. *Cor.* o. *Stam.* quinque. *Stylus* bipartitus. *Sem.* unicum, depresso-fusum.

Fem. *Cal.* diphyllus. *Cor.* o. *Stylus* bipartitus. *Sem.* unicum, compressum.

portula- 1. ATRIPLEX caule fruticoso, foliis obovatis. *Sp. pl.* *coides.* 1493.

Atriplex maritima fruticosa, Halimus et Portulaca marina dicta, angustifolia. *R. syn.* 153.

Halimus seu portulaca marina. *B. pin.* 120.

Halimus vulgaris s. portulaca marina. *Ger. em.* 523.

Portulaca marina nostras. *Park.* 724.

Anglis, shrubby Orache or sea Purslane.

Habitat in littoribus maritimis, solo lutoso. 5. VII. VIII.

laciniata. 2. ATRIPLEX caule herbaceo, foliis deltoidibus sinuato-dentatis undulatis subtus argenteis.

Atriplex

- Atriplex caule herbaceo, foliis deltoidibus dentatis
subtus argenteis. *Sp. pl.* 1494.
- Atriplex maritima. *B. hist. II.* 979. *R. syn.* 152. la-
ciniata. *B. pin.* 120.
- Atriplex marina. *Ger. em.* 324. repens. *Park.* 758.
- β Atriplex caule herbaceo, foliis deltoidibus sinuato-tartarica.
dentatis undulatis alternis. *Sp. pl.* 1493.
- Atriplex maritima nostras procerior, foliis angulosis
incanis, admodum sinuatis. *Pluk. alm.* 60.
- Anglis*, sea Orache.
- Habitat in littoribus maritimis. \odot . VII. VIII.
- Obs. α , Caulis bipedalis, erectiusculus, ramosus; ramis
patulis; β , Caulis tri et quinquepedalis, erectus, ra-
mosus; ramis erectis. Folia in α et β , deltoidea, fa-
rinosa, argentea; Calyx fructus, magnus, deltoideus,
compressus, basi utrinque bidentatus. α , Sata in horto
in β mutatur.
3. ATRIPLEX caule herbaceo, calycis valvulis femineis hastata.
magnis deltoidibus sinuatis. *Sp. pl.* 1494.
- Atriplex foliis triangularibus, basi producta, valvulis
triangularibus subasperis. *Hall. hist.* 1617.
- Atriplex sylvestris, folio hastato s. deltoide. *R. syn.*
151.
- Atriplex sylvestris annua, folio deltoide triangulari si-
nuato et mucronato, hastæ cuspidi simili. *Hist. Ox.*
II. 607. *f. 5. t.* 32. *f.* 14.
- β Atriplex maritima perennis, folio deltoide seu trian-
gulari minus incano. *Hist. Ox. II.* 607.
- γ Atriplex maritima ad foliorum basin auriculata pro-
cumbens et ne vix sinuata. *Pluk. alm.* 61.
- Anglis*, wild Orache.
- Habitat in ruderatis, fimetiis et littoribus maritimis. \odot .
VIII. IX.
- Obs. variat caule erecto et decumbente, foliis subdeltoidibus
sinuato-dentatis, dentatis et integris.
4. ATRIPLEX caule herbaceo patulo, foliis subdeltoidi- patula.
deo-lanceolatis, calycibus seminum disco-dentatis.
Sp. pl. 1494.
- Atriplex caule herbaceo, foliis superioribus lanceola-
tis integerrimis. *Hort. cliff.* 469. *Roy. lugdb.* 218.
Atriplex

POLYGAMIA MONOECIA.

Atriplex foliis imis hamatis, reliquis lingulatis, valvulis seminalibus dentatis. *Hall. hist.* 1616.

Atriplex sylvestris angustifolia. *Ger. em.* 326. *Park.* 748. *R. syn.* 151.

Atriplex angusto oblongo folio. *B. pin.* 119.

β *Atriplex caule herbaceo, foliis hastatis dentatis.* *Fl. angl.* 376.

Atriplex angustifolia laciniata. *R. syn.* 152.

Anglis, spreading Orache.

Habitat in ruderatis et ad sepes. ☽. VIII.

serrata. 5. *ATRIPLEX* caule herbaceo erectiusculo, foliis linearibus serratis. *Fl. angl.* 377.

Atriplex angustifolia maritima dentata. *R. syn.* 152.

Atriplex maritima angustifolia. *B. pin.* 152.

Anglis, serrated Orache. *Pet. h. br. t. 7. f. 4.*

Habitat in ruderatis et littoribus maritimis. ☽. VIII.

littoralis. 6. *ATRIPLEX* caule herbaceo erecto, foliis omnibus linearibus integerrimis. *Sp. pl.* 1494.

Atriplex angustissimo et longissimo folio. *Herm. lugd.* 79. *Tourn.* 505. *R. syn.* 153.

β *Atriplex maritima scopariæ folio.* *R. syn.* 153.

γ *Atriplex maritima angustifolia, obtusiore folio.* *R. syn.* 153.

Anglis, grass Orache. *Pet. h. br. t. 7. f. 6.*

Habitat in ruderatis et littoribus maritimis. ☽. VIII.

pedunculata. 7. *ATRIPLEX* caule herbaceo divaricato, foliis lanceolatis obtusis integris, calycibus femineis pedunculatis. *Sp. pl.* 1675.

Atriplex marina semine lato. *Ph. br.* *R. syn.* 153.

Atriplex maritima Halimus dicta, humilis erecta, semine folliculis membranaceis bivalvibus in latitudinem expansis et utrinque recurvis, longo pediculo insidentibus, clauso. *Pluk. ph. t. 36. f. 1.*

β *Atriplex maritima nostras Ocyti minoris folio.* *D. Pluk.* *R. syn.* 253.

Anglis, pedunculated Orache.

Habitat in littoribus maritimis; prope Schubbeck vicum milliare a Bostoniam distantem, copiose provenit. *D. Pluknet.*

Pluknet. *Found in the Isle of Thanet, near the ferry-house, in great plenty.* Mr. Sherard. R. syn. *prope* Yarmouth. ♂. VII—IX.

A C E R. 1155.

Hermaphrod. *Cal. quinquefidus. Cor. pentapetala. Stam. octo. Pist. unicum. Caps. duæ s. tres, monospermæ, ala terminatæ.*

Masc. *Cal. quinquefidus. Cor. pentapetala. Stam. octo.*

1. ACER foliis quinquelobis inæqualiter serratis, floribus racemosis. *Sp. pl. 1495. Pseudoplatanus.*

Acer foliis quinquelobis, acute serratis, racemis pendulis. *Hall. hist. 1029. ******

Acer montanum candidum. B. pin. 430.

Acer majus. Dod. pem. 840. Ger. em. 1484. R. syn. 470. latifolium, Sycomorus falso dictum. Park. 1425.

Anglis, greater Mapple or Sycamore. Hunt. Evel. syl. 200.

Habitat in sepibus et ad domos. H. V. VI.

2. ACER foliis lobatis obtusis emarginatis. *Sp. pl. 1497. campestre.*

Acer foliis semitrilobis, obtusis, lobis lateralibus emarginatis. *Hall. hist. 1029*****.*

Acer minus. Dod. pem. 840. Ger. em. 1484. R. syn. 470. et vulgare. Park. 1426.

Acer campestre et minus. B. pin. 431.

Acer campestre et minus, fructu rubente. Vail. paris. R. syn. 470.

Anglis, common Mapple. Hunt. Evel. syl. 190.

Habitat in sepibus et dumetis. H. VI.

D I O E C I A.

F R A X I N U S. 1160.

Hermaphrod. *Cal. quadripartitus. Cor. o. Stam. duo. Pist. unicum. Sem. unicum, lanceolatum.*

Fem.

Fem. *Pist.* unicum. Sem. unicum, lanceolatum.

- excelsior.* 1. **FRAXINUS** foliis ferratis, floribus apetalis. *Sp. pl.* 1509. *Fl. suec.* 926.
Fraxinus apetala, foliis pinnatis ferratis. *Hall. hist.* 528.
Fraxinus. *Dod. pempt.* 771. *Cam. ep.* 64. *Ger. em.* 1472. *R. syn.* 469. *excelsior.* *B. pin.* 416.
Anglis, common Ash-tree. *Hunt. Ev. sylv.* 150.
Habitat in sylvis et sepibus. *H.* III. IV.
Obs. variat foliis pinnatis et simplicibus.

I L E X.

Hermaphrod. *Cal.* quinquedentatus. *Cor.* quinquepartita, rotata. *Stam.* quinque, rotata. *Stylus* nullus. *Stigma* quatuor. *Bacca* tetrasperma.

Masc. *Cal.* quadridentatus. *Cor.* quadripartita. *Stam.* quatuor.

- aquifoli-
um.* 1. **ILEX** foliis ovatis acutis spinosis. *Sp. pl.* 181.
Ilex aculeata baccifera. *B. pin.* 425.
Aquifolium. *Cam. ep.* 84. *Hall. hist.* 667.
Agrifolium. *Ger. em.* 1338. f. *Aquifolium.* *Park.* 1486. *R. syn.* 466.
Anglis, common Holly. *Hunt. Ev. sylv.* 383.
Habitat in sylvis, sepibus et ericetis, *H.* V.

Classis XXIV.

CRYPTOGAMIA

FILICES.

EQUISETUM. 1169.

Spica fructificationibus peltatis, basi dehiscentibus multivalvi.

1. EQUISETUM caule spicato, frondibus compositis. *sylvaticum.*
Sp. pl. 1516.

Equisetum foliis repetito ramosis, vaginis levissimis.
Hall. hist. 1680.

Equisetum sylvaticum. *Tab. ic. 253.* *Ger. em. 1114.*
R. syn. 130. tenuissimis setis. *B. Pin. 16.*

Equisetum omnium minus tenuifolius. *Park. 1201.*

2. Equisetum sylvaticum, procumbens, setis uno versu dispositis. *R. syn. 131.*

3. Equisetum palustre tenuissimis et longissimis setis.
B. pin. 16. pr. 24.

Anglis, wood Horse-tail.

Habitat in sylvis et umbrosis humidis. 24. IV. V.

2. EQUISETUM scapo fructificante nudo: sterili *arvense.*
frondofo. *Sp. pl. 1516.*

Equisetum caule floriero nudo, sterili verticillato,
radiorum duodecim. *Hall. hist. 1676.*

Equisetum arvense longioribus setis. *B. pin. 16. Park.*
1202. *R. syn. 130.*

Equisetum segetale. *Ger. em. 1114.*

2. Equisetum pratense longissimis setis. *B. pin. 16.*

3. Equisetum nudum minus variegatum basiliense. *B.*
pin. 16. pr. 25. R. syn. 130.

Anglis,

CRYPTOGAMIA FILICES.

Anglis, corn Horse-tail.
Habitat in arvis humidis. 4. III. IV.

- palustre.* 3. EQUISETUM caule angulato, frondibus simplicibus. Sp. pl. 1516. Fl. suec. 928.
Equisetum caule sulcato, ramis multifloris, foliis indivisis. Hall. hist. 1677.
Equisetum palustre brevioribus setis. B. pin. 16.
Equisetum palustre. Lob. ic. 795. Ger. em. 1114.
R. syn. 131. minus. Park. 1200.
Equisetum palustre minus polystachion. B. pin. 16.
pr. 24. R. syn. 131. t. 5. f. 3.
Anglis, marsh Horse-tail.
Habitat in palustribus et aquosis. 4. VI. VII.

- fluvia-*
tile. 4. EQUISETUM caule striato, frondibus subsimplicibus. Sp. pl. 1517.
Equisetum caule florigeru nudo, sterili verticillato, radicum quadraginta. Hall. hist. 1675.
Equisetum. Cam. epit. 770. majus. Ger. em. 1113.
R. syn. 130. palustre. Park. 1290.
Equisetum palustre longioribus setis. B. pin. 15.
Anglis, river Horse-tail.
Habitat in palustribus et aquosis et ad ripas fluviorum et lacuum.

- limosum.* 5. EQUISETUM caule subnudo lævi. Sp. pl. 1517.
Equisetum nudum lævius nostras. R. syn. 131. t. 5.
f. 6.
Anglis, smooth Horse-tail.
Habitat in aquosis. 4. VI. VII.

- hyemale.* 6. EQUISETUM caule nudo scabro basi subramoso.
Sp. pl. 1517.
Equisetum caule subnudo asperrimo, vaginis caulinis indivisis, ramis foliatis. Hall. hist. 1679.
Equisetum nudum. Ger. em. 1113. R. syn. 131.
Equisetum junceum ramosum. Park. 1207.
Equisetum foliis nudum ramosum. B. pin. 16.
β Equisetum foliis nudum non ramosum s. junceum.
B. pin. 16.

Equisetum

✓ Equisetum læve pœne nudum. *Pet. com. gr.* 238.
Anglis, rough Horse-tail or Shave-grass.
Habitat in palustribus et aquosis sed rarius. 24. VIII.

OPHIOGLOSSUM. 1171.

Spica articulata, distichia: articulis transversim dehiscentibus.

1. OPHIOGLOSSUM fronde ovato. *Sp. pl.* 1518. *vulgatum*.
Fl. dan. 147.

Ophioglossum folio unico ovato-lanceolato obtuso.
Hall. hist. 1685.

Ophioglossum. *cam. ep.* 364. *Ger. em.* 404. *B. hist.*
III. 708. *R. syn.* 128. f. *Lingua serpentina*. *Park.*
506.

Ophioglossum primum f. *vulgatum*. *B. pin.* 354.
Anglis, common Adder's Tongue.

Habitat in pratis et pascuis humidis. 24. V. VI.
Pharmac. *Ophioglossi Herba*.

OSMUNDA. 1172.

Spica ramosa: *Fruetificationibus globosis*.

* *Scapis insidentibus cauli ad basin frondis*.

1. OSMUNDA scapo caulino solitario, fronde pinnata *Lunaria*.
solitaria. *Sp. pl.* 1519. *Fl. dan.* 18.

Osmunda foliis pinnatis flabelliformibus lunatis. *Hall.*
hist. 1686.

Lunaria minor. *Ger. em.* 405. *Park.* 507. *R. syn.*
128.

Lunaria racemosa minor. *B. pin.* 354.

2. *Lunaria minor* foliis dissectis. *R. syn.* 129.
Anglis, Moon-wort.

Habitat in pratis et pascuis montosis. In comitatibus Eboracensi et Westmorlandico passim. 24. V.

** *Fronde ipsa fructificationes ferente*.

2. OSMUNDA frondibus bipinnatis apice racemifere regalis.
ris. *Sp. pl.* 1521.

Osmunda regalis f. *Filix florida*. *Park.* 1038.

Filix ramosa non dentata florida. *B. pin.* 357.

H h

Filix

CRYPTOGAMIA FILICES.

Filix florida f. *Osmunda regalis*. *Ger. em.* 1131.
Anglis, common Osmund-royal, or flowering fern.
Habitat in aquosis et palustribus putridis. 24. VIII.

*** *Frondibus aliis foliaceis, aliis fructificantibus.*

- Spicant.* 3. *OSMUNDA* frondibus lanceolatis pinnatifidis : lacinias confluentibus integerrimis parallelis. *Sp. pl.* 1522. *Fl. suec.* 936. *dan.* 217.
Struthiopteris. *Hall. hist.* 1687.
Lonchitis aspera. *Ger. em.* 1140. *R. syn.* 118. *minor Cam. ep.* 665. *B. pin.* 359. *Park.* 1042.
Anglis, spleenwort Osmund-royal.
Habitat in nemorosis et ericetis humidis. 24. VIII.

- crispa.* 4. *OSMUNDA* frondibus supradecompositis : pinnis alternis subrotundis incisis. *Sp. pl.* 1522. *Fl. dan.* 496.
Filix foliis triplicato-pinnatis, sterilibus obtusis dentatis, floralibus ovatis integerrimis. *Hall. hist.* 1689.
Adiantum album crispum alpinum. *Schwenkf.* Cat. 10. *R. syn.* 126.
Adiantum album floridum f. *Filicula petræa crispa per-elegans*. *R. syn. ed.* II. 51. *Pluk. ph. t.* 9. f. 3.
Anglis, curl'd Osmund-royal, or stone-fern.
Habitat in petris et rupibus. *In comitatibus Eboracensi, Westmorlandico et Wallia frequens*. 24. VIII.

ACROSTICHUM. 1173.

Fructificationes discum totum frondis tegentes.

* *Fronde simplici divisa.*

- septentrionalis.* 1. *ACROSTICHUM* frondibus nudis linearibus laci-natis. *Sp. pl.* 1524. *Fl. dan.* 60.
Acrostichum caule bis bifurcato. *Hall. hist.* 1714.
Filix saxatilis Tragi. *Lob. ic.* 47. *B. hist.* III. 755.
Park. 1045. *R. syn.* 120.
Filix saxatilis corniculata. *B. pin.* 358.
Anglis, forked or horned Acrostichum.
Habitat in fissuris rupium. *Ad cacumen montis Carnedd-Llewelyn prope Lhan-Lhechyd in agro Arvonien-si invenit,*

invenit, D. Lhwyd. *in muris antiquis Lhan-Dethylæ uno circiter milliari a Lhan-Rhoost aquilonem versus*, D. Richardson. R. syn. *in monte Ingleborough*, D. Tofield, *in montibus supra Ambleside in agro Westmorlandico*. 24. VII.

** *Fronde subbipinnata*.

2. ACROSTICHUM ? frondibus subbipinnatis; pinnis *ilvense*.
opposito-coadunatis obtusis subtus hirsutis: basi in-
tegerrimis. Sp. pl. 1528.
Filix alpina pedicularis rubræ foliis subtus villosis. D.
Lhwyd. R. syn. 118.
*Filix pumila lonchitidis maranthæ species cambrobri-
tannica*. Pluk. ph. t. 89. f. 8.
*Filicula alpina tenerior, alis latiusculis brevioribus in-
tegris profunde dentatis*. Hist. Ox. III. 576. t. 3.
f. 23.
Anglis, hairy Arostichum.
Habitat *in fissuris rupium*; It grows on a moist black
rock, almost at the top of Clogwyn y Garnedh, facing
North-west, directly above the lower lake. D. Rich-
ardson, R. syn. *in eodem loco inveni*. 24. VII—IX.

PTERIS. 1174.

Fruetificationes in lineis marginalibus.

1. PTERIS frondibus supradecompositis: foliolis pin- *aquilina*.
natis: pinnis lanceolatis: infimis pinnatifidis, su-
perioribus minoribus. Sp. pl. 1533.
*Filix foliis triplicato-pinnatis, pinnis nervosis integer-
rimis, ultimis lanceolatis*. Hall. hist. 1688.
Filix semina. Fuchs. hist. 596. Cam. ep. 992. Ger. em.
1128. R. syn. 124. *vulgaris*. Park. 1037.
Filix ramosa major, pinnulis obtusis non dentatis. B.
pin. 357.
2 *Filicula saxatilis ramosa maritima nostras*. R. syn.
125. Pluk. ph. t. 182. f. 1.
Anglis, female Brakes, or Fern.
Habitat *in sylvis et ericetis* 24. VIII.

CRYPTOGAMIA FILICES.

ASPLENIUM. 1178.

Fruetificationes in lineolis disci frondis sparsis.

* *Fronde simplici.*

- Scolopendrum.* 1. ASPLENIUM frondibus simplicibus cordato-lingu-
driu- latis integerrimis, stipitibus hirsutis. *Sp. pl.* 1537.
Asplenium petiolis hirsutis, folio longe linearis-lanceo-
lato integerrimo postice cordato. *Hall. hist.* 1695.
Phyllitis. *Cam. ep.* 579. *Ger. em.* 1138. *R. syn.* 116.
f. Lingua cervina vulgaris. *Park.* 1046.
Lingua cervina officinarum. *B. pin.* 353.
Anglis, Hart's tongue Spleen-wort.
Habitat in umbris saxos. 24. VIII.
Pharmac. Phyllitidis Folia.

** *Fronde pinnatifida.*

- Ceterach.* 2. ASPLENIUM frondibus pinnatifidis: lobis alternis
confluentibus. *Sp. pl.* 1538.
Asplenium foliis pinnatis, pinnis in basi dilatatis obtu-
sis, subtus muscosis. *Hall. hist.* 1694.
Asplenium. *Cam. ep.* 640. f. Ceterach. *B. hist.* III.
749. *Ger. em.* 1139. *Park.* 1046. *R. syn.* 118.
Ceterach officinarum. *B. pin.* 354.
Anglis, common Spleenwort.
Habitat in muris antiquis et fissuris rupium humidis:
Circa Bristolium copiose. 24. V—X.
Pharmac. Ceterach f. Asplenii Herba.

*** *Fronde pinnata.*

- Trichomanes.* 3. ASPLENIUM frondibus pinnatis: pinnis subrotun-
dis crenatis. *Sp. pl.* 1540. *Hall. hist.* 1693.
Trichomanes. *Fuchs. hist.* 796. *Cam. ep.* 925. *Park.*
1051. *R. syn.* 119. f. *Polytrichum officinarum.*
B. pin. 356.
Trichomanes mas. *Ger. em.* 1146.
g Trichomanes ramosum. *B. hist.* III. 755. *R. syn.*
119. majus et minus. *B. pin.* 356.
Anglis, Trichomanes Spleenwort.

Habitat

Habitat in muris antiquis, saxosis et umbrosis. 24.

V—X.

Pharmac. Trichomanis Herba.

4. ASPLENIUM frondibus pinnatis : pinnis subrotund- *viride*.
dis crenatis basi truncatis. *Fl. angl.* 385.

Trichomanes costa viridi quandoque bifida foliis len-
ticularibus crenatis. *D. Lhwyd. R. syn.* 119.

β Trichomanes foliis eleganter incisis. *Tourn.* 539. *t.*
350. *f. i. c.* *R. syn.* 120.

Trichomanes foliis mucronatis profunde incisis. *Sibb.*
pr. scot. Hist. Ox. III. *f.* 14. *t.* 3. *f.* 13.

Adiantum maritimum segmentis rotundioribus. *Pluk.*
ph. *t.* 73. *f.* 6.

Anglis, green Spleenwort.

Habitat in rupibus humidis in montibus Walliae et in
comitatibus Eboracensi et Westmorlandico. 24.
VI—IX.

5. ASPLENIUM fronde pinnata, pinnis obovatis ferra- *marinum*.
tis superne gibbis obtusis basi cuneatis. *Sp. pl.*
1540.

Filix marina anglica. *Park.* 1045.

Filicula petræa fœmina. *f.* Chamœfilix marina angli-
ca. *Ger. em.* 1143.

Chamœfilix marina anglica. *B. hist.* III. 737. *R.*
syn. 119. *Hist. Ox.* III. 575. *t.* 3. *f.* 25.

Anglis, sea Spleenwort.

Habitat in rupibus maritimis. On the rocks about Prest-
holm island, near Beaumaris; and at Llandwyn,
in the isle of Anglesea. About the Castle of Hastings
in Sussex; *R. syn.* in comitatibus Devoniensi,
Cornubiensi et Cumberlandico passim. 24. VI—IX.

**** Fronde decomposita.

6. ASPLENIUM frondibus alternatim decompositis : *Ruta mu-*
foliolis cuneiformibus crenulatis. Sp. pl. 1541. *Fl. raria.*
dan. 190.

Asplenium fronde laxa ramosa, ramis secundis trifoliis,

CRYPTOGAMIA FILICES.

liis, superioribus semitribolis rhomboideis circum-serratis. *Hall. hist.* 1691.

Ruta muraria. *B. pin.* 356. *Ger. em.* 1144. *R. syn.* 122. s. *Salvia vitæ*. *Park.* 1050.

Adiantum album. *Tab. ic.* 796.

β *Adiantum album tenuifolium*, *rutæ murariæ accedens*.

B. hist. III. 753. *R. syn.* 123. *Pluk. ph. t. 3. f. 3.*

Anglis, white Spleenwort, or Maidenhair.

Habitat in muris antiquis et rimis petrarum humidis.

24. VI—X.

Pharmac. *Adianti albi Herba*.

Adian-tum ni-grum. 7. *ASPLENIUM* frondibus subtriplicato-pinnatis del-toidibus, foliolis alternis, pinnis ovatis inciso-ferra-tis.

Asplenium frondibus tripinnatis : foliolis alternis : pinnis lanceolatis inciso-ferratis. *Sp. pl.* 386. *Fl. dan.* 250.

Asplenium foliis triangularibus, pinnis pinnatis, pin-nulis semipinnatis, lobulis ovatis ferratis. *Hall. hist.* 1692.

Adiantum nigrum officinarum. *B. hist. III.* 743. *R. syn.* 126.

Adiantum foliis longioribus pulverulentis, pediculo nigro. *B. pin.* 355.

Adiantum nigrum vulgare. *Park.* 1406.

Onopteris mas. *Ger. em.* 1137.

β *Filix minor longifolia*, tarvis rarissimis, pinnulis longis, te-nuissimis et oblongis laciniis fimbriatis. *R. syn.* 127.

γ *Filix pumila petræa nostras adianti nigri foliorum æmula*, saxorum interveniis prorumpens. *Pluk. alm* 91. *R. syn.* 127.

Anglis, black Spleenwort, or Maidenhair.

Habitat in umbrosis et muris antiquis. 24. IV—X.

Pharmac. *Adianti nigri Herba*.

lanceola-tum. 8. *ASPLENIUM* frondibus duplicato-pinnatis lance-olatis : foliolis alternis ; pinnis obovatis inciso-cre-natis.

Asplenium frondibus duplicato-pinnatis : pinnis obo-vatis

vatis crenatis : foliolis inferioribus minoribus. Sp.
pl. 1541.

Filix elegans, adianto nigro accedens segmentis rotundioribus. R. syn. 127?

Anglis, spear Spleenwort.

Habitat in muris antiquis et rupibus circa St. Ives et alibi in Cornubia copiose. 4. V—IX.

POLYPODIUM. 1179.

Fructificationes in punctis subrotundis sparsis per discum frondis.

* *Fronde pinnatifida lobis coadunatis.*

1. POLYPODIUM frondibus pinnatifidis : pinnis ob-vulgare. longis subserratis obtusis, radice squamata. Sp. pl. 1544.

Polypodium foliis pinnatis lanceolatis, radice squamata. Hall. hist. 1696.

Polypodium vulgare. B. pin. 359. Park. 1039.

Polypodium. Matth. 1292. Ger. em. 1132. R. syn. 117.

β Polypodium murale pinnulis serratis. Pet. bot. hort. II.
R. syn. 117.

γ Polypodium frondibus pinnatis, pinnis lanceolatis lacero-pinnatifidis serratis. Sp. pl. 1546. cum.

Polypodium cambrobritannicum, pinnulis ad margines laciniatis. R. syn. 117.

Polypodium cambrobritannicum, lobis foliorum profunde dentatis. Hist. Ox. III. 565. f. 14. t. 2. f. 8.

Filix amplissima, lobis foliorum laciniatis cambrica. Pluk. ph. t. 30. f. I.

Anglis, common γ jagged Polypody.

Habitat in muris antiquis umbrosis et ad radices arborum.

γ on a rock in a wood, near Dennys Powis Castle, not far from Caerdiff in Clamorganshire. R. syn. 4. VI—X.

Pharmac. Polypodii. Radix, Herba.

** *Fronde pinnata.*

2. POLYPODIUM frondibus pinnatis : pinnis lunula-H h 4 Lonchitis, tis, tis.

CRYPTOGAMIA FILICES.

tis, ciliato-serratis declinatis, stipitibus strigosis.
Sp. pl. 1548. Fl. dan. 497.

Polypodium foliis pinnatis, pinnis ciliatis dentatis,
appendiculatis. Hall. hist. 1711.
Lonchitis aspera. B. pin. 359. major. Cam. ep. 664,
Ger. em. 1140. R. syn. 118. Matthioli. Park.
1042.

Anglis, rough Polypody, or Spleenwort.

Habitat in fissuris rupium; in montibus circa Llanber-

ris, copiose. 24. V—IX.

*** *Fronde subbipinnata*.

fonta-
num.

3. *POLYPODIUM* frondibus subbipinnatis lanceola-
tis, foliolis subrotundis argute incisis, stipite lævi.
Sp. pl. 1550.

Polypodium duriusculum; pinnis laxe pinnatis, pin-
nulis bidentatis et tridentatis argutis. Hall. hist.
1706.

Adiantum album. Lob. ic. 810.

Filicula fontana. Tabern. 792. minor. B. pin. 358.

Filix saxatilis non ramosa minima. R. cat. eur. Pluk.
ph. t. 89. f. 2.

Filix saxatilis omnia minima elegantissima. Hort. reg.
paris. Pluk. 89. f. 3.

Anglis, rock Polypody.

Habitat in muris antiquis et rupibus. supra Hammer-
sham Church, D. Bradney; in locis saxosis, prope
Wybourn in Westmorlandia. 24. VI—IX.

phegopte-
ris.

4. *POLYPODIUM* frondibus subbipinnatis, foliolis in-
fimis reflexis: paribus pinnula quadrangulari coa-
dunatis. Sp. pl. 1550. Fl. dan. 497.

Polypodium foliis pinnatis reflexis, pinnis ovatis hir-
sutis, primis cum nervo confluentibus. Hall. hist.
1698.

Filix minor britannica, pediculo pallidiore, alis infe-
rioribus, deorsum spectantibus. Hist. ox. III. 575.
f. 14. t. 4. f. 17. R. syn. 122.

Anglis, wood Polypody.

Habitat in rimis petrarum humidiusculis et umbrosis in
comitatibus

comitatibus Eboracensi, Westmorlandico, et Devonensi passim. 4. VI—IX.

5. POLYPODIUM frondibus subbipinnatis lanceolatis, *Thelypteris* pinnulis integerrimis acutis, fructificationibus marginalibus.

Polypodium pinnis pinnatis, pinnulis ovatis integerimis. Hall. hist. 1697.

Acrosticum frondibus pinnatis: pinnis pinnatifidis integrerrimis. Sp. pl. 1528.

Filix minor palustris repens. R. syn. 122.

Dryopteris. Leb. ic. 814. Ger. em. 1135. f. *Filix querna repens.* Park. 1041.

Anglis, marsh Polypody.

Habitat in palustribus cæspitosis, nemorosis, et ad sepes; in septentrionali Britanniæ et Walliæ frequens. 4. VII—X.

6. POLYPODIUM frondibus bipinnatis: pinnis ova-*fragrans*, tis sublobatis obtusis subtus nudis margine reflexis, fructificationibus marginalibus. Mantiss. II. 307.

Polypodium frondibus subbipinnatis lanceolatis: foliolis confertis: lobis obtusis ferratis. Sp. pl. 1550.

Dryopteris rubrum idæum spirans. Amm. ruth. 251.

Anglis, sweet Polypody.

Habitat in rimis petrarum humidis; prope Keswick in comitatu Westmorlandico. 4. VII—IX.

7. POLYPODIUM frondibus subbipinnatis; foliolis *crista-* ovato-oblongis: pinnis obtusiusculis apice acute *tum.* ferratis. Sp. pl. 1551.

Polypodium pinnulis pinnatis, lobis semipinnatis den- tatis aristatis. Hall. hist. 1705.

Filix mas ramosa, pinnulis dentatis. Ger. em. 1129. R. syn. 124. Pluk. ph. 181. f. 2.

Anglis, crested Polypody.

Habitat in sylvis et umbrosis humidis. 4. VI—IX.

Obs. variat frondibus tripinnatis.

CRYPTOGAMIA FILICES.

rhæticum. 8. POLYPODIUM frondibus bipinnatis : foliolis pin-
nisque remotis lanceolatis : serraturis acuminatis.
Sp. pl. 1552.

Polypodium triplicato-pinnatum, pinnulis tertiiis se-
mipinnatis lobulis bifidis. *Hall. hist.* 1710.

Filix montana ramosa minor argute denticulata. *R.*
syn. 124.

Filix alpina myrrhidis facie cambrebritannica. *Pluk.*
ph. t. 89. *f.* 4.

Filix fontana major s. Adiantum album, filicis folio.
B. pin. 358 ?

Filix rhætica tenuissime denticulata. *B. hist.* III.
740 ?

Anglis, stone Polypody.

Habitat in montibus saxosis ; in Westmorlandia passim ;
ad summitatem montis Glyder. *R. syn.* 5. VI—IX.

Obs. nimis affinis præcedenti, sed multo minor, an dis-
tincta sit species ?

Filix *mas.* 9. POLYPODIUM frondibus bipinnatis : pinnis ob-
tusis crenulatis, stipite paleaceo. *Sp. pl.* 1551.

Polypodium pinnis pinnatis obtusis dentatis. *Hall.*
hist. 1701.

Filix mas vulgaris. *Park.* 1036. *R. syn.* 120.

Filix mas non ramosa dentata. *B. pin.* 258.

Filix mas non ramosa, pinnulis latis densis minutim
dentatis. *Ger. em.* 1130.

Anglis, male Polypody, or Fern.

Habitat in sylvis, ericetis, et locis saxosis. 4. VI—IX.

Pharm. ac. Filicis maris Radix.

Filix fe- *mina.* 10. POLYPODIUM frondibus bipinnatis : pinnulis
lanceolatis pinnatifidis acutis. *Sp. pl.* 1552.

Polypodium pinnis pinnatis, pinnulis lanceolatis semi-
pinnatis, lobis acute bisectis. *Hall. hist.* 1740.

Filix mas non ramosa, pinnulis angustis raris pro-
funde dentatis. *Ger. em.* 1130. *Hist. ox.* III. 579.

f. 14. *t.* 3. *f.* 8. *R. syn.* 121. *Pluk. ph.* 180. *f.* 4.

Anglis, female Polypody, or Fern.

11. POLYPODIUM frondibus bipinnatis ; pinnis lu- *aculea-*
nulatis ciliato-dentatis, stipite strigoso. *Sp. pl. tum.*

1552.

Filix mas aculeata major. B. pin. 558. pr. 151.

Filix mas non ramosa, pinnulis latis auriculatis spino-
sis. Ger. em. 1130. Pluk. ph. 179. f. 6. R. syn.
121.

β *Filix aculeata major, pinnulis auriculatis crebrioribus,*
foliis integris angustioribus. R. syn. 121.

γ *Filix mas aculeata nostras, alis expansis, muscosa la-*
nugine aspersa. Pluk. ph. 180. f. 1. R. syn. 121.

Anglis, prickly Polypody.

Habitat in sylvis et umbrosis. 4. VI—IX.

12. POLYPODIUM frondibus bipinnatis : pinnulis *lobatum.*
ovatis ciliato-serratis suprema basi auriculatis, sti-
pite strigoso.

Polypodium pinnis pinnatis ciliatis ferratis appendi-
culatis. Hall. hist. 1712?

Filix lonchitidis affinis. Pluk. ph. 180. f. 3. R. syn.
121.

Anglis, lobed Polypody.

Habitat in umbrosis et ad sepes. 4. VI—IX.

Obs. affinis praecedenti, an distincta sit species?

13. POLYPODIUM frondibus bipinnatis : foliolis re- *fragile.*
motis : pinnis subrotundis incisis. *Sp. pl. 1553.*

Filix saxatilis caule tenui fragile. R. syn. 125. Pluk.
ph. 180. f. 5.

Filix pumila saxatilis altera clusii. Park. 1043.

Filix saxatilis non ramosa, nigris maculis punctata.
B. pin. 358.

β *Adiantum nigrum pinnulis cicutariæ divisura. D.*
Bobart. R. syn. 126.

Anglis, brittle Polypody.

Habitat in aridis lapidosis in boreali parte Britanniæ
et in Wallia; circa Bristol. 4. VI—IX.

CRYPTOGAMIA FILICES.

**** *Fronde supradecomposita.*

- Dryopteris.* 14. POLYPODIUM frondibus supradecompositis : foliolis ternis bipinnatis. *Spl. pl.* 1555.
Polypodium pinnis pinnatis conjugatis, pinnulis ova-
tis obtusis crenatis. *Hall. hist.* 1693.
Filix ramosa minor. *B. hist. III.* 741. *R. syn.* 125.
Filix saxatilis ramosa nigris maculis punctata. *B.*
pin. 358.
Filix pumila saxatilis prima Clusii. *Park.* 1043.
Dryopteris Tragi. *Ger. em.* 1135.
Anglis, branched Polypody.
Habitat in aridis saxosis in comitatibus Eboracensi, Lan-
castrensi, Westmorlandico, &c. frequens. 4
VI—IX.

ADIANTUM. 1180.

Fru>ctificationes in maculis terminalibus, sub replicato
margine frondis.

- Capillus* 1. ADIANTUM frondibus decompositis : foliolis al-
veneris. ternis : pinnis cuneiformibus lobatis pedicellatis.
Sp. pl. 1559.
Adiantum petiolis ramosis, foliis flabelliformibus lo-
batis. *Hall. hist.* 1713.
Adiantum. *Cam. ep.* 924. verum s. *Capillus vene-*
ris verus. *Park.* 1049.
Adiantum foliis coriandri. *B. pin.* 355.
Capillus veneris verus. *Ger. em.* 1143. *R. syn.* 123.
Anglis, true Maidenhair.
Habitat in rupibus et muris humidiusculis; Found by Mr.
Lhwyd at Barry island, and Porth Kirig in Glâ-
morganshire. *R. syn.* 4. V—IX.

- trapezi-* 2. ADIANTUM frondibus supradecompositis : foliolis
forme. alternis : pinnis rhombeis incisis utrinque fructifi-
cationibus. *Sp. pl.* 1559.
Adiantum majus coriandri folio, adianto vero affine,
pediculo pallide rubente. *Sibb. pr.* 7. *R. syn.* 124.
Adianto

Adianto vero affinis minor *Scotica*, folio obtuso saturate viridi, &c. *Sibb. pr.* 8. *R. syn.* 124.

Adiantum ramosum pediculis lucidis et nigris. *Plum. fil. amer.* 78. *t.* 95.

Anglis, shining Maidenhair.

Habitat in *rupibus*. D. Collinson *communicavit*, qui a D. Alston ex *Scotia* *recepit*. 4. VI—IX.

TRICHOMANES. 1181.

Fructificationes solitariæ, *stylo* setaceo terminatæ, margini ipsi frondis insertæ.

1. TRICHOMANES frondibus subbipinnatis: pinnis *pyxidiferae* alternis confertis lobatis linearibus. *Sp. pl.* 1561. *rum.*

Filix pyxidifera. *Plum. fil. amer.* 74. *t.* 50.

Filix humilis repens, foliis pellucidis et splendentibus caule alato. D. Richardson. *R. syn.* 127. *t.* 3.

f. 3. 4.

Dareæ tunbrigenis facie. *Pet. fil.* 104. *t.* 13. *f.* 13.

Anglis, cup Trichomanes.

Habitat in *petris* et *rupibus aqua humantibus*. Found by Dr. Richardson at Belbank, scarce half a mile from Bingley, at the head of a remarkable spring. *R. syn.* 4. VIII.

2. TRICHOMANES frondibus pinnatis: pinnis ob-*tunbri-* longis dichotomis decurrentibus dentatis. *Sp. pl. gense.* 1561.

Adiantum petræum perpusillum anglicum, foliis bifidis trifidisque. *R. syn.* 123.

Adiantum radicosum humisparsum. f. *Filicula pellucida nostras*, coriandri foliis mollicellis, globuliferum. *Pluk. ph.* 3. *f.* 5. 6.

Darea tunbrigenis minor. *Pet. mus.* 761.

Anglis, tunbridge Trichomanes.

Habitat in *fissuris rupium* et *locis saxosis humidis*. near Tunbridge Mr. Dare, at Cockbush, near Chichester, Mr. Rand; *supra Dartmoore* in Devonia; in *montibus Westmorlandicis*, *Cumberlandicis*, *Eboracensisibus* et *Cambror Britannicis frequens*. 4. V—X.

CRYPTOGAMIA MUSCI.

P I L U L A R I A. 1183.

Flores *Masculi* ad latus frondis.

Fructificatio *Feminea* ad radicem, globosa, quadrilocularis.

- globuli-
fera.* 1. PILULARIA. Sp. pl. 1563. Fl. dan. 223.
Pilularia palustris juncifolia. Vaill. paris. 159. t. 15.
f. 6. Dill. musc. 538. t. 79. f. 1.
Graminifolia palustris repens, vasculis granorum piperis æmulans. R. syn. 130.
Anglis, Pepper-grass.
Habitat in inundatis præsertim solo arenoso; prope fontes medicatos Strethamenses, D. Wilmer. in ericeto Hounsflejano. R. syn. 4. V—IX.

I S O E T E S. 1184.

Flores *Masculi* Anthera intra basin frondis.

Flores *Feminei* Capsula intra basin frondis.

- lacustris.* 1. ISOETES. Sp. pl. 1563. it. scan. 417. ic. Fl. dan. 191.
Calamaria folio longiore et graciliore. Dill. musc. 541. t. 80. f. 2.
Subularia vulgaris erecta, folio rigidissimo. R. syn. 306.
β Subularia repens folio minus rigido. R. syn. 306.
Subularia fragilis, folio longiore et tenuiore. R. syn. 307.
Anglis, common Quillwort.
Habitat in fundo lacuum, circa Llanberris copiose; in Loch Tay, in Scotia. D. Arch. Menzies. 4. V—IX.

M U S C I.

L Y C O P O D I U M. 1185.

Anthera bivalvis, sessilis. Colyptra nulla.

- clavatum.* 1. LYCOPODIUM foliis sparsis filamentosis, spicis teretibus pedunculatis geminis. Sp. pl. 1564. Fl. dan. 126. Weis Crypt. 269.

Lycopodium

Lycopodium ramis prolixis, spicis petiolatis gemellis, foliis linearibus pilo aristatis. *Hall. hist.* 1722.

Lycopodium. *Tab. ii.* 814. *R. syn.* 107. *vulgare pilosum anfragosum et repens.* *Dill. musc.* 441. *t.* 58. *f.* 1.

Muscus terrestris clavatus. *B. pin.* 360.

Muscus clavatus s. Lycopodium. *Ger. em.* 1562. *Park.* 1307.

Anglis, common Club-moss.

Habitat in montibus et ericetis, in ericeto Hounflejano et prope Esher. 24. VII. VIII.

Pharmac. *Musci clavati Herba Lycopodii Semina.*

2. LYCOPODIUM foliis sparsis integerrimis, spicis *inundat* terminalibus foliosis. *Sp. pl.* 1565. *Fl. dan.* 336. *tum.*

Lycopodium spicis sessilibus, foliis linearibus confertissimis incurvis. *Hall. hist.* 1721.

Lycopodium palustre repens, clava singulari. *Vaill. paris.* 123. *t.* 16. *f.* 11. *Dill. musc.* 452. *t.* 62. *f.* 7.

Muscus terrestris repens, clavis singularibus foliosis erectis. *R. syn.* 108.

Anglis, marsh Club-moss.

Habitat in ericetis humidis passim. in ericeto Hounflejano et prope Esher. 24. VI—IX.

3. LYCOPODIUM foliis sparsis ciliatis lanceolatis, *selaginoides* spicis solitariis terminalibus foliosis. *Sp. pl.* 1565. *des.* *Fl. dan.* 70.

Lycopodium spicis sessilibus, foliis ovato-lanceolatis serratis confertis. *Hall. hist.* 1717. *t.* 45. *f.* 1.

Selaginoides foliis spinosis. *R. syn.* 1066. *Dill. musc.* 460. *t.* 88. *f.* 1.

Anglis, prickly Club-moss.

Habitat in pascuis et ericetis montosis; in boreali parte Britanniae et in Wallia frequens. 24. VI—IX.

4. LYCOPODIUM foliis sparsis octofariis, caule *Selago* dichotomo erecto fastigiato, floribus sparsis. *Sp. pl.* 1565. *Weis. cryp.* 273.

Lycopodium spica sessili, foliis linearibus lanceolatis confertis. *Hall. hist.* 1716.

Selago

CRYPTOGAMIA MUSCI.

Selago vulgaris abietis rubræ facie. *Dill. musc.* 435.
t. 56. f. 1.

Selago foliis et facie abietis. *Fl. jen.* 330. *R. syn.*
106.

Chamæpeuce. *Turn. hist. par.* I. 129.

Muscus erectus ramosus saturate viridis. *B. pin.* 360.
Anglis, firr Clubb-moss.

*Habitat in ericetis montosis, in comitatibus Eboracensi,
Lancastriensi, Westmorlandico, Cambrobritannico
etc. frequens.* 4. IV—X.

*annoti-
num.* 5. *LYCOPODIUM* foliis sparsis quinquefariis subser-
ratis, surculis annotino-articulatis, spicis termi-
nalibus glabris erectis. *Sp. pl.* 1566.

*Lycopodium ramis prolixis, spicis sessilibus foliis line-
aribus subserratis.* *Hall. hist.* 1720.

*Lycopodium elatius juniperinum, clavis singularibus,
sine pediculis.* *Dill. musc.* 455. *t. 63. f. 9.* *R. syn.*
107.

*Muscus clavatus, juniperinis foliis reflexis, clavis sin-
gularibus sine pediculis.* *Hist. Ox.* III. 624. *f. 15.*
t. 5. f. 3.

Anglis, Welsh Club-moss.

*Habitat in alpibus Arvoniæ sed rarius; copiosam observa-
vimus in monte Rhiwr Glyder, qua super lacum
Llyn y cown, prope ecclesiam S. Perisi, nec rarius
in depressis ejusdem montis Glyder, qua rupem y 'Tri-
van spectat.* D. Llhwyd. *R. syn.* 4. VI—IX.

alpinum. 6. *LYCOPÓDIUM* foliis quadrifariam imbricatis acu-
tis, surculis erectis dichotomis, spicis sessilibus te-
retibus. *Sp. pl.* 1567. *Fl. dan.* 79. *Weis. Cryp.*
275.

*Lycopodium spicis sessilibus, foliis lanceolatis adpres-
sis, utrinque ternatis.* *Hall. hist.* 1719.

Lycopodium sabinæ facie. *Dill. musc.* 435. *t. 58.*
f. 2.

Muscus clavatus cupressiformis. *Park.* 1309.

Muscus clavatus foliis cupressi. *Ger. em.* 1562. *B.*
pin. 360.

Anglis, mountain Club-moss.

CRYPTOGAMIA MUSCI.

465

Habitat in ericetis montosis, in comitatibus Eboracensi,
Cumberlandico et in montibus Wallicis. 24.
VII—X.

S P H A G N U M. 1187.

Anthera operculata: ore lævi. *Calyptra* nulla.

1. SPHAGNUM ramis deflexis. *Sp. pl. 1569. Fl. dan. palustre.*
474. *Weiss crypt. 263.*
Sphagnum caulerum ramis teretibus pendulis. Hall.
hist. 1724.
Sphagnum palustre molle deflexum, squamis cymbiformibus. Dill. musc. 240. t. 32. f. 1.
Sphagnum caulerum et ramosum palustre molle candicans, reflexis ramulis, foliolis latioribus. Dill.
giss. 229. R. syn. 104.
2. *Sphagnum palustre molle deflexum, squamis capillaceis. Dill. musc. 243. t. 32. f. 2.*
Sphagnum caulerum et ramosum palustre molle candicans, reflexis ramulis, foliolis angustioribus. Dill.
giss. 229. R. syn. 104.
Anglis, grey Sphagnum, or Bog-moss.
Habitat in palustribus turfosis. 24. VII. VIII.

2. SPHAGNUM subramosum erectum. *Sp. pl. 1570. alpinum.*
Sphagnum subulatum viridissimum, capsulis ovatis.
Dill. musc. 245. f. 32. f. 3.
Anglis, alpine Sphagnum.
Habitat in paludibus in montibus Cader Idærus et Snowdon copiose. Dill. IX. X.

3. SPHAGNUM ramosum repens, antheris lateralibus *arbores-*
secundis. Fl. angl. 396. Sp. pl. 1570. um.
Sphagnum heteromallum polycephalum. Dill.
musc. 248. t. 32. f. 6.
Sphagnum caulerum et ramosum minus hirsutum
capitulis crebris pilosis per ramulorum longitudinem adnascentibus. R. syn. 105.
Anglis, tree Sphagnum.
Habitat in arborum truncis paſſim. VI—X.

I i

PHASCUM.

PHASCUM. 1189.

Anthera operculata: ore ciliata. *Calyptra caduca*, minuta.

subula- 1. PHASCUM acaule, anthera sessili, foliis subulatis
tum. setaceis patulis. *Sp. pl.* 1570. *Weis. crypt.* 268.
Fl. dan. 249.

Sphagnum acaulon trichoides. *Dill. giss.* 229. *Musc.*
251. t. 32. f. 10. *R. syn.* 105. *Hall. hist.* 1727.
Anglis, subulated Phascum.
Habitat in ericetis solo arenoso. III—V.

monta- 2. PHASCUM acaule, anthera sessili, foliis imis patulis
num. oblongis, supremis erectis lanceolatis acuminatis.
Phascum sessile foliis radicalibus obtusis, centralibus
ciliatis. *Hall. hist.* 1725. t. 45. f. 3.

Sphagnum acaulon maximum foliis in centro cili-
aribus. *Hall. it. alp.* 83. *Dill. musc.* 253. t. 32.
f. 13.

Anglis, mountain Phascum.
Habitat in rupibus alpinis (terrâ substrata); circa Llan-
beris in Arvonia, Dill. in monte Hart-fell dictâ
prope Moffat. D. Sheffield. ○. V—VIII.

acaulon. 3. PHASCUM acaule, anthera sessili, foliis ovatis acu-
tis conniventibus. *Sp. pl.* 1570. *Fl. dan.* 249.
Weis. crypt. 266.

Sphagnum acaulon, foliis ovato-lanceolatis, pilo aris-
tatis. *Hall. hist.* 1726.

Sphagnum acaulon bulbiforme, majus. *Dill. musc.*
251. t. 32. f. 11.

Sphagnum acaulon foliis in bulbi formam congestis,
majus. *Dill. giss.* 230. *R. syn.* 105.

β Sphagnum acaulon bulbiforme, minus. *Dill. musc.*
252. t. 32. f. 12.

Sphagnum acaulon, foliis in bulbi formam congestis,
minus. *Dill. giss.* 230. *R. syn.* 105.

Muscus trichoides acaulos, minor, latifolius. *Vaill.*
par. 128. t. 27. f. 2.

Anglis, oval Phascum.

Habitat

Habitat in ericetis et aggeribus fossarum solo arenoso.

○. I—V.

4. PHASCUM caulescens repens. *Sp. pl.* 1571. *repent.*
Sphagnum vermiculare repens capsulis intra foliorum
 squamosorum alas minimis. *Dill. musc.* 550. *t.* 85.
f. 16.

Anglis, creeping Phascum.

Habitat in arborum truncis, in comitatu Eboracensi.

D. Richardson. 24. V.

F O N T I N A L I S. 1190.

Anthera operculata, calyprata, sessilis, perichætio inclusa.

1. FONTINALIS foliis complicato-carinatis trifariis *antipyre-*
acutis, antheris lateralibus. *Sp. pl.* 1571. *Weis.* *tica.*
crypt. 260.

Fontinalis triangularis major complicata e foliorum
 alis capsulifera. *Dill. musc.* 254. *t.* 33. *f.* 1.

Fontinalis major foliis triangularibus complicatis ca-
 pitulis in foliorum alis sessilibus. *R. syn.* 79.

Hypnum foliis complicatis ovato-lanceolatis, capsulis
 in alis petiolatis ovatis. *Hall. hist.* 1794.

Muscus squamosus, foliis acutissimis, in aquis nascens.

Tourn. 554. *Vaill. par.* 140. *t.* 33. *f.* 5.

Anglis, greater Fontinalis, or Water-moss.

Habitat in fluviis leniter fluentibus et stagnis. 24.
 VI—X.

2. FONTINALIS foliis imbricatis subulato-lanceola- *squamosa.*
 tis, antheris lateralibus. *Sp. pl.* 1571.

Fontinalis squamosa tenuis sericea atro-virens. *Dill.*
musc. 250. *t.* 33. *f.* 3.

Hypnum foliis ovato-lanceolatis, pilo terminatis, cap-
 sulis per alas sessilibus. *Hall. hist.* 1796.

Anglis, squamous Fontinalis.

Habitat in rivulis alpinis in Wallia & septentrionali
 parte Britanniæ frequens. 24. VI—X.

Obs. variat foliis subulato-lanceolatis et lanceolatis acutis ;
 nimis affinis præcedenti.

CRYPTOGAMIA MUSCI.

- minor.* 3. **FONTINALIS** foliis ovatis concavis trifariis acutis, paucim geminis, antheris terminalibus. *Sp. pl.* 1571.
Fontinalis triangularis minor carinata, e cymis capsuliferis. *Dill. musc.* 257. *t.* 33. *f.* 2.
Fontinalis minor foliis triangularibus minus complicatis capitulis in summis ramulis sessilibus. *R. syn.* 79.
Hypnum foliis ovato-lanceolatis carinatis, apicibus capsuliferis. *Hall. hist.* 1795.
Anglis, lesser Fontinalis, or Water-moss.
Habitat ad ripam Thamefis circa Londinum, et in Iside prope Oxonium frequens. 24. VIII—X.
- pennata.* 4. **FONTINALIS** foliis bifariis patentibus, capsulis lateribus. *Sp. pl.* 1571.
Sphagnum pennatum undulatum, vagina squamosa. *Dill. musc.* 250. *t.* 32. *f.* 9.
Hypnum caulis distichis ramosis, foliis ovatis transversim undosis. *Hall. hist.* 1797.
Anglis, feathered Fontinalis.
Habitat in arborum truncis, in sylvis inter Troutbeck et Ambleside in Westmorlandia. 24. VIII—X.

SPLACHNUM. 1191.

Anthera insidens apophysi maximæ coloratæ. Calyptra caduca.
Stella feminea in distincto individuo.

- ampulla-* 1. **SPLACHNUM** umbraculo ampullaceo obconico. *Sp. pl.* 1572. *Fl. dan.* 192.
Bryum foliis ovato-lanceolatis, capsula pyriformi terminata cylindro. *Hall. hist.* 1830.
Bryum ampullaceum foliis thymi pellucidis, collo strictiore. *Dill. musc.* 343. *t.* 44. *f.* 3.
Bryum erectis gigartinis capitulis, foliis serpylli pellucidis acutis. *R. syn.* 93.
Muscus aureus capillaris minor, capitulis geminatis erectis mutuo incubitu adnatis. *Hist. Ox.* III. 629. *f.* 15. *t.* 16. *f.* 10.
Anglis, purple Splachnum.

Habitat

Habitat in paludibus turfosis. About Hitchin-ferry, near Southampton; and in the Bogs by West Wickham and Addington, near Croydon. Dr. Skerrard. R. syn. O. IV. V.

2. **SPLACHNUM** umbraculo ampullaceo subgloboso *vasculo-*
sum.
Sp. pl. 1572.
Phascum acaule anthera pedunculata. Fl. angl. 397.
Bryum foliis ovato-lanceolatis, capsula pyriformi brevissime papillata. Hall. hist. 1831.
Bryum ampullaceum foliis serpylli pellucidis, collo crassiore. Dill. musc. 344. t. 44. f. 4.
Bryum erectis gigartiniis capitulis, foliis serpylli pellucidis obtusis. R. syn. 93. t. 3. f. 2.
Anglis, orange Splachnum.
Habitat in ericetis montosis et humidis; in comitatibus Eboracensi, Westmorlandico passim, et in Wallia.
O. VI—X.

POLYTRICHUM. 1192.

Anthera operculata apophysi minimæ insidens. Calyptra villosa.
Stella feminea in distincto individuo.

1. **POLYTRICHUM** caule simplici anthera parallelepipedæ. Sp. pl. 1573. Fl. dan. 295. Weis crypt. 168. *commune.*
Polytrichum quadrangulare vulgare, yuccæ foliis serratis. Dill. musc. 420. t. 54. f. 1.
Polytrichum vulgare et majus, capsula quadrangulari. Dill. giss. 221. R. syn. 90.
Polytrichum aureum majus. B. pin. 359. Park. 1052.
Muscus capillaris s. Adiantum aureum majus. Ger. em. 1559.
Muscus scoparius. Lob. Obs. 645. ic. 245.
Mnium calyptris villosis foliis ferratis, capsulis quadrangularibus, disco insidentibus. Hall. hist. 1835.
§ Polytrichum quadrangulare, juniperi foliis brevioribus et rigidioribus. Dill. musc. 424. t. 54. f. 2.
Li 3 Polytrichum

CRYPTOGAMIA MUSCI.

Polytrichum montanum et minus capsula quadangulari. *Dill. giss.* 221. *R. syn.* 90.

Polytrichum aureum medium. *B. pin.* 356.

γ *Polytrichum quadrangulare* minus, juniperi foliis pilosis. *Dill. musc.* 426. *t. 54. f. 3.*

Mnium calyptra villosa, foliis ferratis pilo aristatis, capsula quadrangula insidente disco. *Hall. hist.* 1836.

Anglis, common *Polytrichum*, or greater Golden Maiden-hair.

Habitat in sylvis, ericetis, uliginosis et sterilissimis.
4. V. VI.

Pharmac. Adianti aurei Herba.

nanum. 2. **POLYTRICHUM** caule simplici, anthera oblonga.

Polytrichum parvum, aloës folio serrato capsulis oblongis. *Dill. musc.* 429. *t. 55. f. 7.*

Polytrichum capsula cylindrica erecta, surculis simplicibus brevissimis, foliis ferrulatis. *Weis. crypt.* 173.

polytri-
choides. *Mnium calyptra* villosa. *Sp. pl.* 1576. acaulon, foliis ferratis capsulis cylindricis erectis. *Hall. hist.* 1837.

§ *Polytrichum nanum*, capsulis subrotundis galeritis, aloes folio non serrato. *Dill. musc.* 428. *t. 55. f. 6.*

Polytrichum minus, capsulis subrotundis, calyptra quasi lacera coronatis. *Dill. giss.* 221. *R. syn.* 91.

Muscus coronatus rigidus minor et humilior capitulis villosis brevibus. *Hist. Ox.* III. 630. *f. 15. t. 7. f. 7.*

Anglis, dwarf *Polytrichum*.

Habitat in ericetis. VIII—XI.

alpinum. 3. **POLYTRICHUM** caule ramoso, pedunculis subterminalibus.

Polytrichum caule ramosissimo pedunculis terminalibus. *Sp. pl.* 1573. *Fl. dan.* 296.

Polytrichum alpinum ramosum, capsulis e summitate ellipticis. *Dill. musc.* 427. *t. 55. f. 4.*

Bryum foliis ferratis, capsulis ovatis, basi turbinatis. *Hall. hist.* 1800. *t. 46. f. 6.*

§ Polytrichum caule ramosissimo, pedunculis axillaribus, urnigerum.
Sp. pl. 1573.

Polytrichum ramosum setis ex alis urnigeris. *Dill.*
musc. 427. *t.* 55. *f.* 5.

Muscus erectius juniperi folio ramosus. *Vaill. par.*
131. t. 28. f. 13.

Bryum caule ramoso, ex alis florigerum, foliis ferratis,
capsulis cylindricis. *Hall. hist.* 1801.

Anglis, alpine Polytrichum.

Habitat in ericetis montosis in boreali parte Angliae, et
in montibus Wallicis et Scoticis frequens. *24.*
VI—VIII.

Obs. Pedunculi in α et β non ex apice surculorum sed
paulo infra oriuntur.

4. POLYTRICHUM caule ramoso, antheris subsessili-*striatum*.
bus subterminalibus, calyptre sursum pilosa.

Polytrichum bryi ruralis facie, capsulis sessilibus ma-
jus. *Dill. musc.* 430. *t. 55. f. 8.*

Polytrichum capsulis subrotundis, pediculis brevissi-
mis insidentibus, calyptre striata, arboreum ramo-
sum majus. *Dill. giss.* 222. *R. syn.* 91.

Bryum antheris sessilibus sparsis, calyptris striatis sur-
sumve pilosis. *Sp. pl.* 1579. *Fl. dan.* 537. *f.* 3.

Bryum setis brevissimis alaribus, calyptris villosis co-
nicis. *Hall. hist.* 1799.

Muscus apocarpos arboreus ramosus. *R. hist.* III. 40.
Vaill. par. 129. *t. 25. f. 5, 6.*

β Polytrichum bryi ruralis facie, capsulis sessilibus, mi-
nus. *Dill. musc.* 431. *t. 55. f. 9.*

Polytrichum capsulis subrotundis, pediculis brevissi-
mis insidentibus, calyptre striata, arboreum et ter-
restre minus ramosum et breve. *Dill. giss.* 222.
R. syn. 91.

Muscus capillaceus minimus acaulos, calyptre stria-
ta. *Tourn.* 552. *Vaill. par.* 130. *t. 27. f. 10.*

γ Polytrichum capsulis sessilibus, foliis brevibus rectis
carinatis. *Dill. musc.* 432.

δ Polytrichum capillaceum crispum, calyptris acutis pi-
losissimis. *Dill. musc.* 433. *t. 55. f. 11.*

CRYPTOGAMIA MUSCI.

Polytrichum capsulis oblongo-rotundis, calyptis pilosissimis. *R. syn. 91.*
Bryum setis brevissimis alaribus, calyptis cylindricis pilosissimis. Hall. hist. 1798.
Muscus capillaceus minimus, calyptra villosa. Vaill. par. 130. t. 27. f. 9.
Anglis, striated Polytrichum.
Habitat in arboribus et rupibus. II-V.

MNIUM. 1593.

Anthera operculata, Calyptra laevis.
Fem. capitulum nudum, pulverulentum, remotum.

- pelluci-* 1. **MNIUM** caule simplici foliis ovatis. *Sp. pl. 1574.*
Fl. dan. 300 Weis. crypt. 161.
Mnium caule simplicissimo, foliis ovato-lanceolatis,
seta fungifera foliosa. Hall. hist. 1853. t. 45. f. 8.
Mnium serpylli foliis tenuibus et pellucidis. Dill.
musc. 232. t. 31. f. 2.
Mnium minus non ramosum, angustioribus et pellucidis foliis. R. syn. 78.
2. **MNIUM** minimum non ramosum angustissimis et pellucidis foliis. *R. syn. 78.*
Anglis, pellucid Mnium.
Habitat in sylvis et umbrosis uidis. O. III. IV.
- androgyn-* 2. **MNIUM** caule ramoso, androgynum. *Sp. pl. 1574.*
Fl. dan. 299. Weis. crypt. 163.
Mnium caule simplici, caulinis rosiferis. Hall. hist.
1854.
Mnium perangustis et brevibus foliis. Dill. giss. 214.
musc. 230. t. 31. f. 1. R. syn. 78.
Muscus coronatus humilis minimus, foliolis, pediculis
et capitulis minimis erectis. Hist. Ox. III. 631.
f. 15. t. 7. f. 2.
Anglis, upright Mnium.
Habitat in sylvis, ericetis et muris. O. III. IV.
- palustre.* 3. **MNIUM** caule dichotomo, foliis subulatis. *Sp. pl.*
1574. Weis crypt. 165.
Mnium caulinis rubiginosis bipartitis, foliis lanceola-
tis

- tis mollibus, capsulis cylindricis acuminatis. *Hall.*
hist. 1855.
- Mnium majus*, ramis longioribus bifurcatis. *R. syn.*
78. Dill. musc. 233. t. 31. f. 3.
- Muscus palustris* flagellis erectis luteolis, raro divisis
 capitulis oblongis adianti. *Hist. Ox. III. 629. f. 15.*
t. 6. f. 9.
- 3 *Mnium caule ramoso eretto, pedunculis femineis ax-* *ramosum.*
illaribus. Fl. angl. 403.
- Mnium majus*, minus ramosum, capitulis pulverulen-
 tis crebrioribus. *R. syn. 78. Dill. musc. 235. t. 31.*
f. 4.
- Anglis*, marsh *Mnium*.
Habitat in paludibus turfosis et ericetis uidis. II. VI.
VII.
4. *MNIUM* foliis distichis integerrimis. *Sp. pl. 1578. trichoma*
Mnium trichomanis facie, foliolis integris. R. syn. nis.
79. Dill. musc. 236. t. 31. f. 5.
- Jungermannia* foliis integerrimis glabris ovatis dis-
 tichis, extremo caule setifero. *Hall. hist. 1858.*
- Anglis*, fern *Mnium*.
Habitat in sylvis, sepibus, et ericetis uidis umbrosis. II.
IV—X.
5. *MNIUM* foliis distichis bifidis. *Sp. pl. 1579. fissum.*
Mnium trichomanis facie, foliolis bifidis. R. syn. 79.
Dill. musc. 237. t. 31. f. 6.
- Jungermannia* foliis bidentatis fragiferis. *Hall. hist.*
1864.
- Jungermannia* terrestris repens foliis ex rotunditate
 acuminatis bifidis, apertura pene visibili. *Mich.*
gen. 8. t. 5. f. 14.
- Anglis*, forked *Mnium*.
Habitat in umbrosis humidis. II. III—X.
6. *MNIUM* foliis distichis, pinnis subtus auriculatis *junger-*
mannia.
Sp. pl. 1579.
- Lichenastrum alpinum* purpureum, foliis auritis et
 cochleariformibus. *Dill. musc. 479. t. 69. f. 1.*
- Lichenastrum trichomanis* facie, prælongum, foliis
 concavis unam partem spectantibus. *R. syn. 112.*
Jungermannia

CRYPTOGAMIA MUSCI.

Jungermannia foliis amplexicaulibus subrotundis.

Hall. hist. 1861. *Weis. crypt.* 123.

Anglis, purple Mnium.

Habitat in rivulis alpinis et palustribus; in fossulis in ericetis turfosis frequentissime cum capitulis femininis observavi. 4. III—VIII.

B R Y U M. 1594.

Anthera operculata; *Calyptra* lævis. *Filamentum e tuberculo terminali ortum.*

Stella feminea in distincto individuo.

* *Antheris sessilibus.*

apocar- 1. *BRYUM* antheris sessilibus terminalibus, calyptora minima. *Sp. pl.* 1115. *Fl. dan.* 480.

Sphagnum nodosum hirsutum incanum. *Dill. musc.* 246. t. 32. f. 5.

Sphagnum cauliferum et ramosum faxatile hirsutum, capitulis virentibus. *R. syn.* 105.

Hypnum caulis ramosis, foliis lanceolatis hirsutis, operculo aristato. *Hall. hist.* 1793.

2. *Sphagnum* subhirsutum, obscure virens, capsulis rubellis. *Dill. musc.* 245. t. 32. f. 4.

Sphagnum cauliferum et ramosum faxatile, hirsutum virescens, capitulis obscuris rubris. *Dill. giss.* 229.

R. syn. 104.

Muscus apocarpos hirsutus, saxis adnascens, capitulis obscure rubris. *Vail. par.* 129. t. 27. f. 15.

Anglis, sessile Bryum.

Habitat in rupibus et arboribus. XII—IV.

** *Antheris pedunculatis erectis.*

pomifor- 2. *BRYUM* antheris erectis sphæricis. *Sp. pl.* 1580.

Bryum capillaceum capsulis sphæricis. *Dill. musc.* 339. t. 44. f. 1.

Bryum foliis subulatis, setis verticalibus, capsulis sphæricis. *Hall. hist.* 1803.

Bryum trichoides virens, erectis majusculis capitulis maliformibus. *R. syn.* 97.

Muscus trichoides minimus sericeus capillaceus, capitulis

pitulis sphæricis. *Hist. Ox. III.* 628. *f. 15. t. 6. f. 6.*
Anglis, apple Bryum.

Habitat in ericetis; on Hampstead Heath. *R. syn.*
 ○. III. IV.

2. BRYUM antheris erectis obovatis, calyptra subula-pyriformata, surculis acaulibus, foliis ovatis muticis. *Sp. pl. me.*
 1580. *Fl. dan.* 537. *Weis. crypt.* 183.

Bryum caule brevissimo, foliis ovato-lanceolatis, capsulis ovatis, operculo brevi. *Hall. hist.* 1832.

Bryum serpyllifolium pellucidum, capsulis pyriformibus. *Dill. musc.* 345. *t. 44. f. 6.*

Bryum parvum erectis pyriformibus majusculis capitulis, foliolis serpylli pellucidis. *R. syn.* 93.

Muscus coronatus humiliis stellaris, foliis latiusculis, capitulis pyriformibus erectis turgidiusculis. *Hist. Ox. III.* 631. *f. 15. t. 7. f. 16.*

Anglis, pear Bryum.

Habitat in ericetis et ad aggeres viarum. ○. III. IV.

3. BRYUM antheris obliquis subrotundis; caule simplici geniculis inflexo. *fontanum.*

Bryum palustre, scapis teretibus stellatis, capsulis magnis subrotundis. *Dill. musc.* 340. *t. 44. f. 2.*

Mnium caule simplici geniculis inflexo. *Sp. pl.* 1574. *Fl. dan.* 298.

Mnium caulis teretibus erectis ex vertice multifidis. *Hall. hist.* 1851.

Muscus palustris adianto aureo affinis, scapis tenuibus foliolis brevibus. *R. syn.* 98.

Anglis, marsh Bryum.

Habitat in palustribus turfosis et ad fontes. 2. V—VIII.

4. BRYUM anthera erecta oblonga minori, calyptis extincto-laxis æqualibus. *Sp. pl.* 1581. *Weis. crypt.* 185. *rium.*

Bryum caule brevissimo, calyptra cylindrica, longe aristata. *Hall. hist.* 1829.

Bryum calyptra extinctorii forma minus. *Dill. musc.* 349. *t. 45. f. 8.*

Bryum erectis capitulis, calyptra conica foliis serpylli pellucidis angustioribus. *R. syn.* 92.

Muscus

CRYPTOGAMIA MUSCI.

*Muscus capillaceus minimus calyptra longa conoide
nitida.* *Vaill. par. 137. t. 26. f. 1.*

5. *Bryum calyptora extinctorii figura, majus et ramosum.*
Dill. musc. 350. t. 45. f. 9.

Anglis, extinguisher Bryum.

*Habitat in ericetis montosis et rupibus circa Llanberris
frequens; in monte Ingleborough et alibi in comitatu
Eboracensi.* ⊙. X—VIII.

*subula-
tum.*

5. **BRYUM** antheris erectis subulatis, surculis acaulibus
*Sp. pl. 1581. Neck. dilig. Gallob. 456. Weis crypt.
187.*

*Bryum caule brevissimo, foliis lanceolatis, capsulis lon-
gissimis, operculo prælongo.* *Hall. hist. 1827.*

Bryum capsulis longis subulatis. *Dill. musc. 350. t.
45. f. 10.*

*Bryum erectis longis et acutis falcatis capitulis, ca-
lyptra subfuscata, foliis serpylli pellucidis.* *R. syn.
92.*

Muscus capillaris, corniculis longissimis incurvis.
R. hist. III. 34. Vaill. par. 133. t. 25. f. 8.

Anglis, subulated Bryum.

Habitat in aggeribus terrenis humidiusculis et sylvis. III.

rurale.

6. **BRYUM** antheris erectiusculis, foliis piliferis recur-
vis. *Sp. pl. 1581.*

*Bryum rurale unguiculatum hirsutum elatius et ra-
mosius.* *Dill. musc. 352. t. 45. f. 12.*

*Bryum majus erectis falcatis capitulis, foliis latiuscu-
lis extantibus, in pilum canescemt desinentibus.*
R. syn. 94.

*Hypnum caulis erectis, foliis lanceolatis pilo fluen-
te terminatis, capsulis erectis longe rostratis.* *Hall.
hist. 1789.*

*Muscus erectus hirsutis capitulis longis acutis ungui-
culis avicularum similibus, vulgatissimus.* *Hist.
Ox. III. 626. f. 15. t. 6. f. 1.*

*Muscus capillaris tectorum densis cæspitibus nascens
capitulis oblongis, foliis in pilum oblongum desi-
nentibus.* *Vaill. paris. 133. t. 25. f. 3.*

Anglis, hairy Bryum.

Habitat

Habitat in muris, tectis et arborum truncis. 24. III.
IV.

7. BRYUM antheris erectis, foliis piliferis rectiusculis, *murale*.
surculis simplicibus cæspitosis. Sp. pl. 1581.

Bryum cauliculis brevissimis, foliis ovato-lanceolatis
patulis pilo terminatis, capsulis aristatis. Hall.
hist. 1825.

Bryum tegulare humile pilosum et incanum. Dill.
musc. 355. t. 45. f. 14.

Bryum minus erectis minus falcatis capitulis, foliis
latiusculis congestis in pilum canescens definen-
tibus. R. syn. 94.

Muscus muralis, omnium vulgatissimus; villosus.
Vaill. par. 133. t. 24. f. 15.

β Bryum humile pilis carens, viride et pellucidum. Dill.
musc. 356. t. 45. f. 15.

Bryum cauliculo brevissimo, foliis ovatis lanceolatis
patulis, capsulis aristatis. Hall. hist. 1826.

Anglis, wall Bryum.

Habitat in muris, tectis et locis arenosis. 24. III. IV.

8. BRYUM acaulon, antheris erectis cylindricis, foliis *rigidum*.
patentibus linearibus convexis rigidis.

Bryum capitulis erectis, foliis carinatis siccitate cris-
pis. Nec. Meth. musc. 193.

Bryum acaulon, ericæ tenuifoliæ Gerardi, folio. Dill.
musc. 388. t. 49. f. 55.

Anglis, rigid Bryum.

Habitat in rupibus humidis; prope Wighmore in comi-
tatu Herefordiensi Littl. Brown. Dill. in rupibus
in monte Ingleborough in comitatu Eboracensi. 24.
XI.—VII.

Desc. Cauliculi brevissimi. Folia patentia, linearia in-
tegerrima, obtusiuscula, supra plana, subtus convexa,
nuda; Pedunculus terminalis solitarius, erectus, semiu-
cialis, purpureus. Calyptra conica, pallida. Anthe-
ra erecta cylindracea, ciliata, glabra. Operculum
acuminatum basi purpureum semilongitudine antheræ.

9. BRYUM antheris erectis subrotundis, operculo mu- truncatu-
cronato. lum.

CRYPTOGAMIA MUSCI.

- cronato. *Sp. pl.* 1584. *Weis crypt.* 191. *Fl. dan.* 537.
Bryum foliis ovato-lanceolatis, capsulis erectis ovatis aristatis. *Hall. hist.* 1833.
Bryum exiguum, creberrimis capsulis rufis. *Dill. musc.* 347. t. 45. f. 7.
Bryum exiguum, erectis parvis subrotundis creberri-
mis capitulis rufis, foliolis serpylli angustis pelluci-
dis. *R. syn.* 94.
Muscus coronatus minimus, foliis et capitulis oblon-
gis in pediculis brevissimis. *Hist. ox.* III. 631. s.
15. t. 7. f. 18.
Bryum parvum erectis subrotundis majusculis capi-
tulis subfuscis, foliis serpylli pellucidis. *R. syn.*
93.
Anglis, brown *Bryum*.
Habitat in pratis, pasuis et ericetis. ☽. III.

- viridu-
lum.* 10. *BRYUM* antheris erectis ovatis foliis lanceolatis acuminatis imbricato-patulis. *Sp. pl.* 1584.
Bryum foliis capillaribus, capsulis ovatis aristatis. *Hall. hist.* 1809.
Bryum capillaceum breve, pallide et læte virens, cap-
sulis ovatis. *Dill. musc.* 380. t. 48. f. 43.
Bryum trichoides exile, erectis capitulis in pediculis brevissimis. *Cat. giss.* 224. *R. syn.* 97.
Anglis, green *Bryum*.
Habitat in pratis, aggeribus foſſarum et ad vias. ☽.
 XII.—III:

- paludo-
sum.* 11. *BRYUM* acaulon, foliis setaceis, antheris obtu-
fissimis patulis. *Sp. pl.* 1584. *Weis crypt.* 194.
Neck. dillic. Gallob. 454.
Bryum foliis capillaribus, cauliculo sessili, capsulis ovatis aristatis. *Hall. hist.* 1810.
Bryum trychoides acaulon palustre minimum, setis et capsulis brevissimis. *Dill. musc.* 387. t. 49. f. 53.
Anglis, dwarf *Bryum*.
Habitat in palustribus arenosis et turfosis in comitatn
 Eboracenſi. D. Richardson. ☽. III—V.
 12. *BRYUM*

12. BRYUM antheris erectis oblongis, foliis linearibus *incurvum*. carinatis integerrimis incurvis.
Anglis, incurved Bryum.
Habitat in pascuis et rupibus circa Llanberris. D. Davies, 24. VI—X.
Desc. Caulis *erectus simplex, uncialis*; Folia alterna *erectiuncula, incurva, linearia, integerrima, acuta, carinata, nuda*; Pedunculus *terminalis, solitarius, erectus, uncialis*; Calyptra *conica, acuta, pallida*. Anthera *erecta oblonga s. cylindracea*; ore *denticulatociliata*; Operculum *conicum acutiusculum*.
13. BRYUM antheris *erectiusculis, pedunculis subso- undulatariis*, foliis lanceolatis carinatis undulatis patentibus ferratis. *Sp. pl. 1582. Weis crypt. 197. Fl. dan. 477.*
Bryum foliis lanceolatis ferratis, capsulis cylindricis inclinatis aristatis. *Hall. hist. 1823.*
Bryum phyllitidis folio rugoso acuto, capsulis incurvis. *Dill. musc. 360. t. 46. f. 18.*
Bryum capitulis oblongis rubentibus, foliis oblongis angustis pellucidis rugosis. *R. syn. 95.*
Anglis, undulated Bryum.
Habitat in aggeribus umbrosis et sylvis. 24. XII—VI.
14. BRYUM antheris *erectiusculis, operculo arcuato, glaucum*. foliis *erectis imbricatis, surculis ramosis.* *Sp. pl. 1582.*
Bryum albidum et *glaucum* fragile majus, foliis *erectis, setis brevibus.* *Dill. musc. 362. t. 46. f. 20.*
Bryum trichoides, *erectis capitulis, albidum fragile.* *Dill. giss. 225. R. syn. 97.*
Hypnum caulis *erectis teretibus, foliis imbricatis fragilibus, capsulis inclinatis aristatis.* *Hall. hist. 1785. Weis. crypt. 208.*
Anglis, white Bryum.
Habitat in ericetis et pascuis montosis. 24. IX—XI.
15. BRYUM antheris *erectis, operculo aciformi, foliis aciculare*. *erectis subsecundis.* *Sp. pl. 1583.*

Bryum

CRYPTOGAMIA MUSCI.

Bryum montanum hemiheterophyllum, operculis acutis. *Dill. musc.* 366. t. 46. f. 25.

Bryum hypnoides erectum montanum, erectis capitulis acutis. *R. syn.* 94.

β. *Bryum hypnoides aquaticum*, calyptris nigris acutis. *Dill. musc.* 367. t. 46. f. 26.

Bryum hypnoides repens aquaticum, erectis capitulis acutis. *R. syn.* 94.

Hypnum caulinibus teretibus, foliis imbricatis lanceolatis, capsulis erectis ovatis aristatis. *Hall. hist.* 1781.

Anglis, mountain *Bryum*.

Habitat in rupibus humidis et ad ripas rivulorum, in boreali parte Angliae frequens, et in Wallia. 4. V—X.

Obs. in a, caules et folia erecti; in β caules decumbentes et folia patentiuscula.

hypnoides. 16. *BRYUM* antheris erectis, caule erectiusculo, ramis lateralibus brevibus fertilibus. *Sp. pl.* 1585. *Weis crypt.* 211.

Bryum hypnoides hirsutie canescens vulgare. *Dill. musc.* 368. t. 47. f. 27.

Bryum trichoides erectis capitulis, lanuginosum. *R. syn.* 97.

γ. *Bryum hypnoides*, hirsutie virescens, fasciculare alpinum. *Dill. musc.* 370. t. 47. f. 28.

γ. *Bryum hypnoides alpinum*, setis et capsulis exiguis. *Dill. musc.* 370. t. 47. f. 29.

Hypnum caulinibus teretibus, foliis pilo aristatis, setis brevissimis. *Hall. hist.* 1782.

δ. *Bryum hypnoides alpinum* operculis obtusis. *Dill. musc.* 371. t. 47. f. 30.

ε. *Bryum hypnoides*, ericæ facie, capsulis barbatis, alpinum. *Dill. musc.* 371. t. 47. f. 31.

Bryum hypnoides, capitulis plurimis erectis non lanuginosum. *R. syn.* 458.

ζ *Bryum hypnoides polycephalon*, lanuginosum montanum. *Dill. musc.* 372. t. 47. f. 32.

Bryum hypnoides, capitulis plurimis erectis, lanuginosum. *Dill. musc.* 372. t. 47. f. 32.

Hypnum

Hypnum ramis alternis brevibus, foliis pilosis petiolis brevibus flexuosis. *Hall. hist.* 1780. *t.* 45. *f.* 4.

Muscus terrestris vulgari similis lanuginosus. *R. hist.* III. 45. *Hist. Ox.* III. 625. *f.* 15: *t.* 5. *f.* 7.

Anglis, hoary Bryum.

Habitat in ericetis montosis frequens. 4. XII—II.

17. BRYUM antheris erectiusculis, foliis recurvis acutis caule hirsuto. *Sp. pl.* 1583. *pellucidum*

Bryum foliis ovato-lanceolatis aristatis reflexis, capsulis ovatis obliquis. *Hall. hist.* 1824.

Bryum palustre pellucidum, capsulis et foliis brevibus recurvis. *Dill. musc.* 364. *t.* 46. *f.* 23.

Bryum erectis capitulis subrotundis fuscis, foliis minoribus pellucidis rugosis. *R. syn.* 96.

β. *Bryum* erectis capitulis brevibus, foliis reflexis. *R. syn.* 95. *Dill. musc.* 365. *t.* 46. *f.* 24.

Anglis, pellucid Bryum.

Habitat in palustribus et umbrosis humidis. 4. VI—IX.

18. BRYUM antheris erectis oblongis imberibus, foliis lanceolatis carinatis patentibus. *imberbe.*

Bryum antheris erectis ore dilatatis, foliis carinatis patulis. *Lin. mantiss.* 309.

Bryum foliis lanceolatis imbricatis capsulis erectis cylindricis aristatis. *Hall. hist.* 1814.

Bryum tenue imberbe et pallidum, foliis crebrioribus. *Dill. musc.* 382. *t.* 48. *f.* 46.

Bryum perangustis foliis et cauliculis, foliis crebrioribus et circa extremitates magis congestis, capitulis erectis, ad summitatem magis egredientibus. *R. syn.* 99.

Anglis, beardless Bryum.

Habitat in ericetis arenosis et aggeribus fossarum. ○. III. IV.

19. BRYUM antheris erectis oblongis, operculis filiforme setaceum, mibus longitudine antherarum. *Fl. Engl.* 409.

Bryum stellare nitidum pallidum, capsulis tenuissimis, *Dill. musc.* 381. *t.* 48. *f.* 44.

CRYPTOGAMIA MUSCI.

- Bryum trichoides exile pallidum, erectis capitulis e surculis annotinis egredientibus. *R. syn.* 96.
Mnium antheris erectis, operculis filiformibus longitudine antherarum. *Sp. pl.* 1575.
Hypnum caulinis teretibus, foliis lanceolatis repandis, capsulis erectis cylindricis aristatis. *Hall. hist.* 1788. *Weis. crypt.* 206.
B. Bryum stellare lacustre, foliis rubris capillaceis. *Dill. musc.* 382. t. 48. f. 45.
Anglis, setaceous Bryum.
Habitat in aggeribus fossarum, sepibus et muris. ○. III.

- unguicu-* 20. **BRYUM** antheris erectis oblongis, operculo acuminato obliquo, foliis linear-lanceolatis carinatis. *Bryum capsulis urceolatis* operculo longo obliquo, foliis lanceolatis tortilibus, caulinis erectis. *Schreb. spic.* 78.
Bryum unguiculatum et barbatum, surculis in summitate crassioribus. *Dill. musc.* 383. t. 48. f. 47.
Bryum angustis viridibus foliis capitulis erectis, brevibus pediculis insidentibus, calyptora falcata vel avium unguiculos referente. *R. syn.* 96.
Muscus capillaris, capitulis erectis lageniformibus. *Buxb. cent.* II. t. 2. f. 9.
Anglis, birds-claw Bryum.
Habitat in muris et arenosis. ○. III. IV.

- purpure-* 21. **BRYUM** antheris erectiusculis ovatis, caule bifido, axillis pedunculiferis, foliis lanceolatis acutis carinatis.
Bryum foliis lanceolatis subulatis, capsulis erectis operculis conicis. *Hall. hist.* 1816.
Bryum tenue stellatum, setis purpureis. *Dill. musc.* 386. t. 49. f. 51.
Bryum perangustis foliis et caulinis, foliis crebrioribus et circa summitates magis congestis, capitulis erectis e surculis annotinis egredientibus. *R. syn.* 99.
Mnium caule dichotomo, axillis pedunculiferis, anthera erecta, foliolis carinatis. *Sp. pl.* 1075.
B. Bryum tenue barbatum, foliis angustioribus et rarioribus. *Dill. musc.* 384. t. 48. f. 49.

Bryum

Bryum foliis lanceolatis imbricatis capsulis cylindricis aristatis. *Hall. hist.* 1817.

Bryum perangustis foliis et caulinis, foliis rarioribus, cinctis, capitulis erectis, e surculis annotinis egredientibus. *Cat. giss.* 225. *R. syn.* 99.

γ *Bryum* foliis lanceolatis, laxe imbricatis, capsulis cylindricis obliquis, operculis conicis. *Hall. hist.* 1818.

Bryum polytrichoides palustre, setis longioribus rubris sericeis. *Dill. musc.* 387. t. 49. f. 52.

Bryum perangustis crebrioribus foliis, capitulis erectis longiusculis, pediculis e surculis annotinis nascentibus. *R. syn.* 99.

Anglis, purple Bryum.

Habitat in muris, ericetis et pascais glareosis. ⊖. III. IV.

22. *BRYUM* antheris erectiusculis, pedunculis aggregatis, foliis secundis recurvatis, caule declinato. *Scoparium um.* *Sp. pl.* 1582.

Bryum reclinatum, foliis falcatis, scoparium effigie. *Dill. musc.* 357. t. 46. f. 16.

Bryum erectis capitulis, angustifolium, caule reclinato. *Dill. giss.* 222. *R. syn.* 95.

Hypnum foliis falcatis heteromallis, vaginis multifloris. *Hall. hist.* 1777. *Weis. crypt.* 213.

Muscus coronatus medius, foliis tenuissimis pallidis longioribus, capitulis erectis acutis. *Hist. Ox.* III. 630. f. 15. t. 7. f. 11.

Anglis, broom Bryum.

Habitat in ericetis et sylvis. 24. VI—VII.

23. *BRYUM* antheris erectis ovalibus, pedunculis lateralis foliis setaceis secundis.

Bryum foliis mollibus subulatis, setis brevissimis alaris, capsulis ovatis. *Hall. hist.* 1202. t. 46. f. 8.

Anglis, lateral Bryum.

Habitat in sylvis et ad ripas rivularum in Scotia; in monte Hart-fell prope Moffat. D. Sheffield. 24.VII. IX.

CRYPTOGAMIA MUSCI.

Desc. Caules cæspitosi, unciales et triunciales, erectiusculi purpurascentes, basi tomentosi; tomento fulvo, subsimplici. Folia numeroſa, secunda, setacea, viridiflava, mollia, longa. Pedunculi laterales, axillares, erecti, breves, filiformes, purpurei. Calyptra conica, acuta, pallida, caduca. Anthera erecta, subrotunda, ciliata, fulva. Operculum conicum, brevissimum, rubescens.

- hetero-* 24. BRYUM antheris erectis ovatis, pedunculis terminalibus, foliis setaceis secundis.
mallum. Bryum antheris erectis, foliis setaceis secundis. Sp. pl. 1583. Fl. dan. 479.
Bryum heteromallum. Dill. musc. 371. t. 47. f. 37.
Bryum trichoides reclinatis cauliculis, capitulis erectis acutis. R. syn. 96.
Muscus trichoides, foliis capillaceis, capitulis minotribus. Hist. Ox. III. 628. s. 15. t. 6. f. 5.
Bryum pilosum interrupte falcatum. Dill. musc. 376. t. 47. f. 38.
Anglis, heath Bryum.
Habitat in ericetis. ○. III. V.
- flexuo-* 25. BRYUM antheris erectis oblongis, pedunculis terminalibus flexuosis, foliis setaceis erectis.
sum. Bryum antheris erectis foliis setaceis, pedunculis flexuosis. Sp. pl. 1583.
Bryum foliis capillaceis, capsulis cylindricis, operculis aristatis. Hall. hist. 1804.
Bryum pilosum molle, setis intortis. Dill. musc. 373. t. 47. f. 33.
Bryum trichoides capitulis erectis, pediculis intortis tenuibus virentibus. Dill. giss. 225. R. syn. 97.
Anglis, waved Bryum.
Habitat in rupibus circa Llanberris. Dill. 4. IV—VI.
- acutum.* 26. BRYUM antheris erectis subrotundis, foliis setaceis erectis, surculis ramosis acutis.
Bryum pilosum sphagni subulati facie. Dill. musc. 374. s. 47. t. 34.
Anglis,

CRYPTOGAMIA MUSCI.

485

Anglis, pointed Bryum.

Habitat in montibus circa Llanberris. Dill. VIII—V.

27. BRYUM antheris erectis oblongis, foliis patentibus æstivum.
setaceis distantibus, surculis filiformibus.

Bryum antheris erectis subrotundis axillaribus, foliis
subulatis distantibus. Fl. angl. 411. Sp. pl. 1585.

Weis. crypt. 195. Schreb. spicil. 77.

Bryum caulis erectis, foliis capillaribus vagis, cap-
sulis cylindricis, operculo conico. Hall. hist. 1806.
t. 45. f. 1.

Bryum palustre æstivum conservæ facie. Dill. musc.
375. t. 47. f. 39.

Bryum angustissimis foliis crebrioribus, capitulis erectis
brevibus, pediculis e surculis novis et longis enas-
centibus. R. syn. 99.

Anglis, spring Bryum.

Habitat in rupibus et montosis humidis, in comitatu Ebo-
racensi. D. Richardson. circa Llanberris. D. Davies.
in monte Ingleborough copiose. 24. IV—VI.

28. BRYUM antheris erectis, pedunculis arefactione verticilla-
contortis, foliis piliferis, surculis fastigiatis. Sp. pl. tum.
1585.

Bryum caulinis subnudis ramosis, foliis subulatis
brevibus, capsulis ovatis. Hall. hist. 1811.

Bryum pilosum verticillatum. Dill. musc. 374. t. 47.
f. 35.

Bryum trichoides brevifolium angustis caulinis,
capitulis erectis parvis et minus aduncis. R. syn.
98.

Anglis, verticillated Bryum.

Habitat in rupibus humidis in comitatu Eboracensi.
D. Richardson. in rupibus maritimis prope Bangor.
D. Brewer. 24. IV—VIII.

29. BRYUM antheris erectis ovatis, foliis subulatis cirratum.
arefactione revolutis.

Bryum cirratum et stellatum, tenuioribus foliis. Dill.
musc. 379. t. 48. f. 42.

CRYPTOGAMIA MUSCI.

- Bryum trichoides exile erectis capitulis in pediculis longioribus rubris. *Dill. giss.* 224. *R. syn.* 97.
Mnium foliis arefactione revolutis. *Sp. pl.* 1576.
Hypnum foliis capillaceis congestis, crispescientibus, capsulis ovato-cylindricis, brevissime ciliatis. *Hall. hist.* 1786. *Weis. crypt.* 207.
Muscus coronatus minimus, capillaceis foliis, capitulis oblongis. *Hist. Ox.* III. 631. f. 15. t. 7. f. 19.
β. *Bryum cirratum*, setis et capsulis brevioribus et pluribus. *Dill. musc.* 378. t. 48. f. 41.
Bryum trichoides erectis sublongis capitulis, extremitatibus per siccitatem stellatis. *R. syn.* 98.
γ. *Bryum perangustis* et brevissimis foliis, extremitatibus stellatis. *Dill. giss.* 226. *R. syn.* 98.
Anglis, starry Bryum.
Habitat in sylvis et ericetis montosis. 24. III—VII.

- tortuo-*
sum. 30. **BRYUM** antheris erectis, foliis setaceis imberibus arefactione retortis. *Syst. nat.* 702. *Sp. pl.* 1583.
Bryum cirratum, setis et capsulis longioribus. *Dill. musc.* 377. t. 48. f. 40.
Bryum trichoides longifolium, crassiusculis caulinis, capitulis erectis aduncis acutis. *R. syn.* 98.
Hypnum foliis subulatis cincinnatis, capsulis cylindricis, longissime ciliatis. *Hall. hist.* 1787. t. 45. f. 2.
Muscus alpinus cirrhosus f. crinum tortorum instar crispati. *Sch. it. alp.* 65. t. 19. f. 5.
Anglis, frizzled Bryum.
Habitat in ericetis et rupibus montosis. 24. VIII.—X.

*** *Antheris nutantibus.*

- simplex.* 31. **BRYUM** antheris oblongis nutantibus, foliis subulatis, surculo simplicissimo medio pedunculifero. *Sp. pl.* 1587. *Schreb. spicil.* 81.
Bryum caulinis cernuis, foliis capillaceis heteromallis, capsulis curvulis cylindricis, operculis conicis. *Hall. hist.* 1808.
Bryum trichoides, capsulis rubris cernuis. *Dill. musc.* 390. t. 50. f. 59.
Anglis,

CRYPTOGAMIA MUSCI.

487

Anglis, simple Bryum.

Habitat in locis gramineis arenosis. ♂. III. IV.

32. BRYUM antheris subrotundis, pedunculis reflexis, pulvinata foliis piliferis. Sp. pl. 1586. Weis. crypt. 201. tum.

Bryum foliis lanceolatis pilo terminatis, capsulis pendulis ovatis aristatis. Hall. hist. 1822.

Bryum orbiculare pulvinatum hirsutie canescens, capsulis immersis. Dill. musc. 395. t. 50. f. 65.

Bryum trichoides hirsutie canescens, capitulis subrotundis reflexis, in perbrevibus pediculis. Dill. giss. 226. R. syn. 100.

Muscus capillaceus lanuginosus minimus. Vaill. paris. 133. t. 29. f. 2.

Anglis, grey Bryum.

Habitat in muris et tectis. ♀. III. IV.

33. BRYUM antheris nutantibus turbinatis, foliis setaceis.

Bryum foliis capillaceis capsulis pyriformibus pendulis. Hall. hist. 1813. t. 45. f. 7. operculo brevissimo rotundata. Schreb. spicil. 81.

Bryum trichoides aureum, capitulis pyriformibus nutantibus. Deer. cat. Nottingh. App. Dill. Musc. 391. t. 50. f. 60.

Mnium antheris pendulis turbinatis, stipite filiformi, pyriformibus femineis setiferis. Sp. pl. 1576. forme.

Anglis, golden Bryum.

Habitat in rupibus Parci Nottinghamsis. D. Deering. ♀. IV—VI.

34. BRYUM antheris pendulis oblongis, foliis lanuginosum. acutis carinatis.

Bryum foliis lanceolatis subulatis, capsulis urceolatis cernuis, operculo conico. Schreb. spicil. 81.

Bryum trichoides læte virens, capitulis cernuis oblongis. R. syn. 100. Dill. musc. 391. t. 50. f. 61.

Anglis, silky Bryum.

Habitat in ericetis montosis, prope Woolwich; Dill. circa Llantberis. D. Davies. in monte Ingleborough et alibi in comitatu Eboracensi. ♀. III—VII.

CRYPTOGAMIA MUSCI:

- cæspitici-* 35. BRYUM antheris pendulis, foliis lanceolatis, acuminato-setaceis, pedunculis longissimis. *Sp. pl.* 1586.
cæspiticium et pilosum; seta bicolori. *Dill. musc.* 396. *t.* 50. *f.* 66.
Bryum trichoides capitulis reflexis, pediculis ima medietate rubris, summa luteo-virentibus. *R. syn.* 100.
Hypnum foliis ovato-lanceolatis aristatis patulis, capsulis ovatis obtusis pendulis. *Hall. hist.* 1790. *Weis. crypt.* 203.
Muscus trichoides, capitulo parvo reflexo, pediculo ima medietate rubro, summa luteo-viridi. *Hist. Ox.* III. 629. *f.* 15. *t.* 6. *f.* 15.
Muscus capillaceus minimus, capitulo nutante, pediculo purpureo. *Vaill. paris.* 134. *t.* 29. *f.* 7.
Anglis, matted Bryum.
Habitat in muris et glareosis. 4, III. IV.
- capillare.* 36. BRYUM antheris pendulis, foliis ovatis setiferis carinatis, pedunculis longissimis. *Sp. pl.* 1586.
Bryum foliis latiusculis congestis, capsulis longis nutantibus. *Dill. musc.* 398. *t.* 50. *f.* 67.
Bryum capitulis reflexis, foliis latiusculis congestis. *Dill. giss.* 227. *R. syn.* 100.
Hypnum foliis ovato-lanceolatis aristatis, capsulis ovatis pendulis, operculis conicis. *Hall. hist.* 1791. *Weis. crypt.* 205.
Muscus capillaris, foliis latiusculis congestis, capitulo longis reflexis. *Hist. Ox.* III. 629. *f.* 15. *t.* 6. *f.* 19.
Muscus capillaceus major, capitulis crassioribus cylindraceis nutantibus. *Vaill. paris.* 134. *t.* 24. *f.* 6.
Anglis, capillary Bryum.
Habitat in sylvis, ericetis, solo glareoso. 4. IV. V.
Obs. nimis affinis præcedenti.
- hygrome-* 37. BRYUM antheris nutantibus turbinatis, calyptra tetragona, foliis ovatis conniventibus.
tricum. *Bryum* bulbiforme aureum, calyptra quadrangulari, capsulis pyriformibus nutantibus. *Dill. musc.* 407. *t.* 52. *f.* 75.

Bryum

Bryum aureum, capitulis reflexis pyriformibus, calyptra quadrangulari, foliis in bulbi formam congestis.

R. syn. 101.

Mnium acaule anthera nutante, calyptra reflexa tetragona. *Sp. pl.* 1575. *Weis. crypt.* 147.

Mnium foliis ovato-lanceolatis conniventibus, capsulis ovatis reflexis. *Hall. hist.* 1852.

Muscus capillaris f. *Adiantum aureum minus*. *Ger. em.* 1559.

Polytrichon aureum minus. *Park.* 1052.

Anglis, yellow Bryum.

Habitat in sylvis, ericetis, hortis et ad semitas. ○. III—V.

38. *BRYUM* antheris pendulis, surculis cylindricis im- *argente-* bricatis lævibus. *Sp. pl.* 1586. *Weis. crypt.* 199. um.

Bryum caulinibus teretibus, capsulis ovatis acuminatis pendulis. *Hall. hist.* 1821.

Bryum pendulum julaceum argenteum et sericeum.

Dill. musc. 392. t. 50. f. 62.

Bryum capitulis subrotundis reflexis, caulinis teretibus argenteis. *Dill. giss.* 226. *R. syn.* 100.

Muscus minimus e viridi argenteus, capitulis oblongis. *Hist. Ox.* III. 629. f. 15. t. 6. f. 17.

β. *Bryum pendulum* surculis teretibus viridibus. *Dill. musc.* 314. t. 50. f. 69.

Anglis, silver Bryum.

Habitat in muris, tectis, apricis et rupibus. 24. X—II.

39. *BRYUM* antheris pendulis subglobosis, foliis acutis *carneum*. alternis. *Sp. pl.* 1587.

Bryum foliis lanceolatis rarioribus, capsulis ovatis pen- dulis. *Hall. hist.* 1834. t. 45. f. 6.

Bryum lanceolatum pellucidum, capsulis rotundis pen- dulis carneis. *Dill. musc.* 400. t. 50. f. 69.

Bryum nitidum, foliis serpylli pellucidis angustioribus, reflexis capitulis, carni coloris. *R. syn.* 102.

β. *Bryum nitidum* perangustis serpyllinis pellucidis foliis, reflexis capitulis subrotundis virentibus, lon- gioribus pediculis insidentibus. *R. syn.* 102.

Anglis, shining Bryum.

Habitat in pascuis, et locis uidis. 24. III. IV.

CRYPTOGAMIA MUSCI.

- alpinum.* 40. BRYUM antheris pendulis oblongis, foliis imbricatis ovatis acutis carinatis, surculis ramosis, axillis pedunculiferis. *Fl. Angl.* 415. *Lin. Mant.* 309.
Bryum hypnoides pendulum sericeum, coma insigni atro-rubente. *Dill. musc.* 394. *t.* 50. *f.* 64.
Anglis, alpine Bryum.
Habitat in rupibus tenui terra tectis, prope Castellum quoddam dirutum, non longe a Llanberris. Dill. *et in boreali parte Britanniæ.* 4. IV—VI.
- anneti-
num.* 41. BRYUM antheris nutantibus oblongis, pedunculis subradicalibus, foliis ovatis acuminatis pellucidis.
Bryum annotinum lanceolatum pellucidum, capsulis oblongis pendulis. *Dill. musc.* 399. *t.* 50. *f.* 68.
Mnium foliis ovatis acuminatis pellucidis, pedunculis radicalibus, anthera nutante. *Sp. pl.* 1576.
Weis. crypt. 151.
Anglis, wood Bryum.
Habitat in sylvis et umbrosis humidis. 4. III. IV.
- trique-
trum.* 42. BRYUM antheris pendulis oblongis, foliis trifariis patulis subulato-lanceolatis carinatis, surculis ramosis.
Bryum annotinum palustre, capsulis ventricosis pendulis. *Dill. musc.* 404. *t.* 51. *f.* 72.
Bryum nitidum foliis serpylli angustioribus, majus. *Dill. giss.* 228. *R. syn.* 102.
Mnium foliis trifariis patulis subulato-lanceolatis carinatis. *Sp. pl.* 1578.
Mnium caulis prælongis rubiginosis, foliis ovato-lanceolatis, capsulis ovato pendulis. *Hall. hist.* 1849.
Muscus capillaris major et elatior, capitulis longis et obtusis deorsum reflexis et veluti pendulis præaltis pediculis rubris. *Hist. Ox.* III. 629. *f.* 15. *t.* 6. *f.* 20.
Bryum lanceolatum bymum, setis et capsulis longis pendulis. *Dill. musc.* 405. *t.* 51. *f.* 73.
Bryum nitidum foliis serpylli pellucidis angustis, capitulis tumidis nutantibus, præaltis pediculis e surculis annotinis egredientibus. *R. syn.* 102.

Mnium

Mnium caulinis rubiginosum, foliis lanceolatis alternis, capsulis pendulis pyriformibus obtusis. Hall. hist. 1847.

v. *Bryum palustre complicatum rubens capsulis turbinatis pendulis.* Dill. musc. 406. t. 51. f. 74.

Bryum nitidum rubens, capitulis reflexis, foliis angustis pellucidis, caulinis proliferis. R. syn. 102.

Anglis, triangular Bryum.

Habitat in paludibus turfosis et palustribus. 4. IV.

V.

43. **BRYUM** antheris pendulis oblongis, calyptra re-crudum. curvata, foliis ovatis acutis pellucidis, surculis simplicissimis.

Bryum pendulum hornum molle, foliis et lanceolatis et gramineis. Dill. musc. 401. t. 50. f. 70.

Mnium antheris pendulis, calyptra recurvata, foliis pellucidis. Sp. pl. 1576.

Anglis, transparent Bryum.

Habitat in sylvis et locis humidis in Cambria. Dill. in sylvis circa Rydall in comitatu Westmorlandico. 4. IV—VI.

44. **BRYUM** antheris nutantibus oblongis, pedunculo hornum. curvato, foliis lanceolatis ferrulatis.

Bryum stellare hornum sylvarum, capsulis magnis nutantibus. Dill. musc. 402. t. 51. f. 71.

Bryum nitidum, capitulis majoribus reflexis, calyptra imum virgente, pediculis oblongis e caulinis novis egredientibus. R. syn. 102.

Mnium antheris pendulis, pedunculo curvato, surculo simplici, foliolis margine scabris. Sp. pl. 1576.

β. *Bryum nitidum foliis serpilli angustioribus, medium.* Dill. giss. 228. R. syn. 103.

Muscus polytrichoides humilior, foliis brevioribus raris, pallide viridentibus et vix pellucidis. Hist. Ox. III. 630. s. 15. t. 6. f. 3.

Anglis, swan's neck Bryum.

Habitat in sylvis et umbrosis humidiusculis. 4. IV.

V.

CRYPTOGAMIA MUSCI.

- Serpullifolium.* 45. *BRYUM* antheris pendulis oblongis, pedunculis subaggregatis, foliis patentibus pellucidis.
Mnium pedunculis aggregatis, foliis patentibus pellucidis. *Sp. pl.* 1577.
- punctatum.* *Mnium* pedunculis aggregatis, foliis obovatis integerimis obtusis punctatis. *Sp. pl.* 1577. *Weis. crypt.* 153.
Mnium foliis ovatis integerimis, capsulis pendulis ovatis aristatis. *Hall. hist.* 1845. *u.s.*
Bryum pendulum serpyllifolio rotundiore pellucido, capsulis ovatis. *Dill. musc.* 416. t. 53. f. 81.
Bryum nitidum serpylli rotundis et latioribus foliis pellucidis. *R. syn.* 103.
Muscus polytrichoides palustris major, serpylli latiore folio pellucido. *Hist. Ox.* III. 627. f. 15. t. 6. f. 39.
- $\beta.$ *Bryum* pendulum serpylli folio longiore pellucido, capsulis oblongis cuspidatis. *Dill. musc.* 416. t. 53. f. 80.
- $\gamma.$ *Mnium* pedunculis aggregatis, foliis alternis acutis ferratis. *Sp. pl.* 1577. *Weis. crypt.* 155.
Mnium foliis ovato-lanceolatis confertis ferratis, capsulis nutantibus obtusis. *Hall. hist.* 1841.
- Bryum* pendulum, foliis variis pellucidis, capsulis ovatis. *Dill. musc.* 413. t. 53. f. 79.
- $\delta.$ *Mnium* pedunculis aggregatis, foliis rosaceo-congestis lanceolatis acutis. *Sp. pl.* 1578.
- Bryum* stellare roseum majus, capsulis ovatis pendulis. *Dill. musc.* 411. t. 52. f. 77.
Bryum roseum majus, foliis oblongis. *R. syn.* 92.
Muscus coronatus humilis, foliolis latioribus stellatim nascentibus donatus. *Hist. Ox.* III. 630. f. 15. t. 7. f. 9.
- $\epsilon.$ *Bryum* stellare roseum pendulum minus, capsulis et fetis longioribus. *Dill. musc.* 412. t. 52. f. 78.
Bryum roseum minus, foliis subrotundis. *R. syn.* 92.
Muscus parvus stellaris. *B. pin.* 361. *Ger. em.* 1563.
Park. 1308.
- $\zeta.$ *Mnium* pedunculis aggregatis, foliis oblongis undulatis. *Sp. pl.* 1578.

Bryum

Bryum dendroides polycephalon phyllitidis folio undulato pellucido, capsulis ovatis pendulis. *Dill. musc.* 410. *t. 52. f. 76.*

Bryum nitidum foliis oblongis undulatis, capitulis cernuis arbusculam referens. *R. syn.* 103.

Muscus ad polytrichoidon accedens ramosus, foliis longis lucidis et veluti crispis. *Hist. Ox.* III. 630. *f. 15. t. 6. f. 1.*

Anglis, thyme-leaved *Bryum*.

Habitat in sylvis et ericetis humidiusculis. 4. IV.

H Y P N U M. 1195.

Masc. *Anthera operculata*. *Calyptra lœvis*. *Filamentum* ortum e perichaetio.

Fem. *Pistila solitaria*, ex alis foliorum, nudæ plumulæ.

* *Frondibus pinnatis.*

1. HYPNUM fronde simplicissima pinnata lanceo-*bryoïdes*-lata apice pedunculifera. Sp. pl. 1588. Weis. crypt. 217. Fl. Dan. 473. f. 1.

Hypnum foliis planis pinnatis, parium septem, setis ex summitate. Hall. hist. 1776.

Hypnum taxiforme exiguum, versus summittatem capsuliferum. Dill. musc. 262. t. 34. f. 1.

Hypnum repens filicifolium non ramosum, pediculis brevibus versus foliorum summittatem egredientibus. R. syn. 88.

Muscus polytrichoides, exiguis capitulis in extremis caulinulis s. foliis, subrotundis erectis. Hist. Ox. III. f. 15. t. 6. f. 11. Vaill. paris. 136. t. 24. f. 13.

Anglis, dwarf *Hypnum*.

Habitat in umbrosis et ad sepes. ⊙. II—V.

2. HYPNUM fronde simplicissima pinnata lanceolata *taxifoli-basi* pedunculifera. Sp. pl. 1587. Weis. crypt. 216. um. Fl. dan. 473. f. 2.

Hypnum foliis planis pinnatis, parium duodecim, setis radicalibus. Hall. hist. 1775.

Hypnum taxiforme minus, basi capsulifera. Dill. musc. 263. t. 34. f. 2.

Hypnum

CRYPTOGAMIA MUSCI.

Hypnum repens filicifolium non ramosum, pediculis brevioribus ad radicem egredientibus. R. syn. 88.
Muscus pennatus, capitulis adiante. Vaill. paris. 136.
t. 2. f. 11.

Anglis, yew-leaved Hypnum.

Habitat in sylvis et umbrosis. 4. II—V.

adiantoides. 3. HYPNUM fronde pinnata ramosa erecta medio pedunculifera. Sp. pl. 1588.

Hypnum foliis planis, pinnarum paribus quadraginta. Hall. hist. 1774.

Hypnum taxiforme palustre ramosum, majus et erectum. Dill. musc. 264. t. 34. f. 3.

Hypnum erectum filicifolium ramosum, pinnulis acutis. R. syn. 87.

Muscus taxiformis ramosus. Vaill. paris. 136. t. 28.
f. 5.

Anglis, upright Hypnum.

Habitat in paludosis et ericetis humidis. 4. III. IV.

sylvaticum. 4. HYPNUM fronde pinnata ramosa decumbente, foliolis acutis medio pedunculifera. Fl. Angl. 419.
Lin. Mant. II. 310. Schreb. spicil. 87.

Hypnum denticulatum pinnatum, pinnis simplicibus rectioribus. Hall. hist. 1773.

Hypnum denticulatum pinnatum, pinnulis simplicibus rectioribus. Dill. musc. 267. t. 34. f. 6.

Hypnum repens filicifolium ramosum pedunculis et capitulis longioribus e foliorum alis egredientibus, foliolis utrinque simplicibus. R. syn. 88.

Anglis, wood Hypnum.

Habitat in sylvis ad arborum radices. 4. IV. V.

denticulatum. 5. HYPNUM fronde pinnata simplici, pinnis duplicatis basi pedunculifera. Sp. pl. 1588. Schreb. spicil. 86.

Hypnum foliis laxis pinnatis ovato-lanceolatis aristatis retroversis. Hall. hist. 1772.

Hypnum denticulatum pinnatum, pinnulis duplicatis recurvis. Dill. Musc. 266. t. 34. f. 5.

Hypnum repens filicifolium non ramosum pediculis et capitulis

CRYPTOGAMIA MUSCI.

495

capitulis longioribus ad radicem egredientibus, foliolis utrinque duplicatis. R. syn. 88.

Muscus pennatus denticulatus minor. Vaill. paris.

137. t. 29. f. 8.

Anglis, dented Hypnum.

Habitat in sylvis et umbrosis humidis et ad truncos arborum. 4. III. IV.

6. HYPNUM fronde pinnata ramosa : foliolis imbricatis ~~complacatis~~ complicatis compressis. Sp. pl. 1588. Weis. natum. crypt. 218.

Hypnum caule disticho, foliis ovatis planis, capsulis ovatis aristatis. Hall. hist. 1771.

Hypnum pennatum compressum et splendens, capsulis ovatis. Dill. musc. 268. t. 34. f. 7.

Hypnum repens filicifolium ramosum, ramulis compressis et magis complanatis. R. syn. 87.

Muscus trichomanoides filicifolius splendens. Vaill. paris. 139. t. 23. f. 4.

β. Hypnum pennatum trichomanoides splendens et ramosum. Dill. musc. 269. t. 34. f. 8.

Hypnum erectum filicifolium ramosum pinnulis obtusis. R. syn. 87.

Anglis, flat Hypnum.

Habitat ad arborum truncoſ frequens. 4. III. IV.

** *Surculis vagis.*

7. HYPNUM surculis ramosis, frondibus subpinnatis, lucens. foliolis punctatis. Sp. pl. 1589.

Hypnum pennatum aquaticum lucens, longis latisque foliis. Dill. musc. 270. t. 34. f. 10.

Hypnum repens filicifolium ramosum, foliolis majoribus magisque crebris. R. syn. 88.

Anglis, shining Hypnum.

Habitat in sylvis et umbrosis uidis. 4. IV—VI.

8. HYPNUM surculis ramosis, frondibus subpinnatis, undulatis foliolis undulatis complicatis. Sp. pl. 1589. Weis. tum. crypt. 220.

Hypnum pennatum undulatum, lycopodii instar sparsum. Dill. musc. 271. t. 36. f. 11.

CRYPTOGAMIA MUSCI.

Hypnum caule plano, foliis distichis ovatis rugosis nitidis, operculo conico. *Hall. hist.* 1770.

Hypnum repens crispum, cauliculis compressis, lyco-podii in morem per terram sparsis. *R. syn.* 88.

Anglis, waved Hypnum.

Habitat in sylvis, umbrosis et rupibus humidis. 24. III. IV.

crispum. 9. *HYPNUM surculis ramosis, frondibus subpinnatis: foliolis undulatis planis.* *Sp. pl.* 1589. *Weis. crypt.* 221.

Hypnum caule plano, foliis distichis ovatis nitidis, transversim undulatis operculis aristatis. *Hall. hist.* 1769. t. 46. f. 5.

Hypnum pennatum undulatum crispum, setis et capsulis brevibus. *Dill. musc.* 273. t. 36. f. 12.

Hypnum repens crispum, ramulis compressis, filicinorum more dispositis. *R. syn.* 80.

Muscus terrestris major, ramulis compressis, foliis superficie crispis. *Hist. Ox.* III. 625. f. 15. t. 5. f. 10.

Anglis, curled Hypnum.

Habitat in sylvis, ericetis, rupibus, et nemorosis cretaceis frequens. *Prope Gravesend copiose.* *R. syn.* 24. III. IV.

trique-trum. 10. *HYPNUM ramis vagis recurvis, foliis ovatis recurvatis patulis.* *Sp. pl.* 1589. *Weis. crypt.* 222.

Hypnum foliis hispidis ovato-lanceolatis aristatis. *Hall. hist.* 1729.

Hypnum vulgare triangulum maximum et pallidum. *Dill. musc.* 293. t. 38. f. 28.

Hypnum repens triangularibus majoribus et pallidioribus foliis. *Dill. giss.* 219. *R. syn.* 80.

Muscus squamosus major f. vulgaris. *Vaill. paris.* 137. t. 28. f. 9.

Anglis, triangular Hypnum.

Habitat in sylvis et pascuis sterilibus. 24. IX—I.

rutabu-lum. 11. *HYPNUM ramis vagis subrepentibus, foliolis ovatis mucronatis imbricatis.* *Sp. pl.* 1589. *Weis. crypt.* 224.

Hypnum

CRYPTOGAMIA MUSCI.

497

- Hypnum foliis ovato-lanceolatis patulis striatis breviter aristatis, operculis conicis. *Hall. hist. 173.*
- Hypnum dentatum vulgatissimum, operculis obtusis. *Dill. musc. 295. t. 38. f. 29.*
- Hypnum repens triangularibus angustioribus foliis. *R. syn. 80.*
- Muscus myosuroides, rutabuli fructu. *Vaill. paris. 27. f. 8.*
- Muscus erectus major, foliis angustioribus acutis. *Vaill. paris. t. 23. f. 2.*
- ♂ Hypnum palustre erectum breve, foliis brevibus angustis tenuibus confertis. *R. syn. 83.*
- ♀ Hypnum striatum, ramis vagis recurvis, foliis ovatis lineatis acutis undique patentibus, operculis cuspidatis. *Schreb. spicil. 91.*
- Hypnum vulgare dentatum, operculis cuspidatis. *Dill. musc. 297. t. 38. f. 30.*
- Hypnum repens triangularibus minoribus foliis, pediculis et capitulis brevioribus et tumidioribus, minus. *R. syn. 80.*
- ♂ Hypnum ruscifolium, surculo repente, ramis imbricatis setiferis, foliis carinatis, capitulo subrotundo incurvo acuminato. *Neck. meth. musc. 181.*
- Hypnum foliis ovato-lanceolatis acutissimis, operculis aristatis. *Hall. hist. 1731. Weis. crypt. 225.*
- Hypnum foliis rusciformibus, capsulis subrotundis. *Dill. musc. 298. t. 38. f. 31.*
Anglis, toothed Hypnum.
- Habitat in sylvis, ericetis et sepibus. 24. IX—XII.

12. HYPNUM surculis vagis ramosissimis, ramis filiforme. formibus teretiusculis, antheris obliquis. *Fl. angl. 421. Mant. II. 308.*
- Hypnum surculo ramosissimo decumbente, ramis teretibus, capitulis erectis acutis. *Neck. meth. musc. 179.*
- Hypnum surculis ramosissimis : ramis rectis teretibus multifloris, capsulis erectis. *Schreb. spicil. 97.*
- Hypnum foliis perangustis, filo terminatis, capsulis inclinatis breviter aristatis. *Hall. hist. 1755.*
- Hypnum sericeum ramosius et tenuius, capsulis acuminatis. *Dill. musc. 327. t. 42. f. 62.*

L I

Hypnum.

CRYPTOGAMIA MUSCI.

Hypnum repens trichoide terrestre, priori viridius et minus, capitulis cernuis minus tumidis. *R. syn.* 84.
Anglis, filiforme *Hypnum*.

Habitat in arborum truncis. 4. II.

*** *Surculis pinnatis*.

filicinum. 13. *HYPNUM surculis pinnatis*: ramulis distantibus foliis imbricatis incurvis acutis secundis. *Sp. pl.* 1590. *Neck. delic. gallob.* 470.

Hypnum caulinis pinnatis, pinnis distantibus alterne longioribus, ex apice confertis, foliis cincinnatis. *Hall. hist.* 1766.

Hypnum repens filicinum crispum. *R. syn.* 85. *Dill. musc.* 282. t. 136. f. 19.

Muscus filicinus palustris. *Vaill. paris.* 138. t. 29. f. 9.
β Hypnum repens filicinum, trichoides palustre. *R. syn.* 85. *Dill. musc.* 286. t. 35. f. 21.

* *Hypnum repens trichoides palustre vernum fuscum* capitulis oblongis incurvis. *R. syn.* 85.

Anglis, bog *Hypnum*.

Habitat in palustribus et ad fontes. 4. III.

compre- 14. *HYPNUM surculis pinnatis compressis*, foliis mu-
sum. cronatis incurvis, antheris erectiusculis. *Fl. angl.* 423. *Lin mant. II.* 310.

Hypnum ramis pinnatis, pinnis ramosis, foliis cincinnatis. *Hall. hist.* 1767.

Hypnum filicinum sericeum molle et pallidum mucro-
nibus aduncis. *Dill. musc.* 286. t. 36. f. 22.

Anglis, compressed *Hypnum*.

Habitat in sylvis ad arborum truncos; in sylva prope Tottenham non longe a Londino. Dill. III. IV.

crista cas- 15. *HYPNUM surculis pinnatis*: ramulis approxima-
trensis. tis apicibus recurvis. *Sp. pl.* 1595. *Weis. crypt.* 233.

Hypnum foliis pinnatis, pinnis simplicibus æqualibus foliis cincinnatis. *Hall. hist.* 1768.

Hypnum filicinum, cristam castrensem repræsentans.
Dill. musc. 284. t. 36. f. 20.

Muscus

Muscus terrestris repens subflavus, foliolis crispis minoribus, ramulisque densius confertis. *Hist. Ox. III. 625. s. 15. t. 5. f. 12.* *Vaill. par. 141. t. 27. f. 14.*

Anglis, crested Hypnum.

Habitat in sylvis et locis saxosis; et collibus cretaceis frequens. *24. III. IV.*

16. HYPNUM surculis proliferis, plano-pinnatis, pedunculis aggregatis. *Sp. pl. 159. Weis. crypt. 230. rum.*

Hypnum ramis teretibus pinnatis, pinnulis pinnatis, foliis adpressis. *Hall. hist. 1764.*

Hypnum filicinum, tamarisci foliis minoribus, non splendentibus. *Dill. musc. 276. t. 35. f. 14.*

Hypnum repens filicinum minus, luteo-virens. *Dill. giss. 217. R. syn. 86.*

Muscus filicinus major. *Hist. Ox. III. 625. s. 15. t. 5. f. 20.* *Vaill. paris. 140. t. 25. f. 1.*

Anglis, proliferous Hypnum.

Habitat in ericetis et sylvis. *24. III.*

17. HYPNUM surculis plano-pinnatis continuatis, parieti-pedunculis aggregatis. *Sp. pl. 1590. Weis. crypt. 232. num.*

Hypnum caule suberecto flexuoso, ramis teretibus pinnatis, pinnulis pinnatis, operculis aristatis. *Hall. hist. 1765.*

Hypnum filicinum, tamarisci foliis majoribus splendentibus. *Dill. musc. 274. t. 35. f. 13.*

Hypnum repens filicinum, veluti spicatum. *R. syn. 86.*

Muscus filicinus major. *Hist. Ox. III. 625. s. 15. t. 5. f. 20.* *Buxb. cent. II. 2. t. 1. f. 2.*

Muscus filicinus flavescens major ramosus. *Vaill. paris. 140. t. 29. f. 1. et t. 28. f. 1.*

Anglis, wall Hypnum.

Habitat in sylvis, ericetis et umbrosis. *24. II.*

18. HYPNUM surculis subpinnatis decumbentibus: *prælong-*
ramulis remotis, foliolis ovatis, antheris cernuis. *gum.*
Sp. pl. 1591. Weis. crypt. 235. Neck. delic. gallob.
471.

Hypnum foliis distichis lanceolatis pilo terminatis,
capulis ovatis inclinatis aristatis. *Hall. hist. 1758.*

CRYPTOGAMIA MUSCI.

*Hypnum repens filicinum, triangularibus parvis foliis,
prælongum. R. syn. 80. Dill. musc. 278. t. 35. f. 15.
Muscus filicinus minor. Vaill. paris. 140. t. 23. f. 9.
Anglis, trailing Hypnum.
Habitat in arborum truncis, lignis putrescentibus et terris
uidis. 4. XI—II.*

abieti-
num.

19. HYPNUM surculis pinnatis teretiusculis remotis
inæqualibus. Sp. pl. 1591. Weis. crypt. 236.
*Hypnum ramis duris teretibus, foliis appressis ovato-
lanceolatis pilo aristatis. Hall. hist. 1762.
Hypnum lutescens, alis subulatis tenacibus. Dill.
musc. 280. t. 35. f. 17.
Hypnum repens filicinum trichoides montanum, ra-
mulis teretibus lutescentibus non divisis. R. syn. 86.
Muscus terrestris surculis filamentosis tenacibus abie-
tinis, semel tantum divisis. Hist. Ox. III. 626. f.
15. t. 5. f. 22.
Muscus pennatus minor, caulis ramosis, in summi-
tate velut spicatus. Vaill. paris. t. 29. f. 12.
Anglis, firr Hypnum.
Habitat in nemorosis aridis et collibus cretaceis passim;
circa Northfleet copiose. 4. III.*

**** Foliis reflexis.

cupressi-
forme.

20. HYPNUM surculo subpinnato, foliis secundis re-
curvis apice subulatis. Sp. pl. 1592. Weis. crypt.
1737. Fl. dan. 535.
*Hypnum caule compresso, foliis imbricatis falcatis
pilo aristatis. Hall. hist. 1737.
Hypnum crispum cupressiforme, foliis aduncis. Dill.
musc. 287. t. 32. f. 23.
Hypnum repens crispum cupressiforme. R. syn. 89.
Muscosus terrestris aureus minor, flagellis clavisque bre-
vibus. Hist. Ox. III. 624. f. 15. t. 5. f. 8.
Muscosus squamosus ramosus, minor et crispus. Vaill.
paris. 139. t. 27. f. 13.
β Hypnum repens trichoides terrestre, foliolis uno versu
dispositis. R. syn. 85.
Anglis, cypress Hypnum.*

Habitat.

Habitat in sylvis et ad arborum radices. 4. II. III.

21. HYPNUM surculo erectiusculo subramoso, foliis *aduncum*, secundis recurvis subulatis, ramis recurvatis. Sp. pl. 1592. Weis. crypt. 240.
Hypnum caule erecto, foliis falcatis pilo aristatis, operculis conicis. Hall. hist. 1736.
Hypnum palustre erectum summitatibus aduncis. R. syn. 82. Dill. musc. 292. t. 37. f. 26.
Anglis, hooked Hypnum.
Habitat in palustribus. 4. IV—VIII.
22. HYPNUM ramis vagis procumbentibus recurvis, *scorpioides*, foliis secundis acuminatis. Sp. pl. 1593. des.
Hypnum scorpioides palustre magnum, Lycopodii instar sparsim. Dill. musc. 290. t. 37. f. 25.
Anglis, scorpion Hypnum.
Habitat in palustribus turfosis; prope Bishops-castle in agro Salopiensi et circa Pentir, prope Bangor. Dill. prope Norwich. D. Pitchford, in septentrionali parte Angliae passim. 4. XI—IV.
23. HYPNUM surculis repentibus, ramis vagis teretibus, foliis patulis acuminatis. Sp. pl. 1592. Weis. sum. crypt. 241.
Hypnum foliis lanceolatis crispis, capsulis erectis, operculo conico. Hall. hist. 1739.
Hypnum subhirsutum, viticulis gracilibus erectis, capsulis teretibus. Dill. musc. 307. t. 39. f. 43.
Hypnum repens trichoides arboreum majus, capsulis et surculis erectis, minus ramosis. R. syn. 85.
Muscus montanus, flagellis longis tenuibus cupressinus, ut plurimum indivisis. Hist. Ox. III. 624. f. 15. t. 5. f. 7.
Muscus squamosus, viticulis longioribus glabris. Vaill. paris. 137. t. 23. f. 1.
Anglis, cylindric Hypnum.
Habitat in arborum stipitibus et ericetis. in collibus cretaceis inter Northfleet et Gravesend in Cantio. Dill. III. IV.

CRYPTOGAMIA MUSCI.

palustre. 24. *HYPNUM* surculis repentibus, ramis confertis erectis, foliis ovatis secundis, antheris erectiusculis.
Fl. angl. 429. *Sp. pl.* 1593.

Hypnum foliis ovato-lanceolatis falcatis, capsulis ovatis. *Hall. hist.* 1738.

Hypnum heterophyllum aquaticum polycephalum repens. *Dill. musc.* 293. *t.* 37. *f.* 27.

Hypnum repens filicifolium ramosum, ramulis surrectis et minus complanatis. *R. syn.* 87.

Anglis, marsh Hypnum.

Habitat ad arborum radices et in saxosis uidis. ad ripam Thamesis prope Batterseam. 4. I—IV.

squarrosum. 25. *HYPNUM* ramis vagis, foliis ovatis apice subulatis undique reflexis. *Sp. pl.* 1593. *Weis. crypt.* 242. *Fl. dan.* 535.

Hypnum foliis patulis subulatis, operculis conicis. *Hall. hist.* 1732.

Hypnum repens triangularibus reflexis foliis, majus. *R. syn.* 82. *Dill. musc.* 303. *t.* 39. *f.* 38.

Muscus terrestris erectior, foliis reflexis. *Hist. Ox.* III. 624. *f.* 15. *t.* 5. *f.* 2.

β *Hypnum* foliis cincinnatis, patulis reflexis. *Hall. hist.* 1733.

Hypnum repens triangularibus reflexis foliis, minus. *R. syn.* 82. *Dill. musc.* 304. *t.* 39. *f.* 39.

Anglis, common Hypnum.

Habitat in pratis et pascuis humidis. 4. III—VI.

lereum. 26. *HYPNUM* surculis repentibus, ramis vagis erectis, foliis secundis, antheris subrotundis. *Sp. pl.* 1593. *Weis. crypt.* 244.

Hypnum lereum montanum, capsulis subrotundis. *Dill. musc.* 305. *t.* 39. *f.* 40.

Hypnum repens, surculis magis erectis, foliis reflexis longioribus cinctis, operculo capituli magno. *R. syn.* 82.

Muscus terrestris vulgaris. *Ger. em.* 1370. alter. *Park.* 306.

Muscus repens major, foliis et flagellis longis et tenuibus

nuibus donatus. *Hist. Ox.* III. 626. f. 15. t. 5.
f. 24.

Muscus squamosus major, foliis angustioribus acutissimis. *Vaill. paris.* 138. t. 25. f. 2.

Anglis, spreading Hypnum.

Habitat in ericetis et pascuis montosis. 24. IV.

***** *Surculis dendroidibus.*

27. HYPNUM surculo erecto, ramis fasciculatis terminalibus simpliciusculis, antheris erectis. *Sp. pl.* 1593. *des.*
Weis. crypt. 245.

Hypnum caule nudo inclinato, ramis teretibus confertis, capsulis erectis aristatis. *Hall. hist.* 1747.

Hypnum dendroides sericeum, setis et capsulis longioribus erectis. *Dill. musc.* 313. t. 46. f. 48.

Hypnum erectum arbusculam referens, ramulis subrotundis confertim nascentibus. *R. syn.* 81.

Muscus dendroides elatior, ramulis crebris minus surculosis, capitulis pedunculis brevibus insidentibus.

Hist. Ox. III. 626. f. 15. t. 5. f. 31.

Anglis, tree Hypnum.

Habitat in sylvis et nemorosis humidis. 24. II. III.

28. HYPNUM surculo erecto, ramis fasciculatis terminalibus subdivisis, antheris nutantibus. *Sp. pl. rum.*
1594. *Weis. crypt.* 246.

Hypnum caule nudo confertim ramoso, ramis et capsulis inclinatis aristatis. *Hall. hist.* 1748.

Hypnum dendroides obscurius, setis et capsulis brevioribus, subnutantibus. *Dill. musc.* 315. t. 41.
f. 49.

Hypnum palustre erectum arbusculam referens, ramulis subrotundis. *Dill. giss.* 220. *R. syn.* 81.

Muscus dendroides sylvarum erectus, ramulis kaliæmulis, radice repente. *Hist. Ox.* III. 626. f. 15.
t. 5. f. 30.

Muscus squamosus alopecuroides, flagellis recurvis.
Vaill. paris. 123. t. 23. f. 5.

Anglis, fox-tail Hypnum.

Habitat in sylvis et umbrosis humidis. 24. IV.

CRYPTOGAMIA MUSCI.

***** *Surculis teretiusculis.*

- curtipen-* 29. **HYPNUM surculis vagis teretibus, foliis ovatis acutis patulis, antheris pendulis.** *Sp. pl.* 1594. *Weis. crypt.* 248.

Hypnum ramis teretibus, foliis ovato-lanceolatis pilo aristatis, capsulis ovatis pendulis, operculis aristatis. *Hall. hist.* 1740.

Hypnum dentatum curtipendulum, viticulis rigidis. *Dill. musc.* 333. t. 43. f. 69.

Hypnum arboreum repens, capsulis reflexis brevibus pèdiculis insidentibus. *R. syn.* 89.

Anglis, pendulous Hypnum.

Habitat ad radices arborum et in locis saxosis. 24. II—IV.

- purum.* 30. **HYPNUM surculis pinnato-sparsis subulatis, foliis ovatis obtusis capsulis obliquis.** *Sp. pl.* 1594. *Weis. crypt.* 249.

Hypnum ramis teretibus, foliis ovato-lanceolatis, setis prælongis, capsulis inclinatis aristis. *Hall. hist.* 1743.

Hypnum cupressiforme vulgare, foliis obtusis. *Dill. musc.* 309. t. 40. f. 45.

Hypnum terrestræ erectum, ramulis teretibus, foliis inter rotunda et acuta medio modo se habentibus.

Dill. giss. 220. *R. syn.* 81.

Muscus squamosus, cupressiformis. *Vaill. paris.* 138. t. 28. f. 3.

31. **Hypnum ramis teretibus, foliis ovato-lanceolatis setis prælongis, capsula crassa, operculo conico.** *Hall. hist.* 1742.

Hypnum cupressiforme tenuius et compressius. *Dill. musc.* 312. t. 40. f. 47.

Hypnum longum erectum, foliis angustis caulinis adpressis. *R. syn.* 83.

Anglis, meadow Hypnum.

Habitat in pascuis, pratis et sylvis. 24. II.

*illece-
brum.*

31. **HYPNUM surculis ramisque vagis teretibus eretiusculis obtusis.** *Sp. pl.* 1594. *Schreb. spicil.* 95.

Hypnum foliis ovato-lanceolatis concavis, ramis teretibus. *Hall. hist.* 1744.

Hypnum

Hypnum cupressiforme rotundius vel illecebræ æmulum. *Dill. musc.* 311. t. 40. f. 46.

Hypnum terestre erectum, ramulis teretibus, foliis subrotundis albo-virentibus cinctis. *R. syn.* 81.

Muscus terrestris, surculis kali geniculati aut illecebræ æmulis foliolis subrotundis squamatim incumbentibus. *R. syn. ed.* 11. 37. *Hist. Ox.* III. 626.

Vaill. paris. 137. t. 25. f. 7.

Anglis, glass-wort Hypnum.

Habitat in ericetis, nemorosis, et pascuis humidiusculis.
24. III. IV.

32. HYPNUM surculis teretibus ramosis, foliis acutis *riparium* patulis distantibus. *Sp. pl.* 1595. *Weis. crypt.* 250.

Hypnum ramis teretibus et pinnatis, foliis ovato-lanceolatis pilo terminatis, fetis caulinis brevibus. *Hall. hist.* 1746.

Hypnum aquaticum, flagellis et teretibus et pennatis.
Dill. musc. 308. t. 40. f. 44.

Hypnum ramosum fluitans pennatum. *R. syn.* 81.

Anglis, water Hypnum.

Habitat in muris et saxosis humidis ad ripas fluviorum et in fluviis. 24. IX—IV.

33. HYPNUM surculis vagis : apice foliis convolutis *cuspida* acuminatis. *Sp. pl.* 1595. *Weis. crypt.* 251. *tum.*

Hypnum foliis ovato-lanceolatis, ramis teretibus, supremis conicis acuminatis. *Hall. hist.* 1741.

Hypnum palustre extremitatibus cuspidatis et pungentibus. *Dill. musc.* 300. t. 39. f. 34.

Hypnum repens palustre, foliis triangularibus per caules expansis, extremitatibus convolutis et acuminatis. *Dill. giss.* 219. *R. syn.* 82.

Anglis, pointed Hypnum.

Habitat in palustribus pascuis et sylvis uidis. 24.
III—V.

***** *Surculis confertis.*

34. HYPNUM surculo repente, ramis confertis erectis, *sericeum* foliis subulatis, antheris erectis. *Sp. pl.* 1595. *Weis. crypt.* 254.

Hypnum

CRYPTOGAMIA MUSCI.

Hypnum ramis teretibus, foliis pilo præpilatis, capsulis cylindricis erectis aristatis. Hall. hist. 1750.

Hypnum vulgare sericeum recurvum, capsulis erectis cuspidatis. Dill. musc. 323. t. 42. f. 59.

Hypnum repens trichoides terrestre luteo-virens vulgare majus, capitulis erectis. R. syn. 84.

Muscus terrestris luteo-viridis sericeus repens. R. syn. ed. II. 38. Hist. Ox. III. 626. f. 15. t. 5. f. 25.

Muscus arboreus splendens sericeus. Vaill. paris. 123. t. 27. f. 3.

plumo- β *Hypnum surculis pinnatis repentibus, ramis confertis, foliis imbricatis subulatis, antheris erectis.* Fl. angl. 423. Sp. pl. 237. Weis. crypt. 237.

Hypnum repens filicinum plumosum. R. syn. 86. Dill. musc. 280. t. 35. f. 16.

Iutescens. γ *Hypnum surculis vagis procumbentibus, foliis subulatis antheris obliquis.* Fl. angl. 421.

Hypnum caulis teretibus, foliis pilo terminatis, capsulis obliquis aristatis. Hall. hist. 1753.

Hypnum sericeum, surculis longioribus et rectioribus, capsulis incurvis. Dill. musc. 325. t. 42. f. 60.

Anglis, silky Hypnum.

Habitat in muris, truncis arborum et pascuis, γ in collibus cretaceis inter Northfleet et Gravesend. 24. I—IV.

veluti- 35. *HYPNUM surculo repente, ramis confertis erectis, num. foliis subulatis, antheris subnutantibus.* Sp. pl. 1595. Weis. crypt. 255. Fl. dan. 475.

Hypnum ramis teretibus, foliis pilo terminatis, capsulis ovatis inclinatis mucronatis. Hall. hist. 754.

Hypnum velutinum, capsulis ovatis cernuis. Dill. musc. 326. t. 42. f. 61.

Hypnum repens trichoides terrestre viridius minus, capitulis tumidioribus cernuis. R. syn. 84.

Muscus squamosus ramosus tenuior, capitulis incurvis. Vaill. paris. 138. t. 26. f. 9.

β *Hypnum repens trichoides terrestre minimum et breve, capitulis tumidioribus cernuis.* R. syn. 84.

Anglis, velvet Hypnum.

Habitat ad radices arborum et sepes, et in umbrosis. 24. II. III.

CRYPTOGAMIA MUSCI.

507

36. HYPNUM surculis repentibus, ramis filiformibus, *serpens*.
foliis oblitteratis. *Sp. pl.* 1596. *Weis. crypt.* 257.

Hypnum caulinibus prostratis, foliis minimis pilo terminatis, capsulis cylindricis erectis mucronatis. Hall. hist. 1756.

Hypnum trichoides serpens, setis et capsulis longis erectis. Dill. musc. 329. *t. 42. f. 64.*

Hypnum repens trichoides terrestre minimum, capitulis majusculis oblongis erectis. R. syn. 85.

Muscus terrestris omnium minimus, capitulis majusculis, erectis. Hist. Ox. III. 626. *s. 15. t. 5. f. 14. 21. Vaill. paris.* 139. *t. 28. f. 2, 6, 7, 8.*

Anglis, creeping Hypnum.

Habitat in sepibus, et lignis putridis, et ad radices arborum. 4. III. IV.

37. HYPNUM surculis erectis ramosis incurvatis. *Sp. sciuroides.*
pl. 1596. Weis. crypt. 258.

Hypnum caulinibus teretibus ramosis, foliis adpresso pilo aristatis, operculis conicis. Hall. hist. 1749.

Hypnum arboreum sciuroides. Dill. musc. 319. *t. 41. f. 54.*

Hypnum trichoides erectum, ramulis recurvis, obscuri coloris. R. syn. 83.

Muscus repens, serici modo lucens, viticulis longioribus erectis. Hist. Ox. III. 626. *s. 15. t. 5. f. 27.*

Muscus arboreus splendens myosuroides. Vaill. paris.
t. 27. f. 12.

Anglis, squirrel-tail Hypnum.

Habitat in truncis arborum. 4. II—IV.

38. HYPNUM surculis ramosissimis, ramis subulatis *myosuroides* utrinque attenuatis teretibus. *Sp. pl.* 1596. *Weis. des. crypt.* 259.

Hypnum ramis teretibus, foliis pilo terminatis, capsulis ovatis inclinatis mucronatis. Hall. hist. 1752.

Hypnum myosuroides tenuius, capsulis nutantibus. Dill. musc. 317. *t. 41. f. 51.*

Hypnum polyanthon triangularibus angustis foliis. R. syn. 83.

Muscus

CRYPTOGAMIA MUSCI.

- Muscus trichoides humilis ramosus, capitalis oblongis tumidiusculis donatus. *Hist. Ox. III.* 628. *f. 15. t. 6. f. 3.*
- Muscus squamosus minor, myosuroides, capitulis incurvis. *Vaill. paris.* 137. *t. 27. f. 6.*
- ♂ Hypnum myosuroides crassius, capsulis erectis. *Dill. musc.* 316. *t. 41. f. 50.*
- Hypnum repens triangularibus angustis foliis, ramulis subrotundis. *R. syn.* 83.
- ♀ Hypnum myosuroides brevius et crassius, capsulis cernuis. *Dill. musc.* 318. *t. 41. f. 52.*
- ♂ Hypnum myosuroides sericeum tenuius, capsulis erectis. *Dill. musc.* 318. *t. 41. f. 53.*
- Anglis*, mouse-tail Hypnum.
Habitat *in sylvis, saxosis et muris.* 24. I—IV.

- ornitho-*
poides. 39. HYPNUM surculis repentibus, ramis fasciculatis teretibus erectiusculis, antheris erectis ovatis. *Fl. angl.* 430. *Lin. mant.* 310.
Hypnum gracile ornithopoides. *Dill. musc.* 320. *t. 41. f. 55.*
Anglis, birds-foot Hypnum.
Habitat *in truncis arborum et rupibus passim. in Fagis in saltu Enfieldensi copiose; ad saxa per campos elatos Grey-weathers dictos.* S. Brewer. 24. II—IV.
- clavella-*
tum. 40. HYPNUM repens, ramulis erectis confertissimis, antheris incurvis, operculis inflexis. *Sp. pl.* 1596?
Hypnum surculo repente, ramis contiguis teretibus erectis duplo seta brevioribus, capitulo incurvo acuminato. *Neck. meth. musc.* 176.
Hypnum clavellatum parvum repens, setis brevibus. *Dill. musc.* 551. *t. 81. f. 17.*
Anglis, club Hypnum.
Habitat *in ramis mortuis et truncis arborum passim.* 24. XII—II.

A L G Æ.

JUNGERMANNIA. 1169.

Masc. Pedunculatus nudus. *Anthera* quadrivalvis.
Fem. Sessilis nudus, seminibus subrotundis.

* *Frondibus pinnatis secundis.*

1. JUNGERMANNIA frondibus simpliciter pinnatis, *asplenio-*
foliolis ovatis subciliatis. Sp. pl. 1597. Weis. crypt. des.
 110.

Jungermannia foliis pinnatis subrotundis ferratis, ex
 apice floriferis. Hall. hist. 1868.

Lichenastrum asplenii facie, pinnis laxioribus. Dill.
 musc. 482. t. 69. f. 5.

2 Lichenastrum asplenii facie, pinnis confertioribus.
 Dill. musc. 483. t. 69. f. 6.

Lichenastrum trichomanis facie, capitulis e foliorum
 summitate enascētibus, majus. R. syn. 112.

Muscus trichomanoides, foliis rotundioribus pelluci-
 dis, squamatim conjuncte sibi incumbentibus. Hist.
 Ox. III. 627. f. 15. t. 6. f. 42.

Hepaticoides polytrichi facie. Vaill. paris. 99. t. 19.
 f. 7.

Anglis, spleenwort Jungermannia.

Habitat in sylvis et umbrosis uidis. 4. II—IV.

2. JUNGERMANNIA frondibus simpliciter pinnatis, *viticulosa.*
 foliolis subulatis. Sp. pl. 1597.

Jungermannia foliis pinnatis subrotundis, ex caule
 florifera. Hall. hist. 1869.

Jungermannia terrestris, viticulis longis, foliis perexi-
 guis, densissimis, ex rotunditate acuminatis. Mich.
 gen. 8. t. 5. f. 4.

Lichenastrum trichomanis facie, e basi et medio flo-
 rens. Dill. musc. 484. t. 69. f. 7.

Lichenastrum capitulis nudis, trichomanis facie, fo-
 liolis densius congestis majus. R. syn. III.

Anglis, straggling Jungermannia.

Habitat

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Habitat in sylvis et umbrosis humidis; in comitatu Eboracensi. D. Richardson. circa Slingfoldiam in Sussexia.
4. III. IV.

multiflora. 3. JUNGERMANNIA frondibus simpliciter pinnatis basi floriferis, foliolis setaceis.

Jungermannia fronde repente ramosa, foliolis alternis geminis setaceis æqualibus. *Lin. mant. II.* 310.
Lichenastrum multiflorum exile, foliis angustissimis.

Dill. musc. 481. t. 69. f. 4.

Anglis, many-flowered Jungermannia.

Habitat in sylvula collis Shooter's-hill dicti, prope Londonum. *Dill. III.*

polyanthos. 4. JUNGERMANNIA frondibus simpliciter pinnatis, foliolis integerrimis imbricatis convexis. *Sp. pl. 1597.* *Weis. crypt. 113.*

Jungermannia foliis pinnatis ovatis ex caule florifera.
Hall. hist. 1870.

Jungermannia palustris repens, foliis densissimis ex rotunditate acuminatis. *Mich. gen. 8. t. 5. f. 5.*

Lichenastrum trichomanis facie, polyanthemum breve et repens. *Dill. musc. 486. t. 70. f. 9.*

Anglis, imbricated Jungermannia.

Habitat in sylvis et umbrosis humidis et ad ripas rivularum. 4. III. IV.

lanceolata. 5. JUNGERMANNIA frondibus simpliciter pinnatis lanceolatis apice floriferis, foliolis integerrimis. *Sp. pl. 1597.* *Weis. crypt. 114.*

Jungermannia foliis pinnatis ovatis confertis ex apice floriferis. *Hall. hist. 1871.*

Jungermannia palustris minima repens, foliis subrotundis densissimis læte viridibus. *Mich. gen. 8. t. 5. f. 6.*

Lichenastrum trichomanis facie minus, ab extremitate florens. *Dill. musc. 486. t. 70. f. 10.*

Lichenastrum capitulis nudis, trichomanis facie, foliolis densius congestis, minus. *R. syn. 112.*

Anglis, lanceolate Jungermannia.

Habitat in umbrosis humidis. II. III.

6. JUNGER-

6. JUNGERMANNIA frondibus simpliciter pinnatis *bidentata*.
apice floriferis, foliolis bidentatis. *Sp. pl.* 1598.
crypt. 15.
Jungermannia foliis distichis bicuspitatis, summis
ramis globuliferis. *Hall. hist.* 1865.
Jungermannia major repens, foliis bifidis. *Mich. gen.*
8. t. 5. f. 12.
Lichenastrum pinnulis acutioribus et concavis bifidis.
Dill. musc. 487. t. 70. f. 11.
Lichenastrum trichomanis facie, foliolis bifidis majus.
R. syn. 113.
Hepaticoides polytrichi facie, foliis bifidis. *Vaill.*
paris. 99. t. 19. f. 8.
Muscus lichenoides, foliis pennatis bifidis, minor.
Hist. Ox. III. 627. f. 15. t. 6. f. 47.
Anglis, bifid Jungermannia.
Habitat in sylvis et ericetis humidiusculis. X—XII.
7. JUNGERMANNIA frondibus simpliciter pinnatis *inflata*.
apice floriferis, theca oblonga inflata, foliolis bifidis
apicibus obtusis.
Lichenastrum pinnulis obtusioribus bifidis, minus.
Dill. musc. 488. t. 70. f. 12.
Anglis, inflated Jungermannia.
Habitat in sylvis et ericetis humidis. XI—III.
8. JUNGERMANNIA frondibus simpliciter pinna- *bicuspidata*-
tis, medio floriferis, foliolis bidentatis. *Sp. pl.* ta.
1598. *Weis. crypt.* 117.
Jungermannia foliis bifidis, ex medio caule crebro
florifera. *Hall. hist.* 1878.
Jungermannia minima repens, foliis bifidis, vagina
florum cylindracea. *Mich. gen.* 9. t. 6. f. 17.
Lichenastrum pinnulis acutissime bifidis, minimum.
Dill. musc. 488. t. 70. f. 13.
Lichenastrum trichomanis facie, foliolis bifidis. *Dill.*
giss. 213. *R. syn.* 113.
Anglis, forked Jungermannia.
Habitat in umbrosis et sylvis humidis. II. III. IV.
9. JUNGERMANNIA fronde pinnata ramosa apice *quinque-*
florifera, *dentata*.

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

florifera, foliolis quinquedentatis. *Fl. angl.* 433.
Sp. pl. 1598.

Lichenastrum multifidum majus, ab extremitate florens. *Dill. musc.* 494. *t.* 71. *f.* 23.

Lichenastrum trichomanis facie, foliolis multifidis, capitulis e summis ramulis nascentibus. *R. syn.* 113.

Muscoides terrestre repens, ex obscurō virescens, foliis superioribus inferioribusque ad apicem dentatis. *Mich. gen.* 10. *t.* 6. *f.* 2.

Anglis, toothed Jungermannia.

Habitat in sylvis et umbrosis uidis, in comitatu Eboracensi.

D. Richardson. 24. IV.

** *Frondibus pinnatis: pinnulis auriculatis superne tectis.*

undulata. 10. *JUNGERMANNIA* frondibus suprabipinnatis apice floriferis, foliolis subrotundis integerrimis. *Sp. pl.* 1598. *Weis. crypt.* 120.

Lichenastrum pinnulis auriculatis majoribus et non crenatis. *Dill. musc.* 490. *t.* 71. *f.* 17.

Hepatica saxatilis undulata seminifera. *Vaill. paris.* *t.* 19. *f.* 6.

Anglis, waved Jungermannia.

Habitat in umbrosis. 24. III. IV.

nemorosa. 11. *JUNGERMANNIA* frondibus supra bipinnatis apice floriferis, foliolis ciliatis. *Sp. pl.* 1598. *Weis. crypt.* 121.

Jungermannia foliis bipartitis, auriculatis imbricatis supremis punctiferis. *Hall. hist.* 1859.

Jungermannia nemorosa, foliis acutioribus auritis, tenuissime denticulatis, flore insidente pediculo breviore. *Mich. gen.* 7. *t.* 5. *f.* 8.

Lichenastrum auriculatum, pinnis minoribus crenatis. *Dill. musc.* 490. *t.* 71. *f.* 18.

Anglis, wood Jungermannia.

Habitat in sylvis et umbrosis uidis; in comitatu Westmorlandico. 24. III. IV.

refupina- 12. *JUNGERMANNIA* frondibus supra bipinnatis inferne

- inferne floriferis, foliolis crenulatis imbricatis rotundis. *Sp. pl.* 1599.
Lichenastrum auriculatum, pinnulis rotundis, crispum.
Dill. musc. 491. *t.* 71. *f.* 19.
Lichenastrum trichomanis facie, capitulis foliorum summitate enascentibus, medium. *R. syn.* 112.
Anglis, curled Jungermannia.
Habitat in fissuris rupium et ericetis turfosis. 24. IV.

13. JUNGERMANNIA frondibus supra bipinnatis *albicans*.
apice floriferis, foliolis linearibus recurvatis. *Sp. pl.* 1599. *Weis. crypt.* 122.
Lichenastrum auriculatum, pinnulis angustis planis recurvis. *Dill. musc.* 492. *t.* 71. *f.* 20.
Lichenastrum trichomanis facie, capitulis e foliorum summitate enascentibus minus. *R. syn.* 112.
Hepaticoides albescens, foliis pinnatis. *Vaill. paris.*
57. t. 19. f. 5.
Anglis, white Jungermannia.
Habitat in sylvis et umbrosis uidis. 24. III. IV.

14. JUNGERMANNIA frondibus subtus bipinnatis, *trilobata*.
foliolis quadratis obsolete trilobatis. *Sp. pl.* 1599.
Weis. crypt. 118.
Jungermannia caulinis convexis, foliis descendantibus imbricatis tridentatis. *Hall. hist.* 1866.
Jungermannia foliis latiusculis obtusis undulatis et veluti angulosis. *Mich. gen.* 7. *t.* 5. *f.* 10.
Lichenastrum pinnulis obtuse trifidis nervo geniculato.
Dill. musc. 493. *t.* 71. *f.* 22.
Anglis, trifid Jungermannia.
Habitat in montibus Cambrobritannis. in monte Crib y ddisil. prope Llanberris. 24. III. IV.

15. JUNGERMANNIA frondibus subtus bipinnatis *reptans*:
apice reptantibus, foliolis quadridentatis. *Sp. pl.* 1599. *Weis. crypt.* 119.
Jungermannia minima ramosa, polyanthos, foliis imbricatis trifidis. *Hall. hist.* 1879.
Lichenastrum multifidum exiguum ad basin florens
M m per

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

per siccitatem imbricatam. *Dill. musc.* 494. *t.* 71. *f.* 24.

Lichenastrum trichomanis facie foliolis multifidis,
capitulis ex imis cauliculis nascentibus. *R. syn.* 113.
Anglis, creeping Jungermannia.
Habitat in umbrosis humidis. 4. IV.

*** *Frondibus imbricatis.*

complana- 16. *JUNGERMANNIA* surculis repentibus, foliolis
inferne auriculatis duplicato - imbricatis, ramis
æqualibus. *Sp. pl.* 1599. *Weis. crypt.* 124.

Jungermannia foliis rotundis, alterne imbricatis, caule
plano multifloro, setis brevissimis. *Hall. hist.*
1860.

Jungermannia foliis cincinnatis auritis, imbricatum
dispositis, ex viridi flavescensibus. *Mich. gen.* 7. *t.*
5. *f.* 21.

Lichenastrum imbricatum majus, squamis compref-
sis et planis. *Dill. musc.* 496. *t.* 72. *f.* 26.

Lichenastrum imbricatum majus. *R. syn.* 111.
Anglis, flat Jungermannia.

Habitat in arborum truncis frequens. 4. IV.

dilatata. 17. *JUNGERMANNIA* surculis repentibus, foliolis
inferne auriculatis duplicato - imbricatis, ramis
apice latioribus. *Sp. pl.* 1600. *Weis. crypt.* 126.

Jungermannia foliis imbricatis alternis orbiculatis,
setis brevissimis. *Hall. hist.* 1874.

Lichenastrum imbricatum minus, squamis convexo-
concavis. *Dill. musc.* 497. *t.* 72. *f.* 27.

Lichenastrum imbricatum minus. *R. syn.* 111.

Hepaticoides surculis et foliolis thuyæ instar compref-
sis, minor. *Vaill. paris.* 99. *t.* 19. *f.* 10.

Anglis, scaly Jungermannia.

Habitat ad truncos arborum. 4. III. IV.

tamarisci- 18. *JUNGERMANNIA* foliis imbricatis serie duplo-
folia. superioribus subrotundis convexis obtusis quadruplo-
majoribus. *Sp. pl.* 165. *Weis. crypt.* 129.

Junger-

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

515

Jungermannia foliis imbricatis rotundis, superne alternis convexis, inferne quadrifariis. *Hall. hist.* 1873.

Lichenastrum imbricatum tamarisci narbonensis facie.

Dill. musc. 499. *t. 72. f. 31.*

Anglis, tamarisk Jungermannia.

Habitat in truncis arborum et rupibus. 24. III.

19. JUNGERMANNIA surculis procumbentibus sub- *platyphyl-*
tus imbricatis, foliolis cordatis acutis. *Sp. pl. la.*
1600.

Jungermannia foliis imbricatis, lanceolatis superne
planis alternis, inferne concavis quinquefariis. *Hall.*
hist. 1872.

Lichenastrum arboris vitæ facie, foliis minus rotundis.

Dill. musc. 501. *t. 72. f. 32.*

Hepaticoides, surculis et foliolis thuyæ instar com-
pressis major. *Vaill. paris.* *t. 19. f. 9.*

Muscus muralis floridus, foliis subrotundis creberrime
imbricatim dispositis. *Hist. Ox.* *III.* 627. *f. 15. t.*
6. f. 44.

Anglis, wall Jungermannia.

Habitat ad arborum truncos et muros. 24. III. IV.

20. JUNGERMANNIA surculis repentibus, foliolis *ciliaris*.
duplicato-imbricatis inferne auriculatis ciliatis. *Sp.*
pl. 1601.

Jungermannia caule pinnato, foliis crispis capillariter
multifidis. *Hall. hist.* 1881.

Lichenastrum filicinum pulchrum villosum. *Dill. musc.*
503. t. 73. f. 35.

Lichenastrum filicinum crispum. *R. syn.* 111.

Muscus palustris absynthii folio. *Vaill. paris.* 140.
t. 26. f. 11.

Anglis, ciliated Jungermannia.

Habitat in sylvis et ericetis udis et ad rivulos in comitati-
bus Eboracensi, Cumberlando, et Westmorlan-
dico *passim*; found by Mr. Dandridge in a small cur-
rent of water, which runs through Old-fall wood, be-
tween Highgate and Muscle-hill. *R. syn.* 24. III. IV.

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

- varia.* 21. *JUNGERMANNIA* surculis erectiusculis bifariam imbricatis, foliolis bipartitis. *Sp. pl.* 1601.
Jungermannia repens, foliis cordatis carinatis. *Mich. gen.* 8. *t. 5. f. 9.*
Lichenastrum foliis variis. *R. syn.* 113. *Dill. musc.* 505. *t. 73. f. 36.*
Anglis, various-leaved Jungermannia.
Habitat in sylvis et umbrosis humidis. III. IV.
- **** *Surculis undique imbricatis foliolis sparsis.*
- julacea.* 22. *JUNGERMANNIA* surculis teretibus, foliolis undique imbricatis, floribus pedunculatis. *Sp. pl.* 1601.
Jungermannia caule filiformi, foliis adpressis inconnspicuis. *Hall. hist.* 1882.
Lichenastrum alpinum bryi julacei argentei facie.
Dill. musc. 506. *t. 73. f. 38.*
Anglis, silver Jungermannia.
Habitat in rupibus udis, in montibus Snowdon, Glyder et Cader-Ideris in Wallia. 4. IX. X.
- rupestris.* 23. *JUNGERMANNIA* surculis teretibus, foliolis subulatis secundis. *Sp. pl.* 1601.
Lichenastrum alpinum nigricans, foliis capillaceis reflexis. *Dill. musc.* 507. *t. 73. f. 40.*
Anglis, rock Jungermannia.
Habitat in rupibus humentibus; in montibus Snowdon et Glyder in Arvonia, et in boreali parte Angliae passim. 4. III—X.
- trichophyl-*
la. 24. *JUNGERMANNIA* surculis teretibus, foliolis capillaceis æqualibus. *Sp. pl.* 1601. *Weis. crypt.* 130.
Jungermannia minima foliis capillariter multifidis. *Hall. hist.* 1880.
Lichenastrum trichoides minimum in extremitate florrens. *Dill. musc.* 505. *t. 73. f. 37.*
Anglis, hairy Jungermannia.
Habitat in ericetis turfosis prope North Bierly in comitatu Eboracensi, D. Richardson. 4. IV.
Lichenastrum

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

517

25. JUNGERMANNIA surculis teretibus, foliolis *alpina*.
ovatis patentibus, calycibus imbricatis. *Sp. pl.*
1602.
Lichenastrum alpinum atro-rubens teres, calycibus
squamosis. *Dill. musc.* 506. *t.* 73. *f.* 39.
Anglis, alpine Jungermannia.
Habitat in rupibus uidis in montibus Arvoniæ et septen-
trionali parte Angliae frequens. 24. IV—X.
- ***** *Acaules frondibus simplicibus.*
26. JUNGERMANNIA acaulis, foliolo frondi inna- *epiphylla*.
to. *Sp. pl.* 1602. *Weis. crypt.* 106.
Jungermannia fronde foliacea, obtuse lobata ex medio
florifera. *Hall. hist.* 1883. *Fl. dan.* 359.
Marsilea major atro-virens, floribus albicantibus e fo-
liorum medio egredientibus. *Mich. gen.* 5. *t.* 4.
f. 1.
Lichenastrum capitulis rotundis e foliorum medio e-
nascentibus. *R. syn.* 110. *Dill. musc.* 508. *t.* 74.
f. 41.
Lichen petræus, caulinco calceato. *B. pin.* 362.
Lichen alter minor, folio calceato. *Park.* 1314.
Anglis, broad-leaved Jungermannia.
Habitat in umbrosis uidis et ad rivulos. 24. III. IV.
27. JUNGERMANNIA acaulis, fronde oblonga sinu- *pinguis*.
ata pingui. *Sp. pl.* 1602. *Weis. crypt.* 107.
Jungermannia fronde foliacea lacera ex latere flori-
fera. *Hall. hist.* 1884.
Marsilea media pinguis, pallide virens, floribus majo-
ribus nigricantibus ad foliorum latera egredientibus.
Mich. gen. 5. *t.* 4. *f.* 2.
Lichenastrum capitulis oblongis, juxta foliorum di-
visuras enascentibus. *R. syn.* 110 *Dill. musc.* 509. *t.*
74. *f.* 42.
Anglis, slippery Jungermannia.
Habitat in paludibus. IV.
28. JUNGERMANNIA acaulis fronde bipinnatifida- *multifida*.
Sp. pl. 1602. *Weis. crypt.* 109.

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Lichenastrum ambrosiæ divisura. R. syn. III. Dill.
musc. 511. t. 74. f. 43.

Anglis, multifid Jungermannia.

Habitat in sylvis et umbrosis humidis; circa Hampstead
et Charleton prope Londinum copiose. 24. IV.

furcata. 29. *JUNGERMANNIA* acaulis, fronde linearis ramo-
sa: extremitatibus furcatis obtusiusculis. Sp. pl.
1602. Weis. crypt. 108.

Jungermannia foliis linearibus dichotomis, inferne
floriferis. Hall. hist. 1835.

Marsilea minima angustifolia, floribus nigricantibus
ex inferiori foliorum parte, e subhirsuta et turbina-
ta vagina erumpentibus. Mich. gen. 5. t. 4. f. 4.

Lichenastrum tenuifolium furcatum, thecis globosis.
Dill. musc. 512. t. 74. f. 45.

Ulva saxatilis furcata, latiusculis et tenerioribus seg-
mentis. R. syn. 63.

Anglis, linear Jungermannia.

Habitat in truncis arborum et saxosis uidis et umbrosis.
24. IV.

pusilla. 30. *JUNGERMANNIA* acaulis, fronde subpinna-
tida, lobis imbricatis, perichætio plicato. Sp. pl.
1136.

Jungermannia foliis palmatis digitatis, ex basi flori-
fero. Hall. hist. 1887.

Lichenastrum exiguum, capitulis nigris lucidis e co-
tylis parvis nascentibus. Dill. musc. 513. t. 74.
f. 46.

Anglis, Dwarf Jungermannia.

Habitat in sylvis et ericetis arenosis humidis et umbrosis;
prope Woolwich. Dill. In sylva Wray-wood diæta
prope Castle-Howard in comitatu Eboracensi. D.
Teasdale. 24. III—VI.

BLASIA. 1199.

Masc, Cal. cylindricus granis repletus.

Fem,* Cal. nudus. Fructu subrotundo, foliis im-
merso, polyspermo,

BLASIA

- I. BLASIA. Sp. pl. 1605. Fl. dan. 145. fronde *pusilla*.
lobata, lobis subrotundis, nervis setiferis. Hall.
hist. 1857.
Blasia pusilla, lichenis pyxidati facie. Mich. gen. 14.
t. 7.
Mnium lichenis facie. Dill. musc. 237. t. 31. f. 7.
Anglis, dwarf Blasia.
*Habitat ad latera fossarum et rivulorum et in umbrosis
udis et arenosis. Prope Manchester, D. Harrison.*
Halifax, D. Bolton; in ericeto Hounsflejano. 24.
VIII—XI.

T A R G I O N I A. 1197.

Calyx bivalvis includens globum.

- I. TARGIONIA. Sp. pl. 1613. minima et vulgaris. *hypophyl-*
Mich. gen. 3. t. 3. *la.*
Lichen petræus minimus, fructu orobi. B. pin. 362.
Dill. musc. 532. t. 78. f. 9.
Lichen alter acaulos hypophyllocarpos. Col. ecphr.
I. 331. f. 333.
Lichen petræus minimus acaulos. Park. 1315.
Lichenastrum capitulo orobœde. R. syn. 118.
Anglis, vetch Targionia.
*Habitat in ericetis et ad latera fossarum prope Dowlish
juxta Exmouth in Devonia.* 24. III—V.

M A R C H A N T I A. 1198.

- Masc. *Cal. peltatus, subtus tectus corollis monopeta-* *polymer-*
lis. *Antheræ multifidæ.* *pha.*
Fem. *Cal. sessilis, campanulatus polyspermus.*
I. MARCHANTIA calyce communi decemfido, Sp.
pl. 1603. Weis. crypt. 132.
Marchantia major, capitulo stellato, radiis teretibus.
Mich. gen. 2. t. 1, f. 1.
Marchantia linea frondem bipartiente, cyathis scobife-
ris ferratis, setis umbellatis et stellatis decemfidis.
Hall. hist. 1891.

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

*Lichen fontanus major stellatus aquæ ac umbellatus
et cyathophorus.* *Dill. musc.* 524. *t. 76. f. 6.*

Lichen petræus latifolius s. Hepatica fontana. *B. pin.*
362. R. syn. 115.

3 *Marchantia capitulo stellato, radiis teretibus.* *Mich.
gen. 2. t. 1. f. 2.*

*Lichen domesticus minor stellatus æque ac umbella-
tus et cyathophorus.* *Dill. musc.* 527. *t. 77. f. 7.*

Lichen petræus stellatus. *B. pin.* 362. *R. syn. 115.*

γ *Marchantia calyce communi octopartito: laciniis e-
plano-convexis.* *Fl. lapp.* 423. *Roy. lugdb.* 507.

Marchantia capitulo non dissecto. *Mich. gen. 1. t. 1.
f. 5.*

*Marchantia fronde æquabili, cyathis serratis, bacillis
umbellatis et stellatis octifidis.* *Hall. hist.* 1892.

Anglis, common Marchantia.

*Habitat juxta aquas, ad fontes et in locis umbrosis uidis;
β in areis, ambulacris et muris umbrosis et humidis.*

2. VI—VIII.

cruciata. 2. *MARCHANTIA calyce communi quadripartito:
laciniis tubulofis.* *Sp. pl.* 1604.

Marchantia scyphis lunatis, capitulis quadrifidis. *Hall.
hist.* 1888.

Lunaria vulgaris. *Mich. gen. 4. t. 4.*

*Lichen feminifer lunulatus, florifer pileatus tandem
cruciatus.* *Dill. musc.* 521. *t. 75. f. 5.*

*Lichen pileatus parvus, capitulo crucis instar se ex-
pandente.* *R. syn. 115.*

Anglis, cross Marchantia.

Habitat in areis et ambulacris hortorum et umbrosis. *2.
VI—X.*

*hemi-
sphærica.* 3. *MARCHANTIA calyce communi quinquefido he-
mispherico, perichaetio nullo.* *Sp. pl.* 1604.

Marchantia fronde crenata, capitulis conicis hirsutis.
Hall. hist. 1890.

Hepatica media capitulo hemisphærico. *Mich. gen. 3.
t. 2. f. 2.*

Lichen

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

321

Lichen pileatus parvus, foliis crenatis. *R. syn. 114.*
Dill. musc. 519. t. 75. f. 2.

Anglis, hemisphæric Marchantia.

Habitat ad ripas fluviorum et fossarum humidas, et in rupibus uidis. *24. IV. V.*

4. MARCHANTIA calyce communi quinqueloculari *conica*, subovato. *Sp. pl. 1604. Fl. dan. 274.*

Marchantia verrucis asperis, capitulis conicis. *Hall. hist. 1889.*

Hepatica vulgaris major s. officinarum Italiæ. *Mich. gen. 3. t. 2. f. 1.*

Lichen vulgaris major pileatus et verrucosus. *Dill. musc. 516. t. 75. f. 1.*

Lichen petræus caulinculo pileolum sustinente. *B. pin. 362.*

Lichen petræus pileatus. *Park. 1314. R. syn. 114.*

Anglis, conic Marchantia.

Habitat ad ripas rivulorum et in umbrosis uidis. *24. IV.*

RICCIA. 1200.

Cal. o. nisi cavitatem vesicularem intra substantiam:
Cor. o.

Stam. Filamenta nulla. Anthera cylindrica sessilis,
germini imposita.

Pistil. Germen turbinatum. Stylus filiformis, antheram perforans.

Peric. Sphæricum, coronatum anthera emarcida.

Sem. hemispherica pedicellata.

1. RICCIA frondibus glabris bipartitis acutis. *Sp. pl. minima.*
1605.

Riccia minima nitida, segmentis angustioribus acutis.
Mich. gen. 107. t. 57. f. 6.

Lichen omnium minimus, foliolis fissis super terram expansis. *R. syn. 115. Dill. musc. 534. t. 78. f. 11.*

Anglis, least Riccia.

Habitat in inundatis; in ericeto nigro prope Londinum.
R. syn. Q. XI. XII.

2. RICCIA

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

glaucæ.

2. RICCIA frondibus glabris canaliculatis, bilobis obtusis. *Sp. pl. 1605. Schreh. spicil. III.*
Riccia fronde sulcodivisa, lobis bifurcatis, lobulis lanceolatis obtusis. Hall. hist. 1897.
Riccia minima pinguis foliis latiusculis ample sulcatis e glauco virescentibus. Mich. gen. 107. t. 54. f. 4.
Hepatica palustris bifurca, lobis brevioribus carinatis. Vaill. paris. 98. t. 19. f. 1.
Lichen minimus, foliis venosis bifariam vel trifariam se dividendo progredientibus. R. syn. ed. II. 41.
Dill. musc. 533. t. 78. f. 10.
Lichen s. Hepatica foliis crassis rutæ murariæ aut chamaedryos foliis laciniatis quodammodo similibus. R. hist. III. 48. syn. 116.
Anglis, glaucous Riccia.
Habitat in ericetis arenosis, humidis. ○. X—IV.

natans.

3. RICCIA frondibus obcordatis ciliatis. *Syst. nat. 708.*
Lichen parvus vernus cordiformis, ima parte fimbriatus, lentis palustris modo aquæ innatans. Buddl. hort. sicc. vol. II. 15. R. syn. 116.
Anglis, fringed Riccia.
Habitat in aquis stagnantibus prope Henley in comitatu Suffolciensi. R. syn. ○. VIII—X.
Obs. valde affinis Targioniæ hypophyllæ.

fluitans.

4. RICCIA frondibus dichotomis linearifiliformibus.
Sp. pl. 1686. Fl. dan. 275.
Jungermannia fronde plana pinnata dichotoma, ramulis brevissime bicornibus. Hall. hist. 1886.
Lichenastrum aquaticum fluitans tenuifolium furcatum. Dill. musc. 514. t. 74. f. 47.
Ulva palustris furcata, angustioribus et firmioribus segmentis. R. syn. 63.
Anglis, flote Riccia.
Habitat in fossis et stagnis passim. 2. I—XII.

ANTHOCEROS. 1201.

Masc. *Cal. sessilis, cylindricus, integer. Anthera subulata, longissima, bivalvis.*
Fem.

Fem. *Cal. sexpartitus, Semina tria.*

1. ANTHOCEROS frondibus indivisis sinuatis punc-*puncta-*
tatis. *Sp. pl.* 1606. *Fl. dan.* 396. *tus.*

Anthoceros minor foliis magis carinatis et eleganter
crenatis subtus incurvis. *Mich. gen.* II. t. 7. f. 2.

Anthoceros foliis minoribus magis laciniatis. *Dill.*
musc. 476. *t.* 68. *f.* 1.

Lichenastrum gramineo pediculo et capitulo, oblongo
bifurco. *R. syn.* 109.

Anglis, punctated *Anthoceros*.

Habitat in ericetis et umbrosis humidiusculis, in ericetis
Woolwicensi et Hounsflejano. VIII—IV.

L I C H E N. 1202.

Masc. *Receptaculum* subrotundum, *planiusculum* ni-
tidum.

Fem. *Farina* foliis adspersa.

* *Leprofi tuberculati.*

1. LICHEN leprosus albicans, lineolis nigris ramosis *scriptus*.
characteriformibus. *Sp. pl.* 1906. *Weis. crypt.* 37.

Lichen bivalvis, de rimis efflorescens, ater, charac-
teristicus. *Hall. hist. et nomencl.* 2079.

Lichenoides crusta tenuissima peregrinis velut litteris
inscripta. *R. syn.* 71. *Dill. musc.* 125. *t.* 18. *f.* 1.

Anglis, lettered Lichen or Liverwort.

Habitat in corticibus arborum. 24. I—XII.

2. LICHEN leprosus flavescens, lineolis nigris mappam *geogra-*
referentibus. *Sp. pl.* 1607. *Fl. dan.* 468. *f.* 1. *phicus.*
Weis. crypt. 38.

Lichen crusta inseparabili flava, scutellis nigris con-
fluentibus. *Hall. hist.* 2063.

Lichenoides nigro-flavum tabulæ geographicæ instar
pictum. *Dill. musc.* 126. *t.* 18. *f.* 5.

Anglis, map Lichen.

Habitat in rupibus in boreali parte Angliæ frequens.
24. I—XII.

3. LICHEN

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

- rugosus.* 3. LICHEN leprosus albicans, lineolis simplicibus punctisque nigris confertis. *Sp. pl.* 1607. *Weis.* *crypt.* 41.
Lichen punctatum et rugosum nigrum. *Dill. musc.* 125. t. 18. f. 2.
Anglis, wrinkled Lichen.
Habitat in corticibus arborum. 4. I—XII.
- niger.* 4. LICHEN leprosus niger, tuberculis concoloribus.
Lichen crusta continua aterrima, globulis subrotundis. *Hall. hist.* 2084.
Anglis, black Lichen.
Habitat in rupibus et saxis grandioribus passim, circa St. Ives in Cornubia copiose. 4. I—XII.
Desc. *Crusta granulata, dura, sicca, atra, latissime expansa.* *Tubercula convexa, atra, magnitudine seminis finapis.*
- sanguina-* 5. LICHEN leprosus cinereo-virescens, tuberculis atris.
rius, *Sp. pl.* 1607.
Lichen crusta farinacea virescente, scutellis atris. *Hall. hist.* 2065.
Lichenoides leprosum, crusta cinereo-virescente tuberculis nigerrimis. *R. syn.* 71. *Dill. musc.* 126. t. 18. f. 3.
Anglis, sanguineous Lichen.
Habitat in rupibus, muris, arborum corticibus et ericetis turfosis. 4. I—XII.
- fusco-* 6. LICHEN leprosus fuscus, tuberculis atris. *Sp. pl.* 1607.
ater. *Lichen crusta farinacea inseparabili cinerea, scutis nigerrimis confertis.* *Hall. hist.* 2062.
Anglis, fuscous Lichen.
Habitat in rupibus et saxis. 4. V—XII.
- calcareus.* 7. LICHEN leprosus candidus, tuberculis atris. *Sp. pl.* 1607.
Lichenoides tartareum tinctorium candidum, tuberculis atris. *Dill. musc.* 128. t. 18. f. 8.
Anglis,

Anglis, calcareous Lichen.

Habitat in rupibus calcareis, in septentrionali parte Angliae et in Wallia. 24. I—XII.

8. LICHEN leprosus viridis margine tuberculisque atris. *atro-virens.*
Syst. nat. 709. Sp. pl. 1607.

Anglis, greenish Lichen.

Habitat in rupibus, in comitatu Eboracensi passim.
24. I—XII.

9. LICHEN leprosus, tuberculis nigris albo marginatis, *cinereus*.
Mant. I. 132. Syst. nat. 709.

Anglis, grey Lichen.

Habitat in rupibus et saxis grandioribus. 24. I—XII.

10. LICHEN leprosus niger, tuberculis atro alboque *atro-albus.*
mixtis. Syst. nat. 709. Sp. pl. 1607.

Anglis, mixed Lichen.

Habitat in rupibus. 24. I—XII.

11. LICHEN leprosus, verrucis subtebellatis lævigatis *pertusus*,
pertusis poro uno altero cylindrico. Mant. I. 131.

Lichenoides verrucosum et rugosum cinereum glabrum. Dill. musc. 128. t. 18. f. 9.

Anglis, pierced Lichen.

Habitat in corticibus arborum, rupibus et muris. 24.
I—XII.

12. LICHEN leprosus albido, tuberculis pallidis albo *ruplicola*,
marginatis. Mant. I. 132. Syst. nat. 709.

Anglis, rock Lichen.

Habitat in rupibus calcareis. 24. I—XII.

13. LICHEN leprosus albus, tuberculo centrali *con-betulinus*,
colori.

Anglis, birch Lichen.

Habitat in truncis et ramis Betulæ. O. IX. IV.

Desc. Crusta fere semiuncialis diametro, orbicularis, alba, tenua, fibrosa. Tuberculum solitarium, centerale, hemisphæricum, album, magnitudine fere seminis canabis.

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

- lacteus.* 14. LICHEN leprosus albus, tuberculis concoloribus hemisphæricis. *Mant. I.* 132. *Syst. nat.* 709.
Anglis, white Lichen.
Habitat in rupibus et saxis. 24. I—XII.
- Fagineus.* 15. LICHEN leprosus albus, tuberculis albis farinaceis.
Sp. pl. 1608.
 Lichen verrucosus crustaceus albus, orbiculis villosis concoloribus. *Hall. hist.* 2086.
 Lichen crustaceus, arboribus adnascens, farinaceus albus, superficie in acetabulis pulverulentis velut efflorescente. *Mich. gen.* 99. t. 53. f. 1. 2.
 Lichenoides candidum et farinaceum, scutellis fere planis. *Dill. musc.* 131. t. 18. f. II. A. B.
Anglis, beach Lichen.
Habitat in corticibus Fagi, carpini, &c. 24. I—XII.
- Carpinus.* 16. LICHEN leprosus cinereus, tuberculis albidis rugosis. *Sp. pl.* 1608.
 Lichenoides candidum et farinaceum, scutellis fere planis. *Dill. musc.* 131. t. 18. f. II. C. D?
Anglis, horn-beam Lichen.
Habitat in corticibus Carpinii, Fagi et Fraxini 24. I—XII.
- corallinus.* 17. LICHEN leprosus ramosus teres fasciculatus fastigiatus confertissimus albus. *Mant. I.* 131. *Syst. nat.* 709.
Anglis, coral Lichen.
Habitat in rupibus, saxosis, et ericetis montosis in Wallia et boreali parte Angliae passim. 24. I—XII.
Obs. an varietas lichenis tartarei?
- ferrugi-* 18. LICHEN leprosus albidus, tuberculis subrotundis
neus. ferrugineus. *Syst. nat.* III. 234. *Fl. angl.* 440.
 Lichenoides leprosum, tuberculis fuscis et ferrugineis.
Dill. musc. 126. t. 18. f. 4. t. 55. f. 8.
Anglis, rusty Lichen.
Habitat in corticibus arborum. 24. I—XII.

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

527

19. LICHEN leprosus flavus, tuberculis rubris. *Sp. pl. ventosus.*
1607.

Anglis, red Lichen.

Habitat in rupibus in boreali parte Angliae et in Cambria. 4. I—XII.

20. LICHEN leprosus candidus, tuberculis incarnatis. *ericetorum.*
Sp. pl. 1608. Weis crypt. 44.

Lichen crusta tenace verrucosa albida, fungis carnatis.
Hall. hist. 2042.

Lichen crustaceus terrestris crusta granulosa, ex albo
subcinerea, receptaculis florum rotundis carneis pe-
diculo insidentibus. *Mich. gen. 100. t. 59.*

Lichenoides fungiforme, crusta leprosa candida, ca-
pitulis et pediculis incarnatis. *R. syn. 70.*

Coralloides fungiforme carneum, basi leprosa. *Dill.*
musc. 76. t. 14. f. 1.

Anglis, heath Lichen.

Habitat in ericetis turfosis. 4. I—XII.

Obs. variat tuberculis sessilibus et stipitatis.

21. LICHEN leprosus virescens, tuberculis substipitatis rufus.
planiusculis fuscis. *Fl. angl. 443.*

Lichen crusta tenace verrucosa fungis fuscis. *Hall.*
hist.

Lichen fungiforme terrestris, capitulis fuscis. *R.*
syn. 70.

Lichen crustaceus terrestris, crusta granulosa ex albo
subcinereo receptaculis florum rotundis fuscis pe-
diculo insidentibus. *Mich. gen. 100.*

Coralloides fungiforme fuscum, basi foliacea. *Dill.*
musc. 77. t. 14. f. 2.

Anglis, brown Lichen.

Habitat in ericetis et aggeribus fossarum. ①. X—III.

22. LICHEN leproso-farinaceus fuscus, tuberculis sti- *byssoides,*
pitatis globosis fuscis.

Lichen leproso-farinaceus, peltis stipitatis subglobosus.
Mant. I. 133. Syst. nat. 709.

Coralloides fungiforme saxatile pallide fuscum. *Dill.*
musc. 78. t. 14. f. 4.

2 Coral-

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

β Coralloides fungiforme ex ungula equina, livide rubescens. *Dill. musc.* 78. t. 14. f. 5.

Fungi parvi globosi, ex ungue equino putrescente enati. *R. syn.* 13. t.

Anglis, pedunculated Lichen.

Habitat in corticibus arborum. 4. I—XII.

** *Leprofi scutellati*.

candela- 23. LICHEN crustaceus flavus, scutellis luteis. *Sp. pl.* *rius.* 1608. *Weis. crypt.* 46.

Lichen fronde laciniata rotunde lobata flava conco-lore. *Hall. hist.* 2023.

Lichenoides crustosum orbiculis et scutellis flavis. *Dill. musc.* 236. t. 18. f. 18.

Anglis, golden Lichen.

Habitat in rupibus, muris, et arborum truncis. 4. I—XII.

flavescentia. 24. LICHEN crustaceus flavo-virescens, scutellis rufo-luteis.

Anglis, yellow Lichen.

Habitat in corticibus arborum, muris et rupibus. 4. I—XII.

Obs. *Habitus præcedentis sed crusta orbicularis, rugosa, virescens; scutellæ fusco-flavescentes, seu testaceo-luteæ convexæ.*

flavo-rubescens. 25. LICHEN crustaceus cinereo-virescens, scutellis flavo-rubescens.

Anglis, orange Lichen.

Habitat in truncis arborum, rupibus et saxis. 4. I—XII.

gelidus. 26. LICHEN crustaceus albicans, peltis tuberculosis rugosis testaceis. *Mant. I.* 133. *Syst. nat.* 709. Lichenoides tartareum lividum, scutellis lividis. *Dill. musc.* 133. t. 18. f. 14?

Anglis, broad Lichen.

Habitat in rupibus et saxis. prope Malham et Ingleton in comitatu Eboracensi. 4. I—XII

Obs. Crusta albida, rugosa crassa, scutellæ convexæ, magnæ rufæ, margine reflexæ ut tubercula apparent; habitus sequentis.

27. LICHEN

27. LICHEN crustaceus albidus, scutellis luteis, mar- *tartareus*,
gine albo. *Sp. pl.* 1608.
Lichenoides crustaceum et leprosum acetabulis majo-
ribus luteis, limbis argenteis. *R. syn.* 71. *Dill.*
musc. 132. *t.* 18. *f.* 13.
Anglis, tartareous Lichen.
Habitat in rupibus et saxis grandioribus in boreali parte
Angliæ, et in Devonia et Cambria paxim. 24.
 I—XII.
28. LICHEN crustaceus albicans, scutellis pallidis. *palleiens.*
Sp. pl. 1608. *Weis. crypt.* 47.
Lichen fronde laciniata appressa, cervina concolore.
Hall. hist. 2024.
Lichenoides crustosum orbiculare incanum. *Dill. musc.*
t. 18. f. 17.
Lichenoides cinereum mère crustaceum eleganter ex-
pansum. *R. syn.* 71.
Lichenoides crustaceum et leprosum, scutellis cinereo-
virescentibus. *R. syn.* 71.
Anglis, pale Lichen.
Habitat in rupibus, muris et arborum truncis. 24.
 I—XII.
29. LICHEN crustaceus cinereus, scutellis concavis fa- *albescens*,
rinaceus albidis.
Anglis, powdered Lichen.
Habitat in muris et corticibus arborum. 24. I—XII.
 Obs. *Habitus Lichenis carpinei.*
30. LICHEN crustaceus albicans, scutellis subfuscis, *subfuscus*,
margine cinereo subcrenato. *Sp. pl.* 1609. *Weis*
crypt. 48.
Lichen crusta tenace verrucosa cinerea, scutellis rufis
marginatis. *Hall. hist.* 2049.
Lichenoides crustaceum et leprosum, scutellis sub-
fuscis. *R. syn.* 71. *Dill. musc.* 134. *t.* 18. *f.* 16.
Anglis, brownish Lichen.
Habitat in corticibus arborum et muris. I—XII.

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

- Parellus.* 31. LICHEN crustaceus albus, peltis concavis obtusis pallidis. *Mant. I.* 132. *Syst. nat.* 710.
 Lichen verrucosus tenax albus, scutellis excavatis marginatis concoloribus. *Hall. hist.* 2048.
 Lichenoides leprosum tinctorium scutellis lapidum cancri figura. *Dill. musc.* 130. *t.* 18. *f.* 10.
Anglis, dyers Lichen.
 Habitat in muris et truncis arborum. 24. I—XII.

- ater.* 32. LICHEN crustaceus albicans rugosus, scutellis atris margine albo subcrenato. *Fl. angl.* 445.
 Lichen crusta glauca tenace verrucosa. *Hall. hist.* 2956.
 Lichenoides crustaceum et leprosum, scutellis nigricantibus majoribus et minoribus. *Dill. giss.* 205.
musc. 133. *t.* 18. *f.* 15. *R. syn.* 71.
Anglis, rugged Lichen.
 Habitat in muris, rupibus, et corticibus arborum. 24. I—XII.
 Obs. Variat scutella margine integra et crenata.

*** *Imbricati.*

- centrifugus.* 33. LICHEN imbricatus, foliolis obsolete multifidis lœvibus albidis centrifugis, scutellis rufo-fuscis. *Sp. pl.* 1609. *Weis. crypt.* 54.
 Lichen fronde profunde laciniata, semipinnata, rotunde lobata, crasse villosa, scutellis peramplis. *Hall. hist.* 2018.
 Lichenoides infbricatum viridans, scutellis badiis. *Dill. musc.* 180. *t.* 24. *f.* 75.
Anglis, spreading Lichen.
 Habitat in rupibus, muris, saxis grandioribus et truncis arborum passim. 24. I—XII.

- crassus.* 34. LICHEN imbricatus, foliolis lobatis rotundatis crenatis virescentibus, scutellis planis fulvis.
 Lichen cartilagineus, scutellis congestis cervinis, fronde brevi rotunde lobata. *Hall. hist.* 2009.
 Lichenoides cartilagineum, scutellis fulvis planis. *Dill. hist.* 179. *t.* 24. *f.* 74.
Anglis, thick Lichen.

Habitat

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

531

Habitat in rupibus et ericetis montosif. Prope Newborough in loco Llandwellyn Rocks diego; in monte Glyder. Dill. circa Malham in comitatu Eboracensi et in Westmorlandia observavi. 24. I—XII.

Obs. Folia parva, subrotunda, lobata, subcrenata, valde crassa luteo-herbacea.

35. LICHEN imbricatus, foliolis lobatis rotundatis cre- *cærulea-*
natis subtus villossimis, scutellis fulvis. *scens,*

Lichen pulmonarius crassus, superne e cinereo plumbeus torosus ac filamentosus, inferne albus et villosus receptaculis florum ex rubro-ferugineis. Mich. gen. 91. t. 43. f. 1.

Lichenoides tenue et molle, Agarici facie. Dill. musc. 179. t. 24. f. 73.

Anglis, bluish Lichen.

Habitat in truncis arborum prope Pentir et Bangor. S. Brewer. Dill. prope Bradford in comitatu Eboracensi. 24. I—XII.

Obs. Scutellæ parvæ, margines foliorum et villi cærulei sunt.

36. LICHEN imbricatus, foliolis sinuatis scabris lacunosis, scutellis folio concoloribus. *Sp. pl. 1609. saxatilis,*

Lichen subviridis, fronde semipinnata rotunde lobata, lineis pulverulentis reticulata, inferne scabra carbonaria. Hall. hist. 2011.

Lichen opere phrygio ornatus. Vaill. paris. t. 21. f. 5.

Lichen pulmonarius foliis eleganter divisis, inferne nigerrimis cirrhosique, superne lacunatis glauco-cinereis. Mich. gen. 92. t. 49. f. 1.

Lichenoides vulgatissimum cinereo-glaucum lacunosum et cirrhosum. Dill. musc. 188. t. 24. f. 83.

Lichenoides crusta foliosa, superne cinereo-glaucia, inferne nigra et cirrhosa, scutellis nigricantibus. R. syn. 72.

Musco-fungus Lichenoides minor cinereus vulgatissimus. Hist. Ox. III. 634. f. 15. t. 7. f. 6.

3 *Lichenoides arboreum purpurascens tenue et læve, scutellis majoribus. R. syn. 73.*

N n 2

Anglis,

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Anglis, stone Lichen.

Habitat in saxis, rupibus et truncis arborum. 4. I—XII.

omphalodes.

37. LICHEN imbricatus, foliolis multifidis glabris obtusis incanis, punctis vagis eminentibus. Sp. pl. 1609.

Lichen pulmonarius tinctorius, foliis eleganter tenuiterque divisis, inferne nigricantibus et cirrhosis, superne purpureis et lacunatis, receptaculis concoloribus. Mich. gen. 90. t. 49. f. 2.

Lichen nigricans omphalodes. Vaill. par. t. 20. f. 10.

Lichen petræus purpureus derbienfis. Park. 1315.

Lichenoides saxatile tinctorium, foliis pilosis, purpureum. R. syn. 74. Dill. musc. 185. t. 24. f. 80.

Anglis, purple Lichen.

Habitat in rupibus et saxis. 4. I—XII.

- fahlunen-* sis. 38. LICHEN imbricatus, foliolis linearibus dichotomis planiusculis acutis nigris, scutellis atris. Sp. pl. 1610.

Lichen fronde laciniata undique nigerrima, scutellis concoloribus. Hall. hist. et Nomencl. 2020.

Lichenoides tinctorium atrum, foliis minimis crispis. Dill. musc. 188. t. 24. f. 81.

Anglis, cork Lichen.

Habitat in rupibus et saxis grandioribus. Prope Langdale in comitatu Lancastrensi et ex Scotia recepi. 4. I—XII.

- olivaceus.* 39 LICHEN imbricatus, foliolis labatis nitidis lividis. Sp. pl. 1610. Weis. crypt. 58.

Lichen fronde semipinnata rotunde lobata olivacea, scutellis lœvibus. Hall. hist. 2013.

Lichenoides olivaceum, scutellis lœvibus. Dill. musc. 182. t. 24. f. 775.

Lichenoides crusta foliosa scutellata, pullum. Dill. giss. 206. R. syn. 72.

β Lichen fronde semipinnata rotunde lobata olivacea pulla, scutellis crenatis. Hall. hist. 2014.

Lichen crusta modo arboribus adnascens olivaceus. Vaill. par. t. 20. f. 8.

γ Lichenoides

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

533

γ Lichenoides arboreum et saxatile, crusta foliosa tenui, fusco virente, in segmenta latiora plerumque divisa.

R. syn. 74.

Anglis, olive Lichen.

Habitat in rupibus saxis et arborum truncis. 24. I—XII.

40. LICHEN imbricatus, foliis crispis fulvis, peltis *parietinosa* coloribus fulvis. *Sp. pl. 1610. Weis. crypt. 59. nus.*

Lichen fronde rugosa, rotunde lobata, flava concolore.

Hall. hist. 2021.

Lichenoides vulgare sinuosum, foliis et scutellis luteis.

Dill. musc. 180. t. 24. f. 76.

Lichenoides crusta foliosa, scutellata, flavescens. *Dill. giss. 206. R. syn. 72.*

Anglis, wall Lichen.

Habitat in arborum truncis, muris et saxis. 24. I—XII.

41. LICHEN imbricatus, laciniis obtusis subinflatilis. *physodes.* *Sp. pl. 1610. Weis. crypt. 57.*

Lichen fronde semipinnata cava, cornubus pulverulentis. *Hall. hist. 2018.*

Lichen pulmonarius arboribus adnascens: desuper cinereus, subtus anthracinus, segmentis teretibus tubulosis, ad extremitates clausis, receptaculis flororum subrubentibus. *Mich. gen. 92. t. 50.*

Lichen arboreus albescens, segmentis cornigeris, subtus aterrimus. *Pet. gag. t. 14. f. 6.*

Lichenoides ceratophyllum obtusius et minus ramosum. *R. syn. 76. Dill. musc. 154. t. 20. f. 49.*

Anglis, inflated Lichen.

Habitat in truncis arborum, saxis et ericetis. 24. I—XII.

42. LICHEN imbricatus, foliolis multifidis linearibus *fuscus*. *subfuscis*, scutellis fusco-atris.

Lichen pulmonarius saxatilis farinaceus ex fusco-nigrans, foliolis angustissimis et creberimis, receptaculis flororum ferme nigris. *Mich. gen. 95. t. 51. f. 6.*

Lichenoides angustifolium fuscum, scutellis pullis.

Dill. musc. 175. t. 24. f. 69.

N n 3

Anglis,

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Anglis, brown Lichen.

Habitat in rupibus et saxis grandioribus, prope Bangor et alibi in Wallia et in Westmorlandia. 24. I—XII.

- Pellaris*. 43. LICHEN imbricatus, foliolis oblongis laciniatis angustis cinereis, scutellis pullis. Sp. pl. 1611. Weis. crypt. 60.
Lichen fronde cinerea, profundius divisa laciniata obtuse lobata, scutellis glaucis nigrescentibus. Hall. Hist. 2017.
Lichen fronde cinerascente, linearis-multifida; scutellis fuscis. Neck. meth. musc. 89.
Lichen pulmonarius vulgarissimus, superne albo cinereus, inferne nigricans, segmentis angustis et eleganter divisis, receptaculis florum nigricantibus. Mich. gen. 91. t. 48. f. 2.
Lichenoides arboreum, crusta foliosa albo-cinerea tenuiter et eleganter dissecta, scutellis nigris. R. syn. 74.
Lichenoides cinereum, segmentis argutis stellatis, scutellis nigris. Dill. musc. 176. t. 24. f. 70.
β *Lichen* imbricatus, foliolis lobatis crenatis obtusis viridibus, polline conspersis, scutellis nigris margine crenatis. Schreb. spicil. 128.
Lichen fronde semipinnata rotunde lobata cinerea, scutellis nigris. Hall. hist. 2016.
Lichenoides arboreum, crusta foliosa virescente, tenuiter et eleganter dissecta, scutellis nigris. Dill. giss. 207. R. syn. 72.
Lichenoides glaucum orbiculare, segmentis latiusculis, scutellis nigris. Dill. musc. 177. t. 24. f. 71.
γ *Lichenoides* arboreum, crusta foliosa informi scutellis subnigris, limbo cinereo crispo cinctis. R. syn. 75.
Anglis, starry Lichen.
Habitat in arborum truncis, muris et saxis. 24. I—XII.
Obs. color in humidis virescens in siccis cinereus est.

- marginalis*. 44. LICHEN imbricatus, foliolis multifidis dentato-crenatis atro-viridibus, scutellis marginalibus planiusculis atro-fuscis.
Lichen gelatinosus ramosus laciniatus, scutellis rubris. Hall. hist. 2039.

Lichen pulmonarius gelatinosus saxatilis, mediæ crassitiei, atro-virens, foliis carinatis angustioribus Jacobæ marinæ in modum divisis, receptaculis flororum subrubris. Mich. gen. 88.

Lichenoides gelatinosum fuscum, Jacobæ maritimæ divisura. Dill. 140. t. 19. f. 25.

Anglis, marginal Lichen.

Habitat in rupibus, saxis in septentrionali parte Britanniae et in Arvonia passim. ♂. X—VI.

45. LICHEN imbricatus, foliis dentato-ciliatis, scutellis folio majoribus. Sp. pl. 1610.

Lichenoides gelatinosum, foliis imbricatis et cristatis. Dill. musc. 140. t. 19. f. 26.

Lichenoides gelatinosum tenerius laciniatum, ex plumbeo colore cærulescens, scutellis fuscis. R. syn. 72.

β *Lichenoides foliis pilosis crassioribus, obscure virentibus, scutellis fuscis.* R. syn. 74.

Anglis, crested Lichen.

Habitat in rupibus, saxis et muris passim. ♂. X—VII.

46. LICHEN imbricatus, foliis lobatis subtruncatis *crispus.* crenatis atro-viridibus, scutellis atro-fuscis. Fl. angl. 447. Syst. nat. 710.

Lichenoides obscure fuscum membranaceum gelatinosum, foliolis ad margines laciniatis densissime congestis. Decr. not. 129.

Lichenoides gelatinosum atro-virens, crispum et rugosum. Dill. musc. 139. t. 19. f. 23.

Anglis, curled Lichen.

Habitat in locis umbrosis, saxis et ad murorum bases.

♂. X—VI.

47. LICHEN imbricatus, foliolis subrotundis *sinuatus.* crenatis fusco-viridibus, scutellis concoloribus.

Lichen saxatilis gelatinosus crispus. Buxb. hal. 188.

Lichenoides tenue crispum, foliis parvis depresso-

Dill. musc. 145. t. 19. f. 33.

Lichenoides saxatile membranaceum gelatinosum erectum ex viridi fuscum, crispum. Dill. giss. 209.

N n 4

Anglis,

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Anglis, sinuated Lichen.

Habitat in rupibus, saxosis et umbrosis, prope Wigmore, in Herefordia Littl. Brown; circa Ashburton in Devonia. ♂. IX—VII.

fascicula- 48. LICHEN imbricatus, foliolis palmatis erectiusculis, scutellis terminalibus turbinatis fronde majoribus.

Lichen foliaceus gelatinosus, tuberculis turbinatis fasciculatis fronde majoribus. Mant. 133.

Lichenoides gelatinosum palmatum, tuberculis conglomeratis. Dill. musc. 141. t. 19. f. 27.

Anglis, cluster'd Lichen.

Habitat in arborum truncis et saxis. ♀. I—XII.

granula- 49. LICHEN imbricatus, foliolis subrotundis crenatis scabriusculis atro-viridibus, scutellis concavis fulvis.

Lichenoides gelatinosum atro-virens, auriculatum et granosum. Dill. musc. 140. t. 19. f. 24.

Anglis, granulated Lichen.

Habitat in rupibus, muris, et arenosis humidis passim; in ambulacris horti Oxoniensis. Dill. ♀. I—XII.

fluviali- 50. LICHEN imbricatus, foliolis lobatis subcrenatis convexis atro-viridibus, scutellis globosis cavis concoloribus.

Lichenoides gelatinosum, foliis augustioribus tuniformibus. Dill. musc. 142. t. 19. f. 28.

Lichenoides gelatinosum opuntioides. R. syn. 72.

Anglis, river Lichen.

Habitat in saxis sub aqua in rivulis alpinis. Rich. Richardson, in rivulo e spelunco Malham-cove dicta, in comitatu Eboracensi, erumpente primus observavit; in torrentibus alpinis Montis Snowdon. Dill. ♀. I—XII.

palmatus. 51. LICHEN imbricatus, foliolis subpalmatis subcrenatis glauco-purpurascensibus, scutellis fulvis.

Lichen terrestris minimus fuscus. R. syn. ed. II. 331. hist. III. 48. Vaill. paris. 144. t. 21. f. 15.

Lichenoides

Lichenoides gelatinosum tenerius laciniatum, ex fusco-purpurascens. R. syn. 72.

Lichenoides pellucidum fuscum corniculatum. Dill. musc. 143. t. 19. f. 30.

Anglis, palmated Lichen.

Habitat in ericetis et truncis arborum inter alios muscos.

○. IX—VI.

**** *Foliacei.*

52. *LICHEN foliaceus membranaceus erectiusculis tremel-*
margine criso lacinulato, scutellis concavis fulvis. *loides.*
Lichen foliaceus gelatinosus foliorum segmentis ca-
pillaceis teretibus ramosis. Scop. carn. ed. II. 1412.
Weis. crypt. 52.

Lichen atro-cæruleus laciniatus et crispus. Hall. hist. 2032.

Lichen terrestris membranaceus mollior fuscus, recep-
taculis florum sordide rubris per exiguis. Mich.
gen. 76. t. 38.

Lichenoides pellucidum endiviæ foliis tenuibus crif-
pis. Dill. musc. 143. t. 19. f. 31.

Lichenoides saxatile tenue rufescens. R. syn. 77.

Tremella Lichenoides, frondibus erectis planis mar-
gine criso lacinulato. Sp. pl. 1625.

Musco-fungus terrestris minor fuscus, foliis e latitu-
dine crenatis musco innascens. Hist. Ox. III. 632.
f. 15. t. 7. f. 4.

Anglis, fringed Lichen.

Habitat in umbrosis, saxis et truncis arborum inter alios
muscos passim. 4. I—XII.

Obs. Scutella magnitudine seminis rapi, orbiculata, con-
cava, marginata, margine glauco, subintegro; fundo
plano fulvo.

53. *LICHEN foliaceus membranaceus subrotundus lo-* nigre-
batus rugosus atro-virens, scutellis confertis rufis. scens.
Fl. angl. 450.

Lichen gelatinosus membranaceus exasperatus convo-
latus atroviridis, scutellis rubris. Hall. hist. 2037.

Lichenoides

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Lichenoides gelatinosum membranaceum tenué nigricans. *Dill. musc.* 138. *t.* 19. *f.* 20.

Lichenoides saxatile membranaceum gelatinosum tenué nigricans. *R. syn.* 72.

Anglis, blackish Lichen.

Habitat in arborum truncis, rupibus, saxis et muris. ○.
X—VI.

Burgessii. 54. LICHEN foliaceus subimbricatus crispus, scutellis elevatis muricato-crispis fundo depresso plano. *Syst. nat. ed.* 13. 807.

Anglis, Burgess's Lichen.

Habitat in arborum truncis, in Dumfrieshire, Dr. Burgess. 24. I—XII.

ciliaris. 55. LICHEN foliaceus erectiusculus; laciniis linearibus ciliatis, scutellis pedunculatis crenatis. *Sp. pl.* 1611. *Weis. crypt.* 62.

Lichen corniculatus planus, ramulis capillaribus scutellis petiolatis. *Hall. hist.* 1980.

Lichen cinereus arboreus, marginibus pilosis, major. *Vaill. paris.* 115. *t.* 20. *f.* 4.

Lichenoides arboreum soliosum cinereum, scutellis nigris, foliorum extremitatibus hispidis et pilosis.

Dill. giss. 207. *R. syn.* 73.

Lichenoides hispidum majus et rigidus, scutellis nigris. *Dill. musc.* 150. *t.* 20. *f.* 45.

Musco-fungus arboreus cinereus scutellatus, marginibus pilosis. *Hist. Ox.* III. 634. *f.* 15. *t.* 7. *f.* 6.

§ Lichen foliaceus laciniatus albus: laciniis adscendentibus obtusis pilosis, scutellis sessilibus. *Scop. carn.* 1406. *Schreb. spicil.* 127.

Lichen fronde semipinnata canaliculata cinerea. *Hall. hist.* 2019.

Lichen cinereus arboreus, marginibus pilosis, minor. *Vaill. paris.* 115. *t.* 20. *f.* 5.

Lichenoides hispidum minus et tenerius, scutellis nigris. *Dill. musc.* 152. *t.* 20. *f.* 46.

Lichenoides saxatile et arboreum tenerius, foliis pilosis, scutellis in aversa foliorum superficie apparentibus. *R. syn.* 69.

Anglis,

Anglis, ciliated Lichen.

Habitat in arborum truncis. 4. I—XII.

56. LICHEN foliaceus adscendens laciniatus, marginibus elevatis ciliatis. *Sp. pl.* 1611. *Weis. crypt.* 68. *Fl. dan.* 155.

Lichen fronde convexa ciliata pustulata obtuse ramosa utrinque lævi, ramulis brevissime bicornibus. *Hall. hist.* 1978.

Lichen terrestris, foliis eryngii. *Buxb. cent.* II. II. t. 6. f. 1, 2.

Lichen pulmonarius minor angustifolius, spinis tenuissimis ad margines ornatus, receptaculis florum transverse oblongis rubris vel ex rubro-ferrugineis. *Mich. gen.* 85. t. 44. f. 4.

Lichenoides rigidum, eryngii foliis referens. *R. syn.* 77. *Dill. musc.* 209. t. 28. f. III.

β Lichen fronde convexa, oris plicatis, ramis brevibus obtuse lobatis. *Hall. hist.* 1979.

Lichenoides eryngii folia referens, tenuioribus et crispioribus foliis. *Cels. upf.* 31. *Dill. musc.* 212. t. 28. f. 112.

γ Lichen fruticosus durus castaneus, surculis spinosis. *Hall. hist.* 1965.

Coralloides fruticuli species fuscum spinosum. *Dill. musc.* 112. t. 17. f. 31.

Lichenoides non tubulosum ramosissimum, fruticuli specie, rufo-nigrescens. *Dill. giss.* 202. *R. syn.* 66.

δ Coralloides tenuissimum nigricans, mundi muliebris instar textum. *Dill. musc.* 113. t. 17. f. 32.

Anglis, iceland Lichen.

Habitat in ericetis et rupibus montosis; δ in summis montium in Arvonia et Westmorlandia. 4. I—XII.

Obs. in γ ramuli teretes submutici, apicibus furcatis, acutis.

57. LICHEN foliaceus decumbens surfuraceus : laciniis furfuracutis, subtus lacunosis atris. *Sp. pl.* 1612. *Weis. crypt.* 65. *ceus.*

Lichen cornubus planiusculis acutis, superne farinosis, inferne atris et reticulatis. *Hall. hist.* 1976.

Lichen

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Lichen alpinus cornua cervi referens, subtus anthracinus desuper cinereus, receptaculis florum amplioribus, intus fuscis. *Mich. gen.* 76. *t.* 38. *f.* 1.

Lichenoides cornutum amarum, superne cinereum, inferne nigrum. *Dill. musc.* 157. *t.* 21. *f.* 52.

Muscus amarus absinthii folio. *B. hist.* 111. 764.

Anglis, branny Lichen.

Habitat in truncis arborum, in Arvonia, et ad palcos vivarii Croft-castle in Herefordia. Littl. Brown. in Westmorlandia et Cumberlandia observavi. 24. I—XII.

farina-
ceus.

58. LICHEN foliaceus erectus compressus ramosus farinaceus, lateribus verrucosis. *Sp. pl.* 1613. *Weis. crypt.* 64.

Lichen lacunosus complanatus, ramis acutissimis, orbiculis farinosis, marginalibus frequentissimis. *Hall. hist.* 1981.

Lichen cinereus angustior, scutis in marginibus segmentorum. *Vaill. paris.* 115. *t.* 20. *f.* 13, 14, 15.

Lichenoides segmentis angustioribus ad margines verrucosis et pulverulentis. *Dill. musc.* 172. *t.* 23. *f.* 63.

Lichenoides arboreum ramosum cinereo-candicans, segmentis angustioribus. *R. syn.* 76.

6 Lichenoides arboreum ramosum, cinereo-virescens, segmentis angustioribus, circa margines crispis. *R. syn.* 76.

7 Lichenoides non tubulosum $\pi\lambda\alpha\tau\upsilon\delta\alpha\sigma\gamma\phi\lambda\lambda\omega\nu$, tuberculis pulverulentis donatum. *[R. syn.* 66.

Anglis, mealy Lichen.

Habitat in truncis et ramis arborum. 24. I—XII.

calicaris. 59. LICHEN foliaceus erectus linearis ramosus lacunosus convexus mucronatus. *Sp. pl.* 1613. *Weis. crypt.* 67.

Lichen utrinque lacunatus farinosus et scutellifer. *Hall. hist.* 1983.

Lichen cinereus latifolius ramosus. *Vaill. paris.* 115. *t.* 20. *f.* 6.

Lichenoides coralliforme rostratum et canaliculatum. *Dill. musc.* 170. *t.* 23. *f.* 62.

Lichenoides

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

541

Lichenoides arboreum ramosum, angustioribus cineo-virescentibus ramulis. *R. syn.* 76.

Musco-fungus arboreus, capitulis rostratis. *Hist. Ox.* III. 634. *f. 15. t. 7. f. 5.*

Anglis, channeled Lichen.

Habitat in rupibus et corticibus arborum. In Cambria.

D. Llhwyd; circa Slingfoldiam in Sussexia, et copiose ad rupes montis Steiperstone in Salopiensi comitatu. Dill. 4. I—XII.

60 LICHEN foliaceus erectiusculus lacunosus: subtus prunastri. tomentosus albus. *Sp. pl.* 1614. *Weis. crypt.* 73.

Lichen complanatus, utrinque lacunosus undique farinosus. *Hall. hist.* 1984.

Lichen pulmonarius mollior dichotomus, superne cinereus, inferne albus, receptaculis florum interna parte ferrugineis. *Mich. gen.* 75. *t. 36. f. 3.*

Lichen cinereus vulgatissimus cornua damæ referens. *Vaill. paris.* 115. *t. 20. f. 11, 12.*

Lichenoides cornutum bronchiale molle subtus incaenum. *Dill. musc.* 160. *t. 21. f. 55.*

Lichenoides arboreum ramosum majus et mollius, colore candicante. *R. syn.* 75.

61 Lichen cornua damæ referens, angustifolius. *Vaill. paris.* *t. 20. f. 7.*

Lichenoides corniculatum candidum molle, segmentis angustis. *Dill. musc.* 159. *t. 21. f. 54.*

Anglis, thorn Lichen.

Habitat in truncis et ramis arborum. 4. I—XII.

61. LICHEN foliaceus erectus oblongus lanceolatus fraxinacenosus glaber, scutellis subpedunculatis. *Sp. pl. neus.* 1614. *Weis. crypt.* 72.

Lichen utrinque lacunosus fronde latissima, scutellis creberrimis. *Hall. hist.* 1985.

Lichen pulmonarius cinereus mollior, in amplas lacinias divisus. *Tourn.* 549. *t. 325. f. A. B.*

Lichen pulmonarius cinereus durior, in amplas lacinias divisus. *Tourn.* 549. *Mich. gen.* 74. *t. 36. f. 1.*

Lichenoides longifolium rugosum rigidum. *Dill. musc.* 165. *t. 22. f. 59.*

Lichenoides

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Lichenoides arboreum ramosum scutellarum majus et rigidius, colore virescente. *R. syn.* 75.
Musco-fungus quernus latifolius cinereus. Hist. Oz.
III. 634. f. 15. t. 7. f. 3, 4, 5, 9, 14, 19.
Anglis, ash Lichen.
Habitat in arborum truncis, praesertim Fraxinis et Querci. 24. I—XII.

- pulmonaria.* 62. LICHEN foliaceus laciniatus obtusus glaber, supra lacunosus, subitus tomentosus. *Sp. pl.* 1612. *Weiss. crypt.* 64.
 Lichen lacunatus inferne gibbosus, reticulo farinoso, scutellis lateralibus. *Hall. hist.* 1986.
 Lichen f. pulmonaria arborea minor et angustifolia. *Mich. gen.* 86. *t.* 45.
 Lichen arborum. *Ger. em.* 1566.
 Lichenoides pulmoneum reticulatum vulgare, marginibus peltiferis. *Dill. musc.* 212. *t.* 29. *f.* 113.
 Lichenoides peltatum arboreum maximum. *R. syn.* 70.
 Muscus pulmonarius. *B. pin.* 361. f. Lichen arboreum. *Park.* 1311.
Anglis, Lungwort, or tree Lichen.
Habitat in truncis arborum. 24. I—XII.

- juniperinus.* 63. LICHEN foliaceus laciniatus crispus fulvus, peltis lividis. *Fl. suec.* 1093. *Sp. pl.* 1614.
 Lichen fulvus sinubus dædaleis laciniatus. *Fl. lapp.* 451. *Roy. lugdb.* 50.
Anglis, juniper Lichen.
Habitat in truncis et ramis arborum. 24. I—XII.
Obs. convenit in multis, cum L. parietino sed differt colore luteo-viridi; foliis laxis, erectiusculis, sublacunosis; scutellis disco bruneis f. olivaceis.

- ampulla-* 64. LICHEN foliaceus planiusculus lobatus crenatus, peltis globosis inflatis. *Sp. pl.* 1613.
 Lichen foliis laciniatis, marginibus convolutis in vesiculam abeuntibus. *Roy. lugdb.* 509.
 Lichenoides tinctorium glabrum vesiculosum. *Dill. musc.* 188. *t.* 24. *f.* 82.
Lichenoides

Lichenoides saxatile tinctorium foliis latioribus non pilosis, vesiculas proferens. R. syn. 74.

Anglis, bladder Lichen.

Habitat in pascuis montanis Emmot-pasture dictis prope Coln in comitatu Lancastriensi. D. Richardson.
24. IX—XI.

65. LICHEN foliaceus depresso lobatus glaber : marginē glaucus, criso farinaceo. Sp. pl. 1615. Weis. crypt. 75.
Fl. dan. 598.

Lichen fronde laciniata et crispa, inferne atra et aspera. Hall. hist. 2007.

Lichenoides endiviæ foliis crispis splendentibus, subtus nigricantibus. Dill. musc. 192. t. 25. f. 96.

Musco-fungus lichenoides crispus cinereus, subtus nigricans. Hist. Ox. III. 633. f. 15. t. 7. f. 4.

Anglis, glaucous Lichen.

Habitat in rupibus, saxis et ericetis. In pascuis montosif Emmot-moor dictis prope Color in Lancastria ; in ericeto Banstead-downs dicto. Tho. Manningham.
Dill. 24. I—XII.

66. LICHEN foliaceus repens lobatus glaber, marginē perlatus : farinaceo, subtus ater, scutellis pedunculatis subcrenatis fuscis. Fl. angl. 448. Syst. nat. 712.

Lichen pulmonarius crispus inferne nigricans glaber superne cinereus, receptaculis obscuris. Mich. gen. 91. t. 50. f. 1.

Lichen pulmonarius saxatilis cinereus minor umbilicis nigricantibus. Vaill. paris. t. 21. f. 12.

Lichenoides glaucum perlatum, subtus nigrum et circosum. Dill. musc. 147. t. 20. f. 39.

Musco-fungus lichenoides arborum angustior, foliis superne cinereis, subtus nigricantibus villosis. Hist. Ox. III. 634.

Anglis, pearl Lichen.

Habitat in truncis arborum et saxis. 24. I—XII.

67. LICHEN foliaceus repens lobatus rugosus luteo-caperatus, glaucus, marginē undulato, scutellis rufis.

Lichen

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Lichen pallide viridis rugosus margine undulatus.
Sp. pl. 1614. Gue. stamp. 1. 31. Weis crypt. 74.

Lichen fronde rotunde lobata rugosa, inferne atræ et aspersa. *Hall. hist. 2005.*

Lichen pulmonarius saxis et arboribus adnascens major, inferne nigricans, superne e sulphureo cinereus receptaculis florum amplioribus, interne sordide et obsolete viridis. *Mich. gen. 89. t. 48. f. 1.*

Lichenoides caperatum rafacee expansum e sulphureo virens. *Dill. musc. 193. t. 25. f. 97.*

Lichenoides crusta foliosa, ex cinereo et luteo virecente, inferne nigra et lævi. *R. syn. 73.*

Musco-fungus lichenoides, crustæ modo adnascens major cinereus. *Hist. Ox. III. 633. f. 15. t. 7. f. 1.*

Anglis, rose Lichen.

Habitat in saxis et arboribus passim. 24. I—XII.

lacinatus. 68. *LICHEN* foliaceus repens sinuato-lobatus glaber, lobis sinuatis, scutellis fulvis.

Lichen fronde rotunde lobata, inferne scabra, arbusculis obscuris. *Hall. hist. 2004.*

Lichen foliaceus repens lobatus, supra cinereus, infra roseus tomentosus, scutellis rubris. *Scop. carn. 1393.*

Lichen pulmonarius arboribus adnascens maximus inferne obscurus, desuper e glauco-cinereus; receptaculis florum rubris; seminibus nigricantibus
Mich. gen. 88. t. 46.

Lichenoides subglaucum cumatile, foliis tenacibus, eleganter laciati. *Dill. musc. 197. t. 26. f. 99.*

Anglis, jagged Lichen.

Habitat in truncis et ad radices arborum; secus viam inter Carno et Main-Lloyne in Mervinia. Dill. 24. I—XII.

herbaceus. 69. *LICHEN* foliaceus repens obtuse lobatus crenatus glaber herbaceus, scutellis rufis.

Lichen fronde rotunde lobata vidente, inferne scabra.
Hall. hist. 2002.

Lichenoides

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

545

Lichenoides læte-virens, scutellis fulvis. Dill. *musc.* 195. t. 25. f. 98.

Lichenoides arboreum cinereo-virens, tenuē et læve ubique, scutellis minoribus. R. *syn.* 73.

Musco-fungus lichenoides arborum Hibernicus scutellatus. Hist. Ox. III. 633. f. 15. t. 7. f. 3.

Anglis, green Lichen.

Habitat in saxis, truncis et ad radices arborum, et ad sepes umbrosas prope Bishops-castle in agro Salopiensi; juxta viam inter Carno et Main-Lloyne in Mervinia. Dill. *Prope Wakehurst in Sussexia.* D. Rand. *Prope Ivy-bridge in Devonia, et in comitatibus Eboracensi et Westmorlandico observavi.* 4. I—XII.

70. **LICHEN** foliaceus repens subrotundus, sublobatus verrucosus crenatus rugosus verrucosus, verrucis farinaceis, fusus, scutellis minutissimis fulvis.

Lichen scrobiculatus. Scop. *carn.* 1391.

Lichen fronde obtuse lobata, inferne scabra, maculis rotundis varia. Hall. *hist.* 1989.

Lichen pulmonarius arboribus adnascens, inferne obscurus, desuper lacunatus, ex glauco et cinereo flavescens, receptaculis florum rubris. Mich. *gen.* 90. t. 49.

Lichenoides pulmoneum villosum, superficie scrobiculata et peltata. Dill. *musc.* 216. t. 29. f. 114.

Lichenoides arboreum foliosum cinereum et sinuatum, inferne scabrum. R. *syn.* 77.

Anglis, warty Lichen.

Habitat in truncis arborum et saxis grandioribus passim. 4. I—XII.

Obs. Scutellæ minutissimæ, hemisphæricæ, cavæ, lutescentes, fundo fulvæ sunt.

***** *Coriacei peltati.*

71. **LICHEN** coriaceus repens lobatus, peltis marginibus posticis. Syst. nat. 711. Sp. pl. 1615. *resupinatus.*

Lichen pulmonarius major ex obscuro purpureus: inferne ex albo rufescens, receptaculis florum rubris amplioribus,

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

amplioribus, ad latera oblongis. *Mich. gen.* 86.
t. 44. f. 42.

Lichenoides fuscum, peltis posticis ferrugineis. *Dill. musc.* 206. *t. 28. f. 105.*

Lichenoides saxatile fuscum, peltis in aversa foliorum superficie locatis. *R. syn.* 77.

Anglis, reversed Lichen.

Habitat in truncis arborum saxis et rupibus. 24. I—XII.

venosus. 72. *LICHEN* coriaceus repens ovatus planus, subtus venosus villosus, peltis marginalibus horizontalibus. *Syst. nat.* 711. *Sp. pl.* 1615. *Weis. crypt.* 82.

Lichen flabelliformis, subtus reticulatus, scutellis marginalibus planis. *Hall. hist.* 1993.

Lichen pulmonarius minimus inferne albus et niger reticulatus, superne e cinereo virescens, receptaculis florum nigricantibus ad latera oblongis. *Mich. gen.* 85. *t. 44. f. 3. et 5.*

Lichenoides parvum virescens, peltis nigricantibus. *Dill. musc.* 208. *t. 28. f. 109.*

Anglis, vein'd Lichen.

Habitat in saxis et rupibus humidiusculis, circa Dunkeld et alibi in Scotia. D. Oakes. 24. I—XII.

caninus. 73. *LICHEN* coriaceus repens lobatus obtusus planus, subtus venosus villosus, pelta marginali adscendente. *Syst. nat.* 712. *Sp. pl.* 1616. *Weis. crypt.* 78.

Lichen fronde subrotunde lobata, inferne reticulata, peltis convexo-concavis. *Hall. hist.* 1988.

Lichen pulmonarius saxatilis digitatus. *Vaill. paris.* *t. 21. f. 16.*

Lichen terrestris cinereus. *R. Cat. angl.* 185.

Lichenoides digitatum cinereum, lactucæ foliis sinuosis. *Dill. musc.* 200. *t. 27. f. 102.*

Lichenoides peltatum terrestre cinereum majus, foliis divisis. *R. syn.* 76.

Lichen fronde lobata obtusa aenia margine sinuata subtus villosa, peltis subrotundis. *Neck. meth. musc.* 79.

Lichen fronde obtuse lobata, superne verrucosa, inferne villosa. *Hall. hist.* 1990.

Lichenoides

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

547

Lichenoides digitatum rufescens, foliis lactucæ crispis.

Dill. musc. 203. t. 27. f. 103.

Lichenoides peltatum terrestre rufescens. R. syn. 88.

γ *Lichen fronde oblonga, subtus venoso-villosa : marginibus revolutis adscendentibus. Neck. meth. musc. 85.*

Lichenoides cinereum polydactylon. Dill. musc. 207. t. 28. f. 107.

δ *Lichenoides membranaceum pellucidum, peltis digitatis geminatis. Dill. musc. 208. t. 28. f. 108.*

Anglis, ground Lichen, or ash-coloured ground Liverwort.

Habitat in sylvis, ericetis et saxosis. γ circa Bangor in Cambria ; δ loco Rumbles-mear dicto prope Helwick in comitatu Eboracensi. Dill. 4. I—XII. Pharmac. Lichenis cinerei terrestris Herba.

74. *LICHEN coriaceus repens lobatus obtusus planus, aphtosus : verrucis sparsis, pelta marginali adscendente. Syst. nat. 711. Sp. pl. 1616. Weis. crypt. 80.*

Lichen fronde obtuse lobata, superne verrucosa. Hall. hist. 1992.

Lichenoides digitatum læte virens, verrucis nigris notatum. Dill. musc. 207. t. 28. f. 106.

Anglis, thrush Lichen.

Habitat in nemorosis, saxosis et rupibus ; in monte Dartmoor dicto in Devonia ; in monte Ingleborough et alibi in comitatu Eboracensi et in Westmorlandia. 4. I—XII.

Obs. affinis præcedenti.

75. *LICHEN coriaceus repens laciatus lacunosus, sylvaticus : peltis marginalibus adscendentibus. Fl. angl. 453.*

Lichen lacunatus exasperatus inferne villosus scutellifer. Hall. hist. 1987.

Lichen pulmonarius saxatilis fusco-rufus, receptaculis florum albidis. Mich. gen. 84. t. 43.

Lichenoides polyschides villosum et scabrum, peltis parvis. Dill. musc. 199. t. 27. f. 101.

Anglis, wood Lichen.

Habitat in sylvis ad radices arborum. 4. I—XII.

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

- horizon-* 76. LICHEN coriaceus repens planus subtus avenius,
talis. peltis marginalibus horizontalibus. *Fl. angl.* 453.
Lin. mantiss. I. 132.
 Lichen fronde rotunde lobata, peltis planissimis.
Hall. hist. 1991.
 Lichen pulmonarius maximus e cinereo rufescens in-
 ferne subrufus, receptaculis florum rubris ad latera
 oblongis. *Mich. gen.* 85. t. 44. f. 1.
 Lichen pulmonarius minor, inferne obscurus, desuper
 cinereus, receptaculis florum nigricantibus circi-
 natis. *Mich. gen.* 85. t. 44. f. 6.
 Lichenoides subfuscum, peltis horizontalibus. *Dill.*
musc. 205. t. 28. f. 104.
Anglis, flat Lichen.
Habitat in rupibus et saxis humidis et ad radices arborum
passim. 24. I—XII.
- fascatus.* 77. LICHEN coriaceus repens subrotundus, peltis de-
 pressis subtus faccatis. *Sp. pl.* 1616. *Fl. dan.* 532.
f. 3.
 Lichen fronde coriacea rotunde lobata, scutellis
 immersis. *Hall. hist.* 1995.
 Lichen pulmonarius alpinus terrestris glauco-virescens,
 receptaculis florum fuscis. *Mich. gen.* 95. t. 52.
 Lichenoides lichenis facie, peltis acetabulitis immersis.
Dill. musc. 221. t. 30. f. 121.
Anglis, pitted Lichen.
Habitat in rupibus et saxis, in rupibus Cheddar-rocks
dicitis in Somersetia; circa Llanberis et alibi in
Cambria, in boreali parte Britanniæ frequens. 24.
 I—XII.
- croceus.* 78. LICHEN coriaceus repens subrotundus planus sub-
 tus venosus villosus croceus, peltis sparsis adnatis.
Sp. pl. 1616. *Fl. dan.* 263.
 Lichen foliis subrotundis planis lævissime incisis, ca-
 lycibus orbiculatis disco folii adnatis. *Fl. lapp.* 443.
t. 11. f. 3.
 Lichen fronde rotunde lobata plana subtus venosa mi-
 niata. *Hall. hist.* 1994.

Lichenoides

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

549

Lichenoides subtus croceum, peltis appressis. Dill.
musc. 211. t. 30. f. 120.

Anglis, saffron Lichen.

Habitat in rupibus et saxosis et nemorosis montosis, prope Money-musk, Aberdeenshire. 24. I—XII.

***** *Umbilicati, squalentes quasi fuligine.*

79. LICHEN umbilicatus gibbus punctatus, subtus miniatus. fulvus. Sp. pl. 1617. Fl. dan. 532. f. 1.

Lichen fronde imbricata rotunde lobata cinerea punctata, inferne ochrea subaspera. Hall. hist. 1999. t. 47. f. 2.

Lichen pulmonarius saxatilis e cinereo fuscus, minimus. Mich. gen. 101. ord. 36. t. 54. f. 1.

Lichenoides coriaceum nebulosum cinereum punctatum subtus fulvum. Dill. musc. 223. t. 30. f. 127.

β *Lichen pulmonarius saxatilis sordide virens, foliis minimis.* Mich. gen. 101. ord. 36. t. 54. f. 2.

Lichenoides imbricatum lividum. Dill. musc. 224. t. 30. f. 128. Fl. dan. 532. f. 2.

Anglis, cloudy Lichen.

Habitat in rupibus et saxis grandioribus passim. 24. I—XII.

80. LICHEN umbilicatus subtus lacunosus, furfure pustulatigro aspersus. Sp. pl. 1617. Fl. dan. 597. f. 2. tus.

Lichen fronde cinerea inferne lacunosa, arbusculis superne nigris. Hall. hist. 1996.

Lichen pulmonarius saxatilis, inferne reticulatus et lacunosus superne cinereus ac verrucosus, receptaculis florum et seminibus nigricantibus et veluti deustus. Mich. gen. 89. t. 47.

Lichen crustæ modo saxis adnascens verrucosus cinereus et veluti deustus. Vaill. paris. 115. t. 20. f. 9.

Lichenoides pustulatum cinereum et veluti ambustum. Dill. musc. 226. t. 30. f. 131.

Anglis, blistered Lichen.

O o 3

Habitat

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Habitat in rupibus, saxis et muris, in rupibus meridiem spectantibus, subter arcem Keven-lees-castle dictam, in comitatu Radnoriensi. Littl. Brown; prope Halifax, D. Bolton; in montibus Scoticis passim. 4. I—XII.

deustus. 81. LICHEN umbilicatus undique lœvis. Sp. pl. 1618.
Lichen fronde rotunde lobata inferne nigerrima glebosa. Hall. hist. 1998.

Lichen pulmonarius saxatilis e cinereo fuscus minimus. Vaill. paris. 116. t. 21. f. 14.

Lichenoides coriaceum cinereum, peltis atris compressis. Dill. musc. 218. t. 29. f. 117.

Lichenoides saxatile, foliis minus divisis cinereo-fuscis. R. syn. 73.

Anglis, footy Lichen.

Habitat in rupibus et saxis; in rupe Sancti Vincentii prope Bristolium. D. Dare. circa Llanberis. D. Davies. 4. I—XII.

polyrrhi- 82. LICHEN umbilicatus polyphyllus utrinque lœvis polyrrhizos. Sp. pl. 1618. Fl. dan. 471. f. 3?

Lichenoides rugosum durum pullum, peltis atris verrucosis. Dill. musc. 220. t. 30. f. 118.

Anglis, singed Lichen.

Habitat in rupibus et saxis, in rupe Sancti Vincentii prope Bristolium; circa Llanberis. D. Davies, et in montibus Scoticis. 4. I—XII.

velleus. 83. LICHEN umbilicatus subtus hirsutissimus. Sp. pl. 1617.

Lichen fronde coriacea inferne pustulata villosa, scutellis atris. Hall. hist. 1997.

Lichenoides pullum superne glabrum, inferne nigrum et cirrosum. Dill. musc. 226. t. 30. f. 130.

β Lichenoides coriaceum, latissimo folio umbilicato et verrucoso. Dill. musc. 545. t. 82. f. 5.

Anglis, fleecy Lichen.

Habitat in rupibus et saxis circa Llanberis. Dill. in Clark's Park et Paradise prope Money-musk, Aberdeenshire. 4. I—XII.

84. LICHEN umbilicatus peltis turbinatis truncatis *proboscideus.*
perforatis. *Sp. pl.* 1617.

Lichen foliaceus ciliatus, peltis cylindricis rectis spar-
sis perforatis truncatis circulo dupli. *Amœn.*
acad. II. 264.

Lichenoides corneum, marginibus eleganter fimbria-
tis. *Dill. musc.* 218. t. 29. f. 116.

Anglis, button Lichen.

Habitat in *rupibus et saxis circa Llanberris in Arvonia,*
S. Brewer; *et in monte Berwyn in comitatu Der-*
biensi. Littl. Brown; in montibus Scoticis passim.
24. I—XII.

85. LICHEN umbilicatus polyphyllus undique lœvis *polyphyl-*
lus. crenatus. *Sp. pl.* 1618.

Lichenoides tenue pullum, foliis utrinque glabris.
Dill. musc. 225. t. 30. f. 129.

Anglis, smooth Lichen.

Habitat in *rupibus et saxis passim.* 24. I—XII.

***** *Scyphiferi.*

86. LICHEN stipite erecto cylindrico cyphifero, tu- *pyxida-*
berculis marginalibus subrotundis. *tus.*

Lichen scyphifer simplex crenulatus, tuberculis fuscis. *Sp. pl.* 1619. *Weis. crypt.* 85.

Lichen scypho infundibuliformi simplici. *Hall. hist.*
1912.

Lichen pyxidatus major. *Vaill. paris.* 115. t. 21. f.
8. *Mich. gen.* 82. t. 41. f. 1.

Coralloides scyphiforme, tuberculis fuscis. *Dill. musc.*
79. t. 14. f. 6.

Lichenoides tubulosum pyxidatum cinereum. *Dill.*
gifs. 204. *R. syn.* 68.

Muscus pyxidatus. *Ger. em.* 1560. *Park.* 1308.

Muscus pyxioides terrestris. *B. pin.* 361.

β Lichen caule simplici, calyce turbinato, centro sim-
pliciter prolifer. *Fl. lapp.* 431.

Lichen infundibulis glabris proliferis. *Hall. hist.* 1923.

Lichen pyxidatus prolifer. *Vaill. paris.* 115. t. 21.
f. 5.

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

- Lichenoides tubulosum pyxidatum proliferum. *Dill. giss. 204. musc. 80. t. 14. f. 6. D—H. R. syn. 69.*
- γ Lichen scyphiger infundibulorum fungis fuscis. *Hall. hist. 1919.*
Lichen pyxidatus major, acetabulo fimbriato et tuberculo. *Vaill. par. 115. t. 21. f. 11.*
- Lichenoides tubulosum pyxidatum, tuberculis fusco-nigris. *Dill. giss. 204. musc. 81. t. 14. f. 6. c. proliferum. Dill. giss. 204. musc. 81. t. 14. f. 6. K—M. R. syn. 69.*
- fimbria- δ Lichen scyphifer simplex denticulatus, stipite cylindricus. *Sp. pl. 1619.*
Lichen scyphiger infundibulis ferratis. *Hall. hist. 1915. coronatis. Hall. hist. 1916.*
- Lichen pyxidatus minor. *Vaill. paris. 115. t. 21. f. 6. Mich. gen. 83. t. 41. f. 4, 5.*
- Lichenoides tubulosum pyxidatum, marginibus serratis. *Dill. giss. 204. R. syn. 69.*
- Coralloides scyphiforme gracile, marginibus ferratis. *Dill. musc. 84. t. 14. f. 8.*
- ε Lichen infundibulis ferratis proliferis. *Hall. hist. 1924.*
Lichen infundibulis proliferis ferratis foliosis et verrucosis. *Hall. hist. 1925.*
- Lichenoides pyxidatum proliferum, marginibus ferratis. *R. syn. 69.*
- filifor- ζ Lichen scyphifer simplex integerrimis filiformis, tuberculis fuscis. *Fl. angl. 456.*
Lichen corniculo simplici apice depresso scutellato. *Hall. hist. 1908.*
- Lichenoides tubulosum pyxidatum exiguum, fusco-virens. *Dill. giss. 206. R. syn. 70.*
- Coralloides scyphis gracilibus tubiformibus, pedicularis folio. *Dill. musc. 85. t. 14. f. 10.*
- exiguus. η Lichen stipite brevissimo scyphifero.
Coralloides scyphis humilibus intus fuscis. *Dill. musc. 86. t. 14. f. 11.*
- foliaceus. θ Lichen foliis suberectis laciniatis crispis scyphiferis, scyphis brevissimis conicis. *Fl. angl. 457.*
Lichen infundibulis explanatis fungiferis. *Hall. hist. 1934.*

Lichen

- Lichen fronde semipinnata rotunde lobata, ex medio scyphigera. *Hall. hist.* 1935.
- Lichen pyxidatus, endiviæ crispæ folio prolifer, acetabulorum oris crispis. *Vaill. paris.* 115. t. 21. f. 3.
- Lichen pyxidatus, endiviæ crispæ folio prolifer, superne flavescens, inferne albidus, acetabulorum oris crispis. *Mich. gen.* 82. t. 42. f. 1, 2.
- Lichenoides cartilaginosum, tubulis et pyxiduis exiguis. *R. syn.* 70.
- Coralloides scyphiforme, foliis alcicorniformibus cartilaginosis. *Dill. musc.* 87. t. 14. f. 12.
- Musco-fungus terrestris minor crispus, foliis superne e flavo-virescentibus, subtus albicantibus. *Hist. Ox.* III. 632. f. 15. t. 7. f. 3.
- Lichen scyphifer simplex integerrimis, stipite cylindrico, tuberculis coccineis. *Sp. pl.* 58. *rus.*
- Lichen scyphiger infundibulorum fungis coccineis. *Hall. hist.* 1918.
- Lichen pyxidatus, acetabulorum oris coccineis et tumentibus. *Vaill. paris.* 115. t. 21. f. 4, 10, 11. *Mich. gen.* 82. t. 41. f. 3, 4.
- Lichenoides tubulosum pyxidatum tuberculis amæne coccineis. *R. syn.* 69.
- Coralloides scyphyforme, tuberculis coccineis. *Dill. musc.* 82. t. 14. f. 7.
- Musco-fungus pyxidatus, calyce altero alteri innato, apicibus nonnunquam coccineis. *Hist. Ox.* III. 632. f. 15. t. 7. f. 4.
- Lichen scyphifer simplex folio brevior, tuberculis cornucocineis. *Sp. pl.* 1621. *poides.*
- Lichen infundibulis proliferis, foliosis et fungosis. *Hall. hist.* 1929.
- Lichenoides pyxidatum, marginibus eleganter foliatis. *R. syn.* 69.
- Coralloides scyphiforme, marginibus foliatis et radatis. *Dill. musc.* 85. t. 14. f. 9.
- Lichen scyphifer simpliciusculus subventricosus, calyx cornutus. cibus integris. *Sp. pl.* 1620.
- Lichen corniculus simplicissimus acutis farinosis. *Hall. hist.* 1902.

Lichen

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

- Lichen cornubus acutis farinosis subramosif. *Hall. hist.* 1903.
- Coralloides vix ramosum, scyphis obscuris. *Dill. musc.* 90. t. 15. f. 14.
- Lichenoides tubulosum cinereum, non ramosum. *R. syn.* 68.
- deformis.* μ Lichen scyphifer simpliciusculus subventricosus, calycibus dentatis. *Sp. pl.* 1620. *Fl. lapp.* t. 11. f. 5.
- Lichen pyxidatus difformis, acetabulis cornigeris. *Hall. hist.* 1938.
- Lichen pyxidatus teres, acetabulis minoribus repandis. *Mich. gen.* 80. t. 41. f. 1.
- Lichenoides tubulosum minus ramosum caulinis crassioribus. *R. syn.* 68.
- Lichenoides tubulosum magis ramosum, maxime difforme. *R. syn.* 68.
- Coralloides crassius subincanum, calycibus dentatis. *Dill. hist.* 95. t. 15. f. 18.
- ventrico-* ν Lichen scyphifer ramosissimus ventricosus, scyphis dentatis, tuberculis fuscis. *Fl. angl.* 457.
- Lichen infundibulis proliferis palmatis ferratis et pungentibus. *Hall. hist.* 1937.
- Lichenoides tubulosum cinereum, valde crustaceum, ramulis brevioribus et crebrioribus ex acetabulis enascentibus. *Dill. giss.* 203. *R. syn.* 68.
- Coralloides cornucopioides incanum, scyphis cristatis. *Dill. musc.* 94. t. 15. f. 17.
- Muscus cornucopioides cristatus alpinus saxatilis. *Bocc. musc.* II. 21. t. 8.
- digitatus.* ξ Lichen scyphifer ramosissimus, ramis cylindricis, calycibus integris nodosis. *Sp. pl.* 1620. *Weis. crypt.* 91.
- Lichen infundibulis palmatis, fungulis coccineis. *Hall. hist.* 1939.
- Lichenoides coralliforme, apicibus coccineis. *R. syn.* 68.
- Coralloides ramulosum, tuberculis coccineis. *Dill. musc.* 96. t. 15. f. 19.
- Coralloides parum ramosum, tuberculis fuscis. *Dill. musc.* 97. t. 13. f. 20.

Lichen

Lichen verrucosus bicornis et tricornis, fungulis fuscis terminatis. *Hall. hist.* 1941.

¶ Lichen scyphifer ramosus, denticulatus filiformis, gracilis. *Sp. pl.* 1619. *Weis. crypt.* 93.

Lichen infundibuliflorus proliferis et corniculatis. *Hall. hist.* 1940.

Lichen pyxidatus et corniculatus ramosus alpinus e fusco-cinereus, pyxidulis crenatis. *Mich. gen.* 81. *t. 41. f. 5.*

Lichenoides pyxidatum cinereum elatius, ramulis pyxidatim desinentibus. *R. syn.* 69.

Coralloides scyphiforme ferratum elatius caulinibus gracilibus glabris. *Dill. musc.* 83. *t. 14. f. 13.*

Musco-fungus pyxidatus gracilior ramosus, calycibus ferratis. *Hist. Ox.* III. 632. *f. 15. t. 7. f. 6.*

§ Lichen corniculatus erectis ramosis, infundibuliflorus gracilibus. *Hall. hist.* 1945.

Lichen pyxidatus et corniculatus cinereus angustior et elatior, corniculatus longioribus. *Mich. gen.* 80. *t. 41. f. 3, 4.*

Lichenoides tubulosum cinereum pulverulentum et crustaceum, ramulis ex acetabulis enascentibus minus copiosis. *Dill. gis.* 203. *R. syn.* 68.

Coralloides scyphiforme cornutum. *Dill. musc.* 92. *t. 15. f. 16.*

Anglis, cup Lichen.

Habitat in ericetis, pascuis montosis et sylvis. 24. I—XII.

***** *Fruticulosi.*

87. LICHEN fruticulosus perforatus, ramulis brevissimi-uncialis. mis acutis. *Sp. pl.* 1621.

Lichen fruticosus levis perforatus caulinis palmatis brevissimis. *Hall. hist.* 1960.

Lichenoides tubulosum, caulinis mollioribus et crassioribus, minus. *R. syn.* 67.

Coralloides perforatum minus molle et tenuer. *Dill. musc.* 99. *t. 16. f. 22.*

β Lichen fruticosus levis perforatus spinosus, ramulis punctiferis. *Hall. hist.* 98. *t. 16. f. 21.*

Lichen

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Lichen coralloides tubulosus albidus major et mollior,
caulibus crassioribus minus ramosis, receptaculis
florum perexiguis rufescentibus. *Mich. gen.* 79.
t. 40. f. 2.

Lichenoides tubulosum, caulinis mollioribus et
crassioribus, majus. *R. syn.* 67.

Coralloides perforatum majus, molle et crassum. *Dill.*
musc. 98. *t. 16. f. 21.*

Musco-fungus ceranoides mollior et elatior albidus
tubulosus. *Hist. Ox.* III. 633. *f. 15. t. 7. f. 7.*

spinosus. Lichen fruticulosus tubulosus ramosissimus spinosus,
ramulis tuberculatis subdigitatis. *Fl. angl.* 459.

Lichen fruticosus vage ramosus foliosus, extremis ra-
mis palmatis fungiferis. *Hall. hist.* 1952.

Lichen coralloides tubulosus major, ex cinereo fusco-
virens caulibus crassioribus et durioribus, minus
ramosis, extremitatibus palmatis, receptaculis flo-
rum exiguis rufescentibus. *Mich. gen.* 79. *t. 40.*
f. 3, 5.

Lichenoides tubulosum ramosum rigidius, majus et
crassius cinereo-fuscum. *R. syn.* 67.

Coralloides sparsum, caulibus tortuosis et spinosis.
Dill. musc. 101. *t. 16. f. 25.*

Anglis, perforated Lichen.

Habitat in ericetis et saxosis, montosis. 24. I—XII.]

Obs. medius inter unciale et subulatum est.

subulatus. 88. LICHEN fruticulosus subdichotomus, ramis sim-
plicibus subulatis. *Sp. pl.* 1620. *Weis. crypt.* 97.

Lichen caule fruticoso erecto, ramis adscendentibus
dichotomis. *Hall. hist.* 1955.

Lichenoides tubulosum cinereum minus crustaceum
minusque ramosum. *R. syn.* 67.

Coralloides corniculatus longioribus et rarioribus. *Dill.*
musc. 102. *f. 26.*

Muscus corniculatus. *Tab. ic.* 809. *Ger. em.* 1560.
Park. 1308.

furcatus. Lichen fruticulosus tubulosus ramosus, ramis erectis
furcatis. *Fl. angl.* 458.

Lichen caule fruticoso subfolioso ramis adscendentibus
repetito bifurcatis punctiferis. *Hall. Hist.* 1954.

Lichen

Lichen coralloides tubulosus medius e cinereo viridans ramulis erectis nonnihil foliosis, extremitatibus apertis et palmatis, receptaculis florum rufescens-tibus exiguis. *Mich. gen. 80. t. 40. f. 4. et D.*

Lichenoides tubulosum cinereum, ramosius et crustaceum. *R. syn. 67.*

Coralloides corniculis brevioribus et crebrioribus. *Dill. musc. 104. t. 16. f. 27.*

Musco-fungus montanus corniculatus. *Hist. Ox. III. 632. f. 15. t. 7. f. 1. Vaill. paris. t. 26. f. 7.*

Anglis, horned, β. forked Lichen:

Habitat in ericeis et pascuis montosis. 24. I—XII.

89. LICHEN fruticulosus perforatus ramosissimus, ramulis nutantibus. *Sp. pl. 1620. Weis. crypt. 95. rinus. Fl. dan. 180.*

Lichen fruticosus farinosus, surculis innumeris nutantibus. *Hall. hist. 1957.*

Lichen coralloides tubulosus major ramosissimus receptaculis florum rufescens-tibus perexiguis. *Mich. gen. 79. t. 40. f. 1.*

Lichenoides tubulosum ramosissimum, fruticuli specie, candicans. *R. syn. 66.*

Coralloides montanum fruticuli specie, ubique candicans. *Dill. musc. 107. t. 16. f. 29.*

Musco-fungus coralloides montanus ramosissimus cinnereus vulgaris. *Hist. Ox. III. 633. f. 15. t. 7. f. 9.*

β Lichen caule ramoso, alis perforatis, ramis capitatis. *sylvaticus. Roy. lugdb. 511.*

Lichen caule fruticoso folioso, ramis subnutantibus, minute multifidis fungiferis. *Hall. hist. 1956.*

Lichenoides tubulosum ramosissimum, fruticuli specie, candicans, corniculis rufescens-tibus. *R. syn. 67.*

Coralloides fruticuli specie candicans, corniculis rufescens-tibus. *Dill. musc. 110. t. 16. f. 30.*

Muscus terrestris coralloides erectus, cornibus rufescens-tibus. *B. pin. 361. Park. 1310.*

Anglis, Rhendeer Lichen.

Habitat in ericetis, pascuis montosis et sylvis. 24. I—XII.

90. LICHEN

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

- paschalis.* 90. LICHEN fruticulosus solidus, tectus foliolis crustaceis. *Sp. pl.* 1621. *Weis, crypt.* 98. *Fl. dan.* 151. Lichen caule fruticoso, fungifero, verrucis calcariis tecto. *Hall. hist.* 1963. Lichen alpinus glaucus ramosus botryoides. *Sch. it. alp. II.* 137. *t. 19. f. 4.* *Mich. gen.* 78. *t. 35. f. 5—8.* Lichenoides non tubulosum cinereum ramosum, totum crustaceum. *R. syn.* 66. Coralloides crispum et botryiforme alpinum. *Dill. musc.* 114. *t. 17. f. 33.* Musco-fungus coralloides fruticosior et lignosior. *Hist. Ox. III.* 635. *f. 15. t. 7. f. 12.* *Anglis,* crisp Lichen. Habitat in rupibus et saxosis montosis. 24. I—XII.
- fragilis.* 91. LICHEN fruticulosus solidus laevis, ramulis teretibus acutis obtusis, tuberculis terminalibus globosis cavis. Lichen fruticulosus solidus ramulis teretibus obtusis. *Sp. pl.* 1621. *Fl. lapp. t. 11. f. 1.* Lichen caule fruticoso ramoso erecto densissime cespitoso. *Hall. hist.* 1962. Lichenoides non tubulosum ramosissimum, fruticuli specie, cinereo-fuscum. *R. syn.* 65. Coralloides alpinum corallinæ minoris facie. *Dill. musc.* 116. *t. 17. f. 34.*
- globife- β Lichen fruticulosus solidus ramosissimus ramulis teretibus acutis furcatis, tuberculis terminalibus globosis. *Fl. angl.* 460. *Lin. Mantiss.* 133. Lichen fruticosus coralloides non tubulosus cinereus ramosissimus, receptaculis florum sphæricis concoloribus. *Mich. gen.* 103. *t. 39. f. 6.* Lichenoides non tubulosum, ramulis scutellis nigris terminatis. *R. syn.* 66. Coralloides cupressiforme, capitulis globosis. *Dill. musc.* 117. *t. 17. f. 35.* *Anglis,* brittle, β globe Lichen. Habitat in rupibus, saxis et ericetis montosis. 24. I—XII.

92. LICHEN fruticulosus solidus lœvis, ramulis tereti-*radiatus*.
usculis acutis, scutellis planis radiatis.
Lichen fruticulosus durus niger, repetito dichotomus.
Hall. hist. 1966.
Coralloides corniculatum, fuci tenuioris facie. *Dill. musc.* 118. t. 17. f. 37.
Anglis, radiated Lichen.
Habitat in rupibus et saxis montosis, in montis Snowdon jugo rupium a Cwn Brwynog. versus Ardu invenit Guil. Jones et Sam. Brewer. *Dill. in alpibus Scoticis.* 4. I—XII.
93. LICHEN fruticulosus solidus compressus subra-*filiqus*.
mosus tuberculis lateralibus concavis. *Fl. Engl.* 460.
Coralloides fasciculare verrucosum et veluti filiquosum. *Dill. musc.* 119. t. 17. f. 38.
Musco-fungus petræus, cornibus indivisis et incurvatis. *Hist. Ox.* III. 633. f. 15. t. 7. f. 4. *R. hist.* III. 30.
Anglis, podded Lichen.
Habitat in rupibus et saxis, in saxa illa grandia, quæ per campos elatos Grey-weathers in Wiltoniensi comitatu, dictos, dispersa jacet. *Dill.* 4. I—XII.

***** Filamentosi.

94. LICHEN filamentosus ramosus erectus fastigiatus *vulpinus*, compressus lacunosus inæquali-angulosus.
Lichen filamentosus ramosissimus erectus fastigiatus inæquali-angulosus. *Sp. pl.* 1623. *Fl. dan.* 226.
Lichen ramosus aureus cauliculis planis lacunatis farinosis cornutis. *Hall. hist.* 1974.
Usnea capillacea citrini, fruticuli specie. *Dill. musc.* 73. t. 13. f. 16?
Muscus aureus tenuissimus. *Mer. pin.* *R. syn.* 65.
Anglis, fox Lichen.
Habitat in truncis et ramis arborum, in ramulis ericæ in ericetis montosis, in insula Anglesea, D. Brewer; supra Dartmoor et alibi in Devoniam; in agro Somersetensi passim. 4. I—XII.

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

- floridus.* 95. LICHEN filamentosus ramosissimus erectus, tuberculis farinaceis sparsis, scutellis radiatis.
 Lichen filamentosus ramosus erectus, scutellis radiatis. *Sp. pl.* 1624. *Weis. crypt.* 102.
 Lichen barbatus, ramis teretibus, surculis parallelis simplicibus, scutellis radiatis. *Hall. hist.* 1972.
Usnea vulgatissima tenuior et brevior cum orbiculis.
Dill. musc. 69. *t.* 13. *f.* 13.
Muscus ramosus floridus. *Tab. ic.* 808. *Ger. em.* 1560.
Muscus arboreus cum orbiculis. *B. pin.* 361. *R. syn.* 65.
Musco-fungus arborum capillaceus, scutis amplissimis per ambitum pilis radiatis. *Hist. Ox. III.* 635. *f.* 15. *t.* 7. *f.* 14.
- hirtus.* β Lichen filamentosus ramosissimus erectus, tuberculis farinaceis sparsis. *Sp. pl.* 1623. *Weis. crypt.* 101.
 Lichen barbatus, teretibus cauliculis, ramis simplicibus parallelis. *Hall. hist.* 1973.
Usnea vulgatissima tenuior et brevior sine orbiculis.
Dill. musc. 67. *t.* 13. *f.* 12.
Muscus ramosus. *Tab. ic.* 807. *Ger. 1372.* *R. syn.* 65.
Anglis, flowering Lichen.
Habitat in sylvis et sepibus frequens. 24. I—XII.
Obs. variat colore fulvo et luteo.
- plicatus.* 96. LICHEN filamentosus pendulus, ramis implexis, scutellis radiatis. *Sp. pl.* 1622. *mat. med.* 495.
 Lichen teres pendulus exasperatus ramis descendentibus, scutellis radiatis. *Hall. hist.* 1971.
Usnea vulgaris, loris longis implexis. *Dill. musc.* 56. *t.* 11. *f.* 1.
Muscus arboreus, *Usnea officinarum.* *B. pin.* 361. *R. syn.* 64.
Muscus quercinus. *Ger. em.* 1558.
Muscus arboreus vulgaris et quercinus. *Park.* 1311.
Anglis, tree Lichen, or Moss.
Habitat in ramis arborum; in sylvis densis passim. 24. I—XII.

97. LICHEN filamentosus pendulus subarticulatus, ramis barbatus, patentibus. *Sp. pl.* 1622. *Weis. crypt.* 100.
Lichen barbatus, trunco articulato lœvi. *Hall. hist.* 1970.
Usnea barbata, loris tenuibus fibrosis. *Dill. musc.* 63. *t. 12. f. 6.*
Muscus capillaceus longissimus. *B. pin.* 361. *Anglis*, bearded Lichen.
Habitat in ramis arborum, in sylva dicta Forest of Dean in Gloucestriensi comitatu, et in sylva prope Bishops- castle in Salopia. *Dill. musc.* 24. I—XII.
98. LICHEN filamentosus articulatus, ramis tenuissimi articulatis punctatis. *Sp. pl.* 1623. *Roy. lugdb.* 513. *tus.*
Usnea capillacea et nodosa. *Dill. musc.* 60. *t. 11. f. 4.*
Muscus arboreus nodosus. *B. pin.* 361. *R. syn.* 65. *f. geniculatus*. *Park.* 1311.
Anglis, jointed Lichen.
Habitat in ramis arborum in sylvis passim; in sylva ad villam Stoken-church; prope Burnley in Lancastria.
Dill. musc. 24. I—XII.
99. LICHEN filamentosus ramosus subpendulus implexus jubatus; cato-flexuosus, axillis compressis.
Lichen filamentosus pendulus, axillis compressis. *Sp. pl.* 1622. *Weis. crypt.* 101.
Lichen barbatus pendulus, filamentis nigris prolixis. *Hall. hist.* 1968.
Usnea jubata nigricans. *Dill. musc.* 67. *t. 12. f. 7.*
Muscus corallinus faxatilis fœniculaceus. *R. syn.* 65.
Musco-fungus trichoides e nigridine cinereus jubæ ad instar e faxis et arboribus dependens. *Hist. Ox.* III. 633.
- 8 Lichen filamentosus ramosus divaricatus decumbens chalybeo-implicato-flexuosus. *Sp. pl.* 1623. *Fl. dan.* 261. *formis.*
Lichen fruticosus diffusus, caulis vagis flexuosis rigidis teretibus. *Hall. hist.* 1969.
Usnea rigida horsum versus extensa. *Dill. hist.* 66. *t. 13. f. 10.*
Muscus caule rigido instar fili chalybei. *R. syn.* 65.
Anglis, wiry Lichen.

P p

Habitat

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Habitat in rupibus et arborum truncis; in Wallia, et in boreali parte Britanniæ passim. 4. I—XII.

- scaber.* 100. LICHEN filamentosus ramosissimus decumbens implexus scaber, scutellis concavis integerrimis. Usnea cæspitosa exilis capillacea atra. Dill. musc. 66. t. 13. f. 9.

Anglis, scabrous Lichen.

Habitat in rupibus et saxis grandioribus circa Llanberris copiose. in boreali parte Angliae passim. 4. I—XII. Obs. Scutellæ magnitudo fere seminis Papaveris albi, hemisphæricæ, concavæ, marginatæ, atræ, fundo atro-fusco, margine integerrima.

- lanatus.* 101. LICHEN filamentosus ramosissimus decumbens implicatus, ramulis brevissimis divaricatis.

Lichen fruticosus minimus flexuosus, cauliculis nigris capillaceis. Hall. hist. 1967.

Usnea lanæ nigræ instar saxis adhærens. Dill. hist. 66. t. 13. f. 8.

Muscus coralloides lanæ nigræ instar saxis adhærens. R. syn. 65.

Anglis, woolly Lichen.

Habitat in rupibus et saxosis, in Cornubia D. Stephens, in rupibus Cambriæ circa Borth, milliaris distantia a Bangor S. Brewer; in septentrionali parte Britanniæ passim. 4. I—XII.

- pubescens.* 102. LICHEN filamentosus ramosissimus decumbens implexus nitidus. Sp. pl. 1623.

Anglis, pubescent Lichen.

Habitat in rupibus et saxosis in Westmorlandia passim. 4. I—XII.

Obs. affinis præcedenti sed minor.

TREMELLA. 1204.

Fructificationes vix manifestæ, in corpore gelatinoso.

- juniperina.* 1. TREMELLA sessilis membranacea auriformis fulva. Sp. pl. 1625.

Agaricus

Agaricus membranaceus sinuosus, substantia gelatinæ.

R. syn. 21.

Anglis, yellow Tremella.

Habitat in junipero communi, Ulice europæo et Spartio scopario. ♂. IX—V.

2. TREMELLA sessilis membranacea auriformis rugosa fusca. *Auricula.*

Tremella sessilis membranacea auriformis cinerea.

Sp. pl. 1625.

Elvela sessilis membranacea rugosa et crispa, in formam gyrosam et concavam varie complicata. *Gled. meth. fung. 39.*

Peziza bracteata, cespitosa, plana extus sericea.

Hall. hist. 2220.

Peziza auriculam referens. *Dill. giss. 195. R. syn. 18.*

Agaricus auriculæ forma. Mich. gen. 124. t. 66. f. 1.

Fungus membranaceus auriculam referens s. sambucinus. *B. pin. 372.*

Fungus sambucinus, s. Auricula Judæ. *Ger. em. 1585.*

Park. 1320. Sterb. th. 256. t. 27.

Anglis, eared Tremella.

Habitat in lignis putridis. ♂. IX—V.

3. TREMELLA sessilis gelatinosa turbinata picea. *Fl. turbinata.*

dgn. 464.

Peziza sessilis infundibuliformis, extus hirsuta umbrina, intus nigerrima. *Hall. hist. 2219. t. 48. f. 8.*

Elvela pulla. *Scheff. fung. IV. 104. t. 158.*

Fungoides quercinum peltatum nigrum. *Dill. giss. 190. R. syn. 16.*

Anglis, black Tremella.

Habitat in truncis et ramis Quercuum dejectarum. ♂. IX—IV.

4. TREMELLA sessilis subrotunda undulata nigra arboreata scens.

Tremella arborea nigricans minus pinguis et fugax.

Dill. musc. 54. t. 10. f. 15.

Nostoc nigricans; arboribus adnascens. *Vaill. paris. 144.*

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Lichen gelatinosus niger undosus et crispus. *Hall. hist.*
2038.

Lichen arboreus membranaceus nigricans. *Buxb.*
comm. petrop. III. 273. t. 14. f. 3.

Anglis, tree Tremella, or Witches Butter.
Habitat in truncis arborum. ⊙. IX—V.

Nostoc. 5. *TREMELLA* sessilis subrotunda plicata undulata fusco-virens.

Tremella sessilis plicata undulata. *Sp. pl.* 1625.
Weis. crypt. 29.

Tremella terrestris sinuosa pinguis et fugax. *Dill.*
musc. 52. t. 10. f. 14.

Linkia terrestris gelatinosa membranacea vulgatissima.
Mich. gen. 126. t. 67. f. 1.

Lichen gelatinosus plicatus undulatus, laciniis crispis granulofis. *Hall. hist.* 2041.

Ulva terrestris pinguis et fugax. *R. syn.* 64.

Nostoc paracelsi. *Aet. paris.* 1708. p. 228.

Anglis, jelly Tremella.

Habitat in pratis et pascuis post pluvias. ⊙. I—XII.

utricula- 6 *TREMELLA* sessilis tuberculosa gelatinosa, tuberculis cavis.

Tremella fluviatilis gelatinosa et uterculosa. *Dill.*
musc. 14. t. 10. f. 16?

Linkia palustris gelatinosa saxis adnascens ex obscurō fulvo et concava vesicam referens. *Mich. gen.* 126.
t. 67. f. 2.

Anglis, bladder Tremella.

Habitat in rivulis supra lapides, circa Pentir et Llanberis, Dill. in rivulis montosis in comitatibus Westmorlandico et Cumberlandica. Prope Tidewell in comitatu Derbiensi. 4. I—XII.

Desc. *Rupes et lapides sub aqua late tegit, hæc Tremella, substantia gelatinosa, viridia, rigidiuscula, fragilis, nunc semi, nunc ad duas uncias crassa; superficies nitidiuscula, tuberculosa, subinde lœvis, tuberculis intus cavis, variæ magnitudinis Pisi vel nucis Avellane.*

7. *TREMELLA*

7. TREMELLA tuberculosa solida rugosa. *Sp. pl. verrucosa.*
1625.
Tremella subrotunda sinuosa difformis gelatinosa. Lin.
It. w-goth. 193.
Anglis, warty Tremella.
Habitat in rivulis et fontibus limpidis supra lapides. 24.
I—XII.
Obs. Substantia valde tenerrima læte viridis.
8. TREMELLA hemisphærica sparsa. *Sp. pl. 1626. hemis-*
Anglis, hemisphæric Tremella.
phærica.
Habitat in conervis, Fuci et rupibus submarinis. 24.
I—XII.
9. TREMELLA subrotunda sinuosa difformis gelatino- *difformis.*
fa. Sp. pl. 1626. It. w-goth. 193.
Anglis, sea Tremella.
Habitat in conervis et Fuci et rupibus submarinis. 24.
I—XII.
10. TREMELLA rotunda imbricata livida. *Sp. pl. adnata.*
1627. It. scan. 323. Fl. suec. 1140.
Anglis, livid Tremella.
Habitat in rupibus et lapidibus submarinis. 24. I—XII.
11. TREMELLA subglobosa sessilis solitaria glabra. *purpurea.*
Sp. pl. 1626. Fl. suec. 1142.
Sphæria convexa miniata hirsuta. Hall. hist. 2189.
Lichenoides tuberculosum amæne purpureum. Dill.
giss. 206. musc. 127. t. 18. f. 6. R. syn. 71.
Lycogala globosum rubrum, grani panici magnitudine
et forma. Mich. gen. 216. t. 95. f. 3.
Nostoc granulosum coccineum arboribus adnascens.
Vaill. paris. 144.
Anglis, purple Tremella.
Habitat in arborum ramis moribundis et emortuis. ②.
IX—V.
12. TREMELLA sessilis gelatinosa difformis albida. *albida.*
Echinus gelatinosus crystallinus. Hall. hist. 2319?
Anglis, whitish Tremella.

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Habitat in arborum ramis dejectis semiputridis, in sylvis densis. ♂. IX—V.

Desc. Frons gelatinosa, difformis, albida subinde glaucescens et flavescens, subrugosa, solida, diaphana.

granula.

13. TREMELLA gelatinosa sphærica aggregata virtidis.

Tremella palustris, vesiculis sphæricis fungiformibus.

Dill. musc. 55. t. 10. f. 17.

Ulva sphærica aggregata. Sp. pl. 1633.

Lichenoides fungiforme, capitulis vel vesiculis sphæricis, aqueo humore repletis. R. syn. 70.

Anglis, granulated Tremella.

Habitat ad margines fossarum et fluvium et in sylvis arenosis humidis, inter Newington et Hackney, prope Londinum, Dill. circa Charlton in Cantio copiose. ♀. X—V.

ULVA 1206.

Fructificationes in membrana diaphana.

pavonia. 1. ULVA plana reniformis decussatim striata sessilis Syst. nat. 719.

Fucus fronde sessili reniformi decussatim striata. Sp. pl. 1630. Gmel. fuc. 169.

Fucus maritimus gallopayonis pennas referens. B. pin. 155. Hist. Ox. III. 645. t. 8. f. 7. R. syn. 43. Ell. cor. 88. t. 33. f. c.

Corallina foliacea, frondibus proliferis reniformibus striatis transversimque fasciatis. Pall. Zoph. 419.

Anglis, striated Laver, or Turkey-feather.

Habitat in rupibus et saxis submarinis passim. I—XII.

Obs. margines foliæ et fassiarum ciliatæ, pilis tenuissimis.

Lactuca. 2. ULVA palmata prolifera membranacea: ramentis inferne angustatis. Sp. pl. 1632. Gmel. fuc. 215.

Ulva marina lactucæ similis. R. syn. 62.

Tremella marina vulgaris lactucæ similis. Dill. musc. 42. t. 8. f. 1.

Fucus marius, lactuca marina dictus, Park. 1293. Muscus

- Muscus marinus lactucæ similis. *B. pin.* 364.
Lichen marinus. *Ger. em.* 1566.
- β Ulva palustris lactucæ marinæ similis sed multo minor et tenerior, *R. syn.* 63.
Tremella palustris, vulgari similis, sed minor et tenerior. *Dill. musc.* 44. t. 8. f. 2.
- γ Ulva terrestris tenerrima viridis crispa. *R. syn.* 64.
Tremella terrestris tenera crispa. *Dill. musc.* 52. t. x. f. 12.
Anglis, green Laver or Oyster-green.
Habitat in rupibus et saxis submarinis. β *fossis et stagnis;*
γ. in umbrosis arenosis et humidis ad muros circa Londonum paſſim. ⊖. IX—V.
3. ULVA plana orbicularis sessilis peltata coriacea. *Syst. umbilicata.* nat. 719.
Ulva fronde dilatata subsinuata, centro radicato. Sp.
pl. 1633. Gmel. fuc. 214.
Ulva marina umbilicatis. *R. syn.* 62.
Tremella marina umbilicata. *Dill. musc.* 46. t. 8.
f. 3.
Fucus umbilicus marinus dictus. *B. pin.* 364.
Anglis, navel Laver.
Habitat in saxis et rupibus submarinis. 4. I—XII.
4. ULVA plana subrotunda membranacea sinuata coccinea.
Anglis, scarlet Laver.
Habitat in rupibus et saxis submarinis, prope Plymouth et Falmouth. 4. I—XII.
Desc. Frons semipedalis et pedalis, subrotunda sinuata, subundulata, plana, membranacea, diaphana coccinea, nitida. Semina numerosa, parva, subrotunda, atro-purpurea.
5. ULVA subensiformis plana undulata membranacea fusca.
fusca.
Ulva oblonga plana undulata membranacea viridis. latissima.
Sp. pl. 1632?
Fucus longissimo latissimo tenuique folio. *B. pin.* 154. *R. syn.* 40.

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Alga longissimo lato tenuique folio. *B. pin.* 364.
hist. III. 801.

Anglis, brown Laver.

*Habitat in rupibus et saxis submarinis, prope Sheerness
in insula Shepey copiose.* *○. V—X.*

*Desc. Frons pedalis et tripedalis, a duabus ad octo uncias
late, ensiformis, membranacea, tenuis, undulata, nitida,
fuscæ.*

lanceolata. 6. ULVA ovato-lanceolata plana. *Syst. nat.* 719.

Tremella marina, porri folio. *Dill. musc.* 46. *t. 5.*
f. 5.

Anglis, spear Laver.

Habitat in scopolis marinis, in insula Mona. *D. Brewer.*
4. I—XII.

linza. 7. ULVA fronde oblonga bullata. *Sp. pl.* 1633.

Ulva marina fasciata. *R. syn.* 62.

Tremella marina fasciata. *Dill. musc.* 46. *t. 9. f. 6.*

Fucus linza dictus, lactucæ marinæ similis. *B. hist.*
III. 801.

Muscus lactucæ marinæ similis. *B. pin.* 364.

Anglis, ribbin Laver.

*Habitat in saxis et rupibus submarinis; in fossis prope
Sheerness.* *4. I—XII.*

dichoto- 8. ULVA plana dichotoma viridis. *Fl. angl.* 476.

Fucus membranaceus dichotomus gramineus. *R. syn.*
45.

Anglis, dichotomous Laver.

*Habitat in rupibus et saxis submarinis in insula Walney
et in Devonie, Cornubia et Sussexia.* *4. I—XII.*

intestina- 9. ULVA tubulosa simplex membranacea viridis.

Ulva tubulosa simplex. *Sp. pl.* 1632. *Weis. crypt.*
271.

Ulva marina tubulosa, intestinorum figuram referens.
R. syn. 62.

Tremella marina tubulosa intestinorum figuram. *Dill.*
musc. 42. *t. 9. f. 7.*

Fucus cavus. *B. pin.* 364. *hist. III.* 803.

Anglis

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

569

Anglis, gut Laver.

Habitat in fossis et stagnis marinis. ○. III—X.

10. ULVA tubulosa subramosa compressa viridis, ramis *compressæ*, alternis longissimis.

Ulva tubulosa ramosa compressa. Sp. pl. 1632.

Ulva marina tenuissima et compressa. R. syn. 63.

Tremella marina tenuissima et compressa. Dill. musc. 48. t. 9, 10. f. 8.

Alga tubulosa albida, navibus adhærens. Pet. gaz. t. 9. f. 6.

Anglis, compressed Laver.

Habitat in rupibus, saxis et fossis marinis. ○. I—XII.

11. ULVA tubulosa ramosissima teretiuscula, ramis op- *purpureæ* positis acutis. *scens.*

Anglis, purplish Laver.

Habitat in rupibus et saxis submarinis; prope Christ- church in comitatu Hantonensi. ○. III—X.

Desc. Frons semipedalis, crassitie filii emporetici, tubulosa, teretiuscula, purpurascens, diaphana, ramosissima; Rami oppositi, subdistichi, teretes, acuti.

12. ULVA tubulosa articulata ramosissima, ramis oppo- *articula-* sitis dichotomis. *ta.*

Corallina lenta purpurea compressa. R. syn. 34.

Fucus purpureus humilis tenuiter divisus geniculatus.
Hist. Ox. III. 646. s. 15. t. 8. f. 14.

β. Tremella marina cæspitosa, segmentis tenuibus. *Dill. musc. 50. t. 10. f. 9.*

Anglis, jointed Laver.

Habitat in rupibus et saxis submarinis, in Cornubia, Devonia, Dorsetia, Sussexia, &c. frequens. ○. III—XI.

13. ULVA gelatinosa tubulosa uniformis simplex. *fistulosa.*

Anglis, pipe Laver.

Habitat in saxis et fucis marinis. ○. V—IX.

Desc. Radix repens, Frondes numerosæ, gelatinosæ, uniformes, fistulosæ, apice clausa, fuscescentes, triun- ciales,

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

ciales, crassitie fili emporetici. Semina numerosa, parva, rotunda, fusca.

- diaphana.* 14. *ULVA gelatinosa pallida diaphana teretiuscula ramosa, ramis brevissimis acutiusculis.*
Alcionum polymorphum gelatinosum. *Faun. suec.* 2228. *Syst. nat. I. 1295.*
Alcionum cinerescente-hyalinum ramosissimum, ramis teretibus subacutis. *Pall. Zooph.* 207.
Spongia ramosa altera anglica. *Park.* 1304.
Fucus spongiosus nodosus. *Johns. it. cant.* 3. f. 3.
Ger. em. 1570. *R. syn.* 49. *Ellis. cor.* 87. t. 32.
f. d. D.
Urtica marina nodosa. *Bocc. musc.* fig. 269. t. 5. f. 13.
Anglis, diaphanous Laver.
Habitat in littore maris; prope Sheerness copiose. 24.
 I—XII.
 Desc. *Frons gelatinosa, solida, teretiuscula, pallida, diaphana, ramosa; ramis brevissimis teretibus acutiusculis.*
Semina numerosissima, minuta, fusca. variat longitudine a quatuor ad sedecim uncias, crassitudine a digito fere ad carpum.

- flavescens.* 15. *ULVA gelatinosa subteretiuscula subramosa flavescens, ramis brevissimis obtusis.*
Alga minor flavescens varie divisa. *Mart. cent.* 32.
Anglis, yellowish Laver.
Habitat in rupibus et saxis marinis; in insulis Anglesea et Walney. 24. I—XII.
 Desc. *Frons gelatinosa, solida, teres, et subinde compressa et dilatata, tum margine sinuato-dentata, subramosa, pallide flavescens; ramis brevissimis, obtusis.* *Semina numerosa, parva; rotunda, fusca, longitudine trium et quatuor unciarum, crassitudine fere digitii minoris.* *An varietas præcedentis?*

- filiformis.* 16. *ULVA gelatinosa filiformis ramosissima purpurea, ramis sparsis distantibus longissimis.*
Anglis, filiform Laver.

Habitat

Habitat in rupibus et saxis submarinis; prope Christ-Church in comitatu Hantonienſi. ○. IV—IX.

Desc. Frons semipedalis, crassitie fere fili emporetici gelatinosa, filiformis, ramosissima, purpurascens; ramis sparsis distantibus, longissimis, obtusis.

17. ULVA gelatinosa filiformis ramosissima pallida, capillaris. ramis alternis capillaribus acutis.

Anglis, capillary Laver.

Habitat in rupibus et saxis marinis; prope Christ-church et alibi in comitatu Hantonienſi; prope Margate. ○. V—X.

Desc. Frons quadriuncialis gelatinosa, solida, filiformis, ramosissima, pallida; ramis alternis capillaribus acutis.

18. UEVA gelatinosa filiformis ramosissima rubescens, rubens. ramis sparsis horizontalibus obtusis.

Anglis, reddish Laver.

Habitat in rupibus et saxis, in insula Portlandica et prope Pool in Dorsetia. ○. V—X.

Desc. Frons quadriuncialis, crassitie fere fili emporetici, gelatinosa, rubescens, filiformis, ramosissimus; ramis sparsis, horizontalibus, brevibus, obtusis.

19. ULVA gelatinosa filiformis dichotoma rubra. rubra.

Anglis, red Laver.

Habitat in saxis submarinis, prope Christ-church in comitatu Hantonienſi. ○. V—IX.

Desc. Frons sesquiuncialis, gelatinosa, filiformis, dichotoma, obtusa, rubra; ramis longis.

20. ULVA gelatinosa filiformis ramosa, ramis linearis lanceolatis pinnatis nitidis. plumosa.

Anglis, feathered Laver.

Habitat in rupibus et saxis submarinis, prope Exmouth in Devonia. ○. IV—X.

Desc. Caulis longitudine digiti, filiformis compressus, fusco-rubescens, ramosus; ramis linearis-lanceolatis compressis, dense pinnatis, rubescenti-viridibus; pinnis gelatinosis, capillaribus, viridiſſimis, nitidis.

incrassa- 21. *ULVA* gelatinosa plana sinuato-dentata viridis,
ta. margine incrassato.

Tremella viridissima corniculis palmatis. *Hall. hist.*
2125.

Tremella palustris gelatinosa, Damæ cornuum facie.
Dill. musc. 51. t. 10. f. 10.

Conferva gelatinosa, damæ cornua repræsentans. *R.*
syn. 60.

Fucus fontanus pinguis, corniculatus viridis. *Vaill.*
paris. 56. t. 10. f. 3.

Anglis, thick Laver.

Habitat in fossis et stagnis, prope Chichester, D. Man-
ningham, in insula Selsey in Sussexia copiose, inter
Greenwich et Woolwich; prope Doncaster, circa
Spalding, et alibi in comitatu Lincolnensi. *O.*
III—X.

prunifor- 22. *ULVA* subglobosa solitaria. *Sp. pl.* 1633. *Fl. suec.*
mis. 1159. intus succulenta. *Syst. nat.* 1633.

Fucus subglobosus sessilis mollis. *Gledit. monogr.*

Anglis, plumb Laver.

Habitat in fossis et stagnis, in lacubus alpinis in West-
morlandia. *O.* V—X.

Obs. magnitudo pruni spinosæ s. insititiæ.

pisiformis. 23. *ULVA* globosa solitaria spongiosa fuscescens.

Anglis, pea Laver.

Habitat in fossis inter Greenwich et Woolwich. *O.*
III—VIII.

Desc. Frons variæ magnitudinis a seminis rapi ad pisum,
sphærica, reticulato-contexta, pulposa, fusco virens.

F U C U S. 1205.

Masc. *Vesiculæ* villis intertextæ.

Fem. *Vesiculæ* adspersæ granis immersis apice promi-
nulis. Sem. Solitaria.

* *Foliis distinctis.*

natans. 1. *FUCUS* caule tereti ramosissimo, foliis lanceolatis
ferratis,

serratis, fructificationibus globosis pedunculatis.

Sp. pl. 1628. Gmel. fuc. 92.

*Fucus folliculaceus, serrato folio. B. pin. 365. Barr.
ic. 1122.*

*Lenticula marina serratis foliis. Lob. obs. 256. Da-
lech. hist. 1397. Ger. em. 1615. Park. 1281.*

Anglis, Flote Fucus, or Gulf-weed.

*Habitat in littoribus maritimis; in insula Shepey D.
Banks; ex Northumbria recipi; inter rejectamenta
maris prope Falmouth. 4. I—XII.*

2. **FUCUS** caule compresso ramoso, foliis ovalibus in-ovalis.
tegerrimis.

Fucus vermicularis. Gmel. fuc. 162. t. 18. f. 4.

Fucus polypodioides. Gmel. fuc. 186.

*Alga minor caulifera, foliis parvis oblongis ex viridi-
rufescens. Mart. cent. 32.*

Anglis, ovate Fucus.

*Habitat in rupibus et saxis submarinis, prope Scarbo-
rough in comitatu Eboracensi, et Christ-church in
comitatu Hantoniensi. O. V. X.*

3. **FUCUS** caule tereti ramoso, foliis ovato-oblongis *sanguine-*
undulatis integerrimis. Fl. angl. 475. Gmel. fuc. us.
185. t. 24. f. 2. Fl. dan. 349.

*Fucus frondibus membranaceis ovato-oblongis inte-
gerrimis petiolatis, caule tereti ramoso. Syst. nat.*
718.

*Fucus sive alga folio membranaceo purpureo, lopathi
sanguinei figura et magnitudine. Hist. Ox. III.
645. s. 15. t. 8. f. 6. R. syn. 49.*

Anglis, dock-leaved Fucus.

*Habitat in rupibus et saxis submarinis passim; prope
Falmouth copiose. 4. I—XII.*

*Obs. Fructificationes subrotundæ, pedunculatæ, atro-ru-
bentes, ad latera ramorum et nervorum; magnitudine
seminis rapi.*

4. **FUCUS** caule tereti ramoso, foliis oblongis undula-*rubens.*
tis sinuatis dentatis.

*Fucus frondibus membranaceis oblongis undulatis
sinuatis,*

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

sinuatis, stipite tereti ramoso. *Syst. nat.* 718. *Sp. pl.* 1630. *Fl. dan.* 1652.

Fucus crenatus. *Gmel. fuc.* 184. *t. 24. f. 1.*

Fucus membranaceus purpureus latifolius pinnatus.
R. syn. 47.

Anglis, reddish *Fucus.*

Habitat in rupibus et saxis marinis. 24. I—XII.

fimbriatus. 5. *FUCUS* caule compresso subsimplici, foliis distichis linearibus ciliatis, fructificationibus marginalibus oblongis.

Fucus caulescens. *Gmel. fuc.* 173. *t. 20. f. 2.*

Anglis, fringed *Fucus.*

Habitat in littoribus marinis, in insula Portlandica sed rarius. 24. I—XII.

** *Ramosi fronde unita.*

siliquosus. 6. *FUCUS* fronde compressa ramosa, foliis distichis alternis integerrimis, fructificationibus pedunculatis oblongis mucronatis. *Syst. nat.* 716. *Sp. pl.* 1629. *Fl. dan.* 106. *Gmel. fuc.* 81. *t. 2. B.*

Fucus maritimus alter tuberculis paucissimis. *B. pin.* 365.

Fucus angustifolius vesiculis oblongis siliquarum æmulis. *R. syn. 48.* *Hist. Ox.* III. 647.

Quercus marina quarta. *Ger. em.* 1569.

Anglis, podded *Fucus.*

Habitat in rupibus et saxis marinis. 24. I—XII.

concatenatus. 7. *FUCUS* fronde filiformi ramosissima, ramulis dichotomis, vesiculis moniliformibus distantibus innatis, foliis subulatis. *Syst. nat.* 717?

Fucus caule tereti ramosissimo, fructificationibus oblongis concatenatis. *Roy. lugd.* 514. *Sp. pl.* 1628.

Fucus folio tenuissimo diviso, siliquatus. *R. syn. 48.*

Fucus foliis ericæ Raii. *Reaum. act. gall.* 1712. 31.
t. 3. f. 5.

Fucus marinus foliis abrotani maris. *Lob. ic.* 2. *p. 254.*

Fucus foliculaceus foliis abrotani. *B. pin.* 365.

Muscus

Muscus marinus abrotanoides. Park. 1290.

Anglis, chain Fucus.

Habitat in rupibus et saxis submarinis in littoribus Sussexiano et Cornubiensi. 24. I—XII.

8. **FUCUS** fronde filiformi ramosissima, ramis alternis *setaceus*.
distichis vesiculis ellipticis innatis, foliis setaceis.

Fucus, seu acinaria maritima anglicana. Bocc. *muf.*
fisic. 270. t. 6. f. 5. Gmel. *fuc.* t. 18. f. 2?

Anglis, setaceous Fucus.

Habitat in rupibus et saxis submarinis sed rarius. 24.
I—XII.

Desc. Frons filiformis ramosissima, rami alterni distichi,
erectiusculi, flexuosi; Folia alterna, setacea, erecta,
versus apicem ramorum imbricata; Vesiculæ ellipticæ,
caule ramisque innatæ, remotiusculæ, magnitudine viciæ
sativæ.

9. **FUCUS** fronde filiformi ramosissima, vesiculis ovatis *foenicula-*
terminatis foliolis multipartitis obtusis apice fructi- *ceus.*
ficantibus. Syst. nat. 717. Sp. pl. 1629?

Fucus vesiculis oblongis pedunculatis: terminatis
foliolis linearibus. Sp. pl. 1629.

Fucus foeniculaceus. Gmel. *fuc.* 86. t. II. A. f. 2.

Anglis, fennel Fucus.

Habitat in rupibus et saxis submarinis, in Devonia pas-
sim. 24. I—XII.

10. **FUCUS** fronde filiformi compressa bipinnata: api- *abrotani-*
cibus vesiculosis dilatatis terminatis fructificationi- *folius.*
bus hinc tuberculatis. Syst. nat. 716.

Fucus pinnatus, ramis dichotomis extremitatibus di-
latato-vesiculosis. Loefl. it. 174. Sp. pl. 1629.

Anglis, southernwood Fucus.

Habitat in rupibus et saxis marinis; in littoribus Sus-
sexiano et Hantonensi. 24. I—XII.

11. **FUCUS** fronde filiformi ramosissima vesiculis sub- *fibrosus.*
rotundis innatis, foliolis filiformibus linearibus-
que.

Fucus

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Fucus abrotanoides vesiculis parvis rotundis ornatus.

Hist. Ox. III. 648. t. 8. f. 17.

Fucus radicibus arborum fibrosis similis. *R. syn. 49.*

Fucus folliculaceus: foeniculi folio. *B. pin. 365?*

Anglis, fibrous Fucus.

Habitat in littoribus Eboracensi, Lancastrensi et Han-
toniensi. *24. I—XII.*

tamarisci- 12. FUCUS fronde filiformi ramosissima, ramis alter-
folius. *natis vesiculis subrotundis innatis, foliis alternis ge-*
mínatis subulatis basi tuberculatis.

selaginoi- 13. Fucus fronde filiformi ramosissima, ramis dichotomis,
des. *foliis subulatis alternis basi vesiculosis.* *Syst. nat.*
717. Mant. 134.

Fucus abies marina. *Gmel. fuc. 83. t. II. A. f. 1.*

Fucus tamarisco similis maritima. *B. pin. 365.*

Fucus foliis ericæ aut tamarisci. *R. syn. 49.*

Erica marina quibusdam. *B. hist. III. 799.*

Anglis, tamarisk Fucus.

Habitat in rupibus et saxis submarinis. *Prope Mar-*
ketjew copiose et alibi in Cornubia et Devonia; in
littore Eboracensi. *24. I—XII.*

*** *Alati s. Fronde plana, stipite medium folium percur-*
rente.

serratus. 13. FUCUS fronde plana dichotoma serrato-dentata,
fructificationibus terminalibus tuberculosis. *Syst.*
nat. 715. Sp. pl. 1626. Gmel. fuc. 57.

Fucus s. Alga latifolia major dentata. *R. syn. 42.*

Hist. Ox. III. 648. s. 15. t. 9. f. 1. Aet. gall. 1711.
285. t. 9. f. 1.

β Fucus marina humilis latifoliæ serratæ similis. *R.*
syn. 42.

Anglis, serrated Fucus, or sea Wrack.

Habitat in rupibus et saxis marinis. *24. I—XII.*

vesiculo- 14. FUCUS fronde plana dichotoma integerrima, ve-
siculis axillaribus geminis, terminalibus tubercula-
tis. *Syst. nat. 715. Sp. pl. 1626. Gmel. fuc. 60.*

Fucus

- Fucus maritimus vel Quercus maritima vesiculos habens. *B. pin.* 363.
- Fucus f. Alga marina latifolia vulgatissima. *R. syn.* 40.
- Quercus marina. *Lob. ic. 2. p.* 255. *Ger. em.* 1567.
herbacea et varietas. *Park.* 1293.
- β Fucus maritimus f. Quercus maritima foliorum extremitis tumidis. *B. pin.* 365.
- Fucus palmaris latioribus foliis in binas ternasve vesiculos verrucosas terminatis. *Hist. Ox. III.* 647.
f. 15. t. 8. f. 10.
- γ Fucus fronde plana dichotoma integerrima axillis di- divaricatis, vesiculis axillaribus geminis. *Sp. pl.* 1627. *tus.*
- Fucus bullatus fruticescens, caule nudo, foliis rectis compressis bifidis. *Hist. Ox. III.* 647. *f. 15. t. 8.*
f. 5.
- Anglis*, bladder Fucus, or Sea Oak.
- Habitat in rupibus et saxis marinis. 4. I—XII.
15. FUCUS fronde plana dichotoma integerrima punc- *spiralis.*
tata: inferne linearis canaliculata, fructificationibus tuberculatis geminis. *Syst. nat.* 715. *Sp. pl.* 1627.
Fl. dan. 286.
- Fucus spiralis maritimus major. *R. syn.* 497.
- Alga spiralis maritima major. *Hist. Ox. III.* 646.
- Anglis*, spiral Fucus.
- Habitat in saxis et rupibus submarinis, in littore Can-
tiano, Sussexiano, et Essexiano frequens. 4.
I—XII.
16. FUCUS fronde plana spirali perfoliata repando- *volubilis.*
dentata. *Syst. nat.* 715. *Sp. pl.* 1627. *Gmel. fuc.*
180?
- Fucus spiralis serratus. *Bar. ic.* 1303?
- Fucus spiralis maritima minor. *R. syn.* 42. *Tourn.*
568.
- Alga spiralis maritima. *Bocc. sic.* 70. *t. 38. f. 2?*
- Anglis*, twisted Fucus.
- Habitat in saxis et rupibus marinis in estuario Cestriensi.
R. syn. 4. I—XII.

- linearis.* 17. **FUCUS** alatus dichotomus integerrimus acutus, fructificationibus tuberculatis terminalibus.
Fucus filiformis. Gmel. *fuc.* 72. *t.* 1. *f.* 1.
Fucus f. *Quercus marina minima angustifolia.* Doody.
R. syn. ed. II. 328.
Anglis, linear Fucus.
Habitat in rupibus et saxis submarinis. 24. I—XII.
- alatus.* 18. **FUCUS** alatus membranaceus subdichotomus integerrimus coloratus, laciniis alternis bifidis.
Fucus frondibus membranaceis subdichotomis nervosis, laciniis alternis decurrentibus bifidis. Lin. *Mant.* 135. *Fl. dan.* 352. Gmel. *fuc.* 187. *t.* 25. *f.* 1.
Fucus dichotomus parvus costatus et membranaceus.
R. syn. 44.
Fucus purpureus tenuiter divisus non geniculatus.
Hist. Ox. III. 646.
Anglis, winged Fucus.
Habitat in rupibus et saxis submarinis. 24. V—X.
- esculentus.* 19. **FUCUS** alatus simplicissimus ensiformis, stipite pinnata.
Fucus fronde simplici indivia ensiformi, stipite pinnata folium percurrente. Mant. 135. Fl. dan. 200. *t.* 29. *f.* 1. Gunner. *aet Nidros.* 4. *t.* 8. *f.* 1.
Fucus alatus sive phæganoides. B. *pin.* 364. pr. 154.
Fucus scoticus latissimus edulis dulcis. Sibb. *pr.* 26. *R. syn.* 46.
Anglis, esculent Fucus.
Habitat in rupibus et saxis submarinis, in littore Cumberlandico, et Scotico passim. 24. I—XII.
- **** *Fronde plana avenia.*
- sacchari-* 20. **FUCUS** fronde plana avenia simplici ensiformi, stipite tereti brevissima.
Fucus fronde simplici ensiformi, stipite brevissima.
Syst. nat. 718. *Sp. pl.* 1630. *Fl. dan.* 416. Gmel. *fuc.* 194. *t.* 27 et 28.
Fucus folio singulari, longissimo lao, in medio rugoso,

- goso, qui balteiformis dici potest. *R. syn.* 39. *Aet. gall.* 1712. 29. t. 3. f. 4.
 ♂ *Fucus longissimo latissimo crassoque folio.* *B. pr.* 154. *R. syn.* 39.
 ♀ *Fucus latissimus et longissimus oris crispis.* *R. syn.* 38;
 ♂ *Fucus phyllitidis folio.* *R. syn.* 40.
Anglis, sweet Fucus, or sea Belts.
Habitat in rupibus et saxis submarinis. 4. I—XII.

21. *FUCUS* fronde plana avenia palmata; laciniis en- *digitatus*.
 siformibus, stipite tereti.

Fucus fronde palmata, foliolis ensiformibus, stirpe
 tereti. *Mant.* 134. *Fl. dan.* 392.

Fucus arboreus polyschides edulis. *B. pin.* 364. *R.*
syn. 46.

Fucus phasganoides et polyschides. *Ger. em.* 1570.

Fucus maximus polyschides. *Park.* 1292.

Anglis, fingered Fucus or Hangers.

Habitat in rupibus et saxis submarinis. 4. I—XII.

22. *FUCUS* fronde plana avenia palmata; laciniis en- *bulbosus*.
 siformibus, stipite plana.

Fucus arboreus polyschides, caule plano et tortuoso.
Aet. gall. 1712. 21. t. 1.

Fucus palmatus. *Gmel. fuc.* 202. t. 30.

Anglis, bulbous Fucus.

Habitat in rupibus et saxis submarinis, in littore Cor-
nubiensi passim. 4. I—XII.

23. *FUCUS* fronde palmata plana. *Sp. pl.* 1630. *ave-palmatus*,
 nia sessilis.

Fucus dulcis. *Gmel. fuc.* 189. t. 26.

Fucus membranaceus ceranoides. *B. pr.* 155. *R.*
syn. 46.

Fucus foliaceus humilis palmam humanam referens.
Hist. Ox. III. 646. f. 15. t. 8. f. 1.

Anglis, palmated Fucus.

Habitat in rupibus et saxis submarinis. 4. I—XII.

24. *FUCUS* frondibus planis membranaceis aveniis ra- *laciniæ-*
 mosis, ramis dilatatis palmatis.

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Fucus ciliatus. *Gmel. fuc. t. 21. f. 1.*

Alga minor suave rubens varie divisa. *Mart. cent.*

32. t. 33.

Anglis, jagged Fucus.

Habitat in rupibus et saxis submarinis. *○. IV—X.*

Obs. variat marginibus integris et dentato-crispatis.

ciliatus. 25. **FUCUS** frondibus planis aeniis ramosis membranaceis acutis ciliatis.

Fucus frondibus membranaceis lanceolatis proliferis ciliatis. *Mant. 136. Syst. 718. Fl. dan. 353.*

Fucus holosetaceus. *Gmel. fuc. 177. t. 21. f. 2.*

Fucus ligulatus. *Gmel. fuc. 178. t. 21. f. 3.*

Fucus membranaceus rubens angustifolius, marginibus ligulis armatis. *R. syn. 47.*

Fucus humilis membranaceus acaulos elegantissimus ruber, capillis longis fimbriatis. *Hist. Ox. III. 646.*

Anglis, ciliated Fucus.

Habitat in rupibus et saxis marinis. *○. IV—XI.*

Obs. variat longitudine ciliarum a linea ad unciam.

Fructificationes ad apicem ciliarum, rotundæ, magnitudine seminis papaveris albi.

crispus. 26. **FUCUS** frondibus submembranaceis planis aeniis dichotomis, apicibus dilatatis bifidis.

Fucus frondibus submembranaceis dichotomis, laciniis dilatatis. *Syst. nat. 718. Mant. 134.*

Fucus membranaceus purpureus varie ramosus. *R. syn. 47.*

Alga crispa scabiosa rubra et pallida. *B. hist. III. 795.*

Anglis, curled Fucus.

Habitat in rupibus et saxis submarinis. *4. I—XII.*

crispatus. 27. **FUCUS** frondibus membranaceis planis aeniis linearibus ramosis, marginibus crispato-lacinulatis.

Fucus frondibus membranaceis sublinearibus ramosis simis crispis coloratis. *Syst. nat. 718?*

Fucus laceratus. *Gmel. fuc. 179. t. 21. f. 4?*

Ulva fronde ramosa plana undulata purpurea. *Fl. angl. 476.*

Anglis,

Anglis, crisped Fucus.

Habitat in rupibus et saxis submarinis, in comitatibus Cornubiensi, Devonensi et Hantonensi passim. ◎. V—X.

Desc. Frons palmaris membranaceus, tenerrimus, rubens, ramosus, linearis, planus, subundulatus, avenius, crisplacinulatus, obtusus, lacinulis fructiferis, fructificazioni subrotundæ, parvæ, atro-rubescentes.

28. FUCUS frondibus membranaceis planis aeniis *bifidus*, dilatatis bifidis.

Anglis, bifid Fucus.

Habitat in saxis et rupibus submarinis, in littore Hantonensi. ◎. V—X.

Desc. Radix ramosus compressus repens. Frons uncialis et sexuncialis, membranacea, semel et subinde bis bifida, cuneiformia s. versus apicem dilatata, plana, aenia, purpurea, diaphana.

29. FUCUS frondibus cartilagineis planis aeniis *ra-pinnatifidus*, ramis dentato-pinnatifidis, dentibus callosis. dus.

Gmel. fuc. 156. t. 16. f. 3. Fl. dan. 354.

Fucus Osmunda. Gmel. fuc. 155. t. 16. f. 2.

Fucus Dealensis pedicularis rubriæ folio. R. syn. 48.

Pet. mus. 405.

Alga cervi cornu divisura. B. hist. III. 797?

Anglis, pinnatifid Fucus.

Habitat in rupibus et saxis marinis. ◎. IV—X.

30. FUCUS frondibus cartilagineis planis aeniis *ra-multifidus*, ramis alternis distichis subduplicato-pinnatifidis obtusis.

Fucus membranaceus acaulos angustior, foliis palmæ in modum divisus, marginibus laciniatis et veluti crisspis. Hist. Ox. III. 646. f. 15. t. 8. f. 2. Act. gal. 1712. t. 4. f. 6.

Anglis, multifid Fucus.

Habitat in rupibus et saxis submarinis in comitatibus Devonensi et Hantonensi. 24? IV—X.

Desc. Frons tri et sexuncialis cartilaginea, plana aenia, linearis, inferne angustior et crassior, fusco-rubra, sed

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

versus apicem pallidior et flavescens, ramosa; ramis alternis distichis subduplicato-pinnatifidis, laciniis obtusis.

- dentatus.* 31. FUCUS frondibus membranaceis aveniis alternatim pinnatifidis: sinubus obtusis, laciniis apice erosis.
Syst. nat. 719. Fl. dan. 354.

Fucus corymbiferus. Gmel. fuc. 124. t. 9.
Fucus membranaceus rubens, foliolis latiusculis ad extrema dentatis. Hist. Ox. III. 646. s. 15. t. 8. f. 5.

Anglis, dentated Fucus.

Habitat in rupibus et saxis marinis, in comitatibus Devonensi et Eboracensi. ⊖. V—X.

- herbace-*
us. 32. FUCUS frondibus subcartilagineis planis aveniis duplicato-pinnatis, laciniis suboppositis linear-lanceolatis ferratis.

Anglis, herbaceous Fucus.

Habitat in rupibus et saxis submarinis, inter rejectamenta maris prope Hastings in Sussexia, et in Northumbria. 4. I—XII.

Desc. Frons sesquipedalis et bipedalis circiter duas lineas lata, subcartilaginea, ovata, plana, avenia, herbacea, duplicato-pinnata; laciniis oppositis linear-lanceolatis, ferratis, ferraturis subinde setaceis.

- ceranoi-*
des. 33. FUCUS fronde cartilaginea plana aenia dichotoma integerrima punctata lanceolata, fructificationibus tuberculatis bifidis terminalibus. Syst. nat. 715.

Fucus fronde dichotoma plana integra, apicibus bifidis vesiculosis. Sp. pl. 1626. Gmel. fuc. 115. t. 7. f. 1, 2, 3.

Fucus membranaceus ceranoides varie dissectus. R. syn. 44.

Fucus dichotomus ceranoides angulis rotundiusculos efformans. Hist. Ox. III. 646. s. 15. t. 8. f. 11?

β Fucus membranaceus ceranoides ramosus, per siccitatem obsolete virens. Pluk. alm. 161. R. syn. 44.

δ Fucus ceranoides albidus, ramulorum apicibus stellatis. Pluk. alm. 161. R. syn. 44.

γ Fucus

- γ Fucus fronde dichotoma plana margine lacero, *Sp. pl.* lacerus.
1627.
Fucus palmetta. *Gmel. fuc.* 182. t. 22. f. 3. et t. 23?
Fucus parvus caulinis teretibus, summitatibus membranaceis dilatatis et laceratis. *R. syn.* 44.
δ Fucus fronde plana dichotoma integerrima punctata inflatus.
ovato-lanceolata inflata, apice diviso. *Syst. nat.*
715. *Sp. pl.* 1627. *Fl. lapp.* 468.
Anglis, buckshorn Fucus.
Habitat in rupibus et saxis submarinis. 24. VI—XI.

34. FUCUS fronde plana aenia dichotoma integerrima canaliculata linearis, fructificationibus tuberculatis latus.
bipartitis obtusis. *Syst. nat.* 716. *Gmel. fuc.* 72.
t. I f. 2. *Fl. dan.* 214.
Fucus fronde linearis dichotoma hinc canaliculata, excisus.
axillis divaricatis, punctatis. *Syst. nat.* 715. *Sp. pl.*
1627.
Fucus pumilus dichotomus, segmentis ex una parte gibbosus, ex altera excavatis. *R. syn.* 43.
Fucus palmae angustifolius ad extrema vesiculis rugosis bifurcatis. *Hist. Ox.* III. 647. f. 15. t. 8,
f. 12.
ε Fucus humilis dichotomus membranaceus, ceranoides,
latiорibus foliis, ut plurimum verrucosis. *Hist. Ox.*
III. 646. f. 15. t. 8. f. 13. *Act. gall.* 1711. 301,
t. II. f. 5.
γ Fucus fronde plana dichotoma integerrima linearis, distichus,
fructificationibus tuberculatis mucronatis. *Syst.*
nat. 716.
Fucus geniculatus. *Gmel. fuc.* 75. t. I, f. 3.
Anglis, furrowed Fucus.
Habitat in rupibus et saxis submarinis. 24. VI—VIII.

***** *Fronde compressa,*

35. FUCUS fronde compressa dichotoma acuta tuberculata vesiculis sparsis.
Fucus fronde filiformi compressa dichotoma undique tuberculata, *Syst. nat.* 716?

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Fucus longo angusto crassoque folio. *B. pin.* 364.
pr. 155. *R. Syn.* 43.

Fucus marinus secundus. *Dod. pempt.* 479. *Park.*
1293.

Quercus marina secunda. *Ger. em.* 1568.

Anglis, thong Fucus, or sea Thongs vulgo.

Habitat in rupibus et saxis submarinis. *4.* VI—IX.

tomento- 36. *FUCUS fronde compressa dichotoma tomentosa ob-*
fus. *tusa.*

elonga- *Fucus fronde filiformi compressa dichotoma articu-*
tus. *lata, geniculis tumidiusculis.* *Syst. nat.* 716. *Sp.*
pl. 1627.

Fucus spongiosus teres ramosior viridis erectis.
Hist. Ox. III. 647. f. 15. t. 8. f. 7.

Spongia dichotomos teretifolia viridis. *R. syn.* 29.
Anglis, woolly Fucus.

Habitat in rupibus et saxis submarinis; in Cornubia.
R. syn. prope Exmouth in Devonia. in littore Ebo-
racensi. *4.* V—X.

nodosus. 37. *FUCUS fronde compressa dichotoma, foliis di-*
stichis integerrimis, vesiculis innatis solitariis di-
latatis. *Syst. nat.* 716. *Gmel. fuc.* 78. *t. 1. B. f. 1.*
Fl. dan. 146.

Fucus caule compresso dichotomo medio ramorum in
vesiculam dilatato. *Sp. pl.* 1628.

Fucus maritimus nodosus. *B. pin.* 365. *R. syn.* 48.
Aet. gall. 1712. 26. *t. 2. f. 3.*

Fucus marinus tertius. *Dod. pempt.* 480.

Fucus maritimus, vesiculis majoribus singularibus per
intervalla dispositis. *Hist. Ox. III. 647. t. 8. f. 2.*

Quercus marina tertia. *Ger. em.* 1568.

Anglis, knobbed Fucus.

Habitat in rupibus et saxis submarinis. *4.* V—X.

pumilus. 38. *FUCUS fronde compressa dichotoma, axillis diva-*
ricatis, vesiculis subsolitariis axillis ultimis innatis
fructificationibus globosis terminalibus.

Anglis, dwarf Fucus.

Habitat

Habitat in rupibus et saxis inter fluxum et refluxum maris frequens. 4. VI—X.

Desc. Frons fere semiuncialis, cartilaginea, dichotoma, compressa, fere plana, inferne angustior, atro-olivacea et subinde purpuro-cærulea; Vesiculæ solitariæ, et subinde geminæ, rotundæ, inflatæ, infra ultimas axillas innatæ. Fructificationes globosæ, apicibus ramorum terminantes, parvæ, glabræ.

39. FUCUS fronde cartilaginea filiformis compressa di- filiformis.
chotoma acuta.

Anglis, filiform Fucus.

Habitat in rupibus et saxis prope insula Walney in comitatu Lancastriensi. 4. V—X.

Desc. Frons semipedalis, cartilaginea, filiformis, compressa, dichotoma, diaphana, rubescens.

40. FUCUS fronde filiformi compressa ramosissima, aculeatus.
dentibus marginalibus subulatis alternis erectis.

Syst. nat. 717. Fl. dan. 355.

Fucus muscoides. Gmel. fuc. 130. t. 12.

Fucus angustifolius, foliis dentatis. R. syn. 48.

Fucus tenuifolius, foliis dentatis. Hist. Ox. III. 648.
f. 15. t. 9. f. 4.

Anglis, prickly Fucus.

Habitat in rupibus et saxis marinis, in Devonia, Cornubia et Northumbria frequens. 4. V—X.

41. FUCUS fronde cartilaginea compressa ramosissima, corneus.
ramis alternis distichis pinnatis. laciiniis oppositis
setaceis, fructificationibus subrotundis pedunculatis.

Fucus sericeus. Gmel. fuc. 149. t. 15. f. 3?

Fucus flavicans teretifoliis ramulis pennatim enascen-
tibus. R. syn. 50.

Fruticulus parvus pennatus flavicans, corneus et te-
nax. Buddl. hort. sicc. II. 2.

Anglis, horney Fucus.

Habitat in rupibus submarinis in Cornubia et Devonia
passim. 4. V—X.

- pinnatus.* 42. FUCUS fronde cartilaginea filiformi compressa sub-triplicato-pinnata, laciniis subulatis erectiusculis.
Anglis, pinnated Fucus.
Habitat in rupibus et saxis submarinis in Cornubia, Devoniam et Sussexiam passim; prope Scarborough in comitatu Eboracensi. ☉. V—X.
Desc. Frons triuncialis, filiformis, compressa, cartilaginea, rubra, duplicito vel triplicato-pinnata acuta; laciniis oppositis subulatis, brevissimis, erectiusculis.
- obtusus.* 43. FUCUS fronde cartilaginea filiformi compressa sub-duplicato-pinnata, laciniis obovatis apice tuberculatis.
Anglis, obtuse Fucus.
Habitat in saxis et rupibus marinis prope Hastings in Sussexiam et in Devoniam passim. ☉. V—X.
Desc. Frons quadriplicaris, filiformis, compressa, cartilaginea, diaphana, purpurascens, subduplicato-pinnata; laciniis oppositis, obovatis, patentibus, apice tuberculatis.
- filicinus.* 44. FUCUS fronde cartilaginea compressa obtusa sub-decomposito-pinnata, laciniis horizontalibus obtusis.
Anglis, fern Fucus.
Habitat in rupibus et saxis submarinis prope Walney in comitatu Lancastriensi. ☉. V—X.
- cartila-*
gineus. 45. FUCUS fronde cartilaginea compressa decomposito-pinnata, laciniis linearibus. *Syst. nat.* 719.
Fucus versicolor. *Gmel. fuc.* 158. t. 17. f. 2.
Fucus coronopi facie. *Buddl. hort. sic.* I. 12. R.
syn. 45.
Frutices marini arbuscularum forma multicolores.
Seb. mus. III. 191. t. 102. f. 1, 2.
Anglis, cape Fucus, or Weed.
Habitat in rupibus et saxis; in Cornubia D. Stevens.
24.I—XII.
- coccineus.* 46. Fucus fronde cartilaginea compressa ramosissima, ramulis alternatim secundis, fructificationibus globosis lateralibus. *Fl. angl.* 473.
Fucus

Fucus plocamium. *Gmel. fuc.* 153. *t.* 16. *f.* 1.

Fucoides rubens varie dissectum. *R. syn.* 37.

Muscus marinus. *Clus. hist.* 250.

Anglis, scarlet Fucus.

Habitat in rupibus et saxis submarinis frequens. 4.

VI—X.

47. **FUCUS** fronde cartilaginea compressa ramosa, ramis duplicato-pinnatis, fructificationibus pedunculatis globosis radiatis. *Fl. angl.* 473. *Gmel. fuc.* 152.

Fucus frondibus cartilagineis lanceolatis bipinnatis plumosis, caule filiformi compresso ramoso. *Mant.* 134. *Syst. nat.* 718. *Fl. dan.* 350.

Fucoides purpureum eleganter plumosum. *R. syn.* 38. *t.* 2. *f.* 5.

Anglis, plumous Fucus.

Habitat in rupibus et saxis submarinis. 4. VII—X.

***** *Fronde tereti.*

48. **FUCUS** fronde filiformi subfragili opaca. *Sp. pl. Filum.* 1631. *Gmel. fuc.* 131.

Fucus chordam referens teres prælongus. *R. syn.* 40.

Filum maritimum germanicum. *B. pr.* 155. *Bocc. mus. fisic.* 271. *t.* 7. *f.* 9.

Ligula marina alba Sussexiana. *Pet. gaz.* *t.* 91. *f.* 5.

Anglis, thread Fucus, or Sea Laces.

Habitat in rupibus et saxis submarinis. 4. I—XII.

49. **FUCUS** fronde cartilaginea filiformi ramosa, ramis setaceis fructiferis fructificationibusque sparsis latus. pedunculatis oblongis.

Anglis, pedunculated Fucus.

Habitat in rupibus et saxis submarinis; in insula Portlandica. ①. VII—IX.

Desc. *Frons dodrantalis, cartilaginea, filiformis, diaphana, flavescens, ramosa; ramis simplicissimis, setaceis, longis, fructiferis, sparsis; Fructificationes numerosæ, parvæ, oblongæ, fuscescentes, sparsæ, pedunculatæ; Pedunculis longis.*

40. **FUCUS**

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

- verruco-* 50. **FUCUS** fronde cartilaginea setacea ramosa, ramis longissimis, fructificationibus lateralibus globosis sessilibus.
Fucus longissimus. *Gmel. fuc.* 134. *t. 13.*
Fucus marinus purpurascens parvus, caule et ramulis s. foliolis teretibus. *R. syn.* 50.
Fucus teres ramosissimus. *Reaum. act. gall.* 1712. *t. 5. f. 9.*
Fucus teres rubens minus ramosus in longum protensus. *R. syn.* 51.
Anglis, warty Fucus.
Habitat in rupibus et saxis submarinis passim. 4. VI—X.
- albidus.* 51. **FUCUS** fronde cartilaginea filiformi teretiuscula subdichotoma; ramis setaceis distantibus subsecundis, fructificationibus lateralibus subrotundis sessilibus. *Fl. angl.* 470. *Gmel. fuc.* 138.
Fucus verrucosus. *Gmel. fuc.* 136. *t. 14. f. 1.*
Fucus teres albus tenuissime divisus. *R. syn.* 50.
Anglis, whitish Fucus.
Habitat in rupibus et saxis submarinis; in comitatibus Sussexiano, Hantonensi et Cornubiensi. 4. VI—X.
Obs. variat albido et fuscente.
- tubercu-* 52. **FUCUS** fronde filiformi subdichotoma, ramis obtusis tuberculatis.
Fucus kali geniculato similis, non tamen geniculatus. *R. syn.* 43.
Anglis, tuberculated Fucus.
Habitat in rupibus et saxis submarinis prope St. Ives in Cornubia. 4. VI—X.
Obs. affinis F. fastigiato, sed differt non uniformiter dichotomus nec fastigiatus sed ramis inæqualibus, ultimis fructificationibus tuberculatis aspersis.
- fastigia-* 53. **FUCUS** fronde filiformi dichotoma fastigiata obtusa, vesiculis lanceolatis terminalibus.
Fucus fronde filiformi dichotoma ramosissima fastigiata obtusa. *Syst. nat.* 718. *Sp. pl.* 1631. *Fl. dan.* 393. *Gmel. fuc.* 106. *t. 6. f. 1.*

Fucus

Fucus palmaris tenuis in orbem expansis in segmenta bifida vel trifida breviora tertia divisus. *Hist. Ox.* III. 649. f. 15. t. 9. f. 19.

Fucus s. alga exigua dichotoma foliorum segmentis longiusculis, crassis et subrotundis. *R. syn.* 45. *Anglis*, fastigiated Fucus.

Habitat in rupibus et saxis submarinis. 4. VI—X.

54. *FUCUS* fronde filiformi dichotoma fastigiata acuminata. *Sp. pl.* 1631. *furcellatus.*

Fucus lumbicatis. *Fl. angl.* 471. *Gmel. fuc.* 108. t. 6. f. 2.

Fucus parvus segmentis prælongis teretibus acutis. *R. syn.* 45. *Hist. Ox.* III. 648. f. 15. t. 9. f. 4.

Fucus forcellata, *lumbricalis* species. *B. pin.* 366.

Furcellaria. *Imp. hist.* 842.

Anglis, forked Fucus.

Habitat in rupibus et saxis submarinis. 4. I—XII.

55. *FUCUS* fronde cartilaginea filiformi dichotoma diffusa. *divaricata diffusa.*

Anglis, diffuse Fucus.

Habitat in rupibus submarinis in Cornubia et Devonia *passim*, et in insula Portlandica. 4. I—X.

Desc. *Frons semipedalis* fili emporetici crassitudine, cartilaginea, *flavescens* s. *purpurascens*, filiformis, diaphana, dichotoma valde divaricata, diffusa, apicibus acutis.

56. *FUCUS* fronde cartilaginea filiformi implicata diaphana. *Fl. angl.* 470. *Gmel. fuc.* 142. t. 14. *plicatus.* f. 2.

Fucus trichoides nostras aurei coloris ramulorum apicibus furcatis. *Pluk. ph.* 184. f. 2. *R. syn.* 45.

Fucus coraloides erectus. *R. syn.* 51.

Alga exigua dichotoma arenacei coloris. *R. hist.* 51.

Anglis, matted Fucus.

Habitat in rupibus et saxis submarinis. ①. V—XI.

57. *FUCUS* fronde filiformi ramosissima, ramulis confertis setaceis fructificationibus globosis innatis. *purpureo-scens.* *Fl. angl.* 471. *Gmel. fuc.* 139.

Fucus

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Fucus teres rubens ramosissimus. R. syn. 51.

Anglis, purplish Fucus.

Habitat in rupibus et saxis submarinis. 4. V—X.

incur-
vus.

58. *FUCUS* fronde filiformi ramosissima, ramis imbricatis apicibus involutis, ramulis subulatis subsecundis.

Fucus pinnastroides. Gmel. fuc. 127. t. 11. f. 1.

Pinus maritima s. *Fucus teres*, cuius ramuli setis sursum tendentibus sunt obsiti. R. syn. 50.

Anglis, pine Fucus.

Habitat in rupibus et saxis submarinis in Sussexia copiose. I—XII.

amphi-
bius.

59. *FUCUS* fronde filiformi ramosissima, ramis alternis involutis, ramulis brevissimis multifidis, fructificationibus oblongis pedunculatis. Gmel. fuc. 135.

Fucoides erectum fruticuli specie, summitatibus inflexis. R. syn. 38. t. 2. f. 6.

Anglis, amphibious Fucus.

Habitat in rupibus, saxis submarinis et ad radices plantarum in fossis et palustribus maritimis frequens. 4. VII—X.

muscoides. 60. *FUCUS* fronde filiformi ramosissima, ramis sparsis divaricatis flexuosis, spinis mollibus alternis.

Fucus fronde tereti ramosissima, ramis sparsis spinis mollibus alternis. Sp. pl. 1630.

Fucus folliculaceus fuscus s. *nigricans* ex insula cypro. R. hist. III. 13. Pet. mus. 219.

Anglis, thorny Fucus.

Habitat in rupibus submarinis, in littoribus Eboracensi et Northumbriensi sed rarius. 4. V—X.

lanosus. 61. *FUCUS* frondibus capillaceis dichotomis scabris fructificationibus tuberculatis lateralibus.

Fucus frondibus capillaceis dichotomis ramosissimis scabris. Syst. nat. 718.

Anglis, wool Fucus.

Habitat in rupibus et saxis submarinis; in insula Walney, in comitatu Lancastriensi. 4. VII—X.

62. *FUCUS*

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

591

62. *FUCUS* fronde filiformi ramosissima scabra, ramis *confervoides* imbricatis capillaceis, ramulis brevissimis fasciculatis denticulatis.

Anglis, rough Fucus.

Habitat in rupibus et saxis marinis in comitatibus Eboracensi et Cornubieni. 4. V—X.

Desc. Frons *semipedalis*, *filiformis*, *rigidiuscula* scabra, *opaca*, *atra ramosissima*; Rami *numerofissimi*, *imbricati*, *capillacei*; *ramuli fasciculati*, *brevissimi*, *multifidi*, *dentati*; *dentibus obtusis*.

63. *FUCUS* fronde filiformi alternatim ramosissima, *racemosa*, mulis subdistichis subulatis brevibus.

Anglis, capillary Fucus.

Habitat in saxis submarinis; prope Sheerness, in insula Shepey, in Devonie et Cornubia passim. 4. IV—X.

Desc. Frons fere *semipedalis*, *filiformis*, *ramosissima*, *atro-purpurascens*; Rami *alterni capillares longi*; *Ramuli subdistichi*, *subulati*, *diaphani brevissimi*.

C O N F E R V A. 1207.

Tubercula inæqualia, in fibris capillaribus, longissimis.

* *Filamentis simplicibus, æqualibus, geniculis destitutis.*

1. *CONFERTA* filamentis simplicissimis æqualibus *rivularis*, longissimis. Sp. pl. 1633. Hall. hist. 2115.

Conferva fluviatilis sericea vulgaris et fluitans. Dill. musc. 12. t. 2. f. 1.

Conferva Plinii. Gesn. cat. 27. R. syn. 58.

Byssus palustris confervoides non ramosa viridis sericeum referens, filamentis longis tenuissimis. Mich. gen. 210. t. 89. f. 7.

2. *Conferva filamentis simplicissimis duriusculis.* Hall. hist. 2116.

Conferva palustris sericea crassior et varie extensa. Dill. musc. 12. t. 2. f. 2.

Conferva palustris sericea filamentis crassioribus et longioribus. R. syn. 477.

Byssus

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Byssus palustris confervoides non ramosa viridis, filamentis crassioribus, setas aprinas æmulantibus.

Mich. gen. 210. t. 89. f. 6.

Anglis, river Conferva, or Crow-silk.

Habitat in rivulis leniter fluentibus. ♂ in fossis. 24. I—XII.

fontinalis. 2. CONFERVA filamentis simplicissimis æqualibus digito brevioribus. *Sp. pl. 1633.*

Conferva cespitosa, filis rectis, undique divergentibus.
Hall. hist. 2114.

Conferva minima byssi facie. *Dill. musc. 14. t. 12. f. 3.*

Conferva fontalis fusca, omnium minima mollis. *R. syn. 58.*

Byssus minima palustris obscura, crassioribus filamentis plerumque simplicibus. *Mich. gen. 211. t. 89. f. 8.*

Anglis, spring Conferva.

Habitat in saxis, in rivulis et fontibus; in rivo novo versus Hornsey. *Dill. ⊙. III—VI.*

violacea. 3. CONFERVA filamentis simplicissimis æqualibus digito brevioribus violaceis.

Conferva mucosa confragosis rivulis innascens. *Dill. musc. 15. t. 2. f. 4.*

Anglis, violet Conferva.

Habitat in rivulis alpinis prope Llanberris. *Dill. ⊙. V—X.*

** *Filamentis ramosis æqualibus.*

furcata. 4. CONFERVA filamentis æqualibus extremitatibus ramosis, ramis simplicibus. *Fl. angl. 478.*

Conferva capillacea, filamentis bifidis et trifidis. *Dill. musc. 16. t. 12. f. 6.*

Conferva rivulorum bicornis, filamentis tenuissimis.
R. syn. 58.

Conferva palustris, filamentis brevioribus et crassioribus. *Dill. musc. 17. t. 3. f. 10.*

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

593

Conferva palustris subhirsuta filamentis brevioribus et crassioribus. *R. syn.* 477.

Anglis, forked Conferva.

Habitat in rivulis leniter fluentibus. β in fossis. ○.
X—V.

5. CONFERTVA filamentis æqualibus dichotomis. *Sp. dichotoma*:
pl. 1635. *Fl. dan.* 358.

Conferva dichotoma, setis porcinis similis. *Dill. musc.*
17. t. 3. f. 9. Hall. hist. 2117.

Conferva Plinii setis porcinis similis. *Merr. pin.*
R. syn. 58.

Anglis, dichotomous Conferva.

Habitat in fossis, inter Greenwich et Woolwich copiose,
prope Gravesend. ○. III—X.

6. CONFERTVA filamentis æqualibus ramosis implica-bullosa-
tis, bullas aëreas includentibus. *Sp. pl.* 1634.

Conferva pilis tenerrimis, vellere goffy piaceo. *Hall.*
hist. 2120.

Conferva palustris bombycinda. *R. syn.* 60. *Dill. musc.*
18. t. 3. f. 11.

Alga bombycinda. *B. pr.* 155. *pin.* 363. *Park.* 1261.

Muscus aquaticus bombycindus, tenuissimis filamen-
tis. *Loef. pruss.* 173. *f. 55.*

Anglis, cotton Conferva.

Habitat in fossis et stagnis passim. ○. III—VI.

7. CONFERTVA filamentis æqualibus versus basin ra- *canalicu-*
mosioribus. *Sp. pl.* 1634. *ramis longis.* *laris.*

Conferva filamentis tenuibus ramosis intricatis fuscis.
Hall. hist. 2118.

Conferva rivulorum capillacea densissime congestis ra-
mulis. *R. syn.* 58. *Dill. hist.* 21. *t. 4. f. 15.*

Alga in tubulis aquam fontanam deducentibus. *B.*
pin. 364.

Anglis, mill Conferva.

Habitat in rivulis purioribus, inque tubulis et afferibus ad
molas deducentibus. 24. I—XII.

R r

8. CONFERTVA

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

- amphibia.* 8. CONFerva filamentis æqualibus ramosis, excis-
catione coeuntibus in aculeos. *Sp. pl.* 479.
Conferva amphibia, fibrillosa et spongiosa. *Dill. musc.*
22. t. 4. f. 17.
Conferva terrestris exilis fibrillosa. *R. syn.* 59.
Anglis, amphibious Conferva.
Habitat *ad ripas fluviorum, fossarum et paludium fre-*
quens. 4. I—XII.
- rigida.* 9. CONFerva filamentis æqualibus ramosissimis ri-
gidiusculis, ramulis alternis brevissimis. *Fl. angl.*
479.
Conferva filis crassiusculis rigidioribus, subarticulatis.
Hall. hist. 2122.
Conferva fluviatilis fibrillosa subrigida. *Dill. musc.*
21. t. 4. f. 16.
Anglis, rigid Conferva.
Habitat *in fluviis; in ericeto Hounsteyano, in fluvio*
*Lug. prope Mortimer's Cross in comitatu Herefor-
dienfi.* Dill. 4. I—X.
- foenicula-* 10. CONFerva filamentis æqualibus ramosissimis,
cea. ramis ramulisque longissimis sparsis. *Fl. angl.* 479.
Conferva marina foeniculacea. *Dill. musc.* 16. t. 2.
f. 8.
Anglis, fennel Conferva.
Habitat *in rupibus et saxis submarinis in Mona insula.*
Dill. *in Cornubia.* ①. VI—X.
- littoralis.* 11. CONFerva filamentis æqualibus ramosissimis
elongatis scabriusculis. *Sp. pl.* 1635.
Conferva maritima filiformis longissima fusca, ramis
alternis simplicibus brevioribus pallidis. *Fl. suec.*
1170.
Conferva marina capillacea longa ramosissima. *R. syn.*
59. *Dill. musc.* 23. t. 6. f. 19.
Anglis, soft Conferva.
Habitat *in rupibus et saxis submarinis passim.* ①. V—X.
- tomentosa.* 12. CONFerva filamentis æqualibus tenuissimis ra-
mosissimis, ramis simplicibus longis confertis fuscis.
Fl. angl. 480.

Conferva

Conferva marina tomentosa, minus tenera et ferruginea. *R. syn.* 59. *Dill. musc.* 19. t. 3. f. 13.
Anglis, flock Conferva.

Habitat in rupibus, saxis, et fucis marinis. ○. V—X.

13. CONFERTA filamentis æqualibus tenuissimis ramosissimis, ramis simplicibus fasciculatis albidos.

Conferva marina tomentosa, tenerior et albicans.
R. syn. 59. *Dill. musc.* 19. t. 3. f. 12.

Muscus maritimus goffipio similis. *B. pin.* 663. *Hist. Ox.* III. 649.

Anglis, whitish Conferva.

Habitat in fossis, paludibus et stagnis. ○. X—V.

Desc. Fila fere uncialia æqualia, valde tenuissima, albida, ramosissima, ramis alternis; ramulis fasciculatis simplicibus, subfastigiatis.

14. CONFERTA filamentis ramosis mollibus digito æruginosæ brevioribus viridibus. *Sp. pl.* 1634. *fa.*

Conferva marina capillacea brevis, viridissima molliſ. *Dill. musc.* 23. t. 4. f. 2.

Anglis, sea-green Conferva.

Habitat in fucis passim. ○. VI—X.

15. CONFERTA filamentis æqualibus ramosis longissimis, ramis alternis multifidis brevissimis. *Fl. angl.* 481. *nigra.*

Anglis, black Conferva.

Habitat in littore Eboracensi passim. ○. V—X.

Desc. Fila quinque pollicaria, æqualia, rigidiuscula, nigra, ramosa, ramis alternis brevissimis multifidis, fasciculatis.

16. CONFERTA filamentis proliferis fastigiatis hirsutis. *Sp. pl.* 1635. *scoparia.*

Conferva marina pennata. *Dill. musc.* 24. t. 4. f. 23.

Fucus scoparia s. Pennacchio marino. *B. pin.* 366. *hist.* III. 800.

Anglis, brown Conferva.

Habitat in littoribus marinis passim. ○. V—X.

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

cancellata. 17. CONFerva filis ramosis, filamentis alternis brevibus multipartitis digitatis. *Sp. pl.* 1635.

Conferva marina cancellata. *R. syn.* 59. *Dill. musc.* 24. *t. 4. f. 22.*

Anglis, latticed Conferva.

Habitat in saxis et rupibus submarinis passim. 4. I—XII.

multifida. 18. CONFerva filamentis æqualibus ramosissimis, ramulis oppositis brevissimis multifidis.

Anglis, tuffed Conferva.

Habitat in saxis et rupibus submarinis in comitatibus Hantoniensi et Dorsetiensi. ○. V—X.

Desc. Fila quadripollucaria, æqualia subgelatinosa, rubra, ramosissima; Rami oppositi, longissimi; Ramuli oppositi, brevissimi, multifidi, tenuissimi, remoti, ut verticillati apparent.

spongiosa. 19. CONFerva filamentis æqualibus subdichotomis, ramulis brevissimis simplicibus undique imbricatis.

Fucus hirsutus, fronde filiformi tereti dichotoma obtecta undique hirsutie. *Mant.* 134.

Fucus teretifolius spongiosus pilosissimus. *R. syn.* 46.

Muscus marinus hirsutus, flagellis longis ramosis subviridibus. *Hist. Ox.* III. 650. *f. 15. t. 9. f. 6.*

Anglis, sponge Conferva.

Habitat in rupibus et saxis submarinis. 4. I—XII.

** *Filamentis anastomosantibus*:

reticulata. 20. CONFerva filamentis reticulato - coadunatis.

Sp. pl. 1635.

Conferva reticulata. *R. syn.* 59. *Dill. musc.* 20. *t. 4. f. 14. Hall. hist.* 2119.

Conferva reticulata crispa. *Pluk. ph.* *t. 24. f. 2. Hist. Ox.* III. 644. *f. 15. t. 4. f. 4.*

Anglis, net Conferva.

Habitat in fossis et stagnis, circa Hounslow. ○. V—X.

*** *Filamentis*

*** *Filamentis nodosis.*

21. CONFERVA filis simplicissimis setiformibus rec-^{fluvia-}
tis, geniculis crassioribus angulatis. *Sp. pl. 1635.* *lis.*

Conferva fluviatilis lubrica setosa, equiseti facie. *Dill.*
musc. 39. t. 7. f. 47.

Corallina fluviatilis non ramosa. *Vaill. paris. 40.*
t. 4. f. 5.

β Conferva fluviatilis nodosa, fucum æmulans. *Dill.*
musc. 39. t. 7. f. 38.

Anglis, horse-tail Conferva.

Habitat in flaviis, prope Bangoriam in rivo, dicto Afon
Cegin, inter molendinum vocatum Pandu maes y Geir-
chan et Malun Escob. Sam. Brewer. prope Ludlow
D. Littl. Brown. in comitatibus Eboracensi, Cum-
berlandico et Westmorlandico. 4. I—XII.

22. CONFERVA filamentis moniliformibus setaceis *atra.*
ramosissimis atris, articulis globosis subgelatinosis.

Conferva fontana nodosa lubrica, filamentis tenuissi-
mis nigris. *Dill. musc. 39. t. 7. f. 46.*

Anglis, bead Conferva.

Habitat in fontibus et rivulis; in fonte quodam parvo
in lacum dictum Gors Velen prope Llanfaithly, se
exonerante, et in scaturagine quadam campi Gors
Bach, dicta Ffynnon bach y Lusg, media via inter
ædes parochiales et Trefadog, in Mona insula. D.
Brewer. prope Martin in comitatu Surriensi. 4.
V—XII.

23. CONFERVA filamentis moniliformibus filiformi-^{gelatina-}
bus ramosis, articulis globosis gelatinosis. *sa.*

Conferva filis ramosis moniliformibus, articulis glo-
bosis gelatinosis. *Sp. pl. 1635.*

Conferva gelatinosa, globulis punctatis concatenatis.
Hall. hist. 2124.

Conferva fontana nodosa, spermatis ranarum instar
lubrica, major et fusca. *R. syn. 62.* *Dill. musc.*
36. t. 7. f. 42.

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Chara batrachosperma, caule ramoso filamentoso; ramis foliaceis capillaceis, in glomeres lubricos geniculatos articulatim circa caulem dispositis. *Weis.* *crypt.* 33. *t.* I.

β *Conferva fontana* nodosa, spermatis ranarum instar lubrica, minor et viridis. *Dill. musc.* 37. *t.* 7. *f.* 43.
Corallina pinguis ramosa viridis. *Vaill. paris.* 40. *t.* 7. *f.* 6.

γ *Conferva stagnalis*, globulis virescentibus mucofisis. *Dill. musc.* 38. *t.* 7. *f.* 44.

δ *Conferva alpina* lubrica, filamentis nodosis cæruleis. *Dill. musc.* 38. *t.* 7. *f.* 45.

Anglis, gelly *Conferva*.

Habitat in fontibus et rivulis purissimis passim; inter Greenwich et Woolwich; β in rivulo quodam saltus Enfieldensis in Middlesexia. γ ; δ . prope Mancunium in Lancastria. D. Harrison. \odot . I—XII.

**** *Filamentis geniculatis.*

capillaris. 24. **CONFERTA** filis geniculatis simplicibus, articulis alternatim compressis. *Sp. pl.* 1636.

Conferva filamentis longis geniculatis simplicibus. *Dill. musc.* 25. *t.* 5. *f.* 25.

Conferva palustris, sive *Filum marinum anglicum*. *R. syn.* 60.

Conferva geniculata minima nostras. *Pluk. ph.* *t.* 84. *f.* 9. *Hist. Ox.* III. 644. *f.* 15. *t.* 4. *f.* 4.

Anglis, thread *Conferva*.

Habitat in fossis et stagnis marinis et rivulis. \odot . III—X.

corallinoi- 25. **CONFERTA** filamentis geniculatis dichotomis, articulis apice incrassatis.

Conferva filamentis geniculatis dichotomis. *Sp. pl.* 1636.

Conferva marina gelatinosa. *corallinæ* instar geniculata crassior. *Dill. musc.* 33. *t.* 5. *f.* 3.

Corallina confervoides geniculata alba, geniculis crassiusculis pellucidis. *R. syn.* 34.

Anglis, coralline *Conferva*.

Habitat

Habitat in saxis et rupibus submarinis passim. ○. V—X.

26. CONFerva filamentis geniculatis dichotomis, *setacea*.

ramis longissimis setaceis, articulis cylindricis.

Conferva marina gelatinosa, corallinæ instar geniculata tenuior. *Dill. musc.* 33. t. 6. f. 37.

Corallina confervoides gelatinosa rubens, ramulis et geniculis perangustis. *R. syn.* 34.

Anglis, setaceous *Conferva*.

Habitat in saxis et rupibus submarinis passim. ○. V—X.

Obs. ramis longis setaceis.

27. CONFerva filamentis geniculatis ramosis, ramis *elongata*.

dichotomis longis setaceis, articulis brevissimis.

Anglis, pointed *Conferva*.

Habitat in saxis et rupibus submarinis, in *Devonia*, *Cornubia*, *Sussexia*, et in *insula Mona*, passim. ○.

IV—X.

Desc. *Fila dodrantalia et pedalia, crassitie fili emporetici tenuioris, articulata, lævia, fusco-purpurea, basi ramosa*; Rami dichotomi, longissimi, setacei; articulis brevissimis.

28. CONFerva filamentis geniculatis dichotomis, *ciliata*. apicibus conniventibus, articulis apice ciliatis.

Conferva ciliata. *Ellis. philos. transact.* LVII. 425.

t. 18. f. b. H.

Anglis, ciliated *Conferva*.

Habitat in *fucis tenuioribus* passim. ○. V—IX.

29. CONFerva filamentis geniculatis subdichotomis *polymorpha*, fastigiatis, ramis fasciculatis.

Conferva filamentis geniculatis, ramis fasciculatis.

Sp. pl. 163. *Fl. dan.* 395. *Ellis. philos. transact.* LVII. 424. t. 18. f. a, A, b, B.

Conferva marina geniculata nigra palmata. *Dill. musc.* 32. t. 6. f. 35.

Conferva marina geniculata ramosissima lubrica, brevibus et palmatim congestis ramulis. *R. syn.* 61.

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Muscus capillaceus multifidus niger. B. pin. 363.

Anglis, pâlmated Conferva.

Habitat in fucis, præcipue in fuco nodoso. 24. I—XII.

tubulosa. 30. CONFERVÂ filamentis geniculatis ramosissimis, articulis ovalibus alternatim compressis.

Confervâ marina fistulosa. Dill. musc. 34. t. 6. f. 39.

Conferva marina geniculata albicans, diaphragmatis distinctis. R. syn. 60.

Conferva marina nodosa ex albo rubescens mollis, sed minus lubrica. R. syn. 61.

Ulva filiformis articulata, articulis alternatim compressis. Sp. pl. 1632.

Anglis, hollow Conferva.

Habitat in saxis, rupibus et fucis marinis passim. ○. IV—X.

rubra. 31. CONFERVÂ filamentis geniculatis ramosissimis, ramis setaceis, articulis cylindricis brevibus.

Conferva flosculosa. Ellis. philos. transact. LVII. 425. t. 18. f. e, E.

Confervâ geniculata ramosissima lubrica longis sparsisve ramulis. R. syn. 61. Dill. musc. 35. t. 6. f. 38.

Anglis, red Conferva.

Habitat in rupibus, saxis et fucis marinis. ○. V—X.

Obs. fructificationes subsessiles solitariæ subrotundæ, filamento subulato subjectæ.

purpura- 32. CONFERVÂ filamentis geniculatis ramosissimis, ramis confertis, articulis cylindricis longis.

Conferva marina nodosa, Coralloidis montani instar ramosa. Dill. musc. 36. t. 7. f. 41.

Anglis, purple Conferva.

Habitat in saxis et fucis submarinis passim. ○. V—X.

nodulosa. 33. CONFERVÂ filamentis geniculatis ramosissimis, articulis oblongis, ramulorum subrotundis moniliformibus.

Conferva marina nodosa lubrica ramosissima et elegan-
tissima

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

601

tiffima rubens. *R. syn.* 62. *t.* 2. *f.* 3. *Dill. musc.*

35. t. 7. f. 40.

Anglis, knotted Conferva.

Habitat in saxis, rupibus et fucis. *Θ.* V—X.

Obs. Fructificationes laterales, sessiles, subrotundæ, globulariae.

34. CONFERVA filamentis geniculatis ramosissimis, pellucida,
ramis oppositis, articulis cylindricis longissimis.

Anglis, pellucid Conferva.

Habitat in rupibus et saxis submarinis, in Devonia, Cornubia, Hantonia, et Sussexia. *Θ.* V—X.

Desc. Fila fere semipedalia, geniculata, nitida, pellucida, viridi-purpurea, ramosissima, ramis oppositis, fere trichotomis; articulis cylindricis, æqualibus, longissimis.

35. CONFERVA filamentis geniculatis flexuosis ramo- *vagabunda*,
fissimis, ramulis brevissimis horizontalibus. *da.*

Conferva filamentis flexuosis, ramis ramulisque brevioribus. *Sp. pl.* 1637.

Conferva marina trichoides, lanæ instar expansa.

R. syn. 60. *Dill. musc.* 30. *t.* 5. *f.* 32.

Anglis, floating Conferva.

Habitat in paludibus et fossis maritimis. *Θ.* IV—X.

36. CONFERVA filamentis geniculatis ramosissimis *rupestris*,
viridibus, ramis ramulisque brevioribus confertis.

Conferva filamentis geniculatis ramosissimis viridibus.

Sp. pl. 1637.

Conferva marina trichoides ramosior. *Dill. musc.* 28.
t. 5. *f.* 29.

Conferva marina trichoides s. muscus marinus virens
tenuifolius. *Pluk. mant.* 53. *t.* 182. *f.* 6. *R. syn.* 60.

β Conferva fluviatilis trichoides, extremitatibus ramosis.

Dill. giss. 199. *musc.* 27. *t.* 5. *f.* 28.

Anglis, rock Conferva or Sea-beard.

Habitat in rupibus et saxis submarinis et in fluviis passim.
24. I—XII.

37. CONFERVA filamentis geniculatis ramosissimis *sericea*,
elongatis viridibus, ramulis confertis tenuissimis.

Conferva

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Conferva trichoides virgata sericea. *Dill. musc.* 31.
t. 5. f. 33.

Conferva marina trichoides, ramulis virgatis longioribus glabris. *R. syn.* 60.

Anglis, silky *Conferva.*

Habitat in rupibus et saxis submarinis; in insula Shepey copiose; in Rivo novo prope Londinum, et ericeto Hounsflejano. *4. I—XII.*

glomerata. 38. **CONFERTVA** filamentis geniculatis ramosissimis, ramulis brevissimis multifidis.

Conferva filamentis geniculatis, ramulis brevioribus multifidis. *Sp. pl.* 1637.

Conferva fontinalis ramosissima glomeratim congesta.
R. syn. 59. *Dill. musc.* 28. *t. 5. f. 31.*

Alga fontalis trichoides. *B. pin.* 364.

Alga f. *Conferva fontalis trichoides.* *Park.* 1260.

Anglis, cluster *Conferva.*

Habitat in rivulis et fontibus, passim. *○. IV—X.*

fulva. 39. **CONFERTVA** filamentis geniculatis ramosis, ramulisque brevissimis fulvis.

Anglis, tawny *Conferva.*

Habitat in saxis et fucis marinis, in littore Eboracensi.
○. V—IX.

nigrescens. 40. **CONFERTVA** filamentis geniculatis ramosissimis, ramis longissimis, ramulis subfasciculatis brevissimis subulatis.

Anglis, blackish *Conferva.*

Habitat in rupibus et saxis submarinis, prope St. Ives in Cornubia et Exmouth in Devonia. *4. I—XII.*

Desc. *Fila semipedalia, cæspitosa, geniculata, tenue atro-rubescens, (in sicca nigra) lævia, ramosissima;* *Rami alterni, longi, ramuli brevissimi, subfasciculati, subulati.*

fusca. 41. **CONFERTVA** filamentis geniculatis ramosissimis, ramulis alternis simplicibus.

Anglis, brown *Conferva.*

Habitat

Habitat in saxis et rupibus submarinis. ○. VI—X.

Desc. Fila tri et quadripolicaria, geniculata, atro-fusca aut rubescens, lævia, ramosissima, Rami alterni, longi, ramuli, alterni simplices, brevi, distantes; Fructificationes ramuli terminatæ et laterales sessiles, parvæ, subrotundæ, glomeratæ.

42. CONFerva filamentis geniculatis ramosissimis *fucoides*, ramulis multifidis, inferioribus fasciculatis fructiferis.

Anglis, fucus Conferva.

Habitat in rupibus, saxis et fucis marinis passim. 24. I—XII.

Desc. Fila pedalia, geniculata, lævia atro-rubescens, ramosissima, Rami alterni; ramuli multifidi, subdichotomi, inferiores fasciculati, fructiferi. Fructificationes terminales, radiatæ, parvæ.

43. CONFerva filamentis geniculatis ramosis, *geniculitis villosis*, ramis subsimplicibus distantibus.

Anglis, hairy Conferva.

Habitat in saxis et rupibus submarinis, in Cornubia, sed rarius. ○. V—IX.

Desc. Fila semipedalia, geniculata, viridia, diaphana, ramosa; Rami longi, setacei, subsimplices; Geniculis villosis s. ramulis brevissimis, tenuissimis, verticillatis.

44. CONFerva filamentis geniculatis ramosissimis, *imbricata*, ramis acutis, ramulis verticillatis imbricatis dichotomis.

Muscus marinus hirsutus, flagellis longioribus, rarius divisis, ruber. *Hist. Ox. III. 650. f. 15. t. 9. f. 7.*

Anglis, imbricated Conferva.

Habitat in rupibus saxis et fucis marinis. 24. I—XII.

45. CONFerva filamentis geniculatis ramosis, ramis *coccinea*, alternis duplicato-pinnatis, laciniis multifidis.

Conferva plumosa. *Ellis. philos. transact. LVII. 425. t. 18. f. c, c; d, D.*

Muscus marinus folio multifido. *Johns. merc. bot. II. 27.*

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Muscus pelagicus pinnatus rubens, ramulis numerosis mollibus latius se spargentibus. *Pluk. ph. t. 48.*

f. 2.

Muscus marinus purpureus parvus, foliis oblongis millifolii fere divisura. *R. hist. 79.*

Anglis, scarlet Conferva.

Habitat in saxis, rupibus et fucis marinis. *24. I—XII.*

pennata. 46. CONFERVA filamentis geniculatis ramosis, ramis conferiis triplicato-pinnatis, laciniis subulatis. *Conferva marina pennata.* *Pet. hort. sicc. R. syn. 59.* *Anglis, pinnated Conferva.*
Habitat in saxis et rupibus submarinis, inter Dover et Margate, in insula Walney in comitatu Lancastrensi. *24. I—XII.*

*parasiti
ca.* 47. CONFERVA filamentis geniculatis ramosis, ramis duplicato-pinnatis.
Anglis, feathered Conferva.
Habitat in fucis, in littoribus Eboracensi, Cornubiensi, et Dorsetiensi passim.
Desc. Fila pollicaria, geniculata, fusca, ramosa, Rami fere pollicares duplicato-pinnati; pinnulis acutis.

*aegagropi-
ia.* 48. CONFERVA filamentis geniculatis ramosissimis e centro confertissimis globum constituentibus. *Sp. pl. 1637.*
Conferva globosa. *Philos. transact. XLI. 498.*
Anglis, globe Conferva, or Moor-balls.
Habitat in lacubus montosis; in Wallingfen-moor, Yorkshire. *Mr. Tho. Knowlton.* *24. I—XII.*

BYSSUS. 1208.

Lanugo aut Pulvis simplicissimus.

* *Filamentosæ.*

*Flos
aqua.* 1. BYSSUS filamentis plumosis natantibus. *Sp. pl. 1637.* *Byssus*

Byssus latissima papiri instar super aquam sparsa. *R.*

syn. 57. Dill. musc. 21.

Conferva crustacea tenerrima viridis. *Hall. hist. 2113.*

Anglis, paper Byssus.

Habitat in aquis stagnantibus. ◎. V—VIII.

2. BYSSUS lanuginosa violacea lignis adnascens. *R. phospho-*
syn. 56. Dill. musc. 54. t. 1. f. 6. Sp. pl. 1638. rea.

Byssus cærulea cespitosa crispa. *Hall. hist. 2102.*

Byssus purpurea delicatissima, arborum corticibus ad-
nascens, brevissimis et tenuissimis filamentis. *Mich.*
gen. 211. t. 9. f. 3.

Fungus violaceus herpatis modo lignis irrepens. *R.*
hist. III. 23.

Anglis, violet Byssus.

Habitat in corticibus arborum et lignis putrescentibus. ◎.
X—V.

3. BYSSUS filamentis simplicibus tenuissimis ærugi-ærugino-

sa.

Byssus lanuginosa æruginosa. *Dill. musc. 4. t. 1. f. 7.*
Weis. crypt. 18.

Lichen crusta viridissima. *Hall. hist. 2097.*

Anglis, verdigris Byssus.

Habitat in stipitibus, filicis, et lignis putrescentibus. ◎.
VIII—IV.

4. BYSSUS capillacea viridis, filamentis ramosis. *Syst. velutina.*
nat. 721. Sp. pl. 1638. Weis. crypt. 12.

Byssus viridis, filamentis ramosis. *Hall. hist. 2101.*

Byssus tenerrima viridis velutum referens. *R. syn. 36.*
Dill. musc. 7. t. 1. f. 14.

Byssus terrestris viridis herbacea et mollissima, fila-
mentis ramosis et non ramosis. *Mich. gen. 211. t. 89.*
f. 5.

Anglis, velvet Byssus.

Habitat in terris umbrosis et corticibus arborum humidi-
usculis. ◎. X—VI.

5. BYSSUS filamentis simplicibus ramosisque rubris. *rubra.*
Anglis, red Byssus.

CRYPTOGAMIA ALGÆ.

Habitat in saxis et rupibus, præcipue marinis. 4.
I.—XII.

- nigra.* 6. BYSSUS filamentis pulverulentis ramosis atris.
Byssus nigra velutina. Hall. hist. 2104.
Byssus petræa nigerrima fibrosa. R. syn. 57. Dill. musc.
 9. t. 1. f. 18.
Byssus minima saxatilis nigra ramosissima, viticulis
 nudis. Mich. gen. 212. t. 90. f. 5.
Anglis, black Byssus.
 Habitat in rupibus et saxis grandioribus, in boreali parte
 Angliae et in Wallia. 4. I—XII.
- aurea.* 7. BYSSUS filamentis pulverulentis simplicibus ramo-
 sisque.
Byssus capillacea pulverulenta, fructificationibus spar-
sis filamentis simplicibus ramosisque. Gledit. fung.
 18. Sp. pl. 1638. Weis. crypt. 13.
Byssus cespitosa pulvinata crocea. Hall. hist. 2106.
Byssus petræa crocea glomerulis lanuginosus. Dill.
 musc. 8. t. 1. f. 16.
Byssus aureus derbiensis humifusus. Pet. gaz. I. t. 13.
 f. 3. R. syn. 56.
Byssus minima saxatilis aurea inodora, filamentis
 partim simplicibus, partim ramosis. Mich. gen.
 210. t. 89. f. 2.
Anglis, golden Byssus.
 Habitat in rupibus cameratis passim. 4. I—XII.
- fulva.* 8. BYSSUS filamentis ramosis fulvis.
Byssus arborea crocea fibrosa. R. syn. 57. Dill.
 musc. Dill. musc. 9. t. 1. f. 17.
Anglis, tawny Byssus.
 Habitat in lignis putrescentibus humidiusculis. 4.
 I—XII.
- barbata.* 9. BYSSUS filamentis erectiusculis summitatibus ramo-
 sis subfastigiatis fulvis.
Byssus arborea barbata fulvi coloris. R. syn. 57.
 Dill. musc. 9. t. 1. f. 19.

Pseudo-spongia fungoides fulva lignis adnascens. *R.*
bijt. III. 23.

Anglis, bearded Byssus.

Habitat in lignis et truncis arborum putrescentibus. *24.*
I—XII.

10. BYSSUS filamentis ramosissimis, ramulis fasciculata candida.
latis albidis.

Byssus tenerrima villosa et elegantissime ramulosa. *R.*
syn. 476. t. 23. Dill. musc. 7. t. 1. f. 15.

Anglis, white Byssus.

Habitat in foliis et lignis putrescentibus. *◎. IX—IV.*

11. BYSSUS filamentis longissimis tenuissimis ramosis *septica*.
implexis.

Byssus capillacea mollissima parallela fragillissima pal-
lida. *Syst. nat. III. 235.*

Byssus longissima tenerrima nivea. *Hall. Hist. 2108.*

Byssus major speluncis et cellis vinariis innascens,
filtrum vel pannum laneum simulans, primum al-
ba, dein nigra, filamentis tenuissimis non ramosis.
Mich. gen. 211. t. 89. f. 9.

Byssus evanida fioccosa nivea. *Dill. musc. 5. t. 1.
f. 9.*

Fungus niveus aqueus, lignis cellarum vinariarum
adhærens. *R. syn. 26. bijt. III. 23.*

Fungus fimosus niveus, ramosissimus mollis. *R. syn.
13.*

β Byssus tenerrima murina doliaris. *Dill. musc. 6. t. 1.
f. 12.*

Fungus spongiosus niger reticulatus, doliolis vinosis
adnascens. *R. syn. 57.*

Anglis, flaky, β mouse-skin Byssus.

Habitat in cellis et cryptis subterraneis humidiusculis.
β supra dolia vinoſa. *24. V—XII.*

12. BYSSUS capillacea perennis cinerea tenax rupi *crypta-*
innata. Sp. pl. 1638. *rum.*

Byssus albida brevis setacea. *Dill. musc. 10. t. 1.
f. 20.*

Anglis, cave Byssus.

Habitat

Habitat in rupibus calcareis cameratis passim. 4.
I—XII.

** Pulverulentæ.

antiquata 13. BYSSUS pulverulenta atra. Sp. pl. 1638. It. goth.
tis. 298.

Anglis, foot Byssus.

Habitat in muris antiquis, rupibus et saxis grandioribus,
passim. 4. I—XII.

saxatilis. 14. BYSSUS pulverulenta cinerea rupes operiens. Sp.
pl. 1638. Fl. suec. 1179.

Anglis, rock Byssus.

Habitat in rupibus et saxis calcareis in comitatibus West-
morlandico, Cumberlandico, Eboracensi et Derbi-
ensi. 4. I—XII.

Jolithus. 15. BYSSUS pulverulenta sanguinea saxis innascens.
Sp. pl. 1638.

Byssus germanica minima saxatilis aurea violæ odorem
spirans. Mich. gen. 210. t. 89. f. 3.

Jolithus s. Lapis violaceus. Swenck foſſ. 382.

Lichen crustaceus, iridis odore, ruberrimus. Hall. hist.
2090.

Anglis, red Byssus.

Habitat in rupibus et saxis quartzosis, in umbrosis hu-
midis. 4. I—XII.

botryoides. 16. BYSSUS pulverulenta viridis. Sp. pl. 1639. Weis.
crypt. 15.

Byssus botryoides saturate virens. R. syn. 56. Dill.
musc. 3. t. 1. f. 5.

Lichen crustaceus, verrucosus viridis. Hall. hist. 2089.
Anglis, green Byssus.

Habitat in cortice arborum, parietibus et terra humida et
umbrosa. 4. I—XII.

*candela-
ris*. 17. BYSSUS pulverulenta flava, lignis adnascens. R.
syn. 56. Dill. musc. 3. t. 1. f. 4. Sp. pl. 1639.
Weis. crypt. 16.

Lichen

CRYPTOGAMIA FUNGI.

609

Lichen crusta tenuissima flava. Hall. hist. 2096.

Anglis, yellow Byssus.

Habitat in corticibus arborum et parietibus. ○. IX—VI.

18. BYSSUS pulverulenta incana, farinæ instar strata. *incana.*

R. syn. 56. Dill. musc. 3. t. 1. f. 3. Sp. pl. 1639.

Weis. crypt. 16.

Lichen farinaceus mollis albicans, glebis difformibus.

Hall. hist. 2094.

Anglis, mealy Byssus.

Habitat in solo glareoso, ad latera fossularum, juxta vias publicas. ○. X—VI.

19. BYSSUS pulverulento-crustacea albissima. *Sp. pl. lactea.*

1693. Weis. crypt. 17.

Byssus candidissima calcis instar muscos vestiens. Dill. musc. 2. t. 1. f. 2.

Lichen farinaceus mollis albus glebulis sphæricis.

Hall. hist. 2093.

Anglis, white Byssus.

Habitat in muscis et ramulis ericæ in Cambria et boreali parte Britanniæ. 4. I—XII.

Obs. nimis affinis L. corallina.

F U N G I.

AGARICUS. 1209.

Fungus horizontalis, subtus lamellosus.

* *Stipitati, pileo orbiculato.*

1. AGARICUS stipitatus, lamellis ramosis decurrentibus. *Sp. pl. 1639. Schœff. fung. t. 82. 206. Fl. rel. dan. 264.*

Agaricus luteus, pileolo turbinato, in margine angulo laciniato, et varie contorto, lamellis crassis venosis, ramosis et crispis. *Gled. fung. 103.*

S f Alecto-

CRYPTOGAMIA FUNGI.

- Alectorolophoides sulcis crispis. *Battar. fung.* 39.
t. 14.
 Fungus angulosus et velut in lacinias sectus. *B. pin.*
371. Vaill. paris. t. 11. f. 9—15.
 Fungus luteus f. pallidus, Chanterelle dictus se con-
 torquens esculentus. *B. hist. III. 832. R. syn. 2.*
 Fungi lethales. *Ger. em. 1380.*
Anglis, chantarelle Agaric.
 Habitat in sylvis et sepibus. VIII—X.

- quinque- 2. AGARICUS stipitatus, pileo subflavescente partito,
partitus. lamellis albidiорibus interne dentato-connexis. *Sp.*
pl. 1640.
 Agaricus caulescens pileo cinereo quinquepartito, la-
 mellis albis. *Fl. suec. 1222.*
Anglis, lobed Agaric.
 Habitat in pratis, pascuis et nemorosis. IX. X.

- camp- 3. AGARICUS stipitatus, pileo convexo squamato al-
stris. bido, lamellis rufis. *Sp. pl. 1641. Schœff. fung.*
t. 33.
 Amanita petiolo annulato, pileo campaniformi albido,
 lamellis roseis. *Hall. hist. 2443.*
 Fungus pileolo lato et rotundo. *B. pin. 370. Battar.*
29. t. 7. f. A.
 Fungus campestris albus superne, inferne rubens. *B.*
hist. III. 824. R. syn. 2. Mich. gen. 174.
 Fungus esculentus. *Park. 1317.*
 georgii. β Agaricus stipitatus pileo flavo convexo, lamellis albis.
Sp. pl. 1642.
 Amanita pileo flavo oris striatis et lanuginofis, lamellis
 albis. *Hall. hist. 2367.*
 Fungus esculentus pileo et lamellis albis. *R. syn. 2.*
 Fungus croceus magnus. *Sterb. fung. 63. t. 11. f. 3.*
Anglis, common Agaric or Mushroom.
 Habitat in pratis et pascuis. VIII—X.
 Obs. in β, succus luteus est.

- integer. 4. AGARICUS stipitatus, pileo convexiusculo viscido
 purpureo, lamellis omnibus æqualibus albis.
 Agaricus stipitatus, lamellis omnibus magnitudine
 æqualibus

CRYPTOGAMIA FUNGI.

611

$\ddot{\alpha}$ equalibus. Sp. pl. 1640. Schœf. fung. t. 15, 16,
58, 75.

Amanita petiolo farto, pileolo convexo umbilicato,
oris rugosis, lamellis crassis et albis. Hall. hist.
2373.

Omphalomyces coccineus. Battar. fung. 37. t. 15.
f. E.

Fungus major rubescens, pediculo brevi crasso, lamel-
lis crebris albentibus. R. syn. 4.

Anglis, red Agaric.

Habitat in sylvis et nemorosis. VIII—X.

5. AGARICUS stipitatus, pileo convexiusculo viscido luteus,
luteo, lamellis omnibus $\ddot{\alpha}$ equalibus flavis.

Fungus glutine flavo limacino resplendens. Vail. par.
62?

Anglis, yellow Agaric.

Habitat in pratis et pascuis sub arboribus, et nemorosis.
VIII—X.

Obs. affinis præcedenti.

6. AGARICUS stipitatus, pileo convexo-fuscescenti, bulbosus.
lamellis cærulecentibus, stipite brevi basi bulboso
violaceo.

Agaricus cærulescens. Schœff. fung. t. 34?

Fungus pileo magno orbiculari sublivido, lamellis
albis, pediculo brevi bulbiformi violaceo. R. syn. 3.

Anglis, bulbous Agaric.

Habitat in pratis et pascuis sed rarius. Prope Newing-
ton. D. Dillenius. IX—XII.

7. AGARICUS stipitatus, pileo rimoso: margine vio-violaceus,
laceo tomentoso, stipite cærulecente, lana ferrugi-
nea. Sp. pl. 1641. Schœff. fung. t. 3. 56.

Amanita violaceus, petiolo bulboso annulato, pileo
plano. Hall. hist. 2455.

Fungus cæruleus major. Buxb. cent. IV. t. 9.

Fungus esculentus bulbosus dilute purpureus. Mich.
gen. 149. t. 74. f. I.

Fungus major violaceus. Vail. paris. 67.

Anglis, violet Agaric.

S f 2

Habitat

CRYPTOGAMIA FUNGI.

Habitat in sylvis et sepibus. VIII—XI:

amethysti- 8. AGARICUS stipitatus, pileo subcampanulato lævi,
nus. lamellis stipiteque violaceis.

Amanita obscure violaceus, pileolo conico. Hall. hist.
2458?

Fungus minor amethystinus. Vaill. paris. 67.

Fungus parvus violaceus marmoreus perniciosus. Sterb.
72. t. 23.

Anglis, amethyst Agaric.

Habitat in sylvis. VIII—X.

muscari- 9. AGARICUS stipitatus, lamellis dimidiatis solitariis,
us. stipite volvato: apice dilatato, basi ovato. Sp. pl.
1640. Schæff. t. 27, 28.

Amanita petiolo annulato, pileo sanguineo, lamellis
albis. Hall. hist. 2373.

Fungus, &c. Mich. gen. 187, 188. t. 78. f. 1, 2.

Fungi muscas interficientis III. species aut varietas.
B. pin. 373.

Mell muscarum venenosum. Sterb. fung. 214. t. 22.
f. A.

Anglis, fly Agaric.

Habitat in sylvis et sepibus solo arenoso. VIII—X.

procerus. 10. AGARICUS stipitatus, pileo hemisphærico lace-
rato-squamoso rufescente-cinereo, lamellis albis,
stipite longo cylindrico acetabulo inferto.

Agaricus procerus. Scop. carn. 1465. Schæff. fung.
t. 22, 23.

Amanita petiolo procero squamoso annulato, pileo
conico squamoso subspadiceo, laminis albis. Hall.
hist. 190. et nomencl. 2366*.

Agaricus petiolo procero annulato, in acetabulum
pilei immisso, pileo squamoso et maculato, lamellis
albis. Hall. hist. 2371.

Fungus major, pediculo longo, modice crasso, lamel-
lis albis creberrimis, superne ad margines apparen-
tibus. R. syn. 4?

Fungus

Fungus coronatus aut marmoreus. *Sterb. fung.* 77.

t. 7. f. A.

Anglis, tall Agaric.

Habitat in sylvis et ad sepes. VIII—XI.

11. AGARICUS stipitatus, pileo convexo cinereo verrucoso, verrucis lamellisque albis, stipite basi bulboso. *Fl. angl.* 494.

Agaricus pustulatus. Schœff. fung. t. 91.

Agaricus maculatus. Schœff. fung. t. 90.

Amanita petiolo procero fistuloso annulato, pileolo plano striato verrucoso sordido, lamellis albis. Hall. hist. 2397.

Fungi albi venenati viscidi. B. hist. III. 826. Sterb. fung. 206. t. 20. f. K. R. syn. 7.

Anglis, warty Agaric.

Habitat in sylvis et sepibus. VIII—XI.

12. AGARICUS stipitatus, pileo planiusculo lacte-piperatus. scente margine deflexo, lamellis incarnato-pallidis.

Sp. pl. 1641. Schœff. fung. 83.

Amanita umbilicatus albus, lacte acri manans. Hall. hist. 2338.

Fungus albus acris. B. pin. 371.

Fungus piperatus albus, lacteo succo turgens. B. hist. III. 823. R. syn. 4. Mich. gen. 141.

Anglis, pepper Agaric.

Habitat in sylvis et ad sepes. IX. X.

13. AGARICUS stipitatus pileo testaceo, succo lute-deliciosus. scente. *Sp. pl. 1641. Schœff. fung. t. 11.*

Agaricus pileolo hemisphærico in centro depresso et in margine fornicate, petiolo brevi et crasso. Gled. fung. 101.

Amanita fulvus, lacte croceo. Hall. hist. 2419 d.

Omphalomyces acris lateritii coloris. Battar. fung. 35. t. 16. f. H.

Anglis, orange Agaric.

Habitat in sylvis; prope Guildford. VIII—X.

Obs. affinis præcedenti, differt colore fulvo et succo lute-scente.

CRYPTOGAMIA FUNGI.

- lactifluus.* 14. AGARICUS stipitatus, pileo plano carneo lactescente, lamellis rufis, stipite longo carneo. *Sp. pl.* 1641. *Schœff. fung. t. 5.*
Agaricus rubescens. *Schœff. fung. t. 73?*
Fungus pileolo lato pumiceo lacteum et dulcem succum fundens. *B. pin. 371.*
Fungus lactescens piperatus rufus. *Vaill. paris. 61.*
Anglis, milky Agaric.
Habitat in sylvis. IX. X.
- dulcis.* 15. AGARICUS stipitatus, pileo convexo albo lactescente, lamellis albidis, stipite longo albo.
Fungus lactescens non acris. *R. syn. 4.*
Anglis, mild Agaric.
Habitat in sylvis. VII—X.
- viridis.* 16. AGARICUS stipitatus, pileo convexo viridi, lamellis albidis, stipite longo virescente.
Agaricus virens. *Scop. carn. 1570.* *Schœff. fung. t. I.*
Amanita annulatus pileo convexo cæruleo-viridi lamellis roseo-cæruleis. *Hall. hist. 2444.*
Fungus esculentus, pileolo pulvinato viridi, inferne cum pediculo albo. *Mich. gen. 152.*
Fungus magnus viridis. *Sterb. fung. 67. t. 5. f. 6.*
R. syn 4.
Anglis, green Agaric.
Habitat in sylvis. VIII—X.
- squamo-fus.* 17. AGARICUS stipitatus, pileo convexiusculo flavescente lacerato-squamoso, lamellis albidis crenatis, stipite brevi solido pallido. *Schœff. fung. t. 29, 30.*
Amanita pileo flavescente squamofo, lamellis terreis obscuris, annulo araneoso. *Hall. hist. 2412.*
Anglis, squamous Agaric.
Habitat in lignis putrefactibus, præsertim salicis. VIII—X.
- viscidus.* 18. AGARICUS stipitatus pileo purpurascente-fusco-viscido, lamellis fusco-purpurascensibus. *Sp. pl.* 1642.

Agaricus

Agaricus truncatus. Schœf. fung. t. 251.

Agaricus pileo convexo subrubro viscidio, lamellis una cum bulbo nudo et pleno stipite albis. Scop. carn. 1477.

Amanita dura ex fusco-rubens quercina. R. syn. 5.

Anglis, viscid Agaric.

Habitat in nemorosis et sylvis. IX. X.

19. AGARICUS stipitatus, pileo convexo rufo, lamel- cinnamo-
lis flavescentibus, stipite longo flavo. meus.

Agaricus stipitatus, pileo sordide flavo, lamellis luteo- rufis. Sp. pl. 1642. Fl. suec. 1205?

Agaricus caulescens flavus, pileo plano. Fl. lapp. 594.

Agaricus croceus. Schœff. fung. t. 4.

Anglis, brown Agaric.

Habitat in sylvis passim. VIII—X.

20. AGARICUS stipitatus, pileo convexo luteo, lamel- fascicula-
lis virescentibus, stipite flavo. ris.

Agaricus lateritius. Schœff. fung. t. 49.

Amanita annulo araneoso, pileo flavo, lamellis ex flavo fuliginosis. Hall. hist. 2482.

Fungus major subluteus, lamellis luridis. Buxb. cent. iv. t. 4?

Fungus mediæ magnitudinis, pileolo superne e rufo flavicante, lamellis subtus sordide virentibus. R. syn. 10.

Anglis, clustered Agaric.

Habitat in lignis putrefactibus. VIII—X.

21. AGARICUS stipitatus, pileo convexo flavescente, testaceus.
lamellis testaceis, stipite flavo.

Agaricus incurvus. Schœff. fung. t. 65.

Amanita leoninus annulo araneoso. Hall. hist. 2431.

Anglis, testaceous Agaric.

Habitat in lignis putrefactibus et ad radices arborum.
VIII—X.

22. AGARICUS stipitatus, pileo hemisphærico fusco- mutabilis.
flavescente, lamellis rufis, stipite longo tomentoso.

CRYPTOGAMIA FUNGI.

Agaricus mutabilis. *Scop. carn.* 1515. *Schæff. fung.* t. 9.

Fungus fasciculosus, pileo orbiculari lutescente, pediculo fusco tenerime villoso, lamellis ex flavo candidantibus. *R. syn.* 9.

Anglis, variable Agaric.

Habitat in sylvis, sepibus, et lignis putrescentibus. VIII—X.

lividus. 23. *AGARICUS stipitatus,* pileo convexo livido, lamellis albidis, stipite longo albo.

Agaricus multiformis. *Schæff. fung.* t. 14.

Amanita orbicularis sublivida lamellis subfuscis, pilei oris leviter purpascentibus. *R. syn.* 5?

Anglis, livid Agaric.

Habitat in sylvis et ad sepes. IX—V.

equestris. 24. *AGARICUS stipitatus,* pileo pallido: disco stel- latim luteo, lamellis sulphureis. *Sp. pl.* 1643.

Agaricus tuberculosus. *Schæff. fung.* t. 79?

Fungus parvus galeriformam exprimens rufus. *R. syn.* 7?

Fungus vaccinus. *Sterb. fung.* 210. t. 21. f. c.

Anglis, starry Agaric.

Habitat in pascuis et nemorosis. IX. X.

pratensis. 25. *AGARICUS stipitatus,* pileo convexiusculo pallide lutescente lamellis stipiteque concoloribus.

Agaricus collinus. *Schæff. fung.* t. 220?

Anglis, field Agaric, or Champignon.

Habitat in pratis pascuis et ericetis. VIII—X.

farinace- 26. *AGARICUS stipitatus,* pileo convexiusculo purpu- rascente-fusco, lamellis convexis distantibus incarnatis pulverulentis, stipite longo.

Agaricus laccatus. *Scop. carn.* 1530. *Schæff. fung.* t. 13.

Amanita petiolo fistuloso lineato, pileo convexo flavo- rufo. *Hall. hist.* 2436.

Fungus multiplex fordide carneus. *Vaill. paris.* 66?

Anglis, powdered Agaric.

Habitat

Habitat in sylvis et nemorosis. VIII—X.

Desc. Stipes solitarius, longus, teretiusculus, subfistulosus, sordide carneus, Pileus uncialis, convexiusculus, lœvis purpurascens-fuscus ad margines frequentissime undulatus. Lamellæ convexæ, distantes, stipite liberæ, incarnatæ, pulverulentæ, pulvere albo.

27. AGARICUS stipitatus, pileo convexo, lamellis dentatus. basi mucrone dentatis. Sp. pl. 1640. Schœf. fung. t. 301, 302.

Agaricus caulescens, pileo flavo lœvi margine inflexo, lamellis pallidioribus basi angulatis. Fl. suec. 1206. *Anglis*, toothed Agaric.

Habitat in ericetis, pascuis et nemorosis. IX. X.

28. AGARICUS stipitatus, pileo campanulato lacero fimetari-lamellis nigris lateraliter flexuosis, stipite fistuloso. us. Sp. pl. 1643. Fl. suec. 1215.

Agaricus ovatus. Scop. carn. 1479. Schœff. fung. t. 7, 8.

Agaricus procellaneus. Schœff. fung. t. 46, 47.

Agaricus cinereus. Schœf. fung. t. 100.

Amanita albus campanulatus squamosus nigrescens. Hall. hist. 2357.

Fungus albus ovum referens. R. syn. 5. Buxb. cent. IV. t. 27. f. 1.

Hydrophori. Battar. fung. 53, 54. t. 26. f. A. B. C.

Anglis, egg Agaric.

Habitat in fimetis, ruderatis et pratis. IX. X.

29. AGARICUS stipitatus, pileo campaniformi albido extingue-lacero, lamellis niveis, stipite subbulbosof subulato rius. nudo. Sp. pl. 1643.

Agaricus caulescens albus, pileo conico, stipite cylindraceo. Fl. suec. 1196.

Anglis, extinguisher Agaric.

Habitat in fimetis et ruderatis. IX. X.

30. AGARICUS stipitatus, pileo campanulato cinereo striatus. striato glabro, lamellis griseis margine crispis, stipite fistuloso.

Agaricus

CRYPTOGAMIA FUNGI.

- Agaricus fugax.* Schœff. fung. t. 67, 68.
Agaricus fuscescens. Schœff. fung. t. 17.
Agaricus rufocandidus. Schœff. fung. t. 201.
Agaricus margaritaceus. Schœff. fung. t. 216.
Amanita pileo ovato striato cinereo, anulo fugaci.
Hall. hist. 2479.
Fungus multiplex ovatus cinereus. Vaill. paris. 73.
t. 12, f. 10, 11.
Hydrophorus oris laceris alter. Battar. 54. t. 27.
f. G.
Anglis, striated Agaric.
Habitat in ruderatis et ad sepes. IX. X.

- campanu-* 31. **AGARICUS** stipitatus, pileo campanulato striato
latus. pellucido, lamellis adscendentibus, stipite nudo.
Sp. pl. 1643.
Agaricus plicatus, bruneus et pallescens. Schœff.
fung. t. 31, 22, et 211.
Amanita albus, petiolo gracile prælongo, pileolo stri-
ato conico. Hall. hist. 2345.
Fungus minimus simetarius pileo undique et utrinque
striato cinereo aut murino, pediculo lanuginoso et
fistuloso. Mich. gen. 167. t. 75. f. 6.
Fungus multiplex obtuse conicus, colore griseo mu-
rino. Vaill. paris. 71. t. 12. f. 12.
Fungus parvus, pediculo oblongo firmo lento, pileolo
in medio fastigiato, striis exterius apparentibus.
R. syn. 8.
¶ Amanita petiolo procero gracilissimo, pileolo conico
striato murino inferne albo. Hall. hist. 2391.
Amanita parva verna utrinque striata fusca, pileo ob-
tuse coniformi. Dill. giss. 184. R. syn. 8.
Anglis, bell Agaric.
Habitat in pratis, pascuis et sylvis. VIII—X.

- separatus.* 32. **AGARICUS** stipitatus, pileo lævi livido, lamellis
nigricantibus separatis, stipite bulboso volvato. Sp.
pl. 1643. Fl. suec. 1220.
Agaricus candicans. Schœff. fung. t. 217?
Anglis, separated Agaric.
Habitat in pratis et pascuis. IX. X.

CRYPTOGAMIA FUNGI.

691

33. AGARICUS stipitatus, pileo hemisphærico livido-*adnatus*.
flavescente, lamellis atro-griseis, stipite longissimo nudo livido.
Agaricus helvolus. Schœff. fung. 210.
Fungus parvus pediculo oblongo pileolo hemisphærico,
ex albido subluteus. R. syn. 7.
Anglis, long-stalked Agaric.
Habitat in pratis et pascuis e fimo bubulo. IX. X.
34. AGARICUS stipitatus, pileo convexo acuto gri-mammo-*sus*, lamellis convexis griseis crenatis, stipite nudo.
Fungus minor capitulo pileum nauticum referente,
pediculo longiore. Buxb. cent. IV. t. 13. f. 1.
Anglis, crenated Agaric.
Habitat in sylvis et nemorosis. VIII—XII.
35. AGARICUS stipitatus, pileo hemisphærico viscido *clypeatus*.
acuminato, lamellis albis, stipite longo cylindrico
albo. Schœff. fung. t. 52. f. 7, 8, 9.
Amanita radice caudata, petiolo fistuloso procero, pileo
umbonato striato cinereo, lamellis albis. Hall.
hist. 2388.
Fungus clypeatus in medio protuberans. Vaill. paris.
68.
Anglis, shield Agaric.
Habitat in sylvis, nemorosis et lignis putrescentibus. IX.
X.
36. AGARICUS stipitatus, pileo campanulato obtuso *aquosus*.
fusco-flavescente, lamellis atro-griseis, stipite fistu-
loso griseo villoso.
Agaricus truncorum. Scop. carn. 1480. Schœff. fung.
t. 6.
Fungus multiplex campaniformis colore fusco. Vaill.
paris. 73. t. 12. f. 5, 6.
Fungus parvus lethalis galericulatus. Lob. ic. 272.
R. syn. 7.
Fungus parvus galericulatus alter flavus. B. pin. 373.
Anglis, watery Agaric.
Habitat in lignis putridis humidis. VIII—X.

37. AGARI-

CRYPTOGAMIA FUNGI.

- conicus.* 37. AGARICUS stipitatus, pileo campanulato acuto striato livido nitido, lamellis albis, stipite fistuloso cinereo.
Agaricus galericulatus. *Scop. carn.* 1564. *Schœff. fung. t. 52.*
Amanita pileolo conico spadiceo, lamellis albis. *Hall. hist.* 2393.
Fungus multiplex campaniformis, colore castaneo.
Vaill. paris. 73. t. 12. f. 3, 4.
Anglis, cone Agaric.
Habitat in lignis putrescentibus. IX. X.
- *fuligino-* 38. AGARICUS stipitatus, pileo hemisphærico cinereo striato, lamellis griseis pulverulentis, stipite fistuloso griseo. *Schœff. fung. t. 6. f. 2?*
Bulla campaniformis utrinque sulcata. *Battar. fung.* 56. t. 27. f. E?
Fungus minor tenerimus farina respersus, pileolo superne cinereo, lamellis subtus tenuissimis creberrimis nigris. *R. syn. 9?*
Fungi minores plurimi simul nascentes turbinati, exteriorius cinerei aut subfulvi, striis nigricantibus.
R. syn. 10.
Anglis, footy Agaric.
Habitat in pratis et pascuis ad sepes. IX. X.
- candidus.* 39. AGARICUS stipitatus, pileo hemisphærico, lamellis stipiteque albis.
Amanita albus, pileo hemisphærico excarni, oris striatis. *Hall. hist.* 2348.
Fungi plures juxta se nascentes, parvi turbinati candidi ubivis coloris. *R. syn. 10. t. 1. f. 2. a a.*
Fungus minimus albus, pileo hemisphærico in arborum caudicibus. *Mich. gen.* 146. t. 74. f. 7.
Anglis, white Agaric.
Habitat in sylvis, ramis arborum dejectis putridis.
VIII—X.
- fragilis.* 40. AGARICUS stipitatus, pileo convexo viscido pellicido, lamellisque luteis, stipite nudo. *Sp. pl.* 1643. *Schœff. fung. t. 230.*

Amanita

Amanita flavo-cinnamomeus viscidus striatus papillatus. *Hall. hist.* 2425.

Fungus pediculo croceo splendoris participe. *Vaill. paris.* 69. t. 11. f. 16, 17, 18.

Fungus pratensis minor externe viscidus, striis subtus fulvis seu croceis. *R. syn.* 8?

Anglis, brittle Agaric.

Habitat in sylvis et sepibus inter dejecta folia et muscos.
VIII—XI.

41. AGARICUS stipitatus, pileo plano plicato pellucido lamellisque lividis brevissimis, stipite longissimo griseo nudo.

Fungus capillaceus, capitulo rorido, nigro punctulo in summitate notato. *Pluk. ph.* t. 116. f. 7. *R. syn.* 13.

Anglis, tender Agaric.

Habitat in pratis et pascuis, in stercore equino. IX—X.

42. AGARICUS stipitatus, pileo plicato membranaceo, umbellilamellis basi latioribus. *Sp. pl.* 1643. *Fl. suec.* 1192. *ferus.* *Scop. carn.* 1571.

Amanita albus tener pileolo campanulato striato. *Hall. hist.* 2346.

Fungus minimus totus albus, pileo hemisphaerico, utrinque striato lamellis rarioribus. *Mich. gen.* 166. t. 80. f. 11.

Fungus parvus candidissimus lamellatus, pediculo longo gracili. *R. syn.* 9.

Anglis, umbrella Agaric.

Habitat in sylvis inter folia dejecta semiputrida. IX—XII.

43. AGARICUS stipitatus, pileo planiusculo marginē plicatus. plicato luteo-rufo, lamellis pallidioribus, stipite longo rufo.

Agaricus alliatus. *Schœff. fung.* t. 99?

Anglis, plicated Agaric.

Habitat in sylvis et sepibus. IX. X.

44. AGARICUS stipitatus albus, pileo plicato membranaceo, androfasciatus.

CRYPTOGAMIA FUNGI.

branaceo, stipite nigro. *Sp. pl.* 1644. *Fl. suec.* 1193. *Schœff. fung.* 239.

Amanita petiolo nigro, pileolo albo striato ex carni:
Hall. hist. 2351.

Fungus caule nigro capillari androsaces capitulo. *Bocc. mus.* 143. *t.* 104.

Fungus pileo candicante lamellis paucis, pediculo fusco splendente. *Vaill. paris.* 69. *t.* 11. *f.* 21, 22, 23.

Fungus minimus adianti aurei capitulis. *R. syn.* 9.
Anglis, black-stalked Agaric.

Habitat in foliis et ramulis dejectis putrescentibus. VIII—XII.

flavus. 45. *AGARICUS* stipitatus, pileo luteo convexo striato, lamellis stipiteque albis. *Sp. pl.* 1644. *Fl. suec.* 1212.

Agaricus acicula. *Schœff. fung.* *t.* 222.

Amanita minimus, oris adtractis flavus, lamellis albis.
Hall. hist. 2370.

Fungus minimus aurantius mammillaris. *Vaill. paris.* 76. *t.* 11. *f.* 19, 20.

Fungus minimus, capitulo conico, rufescens, lamel-
lis subtus paucis. *R. syn.* 9?

Anglis, dwarf Agaric.

Habitat in sylvis et sepibus. IX—III.

pilosus. 46. *AGARICUS* stipitatus, pileo convexo albo piloso, pilis rubris, stipite longo.

Anglis, hairy Agaric.

Habitat in sylvis, in foliis putrescentibus, præcipue illicis. IX—XI.

Desc. Stipes fere uncialis, filiformis, albidus aut rufus, aut rubescens, ad basin subpilosus. Pileus magnitudine seminis cannabis, convexus, fere hemisphæricus, albus, pilosus; pilis erectis, rigidiusculis rubris; Lamellæ albidae.

** Parasitici, subacaules, dimidiati.

quercinus. 47. *AGARICUS* acaulis, lamellis labyrinthiformibus.
Sp. pl. 1644. *Schœff. fung.* 57.

Agaricus

CRYPTOGAMIA FUNGI.

623

Agaricus quercinus lamellatus coriaceus villosus. *Dill.*
giss. 191. R. syn. 25.

Agaricus de St. Clou. *Vaill. paris. 3. t. 1. f. 1, 2.*

Agaricus dædalæis sinibus excavatus. *Battar. 72. t.*
38. f. A.

Amanita sessilis durissimus; lamellis cartilagineis im-
bricatis. *Hall. hist. 2330.*

Anglis, oak Agaric.

Habitat in truncis arborum præsertim quercuum. **24.**
I—XII.

48. AGARICUS acaulis coriaceus, lamellis simplici- pectina-
bus sinuatis. *Fl. angl. 495.* *tus.*

Agaricus coriaceus longissimus, pectinatum inferne
divisus. *R. syn. 25. f. 5.*

Anglis, pectinated Agaric.

Habitat in lignis et truncis arborum putrescentibus. **24.**
I—XII.

49. AGARICUS acaulis coriaceus villosus: margine betulinus:
obtuso, lamellis ramosis anastomosantibus. *Sp. pl.*
1645. Fl. suec. 1244.

Agaricus hirsutus. *Schæff. fung. t. 76?*

Agaricus villosus, lamellis sinuosis et invicem im-
plexis. *Dill. giss. 192. R. syn. 24.*

Agaricus hirsutus nigricans, lamellis luteis. *Buxb.*
cent. V. t. 6?

Amanita sessilis hirsutus fulvus, lamellis concoloribus.
Hall. hist. 2331?

Anglis, birch Agaric.

Habitat in truncis arborum. **24. I—XII.**

50. AGARICUS acaulis lamellis bifidis pulverulentis. alneus:
Sp. pl. 1645. Fl. suec. 1242. Schæff. fung. t. 246.

Agaricus imbricatus hirsutus, lamellis violaceis. *Buxb.*
cent. V. t. 7. f. 1.

Agaricus lamellatus cinereus. *Battar. fung. 73. t.*
38. f, c, D.

Agaricus lamellatus pectunculi forma major. *Dill.*
giss. 192.

CRYPTOGAMIA FUNGI.

Amanita sessilis, lamellis pulverulentis bifidis. *Hatt.*
hist. 2333.

Fungus arboreus albus durus, lamellis instar lapidis
hæmatitis. *R. syn.* 25.

Anglis, alder Agaric.

Habitat in truncis arborum. 24. I—XII.

lateralis. 51. **AGARICUS** substipitatus, pileo albido lævi, la-
mellis subsimplicibus pallidis, stipite laterali.

Agaricus semipetiolatus. *Schœff. fung.* t. 208?

Agaricus parvus lamellatus pectunculi forma elegans.
Dill. giss. 192. *R. Syn.* 25.

Agaricum squamosum rufescens, pediculo donatum,
subtus lamellis densis. *Mich. gen.* 123. t. 65. f.
7?

Amanita semipetiolatus albidus, subtus terreus. *Hall.*
hist. 2337.

Fungus parvus, lamellatus, pectunculi forma, alno
adnascens. *Vaill. paris.* 70. t. 10. f. 1, 2.

Anglis, lateral Agaric.

Habitat in sylvis et sepibus, in ramis arborum dejectis pu-
trescentibus. VIII—XII.

BOLETUS. 1210.

Fungus horizontalis; subtus porosus.

* *Parasitici acaules.*

suberosus. 1. **BOLETUS** acaulis pulvinatus albus lævis, poris
acutis difformibus. *Sp. pl.* 1645.

Boletus acaulis coriaceo-convexus villosus albus, poris
difformibus rotundis flexuosisque. *Fl. suec.* 1253.

Anglis, cork Boletus.

Habitat in truncis arborum, in fraxinis in comitatu West-
morlandico *passim.* 24. I—XII.

fomenta-
rius. 2. **BOLETUS** acaulis pulvinatus inæqualis obtusus,
poris teretibus æqualibus glaucis. *Sp. pl.* 1645.
Fl. suec. 1252.

Agaricus porosus ignarius Fagi, superne candicans,
inferne fuscus. *Dill. giss.* 193. *R. syn.* 24.

β *Agaricus*

CRYPTOGAMIA FUNGI.

625

3. *Agaricus porosus ignarius* Carpi. *Dill. giss.* 193.
R. syn. 24.

Anglis, tinder Agaric.

Habitat in truncis arborum. 4. I—XII.

3. *BOLETUS acaulis pulvinatus lœvis, poris tenuissimi ignarius*.
 mis. *Sp. pl.* 1645. *Fl. suec.* 1256.

Boletus ungulatus, fulvus et variegatus. *Schœff.*
fung. t. 137, 138, 262, 263.

Polyporus convexo-planus durissimus cinereus, infelix
albidus. *Hall. hist.* 2288.

Agaricus pedis equini facie. *Tourn.* 562. *R. syn.* 22.
Battar. 71. t. 37. f. E.

Agaricum igniarium, &c. *Mich. gen.* 118. t. 61.

Fungus in caudicibus nascens, unguis equini figura.
B. pin. 372.

Fungus durus ignarius. *Park.* 1323.

β *Boletus annulatus*. *Schœff. fung.* t. 106.

Polyporus sessilis convexo-planus, anulus versicolori-
bus, poris albis tenuissimis. *Hall. hist.* 2283.

Anglis, touchwood Boletus.

Habitat in arborum truncis. 4. I—XII.

4. *BOLETUS acaulis coriaceus convexus lobatus flavo-coriaceus*
 vus lœvis, poris tenuissimis.

Boletus caudicinus. *Scop. carn.* 1596. *Schœff. fung.*
 t. 131, 132.

Agaricus speciosus. *Battar. fung.* 68. t. 34. f. B.

Anglis, coriaceous Boletus.

Habitat in truncis arborum. 4. I—XII.

5. *BOLETUS acaulis convexus sublobatus rufus lœvis hepaticus*.
 poris teretibus flavis. *Schœff. fung.* t. 116—120.

Polyporus sessilis sanguineus crassus mollis obscure lo-
batus. *Hall. hist.* 2315.

Agaricus porosus rubens carnosus, hepatis facie. *Dill.*
giss. 192. *R. syn.* 23.

Agaricum esculentum, castaneæ adnascens, latissimum,
hepatis facie, superne ex rubro ferrugineum, interne
sanguineum, inferne ochroleucum. *Mich. gen.* 117.
 t. 60.

T t

Anglis,

CRYPTOGAMIA FUNGI.

Anglis, liver Boletus.

Habitat in truncis arborum. 24. I—XII.

versicolor. 6. BOLETUS acaulis, fasciis discoloribus, poris albis.*Sp. pl. 1645. Schœff. fung. t. 136.*Boletus variegatus, mesentericus, atrofuscus et multicolor. *Schœff. fung. t. 263, 267, 268, et 269.*Polyporus sessilis cespitosus planus hirsutus, anulis versicoloribus. *Hall. hist. 2282.*Agaricus varii coloris squamosus. *Tourn. 562. R. syn. 24.*Agaricus squamis iridiformibus. *Battar. fung. 69. t. 35. f. A.**Anglis*, striped Boletus.

Habitat in truncis arborum. 24. I—XII.

villosus. 7. BOLETUS acaulis convexus villosus fuscus, poris angularibus flavescentibus.Agaricus villosus et porosus substantiae coriaciae. *Dill. giss. 193. R. syn. 24.**Anglis*, villous Boletus.

Habitat in truncis arborum. 24. I—XII.

squamofusus. 8. BOLETUS subacaulis planiusculus lacerato-squamofusus flavescens, poris tetragonis.Boletus juglandis. *Schœff. fung. t. 101, 102.*Polyporus sessilis, convexo-planus, poris amplissimis albidis. *Hall. hist. 2278.*Fungus angulosus pediculo exiguo. *B. pin. 370. R. syn. 11.*Auricula flammea Malchi. *Sterb. fung. 105. t. 13.**Anglis*, scaly Boletus.

Habitat in truncis arborum præcipue Fraxinis et Betulis; in boreali parte Angliae frequens. V—X.

albus. 9. BOLETUS acaulis pulvinatus lævis, poris oblongis.*Fl. angl. 496.*Polyporus sessilis convexo-planus farinosus. *Hall. hist. 2287?*Agaricus officinali similis. *Dill. giss. 192. R. syn. 23.**Anglis*,

CRYPTOGAMIA FUNGI.

627

Anglis, white Boletus.

Habitat in truncis arborum præsertim salicibus. V—X.

** *Stipitati.*

10. BOLETUS stipitatus, pileo glabro pulvinato marginato, poris compositis acutis, porulis angulatis brevioribus. *Sp. pl.* 1647. *Schœff. fung.* t. 103, 104, 105, 107, 112, 130, &c. *Scop. carn.* 1586.

Polyporus carne secedente, petiolatus fulvus inferne virescens. *Hall. hist.* 2302.

Suillus esculentus crassus, superne fulvus, inferne initio albidus, deinde e flavo subvirescens, pediculo ventricoso et superne pilei parti concolore. *Mich. gen.* 127. t. 68. f. 1.

Fungus porosus crassus. *R. syn.* 11.

Ceriomyces crassus. *Battar. fung.* 62. t. 29. f. A. B.

Anglis, brown Boletus.

Habitat in sylvis. VII—X.

11. BOLETUS stipitatus, pileo pulvinato subviscido luteus, poris rotundatis convexis flavissimis, stipite albido.

Sp. pl. 1646. *Schœff. fung.* t. 114.

Boletus luteus. *Dill. giss.* 188. *R. syn.* 10.

Polyporus carne secedente petiolatus annulatus. *Hall. hist.* 2301.

Fungus porosus autumnalis luteus. *Buxb. cent.* 5. t. 14.

Anglis, yellow Boletus.

Habitat in sylvis. VIII—X.

12. BOLETUS stipitatus, pileo flavo subtomentoso. *subtomentosus*. poris subangulatis difformibus fulvis planis, stipite tosus. flavo. *Sp. pl.* 1647. *Fl. suec.* 1251?

Boletus ovinus. *Schœff. fung.* t. 121.

Polyporus carne secedente petiolatus, pileo villoso cervino, poris albidis. *Hall. hist.* 2311.

Suillus parvus crassus, pediculo et superna pilei fulvis sericea, perbrevique lanagine infectis, inferne vero ochroleucis. *Mich. gen.* 128. t. 68. f. 2.

T t 2

Fungus

CRYPTOGAMIA FUNGI.

Fungus porosus tenuis coriaceis. *Buxb. cent. 5. t. 15.*
f. 1.

Anglis, woolly Boletus.

Habitat in sylvis. *Prope Eshar in comitatu Surriensi.*
IX. X.

perennis. 13. *BOLETUS stipitatus perennis, pileo utrinque planiusculo.* *Sp. pl. 1646. Fl. suec. 1245.*

Boletus coriaceus. *Scop. carn. 1588. Schœff. fung. t. 125.*

Polyporus petiolatus infundibuliforme cespitosus intus nigricans, extus albus. *Hall. hist. 2298.*

Polyporus lignosus et cespitosus infundibulum imitans, superne nigricans, inferne cum pediculo albus, areolis carbonariis innascens. *Mich. gen. 131. t. 70. f. 6.*

Fungus lignosus fasciatus. *Vaill. paris. 61. t. 12.*
f. 7.

Anglis, perennial Boletus.

Habitat in sylvis, ad ligna putrida. *q. I—XII.*

HYDNUM. 1211.

Fungus horizontalis, subtus echinatus.

imbricatum. 1. *HYDNUM stipitatum, pileo convexo imbricato.*
Sp. pl. 1647. Schœff. fung. t. 140. 273. Fl. dan.
176.

Echinus petiolatus albicans, superne squamosus. *Hall.*
hist. 2324.

Erinaceus esculentus albus crassus. *Mich. gen. 132.*
t. 72. f. 2.

Fungus pœne albus, prona parte erinaceus. *B. hist.*
III. 828. R. syn. 11.

Anglis, imbricated Hydnum.

Habitat in sylvis; prope Maidston in Cantio. IX. X.

repandum. 2. *HYDNUM stipitatum, pileo convexo lœvi flexuoso.*
Sp. pl. 1647. Fl. suec. 1258. Fl. dan. 310. Schœff.
fung. t. 141, 318.

Echinus

Echinus petiolatus subfuscus, petiolo lævi. *Hall. hist.*
2325.

Erinaceus esculentus pallide luteus. *Mich. gen.* 132.
t. 72. f. 3.

Anglis, smooth Hydnum.

Habitat in sylvis. IX—XI.

3. HYDNUM stipitatum, pileo dimidiato. *Sp. pl.* 1648. *auriscal-*
Schœff. fung. t. 143. *pum.*

Echinus petiolo gracili laterali, pileolo piano obscuro.
Hall. hist. 2321.

Erinaceus parvus hirsutus ex fusco fulvus, pileolo
semiorbiculari, pediculo tenuiore. *Mich. gen.* 132.
t. 78. f. 8.

Fungus erinaceus parvus, in conis abietis nascens.

Buxb. cent. I. *t. 57. f. 1.*

Anglis, fir Hydnum.

Habitat in ramis foliis et conicis dejectis putrescentibus
Pini et Abietis, passim. IX. X.

PHALLUS. 1212.

Fungus supra reticulatus, subtus lævis.

1. PHALLUS pileo ovato celluloso, stipite nudo ru- *esculentus.*
gofo. *Sp. pl.* 1648. *Fl. dan.* 53. *Schœff. fung. t.*
199, 298—300.

Boletus capite tereti reticulato. *Hall. hist.* 2247.

Boletus esculentus rugosus. *Mich. gen.* 203. *t. 85.*
f. 1, 2. albicans, quasi fuligine infectus. *Tourn.*
561. *t. 329. f. A. Battar. fung.* 24. *t. 2. f. F.*

Fungus porosus rugosus albicans, quasi fuligine infec-
tus. *B. pin.* 370.

Fungus favaginosus. *Park.* 1317. *R. syn.* II.

Anglis, esculent Morel.

Habitat in sylvis et sepibus.

2. PHALLUS volvatus stipitatus, pileo albo celluloso *impud-*
apice pervio. *cus.*

CRYPTOGAMIA FUNGI.

- Phallus volvatus stipitatus, pileo celluloſo. *Sp. pl.*
1648. *Fl. dan.* 175. *Schæff. fung.* t. 196—198.
Phallus volva exceptus, capituli apice patulo. *Gled.*
fung. 55. *Hall. hist.* 2248.
Phallus vulgaris totus albus, volva rotunda, pileolo
cellulato, ac summa parte umbilicato pervio ornato.
Mich. gen. 201. t. 83.
Boletus phalloides. *Tourn.* 562. *Battar. fung.* 23. t.
2. f. A.
Fungus phalloides. *B. hist.* III. 843. *R. syn.* 12.
batavicus pileo laciniato et veluti criso. *R. hist.*
III. 25. *Sterb. fung.* 277. t. 30. f. A—D.
Fungus foetidus penis imaginem referens. *B. pin.* 374.
Anglis, stinking Morel.
Habitat in sylvis et ad sepes. VII—IX.

- caninus.* 3. PHALLUS volvatus stipitatus, pileo rubro celluloſo
acuto, apice clauso.
Phallus caninus. *Schæff. fung.* t. 330?
Phallus exilis marattæ. *Battar. fung.* 76. desc?
Anglis, red-headed Morel.
Habitat in sylvis et nemorosis, prope Shrewsbury. D.
Ehret. VII—IX.

CLATHRUS. 1213.

Fungus subrotundus subcancellatus, villo repletus.

* *Stipitati.*

- denuda-*
tus. 1. CLATHRUS stipitatus, capitulo oblongo volvato.
Sp. pl. 1649.
Clathroides purpureum, pediculo donatum. *Mich.*
gen. 214. t. 94. f. I.
Trichia gregaria purpurea petiolata, capitulo sphærico.
Hall. hist. 2164. t. 48. f. 6.
Anglis, purple Clathrus.
Habitat in lignis putridis. VI—X.

- nudus.* 2. CLATHRUS stipitatus, capitulo oblongo axi lon-
gitudinali adnato. *Sp. pl.* 1649. *Fl. dan.* 216.

Clathroidastrum obscure purpureum majus. Mich.
gen. 215. t. 94.

Trichia petiolata, capitulo cylindrico axi perforato.
Hall. hist. 2165.

Mucor stemonitis. Scop. carn. 1641. Schæff. fung. t.
297.

Anglis, naked Clathrus.

Habitat in lignis putridis. V—X.

3. CLATHRUS stipitatus, capitulo globoso, villo *flavus*.
flavo.

Mucor perennis, stipite filiformi nigro, capitulo glo-
boso cinereo. Sp. pl. 1655.

Trichia petiolata nigra, capitulo sphærico, villo
ochroleuco. Hall. hist. 2161. t. 48. f. 3.

Anglis, yellow Clathrus.

Habitat in lignis putridis. VI—X.

4. CLATHRUS stipitatus, capitulo globoso, villoque *ater*.
atro.

Clathrus stipitatus, capitulo globoso, glande ovali. recuti-
Sp. pl. 1649 ? tus.

Trichia nigra petiolata, capitulo sphærico. Hall. hist.
2158.

Anglis, black Clathrus.

Habitat in lignis putridis. V—X.

5. CLATHRUS stipitatus, capitulo subrotundo cine- *cinereus*.
reo, villo livido.

Mucor perennis, stipite subulato nigro, capitulo len-
ticulari cinereo. Sp. pl. 1655.

Coralloides fungiforme arboreum nigrum vix crusto-
sum. Dill. musc. 78. t. 14. f. 3.

Trichia petiolo brevissimo, capitulo sphærico, cortice
niveo, filamentis nigris. Hall. hist. 2160. t. 48.
f. 2.

Anglis, grey Clathrus.

Habitat in lignis putridis. I—XII.

6. CLATHRUS stipitatus, capitulo globoso, villo *fulvus*.
fulvo.

CRYPTOGAMIA FUNGI.

Mucor perennis pallidus, pileo fulvo. *Sp. pl.* 1655.
Trichia petiolata rufa, capitulo sphærico. *Hall. hist.*

2163. *t.* 48. *f.* 4.

Anglis, brown Clathrus.

Habitat in lignis putridis. V—X.

virescens. 7. CLATHRUS stipitatus viridis, capitulo globoſo fa-
rinaceo,

Mucor perennis viridis, foliis furfuraceis, stipite fili-
formi, capitulo globoſo. *Sp. pl.* 1655.

Anglis, greenish Clathrus.

Habitat in terra umbroſa ad latera viarum et foſſarum
et in lignis putridis. V—X.

** Acaulis.

turbina- 8. CLATHRUS acaulis turbinatus, villo flavescente,
tus. Clathroides purpureus, pediculo carens. *Mich. gen.*
214. *t.* 94. *f.* 2.

Trichia gregaria ſeſſilis piriformis, flava. *Hall. hist.*
2168. *t.* 48. *f.* 7.

Anglis, turbinated Clathrus.

Habitat in lignis putridis. VIII—IV.

HELVELLA. 1214.

Fungus horizontalis, utrinque lævis.

* Stipitatæ.

Mitra. 1. HELVELLA pileo deflexo adnato lobato difformi
Sp. pl. 1649.

Elvela mitra. *Schœff. fung.* 159—162, 154, 282,
320, et 322.

Boletus capitulo explanato laciniato. *Hall. hist.* 2246.

Boletus leucophæus. *Battar. fung.* 25. *t.* 3. *f.* B.

Boletus pileolo spiralibus plicis contorto. *Battar.*
fung. 24. *t.* 2. *f.* G.

Fungoides fungiforme crispum laciniatum et compli-
catum, pediculo crasso striato rimoso et fistuloso.

Mich. gen. 204. *t.* 86. *f.* 7, 8, 9.

Fungus

CRYPTOGAMIA FUNGI.

633

Fungus terrestris pediculo striato et cavernoso, capitulo plicatili, subtus plano. R. syn. 8.

Anglis, curled or mitred Helvella.

Habitat in sylvis. VIII—X.

Obs. variat stipite lœvi, et striato; Pileo flavescente, fuscō et livido.

2. HELVELLA pileo plano livido, stipite lœvi. planus.

Anglis, plain Helvella.

Habitat in sylvis. VII—X.

* *Acaulis.*

3. HELVELLA acaulis.

*Agaricus acaulis utrinque planiusculus. Fl. lapp. 517. acaulis.
suec. 1243.*

*Agaricus villosus tenuis, inferne lœvis. Dill. giss.
193. R. syn. 21?*

Anglis, sessile Helvella.

*Habitat in lignis et arborum truncis putrescentibus. 4.
I—XII.*

PEZIZA. 1215.

Fungus campanulatus.

1. PEZIZA campanulata lentifera villosa interne lœvis. *lentifera.*
*Peziza campanulata lentifera. Sp. pl. 1649. Fl. dan.
469.*

Peziza sericea. Schæff. fung. t. 180.

Cyathus sericeus intus levis. Hall. hist. 2215.

*Cyathoides cyathiforme, cinereum et veluti sericeum.
Mich. gen. 222. t. 102. f. 1.*

*Fungoides infundibuliforma, semine foetum. Tourn.
560. Vaill. paris. 56. t. II. f. 677.*

*Fungus pyxoides seminifer. Fl. pruss. 90. t. 16. f.
sup.*

*Fungus minimus ligneis tabulis areolarum hortorum
adnascens. B. pin. 514.*

*Fungi calyciformes seminiferi. Mentz. pug. t. 6.
R. syn. 20.*

Anglis,

Anglis, seeding Peziza.

Habitat in sylvis, agris, areis hortorum et lignis putridis. I—XII.

striata. 2. PEZIZA campanulata lentifera villosa, interne striata. *Fl. dan.* 105.

Peziza hirsuta. *Schæff. fung. t.* 178.

Cyathus hirsutus, intus striatus. *Hall. hist.* 2214.

Cyathoides cyathiforme, obscurum, externe hirsutum interne plumbeum glabrum et striatum. *Mich. gen.* 222. *t.* 182. *f.* 2.

Fungoides infundibuliforma, semine foetum, interne striatum, externe hirsutum. *Vaill. paris.* 57. *t.* 11. *f.* 4, 5.

Fungus semenifer, externe hirsutus, interne striatus. *R. syn.* 21.

Fungus non vescus XLI. *Fl. pruss.* 90. *t.* 16. *f. inf.* *Anglis*, striated Peziza.

Habitat in sylvis, agris et lignis putridis. I—XII.

levis. 3. PEZIZA campanulata lentifera ventricosa glabra.

Peziza crucibuliformis. *Scop. carn.* 1630. *Schæff. fung.* *t.* 179. 181.

Cyathoides luteum crucibuliforme. *Mich. gen.* 222. *t.* 102. *f.* 3.

Fungus semenifer minor, fere hemisphæricus. *R. syn.* 20. *t.* 1. *f.* 2. *b*, *c*.

Anglis, smooth Peziza.

Habitat in lignis putridis. IX—V.

punctata. 4. PEZIZA turbinata truncata, disco punctata. *Sp. pl.* 1650. *Fl. suec.* 1275. *dan.* 288.

Fungus minimus infundibuliformis, superne nigris punctis notatus. *R. syn.* 12.

Fungus minimus lignosus disco punctato. *Bacc. mus.* II. 149. *t.* 107.

Anglis, dotted Peziza.

Habitat in stercore equino. V—X.

cornuco-pioides. 5. PEZIZA infundibuliformis, disco patente sinuato punctato. *Sp. pl.* 1650. *Fl. dan.* 268. *Schæff. fung.* *t.* 165, 166.

Peziza

CRYPTOGAMIA FUNGI.

635

Peziza membranacea tubæ similis, marginibus repli-catis. *Hall. hist.* 2216.

Peziza tubæ fallopianæ æmula. *Dill. giss.* 194. *R. syn.* 20.

Fungoides nigricans majus, cornucopiæ forma. *Vaill. paris.* 57. t. 13. f. 2, 3.

Fungoidaster cespitosus, superne fuscus, inferne cinea-reus. *Mich. gen.* 201. t. 82. f. 5, 6, 7.

Anglis, cornucopia Peziza.

Habitat in sylvis; prope Hornsey copiose. IX. X.

6. PEZIZA cyathyformis, extus angulata venis ramosis. *acetabu-lum.* *Sp. pl.* 1651.

Peziza subfuscæ major. *Dill. giss.* 194. *R. syn.* 17.

Fungoides fuscum acetabuliforme, externe ramifica-tum. *Vaill. paris.* 57. t. 13. f. 1.

Fungoides fuscum maximum. *Buxb. act.* 4. 283. t. 29. f. 1, 2.

Fungoides maximum vasis fusorii forma, subalbidum. *Mich. gen.* 207. t. 86. f. 1?

Anglis, cup Peziza.

Habitat in lignis putridis in sylvis et sepibus sed rarius. IX. X.

7. PEZIZA globoso-campanulata, margine crenato. *cupularis.* *Sp. pl.* 1651.

Peziza petiolata hemisphærica, ora dentata, extus vil-lofa spadicea intus alba et levis. *Hall. hist.* 2228.

Fungoides glandis cupulam referens margine dentato. *Vaill. paris.* 57. t. 11. f. 1, 2, 3.

Fungoides pyri inversi forma, ore lacero et veluti coronato ex albo griseum. *Mich. gen.* 207. t. 86. f. 2.

Anglis, crenated Peziza.

Habitat in lignis putridis, et stercore equino. VIII—X.

8. PEZIZA hemisphærica, externe fusca hispida, in-*hispida.* terne lævis glauca.

Peziza sessilis hemisphærica, extus villøsa spadicea. *Hall. hist.* 2231.

Peziza albida. *Schœff. fung.* t. 151.

Elvela

CRYPTOGAMIA FUNGI.

Elvela hemisphærica excavata et sessilis, intus candida
glabra extus pilosa et subobscura. *Gled. fung.* 46.
Fungoides scutellatum, interne album, externe obscu-
rum et subhirsutum. *Mich. gen.* 206. *t.* 86. *f.* 4.
Anglis, hairy Peziza.
Habitat in sylvis et sepibus humidiusculis et lignis putridis
humidis. IX. X.

stipitata. 9. PEZIZA stipitata, hemisphærica, externe fusca his-
pida, stipite cylindrico.
Peziza hispida. *Schœff. fung.* *t.* 167.
Peziza terrea petiolo longo gracili, acetabulo extus
subaspero, plano aut concavo. *Hall. hist.* 2227.
Fungoides fuscum, pediculo longiore donatum. *Buxb.*
comm. Aet. petrop. IV. 282. *t.* 29. *f.* 3.
Anglis, stalked Peziza.
Habitat in sylvis; prope Guildford. IX. X.

coccinea. 10. PEZIZA subglobo-campanulata interne coccineae,
margine integro. *Schœff. fung.* *t.* 148.
Peziza cava albida, intus coccinea. *Hall. hist.* 2222.
Peziza miniata major. *Dill. giss.* 194. *R. syn.* 17.
Fungus membranaceus seu coriaceus acetabuli modo
concavus, colore intus coccineo seu cremesino sa-
turo. *R. syn.* 18.
Fungoides coccineum, acetabuli forma. *Mich. gen.*
207.
Fungi perniciosi gen. xxiv. spec. 2. *Clus. hist.* 287.
Anglis, scarlet Peziza.
Habitat in lignis putridis in sylvis et sepibus. VIII—
III.

cyathoides. 11. PEZIZA cyathiformis, margine obtusa erecto. *Sp.*
pl. 1651.
Peziza lutea parva, marginibus lævibus. *R. syn.* 18.
t. 24. *f.* 4.
Anglis, smooth Peziza.
Habitat in lignis putridis. VIII—IV.

fulva. 12. PEZIZA plana fulva, margine convexo glabro.
Peziza

CRYPTOGAMIA FUNGI.

637

Peziza lenticulatis parva miniata. *R. syn.* 18. t. 24.

f. 2.

Peziza sessilis aurantia plana annulata. *Hall. hist.*

2224.

Fungus fimosus bracteolatus croceus. *Pet. Vaill.*

paris. t. 13. f. 14.

Anglis, orange Peziza.

Habitat in stercore equino et bubulo, et solo glareoso.

VIII—X.

Obs. variat colore flavo et fusco.

13. PEZIZA concava atra.

atra.

Peziza planissima, ex glauco nigricans. *Hall. hist.*

2243.

Anglis, black Peziza.

Habitat in fimo vaccino. IX—V.

14. PEZIZA plana, margine convexo piloso. *Sp. pl. scutellata.*

1651.

Peziza sessilis miniata plana, ora ciliata. *Hall. hist.*

2245.

Peziza lutea parva, marginibus pilosis. *R. syn.* 18.

t. 24. f. 3.

Elvela ciliata. *Scop. carn.* 1620. *Schœff. fung.* 284.

Anglis, ciliated Peziza.

Habitat in stercore equino et bubulo et lignis putridis in sylves et sepibus. VIII—X.

15. PEZIZA turbinata cochleata. *Sp. pl.* 1657. *cochleata.*

Elvelæ. *Schœff. fung.* t. 150, 155, 156, 274, 280.

Fungoides auriculam judæ referens, intus rufescens extus candicans et quasi farinosum. *Vaill. paris.*

57. t. 11. f. 8.

Anglis, wreathed Peziza.

Habitat in sylvis. IX. X.

CLAVARIA.

CLAVARIA. 1216.

Fungus, lævis, oblongus.

* *Indivisæ.*

- pistillaris.* 1. CLAVARIA clavæformis simplicissima. *Sp. pl.* 1651.
Clavaria alba pistilli forma. *Vaill. paris.* 39. t. 7.
 f. 5.
Clavaria lutea minima. *Mich. gen.* 208. t. 87. f. 5.
Clavaria cespitosa media lutea. *Mich. gen.* 209. t. 87.
 f. 10, 11.
Clavaria ligula. *Schæff. fung.* t. 171.
Clavaria alba longa petiolata. *Hall. hist.* 2203.
Fungoides clavatum minus. *R. syn.* 14.
 ♂ *Clavaria minima nivea.* *Mich. gen.* 208. t. 87. f. 6, et
 9. *Hall. hist.* 2207.
Fungus clavatus minimus. *R. syn.* 14.
 ♀ *Clavaria vermiculata, simplex lumbriciformis ochro-*
 leuca. *Fl. carn.* 1623.
Clavaria vermiculata fistulosa et non fistulosa candi-
 da. *Mich. gen.* 209. t. 87. f. 12, 13.
Fungoides clavatum incurvum in acutum mucronem
productum, *R. syn.* 14.
 ♂ *Clavaria major lutea.* *Mich. gen.* 208. t. 87. f. 1,
 2, 3.
Clavaria pistillaris. *Schæff. fung.* t. 169.
Anglis, club Clavaria.
Habitat in sylvis et ericetis. IX—XI.

- militaris.* 2. CLAVARIA clavata integerrima, capite squamoso.
Sp. pl. 1652.
Clavaria militaris crocea. *Vaill. paris.* 39. t. 7. f. 4.
Fungus fontanus purpureus elegans. *R. syn.* 12.
Anglis, red Clavaria.
Habitat in sylvis humidis et paludibus. IX. X.

- ophiogloss-*
soides. 3. CLAVARIA clavata integerrima compressa obtusa.
Sp. pl. 1652. *Schæff. fung.* t. 327.
Clavaria indivisa nigra compressa. *Hall. hist.* 2206.
Clavaria ophioglossoides. *R. syn.* 14.

Clavaria

Clavaria ophioglossoides nigra. *Vaill. paris.* 39. t. 7.

f. 3.

Anglis, black Clavaria.

Habitat in sylvis et ericetis humidis. IX. X.

** *Ramosæ.*

4. CLAVARIA ramosa lignea nigra. *Sp. pl.* 1652. *digitata.*

Sphæria nigerrima aspera petiolata conica. *Hall. hist.*
2193.

Lichen-agaricus, qui Lithophytoides terrestre, digitatum nigrum. *Mich. gen.* 104. t. 54. f. 4.

Lichen-agaricus nigricans cupressiformis ramosus et non ramosus. *Mich. gen.* 104. t. 55. f. 2.

Fungus piperi æthiopico similis, vel digitatus niger. *Merr. pin. R. syn.* 14.

Lithophytoides terrestre digitatum nigrum. *Aet. par.*
1711. p. 100.

Fungus hypoxylon digitatus. *Bruk. indisp. et cent.*
II. t. 9.

Anglis, digitated Clavaria.

Habitat in lignis putrescentibus. VIII—XI.

5. CLAVARIA ramoso-cornuta compressa. *Sp. pl. hypoxylon.*

1652. *Schæff. fung.* t. 328.

Sphæria nigerrima aspera palmata, cornubus planis carnosis pulverulentis. *Hall. hist.* 2194.

Lichen-agaricus nigricans, ligno adnascens plerumque multifidus et compressus, ima parte villosus, summa vero glaber albidus et pulverulentus. *Mich. gen.* 104. t. 55. f. 1. c. c. c.

Fungus ramosus niger compressus parvus apicibus albidis. *R. syn.* 15.

β Fungus cornu dorcadis facie. *E. N. C. Dec.* 1. *Ann.*
IV. 195.

Agaricus ramosus cornu rangiferi referens. *Blackf.*
sp. bot. 2. t. 1.

γ Fungus niger subularis, apicibus albidis. *R. syn.* 15.

δ Fungus niger compressus varie divaricatus et implexus inter lignum et corticem. *R. syn.* 15.

Anglis, horned Clavaria.

Habitat

CRYPTOGAMIA FUNGI.

Habitat in lignis putrescentibns. I—XII.

coralloides. 6. CLAVARIA ramis confertis ramosissimis inæqualibus. *Sp. pl.* 1652. *Schæff. fung.* t. 175, 176, 177, 285—288.

Clavaria caule crassissimo, ramis innumerabilibus cespitosis, breviter dentatis. *Hall. hist.* 2201.

Corallo-fungus flavus. *Vaill. paris.* 41. t. 8. f. 4.

Coralloides flava albida. *Tourn.* 564. t. 332. f. B.

Fungus ramosus flavus et albidus. *B. hist.* III. 837. *R. syn.* 16.

Fungoides ramosum maximum, brassicæ caulifloræ facie et magnitudine. *R. syn.* 16.

Barba caprina. *Sterb. fung.* 69. t. 11. f. A—D.

Anglis, coral Clavaria.

Habitat in ericetis, nemorosis et pascuis. VIII—X.

fastigiata. 7. CLAVARIA ramis confertis ramosissimis fastigiatis obtusis luteis. *Sp. pl.* 1652.

Clavaria albida, purpurea, flammea. *Schæff. fung.* t. 170, 172, 174.

Clavaria caule plano sulcato ramis ferratis. *Hall. hist.* 2200.

Coralloides minor cristata. *Buxb. cent.* IV. 39. t. 66. f. 1.

Fungoides fungiforme luteum foetidum et minus ramosum. *R. syn.* 479. t. 24. f. 5.

Anglis, yellow Clavaria.

Habitat in sylvis. VIII—X.

muscoides. 8. CLAVARIA ramis ramosis acuminatis inæqualibus luteis. *Sp. pl.* 1652. *Schæff. fung.* t. 173.

Clavaria caule ramoso, ramis incurvis acutis. *Hall. hist.* 2199.

Fungus parvus ramosus luteus. *R. syn.* 16. t. 24. f. 7.

Fungus ramosus minimus, coloris aurantii. *R. syn.* 16.

Anglis, dwarf Clavaria.

Habitat in ericetis et sylvis. IX, X.

LYCOPERDON. 1712.

Fungus subrotundus, Seminibus farinaceis repletus.

* *Solida, subterranea absque radice.*

1. LYCOPERDON globosum solidum muricatum, *tuber.*
radice destitutum. *Sp. pl. 1653.*

Lycoperdon subterraneum conglomeratum, cortice nigro exasperato. *Hall. hist. 2177.*

Tubera. Math. 544. B. pin. 376. hist. III. 849.
Tourn. t. 333. R. syn. 28. terræ. Ger. em. 1583.
edulia. Park. 1319.

Tuber brumale, pulpa obscura odorata. *Mich. gen. 221. t. 164.*

Anglis, esculent Puff-ball or Truffles.

Habitat sub terra; in sylvis et pascuis elatis. - Downs
dictis in comitatibus Wiltoniensi, Hantoniensi, Can-
tiano, &c. passim. IX—V.

2. LYCOPERDON globosum solidiusculum lacerum *cervinum,*
centro farinifero, radice instructum. *Sp. pl. 1653.*

Sphæria subrotunda, tuberculis minimis, medulla
atra pulverulenta. *Hall. hist. 2191.*

Tubera cervina. *Lob. ic. 276. B. pin. 376.*

Tubera perniciosa terrestria s. cervinæ. *Sterb. fung.*
215. t. 32. f. B. B. B. R. syn. 28.

Lycoperdastrum tuberosum arrhizon fulvum cortice
duriore crasso et granulato, medulla ex albo pur-
purascente, semine nigro crassiore. *Mich. gen. 320.*
t. 99. f. 4.

Anglis, subterraneous Puff-ball.

Habitat in sylvis et ad sepes. In Canewood, Hamp-
stead. *R. syn. in Devonia.* IX. X.

** *Solidum, parasiticum.*

3. LYCOPERDON subrotundum solidum tuberculatum *fraxinea-*
tum nigrum.

Sphæria maxima convexa nigerrima. *Hall. hist. 2192.*

Lichen-agaricus crustaceus crassus, bovillum quasi
U u renem

CRYPTOGAMIA FUNGI.

renem repræsentans, niger et veluti deustus. *Mich. gen. 104. t. 54. f. 1.*

Fungus fraxineus niger durus orbiculatus. R. syn. 16. hist. 109.

Anglis, ash Puff-ball.

Habitat in putrescentibus fraxini truncis. I—XII.

*** *Pulverulenta, radicata supra terram.*

Bovista. 4. *LYCOPERDON* subrotundum, lacerato-dehiscens.
Sp. pl. 1656.

Lycoperdon saccatum cinereum, polline obscure vi-
ridi. Hall. hist. 2172.

vulgare. ♂ *Lycoperdon vulgare. Tourn. 563.*

Lycoperdon areolatum. Schæff. fung. t. 190.

Crepitus Lupi s. Fungus ovatus. Park. 1323. R. syn.
26.

Fungus rotundus orbicularis. B. pin. 374.

Fungus tertius s. orbicularis. Ger. em. 1582.

♂ *Fungus orbicularis per totum pulvere repletus. R.*
syn. 26.

♀ *Lycoperdon furfuraceum. Schæff. fung. t. 294.*

Fungus Lupi crepitus dictus in summitate solum pul-
verulentus. R. syn. 26.

Fungus niger calycis figuram referens. B. pin. 375.

♂ *Lycoperdon maximum, Schæff. fung. t. 191.*

Fungus maximus rotundus pulverulentus dictus ger-
manis Bofist. B. hist. III. 848. R. syn. 26.

Fungus cucurbitiformis magnitudine capitis humani
et ponderosus candiusque instar nivis. Merr. pin.

echina-
tum.

Lycoperdon echinatum. Schæff. fung. t. 186.

Lycoperdon esculentum obscurum, echinis quadran-
gularibus et quadripartitis insignitis. Mich. gen.
218. t. 97. f. 5.

Lycoperdon gemmatum. Schæff. fung. t. 189.

Lycoperdon niveum sphæricum, superficie in areolas
adamantis instar dissecta ac distributa. Tourn. 564.
Mich. gen. 218.

excipuli-
forme.

Lycoperdon excipuliforme. Schæff. fung. 187, 292,
295.

Lycoperdon.

Lycoperdon excipuli chymici forma. *Vaill. paris.*
123. t. 22. f. 15.

Fungus pulverulentus crepus lupi dictus major, pediculo longiore ventricoso. *R. syn.* 27.

Lycoperdon verrucosum sphæricum pediculo donatum, e flavo rufescens, punctulis fuscis notatum.
Vaill. paris. 123. t. 16. f. 7..

Fungus pulverulentus crepidus lupi dictus, pediculo longiori scabro. *R. syn.* 27.

Lycoperdon pyriforme. *Schœff. fung.* 185, 293.

Fungus pyriformis. *Merr. pin.* *R. syn.* 27.

Anglis, common Puff-ball.

Habitat in pratis et pascuis: IX. X.

5. LYCOPERDON stipite longo, capitulo globoſo peduncu-
glabro: ore cylindrico integerrimo. *Sp. pl.* 1654. *latum.*

Lycoperdon petiolo gracili capite sphærico lèvi, pa-
pillato perforato: *Hall. hist.* 2170.

Lycoperdon parisiense minimum, pediculo donatum:
Tourn. 563. t. 331. f. E, E.

Fungus pulverulentis minimus, pediculo longo in-
fidens. *R. syn.* 27.

Anglis, stalked Puff-ball.

Habitat in pratis et pascuis: VIII—X.

6. LYCOPERDON volva multifida patente, capitulo stellatum,
glabro ore acuminato. *Sp. pl.* 1653. *Fl. dán.* 360.

Schœff. fung. 182.

Lycoperdon cortice exteriori revoluto stellato. *Hall.*
hist. 2174.

Lycoperdon stellatum calycē inverso. *Buxb. cent.* II:
45. t. 49. f. 3.

Geaster major et mediuss, umbilico-fimbriato. *Mich.*
gen. 220. t. 100. f. 1, 3.

Fungus pulverulentus crepus lupi dictus, coronatus
et inferne stellatus. *R. syn.* 27. t. 1. f. 1.

Anglis, star Puff-ball.

Habitat in pratis, pascuis et ad sepes. IX. X.

CRYPTOGAMIA FUNGI.

- fornica-* 7. LYCOPERDON volva quadrifida fornicata, capitulo glabro: ore obtuso ciliato.
Lycoperdon coronatum. Schœff. fung. t. 183.
Geaster volvæ radiis et operculo elevatis. D. Watson. Act. angl. No. 474. p. 234.
Geasteroides phragmites fuscum e volva erumpens quatuor radiis elevatum, curiosum. Battar. fung. 74. t. 39. f. 1—5.
Fungus pulverulentus turriculam fornicatam reserens. D. Rand. Blacks. spec. bot. 24. t. 2.
Anglis, turret Puff-ball.
Habitat in pratis et pascuis; at Bucklebury, *ten miles from Reading, Berkshire, and about Wickham near Bromley in Kent.* Blacks. spec. bot. prope Doncaster. D. Tofield. IX. X.

- Carpobo-* 8. LYCOPERDON volva multifida, fructu globoſo ex seminibus combinatis. Sp. pl. 1654.
Lycoperdon corticibus revolutis stellatis, globo projectili. Hall. hist. 2175.
Carpobolus. Mich. gen. 221. t. 101. f. 1, 2.
Anglis, projectile Puff-ball.
Habitat in lignis putridis, in sylvis et sepibus. VIII—X.

**** Parasitica, in farinam fatescentia.

- pisiformis.* 9. LYCOPERDON globosum scabrum, ore perforato. Syst. nat. 726.
Sphaeria solitaria, scutellis nudis atris obtuse conicis. Hall. hist. 2180.
Lichen crustaceus tartareus, arboribus adnascens, niger et veluti deustus, receptaculis florum rotundis per siccatem nonnihil adpressis et umbilicatis. Mich. gen. 104. t. 54. f. 5.
Anglis, pea Puff-ball.
Habitat in arborum truncis putrescentibus. IX—IX.

- nigrum.* 10 LYCOPERDON parasiticum sessile subrotundum nigrum farina concolori.
Sphaeria convexa carne nigra. Hall. hist. 2184.
Lichenoides

Lichenoides tuberculatum compressum nigrum lignis putridis adnascens. *R. syn.* 51. *Dill. musc.* 126. *t. 18. f. 7.*

Lichen-agaricus bullatus parvus, ex obscure nigricans, sub cute arborum exsiccatarum erumpens. *Mich. gen.* 105. *t. 54. ord.* 11. *f. 2.*

Anglis, black Puff-ball.

Habitat in lignis et truncis arborum putridis. IX—IV.

11. LYCOPERDON parasiticum sessile subrotundum variolosum. cortice exteriore fulvo deciduo, farina atra compacta. *Syst. nat.* III. 234.

Lycogala globosum grani pisii magnitudine, aeris recociti colore. *Mich. gen.* 216. *t. 95. f. 2.*

Lycogala sessile fulvum. *Hall. hist.* 2142.

Anglis, orange Puff-ball.

Habitat in lignis et truncis arborum putridis. IX—IV.

Obs. affinis Tremellae purpurae, sed major et caro in senescente atra est.

12. LYCOPERDON parasiticum globosum fuscum ferrina concolori.

Lycogala griseum majus. *Mich. gen.* 216. *t. 95. f. 1?*

Anglis, brown Puff-ball.

Habitat in arborum truncis putridis. IX—V.

13. LYCOPERDON cortice farinaque purpurea. Sp. epidendrum. pl. 1654.

Lycoperdon sanguineum sphæricum. *Buxb. cent.* V. 15. *t. 29. f. 2.*

Lycoperdon leve miniatum sphæricum. *Hall. hist.* 2173.

Anglis, purple Puff-ball.

Habitat in lignis putridis. IX—V.

14. LYCOPERDON aggregatum parasiticum ore mulcifido lacero; pulvere fulvo. Sp. pl. 1655.

Mucor fragiformis. *Schœff. fung.* t. 193.

Anglis, yellow Puff-ball.

CRYPTOGAMIA FUNGI.

Habitat in lignis et foliis semiputridis et hypnis. VIII
—V.

M U C O R. 1218.

Fungus vesiculis stipitatis.

* *Perennis.*

Embolus. 1. MUCOR seta nigra villo fusco. *Sp. pl.* 1655.

Embolus nigerrimus, villo albo adspersus. *Hall. hist.*

^{2137.}

Anglis, globe Mould.

Habitat in lignis putridis. I—XII.

** *Fugaces.*

Mucedo. 2. MUCOR stipitatus, capsula globosa. *Sp. pl.* 1655.

Fl. dan. 467. f. 4.

Mucor petiolatus cinereus. *Hall. hist.* 2147.

Mucor vulgaris, capitulo lucido per maturitatem ni-

gro, pediculo griseo. *Mich. gen.* 215. t. 95. f. 1.

Mucedo capitulo diaphano, deinde viridi et postremo

nigro. *Malp. veget.* t. 25. f. 108.

Fungus bombycinus murini coloris e simo felino te-

nuissimis capillis. *Pluk. alm.* 164. *R. syn.* 13.

Anglis, common Mould.

Habitat in variis putridis: pane, plantis, &c. I—XII.

leprosus. 3. MUCOR fetaceus, seminibus radicalibus. *Sp. pl.* 1656.

Aspergillus cespitosus densissimus, initio niveus deinde

aureus, seminibus ovatis. *Mich. gen.* 213. t. 91. f. 5.

Anglis, leprous Mould.

Habitat in cavernulis et cellulis fornicatis. IX—IV.

glaucus. 4. MUCOR stipitatus, capitulo subrotundo aggregato.

Sp. pl. 1656.

Aspergillus capitatus, capitulo glauco, seminibus ro-

tundis. *Mich. gen.* 212. t. 91. f. 1.

Anglis, glaucous Mould.

Habitat in Pomis, Melonibus aliisque corruptis. I—XII.

5. MUCOR

5. MUCOR stipatus, spicis digitatis. *Sp. pl.* 1656. *crustace-*
Botrytis alba, racemis sphæricis. *Hall. hist.* 2141. *us.*
Botrytis non ramosa alba, seminibus rotundis. *Mich.*
gen. 212. t. 91. f. 3.
Anglis, fingered Mould.
Habitat in cibis corruptis. I—XII.
6. MUCOR stipite ramoso, spicis ternatis. *Sp. pl.* 1656. *cæspito-*
Aspergillus albus tenissimus graminis dactyloidis facie, fus.
seminibus rotundis. *Mich. gen. 215. t. 91. f. 3.*
Aspergillus terrestris cespitosus et ramosus albus. *Mich.*
gen. 213. t. 91. f. 4.
Anglis, ternate Mould.
Habitat in putrescentibus in umbrosis. I—XII.
7. MUCOR albus capitulis fuscis sessilibus. *Sp. pl.* 1656. *Erysiphe.*
Anglis, sessile Mould.
Habitat in foliis putrescentibus. VIII. IX.
8. MUCOR unctuosus flavus. *Sp. pl.* 1656. *septicus.*
Mucor butyraceus. *Schœff. fung.* t. 194.
Mucor butyracea crocea, caulinis ramosis laciniatis.
Hall. hist. 2133.
Spongia fugax mollis flava et amœna in pulvere co-
riario nascentis. *A&T. paris.* 1727. p. 472.
Anglis, yellow Mould.
Habitat in lignis putridis, &c. IX. V.

APPENDIX.

- pauciflorus.* 2—3. **S**CIRPUS culmo striato nudo, spica terminata pauciflora valvis calycinis longiore. *Lightf. scot. 1078. Fl. dan. 167?*
Scirpus caule tereti, spica nuda pauciflora, glumis calycinis longiore. Hall. hist. 1335.
Scirpus minimus, spica breviore squamosa spadicea. Sch. agrest. 364. t. 7. f. 19.
Anglis, chocolate-head Club-rush.
Habitat in montosis. Upon Malghyrdy in Breadalbane. Mr. Stuart. Lightf. Scot. 4. VIII.
Obs. varietas scirpi cæspitosi videtur.
- glabra.* 4—5. **FESTUCA** panicula ramosa erecta coarctata, spiculis subulatis trifloris aristatis glabris. *Lightf. scot. 1085,*
Anglis, smooth Fescue-grass.
Habitat in pascuis. Found at Ardbigland in Galloway. Lightf. scot. 4. VII.
Obs. affinis festucæ cambricæ, an eadem.
- tuberosum.* 2. **SYMPHYTUM** foliis semidecurrentibus, summis oppositis. *Syst. nat. 147. Sp. pl. 195. Jacq. obs. III. 12. t. 63.*
Symphytum tuberosum. Ger. em. 806. majus. Clus. hist. 166.
Anglis, tuberous-rooted Comfrey.
Habitat in Scotia. Mr. Yalden found it sparingly opposite the new well at the water of Leith, but more plentifully

plentifully in Dr. Robertson's walks at North Marchiston. 4. VII.

IMPERATORIA. 359.

Fructus subrotundus, compressus, medio gibbus, mar-
gine cinctus. Petala inflexo-emarginata.

125. 1. IMPERATORIA. *B. pin.* 156. *Ger. em.* 1001. *estruthi-*
Sp. pl. 371. *Lightf. scot.* 169. *major. Hist. Ox. III.* *um.*
278. f. 9. t. 4. f. 1.

Anglis, Masterwort.

Habitat in *pascuis et ruderatis.* Upon the banks of the Clyde in several places, particularly about Ardencaple, and in the isle of Bute, near Mountstewart; on the banks of the Tweed, about half a mile above the old castle of Drummelzier. Dr. Burgess. Lightf. scot. 4. VI.

7. ALLIUM scapo nudo adæquante folia teretia sub
 - lato-filiformia. Syst. nat.* 140. *Sp. pl.* 432. *schoeno-*
 - Allium radice multiplici, foliis radicalibus teretibus,* *prasum.*
 - scapi longitudine, floribus umbellatis cylindricis.*
 - Hall. hist.* 1226.

Allium montanum capite rotundo. *Hist. Ox. III.*
386. f. 4. t. 14. f. 4.

Porrum se^ttivum juncifolium. *B. pin.* 72.

Schoenoprasum. *Dod. pempt.* 639. *Ger. em.* 176.

Anglis, chived or cives Garlick.

Habitat in *pratis et pascuis;* by Fast-castle on the borders of Berwickshire. Dr. Parsons. Fl. scot. in *comitatu Westmorlandico passim.* 4. VI.

- 9—10. JUNCUS folio subulato, gluma biflora termi
 - nali. Sp. pl.* 467. *Amœn. acad.* II. 266. *t. 3. f. 3.* *biglumis.*
 - Lightf. scot.* 1200?

Anglis, two-flowered Rush.

Habitat in *alpibus Scoticis.* Upon the top of Malghyrdy, and upon Ben-Teskerny, in Breadalbane. Mr. Stuart. Lightf. scot. 4. VIII.

14. JUNCUS

APPENDIX.

- spicatus.* 14. *JUNCUS* foliis planis, spica racemosa nutante.
Sp. pl. 469. *Fl. lapp.* 125. *t.* 10. *f.* 4. *Lightf. scot.* 187.
Anglis, spiked Rush.
Habitat in alpibus Scoticis. Upon Ben-na-scree, on the north side of Loch-Urn, on the western coast of Inverness-shire, &c. 4. VII.

DORONICUM. 959.

Recept. nudum. Pappus simplex. Calycis squamæ duplicis ordinis æquales, disco longiores. Sem. radii nuda pappoque destituta.

- pardalis-* *370. 1. *DORONICUM* foliis cordatis obtusis denticulatis, radicalibus petiolatis caulinis amplexicaulibus. *Sp. pl.* 1247. *Mill. ic.* 128. *Lightf. scot.* 485
Doronicum foliis cordatis obtusis, imis longis petiolatis, superioribus amplexicaulibus. *Hall. hist.* 88.
Doronicum maximum, foliis caulem amplexantibus.
B. pin. 185. *Garn. epit.* 823.
Doronicum maximum. Ger. em. 762.
Anglis, great Leopard's or Wolf's Bane.
Habitat in montosis. In several places in the Lowlands, as about Hoddam-castle in Annandale, &c. 4. V. VI.

- incurva.* 7—8. *CAREX* spica conica, e spiculis congestis androgynis sessilibus composita, involucro nullo, culmo incurvo. *Lightf. scot.* 544. *t.* 24.
Anglis, curved Carex.
Habitat in arenosis. It was discovered in deep loose sea-sand, at the mouth of the water of Naver, and near Shelberry, in Dunrofsness, in Shetland. Dr. Hope. Lightf. Scot. 4. VIII.

- tomentosa.* 17—18. *CAREX* spicis femineis subpedunculatis, capsulis subglobosis tomentosis. *Syst. nat.* 617. *Lightf. scot.* 553.
Carex spicis sessilibus approximatis teretibus folio insidentibus. *Hall. hist.* 1383.
Cyperoides sylvaticum angustifolium, spicis parvis tenuibus

APPENDIX.

651

nuibus spadiceo viridibus. Sch. agr. 425. t. 10.
f. 11.

Anglis, downy Carex.

Habitat in Scotia. It grows plentifully at the south end
of Air links. Dr. Hope. Lightf. scot. 24. VII.

22—23. CAREX spicis pendulis : mascula erecta, fe. *capillaris*.
mineis oblongis distichis capsulis nudis acuminatis.

Sp. pl. 1386? Fl. dan. 168 Lightf. scot. 557.

Carex spicis femininis raris pendulis, capsulis ovato-
conicis mucronatis. Hall. hist. 1394.

Cyperoides alpinum, spicis seminiferis pendulis : binis
in summo caule. Segu. veron. III. 83. t. 3. f. 1.

Anglis, capillary Carex.

Habitat in montosis. Upon the highland mountains, as on
Benteskerny, Craigneuliet and Malghyrdy, in Brea-
dalbane. Mr. Stuart. 24. VII. VIII.

12—13. SALIX foliis utrinque lanatis subrotundis *lanata*.

acutis. Sp. pl. 1446? Fl. lapp. 368. t. 8. f. x. et
t. 7. f. 7.

Salix foliis integerrimis ovato-lanceolatis, subtus se-
riceis, julis ovatis. Hall. hist. 1651.

Salix humiliis latifolia erecta. B. pin. 474. pr. 159.
R. hist. 1426.

Anglis, downy Willow.

Habitat in Scotia. In the valleys among the Highlands,
as at Finlarig, at the head of Loch-Tay, &c. Mr.
Stuart. Lightf. scot. 2. V.

12—13. SALIX foliis integerrimis hirsutis lanceolatis. *lapponum*.

Sp. pl. 1447. Fl. lapp. 366. t. 8. f. T. Lightf. scot.
604.

Anglis, woolly Willow.

Habitat in alpibus Scoticis. On Creg-chaillech, and
Malghyrdy, in Breadalbane, &c. Mr. Stuart.
Lightf. scot. 2. VI.

22—23. JUNGERMANNIA surculis teretibus sub- *concinna*-
compressis dense imbricatis compactis, foliis con- ta-

APPENDIX.

vexo-concavis glabris, floribus pedunculatis. *Lightf.*
scot. 787.

Anglis, braided Jungermannia.

Habitat in rupibus. Upon the rocks on the Highland
mountains frequent. *Lightf. scot.* IX. X.

Obs. an varietas Jungermanniæ julaceæ.

cæruleo-nigricans. 5—6. LICHEN leprosus cærulescens, tuberculis ni-
griantibus. *Lightf. scot.* 805.

Lichenoides granosum subglaucum, tuberculis planis
nigriantibus. *Dill. musc.* 544. s. 82. f. 2.

Anglis, bluish Lichen.

Habitat in rupibus. Upon the Highland rocks, but not
common, *Lightf. scot.* 24. I—XII.

cornuta. 8—9. ULVA subrigida cornuta terrestris. *Lightf. scot.*
972.

Tremella terrestris cornuta. *Dill. musc.* 52. t. 10.
f. 13.

Anglis, horned Laver.

Habitat in arenosis humidis; near Leith. Mr. Yalden.
Lightf. scot.

Obs. an varietas Jungermanniæ pinguidis.

montana. 7—8. ULVA plana coriacea terrestris sanguinea. *Lightf.*
scot. 973.

Anglis, mountain Laver.

Habitat in montosis. Amongst the grass and moss on the
sides of the mountains in the isle of Skye, and in Ross-
shire, on the side of a mountain called Cail-veg, be-
tween Loch-broom and Lead-beg, on the western
coast. *Lightf. scot.* VIII.

laciniata. 3—4. ULVA frondibus planis purpureis, apice dilata-
tis laciniatis undulatis. *Lightf. scot.* 974.

Anglis, laciniated Laver.

Habitat in littoribus marinis; upon the coast of Jura.
Lightf. scot. —VIII.

Obs. an varietas Ulvæ umbilicalis.

endiviae- 24—25. FUCUS fronde membranacea laciniata, la-
folius. cinii

APPENDIX.

653

ciniis dilatatis undulatis, marginibus crispis tuberculato-punctatis. *Lightf. scot.* 948. t. 32.

Anglis, endive-leaved Fucus.

Habitat in littoribus. In the Frith of Forth, and on the coast of Jona. VIII.

19—20. CONFerva filamentis ramosis geniculatis, *verticil-*
ramulis verticillatis furcatis incurvis. *Lightf. scot.* lata.

984.

Anglis, verticillate Conferva.

Habitat in rupibus et saxis submarinis. In the Frith of Forth, and many other places not unfrequent. *Lightf. scot.*

27—26. CONFerva filamentis geniculatis ramosissimis, ramis dichotomis apice forcipatis, septis ruberrimis, articulis diaphanis. *Lightf. scot.* 998.

Anglis, diaphanous Conferva.

Habitat in rupibus et saxis submarinis in littoribus Scotticis. *Lightf. scot.*

22—23. AGARICUS stipitatus, pileo conico viscido aurantio, lamellis luteis, stipite nudo. *Lightf. scot.* tius.

1025.

Agaricus conicus. *Schæff. fung.* t. 2.

Agaricus palustris sanguineo colore. *Dill. giss.* 180?

Amanita glutinosus flavus pileo umbonato. *Hall. hist.*

2420.

Anglis, orange Agaric.

Habitat in pascuis siccis, in Scotia. *Lightf. scot.* IX.

X.

10—11. LYCOPERDON nigrum, aggregatum parasiticum sphæricum, ore integro. *Lightf. scot.* 1069. tum.

t. 31.

Anglis, clustered Puff-ball.

Habitat in arborum truncis putridis. *Lightf. scot.* XI.

V.

PINGUICULA

APPENDIX.

PINGUICULA villosa. Lightf. scot. 77. t. 6. In Strathswardale in the Isle of Skye, in a bog just by Mr. McKennon's, of Coryattacha, and on the side of a mountain there called Benna-Caillick. Lightf. scot.

CIRCÆA alpina. At the foot of the mountains about Loch-Broom in Ross-shire. Under the rocks on the east-side of St. Mary's Loch, at the head of Yarrow-water, in the county of Peebles. Dr. Burgess. Lightf. scot. 77. 1115.

SCHŒNUS rufus.

Schœnus compressus varietas. Lightf. scot. t. 24.

AGROSTIS pumilla. Vide figura in fronte tom. II. Lightf. scot.

FESTUCA rubra. In the Isle of Canay plentifully. Lightf. scot. 102.

CORNUS herbacea. On the sides of the Highland mountains not unfrequent. Lightf. scot. 119.

ATROPA Belladonna. Jacq. austr. IV. 5. t. 309.

CAUCALIS arvensis.

Caucalis helvetica. Jacq. hort. III. 12. t. 16.

SISON Amomum. Jacq. hort. III. 13. t. 17.

SISON verticillatum. Lightf. scot. 1095. t. 35.

OENANTHE pimpinelloides. Jacq. austr. IV. 49. t. 395.

CARUM Carui. Jacq. austr. IV. 49. t. 393.

PIMPINELLA major. Jacq. austr. IV. 50. t. 396.

PIMPINELLA saxifraga. Jacq. austr. IV. 50. t. 395.

VIBURNUM Lantana. Jacq. austr. IV. 21. t. 341.

GALANTHUS nivalis. Jacq. austr. IV. 7. t. 313.

ORNITHOGALUM umbellatum. Jacq. austr. IV. 22. t. 340.

JUNCUS trifidus. Lightf. scot. 183. t. 9. Upon the summits of the Highland mountains to the south of Little-Loch-Broom, in Ross-shire, and on Ben-na-scree above Arnesdale, on the side of Loch-Urn, in Inverness-shire. Upon Ben-nevis in Lochabar. Lightf. scot. 184, 1120.

JUNCUS

A P P E N D I X.

655

JUNCUS triglumis. Upon Craigneulie near the head of Loch-Tay. Upon Ben-Lomond, and in mossy ground at the top of Carndearg, one of the lower heads of Ben-Squiert, in Glen-creran, in Upper-Lorn. Upon Malghyrdy and Malhan-tarmonach, on the east side of Craig-Chealleach, above Finlarig, and almost all the higher mountains in Breadalbane. Mr. Stuart. Lightf. scot. 186, 1120.

EPILOBIUM alpinum. Lightf. scot. 199. t. 10. On Ben-Lomond, on the mountains near Little-Loch-Broom, in Ross-shire; in great abundance near the top of all the high mountains in Breadalbane, and on the higher parts of Corry-Yaal in Glenco. Fl. scot. 199. 1122.

PYROLA minor. In the Isle of Skye, in a wood on the side of Ben-na-Grion, near M'Kennon's castle, in Strath, and in a wood called Ca-buck, facing the house of Mr. M'Kenzie of Dundonald near Little-Loch-Broom in Ross-shire, and in the woods about Loch-Rannoch in Perthshire. Fl. scot. 218.

PYROLA secunda. Near Little-Loch-Broom in Ross-shire, and about Loch-mari, and in the Birch-woods of Troschraig, Craig-loygt, and Coille-mhor, about Loch-Rannoch in Perthshire, where all the three species are found. Lightf. scot. 219.

ARBUTUS alpina. Lightf. scot. 215. t. 11. Upon the mountains south of Little-Loch-Broom, and those in the way between Loch-Broom and Loch-Mari abundantly, upon Ben-na-grion in Strath, in the isle of Skye, two miles above M'Kennon's castle. Lightf. scot.

SAXIFRAGA nivalis. Lightf. scot. 221. t. 12. Upon the east side of Craig-chailleach above Finlarig in Breadalbane; in the clefts of the higher rocks of Ben-chruipen and Malgreen; and in Glenlyon, among the rocks on the north side of Stuic-an-lochain. Mr. Stuart.

ARENARIA

APPENDIX.

ARENARIA laricifolia. Upon castle-hill near Forfar,
in the county of Angus. Fl. scot. 232.

CERASTIUM latifolium. Lightf. scot. 242. t. 10.
Upon Ben-Lomond and the mountains about Glenco.
Lightf. scot.

RESEDA lutea. Jacq. aust'. IV. 28. t. 353.

EUPHORBIA platyphyllos. Jacq. aust'. IV. 40. t. 376.
POTENTILLA verna. Upon the top of Craig-chail-

leach, near Finlarig in Breadalbane. Fl. scot. 270.

CLEMATIS Vitalba. Jacq. aust'. IV. 4 t.. 308.

THALICTRUM alpinum. Lightf. scot. 286. t. 13.

STACHYS germanica. Jacq. aust'. IV. 10. t. 319.

BARTSIA viscosa. Lightf. scot. 321. t. 14.

HESPERIS inodora. Jacq. aust'. IV. 25. t. 347.

CARDAMINE petræa. Lightf. scot. 347. t. 15. Upon
Craig-chailleach in Breadalbane; upon Baikeval in
the island of Rum, and upon Ben-na-caillich in the
isle of Skye. Lightf. scot.

BRASSICA monensis.

Sisymbrium monense. Lightf. scot. 353. t. 15.

SISYMBRIUM Irio. Jacq. aust'. IV. 11. t. 322.

GERANIUM pyrenaicum. In mountainous pastures and
waste places near Edinburgh. Dr. Parsons. Lightf.
scot. 367.

OROBUS sylvaticus. Lightf. scot. 390. t. 16.

HEDYSARUM onobrychis. Jacq. aust'. IV. 27. t. 352.

ASTRAGALUS arenarius. Upon the hills in the King's
Park at Edinburgh; upon the sands of Musselburgh,
upon the hill of Moncreis, near Perth; and in dry
ground near York-Cascade at the seat of the Duke of
Argyle, at Blair. Light. scot. 400.

ASTRAGALUS uralensis. Light. scot. 401. t. 17.

Upon Carn-Dearg one of the lower heads of Ben-
Squilert, a high mountain in Clen-creran, in Up-
per Lorn. Mr. Stuart.

HIERACIUM alpinum. Light. scot. 434. t. 18. Upon
Ben-mor, and Craig-vore just above Loch-Laraig-

ans

an-Lochain in Breadalbane; upon Corry-yaal and near the top of Bedannam-bian, the highest mountain in Glenco. On the high mountains to the south of Little-Loch-Broom, in Ross-shire, also on Ben-na-groin, two miles above M^c Kinnon's Castle in Strath in the isle of Skye. Lightf. scot.

SERRATULA alpina. Lightf. scot. 448. t. 19 Among the rocks on the eastern side of Mal-ghyrdy, and near the top of Ben-Cruipen in Breadalbane; on the north side of Stuic-an-lochain in Glen-lyon; upon Ben-achalader and Ben-dotha, in Glenorchy; and upon Malmore in Glenco, in Upper-Lorn; upon a Brae a mile from Talisker in the isle of Skye. Lightf. scot.

GNAPHALIUM supinum.

Gnaphalium alpinum. Lightf. scot. 470. t. 20.

ORCHIS militaris β.

Orchis fusca. Jacq. austr. IV. 4. t. 307.

SATYRIUM hircinum. Jacq. austr. IV. 35. t. 367.

SATYRIUM albidum. In the dry mountainous pastures not very uncommon. Lightf. scot. 520.

SATYRIUM repens. Jacq. austr. 36. t. 369. Lightf. scot. 550. t. 22. In a birch wood called Ca-bue or Yellow-hill, facing the house of Mr. M^c Kenzie of Dundonald, two miles from the head of Little-Loch-Broom on the western coast of Ross-shire. Lightf. scot.

OPHRYS corallorrhiza. Lightf. scot. 523. t. 23: In a moist hanging-wood, on the south-side near the head of Little-Loch-Broom, Ross-shire. Lightf. scot.

CAREX patula.

Carex pauciflora, spica simplici androgyna; floribus femineis subternis remotiusculis patentibus, masculo unico terminali. Lightf. scot. 543. t. 6. In a boggy soil about half-way up the mountain of Goat-field, in the isle of Arran, near the place where peat is dug, in the ascent from Brodwick-castle. Lightf. scot.

APPENDIX.

CAREX atrata. Upon the Highland mountains frequent, as upon Benteskerny, Mal-ghyrdy, Mal-nan-tarmonach, &c. in Breadalbane. Lightf. scot. 555.

CAREX inflata. In bogs and marshes as about Finlarig, in Breadalbane. Mr. Stuart. Lightf. scot. 567.

BETULA nana. Lightf. scot. 575. t. 25. This grows in great abundance in Corry-yeallin, on the west side of a hill directly north from Miggerny, in Glenlyon, in Breadalbane; on some of the moors of Loch-glass, in Ross-shire. Lightf.

SALIX myrsinitis. Upon the Highland mountains, as upon Ben-Achulader, in Glenurchy, Mal-ghyrdy, in Breadalbane; and on Craig-vore, a high projecting rock on the west side of Loch-laraig-an-lochain, a small lake between Loch-tay, and Glen-lyon. Mr. Stuart. Lightf. scot. 599.

SALIX reticulata. It grows upon several of the Highland mountains, in a talky soil, as upon Creg-chaillech, Mal-ghyrdy, and Mal-grea, mountains in Breadalbane, &c. Lightf. scot. 601.

ACROSTICUM septentrionale. This grows out of the cliffs of the rocks about Arthur's Seat, at Edinburgh. Lightf. scot. 656.

ISOETES lacustris. In some small locks near the foot of the Paps of Jura, and in others above Great-Breeze-Hill, near Talisker, in the isle of Skye. Lightf. scot. 684.

LYCOPodium annotinum. In rough stony places on the sides of the Highland mountains. Light. scot. 689.

MNIUM trichomanes.

Jungermannia frondibus simpliciter pinnatis, foliolis ovatis planis integerimis, caule apice femineo. Lightf. scot. 769.

MNIUM fissum.

Junger-

APPENDIX.

659

Jungermannia frondibus simpliciter pinnatis, foliolis bifidis, caule apice femineo. Lightf. scot. 770.

MNIUM *Jungermannia*.

Jungermannia purpurea pinnis subtus auriculatis, foliolis subrotundis convexo-concavis amplexicaulis. Lightf. scot. 778.

BRYUM *laterale*.

Bryum antheris erectis lateralibus, foliis setaceis subsecundis. Light. scot. 727. *In shady woods by the sides of the Highland mountains, and by the sides of rivulets in the Fir-forests.* Lightf. scot.

TARGIONIA hypophylla. Upon rocks covered with little earth, near the Tarbet of Cantire on the confines of Knapdale. Lightf. scot. 792.

LICHEN *flavo-rubescens*.

Lichen aurantiacus, leprōsus albido-cinereus, scutellis aurantiacis. Lightf. scot. 810.

LICHEN *crassus*.

Lichen cartilagineus, imbricatus, foliolis crenatis pallidis cartilagineis, scutellis planis fulvis. Lightf. scot. 815.

LICHEN *cærulescens*.

Lichen plumbeus, imbricatus, foliis obtuse lobatis plumbeis, subtus cæruleo-spongiosus, scutellis ex rubro-ferrugineis. Lightf. scot. 826. t. 26. *On the trunks of trees about Drumlanrig frequent, and in the deep clough called Barntimpenn Linn, in the parish of Kirkpatrick, about five miles from Moffat.* Dr. Burgess. Lightf. scot.

LICHEN *fuscus*.

Lichen pullus, imbricatus, foliolis perangustis implexis laciniatis fuscis, superne convexis, apicibus demissis, scutellis pullis. Lightf. scot. 824.

LICHEN *tremelloides*.

Lichen foliaceus membranaceus pellucidus: foliorum laciniis

APPENDIX.

laciiniis margine fimbriato-crispatis. Lightf. scot. 842.

LICHEN Burgesii. Lightf. scot. 827. t. 26. *Upon the trunks of hazel and birch-trees, on the banks of a rivulet called Duff-Kinnel, in the parish of Kirkpatrick, and in a shady wood called Mollin-Linn, in the parish of Johnstone, in Dumfrieshire.* Lightf. scot.

LICHEN islandicus γ.

Lichen hispidus, fruticulosus solidus ramosissimus, ramis divaricatis subcompressis glabris spinulosis, angulis obtusis. Lightf. scot. 883.

LICHEN laciniatus.

Lichen glomuliferis, coriaceus repens laciniatus glaber, laciniarum axillis orbicularibus, scutellis fulvis et glomulis atroviridibus. Lightf. scot. 853.

LICHEN herbaceus.

Lichen læte-virens, coriaceus repens lobatus obtusus glaber læte-virens, subtus-avenius, scutellis fulvis. Lightf. scot. 852.

LICHEN verrucosus.

Lichen scrobiculatus, coriaceus repens lobatus obtusus, superne scrobiculatus verrucosus, inferne villasus tumoribus albidis. Lightf. scot. 850.

LICHEN croceus. *Upon a rock near the top of Benteskerney, in Breadalbane.* Mr. Stuart. Lightf. scot. 856.

LICHEN polyrrhizos.

Lichen torrefactus, umbilicatus pullus, supra rugosus subtus-reticulato-fibrosus, verrucis nigris crispis. Light. scot. 862.

LICHEN velleus.

Lichen polyrhizus. Lin. secundum. Lightf. in Fl. scot. 864.

LICHEN proboscideus.

LICHEN *crinitus*, *umbilicatus* *margine crinitus*, *peltis nigris concinnatis subpedunculatis*. *Lightf. scot.* 860. *On Goatfield in the isle of Arran, Ben-Nevis in Lochaber, and on the mountains of Breadalbane.* *Lightf. scot.*

LICHEN *radiatus*.

Lichen corniculatus, *fruticulosus solidus ramosus*, *ramis declinatis compressis dichotomis*, *scutellis plano-convexis fungiformibus*. *Lightf. scot. 885.* *On Creg-chaillech, in Breadalbane, on Ben-Lomond, on the mountains in Ross-shire, and in the isle of Skye.* *Lightf. scot.*

LICHEN *scaber*.

Lichen exilis, *filamentosus ramosissimus cæspitosus*, *filamentis capillaceis implexis opacis scabris*. *Lightf. scot. 895.*

TREMELLA *auricula*.

Peziza concava rugosa auriformis. *Lightf. scot. 1055.*

TREMELLA *turbanata*.

Peziza polymorpha, *turbanata*, *primum cava, deinde plana seu convexa, externe rugosa*. *Lightf. scot. 1055.*

ULVA *lactuca* γ.

Ulva crispa, *tenera crispa terrestris*. *Lightf. scot. 972.*

ULVA *dichotoma*.

Ulva fronde plana dichotoma reticulata viridis. *Lightf. scot. 975. t. 34.*

ULVA *purpurascens*.

Fucus verticillatus, *frondibus tubulosis subarticulatis ramosis setaceo-ligulatis*. *Lightf. scot. 962. t. 31.* *Upon the rocks of the little isles of Jura*. *Lightf. scot.*

APPENDIX.

ULVA articulata &c et.

- α Fucus fronde articulata ramosissima, articulis ovato-cylindricis tubulosis, ramis oppositis et verticillatis, *Lightf. scot.* 959.
- β Fucus frondibus cæspitosis repentibus ramosis articulatis, articulis planis, *Lightf. scot.* 961.

FUCUS ovalis.

Fucus vermicularis, caule filiformi ramoso, ramis dichotomis, foliis oblongis teretibus petiolatis, *Lightf. scot.* 958.

FUCUS esculentus. *Lightf. scot.* 938. t. 28.

FUCUS bulbosus.

Fucus polyschides, fronde palmata, foliolis ensiformibus, radice cava, stirpe plana marginibus plicatis, *Lightf. scot.* 936.

FUCUS palmatus. *Lightf. scot.* 933. t. 27.

FUCUS crispus.

Fucus prolifer, frondibus membranaceis dichotomis catenato-proliferis, apicibus dilatatis bifidis. *Lightf. scot.* 949. t. 30.

FUCUS herbaceus.

Fucus ligulatus, fronde membranacea linearis bipinnato-ligulata, ligulis ensiformibus ciliatis. *Lightf. scot.* 946. t. 29. *In the Frith of Forth about Newhaven.* *Lightf. scot.*

FUCUS pumilus.

Fucus pygmæus fronde cartilaginea compressa apice dilatata palmata, fructificationibus terminalibus subrotundis apice perforatis. *Lightf. scot.* 964. t. 32.

FUCUS corneus.

Fucus nereideus, fronde cartilaginea filiformi-compressa ramosa, ramulis setaceo-pinnatis. *Lightf. scot.* 656. *In the Frith of Forth.*

FUCUS

FUCUS verrucosus.

Fucus flagelliformis, fronde filiformi tereti ramosa, ramis alternis subdistichis longissimis uniformibus. *Lightf. scot.* 928.

FUCUS purpurascens.

Fucus tuberculatus, fronde filiformi tereti ramosissima; ramis alternis ramulis confertis tuberculatis, tuberculis subrotundis distantibus innatis. *Lightf. scot.* 927.

CONFerva violacea.

Conferva confragosa, filamentis mucosis simplicibus æqualibus violaceis. *Lightf. scot.* 976. Upon the rocks in the water-falls on the mountain of Goatfield in the isle of Arran. *Lightf. scot.*

CONFerva ciliata.

Conferva ciliata, filamentis geniculatis dichotomis, apice forcipatis, articulis verticillatim ciliatis. *Lightf. scot.* 998.

CONFerva imbricata.

Conferva equisetifolia, geniculata ramosa, ramis subulatis, ramulis dichotomis verticillato-imbricatis. *Lightf. scot.* 948.

CONFerva coccinea.

Conferva filamentis geniculatis ramosissimis compressis, ramis supradecompositis alternatim pinnatis, fructificationibus ovatis dioicis. *Lightf. scot.* 997.

BYSSUS rubra.

Byssus parpurea, capillacea, perennis. *Light. scot.* 1000. Upon the base of Abbot Mackinnon's tomb, in the ruined abbey at J. Columb-kill. *Lightf. scot.*

AGARICUS pratensis.

Agaricus coriaceus, stipitatus pileo et lamellis sordide albidis coriaceis. *Lightf. scot.* 1021.

APPENDIX.

AGARICUS *procerus*.

Agaricus annulatus, stipitatus, pileo campanulato sub-fusco squamato, lamellis albidis, stipite bulboso annulato. *Lightf. scot.* 1025.

AGARICUS *striatus*.

Agaricus plicatus striatus pileo ovato striato plicato cinereo, vertice lævi, stipite annulato fistulato basi subulato. *Lightf. scot.* 1023.

AGARICUS *lateralis*.

Agaricus semipetiolatus, subacaulis lævis albidus, lamellis simplicibus pallide fuscis. *Lightf. scot.* 1031.

BOLETUS *coriaceus*.

Boletus tenax, acaulis suberosus imbricatus lævis, poris minutis teretibus. *Lightf. scot.* 1031.

BOLETUS *squamulosus*.

Boletus cellulofus, acaulis squamosus subflavus poris amplissimis, quadrangularibus albidis. *Lightf. scot.* 1032.

BOLETUS *villosus*.

Boletus spongiosus, acaulis villosus fuscus, poris albidis ciliatis angularibus. *Lightf. scot.* 1033.

BOLETUS *hepaticus*.

Boletus hepaticus, acaulis lævis carnosus sanguineus mollis, obscure lobatus. *Lightf. scot.* 1034.

PEZIZA *striata*.

Peziza striata campanulata lentifera extus hirsuta. intus striata. *Lightf. scot.* 1049.

PEZIZA *lævis*.

Peziza crucibuliformis lentifera glabra sublutea. *Lightf. scot.* 1049.

CLAVARIA *pistillaris*. γ. δ.

γ. *Clavaria vermiculata*, lumbriciformis ochroleuca.

Lightf. scot. 1057.

δ *Clavaria herculeana*, clavæformis simplicissima crassissima luteo-fusca rugosa, vertice depresso. *Lightf. scot.* 1056.

LYCOPERDON *nigrum*.

Sphæria tuberculosa, atra convexa carne nigra.

Lightf. scot. 1113.

F I N I S.

I N D E X

NOMINUM LATINORUM.

Generica nomina Romana Charactere trăduntur:

Cursivis Literis Synonyma.

Primus numerus Genus designat; cæteri Synonyma.

A.	Page		Page
<i>Abies</i>	—	424	Ægilops — 441, 52
<i>Abrotanum</i>	—	358	Ægopodium — 129
<i>Absinthium</i>	—	358, 359	Æthusa — 123
<i>Acanthium</i>	—	354	Agaricus 609, 626, 633, 639, 653, 663, 664
<i>Acer</i>	—	445	Agaricum — 563, 625
<i>Acetosa</i>	—	156	Agrifolium — 446
<i>Acetosella</i>	—	156	Agrimonia — 206
<i>Achillea</i>	—	374, 375	Agrostemma — 198
<i>Acinos</i>	—	261, 263	Agrostis — 30—32, 654
<i>Aconitum</i>	—	228	Aira — — 33, 37
<i>Acorus</i>	—	147, 14	Ajuga — — 248
<i>Acrosticum</i>	450, 451, 457, 658		Aizoon — 198, 197
<i>Actaea</i>	—	228	Alcea — 207, 208
<i>Adiantum</i>	460, 461, 450, 454, 456, 459		Alchemilla — 71, 72, 178
<i>Adonis</i>	—	239	Alcionum — — 570
<i>Adoxa</i>	—	172	Alectrolophis — — 267
			Alectrolophoides — — 610
			Alectrolophus

668 INDEX NOMINUM LATINORUM.

	Page		Page
<i>Alectrolophus</i>	268	<i>Aphanes</i>	—
<i>Alga</i> 395, 396, 568—570, 577, 580, 581, 589, 593, 602	—		
<i>Alisma</i>	158, 159		
<i>Alliaria</i>	—		
<i>Allium</i>	138—140, 649		
<i>Alni</i>	—		
<i>Alnus</i>	—		
<i>Aloe</i>	—		
<i>Alopecurus</i>	—		
<i>Alsinanthemos</i>	—		
<i>Alsinastrum</i>	—		
<i>Alfine</i> 131, 6, 7, 60, 63, 72, 73, 138, 147, 160, 186, 190—195, 200—203, 255, 256, 276	—		
<i>Alsinella</i>	—		
<i>Althaea</i>	—		
<i>Alyssum</i>	—		
<i>Amanita</i>	—		
<i>Amara dulcis</i>	—		
<i>Amaranthus</i>	—		
<i>Ambrosia</i>	—		
<i>Amomum</i>	—		
<i>Ampeloprasum</i>	—		
<i>Anacampseros</i>	—		
<i>Anagallis</i>	—		
<i>Anblatum</i>	—		
<i>Anchusa</i>	—		
<i>Andromeda</i>	—		
<i>Androsænum</i>	—		
<i>Anemone</i>	—		
<i>Anethum</i>	—		
<i>Angelica</i>	—		
<i>Anonis</i>	—		
<i>Anthemis</i>	—		
<i>Anthericum</i>	—		
<i>Anthoceros</i>	—		
<i>Anthoxanthon</i>	—		
<i>Anthoxanthum</i>	—		
<i>Anthyllis</i>	—		
<i>Antirrhinum</i>	—		
<i>Aparine</i>	—		
<i>Aphaca</i>	—		
	315		
<i>Aphanes</i>	—		
<i>Apium</i>	—		
<i>Aponogiton</i>	—		
<i>Aquifolium</i>	—		
<i>Aquilegia</i>	—		
<i>Arabis</i>	—		
<i>Aracus</i>	—		
<i>Arbutus</i>	—		
<i>Arctium</i>	—		
<i>Aretia</i>	—		
<i>Arenaria</i>	—		
<i>Argemone</i>	—		
<i>Argentina</i>	—		
<i>Argyrocome</i>	—		
<i>Aria</i>	—		
<i>Aristolochia</i>	—		
<i>Armeria</i>	—		
<i>Armerius</i>	—		
<i>Artemisia</i>	—		
<i>Arum</i>	—		
<i>Arundo</i>	—		
<i>Asarum</i>	—		
<i>Ascyron</i>	—		
<i>Asparagus</i>	—		
<i>Aspergillus</i>	—		
<i>Asperugo</i>	—		
<i>Asperula</i>	—		
<i>Asphodelus</i>	—		
<i>Asplenium</i>	—		
<i>Aster</i>	—		
<i>Astragalus</i>	—		
<i>Athamanta</i>	—		
<i>Athanasia</i>	—		
<i>Atriplex</i>	—		
<i>Atropa</i>	—		
<i>Avena</i> 51—53, 30, 31, 34—36, 440	—		
<i>Auricula flammea</i>	—		
<i> muris</i>	—		
<i>Azalea</i>	—		
	88		
	B.		
<i>Bacharis</i>	—		
	363		
<i>Bella-</i>	—		

INDEX NOMINUM LATINORUM. 669

	Page		Page		
<i>Belladonna</i>	—	93	<i>Bupleurum</i>	—	111
<i>Ballota</i>	—	260	<i>Bursa pastoris</i>	278, 283, 285, 292	
<i>Balsamine</i>	—	381	<i>Butomus</i>	—	174
<i>Barba capri</i>	—	218	<i>Buxus</i>	—	416, 417
— <i>caprina</i>	—	640	<i>Byssus</i>	604—609, 591, 592, 663	
<i>Barbarea</i>	—	286			
<i>Bardana</i>	—	348, 418			
<i>Bartsia</i>	—	267, 268, 656			
<i>Becabunga</i>	—	5			
<i>Behen album</i>	—	186			
<i>Bellis</i>	—	370, 371			
<i>Berberis</i>	—	137			
<i>Beta</i>	—	108			
<i>Betonica</i>	—	258, 275			
<i>Betula</i>	—	416, 658			
<i>Betulus</i>	—	422			
<i>Bidens</i>	—	355, 356			
<i>Bifolium</i>	—	388, 389			
<i>Bistorta</i>	—	168, 169			
<i>Blackstonia</i>	—	168			
<i>Blasia</i>	—	518, 519			
<i>Blattaria</i>	—	91			
<i>Blitum</i>	—	104—108, 418			
<i>Boletus</i>	—	624—630, 632, 664			
<i>Bonus henricus</i>	—	104			
<i>Botrytis</i>	—	647			
<i>Brassica</i>	—	289—291, 293, 299, 656			
<i>Briza</i>	—	38			
<i>Bromus</i>	—	48, 51, 44			
<i>Bryonia</i>	—	437, 438, 433			
<i>Bryum</i>	—	474—493, 468—472, 659			
<i>Buccaferra</i>	—	77			
<i>Buffonia</i>	—	72			
<i>Buglossa</i>	—	82			
<i>Buglossum</i>	—	80—82, 343			
<i>Bugula</i>	—	248, 249			
<i>Bulbocastanum</i>	—	120			
<i>Bulbocodium</i>	—	144			
<i>Bulbosa alpina</i>	—	144			
<i>Bulla</i>	—	626			
<i>Bunias</i>	—	298			
<i>Bunium</i>	—	122			
<i>Buphtalmum</i>	—	373, 374			
			C.		
			<i>Cakile</i>	—	298
			<i>Calamagrostis</i>	—	54
			<i>Calamaria</i>	—	462
			<i>Calamintha</i>	253, 254, 263, 264	
			<i>Calamus aromaticus</i>	—	147
			<i>Calceolus</i>	—	392
			<i>Calcitrapa</i>	—	376, 377
			<i>Callitricha</i>	—	439, 440
			<i>Caltha</i>	—	245
			<i>Camelina</i>	—	287
			<i>Cameraria</i>	—	60
			<i>Campanula</i>	—	94—97
			<i>Cannabina</i>	—	355, 356
			<i>Cannabis</i>	—	257
			<i>Capillus veneris</i>	—	460
			<i>Caprifolium</i>	—	94
			<i>Cardamine</i>	293—295, 280, 656	
			<i>Cardiaca</i>	—	258, 261
			<i>Carduus</i>	350—354, 61, 349, 376,	
					377
			<i>Carduo-cirsium</i>	—	349
			<i>Carex</i>	400—411, 650, 651, 657,	
					658
			<i>Carlina</i>	—	355
			<i>Carpinus</i>	—	423
			<i>Carpobolus</i>	—	644
			<i>Carum</i>	—	126, 120, 654
			<i>Caryophyllata</i>	—	226
			<i>Caryophyllus</i>	73, 132, 183—185	
				187, 197, 199, 201, 202	
			<i>Cassida</i>	—	265
			<i>Cassutha</i>	—	104
			<i>Catananche</i>	—	315
			<i>Castanea</i>	—	422
			<i>Cataria</i>	—	249
			<i>Caucalis</i>	112—114, 124, 654	
					Cauda

670 INDEX NOMINUM LATINORUM.

	Page		Page		
<i>Cauda equina</i>	—	2	<i>Cicutaria</i>	—	123—125
<i>— muris</i>	—	136	<i>Cineraria</i>	—	369, 370
<i>Centaureo</i>	—	375—377	<i>Circæa</i>	—	10, 11, 654
<i>Centaurium</i>	—	102, 103, 168	<i>Cirsium</i>	349, 350, 352—354	
<i>Centunculus</i>	—	63	<i>Cistus</i>	—	232—234
<i>Cerastium</i>	200—202,	656	<i>Clathroidastrum</i>	—	631
<i>Cerasus</i>	—	213	<i>Clathroides</i>	—	630, 632
<i>Ceratophyllum</i>	—	419	<i>Clathrus</i>	—	630—632
<i>Cerefolium</i>	—	124, 125	<i>Clavaria</i>	—	638—640, 665
<i>Cerinthe</i>	—	81	<i>Clematis</i>	—	238, 656, 91
<i>Ceryomices</i>	—	627	<i>Clinopodium</i>	261, 263, 267	
<i>Ceterach</i>	—	452	<i>Clymenum</i>	—	320, 332
<i>Chærophyllo</i>	—	72	<i>Cnicus</i>	—	355
<i>Chærophylum</i>	—	124, 125	<i>Cochlearia</i>	—	283, 284
<i>Chamæclema</i>	—	254	<i>Colchicum</i>	—	157
<i>Chamæcistus</i>	88, 181, 233,	234	<i>Comarum</i>	—	227
<i>Chamædrys</i>	6, 226,	247, 248	<i>Conferva</i>	591—605, 572, 653, 663	
<i>Chamæflix</i>	—	453	<i>Conium</i>	—	114, 115
<i>Chamægenista</i>	—	311	<i>Consiligo</i>	—	245
<i>Chamælea</i>	—	167	<i>Consolida</i>	—	235, 248, 249
<i>Chamælinum</i>	—	134	<i>Convallaria</i>	—	146, 147
<i>Chamæmelum</i>	—	372, 374	<i>Convolvulus</i>	—	88, 89, 171
<i>Chamæmorus</i>	—	221	<i>Conyza</i>	362, 363, 356, 366, 369,	
<i>Chamænerion</i>	—	161—163	370		
<i>Chamæorchis</i>	—	390	<i>Corallina</i>	566, 569, 598, 599	
<i>Chamæpericlymenum</i>	—	71	<i>Coralloides</i>	286, 527, 328, 539,	
<i>Chamæpitys</i>	—	248	551—359, 631		
<i>Chamæpeuce</i>	—	464	<i>Corallorrhiza</i>	—	388
<i>Chamæitea</i>	—	429	<i>Coreopsis</i>	—	356
<i>Chamærubus</i>	—	221	<i>Coriandrum</i>	—	123
<i>Chamæskænus</i>	—	20	<i>Cornu cervinum</i>	—	65
<i>Chàra</i>	—	297, 298	<i>Cornus</i>	—	70, 71, 654
<i>Chelidonium</i>	—	228, 229, 244	<i>Coronopus</i>	—	64, 65, 284
<i>Cheiranthus</i>	—	287, 288	<i>Corrigiola</i>	—	100
<i>Chenopodium</i>	—	104—108	<i>Corylus</i>	—	423
<i>Cherleria</i>	—	193	<i>Cotyledon</i>	—	194, 110
<i>Chlora</i>	—	168	<i>Cracca</i>	—	318, 321
<i>Chondrilla</i>	—	338	<i>Crambe</i>	—	299, 298
<i>Christophoriana</i>	—	228	<i>Crassula</i>	—	73, 195
<i>Chrysanthemum</i>	—	370	<i>Cratægus</i>	—	214
<i>Chrysosplenium</i>	—	178, 179, 268	<i>Crætægonon</i>	—	268, 270
<i>Cichoreum</i>	—	348, 341, 342	<i>Crepis</i>	—	339, 341, 342
<i>Cicuta</i>	—	122, 123, 115	<i>Crepitus lupi</i>	—	642
				<i>Crithmum</i>	

INDEX NOMINUM LATINORUM. 671

	Page
<i>Crithmum</i>	— 117, 112, 369
<i>Crista galli</i>	— 268
<i>Crocus</i>	— 13
<i>Cruciata</i>	— 441
<i>Cucubalus</i>	— 185—187
<i>Cuminum</i>	— 126
<i>Cuscuta</i>	— 104
<i>Cyanus</i>	— 375, 376
<i>Cyathoides</i>	— 633, 634
<i>Cyathus</i>	— 633, 634
<i>Cymbalaria</i>	— 271
<i>Cynocrambe</i>	— 435
<i>Cynoglossum</i>	— 80, 81
<i>Cynosorchis</i>	— 383
<i>Cynosurus</i>	— 59
<i>Cyperoides</i>	400, 401, 407, 409, 410, 412
<i>Cyperus</i>	17. 14—17, 21, 403
<i>Cyperella</i>	— 16
<i>Cypripedium</i>	— 392
 D.	
<i>Dactylis</i>	— 43
<i>Damasonium</i>	— 158, 159
<i>Daphne</i>	— 167
<i>Darea</i>	— 461
<i>Datura</i>	— 92
<i>Daucus</i>	114, 115, 120, 128
<i>Delphinium</i>	— 235
<i>Dens-leonis</i>	— 239
<i>Dentaria</i>	— 285, 286, 388
<i>Dianthus</i>	— 183—185
<i>Diapensia</i>	— 111
<i>Digitalis</i>	— 275, 276
<i>Digitaria</i>	— 25
<i>Dipsacus</i>	— 61
<i>Doronicum</i>	— 650
<i>Dortmanna</i>	— 377
<i>Draba</i>	— 278, 279, 378
<i>Dracunculus</i>	— 375
<i>Drosera</i>	— 155
<i>Dryas</i>	— 226

<i>Dryopteris</i>	—	Page 457, 460
E.		
<i>Ebulus</i>	—	130
<i>Echium</i>	—	82, 83, 78, 81
<i>Echinophora</i>	—	112, 113
<i>Echinus</i>	—	565, 628, 629
<i>Elatine</i>	—	173, 271, 272
<i>Elleborine</i>	—	392
<i>Eleoselinum</i>	—	129
<i>Elichrysum</i>	—	359
<i>Elymus</i>	—	56—58
<i>Embolus</i>	—	646
<i>Elvela</i>	—	563, 632, 636, 637
<i>Empetrum</i>	—	430, 431
<i>Epilobium</i>	—	161—163, 655
<i>Epipactis</i>		386—390, 393
<i>Equisetum</i>	447—449,	2, 173, 398
<i>Erica</i>	—	165—167 177, 431
<i>Erigeron</i>	—	363, 365
<i>Eriocaulon</i>	—	415
<i>Eriophorum</i>	—	21, 22
<i>Eruca</i>	137, 278, 286,	290, 291, 296, 298
<i>Ervum</i>	—	320, 321, 315
<i>Eryngium</i>	—	109, 110
<i>Erysino similis</i>	—	292
<i>Erysimum</i>	—	286, 287, 172
<i>Esula</i>	—	208
<i>Euonymus</i>	—	98
<i>Eupatorium</i>	—	356, 206, 355
<i>Euphorbia</i>	—	207—211, 656
<i>Euphrasia</i>	—	269, 267, 268
F		
<i>Fagus</i>	—	422
<i>Fagopyrum</i>	—	171, 172
<i>Festuca</i>	44—52, 33,	55, 648, 654
<i>Ferrum equinum</i>	—	321, 322
<i>Ficaria</i>	—	244
		<i>Filago</i>

INDEX NOMINUM LATINORUM. 673

674 INDEX NOMINUM LATINORUM.

	Page		Page
<i>Lepidium</i>	279, 280, 282	<i>Lythrum</i>	— 205, 206
<i>Leucoium</i>	— 140, 287, 378		
<i>Leucanthemum</i>	— 371		
<i>Lichen</i>	523—562, 517, 519— 522, 564, 565, 605, 608, 609, 644, 652, 659, —661		
<i>Lichen-agaricus</i>	— 639, 641		
<i>Lichenastrum</i>	473, 509—519, 522, 523		
<i>Lichenoides</i>	523—562, 565, 566, 645, 652		
<i>Ligusticum</i>	— 117, 118		
<i>Ligustrum</i>	— 3		
<i>Ligula marina</i>	— 587		
<i>Lillum convallium</i>	— 146		
<i>Limnopeuce</i>	— 2		
<i>Limodorum</i>	— 387		
<i>Limonium</i>	— 132, 133		
<i>Limosella</i>	— 276		
<i>Linchia</i>	— 564		
<i>Lithophytoides</i>	— 639		
<i>Lithospermum</i>	— 78, 79		
<i>Littorella</i>	— 415		
<i>Lobelia</i>	— 377, 378		
<i>Lolium</i>	— 55		
<i>Lonchitis</i>	— 450, 456		
<i>Lonicera</i>	— 95		
<i>Lotus</i>	— 329		
<i>Loto affinis</i>	— 313		
<i>Lunaria</i>	— 279, 449, 520		
<i>Lupulus</i>	— 433		
<i>Luteola</i>	— 207		
<i>Lychnis</i>	198, 199, 137, 183, 186—189, 193		
<i>Lychnoides</i>	— 192, 198		
<i>Lycogala</i>	— 565, 645		
<i>Lycoperdon</i>	— 641—645, 665		
<i>Lycoperdastrum</i>	— 645		
<i>Lycopodium</i>	462—464, 658		
<i>Lycopsis</i>	— 82, 83		
<i>Lycopus</i>	— 9		
<i>Lysimachia</i>	85—87, 161—163, 206, 265		
		M.	
<i>Malva</i>	—	306—308	
<i>Malus</i>	—	216, 217	
<i>Marchantia</i>	—	519—521	
<i>Majorana</i>	—	262	
<i>Marsilea</i>	—	517, 518	
<i>Marrubium</i>	—	260, 261, 9	
<i>Matricaria</i>	—	371—374	
<i>Medica</i>	—	330, 331	
<i>Medicago</i>	—	330, 331	
<i>Melampyrum</i>	—	269, 270	
<i>Melica</i>	—	37	
<i>Melilotus</i>	—	324	
<i>Melissa</i>	—	263, 264	
<i>Melissophyllum</i>	—	264	
<i>Melittis</i>	—	264	
<i>Mell-muscarum</i>	—	624	
<i>Mentha</i>	—	249—254	
<i>Menthastrum</i>	—	251	
<i>Menyanthes</i>	—	85	
<i>Mercurialis</i>	—	435, 381	
<i>Mezerion</i>	—	167	
<i>Mespilus</i>	—	217, 214, 215	
<i>Meum</i>	—	116	
<i>Milium</i>	—	29, 28	
<i>Millefolium</i>	9, 76, 85, 375, 419, 420		
<i>Millegrana</i>	—	135	
<i>Militaris</i>	—	236	
<i>Mnium</i>	472, 473, 469, 470, 475, 482, 486, 487, 489—492, 519, 658, 659		
<i>Mollugo</i>	—	60, 67, 68, 70	
<i>Molle</i>	—	139	
<i>Monotropa</i>	—	175	
<i>Montia</i>	—	60	
<i>Morsus diaboli</i>	—	62	
<i>ranc</i>	—	436	
<i>Moscatellina</i>	—	171	
<i>Mucedo</i>	—	646	
<i>Mucor</i>	646, 647, 631, 632, 645		
		<i>Muscipula</i>	

INDEX NOMINUM LATINORUM. 675

	Page		Page
<i>Muscipula</i>	—	186, 199	
<i>Muscus</i>	463—478, 481—484, 486—509, 511—515, 540, 542, 551, 554, 556, 557, 559 —562, 567, 568, 587, 593, 596, 603, 604		
<i>Muscoides</i>	—	512	
<i>Musco-fungus</i>	531, 537, 538, 541 545, 553, 555—559, 560, 561		
<i>Myagro affinis</i>	—	287	
<i>Myagrum</i>	—	277	
<i>Myosotis</i>	78, 190, 200—202		
<i>Myosurus</i>	—	136	
<i>Myrica</i>	—	432	
<i>Myriophyllum</i>	—	419, 420	
<i>Myrrhis</i>	—	124, 125	
<i>Myrtus</i>	—	432	
N.			
<i>Napus</i>	—	290	
<i>Narcissus</i>	—	141	
<i>Nardus</i>	—	22, 32	
<i>Narthesium</i>	—	145	
<i>Nasturtium</i>	278, 280—284, 293 —297		
<i>Nasmythia</i>	—	414, 415	
<i>Nepeta</i>	—	249	
<i>Nidus avis</i>	—	386, 388	
<i>Noli me tangere</i>	—	381	
<i>Nostoc</i>	—	363—365	
<i>Nucula terrestris</i>	—	122	
<i>Nummularia</i>	—	87	
<i>Nux vesicaria</i>	—	131	
<i>Nymphaea</i>	—	334, 85, 436	
O.			
<i>Ocymum</i>	—	263	
<i>Ocymoides</i>	—	— 187	
<i>Odontites</i>	—	268	
<i>Oenanthe</i>	—	121, 654	
<i>Omphalomyces</i>	—	611, 613	
P.			
<i>Padus</i>	—	—	313
<i>Palma christi</i>	—	—	385
<i>Panicum</i>	—	24, 25, 29	
<i>Panax coloni</i>	—	—	259
<i>Papaver</i>	230, 231, 186, 229		
<i>Paralyssis</i>	—	—	84
<i>Parietaria</i>	—	—	442
<i>Paris</i>	—	—	172
<i>Parnassia</i>	—	—	131, 132
<i>Paronichia</i>	101, 182, 278, 279, —292		
<i>Pastinaca</i>	—	—	125, 119
<i>Pecten veneris</i>	—	—	123
<i>Pedicularis</i>	—	270, 271, 268	
<i>Peloria</i>	—	—	273
<i>Pentaphylloides</i>	136, 222, 223, 227		
Y y 2			<i>Pentaphyllum</i>

676 INDEX NOMINUM LATINORUM.

	Page		Page
<i>Pentaphyllum</i>	— 71, 223—225	<i>Polygonatum</i>	— 140, 147
<i>Pentapteris</i>	— 419, 420	<i>Polygonum</i>	168—172, 72, 74, 100, 108, 135, 137, 178
<i>Pentapterophyllum</i>	— 420	<i>Polypodium</i>	— 455—460
<i>Peplis</i>	— 147, 207, 208	<i>Polyporus</i>	— 625—628
<i>Peplus</i>	— — 208	<i>Polytrichon</i>	— 489
<i>Percepier</i>	— — 72	<i>Polytrichum</i>	— 469—472
<i>Perfoliata</i>	— — 111, 290	<i>Populago</i>	— 245
<i>Periclymenum</i>	— — 71, 94	<i>Populus</i>	— 433, 434
<i>Perficaria</i>	— 169, 170, 381	<i>Portulaca</i>	— 60, 147, 442
<i>Pervinia</i>	— — 91	<i>Porrum</i>	— 139, 649
<i>Pes anserinus</i>	— 105	<i>Potamogiton</i>	74—77, 169, 395, 397
<i>Petasites</i>	— — 364	<i>Potentilla</i>	222—225, 656
<i>Peucedanum</i>	— 116, 128	<i>Poterium</i>	— — 421
<i>Peziza</i>	633—637, 563, 661, 669	<i>Prenanthes</i>	— — 338
<i>Phalangium</i>	— 143—145	<i>Primula</i>	— — 83, 84
<i>Phalaris</i>	— 23, 26	<i>Prunella</i>	— — 264
<i>Phallus</i>	— 629, 630	<i>Prunus</i>	— — 212, 213
<i>Phœnix</i>	— 441	<i>Pseudo-asphodelus</i>	— 145, 157
<i>Phascum</i>	466, 467, 469	<i>— cyperus</i>	— 14, 21, 410
<i>Phellandrium</i>	— — 122	<i>— iris</i>	— 14
<i>Phleum</i>	— 25, 26, 23, 28	<i>— linarea</i>	— 101
<i>Phyllitis</i>	— — 452	<i>— melanthium</i>	— 198
<i>Phytuma</i>	— — 97	<i>— Narcissus</i>	— 141, 144
<i>Picea</i>	— — 424	<i>— Orchis</i>	— 387, 390
<i>Picris</i>	— 342, 341	<i>Ptarmica</i>	— — 375
<i>Pilularia</i>	— — 462	<i>Pteris</i>	— — 451
<i>Pilosella</i>	— 343—345	<i>Pulegium</i>	— — 254
<i>Pimpinella</i>	127, 128, 65, 421, 654	<i>Pulmonaria</i>	80, 81, 344, 345
<i>Pinguicula</i>	— 8, 654	<i>Pulsatilla</i>	— — 237
<i>Pinus</i>	— 423, 424, 590	<i>Pyrola</i>	175, 176, 160, 387, 655
<i>Piperitis</i>	— — 279	<i>Pyrus</i>	— — 216
<i>Pistacea</i>	— — 132	<i>Pyraster</i>	— — 216
<i>Pisum</i>	— 313, 314		
<i>Plantaginella</i>	— — 276		
<i>Plantago</i>	63—65, 158, 159, 415		
<i>Pneumonanthe</i>	— — 102		
<i>Poa</i>	38—43, 31—34, 46, 47		
<i>Podagraria</i>	— — 129		
<i>Polemonium</i>	— — 89		
<i>Polycarpon</i>	— — 60		
<i>Polygalon</i>	— — 322		

Q.

<i>Quercus</i>	— — — 421
<i>— marina</i>	— 577, 584
<i>Quinquefolium</i>	223, 225, 227

R.

<i>Radiola</i>	— — — 134
<i>Radicula</i>	

INDEX NOMINUM LATINORUM. 677

	Page		Page
<i>Radicula</i>	—	—	296
<i>Radix cava</i>	—	—	172
— <i>idæa</i>	—	—	177
<i>Randalia</i>	—	—	415
<i>Ranunculus</i>	239—244,	110, 172,	
	236, 240		
<i>Rapa</i>	—	—	289
<i>Rapum</i>	—	—	289
<i>Raphanus</i>	—	—	284, 296
<i>Raphanistrum</i>	—	—	298
<i>Rapistrum</i>	—	—	297
<i>Raponticum</i>	—	—	297
<i>Rapunculus</i>	—	95, 97, 377, 378	
<i>Rapuntium</i>	—	95, 97,	378
<i>Regina prati</i>	—	—	218
<i>Reseda</i>	—	207, 656	
<i>Rhamnoides</i>	—	—	432
<i>Rhamnus</i>	—	98, 432	
<i>Rhinanthus</i>	—	—	268
<i>Rhodia</i>	—	—	434
<i>Rhodiola</i>	—	—	434
<i>Rhus</i>	—	—	432
<i>Ribes</i>	—	99, 100	
<i>Riccia</i>	—	521, 522	
<i>Rorella</i>	—	—	135
<i>Ros solis</i>	—	—	135
<i>Rosa</i>	—	218, 220	
<i>Rosmarinum</i>	—	—	177
<i>Rubia</i>	—	65—68	
<i>Rubeola</i>	—	66, 67, 69	
<i>Rubus</i>	—	—	220, 221
<i>Rumex</i>	—	153—156	
<i>Ruppia</i>	—	—	77
<i>Ruscus</i>	—	—	437
<i>Ruta muraria</i>	—	—	454
S			
<i>Sagina</i>	—	73, 193	
<i>Sagitta</i>	—	—	420
<i>Sagittaria</i>	—	—	420
<i>Salicaria</i>	—	205, 206	
<i>Sálicornia</i>	—	—	1
Y y 3			
<i>Salix</i>	—	425—430, 651, 658	
<i>Salsola</i>	—	—	107, 108
<i>Salvia</i>	—	—	10, 248
<i>Sambucus</i>	—	—	130
<i>Samolus</i>	—	—	94
<i>Sanguisorba</i>	—	—	65, 421
<i>Sanicula</i>	—	110, 111, 8,	179
<i>Santolina</i>	—	—	356
<i>Saponaria</i>	—	—	183
<i>Satyrium</i>	—	386, 387, 388,	657
<i>Saxifraga</i>	—	179—183, 73, 116,	
	118, 178, 203,	655	
<i>Scabiosa</i>	—	62, 376, 377	
<i>Scandix</i>	—	123, 124, 113	
<i>Schœnus</i>	—	14—16, 654	
<i>Schœnoprasum</i>	—	—	649
<i>Scheuchzeria</i>	—	—	175
<i>Scilla</i>	—	—	142
<i>Scirpus</i>	—	17—21, 648	
<i>Scirpoides</i>	—	—	20
<i>Sclaria</i>	—	—	10
<i>Scleranthus</i>	—	—	178
<i>Scoparium</i>	—	—	310
<i>Scordium</i>	—	—	247
<i>Scorodonia</i>	—	—	248
<i>Scorodoprasum</i>	—	—	138
<i>Scorpiurus</i>	—	—	78
<i>Scrophularia</i>	—	—	274, 275
<i>Scutellaria</i>	—	—	265
<i>Sedum</i>	195—197, 168,	179—	
		183, 193	
<i>Sedula</i>	—	—	181
<i>Slaginoides</i>	—	—	463
<i>Selago</i>	—	—	464
<i>Selinum</i>	—	—	115, 120
<i>Sempervivum</i>	—	—	211, 196
<i>Senecio</i>	364—367,	339, 370	
<i>Serapias</i>	—	393, 386,	637
<i>Serpillum</i>	—	—	262, 263
<i>Serratula</i>	—	—	349, 657
<i>Sesamoides</i>	—	—	186
<i>Seseli</i>	—	112, 115—118,	128
<i>Sesleria</i>	—	—	59
			Sherardia

678 INDEX NOMINUM LATINORUM.

	Page		Pag		
<i>Sherardia</i>	—	66	<i>Stramonium</i>	—	92
<i>Sibbaldia</i>	—	136	<i>Stratiotes</i>	—	236, 436
<i>Sibthorpia</i>	—	276	<i>Stratiocarpis</i>	—	450
<i>Sideritis</i>	—	256, 260	<i>Subularia</i>	—	277, 462
<i>Silene</i>	—	187—189	<i>Succisa</i>	—	62
<i>Silibum</i>	—	353	<i>Suillus</i>	—	627
<i>Sinapi</i>	—	297	<i>Swertia</i>	—	101, 102
<i>Sinapis</i>	—	297, 298	<i>Symphytum</i>	—	81, 646
<i>Sison</i>	—	119, 120, 654	<i>Sycomorus</i>	—	445
<i>Sisymbrium</i>	295—297, 252, 299,	291, 656			
<i>Sium</i>	—	118—120, 122, 295			
<i>Smilax</i>	—	88, 89	<i>Tamus</i>	—	433
<i>Smyrnium</i>	—	126, 118	<i>Tanacetum</i>	—	357
<i>Solanum</i>	—	22, 93, 172	<i>Taraxacum</i>	—	339
<i>Solanifolia</i>	—	10, 11	<i>Targionia</i>	—	519
<i>Solidago</i>	—	367	<i>Taxus</i>	—	436, 437
<i>Soldanella</i>	—	89	<i>Telephium</i>	—	195
<i>Sonchus</i>	—	336—338	<i>Testiculus</i>	—	392
<i>Soncho-affinis</i>	—	348	<i>Teucrium</i>	—	247, 248, 227
<i>Sophia</i>	—	297	<i>Thalictrum</i>	—	238, 239, 656
<i>Sorbus</i>	—	215, 216, 214	<i>Thapsus</i>	—	90
<i>Sparganium</i>	—	400—401	<i>Theesium</i>	—	101
<i>Spartium</i>	—	310	<i>Thlaspi</i>	—	281—285, 278
<i>Spartum</i>	—	22, 29, 43, 54, 56	<i>Thymus</i>	—	262, 263
<i>Spatula</i>	—	14	<i>Thyselinum</i>	—	115
<i>Sergula</i>	202, 203, 193, 276		<i>Tilia</i>	—	231, 232
<i>Sphagnum</i>	—	465—468, 474	<i>Tillæa</i>	—	73
<i>Sphæria</i>	565, 639, 641, 644, 665		<i>Tithymalus</i>	—	207, 211
<i>Sphondylium</i>	—	117	<i>Tofieldia</i>	—	157
<i>Spina alba</i>	—	354	<i>Tordylium</i>	—	112, 114
<i>— acida</i>	—	137	<i>Tomentilla</i>	—	225, 71
<i>— Appendix</i>	—	215	<i>Trachelium</i>	—	96
<i>Spiræa</i>	—	217	<i>Tragopogon</i>	—	335
<i>Splachnum</i>	—	468, 469	<i>Tragofelimum</i>	—	127
<i>Spongia</i>	—	570, 584, 647	<i>Tragorchis</i>	—	383, 386
<i>Stachys</i>	—	259, 260, 656	<i>Tragum</i>	—	107
<i>Stæbelina</i>	—	267	<i>Tremella</i>	562—569, 537, 572, 661	
<i>Staphyodendron</i>	—	131	<i>Tribulus</i>	—	75
<i>Staphylea</i>	—	131	<i>Trichia</i>	—	630, 632
<i>Statyce</i>	—	132, 133	<i>Trichomanes</i>	—	461, 452, 453
<i>Stellaria</i>	189, 190, 439, 440		<i>Trientalis</i>	—	166
<i>Stipa</i>	—	29	<i>Trifolium</i>	323—331, 85, 198	
				<i>Triglochin</i>	

INDEX NOMINUM LATINORUM. 679

	Page		Page
<i>Triglochin</i>	— 152, 461	<i>Virga aurea</i>	— 366—368
<i>Triorchis</i>	— 389	<i>— pastoris</i>	— 61
<i>Tripolium</i>	— 368	<i>Viscago</i>	— 186—189
<i>Triticum</i>	— 57, 58	<i>Viscum</i>	— 431
<i>Trixago</i>	— 260	<i>Vitis idaea</i>	— 163—165, 177
<i>Trollius</i>	— 244	<i>Volubilis</i>	— 171
<i>Tuber</i>	— 641	<i>Vulneraria</i>	— 313
<i>Tubera</i>	— 641	<i>Vulvaria</i>	— 107
<i>Tunica</i>	— 183, 185		
<i>Turritis</i>	— 291—293		
<i>Tussilago</i>	— 364		
<i>Typha</i>	— 400		
		U.	
		<i>Ulex</i>	— 312
		<i>Ulmaria</i>	— 218
		<i>Ulmus</i>	— 109
		<i>Ulva</i>	566—572, 518, 522, 564, 581, 600, 652, 661, 662
		<i>Umbelicus veneris</i>	— 194
		<i>Urtica</i>	— 417, 418, 257
		<i>Usnea</i>	— 559—562, 570
		<i>Utricularia</i>	— 8, 9
		<i>Uva ursi</i>	— 177
		X.	
		<i>Xanthium</i>	— — 418
		<i>Xyris</i>	— — 14
		Z.	
		<i>Zannichellia</i>	— — 397
		<i>Zostera</i>	— — 395

INDEX

I N D E X

NOMINUM ANGLICANORUM.

A.	Page		Page		
A CORUS	—	147	Arrowhead	—	420
Acrostichum	450, 451		Arfsmart	—	170, 171
Adders tongue	—	449	Afarabacca	—	205
Adonis	—	239	Ash-tree	—	446
Agaric	— 610, 624, 653		— mountain	—	215
Agrimony	—	206	— weed	—	129
— hemp	—	355	Asphodel	—	145, 157
Alder	—	416	Astragalus	—	323
— berry-bearing	—	98	Avens	—	226
Alexanders	—	126	Azalea	—	88
Alkanet	—	80		B.	
— bastard	—	79	Ballote	—	260
Alheal	—	259	Balm, bastard	—	264
— seed	—	135	Balsam	—	381
Althæa	—	306	Bane-berries	—	228
Amaranth	—	419	Barberry	—	137
Angelica	—	118	Barley-gras	—	56
Anthericum	—	144	Bartsia	—	267, 268
Anthoceros	—	523	Basil	—	261, 263
Anemony	—	236, 237	Bawd-money	—	116
Apple-tree	—	217	Beam-tree	—	214
— thorny	—	92	Bears-foot	—	245
Arbutus	—	177	— berry	—	177
Archangel	—	255, 256	Bedstraw		

INDEX NOMINUM ANGLICANORUM.

681

	Page		Page		
Bedstraw	—	67—70	Bugle	—	248, 249
Beech	—	422	Bugloss	—	82
Beet	—	108	cowslip	—	81
Bell-flower	—	95—97	vipers	—	83
Beet, sea	—	579	Bullace-tree	—	212
Betony, paul's	—	5	Bunias	—	298
water	—	275	Burdock	—	348
wood	—	258	lesser	—	418
Bidens	—	355, 356	Burnet	—	421
Bill-berries	—	164, 165	Bur-reed	—	400
Bind-weed	—	88, 89	Butchers-broom	—	437
black	—	171	Butomus	—	174
Birch-tree	—	416	Butter-bur	—	367
Birds-cherry	—	213	cups	—	241
eye	—	84	wort	—	8
foot	—	321	witches	—	564
trefoil	—	329	Byssus	—	605—609
nest	—	114, 175, 386, 388			
Birthwort	—	394			
Bistort	—	168, 169			
Bitter-sweet	—	93	C.		
Bladder-nut	—	131	Cabbage	—	289—291
Blasia	—	519	Calamint	—	263, 264
Blea-berry	—	164	Calamus	—	147
Blue-bottle	—	375	Caltrops	—	75
Bog-rush	—	15, 16	Cammock	—	312
Boletus	—	624, 628	Camomile	—	373, 374
Borage	—	82	Campion	—	186, 187, 199
Box-tree	—	417	Candy-tuft	—	288
Bramble	—	220, 221	Canterbury-bells	—	96
Brakes	—	451	Carex	400—414, 650,	651
Briar, sweet	—	218	Carline	—	355
Brooklime	—	5	Carrot	—	114
Broom	—	311	Caraways	—	126
base	—	311	Cat-mint	—	249
rape	—	266	tail	—	400
Briony, black	—	433	foot	—	360
white	—	438	Catchfly	—	186, 189, 199
Bryum	—	474—493	Caucalis	—	113, 114
Buck-bean	—	85	Celandine	—	229
thorn	—	98	lesser	—	244
wheat	—	172	Centaury	—	375—377
Bufonia	—	72	Centunculus	—	63
			Cerastium	—	200—202
			Champignon		

682 INDEX NOMINUM ANGLICANORUM.

	Page		Page
Champignon	616	Coriander	123
Charlock	298	Cornel-tree	70, 71
Chara	398	Corn-sallet	13
Cheese-renning	69	Cow-parsnep	117
Cherleria	193	— quakes	38
Cherry-tree	213	— weed	125
Chervil	125	— wheat	269, 270
Christopher, herb	228	Cowslips	84
Chestnut-tree	422	Crab-tree	216
Chickweed	131	Crake-berries	165
— germander	7	Crepis	339
— mouse-ear	200, 201	Cress, bastard	281, 283
— water	60	— bitter	294
— winter-green	161	— rocket	278
Chives	649	— rock	285
Cicely	124	— swines	284
Cicuta	122	— wall	292, 293
Cineraria	370	— water	296, 297
Cinquefoil	222—225	— winter	286
— marsh	227	Crocus	13
Cistus	232—234	Crosswort	441
Cives	649	Crowfoot	240—243
Clary	10	— berries	431
Clathrus	630—632	— filk	592
Clavaria	638—640	Cuckow-flower	199, 294
Cleavers	70	— pint	395
Climber	238	Cudweed	359—362
Clot-bur	348	Currants	99
Cloud-berry	221	Cyperus, bastard	21
Clover	325, 326, 331	— millet	21
Cockle	198	— sweet	17
Cock's comb	268		
— head	322	D.	
Codlings and Cream	162	Daffodil	141
Colchicum	155	— chequered	144
Colewort	299	Daisy	370, 371
Coltsfoot	364	Dandelion	339
Columbine	235, 236	Danewort	130
Comarum	227	Daphne	167
Comfrey	81, 648	Datura	92
Conferva	592—604, 653	Devil's bit	62, 342
Conyza	363	Dewberry	220
Coral-wort	286		
		Diers.	

INDEX NOMINUM ANGLICANORUM. 683

	Page		Page		
Diers-weed	—	220	Fluellin	—	272
Dittander	—	279	Fontinalis	—	467, 468
Dock	—	153—156	Foxgloves	—	276
Dodder	—	104	Frankenia	—	137, 138
Dogberry	—	70	Fritillary	—	144
Dropwort	—	217	Frog-bit	—	436
water	—	121	Fucus	—	573—592, 653
Dryas	—	227	Fumitory	—	309, 310
Duck's meat	—	399, 340	Furze	—	312
Dwale	—	93			
			G.		
			Gale	—	432
Echinophora	—	112	Galeobdolon	—	258
Elder	—	130	Galingale	—	17
water	—	130	Garlick	—	138—140 649
Elecampane	—	368, 369	Gentian	—	102, 103
Elm	—	109	Gatter-tree	—	70
Epilobium	—	161—163	Germander	6, 247, 248	
Erigeron	—	363	Gillyflower, sea	—	130
Eryngo	—	109, 110	Gladiole	—	578
Eyebright	—	269	Gladwyn	—	14
Eupatorium	—	356	Glasswort	—	1
			Globe-flower	—	244
			Goats-beard	—	335
			Goldilocks	—	242
Fennel	—	126	Gold of pleasure	—	277
hogs	—	116	Golden-rod	—	367, 368
Fern, female	—	451	Goose-corn	—	144
flowering	—	450	foot	—	104—107
male	—	458	grass	—	69, 70, 82
stone	—	450	tongue	—	375
Feverfew	—	372, 373	Gout-weed	—	129
Figwort	—	275	Grass, arrow-headed	—	152
Finkle	—	126	Barley	—	56, 57
Fir	—	423, 424	Dent	—	30—32
Fiveleaved-graſſ	—	225	Brome	—	49—51
Flax	—	133—135	Canary	—	23, 24
Fleabane	—	369	Cat's tail	—	25
Flixweed	—	297	Cock's foot	—	43, 44
Flos adonis	—	239	Cotton	—	22
Flower-de luce	—	14	Couch	—	58
gentle	—	419	Darnel	—	55
				Grass,	

684 INDEX NOMINUM ANGLICANORUM.

	Page		Page
Grafs, Dog's	— 58	Hafel, wych	— 109
— tail	— 59	Hawke-weed	— 343—346
Feather	— 29	Haw-tree	— 214, 215
Fescue	44—48, 648	Heath	— 165, 167
Fiveleaved	— 225	— berried	— 431
Fox-tail	— 27—29	— sea	— 137, 138
Hard	— 441	Hedge-hyslop	— 206
Hair	— 33—37	Hedypnois	— 341, 342
Knot	— 171	Hellebore	— 245, 246
Lime	— 56	Helleborine	— 392, 393
Marle	— 326	Hellweed	— 104
Mat	— 22	Helvella	— 633
Meadow	38—43	Hemlock	— 115
Melic	— 37	— water	— 123
Millet	— 30	Henbane	— 92
Oat	— 52, 53	Henbit	— 7, 256
Panic	— 24, 25	Hep-tree	— 220
Parnassus	— 132	Herb-christopher	— 228
Pepper	— 462	— bennet	— 226
Quaking	— 38	— Gerard	— 129
Quick	— 58	— Paris	— 172
Reed	— 54	— Robert	— 305
Soft	— 440, 441	High-taper	— 90
Spring	— 11	Holly-tree	— 446
Scurvy	— 283, 284	— Knee	— 437
Spiked	— 153	— Sea	— 109
Vernal	— 11	Honey-wort	— 120
Wheat	— 58	Honey-suckle	— 94
Wrack	— 396	Horehound, black	— 260
Green-weed	— 311, 312	— water	— 9
Greymill	— 79	— white	— 261
Gromwell	— 79	Hornbeam	— 423
Ground-ivy	— 254	Hornwort	— 419
— pine	— 248	Horse-beach	— 425
Groundsel	— 365, 367	— radish	— 284
H.		— shoe-vetch	— 322
Hardbeam	— 423	— tail	— 447—449
Harebells	— 142	Houseleek	— 211
Hares-ear	— 111	Hounds-tongue	— 80
— tail	— 22	Hyacinth	— 142
Harts-tongue	— 452	Hydnum	— 628, 629
Hafel-nut-tree	— 423	Hypnum	— 493—509
		Hyoseris	— 346
		Hypochæris	— 347
			I. Ille-

INDEX NOMINUM ANGLICANORUM. 685

	I.	Page		Page
Illecebrum	—	100	Lobelia	—
Jafione	—	378	Locker-gowlons	—
Iris	—	14	Loose-strife	—
Jungermannia	509—518,	652	86, 87, 206	244
Juniper	—	436	Louse-wort	—
Ivy	—	100	Lovage	—
— ground	—	254	Lucern	—
	K.		Lungwort, French	—
Kidney-wort	—	179	golden	—
— vetch	—	313	tree	—
Knapweed	—	376	Lycopus	—
Knawell	—	178		9.
Knot-grass	—	168, 172		
	L.		M.	
Ladies-bedstraw	—	67—70	Madder	—
— finger	—	313	bastard	—
— mantle	—	71	field	—
— slipper	—	393	Maiden-hair	—
— smock	—	293—295	black	—
— traces	—	389	golden	—
Lambs lettuce	—	13	white	—
Lark-spur	—	235	Maithes	—
Lathyrus	—	315—317	Mallow	—
Laver	—	566—572, 652	Maple	306—308
Laurel-spurge	—	167	Marchantia	—
Lavatera	—	306	Marjoram	520, 521
Lavender, sea	—	132, 133	Marle-grass	—
Leopards-bane	—	650	Mare's tail	—
Lettuce	—	337, 338	Marygold, corn	—
— lambs	—	13	marsh	370.
Lichen	—	523—562, 652	Masterwort	—
Lilly-of-the-Valley	—	146, 147	Mayweed	—
— may	—	146	Meadow-sweet	—
— water	—	234	Mealy-tree	—
Lime-tree	—	232	Medick	—
Linden-tree	—	232	Medlar	330, 331
Lions-tail	—	261	Melilot	—
Liquorish	—	323	Mercury	—
Littorella	—	415	Meu	104, 435
Livelong	—	195	Mezerion	—
Liver-wort	—	523, 547	Milfoil, water	—
			hooded	167
			Milkwort	—
			Mint	—
			nep	250—254.
			Miseltoe	—
				249
				431
				Mnium

686 INDEX NOMINUM ANGLICANORUM.

	Page		Page	
Mnium	—	472—474	Nettle, dead	— 255, 256
Money-wort	—	87	——— hemp	— 256, 257
——— Cornish	—	276	——— hedge	— 259
Monotropa	—	175	——— roman	— 417
Moonwort	—	449	Nightshade	— 93
Moorballs	—	604	——— deadly	— 93
Morel	—	629, 630	——— enchanter's	10, 11
Morocco	—	239	Nipplewort	— 348
Moscatel	—	172	Non-such	— 331
Moss, bog	—	465	Nut, earth	— 122
——— cup	—	555	——— bladder	— 131
——— Club	—	463, 464	——— Kipper	— 122
——— tree	—	566	——— Hawke	— 122
——— water	—	567, 568	——— Pig	— 122
Mother-wort	—	261		
Mould	—	646, 647	O.	
Mouse-ear	—	343	Oak-tree	— 421
——— scorpion-grass	—	78	——— sea	— 577
——— tail	—	136	Oneberry	— 172
Mudwort	—	276	Onopordum	— 354
Mugwort	—	276	Ophrys	— 388—392
Mullein	—	90, 91	Orache	— 442—444
Mushroom	—	610	——— stinking	— 107
Muscovy	—	301	Orchis	— 382—387
Mustard	—	298	Orobus	— 314
——— hedge	—	286, 287, 297	Orpine	— 195
——— Mithridate	—	281	Osier	— 430
——— tower	—	291, 292	Osmund-royal	— 450
——— treacle	—	282	Ox-eye	— 371, 374
Myagrum	—	277	——— slips	— 84
Myrtle	—	432	Oyster-green	— 567
	N.			
	P.			
Nape	—	290	Pagils	— 84
Narcissus	—	141	Panick-grass	— 24, 25
Narthesium	—	145	Parsley	— 129
Nasmythia	—	415	——— fools	— 123
Navew	—	290	——— stone	— 120
Navel-wort	—	194	Parflep, cows	— 117
Needle, shepherd's	—	124	——— water	— 119
Nep-mint	—	249	——— wild	— 125
Nettle,	—	417, 418	Pearlwort	

INDEX NOMINUM ANGLICANORUM. 687

	Page		Page		
Pasque-flower	—	237	Prickmadam	—	195.
Pear-tree	—	216	— wood	—	70, 99
Pearlwort	—	73	Prim	—	3
Peas, everlasting	—	237	Primrose	—	84
— heath	—	314	Privet	—	3
— sea	—	314	Prunus	—	212, 213
Pellitory, wall	—	442	Puff-balls	641—645,	653
Penny-royal	—	254	Purflain-water	—	147
Pennywort, marsh	—	110	— sea	—	442
— wall	—	194	Pursley-piert	—	72
Peplis	—	147			
Pepper-grafs	—	462			
— wall	—	196			
— wort	—	279, 280			
Periwinkle	—	91	Quicken-tree	—	215
Perficaria	—	169, 171	Quick in the hand	—	381
Peziza	—	934—637	Quil-wort	—	462
Phascum	—	466, 467			
Pheasant's eye	—	239			
Picris	—	343	R.		
Pilcorn	—	52	Radish, horse	—	284
Pilewort	—	244	— water	—	297
Pimpernel, male	—	87	Ragwort	—	366, 370
— water	—	94	Rampions	—	95
— yellow	—	86	Ramsons	—	140
Pimpinel	—	127, 128	Rape	—	290
Pink	—	184, 185, 199	Raspberry	—	220
Pipperidge-bush	—	127	Rattle, yellow	—	268
Pitch-tree	—	424	Reed	—	54
Plantain	—	63—65	— mace	—	400
— water	—	158, 159	Refeda	—	207
Plumb	—	212	Rest-harrow	—	312, 313
Plowman spikenard	—	363	Rhamnus	—	98
Polycarpon	—	60	Ribwort	—	64
Polymonium	—	89	Riccia	—	521, 522
Polypody	—	455—460	Rocket, base	—	207
Polytrichum	—	470—472	— sea	—	298
Pondweed	—	74—77	— wild	—	288, 291, 296
Poplar	—	434	Rose-tree	—	218—220
Poppy	—	230—231	— wort	—	434
— horned	—	229	Rue, meadow	—	238, 239
— spatling	—	186	Rupture-wort	—	108, 109
Prenanthes	—	339	Ruppia	—	77
			Rush	148—152, 649, 650	
					Rush,

688 INDEX NOMINUM ANGLICANORUM:

	Page	Page
Rush, bog	—	15, 16
— bull	—	19, 20
— club	—	17—21, 648
— flowering	—	174
— hares-tail	—	22
S.		
Sage	—	10
— wood	—	248
Saffron	—	13, 157
Saintfoin	—	322
St. John's wort	332—334	
— Peter's wort	—	334
Sallow	—	430
— thorn	—	432
Saltwort	—	1, 107
Samolus	—	94
Sampire	—	11, 112, 117, 369
Sandwort	—	192, 193
Sanicle	—	111
Santolina	—	357
Satyrion	—	386, 387
Sauce-alone	—	287
Saw-wort	—	349, 350
Saxifrage	—	179—183
— burnet	65, 127, 128	
— English	—	203
— golden	—	179
— meadow	—	116
Scabious	—	62, 63
— sheep's	—	377
Scorpion-graſſ	—	78
Scurvy-graſſ	—	283, 284
— Scotiſh	—	89
Selfheal	—	264
Sea-beard	—	601
— belts	—	579
— Buck-thorn	—	432
— laces	—	567
Selinum	—	115
Septfoil	—	225
Service	—	214—216
Setterwort	—	245
Shepherd's needle	—	124
— purse	—	283
Sherardia	—	66
Sibbaldia	—	136
Sibthorpia	—	276
Silverweed	—	223
Simpson	—	365
Skullcap	—	265
Sloe-tree	—	212
Smallage	—	129
Snake's head	—	144
Snakeweed	—	168
Snapdragon	—	274
Sneezewort	—	375
Snowdrop	—	140
Soap-wort	—	183
Soldier, fresh-water	—	236
Solomon's seal	—	146, 147
Sorb	—	215
Sorrel	—	156
— wood	—	198
Southernwood	—	358
Sow-thistle	—	336, 337
— bane	—	105
Sparagus	—	146
Spearwort	—	240
Sphagnum	—	465
Spignel	—	115, 116
Spikenard	—	363
Spindle-tree	—	99
Spiræa	—	217, 218
Splachnum	—	468, 469
Spleenwort	—	452—456
Spurge	—	208—211
— laurel	—	167
— olive	—	167
Squill	—	142
Squinancy berries	—	100
— wort	—	67
Stachys	—	259, 260
Star of Bethlehem	—	143, 144
— wort	—	368
Stitchwort		

INDEX NOMINUM ANGLICANORUM. 689

	Page		Page		
Stitchwort	—	73, 190	Travellers-joy	—	238
Stock	—	287, 278	Trefoil	—	324, 329
Stonecrop	—	195—198	marsh	—	86
parsley	—	115	Tremella	—	563—566
Strawberry	—	222	Trientalis	—	160
tree	—	177	Trichomanes	—	461
Succory, swines	—	346	Triglochin	—	152
wild	—	348	True-love	—	172
Sulphur-wort	—	116	Truffles	—	641
Sundew	—	135	Turkey-feather	—	566
Sun-flower	—	233	Turneps	—	289
Swertia	—	102	Twablade	—	388, 389
Sycamore	—	445			

T.

Tamus	—	433
Tansey	—	357
wild	—	223
Tare	—	318—321
Targiona	—	519
Teafel	—	61, 62
Thefum	—	101
Thistle	—	350, 354
star	—	376
St. Barnaby's	—	357
Thongs, sea	—	584
Thorn, black	—	212
buck	—	98
haw	—	215
white	—	215
Thorow-wax	—	111
Thrift	—	132, 133
Throatwort	—	96
Thyme	—	268
Tillæa	—	74
Toad-flax	—	271—274
bastard	—	101
Tofieldia	—	157
Toothwort	—	266
Tormentil	—	225
Touch-me-not	—	381
Tordylium	—	112

V.

Valerian	—	12, 13
greek	—	89
Venus's comb	—	124
Vervain	—	249
Vetch	—	318—320
bitter	—	314
grass	—	315
horse-shoe	—	322
ling	—	315
Viburnum	—	139, 130
Violet	—	378—380
calathian	—	102
dames	—	288
water	—	85
Vipers-bugloss	—	83

W.

Wake-robin	—	395
Wall-flower	—	287, 288
Wart-wort	—	209
Water-wort	—	273
chickweed	—	60
Way-bennet	—	56
faring-tree	—	129
Weed, cape	—	586
gulf	—	573
Whin	—	312
Z z	—	White-

690 INDEX NOMINUM ANGLICANORUM.

	Page		Page
White-rot	110	Wormwood	358
Whitlow-grass	182, 278, 279	Wrack, grass	396
Whortle-berry	164	— sea	576
Wilding	216		
Winter-green	176		
Whorts	164		
Williams, wild	199	Xanthium	418
Willow	425—430, 651		
— herb	161—163		
— — hooded	265		
— rosebay	161	Yarrow	375
— sweet	— 432	Yellow-wort	168
Woad, wild	299	Yew-tree	437
Wolfs-bane	650		
Woodbine	294	Z.	
— roof	66, 67	Zannichellia	397
— waxen	311		
Wormseed	288		

