


洪全氏生集指驗迷方



叢書集 成

初編

主王


鴻雲

著五

商務印書館發行



方迷指生全



3 0649 1663 2

羅 鳴 王

本館叢書集成初編所選
墨海金壺及珠叢別錄皆
收有此書同一版本墨海
在先故據以排印

原序

余昔任左史遇疾瀕死考城王貺子亨爲察衆工之用藥而余以生因以其所著全生方一編遺予藏之未暇讀也繼掌外制一日得異疾謀諸醫未決子亨笑曰毋恐此吾書所有也視某章病當某藥如方信宿而疾良已於是始奇之歸居淮南去王城遠偶有病祗訊於書謫三巴遷百粵去醫益遠又橐本以歸余以爲之表其端曰此書直而邃曲而通部居標列而脈絡潛流形色昭彰而對治要妙知方者讀之智思橫生不知者猶可按圖而愈疾真衛生之奇寶濟物之良術也至理不煩至語不費余非知道者而於此乎取之子亨當官不苟遇世變嘗慨然再請出疆萬里其論著此書用心救世利物不特此矣吳敏序

52125

083
112
2:1438

金生指迷方 原序

自序

德彌大者常存乎好生之心。志彌廣者每切於立言爲教。在上世則有伊尹。逮後漢乃見張機。祖述神農之經。發明黃帝之道。雖然術至通神之妙。在乎知慮以爲先。藥至起生之功。必因精能而後效。天無棄物。非人莫知所能。人有常心。非道莫知所適。凝神自悟。觸理皆分。故能贊益天機。悉體陰陽之變。深窮造化。博極生死之源。候色驗形。自契一時之理。剝腸剖臆。難傳後代之精。至於湯液除疴。砭石起死。必當研窮性味。斟酌淺深。治理在於君臣。協攻資乎佐使。方書之行。其來尚矣。有人猶不能刻意研求。專心致志。摶邪抱病。則束手無能。制療處方。則委身紕繆。余竊悲之。於是採古人之緒餘。分病證之門類。別其疑似。定其指歸。陰陽既明。虛實可攷。若能按圖求治。足以解惑。指迷雖未起死回生。庶幾扶危拯困。故號曰全生指迷。以崇大倫之道焉。考城王貺子亨序。

全生指迷方提要

全生指迷方四卷。宋王貺撰。案書錄解題。貺字子亨。考城人。名醫宋毅叔之婿。宣和中以醫得幸。官至朝請大夫。是書宋史藝文志作三卷。而傳本久絕。故醫家罕所徵引。或至不知其名。今檢永樂大典所收。按條掇拾。雖未必盡符原本。然大要已略具矣。方書所載。大都皆標某湯某丸。主治某病。詳其藥品銖兩而止。獨貺此書于每證之前。非惟具其病狀。且一一論其病源。使讀者有所據。依易於運用。其脈論及辨脈法諸條。皆明白曉暢。凡三部九候之形。病證變化之象。及脈與病相應不相應之故。無不辨其疑似。剖析微茫。亦可爲診家之樞要。謹詳加訂正。分爲二十一門。依類編次。而以論脈諸篇冠之于首。因篇頁稍繁。釐爲四卷。不復如其原數焉。

全生指迷方卷一

宋



脈論

論曰。人以天地之氣生。四時之法成。是以有五藏六府。四肢十二經。三百六十五穴。以象五運六氣。四時十二月。周天之度。陰陽變化。與天地同流。乖其氣逆其理。則陰陽交錯。府藏偏毗。脈行遲速。榮衛失度。百病從生。非脈無以探賾索隱。所謂脈者。乃天眞之元氣。有生之精神。精神去幹。脈理乃絕。故上古聖人體性鑒形。剖別藏府。詳辨經絡。會通內外。各著其情。氣穴所發。各有腧名。善診脈者。靜意視義。觀其變於冥冥之中。以神合神。悠然獨悟。口弗能言。先別陰陽。審清濁。而知分部。視喘急。聽音聲。而知病所生。所謂陰陽者。至者爲陽。謂隨呼而出也。去者爲陰。謂隨吸而入也。動者爲陽。鼓擊躁急也。靜者爲陰。來去沉沉默默也。數者爲陽。謂一呼一吸六至也。遲者爲陰。謂往來不滿三至也。於三部九候之內。察其脈形。有獨異者。謂獨大。獨小。獨疾。獨遲。獨不應四時者。乃受病之所也。

辨五藏六府部位脈法

左手寸口脈浮取之屬小腸爲府。沉取之屬心爲藏。其經則手太陽少陰。左手關上脈浮取之屬膽爲府。沉取之屬肝爲藏。其經則足少陽厥陰。左手尺中脈浮取之屬膀胱爲府。沉取之屬腎爲藏。其經則足太

陽少陰右手寸口脈浮取之屬大腸爲府沉取之屬肺爲藏其經則手太陰陽明右手關上脈浮取之屬胃爲府沉取之屬脾爲藏其經則足太陰陽明右手尺中脈浮取之屬三焦爲府沉取之屬心胞絡又屬右腎其經則手少陽厥陰

辨人迎三部趺陽九候五藏六府脈法

論曰診脈之法其要有三一曰人迎在結喉兩傍取之應指而動此部法天也二曰三部謂寸關尺也于腕上側有骨稍高曰高骨先以中指按骨謂之關前指爲寸部後指爲尺部尺寸以分陰陽陽降陰升通度由關以出入故謂之關此部法人三曰趺陽在足而繫鞋之所按之應指而動者是也此部法地三者皆氣之出入要會所以能決吉凶死生凡三處大小遲速相應齊等則爲無病之人故曰人迎趺陽三部不參動數發息不滿五十未知生死以三者爲決死生之要也故人迎一盛病在太陽謂陽極也四盛以上爲上爲隔陽謂無陰以收也寸口一盛病在少陰二盛病在太陰三盛病在厥陰厥有盡也四盛以上爲關陰謂無陽以繫也隔陽者氣上而不能下則吐逆關陰則閉塞大小便不通皆死不治九候者謂三部之位一位有三候浮取之屬陽沉取之屬陰中得之爲胃氣故無胃氣則死五藏之脈經手足肢膚得之者肺也至肌得之者心也至肉得之者脾也至筋得之者肝也至骨得之者腎也五者輕重皆應是謂五藏之氣全也又有推而外之在經絡推而內之在血脈凡診平人之脈當以平旦陰氣未動陽氣未散飲食未進脈絡調和可以見有餘不足之脈一呼行三寸一吸行三寸呼吸行六寸而脈四至呼吸之間又一

至此盛脈得天全者也。若過十息脈應五十動，又須與氣相應，往來緩急得中，潤澤如慢水流行源源者，此壽脈無疾也。若不滿五十動一止，此一歲之氣絕，四歲死。三十動一止，三歲死。二十動以下一止，期以歲月死。若與形氣不相應，往來短促，枯燥無首尾，此不壽之脈而多病。凡診病脈則不拘晝夜審脈，所以察其由，則寒熱虛實見矣。凡脈病人不病者死，人病脈不病者生。

診諸病證脈法

論曰：脈變於內，病形於外，相參以察其理。氣熱脈滿，是謂重實。脈實以堅，謂之益甚。上下相失，不可數者死，謂至數也。脈口熱而尺反緩，皮膚外證也。滑則從濇，則逆。寸口膚熱而尺膚寒，是經氣有餘，絡氣不足也。尺膚熱，脈滿，寸口膚寒，脈濇，是經氣不足，絡氣有餘也。脈寸虛尺虛，是謂重虛。重虛者死。寸虛者，病情無常，神不守也。尺虛者，行走愴然，脈滑則生，濇則死。脈急大堅，尺濇而不應，謂之形滿。手足溫則生，寒則死。乳子中風，熱喘鳴肩，息脈緩則生，急則死。下痢白沫，脈沉則生，浮則死。下痢膿血，脈懸絕則死。滑則生，浮濇之脈，身有熱者死。癲疾之脈博大而滑，久自已，脈小堅急死。不治病人，口甘而渴，此數食甘美而多肥，五氣之溢也。謂之脾瘅。病人口苦，此因數謀慮不決，脾虛氣上溢，是謂脾瘅。凡消瘅之脈，實大，病久可治。病人身熱如炭，頸膺如格，人迎躁盛，喘息氣逆，太陰脈微細如髮者死。不治謂氣口與人迎不相應也。心脈滿大，癰癧筋變，肝脈小急，癰瘡筋攀，肝脈驚暴有所驚駭，無故而瘡，脈不至，不治自已，謂氣暴厥也。氣復則已。腎脈小急，肝脈小急，皆爲瘕。肝脈併沉爲石水，併浮爲風水，併虛爲死，併小弦爲驚。腎脈大

急沉。肝脈大急沉。皆爲疝。肺沉博爲肺疝。太陽急爲瘕。膀胱氣也。太陰急爲脾疝。少陰急爲癰厥。心病也。少陽急爲驚膽病也。脾脈沉鼓爲腸癖。由飽食而筋脈橫解。腸癖爲痔。胃脈沉鼓濶。胃外鼓大。心脈小急。皆爲偏枯。年不滿二十者三歲死。脈至而搏血竭。身熱者死。心肝脈小沉濶爲腸癖。心脈至如喘。名曰暴厥。不知與人言。脈至如數。使人暴驚。三四日自己。肺脈有餘。病皮瘡閉不通。而生癰疹不足。病肺瘡寒濕。脾脈有餘。病肉瘡。寒中陰隔塞也。不足。病脾瘡。肝脈有餘。病筋瘡。腸滿不利。不足。病肝瘡。腎脈有餘。病骨瘡。身重不足。病腎瘡。凡陰病見陽脈者生。謂病人四肢厥惡寒多汗。脈得洪大數實也。陽病見陰脈者死。謂病人身熱狂躁譖言欲飲水。脈得沉細微遲也。

辨脈形及變化所主病證法

浮脈之狀。在皮膚輕手得之。重按則似有若無。王於秋。主脈主風。主虛乏短氣。秋得之爲順。春得之爲賊邪。冬得之爲虛邪。夏得之爲實邪。又爲微邪。其病不治自愈。純浮爲感風。浮弦爲虛勞。浮緊爲風寒浮芤爲衄血。浮滑爲風痰。浮洪爲風氣壅滯。浮微爲氣不足。浮緩爲風虛。四肢不隨。浮濶爲傷肺咯血。嗽血浮遲爲傷憊。浮弱爲虛損。浮濡爲氣血俱不足。又看見於何部位。以藏府經絡推之。餘可倣此消息。沉脈之狀。取於肌肉之下。得之主藏病。沉滯伏匿在寸。爲心肺鬱伏。悲憂不樂。在關爲肝脾不利。中滿善噫。膩脹。濕勝則腫滿。溏泄食不化。支膈胠胸滿。善恐。在尺。則爲石水。腹腫硬以指彈之。殼殼然有聲。小便澀。沉緊爲腸間積寒痛。沉澀結爲五氣積聚成形。沉數或疾爲骨蒸。沉滑爲腎消骨枯。善渴小便數。純沉澀。沉緊爲腸間積寒痛。沉澀結爲五氣積聚成形。沉數或疾爲骨蒸。沉滑爲腎消骨枯。善渴小便數。純沉

爲腫重。足膝不利。不得履地。得之於陰濕之氣沉而微。天藏氣衰。骨痿不能起。

遲脈之狀。往來極遲。一息三至。爲陰盛陽虛之候。若手足厥不回者死。五藏氣短。不能朝於氣口。肺腎俱衰也。太素脈訣·作肺腎俱絕陳無擇三因方云。遲者應動極緩。與人迎相應。則濕寒凝滯。與氣口相應。則虛冷沉積。爲寒爲痛。遲而濶。爲癥瘕咽酸。

數脈之狀。往來急數。一息六至。爲陽盛陰微之候。寸脈見之。爲熱爲躁。爲煩。左關爲目赤頭疼。煩滿。右關爲口臭。胃煩。嘔逆。尺中見。爲小便黃赤。大便閉澀。與人迎相應。爲熱。與氣口相應。或爲瘡。

洪脈之狀。大而隱指。若大而散漫。是謂氣衰。大而浮。風客於衛。欬出青黃膿如彈丸。大若不出。則傷肺。下利得脈大。利益甚。霍亂得之。則吉。又其脈主夏屬心。

虛脈之狀。浮大無力。遲而且柔。又如蜘蛛絲。此陽氣衰少。陰獨居。爲多汗亡陽。形氣蕭索。其人不壽。

散脈之狀。浮而無力。至數不齊。渙漫不收。更甚于虛。或來多去少。按之如無。此氣血俱虛。根本脫離之候。左寸軟散。爲陽虛不斂。右寸見之。爲氣耗汗出。肝脈軟散。色澤者。富病溢飲。脾脈得之。色不澤。當病足跗腫。尺脈見散。爲精氣衰耗。又產婦得之。生孕婦得之死。

芤脈之狀。如浮而大於指面之下。其形中斷。又如流水不相續。或如瀉漆之形。斷而倒收。又似弦而軟。太素脈訣云·芤脈之狀·中空弦散主吐血。嘔血。衄血。男子失精。婦人胞漏半產血崩。又曰其狀弦大。弦則爲減。大則爲芤。弦芤相搏。此名爲革。金刑木而傷肝也。芤而滑。嘔吐甚。則亡血。芤而數。陽陷陰中。血妄行。芤而急。風冷入血。

下血如豚肝。臍腹痛死不治。芤而弦。因失血致勞傷。芤而微。或散久成血枯。

濡脈之狀極軟弱。如以指按水中綿。如有如無。太素脈訣云。諸部脈形。按之極小。爲陰陽俱不足。濕冷霧露之氣所傷。爲病頭重。如以濕熱之物裹首。大筋軟短。小筋弛長。爲痿弱。骨不能立。又爲亡津液。精神不收。十便良方云。精神乾急。或偏枯。血脉搏。得之風冷濕氣也。餘同前。又爲脛瘦枯細。手足常厥冷。肉理不密。

微脈之狀極微。或似有似無。爲氣血不足。爲虛憊。亡血亡汗。小便數。或曰濁。若微數。爲陰虛客陽。內熱穀氣少也。若在尺部。腎脂枯髓不滿骨。若在左關。則肝氣血不足。目視瞶。筋緩弱。若在右關。則虛滑泄注。穀不化。腸鳴及漿粥不入胃。若在右寸。則爲肺損背寒。口中如含霜雪。欬嗽肌疎。不可以風。短氣。若在左尺。爲心虛恍惚。憂思不樂。多恐。如人將捕之。若六部俱微。則陽不及四肢。足脰冷。手足厥。常欲湯火煖之。陳無擇三因方云。微者極細而軟。似有若無。與人迎相應。則風暑自汗。與氣口相應。則微陽脫泄。入裏病。脈微爲虛。爲弱。爲衄。爲嘔。爲泄。爲亡汗。爲拘急。微弱爲少氣。爲中寒。

革脈之狀。渾渾革至。如湧泉。謂出而不返也。爲陰氣隔陽。又爲溢脈。蓋自尺而出。上於魚際。亦謂之離經。無根本也。又覆脈之狀。自寸口下退過而入尺。皆必死之脈也。

伏脈之狀。重於沉。指下尋之。方得。蓋時見時隱也。太素脈訣云。伏脈之狀。其形況伏。隱隱其位。此陰陽之氣相伏也。或陰中伏陽。陽中伏陰。脈疾爲伏陽。內熱。身雖寒而不欲蓋衣。脈遲小。有來無去。此伏陰在內。陽氣不得入也。其人身雖熱。而但欲覆被向火。脈實者。有伏氣在內。濁者。有動氣在左。則左病。在右。則右病。在尺。則居臍上下。

居臍上爲逆。居臍下爲從。

牢脈之狀如弦而實尋之則散。太素脈訣云。指下尋之不動。爲五勞六極七傷之病若加數疾則發熱加短遲則發寒。

疾遲不常則寒熱支體迫急情思不樂。

實脈之狀舉按有力重按隱指幅幅然氣不利亦主伏陽在內蒸熱勞倦胃氣壅塞爲內癰實數爲三焦閉熱大便祕實滑爲癖飲癥瘕留聚之病實大爲氣盛閉塞太素脈訣。實大作實洪。實沉爲藏府氣不通帶短太素脈訣。脈訣云。實而短。爲宿穀不化。

弱脈之狀小而無力爲精不足短氣表裏俱衰爲暴下陰併於陽汗出不止者死又爲腳弱筋緩足不能履地惡寒不可出風。

細脈之狀細細似線太素脈訣云。其形細微。陰氣勝陽也又爲手足寒氣少慘慘不舒暢又血不榮於四肢謂寒則澀而不流行也。太素脈訣云。又半治洩瀉。

緩脈之狀不遲不疾一息四至往來得中實得上氣太素脈訣云。緩脈。之狀如柳葉也。緩甚爲病四肢不收受濕而痺緩而沉脾氣滯志意不舒展氣痞多噫緩而濇肌肉不仁津液不流行榮衛失度因以致風緩而微爲消氣緩而滑爲熱中多食緩而短穀不化爲溏泄緩而浮爲風蟬曳陳無擇三因方云緩者浮大而軟去來微遲與人迎相應則風熱入藏與氣口相應則怒極傷筋緩而在下爲風爲寒爲弱爲痺爲疼爲不仁爲氣不足爲眩暉緩而滑爲熱中緩而遲虛寒相搏食冷則咽痛。

濤脈之狀。往來極濤。如水不能流。或聚於指下。或綿綿如瀉漆。斷而倒收。又似止非止。太素脈訣云。濤脈之狀。如刀口。到指不離其

主男子亡血失精。婦人胎姪不成月。候凝澀。或崩傷不止。五帶敗血在腹。或血瘕成形。筋急寒瘻。浮濤爲肺病。咯血欬嗽。虛勞。濤中時弦爲金木相剋。脇下痛。不得臥者死。在左寸爲心瘻。寒慄病。積洩血。在左尺爲病小腹積氣。在右關則病心腹時滿。在左關則病筋急積寒。

結脈之狀。大小不定。往來不拘數至時一止。主氣不流行。腹中癥癖氣塊成形。或因大病後亡津液。亡血。或驚恐神散而精不收。或夢漏亡精。又多慮而心氣耗也。若無是因。則其人壽不過一二年。

代脈之狀。其來如斷絕而相待。其息以至時搏而動。主血氣虧損。或驚憂積甚。形氣不相得也。

滑脈之狀。指下如水之流。或如轉珠而滯礙。太素脈訣云。不緩不實。如珠之形。主嘔吐。主飲滑而弦細者爲支飲。欬逆。倚息面浮腫。滑而緊。停寒積飲。吞酸。腸間漉漉有聲。滑而弦。留飲在胃。頭痛而眩。滑而數。爲中渴。甚則爲痓。手足癰癧。搖搦也。滑而緩。熱中消穀。引食滑而細沉。爲消渴。帶微爲消中。不渴。小便數。滑實爲氣盛。上熱。滑大而數。爲心氣熱。越多汗滑而微。小爲多盜汗。在尺滑爲狐風疝。在右手寸口爲肺風疝。在右關則爲脾風疝。在左關則爲肝風疝。

緊脈之狀。如按繩繳指三部通度。與弦相似而有力。舉按皆有餘。主中寒。腹痛切急。在寸口。則中寒口噤。頭痛惡寒。欲得覆被火炙。在關上。則胃冷。吞酸。中脘。脅腹痛。下利。筋寒。或轉筋霍亂。欬嘔。膽汁緊數。爲冷熱痢。下膿血。或身熱。飲食如故。有病處。則結癰疽。在尺。爲寒疝痛。

促脈之狀。自尺上寸口促急。有來無去。太素脈訣作有時止復來此榮衛無度數。陰氣促陽也。又腎氣離經升而不降。又爲無陰而陽無以繫也。若時氣促數。上出寸口。此陽併於血。病赤斑。十死一生。若脈見斷絕。爲黑斑。

獨陽攻藏氣絕死不治。

動脈之狀。鼓動而暴於指下。不常氣血相乘。搏擊而動也。或鼓於陽。則一陽爲鈎。如夏脈之盛。或鼓於陰。一陰爲毛。如秋氣之急切勁烈。鼓陽勝而急曰弦。陰緩而陽急也。鼓陽至而絕曰石。陽辟而陰孤也。陰陽相過曰溜。氣相鼓作而動也。

弦脈之狀。如張弓弩弦。應指有力。重按則軟弱。太素脈訣云狀如琴弦主春氣。主肝藏。主虛。主痰。主瘡。主勞。弦而微氣不足。筋緩不榮。弦急似數。非數綿綿之狀。勞傷氣促急。四肢煎厥。無首尾而促疾。虛勞不足。弦弱而疾。夜多盜汗。弦短而大。榮衛勞傷。內急外緩。兼數則熱。目視瞞瞞。血不足也。兼遲則寒。筋脈急攣。弦僵因失血。女子則月閉。血瘕。弦緊爲虛寒。裏急寒疝。少腹痛。面青。下利。弦遲而濶。出入無首尾。爲寒閉。血少筋乾。太素脈訣急作弦而急一便良方云沉而微五或偏枯。血脈痺。得之風冷濕也。藏氣衰。腎痿不能起

短脈之狀。往來極短。不待息盡而回。或無首尾。但見於指面。亦不待氣來而至。其人短氣息。或不能長息。又爲大下脫氣。又主久病。

長脈之狀。往來指下。息隨而盡。其有餘。如操帶物之長。太素脈訣云長脈之狀。往來至長。稟賦氣強。勝血而氣擁。其人壽。若加大而數。爲病陽盛內熱。當利三焦。

全生指迷方卷二

寒證

論曰。若其人洒淅惡寒。但欲厚衣。近光隱隱。頭重。時痛。鼻塞。濁涕如膿。欬嗽。動輒汗出。或無汗。甚則戰慄。此由寒中於外。或由飲冷傷肺胃。內外合邪。留而不去。謂之感寒。寒從外至者。兩手寸口脈俱緊。或但見於右寸。寒從內起者。其脈遲小。無汗者。小青龍湯主之。小汗者。溫肺湯主之。

小青龍湯

五味子
細辛去苗
乾薑
半夏湯洗七
過

甘草炙各一
兩

右爲散。每服五錢。水二大盞。薑三片。棗一箇。擘破。同煎至八分。去滓溫服。

溫肺湯

方缺

若陰寒積冷。心腹大痛。嘔逆惡心。手足厥冷。心智不快。腰背疼痛。良薑湯主之。

良薑湯

高良薑碎一兩。剉炒
官桂去皮一兩
當歸去蘆一兩。剉炒
乾薑炮一塊。

人參去蘆一兩。

一兩。

吳茱萸七錢半。炒

半兩。

白茯苓一兩。

半兩。

附子炮半兩。

石爲散。每服二大錢。水一盞半。入生薑五片。煎至七分。去滓空心服。

若但寒頭重動眩暈肌肉痛牽急不得轉側。熱漿汗出惡寒小便難大便反快短氣足寒或時咽痛微熱。此由寒濕客搏經脈不得發泄其脈遲緩而小弦附子湯主之除濕湯亦主之。

附子湯

附子一箇·炮 · 白朮炒一兩

茯苓

白芍各三兩

人參二兩

右爲散每服二大錢水一盞半入生薑三片煎至七分去滓空心服。

除濕湯方缺。

熱證

論曰陰不足則陽偏陽偏則發熱若熱從背起自手足漸漸周身口舌乾燥欲飲食而不能此由陰氣虧少少水不能制盛火諸陽起於四末循行於背陰不能斂陽陽氣獨行所以發熱或晝發而夜寧或夜發而至旦即消其脈虛疾而小芍藥黃耆湯主之。

芍藥黃耆湯

芍藥三錢

黃耆

甘草炙

青蒿陰乾各一兩

右爲散每服五錢水二大盞煎至一盞去滓食後溫服。

若熱從腹起上循胸腋繞頸額初微而漸至大熱發無時遇饑則劇中脘不利善食而瘦其色蒼黃肌肉不澤口唇乾燥由脾氣素弱會因他病悞服熱藥入於脾脾熱則消穀引飲善消肌肉其脈濡弱而疾參

橘丸主之。若嗽者用加減法及灸肺腎百壯。

參橘丸

橘皮 三兩洗

麥門冬 去心一兩

人參 去蘆一兩

右爲末。煉蜜爲丸如梧桐子大。食前米飲下三十丸。若嗽加五味子一兩。

若熱從腹中或從背起。漸漸蒸熱。日間劇。夜漸退。或寐而汗出。小便或赤或白而濁。甚則頻數。尿精。夜夢鬼交。日漸羸瘦。由思慮太過。心氣耗弱。陽氣流散。精神不藏。陰無所使。治屬虛勞。大建中湯主之。

大建中湯

芍藥 六兩

黃耆

遠志 去心一兩

當歸 洗一兩

澤瀉 各三兩

龍骨

人參

甘草 炙二兩各

當歸 洗一兩

澤瀉 各三兩

右爲散。每服五錢。水二盞。棗二箇。擘破。薑五片。同煎至一盞。去滓。食後溫服。腹中急加餳。如聚大。

若自腰以上發熱。熱及則汗出。出已而涼。移時如故。復加昏暈。腹中膨脹。其氣上攻。時時欬嗽。嗽引脇下牽痛。睡則驚悸。其脈弦急。疾由外寒客搏。內冷相合。寒則氣收。而水液聚內化成飲。醫以熱藥攻寒。寒閉於內。熱增於上。陽氣不行。故散越於上。發而爲熱。散而爲汗。汗多亡陽。心氣內虛。故令驚惕。治屬飲家。以旋覆花丸主之。

旋覆花丸

旋覆花 桂心

枳實
麸炒

人參
各五分

乾薑

芍藥

白朮
各六分

伏苓

狼毒
去心

烏頭
炮去皮

礬石
火煅一伏時，各八分

甘遂
三分炒

細辛
去苗

大黃
濕紙裹煨

黃芩
去皮，蕊汁炙

葶藶
炒

芫花
炒

橘皮
洗

吳茱萸
炒

厚朴
各四兩去皮，蕊汁炙

右爲細末，煉蜜爲丸，如梧桐子大，米飲下三丸，未效加至七丸，小兒黃米大二丸。

若熱起骨間煩疼，手足時冷，早起體涼，日晚卽熱，背脊牽急，或骨節起凸，足脛酸弱，由陰不足而陽陷陰中，熱留骨髓，髓得熱則稀，髓稀則骨中空虛，陰虛水少，脂枯故蒸起其脈沉細而疾，治屬骨蒸補髓丸主之。

補髓丸

生乾地黃
日乾，三兩

乾漆
半兩，碎，炒，令烟盡

右爲末，煉蜜爲丸，如梧桐子大，飲下三十九空心臨臥服。

若自骨以上至頭發熱，口鼻氣色時如煙薰，目澀咽燥，唾如凝脂，時欬毛竦，大便不利，小便赤，由肺不調，邪熱薰上，焦其脈疾，大先服桔梗湯，熱不退者，五味子湯主之。

桔梗湯

桔梗
一兩

人參

麥門冬
去心

甘草
炙，各半兩

小麥
一合

右咬咀水三升煎至一升去滓分三服

五味子湯 指南方治發熱不退

柴胡去苗·洗四兩 半夏湯洗七遍一兩一分

黃芩

五味子

赤茯苓分兩原缺半兩

右爲散每服五錢水二盞薑五片棗二箇擘破同煎至一盞去滓溫服

若但熱不歟日晡尤甚口中勃勃氣出耳無所聞晝多昏睡睡卽浪言喜冷小便赤澀大便不通由三陽氣盛蘊於經絡內屬府藏或因他病而致疾其脈短疾而數柴胡芒硝湯主之

柴胡芒硝湯

柴胡四兩·洗去苗

黃芩

甘草炙

赤茯苓各一兩

半夏湯泡七遍一兩一分

爲度

若身大熱背微惡寒心中煩悶時時欲嘔渴不能飲頭昏重痛惡見日光遇涼稍清起居如故由飲食失時胃中無穀氣熱蓄於胃中中脘熱則三陽不下降而上聚於腦又胃主陽明經爲惡熱其脈虛大而數久則細小謂之中暑初卽服好茶一杯立愈不卽治之留而在胃別致他病生薑竹茹湯主之

生薑竹茹湯

竹茹雞子大

人參半兩

葛根半兩

生薑一錢切

右爲散水三盞煎二盞去滓分二服不拘時。

若間日發熱發必數次頭痛拘倦由肺素有熱氣盛於身厥逆上衝中氣實而不外泄其氣內藏於心外舍於分肉之間令人消爍脫肉其脈弦大而數謂之癰瘍柴胡栝樓湯主之。

柴胡栝樓湯

去苗洗

柴胡

八錢

芍藥

人參各二錢

半夏湯洗七遍
二錢半

甘草炙二錢

栝樓二錢

右㕮咀水二升生薑十片棗二箇擘破同煎至一升分三服去滓服大熱者去芍藥栝樓用黃芩三錢卽名小柴胡湯。

若身熱汗出煩滿不爲汗解由太陽之經先受風邪與熱相搏腎氣厥則煩滿謂之風厥澤瀉湯主之。

澤瀉湯

澤瀉半兩

白朮

防風各二兩

石膏研

赤茯苓各一兩

右爲散每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服。

若四肢發熱逢風如炙如火由陰不勝陽陽盛則熱起於四支少水不能滅盛火而陽獨治於外以免絲子丸主之。

兔絲子丸

菟絲子先於白內杵百下，節去雜物，末。

五味子各一兩

生乾地黃一兩

右爲末，煉蜜和丸如梧桐子大，飲下三十粒，食前溫服。

若發熱耳暴聾，頰腫脣脹，痛脹不可以運，由少陽之氣厥而熱留其經，宜小柴胡湯。若口乾渴，赤腹滿心痛，由熱留於手少陰之經，其氣厥也。赤茯苓湯主之。

赤茯苓湯

赤茯苓四兩

甘草生一兩

木香半兩

右爲散，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去滓溫服。

風食

論曰：若其人翕翕如熱，漸漸如寒，無有時度，支節如解，手足酸痛，頭目昏暈，此由榮衛虛弱，外爲風邪，相乘搏於陽則發熱，搏於陰則發寒，久不治成勞氣。荆芥散主之。

荆芥散

荆芥穗

人參

白朮

當歸切細

黃耆

芍藥

桂去皮一兩

柴胡去苗二兩

甘草炙半兩

右爲末，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去滓溫服。

若忽然牙關緊急，手足瘓癰，目直視，此風客血經，謂之風瘻，脈緊大者不可治，獨活湯主之。

獨活湯

獨活剉半兩 荆芥穗一兩

右以水三盞煎荆芥汁至一大盞再入獨活煎一半去滓溫服凡用獨活紫色有成白子者蓋羌活極大而老者是尋常所用白色者乃老宿前胡也慎不可用

又方

煎荆芥濃汁於盆中坐病人於上薰蒸然然淋洗之

若寒熱如瘡不以時度腸滿膨脹起則頭暈大便不通或時腹痛胸膈痞悶此由宿穀停留不化結於腸間氣道不舒陰陽交亂備急丸主之

備急丸

大黃濕紙裹一錢 巴豆去皮心及油一錢 乾薑去皮等分

右爲細末煉蜜爲丸如豌豆大每服一丸米飲下羸人服一丸如棗豆大以便快利爲度

風濕

論曰若身體疼心煩口燥欲得水而不能飲額上微汗背強欲得覆被向火其脈浮虛或日晡發熱或身重汗出而脈但浮或掣痛不得屈伸近之則痛極短氣或身微腫或發熱而黃而喘鼻塞而煩脈大自能飲食此由汗出當風或因冒濕冷復遇風邪之氣閉固腠理病名風濕麻黃加朮湯主之

日晡發熱者。薏苡仁湯主之。

掣痛不得屈伸者。甘草附子湯主之。
鼻窒塞氣不通者。瓜蒂散主之。

惡風身體重者。防已湯主之。

麻黃加朮湯

麻黃去根節三兩

桂心二兩

甘草炙兩一

杏仁湯洗去皮尖半兩

白朮四兩

右爲散。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去滓溫服。

薏苡仁湯

麻黃去根節三兩

杏仁去皮尖半兩

甘草炙

薏苡仁各兩

右爲散。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去滓溫服。

甘草附子湯

甘草炙兩

附子炮去皮臍兩

右爲散。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去滓溫服。

瓜蒂散

瓜蒂

細辛去苗

藜蘆去苗等分各

右爲細末。每用半字許。內鼻中。以氣通爲度。

防已湯

防已四兩

黃耆四兩

甘草炙二兩

蒼朮去皮三兩

右爲散。每服五錢。水二盞。薑二片。聚一箇。擘破同煎至一盞。去滓溫服。

瘧疾

論曰。寒熱之病。或寒已而熱。或熱已而寒。或寒熱戰慄。頭痛如破。身體拘急。數欠渴欲飲冷。或猝時而發。或間日而作。至期便發。發已卽如常。此謂之瘧。瘧脈自弦。弦數多熱。弦遲多寒。此皆得之於冬中風寒之氣藏於骨髓之中。至春陽氣大發。邪氣不能自出。因遇大暑。而後與邪氣相合。而發。常山湯主之。

常山湯

常山

知母

甘草炙各三兩

麻黃去節二兩

右爲散。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去滓溫服。以糜粥一盃助取汗爲度。

熱多者。宜解之。栝樓湯主之。

栝樓湯

栝樓根四兩

柴胡去苗八兩

人參

黃芩

甘草炙各三兩

右爲末。每服二錢。水二盞。生薑三片。聚一箇。擘開。煎至一盞。去滓溫服。

寒多者宜溫之。蠶桂湯主之。

蠶桂湯

乾蠶

去苗

牡蠣赤

火煅通

甘草

炙二兩各

黃芩

二兩活人書用三兩

柴胡

八兩

桔梗根

四兩

桂

去皮取心三兩

右爲末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時候寒熱等者宜調之。鼈甲湯主之。

鼈甲湯

鼈甲淨

醋炙

白朮

常山

桂去皮

柴胡

去苗各一兩

右爲散每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服。

痺證

論曰若始覺肌肉不仁久而變生他證病名曰痺此由風寒濕三氣客於經絡舍於血脈搏於榮衛故令皮膚痺而不仁有熱則肌肉骨節煩疼有寒則冷以春得之在筋夏得之在脈秋得之在皮冬得之在骨四季得之在肌肉又久而不去各傳其藏筋痺不已舍之於肝夜臥則驚飲食多小便數上爲引如懷妊脈痺不已舍之於心其脈不通煩滿心下鼓暴上氣肌痺不已舍之於脾其狀四肢懈惰發渴嘔汁上爲

大寒皮瘡不已。舍之於肺。其狀煩滿而喘。骨瘡不已。舍之於腎。其狀善脹。尻以代踵。脊以代頭。右證雖多。必先肌肉不仁。其始治當以增損小續命湯。證狀小不同者。當依本法。病久入深。魯公酒主之。

增損小續命湯方缺。

魯公酒

茵芋	川烏頭	炮去皮臍	躡躅花	天雄	炮去皮臍	防已
石斛一兩	細辛	去根各去苗	柏子仁	牛膝	去苗	甘草
通草	桂	去皮取心	山茱萸	秦艽	去土去皮	炙
茵陳蒿	瞿麥		附子	杜仲	去皮	黃芩
王不留行	石楠葉		炮去皮	生乾地黃	各半	澤瀉
						遠志去心

右㕮咀酒四斗漬十日每服一合常令酒氣相續。

若胃乾而渴。肌肉不仁。由居處卑濕。以水爲事。肌肉濡漬。瘡而不仁。是謂肉瘻。瞿粟湯主之。

瞿粟湯

瞿粟少

不計多

右研細末。煮稀粥入蜜飲之。大解金石毒。

若一邊足膝無力。漸漸瘦。肌肉不澤。上牽脇肋。下連筋急。不能行步。此由大病之後。數亡津液。血少不

榮氣弱不運。肝氣虧損無血以養筋筋不榮。則乾急而痛亦不能舉。活血丹主之。

活血丹

乾地黃二兩、當歸洗、芍藥、續斷、白朮各一兩。

右爲細末酒糊爲丸如梧桐子大酒溫下三十九丸食前服加至五十九丸如痛甚足痿不能行去朮加杜仲一兩乳香威靈仙木鼈子仁草烏頭白芥子各半兩。

鹿茸丸

鹿茸去毛切作片子、蘇炙五兩、乾地黃二兩、兔絲子揀淨酒浸透乘潤、杜仲去粗皮搣爛炒乾、牛膝二兩、草薢二兩、附子炮去皮臍半兩、乾漆半兩炒煙盡爲度。

右爲細末酒糊爲丸如梧桐子大飲下三十九丸食前服。

若始覺脚弱速灸風市三里二穴各一二百壯若覺熱悶慎不可灸大忌酒麵房勞風市穴使病人平立垂兩手合手著腿中指尖頭即是穴三里穴在足膝蓋下三寸外廉按之陷中是又法以指深按之則足趺陽脈不見爲準。

勞傷

論曰古書有五勞六極七傷皆由勞傷過度或五藏六府互相尅賊一藏偏損五行逆伏以至盡絕皆謂之虛勞也。

若日賴羸瘦短氣腰背牽急膝脛酸痿小便或赤或白而濁夜夢紛紜或夢鬼交翕翕如熱骨肉煩疼由房勞過度或思慮過多皆傷神耗精之由得之心腎其脈細促大骨枯者不治微弱者可治脈大數甚不能食者死大建中湯主之

大建中湯見前發熱門

氣病

論曰百病皆生於氣其始必由喜怒悲憂驚恐由是變生形證不一若其氣起於一邊或左或右循行上下或在肌肉之間如錐刀所刺其氣不得息令人腹中滿由驚恐恚怒或冒寒熱留而不去爲鬱伏之氣因氣流行隨經上下相搏痛久久令人痞悶其脈短濇謂之聚氣七氣湯趨痛散主之

七氣湯 楊仁齊直指方云治七情相干陰陽升降氣道壅滯攻衝作疼

京三稜

蓬莪茂

青橘皮

香附子

去毛

陳橘皮

洗

桔梗

藿香葉

桂取心

益智半

各一兩

甘草

炙三錢

胡氏經効方有

沉香半兩

無陳橘皮

右爲散每服五錢水二盞生薑二片棗二枚煎至一盞食前溫服

趨痛散 可用方云治氣搏作痛肌肉之間如錐刀所刺胸膈痞悶

蓬莪茂炮

桂心兩

各一

檳榔

附子皮膏去

細辛半兩

去苗各

芫花炒別爲末

一錢

右除芫花外共爲末每服三大錢水一盞煎至七分去滓調芫花末一字溫服若心下似硬按之卽無常覺膨脹多食則吐氣引前後噫氣不除由思慮過多氣不以時而行則氣結又曰思則心有所存神有所歸正氣留而不行其脈澀滯謂之結氣參橘丸主之

參橘丸

橘皮洗四兩人參一兩

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大米飲下三十九食前服

若咽中如核嚥之不下吐之不出久不治之漸妨於食或由思慮不常氣結不散或因飲食之間氣道卒阻因而留滯因氣者謂之氣噎其脈緩澀因食者謂之食噎嘉禾散主之食噎神麪丸主之

嘉禾散

方缺

神麪丸

神麪炒一兩橘皮洗二兩

右爲細末煉蜜和爲丸如雞豆大每服一粒含化嚥津

若痛而遊走上下無常處脈亦聚散或促或濇謂之遊氣茂香散主之不止者延胡散主之

茂香散

蓬莪茂炮一兩

人參一分

木香一錢

右爲細末醋湯調方寸匕

延胡散

延胡索炒

當歸洗等分

右爲細末醋湯調方寸匕

若自咽喉以下至臍左右氣各不相通氣上奔急攻右臂痛如斧槌肌肉日消漿粥不下心中懊悶由肺經本受寒邪留於右邊以肺左右或因以大熱藥攻寒寒本在於經而不能散發於是火氣但逼於肺肺燥則氣上迫但解藥毒然後理肺先宜炙肝散後宜理氣湯

炙肝散

牡丹皮

柴胡

芍藥各一兩

白朮二兩

右爲細末用豬肝三指許薄批穆藥末二錢慢火炙熟細嚼米飲下食前服

理氣湯疑卽前七氣湯

柏子仁丸 史載之指南方多楮實一兩治臂痛不能屈伸筋脈攣拘

柏子仁炒研

乾地黃各二兩

茯苓

枳實麸炒去瓢

桂取心

五味子

附子炮去皮鹽去

石斛去苗

鹿茸子去毛截作片

酸棗仁

覆盆子

沉香

黃耆各二兩

右爲細末。煉蜜和丸如梧桐子大。酒下三十九空心服。

若腹脇有塊。大小成形。按之不動。推之不移。久久令人寒熱如瘡。咳嗽。面目浮腫。動輒微喘。日就羸瘦。由暴怒或驚恐。氣上而不下。動傷於肝。氣結聚成形。始得之在肝。其脈牢大而結。不傳可治。沉香煎主之。

沉香煎

石斛五錢

椒去汗

附子炮皮

秦艽去辛

鼈甲熬刮去筋

柴胡去黃

沉香

木香

檀榔

黃耆各二兩

右爲末。先用枸杞根新者十斤。淨洗搗碎。好酒二斗煮至七升。取出枸杞。別用好酒三升。拍洗令淨。滙去滓。濾過。併於前煎酒內。更入熟蜜四兩。再熬成膏。和藥末丸如梧桐子大。飲下二十九。食前服。

血證

論曰。諸陽統氣。諸陰主血。陰盛則陽虧而陽病。陽盛則陰虧而陰病。陽氣侵陰。血失常道。故或吐或衄。或從口。或從鼻。若暴出而色鮮。心煩燥悶。時欲引飲。出至三升。陽入於陰也。血得熱則流散。譬如天地之經水。天暑地熱。則經水沸溢而壠起。故有內衄肺疽。其證大屬而小異。其脈洪數者爲逆。微小者爲順。宜梔子麋皮湯。煎金湯。大熱者宜地黃煎。

若吐血時。先聞腥臊。鼻出清液。脅脹支滿。妨於食。目眩。時時前後血。此由素經大奪血。或醉入房中。氣竭。

傷肝女子則月事衰少不來病名血枯梔子棗皮湯主之。

梔子棗皮湯

黃藥

梔子各一兩

甘草半兩

右爲散每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服。

煎金湯

金花并莖葉陰乾不拘多少。

右濃煮汁頓服立定。

地黃煎

生地黃汁半斤

大黃末一兩

右將地黃汁熬耗一半內大黃末同熬候可丸如梧桐子大熟水下五粒未效加至十粒。若吐血服湯後轉加悶亂煩躁紛紛欲嘔顛倒不安由胸上有留血其脈沉伏急須吐之人參散主之。

人參散

右爲末水調下一二錢。

人參蘆

若血隨嘔出胸中痞悶嘔畢則目睛痛而氣怒由怒氣傷肝膽血隨嘔出竹皮湯主之。

竹皮湯

青竹皮

甘草
炙

芎藭

黃芩

當歸
洗·各六分

芍藥

白朮

人參

桂心
各一兩

右爲散。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去滓溫服。

若先吐血。血止後。嗽中血出如線。痛引脇下。日漸羸瘦。由悲憂傷肺。肺主諸氣。血常隨之。氣傷。則血無以運。故橫流而暴出。後隨病而上下也。其脈緩小者可治。細數加急者不可治。黃耆湯主之。

黃耆湯

黃耆
蜜炙
一兩

白朮
炒·二
兩

人參

甘草
炙·各
一兩

白芍
一兩

陳皮
半兩

藿香
半兩

右爲散。每服四錢。水一盞半。煎至七分。去滓溫服。

若衄血吐血。發作無時。肌肉減少。由氣虛弱。或從高墮下。勞傷所致。其脈虛弱。當補陰平陽。阿膠散主之。

阿膠散

阿膠
蛤粉拌·炒
一兩半

杏仁
炮去皮尖
七錢

馬兜鈴
焙

牛蒡子
炒·各
一兩

甘草
炙
一兩

糯米
一兩

右爲細末。熟水調下一二錢。

若吐血。腹中絞痛。汗自出。胸中悶。由飲食傷胃。胃氣不轉。氣上衝胸。所食之物與氣迫蹙。因胃裂。白朮湯主之。

白朮湯方缺。

全生指迷方卷三

諸積

論曰。若腹中成形作塊。按之不移。推之不動。動輒微喘。令人寒熱。腹中時痛。漸漸羸瘦。久不治之。多變成水虛勞。亦由憂思驚恐。寒熱得之。陰陽痞滯。氣結成形。其脈結澀。謂之積氣。萬安丸主之。

萬安丸

大戟炒

甘遂炒

牽牛炒

五靈脂各半

芫花炒一

膽礬研一錢

細墨燒一錢

巴豆去皮出油一錢

芫青頭去翅四十箇去

斑貓頭去翅二十箇去

石膏細研一分

延胡索兩炒半

吳茱萸兩炒半

右爲細末。白麵糊爲丸。如葵豆大。生薑橘皮湯下一粒。日二服。病去六七分。卽住服。史氏指南方有續。隨予郁李仁信丸。各一分。無延胡索、巴豆。袁當時大方有丸。一分。無斑貓、芫青、巴豆。若左脇下如覆杯。有頭足。久不已。令人發瘍瘍。寒熱欬。或間日一發。由肺病傳肝者。當傳脾。脾乘王而不受邪。其氣留于肝。故結而爲積。其脈澀結。麝香丸主之。

麝香丸

蓬莪茂炮一兩

桂心

當歸

人參各半

細辛去苗

川烏頭炮。去皮臍各分。

巴豆一分。去皮出油。

右研細末。白麵糊爲丸如棗豆大。食後飲下三粒。史氏指南方無蓬莪茂。有芍藥一兩。若心下如盤久不已。令人四肢不收。發黃疽。飲食不榮肌膚。始由肝病傳脾。脾當傳腎。腎乘王而不受邪。氣留於脾。其脈緩滯時結。謂之痞氣。三棱煎主之。孫氏仁存方云。兼治食癥。酒癥。血癥。氣塊。血瘕時發刺痛。婦人血分。男子脾氣橫泄。

三棱煎

京三棱剉。

蓬莪茂各四兩剉。

茺蔚一兩

右用米醋三升。煮令醋盡。獨炒茺蔚令乾。餘二味切片子。焙乾同爲末。白麵糊爲丸如豌豆大。橘皮湯下三粒。以知爲度。

若從少腹上衝心胸咽喉發痛。如肫肝狀。發作欲死。由脾病傳腎。腎當傳心。心乘王而不受邪。氣留於腎。結而爲積。其脈沉結。謂之責肫。責肫湯主之。

責肫湯

甘草炙

川芎

半夏湯洗七遍。

芍藥

黃芩各二兩。

葛根

甘李根皮各五兩。

右爲散。每服五錢。水二盞。薑五片同煎至一盞。去滓溫服。

史氏指南方加當歸一兩。

孫氏仁存方

加乾蠶一兩。一方當歸二兩無葛根。

若脈大而散時一結謂之伏梁。伏梁丸主之。

伏梁丸

青皮透白馬尿浸三日令軟切三十箇

巴豆去皮同炒乾十五箇去巴豆不用

羌活半兩

右爲末。白麵糊爲丸如棗豆大。飲下五粒。未知漸加至十粒。若身體及脾股脅皆腫。環臍而痛。不可動。動之爲水。亦名伏梁。椒仁丸主之。

椒仁丸

五靈脂

吳茱萸炒

延胡索炒半兩各

芫花醋浸一宿炒一分

續隨子去皮研

郁李仁去皮研

牽牛炒熟半兩各

石膏火煅過分研一

椒仁

甘遂炒一錢研

附子炮去皮梢

木香各半兩

膽礬一錢研

右爲細末。白麵糊爲丸。豌豆大。橘皮湯下一粒。早晨日午臨臥服。如婦人血分。則去木香。加斑蝥、芫青。各三十枚。去頭足翅。炒當歸半兩。

諸痛

論曰。諸心腹痛者。或外邪來客。或氣相干。其卒然痛而即止者。此寒氣客於脈外。得寒則縮。踰急。外引

小絡得熱即止。宜先用熨法後以良薑散主之。

熨法 指南方云治心腹痛卒然而止遇寒再發。

鹽極熟半斤炒

右以舊帛包熨痛處。指南方云漸去至一重。

良薑散

高良薑五兩去粗皮杵碎酒拌炒焦一兩

厚朴去皮二兩炙

桂心各三兩

當歸

右爲散每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服。

若腰者腎之外候足太陽經之流注如痛連小腹不得仰俛欬欬短氣由腎氣虛弱有所不榮補腎散主之。

補腎散

杜仲去粗皮杵碎酒拌炒焦一兩

桂去皮

牡丹皮各半兩

右爲末每服三錢用猪腎一箇批開移藥在內入鹽少許以線扎定水煮熟空心食之。

若隱隱腰痛以熱物熨痛處即少緩由處卑濕復爲風邪傷足太陽之經其脈緩澀白朮散主之。

白朮散

白朮二兩

芍藥三兩

桂去皮

附子炮去皮臍一兩剉各

右爲細末溫酒調二錢匕食前服。

若腰痛不能轉側由勞役動傷經絡或從高墮下氣滯於腰正氣流行相搏則痛其脈沉大小不常謂之腎腰趨痛丸主之。

趨痛丸

諸氣門見
趨痛散

若腰如錐刀所刺大便黑色小便赤黑此留血滯於腰間謂之血瀝腰痛其脈濶當歸丸主之。

當歸丸

當歸三兩剉
碎

水蛭三十箇好者炒

桃仁個去皮尖三十
個炒研

右爲末酒糊爲丸如梧桐子大酒下十粒未知加至三十粒。

若腰冷腹重如帶五千錢如坐於水由腎經爲陰濕所逼復受風冷久不治變成水病腎著湯主之。

腎著湯

甘草炙

乾薑各二兩

白茯苓

白朮各四兩

右爲散每服五錢水二盞煎至一盞去滓食前溫服。

若腰脊不舉由遠行勞倦逢大熱而渴陽氣內伐熱舍於腎水不勝火則骨枯而髓減蓋陽明併腎則腎脂枯而宗筋主束骨而利機關也是謂骨痿免絲子丸補腎散主之。

免絲子丸

兔絲子 揀淨·酒浸透·搗
爛·焙·二兩

乾地黃 培·二
兩

牛膝 酒浸·一兩

草薢 一兩

杜仲 去粗皮·杵碎·酒拌
一宿·炒焦·三兩

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大飲下三十粒食後服。

補腎散 見前

若脇痛不得息痛則欬而汗出由邪客於足少陽之絡屬膽宜灸足小指次指爪甲上與肉交處七壯竅陰二穴也。

若臂外廉痛手不及頭心煩喉痺者由邪客於手少陽之絡以針刺手大指次指之端去爪甲如蕪葉令血出而止。

若臂痛不能屈伸此邪客於臂掌之間取腕踝骨後以指按之極痛刺之留二呼急出針或灸。

若筋拘攣背急痛引脇下從項推下夾脊按之應手痛者於其上灸七壯未定加至十四壯。

若痛引小腹由寒氣客於厥陰之脈或脇肋相引腎肝脈弦大久成寒疝桂枝烏頭湯主之。

桂枝烏頭湯

桂心 三兩

芍藥 三兩

烏頭 炮·去皮臍
二兩半

甘草 炙·二
兩

右爲散每服五錢水二盞薑五片棗一枚同煎至一盞去滓入蜜半匙許再煎一二沸稍熱服。
眩暉

論曰。頭眩之狀。謂目眩旋轉。不能俛仰。頭重不能舉。目不能開閉。則不能視物。史氏指南云。此由邪客諸氣。陰陽持精神。發亂。上下相隔。氣復通則蘇。脈虛大而澀。謂之氣暈。流氣飲子草烏頭湯主之。或如反。或如浮水。或身如在車船上。是謂徇蒙。招尤。目瞑耳聾。下實上虛。過在足少陽厥陰。由肝虛血弱。則風邪乃生。蓋風氣通於肝。又曰。諸風掉眩。皆屬於肝。左手關脈虛弦。謂之風眩。香芎散、桃紅散主之。

香芎散

芎窮

獨活

旋覆花

藁本

去苗

細辛

去苗

蔓荊子

各一兩

石菖

研

甘草

炙

荆芥穗

各半兩

桃紅散

白附子

新羅

黃丹

等分

右同炒候黃丹深紫色。篩出黃丹不用。只將白附子爲末。清茶調下一錢匕。若頭眩發則欲嘔。心下溫溫。胸中如滿。由胸上停痰。胃氣不流。盤鬱不散。氣上騰入腦。腦滿則眩。關脈沉弦。或謂之痰眩。旋覆花丸主之。

旋覆花丸

見前熱證門

若但暈而不眩。發則伏地昏昏。食頃乃蘇。由榮衛錯亂。氣血溷濁。陽氣逆行。指南云。此由邪客諸氣。陰陽持精神。發亂。上下相隔。氣復通則蘇。脈虛大而澀。謂之氣暈。流氣飲子草烏頭湯主之。上下相隔。氣復通則蘇。脈虛大而澀。謂之氣暈。流氣飲子草烏頭湯主之。

流氣飲子

紫蘇葉

青皮

當歸

芍藥

烏藥

茯苓

桔梗

半夏

黃耆

黃耆

枳實

麸炒去瓢

防風

各半

甘草

炙三分

橘皮

洗各三分

木香

連皮大腹宿

剉薑汁浸一兩

川芎

三分

右爲散每服五錢水二盞生薑三片棗一個同煎至一盞去滓溫服。

草烏頭湯

草烏頭去皮尖生用

細辛去苗

茶芽等分

右爲散每服五錢水二盞煎至一盞去滓緩緩服盡。

若但欲上視自瞑不能開閉而眩睡出若涕惡風振寒由腎氣不足動作勞損風搏於肺腎氣不足膀胱不榮於外故使強上瞑視因其勞而受風在肺故睡出若涕而惡風謂之勞風芍藥黃耆湯主之。

芍藥黃耆湯

芍藥二兩

黃耆三兩

川芎二兩

烏頭炮去皮半兩

右爲散每服五錢水二盞薑三片棗一個同煎至一盞去滓溫服。

論曰。若暴厥。卒然不知人事。身脈皆動。其狀如尸。聽其耳中如循囁聲。股間暖。由邪氣折於手足少陰太陰足陽明之絡。五絡俱竭。腎氣微少。精血奔氣促迫。上入胸膈。宗氣反聚。血結心下。陽氣下墮。陰氣卒上而不交。陰陽離居。身溫而汗出。氣復反。則唇青身冷。此爲入藏。卽死。謂之尸厥。先以竹管吹左耳極三度。又吹右耳如前。灸熨斗熨兩脇。以石菖蒲末著舌下。及吹鼻中。又刺足大指內側爪甲去端如韭葉。入一分留三呼。謂隱白穴也。出之。又刺足心湧泉穴。如上法。又刺足中指爪上令破。如上法。謂厲兑穴也。又刺手大指內側去端如韭葉。又刺手心主。謂中衝穴也。又刺掌後銳骨之端。謂神門穴也。又剔取頭左角之髮燒灰。酒服方寸匕。不能飲灌之後。太乙神精丹。

太乙神精丹方缺。

若居常無苦。忽然如死。身不動。默默不知人。目閉不能開。口噤不能語。又或似有知。而惡聞人聲。或但如眩冒。移時乃寤。此由亡汗過多。血少氣併。血中氣血爭。陰陽亂。氣過血還。則陰陽復通。而人乃寤。謂之鬱冒。血厥。此證多生婦人。男子亦有之。白微湯、倉公散主之。

白微湯

白微一兩

當歸半兩

人參半兩

右爲散。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去滓溫服。

倉公散

瓜蒂

藜蘆

雄黃 研

礬石 時火研一伏

右等分爲末。以豆許吹鼻內。醒爲度。

若卒然昏冒無所知。或妄言語。此由暴驚心無所倚。神無所歸。久不治。陰陽相併。或陰氣併陽。陽氣併陰。令人九竅閉塞。狀類尸厥。菖蒲散主之。

菖蒲散

石菖蒲 一兩

麝香 研 一錢

右爲細末。酒調服二錢。或飲亦得。

若忽然瘓癰。瞑目不能語。喉中有聲。大便不通。胸滿欲嘔。或惡人聲。聞人聲則惕然而驚。或時叫。此得之暴驚。氣積而不散。伏痰聚於中脘。濕漬於脾。久而脾氣既耗。水氣乘之。則風動四末。宜先吐之。以勝金丸。次宜玉壺丸。以大便利卽止。有熱則脈洪數。此脾鬱於心。鐵粉丸主之。

勝金丸方缺。

玉壺丸方缺。

鐵粉丸

鐵粉 二兩

硃砂研 一兩

牛黃 研

天竺黃 研

鉛霜牛黃各研一兩

天南星

右爲末，蜜汁煮糊爲丸，如梧桐子大，生薑湯下五丸。

若素無疾而暴得瘧癆，發訖卽如常，經隔月日又復如前，由陰陽失其常度，氣血相併也。此謂之癓，宜龍齒丸、烏鵲散、獨活湯主之。

龍齒丸

牛黃研

麝香研

羚羊角剉

龍齒

龍骨

羊齒火煅赤

硃砂研

蛇退炒

白僵蠶炒

烏鵲散

右爲末，煉蜜和丸，如梧桐子大，飲下五丸，臨臥服。

獨活湯

獨活一兩

細辛去苗

僵蠶炒

牡丹皮三分

防已半兩

紫苑去苗

一分

右爲散，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去滓溫服。

若病人喜怒不常，獨閉戶牖而處，惡聞人聲者，蓋陽氣常動，因暴折而難決，肝膽氣鬱而不伸，故令喜怒。

謂之陽厥。宜鐵落飲無食肉及菖蒲散。

鐵落飲方缺。

菖蒲散見前。

若言語不避親疎。或棄衣而走。登高而歌。此思慮用心太過。神散不藏。又或悲哭。忽忽不樂。神有餘則笑。爲狂。勝金丸主之。神不足則悲。露朱丹主之。

勝金丸方缺。

露朱丹

好硃砂碎一兩。

右用真琉璃器盛之。露四十九夜。陰雨不算數。研細入牛黃半錢。研和滴熟蜜珠子丸如梧桐子大。空心人參湯下一粒。

若腫頭重足不能行。發則珣仆。此太陽厥也。烏頭湯主之。

烏頭湯見前眩門。

若喜怒嗌痛。不肉食氣奔走上刺足下中央之脈。血出而止。
痰飲

論曰。若咽中如炙肉癰。嚥之不下。吐之不出。由胃寒乘肺。肺胃寒。則津液聚而成痰。致肺管不利。氣與痰。

相搏其脈澀半夏厚朴湯主之。

半夏厚朴湯

半夏湯洗七遍
一五兩

厚朴去皮
炙
三兩

茯苓

紫蘇葉各二
兩

右爲散每服五錢水二盞生薑十片同煎至一盞去滓食前溫服。若心下盤旋欲吐不吐由飲癖停留不散枳朮湯主之。

枳朮湯

白朮四兩

枳實麸炒
去瓢
二兩

右爲散每服五錢水二盞煎至一盞去滓食前溫服。

若腹滿按之沒指隨手而起餘與正水皆同但四肢顛動其脈亦浮由肺氣久虛爲風邪所客氣不得運百脈閉塞氣結陰聚成水謂之皮水亦宜發汗先以防已湯次以大豆散。

防已湯

防已三兩

人參四兩

桂心二兩

茯苓四兩

右爲散每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服。

大豆散方快

若欬嗽喘不得臥面浮腫脈弦急或遲由肺胃停塞水聚成飲支乘於心氣不得下謂之支飲宜先用十

聚湯瀉之後宜防已湯主之。

十聚湯

茺花炒黑

甘遂

大戟各等分

大聚十枚

右先煮聚去滓。內前藥末。強人服一錢。虛人服五分。若病不除。再服。得快下爲度。後以糜粥自養。

防已湯

見前

消證

論曰。消渴之病。其來有二。或少服五石湯丸。恣慾不節。不待年高。氣血衰耗。石性獨存。火烈焦槁。精血涸竭。其狀渴而肌肉消。又有積久飲酒。酒性酷熱。薰蒸五藏。津液枯燥。而血澀。其狀渴而肉不消。如解五石毒者。宜瞿粟湯。欲止渴者。宜兔絲子丸。大渴而加煩熱者。宜馬通散。栝樓粉。

瞿粟湯

見前

兔絲子丸

兔絲子不計多少。水淘。酒浸三宿。揀淨。

右控乾。乘潤。搗羅爲散。焙乾。再爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。食前飲下五十粒。一日二三服。或作散。

飲調下三錢。瑣碎錄云。用酒浸晒於日中三兩日。一換酒。用時洗去酒。濃煎湯飲。

馬通散方缺。

桔梗粉 方缺

若其人素渴引水，一旦不飲不渴，小便日夜數十行，氣乏肉消脫，此消中腎氣敗也。茱萸丸主之。

茱萸丸

蒼朮 洗切、焙

五味子 炒

山茱萸

乾山藥 等分

右爲末，酒糊爲丸，如梧桐子大，飲下三十粒，空心服。

痘病

論曰：黃疸之病，皆屬於脾。脾屬土而色黃，惡濕，濕勝則土氣不行而鬱，故發則真色見。蓋黃疸本得之濕，瘀熱在裏，濕熱相搏，身必發黃。若先有留熱，而後爲濕氣所加，則熱多而濕少。治之先導其熱，若先爲濕氣所乘，而後有熱，則濕多而熱少。治之先去其濕，去其濕則熱從而去。亦有因冷癥結，陰加於陽，上下氣不通，而脾氣不行，則陰氣鬱而生濕。其狀胸中痞，嘔逆，時惡寒，當先除痞，利其小便，則濕自去。脈洪大，便利，加渴者死。脈微小，小便不利，不渴，則生。若病人一身悉黃，四肢微腫，胸滿不得臥，汗出如黃蘖汁，此由大汗出，卒入水中所致。苦酒湯主之。

苦酒湯

黃耆 五兩

芍藥

桂心 取心、各三兩

右爲散，每服五錢，水二盞半，苦酒半盞，同煎至一盞，去滓溫服。

若因他病未除忽然一身面目悉黃如橘。瘀熱在裏也。或因大熱以冷水洗之。濕熱相搏。薰蒸肌肉。謂之黃疸。藥皮湯主之。茵陳五苓散主之。

藥皮湯

黃藥

黃連

黃芩

各等分

茵陳五苓散

茵陳一兩

猪苓

茯苓

白朮炒各十八錢

澤瀉半兩

桂心半兩

右爲散。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去滓溫服。

若心下懊痛。足膝脛滿。小便黃。面發赤斑。由大醉當風入水。濕加於熱。內蒸脾氣。謂之酒疸。治屬飲家。茯苓半夏湯主之。

茯苓半夏湯

茯苓四兩

半夏二錢半洗七遍湯

旋覆花三錢

甘遂剉末一錢炒

右爲散。每服五錢。水一盞半。煎至一盞。去滓溫服。

若脈浮。腹滿欲嘔吐者。先吐之。瓜蒂散主之。脈沉。腹滿。大便祕。先利之。大黃丸主之。

右咬咀水二盞。煎至一盞。去滓。將甘遂末分二服。用藥汁半盞調服。以利爲度。

瓜蒂散

瓜蒂

赤小豆

秫米^{等分}

右爲細末。粥飲調方寸匕。以吐爲度。

大黃丸

大黃^煨

葶苈^{各等分}

右爲細末。煉蜜和丸如梧桐子大。蜜湯下十粒。以利爲度。

全生指迷方卷四

欬嗽

論曰。古書有欬而無嗽。後人以欬嗽兼言之者。蓋其聲響。毫不因痰涎而發。謂之欬。痰涎上下隨聲而發。謂之嗽。如水之漱蕩能漱其氣也。諸欬之原。其來雖各不同。其氣必至於肺而後發。若非其時。感邪而發。欬者。固因藏氣虛弱。抑或五行之氣。內相剋制。病作卽治。無使傳注。不卽治之。傳注他臟。遂至不起。然有因寒者。因風者。因熱者。風寒從外至。熱則從內起。風寒則諸經自受其邪。熱則臟腑薰蒸。乘而爲病。風則散之。寒則溫之。熱則調之。瀉之。因風者惡風。出風中則欬甚。因寒者遇寒則劇。因熱者得熱則發。若因外感風寒。不卽治之。邪氣留淫日深。攻傷藏氣。一藏受極。遂傳其所不勝。如肺經受病久而不去。欬則右脇痛不可轉側。遂傳之肝。肝屬木。肺屬金。金剋木。欬引左脇不可臥。臥則欬劇。遂傳之脾。脾土也。爲木來剋。則大便鴟溏。甚則瘻癰。如癟狀。次傳之腎。腎屬水。爲土所剋。則骨痿不能起於牀。手足浮腫。次傳之心。則死。若因藏氣自相薰蒸。如心乘於肺。急補肺而瀉心。補肺宜辛甘。瀉心宜苦。若脾熱薰蒸。但瀉其脾。治以甘平。調肺以辛溫。謂之間傳學宜知此。

若肺欬惡風脈浮。小青龍湯主之。
惡寒脈緊。杏子湯主之。

微弱者鍾乳丸主之。

惡熱喉燥脈數甚則咯血天門冬湯杏子湯主之。孫氏仁存活法祕方肺欬之狀喘息有音甚則咯血。

小青龍湯

銀門見寒

杏子湯

杏仁尖去皮

乾薑

細辛去苗

甘草炙各半兩

五味子

桂心各一兩

桂心

細辛去苗

甘草炙各半兩

五味子

鍾乳丸

鍾乳銀石器內煮一伏時

紫苑去苗及枯燥者

桑白皮一分剉

款冬花

黃耆各半兩

紫苑半兩

桑白皮微炒

款冬花

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大飲下三十九食前服。

天門冬湯

天門冬去心各半

紫苑去苗及枯燥焙

知母一兩

桑白皮

五味子

桔梗各半兩

右爲散每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服欬血者阿膠半兩炒燥大便澀而喘加葶藶半兩。

若心欬脈浮惡風桂心湯主之。

惡寒時口噤脈緊大附子細辛湯主之。

惡熱脈疾小便赤澀茯苓湯主之。

桂心湯 孫氏仁存活法祕方云心欬之狀上引心痛喉介介然如梗甚則咽喉腫痛脈浮惡風宜桂心

湯、

人參

桂去心

白茯苓各一兩

麻黃

貝母炒各半兩

遼志去心

甘草炙各一分

菖蒲各一兩

甘草

秦艽去土各半兩

附子細辛湯

附子炮去皮脂

細辛去苗各半兩

人參

菖蒲各一兩

五味子二兩

柴胡去苗各半兩

甘草炙各半兩

右爲散每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服。

茯苓湯

茯苓

去皮尖

麥門冬去心各一兩

黃芩各一兩

秦艽去土各半兩

柴胡去苗各半兩

杏仁一分去皮尖

右爲散。每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服。

若肝欬惡風脈浮弦射干湯主之。孫氏仁存活法祕方云。肝欬之狀。欬則兩脇痛甚。則不可轉側。轉側兩脇下滿。

惡寒脈弦緊五味子煎主之。

惡痛脈疾目赤頭眩百部丸主之。

射干湯

射干 五兩 麻黃 去根節 各半兩

五味子

半夏 湯泡七遍 各一兩

款冬花 二兩

右爲散。每服五錢水二盞薑五片同煎至一盞去滓溫服。

五味子煎

五味子 五兩

桂 取心 一兩

川烏頭 炮 去皮臍 一兩

右爲末。水五升煎至一升。絞取汗用好蜜二兩再熬成膏。溫酒化彈子大食前服。

百部丸

百部 八兩 細末 為

生地黃 五斤 熟成膏 取汁

右將地黃膏和百部爲丸如梧桐子大飲下三十粒食後服。

若脾欬惡風脈浮緩麻黃厚朴湯主之。孫氏仁存活法祕方云。脾欬之狀。欬則右脇下痛引肩背痛甚。

則不可以動。動則欬劇。

口中如含霜雪。中脘隱隱冷惡寒。脈緊弱。溫中丸主之。
大便堅。從腹上至頭發熱。脈疾。茯苓丸主之。

麻黃厚朴湯

厚朴 去皮、薑汁
炙、炙、炙

麻黃 去根
湯洗七遍

杏仁 尖、去皮
各半兩

橘皮 洗、各
二兩、各半

甘草 炙、炙、炙

半夏 湯洗七遍
各半兩

細辛 去苗
各半兩

右爲散。每服五錢。水二盞。薑五片。同煎至一盞。去滓。溫服。

溫中丸

乾薑

半夏 湯洗七遍
各一兩

白朮 二兩

細辛 去苗
各半兩

胡椒 各半
兩

右爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。米飲下三十粒。食前服。

茯苓丸

茯苓

黃芩 各一
兩

五味子 半兩

半夏 湯洗七遍、切、薑
汁浸焙三分

橘皮 洗、一
兩

桔梗 半兩
各半兩

右爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。米飲下三十粒。食後服。

若腎欬惡風脈浮。白前湯主之。孫氏仁存活法祕方云。腎欬之狀。則腰背相引疼痛。

惡寒。睡冷沫。小便數。脈緊。椒紅丸主之。
惡熱骨間煩疼。地骨皮湯主之。

白前湯

白前

細辛

去苗

川芎

五味子

各一兩

麻黃

去根節

右爲散。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去滓溫服。

椒紅丸

椒汗去目半兩炒出

款冬花

紫苑去苗及枯燥者半兩

乾薑各一兩

礬石火煅一伏時

附子炮去皮鹽半兩

細辛去苗半兩

阜莢去子酥炙半兩

右爲細末。煉蜜和丸如梧桐子大。米飲下三十粒。食前服。

地骨皮湯

地骨皮

百部各二兩

芍藥

赤茯苓各一兩

右爲散。每服五錢。水二盞。竹葉十片。同煎至一盞。去滓。食後溫服。

若癰骨赤大如錢。日晡發熱者死。若潮熱有時。五心煩熱。搏於榮衛。不欬者易治。脈促濶者難治。青蒿煎、柴胡芍藥湯主之。

青蒿煎

一

青蒿汁
升

人參

麥門冬

去心
二兩

右將二味爲末用青蒿汁同熬成膏丸如梧桐子大飲下二十粒食後服。

柴胡芍藥湯

一

柴胡
去苗

芍藥
各一
兩

地骨皮

石膏
各半
兩

右爲散每服五錢水二盞小麥五十粒同煎至一盞去滓食後溫服。

若但嗜臥飲食不榮肌膚或不能食心腹虛脹滑泄背膂牽急勞倦不能動止或因大病後或因下利後不復常得之於脾脈弦大甚者不治四肢煎厥亦謂之肉極。灸肝散白朮丸主之。

灸肝散

見前氣
證門

白朮丸

白朮

橘皮
一兩
洗各

厚朴

去皮
炙
一兩
蜜汁塗

人參
各半
兩

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大米飲下三十九丸。

若欬嗽如膿涕或微喘急短氣脇下痛皮膚乾燥動則欬極由形寒飲冷傷於肺經久嗽不已則肺枯燥令人先寒後熱脈弱者可治或緊或弦者不可治

喘證

論曰。凡人一呼一吸謂之息。呼出心肺。吸入腎肝。呼吸之間。脾受其氣。則榮衛行陽二十五度。行陰亦二十五度。而周身之氣無過不及。若藏氣乘併。則榮衛不能循常。氣過周身失度。不能隨陰陽出入以成息。故促迫而喘。諸氣併上於肺。肺管隘。則氣爭而喘也。其始或因墜墮恐懼。恐則精却。精却則上焦閉而氣不行。氣不行則留於肝。肝乘於肺。此喘出於肝也。或因驚恐驚心。心無所倚。神無所歸。氣亂而氣乘於肺。此喘出于心也。或因渡水跌仆。腎氣暴傷。腎氣乘肺。此喘出於腎也。或因飽食過傷。動作用力。穀氣不流行。脾氣逆而乘肺。此喘出於脾也。圍參散主之。

若喘而發熱。頸脈皆動。日漸瘦削。由客熱乘肺。或因飲食失宜。氣不轉而氣急。悞服熱藥。火氣薰肺而遂喘。頰赤咽燥。其脈細數。治屬骨蒸。小建中湯。天門冬湯主之。

圍參散

- | | | | | | | | | | |
|-----|---------|-----|-----------|--------|----------|----------|----------|----|--------|
| 人參 | 一兩 | 桑白皮 | 剉炒
二兩 | 大腹皮 | 剉炒
一兩 | 麥門冬 | 去心
一兩 | 橘皮 | 洗
兩 |
| 吳茱萸 | 炒
半夏 | 一兩 | 檳榔 | 剉
炒 | 附子 | 炮
附子皮 | 桂心 | 澤瀉 | 各半 |
| 桂心 | 各一 | 荳子 | 炮去核
半兩 | 杏仁 | 去皮尖
研 | 枳實 | 麸炒
半兩 | | |
| 白朮 | 牛兩 | | | | | | | | |

右爲細末。薑汁煮糊爲丸。如梧桐子大。米飲下三十粒。食前服。

小建中湯

芍藥六兩

桂心三兩

甘草炙二兩

右爲散每服五錢水二盞生薑三片棗二箇同煎至一盞去滓溫服

天門冬湯

天門冬去心一兩

馬兜鈴

百部各半兩

右爲散每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服

若喘嗽時血出四肢懈怠脈浮大而沉由腎氣上併於胃氣道壅塞血無所行而散溢於脾精不化上不勝下脾之絡脈外絕去胃外歸陽明白朮丸主之

白朮丸

麥門冬去心

人參

茯苓

白朮

澤瀉

生地黃焙

大豆卷各二兩

桑白皮炒二兩

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大米飲下三十粒食前服

若病人不臥而有所不安則喘者藏有所傷精有所寄故不得臥而喘肺氣盛脈滿大也牡蠣散主之

牡蠣散

用左顎牡蠣文片色白正者二兩先杵爲粗末以乾鍋子盛火燒通赤放冷研爲細末每服一錢濃煎鯽魚湯調下不拘時鯽魚重四兩者一箇去鱗肚濃煎煎時不許動

若欬嗽逆。倚息喘急。鼻張。其人不得仰。咽中作水雞聲。時發時止。由驚憂之氣畜而不散。肺氣鬱。或因過飽勞傷。氣上行而不能出於肺。復遇寒邪。肺寒則諸氣收聚。氣緩則息有所觸。則發。經久則不能治。杏子散主之。及灸腎俞百壯。

杏子散

杏仁去皮尖·炒黃
色·研成膏

麻黃爲末·等分

右研和。煎橘皮湯調二錢匕。

玉腋散

人參

川芎

茯苓

桂心各一兩

馬兜鈴

半兩

知母

貝母炒

杏仁去皮尖·炒黃

葶藶炒

半夏麵各一兩

柴胡

去淨苗一兩

石膏研

荳子炮·各二兩

橘皮洗·兩半

麻黃去根節一兩

白朮

半兩

甘草炙

羌活各半兩

右爲細末。每服三錢。水一盞半。生薑三片。聚一箇。煎至一盞。去滓。食前溫服。

若喘息肺鳴而痿蹶。由有所失亡。所求不得。氣鬱而肺熱。葉焦上舉。是謂肺痿。阿膠丸主之。

阿膠丸

天門冬去心

桔梗

生乾地黃焙

阿膠剉·炒

桑白皮剉炒

麥冬去心

柏子仁炒研各半兩

甘草炙三分

右爲末。煉蜜和丸如彈子大。每服一丸。水一盞。煎至七分。食後溫服。

嘔吐

論曰。嘔吐者。由清濁不分。中焦氣痞。若心下牢大如杯。或時寒時熱。朝食則暮吐。暮食則朝吐。關脈弦緊。弦則爲虛。緊則爲寒。虛寒相搏。此名爲格。與關格同也。是謂反胃。青金丹、朴附丸主之。

青金丹

硫黃

水銀

木香末

右將硫黃水銀二味同研。令不見水銀星子爲度。合木香再研。用生薑汁煮糊爲丸如梧桐子大。米飲下三粒。食後服。

朴附丸

厚朴去皮・剉作小塊子

附子炮去皮臍・剉作小塊子・各一兩

生薑八兩・去皮取汁

右將二味以薑汁同煮。盡汁爲度。焙乾爲末。酒養。和丸如梧桐子大。米飲下三粒。食前服。

若心中溫溫常欲嘔。聞食吐酸。由宿寒在胃。不能運水穀。中腕成痰。其關弦脈小而短。白朮丸、大半夏湯主之。

白朮丸 史氏指南方無橘皮。

白朮 三兩 半夏 湯洗七遍
二兩 橘皮 洗

乾薑 各三
兩

丁香 一兩

右爲細末。薑汁煮糊爲丸如梧桐子大。薑湯下三十九。食前服。

大半夏湯

半夏 一升 人參 一兩 白蜜

右爲末。每服三錢。水一盞。煎至半盞。加白蜜少許。食前服。

若心上汪洋嘈煩。頭目時痛。胷中不利。或嘔膽汁。大便或利或祕。喜渴。此中脘伏痰。旋覆丸主之。

旋覆花丸 見前熱證門

若心下虛滿。不入飲食。時時欲嘔。嘔無所出。欬欬短氣。由他病差後。復爲寒邪傷氣。氣寒則不能食。胃無穀氣以養。其脈微弱。大藿香散主之。

大藿香散

藿香葉

人參

茯苓

桔梗

木香

桂 取心

白朮 各半
兩

半夏 湯洗七遍爲末
和成餅子
半兩

枇杷葉 十片
去毛
刷

右爲末。每服三大錢。水一盞。炒薑絲一分。與藥同煎至七分。去滓。食前溫服。劉孟容瑣碎錄名藿香湯。

若心下煩。不喜熱物。得熱即嘔。喜渴。由胃受邪熱。胃熱則氣濁。陰陽渾亂。其脈虛數。或細而疾。竹茹湯主。

之。

竹茹湯

竹茹

橘皮

甘草

半夏

赤茯苓

麥冬

人參

枇杷葉

半夏

右加薑聚煎。胃寒去竹茹。麥冬加丁香。實火去人參。

若心下悶亂。嘔吐不止。臥起不安。手足躁擾。水漿不下。由冷熱不和。邪正相干。清濁不分。陰陽錯亂。喜冷者。因熱惡冷者。因寒。名曰霍亂。其脈弦大者。寒也。大理中湯、半硫丸主之。其脈數疾者。熱也。小薑香散、青金散主之。

大理中湯方缺。

半硫丸

半夏湯洗七遍
焙爲末

硫黃

右研細。生薑汁煮糊爲丸。米飲下三十九。

小薑香散

丁香

枇杷葉去毛

乾葛

赤茯苓

藿香葉

甘草

右爲末。每服三錢。水一盞。生薑三片。同煎至一盞。去滓温服。

青金散方缺。

若卒然嘔吐。胷中痞悶。氣不行。由飲食過傷。胷氣滯而不轉。胃中爲濁逆行。則吐。其脈沉疾。金汁丸主之。

金汁丸方缺。

若痛而嘔者。此寒氣客于腸胃。腸胃得寒。則聚沫。聚沫則痛。痛則氣逆。逆則津液反出而嘔。其脈緊細而滑。粳米湯主之。

粳米湯

附子炮去皮臍·切

半夏湯浸七遍·切片

甘草炙·剉碎

陳粳米二兩

附子炮去皮臍

半兩

附子炮去皮臍

半兩

右拌和。分作十二服。每服用水三盞。薑十片。同煎至一盞。去滓温服。

若因嘔而噦者。吳茱萸丸主之。

吳茱萸丸

炒·一

橘皮洗·二

附子炮去皮臍

半兩

附子炮去皮臍

半兩

右爲細末。白麵糊爲丸。如梧桐子大。飲下二十粒。食前服。

小便附大便·

論曰。小腸爲受盛之府。傳導水液。若始覺小便微澀赤黃。漸漸不通。小腹脹脹。由心經蘊熱。傳於小腸。小腸熱則滲於脬中。脬辟而系轉。診心脈大而牢。用翦葉散或石葦湯主之。

翦葉散

蓼茶翦葉灰一兩燒

滑石研半兩

右爲細末。沸湯浸服。或小便暴不通。點好茶一盃。入生油三兩點飲之。

石葦湯

石葦去毛剉

車前子可剉車前葉亦等分

右濃煮汁飲之。若腹脹瀉不得好臥。屈膝陰縮腫。此厥陰之厥。加赤茯苓黃芩八兩。如前。

若卒暴小便不通。脅腹膨急。氣上衝心。閉絕欲死。由忍尿勞役。或從驚恐氣無所伸。乘併膀胱。氣衝脬系。不正。診其脈右手急。大葱白湯主之。

葱白湯

橘皮洗切三兩

葵子一兩

葱白三莖切

右以水五升煮取二升。分三服。

固脬丸

茴香炒一兩

桑螵蛸炒半兩

菟絲子揀淨酒浸一宿乘潤搗爛二兩

戎鹽炒一分

附子 炮去皮臍半兩

右爲細末。煮糊爲丸如梧桐子大。飲下三十粒空心服。

若小便純血。血下則凝。亦無痛處。憊憊短氣。由陽氣不固。陰無所守。五液注下。其脈散濇。欲絕而身冷者死。旋蓉丸主之。

旋蓉丸 史載之指南方治虛勞漏血。加桑螵蛸半兩。炙酒糊爲丸。鹽湯下。

兔絲子

揀淨。酒浸一宿。乘潤搗爛。再焙。

肉旋蓉

洗切

鹿茸

去毛。截片。酥炙。

乾地黃

等分

右爲細末。煮糊爲丸如梧桐子大。米飲下三十粒空心服。

若大腸爲傳導之官。變化出焉。如大便不通者。津液燥也。慎無以烈藥。宜紫蘇丸主之。

紫蘇丸

紫蘇子 研去皮

橘皮 洗二兩各

知母 一兩

右爲末。用生薑汁調成稀膏。於重湯上煮。不住手攪。候可丸如梧桐子大。蜜湯下三十粒。

婦人科

四物加桂湯 治忽然寒熱。

川芎

當歸 洗焙

芍藥

地黃 精

桂心 等分

右爲散。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去滓溫服。史載之指南方內無川芎。

葶苈丸 治先因小便不利後身面浮腫致經血不行此水乘於血名曰水分

甜葶苈 炒 繢隨子去皮研各半兩 乾筍一兩

右爲細末熟棗肉和丸如梧桐子大煎扁竹湯下七粒如大便利者減葶苈續隨子各一分加白朮半兩食後服

牡丹丸 治經候時行時止或淋漓不斷腹中時痛其脈沉澀由寒熱邪氣客於胞中留而爲血滯當有所去乃愈

大黃 蒸 附子炮去皮 伏苓

牡蒙

牡丹皮

桔梗 各二

芎藭

人參

厚朴

去皮蘆

當歸 烘各半兩

甜葶苈 炒各二兩

椒汗 半兩

蟲蟲 去頭足翅五十箇

吳茱萸 炒

柴胡 去苗

乾薑

桂半兩 去心各半兩

細辛 半兩

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大酒下十粒未知加至二十粒食後服

小薊湯 治經候過多遂至崩漏色鮮明如水下得溫則煩至于昏悶其脈數疾微小爲順大者逆由陰虛陽搏爲熱所乘傷于衝任血得熱則流散衝任不能收也

小薊莖葉 洗切研服 汁一盞

生地黃汁 一盞

白朮 半兩 煙剉

右以水一盞同煎取一半去滓分三服

人參白朮散 治婦人經候不來。身如病而無病。脈滑大而六位俱勻。謂之陰搏陽。有子也。精神如故。惡聞食臭。但嗜一物。或大吐時吐清水。此名惡阻。慎毋作他病治之。

白朮 一兩

人參 半兩

丁香

甘草 炙各一分

右爲末。每服三錢水一盞。生薑三片。同煎至七分。去滓。食前溫服。

秦艽散 治胎動不安。

秦艽

阿膠 炒

艾葉 等分

右爲散。每服五錢水二盞。糯米百粒。同煎至一盞。去滓溫服。

白朮散 治妊娠面目腫如水狀。

橘皮 洗

大腹皮

茯苓

生薑 各半兩

右爲末。飲調方寸匕。食前服。

兔血散 治難產。最要臨產服之。

臘兔血

右用蒸餅切片子。蘸血陰乾爲末。煎乳香湯調服二錢。

半夏散 治胎死腹中。其母面赤舌青者是。

半夏 湯洗七遍。薄切片。

炒乾。

右爲末。溫酒調下一錢。不能酒用湯亦治。橫生逆產。

桃仁湯 治惡路頓絕。或漸少。腰重痛下注。兩股刺痛如錐刀刺。此留血於經絡。不卽通之。大有痛處。必作癰腫。

蘇木

地黃

桃仁

去皮尖炒各半兩

蟲蟲

去頭足翅炒各三

水蛭

炒各三十枚

右爲散。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去滓。食後溫服。

五香湯 治同前。

木香

丁香

沉香

乳香

麝香

升麻

獨活

連翹

木通

各半兩

大黃

桑寄

右爲散。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去滓。食後溫服。

沒藥丸 治惡路方行忽然斷絕。驟作寒熱。臍腹大痛。胸中如以針刺。此大有畜血。留於經絡。

當歸

焙一兩

桂心

芍藥

各半兩

沒藥

一分

桃仁

去皮尖炒一分

蟲蟲

去頭足翅炒

水蛭

各三枚炒

右爲細末。醋糊丸如梧桐子大。醋湯下三丸。

皁角散 治乳婦吹奶。由哺兒時。鼻氣沖乳中。忽然腫硬痛急。手揉服皁角散、枯棲散及敷藥。不卽治之。

結癰膿能殺人。

阜角燒粗研 蛤粉研分等

右研細熱酒調一匙或半錢急以手揉之取軟爲度。

瓜子湯 治腸頭如以針刺連穀道又因痔痛小便如淋狀時寒時熱此由產時用力氣併腸間亦由陰虛邪熱乘客留聚腸間熱結恐成腸癰。袁當時大方云崔左丞屢用有效。

薏苡仁炒四兩 桃仁尖去皮三兩 牡丹皮各三兩 瓜子一兩

右爲末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服。