



3092952

吞酸嘈雜

噎膈

反胃

嘔吐

噦哕

呃逆

霍亂

泄瀉

痢疾

瘧疾

心下

痞堅
諸病

脹滿

諸腫

本草類方乙

本草類方卷之二

吞酸嘈雜第十四

食積痰火 瀉肺火胃火白石膏火煨出火毒半斤為末醋和丸梧子大每服四五十九白湯下

溪方 丹

食已吞酸

胃氣虛冷者吳茱萸湯泡七次焙乾薑炮等分為末湯服一錢。聖惠方

醋心吐水

欖榔四兩橘皮一兩為末研服方寸匕空心生蜜湯調下。梅師方

醋心上攻

如濃酸用茱萸一合水三盞煎七分頓服近有人心如蠶破服此二十年不發也累用有效。

兵部手集

嘈雜吐水

真橘皮去白為末五更安五分於掌心紙之即睡三日必效皮不真則不驗。怪證

本草類方

吞酸嘈雜 卷二

奇方

食物醋心

胡桃爛嚼以生薑湯下立止。傳信適用方

食已吞酸

胃氣虛冷者吳茱萸湯泡七次焙乾薑炮等分為末湯服一錢。聖惠方

食積痰火

瀉肺火胃火白石膏火煨出火毒半斤為末醋和丸梧子大每服四五十九白湯下

吞酸嘈雜第十四

本草類方卷之二

本草類方卷之二

噎膈第十五

噎

疾。古塚內罐罌中水，但得飲之，即愈。極有神效。壽域方。

噎食不納

畢澄茄、白豆蔻等分，為末，乾服之。壽域神方。

噎膈反胃

之煨魚待冷，取中間濕者，焙乾一錢，入檳榔二錢，丁香二箇，研勻，每服七厘，燒酒送下。日三服，愈即止。後喫自粥，半月仍服。助

胃丸藥。孫天仁集效方。用北庭砂二兩，一兩用人言末，一兩入罐內，文武火煎

三炷香，取出燈蓋上末，一兩以黃丹末一兩同入罐內，如上法煎過，取末用桑灰霜

一兩，研勻，每服三分，燒酒下，愈即止。又方：平胃散各一錢，入鹵砂生薑各五分，為

本魚類方

噎膈

二

末沸湯點服二錢，當按北庭砂。吐山黑物如石，屢驗。即鹵砂。

噎食膈氣

馬蹄香即沉香，四兩為末，好酒三升，煑膏每服二匙，好酒調下，日三服。孫氏集效

噎膈拒食

端午采頭次紅花，無灰酒拌焙乾，血竭瓜子，搽者等分，為末，無灰酒一盞，隔湯頓熱

徐噍初服二分，次日四分。三日五分。楊起簡便方。

噎食不下

鳳仙花子酒浸三宿，晒乾為末，酒丸綠豆大，每服八粒，溫酒下，不可多用，即急性子也。摘。

玄方

五噎吐逆

心膈氣滯，煩悶不下，食蘆根五兩，剉以水三大盞，煮取二盞，去滓溫服。金匱玉函

膈氣噎噎

甘遂、麩、五錢、南木香一錢，為末，壯者一錢，弱者五分，水酒調下。怪病奇方。

噎食不下

赤稻細稍，燒灰滾湯一盞，隔絹淋汁三次，收汁入丁香一枚，白豆蔻半枚，米一盞，煮

消食神效。
摘玄妙方

噎食

蕎麥稻燒灰淋汁入鍋內煎取白霜一錢入蓬砂一錢研末每酒服半錢。海上方

膈氣

生飛。生搗汁一。集簡方

噎塞膈氣

威。一。把醋蜜各半盥煎五分服之。出宿痰愈。唐瑤經驗

噎食病

米湯每服一錢。白鷺尾毛燒灰

膈氣噎塞

飲食不下用確嘴上下細糠蜜丸。彈子大時時含藥津液。聖惠

梅核膈氣

取半青半黃梅子每個用鹽一兩滷一日夜曬乾又浸又晒至水盡乃止用青錢三個夾二梅麻線縛定通裝磁罐內封埋地

下百日取出每用一枚含之嚥汁入喉即消收一年者治一人二年者治二人其妙絕倫。龔氏經驗方

本草類方

噎膈 卷二

卒然食噎

橘皮一兩湯浸去瓢焙為末以水一大盞煎半盞熱服。食醫心鏡

膈氣疼痛

白玉散用壁上陳白螺螄燒研每服一錢酒下甚效。孫氏

食

噎 鷹糞燒灰水服 方寸七。外臺

噎膈吐食

用蛇含蝦蟇泥包煨存性研末每服一錢酒下。壽域方

噎

膈 用蛇含蝦蟇泥包煨 存性研末水飲服

噎塞不通

婦木梳一枚燒灰前鎖匙湯調下二錢。生生編

噎塞不通

於羊角屑為末飲服方寸匕并以角摩噎上。外臺

膈氣吐食

用地牛兒二箇推屎虫一公一母同入罐中待虫食盡牛兒以泥裹煨存性用去泥

陳皮二錢以巴豆同炒過去豆將陳皮及虫為末每用一二分吹入咽中吐痰三四

次卽愈。孫氏業效方。

膈氣吐食

用大鯽魚去腸留鱗切大蒜片填滿紙包十重泥封晒半乾炭火煨熟取肉和平胃散末一兩杵丸梧子大密收。

噎膈不食

黃犬乾餓數日用生粟或米乾飼之俟其下糞淘洗米令淨煮粥入薤白一握泡熟去薤入沉香末二錢。

反胃噎膈

大力奪命丸牛嚼草杵頭糞各半斤糯米一升為末取黃母牛涎和丸龍眼大煮熟食之。永類鈴方。

老人噎食

食之入沙糖二兩尤妙。醫學正傳。不通黃鴨雞肉四兩切茯苓二兩白麵六兩作餛飩入豉汁煮食三五服效。養老書。

本草類方

噎膈卷二

噎食病

數月不愈者用狗寶為末每服一分以威靈仙二兩鹽二錢搗如泥將水一鍾攪勻去滓調服日二不過三日。

氣噎不通

愈後服補劑。杏林摘要。雞紫兩枚連食以濕紙包黃泥固煨存性為末入木香沉香丁香末各一錢棗肉和九梧子大每服下三丸。

噎食不下

人尿入蘿蔔內火煉三炷香取研每服三分黃酒下三服效。海上名方。用生人膽一箇盛糯米令滿入麝香少許突上陰乾一半青者治瘡一半黑者治噎。

噎食反胃

並為末每服十五粒瘡用陳皮湯下噎用通草湯下。俱出普濟方。諸藥不效真阿魏一錢野外乾人屎三錢為末五更以薑片攤食能起死人乃趙王困方也。

永類鈴方。

噎氣不食

入靈蓋七箇每箇用黑豆四十九粒層層隔封水火升降楊梅色冷定取出去豆不

噎食反胃

用研 塊服 錢溫 酒下 坏氏集效方 枳石 卅一錢白湯 下註 卅方摘要

噎食

取 性為末每服一匙以溫酒服。壽域神方 生毛者一對用黃泥固濟煨存

本草類方

噎膈 卷二

五

噎食

掛盆米研一投以塊醋煎。壽域神方

噎食反胃

下註 卅一錢白湯 卅方摘要

噎食不食

掛盆米研一投以塊醋煎。壽域神方

本草類方卷之二

反胃第十六

翻胃吐食

男婦皆治白善土煨赤以米醋一升淬之
再煨再淬醋乾為度取一兩研乾薑二錢
半炮為末每服一錢調下服

反胃吐食

至一斤以止為妙。干金翼
或五味淹炙食。普濟
地龍糞一兩木香三錢大黃七錢為末每
服五錢無根水調服忌煎炒酒醋椒薑熱

反胃轉食

物一二服其效如神
鄧真人經驗方

反胃吐食

竈中土年久者為末米飲
服三錢經驗。百一選方
梁上塵黑驢尿調

翻胃吐食

服之。集簡方

本草類方

反胃噦逆

黑鉛化汁以柳木地研成粉一兩入米醋
一升砂鍋熬膏入蒸餅末少許擣丸小豆
大每服一丸薑
湯下。聖劑

多年反胃

不止紫背鉛二兩石亭脂二兩鹽鹵汁五
兩燒鉛以鹵汁淬盡與亭脂同炒起挑
于水上焙止研勻蒸餅和丸梧子大每
服二十九煎石蓮乾柿湯下。聖濟方

反胃氣逆

胃虛鉛丹二兩白礬二兩生石亭脂半兩
以丹礬研勻入坩鍋內以炭半稱煨赤更
養一夜出毒兩日入亭脂同研粟米飯和
九綠豆大每日米飲下十五丸。聖濟錄

脾疼反胃

靈砂一兩蚌粉二兩同炒赤丁香胡椒各
四十九粒為末自然薑汁煮半夏粉糊丸
梧子大每薑湯下

反胃吐食

雌黃一分甘草生半分為末飯丸梧子大
以五葉草糯米煎湯每服四九。聖濟錄

反胃

六

反胃吐食

絕好赤石脂為末蜜丸梧子大每空心薑湯下一二十九先以巴豆仁一枚勿令破以津吞之後乃服藥。聖惠方

反胃嘔吐

白礬硫黃各二兩銕內燒過入硃砂一分為末麩糊丸小豆大每薑湯下十五丸。又方白礬楮三兩蒸餅丸梧子大每空心米飲服十五丸。普濟方

反胃上氣

食入即吐茅根蘆根各二兩水四升煮二升頓服得下良。聖濟總錄

反胃惡心

藥食不下京三稜炮一兩半丁香三分為末每服一錢沸湯點服。聖濟總錄

脾虛反胃

白豆蔻縮砂仁各二兩丁香一兩陳廩米一升黃土炒焦去土研細薑汁和丸梧子大每服百丸薑湯下。濟生方

反胃嘔吐

飲食入口即吐困弱無力垂死者上黨人參三兩大兩拍破水一大升煮取四合熱服

本草類方

卷二 七

日再兼以人參汁入粟米雞子白蘆白煮粥與噉李直方可勲於漢南患此兩月餘諸方不瘥遂與此方當時便定後十餘日遂入京師絳每與名醫論此藥難可為儔也。李絳

血風反胃

兵部手集 香白芷一兩切片瓦炒黃為末用豬血七片沸湯泡七次蘸末食之日一次。婦人良方

翻胃吐食

白麵二斤半蒸作大饅頭一個頭上開口剝空將皂礬填滿以新瓦圍住鹽泥封固空土窰安放文武火燒一日夜取出研末棗肉為丸梧子大每服二十九空心酒湯任下忌酒色

反胃上氣

○醫方廣要 蘆根茅根各一兩水四升煮二升分服。千金方

反胃吐食

火飲草焙為末蜜丸梧子大芻
沸湯下五十九。百一選方

反胃吐食

芥子末酒服方寸匕
日三服。千金方

久冷反胃

經驗方用大附子一個生薑一兩剉細同
煮研如麩糊每米飲化服一錢。衛生家

寶方用薑汁打糊和附子末為丸大黃為
衣每溫水服十丸。斗門方用長大附子

一個坐于磚上四面著火漸逼以生薑自
然汁淬之依前再逼再淬約薑汁盡半盞

乃止研末每服一錢粟米飲下不過三服
差或以猪腰子切片炙熟蘸食。方便集

用大附子一個切下頭子剉一窠安丁香
四十九個在內仍合定線紮入砂挑肉以

薑汁浸過文火熬乾為末每挑少許
置掌心頭喫日十數次忌毒物生冷

馬雷兒燈上燒存性一錢入好棗肉平胃
散末二錢酒服食即可下即野甜瓜北方

反胃吐食

本草類方

反胃
卷二

多有之。
丹溪纂要

虛寒反胃

神麩六兩麥蘖炒三兩乾薑炮四兩烏梅
肉焙四兩為末蜜丸梧子大每服五十九
米飲下日三服

和劑局方

反胃欬噫

生薑四兩擣爛入蘭香葉一兩椒末一錢
鹽種麩四兩裹作燒餅煨熟空心喫不過
兩二度效反胃人甘

蔗汁和之。普濟方

反胃膈氣

不下食者太倉散用倉米或白米日西時
以水微拌濕勻想日氣如在米中次日晒
乾袋盛掛風處每以一撮水煎和汁飲之

即得便下。又方陳倉米炊飯焙研每五
兩入沉香末半兩和勻每

米飲服二三錢。普濟方

反胃吐食

脾胃氣弱食不消化湯飲不下用粟米半
升杵粉水凡梧子大七枚煮熟入少鹽空

心和汁吞下或云納醋中吞之得下便已。心鏡

反胃羸弱

兵部手集用母薑二斤搗汁作粥食。傳信適用方用生薑切片麻油煎過為末軟柿釀末。

反胃吐食

豐粟粥用白粳粟米二合人參末三大錢生山芋五寸細切研三物以水二升三分煮取以合入生薑汁為鹽花少許和勻分服不計早晚吞不妨別服湯丸。圖經

反胃吐痰

柳樹葉五七箇煎湯服即愈。活人心統

反胃噎疾

羅綺蜜煎浸細細嚼。喉良。普濟方

反胃上氣

白芥子末酒服一錢。普濟方

反胃吐食

乾柿一枚連蒂搗爛酒服甚效切勿以他藥雜之

本草類方

反胃卷二

九

反胃吐食

棠梨葉油炒去刺為末每酒服一錢。山居四要

反胃關格

氣噎不通丁香木香各一兩每服四錢水一盞半煎一盞先以黃泥做成餅濾藥汁于內食前服此方乃掾史吳安之傳于都事蓋松大有效試之果然土器取其助脾也。德生

反胃吐食

戴原禮方用胡椒醋浸日乾如此七次為永酒糊丸梧子大每服三四十九醋湯下。聖惠方用胡椒七錢半煨薑一兩水煎分三服。是齋百一方用胡椒半夏湯泡等分為末薑汁糊丸梧子大每薑湯下三十九

朝食暮吐

丁香十五個研末甘蔗汁薑汁和九蓮子大噉嚙之。摘玄方

反胃吐食

吐出黑汁治不愈者用畢澄茄為末米糊
丸梧子大每薑湯下三四十九日一服愈

反胃轉食

藥物不下用大雪梨一個以丁香十五粒
刺入梨內以濕紙包四五重煨熟食之。

後服平胃散三百

反胃吐食

真橘皮以日照西壁土炒香為末每服二
錢生薑三片裹肉一枚水二鍾煎一鍾溫

服。直

反胃吐食

袖珍方用母丁香一兩為末以鹽梅入藕
和丸茨子大每噉一九。聖惠方用母丁

香神麴炒等分為末米以

反胃吐食

朝食暮食朝吐旋食旋吐者用甘藷
汁七升生薑汁一升和勻日日細呷之。

本草類方

反胃
卷二

十

梅師

反胃吐食

大棗一枚去核用斑斕一枚去頭翅入
在內煨熟去殼空心食之白湯下良

反胃吐食

石蓮肉為末入少肉豆蔻
末米湯調服之。直指方

反胃止瀉

厚朴薑汁炙焦黑為末以陳米飲
調服二錢七日三服。斗門方

反胃吐食

干葉白朮花陰乾為末陳糯米湯
調送三五口不轉再服。袖珍方

反胃吐食

干搥花一枚燒研酒
服。衛生易簡方

反胃吐食

用鯉魚一頭童便浸一夜炮焦
研末同米煮粥食之。壽域

反胃吐食

用黃蠟殼並田螺殼並取久在泥中者各
等分炒成白灰每一兩入白梅肉四兩搗

和為丸再入砂合子內蓋定泥固煨存性
研細末每服二錢用人參縮砂湯調下不

反胃膈氣

然用陳米飲調服亦可凡覺心腹脹痛將發反胃卽以此藥治之。百一方
地塘蟲卽壁虎也七個炒焦木香人參珠砂各一錢半乳香一錢爲末蜜丸梧子大每服七丸木香湯下

反胃嘔噎

田螺洗淨水養待吐出泥澄取曬半乾九梧子大每服三十九丸藿香湯下爛殼研服亦可。
經驗方

反胃吐食

用真正蛤粉每服稱過二錢搗生薑汁一盞再入米醋同調送下。急救良方

反胃吐食

蠶繭十箇煮汁烹雞子三枚食之以無灰酒下日二服神效或以練絲湯煮粟米粥食之。

惠濟方

反胃吐食

用大鯽魚一尾去腸留鱗入綠礬末各滿泥固煨存性研末每米飲服一錢日二。

本草類方

反胃 卷二

反胃膈氣

丁丹崖祖傳狗寶丸用硫黃水銀各一錢同炒成金色入狗寶二錢爲末以鷄卵一枚去白留黃和藥攪勻紙封泥固煨火煨半日取出研細每服五分燒酒調服不過三服見效。 鬱

氏頤真堂方

反胃吐食

用烏雞一隻治如食法入胡椒子半斤在腹內烹食二隻愈

反胃吐食

雞臙脰一具燒存性酒調服男用雌女用雄。千金

反胃嘔食

羊糞五錢童子小便一大盞煎六分去渣分三服。聖惠

反胃吐食

不拘丈夫婦人老少遠年近日用五靈脂末黃犬臙汁和丸龍眼大每服一九好酒

半盞磨化服不過三服卽效。本事

一切反胃

虎脂半

清油一斤瓦瓶浸一月密封以油一兩入無灰酒一盞溫

服以瘥及油盡再添神方

虛冷反胃

羊肉去脂及油盡空腹食之生以蒜雜

反胃吐食

五清蛇二條竹刀切與水飲四五日勿與食將乾為末水丸粟米大每服一分桃

仁湯下五七服即愈○證治發明

噎膈反胃

○危氏得效香牛飲用牛涎一盞入麝香

少許銀盞頓熱先以帛緊束胃腕合氣喘

解開乘熱飲之仍以丁香汁入粥與食○

普濟千疔丹用牛涎好蜜各半斤木鱉仁

本草類方

反胃

主

反胃嘔吐

水能停黑鉛水銀各一錢半結砂舶硫黃以官桂一錢為末每服六錢一半米

湯作一處服○自然薑汁調

嘔吐反胃

大半夏湯半夏三斤人參三兩白蜜一升

升半溫服一升日再服亦

反胃吐食

水不能停黑鉛水銀各一錢半結砂舶硫

湯黃五錢官桂一錢為末每服六錢一半米

湯作一處服○聖濟錄

本草類方卷之二

嘔吐第十七

服藥過劑

卒嘔不已飲新汲水一升。肘後方

嘔吐陽厥

卒死者飲新汲水三升佳。千金方

吐逆不止

碧霞丹用北黃丹四兩米醋半升煎乾炭火三秤就鐵內煨紅冷定爲末粟米飯丸

醋湯下。每服七丸。集驗方

諸般吐逆

陰陽丸用硫黃半兩水銀一錢研末薑汁糊丸小豆大三歲三九冷水下大人三四

十九。鄭氏小兒方

暴得吐逆

仍以下食生滑石末二錢七溫水服仍以細麵半盞壓定。寇氏衍義

本草類方

嘔吐卷二

三

人忽惡心

多嚼白豆蔻子最佳。肘後方

冷痰惡心

華菱一兩爲末食前用米湯服半錢。聖惠方

食入卽吐

人參半夏湯用人參一兩半夏一兩五錢生薑十片水一斗以杓揚二百四十遍取

三升入白蜜三合煮一升半分服。張仲景金匱方

口吐清水

乾蘆艾煎湯燉之。怪證奇方

胃寒嘔惡

不能腐熟水穀食卽嘔吐人參丁香藿香各二錢半橘皮五錢生薑三片水二盞煎

一盞溫服。拔萃方

乾嘔不息

杉根搗汁服一升。肘後方

支飲作嘔

嘔家本渴不渴者心下有支飲也或似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦心下憤憤並宜

小半夏湯用半夏泡七次一升生薑半升水七升煮一升五合分服。張仲景金匱要畧

嘔逆厥逆

內有寒痰半夏一升洗滑燥研小麥麩一升水和作彈丸水煮熟初吞四五枚日三服稍增至十五枚旋煮旋吞覺病減再作忌羊肉錫糖乃許仁則方也。外臺秘要

中酒嘔逆

赤小豆煮汁徐飲之。食鑑本草

食已即吐

胸中有火也大黃一兩甘草二錢半水一升煮半升溫服。張仲景金匱玉函方

吐泄不止

四肢厥逆虛風不省人事服此則陽回名回陽散大南星爲末每服三錢京粟三枚水二鍾煎八分溫服未省再服。又方醋調南星末貼足心。普濟方

嘔逆酸水

羊屎十枚酒二合煎一合頓服未定更服之。兵部手集

本草類方

嘔吐卷二

西

乾嘔不息

蔗汁溫服半升日三次入薑汁更佳。肘後方

上氣嘔吐

芥子末蜜九梧子大井華水寅時下七丸申時再服。千金方

噫吐酸漿

漿水煎頭豌豆許服一盃效。普濟方

嘔吐不止

生薑二兩醋醬二合銀器煎取四合連滓呷之又殺腹內長蟲。食醫心鏡

嘔吐胸滿

吳茱萸湯用吳茱萸一升棗二十枚生薑七合日三服

仲景方

嘔吐痰水

白檳榔一顆烘乾橘皮二錢半炙爲末水一盞煎半盞溫服。千金

嘔逆不食

詞黎勒皮二兩炒研糊丸梧子大空心易服二十九日三服。廣濟方

胃熱吐食

清脂散用蟬退五十個去泥滑石一兩爲末每服二錢水一盞入蜜調服。衛生家

寶方

嘔逆不止

不拘男女速日粥飲湯藥不能下者即效

五靈脂治淨為末狗膽汁和九芘子大每服一丸煎生薑酒磨化猛口熱吞不得救口急將溫粥少許壓之○經驗

食後喜嘔

鹿角燒末二兩人參一兩為木薑湯服方寸匕日三○升後方

嘔逆不止

真火酒一盃新汲井水一盃和服甚妙○瀕湖

嘔逆不止

麻仁杵熬水研取汁着少鹽喫立效李諫議常用極妙○外臺

胃冷嘔逆

氣厥不通母丁香三個陳橘皮一塊去白焙水煎熱服○十便良方

痰壅嘔逆

心胸滿悶不下飲食厚朴一兩姜汁炙黃為末非時米飲調下二錢七○聖惠方

病後嘔逆

天行病後嘔逆食即反出用青羊肝作生淡食不過三度食不出矣○外臺

本草類方

嘔吐卷二

五

本草類方卷之二

嘔啞第十八

虛寒嘔啞 飲食不下細辛去葉半兩丁香二錢半為末每服一錢柿蒂湯下

嘔啞厥逆 雙蓼藤煎汁啣之。劑後方

溫病冷啞 因熱甚飲水成暴令啞者茅根切杜杷葉拭去毛炙香各半斤水四升煎二升去滓

常傷寒卒病論 稍飲之。麗安

卒啞不止 香蘇濃煮頓服 三升良。千金

嘔啞不止 厥逆者蘆根三斤切水煮濃汁頓飲二升必效若以童子小便者服不過三升愈。

肘後

本草類方

嘔啞

去

嘔啞欲死 半夏生薑湯主之用半夏炮七次一升生薑半升水一升五分服。張仲景金匱

要畧

嘔啞眩悸 穀不得下半夏加茯苓湯半夏一升生薑半斤茯苓三兩切以水七升煎一升半分

溫服之。金匱要畧

傷寒乾啞 半夏熟洗研末生薑湯服一錢匕。梅師方

嘔啞不止 取三合去麻溫服。近效方

胃寒嘔逆 停痰留飲藿香半夏湯用半夏湯泡炒黃二兩藿香葉一兩丁香半兩每服四錢水

一盞薑七片煎服。和劑局方

嘔啞不止 醋和麴作彈丸二三十枚以沸湯煮熟瀝去投漿水中待溫吞三兩枚噦定即不用

再吞未定至晚再吞○兵部手集

心痞嘔噦

心下痞堅生薑八兩水三升煮一升半夏五合洗水五升煮一升取汁同煮一升半

分再服
○千金

卒哕不止

案米粉并華水服之良○肘後

噦逆不止

石蓮肉六枚炒赤黃色研末冷熱水半盞和服便止○蘇頌圖經

腎氣上噦

腎氣自腹中起上築於咽喉逆氣連屬而不能出或至數十聲上下不得喘息此由

寒傷胃脘腎虛氣逆上乘于胃與氣相併難經謂之噦素問云病深者其聲噦宜服此方如不止灸期門關元腎俞穴用吳茱萸醋炒熱橘皮附子去皮各一兩為末麴糊丸梧子大每薑湯下
七十九○孫氏仁存方

本草類方

噦噦
卷二

七

反胃嘔噦

枇杷葉去毛炙丁香各一兩人參二兩每服三錢水一盞薑三片煎服○聖惠

反胃嘔噦

乾棗葉一兩藿香半兩丁香二錢半每服二錢薑三片水一盞煎服○聖惠方

本草類方卷之二

呃逆第十九

欬逆打呃 疏黃燒烟嗅之立止。醫方摘要

噫不下食 取崖蜜含微效。廣利方

暴逆氣上 嚼薑兩三片屢效。寇氏衍義

乾嘔厥逆 類嚼生薑嘔家聖藥也

欬逆不止 濟生柿蒂散治欬逆胃滿用柿蒂丁香各二錢生薑五片水煎服或為末白湯點服

○潔古加人參一錢治虛人欬逆。○三因加良薑甘草等分。○衛生寶鑑加青皮陳皮。○王氏易簡加半夏生薑

本草類方

卷二 呃逆

大

呃噫不止 用椒四兩炒研麵糊丸梧子大每服十九醋湯下神效。鄧以正經驗方

諸氣呃噫 橘皮二兩去瓢水一升煎五合頓服或加枳殼尤良。孫尚藥方

胃冷久呃 沉香紫蘇白豆蔻仁各一錢為末每柿蒂湯服五分。吳味活人心鏡

呃逆不止 荔枝七個連皮核燒存性為末白湯調下立止楊拱醫方摘要

陰證呃逆 乳香同硫黃燒烟嗅之則傷寒瀉要

傷寒呃逆 及噫逆不定丁香一兩乾柿蒂焙一兩為末每服一錢煎人參湯下。簡要濟眾方

呃逆不止 黃蠟燒烟薰三三次。醫方摘要

本草類方卷之二

霍亂第二十

霍亂吐瀉 勿食熱物飲冷水一盞仍以水

乾霍亂病 不吐不利脹痛欲死地漿三五

霍亂吐下 酸漿水煎乾薑屑

絞腸沙痛 欲死者用馬糞研汁

霍亂煩悶 向陽壁土煮汁

絞腸沙痛 陰陽腹痛手足冷但身上有紅點以

霍亂吐下 鍋底炭煤半錢皂額上墨半錢百沸湯一

本草類方 霍亂卷二

五止 經驗方

霍亂吐利 犀下倒掛塵滾湯泡澄清

霍亂煩渴 麥手一兩香薷二兩每

霍亂不通 服二錢水煎服 聖惠

霍亂困篤 童女月經衣和血燒灰酒服方寸

乾霍亂病 脹滿煩躁亂髮一團燒灰鹽湯

霍亂吐逆 二升和服取吐 上便良方

錢氏小兒方

霍亂煩滿 氣逆腹脹手足厥冷不灰木陽起石椒阿

乾霍亂病

為末粟飯丸櫻桃大穿一孔每服一九燈
上燒烟盡研末薑湯下以利為度聖濟錄
醋湯亦可名落蓋湯○摘玄方

冷熱霍亂

分利陰陽玄精石半夏各一兩硫黃三錢
為末麩糊丸梧子大海米飲服三十九○
指府

霍亂腹痛

炒鹽一包熨其心腹令氣透
又以一包熨其背○救急方

絞腸沙痛

童子小便服之
即止○聖惠方

霍亂吐瀉

硫黃一兩胡椒五錢為末黃蠟一兩化
九皂子大每涼水下一丸○聖濟錄

霍亂吐瀉

垂死者服之回生用藿香葉陳皮各半
兩水二盞煎一盞溫服○百一選方

霍亂吐瀉

枯白礬末一錢百沸湯
調下○華佗危病方

本草類方

霍亂
卷二

二十

霍亂吐利

肉豆蔻為末薑湯
服一錢○普濟方

霍亂吐利

火灸高良姜令焦香每用五兩以酒一升
煮三四沸頓服亦治腹痛中惡○外臺

霍亂嘔甚

不止用高良姜生剉二錢大棗一枚
水煎冷服立定名水壺湯○普濟方

霍亂腹痛

高良姜一兩剉以水三大盞煎二盞半去
滓入粳米一合煮粥食之便止○聖惠方

霍亂煩渴

草豆蔻黃連各一錢半烏豆五十粒
生薑三片水煎服之○聖濟總錄

霍亂成痢

劉寄奴草煎汁
飲○聖濟總錄

霍亂嘔惡

人參二兩水一盞半煎汁一盞入雞子白
一枚再煎溫服一加丁香○衛生家寶方

霍亂腹滿

未得吐下用生蘇搗汁飲之
佳乾蘇煮汁亦可○肘後方

絞腸沙痛

馬蘭根葉細嚼嚥汁
立安○壽域神方

霍亂煩悶 人參五錢桂心半錢水

霍亂困篤 二蓋煎服。聖惠方

霍亂吐瀉 煩躁不止人參二兩橘皮三兩生薑一兩水六升煮三升分三服。聖濟總錄

霍亂吐利 扁竹入豉汁中下五味 煮羹食。食醫心鏡

霍亂吐下 一不以艾一外臺秘方 升頓服。外臺秘方

霍亂脹痛 蘆根一升生薑一升橘皮五兩水 入升煎三升分服。太平聖惠方

霍亂煩渴 腹脹蘆葉一握水煎服。又方蘆葉五錢 糯米二錢半苜蓿一錢水煎入薑汁密各 半合煎兩沸時時

霍亂煩悶 卽之。聖惠方 蘆根三錢麥門冬一 錢水煎服。千金方

本草類方 霍亂

霍亂腹脹 半夏肉桂等分爲末水 服方寸匕。別後方

乾霍亂病 心腹脹痛蘆蓬茸 把水煮 濃汁每服一升。小品方

絞腸沙痛 蕎麥麵一撮炒黃 水烹服。簡便方

霍亂吐泄 四錢水二蓋鹽半錢煎一盞溫服立止。 孫兆秘

霍亂不止 寶方 白梁米五合水一升 和煮粥食。千金方

霍亂吐利 扁豆香薷各一升水六 升煮二分分服。千金

霍亂心煩 蘆根炙一兩半水半培人參枳杷葉各 一兩每服五錢入薤白四寸酒煎溫服。

聖惠方

霍亂吐瀉 煩渴欲絕用梗米二合研粉入水二盞研汁和淡竹瀝一合頓服○普濟

霍亂吐利 鹽醋煎服甚良○如宜方

霍亂吐利 綠豆粉白糖各二兩新汲水調服即愈○生蒲瀉

霍亂脹痛 生薑蒲到四兩水和鴉汁分溫四服○聖惠方

霍亂脹痛 大豆生研水服方寸七○普濟

霍亂脹痛 蕪菁子水煮汁飲之○瀕湖集簡方

霍亂吐利 防已白芷等分爲末新汲水服二錢○聖惠方

霍亂腹脹 不得吐下用生薑一斤水七升煮二升分三服○時後方

霍亂乾嘔 不止者以薤一虎口以水三升煮取一斗頓服不過三作即已○韋甫獨行方

本草類方 霍亂 卷二

霍亂吐利 梨枝煮汁飲○聖惠

霍亂吐瀉 芥子搗細水和傳臍上○聖濟總錄

霍亂吐利 豌豆三合香葉即香薷三兩爲末水三盞煎一盞分二服○聖惠

霍亂大渴 能殺人以黃倉米三升水一斗煮汁澄清飲良○永類鈴方

霍亂煩脹 未得吐下以好苦酒三升飲之○千金方

霍亂腹痛 桃葉三升切水五升煮一分二分服○外臺

乾濕霍亂 轉筋用大蒜搗塗足心立愈○永類鈴方

霍亂煩躁 黃梁米粉半升水升半和覺如白粉頓服○外臺方

霍亂吐利 山豆根末橘皮湯下三錢

霍亂欲死

生薑五兩牛兒屎一升水四升煎二分再服即止。梅師方

霍亂吐利

鹽梅煎湯細細飲之。如宜方

霍亂脹滿

不得吐下名乾霍亂小蒜一升水三升煮一升頓服。肘後方

中惡霍亂

海桐皮煮汁服之。聖濟總錄

霍亂大渴

不止多飲則殺人黃梁米五升水一斗煮清三升稍飲之。肘後

霍亂吐利

生藕搗汁服。聖惠

乾霍亂病

心腹脹痛不吐不利煩悶欲死用檳榔末五錢童子小便半盞水一盞煎服。聖濟

總錄

霍亂吐瀉

不拘男女但有一點胃氣存者服之再生廣陳皮去白五錢真藿香五錢水二盞煎

本草類方

霍亂卷二

三

一盞時時溫服出百一選方。聖惠用陳橘皮末二錢湯點服不省者灌之仍燒磚沃醋布裹磚安心下熨之便活

霍亂煩渴

不止糯米三合水五升蜜一合研汁分服或煮汁服。楊氏產乳

乾霍亂痛

不吐不下丁香十四枚研末以沸湯一升和之頓服不瘥更作。思邈千金方

霍亂吐利

孫真人用胡椒三十粒以飲吞之。直指方用胡椒四十九粒綠豆一百四十九粒研勻木瓜湯服一錢

湯服一錢

霍亂煩悶

茶末一錢煎水調乾薑末一錢服之即安。聖濟總錄

霍亂腹痛

木瓜五錢桑葉三片棗肉一枚水煎服。聖惠方

霍亂煩渴

藕汁一鍾薑汁半鍾和勻飲。聖濟總錄

霍亂吐瀉

出路在家應急方用路旁破草藺去兩頭洗三四次水煎湯一盃滾服之即愈事

乾霍亂病

心腹脹痛不吐不利欲死巴豆一枚去皮心熱水研服得吐利即定也

霍亂吐利

偷本人頭繪以百沸湯泡汁服一呷勿令知之。集玄方

霍亂腹痛

厚朴湯用厚朴炙四兩桂心二兩枳實五枚生薑二兩水六升煎取二升分三服此陶隱居方也唐石泉公王方慶廣南方云此方不惟治霍亂凡諸病皆治。聖惠方用厚朴薑汁炙研末新汲水服二錢如神

中惡霍亂

麝香一錢醋半盞調服。聖惠方

霍亂煩悶

槐葉桑葉各一錢炙甘草三分水煎服之。聖惠方

本草類方

霍亂卷二

絞腸沙痛

用胡豬生兒時拋下糞日乾爲末以白湯調服

伏暑霍亂

傷冷吐利煩渴水浸丹用巴豆二十五個去皮心及油黃丹炒研一兩二錢半化黃蠟和九綠豆大每服五七丸水浸

少頃別以新汲水吞下。和劑方

風痰霍亂

食不消大便澀訶黎三枚取皮爲末和酒頓服三五次妙。外臺秘要

霍亂厥逆

服烏牛尿二升。千金方

霍亂吐利

蠟一彈丸熱酒一升化服即止。肘後方

霍亂乾嘔

不止吳茱萸泡炒乾薑炮等分水煎服之。聖濟錄

霍亂吐利

甜漿水一升半煮汁五合服。劉涓子遺方

遺方

音

霍亂吐下

不止。四肢逆冷。外臺用黃牛屎半升。水二升。煮三四沸。服半升。止。聖惠用烏牛糞絞汁一合。以百口兒乳汁一合。和溫服。

本草類方

霍亂
卷二

五

本草類方卷之二

泄瀉第二十一

水泄不化 日夜不止白堊煨乾薑炮各一兩楮葉生
研二兩為末糊丸綠豆大每米湯下二十
丸。普

濟方

水瀉腹鳴 如雷有火者石膏火煨倉米飯和九梧子
大黃丹為衣米飲下二十九不二服效。

李樓

大腸寒滑 小便秘出赤石脂乾薑各一兩胡椒半兩
為末醋糊丸梧子大每空心米飲下五七
十丸有人病此熱藥服至一斗二升不
效或教服此終四劑而愈。寇氏衍義

奇方

大腸冷滑 不止鍾乳粉一兩肉苁蓉煨半兩為末煮
麥肉丸梧子大每服七十九空心米飲下

本草類方 泄瀉 卷二

美

生方

水瀉不止 風化石灰一兩白茯苓三兩為末糊丸梧
子大每服二三十丸空心米飲下絕妙。

集玄

伏暑泄瀉 玉華丹白礬煨為末醋糊為丸
量大小用木瓜湯下。經驗方

老人泄瀉 乾糕一兩薑湯泡
化代飯。簡便方

老人泄瀉 不止枯白礬二兩訶黎勒煨七錢半為
末米飲服二錢取愈。太平聖惠方

泄瀉下痢 白龍丹用明礬枯過為末飛羅麩醋打糊
為丸梧子大每服二三十丸白痢薑湯下

赤痢甘草湯泄瀉
米湯下。經驗方

冷勞泄痢 食少諸藥不效白礬三兩燒羊肝一具去
脂臘醋三升煮爛搗泥和丸梧子大每服

二十九米飲一。早夜各一服。普濟方

元臟久冷

腹痛虛泄裏急玉粉丹用生硫黃五兩青鹽一兩細研以蒸餅丸綠豆大每服五九空心熱酒下以食壓之。經驗方

暴泄引飲

秦莖二兩甘草炙半兩每服三錢水煎服。聖惠方

元臟冷泄

腹痛虛極硫黃一兩黃蠟化丸梧子大每服五九新汲水下一加青鹽二錢蒸餅和丸酒下。普濟方

冷勞腸泄

不止神效太乙丹禹餘糧四兩火煨醋淬烏頭一兩冷水浸一夜去皮臍焙為末醋糊丸梧子大每食前溫水下五九。聖惠方

氣虛暴泄

日夜三二十行腹痛不止夏月路行備急最妙朝真丹用硫黃二兩枯礬半兩研細

本草類方

泄瀉卷二

毛

水浸蒸餅丸梧子大硃砂為衣每服十五丸至二十九丸溫水下或鹽湯任下。孫尚

藥秘寶方

水泄脾泄

神聖香黃散宜連一兩生薑四兩同以文火炒至薑脆各自揀出為末水泄用薑末脾泄用連末每服二錢空心白湯下甚者不過二服亦治痢疾。博濟方

中寒水瀉

乾薑炮研末粥飲服二錢即效。千金方

脾積食泄

用黃連二兩為末大蒜搗和丸梧子大每服五十九白湯下。活人心鏡

老小滑瀉

白朮半斤黃土炒過山藥四兩炒為末飯九量人大小米湯服或加人參三錢。瀕

湖集簡方

人常瀉

白朮二兩黃土拌蒸焙乾去土蒼朮五錢泔浸炒茯苓一兩為末米糊丸梧子大每

脾腎虛瀉

每服三五丸米飲下。○和劑局方。二神丸用破故紙炒半斤肉豆蔻生用四兩為末肥棗丸研膏和丸梧子大每空心米飲服五七十丸。○本事方。加木香二兩。○各三神丸。

冷勞泄痢

瀉盧一兩艾葉炒四兩為末米醋三升入藥末一半同熬成膏入後末和丸梧子大每溫水下三十丸。○聖濟總錄。

脾濕水瀉

注下困弱無力水穀不化腹脹甚者蒼朮二兩白芍藥一兩黃芩半兩淡桂二錢每服一兩水一盞半煎一盞溫服麻豉頭微痛去芍藥加防風二兩。○保命集。

暴泄不止

陳艾一把生薑塊水煎熱服。○生疔綱。麻葉陰乾為末每服二錢冷水調下勿吃日夜不止欲死不切男婦用五月五日采

驟然水瀉

本本草類方。卷二。熱物令人悶倒只吃冷物小兒半錢。○楊子建護命方。

風寒泄瀉

火杓丸治風氣行於腸胃泄瀉火杓草為末醋糊丸梧子大每服三十九白湯下。○聖濟總錄。

水瀉日久

青州乾棗十個去核入葇若子真滿紫定燒存性每粟米飲服一錢。○聖惠方。木鱉仁五個母丁香五個麝香一分研末米湯調作膏納臍中貼之外以膏藥護住。○吳曼扶。

水瀉不止

壽精方。生川烏頭一兩木香半兩為末醋糊丸梧子大每陳皮湯下二十九。○本事方。

冷氣洞泄

水泄久痢。熟研丸綠豆大每服五丸黃連湯下。○普濟方。

臟寒脾泄

及老人中氣不足久泄不止肉豆蔻二兩
煨熟大附子去皮臍一兩五錢為末粥九
梧子大每服八十九蓮肉煎湯下。十便
良方治脾胃虛冷大腸滑泄米穀不化乏
力用大附子十兩連皮同大棗二斤於石
器內以水煮一日常令水過兩指取出每
個切作三片再同煮半日割去皮切焙為
末別以棗肉和丸梧子大每空心米飲服

三四十九

老人虛泄

不禁熟附子一兩赤石脂一兩為末醋糊
九梧子大米飲以下五十九。楊氏家藏方
水泄寒痢和九綠豆大每服七丸井華水下忌生冷

魚肉。十便良方

濕熱虛泄

山藥蒼朮等分飯九米飲服大
人小兒皆宜。瀕湖經驗方

本草類方

泄瀉

三

泄痢不固

白麵一斤炒焦黃每日空
心溫水服一二匙。正要

一切泄痢

白扁豆花正開者擇淨勿洗以滾湯淪過
和小猪脊肥肉一條葱一根胡椒七粒醬
汁拌勻就以淪豆花汁和麩包作小
餛飩炙熟食之。必用食治神方

暴泄不止

神麩炒二兩吳茱萸湯泡炒半兩為末醋
糊丸梧子大每服五十九米飲下。百一
方選

五更腎泄

凡人每至五更即游泄一二次經年不止
者名曰腎泄蓋陰盛而然脾惡濕濕則濡
而困困則不能治水水性下流則腎水不
是用五味子以強腎水養五臟吳茱萸以
除脾濕則泄自止矣五味去梗二兩茱萸
湯泡七次五錢同炒香為末每旦陳米飲

服二錢。許叔微本事方

水泄不止

鶯粟殼一枚去蒂膜烏梅肉大棗肉各十枚水一盞煎七分溫服。經驗方

暑毒泄痢

特珍發明按洪邁夷堅志云虞雍公允文感暑痢連月不癒忽夢至一處見一人如

仙官延之坐壁間有藥方其辭云暑毒在脾濕氣連脾不泄則痢不痢則瘵獨煉雉

黃蒸餅和藥別作治瘵醫家大錯公依方用雄黃水飛九度竹筒盛蒸七次研末蒸

餅和九梧子大每日甘草湯下七九日三服果愈

久瀉虛痢

腹痛者欖子九治之欖子肉豆蔻各一兩陳米一兩半以米一攪同二味炒黃為末

一分生礪為末粟米粥九梧子大每陳米飲下五十九日三服。普濟方

泄痢口渴

烏梅煎湯日飲代茶。扶壽精方

水瀉妳疳

椒一分去目礪木酥調少少塗臍上日三度。姚和仲延齡方

本草類方

泄瀉

三

老小洩瀉

小兒水瀉及人年五十以上患瀉用椒二兩醋二升煮醋盡慢火焙乾礪末磁器貯之每服二錢七酒及米飲下。譚氏方

夏月濕瀉

川椒炒取紅肉豆蔻煨各一兩為末梗米飯丸梧子大每量人米飲服百九

餐瀉不化

及久痢用椒一兩炒蒼朮二兩土炒礪末醋糊丸梧子大每米飲服五十。普濟

夏月冷瀉

及霍亂用胡椒礪木飯丸梧子大每米飲下四十九。衛生易簡方

脾泄腸滑

不遺肉炒為末每服三錢陳倉米調下便覺思食甚妙加入香連丸九炒。丹溪

久瀉不止

黑神散用酸石榴一個煨爛盡出火毒一夜研末仍以酸榴一塊煎湯服神效無比

○普濟方

夏月水瀉

不止巴豆一粒針頭燒存性化蠟和作一九倒流水下。危氏得效方

暑月水泄

五倍子末飯丸黃豆大每服二十九荷葉煎水下卽時見效。余居士選奇方

泄瀉不止

白龍骨白石脂等分爲末水丸梧子大紫蘇木瓜湯下量大人小兒用。心鑑

下痢水泄

吳茱萸泡炒黃連炒各二錢水煎服未止再服。聖惠方

臟寒洩瀉

體倦食減用豬大臟一條去脂洗淨以吳茱萸末填滿縛定蒸熟搗丸梧子大每服

五十九米飲下

脾虛滑泄

烏骨母雞一隻治淨用豆蔻一兩草果二枚燒存性摻入雞腹內紮定煮熟空心食

之

水洩多時

殺羊角一枚白礬末填滿燒存性爲末每新汲水服二錢。聖惠方

水瀉不止

用獐猪肚一枚入蒜煮爛搗膏丸梧子大每米飲服三十九丁必卿云子次口五更

本草類方

泄瀉卷二

三

必水瀉一次百藥不效用此方入平胃散末三兩九服遂安。普濟

久泄不止

猪腎一個批開摻骨碎補末煨熟食之神效。瀨湖集簡方

臟寒泄瀉

倦怠減食吳茱萸湯泡過炒豬臟半條去脂洗淨裝滿紮定文火煮熟搗丸梧子大

每服五十九米飲下日二服。普濟

或瀉或止

久而不愈二聖丸用黃連黃蘗末各一兩以猪胆煮熟和丸如綠豆大量兒大小每

米飲服之

多年脾泄

老人多此謂之水土同化吳茱萸三錢炮過入水煎汁入鹽少許通口服蓋茱萸能

暖膀胱水道既清大腸自固他藥難熱不能分解清濁也。孫氏仁存方

伏熱吐瀉

陰陽丸用硫黃半兩水銀一錢研末薑汁糊丸小豆大三歲三丸冷水下大人三四

總徵論

十九〇鄭
氏小兒方

本草類方

泄瀉
卷二

三

本草類方卷之二

痢疾第二十二

赤白下痢

薑黑丸用乾薑如墨各五兩為末醋漿和九梧子大每服三四十九米飲下日夜六七服愈。

挾熱下痢

膿血竈突中墨黃連各一兩為末每酒下二錢日二服。聖惠方

暴作瀉痢

百草霜末米飲調二錢。續十全方

赤白久痢

積年不愈飲調雲母粉方寸匕服二服立見神効。千金方

一切痢下

初起一錢半夏七分巴豆煮十四粒研勻黃蠟三錢同香油化開和成劑量大小每服三五丸或四五丸薑湯下。蕭江方

本草類方

痢疾

五

赤白痢下

黃丹炒紫黃連炒等分為末以糊丸麻子大每服五十九生薑甘草湯下。普濟方

泄瀉下痢

赤白用棗肉搗爛入黃丹白礬各皂子大粳米飯一團和丸彈子大鐵線穿於燈上燒過為末米飲服之。摘玄方

虛寒下痢

腸滑不禁鐵砂七錢半官桂一錢枯礬一錢為末以涼水調攤餅上下縛之當覺大熱以水潤之可用三四

赤白下痢

次名玉胞肚。任存方
蜜陀僧二兩燒黃色研粉每服一錢醋茶下日三服。聖惠方

下痢肛痛

不可忍者熬鹽包坐熨之。肘後方

血痢腹痛

賦粉五錢定粉三錢同研水浸蒸餅心少許和丸綠豆大每服七丸或十九艾一枝水一盞煎湯下。秘寶方

赤痢不止

胡桃仁枳殼各七箇皂莢不蛀者一挺新瓦上燒存性研為細末分作八服每臨臥時一服二更一服五更

久泄久痢

白石脂乾薑等分研白沸湯和麵為稀糊搜之併手九梧子大每米飲下三十九。

老人氣痢

虛冷赤石脂五兩水飛白麵六兩水煮熟入葱醬作臛空心食三四次即愈。壽親

冷痢腹痛

下自凍如魚腦桃花丸赤石脂散乾薑炮等分為末蒸餅和丸量大小服日三服。

痢後脫肛

赤石脂伏龍肝為末傳之一加白礬。錢氏小兒方

赤白下痢

赤石脂木飲服一錢。普濟方

本草類方

痢疾

三

酒積下痢

石灰五兩水和作團黃泥包煨一日夜去泥為末醋糊九梧子大每服三十九薑湯空心下。

血痢十年

石灰三升熬黃水斗穀之澄清一服一升日三服。崔知悌方

一切積痢

砥霜黃丹等分礬和收旋丸竊豆大每米飲下三九。普濟方

氣痢不止

巴石丸取白礬一大斤以炭火淨地燒令汗盡其色如雪謂之巴石取一兩研末熟摻肝作丸梧子大空腹量人加減水牛肝更作如素食人以蒸餅為丸或云白礬中

休息下痢

經一二年不瘥羸瘦衰弱砥霜成塊者為未黃丹各半兩化蠟入砥以柳條攪焦則換至七條取起收之每旋丸梧子大冷水送下小兒黍米大。和劑局方

赤白痢下

白礬飛過為末好醋飛羅麵為丸梧子大赤痢甘草湯白痢乾薑湯下。○生炷方

一切積痢

靈砂丹用確砂硃砂各二錢半為末用黃蠟半兩巴豆仁三七粒去膜同入石器內重湯煮一伏時候豆紫色為度去二七粒止將一七粒同二砂研勻浴擦和收每旋

丸綠豆大或三丸五丸
淡姜湯下。○本事方

血痢不止

白鹽紙包燒研調粥吃三四次即止也。○救急方

積熱下痢

柴胡黃芩等分半酒半水煎七分浸冷空心服之。○濟急方

熱痢腹痛

胡黃連末飯丸梧子大每米湯下三十九。○鮮于樞鉤玄

血痢不止

胡黃連烏梅肉竈下土等分為末蠟茶清下。○普濟方

血痢不止

木賊五錢水煎溫服
一川一服。○聖惠方

本草類方

痢疾

美

下痢虛寒

硫黃半兩壺麻仁七箇為末填臍中以衣隔熱湯熨之止乃已。○仁存方

協熱下痢

赤白用硫黃蛤粉等分為末糊丸梧子大每服十五丸米飲下。○指南方

紫參湯

治痢下紫參半斤水五升煎二升入甘草二兩煎取半升分三服。○張仲景金匱玉

血痢不止

苦參炒焦為末水丸梧子大每服十五丸米飲下。○孫氏仁存堂方

赤痢血痢

三七三錢研末米泔水調服即愈。○瀕湖集簡方

禁口痢疾

蕎麥麵每服二錢沙糖水調下。○坦仙方

濕痢腸風

百一選方變通丸治赤白下痢日夜無度及腸風下血用川黃連去毛吳茱萸湯泡

過各二兩同炒香揀出各為末粟米飯和丸梧子大各收每服三十九赤痢甘草湯

下黃連丸白痢羹湯下茱萸丸赤白痢各
用十五丸米湯下此乃浙西河山純老方
後人甚効、局方戊巳丸治脾胃受濕下
痢腹痛米穀不化用二米加白芍藥同炒
研蒸餅
和丸服

熱毒血痢

宣黃連一兩水二升煮取半升露一宿空
腹熱服少卧將息一二日即止。千金方

赤白暴痢

如鷲鳴肝者痛不可忍用黃連黃芩各一
兩水二升煎一升分三次熱服。經驗方

五疔八痢

四治黃連丸用連珠黃連一斤分作四分
一分用酒浸炒一分用自然薑汁炒一分
用吳茱萸湯浸炒一分用益智仁同炒去
益智研末白芍藥酒煮切焙四兩使君子
仁焙四兩廣木香二兩為末蒸餅和丸綠
豆大每服三十九丸米飲食前下日三服忌
豬肉冷水。

醫通
卷一
痢疾
李絳兵部手集治赤白諸痢裏急後重腹
痛用宣黃連青木香等分搗篩白蜜丸梧
子大每服二三十丸空腹飲下日再服其
効如神久冷者以煨薑搗和丸之不拘大
人嬰孺皆効。易簡方黃連茱萸炒過四
兩木香麵煨一兩粟米飯丸。錢仲陽香
連丸治小兒冷熱痢加煨熟訶子肉。又
治小兒瀉痢加煨熟肉荳蔻。又治小兒
氣虛瀉痢腹痛加白附子尖。劉河間治
久痢加龍骨。朱丹溪治禁口痢加石蓮
肉。王氏治痢湯加烏
梅肉以阿膠化和為丸
葱白一握細切和米煮粥
日日食之。食醫心鏡

本草類方

治痢香連丸

李絳兵部手集治赤白諸痢裏急後重腹
痛用宣黃連青木香等分搗篩白蜜丸梧
子大每服二三十丸空腹飲下日再服其
効如神久冷者以煨薑搗和丸之不拘大
人嬰孺皆効。易簡方黃連茱萸炒過四
兩木香麵煨一兩粟米飯丸。錢仲陽香
連丸治小兒冷熱痢加煨熟訶子肉。又
治小兒瀉痢加煨熟肉荳蔻。又治小兒
氣虛瀉痢腹痛加白附子尖。劉河間治
久痢加龍骨。朱丹溪治禁口痢加石蓮
肉。王氏治痢湯加烏
梅肉以阿膠化和為丸
葱白一握細切和米煮粥
日日食之。食醫心鏡

赤白下痢

葱白一握細切和米煮粥
日日食之。食醫心鏡

血痢不止

鳳尾草根即買衆五錢煎酒服
陳解元吉言所傳。集簡方

休息久痢

白豆腐醋煎食之
即愈。普濟方

冷熱諸痢

胡洽九盞湯治下痢不問冷熱赤白穀滯
休息久下悉主之黃連長三寸三十枝重

一兩半龍骨如碁子大四枚重一兩大附
子一枚乾薑一兩半膠一兩半細切以水

五合着銅器中去火三寸煎沸便取下坐
土上沸止又上水五合如此九上九下納

諸藥入水內再煎沸取湯下沸止又上九
上九下度可得一升頓服即止妙○圖經

本草

血痢不止

薄荷葉煎湯
常服○普濟

諸痢脾泄

臟毒下血雅州黃連半斤去毛切裝肥猪
大腸內紫定入砂鍋中以水酒煮爛取連

焙研末搗腸和丸梧子大每
服百丸米湯下極效○直指

下痢腹痛

赤白痢下令人下部疼重故名重下日夜
數十行臍腹絞痛以黃連一升酒五升煮

本草類方

痢疾
卷二

美

取一升半分再服當
止絞痛也○肘後

熱痢不止

車前葉搗汁入蜜一
合煎溫服○聖惠方

赤痢久下

累治不瘥黃連一兩雞子白和為餅炙紫
為末以漿水三升慢火煎成膏每服半合

溫米飲下一方只以雞
子白和丸服○勝金方

傷寒下痢

不能食者黃連一斤烏梅二十枚去核炙
燥為末蠟一碁子大蜜一升合煎和丸梧

子大一服二十丸日三服○又方黃連二
兩熟艾如鴨子大一團水三升煮取一升

頓服立止○
並肘後方

氣痢後重

裏急或下泄柱壬方薑連散用宣連一兩
乾薑半兩各為末收每用連一錢薑半錢

和勻空心溫酒下或米飲下神妙○濟生
方秘傳香連丸用黃連四兩木香二兩生

薑以薑鋪砂鍋底次鋪連上鋪香新汲水
三盃煮烂研醋調倉米糊為丸如常日服
次五

血痢產痢

冬葵子為末每服二錢入臘茶
一錢沸湯調服日三〇聖惠方

赤白久痢

並無寒熱只日久不止用黃連四十九箇
鹽梅七箇入新瓶內燒烟盡熱研每服二
錢鹽米湯下〇

楊子建護命方

下痢口渴

引飲無度麥門冬去心三兩烏梅肉二十
箇細剉以水一升煮取七合細細呷之〇

必效

熱毒赤痢

黃連二兩切瓦焙令焦當歸一兩焙為末
入麝香少許每服二錢陳米飲下佛智和
尚在閩以此濟

人〇本事方

本草類方

痢疾卷二

堯

下痢咽腫

春夏病此宜用白頭翁黃連各一兩木香
二兩水五升煎一升半分二服〇聖惠方

白頭翁湯

治熱痢下重白頭翁二兩黃連黃蘗秦皮
各三兩水七升煮二升每服一升不愈更
服婦人產後痢虛極者加甘草阿

膠各二兩〇仲景金匱玉函方

赤白下痢

骨立者地榆一斤水三升煮一升半去滓
再煎如稠餈絞濾空腹服三合日再服〇

崔元亮
海上方

赤白痢下

崔宣州衍所傳方用甘草一尺炙劈破以
淡漿水蘼水一升半煎取八合服之立效

〇梅師方用甘草一兩炙肉荳蔻
七箇煨剉以水三升煎一升分服

一切下痢

不拘丈夫婦人小兒木香一塊方圓一寸
黃連半兩二味用水半升同煎乾去黃連

薄切木香焙乾為末分作三服第一服橘
皮湯下二服陳米飲下三服甘草湯下此

冷痢腹痛

乃李景純所傳有一婦人久痢將死夢中觀音授此方服之而愈也○孫兆秘寶方

久痢不止

當歸二兩吳茱萸一兩同炒香去萸不用為末蜜丸梧子大每服三十九米飲下名勝金丸○

普濟方

冷滑下痢

不禁虛羸用縮砂仁熬為末以羊子肝薄切摻之瓦上焙乾為末入乾薑末等分飯

丸梧子大每服四十九白湯下日二服○又方縮砂仁炮附子乾薑厚朴陳橘皮等

分爲末飯丸梧子大每服四十丸米飲下日二服○並藥性論

赤白下痢

龍牙草五錢陳茶一撮水煎神效○醫方摘要

飧瀉久痢

椒木丸用蒼木二兩角椒一兩爲末醋糊丸梧子大每服二十九食前溫水下惡痢

本草類方

痢疾卷二

單

久者加桂○保命集

水瀉久痢

破故紙炒一兩粟殼炙四兩爲末煉蜜丸灑子大每服一丸薑棗同水煎服○百一

選方

老人虛痢

炒研五錢爲末每服方寸七米湯調下日

三服○十便良方

下痢禁口

獨將軍草根有珠如豆者取珠鴉汁三匙以白酒半盃和服

下痢禁口

人參蓮肉各三錢以井華水二盞煎一盞細細呷之或加薑汁炒黃連三錢○經驗良選

良選

冷痢厥逆

六脉沉細人參大附子各一兩半每服半兩生薑切片丁香十五粒粳米一撮水二

蓋煎七分空心
溫服。經驗方

血痢不止

地膚子五兩地榆黃芩各一兩為末
每服方寸匕溫水調下。聖惠方

五色諸痢

返魂丹用零陵香草去根以鹽酒浸半月
炒乾每兩入廣木香一錢半為末裏急腹

痛者用冷水服一錢半通了三四次用熱
米湯服一錢半止痢只思生梨一味。集

方

下痢赤白

藍姑草即淡竹葉煎
湯日服之。溫幼全書

赤白下痢

雞冠花煎酒服赤用
紅白用白。集簡方

積熱瀉痢

冬瓜葉嫩心拖麵煎
餅食之。海上名方

赤白雜痢

困重者益母草日乾陳鹽梅燒存性等分
為末每服三錢白痢乾薑湯赤痢甘草湯

本草類方

痢疾

聖

下名二靈散。
衛生家寶方

下痢腹痛

華老年五十餘病下痢腹痛垂死已備棺
木予用此藥三錢米飲服之痛即減十之

五調理而安即玄胡索末三錢溫酒調下
蓋玄胡索味苦微辛氣溫入手足太陰厥

陰四經能行血中氣滯氣中血滯故專治
一身上下諸痛用之中的妙不可言活血

行氣第一品藥
也。時珍發明

赤白下痢

蒼耳草不拘多少洗淨用水煮爛去滓入
蜜用武火熬成膏每服一二匙白湯下。

摘玄

老小白痢

艾蒿九用陳北艾四兩乾薑三兩為末醋
煮倉米糊丸梧子大每服七十九空心米

飲下甚有奇
效。永類方

熱病下痢

困篤者大青湯用大青四兩甘草赤石脂三兩膠二兩鼓八合水一斗煮三升分三服不過二劑

艾葉陳皮等分煎湯服之亦可為末酒煮爛飯和九每鹽湯下二三十九○聖濟總錄

諸痢久下

艾葉陳皮等分煎湯服之亦可為末酒煮爛飯和九每鹽湯下二三十九○聖濟總錄

赤白下痢

腹痛腸滑後重大黃煨半兩葇若子炒黑一撮為末每服一錢米飲下○普濟方

冷瘡痢下

葇若子為末臘猪胎和丸綿裹棗許導下部因痢出更納新者不過三度瘥○孟詵必効方

諸痢初起

大黃煨熟當歸各二三錢壯人各一兩水煎服取利或加檳榔○集簡方

痢下腸盡

凡痢下應先自後赤若先赤後白為腸盡牛膝二兩搗碎以酒一升漬一宿每服一

本草類方

兩益日三服○肘後方

痢疾卷二

聖

赤白痢下

五月五日菜青蒿艾葉等分同豆豉罽作餅日乾名蒿破日每用一餅以水一盞煎服○聖

煎服○聖濟總錄

水痢百病

張文仲備急方用馬蘭子以六月六日麴熬各等分為末空心米飲服方寸匕如煎

六月六日麴常麴亦可牛骨灰亦可○又方馬蘭子乾薑黃連各等分為散熟湯服

二方寸匕入腹即斷也冷熱皆治常用神効不得輕之忌猪肉冷水

赤白下痢

陰陽交帶不問赤白劉寄奴烏梅白薑等分水煎服赤加梅白加薑○艾元英如宜

久痢不止

變種種痢兼脫肛葇若丸用葇若子一升淘去浮者煮令芽出曬乾炒黃黑色青州

痢疾禁口

棗一升去皮核醱醋二升同煮搗膏丸梧子大每服二十九食前米飲下○聖惠方木簡仁六箇研泥分作二分用麵燒餅一箇切作兩半只用半餅作一竅納藥在內乘熱覆在病人臍上一時再換半箇熱餅其痢即止遂思飲食○邵真人經驗方

久痢休息

熟附子半兩研末雞子白二枚搗和丸梧子大傾入沸湯煮數沸漉出作兩服米飲下○聖濟總錄

熱痢裏急

煎服取利○集簡方
三神丸治青濁不分泄瀉注下或赤或白腹臍刺痛裏急後重用草烏頭三箇去皮尖以一箇火炮一箇醋煮一箇燒灰為末醋糊丸綠豆大每服二十九水為流水下

泄痢注下

赤痢甘草湯下白痢薑湯下
忌魚腥生冷○和劑局方

本草類方

痢疾卷二

聖

久痢赤白

獨聖丸用川烏頭一箇灰火燒烟盡取出地上蓋蓋良久研末酒化臘丸如大麻子大每服三九赤痢黃連甘草黑豆煎湯放冷吞下白痢甘草黑豆煎湯冷吞如瀉及肚痛以水吞下並空心服之忌熱物○經驗良方

下痢禁口

山藥半生半炒為末每服二錢米飲下○衛生易簡方

赤痢不止

蘇同黃蘗煮汁服之○陳藏器
金剛根蠟茶等分為末白梅肉搗丸芡子大每服五七九小兒三九白痢甘草湯下

下痢赤白

赤痢烏梅湯下
衛生易簡方

久痢五色

大熟瓜萋一箇煨存性出火毒為末作一服溫酒服之胡大卿一僕患痢半年杭州愈○本事方

冷痢不止

生薑煨研為末共乾薑末等分以醋和麵作餛飩先以水煮又以清飲煮過停冷吞

二七枚以粥送下
日一度○食療

酒痢腸風

黑散子治風入臟或食毒積熱大便秘血痲痛肛出或久患酒痢木饅頭燒存性櫻

櫛皮燒存性烏梅去核粉草炙等分為末每服二錢水一盞煎服○惠民和劑局方

血痢下血

木耳炒研五錢酒服即可赤用并花小服或以水煮鹽醋食之以汁送下○普濟方

血痢腹痛

日夜不止以薑薑葉搗汁二合入蜜一合溫服○聖惠方

下痢禁口

糯穀一升炒出白花去殼用薑汁拌濕再炒為末每服一匙湯下三服即止○經驗

方良

下痢赤白

治營衛氣虛風邪襲入腸胃之間便痢赤白臍腹痛裏急後重煩渴脹滿不進飲

本草類方

刺疾
卷二

醫

食用乾蒸餅蜜拌炒二兩御米殼蜜炒四兩為末煉蜜丸芡子大每服一九水一盞煎化熱服○傳

信適用妙方

水穀痢疾

韭菜作羹爛燉炒任食之良○食醫心鏡

濕熱泄痢

丹溪清六丸用六一散加紅麴五錢為末蒸餅和丸梧子大每服五七十九白湯下

丹溪心法

赤白痢下

鴉片木香黃連白朮各一分研末飯丸小豆大壯者一分老幼半分空心米飲下忌

酸物生冷油膩茶酒麵無不正者口渴畧飲米湯一方罌粟花未開時外有兩片

青葉包之花開即落收取為末每米飲服錢神效赤痢用紅花者白痢用白花者

傷寒暴痢

藥性論曰以鼓一升薤白一握水二升煮薤熟納鼓更煮色黑去鼓分為二服

赤痢不止

以大麻子水研濾汁煮綠豆食之極効粥食亦可。必効方

久痢不止

水一盞薑三片煎八分溫服。又方粟殼

一分生用煎為末蜜丸芡子六每服三十丸米湯下。集要中散川粟殼蜜炙厚朴薑製各四兩為細末每服一錢米飲下忌生

下痢禁口

蘿蔔壽汁一小盞蜜一盞水一盞同煎早無蘿蔔以子搗汁亦可一方加枯礬七分同煎一方只用蘿蔔菜煎湯日日飲之。普濟方用蘿蔔片不拘新舊藥蜜噙之嚙汁味淡再換覺思食以肉煮粥與食不可

本草類方

多過 痢疾 卷二

血痢不止

必效方用麻子仁汁煮綠豆空心食極效。外臺

泄痢赤白

子大每服三十丸米飲下有人經驗。百

久痢久瀉

陳石榴皮醋者焙研細末每服二錢米飲下患二三年或二三月百方不效者服之便止不可輕忽

血痢不止

地錦草研每服二錢空

下痢禁口

及小兒泄痢用大蒜搗貼兩

赤白下痢

山豆根末蜜丸梧子大每服二十九

酒痢便血

腹痛或如魚腦五色者乾絲瓜一枚連皮

經驗良方

赤痢熱躁

梗米半升水研取汁入油瓷瓶中蠟紙封
口沉井底一夜平旦服之吳內翰家乳母
病此服之有

新久洩痢

乾木耳一兩炒鹿角膠二錢半炒為末
每服三錢溫酒調下日二。御藥院方

寒痢白色

炒麵每以方寸七入粥中食之能
療日瀉百行師不救者。外臺

熱毒血痢

忍冬藤濃煎
飲。聖惠方

熱痢便血

粟殼醋炙一兩陳皮半兩為末
每服三錢烏梅湯下。普濟方

赤痢臍痛

黑豆茱萸子二件
摩吞嚥之良。經驗

久痢成疝

葛勒蔓末以管吹入肛
門中不過數次如神

本草類方

痢疾

異

血痢不止

用鼓大蒜等分杵丸梧子大每
服三十九鹽湯下。王氏博濟

赤白痢下

蘆白一握同米煮粥
日食之。食醫心鏡

痢及瀉血

胡荽子一合炒熨末每服二錢赤痢沙糖
水下白痢薑湯瀉血白湯下日二。普濟

久痢不止

茄根燒灰石榴皮等分為末
以沙糖水服之。簡便單方

赤白下痢

用酢榴根凍生者一握炙乾水
大盞濃煎一盞服之。斗門方

血痢不止

乾薑燒黑存性放冷為末每服
一錢米飲下神妙。姚氏集驗

血痢如刺

藥性論曰以豉一升水漬相淹
煎兩沸絞汁頓服不瘥再作

五色痢疾

鴉皮燒灰酒服
二錢。壽域方

赤痢不止

秋米一把鯽魚鮓二瓣葱白一虎口煮粥食之。普濟方

水穀痢疾

小豆一合罨蠟三兩頓服取効。必効方

久痢

阿芙蓉小豆許空渴飲蜜水化下日一服忌葱蒜漿水若渴飲蜜水解之

寒痢青色

乾薑切大豆大每米飲服六七枚日三夜一累用得効。肘後方

赤白痢下

水穀不消以麴熬粟米粥服方寸七日四五服。肘后方

下痢赤白

荷葉燒研每服二錢紅痢蜜白痢沙糖湯下

水痢不止

大豆一升炒白米半兩為末每服三錢米飲下。指南方

下痢不止

楊梅燒研每米飲服二錢日二服。普濟

水痢百起

六月六日麴炒黃馬藷子等分為末米飲服方寸匕無馬藷子用牛骨灰代之。普

本草類方

痢疾卷二

聖

血痢不止

地榆晒研為末每服二錢摻在羊血上炙熱食之以捻頭煎湯送下或以地榆煮汁熬如飴狀一服三

熱毒下痢

蒲根二兩粟米二合水煎服日二次。聖濟總錄

臟毒赤白

地錦草洗暴乾為末米飲服一錢立止。經驗方

血痢不止

日夜有餘行者椽實二兩楮葉炙一兩縮砂仁半兩共為末每服一錢食前烏梅湯調下。普濟

裏急後重

不蛀皂莢子米糠炒過枳殼炒等分為末飯九梧子大每米飲下三十九。普濟方

赤白久痢

不狗大人小兒用新槲皮一斤去黑皮切以水一斗煎取五升去滓煎膏和酒服

聖惠方

聖惠方

赤痢腹痛

直指用陳白梅同真茶蜜水各半煎飲之。聖惠用烏梅肉炒黃連各四兩為末煉蜜丸梧子大每米飲。

久痢不止

腸痛已出肘後用烏梅肉二十個水一盞煎六分食前分二服。袖珍用烏梅肉白梅肉各七個搗爛入乳香末少許杵丸梧桐子大每服二三十九茶湯下日三

下痢禁口

沙糖半斤烏梅一個水二碗煎一碗時飲之。摘玄方烏梅一兩去核燒過為末每服

便痢膿血

二錢米飲下立止。聖濟總錄荔枝殼橡斗殼炒石榴皮炒甘草炙各等分每以半兩水一盞半煎七分溫服日二

赤白痢

濟方。普服。黑神散用酸石榴一箇煨烟盡出火毒一夜研末仍以酸榴一塊煎湯服神效無比

腸滑久痢

本藥類方。卷二。痢疾。吳

久冷下痢

濟方。普。或不痢腰腹若冷用蜀椒三升酢漬一宿麴三升同椒一升拌作粥食不過三升瘥

水痢不止

金方。林檎半熟者十枚水二升煎一升并林檎食之。食醫心鏡

大腸冷痢

服二錢日二次。腹痛食不消化者食療本草用酸榴皮炙黃為末棗肉或粟米飯和丸梧子大每空

赤白痢下

滑加附子赤石脂各一倍。肘后方用皮燒存性為末每米飲服。方寸七日三服效方止

血痢瀉血

鳥藥燒存性研陳米飯丸梧子大每米飲下三十九。普濟方

赤白重下

葛氏用豆豉熬小焦搗服一合日三或炒焦以水浸汁服亦驗。外臺用豉心炒為末一升分四服酒下入口即斷也。

水穀下利

日夜百餘行者檉實二兩楮葉炙一兩為末每服一錢食前烏梅湯調下。聖惠方胡椒綠豆各一歲一粒為末糊丸梧子。

赤白下痢

大紅用生姜白用米湯下。集簡方神妙無比方也用石榴一箇劈破炭火簇燒存性出火毒為末每服一錢別以酸石榴一瓣水一盞煎。

腸滑久痢

湯調服。經驗方。久痢不止。為末每服二錢米飲酒下。聖濟總錄。

痢血五色

或膿或水冷熱不調酸石榴五枚連子搗汁二升每服三合神妙。聖濟。

血痢不止

荷葉蒂水煮汁服之。普濟方。

本草類方

卷二 痢疾 晁 孟詵曰赤白下痢以好茶一斤炙末濃煎一二盞服久患痢者亦宜服之。直指。

熱毒下痢

用臘茶赤痢以蜜水煎服白痢以連皮自然薑汁同水煎服二三服即愈。經驗良方。

下痢不止

和服須臾腹痛大下即止。少年用之有效。一方蠟茶末以白梅肉和丸赤痢廿草湯下白痢烏梅湯下各百丸。一方建茶合醋煎熱服即止。

久痢禁口

諸藥不效服此三服宿垢去盡即變黃色屢驗。息菴子堯婦為末米糊丸梧子大每服四五十九粒陳茶下。醫方摘要。石連肉炒為末每服二錢陳倉米調下便覺思食甚妙。加入香連丸尤妙。丹溪心法。

熱瀉下痢

五倍子一兩枯礬五錢為末糊九梧子大每服五十九米湯送下。鄧筆峯雜典方

三十年痢

赤松上蒼皮一斗為末糊痢和服一斗日三不過一斗救人。聖惠方

下痢赤白

午日午時取完好葶藶洗淨拭乾勿令損破於甌內入好燒酒浸之黃泥密封收貯遇有患者取二枚細嚼空心用原酒送下。唐璠經驗方

氣痢不止

寒食一百五日采木蓼暴乾用時為末粥飲服一錢。聖惠方

下痢清血

腹中刺痛椿根白皮洗刮晒研醋糊九梧子大每空心米飲下三四十九一加蒼木

積殼減半

。經驗方

血痢不止

白紙三張裏鹽一匙燒赤研末分三服米飲下。聖惠方

下痢禁口

肥皂菜一枚以鹽實其內燒存性為末以少許入白米粥內食之即效。乾坤生意

本草類方

卷二 痢疾 辛

血痢下血

臘月日未出時取背陰地北引袴根皮東流水洗淨掛風處陰乾為末每服二兩入寒食麵一兩新汲水九梧子大陰乾每服三十九水煎滾傾出溫水送下忌見日則無效名如神

傷風下痢

九。普濟方 風傷久不已而下痢膿血日數十度用皂莢刺枳實麩炒槐花生用各半兩為末煉蜜丸梧子大每服三十九

老少瘴痢

米湯下日二服。袖珍方 日夜百餘度者取乾楮葉三兩熬搗為末每服方寸匕烏梅湯下日再服取羊肉裹末納肛中痢出即止。楊炎南行方

順氣止痢

積殼炒二兩四錢甘草六錢為末每沸湯服二錢。嬰童百問

水穀痢下

櫻欄皮燒研水服近効方

一切瀉痢

脉浮洪者多日難已脉微小者服之立止
名勝金膏巴豆皮楮葉同燒存性研化蠟
丸綠豆大每甘草湯下
五九。劉河間宣明方

赤白下痢

五六年者荆瀝每日
服五合。外臺秘要
厄子十四枚去皮搗末蜜丸梧子大每三
九日三服大效亦可水煎服。肘后方

熱毒血痢

日夜無度腥臭不可近臍腹撮痛東垣脾
胃論用椿根白皮訶黎勒各半兩母丁香
三十箇爲末醋糊丸梧子大每服五十九
米飲下。唐鑑經驗方用椿根白皮東南

休息痢疾

行者長流水內漂三日去黃皮焙爲末每
一兩加木香二錢粳米飯爲丸每服一錢
二分空服
米飲下

氣痢赤白

巴豆一兩去皮心熬研以熱豬肝丸綠豆
大空心米飲下三四丸量人用此乃鄭解

本草類方

侍御所傳方
也。經驗方

血痢連年

秦皮鼠尾草薔薇根等分以水煎取汁銅
器重釜煎成丸如梧子大每服五六丸日
二服消增以知爲度
亦可煎飲。千金方

下痢水穀

久不瘥者厚朴三兩黃連三兩水
三升煎一升空心細服。梅師方

水瀉下痢

訶黎勒炮二分肉豆蔻一分爲
末米飲每服二錢。聖惠方
嚴緊絕妙方罌粟殼醋炒金櫻花葉及子
等分爲末蜜丸芡子大每服五七丸陳皮
煎湯化下
○普濟方

臟毒下痢

赤白用香椿洗刮取皮日乾爲
末飲下一錢立效。經驗方

滑痢不止

用五倍子醋炒七
次爲末米湯送下

痢疾
卷二

赤白下痢

生甘草湯下白痢炙甘草湯下不過再服

○趙原陽濟急方

血痢不止

沒石子一兩為末飯丸小豆大每食前米飲下五十九○普濟方

脾泄久痢

五倍子炒半斤倉米炒一升白丁香細辛木香各三錢花椒五錢為末每服一錢蜜湯下日二服忌生冷魚肉○集靈方

冷魚肉○集靈方

飧泄滑痢

不止白茯苓一兩木香煨半兩為末紫蘇木瓜湯下二錢○百一選方

瀉痢不止

五倍子一兩半生半燒為末糊丸梧子大每服二十九紅痢燒酒下白痢水酒下水

泄米湯下○集靈用五倍子末每米飲服一錢

水穀下痢

日夜百餘行者橡實二兩楮葉炙一兩為末每服一錢食前烏梅湯調下○聖惠方

本草類方

痢疾卷二

壘

下痢轉白

訶子三箇二炮一生為末沸湯調服水痢加甘草末一錢○普濟方

赤痢不止

文蛤炒研末水浸烏梅肉和丸梧子大每服七十九烏梅湯下

積滯泄痢

腹痛裏急杏仁去皮尖巴豆去皮心各四十九箇同燒存性研泥落蠟和丸綠豆大每服二三丸煎大黃湯下開日一服

一加百草霜三錢○劉守真宣明方

下痢裏急

穿山甲蛤粉等分同炒研末每服一錢空心溫酒下○普濟方

赤痢臍痛

萊萁合黑豆湯吞之○千金方

久痢禁口

病勢欲死用金絲鯉魚一尾重一二斤者如常治淨鹽醬葱必入胡椒末三四錢煮熟置病人前嗅之欲喫隨意連湯食一飽

病即除根屢治有效○楊拱醫方摘要

仲景調氣飲

治赤白痢小腹痛不可忍下重或面青手足俱變者用黃蠟三錢阿膠三錢同溶化

入黃連末五錢攪勻分
三次熱服神效。金匱
海蛤末蜜水調服
二錢日二。傳信

千金膠蠟湯
治熱痢及婦人產後下痢用蠟二基子大
阿膠二錢當歸二錢半黃連三錢黃蘗一

錢陳廩米半升水三鍾煮米至一升云
米入藥煎至一鍾溫服神效。千金方

久痢休息
半分五服冷飲仍以米飲和丸每服十九

。肘
後方

赤白下痢
和劑局方戊巳丸治脾胃受溼下痢腹痛
米穀不化用吳茱萸黃連白芍藥各一兩

同炒為末蒸餅丸梧子大每服二三十九
米飲下。百一選方變通丸治赤白痢日

夜無度及腸風下血用川黃連二兩吳茱
萸二兩湯泡七次同炒香揀出各自為末

本草類方

痢疾

卷二

粟米飯九梧子大另收每服三十九赤痢
甘草湯下黃連九白痢乾薑湯下茱萸丸

赤白痢各用十五丸米湯下此乃浙西河
山純老以傳齋黯光者殺人甚效。鄧筆

峯襍興方二色丸治痢及水泄腸風用吳
茱萸二兩黃連二兩同炒香各自為末以

百草霜二兩同黃連作丸以白芍藥末二
兩同茱萸作丸各用飯丸梧子大各收每

服五十九赤痢烏梅湯下連霜丸白
痢米飲下茱萸丸赤白痢各半服之

赤白下痢
黑牛散治赤白痢禁口痢及泄瀉用黑牛
兒卸蟻蜋一名鐵甲將軍燒研每服半錢

或一錢燒酒調服小兒以
黃酒服立效。李延壽方

水穀下痢
及每至立秋前後即患痢兼腰痛取樗根
一大兩擣篩以好麵捻作餛飩如皂子大

水煮熟每日空心服十枚並無
禁忌神良。劉禹錫傳信方

禁口痢疾

用大田螺二枚搗爛入麝香三分作餅烘熱貼臍間半日熱氣下行卽思食矣甚效

熱痢吐食

因服熱藥而致者用糞中蛆流水洗淨曬乾爲末每服一錢米飲下

毒痢禁口

小蛙一箇并腸肚搗碎尾烘熟入麝香五分作餅貼臍上氣通卽能進食也

赤痢不止

鱖魚鱗二錢切米一把薤白虎口切合煮粥食之聖惠

氣痢水瀉

訶黎勒十枚麵裹糖火煨熟去核研末粥飲頓服亦可飯丸服一加木香又長服方訶黎勒陳橘皮厚朴各三兩搗篩蜜丸大如梧子每服二三十九白湯下。圖經

痢及瀉血

烏龜肉以沙糖水拌椒和炙煮食之多度卽愈。普濟方

本草類方

卷二 痢疾

五

酒痢下血

百藥煎五倍子陳樛花等分焙研末酒糊丸梧子大每服五十九米飲送下。本草方

赤白下痢

臘月狗膽一百枚每枚入黑豆充滿麝香少許每服一枚赤以甘草白以乾姜湯送下。奇

赤白痢疾

黃連阿膠九治腸胃氣虛冷熱不調下痢赤白裏急後重腹痛小便不利用阿膠炒過水化成膏一兩黃連三兩茯苓二兩爲末搗丸梧子大每服五十九粟米湯下白

三。和

劑局方

少陰下痢

不止厥逆無脈乾嘔者以白通湯加豬膽汁主之葱白四莖乾姜一兩生附子一枚水三升煮一升入人尿五合豬

膽汁一合分服。仲景傷寒論

休息痢疾

五十日以上一二年不瘥變成疳下如泔澁者用生羊肝一具切絲入三年醋中吞之心悶則止不悶便服一日勿食物或以姜薤同食亦可不過二三具。外臺

禁口痢疾

鷄內金焙研乳汁服之

下痢鮮血

犀角地榆生地黃各一兩為末煉蜜丸彈子大每服一九水一升煎五合去滓溫服

○聖惠方

赤白痢下

白雉鷄一隻如常作臠及餽飽空心食。心鏡

下痢紅白

臘猪骨燒存性研末溫酒調服三錢

血痢不止

乳腐一兩漿水一鍾煎服。普濟方

脾虛滑痢

用黃雌鷄一隻炙以鹽醋塗煮熟食之。心鏡

本草類方

痢疾卷二

壘

水穀痢疾

牛骨灰同六月六日麴炒等分為末飲服方寸匕乃御傳方也。張文仲方

下痢赤白

生鷄子一箇取白攤連紙上日乾摺作四重包肥烏梅十箇安袋斗中以白炭燒存性取出碗覆冷定研末入水銀粉少許大人分二服小兒三服空心井華水調下如

覺微利不須再服。證類

再服。證類

胃寒下痢

羊肉一片萹荅子末一兩和以綿裹納下部度瘥。外臺方

霍亂成痢

劉寄奴草煎汁飲。聖濟總錄

虛痢危困

因血氣衰弱者鹿茸酥炙一兩為末入麝香五分以燈心煮棗肉和九梧子大每空

心米飯下三五十九。濟生方

下痢腹痛

羊脂阿膠蠟各二兩黍米二升煮粥食之。千金

休息痢疾

經年不愈取大蟲骨炙黃焦搗末飲服方寸匕日三取效。張文仲方

赤白痢下

臘月取雀兒去腸肚皮毛以巴豆仁一枚入肚內餅同濟煨存性研末以好酒煮黃蠟百沸取蠟和九梧子大每服一二十九

下痢禁口

黃雌雞一隻如常為雁作濕餽飽空心食之。心鏡

禁口痢疾

臘肉脯煨熟食之妙。李樓奇方

赤白下痢

十二月猪膽百枚俱盛黑豆入內着麝香少許陰乾每用五七粒為末生姜湯調服

下痢腹痛

狗肝一具切入米一升煮粥合五味食。心鏡

濕蠶下痢

不止乾嘔羸瘦多睡而赤猪膽汁和姜汁醃醋同灌下部捻令醋氣上至咽喉乃止

本草類方

痢疾卷二

奕

赤白痢下

當下五色惡物及虫而愈也。拾遺 煎數腸痛定粉一兩鷄子清和炙焦為末冷水服一錢。肘後方

脾虛下痢

日夜不止野雞一隻如食法入橘皮葱椒五味和作餽飽煮空心食之。食醫心鏡

赤白下痢

雞卵一枚取黃去白入胡粉滿殼燒存性以酒服一錢匕。葛氏方

洞注下痢

羊骨灰水服方寸匕。千金方

赤白久痢

臘月狗頭骨一兩半燒灰紫筍茶末一兩為末每服二錢米飲下。聖惠方

久痢赤白

馬糞一九燒灰水服。肘後方

赤白下痢

腰痛用猪腎二枚研爛入陳皮椒醬作餽飽空心食之。食醫心鏡

下痢休息

杏仁去皮炒研以猪肝一具切片水洗血淨置淨鍋中一重肝一重杏仁鋪盡以

童便二升同煎乾放冷

任意食之。聖惠方

休息痢疾

積豬肝一具切片杏仁炒一兩於淨鍋內
一重肝一重杏仁入童子小便二升文火
煎乾取食日
一次。千金

恟熱血痢

急救用猪大腸一條入芫花蔓在內煮食
奇效用猪臟人黃連末在內煮爛搗丸
梧子大每米飲服三十九。又方猪臟人
槐花末令滿縛定以醋煮爛搗為丸如梧
桐子大每服二
十九温酒下

滑痢不止

倦怠減食吳茱萸湯泡過炒猪臟半條去
脂洗淨裝滿紫定文火煮熟搗丸梧子大
每服五十九米飲
下日二服。普濟

毒痢膿血

六脉微小並無寒熱宜以桑寄生二兩防
風大芎二錢半炙甘草三銖為末每服二
錢

本草類方

痢疾
卷二

毒

錢水一盞煎八分和滓
服。楊子建護命方

冷痢白凍

日夜不止欲死不拘男婦用五月五日采
麻葉陰乾為末每服二錢冷水調下勿喫
熱物令人悶倒只喫冷物小
兒半錢。楊子建護命方

血痢不止

此含石二枚火煨醋淬研末
每服三錢米飲下。普濟方

久痢休息

時止時作鼠尾草花搗
末飲服一錢。聖惠方

下痢噤口

紅木槿花去蒂陰乾為末先煎麵餅
二個為末食之。趙宜真濟急方

本草類方卷之二

瘧疾第二十三

寒熱瘧疾

秋後霜一錢半熱酒服之。集玄方

斷截熱瘧

邵氏青囊方用五月五日午時取蚯蚓糞以麩和丸梧子大硃砂為衣每服三九無

根水下忌生冷即止皆效或加菖蒲末獨頭蒜同丸

寒熱瘧疾

體虛汗多者黃丹百草霜等分為末發日空心米飲服三錢不過二服愈或糊丸或蒜丸皆效。肘方用飛炒黃丹一兩恒

山末三兩蜜丸梧子大每服五十九丸温酒下平旦及未發將發時各一服無不效。

普濟方端午日用黃丹炒二兩獨蒜一百箇搗丸梧子大每服九九空心長流水面

東下二三發後乃用神效亦治痢疾。三

本草類方

瘧疾

黃

因方用黃丹炒建茶等分為末温酒服二錢。又黃丹飛掃麵糊丸茨子大每服子

一枚去核包一丸紙裹煨熟食之

温瘧不止

黃丹炒半兩青蒿童尿浸二兩為末每服二錢寒多酒服熱多茶服。仁存堂方

牝瘧多寒

雲母燒二日夜龍骨蜀漆燒去腥等分為散未發前漿水服半錢。仲景金匱方

瘧疾寒熱

灰二錢頭垢五靈脂各一錢研末飯丸皂子大每服一九五更無

根水下即止。集玄方

寒熱瘧疾

孫真宗秘寶方用信砒二兩研粉寒水石三兩別搗末用生鉄銚一箇鋪石末後鋪

砒在上又以石末蓋之厚蓋覆定醋糊帛條密封十餘重炭火一斤煨之待紙條黑

時取出候冷刮盡上砒末乳細粟米飯丸綠豆大辰砂為衣每用三四九小兒一二

丸發日早以臘茶清下一日不得食執物
男人患女人着藥入口中女人患男人着
藥入口中。本事方用人言一錢綠豆末
一兩爲末無根井水丸綠豆大黃丹爲衣
陰乾發日五更冷水下五七丸。衛生齋
鑑一剪金用人言醋煮硫黃綠豆等分爲
末每一豆許用紅絹包之承絲絮定每剪
下一粒新汲水空心吞下治癰聖藥也。
醫壘元戎九轉靈砂丹用硃霜黃丹紫河
車各一錢爲末雄黑豆一百粒水浸一夜
研泥和九梧子綠豆黍米三樣大每服一
二十丸發日五更向東無根水下紫河車
綠豆黑豆皆解硃毒也。本草權度不二
散用硃一錢麵二兩和勻香油一斤煎黃
色以草紙壓去油入茶三兩爲
末每服一錢發日早冷茶下

瘡癩鬼瘡

食瘡蛇含石末一兩信石末一兩研勻入
水火鼎內上以盞蓋六一泥固濟煨至藥

本草類方

瘡疾
卷二

堯

升在盞刮下爲末米糕糊丸綠豆大雄黃
爲衣每服一丸黑豆研水五更送下。摘

方

疔瘡疲瘵

時珍發明野史云盧絳中病疔疾疲瘵忽
夢白衣婦人云食蔗可愈及且買蔗數挺

食之翌日疾愈此亦
助脾和中之驗與

久瘡不止

鮑氏方用硫黃硃砂等分爲末每服二錢
臘茶清發日五更服當日或大作或不作

皆其效也寒多倍硫熱多倍砂。朱氏方
用硫黃臘茶等分爲末發日早冷水服二

錢二服效寒多
加硫熱多加茶

諸瘡寒熱

赤脚馬蘭搗汁入水少許發日早
服或入沙糖亦可。聖濟總錄

氣虛瘡瘡

熱少寒多或單寒不熱或虛熱不寒用草
果仁熟附子等分水一盞薑七片棗一枚

煎半盞服名果附湯。濟生方

虛寒瘧

寒多熱少飲食不思用高良薑麻油炒乾薑炮各一兩為末每服五錢用猪膽汁調服四十九酒下亦佳吳并內翰致和丁酉居全椒縣歲瘧大作用此救人以百計張大亨病此甚微致仕亦服之愈大抵寒發於膽用猪膽引二薑入膽去寒而燥脾胃一寒一熱陰陽相制所以作效也一方只用二薑半生半炮各半兩穿山甲炮三錢為末每服二錢猪腎煮酒下。朱氏集驗方

虛瘧自汗

不止用草果一枚麴暴煨熟連麴研入平胃散二錢水煎服。經效濟世方

脾寒瘧疾

寒多熱少或單寒不熱或大便洩而小便多不能食用草果仁熟附子各二錢半生

本草類方

瘧疾卷二

卒

溫瘧不止

薑七片棗肉二枚水三盞煎一盞溫服。醫方大成

瘧疾寒熱

馬鞭草搗汁五合酒二合分二服。千金方

瘧疾寒熱

礬紅獨蒜頭煨等分搗丸艾子大每白湯嚼下一丸端午日合之。普濟方

虛瘧發熱

人參二錢二分雄黃五錢為末端午日用稷尖搗丸梧子大發日侵晨并華水吞下

七丸發前再服忌諸般熱物立效

少陰瘧疾

嘔吐綠礬一錢乾薑炮半夏薑製牛兩為末每服半錢發日早以醋湯下。聖濟錄

瘧疾不止

蒴藿一大握炙令赤色以水濃煎一盞欲發前服。斗門方

瘧疾邪熱

冬葵子陰乾為末酒服二錢午日取花接手亦去瘧。聖惠方

瘧疾寒熱

肘後方用青蒿一握水二升搗汁服之仁存方用五月五日天未明時采青蒿陰乾

四兩桂心一兩為末未發前酒服二錢。經驗方用端午日采青蒿葉陰乾桂心等

分爲末每服一錢先寒用熱酒先熱用冷酒發日五更服之切忌發物

勞瘧積久

不止者長牛膝一握生切以水六升煮二升分三服清早一服未發前一服臨發時

臺秘要 一服。外

温瘧痰甚

但熱不寒用青蒿二兩童子小便浸焙黃丹半兩爲末每服二錢白湯調下。仁存

方

瘵瘧邪熱

蜀葵花白者陰乾爲末服之午日取花授手亦能去瘵。蘇頌圖經本草

老瘵不斷

牛膝莖葉一把切以酒三升漬服令微有酒氣不卽斷更作不過三劑止。肘後方

本草類方

瘵瘵 卷二

空

瘵疾寒熱

齊頭蒿根滴金根各一把搗生酒一鍾未發前服以滓傳寸口男左女右二日便

止。海 上名方

温瘧熱多

恒山一錢小麥三錢淡竹葉二錢水煎五更服甚良。藥性論

久瘵不瘵

蒼耳子或根莖亦可焙研末酒糊丸梧子大每酒服三十九日二服生者搗汁服亦

可。朱氏 集驗方

久瘵結癖

在腹脇堅痛者芫花炒二兩硃砂五錢爲末蜜丸梧子大每服十九裏湯下。直指

瘵疾渴甚

童便和蜜煎沸頓服。簡便方

瘵發無時

胡椒吳茱萸高良薑各二錢爲末以豬脾一條作膾炒熟一半滾藥一半不滾以黑

記定並作餛飩者熟有藥者吞之無藥者嚼下一服效。衛生家寶方

繫背截瘡

旱蓮草槌爛男左女右置寸口上以古文錢壓定帛繫件長久起小泡謂之天灸其瘡即止甚效。

王執中資生經

三十年瘡

肘后方治三十年老瘡及積年久瘡常山黃連各一兩酒三升清一宿以瓦釜煮取

一升半發日早服五合發時再服熱當吐冷常利無不瘳者。張文仲備急方用恒

山一兩半龍骨五錢附子炮二錢半大黃一兩為末鷄子黃和九梧子大末發時五

九將發時五九白湯下支太醫云此方神驗無不瘳者

牡瘡獨熱

不冷者蜀漆一錢半甘草一錢麻黃二錢牡蠣粉二錢水二鍾先煎麻黃蜀漆去沫入藥再煎至一鍾未發前溫服

得吐則止。王肅外臺秘要

牡瘡獨寒

骨各二錢為末每服半錢臨發日旦一服

本草類方

瘡疾

奎

發前一服酢漿水調下溫瘡又加蜀漆一錢。張仲景金匱要畧

瘡疾不止

黃芩根燒灰水服一合量人強弱用。千金方

瘡瘧寒熱

劉長春經驗方常山一寸草果一枚熟酒一盃浸一夜五更望東服之蓋卧酒醒即愈。談埜翁試驗方用常山檳榔甘草各

二錢黑豆一百粒水煎服之乃彭司寇所傳。葛稚川肘后方用常山黃連香鼓各

一兩附子炮七錢搗末蜜丸梧子大空腹飲服四九欲發時

三九至午後乃食

厥陰肝瘡

寒多熱少喘息如死狀或小腹滿小便如膿不問久近不吐不泄如神恒山一兩醋

浸一夜瓦器煮乾每用三錢水一盞煎半盞五更冷服。趙真人濟急方

截瘡諸酒

肘后方用常山一兩酒一升漬二三日分作三服平旦一服少頃再服臨發又服或

加甘草煮服之。宋俠經心錄醇醪湯治

間日瘧支太醫云乃桂廣州方也甚驗恒

山一錢二分大黃二錢半炙甘草一錢二

分水一盞半煎減半日出未發時溫服。虞

以水一盞煎減半日出不發時溫服。虞

搏醫學正傳治久瘧不止常山一錢半檳

榔一錢丁香五分烏梅一個酒一盞浸一

宿五更飲之。服便止永不再發如神。

凄凄然寒手足寒腰脊痛大便難目眴眴

然恒山二錢半或半兩烏梅一錢竹葉一

錢半葱白三根水一升半煎

一升發前分三服。千金方

痰聚胸中病至令人心寒甚乃熱熱間

善驚如有所見恒山三錢甘草半錢秫米

三十五粒水二鍾煎一鍾發

日早分三次服。千金方

外臺秘要用常山三兩漿水三升浸一宿

煎取一升欲發前頓服取吐。肘后方用

本草類方

瘧疾

壹

太陰肺瘧

截瘧諸湯

痰瘧積瘧

久瘧有母

截瘧諸丸

常山一兩秫米一百粒水六升煮三升分
 三服。晝夜未發臨發時服盡。養生主論
 丁隱居驅瘧湯云子用此四十年奇效不
 能盡述切勿加減萬一無吐者常山酒煮
 晒乾知母貝母草果各一錢半水一鍾
 半煎半熟五更熱服清以酒浸發前服
 黎蘆皂莢炙各一兩巴豆二十五枚熬黃
 研末蜜丸小豆大每空心服一丸未發時
 一丸臨發時又服一丸
 凡勿用飲食。肘後
 木鼈子穿山甲炮等分爲末每服
 三錢空心溫酒下。醫方摘要
 子金方恒山丸治數年不瘥者兩劑瘥一
 月以來者一劑瘥恒山三兩研末鷄子白
 和丸梧子大瓦器煮熟殺腥氣則取晒乾
 取之每服二十九丸竹葉湯下五更一張天
 明一服發前一服或吐或否卽止。肘後
 丹砂丸恒山鴉末三兩真丹一兩研白蜜

本草類方

瘧疾卷二

畜

和杵百下丸梧子大先發時三九少頃再服三九臨時服三九酒下無不顯者。曾世榮活幼心書黃丹丸治大小久瘧恒山二兩黃丹半兩烏梅連核瓦焙一兩為末糯米粉糊丸梧子大每服三五丸涼酒下隔一夜服半日一服午後方食。葛洪肘後方用恒山三兩知母一兩甘草兩兩搗末蜜丸梧子大先發時服十九丸次服七丸後服五六丸以瘧為度。和劑局方瞻仰丸治一切瘧常山四兩炒存性草果二兩炒存性為末薄糊丸梧子大每時時冷酒服五十九丸五更再服忌鷺羊熱物。又勝金丹治一切瘧胸膈停痰發不愈者常山入兩酒浸蒸焙檳榔二兩生研末糊丸梧子大如上法服。集簡方二聖丸治諸瘧不拘遠近大小鷄骨恒山鷄心檳榔各一兩生研鱧甲煨焦一兩半為末糯粉糊丸棗豆大黃丹為衣每服三五丸

勞瘧劣弱

如法服
烏梅十四枚豆豉二合桃柳枝各一虎口甘草三寸生薑一塊以童子小便二升煎一半溫服即止

久瘧痰多

不食欲吐不吐藜蘆末半錢
溫菴水調下探吐。保命集

瘧疾寒熱

瓜蒂二枚水半盞浸一宿頓服取吐愈。千金

寒瘧積瘧

巴豆一枚去心皮射罔去皮如巴豆大大棗去皮一枚搗成丸梧子大清旦先發時各服一丸白湯下。肘後方

寒熱瘧疾

附子一枚重五錢者麵煨人參丹砂各一錢為末煉蜜丸梧子大每服二十九未發前連進三服中病則吐或身體麻木末中病來日再服。麗安常傷寒論

瘧疾寒熱

煮鼓湯飲數升得大吐即愈。附后方

脾寒厥瘧

先寒後熱名寒瘧但寒不熱面色黑者名厥瘧寒多熱少面黃腹痛名脾瘧三者並

宜服此買耘老用之二十年累試有效蓋

良久切焙研稀糊丸梧子大每服三十九

薑十片棗三枚葱三根煎湯清早服以棗

壓之如人行十里許再一服絕勿

飲湯便不發也。蘇東坡良方

青皮一兩燒存性研末發前溫

酒服一錢臨時再服。聖惠方

濟生方云五臟氣虛陰陽相勝發為瘧瘧

寒多熱少或但寒不熱宜七東湯主之用

附子一枚炮七次鹽湯浸七次去皮臍分

作二服水一碗生薑七片棗七枚煎七分

露一宿發日空心溫服未久再進一服工

璆百一選方云寒瘧宜附子風瘧宜烏頭

本草類方

瘧疾

壹

瘧瘧寒熱

冷瘧寒熱往來頭痛身疼嘔痰或汗多引

飲或自利煩躁宜薑附湯主之大附子一

枚四破每以一片水一盞生薑十片煎七

分溫服李待制云此方極妙章傑云嶺南

以啞瘧為危急不過一二日而死醫謂極

熱感寒也用生附子一味治之多愈得非

新久瘧疾

死回生之藥也。嶺南衛生方

用葛藟草一握一名勒蔓去兩頭秋冬川

乾者恒山末等分以淡漿水二大盞浸藥

星月下露一宿五更煎一盞分二服以吐痰愈

熱瘧不止 翹搖梓汁服之。廣利方

男女瘧疾 馬齒莧搗紫手寸口男左女右

止截瘧疾 小蒜不拘多少研泥入黃丹少許并如芡子大每服一九面東新汲水下至妙。唐

慎

瘧瘧發熱 連背項者尚香子搗汁服之。孫真方

脾寒瘧疾 石胡荽一把梓汁半盞入酒半盞和服甚效。集簡方

諸瘧久瘧 用三姓人家寒食麩各一合五月五日午時采青蒿搗自然汁和九絲豆大臨發日早無根水一九一方加炒黃丹少許。德生堂

或酒下移病人原睡處其狀如醉醒即愈。又方火麻葉如上法為末一兩加縮砂丁香陳皮亦各半兩酒糊丸梧子大每酒茶任下五七丸能治諸瘧壯元氣。普濟方

治瘧不止 火麻葉不問榮枯鍋內文武火慢炒香取起以紙蓋之令出汗盡為末臨發前用茶

本草類方 瘧疾

卷二

突

肺瘧寒熱 痰聚胸中病至令人心寒寒甚乃熱善驚如有所見恒山三錢甘草半錢秫米三十

五粒水煎末發時分作三次服。千金

寒瘧冷痢 端午日以獨頭蒜十箇黃丹二錢壽九梧子大每服九九長流水下甚妙。普濟方

瘧疾寒熱 脾胃聚痰發為寒熱生薑四兩搗自然汁一酒盞露一夜於發日五更面北立飲即

止未止再服。易簡

脾寒瘧疾 外臺用乾薑高良薑等分為末每服一錢水一盞煎至七分服。又乾薑炒黑為末

臨發時以溫

酒服三錢七

鬼瘧寒熱

樹上白乾桃子二七枚為末滴水并梧子大朱砂為衣每服一九侵晨而東并華水

下良。聖

濟總錄

瘧疾不已

桃花為末酒服方寸匕良。梅師方

瘧疾寒熱

翻白草根五七個煎酒服之

斷截瘧疾

紫葳一握搗爛絹包周身摩擦得腫行汗即愈臨發前一時作之。救急易方

瘧疾寒熱

肘後用獨頭蒜炭上燒之酒服方寸匕。簡便用桃仁半片放內闔穴上將獨蒜搗

人屢效。普濟方端午日取獨頭蒜煨熟

入礬紅等分搗丸突子大每白湯嚥下一丸

本草類方

瘧疾卷二

奎

五種瘧疾

家寶通神丸用神桃即桃奴十四枚巴豆七粉黑豆一兩研勻以冷水和丸梧子大

朱砂為衣發日五更急藥王菩薩七遍并華水下一九立瘥不過二次妙不可言。

王隱君養生主論

瘧疾寒熱

桃仁一百枚去皮尖乳幹內研成膏不得犯生水入黃丹三錢丸梧子大每服三九

當發日而北溫酒吞下五月五日午時合之忌鷄犬婦人見。唐慎微本草

寒熱瘧疾

體虛汗多者黃丹百草霜等分為末發日空心米飲服三錢不過二服愈或糊丸或

赤丸皆效。肘後方用飛炒黃丹二兩恒山末三兩紫丸梧子大每服五十九溫酒

下平日及未發將發時各一服無不效。普濟方端午日用黃丹炒二兩獨蒜一百

箇搗丸梧子大每服九丸空心長流水面東下二三發後乃用神效亦治痢疾。三

因方用黃丹炒建茶等分爲末溫酒服二錢。又黃丹飛焙麪糊丸次子大每棗子一枚去核包一丸

鬼瘡日發

紙裹煨熟食之
鬼箭羽鯁鯁甲燒灰二錢半爲末每以一字發時噴鼻。又法鬼箭羽末一分砒霜一錢五靈脂一兩爲末發時

脚寒諸瘡

冷水服一錢。聖濟總錄
不拘老少孕婦只兩服便止真橘皮去白切生薑自然汁浸過一指銀器內重湯煮乾焙研末每服三錢用隔年青州棗十箇水一盞煎半盞發前服以棗下之。適用方

呪棗治瘡

執棗一枚呪曰吾有棗一枚一心歸大道優他或優降或劈火燒之念七遍吹棗上與病人食之即愈。响嘍神書

本草類方

瘡疾卷二

矣

食瘡積瘡

巴豆去皮心二錢皂莢去皮子六錢搗丸綠豆大一服一丸冷湯下。附後方

痲瘡寒熱

阿魏臙脂各一豆大研勻以蒜管和覆虎口上男左女右。聖濟總錄

瘡疾不止

故鞋底去兩頭燒灰并華水服之。千金方

鬼瘡來去

畫鍾馗紙燒灰二錢阿魏砒霜丹砂各一皂子大爲末寒食通和九小豆大每服一丸發時冷水下正月十三日

截瘡

五月初五日修合。聖濟錄
五月五日取花蜘蛛肥乾絳囊盛之臨期男左女右繫臂上勿令知之。普濟方
葛洪方用蜘蛛一枚同飯搗光吞之。楊氏家藏用蜘蛛一枚着蘆管中密塞縮項上勿令患人知之。海上方用蜘蛛三五枚綿包繫寸口上。宣明方用大蜘蛛三枚信祝一錢雄黑豆四十九粒爲末滴水爲丸豌豆大先夜以一九獻於北斗下次早

紙裹插耳內立見神
聖一丸可醫二人

寒熱瘧疾

猪膏九治瘧疾發渴往來不定臘猪膏二兩獨角仙一枚獨頭蒜一箇樓葱一握五月五日三更時淨處露頭赤脚舌柱上嚮回面向北搗一干九兒子大每以新綿裹一丸繫臂上男左女右。聖惠

老瘧勞瘧

用鼈甲醋炙研末酒服方寸匕隔夜一服清早一服臨時一服無不斷者入雄黃少許更佳。肘后

瘧疾不止

白蠶蠶而者一箇切作七段綿裹為丸硃砂為衣作一服日未出時面向東用桃李枝七寸煎湯吞下。陰方

老瘧不止

龍骨末方寸匕先發一時酒一升半煮三沸及熱服盡溫覆取汗即效。肘後

本草類方

瘧疾

堯

熱瘧不寒

穿山甲一兩乾薑十個同燒存性為末每服二錢發日五更并花水服。楊氏家藏

佩囊瘧疾

五月五日收大蝦蟆晒乾紙封絳囊貯之男左女右繫臂上勿令知之。楊氏家藏

瘧疾寒熱

牡蠣粉杜仲等分為末蜜丸梧子大每服五十九溫水下。普濟方

瘧疾不止

不拘久近重輔垢水洗下遍和丸彈子大作燒餅未發時食一枚發時又食一枚。聖惠

瘧疾不止

龜版燒存性研末酒服方寸匕。海上名方

厭瘧疾

藏器曰燕屎方寸匕發日下旦和酒一升令病人兩手捧住吸氣慎勿入口害人

邪瘧時作

生虎睛一枚臘月豬血少許硃砂阿魏各一分為末端午日取糝尖七枚和丸黍米

大每綿包一丸塞耳中
男左女右。聖惠方

五瘧不止

聖惠用夜明砂末每冷茶服一錢立效。
又方治瘧發作無時經久不瘥用蝸蝓糞
五十粒硃砂半兩麝香一錢為末糯
米飯丸小豆大未發時白湯下十九

鬼瘧經久

或發或止野貓肝一具瓶盛熱豬血浸之
封口懸乾去血取肝研末狗獾頭骨虎頭
骨狗頭骨各一兩麝香一分為末醋糊丸
芡子大發時手把一丸嗅之仍以緋帛包

上。聖惠方

狐膽丸

治邪癘發作無時狐膽一箇硃砂砒霜各
半兩阿魏麝香黃丹菴豆粉各一分為末

久瘧不止

五月五日午時粽子尖和丸梧子大空心
及發前冷醋湯服二丸忌熱物。聖惠方
伏翼丸用蝙蝠一枚炙蛇蛻皮一條燒蚰
蛛一枚去足炙鼈甲一枚醋炙麝香半錢

本草類方

瘧疾卷二

辛

久瘧不止

為末五月五日午時研勻入煉蜜和
丸麻子大每溫酒下五丸。聖惠方
或一日二發或一日二三發或二三日一
發用五靈脂頭垢各一錢古域石灰二錢
研末針丸息子大每服一九五更

鬼瘧不止

無根水下即止神效方也。海上
用白驢蹄割炒砒霜各二分大黃四兩菜
豆三分雞黃一分硃砂半分研丸梧子大
未發平旦冷水服二丸

勞瘧瘴瘧

即止七日忌油。肘后
野狐肝一具陰乾重五日五更初北斗下
受氣為末粳米作丸菜豆大每以一九緋
帛裹繫手中指男

久瘧不止

空女右。聖惠方
雄野鷄屎熊膽五靈脂恒山等分為末醋
糊丸黑豆大正發時冷水下一丸。聖惠
久瘧不止
范汪方用蝙蝠七個去頭翅足擣干下丸
梧子大每服一九清湯下鷄鳴時一九日

勞瘧瘴瘧

久不愈用白狗糞燒灰發前冷水服二錢。聖惠方

邪氣瘴疾

外臺用黑牛尾燒末酒服方寸匕日三服。一用牯牛陰毛七根黃荊葉七片縛內

關上亦效

虛寒瘴疾

羊肉作臠餅飽食之更飲酒暖。取汗燕國公常見有驗。集驗方

鬼

瘧

進退不定用獨絲頭骨一枚燒研空心溫酒服一錢臨發再服。聖惠方

虛寒瘴疾

黃狗肉煮臠入五味食之

鬼瘧進退

不定者用人膽硃砂雄黃麝香等分爲末醋糊丸綠豆大每綿裹一九納鼻中即瘧

男左女右一九可治二人。聖惠方

本草類方

瘧疾卷二

圭

久瘧連年

用生人膽一箇盛糯米令滿入射香少許突上陰乾一半青者治瘧一半黑者治噎

爲末每服十五粒瘧用陳皮湯下噎用通草湯下。普濟方

瘴癘諸瘧

無問新久童便一升入白蜜二匙攪去白沫頓服取吐碧綠痰出爲妙若不然終不除也。聖惠方

除也。聖惠

諸瘧寒熱

天靈蓋煨研末水服一字取效。聖惠方

本草類方卷之二

心下第二十四

枳木湯

心下堅大如盤邊如旋盃水飲所作寒氣
通即手足冷厥逆腹滿脅鳴相逐陽氣不
寒陰前通則痺不仁陰陽相得其氣乃行
大氣一轉其氣乃散實則失氣虛則遺尿
名曰氣分宜此主之自木一兩枳實七個
水五升煮三升分三服胸

中軟即散仲景金匱玉函

腹中痞積

牛肉四兩切片以風化石灰一錢擦上
蒸熟食常食痞積自平○經驗秘方
消痞強胃久服令人食自不停也白木一
兩黃壁土炒過去土枳實麩炒去麩一兩
為末荷葉包飯燒熟鴉和九梧子大每服
五十九白湯下氣滯加橘皮一兩有火加

枳木丸

本草類方

心下

聖

黃連一兩有痰加半夏一兩有寒加乾薑
五錢木香三錢有食加神麩麥藥各五錢
○潔古

腹中痞積

水紅花或子一盞以水三盞用桑柴文武
火煎成膏量痞大小攤貼仍以酒調膏服
忌腥葷油膩之物○

下早成痞

傷寒陰證下早成痞心下滿而不痛按之
虛軟枳殼檳榔等分為末每服三錢黃連
湯調下

癰痞腹脹

及堅硬如盃盃者用水紅花子一升另研
獨顆蒜三十箇去皮新狗腦一箇皮硝四
兩石臼搗爛一在患處上用油紙以長帛
束之酒時貼之次日辰時取之未效再貼
二三次的倘有膿潰勿怪仍看虛實日逐間
服錢氏白餅子紫霜九塌氣丸消積九利

本草類方

老人膈痞

之磨之服至半月甚者一月無不瘥矣以喘滿者為實不喘者為虛○蘭氏經驗方末一分薑汁搜如常法入五味作臛食每

脾積痞氣

○多能鄙事牛腦丸治男婦脾積痞病大有神效黃萍牛腦子一個去皮筋搗爛皮硝末一斤蒸餅六箇晒研和勻糊丸梧子大每服三十丸空心好酒下日三服百日有驗○聖濟

腹中痞積

威靈仙楮桃兒各一兩為末每温酒服三錢各化鐵丸○普濟善忘不禁茵茹二分甘草炙二兩消石為末每服一錢鷄鳴時温酒下以知為度○

中焦熱痞

聖惠方聖惠末每服一錢鷄鳴時温酒下以知為度○

痞證發熱

盜汗胸背疼痛甘遂麵包漿水煮十沸去麵以細糠火炒黃為末大人三錢小兒一

本草類方

錢冷蜜水卧時服忌油膩魚肉○普濟方

腹中痞塊

本籠子仁五兩用豬腰子二副批開入在內簽定煨熟同搗爛入黃連三錢末蒸餅和丸綠豆大每白湯下三十九○醫方集成

一切壅滯

經驗方治風熱積壅化痰涎治痞悶消食化氣導血用大黃四兩牽牛子半炒生四兩為末煉蜜丸如梧子大每服十九○白湯下並不損人如要微利加一二十九○衛生寶鑑用皂莢熬膏和丸名墜痰丸又名金真丸金宣宗服之有驗賜名保安丸

痞塊心痛

服并傳塊上○摘玄方

腹中痞硬

夏秋之交露坐夜久腹中痞如群石在腹用大豆半升生薑八分水三升煎一升已來頓服瘥○經驗方

卷二下

七

冷痰痞滿

黑芥子白芥子大戟甘遂胡椒桂心等分為末糊丸梧子大每服十九薑湯下名黑芥丸○

普濟方

腹滿癖堅

如石積年不損者必效方用白楊木東枝去粗皮辟風細到五升熬黃以酒五升淋

訖川繩袋盛滓遠納酒中密封再宿每服一合日三服○外臺秘要

痞塊有積

阿魏五錢五靈脂炒烟盡五錢為末以黃雄狗膽汁和丸黍米大空心唾津送下三十九忌羊肉醋

麩○扶壽精方

胸痺結胸

胸痺心下痞堅留氣結胸脇下逆氣搶心枳實薤白湯主之陳枳實四枚厚朴四兩

薤白半斤括樓一枚桂一兩以水五升先煎枳朴取二升去滓納餘藥煎三兩沸分

溫三服常愈○張仲景金匱要畧

本草類方

卷二下

杏

腹中痞塊

外臺秘要 雄黃一兩白礬一兩為末麩糊調膏攤貼即見功效未效再貼待大便數百斤之狀乃愈秘方也

外臺秘要

痞氣胸滿

口乾肌瘦食減或時壯熱石三稜京三稜雞爪三稜並炮薑莪茂三枚檳榔一枚青橘皮五十片醋浸去白陳倉米一合醋浸淘過巴豆五十個去皮同青皮倉米炒乾去豆為末糊丸綠豆每米飲

下三九日一服○聖濟總錄

腹中痞塊

餅量痞大小貼之兩炷香為度其痞化為膿血從大便出○

劉松石保壽堂方

腹中痞塊

著葉獨蒜穿山甲末食鹽同以好醋搗成餅量痞大小貼之兩炷香為度其痞化為膿血從大便出○

腹中痞塊

餅量痞大小貼之兩炷香為度其痞化為膿血從大便出○

劉松石保壽堂方

脾積痞塊

猪脾七個每個用新針一個刺爛以皮硝一錢擦之七個並同以瓷器盛七日鐵器

焙乾又用水紅花子七錢同搗為末以無灰酒空心調下一年以下者一服可愈五年以下者二服十年以下者三服○保壽堂方

腹中痞塊

皮硝一兩獨蒜一個大黃末八分搗作飯貼于患處以消為度○邵氏經驗方

本草類方

心下
卷二

毒

本草類方卷之二

水腫脹滿第二十五

腹脹氣滿

黑鹽酒服六銖。後魏書

心腹脹堅

痛悶欲死鹽五合水一升煎服。吐下即定不吐更服。梅師方

脾虛脹滿

脾氣不和冷氣客于中壅遏不通是為脹。滿寬中丸用白朮二兩橘皮四兩為末酒糊丸梧子大每食前木香湯送下三十九効。指迷方

胸滿不痛

桔梗枳殼等分水三鍾煎一鍾溫服。南陽活人書

心腹脹滿

短氣用蔥豆蔻一兩去皮為末以木瓜生姜湯調服半錢。千金方

脾痛脹滿

草果仁二箇酒煎服之。直指方

本草類方

脹滿
卷二

腹脹忽瀉

日夜不止諸藥不效此氣脫也用益智子仁二兩濃煎飲之立愈。危氏得効方

腹中緊脹

白餅以酒三升煮服之。不過再服。子母秘錄

腹脹積聚

葶藶子一升熬以酒五升浸七日日服三合。千金方

鼓脹煩渴

身乾黑瘦馬鞭草細剉曝乾勿見火以酒或水同煮至味出去滓溫服以六月中旬雷鳴時採者有効。直指方

血氣脹滿

劉寄奴穗實為末每服三錢酒煎服不可過多令人吐利此破血之仙藥也。衛生易簡方

水蠱脹滿

芫花枳殼等分以醋煮芫花至爛乃下枳殼煮爛搗丸梧子大每服三十九白湯下。普濟方

水蠱脹滿

易簡方

水蠱脹滿

芫花枳殼等分以醋煮芫花至爛乃下枳殼煮爛搗丸梧子大每服三十九白湯下。普濟方

水蠱脹滿

普濟方

腹脹黃腫

用亞腰壺盧連子燒存性每服一個食前溫酒下不飲酒者白湯下十餘日見效。

中滿鼓脹

用三五年陳壺盧瓢一個以糯米一斗作酒待熟以瓢於炭火上炙熟入酒浸之如此三五次將瓢燒存性研末每服三錢酒下神效。余居士選奇方

關格脹滿

大小便不通獨頭蒜燒熟去皮綿裹納下部氣立通也。外臺秘要

濕氣中滿

足脛微腫小便不利氣急欬嗽黑牽牛末一兩厚朴制半兩為末每服二錢姜湯下或臨時水丸每服湯下

水蠱腹脹

老絲瓜去皮一枚剪碎巴豆十四粒同炒豆黃去豆以瓜同陳倉米再炒熟去瓜研米為末糊丸梧子大每服百丸白湯下蓋米收胃氣巴豆逐水絲瓜象人脈絡借其

本草類方

卷二

夫

腹中脹滿

氣以引之也此乃元時杭州名醫宋會之之方。鮮于樞鈞玄

心腹虛脹

手足厥逆或飲苦寒之劑多未食先嘔不思飲食山藥半生半炒為末米飲服二錢

吞犒後臍滿

兩脇刺脹臍下如小腫以構樹枝汁隨意服之小便利即消。外臺秘要

水腫脹滿

水不下則滿溢水下則虛竭還脹十無一活宜用桑椹酒治之桑心皮切以水二斗煮汁一斗入桑椹再煮取五升

中滿洞瀉

厚朴乾姜等分為末蜜丸梧子大每服五十丸米飲下。鮑氏方

男女氣脹

心悶飲食不下冷熱相攻久患不愈厚朴姜汁炙集黑為末以陳米飲調服二錢七

日三服。斗門方。

腹脹瓜數

厚朴三物湯用厚朴半斤枳實五枚以水一斗二升煎取五升入大黃四兩再煎三升溫服一升轉動更服不動勿服。張仲景金匱要畧。

腹痛脹滿

厚朴七物湯用厚朴半斤製甘草大黃各三兩藜十枚大枳實五枚桂二兩生姜五兩以水一斗煎取四升溫服入合日。

胸腹脹滿

欲令瘦者猪牙皂莢相續量長一尺燬火煨去皮子搗篩蜜丸大如梧子服時先喫羊肉兩鸞汁三兩口後以肉汁香藥十九以快利為度覺得力更服以利清水即止藥瘞後一月不得食肉及諸油膩。崔元亮海上集驗方。

老幼腹脹

血氣凝滯用此寬腸順氣名四炒丸商州枳殼厚而絲背者去穰四兩分作四分一

本草類方

張滿卷二

羌

兩用蒼朮一兩同炒一兩用蘿蔔子一兩同炒一兩用乾漆一兩同炒一兩用茴香一兩同炒黃去四味只取枳殼為末以四味煎汁煮麵糊和丸梧子大每食後米飲下五十丸。

水蠱腹大

王氏簡易方。動搖有水聲皮膚黑色用乾青陸二枚以酥炒乾螻蛄七枚炒苦蘆葦半兩炒右為末每空心溫酒服二錢。

水腫脹滿

赤尾鯉魚一片破開不見水及鹽以生礬五錢研末入腹內火紙包裹外以黃土泥包放竈內煨熟取出去紙泥送粥食頭者上消食身尾者下消一日用盡屢試經驗。

腹大如箕

用蜈蚣三五條酒炙研末每服一錢以雞子二個打開入末在內攪勻紙糊沸湯煮方摘要。

楊拱醫

熟食之日一服連進
三服瘳○活人心統

少小腹脹

車穀中脂和輪下土如彈丸吞之立愈○千金方

牽牛酒

脹水脹等有峨岬一僧用此治人得効其人牽牛來謝故名用乾雞矢一升炒黃以酒醅三碗煮一碗濾汁飲之少頃腹中氣

大轉動利下即白脚牛皮皺消也未盡隔日再作仍以田蠶二枚滾酒淪食後用白粥調理○積

善堂經驗方

野雞一隻不拘雄雌茴香炒馬芹子炒川椒陳皮生姜等分用醋以一夜蒸餅和雉肉作餡料外以麵皮包作餛飩煮熟食仍

心腹脹滿

早服嘉禾散辰服此午服導氣枳殼丸○朱氏集

驗方

朱氏集

本草類方

脹滿卷二

全

癥癖鼓脹

烏牛屎一升微火煎如稠飴空心服棗許當鳴轉病出隔日更服之○千金翼

積聚脹滿

白馬糞同蒜搗膏傅患處効○活人心鏡

胸脇通滿

於羊角燒末水服方寸匕○子母秘錄

中滿腹脹

且食不能暮食用不着鹽水猪血漉去水晒乾為末酒服取洩甚効○李樓奇方

浮腫脹滿

生以蒜雜食之○心鏡

久患氣脹

烏牛屎一升空心溫服氣散止○廣濟方

氣水鼓脹

狗肉一斤切和米煮粥空腹食之○心鏡

浮腫脹滿

不下食猪肝一具洗切著葱豉姜椒炙食之或單煮羹亦可○心鏡

水蟲腹大

動搖水聲皮膚黑用鬼扇根搗汁服一盃水即下○肘後方

水氣鼓脹

大小便瀉羊桃根桑白皮木通大戟炒各半斤剉水一斗煮五升熬和稀餵每空心茶服一匙二便利食

大腹水蠱

馬鞭草鼠尾草各十斤水一担煮取五斗去滓再煎令稠以粉和九大豆大每服二三九加至四五丸

水氣脹滿

椒目炒搗如膏每酒服方寸匕○千金方

水蠱脹滿

兩和作燒餅卧時焙熟食之以茶下降氣為驗○河

水蠱腹大

動搖有聲皮膚黑者用赤小豆三升白茅根一握水煮食豆以消為度○肘後

本草類方

脹滿卷二

十種蠱氣

若丁香為末棗肉和九梧子大每服三十丸棗湯下甚效○瑞竹堂方

水蠱大腹

動搖水聲皮膚色黑巴豆九枚去心皮熬黃杏仁六十枚去皮尖熬黃搗丸如豆大水下九以利為度勿

水氣蠱脹

飲酒○張文仲備急方

水蠱類方

褚實子九以潔淨釜用褚實子一斗水二斗熬成膏茯苓三兩白丁香一兩半為末以膏和丸梧子大從少至多脹至小便清利脹減為度後服治中湯養之忌甘苦峻補及發動之物

潔古活法機要

本草類方卷之二

諸腫第二十六

水腫浮滿

烏錫五兩皂莢一挺炙酒二斗煮六沸
頓服至小便出二三升即消。千金翼

水腫尿少

鐵砂醋煮炒乾豬苓生地龍各三錢為末
葱涎研和傳臍中約一寸厚縛之待小便

石水腫堅

脹滿用白石莢二兩逆豆大甕瓶盛好酒
二斗浸之以泥重封將馬糞及糠火燒之

水氣腫滿

黍粉一錢烏雞子去黃盛粉蒸餅包蒸熟
取出苦葶藶炒一錢同蒸餅杵丸棗豆大

水腫上氣

分以蠟紙鋪艾酒二末于上荻管捲成筒
燒烟吸嚥三十日則瘥。外臺秘要

正水腫病

大便利者銀朱半兩硫黃取四兩為末麩
糊丸梧子大每飲下三十丸。普濟方

黃腫水腫

推車丸用明礬二兩青礬一兩白麩半斤
同炒冷赤以醋煮米粉糊為丸棗湯下三

通身水腫

姜石燒赤納黑牛尿中熬
服日飲一升。千金方

水腫

黃環根晒乾每服五錢水煎
服小便利為效。儒門事親

虛後水腫

因飲水多小便不利用白茅根一大把小
豆三升水三升煮乾去茅食豆水隨小便

本草類方

諸腫

全

酒腫虛腫

香附子艾米醋煮乾焙研為末米醋糊丸
服久之取水從小便出神效。經驗方

水腫

欬嗽腹脹熏黃一兩欬冬花二分熟艾一
分以蠟紙鋪艾酒二末于上荻管捲成筒

正水腫病

大便利者銀朱半兩硫黃取四兩為末麩
糊丸梧子大每飲下三十丸。普濟方

黃腫水腫

推車丸用明礬二兩青礬一兩白麩半斤
同炒冷赤以醋煮米粉糊為丸棗湯下三

通身水腫

姜石燒赤納黑牛尿中熬
服日飲一升。千金方

水腫

黃環根晒乾每服五錢水煎
服小便利為效。儒門事親

虛後水腫

因飲水多小便不利用白茅根一大把小
豆三升水三升煮乾去茅食豆水隨小便

下也。附後方。

四肢腫滿

白朮三兩咬咀每服半兩水一盞半大棗三枚煎九分溫服日三四服不拘時候。

氣虛浮腫

香附子一斤童子小便浸三日焙為末糊丸每米飲下四五十九丸日二。丹溪心法

水病洪腫

朝洽屬止香薷煎用乾香薷五十斤剉入金中以水淹過三寸煮使氣力都盡去滓澄之微火煎至可九九如梧子大一服五先日三服日漸增之以小便利則愈。蘇

通身水腫

深師膏水丸治暴水風水氣水通身皆腫服至小便利為效用香薷葉一斤水一斗熬極爛去滓再熬成膏加白朮末七兩和丸梧子大每服十九米飲下日五夜一服

本草類方

諸腫 卷二

金

通身浮腫

杜蒺藜日煎湯洗之。聖惠方

水腫尿澀

馬蘭菜一虎口黑豆小麥各一撮水酒各一鍾煎一鍾食前溫服以利小便水四五日愈。楊起

遍身腹滿

陰亦腫者用縮砂仁土狗一箇等分研和老酒釀之。直指方

大腹水腫

肘後方用苦葶藶土并炒為末割鷄雄雞血及頭合搗丸梧子大每小豆湯下十九日三服。又方葶藶二升春酒五升漬一夜稍服一合小便當利。又方葶藶一兩杏仁二十枚煎熬黃色搗分十服小便去常瘥

通身腫滿

苦葶藶炒四兩為末棗肉和丸梧子大每服半五九桑根皮湯下日三服此方人不

疾信試
之自驗

陽水暴腫

面赤煩渴喘急小便澀其效如神甜葶藶
一兩半炒研末漢防已末二兩以絲頭鴨
血及頭合搗萬杵九梧子大甚者空腹白
湯下十丸輕者五丸日三四服五日止小
便利為驗一加猪苓
未二兩○外臺秘要

大腹水腫

馬鞭草鼠尾草各十斤水一担煮取五斗
去滓再煎令稠以粉和九大豆大每服二
三丸加至四九
神效○附後方

通身水腫

鹿葱根葉晒乾為末每服二錢入席下塵
半錢食前米飲服○聖惠方鹿葱乃萱草
也

水腫尿澀

梅師方用甜葶藶二兩炒為末以大棗二
十枚水一大升煎一升去棗入葶藶末煎

本草類方

諸腫

齒

水腫

至可九如梧子大每飲服六十九漸加
微利為度○崔氏方用葶藶三兩絹包飯
上蒸熟鴉萬杵九梧子大不須蜜和每服
五丸漸加至七九以微利為准不可多服

水腫

令人不堪若氣發服之得到氣下即止水
氣無比蕭駒馬水腫服此得捷○外科精
義治男婦大小頭面手足腫用苦葶藶炒
研藥肉和丸小豆大每服十九煎麻子湯

水腫

下日三服五七日小便多
則消腫也忌鹹酸生冷

脚濕腫滿

腹脹如鼓喘不得卧海金沙散用海金沙
三錢白米四兩甘草半兩黑牽牛頭末一
兩半為末每服一錢煎側流米調
下得利為妙○東垣蘭室秘藏

渾身水腫

坐臥不得取蒲薺根去皮搗汁一合
和酒一合煖服當微吐利○梅師方

大腹水腫

小便不利蒼耳子灰葶藶末等分
每服二錢水下日二服○千金方

身面卒腫

生豬肝一具細切醋洗入蒜醋食之勿用鹽

風水身腫

欲裂鼠粘子二兩炒研為末每溫水服二錢日三服。聖惠方

水腫支飲

及癖飲用十棗湯加大黃甘草五物各一兩。胡洽

水腫腹大

如鼓或遍身浮腫用棗一斗入鍋內以水浸過用大戟根黃益之瓦盆合定煮熟取棗無時食之棗盡火愈。又大戟散用大戟白牽牛木香等分為末每服一錢以猪

水腫

食之左則塌左右則塌右。張潔古活法

水病腫滿

不問年月淺深大戟當歸橘皮各一兩切以水二升煮取七合頓服利下水二三升

本草類方

諸腫 卷二

十腫水氣

澤漆十斤夏月取嫩莖葉入水一斗研汁約二斗於銀鍋內慢火熬如稀錫入瓶內收每日常空心溫酒調下

腫滿洪大

防葵研末溫酒服。刀圭至二三

水腫脉沉

屬少陰其脉浮者為氣虛服者為氣皆非水也麻黃附子湯汗之麻黃三兩水七升者去沐入甘草二兩附子炮一枚煮取二升半每服八分日三服取汗。張仲景全

水腫支飲

賈要

水氣腫脹

大戟一兩廣木香半兩為末五更酒服一錢半取下碧水後以粥補之忌鹹物。簡

水腫

要

水腫

要

水腫

要

水腫

要

水腫

要

水腫

要

水腫

要

木煎製... 便方用大戟燒存性研末每空心酒服一錢七

裏水黃腫 張仲景云一身面目黃腫其脉沉小便不利甘草麻黃湯主之麻黃四兩水五升煮去沫入甘草二兩者取三升每服一升重覆汗出不汗再服慎風寒。千金云有患

氣急久不瘥變成水病從腰以上腫者宜以此發汗

水氣蠱病 生鮮蒲眼睛睛草晒乾為末棗肉丸彈子大每服二丸白湯化下日二服覺腹中暖小便利為度。

乾坤秘製... 水蠱大戟炒二兩乾姜炮半兩

水腫喘急 小便澀及水蠱大戟炒二兩乾姜炮半兩為散每服三錢姜湯下大小便利為度。

聖濟總錄

腎水流注 腿膝攣急四肢腫痛用甘遂二錢生研為末以豬豬腎一枚分為七瓣加水香四錢

本草類方 諸肺卷二 全

每用二錢煨熟溫酒嚼下當利黃水為驗。御藥院方傳

水氣腫滿 外臺秘要用白商陸根去皮切如豆大一盞以水二升煮一升更以拉米一大盞

同煮成粥每日空心服之取微利不得雜食。千金髓用白商陸六兩取汁半合和酒半升看人與服當利下水取效。梅師

方用白商陸一升羊肉六兩水一斗煮取

去升去葶和葱

陽水腫脹 續隨子炒去油二兩大黃一兩為末酒水攪隨子炒去油二兩大黃一兩為末酒水攪

攪綠豆大海白湯下五十九以去陳莖。

水腫腹滿 甘遂炒二錢二分黑牽牛一兩半

水氣腫脹 聯步一兩去殼研壓去油重研分作七服每治一人用一服丈夫生餅子酒下婦人

荆芥湯五更服之當下利至曉自止後以厚朴湯補之煩弊蓋善忌鹽醋一百日乃

不復作聯步節續隨子也。斗門方

然腫滿

用猪腎批開入甘遂末一錢紙裹煨熟食以小便利為效否則再服。肘後方

身面腫滿

鷄子黃白相和塗腫處乾再上。肘後方

膜外水氣

甘遂末大麥麵各半兩水和作餅燒熟食之取利。聖濟總錄

身面洪腫

甘遂二錢生研為末以豬腎一枚分為七瓣入末在內濕紙包煨令熟食之日一服至四五服當覺腹鳴小便利是其效也。肘後方

水腫喘急

大小便不通十棗丸用甘遂大戟芫花等分為末以棗肉和丸梧子大每服四十九侵晨熱湯下利去黃水為度

本草類方

卷二 諸腫 七

婦人血結

婦人少腹滿如敦狀小便微難而不渴此為水與血俱結在血室大黃二兩甘遂阿膠各二兩水一升半煮半升頓服其血當下。張仲景方

膜外水氣

人參麵甘遂末各半兩水和作餅炙熟食取利。總錄

正水脹急

大小不利欲死甘遂五錢半生半炒胭脂坯子十文研勻每以一錢白麵四兩水和作碁子大水煮令浮淡食之大小便利後用平胃散如熟附子每以二錢煎服。普濟方

陰水腫滿

烏頭一升桑白皮五升水五升煮一升去滓銅器盛之重湯煎至可丸九小豆大每服三五丸取小便利為佳忌油膩酒麵魚肉。又方大附子童便浸三日夜逐日換尿以布擦去皮搗如泥酒糊和丸小豆大每服三十九煎流氣飲送下。普濟方

腫疾喘滿

大人小兒男女腫因積得既收積而腫再作小便不利若再用利藥性寒而小便愈不通矣醫者到此多束手蓋中焦下焦氣

不升降為寒痞膈故水凝而不通惟服沉附湯則小便自通喘滿自愈用生附子一箇去皮臍切片生薑十片入沉香一錢磨

水同煎食前冷飲附子雖三五十枚亦無害小兒每服三錢水煎服○朱氏集驗方

喘急馬兜鈴煎湯

水腫腹大

喘急馬兜鈴煎湯

陰水陽水

黑牽牛頭末三兩大黃末三兩陳米飯鍋蒸一兩為末糊丸梧子大每服五十九姜湯下欲利服百丸○醫方捷徑

丸○醫方捷徑

小腹堅大

如盤胸滿食不能消化用麴末湯服方寸七日三○千金

水腫尿瀉

牽牛末每服方寸七以小便利為度○千金方

本草類方

諸腫

矣

麻子仁粥

治風水腹大腰臍重痛不可轉動用冬麻子半斤研碎水瀝取汁人糲米二合煮稀粥下葱椒鹽豉空心食○食醫心鏡

心食○食醫心鏡

皮水附腫

按之沒指不惡風水氣在皮膚中四肢重難動者防已茯苓湯主之防已黃芪桂枝

各三兩茯苓六兩甘草三兩每服一兩水一升煎半升服日二服○張仲景方

水腫煩渴

小便少者冬瓜白甄水煮汁淡飲之○聖濟總錄

通身水腫

煮湯浴之

水氣腫滿

大蒜田螺車前子等分熬膏攤貼臍中水從便澀而下數日即愈泉山民人患水腫

一卜者傳此用之有效○仇遠神史

十水腫喘

庄大戟一錢蕎麥麵二錢水和作餅炙熟為末空心茶服以大小便和為度○聖惠

水蠱洪腫

苦瓠瓢一枚水二升煮至一升煎至可丸如小豆大每米飲下十九丸待小便利作小

豆羹食勿飲水

遍身黃腫

搗新鮮百條根洗搗登臍上以糯米飯半升拌水酒半合揉軟蓋在藥上以帛包住

待一二日後口內作酒氣則水從小便中

出腫自消也百條根一名野天門冬一名百始狀如葱頭其苗葉柔細一根

身面浮腫

下有百餘個數○楊氏經驗方小便利不利喘息用胡葱十莖赤小豆三合

硝石一兩以水五升煮葱豆至熟同搗成膏每空心溫酒服

十種水氣

浮腫喘滿用大冬瓜一枚切蓋去瓢以赤小豆填滿蓋合簽定以紙筋泥固濟日乾

用糯糠兩大籬入瓜在內煨至火盡取出切片同豆焙乾為末水糊丸梧子大每服

本草類方

卷二 諸腫

完

七十九煎冬瓜子湯下日三服小便利為度○楊氏家藏方

水病危急

冬瓜不拘多少任意喫之神效無比○兵部手集

水氣腫脹

頰目用赤小豆五合大蒜一顆生姜五錢商陸根一條煎碎破同水煮爛去藥空心

食豆旋旋啜汁令盡腫立消也○韋而獨行方治水腫從脚起入腹則殺人赤小豆

一斗煮極爛取汁五升溫漬足膝若已入腹但食小豆勿雜食亦愈○梅師治水腫

以東行花桑枝燒灰一升淋汁煮赤小豆一升以代飯良

遍身浮腫

出了子蘿蔔浮麥等分浸湯飲之○聖濟總錄

石水腹腫

四肢皆瘦削用苦瓠脫炒一兩杏仁半兩炒去皮尖為末糊丸小豆大每飲下十九

日三水下止○聖濟總錄

新久水腫

大豆一斗清水一斗煮取八升去豆入薄酒八升再煎取八升服之再三服水當從小便中出

十種水氣

用綠豆二合半大附子一隻去皮臍切作兩片水三碗煮熟空心卧時食豆次日將附子二片作四片再以綠豆二合半如前煮食第三日別以綠豆附子如前煮食第四日如第二日法煮食水從小便下腫自消未消再服忌生冷毒物鹽酒六十日無不效者○朱氏集驗方

身面浮腫

千金用烏豆一升水五升煮汁三升入酒五升更煮三升分溫三服不瘥再合○王璆百一選方用烏豆煮至皮乾為末每服二錢米飲下建炎初吳內翰女孫忽發腫凸異檢外臺得此方服之立驗

本草類方

諸腫卷二

九

風水惡風

汗出身重脈浮防已黃芪湯主之防已一兩黃芪二兩二錢半白朮七錢半炙甘草半兩剉散每服五錢生姜四片棗一枚水一盞半煎八分溫服良久再服腹痛加芍藥○張仲景方

水瘡病腫

葱根白皮煮汁服一盞當下水出病已困者取根搗爛坐之取氣水自下○聖濟錄

水氣洪腫

小便不利浮萍日乾為末每服方寸匕白湯下日二服○聖惠方

身體卒腫

醋和蜆蜎屎傳之○千金

水腫喘急

用郁李仁二兩研以水瀝汁煮薏苡仁飯日二食之○獨行方

水病腫滿

喘急大小便澀大豆黃卷醋炒大黃炒等分為細末葱橘皮湯服二錢平明以乳為度○聖濟總錄

水氣浮腫

氣促坐卧不得用牽牛子二兩微炒搗末以烏牛尿浸一宿平旦入葱白一握煎十餘沸空心分二服水從

通身水腫

小便中出。聖惠方。苦瓠膜炒二兩苦葶藶五分搗合丸小豆大每服五丸日三水下止。又用苦瓠膜五分大棗七枚搗丸一服三丸如人行十里許又服三丸水出更服一丸即止。並千金方。

喘促浮腫

小便淋瀝用杏仁一兩去皮尖煖研和米煮粥空心喫二合妙。心鏡。

水病足腫

葱莖葉煮湯漬之日三五次妙。韋宙獨行方。陽水浮腫敗荷葉燒存性研末每服二錢米飲調下日三服。證治要訣。

水腫自足起

削楠木桐木煮汁漬足並飲少許日為之。肘後方。

水腫

蘇合香白粉水銀等分搗勻蜜丸小豆大每服二丸白湯下。下出。肘後方。葡萄嫩心十四個樓站七個去頭尾同研露七日曝乾為末每服半錢淡酒調下。暑月尤佳。潔古保命集。

水氣滿急

烏梅大棗各三枚水四升煮二升納蜜和勻含嚥之。聖濟總錄。

身面浮腫

取瓜蒂丁香赤小豆各七枚為末吹少許入鼻少時流出黃水隔日一用。遂乃止。孟詵食療。

腎熱肢腫

拘急菜黃根一合半桑白皮三合酒二升煮一升日二服。普濟方。

身體暴腫

榆皮搗末同米作粥食之。小使良。備急方。

身面水腫

坐卧不得取東引花桑枝燒灰淋汁煮赤小豆每飢即飽食之不得喫湯飲。梅師。

諸腫卷二

三

男婦腫疾

不拘久近暴風入腹婦人新產上圍風入臟內腹中如馬鞭短氣痞皮枝葉一大束

切煮汁釀酒不斷飲之不過三四日即退可常服之。千金方

膀胱石水

四肢瘦削小腹脹滿溝根白皮桑根白皮各二升白朮四兩黑大豆五升流水一斗

煮四升入清酒二升再煮至三升日再一七服之。集驗方

通身腫滿

小便不利豬苓五兩為末熟水服方寸七日三服。楊氏產乳

通身水腫

飲。聖惠方

身面卒腫

洪滿用皂莢去皮炙黃到三升酒一斗漬透煮沸每服一升一日三服。肘後方

風水腫浮

二錢桑白皮三錢陳皮橘皮一錢生姜三

本草類方

諸類卷二

叁

片水二鍾煎服日一劑。聖濟總錄

手足腫浮

或加小豆尤妙。聖惠方

水腫尿瀉

茯苓皮椒目等分煎湯日飲取效。普濟方

熱水腫疾

山梔子仁炒研米飲服三錢若上焦熱者連殼用。丹溪纂要

通身水腫

楮枝葉煎汁如餲空腹服一七日三服。聖惠方

腫自足起

生豬肝一具細切醋洗入蒜醋煮食勿用鹽

水氣虛腫

小便澀烏白皮攢櫛木通一兩為末每服二錢米飲下。聖惠方

石水肢瘦

其腹一大者海蛤丸主之海蛤煨粉防已各七錢半葶藶赤茯苓桑白皮各一兩陳

橘皮郁李仁各半兩為末蜜丸如梧子大每米飲下五十九日二次。聖濟總錄

十腫水病

腹滿喘促不得卧聖惠方以螻蛄五枚焙乾為末食前白湯服一錢小便利為效楊氏加甘遂末一錢商陸汁一匙取下水為

效忌鹽一百日○小便秘者聖惠用螻蛄下截焙研水服半錢立通○保命集用螻蛄

蛄一個葡萄酒心七箇同研露一夜日乾研

黍酒服○乾坤秘韞用端午日取螻蛄陰乾分頭尾焙收治上身穿頭末七箇治中

大腹水病

用腹末七箇治上用尾末七箇食前酒服

肘後用螻蛄炙熟口食十箇○普濟半邊散治水病用大戟芫花甘遂大黃各三錢

為末以土狗七枚五月能飛者搗葱瀝上

瓦上焙之待乾去翅足每個剪作兩半邊分左右記收欲退左即以左邊七片焙研

入前末二錢以淡竹葉天門冬煎湯五更調服候左退三日

本草類方

後服右邊如前法

諸腫

壘

蛤

饌

治水腫用活蛙三個每個口內安銅錢一箇上着胡黃連末少許以雞豬肚一箇茶

油洗淨包蛙繫定煮一宿取出去皮腸食肉並豬肚以酒送下忌酸鹹魚麩鷄鵝羊

肉宜食猪鴨○壽域神方

水氣浮腫

用黃蘗三尾綠豆一合大蒜三瓣水煮爛去魚食豆以汁調商陸末一錢服其水化

為清氣而消詩云一頭黃蘗入鬚魚綠豆同煎一合餘白煮作羹成頓服管教水腫

自消除○集要

嗜鼻消水

面浮甚者用土狗一個輕粉二分半為末每嚙少許入鼻內黃水出盡為妙○楊氏

家藏方

十腫水氣堯

鱧魚一斤重者煮汁和冬瓜葱白作羹食○心鏡

氣腫濕腫

用海蛤海帶海藻海螵蛸海昆布鳧茨
荔枝殼等分流水煎服日二次。何氏

卒病水腫

用鯽魚三尾去腸留鱗以商陸赤小豆等
分填滿茶定水三升煮糜去魚食豆飲汁
二日一作不過三次

小便利愈。肘後方

水瘰腫滿

藏氣曰用海蛤杏仁漢防已棗肉各二兩
葶藶六兩為末研丸梧子大一服十九服
至利下

水為妙

水腫發熱

小便不通者海蛤湯主之海蛤木通猪苓
澤瀉滑石黃葵子桑白皮各一錢燈心三
分水煎服日

二。聖惠方

水氣浮腫

用大田螺大蒜車前子等分搗膏攤臍臍
上水從便旋而下象山縣民竊此得是方
而愈。仇

遠禪史

本草類方

卷二 諸腫

齒

氣虛水腫

昔滁州酒庫攢司陳通患水腫垂死諸醫
不治一媼令以大蒜十個搗如泥入蛤粉
丸梧子大每食前白湯下三十九

服盡小便下數桶而愈。普濟方

水病囊腫

牡蠣煨粉三兩的薑炮一兩研末冷水調
糊搽土須臾囊熱如火乾則再上小便利
即愈一方用葱汁白麵同調小兒

不用乾薑。初虞世古今錄驗方

水鼓石水

腹脹身腫者以肥鼠一枚取肉煮
粥空心食之兩三頓即愈。心鏡

水氣腫滿

豆大日三服。千金方

水腫

范汪用大鯽魚一頭醋三升煮乾食一日
一作。外臺用大鯽一尾赤小豆一升水
二斗煮食飲汁一頓

服盡當下利盡即瘥

雞矢醴

普濟方云治鼓脹且食不能暮食由脾虛
不能制水水反勝土水穀不運氣不宣流

鴨頭丸

效令中滿其脉沉實而滑宜雞矢醴主之
滲入膀胱別走于脾溢於皮裏膜外故成
脹滿小便短澀雞矢性寒利小便誠萬金
不傳之寶也用臘月乾雞矢白半斤袋盛
以酒醅一斗漬七日溫服三盃日三或為
末服二錢亦可○宜明用雞矢炒仁大黃
各一錢水煎服○正傳用雞矢炒研沸湯
淋汁調本香櫛榔末二錢服○又方
治陽水暴腫面赤煩燥喘急小便澀其效
如神此裴河東方也用甜葶藶炒二兩熬
膏漢防已末二兩以綠頭鴨血同頭全搗
三千杵丸梧子大每木通湯下七十九日
三服一加猪苓一
兩○外臺秘要

大腹水病

小便短少百一方用青頭雄鴨煮汁飲厚
蓋取汗○心鏡治十種水病垂死用青頭
諸種

本草類方

鴨一隻如常治切和米並五味煮作粥食
○又方用白鴨一隻治淨以豉半升同薑
椒入鴨腹中縫
定蒸熟食之

浮腫尿澀

肥狗肉五斤熟蒸
空腹食之○心鏡
青殺羊肺一具微燻切曝為末葶藶子一
升以三年醋漬搗麝蜜九梧子大食後麥

水腫尿短

門冬飲服四九日三
小便大利佳○千金

陰卒腫痛

鷄融六枝燒存性蛇狀子末
等分隨左右傳之○肘後方
治淨和赤小豆一升同煮汁飲日二夜一

水腫尿澀

小豆一升白雄雞一隻治如食法以水
小豆一升白雄雞一隻治如食法以水
治淨和赤小豆一升同煮汁飲日二夜一

水氣浮腫

三斗煮熟食之飲汁令盡○肘後方

身腫攻心

用生猪肉以漿水洗壓乾切膾蒜薤啖之
一日三次下氣去風乃外國方也。張文

仲方

水腫尿澀

牛肉一斤熟蒸以薑醋空心食之。心鏡

水腫澀澀

黃牛尿一升絞汁飲澀利差勿食鹽。梅師方

身面浮腫

商陸一升水二斗煮取一斗去滓羊肉一斤切入肉煮熟下葱或五味調和如臠法食之。

肘後方

水腫

脹滿小便澀者用水半蹄一具去毛煮汁作羹切食之或以水半尾條切作腊食或

者亦佳。食醫心鏡

水腫澀澀

猪肝尖三塊豉豆四撮陳倉米一合同水煮粥食毒從小便出也

本草類方

諸腫卷二

癸

水腫蠱脹

時珍發明羚羊肺本草不收千金翼載太醫山璉治韋司業水腫黃芩丸用之蓋取其引藥入肺以通小便之上源也其方用

羚羊肺一具沸湯微燥過曝乾為末貴蓉子一升用三年醋浸一伏時蒸熟搗爛和丸梧子大每用四十九麥門冬湯食後服

丸口乾妄語為驗數日小便大利

候口乾妄語為驗數日小便大利

風水浮腫

羌活蘿蔔子炒香只取羌活為末每服二錢溫酒調下一日一服二日二服三日三服

服嘉興主簿張昌明所傳。許學士本事方

腫滿腹大

四肢枯瘦尿澀用甜葶藶炒薺菜根等分為末煉蜜丸彈子大每服一九陳皮湯下

只二三九小便清十餘九腹如故。三因

脾濕腫滿

腹脹如鼓喘不得卧海金沙散用海金沙三錢白朮四兩甘草半兩黑牽牛頭末一

兩半爲末每服一錢煎倒流水調
下得利爲妙○東垣蘭室秘藏

腫滿氣急

不得卧用郁李仁一大合搗末和麴作餅
喫入口即大便通泄氣便愈○楊氏產乳

腫滿入腹

脹急皂莢去皮子炙黃爲末酒一斗
器煮沸服一斗日三服○肘後方

本草類方

諸腫
卷二

七

