

良改
嵩厓尊生

上海錦章圖書局印行

藥性部

藥性賦

計二百七十六味

甘草生瀉心火而益胃。災補三焦而除熱。酒刺鬱滿不可犯。虛熱短氣不可缺。下焦用稍子。導毒須頭節。

人但知為和藥通劑。不知其為肩重主帥。音說

黃芪性入肺脾。功在皮肌。大凡脾氣虛而肺源絕。用以溫分肉而戢汗出。內外君佐。與參表裡。瘡陷汗脫。

不可少。火動痰癰不可入。製法惡寒酒炒。胃虛泔浸。外科用鹽。體雜用乳。無汗煨用。有汗蜜炙。生用亦。

瀉火製法豈執一。

人參上虛火旺宜生。涼薄以取其氣。脾虛肺怯宜熟。甘溫以賢其味。面赤黑實熱者無藉。色黃白青悴者。

最宜。痰癰感寒之喘嗽不必用。氣短喜按之痛熱所當入。氣虛補衛。固所必選。血虛養榮。必不可遺。熱。

隔紙焙並忌鐵器。

沙參體輕而寒。清熱補陰有功。與人參體重而溫。益肺補陽不同。參用或宜。代用欠通。

桔梗行表達竅。開提氣血。輕清王一上升。人皆知其為舟楫。佐以硝黃。使不峻下。君歸芍。以治咽嗑。下虛。

怒氣火炎之病。不得用。咳喘初火鬱之症。不可使。

知母黃柏入腎經血分。潤燥于下。知母入肺經氣分。清熱於上。若用鹽製。亦能下降。多服致泄。脾虛勿用。

肉苁蓉峻補腎陰。最為神奇。相火旺者忌。尺脈弱者宜。能益男女精寒。兼療虛老枯秘。若使用膜不去。必。

妨上氣不出。

天麻肝胆不足。乃急勁而生風。天麻甘和。斯養肝而緩勁。眩暈者。風虛內作。非此不能勝。血虛者。畏其助。

火用之須慎重。

白朮健脾以燥性非中和。脾病概用。陰害實多。濕勝宜之。得燥痊可。或若脾虛無濕。妄用反致液涸。蓋脾象中土。燥濕宜和。太潤固泥滯。而太燥亦枯涸。脾為陰臟。奚容燥多。若夫尺脈大而水泛。用以隄防斯可。其或尺脈細而無水。豈宜過用燥藥。怒氣傷肝。用之則引邪入土。腹中饒雜加之。恐脾虛起。火發散。妄施滯氣固邪。或結室而不和。潰瘍誤投。燥腎閉氣。反膿生而痛多。補中十全生用宜。其餘諸方炒用多。若煮爛成餅。補脾陰亦可。

蒼朮無濕便不宜。燥症亦不可。平胃用之。以治濕多。雖寬中而發汗。脾病萬不可過。

巴戟功強筋骨。亦除風邪。相火熾盛者禁用。元陽不足者允協。

遠志入心開竅。痰沃神濁者有功。入脾醒發鬱結。久困者能通。若心虛無痰可豁。大辛豈宜泛用。或謂其味辛潤腎。益是不通。夫此物戟喉刺舌。似星牛腎臟惡燥。烏能有功。

淫羊藿主陰萎絕陽有功。治腎虛莖痛殊效。若久服而陽數舉。頻御女而精寔耗。故云多服無子。種子豈是正療。

仙茅彷彿羊藿。辛烈有毒。若信沈括范成。而藉以求效。反恣慾助淫。驅之死路。

玄參滋少陰。水清上焦火。陰虛火炎皆效。陽毒上熱均可。人知其為清肅上品。不知其為涼補君藥。蒸晒勿犯銅犯之喉嚨多。

地榆沉寒血藥。用者頗多。下稍行血有功。止血上截炒過。

黃連連柏性冷而燥。非比苦寒。多利故端降火。又能勝濕。然味苦從火。久服化熱入心。恐其偏勝。治熱豈宜過劑。古方用之。惟慎取長。亦能防備。或合木香乾姜。亦和吳萸酒煮。治法不一。今為條析。肝火醋炒。實則胆汁。上酒中薑。下則鹽治。或和硝炒。入下有益。食積之火。用土炒。濕熱之火。用吳萸。若血中火炒。

用乾漆服之倘犯猪肉令人瀉不數計雖云下痢不成口連猪豈容并日食不驗各藥一何其愚
胡連力能除熱獨入血分驚癩疳積有功骨蒸晡熱神品能除陰汗蓋緣入腎服之犯猪肉令人精不禁
黃芩功用人所皆知獨其治瘧炒宜胆汁使之入肝亦以清鬱

秦芩利濕入陽明奏功治諸熱體痛不遂有效黃疸煩渴必須審用左交甚良右交即發脚氣

柴胡半表半裡端主胆經太陽病不可服早陰經病不宜復用醫家混用藏拙其以誤人不輕氣虛少用

助參芪非以退熱勞症多用退火熱惟宜肝經心脾亦可肺腎不用黑柴發表銀柴療熱

前胡降氣異柴胡治外感之風痰氣虛混用是為失傳

防風風藥燥其此味獨潤合羌活祛肝氣之風同白芍止表虛之汗又頭又尾皆所宜禁

羌活善入氣分頭踵皆行感寒發熱體痛多用借其發泄風熱痰症癱瘓少用取其疏通若治周身骨節

之疼欲透關節必借川芎

獨活善入血分舒筋活絡然須血藥為君此味為佐若得細辛上領方治頭目諸河兼治背部諸風亦療

下部痿弱

升麻用之陰中升陽有功佐藥補衛實表殊能三分至胸中四分升巔頂合葛根散鬱火治胃虛之傷冷

和石羔清陽明瘴火熱之齒痛若入升陽劑內飲酒助之效宏

苦參氣沈純陰降而不升暫服除風疹久服致腰重

玄胡通行氣血管理諸痛性極辛走血熱忌用

貝母治心胸氣開散結鬱引熱下行痰氣自利其與半夏不同性味以此代彼何其悖戾糯米炒黃為度

獨顆無歧不取

龍胆草生用下降酒炒上行固瀉肝胆亦止蛔虫蓋虫得苦則安此味除熱有功切忌空心服犯之瀉無

終

細辛根直色紫氣味極辛用散寒邪單入陰分若單用未不過五分過則傷人須防氣悶當歸導血歸源故名曰歸頭止稍破全和兼備古人有言入心肝脾然其氣香味辛肺氣受而先入久瀉病屬腸滑誤用反增肺虛肺虛瀉當益甚大腸愈無約制一切脾虛惡食此味不必入劑惡其辛滑恐其散氣製皆用酒吐血醋治脾虛米拌炒防便滑有痰薑炒以防粘膩

川芎一切頭痛必用然非引使不濟太陽羌活太陰蒼朮陽明白芷厥陰吳萸少陽柴胡少陰細辛血痢痛不止用之痛自已感冒遍身痛用之骨節利大抵走散真氣若遠中病即已蓋此物雖入肝經而味辛劫喜歸肺久之肺氣偏盛肝家反受刑逼偏絕暴亡古言有以大抵四物雖血藥不治不足治有餘血有餘兮不歸經當歸引歸川芎行二味太走白芍斂地黃用之達丹田惟有餘血血生病四藥始能救其偏若血不足以是補孤陰不生豈不誤兼之四君以補脾陽長生陰陰自足借問脾虛飲食少補血從何生起

撫弓所以升氣端主開鬱他無所用與川芎異

藜本味辛氣雄上行巔頂乃若產後血虛火炎溫病腸症頭痛非寒非濕所宜禁用

白芷疏風要品辛散良味走陽明而治血病排膿血而宣毒氣

白芍肝性欲散芍酸故斂太散則甚斂之使安本非脾藥之則性善氣散能收胃熱能斂辟如積痛症屬

脾土極似木亦可制此藥土中能瀉木木氣乘脾所必需血虛腹痛需酒芍佐以甘草酸甘合甲己化

土脾陰足虛痛之症始痊可久嗽何以能斂肺色白味酸與金合下痢肺氣鬱大腸此藥用之主收緩

帶下血痢或非宜雜劑丹溪用數錢惟虛寒人勿妄服古云減芍避中寒伐肝用生補肝炒補脾腹痛

酒炒前後重生用血溢醋治用古人不一

赤芍芩破惡血有功。一切血虛瘡潰勿用。

丹皮心經正藥。芩主涼血。用之入腎。又何以說神志水火心腎交接。陰陽之精。互藏其宅。緣其味苦。故能

瀉熱。因其氣辛。故能疏結。古方以此治相火。今人止知用黃柏。此較黃柏為更勝。涼而能散。兼理血。故

夫積血與吐衄。古人用之以疏洩。為有血崩及經過。此味忌用。恐行血

木香火鬱氣滯。脾氣不醒。木香開滯。上下便通。痰食壅塞。磨入約中。入溫補劑。煎服有功。若是大腸。麩煨

熟用。體枯味辣粘牙者精。

高良薑心脾冷痛用之甚宜。若有熱症。誤投愈劇。子名紅薑。入藥同治。

草豆蔻胃寒作痛。用之溫散。其或濕鬱。投之亦安。若係內熱。在反掌間。

白豆蔻芩主傷冷嘔惡。以其性緩消灼。晴白生翳肺寒。此散骨滯要藥。然宜暫用。過則損劑。

砂仁開脾胃要藥。性溫而不熱。和中氣上品。行氣而不尅。腎虛氣不歸元。用之向導。功捷。因腎惡燥喜潤。

此品辛潤故悅。達下同地。黃蒸殆勝桂附毒烈。漫言水穀消溶。且化骨鯁銅鐵。

益智芩治下焦虛寒。能於土中益火。欲補脾胃。須同山藥。

萹撥辛熱能治冷痛。多用令目昏重。

肉菴溫中消食。厥同諸菴。兼入大腸。力能澀兜。傷乳泄瀉。非此莫救。其云下氣。健脾氣利。非若橘附性偏。

泄滯瀉痢。又寒用此固佳。惟溫能固。非芩瀉制。若有鬱火。去油入劑。

故欲脾胃之虛。由於腎氣。腎中陽衰。不能董脾。腸鳴泄瀉。痞滿噎噫。補火生土。此味神奇。腐熟水穀。運化

精微。丹溪常云。故欲治氣。氣不歸元。舍此莫醫。較附毒烈。隔懸天地。益能交通。君相二火。補益骨髓。使

實。若使火熾津枯。未可混用。取戾。

薑黃下氣破血。與片薑黃迥別。片薑黃如乾薑形。治風痺背痛。血虛勿用。

鬱金調氣行來降火下血。喉中血腥吐衄莫缺。
莪朮建敷利氣脾虛忌入。

三稜下氣化堅破血中氣凡用消散佐參芍地。尅削兼補。然後無弊。益諸積癖。由元氣虛不能運化。所以病聚。必脾氣旺以漸消。制退其平復。養正除邪。五積用參。東垣深意。

香附辛苦主散主降。用之鬱氣開暢。非止女人常藥。但女多鬱最良。要惟氣實甚宜。若或氣虛益戕。便製散胸臆痞醋炒入肝則良。血瘀氣滯用酒炒黑。淋崩堪賞。大抵氣分君藥。臣以參芪始當。月事先期誤投病愈增劇可傷。

蒼香葉則主散莖則主通。能治諸邪驅除不正。但香散氣不宜過用。澤蘭行血而不推蕩。養血而無滯膩。兼治水腫癰瘰。婦人血藥最宜。

香薷治暑主藥。熱服反致吐多。常宜夏月解表。火甚氣虛勿啜。譬如冬月麻黃。虛人豈是常藥。

荊芥上行頭目。又主肝氣行血療風。皮裡膜外。生用解散風邪。炒黑常去朋漏。表虛有汗急啜。常治血中之風。血量中風可借。最忌魚鱗河豚。誤犯為禍甚烈。本草醫方未載。稗官野史有說。

薄荷常主風熱引經。緣其味辛上升。若諸傷食疳積。腳氣陰虛熱症。本非外感。不宜用之。可謂濛濛。

紫蘇味薄發泄。放邪出路。其味辛香。亦解氣鬱。寒滯腹痛。火滯瀉痢。少佐一二。略為開滯。虛人感冒。必借

參助。子是氣藥。何以治痰。氣降痰降。鬱結能散。梗體中道。上下宣暢。順氣諸品。惟此純良。疏氣不迅。虛

滿止當。大抵紫蘇終是散氣。日用常食。甚為無益。胃虛致泄。時人不知。各有用法。亦宜詳析。蘇梗去節

安胎。用于順氣。養陰。用葉無益。子宜略炒。不可隔宿。其油甚迅。消灼金石。

甘菊花得秋金正氣。白者肺虛甚宜。眼昏翳膜掉眩。肺肝是虛。堪取黃者。常主肺熱。頭痛鼻塞。可醫。赤眼

肌熱背痛。諸凡風熱皆宜。皆用家園大花小者。俱名苦薏。

艾葉婦人方中用之。以為種子調經。然惟後期血少。毫無熱症可用。若遠先期用之。反增沸熱。無功。或宜婦人不孕。子宮虛寒風冷。宜知血虛無子。多由血不攝精。投以辛熱。益甚。久久毒發。匪輕。醋炒治其燥。偏酒製。益其熾性。交病亦宜虛寒。一概熱病不用。灸法壞人經絡。灸癰氣血不行。古人用灸針頂。原非切肌受烘。俗云艾火不傷。此語誤人不輕。

茵陳利水清熱。黃病主品。佐使不一。以之為君。

青蒿能去骨熱。宜於血虛。他品苦寒。與胃不利。此獨無犯。全沖和氣。

益母草入肝疏滯。清熱行氣。和血不峻。醫者鮮知用者。一切血氣神品。兼治血貫瞳人。與涼血藥同群。瞳

子散大血虛不宜。再用害深。其性希於行血。血中崩漏亦禁。

夏枯草辛苦散結除熱。瘰癧癰瘻。豈缺治目珠夜痛。沙汰水浸頻啜。

旋覆夏開黃。花盜竊金氣。消胸上痰結。如膠漆。長於逐散。兼治驚悸。益以驚悸伏飲在脾。此物逐飲。腸冷

切忌。

青箱子固主明目。瞳亦用治口青。想其性味入厥陰經。

紅花活血潤燥。散腫通經。多用則破。少用則生。血行即已。過用致崩。

續斷續筋骨外。並利關節。亦縮小便。兼止夢泄。

牛蒡利咽去風。散氣惟是。血熱便閉。瘡家已潰。氣虛用之。反增瀉劑。沙疹不妨。泄瀉用之。不必過忌。

稀簽雞治肝腎風氣。要非急效之劑。前人張詡過當。今人屢用無濟。

麻黃過用泄真氣。有汗不入劑。

木賊治目退翳。肝經本治。兼療血漏。腸風止痢。

燈心質輕味淡。滲入小腸。導上滲下。其力獨強。若得麥冬甘草。得以引火下降。惟有虛脫不宜。一概誤用。

殊因。

地黃生者色紫入肝通徹諸經血熱雖性涼而帶補故治骨蒸勞怯有如苦學勤政勞神動火耗血此同
麥冬養神清涼肝胆效捷至若用酒蒸熟製黑純陰效別苦化甘涼變溫而入肝腸補血肝急須用甘
緩兼益肝子心血其色純黑走腎補填骨髓妙訣陰虛補之以味此為昔人成說生地胃弱妨食熟地
痰多膩隔生酒熟薑各炒兼忌勿犯銅鉄

牛膝味厚氣薄補下入足厥陰少陰生用則逐惡血酒蒸則補肝腎不得並用川芎以其升降異用能引

諸藥至膝利便療痛莖中。

紫苑味苦心瀉火氣辛入肺散氣色紫並入肝經勞熱清涼潤劑體潤並入腎水宣通二便壅窒肺中

血藥獨此陰虛肺熱亦忌若與門冬參用方于肺熱有濟

麥冬色白氣涼清肺如風扇暑熱失若合地黃阿膠潤經益血涼劑滋燥清水之源肺中伏火能去

欵冬花雪滿冰堅獨艷純陽氣溫可參冬生故不助火肺病可以久餐蒸係一陽生機已開氣氤索然甘

草水浸晒用梗蒂外殼去焉

瞿麥凡用蒸亮不用莖葉猛利下逐虛人免噉上下全用恐防氣噎

葶藶肺中水氣贖急非此不能逐除甘緩苦急下泄故云泄可去閉甘不傷胃苦傷輔以大棗始濟

車前利水而不走耗殆與茯苓同效

旱蓮草汁玄黑味甘酸純陰入腎肝髮白齒痛腎熱菘味良血可餐又治臟毒下血研末焙服二錢

連翹輕揚芬芳之氣足解熱而散鬱治三焦諸經火一切血結氣聚

青黛色青屬木涼肝味甘屬土清脾

扁蓄能破血淋

蒺藜沙苑蒺藜嚼之豆氣如腎色綠腎家補劑菱角白色名制蒺藜肝家風藥眼疾必需
穀精草明目退翳在菊花上

大黃味厚而入陰分所至蕩陰無存一切亢甚火熱酒浸引上高岑
大戟受濕停水必需脾虛土堅無濟並至控涎奇效隨氣上下俱利
甘遂其性尚主行水並達水氣結處水結胸症需此大陷胸湯用之

蓖麻其力長於收吸能拔病氣出裡大抵宜於外治內服不可輕易
常山能驅山嵐瘴癘祛逐老痰飲滯癰家往往用之得毋大傷真氣

附子大辛大熱大毒辟如驍勇烈夫用之稍失其當鮮不償事敗覆大寒直中陰經真陽哀竭暫服若云
溫補妄投補火必防水涸枉殺人命惟此倉卒下咽安贖總之不可嘗試業醫君子慎諸烏頭天雄側
子老嫩原是一物治疾他藥尚有何必用此毒物

白附子取名蓋以形博功能逐風消癰

南星燥痰功等半夏辛而不守較差黃蘗相引行下防風使則不麻胆製非徒監制蓋借胆汁鎮邪肝胆
性氣之風調和此為莫加

半夏祛濕分水寔脾能開寒痰氣鬱若係陰虛血少津液不足大忌血竭汗家三禁古人之言有以此本
脾胃經藥貝母代者大非

射干喉痺咽痛行血散氣慎勿久任

芫花長于逐水泄濕直達水窠囊僻只可徐用取效損元慎勿過劑

兒絲子力善補而不峻性益陰而固陽味甘療脾虛損單治腎損勞傷風虛明目聖品以其善補肝臟性
銳而滑行血有孕血崩須防

五味子雖備五味酸多為極久嗽肺病肺性喜斂惡寒此遂肺性之藥黃昏嗽甚忌涼此味斂其浮火一切咳嗽初得此味不可驟判因其色黑味厚故又為腎經藥仲景八味代附滋陰斂氣效多兩產紅而連黑黑補紅散風疴

史君子甘味氣溫殺蟲開胃健脾有功忌食熱物熱茶犯之即瀉無終牽牛味辛泄氣散氣血中濕熱無濟雖能泄下如水畢竟益增元虛括萋善能引火下行清肺潤燥解癘子則滌除諸痰膠濁粘執有功

葛根多用至一二錢開發腠理出汗若少用五六分熱渴酒毒立驗鼓舞胃氣上升佐藥醒脾健脾肌熱陽氣鬱遏此同群藥升散

天門冬肺子五臟司氣氣盛是火反尅此味體潤性寒保肺之功為烈且其味厚苦寒腎正惡燥喜堅此味苦以堅之故能入腎助元痰標在脾與肺腎寔疾之根蒂若非腎火灼肺何由煎熬粘膩此味保肺通腎故為清嗽神劑然既大寒而苦即非脾胃所宜陰虛脾胃多弱損胃恐致不起益胃元寔係後天弱則困倦惡食病既陰虛精絕正賴食滋精氣脾壞又絕化源後天氣生何地藥餌亦借脾運脾虛誰為轉輸除邪不知審顧毋怪不能奏績此非獨言天冬用藥宜識此意

何首烏以其澁能斂血故療風疹膚痒以其澁可收脫故治久痢甚強

葶藶入胃中除濕故治拘攣不利濁帶畏濕下流此味滲濕兼治

土茯苓力能除脾濕鬱故已拘攣瘰癧疾初病服之不效火亢而濕困鬱此味去火無功必宜痛久濕鬱

葶靈仙疏入臟腑真氣中病切宜即已
防已雖治腿足腫痛然必水秘方用此乃瞑眩之味妄服減食心中
木通性利水通心竅胸腹熱痛甚妙

鈎藤祛肝風而不燥。久煎力減不效。絡石功主筋骨關節。神農列之上品。

忍冬昔稱除脹解痢。後世不復知。今稱消腫敗毒。昔人未言及。

澤瀉味鹹入腎分利。六味用去濁閉。古人用補兼瀉。邪去補愈得力。腎水寔出高原。此能上引肺氣。苓瀝同是白色。引肺水降故濟。有如水閉口渴。熱在上焦氣裡。便宜澤瀉。茯苓滋水上源清肺。有如口或不渴。熱在下焦血裡。宜用知蘗滋下。上下不得混舉。今人概用澤瀉。謂此治水閉。

菖蒲辛香透利心竅。健忘聾喑殊效。但心喜斂惡散。遠志並皆辛燥。若使久用多用。心氣毋乃益耗。蒲黃色黃氣香入脾。諸失血者炒宜。助脾攝血歸源。落後收功有濟。若在失血之初。用之雖多無益。生用涼血消腫。今人妄用破瘀。

浮萍發汗力比麻黃。下水功同木通。生于水而勝水。非實不宜輕用。

海藻瘦瘤馬刀有功。鹹能軟堅消腫。

昆布較之海藻力雄。無病久服瘦生。海中菜多損人。養生之家慎用。

石斛色黃氣清象肺。性涼而清肺宜。肺虛久嗽邪熱順氣下行有益。性不苦寒沈下。厚益腸胃長肌。神農列之上品。泡漿頓健足力。

骨碎補得金氣並石氣。以其生長陰處。得陰之氣最厚。故主齒耳骨脊。研末入猪腎煨。一味即治久痢。便

泄久屬腎虛。故云門戶不濟。久痢醫治不效。以其當責脾肺。

柏子仁氣香故當透心。體潤故亦滋腎。油滑入腸作瀉。隔間多疾宜禁。其葉澁苦之極。澁血亦清血分。

松烟墨嵩止血症泛濫。墨係燒松薰烟。墨中下品入藥。不借油滑香氣。

肉桂荜厚補益命門。力能益火消陰。雖云春夏禁服。真陽虛者勿論。有如脾虛不食。肝熱乘之太深。涼肝

而脾愈虛。煖脾而肝愈甚。溫平倍加肉桂。殺肝脾得不困。傳云木得桂枯。建中湯亦有本。若夫血虛發熱。誤用禍不轉瞬。

桂枝淡薄輕浮上行。止煩出汗有功。領藥直至病處。痰凝血滯痛風。古云汗多用此。疑為止汗清中。不知汗因風致。用此邪無所容。汗解則汗自止。以出為止之能。大抵味辛善散。甘則寔表有功。肉桂通經破瘀。此則尚能橫行。

辛夷助胃清陽上行。辛香走竄慎用。

沈香舒經祛逐邪氣。活血定痛散瘀。尚補右腎命門。納氣歸元上劑。血虛固不宜用。水衰火炎亦去。

丁香此治嘔呃脹滿。蓋其宜于胃寒。

檀香白者入氣利胸。紫者入血消腫。

降真香助胸痛而吐血。用此一味急吸。番舶來者色紅。差勝紫者效別。

烏藥此味尚以氣勝。疏氣散風有益。

乳香活血止痛伸筋。徹毒不致內侵。

沒藥入血散瘀治熱。乳香活血較別。

血竭入瘡不宜多使。多則引膿不止。

真冰片痰涎壅因風邪。此味速效殊別。緣其辛香竄走。故能散熱利結。世人誤以為寒。不知辛極熱烈。諸

香皆屬陽品。豈有極香不熱。風在肌肉誤用。引風入骨堪嗟。

朝腦性同硝焰純。火木中之火益烈。

阿魏辛熱與胃腑宜。破癥殺虫去積。

黃蘗降火自頂至踵。淪膚徹骨通行。需清陰火上炎。火清水自堅凝。益水炒則入腎。蜜拌懸膈不行。大抵

陰寒傷胃。虛有火宜遠。

厚朴辛散苦降泄寒。鬱積腹滿能除。但有積滯者宜用以補益無濟。杜仲味苦能堅腎氣。又合筋骨之離。此氣牛膝屬血。二者用每相須。

椿白樗白椿皮入血性溫。樗皮入氣性利。

乾漆能削堅結積滯。善破凝固瘀血。益鹹味入血分。而辛溫能散結。

苦棟導小腸膀胱熱引心包相火下。

槐花涼血功在大腸。泄肺疏肌熱癆。槐實純陰入肝。兼理脾痰熱狂。

皂莢氣味大辛主散立能宣去頑痰刺以發數排膿仁以潤腸利便。

訶子入肺降斂出聲。固澁大腸有功。用須六路紋者。或多或小他種。

蕪荑溫能化食去積。諸虫氣食寒濕。骨膚濕淫虫行。此能溫化邪氣。

蘇木一味主子破血。血虛腹痛勿啜。

機欄失血瘀滯已和用此澁以去脫。若血瘀滯方動。遠用澁之奈何。

巴豆蕩滌一切積滯。若非痼寒勿與炒去烟則能消。生去油乃應急。少擦好膚發泡。何況腸胃柔廣。

桑白皮肺中水氣有餘。以此燥可去濕。

楮實性屬濁陰下降。宜入壯陰諸方。

枳殼色白。常利肺氣。性則寬緩不疾。枳實色黃味苦。故宜常瀉肺實。性則猛酷善下。不如枳殼能除。古主

中脫血分。要治血中之氣。二藥皆能利氣。氣下則痰痞除。胸痛與後重。二者各有宜。大腸肺之腑。枳殼

斯為主。脾為胃之臟。脾痞尋枳實。何以治風痺。肺則皮。胃則肌。風寒客入二經。所以搔痒麻痺。二味苦

辛散。世引風藥入臟裡。故為治風所尚。風散闔節自利。枳實不去核。穰雷公取其酸味。

梔子引火屈曲下行。清胃脘亦有功。痞塊中有火邪。非此不能導行。去胸中熱。用仁表熱。則連皮用。棗仁多睡。宜用棗肉。本經不茹。取仁炒。療不得眠。香氣入脾。斯寢。胆心子母同補。故治虛熱。煩心。諸汗。用藥罔效。多用棗仁醋炒。惟其酸味主收。諸經實熱未效。臨用炒研使香。隔宿香走不炒。

山萸酸潤。入肝膽。故治口苦舌乾。心為肝子。亦入。蓋能收其懊惱。心虛驚悸。怔忡。虛則補母。自痊。腎為肝母。喜潤。斂水生津。腎堅。何以能治腰膝。子令母實。故然。火旺陽強。宜禁。陰虛血熱。當刪。必兼小水黃。赤。此味惡。其收斂。用與黃蘗同。加味古滋腎陽丸。

郁李其仁能下結氣。燥結水症亦宜。有病張目不閉。此味煮酒醉愈。說見宋史錢傳。開肝胆結有理。

女貞子純陰入腎。除熱無熱。必防作泄。

五加皮風病飲酒生痰。此味浸酒甚善。

枸杞子體潤能滋腎陰。味甘能助腎陽。每與人參相須。平補王道。堪嘗。參固氣則精堅。杞滋陰則火藏。地

骨退骨伏火。故治汗蒸陽光。

蔓荊子主治頭痛腦鳴。兼理目睛內痛。

密蒙花此味獨入肝經。除熱和營。通用。肝經血虛熱。其各種目疾。擅重。

茯苓其味甘補。淡滲。質重用補脾陰。便利與夫汗多。淡滲所在宜禁。淡為陽而上行。何以利水下滲。氣薄

陽中之陰。性升而功下沈。經云飲食入胃。游溢精氣。輸肺水道。通調膀胱。肺為上源。下輸。淡滲必先上

行。然後順下降入。總之益肺補脾。從上順下有濟。若夫上熱下寒。陽少脫陽。肢冷脈遲。當用溫熱。峻補。

夫豈淡滲所宜。痘瘡起脹。費發。淡瀉。蓋所不許。赤苓燥脾。同白色黃不能入肺。豈如後人謬說。白補赤

瀉分歧。扶神終守不移。風眩心虛自除。

琥珀用以利水安魄。功甚。茯苓有差。

猶苓利便能開勝理。五苓用理上濕。本經云治痰癘。損瘧亦治瘧疾。能於陽中降陰。人苦未嘗讀書。雷丸苦寒燥脾除熱。能搗諸虫巢穴。桑寄生益血是其本能。去濕又兼其長。

淡竹葉除風邪煩熱。茹療胆火氣邪。滯則借火而成滑痰。支散胸膈。若夫胃虛腸滑。不宜再進寒劑。天竺黃是竹節黃粉。焔瀉心火熾甚。本與竹瀝同功。但不寒滑取價。

杏仁散肺風寒滯氣。虛熱熱痰宜忌。外邪若非喘促。亦宜慎用此味。又其味辛帶苦。大腸氣秘必需。用攪濁水即清。并清降濁可取。

烏梅冬花夏實純木。味酸肝胆必需。人舌兩竅通胆。食梅數沮澆漉。經云味過于酸。肝氣以津是夫。又筋病無食酸。蓋木喜散惡束。性暢茂條達。酸斂投其所惡。若夫肺經喜斂。以治久嗽。自蘇初嗽亦不宜用。邪氣亦恐驟束。其能止瀉固脫。大腸亦是肺腑。

桃仁辛苦泄滯散結。又能生新破血。然使用之不當。血崩損陰可嗟。有如經閉不通。非瘀而血枯竭。亦或產後腹痛。由血虛而非留血。大便閉由津少。非關血燥閉結。粗工不辨妄用。殺人等於刀割。留皮赤色入肝。連尖生研。行血潤便。去尖炒熟。去皮取其純白。

大棗味甘益脾不足。中滿腫脹忌。入紫黑亦入肝腎。虛勞補葯必需。生食損齒助疳。不可無故頻食。木瓜性稟曲直酸。化故治筋病。莫加有血熱。轉筋酸涼舒筋不差。更或濕滯筋軟。以酸斂之自佳。然其性昂主瀉。下虛不可妄加。蓋其體乾不潤。不如萸養肝家。針經戒酸致瘥。蓋胞得配絡下。胞絡卷約不通。小便所以癢澹。凡便赤戒食酸。何獨一味木亦。

山查剋脾善消肉積。兒枕血滯癰癥。若無食積誤服。反剋脾土生氣。

柿甘寒宜入肺脾。兼能通耳鼻氣。耳鼻數原肺腎。金水火熱最忌。火盛外竅斯閉。火行竅斯清利。大腸合

肺與胃。濕熱傷為腸澼。甘寒以除血熱。臟清腑病亦愈。柿乾潤肺止渴。柿蒂治呃逆。

陳皮理氣不傷峻烈。芫荽脾肺虛泄。但隨所配群味。以為升降補瀉。

青皮苦辛氣猛性烈。醋拌炒黑入血辛入肝。經能散並寒苦降酸泄。

枇杷葉苦涼職司清降。火熱逆上宜訪。

白果色白屬金性收。能益肺氣定嗽。食多令人氣壅。以其性味過收。

胡桃痰熱多食有損。肺腎虛寒大益。命門外裹白膜。體象脂肉却非在兩腎之中間。有二線著於脊。下則

通於二腎。上則通乎心肺。貫腦生命之源。精府相火之主。人物皆是一樣。生化胥由此出。難經脈訣不

察指右腎是者非。胡桃頗類其狀。外皮水汁青黑。故能直入北方。益氣養血大益。命門氣與腎通。藏精

而惡燥。命門通而接肺。故為喘嗽所宜。但其性熱不寒。火熾忌之。須知。

龍眼此物亦名益智。赤甘心脾二經。然甘則能作脹。膈滿等病勿用。

檳榔端入陽明二經。一穀海一傳送二經。相為貫輸。運化精微無窮。假如二經有病。水穀不能消鎔。羈留

而成痰癖。濕熱久而生虫。此味辛能散結。苦能下洩。殺虫。且其體重而實。能洩高氣下行。性如鐵石之

沈。諸氣後重急用。

大腹皮疏通脾肺之鬱。暢利腸胃之滯。

川椒散除脾胃寒濕。兼主水腫瀉痢。入右腎能補火。並治遺洩痿足。

吳萸疏達肝氣其速。多用亦損脾土。

瓜蒂上部有脈下無脈。診得其人必當吐。此為飲食填胸中。太陰阻隔鬱風木。須尋瓜蒂一下咽。吐去上

焦有形物。木得舒暢天地交。行見中州泰運復。唯諸亡血理所忌。宜與不宜慎勿忽。

蓮肉去衣健脾益肺。若補脾陰帶衣。味澁借其收束。統血以其色赤。藕主心脾血分。生用甚能去瘀。寔心

若能清熱故治血竭必取蒸髮通腎固精功與蓮子同許。

芡實甘平而性和緩健脾陰而療濕。

夢薺消堅削積之品化膈積而除渴甚一種質小黑堅取粉點翳如神。

胡麻黑者常治燥症為其黑入腎經炒食大已風疾防滑白木並行白者行氣通血兼祛頭上浮風。

大麻仁甘滑潤腸去燥虛老便結甚效須同紫苑杏仁肺潤大腸自調。

浮麥能止諸汗虛熱性涼與麥迥別。

麥芽炒香開胃除煩生用除積削滿又行上焦滯血宿乳煎服立安。

穀芽消食同於麥芽溫中之功較大。

粳米本經所為金穀入肺解熱甚速其穰作紙爛肉此亦人之所忽。

薏苡甘和健脾益胃常療筋骨效倍寒其筋則堅急熱甚筋則縮退濕甚筋縱不收三者相因而至濕寒。

內熱所名酒火肥甘中熾濕甚泄瀉水腫風濕筋骨不利故濕勝而土敗乃土勝而濕去苡仁養元治。

渴蓋其色白入肺又其味厚沈下引藥下行達足氣緩倍用方效乾濕脚氣皆治為其下入甚捷故夫。

孕婦切忌。

罌粟殼酸澀甚宜瀉痢病久氣散方入然欲用之得法烏梅加以醋製虛勞久嗽亦用然其收後之劑新。

病若用不當殺人如劍可慮。

赤小豆緊小赤黯者是而紅色者非性能消腫利便久服津液滲溢。

綠豆消腫治痘同赤歷熱解毒過之益氣厚腸通經久服不致格塞。

白扁豆味甘氣香色黃入脾臟性最當諸邪傷胃並治和中益氣莫尚又其色白入肺肺清大腸自理善。

療腸紅久瀉補臟以治腑虛。

豆豉經云肺苦氣逆。急用苦以洩之。傷寒瘧氣肺受。喘悶肺氣有餘。法以或吐或汗。兼以豆豉為主。神麴味甘氣香醒脾。生用消穀力劇。

紅麴水穀入人胃中。中焦濕熱薰蒸。游溢精氣化紅。散在臟腑諸經。是為人之營血。紅麴白米飯蒸。濕熱變而為紅。即成真色。耐久直窺造化。巧工同氣。因之相求。治脾營血奏功。大抵消食活血。健脾燥胃。可重赤白痢疾。必求水穀不化。亦用。

飴糖味甘固能入脾。米麥皆養脾具。仲景健中用之。主補虛。之有理。肺胃有大發渴。火炎迫血。血澁。甘能緩火之標。火降。渴血自己。但其屬土。火成濕中之熱。可慮。凡夫牙。目赤。中滿。秘結。吐逆。用之。生痰動火。疔病。尤所宜忌。腎病。勿多食。甘傷腎。落齒。此。

醋大能散瘀解毒。不獨取其酸斂。偏痺拘攣。宜禁。筋病。毋多食。酸。過酸。肝津脾絕。多酸。肉皺唇揭。助肝是脾賊邪。凡有脾病。宜節。

酒海水酒獨不冰。熱性獨冠群種。製藥。借其疏引。酷烈。不啻附雄。行表。高處能到。厚腸潤肌。通經。走散皮。膚。疏宣。開散。經絡。橫行。多飲。熱傷脾經。濕熱。為害無窮。

韭生行血。熟補中。其子坎火能動。葱其白。冷主發散。通氣於表。堪羨。

蒜走竅。溫中消食。但其辛能散氣。

白芥子味辣。則能橫行。端開皮膜。痰凝。結胸。咳啞。皆利。炒緩。生則力猛。

萊菔子生食。甘少辛多。下氣耗血。沉疴。熟食。甘多于辛。益脾滯氣。奈何。其子下氣。尤捷。消食除脹。甚烈。生薑利竅。豁痰。止嘔。合葱。大散表邪。合棗。辛甘發散。治虛。往來寒熱。薑皮。主腫痞。脹汁。大辛。以散結。竹瀝。梨汁。等物。非此。不能開洩。

乾薑乾艾氣則走泄。然而味則含蓄。辛熱止而不行。若散裡寒內入。用須配以甘草。辛甘化陽之義。炮之變為苦溫。用入肝經血裡。肝本溫。虛則涼。以此溫肝益虛。虛甚用道遠散。生加三片。有益。產後大熱六用。溫肝表熱自除。又能去惡養新。陽生陰長。有理。炒黑止泄。溫腎。微炒溫中和胃。吐血必用炒黑。中血得溫而歸。血以溫行。歸經。非黑止血之謂。

胡荽辛溫香辣通脾。香入脾氣不滯。

茴香小茴入腎氣海。大茴厥陰肝經。俱能寬膈開胃。鹽酒致使下行。

山藥生涼乾則化溫。味甘苦補脾陰。色白兼能調肺。子母土旺生金。一切虛症必需。性緩力微倍任。

百合止嗽安神利便。莫與中寒下陷。

童便治肺引火下行。仍循故道收功。熱服尚含真氣。冷獨鹹味寒性。產後少飲敗瘵。多飲必致帶生。勞怯

常服自溺。鬱熱腥穢何功。

秋石水澄火煉而成。真元之氣盡失。古取中白童便。滋陰降火有益。貴人惡其不潔。設法煅煉秋石。經煉

變冷為溫。服之水涸火起。所以久服致瀉。惟虛冷者為宜。觀諸沙石火淋。便煉秋石同理。

入胞精血之氣凝結。類補芩益勞法。女人服之尤宜。為能補氣益血。然凡陰虛精涸。水不制火。咳血。此屬

陽盛陰虛。法當壯水為訣。服此陰陽並補。將來必致陰竭。昔人罕用此物。丹溪始倡其說。括蒼大造一

丸。藥味平補可悅。中去人胞一物。亦可服餌補血。吾嘗觀諸古書。生兒藏衣有訣。藏之吉。方兒壽。棄之

蟲獸暴絕。銅山崩而鍾應。一氣感應必也。以之蒸煮炮炙。何異殺兒取血。目見有人食此。數服火動而

絕。

烏骨雞屬木而烏。兼水。是得水木之精。故主陰虛發熱。兼治弱勞崩中。

五靈脂生用行血不峻。苦羶入肝最捷。黑色血見則止。炒用治諸失血。

猪腎水畜水臟性寒不補命門宜參

羊肉肉性熱能補形痿弱羸瘦必用

牛黃黃結心與肝胆治病亦在此間消痰散熱療驚此誠神物內丹如人淋石治淋此理可以相參

阿膠入水臟治熱痰濁逆痰可啜枯臟宜防胃弱嘔吐食積不悅

虎骨屬金故追風痛足脛氣力更雄

犀角而入陽明少陰能除風火邪侵口鼻陽明二竅孔竅熱病宜尋總之涼血解毒烏者取尖上品粉之

必借人氣懷蒸熟搗碎勻

熊胆苦寒入心勝熱癩瘡疔虫莫缺

羚羊角木畜角入肝一切肝病悉安肝之開竅於目目暗翳障必選肝風在合為筋故治驚癇拘攣魂

者肝臟之神驚狂魔寐悉安血者肝之所藏瘀毒滄溲能散相火寄於肝胆在氣為怒煩冤氣逆噎塞

寒熱此能降之使全

鹿茸純陽內含生氣補陰而和膝理鹿角生用散血熟用補腎益虛其膠一味滋補陰虛火熾忌啜

麝香芳烈通關利竅風病在骨用效若在肌肉妄用引邪入骨害燥吐衄陽虛陰乖不宜用此竅敗亦治

果積酒渴果酒過麝則壞

五倍子其味酸鹹主斂化痰止渴收汗釀造為百藥煎咳痰熱渴有驗

桑螵蛸走腎高利膀胱

白殭蠶風蠶治病類應能去皮風虫行兼治喉痺結痰要惟客邪始用

原蠶蛾至淫出繭即孺至於枯槁乃安強陰益精不足然其枯槁可鑒

斑蝥宜於瘰癧顛犬餘症必不多選

蠍此治風之藥物。辛溫走散多效。

水蛭殿之設或不勻。入陽變蛭。啣人破瘡。消血品多。美必用此不馴。

蟬退木土氣化清虛。主治風熱諸疾。然必風在皮膚。用以浮行腠理。古方用治夜啼。取其晝鳴夜息。催生

蓋取其脫。惟脫故去雲翳。

蛻螂陰濕能除熱疾。驚癩。古方第一。

蟾蜍辛寒散熱解毒。見病勞瘦甚良。辛能發汗治瘡。金蟾脫用酒方。眉酥療疔發背。外拔內發尤良。

蜈蚣治風氣暴烈。

龍骨善能鎮伏心神。兼治痢漏益腎。

穿山甲性主竄走經絡。行散不可服多。

蛤蚧能補水之上源。治嗽渴淋神效。眼毒功獨在尾。神效勞熱止喘。

白花蛇透骨搜風神品。癩癬惡瘡要藥。頭尾各有大毒。中段以酒浸過。骨刺須速棄之。傷人與生同禍。

海螵蛸入厥陰肝經。目翳流淚有功。

龜甲此物陰中至陰。底甲更屬純陰。厚濁者入腎臟。方家用入補心。取義水火既濟。實非補心正品。有如

堅虛火動。勞熱乾燥。骨蒸若欲息其上炎。藉此純陰至靜。所謂動則火起。此則靜能制動。至于潮熱盜

汗。癱攣腰腿痠痛。入瘡血枯遺精。小兒顛顛不成。皆由真臟虛衰。以至元陰不生。需此厚味純陰。所謂

滋養腎精。敗版乃經灼過。自死甲枯無用。入藥勿令中濕。濕則瘕積腹中。且宜研之極細。不然變瘕無

功。

蟹甲其色青。單入肝。故宜寒熱癰症。瘰癧驚癩陰瘡。皆主厥陰血邊。用須七肋九肋。取其陰中陽合。陰虛

水衰之人。暑邪中入陰分。出併于陽而熱。入併于陰寒甚。氣虛中焦不治。邪結瘧母陷深。此味益陰除

熱消散瘧疾要品。其主骨蒸血癆。固皆血病陰分。

牡蠣合龍骨治夢遺。然亦不可執。一亦有腎虛無火。寒精自出。須知。

真珠心熱。則神飛越。肝熱目生翳屑。此入少陰厥陰。取其鹹寒除熱。

蛤蚧此物須用紫口。蓋稟水中之陰。鹹能入血軟堅。兼能滋潤助津。痰因炎火上熾。熬煎津液作殄。此物

軟堅潤下。火降消痰。能任疝氣白濁帶下。其病皆原于腎。鹹為水化類。從故能除其邪侵。何以能治心

痛心。虛而熱。故病心欲更急。食鹹此謂其欲能中。中去

自然銅行瘀續筋接骨。其他血病不取。

硃砂此物鎮養心神。鍊服為禍實深。

輕粉此係水銀并煉。古云消積下痰。吾謂性極燥烈。誤服為患不淺。大病暫用開結。過服毒氣薰蒸。深入

筋骨不出。痰去血液枯煎。經年累月毒發。發為癭腫漏疔。煉谷升鍊鼎器。稍失固濟。迸裂。何況人之骨

肉。安能當此剗劑。

雄黃治瘡散毒要藥。其所主病甚多。

石膏金水清寒正氣。喘入陽明。奏績一切內蓄烈熱。體重而降能散。味淡帶辛主散。故清肌表熱鬱。有如

內熱口渴。是皆腸胃熱窒。內熾蒸發肌表。借此通解清肅。若或諸病不渴。又或熱由不足。暑氣垂濕。作

瀉。此味不宜入劑。大抵內清裡熱。又能發汗解肌。只宜略煨帶生。多煨性斂。體膩。

滑石石中獨得沖氣蕩除無尅伐弊。主治暑渴濁澀。取其甘寒滑利。其效偏主石淋。以其質類相濟。大都

製末臨加。此藥無味用質。

赤石脂經云。澁可去脫。此為下焦澁藥。他味性多輕浮。此則體重下墮。發其氣味辛溫。初病濕熱宜禁。若

夫崩漏概用。此尤不可為訓。

礞石為主散結軟堅。古方用之滾痰。其或酒熱濕熱。或痰膠固稠粘咯唾不能出口。用之除泄立安。若夫久病脾虛。又或陰虛火炎。煎熬津液痰結。誤投適增敗端。

花蕊石其功端于止血。能使血化為水。血暈惡血上薄。此消惡血自止。死胎胞衣不下。此物亦能下之。食鹽以水為根源。潤下之味作鹹。在人血脈應之。蓋腥無腥皆鹹。血病毋多食鹽。脈泣凝而色變。煎鹽

收以皂莢。鹽沫故似辛然。辛鹹走腎走肺。嗽腫消渴大忌。引痰涎血助水。水腫戒之有義。何以能破。破結熱。以北制南有說。補腎其入本臟。補心救投所悅。何以能吐痰癍。鹹味壬子涌泄。軟堅何以堅骨。骨消肉泥。濕熱有如夏暑濕盛。肉物易于潰齒。鹽性鹹寒。制之乃能堅久不弊。

青鹽陰氣凝結而成。不經熬煨獨勝。

凝水石小熱之氣涼。和大熱宜以寒取。此味辛鹹陰盛。故主伏熱邪氣。

朴硝質濁苦澁。不和食。繪不消能削。芒硝質清性緩。用以去熱軟堅。朴硝止可塗傳。芒硝始入煎湯。水少

火盛熱淫。佐苦治以鹹寒。故夫芒硝大黃。每用必以相參。若夫燥結由于津枯。虛極陰火如燃。陰甚類

陽等症。誤投禍不旋踵。

火硝能消五金八石。不與朴硝同治。朴硝屬水鹹寒。性下故主蕩除。火硝辛苦微鹹。屬火性升最厲。故能

破積散堅。升散三焦火鬱。烽機直達霄漢。則其升性可知。火焰並同硫磺。安有性寒之理。此物亦有芒

牙。竟與朴硝不差。然而水火異性。古方代用可訝。今人乃混為一。是皆不讀書者。

硃砂此物大熱有毒。內劑不宜輕服。

蓬砂清熱上焦胸膈。白除肺分痰熱。其性柔物去垢。剋削慎勿多吸。

礞石其性燥急。收澁墜濁。解毒除熱。吐利風熱痰涎。取其酸苦涌泄。又治泄痢白帶。取其收而酸澇。能除

固熱在骨髓。熱骨痠齒浮。礞石入骨除熱。故為固齒所需。然性燥急。刻水涌泄。不宜陰虛。又或初劑虛

帶。遠用收澁可慮。

礬紅此物善消肉積。入藥健脾消食。
孩兒茶化痰生津。清熱生肌定痛止血。

論治部

宗嵩景日診

岳生堂買蔡著

臟腑虛實用藥法則圖

本苦苦補南

本甘甘補

北補苦頭發

心

交

脾

中兼沖
雜氣

交

肝

欲乘鹹補南

欲緩甘緩補

北補鹹頭中

水酸酸補東

欲散辛補東

肝

五臟苦欲宜惡譜

肝苦急

木燥則摧

以甘緩之

熟地天麻
皆後解也
勁急甚
山梳味苦清其
氣左金丸

過散當制以酸收之

白芍平其性即瀉
胆草瀉亦酸類

虛則臟性自見思酸

惡風相傷

辛平散之

風傷陽甚筋熱拘攣

喜揚則能

辛香散之

本溫 虛則涼

欲散

以辛散之

順性即為補

以酸補之

養血地黃丸用之是

是

涼之

甘溫溫之

熟地天麻當歸
川芎杏仁棗仁

肝蓄相火常日清之鬱則疏之虛則補之 膽亦多火常宜清之驚則平之棗仁天
其腑膽屬風和則清涼狂則氣冷故曰膽本涼虛則寒煩不寐甘溫養之棗仁天

血少必胃和暢 氣升膽之精氣始發

心火苦散散亂氣消 以酸收之五味芍藥等

惡熱以等相傷 以苦補之香粟金石斛微苦

本熱虛則寒如火減則冷 香甘溫補之茯苓砂肉桂

心火臟散則不制常宜斂之熱則清之虛則煖之

其腑小腸火勝心熱不受邪移 苦寒清之是清火

外主小便其腑屬火本熱若熱其小

本熱虛則冷小腸虛寒小便短數

脾土苦濕土濕 又苦燥土燥 苦辛補之白木燥之佐以當歸潤之

欲緩運動太速 以甘緩之甘草茯苓

惡濕濕內濕皆傷脾 有外 辛溫燥之蒼朮

本濕虛則燥寒而燥者 秋則土乾物不生

其腑胃稟母 本溫主消 虛則熱飲食加致昏聩

屬土制膀胱水故飲後膀胱入約

虛熱傷冷則熱 辛苦發之升陽散

辛苦清之散清胃散佐

氣弱火上行神短火

欲軟不軟則躁急出火 以鹹軟之芒硝玄粉降火

清益躁甚如病狂等症 以鹹軟之較其堅即為

多血少生痰碍竅中 辛溫開之遠志菖蒲

小腸陽火常宜清之熱則導之虛則溫之

職主傳水失職則小腸 甘淡滲之五苓散

甘涼苦補之紫苑牛膝枸杞

甘溫補之陳皮白芍牛膝連翹

主四肢脾虛 苦溫補之神曲麥

苦補之兼神曲黃連

苦辛酒治芩連白芍甘草

肺金苦逆主氣呼吸以苦泄之陳皮枳壳惡寒感風寒傷皮毛辛熱發之麻黃金沸紫葳

畏熱燥火甚虛煩不睡苦寒清之山柘黃受生冷傷本氣鬱滯聲嘶苦香通之潤之

喜清熱肺葉張以酸收之芍藥五味本清虛則溫虛不能制侮苦甘清之合茯苓山藥百合諸清品

虛補母嬌怯依腎為宮腎主出氣謂主納氣肺氣夜卧歸藏畏熱腎中有火金畏火刑不得歸

喘脹欬嗽氣從臍下逆奔而上此腎虛不腎熱則壯火之源故肺金生於腎水中

華蓋覆四臟手足曲折運動陰陽熱則葉焦發為痿躄苦以堅腎

其腑大腸本燥虛則寒甘平補之茯苓白朮山豆以苦辛大黃等為佐涼驅散

燥甚則熱便閉生火有虛熱治以鹹寒芒硝為君冬杏仁紫苑為君麻黃秦芫為佐

氣反病在上嘔吐酸水致納下取之法腸鳴虛不能統氣大補鳴止

腎水惡燥有寒凝則乾如冬水則火乾酒隔嗝辛以潤之貝母等欲堅腎藏五臟之精熱則以苦堅之黃蘗等

一陰制羣陽起若水衰則火炎甘溫補之壯水之主以制陽光水寒虛則熱陰虛發熱咳沉

甘寒補之天冬麥冬生地熟地乾辛以潤之丹皮等欲堅腎藏五臟之精熱則以苦堅之黃蘗等

其門戶司二便虛則多寒大便溫煖之肉果故絲免絲等

其腑膀胱屬寒水本寒虛則燥下焦利口不渴是在以苦利之知母黃蘗少佐

以肺為上源肺虛氣逆而不下則下焦利口不渴是在以苦利之知母黃蘗少佐

與腎表裡多致精傷見色火降補腎不補膀胱前理澤瀉車疾癰肺亦致小便不

論曰凡人臟病少腑病多臟病緩腑病急凡諸痛皆屬腑故曰臟病由腑病腑通臟自安

四季時令用藥譜

論治部

正月二月初春微陽不宜過汗宜香蘇散冬時陽氣潛藏凡人之陽深藏于腎飲食七情之氣無陽以發之

三月外寒中虛宜四物參蘇飲此時冬令去風去濕發散寒下咽喉之毒人參係元半夏化痰甘草

春宜溫反寒為不及香蘇散正治反熱為大恩有口乾照溫病條治

四月火熱赤口渴此時病多便宜五苓清暑益氣十味香薷之類

宜熱初令未除仍宜香蘇散參蘇飲解之

五月正令大熱過大雨宜清暑益氣湯

六月正令溫熱病多宜五苓散

四月熱月五月火月六月濕月熱火旺則生濕濕盛亦生火熱三者相合肺金受剋熱傷元氣痿倦疾

作故用清暑益氣湯黃芪助肺人參補元甘草瀉火清肺復元濕熱感傷胃故加蒼木濕病胸不舒故

黃藥濕病發熱加升麻升陽冬清心五味斂肺皆以救肺也

夏三個月濕熱極勝三焦氣不清上咳下瀉中滿故用五苓散猪苓清上焦茯苓清中焦澤瀉清下焦

陽氣不到則濕不除如日所不照處濕不易乾用官桂之辛升至表引表之陽氣入裡裡得陽氣而濕即行

夏多渴不宜五苓愈渴然大渴引飲是濕熱在上焦宜滲瀉之仍宜五苓散

長夏濕熱中本臟脾土則為宜五苓散加乾薑

入於肝則寒熱似瘧五苓加柴胡黃芩頭痛加川芎蔓荊

入於肺則為痰嗽五苓加半夏五味子有宿食加乾薑半夏乾姜溫中化食汗多五苓加小建

中汗多甚或黃芪建中身熱加柴葛熱甚加石膏發表五苓熱飲利便五苓冷飲

七月秋初陽掃除陰主因夏濕熱之氣尚留胸臆而有痞滿不寬之証宜金不換正氣散濕去金清則降下之令復

藿香厚朴紫蘇陳皮

秋初若濕熱猶勝便不宜五苓宜清暑益氣湯蓋夏之濕熱感脾自作病也若此時濕熱太盛主氣衰其濕并葛鮮表熱青陳曲消濕熱之痞滿而祛陳腐之氣五苓只能滲不能滋矣秋多痢在表太陰在裏純陰無陽生冷積而不化積久成熱故作痢不發于夏者無陽則發不運至秋則陽氣入裏邪無所容也宜溫之開之因勢而導之

八月九月旺或傷風咳嗽寒熱不能平木宜溫肺湯薑辛五味肉桂乾姜脾腎藥也皆以溫下腎水溫氣水從天降金旺則能平木矣

十月十一月十二月陽氣下替裡寔表虛寒邪易入陽氣難生宜十神湯升葛芷升陽明之陽蘇麻升太陽川

四時治感冒法以扶陽為主不外乎一升一降之理春用香蘇開豁胸中冬時鬱室之氣使陽氣上升也夏用五苓為陽氣在表火上混雜四苓上下通宣肉桂辛散濕鬱接引陽氣入裏也秋時陽宜降下以濕熱內鬱不得降正氣散開豁胸膈醒脾溫胃令陽氣得以下替也味者反欲泄陽謬矣

七方治病權衡譜

大方二 有君一臣三佐九之大方 病有兼証而邪不一不 可以一二味治者宜之 有分兩大而須服之大方 肝腎及下部病

肝腎位遠數多其氣緩不能逮 下大劑數少取其迅急下走 病無兼証可一 有分兩少而徐呷之小方 心肺及在上之病宜之 肺

小方二 有君一臣二之小方 二味治者宜之 有分兩少而徐呷之小方 心肺及在上之病宜之 肺

升發于上必小劑數 多取其易散上行 心位近數少則氣急下不能

緩方五 有無毒治病之緩方 無毒性 有丸以緩之之方 比之湯散行遲病不可以 有甘以緩之之

方 甘草蜜糖之屬病在胸膈取其 有品件多之緩方 品眾則進相拘制 有氣味俱薄之緩方 氣味

留戀 治主宜緩緩則治其本 有品件多之緩方 品眾則進相拘制 有氣味俱薄之緩方 氣味

急方四 有毒藥之急方 世以奪病勢 有急病急攻之急方 中風闕格之類 治 有湯散盪除之急

方。下咽易散。○有氣味俱厚之急方。厚則直行于下而力不良。經曰

奇方二。有獨用一物之奇方。病在下而速者宜之。經曰。有合陽數一三五七九之奇方。宜下不

偶方三。有二方相合之偶方。病在上而奇制少數服之。經曰。有合陰數

二四六八十之偶方。宜汗不

複方三。有本方加味之複方。如調胃承氣加麴。有二方三方數方相合之複方。湯五積散之屬。有

分兩均齊之複方。如胃風湯各

臆加四方

重病輕方。久病元虧如草將枯大其浸灌。○輕病重方。邪氣初感正氣未虧。○反佐方。即從治也。如熱在

藥中入熱藥為佐下膈之後熱散寒性得力也。○顧忌方。外腎病心氣不足。腎藥於心益

有浮火則熱藥中入寒藥為佐下膈後寒清熱性得力也。○顧忌方。哀故曰。謀伐無過。命曰大惑。治上

十劑用藥規矩譜

宣可去壅劑。壅者上膈病也。嘔噦用薑橘。○有痰壅吐涌之宣法。膈上熱痰瓜蒂等吐者是。○有鬱壅取嚏之宣法。中風口

有氣壅破利之宣法。霍亂用薑橘。霍半者是。

通可去滯劑

有氣滯通之之法。木香枳。○有水滯通之之法。水病木通。○有鬱滯通之之法。香附蘇

補可去弱劑

有精弱味補之法。熟地茯苓。○有形弱氣補之法。人參。○有五味各補其臟之法。酸補肝。辛補肺。

有臟性所欲補之之法。肝欲辛散。肺欲酸收。心欲甘軟。脾欲甘緩。腎欲苦堅。脾欲甘緩。

補劑。○有臟性所欲補之之法。肝欲辛散。肺欲酸收。心欲甘軟。脾欲甘緩。腎欲苦堅。脾欲甘緩。

泄可去閉劑

有陽閉泄之之法。葶藶之屬。利小便。○有陰閉泄之之法。大黃之屬。益腸胃。○有痛閉泄之之法。諸痛為寔痛。隨利減芒硝。大黃牽牛巴豆。

○有結閉泄之之法。利下乳。磨積利水。破經。澁氣。凡下行之法。皆是。

輕可去實劑。虛者亦輕類也。

有風熱解表之法。麻黃湯香。蘇散之類。○有瘡毒解散之法。敗毒散。活命飲之類。○有諸解之法。點洗。蒸炙。熨烙。刺砭。導引。按摩。皆汗法也。

重可去法劑。實者亦重類也。

有氣法而浮鎮神之法。喪神氣不守。用珠砂。寒水石之屬。○有形法。涎潮重障之法。久嗽涎潮。用礞石。海石之屬。

滑可去着劑。膩者亦滑類也。

有大腸氣着滑之之法。麻仁郁李之屬。○有小腸氣着滑之之法。葵子滑石之屬。○有兩陰氣俱着名曰三焦約滑之

之法。宜以滑劑潤養。其燥然後攻之。○有氣虛着滑之之法。蜜導法。後以潤劑養之。

澀可去脫劑。酸者亦澀類也。

有汗脫澀之之法。壯礞五倍。五味之屬。○有腸脫澀之之法。內果訶皮龍骨。栗壳之類。○有津脫澀之之法。口渴病用五。味烏梅者是。

水脫澀之之法。便遺用益智仁。蓮蕊之屬。○有血脫澀之之法。地榆牡蠣之屬。

燥可去濕劑。乾者亦燥類也。

有濕勝燥之之法。桑皮。茯苓之屬。○有寒濕燥之之法。姜附胡椒之屬。○有氣濕燥之之法。蒼朮白朮之屬。○有濕痰燥之之

法。半夏。南星。蛤粉之屬。○有濕熱燥之之法。黃連。黃蘗。山梔之屬。若屬火亦燥劑。

濕可去枯劑。潤者亦濕類也。

有用辛化液之法。治津液乾枯。當歸之屬。○有用鹹濡潤之法。治澀渴。硝之屬。

又添立劑

寒可去熱劑。濕亦熱類也。熱可去寒劑。類也。銳可下行劑。和可安中劑。緩可制急劑。

生可主養劑。靜可制動劑。

用藥補瀉治病紀綱譜

虛病

有正虛名邪之虛。如氣虛發熱陰虛潮熱。宜以補為瀉之法。如參芪大草之退勞倦虛熱。補即瀉也。○有邪盛耗

正之虛。如咳嗽傷肺癆開傷腎。宜以瀉為補之法。如桑皮黃芩之瀉肺車前之利水。瀉即補也。

實病

有本臟邪盛之實。如心火盛肝怒盛風盛肺燥或脾濕或腎寒或。宜直瀉之。或瀉其子。○有勝藏來尅之實。如火熱甚肺病或怒氣甚脾作

滿之宜瀉勝臟兼補本臟以絕其來侮。○有我勝反侮之實。如水腫由于脾虛勞熱出于腎虛之屬。宜先補本臟後瀉來

侮之臟。

總無正氣有餘之實。凡云瀉者瀉邪氣也。正氣斷無瀉理。即用瀉邪去八九即當已。過者傷正。

五色所主譜

青肝木 稟母水黑青黑 故木色多紫

黃脾土 稟母火赤 故土色多赤

黑腎水 稟母金白 故水色多白

用藥升降治病闡紐譜

補陽宜升 升有散之義。凡散劑皆升也。

飲食勞倦陽下陷。升陽益氣。瀉痢不止。升陽益胃。鬱火內伏。升陽散火。滯下不休。升陽解毒。

濕泄。升陽除濕。肝鬱地中。小腹脹。升陽調氣。

紅心火 稟母木青青紅 故火中黯紅
白肺金 稟母土黃 故金色多黃
大腸燥

補陰宜降 降有斂之義 凡斂劑皆降也

火盛降氣 痰盛降火 熱盛降濕 氣盛疏之斂之

升藥便瀉肺腎 辛甘溫熱及氣味之薄品能助春夏之升浮便瀉秋冬之收藏
降藥便瀉肝心 酸苦鹹寒及氣味之厚品能助秋冬之降沉便瀉春夏之生長
如辛溫過肺絕 甘熱過腎絕 酸寒過肝絕 苦鹹過心絕

淡滲藥亦有降升 滲即為升 泄即為降 所以佐使諸藥

以降為升 如補中益氣湯 以脈右大于左陽陷于陰分用之從陰引陽

以升為降 如六味地黃丸 以脈寸旺于尺陽亢于上陰竭于下用之從陽引陰

用藥溫涼寒熱正變譜

溫性得木之正 溫多成熱 溫之變也 溫多涼少 涼不為之涼 溫之正涼之變也

涼性得金之正 涼多成寒 涼之變也 涼多溫少 溫不為之溫 涼之正溫之變也

熱性得火之正 熱極似寒 熱之變也 熱多寒少 寒不為之寒 熱之正寒之變也

寒性得水之正 寒極似熱 寒之變也 寒多熱少 熱不為之熱 寒之正熱之變也

寒熱各半而成溫 又寒熱之變溫之變也

寒多熱少而成涼 又寒熱之變涼之變也 陽亦從熱 熱之變也

寒熱各半晝服則從熱而升陽分 又熱之變也 陰亦從寒 寒之變也

寒熱各半夜服則從寒而降陰分 又寒之變也 溫性涼服 補中下無妨於上涼先行而溫後行 溫之中有涼也 溫之變也

涼性熱服 補上無妨於中 溫先行而涼後行 且涼資熱以升之 涼之變也

寒性熱服 寒不能散資熱以散 經絡寒始得力也 寒之變也

熱性寒服 熱攻寒恐相攻借以引入寒分 熱之變也

藥性宜用譜

藥性

所養

所主

藥性

所養

所主

溫

養肝胆

主補

熱

養心神

主浮

濕濡

養脾陰

主潤

清涼淡

養肺氣

主涼

寒

養腎精

主沉

燥

養脾氣

主通

藥味宜用譜

五味

所入 所走

所養

所主

兼能

酸

肝 筋

筋膜

收斂

收緩

收淫

收脫

斂散

斂熱

斂表

斂血

苦

心 血

血脈

泄

堅脆

燥淫

直行

降下

去垢

解毒

養陰

甘

脾 肉

肌肉

緩滲

緩急

上行

發生

潤陽

補氣

補開

補養

辛

肺 氣

皮毛

散

散結

驅風

橫行

利竅

潤燥

補陽

利陰

鹹

腎 骨

骨體

軟利

軟堅

凝結

治下

利竅

養竅

服藥法則譜

急服

有通口直飲

重劑治下

有趁熱連飲

輕劑偶劑

緩服

有趁熱徐徐小飲

治大熱病宜

有不用氣隨津自下

治假熱病宜

冷服

有寒劑冷服

治大寒病宜

有熱劑冷服

治假寒病宜

熱服

有熱劑熱服

治大熱病宜

有寒劑熱服

治假寒病宜

溫服

有補藥溫服

補取溫意

有平藥溫服

寒熱者宜

肝病禁 腎病禁 肝病禁 肝病禁 肝病禁

空心服

有五更空心服病在腎肝宜取其再

有早起空心服補下治

有空心服後即壓以食治腎

恐妨

食後服

有食後即服病在胸

有食遠方服病在中脘者宜或病在胸膈用岐下藥

有服後左右側卧恐飲食方在胃口下早致胸結者宜

有服後去枕卧病在肺及在

臨臥服

有積者宜

病在胸膈素

有服後去枕卧

病在肺及在

臨臥服

病在胸膈素

臨臥服

有服後正卧病在胸膈素

有積者宜

有服後左右側卧病在胸膈素

有服後去枕卧病在肺及在

臨臥服

有積者宜

病在胸膈素

有服後去枕卧

病在肺及在

臨臥服

病在胸膈素

一二滾服

發散治上

百十滾服

溫補治中

濃煎服

治下部

去頭煎服

病者宜

已未午初服

虛怯病不勝

藥力者宜

中陰中引提陽氣宜補

中益氣湯提瘧湯皆是

藥性皆偏論

一藥之生其得寒熱溫涼之氣各有偏至以成其體質故曰藥藥者毒之謂設不偏則不可以救病之偏矣故寒病熱救熱病寒救虛補實瀉即補亦偏至之味非中和也蕭何約法武侯峻綱皆因時勢之偏而救之不得已也設得一二方之效遠長服以為保命之品其初或亦投其正病久之而味之偏勝偏歸其臟則所勝之臟受傷而必至於偏絕故岐伯有去六去七去八去九之戒蓋慎之也

熱補為害論

六味丸加桂附益火也乃今之豪貴者不問虛實陰陽概用之此拘於陽能生陰陰不能生陽之說也即問知桂附不宜輕用而又引引火歸源之說以為解夫豪貴之家酣飲助火恣慾亡陰往往用此無依之火未歸源而陰火轉熾是未生陽生之益先貽壯火之患也故古人云寒藥不可多熱藥不可久

治病用藥宜活論

論治部

論治部

六

譬如內傷証治以寒涼此庸鄙不足言者也。間有名手又端主甘溫除却補中歸脾六味等湯。尤更無他技不效。則曰病劇難措也。此不明於活治者也。設使內傷元氣尚強。何妨暫投清快之劑。即本原已傷。若久用甘溫不效。倘少佐之以辛。而邪火自散。所以為養正祛邪之助也。若寒病久用熱藥。何妨稍為涼解。熱病久用寒藥。何妨暫為溫理。在明理者自酌之耳。

六味丸八味丸加減論

寒之不寒。責其無水。熱之不熱。責其無火。故宜壯水之主。以制陽光。益火之元。以消陰翳。仲景八味丸。益火也。錢氏六味丸。壯水也。以濟人多效。然余謂真陰既虛。不宜再泄。二方俱用丹芩澤。滲利太過。雖曰大補之中。加此無害。然未免減去補力。而奏功為難。便或陰弱未傷。或臟氣微滯。而兼痰飲水邪者。正宜用此。若精氣頭損。年力俱衰。真陰內乏。虛痰假火等証。即純補猶嫌不足。若加滲利。如實漏危矣。故當察微甚緩急。而用隨其人。斯為盡善。虛勞生火。非壯水何以救其燎原。瀉痢亡陰。非補腎何以固其內戶。

壯水制陽丸。治真陰腎水不足。不能滋溉榮衛。漸至衰弱。或虛熱往來。自汗盜汗。或神不守舍。血不歸原。或遺淋不禁。或氣虛昏暈。眼花耳聾。或口燥舌乾。或腰酸腿痛。凡精髓內竭。津液枯涸等症。俱速宜壯水之主。以培左腎之元陰。

熟地黃 八兩

山藥 四兩

山黃 四兩

龜膠 炒成珠 四兩

川牛膝 蒸熟用 三兩

鹿膠 炒成珠 三兩

免絲子 三兩

枸杞子 三兩

煉蜜丸 白滾湯空心下百丸

如陰虛火動者。宜用純陰至靜之劑。去枸杞鹿膠。加女貞實三兩。麥冬三兩。○如火灼肺金。乾枯多嗽者。加百合三兩。○如夜熱骨蒸。加地骨皮三兩。○如小水不利。加茯苓三兩。○如大便燥澇。去免絲子。

加肉蓯蓉酒洗三兩。○如血虛有滯。加當歸四兩。

作飯

熟地自二三錢可加至二兩隨輕重用之 山藥二錢 山黃一錢 炙草一錢 枸杞二錢 茯苓一錢

如肺熱而煩加麥冬二錢。多嗽加百合二錢。血少加當歸二錢。血滯而熱加丹皮二錢。陰虛

不寧加女貞子二錢。血熱妄動加生地二三錢。脾熱易飢及多汗傷陰加白芍二錢。心熱多躁

者加元參二錢。腎熱骨蒸加地骨皮二錢。津枯熱渴加花粉二錢。上實下虛加牛膝二錢。以導

益火消陰丸。治元陽不足。或先天稟衰。或勞傷過度。致命門火衰不能生土。而為脾胃虛寒。飲食少進

或嘔惡膨脹。或反胃膈塞。或法寒畏冷。臍腹冷痛大便不實。小水自遺。虛淋寒疝。或寒侵谿谷肢節痺

痛。總之真陽虛者。必神疲氣怯。或心跳不寧。或四肢不收。或眼見邪魔。或陽衰無子等症。俱速宜益火

之源。以培右腎之元陽。

熟地八兩 山藥炒四兩 山黃微炒三兩 枸杞微炒四兩 鹿膠炒成珠四兩 杜仲姜炒四兩 鬼絲子炒熟四兩

當歸四兩大便溏者即去之 附子自二兩可加至六兩因人而用 肉桂自二兩可加至四兩因人而用 右丸服如前。

如陽衰氣虛。加人參二三兩。或五六兩。陰藥入虛實以為增減人參之功隨陽藥入陽分隨 如陽虛精

滑。或帶濁便溏。加補骨脂酒炒三兩。如食泄腎泄不止。加肉豆蔻麩炒去油三兩。如嘔惡吞酸。加

乾姜三兩。如腹痛不止。加吳萸湯泡三次炒二兩。

製附子法。每附子二兩。用粉草五錢。煎濃湯。浸二三日。剝去薄皮。切四塊。又浸一日。俟極透。取起

少晒切為片。用微火徐炒至七分熟。即可用矣。

作飲

熟地如前 山藥炒二錢 山黃一錢五分 炙草一錢 枸杞二錢 杜仲姜炒二錢

附子錢至三錢止 肉桂自一錢至二錢

如氣虛血脫。或昏或厥。或汗或暈。或虛狂。或短氣。加人參自一錢二錢至一兩二兩。如火虛不能生土。或嘔惡或

足厥陰少
陽肝胆
手少陰太
陽心小腸
手太陽陽
明肺大腸
足少陰太
陽腎膀胱

吞酸加泡姜一錢○如泄瀉不止腹痛無休加附子自一錢至二三錢須人參兼用或再加肉豆蔻二錢○如小腹疼痛加桂附
仍不止者再加吳萸一錢佐之○如淋遺白帶臍腹疼痛加補骨脂一二錢炒熱搗碎用○如血少血凝加當歸二錢

四氣調神論

春夜卧早起廣步于庭舉動和緩以應春氣逆之則傷肝夏必火不足
夏夜卧早起無惰于日使志無怒使氣疏泄逆之則傷心秋必為瘡
秋早卧避初寒早起從新爽與雜俱興使志安寧逆之則傷肺冬必飢泄
冬早卧晚起必待日光若伏若匿自重無妄動去寒就溫無泄皮膚逆之則傷腎春為痿厥

治病必求其本論

治病必求其本本有先後天之辨先天之本在腎蓋嬰兒未成先結胞胎其象中空一莖透起形如蓮蕊
一莖即臍帶蓮蕊即兩腎也而命寓焉腎應北方水水生木而後肝成木生火而後心成火生土而後脾
成土生金而後肺成五臟既成六腑隨之四肢乃具百骸乃全故腎為臟腑之本十二脈之根人資之以
為始者也故曰先天之本在腎後天之本在脾嬰兒既生一日不再食則飢七日不食則腸胃洞絕而死
經云安穀則昌絕穀則亡猶兵家之有餉道也餉道一絕萬眾立散胃氣一敗百藥難滋一有此身必資
穀氣穀入胃澆陳於六腑而氣至和調於五臟而血生人資之以為生者也故曰後天之本在脾上古聖
人見腎為先天之本故著之脈曰人之有尺猶樹之有根見脾胃為後天之本故著之脈曰有胃氣則生
無胃氣則死而治先天則有水火之分水不足者用六味丸壯水之主以制陽光火不足者用八味丸益
火之源以消陰翳治後天則有飲食勞倦之分飲食傷者枳朮丸主之勞倦傷者補中益氣湯主之王應
震曰見痰休治痰見血休治血無汗不發汗有熱莫攻熱喘生毋耗氣精遺毋澁泄明得箇中趣方是醫

中辭真知本之言也

用熱遠熱用寒遠寒發表不遠熱攻裡不遠寒論

遠者。避忌之謂。即無犯也。凡用熱者。無犯司氣之熱。及時令之熱。用寒者。無犯司氣之寒。及時令之寒。溫涼亦然。惟發表則不遠熱。惟攻裡則不遠寒。發攻二字要者。發者逐之于外。開其外之固也。中表多寒邪。非溫熱不散。故外雖熾熱。內無熱症。火不在裡。醫者不察本寒標熱之義。輒用芩連等邪寒在表。藥寒在裡。內外合邪。遂不可解。春秋冬三季。土金水三氣。陰勝陽微之時。尤其亦有用柴胡白虎。益元冷水之類。取汗而愈者。此因表裡俱熱。故當涼解。非發之之謂也。攻者逐之於內。伐其內之實也。內鬱多熱。邪非沉寒不除。故攻裡不遠寒。亦有用理中四逆回陽之類。而除痛去積者。此因陰寒留滯。故當溫中。非攻之之謂也。知發與攻者不遠之義。益知遠熱遠寒之不可忽矣。

卷之三十一