

可遽用香薷沉冷之劑。合先用橘皮半夏生姜之類，開散結滯，次則以香薷五苓溫服，散暑解煩，或挾寒而手足厥逆，腹中絞痛，宜以四逆理中之類，溫之亦不可遽用峻補兜澁之劑，則邪愈滋，而變症百出。治乾霍亂急以鹽湯灌之，令其大吐庶有可生効。不可與穀食恐胃中邪物吐瀉不盡，新穀一入脾不能化轉，增危殆慎之慎之。大槩其脉浮洪者易治，若脉微遲，加以氣少，昏沉不語者皆難治也。

舟溪曰：內有所積，外有所感，致成吐瀉，仍用二陳湯加減，作吐以提其氣，切莫與穀食，雖米飲一呷，入口即死，必待吐瀉盡過二三時，直至飢甚方可與稀粥，其脈多伏，欲絕，又曰：雖已吐瀉不徹，還用吐，提其氣，或用樟木煎湯，吐之。夫法生姜理中湯最好，不渴者可用，渴者用五苓散，亦可下者。○乾霍亂最難治，死在須臾，升降不通，亦無從出，當吐，提其氣，極是良法。世多用鹽湯，為內有食傷，外有邪遏，故吐之，吐中。

就有發散之義

轉筋不住男子以手挽其陰女子以手牽其乳近兩邊此千金妙法也 轉筋入腹者死

脉訣舉要曰滑數為脈代者霍亂微滑者生

數

凶斷又曰滑而不勻必是吐瀉霍亂之候脉代勿訝

內經曰脉伏者霍亂脉微而澁 或代而散 或隱而伏 或大而虛 脉右閨滑為霍亂吐瀉脉結促代皆不可斷以死 脉大者生

洪者為熱 級者為渴 氣口脉絃滑膈間有宿食留飲

縮脾飲

解伏熱除煩渴消暑毒止吐瀉宜沉冷

頻服

草果仁四

烏梅肉三

甘草炙二兩半

每服五錢姜十片水煎服

藿香正氣散 中溫霍亂吐瀉

蒼朮 陳皮 半夏 蕤香各二

甘草錢一

姜五片束二枚水煎服

桂苓甘露飲 中暑霍亂吐瀉發渴引飲

方見中暑

卷之三

十一

五

不換金正氣散

霍亂轉筋嘔吐泄瀉頭疼

方見暑門

五苓散

方見暑門

藿芩湯

外感風寒內傷飲食霍亂轉筋吐瀉

藿香

厚朴

白术

茯苓

半夏

陳皮

大腹皮

紫蘇

白芷

桔梗

半夏

陳皮

訶子散

霍亂吐利如神又治心脾冷痛

訶子

甘草

厚朴

乾姜

草果仁

陳皮

良姜

茯苓

神曲

麥芽等

水煎入鹽服

五

二香散

暑濕相搏霍亂轉筋煩渴悶亂

藿香

白术

厚朴

陳皮

茯苓

半夏

白扁豆

紫蘇

桔梗

白芷

香薷

黃連

錢各一

大腹皮

甘草

分五

姜五片葱白根水煎服

沉脉

加味四君子湯

霍亂轉筋吐瀉腹中痛體重

沉脉

細人參

白术

茯苓

各二

甘草炙芍藥

良姜

錢一

姜三片

東二枚水煎服

通脈四逆湯

霍亂多寒內冷脉絕

吳茱萸

兩炒二

附子

兩炮一

桂心

木通

白芍藥

細辛

甘草炙各五錢

當歸

錢

每服七錢水一鐘

酒半鍾姜七片枣一枚煎，七分溫服。

七氣湯 七氣鬱五臟之間互相刑克，陰陽不和。

揮霍交亂，吐利交作。

半夏

五兩

厚朴

桂心

各二

白芍藥

茯苓

四

紫蘇葉

橘皮

各二

人參

兩

每七錢水一

盞半酒半盞姜七片枣一枚煎，溫服。

木瓜湯

霍亂吐瀉轉筋擾悶。

酸木瓜

兩

茴香

微炒

二

甘草

錢

二吳茱萸

炒

二

每服五六錢姜七片紫蘇十葉水煎服。丁方無
草各一錢

姜附湯

霍亂轉筋，手足厥冷，多汗。

咽逆

寒

門

見方

加味香薷飲

伏暑吐利不止，煩悶多渴。

本方加檳榔黃連。

每五錢

水酒各半煎服。

冷香湯

夏秋伏暑引飲，過食生冷，遂成霍亂。

良姜

附子

甘草

檀香

錢各一錢，乾姜一錢，炒一錢。

藁本

半錢

丁香三分

二服水煎

連瓶沉井內待

效服

人參散

霍亂體痛，四肢逆冷，服理中四順，不效者。

人參

白芍

川歸

炒良姜

各二錢

附子

陳皮

桂心 白术 各三錢 每五錢加紅棗三枚水煎服
活命散 霍亂吐瀉不止面色青黑垂死者

防風

羌活

獨活 乾姜

細辛各一分

草豆蔻

肉豆蔻 川芎

各五錢

官桂半分

吳茱萸

木瓜

各一兩

每三錢濃煎木瓜湯調服

回生散

霍亂不已吐利不止但有二點胃氣存

無不効者

陳皮

藿香葉

各五錢

水煎或為末

熟酒調服

秘方

霍亂吐利轉筋神效

白扁豆葉根研取汁一碗入米醋同服立瘥
加減理中湯 霍亂嘔吐

白术 人參 乾姜各三錢

甘草錢一錢

水煎服

若為寒氣濕氣所干者加附子一錢名附子
理中湯 君霍亂吐瀉加陳皮青皮各一錢
治中湯 君乾霍亂心腹作痛先以鹽湯少
許頻服俟吐出令透即進此藥 君嘔吐者
加丁香半夏各一錢姜十片同煎 泄瀉者
加橘紅茯苓各一錢名補中湯 唐瀉不已

於補中湯內加附子二錢，不喜飲食及米穀。

不化再加砂仁一錢。霍亂吐下心腹作痛。

手足逆冷于本方內去白朮加熟附子名為

四順湯。傷寒結脅先以桔梗枳殼等分煎

服不效者及諸吐利後脅痞欲絕心膈高起

脹痛手不可近者加枳實茯苓各一錢名枳

實理中湯。君渴者再于枳實理中湯內加

爪葵根一錢。霍亂轉筋者理中湯內加火

煅石膏一錢。君膀胱築者乃腎間動氣也

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

去木加官桂丁錢半。惡燥去木恐作奔豚。
也故加桂取辛以潤之。若悸者加茯苓。渴
欲飲水者加白朮五分。腹滿者去白朮。
加附子丁錢。若寒者再加乾姜一錢。飲
酒過多及啖炮炙熱物發為鼻衄者加川芎
一錢。傷胃吐血以此藥能理中脫分利陰
陽安定血脉只用本方。

三因白朮散 中暑嘔吐眩運及木病後調理失
宜。勞復及脾胃虛損面色青黃飲食不思口吐

及酒毒嘔噦	白术	茯苓	人参	各五錢
五錢	甘草	木香	葛根	為末白湯調服
五錢	人參	茯苓	葛根	各五錢
二錢	煩渴加滑石二兩甚者加姜汁			
經驗方人參散	止吐逆及瀉後煩渴常服調中			
和氣	人參	茯苓	葛根	各五錢
甘草	錢半	分三帖水煎服	蘿香	木香
	加滑石一錢		瀉後渴甚者	
止渴湯	霍亂煩渴			
甘草炙人參	麥冬	茯苓	桔梗	香附

酸水滑泄腹鳴飲食所傷霍亂吐瀉並宜服之
白芷 甘草炙青皮 白茯苓 桔梗 香附
子 山藥各三乾姜五錢 白术 陳皮各一兩
每十兩姜三片枣十枚木瓜一片紫蘇三葉
水煎服 若吐瀉加白梅煎 喘加桑白皮
杏仁 傷寒勞復加薄荷 脳氣加木通入
射香少許 中暑嘔逆加香薷 霍亂加藿
香 產後泄瀉加荆芥 氣厥加鹽煎服
調中白术散 大病後吐瀉煩渴霍亂虛損氣弱
調中白术散 太病後吐瀉煩渴霍亂虛損氣弱

澤瀉

葛根

錢各五

右末蜜湯調下二錢

姜鹽飲

霍亂欲吐不吐欲瀉不瀉

鹽一
兩

生姜五錢

搗碎

同炒冷色變以水一盞煎

熱溫服甚者加童便一盞

蓼湯 霍亂轉筋不止

蓼一大木搾水煎湯薰洗或以帛蘸湯慰患處
一方 每遇轉筋時即以鹽揩擦痛處三五十匝
即雖皮破亦不妨可以斷根

炙法 霍亂已死腹中尚緩猶未絕氣者

用鹽納廝中令滿太艾炷灸三五七壯甦

麥冬湯

霍亂已愈煩熱多渴小水不利

麥門冬

茯苓半夏

陳皮白朮各一

人參

小麥

甘草各一

生姜五片

烏梅半箇

煎服

青金丹

霍亂吐瀉不止及轉筋諸藥不効者

硫黃一
兩

水銀八
錢

右二味銚子內炒柳木管

子不往手攬勻更以柳枝蘸冷醋頻洒候結
如鐵色即成青金丹乃刮下再研如粉留小

半為散餘以粽子尖三箇醋約半盞研稀稠得所成膏丸如雞豆子大硃砂為衣每服一丸煎丁香湯磨化下熱服如作散服以丁香湯調下一錢傷寒陰陽乘伏用龍腦冷水磨下一日二十三服

海藏云吐瀉轉筋身熱脉長陽明本病也宜和中四君子湯平胃散建中湯每二兩姜五片水煎服如吐瀉轉筋自汗脉浮者四君子湯加桂五錢。吐瀉轉筋肠下痛脉絃者宜建中加木

瓜柴胡湯平胃散加木瓜五錢亦可也
建中木瓜柴胡湯

桂枝半两芍藥三

兩

甘草一

兩

膠餡糖半生姜一

半

兩

大棗六

枚

木瓜

五

錢

柴胡

五

錢

加飴糖兩匙

一

呼瀉

後小便不通

胸中實痛者

四君子湯加大黃

兩

呼瀉

腹中痛

轉筋體重

脉沉而細者宜四君子加

高良姜白芍藥

四君

子四味各一兩芍藥良姜各五錢同前煎法服

呼瀉霍亂四肢拘急脉沉而遲者宜四君子湯

加姜附厚朴湯四君子四味各一兩生姜附子
厚朴炮_{三錢}製各同前煎服 吐瀉轉筋四肢厥冷
脉微緩者宜建中加附子當歸湯

桂枝一當歸二芍藥二粉草五錢飴糖半生姜一
附子炮_{三錢} 三大棗六枚 同前煎服 吐後轉筋木

瓜一丁味煎服良

○轉筋

尋常轉筋四時皆有不因霍亂而發者其發多于
睡中或伸欠而作丹溪謂此多屬血熱以四物

湯加蒼朮紅花酒芩南星水煎服
有筋轉于足大指轉上至大腿近腰結了乃因奉
養過厚飲冷感寒而作寒遏其熱寒主收引勁
急故筋轉而疼也前方加姜汁臨時服之
足太陽之下血氣皆少則善轉筋踵下痛
丹溪曰轉筋偏身入肚不忍者作極酸鹽湯于槽
中暖浸之 磬湯亦妙 蒸湯亦好
仲景云轉筋之為病其臂脚直脉上下行微弦轉
筋入腹者雞屎白散主之

雞屎白 炒為末取方寸七以水六合和溫服入

程惠方 肝虛轉筋用赤藜莖葉切作三合水一

盞酒三合煎四合分二服

孫尚藥 脚轉筋疼痛挛急

松節二兩剉如米粒乳香一錢以瓦器內慢火

炒金焦只留一分出火毒為末每一錢至二錢

熟木瓜酒調下但是筋病疼痛皆妙不獨轉

筋而已

外臺治轉筋取舊綿以釀醋浸醃中蒸及熟用綿

裹患脚上冷則易勿傷皮以瘥為止
秘方 脚轉筋無時甚好

雄猪陰莖一條全者薄切香油煎熟細嚼鹽酒送下空心服連進三朝奇驗

○中惡客忤門

中惡客忤者無故忽然而病倒者是也多受干道
途及早晚門外忽得之卒受非節之氣令人半
腹絞痛張滿叫喚氣冲心胃不急治則死磨
真烟墨一盞熱湯解服之又有鹽湯探吐亦好

卒死鬼擊或先病因睡卧間忽然而絕皆是中
惡之候若脉氣應指心頭仍暖者搗石菖蒲灌
之立甦如口噤須灌從鼻入

中惡暴死 石菖蒲為末每用五分安舌底又吹
入兩耳及鼻中則甦

中惡入心頻死

阿魏末鹽酒調下一錢半連進二服効

中惡吐血 牛桔梗取汁每服一鐘日三無生者
以乾者為末仍以桔梗湯調下

中惡客忤 蘇合香丸姜湯調下妙

○效逆門

內經曰歲金太過效逆金鬱之發效逆少陰二氣
效逆古謂之飢逆氣上逆作聲之名也經曰諸
逆衝上皆属于火是心火刑于肺金也易老曰
效逆者火熱奔急上行而肺金不納何其當哉
俗以為噦者非盖噦者出聲也噦出其氣噦声
盡然後呼也出入呼吸大有不同况噦者本于
胃效逆者本于肺又豈可例論哉然此症或由

水瀆于肺而心痞或喜笑過多而氣嘔或懲飲錯喫而氣嗆或急食乾物而氣塞皆令作欬逆之聲連續不絕俗謂吃忒是也入或以紙撚取鼻嘔而止或寃以盜賊因恐而止或鼻熱聞食香調氣而止皆抑之駭乏而使氣下也又有胃氣寒而呃元禮戴氏以雜病發呃者皆屬寒惟有傷寒發呃屬熱蓋由陽明內實過經失下清濁不得升降以致氣不宣通而作或又有飲食填塞胃中而氣不得升降者或有痰閉于上火

起于下而氣不得伸越者又有吐利後胃虛膈熱而作呃者又有氣血虛作呃者不可以不辨傷寒陽症欬逆者蓋由陰消將盡陽火暴甚直冲而上出于胃入於肺而作聲所以東垣用涼藥以馮熱降火其陰症欬逆者蓋以陰氣先消陽火將竭浮于胃中亦欲散也故反用丁香乾姜之屬以養胃中陽氣胃氣一和陽生則陰長也丹溪云傷寒發呃亦有四症不同有中氣不足脉虛微氣不相續而發呃者宜補中益氣湯加生

脉散加黃柏以降虛火或少加附子服之立愈○有陽明內實失下而發呃宜大承氣湯下之○有渴而飲水太過成水結胃而發呃者宜小陷胃湯或小青龍湯去麻黃加附子治水寒相搏發呃者妙○有傳經傷寒熱症誤用姜桂熱藥助起火邪痰火相搏而為呃者宜用黃連解毒白虎湯及竹瀝之類○大凡食呃便祕者大承氣下之便軟者瀉心湯主之○又病虛者見此症最危○心法云欬逆有痰有氣虛有陰火服

視其有餘不足治之其詳在格致餘論不足者參白虎下大補丸○有餘并有痰者吐之人參蘆之類○痰碍氣而吃逆者用蜜水吐此乃燥痰不能出○痰者以陳皮半夏○氣虛人參白朮○陰火黃連黃柏滑石○欬逆自痢者活石甘草炒黃柏白芍藥人參白朮陳皮加竹瀝服

戴元禮云欬逆因痰與熱及胃火者極多
橘皮竹茹湯 胃熱多渴噦逆不進飲食

赤茯苓

陳皮

枇杷葉

麥門冬

竹茹

半夏

各二錢

甘草

炙人參一錢

分二服每服

姜七片水煎

一方只用人參陳皮甘草竹茹

小柴胡湯

加姜三片柿蒂三枚輕服治同上

橘皮乾姜湯

胃寒欬逆

陳皮

通草

乾姜

桂心

人參

甘草各等

分水煎

丁香柿蒂散

病後胃中虛寒欬逆至八九聲相連收氣不圓者難治

人參 茯苓 陳皮 半夏 良姜

炒丁香

柿蒂各一
生姜半兩
甘草五錢

水煎服調蘇合

香丸服尤妙一方只用良姜丁香柿蒂甘草

四味水煎服

柿蒂湯

胃滿欬逆不止

柿蒂 丁香各三

一方加人參姜五片水煎服

皂莢半夏湯

治欬逆欲死

半夏

各二錢

皂莢八錢去皮

為末

煉蜜丸梧子大

每三丸東湯吞日三服夜一服

卷活附子湯 吐痢後胃寒欬逆

羌活

附子

炮去皮臍

茴香

炒多半兩

乾姜

炮

丁香

各一兩 每二三錢水一鍾鹽少許煎七分服

灸欬逆法

乳下一指許與乳相直骨間陷處婦人

三壯男左女右只灸一處火至則瘥不瘥即無病偶然致範此緣逆氣而生宜小半夏茯苓湯加枳實半夏湯或用煎湯泡蘿蔔子研取汁調木香調氣散乘熱服逆氣用之佳

人參白朮湯

人參

黃芩

柴胡

乾姜

甘草炙

梔子仁

各五錢

白朮

防風

半夏

炮

五味子

每服

五六錢加姜五片水煎服

宣明桂苓白朮散 消痰止欬逆散痞塞開堅結痛悶進飲食和臟腑

乾生姜

官桂

各二錢

茯苓

半夏

各一兩

白朮

橘紅

澤鴻

各五錢

右朱麵糊丸

小豆大

姜湯

下

三十丸日三服一方加黃連半兩黃柏二兩

水丸効尤速

○意門 俗作喫氣

靈樞曰寒氣客于胃厥逆從下上散復出于胃故為噫又曰心為噫胃為噦釋之者曰神不守心故嘔胃精內竭故噦傷寒書上焦不至其部故為噫中焦不至其部故為噦仲之曰上焦竭善噫以上焦受中焦氣中焦不和不能消穀故令噫又曰緩者胃氣有餘噫而呑酸此言有餘者謂胃中有穀物未消故使噫而呑酸由此觀之

一由于胃寒一由于胃有宿食然亦有胃火衝逆而致者也有陰虛火因上炎而致者難以槩論也治法寒者溫之熱者涼之中焦未和者則消導以通之至于病久虛憊而噫則為神不守心而為死症矣

噫與欬逆不同噫乃中氣欬逆則為氣逆治法胃寒亦宜橘皮乾姜湯胃熱宜橘皮竹茹湯中焦未和而熱壅鬱或以調胃承氣下之或以加減平胃散以消之陰虛宜以四物湯或芎歸湯

加知母、甘草以滋之。

靈樞註云：噫，象火，隨煩出心，不受邪，故噫出之。宣甘草瀉心湯，以生姜易乾姜，若有微熱時，噫者，小柴胡湯。

二陽一陰發病，主驚駭背痛，善噫火也。

仲景旋覆代赭湯治痞而噫。

本事方枳殼散心下蓄積痞悶，或作痛，多噫敗

卯氣

枳殼

白朮

各五錢

香附

一錢

檳榔

二錢

為末，每二錢，水飲，調下日三服。

丹溪云：噫氣胃中有痰有火。

又云：曾治宣州一人，氣上築心膈，噫氣脈之右，關短弱，左關尺洪長而大數，此肝有熱，宜瀉肝補脾。青皮一錢，白朮二錢，木通二錢，甘草二分，水煎，下保和丸十五粒，抑青丸二十粒，清胃中痰火，鬱熱，嗳氣。

南星製半夏各一錢，石膏一錢，香附各一錢，山梔子一錢，每八錢水煎服。

○下氣門

下氣屬心虛經云夏脉者心也心脉不及下為氣泄者是也

河間云腸胃鬱結穀氣內發而不宣通于腸胃之外故善噫而或下氣也

診論云頭痛癆瘍若氣下泄不止者必死此真氣竭絕腸胃腠理閉塞穀氣不能宣通于腸胃之外故從腸胃中泄出也

○漏氣走哺門

病者身背皆熱肘臂掣痛其氣不續膈間厭悶食

入則先吐而後下名曰漏氣此由上焦傷風開其腠理經氣失道邪氣內著麥冬湯主之

麥門冬 生蘆根 竹茹 白朮 人參 芡

草 茯苓 陳皮 蕤蕤

走哺病者下焦實熱太小便不通氣逆不續嘔逆不禁名走哺入參湯主之

入參湯即前方加知母石膏黃芩

○嘈雜門

生生子曰內經云胃為水穀之海無物不受矣失

溫熱鬱滯不喜食者宜三補丸加蒼朮倍香附
蔣氏云心嘈索食白朮黃連陳皮作丸白湯下
七八十丸數服而愈要在臨症加減

脉法

右寸脉緊而滑兩寸弦滑胸中有留飲寸脉
橫者膈上有橫積也右關弦急甚者為木乘
土位欲作胃反難治

曹雜亦有中氣不足者以六君子湯加竹茹黃連
三補丸

濕麵魚腥水果生冷以及烹飪粘滑難化等物
恣食無節脾氣受傷失其健運之常清痰稠飲
由此而生曹雜由此而作也夫曹雜之為症似
飢不飢似痛不痛而有懊惓不自寧之態是也
或兼嘔氣痞滿惡心漸至胃脘作痛數者多挾
瘀火故丹溪云嘈雜是痰因火動治法宜以南
星半夏橘紅之類以消其痰苓連知母石膏梔
子之類以降其火蒼朮白朮芍藥之類以健脾
行湿又食鬱者梔子姜炒黃連山楂之類又有

黃芩

黃連

黃柏等

蒸餅糊丸服

三聖丸

白术

四兩

黃連

四錢

陳皮

一兩

神曲

糊丸

姜湯

下

右關脉沉曵雜

痰火

二陳湯加藿香

若吐而有

物有声者

加砂仁

有声無物加姜炒黃連

○眩暉門

丹溪曰眩言其黑暉言其轉

林氏曰眩者玄也謂忽然眼見黑花昏亂以頭方定暉者運也謂頭目若坐舟車而旋轉運也甚

有至于卒倒而不知者

○丹溪又曰此症屬痰者多蓋無痰不能作眩雖因于風亦必有痰痰在上火在下火炎上而動其痰則作眩也治宜二陳湯加黃芩蒼朮羌活換氣虛者亦治痰為主兼補氣降火如東垣白朮半夏天麻湯之類傷溫者降溫湯加川芎芍藥數熱多脉澁有死血右脉實有痰積脉大久病眩運不可當者以太黃酒炒為末茶湯調下甚効○戴云有因虛致暉雖暉然醒時面常欲得

熱手按之蓋頭者乃諸陽之會陽氣不足故耳
有頭眩而耳中常鳴頭上如鳥雀啾啾之聲切
不可全謂耳鳴為虛此頭腦挾風所為也○原
病式曰諸風掉眩皆屬肝木風主動故也所謂
風氣甚而頭目眩暉者由金虛不能制木而復
生火風火皆屬陽陽主動兩動相搏則為之旋
轉也成無己曰傷寒頭暉與眩冒者皆發汗吐
下後所致由陽虛也○嚴用和曰眩暉之症經
雖云皆屬於肝風上攻然體虛之人外感六淫

內傷七情皆能眩暉當以脉証別之風則脉浮
有汗項強不仁寒則脉繁無汗筋挛掣痛暑則
脉虛煩悶濕則脉沉重則吐逆及其七情所感
遂使臟氣不平鬱而生癥結而為飲隨氣上逆
令人眩暉眉稜骨痛眼不可開寸脉多沉此為
真耳若疲勞過度下虛上實金瘡吐衄便利及
婦人崩傷產後去血過多皆令人眩暉當隨其
因治之○張子和曰頭風眩暉手足麻痺胃脘
發痛皆風寒暑溫之氣雜至合而為痺也在上

為之停飲可用獨聖散吐之吐後服清上辛涼之藥○劉宗厚曰眩暉一証人皆稱為上盛虛所致而不明言其所以然之故所謂虛者血與氣也所謂實者痰涎風火也原病之由有氣虛者乃清氣不能上升或多汗亡陽當升陽補氣有血虛者乃因亡血過多陽無所附當益陰補血此皆不足之症也有因痰涎鬱遏者宜導痰開鬱重則吐下有因風火所動者宜清上降火又外感而得者嚴氏雖分四氣之異此當

散邪為主此皆有餘之症也世所謂氣不歸元而用丹藥鎮墜沉香降氣之法蓋香竄散氣丹藥助火其不歸之氣豈能因此而復耶內經所謂治病必求其本氣之不歸求其本而用藥則善矣○林氏曰淫慾過度腎家不能納氣歸元使清氣逆奔而上此眩暉出于氣虛也吐衄崩漏肝家不能收攝榮氣使諸血失道妄行此眩暉生于血虛也氣虛者宜益氣補腎湯血虛者宜補肝養榮湯若專用溫熱鎮墜丹藥多致飛

越之元其害有不可勝言者矣

生生子曰按劉林二公慎丹劑戒燥熱俱為保全水二臟真陰而言也未之有餘則挾火勢而侮肺金金受火侮津液枯燥降令不行生化之源絕矣况斲喪枯燥之腎曷能為其母復仇耶由是假藥餌以相濟也既知其腎虛不能納氣歸元矣寧復更以燥熱傷其母可乎都緣滯于溫補下元之說不體認夫真陰真陽之虛實以故相循習俗而為流弊也凡物各有屬也肺出氣

腎納氣今氣不歸元是腎之真陰不足當益腎陰以全其職可也腎雖屬陰臟而用藥亦自有氣血之分焉氣虛則用補膏脂杜仲菟絲子之類如安腎丸之謂也君血虛則以山藥山茱萸熟地黃之類如六味地黃丸之謂也氣是無形者至清所以能走空竅而施精明非有形之丹石所能鎮墜二公辨之允矣或曰經云形不足者溫之以氣精不足者補之以味吾子以溫補為謬可乎予曰前人已註之矣溫是溫存之溫

非專指溫暖之藥而言也。味是味之厚者，乃陰中之至陰本平。天造非偏厚出于人為之味也。是皆不以溫熱為補明矣。前証若果屬腎虛，本旺，火亢，金衰，則當從東方實，西方虛，南方補，北方之治，則其氣自平而無偏倚之患也矣。眩暉，丁証前賢著述，病因方藥，可謂周且備矣。原其著述，各有所發明也。劉河間之肝木兼于風火之化，成無己之傷寒引汗吐下後之虛嚴，用和之四氣七情，張子和之停飲吐法，朱丹溪之

痰火溫熱氣虛，血虛死血，冬病戴氏之陽虛，劉宗厚林億公之陰虛，戒溫熱香竄之丹劑，各剖其衷，製方立論，誠後學之寶鑑。丁展視之毫髮畢覩，原其設意，蓋以人之司命為重，故不以研心為勞也。庸是窮究精微，不為成說所縛，補前人所未盡，開來學之蒙蔽，得非仁人之心其心歟？今之醫者，每每檢方治疾，至于經旨病機，全不致究，甚至有得一僥倖之方，就以足為世世傳家，至寶不妄泄，人噫何其鄙哉！方前諸君子

咄心露膽者為何如人耶聖人未嘗以聖自期也蓋以其有公天下之心立德不衰而後人稱之也賢人未嘗以賢自待也蓋以其有同天下之志繼聖不怠而後人誦之也後之視今亦猶今之視古也學者能不以聖賢之心為心焉

鈎藤散 肝厥頭暉清目

鈎藤 陳皮 半夏 大麥冬 茯苓 石膏
人參 甘菊 防風各五錢 甘草一錢半
每服四錢姜七片水煎溫服

肝厥狀如癇疾不醒嘔吐醒後頭虛暉發熱
麻黃 鈎藤取皮 石膏 乾姜 半夏曲
柴胡 甘草 枳殼 甘菊
每四錢姜三片東一枚水煎溫服

婦人患頭風眩者十居其半每發必掉眩如在車上蓋因血虛肝有風熱故耳余嘗取此方以授人比他藥捷而効速名曰芎窮散

川芎兩 川歸三 羌活 旋復花 蔓荆子
細辛 石膏 藥本 荆芥穗 半夏曲炒

防風 熟地 甘草各半

每五錢姜三片水煎溫服

天麻半夏湯 風痰內作胸膈不利頭旋眼黑兀
兀欲吐上熱下寒不得安卧

天麻 半夏各一橘紅 柴胡各七酒芩

前胡

甘草炙 白茯苓各五

黃連分

姜三片水煎食後溫服忌生冷酒麵
益氣補腎湯 滋慾過度腎家不能納氣歸元使
諸氣逆奔而上此眩暉出于氣虛也

人參 黃芪蜜炙各一白朮二山藥 山茱
萸各一白茯苓一錢 分五東二枚水煎服
補肝養榮湯 咳衄崩漏肝家不能收攝榮氣使
諸血失道妄行此眩暉生于血虛也

當歸 川芎各二芍藥熟地 陳皮各一

芍菊一錢 甘草分一水煎食前服若腎虛氣不

降者去菊花入前補腎湯

清眩化痰湯 痰火上攻作眩及氣不降胸滿者

川芎 酒芩各一 天麻一錢半夏二錢泡白茯苓

橘紅各一錢 桔梗 枳殼各一甘草四分

痰結眩暉甚者加南星旋覆花各一錢六全湯 風虛頭暉及血虛或去血過多

當歸

川芎錢二白芍藥 熟地錢半秦艽錢

卷活丸

水煎食遠服

川芎散 労倦後身體發熱眩暉神魂不安

山茱萸

兩一

山藥 甘菊花 人參 茯神

小川芎

兩各半

右末每服二錢酒調下

安腎丸

腎虛頭眩牙齒疼痛腰痛

破故紙炒 胡芦巴炒 茵香炒 川練炒 繢斷
桃仁炒 杏仁炒 各一
右末蜜丸梧子大空心益湯下五十丸

六味地黃丸

見虛損門

加味參夏湯 七情相午眩暉欲倒者

人參

半夏兩半

肉桂一

甘草錢五

乳香錢三

每五錢姜五片水煎服 又治七情之氣鬱於心腹痛不可忍脉沉遲一服立効

枯礬散

治瘧暉

枯礬為末，姜湯調下，一劑立愈。

清上丸 安神治癆，大眩暈。

石菖蒲 酸枣仁 膽星 茯苓 黃連 半

夏 神曲 橘紅各一錢

茶胡半錢

木香各五分

竹瀝打糊為丸，食後茶下。

錢五分

○瘡門

瘡者邪入陰部也。經云邪搏陰則歎瘡，然有二症：一曰毒瘡，乃中風舌不轉運之類是也；二曰喉

瘡，乃勞數失音之類是也。蓋毒瘡但舌本不能轉運言語，而咽喉音声則如故也；嘔瘡但喉中聲嘶，而舌本則能轉運言語也。

痰涎乘虛閉塞舌本之脉道，令人瘡。

舟溪謂一人年三十五，連日勞倦，發敏發瘡，醫與瘡藥三錢，後變為發熱，舌短，言語不辯，喉間痰吼，有聲脉洪數似滑，遂以獨參湯加竹瀝兩甜殼許，兩服後，吐膠痰三塊，舌本正而言可辯，餘症未退，遂煎人參黃芪湯服半月而諸症皆

周易卷五
退粥食調補兩月方能起

丁中年舌短，言語不辨。始傷寒，身熱，師與傷寒藥，五帖後變神，而瘡遂作。體虛，有痰，治以人參五錢，黃芪當歸白朮陳皮各一錢，煎湯入竹瀝姜汁飲之。十二日，其舌始能語，得一字，又服之半月，舌漸能轉運，言語熟除而痊。

足少陰脉挾舌本，足太陰之脉連舌本，手少陰別繫舌本。若此三脉虛則痿，涎乘虛而閉塞其脉道，故舌不能轉運，言語也。若此三脉亡血，則舌

無血營養而瘡。經云：刺舌下中脉，大過血出不止，為瘡。治當補氣血。

一男，字年五十餘，嗜酒，吐血，桶許，後不食。舌不能語，但渴，飲水，脉畧數，與四物各一兩，參朮各二兩，陳皮一兩半，甘草二錢，入竹瀝童便姜汁，至二十餘帖，乃能言。凡此三脉風熱中之，則其脉弛縱，故舌亦弛縱，不能轉運而瘡。風寒客之，則其脉縮急，故舌強，舌卷而瘡。治在中風，半身不

求之也

脉要精微篇岐伯謂心脉搏堅而長當病舌轉不能言

丹溪治俞繼道遺精誤服參芪及升浮劑遂氣壅于上焦而音聲不出用童便浸香附為末調服而竦通上焦以治瘡又用蛤粉青黛為君黃柏知母香附佐之為丸而填補下焦以治遺十餘日良愈本草云童便主久嗽失音故治瘡多用之由其能降火故也

出音声方

訶子炮去核木通各一兩甘草半兩用水三升煎一升半入生姜地黃汁一合再煎數沸放溫分六服食後日三服訶子治逆氣破結氣利水通利九竅發肺癰甚當

訶子湯 治失音不能言語

訶子四兩半生半炮桔梗一兩半生甘草二寸半灸半生右末每服二錢童便一盞水一盞煎至七沸溫服甚者不過三服愈桔梗通利肺氣童便降火

又方 桔梗三兩 大訶子四箇 甘草二兩 每服

三四錢水煎入砂糖一小塊不入童便時時細呷一日服盡其効甚速

發声散 治咽喉語声不出

桔萎皮

白姜蚕頭

甘草

俱炒黃等分為

末每溫酒調下三錢或生姜自然汁調下用五分綿裹噙化咽津亦可日二三十次不拘時

肘後方 咽喉卒失音不出

陳皮五兩

水三升煮取一升頓服

玉粉丸 冬月寒痰結在咽喉語声不出

半夏炮五錢

草烏炒二分

桂半分

為末生姜汁浸

餅糊為丸雞豆大

每夜噙化一丸多年不

愈皆効

黃帝針經中說寒氣客于會厭卒

然而亞此藥主之

蛤蚧丸治肺間邪氣胸中積血作痛失音并治冬

欬朱音

蛤蚧

膜刮去嘴足溫水浸去

阿膠炒

生地

麥門冬

甘草

各五錢

為末蜜丸東子大每食後噙化一丸

千金方 暴失音語声不出

杏仁泥 姜汁 砂糖 白蜜各一 五味子

紫苑

各三两

通草

貝母各四两

桑白皮

五两

右水九升煮五味紫苑通草貝母桑皮取三升去渣納杏仁泥姜汁蜜糖微火攬煎取四升初服三合日再服一合後稍加

通声膏

五味子

欵冬花

通草各三

人參

石菖蒲

細辛

桂心

竹茹各二两

杏仁升

白蜜

東膏

姜汁一升

酥五升

水五升微火煎三上三下去渣納姜汁東膏
酥蜜煎令調和酒服如枣大二丸

丹溪治咳嗽声嘶者此血虛受熱也用青代蛤粉
蜜調服之

濟世方 治失音及咯血

槐花瓦上炒香出火毒三更後床上仰卧隨意
吞之

又方 治卒啞

杏仁去皮尖桂分研如泥和取杏核太綿裹

卷之三
三十六
含細細呷之日五夜三

舟溪治朱音以桂末著舌下，嚥津妙于金斗門食內侍曹都使新造宅落成入居半月飲酒大醉卧起失音不能語召孫至診曰因新宅故得此疾耳半月嘔愈但服補心氣薯蕷丸治溫用川芎細辛又十日其病漸減二十日全愈曹既安見上問誰治曰孫兆郎中上乃召問曰曹何疾也對曰凡新宅壁上皆濕地亦陰多入乍來陰氣未散曹心氣素虛飲酒至醉毛竅皆開陰湿之

氣乘虛而客心經所以不能語臣先用薯蕷丸使心氣壯熱然後以川芎細辛去其濕所證也能靈樞經黃帝問于少師曰人之卒然憂恚而言者晉者何道之塞何氣出行使音不彰願聞其方少師曰咽喉者水穀之道路也喉嚨者氣之所以上下者也會厭者声之戶也口唇者音聲之竊也頑頽者分氣之所泄也橫骨者神氣所使主發舌者也故人之鼻洞涕出不收者頑頽不開

分氣失也。是故厭小而疾薄，則發氣疾其開闔，利其出氣易其厭大而厚，則開闔難其氣出遲，故重言也。入卒然無音者，寒氣客于厭，不能發，不能下至其開闔，不至故無音。黃帝曰：刺之柰何？岐伯曰：足之少陰上繫于舌絡，于橫骨終于會厭，兩瀉其血脈，濁氣乃辟。會厭之脉上絡任脈，取之天突，其厭乃發也。

○胎前產後瘡

素問黃帝曰：人有重身九月而瘡，此為何也？岐伯

曰：胞之絡脉絕也。帝曰：何以言之？岐伯曰：胞絡者繫于腎，少陰之脉貫腎係舌本，故不能言。帝曰：治之奈何？岐伯曰：無治也。當十月復。

郭氏論：產後不語者何？答曰：人身有七孔三毛，產後虛弱多致停積敗血，閉于心竅，神志不能明了，心氣通于舌，心氣閉塞，則舌亦強矣，故令不語。但服七珍散。

七珍散：產後敗血閉塞，心竅，令人不語。
人參 石菖蒲 生地 川芎 酸一細辛

防風 辰砂 半兩 另研各為末 每服一錢 薄荷湯調

胡氏孤鳳丹 產後閉口不語

白芷研末，每半錢熱水調服

○痘門

夫痘者謂濕與熱鬱蒸于脾而目肢體為之發黃是也。痘之名有五：一曰黃汙者身體俱腫，汗出不渴，其汗能染衣黃如蘋汁，此由脾胃有熱汗出，為風所閉，熱結于中，其汗黃也；二曰黃癟，食已即飢，遍身俱黃，但欲卧，小便澁黃，增寒壯熱。

此酒麵燙炙蘊熟，瘀滯而得也；三曰穀癟，食畢即頭眩，心中怫鬱，不安，遍身發黃，此脾胃有熱，因大飢過食，有傷胃氣所致也；四曰酒痘，身目俱黃，心中懊痛，足胫滿，小便黃，面糞赤班，此由飢中飲酒，大醉當風，入水所致也；五曰女勞痘，大勞淫慾，太熱交接，袒席未幾，遽就浴室，以致瘀熱惡寒，小腹滿急，而身目俱黃也。五者之証雖不同，而其為黃則一也。察其所自，未有不由濕熱而致者也。濕也，熱也，而豈無輕重之別乎？

濕氣勝則如薰黃而晦，熱氣勝則如橘黃而明。蓋脾主肌肉土色本黃，濕熱內蒸或重或輕，自然見于外矣。自其濕熱瘀而傷血，此又為血瘀發黃。何以明之？痘瘡之黃，小便不利，血症之黃，小便自利。夫脾受濕熱，鬱而不行，亦多有腹脹之疾。治法大要，鍊導濕熱于大小便之中。如茵陳五苓、黃連三黃之劑，皆要藥也。然又單陽無陰，病熱已極，而不渴，猶為可療。瘡而復渴，加之腹脹，則為難治矣。甚者寸口無脈，鼻出冷氣。

與夫形如烟薰，搖頭直視，為心絕環口，黧黑，蒸汗發黃，為脾絕離。雖遇蘆扁亦將不救，孰謂黑瘡其可療乎？

加減五苓散 飲食伏暑鬱發，為瘡，煩渴引飲，小便不利。
茵陳 猪苓 白朮 赤茯苓 澤鴻各二
水煎，食前服。一方有桂心七分。

葛根荳豉湯 治酒疸。

葛根一錢 山梔仁 枳實嫩 荻豉各二
炙甘草一錢 水煎服。

秦艽飲子 五疸口乾發熱微寒

秦艽 當歸 茯苓 陳皮 小草 川芎 半夏 甘草 各一錢 加姜五片水煎服

山茵陳湯 痘症發熱太小便秘澁

山茵陳 桔子 赤茯苓 枳實各半錢
甘草各一錢 姜二十片水煎服

加味四君子湯 治色痘

人參 白术 茯苓 白芍藥 黃芪 各白扁

豆炒各二錢 甘草錢一姜五片東二枚水煎服

茵陳湯

時行癥熱在裏鬱蒸不散通身發黃

茵陳一兩 桔子仁半錢 大黃三錢

水煎服

當歸白术湯

酒疸發黃心胸堅滿不進飲食小

便黃赤脉弦濶

當歸 黃芩 茵陳

甘草

一錢各

白术錢二

半夏

杏仁皮去

枳實炒

前胡錢半

茯苓錢二

姜三片水煎服

白术湯

酒疸因下後變為黑疽目青面黑心下如咬蒜鑿狀大便黑皮膚不仁脈微而數

赤水經保

十八

里

白术

桂心

錢各二

枳實

荳蔻

葛根

杏仁

炒去皮尖

甘草

炙各一錢

水煎服

桂枝加黃芪湯

黃汗身腫，汗出已輒輕，久必

身潤，胸中痛，腰已下無汗，其腰弛痛，如有物在

皮中，劇者不能飲食，煩躁，小便不利。

桂枝錢 茯苓錢 甘草錢 一 黃芪錢

姜五片 杏

三枚水煎服，忌生冷。

茵陳散 黃疸食已即飢，身體面目水甲，牙齒及小便悉黃，寒熱，身體多赤多青，皆由酒食過

度為風濕所搏，熱氣鬱蒸而成。

茵陳

木通

大黃

炒梔子各一

石膏

兩

爪姜

甘草

炙半

每五錢

姜五片葱白一莖，煎至

八分

服太小

便祕加

枳實赤茯苓草莖

又有傷寒，瘀血不解，鬱于表，發為黃疸，其脉浮緊

當以汗解，獨煎麻黃湯飲之。

黃芩湯

黃汗身膚腫，發熱，不渴，汗出，染衣黃色

黃芪

炙各一錢

赤芍

茵陳

兩各二

石膏

四錢

豆豉

各兩

甘草

炙半兩

竹葉

十四片

姜三片水煎服

滑石散 治女勞疸

枯礬五錢 滑石半兩 為細末。每二錢用大麥粥湯調服。以小便出黃水為度。

噙藥爪蒂散 黃疸遍身如金色。累効。

爪蒂錢 母丁香錢 杵米四十粒 赤小豆五分

為末。每夜以少許吹兩鼻內。隨入便睡。明日

取下黃水次服黃連散。

黃連散

黃疸大小便秘。臟腑壅熱。

黃連

大黃

醋炒各二

黃芩

甘草一錢

每服二錢白湯。下日三

犀角散

發黃心膈煩躁目赤痛。

犀角屑

黃芩

梔子仁

升麻

各二

茵陳

朴硝各二

每五錢竹葉七片水煎服。

紫金丸

脾胃食積結塊。令人四肢怠惰。身面俱

黃

肚腹膨脹。俗名黃胖病。此藥能理脾胃消積。

聚退黃去脹進飲食。

針砂

銀鍋內赤色研紫金皮

酒浸香附

炒京三稜

煨

蒼朮

米泔

炒陳皮

厚朴

砂仁

各二

麵糊丸梧子大每三十丸白湯下或酒或川
椒湯亦可忌牛肉沙魚等物

大溫中丸

食積黃腫病

蒼术 厚朴 陳皮 三稜 蓬术 青皮 各五錢

香附一斤 甘草二兩

針砂 醋炒紅三兩

醋糊丸梧子大每五十丸空心姜湯下午後

益湯下臨卧酒下

金黃丸 食積酒積諸積面黃積塊堅硬痘症

京三稜

黑丑

各二錢

巴豆四十九粒

去油為末

黍米粉

香附各半兩澤瀉半錢 為末梔子煎湯和丸裝
豆大每三五丸食遠白湯下

穀疽丸

專治穀疽

苦參三兩龍膽草一兩牛膽兩

為末以膽汁入少煉蜜丸梧子大每五十丸
空心滾水或生姜甘草煎湯下

治黃疽効方

生蘿蔔子焙為末白湯調下日三服每用二錢

○厥證門

冬則陰氣盛而陽氣衰，人質壯，秋冬多慾而奪其精，則陽氣日衰，不能滲榮其經絡，陰氣獨在邪氣因從之而上，故手足為之寒也。熱厥何如，而然酒氣盛而標俾酒入于胃，則絡脉滿而經脈虛，脾主為胃，行其津液者也。陰氣虛則陽氣入而胃不知，胃不知則精氣竭而不榮其四肢，此人數醉，若飽以入房，氣聚于脾中，不得散，酒氣與穀氣相搏，熱盛于中，故腎氣日衰，陽氣獨勝，熱遍于身內，而溺赤，手足為之熱也。此

脉沉微而不數謂之寒厥，沉伏而數謂之熱厥。內經曰：厥之寒熱者何也？陽氣衰于下則為寒厥，陰氣衰于下則為熱厥。熱厥之為熱必起于足，者陽氣起于足，五指之表陰脉集于足下而聚于足心，故陽氣勝則足下熱也。寒厥之為寒必從五指而上于膝者，陰氣起于足五指之裏，集于膝下而聚于膝上，故陰氣勝則從五指至膝上寒也。寒厥何如？而然前陰者宗筋之所聚，太陰陽明之所合也。春夏則陽氣多而陰氣少，秋冬則陰氣多而陽氣少。

內經論寒厥為手足寒，熱厥為手足熱，不專以厥為手足冷矣。故以六經厥狀言之。太陽之厥，腫首頭重，足不能行。發為煦陽明之厥，癲疾走呼，腹滿不得卧，面赤而熱。妄見妄言少陽之厥，頰腫而熱，暴龍脣痛，脈不可以運太陰之厥，腹滿，脹後不利，不欲食。食則嘔，不得卧少陰之厥，口乾渴，赤腹滿心痛，厥陰之厥，少腹腫痛，腹脹洩不利，好卧屈膝，陰囊腫，脈內熱。此分六經之厥，亦不出寒熱二證。劉宗厚謂陽證至為煦。

仆為癲疾，為妄見，陰證至為脹，脹太小便不利，或嘔，或心痛之類，皆素多痰氣，因虛所乘之為病。陳無擇謂攷其所因，多以不勝乘其所勝氣，不得行，遂致厥逆。如腎移寒于脾，則水乘干土，水既不行，乃成寒厥。如心移熱于腎，則火乘干水，火既不行，乃成熱厥。六經皆然，可次第論也。再考張仲景傷寒論陰陽二厥之證，則皆指手足逆冷而言，不以陽厥為手足熱也。原病式謂陰厥者，原病脉候皆為陰證，身涼不渴，脉遲而

微陽厥者原病脉候皆為陽證煩渴譖語身熱脉數若陽厥極深或失下變為身冷脉微欲絕反見陰證者正為熱極而然若悞作陰證而用熱藥治之必死王安道云熱極而成厥逆者陽極似陰也寒極而成厥逆者獨陰無陽也陽極似陰用寒藥獨陰無陽用熱藥今詳內經所論寒熱二厥由腎之精氣內竭而成乃常病虛損之證寒厥當補陽熱厥當補陰王冰所謂益火之原以消陰翳壯水之主以鎮陽光是也若仲

景河間安道所論厥證乃傷寒傳变手足厥冷者病情不同治法亦異診察之間生死反掌医者當詳究焉

按傷寒陽厥者先自三陽氣分感寒起于頭痛發熱惡寒後傳入三陰血分變出四肢厥冷大便燥實譖語煩渴揚手擲足不惡寒反怕熱脉沉有力等証此因大實失下使血氣壅閉不通故手足厥冷其手冷上不過肘足冷上不過膝或有時而乍溫是外雖厥冷內實熱邪耳如火燥

金熱極則金反化水所謂亢則害其物承乃制其極也厥微者熱微四逆散厥深者熱深太承氣湯若悞作寒証而投熱藥是抱薪救火矣傷寒陰厥者是因三陰血分自受寒邪初病無身熱頭痛就便惡寒四肢冷過肘膝引衣捲卧或腹痛呴利小便清白或戰慄面如刀刮口吐涎沫脉沉遲無力此陰証也又有病自三陽傳入三陰久而變寒者亦陰厥也輕者理中湯甚者四逆湯且夫人之手足乃胃土之末亢脾胃有

熱手足必熱有寒手足必寒此理之常至于亢極反成兼化此又病形之變也故亢厥無脉可診未辨其為陰陽者且與理中丸加甘草一倍試之若陽厥便當見出熱証陰厥則無熱証矣此法記之

注子良內外厥論曰素問云盛則鴻之虛則補之不盛不虛以經取之靈樞引此以言人迎寸口經刺之法難經引此以言子母本經補鴻之方而王氏真邪相持之註尤別夫聖人之言所該

自廣固可推而無不通然此段屬之六經厥狀病能之下而意實兼承上文寒熱之厥而著其所以治之之法故盛則渴言厥也虛則補之言寒厥也皆主內傷不虛以經取之言六經厥狀此主外感按經有言熱為有餘寒為不足寒熱感裏之別久矣而人之一身臟腑咽喉之類屬內經脉四肢皮膚頭項之類屬外故內傷之治在臟腑外感之治在經絡不可紊也觀上文云熱厥之故因酒入內氣薄于脾胃酒氣慄

慄腎氣獨衰陽氣獨盛故手足為之熱矣陽挾酒毒鬱而為熱非盛而何故其治當瀉陽氣之有餘也又觀上文云寒厥之故因秋冬勞傷脾胃陽虛不能參營其經絡陽氣獨損陰氣獨存故手足為之寒也陽為陰搏瘤而為寒非虛而何故其治當補陽氣之不足也此二治者皆主內傷也非因內傷則臟腑之內無盛虛之分再外感邪氣客于經脉之間須審兼某經之証則取其經隨病盛衰而施補瀉也如腫首頭重足

不能行發為駒仆者取之太陽如脅急寒心痛
引腹者取之太陰之類是知此則聖言各有所
指而意亦可以觸類而通矣

有入胃犯不正之氣忽然手足逆冷肌膚栗起頭
面青黑精神不守牙緊口噤昏不知人頭旋暉
倒者此不廢也凡半死間喪入廟登塚飛尸鬼
擊多有此病急以蘇合香丸灌之候稍甦省以
調氣散合平胃散治之名調氣和胃散二法急
用姜汁半盞酒半盞煎沸灌之灸百會四十九

壯氣海丹田二三百壯竄體暖即止後以陰毒
法治之此臟氣虛寒之証也世俗不識多作中
風而治鮮不斃矣靈樞云邪客于手足少陰太
陰足陽明之絡此五絡皆會于耳中上絡耳角
若臟氣相刑或外邪相忤則氣遏不行五絡俱
絕諸脉伏匿令人身脉皆動而形無所知其狀
若尸故名尸厥昔扁鵲治虢太子之尸厥針三
陽五會而愈正此謂也

有人七情內傷卒然氣逆身冷僵仆牙關緊急瘡

延潮壅昏不知人者此氣厥也凡忿怒太甚多有此病勿悞作中風而用躁風散之藥急以蘇合香丸灌之候省以八味順氣散或木香調氣散調降其氣自然平復有痰者以四七湯加南星木香治之然暴厥不知人有不治自愈者昔宋仁宗最寵貴妃一日食次忽仆倒遍身卒冷急召孫尚杜任至奏曰不妨此氣厥耳少頃吐即復甦御坐良久果而甦上問因何而得三人並奏曰貴妃夜食因憂愁氣上與食相併故如

此吐即氣通故復甦也素問云厥或令人腹滿或令人暴不知人或至半日遠至一日乃知人者陰氣盛于上則下虛下虛則腹脹滿陽氣盛于上則下氣重上而邪氣逆逆則腹脹滿陽氣亂則不知人也又云血之與氣并走于上則為大厥厥則暴死氣復反則生不反則死者是也因氣虛而得者其脉細小宜四君子湯加黃芪附子○因血虛而得者脉洪大宜四物湯加酒炒黃柏知母○因氣血兩虛而得者宜十全大

補湯血加附子○有吐衄不知人而厥者此血厥也治之無論其脉急用芎歸養榮湯十全大補湯或獨參湯以救之○厥因飲酒而得者宜二陳湯加黃連梔子乾葛青皮或葛根解醒湯加減治之

有人醉飽之後或感風寒或着惱怒忽然厥逆昏迷口不能言肢不能舉者此食厥也蓋食滯胸中陰陽痞隔升降不通故生此症若悞作中風而用祛風散氣之劑則胃氣重傷死可立待宜

煎姜鹽湯探吐其食後以平胃散加茯苓、白朮麥芽半夏之類調理若有風寒尚在者以藿香正氣散解之氣滯不行者以八味順氣散調之有小兒手足搐搦而發厥者此風厥也宜加減續命湯

五色篇雷公曰人不病而卒死何以知之黃帝曰火氣入于臟腑者不病而卒死矣雷公曰病小愈而卒死者何以知之黃帝曰赤色出兩顴大如拇指者病雖小愈必卒死黑色出于天庭大

如拇指必不病而卒死

○姜附湯

乾姜 炮 附子 水煎涼服

○星香散

南星 錢四 木香 磨五 川烏 錢一 南星 錢二 附子 炮一 姜三片 水煎服

○順元散

木香 磨五 川烏 錢一 南星 錢二 附子 炮一 姜三片 水煎服

○導痰湯

水煎服

○調氣和胃散
南星 半夏 枳實 橘紅 赤茯苓 甘草
失姜三片 水煎服

○調氣和胃散

白豆蔻 木香 丁香 檀香 麝香葉
砂仁 甘草 蒼朮 厚朴 陳皮 水煎服
八味順氣散
白术 茯苓 青皮 陳皮 人參 白芷
烏藥 甘草 水煎服
木香調氣散

木香

藿香

丁香

檀香

白芷

砂仁

甘草

為末沸湯入鹽少許煎服二錢

○芎歸養榮湯

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

黃柏

知母

人參

枸杞子

麥門冬

甘草

水煎服

加減續命湯

防風

防已

人參

黃芩

白芍藥

川芎

甘草

炙麻黃

杏仁

桂枝

附子炮

生姜

水煎服

右方

去太陽無汗去桂枝附子有汗

如母有汗加葛根黃芩

加桂根黃芩

去陽明無汗加石膏膏

去汗加桂枝附子有汗

去桂枝附子有汗

去桂枝附子有汗

傷寒病有胃中虛寒，蛔魚攻胃而手足厥冷，口吐清水或吐蛔者，此蛔厥也，宜理中湯加炒川椒、檳榔煎，吞烏梅丸，如不止用烏梅用椒黃柏煎服，蓋蛔見酸則安，見辛則伏，見苦則不敢動也。

烏梅丸

烏梅五十枚

細辛

附子炮

人參

黃柏

桂枝

錢五

乾姜八錢

黃連一錢

當歸三錢

川椒二錢

右末以醋浸烏梅取肉蒸爛杵膏加棟蜜和丸每十五丸食前服

○四逆散

甘草

柴胡

芍藥

枳實

分

為末白湯調服

方寸匕日三服

蘇合香丸

治厥

方見氣門

○論吐法

王海藏曰病有當吐而不可吐者如尺中脉按之有^生力則當吐之若尺中按之無力不可吐也看

方則陽氣下陷于陰中為陰中所遏故吐之使陽氣得上升而復其平也

綱目論病不可吐者有六病勢劇甚老弱氣衰者不可吐吐不止則亡陽血虛者不可吐諸吐血嘔血咯血衄血嗽血血崩失血者皆不可吐病入無正性妄言妄從者不可吐主病者不辨邪正之說不可吐性行剛暴好怒喜淫之人不可吐張子和曰允涌後有頓快者有徐快者有反悶者悶者病未盡也有反熱者不可不下也太抵三

日後無不快者。凡下不止者，以冰水解之。凡藥熱，即行寒，即止。

生生子曰：經云：上部有脉，下部無脉。其人當吐。不能吐者死。王海藏謂：尺脉按之無力，不可吐。非與經背也。經云：下部無脉者，謂病人當其正吐之時，氣脈皆上逆，而下虛。是言病勢脉勢也。若其人不能吐，而脉不至，于人乃腎經之原氣絕矣。故云：下部無脉者死也。海藏謂：尺脉按之無力，不可吐者，是言治法也。凡尺脉有力，則腎間有

原氣當吐。去其邪，則安矣。若尺脉無力，是賁陰已虛，吐則復傷其陽，陰陽俱虛，必致真蹶。故曰：尺脉無力者，不可吐也。經言其病，王言其治也。茶調散一名二仙散。

爪蒂不以多少為細末，每十二錢，薑汁調下服。汁調下空心服。

獨聖散

爪蒂不以多少為細末，每十二錢，薑汁調下服。之腸痛加全蝎，頭痛加蔚金。