續瘍科秘錄

二

特279
469

第千百卅九號

始

東方文化學院東京研究所圖書之印

續瘍科秘錄卷之二

嘉慶十九年五月七日太醫院收貯

目錄

肉瘤
附圖
脂瘤
神經瘤
水脈瘤
附圖
粉瘤
附圖

自庫書藏

76W11093

蚘蟲瘤
包莖翻花瘡
附圖
莖皮硬腫
包莖
小便閉
石淋
附圖
痔漏
喉癬

續瘍科秘錄巻之二

棗軒本間先生口授
下野　川又誠
陸奥　目黒安
門人　越後　稲葉賢　同記
常陸　石塚雄
下總　篠塚節

肉瘤

肉瘤ハ多クハ翻花スルモノニテ年久シキ寸ハ自潰シテ死スルモノナリ世醫妄ニ鍼灸ヲ施シ或ハ腐

藥ヲ點シ乍チ翻花シテ命期ヲ促スヿアリ謹ムベキヿナリ然レ𪜈予カ刀法ヲ以テ瘤根ヲ拔ク片ハ治セスト云ヿナシ其法血瘤ノ截斷ニ準ス今經驗一二件ヲ舉テ治法ヲ示ス

本州眞壁郡海老嶋村ノ民勘五郎年三十七歲頭ノ右鬢ニ小瘤アリ格別ニ醜キヿモナク又邪魔ニモナラヌ故療治スルヿヲ求メス時ニ村醫數慫慂シテ腐藥ヲ貼スルニ僅ニ皮膚ノ糜爛スルノミニテ免角愈ヘ易ケレ𪜈氣長ク貼スルヿ一年餘ニ及テ初テ孔ヲ穿チ小肉突出シテ乳頭ノ如ク堅クシテ色白シ速ニ大ニナリ一升壜子ノ如ク重クシテ五千錢ヲ戴クヤウニ覺ユ神思常ニ爽快ナラス遂ニ產業ヲ廢スルニ至レリ別ノ瘍科ニ請テ之ヲ截斷スルニ瘤ノ重サ六百二十錢有リタリト云フ截斷ノ後一旦癒ヘタレ𪜈復直ニ再發シテ故ノ如クニナレリ遂ニ來テ予カ療治ヲ請フ瘤形及諸證前件ノ如クナレ𪜈大サハ截斷ノ前ヨリモ一倍セリト云フ軟慢ニシテ壓スヘク又撮ムヘシ瘤頂少シク糜爛シテ臭氣アリ試ニ合谷鍼ヲ刺スニ知覺ナシ根蔕ハ淺クシテ固著セス飲食ハ常ノ如ク脈ニモ虛

候ナシ但面色憔悴シテ神思樂マサルノミ時ニ予疝ヲ患ヒ手ヲ下ス一能ハス三兒貞佐及弟子永井玄洞ヲシテ代テ療セシム先ツ麻沸湯ヲ用ヒ「コロンメス」ヲ以テ瘤圍ヲ距ル一五分許ノ處ヨリ刀鋒ヲ骨ニ至ル程ニ深ク入テ截リ廻スニ瘤脫然トシテ墜ツ創痕凹ニシテ杯底ノ如ク逆血枕席ノ間ニ流滴スル一升許還魂紙ヲ採テ石灰ヲ包ミ急ニ創口ヲ壓閉スルニ逆血立トコロニ止メリ還魂紙ヲ四ツニ疊テ石灰ノ上ニ當テ又綿布ヲ疊ミ紙上ヲ覆ヒ其上ヘ繃帶ヲ施シ鹽茶ヲ與ヘ瞑眩ノ醒ルヲ

待テ人參調榮湯ヲ服サシム第三日ニ初テ繃帶ヲ解キ石灰ヲ去リ破敵ヲ綿片ニ攤テ貼スルニ赤肉勃勃トシテ生シ創口速ニ斂リ錢來大ニナリ回春ヲ謝シテ辭シ去ル瘤ヲ秤量スルニ重サ七百八十錢强ナリ之ヲ銅盤ニ盛ルニ斷口髮ヲ帶ヒ殘血尚腥ク其大サ首一級ヲ得ルニ似タリ觀者門前ニ群集シテ堵ノ如シ一豎子之ヲ觀物場ニ出サンヿヲ請フテ金錢ニ募レリ此一事ニテ瘤ノ最大ナルヿヲ想像スヘシ

江戸古川恭藏劍術ヲ以テ業トス額ニ瘤ヲ生シ漸大

ニナリ梨子ノ如クニシテ假面ヲ著ルヿヲ得ス殆ト業ヲ廢スルニ至ル深ク之ヲ憂ヒ都下ノ名工ニ就テ療治ヲ求ルニ多クハ禁鍼ノ處ト爲シテ手ヲ下サス或ハ徒ニ腐藥ヲ貼スルノミニテ遂ニ寸驗ヲ得ス因テ水戸ヘ來リ興野助右衛門ヲ紹介トシテ予カ治ヲ請フ瘤ヲ按スルニ實スレ氏軟ニ瘤根ハ運轉セサレ氏深カラス又合谷鍼ヲ以テ試ニ瘤心ヲ刺スニ脂粉及血瘤等ノ候ナシ是肉瘤ニシテ治スヘキノ證ナリ天庭ハ古ヨリ要處ト爲シテ醫俗共ニ鍼灸ヲモ禁スレ氏止血ノ法ヲ心得テ居レハ

截斷術ヲ施スニ少モ懼ルヽニ足ラス乃患者ヲ仰臥セシメ瘤頭ノ皮ヲ横ニ撮ミ上ケ「ランセツタ」ニテ突キ截リ剪刀ヲ創口ヘ入レ竪ニ上下ヲ剪ミ截ルニ瘤膜微ク露ハル更ニ「コロンメス」ヲ以テ膜ヲ破ラヌヤウニ創口左右ノ瘤ト皮トノ間ヲ徐徐ニ截ルニ瘤頭半ハ出タレ氏固着シテ拔キ難シ又剪刀ニテ創口ヲ左右ヘ截リ十字形トナシ鐵篦ヲ瘤下ヘ入レ骨ヘ著タル處ヲ離シ拔取ルニ瘤狀軟慢ニシテ自ラ扁平ニナリ流動スル物ノヤウニ見ユレ氏流動セス色ハ淡紅ニシテ肉質ナリ肉瘤ノ類

ト為スヘシ創痕ノ骨凹ニナリテ杯底ノ如シ此ハ瘤ニテ多年壓シタルユヱ自然ト窪ミタルナリ胎瘤ノ下ノ骨ノ窪ムト同シ瘤ヲ拔タル跡ハ燒酎温湯ヲ等分ニ合シ寒温適宜ニシテ綿布ヲ漬シ輕ク絞リ殘血ヲ拭ヒ去リテ縫合シ前衝ヲ綿片ヘ攤テ貼シ繃帶等ハ總テ金創ノ治法ヲ用ヒ人參調榮湯ヲ服サシメ二十日餘ニシテ全愈ス沐浴ニ人ハ勿論助右衛門モ亦大ニ欣躍シテ割瘤ノ記一篇ヲ贈レリ今此ニ附ス

割瘤記

偃戈以還至治休明文運盛開百技從精實我東照公之遺澤哉而本藩以　公之芳亂政教風俗卓出諸藩故世稱多偉人傑士焉醫官棗軒本間先生容貌魁梧天資精敏術該内外最工外治名聲藉甚于關東余聞癭瘤乳岩自古稱險證良工哲匠實所難也而先生治之數有神驗先是紀之華岡氏以英邁之資始開活眼於外科之治法無所不備而先生親炙有年稱爲出藍余與　幕府士人古川恭藏有故恭藏慷慨之士也學無念流劒技於齋藤氏致仕以技周遊四方與天下賢豪交其人雖不讀書頗有讜言嚮本藩國難之日

江戸八百街。令嚴不許舍藩人。當是時。倚賴于叅藏者。凡三十餘人。嘗曰。吾毫不懼得罪。而延客者非為貴國而已。斯寃不雪。殆失神州之所以為神州。凡士之臨事。宜有始有終。子等其勉旃。以是藩人亦為奮勵焉。由是觀之。不啻氣象豪强。天資精忠亦可知也。先是叅藏瘤發天庭。駸駸日大。人呼曰一角先生。而不復稱其姓名。一日慷慨謂余曰。令也升平二百餘年。風習日流愉惰。士氣蕩然不復振。而戎狄猖獗日甚。有志之士。瞋目切齒。實報國致命之秋也。而吾令不幸患奇疾。不能自奮。苟如是。不如死也。夫江戸者。衆技之淵海也。就方技名家戸塚伊東二氏以下稱杰出者。請治數矣。皆稱險證不敢下手。唯戸塚氏以為可以漸治。因託之治。然不得全愈。至今十餘年。未免一角之稱。近来日漸長大。誤觸干物。則痛徹通身。以此不能著假面。殆將廢業。都鄙名醫咸既束手。不如自截斷之。誤死無遺憾矣。余咲曰。消息盈虛。天地之數也。奇人必有奇患。奇患必有奇治。是又自然之理也。水城有棗軒先生。天下之名工也。子盍請乎。曰吾亦嘗聞之。然羈旅落魄。不能如之何。余曰。子令分死至此。余豈可坐視其自割乎。余與先生季子子翼交善。請為紹介。叅藏大喜。於是以本月十七日至自

準亭請治曰寒士奇疾進退維谷遥聞高名来歸幸賜回生先生諾之期以翌日午後及期而詣焉門生數十人侍坐病客滿門蔟擁觀之先生先問其来由因手按患處以鍼刺之絶不見血曰是肉瘤而異證者可治也廼使患者仰卧徐徐割之流血淋漓瘤塊大如茄子表尖裏平重三十餘錢而恭藏神色自若也亦關雲長割臂之比哉嗚呼先生之伎術甲于關東者於是益信矣夫三都方技家以江戸為最盛而無一人治之者先生一旦能之然則豈唯甲于關東哉謂之甲于三都而可也夫甲于三都者實甲于天下者也苟有若術何瘻瘤不可截何乳岩不可治大抵世之稱良工者不汲汲于財利者幾希矣今先生視寒士之疾鄭重繾綣終能治其大患而無德色可謂氣宇卓絶不事財利者矣苟不然烏得如此之妙術哉恭藏之劍褐余之簞瓢不能報回生肉骨之恩者先生毫不介意古云醫仁術也先生其體之又云一以當百恭藏則近之嗚呼若先生若恭藏可謂偉人傑士也已余因不辭拙陋記所見以告于四方庶幾患奇疾學方伎者共来仰治取則焉水戸槐莽居士興野任道甫撰

一村婦足ノ大拇指ノ側ヘ瘤ヲ生シ十餘年ヲ經テ大

サ鶩卵ノ如クニナリ誤テ竹刺ニ觸レ損傷スルニ日ヲ經テ糜爛シ稀水流出シテ止マス百方スレ氏寸効ナク遂ニ翻花狀ヲ成セリ予熟察スルニ粉脂ノ情態ナク純肉ニシテ肩ヘ出ル擔瘤ヲ按スルニ似テ全ク肉瘤ナレ氏根淺クシテ取リ易キヤウニ覺ユ因テ麻沸湯ヲ與ヘ藥ノ廻リタル頃「コロンメ」スヲ以テ瘤根ヲ輪様ニ淺ク截リ廻シ緊シク瘤頭ヲ握リカヲ極テ引クニ少シク拔ケ出タリ又「コロンメス」ニテ筋脈ヲ截ルニ自ラ脫落セリ創痕深ク坑ニナリタルユヱ絲ニテ縫ヒ合セ金創ノ治法ヲ用ルニ日ナラスシテ愈タリ

額ヲ撲テ瘤ノ如ク凸起スル「アリ其時直ニ消散セサレハ眞ノ瘤ニナリテ敷藥等ニテハ治サヌ者ナリ此ハ肩ノ擔瘤ト同證ナリ少年ノ者ハ邪魔ニスレ氏前件ニモ述ル通リ要處ニテ截斷ノナラヌ事ニ云ヒ傳テアルユヱ療治ヲ加ヘスシテ終身ノ患トナルモノ尠ナカラス一農夫適路上ニ倒レ額ヲ石ニテ打チ肉凸起シ大サ蜜柑ノ如クニナリ直ニ醫藥ヲ請タレ氏確乎トシテ消散セス已ニ數年ヲ經テ予カ治ヲ請フ恭藏ノ治法ノ通リニ之ヲ療治

スルニ速ニ全快シテ斧鑿ノ痕ヲ遺サス其瘤原(モト)打撲ヨリ發シタレ氏薄膜ニテ裹ミ自ラ軟肉一球ヲ成シタルハ人身自然ノ造化ナルヘシ

齒齦ノ硬ク腫テ漸漸ニ大ニナリテ愈硬ク石ノ如クニナリ外ヘモ脹出シ頰長ク頰高ク竒恠ノ容貌ニナリ齒牙ハ自ラ抽ケ上リ或ハ脱落シテ食物ヲ咀嚼スルヿヲ得ス最初ハ但偏面ノ大ニナリタルノミニテ大害モナケレ氏五六年或七八年ニ至レハ自潰シテ疼痛ヲ發シ遂ニ死スル者ナリ是ハ齦肉瘤ニシテ不治ニ属ス

肉瘤應用方

人參調榮湯　麻沸湯　前衝　破歃

海老嶋村勘五郎肉瘤圖


第二圖
鞘瘤視齶口
齶口帶髮



肉瘤圖

瘤頭微作翻花

先周截瘤根。極力拔之。
完瘤脫然而落。

脂瘤

世ニ所謂脂瘤ハ其液粘稠ニシテ膠飴ノ如ク膏油ニ似タレ氏實ハ脂ニ非ス試ニ火ニ點スルニ微沸シテ燃レ氏烟ノ騰ルノミニテ發焰セス外ニ脂肪ノ凝滯シテ瘤ニ成ル者アリ一男子肩背及胸脇ニ夥ク瘤ヲ生シ大ナル者ハ梅核ノ如ク小ナル者ハ杏子ノ如シ乃割開スルニ盡凝脂ナリ之ヲ爐火ニ點スレハ下チ燃テ焰ヲ發スル丁麻油獸脂ノ類ニ異ナラス跡ヘハ猛汞油ヲ點シテ瘤膜ヲ除キ去ルニ速ニ愈ユ五日ヲ隔テ、二三瘤ヲ截リ十日ヲ隔テ

テ五六瘤ヲ截リ數月ニシテ盡截テ全愈セリ此瘤ノ如キハ眞ノ脂瘤ト謂テ可ナリ

脂瘤應用方

猛汞油

神經瘤

府下小原村某ノ妻手背ニ瘤ヲ生シ其狀磊落トシテ堅ク大サ梅子ニ過キス根脚深カラスシテ少シク運轉シ又撮ムヘシ皮色變セス小瘤ナレ𪜈數疼痛ヲ發シ截カ如ク刺カ如ク四肢搐搦反覆顛倒呻吟叫呼自汗流漓シテ積聚ノ衝心シタルヤウニ苦楚スル一時或ハ二時許ニシテ痛斷然トシテ止ミ諸證盡ク退ク此ノ如ク發スル毎月兩三回既ニ數年ヲ經レ𪜈愈ヘス手背ノ瘤ハ多クハ脂瘤筋瘤ノモノナレ𪜈諸候脂筋ノ類ニ非ス然レ𪜈治スヘ

キノ瘤ナリ因テ先腕後ヲ緊縛シテ出血ヲ預防シカヲ極テ瘤ヲ撮ミ舉ケ「コロンメス」ニテ周圍ヲ截リ廻シ之ヲ拔去ルニ創口濶大ニシテ手背ノ筋骨盡ク露ハル綿布ヲ燒酎温湯等分ノ中ニ浸シ殘血ヲ拭去リ急ニ縫合スル「金創ノ治法ニ從フニ全愈シテ疼痛復發セス其瘤硬クシテ白ク透明ニシテ珠玉ニ似タリ愚按スルニ凡嬰瘤ノ生スルハ必ス本ツク所アリ骨瘤ノ骨ヨリ生シ血瘤ノ血脈ヨリ發スルノ類ニテ此瘤恐クハ神經ノ凝滯シテ發シタル者ナルヘシ

水脈瘤

一傭夫ノ兒生レナカラ腰ニ瘤アリ大サ瓜ノ如ク色純紅ニシテ緊脹シ一目擊シタル所ニテハ血瘤ニ似タリ强ク按スレハ窪メ氏手ヲ放テハ乍チ脹テ故ノ如クニナリ瘤心ニ堅キ所モナク亦鼓動モナシ血或ハ水ニテモ有ルヤウニ覺ユ試ニ太陽ニ透シテ視レハ色較薄シ若シ血瘤ナレハ日影ニ對シテモ暗黑ナルモノナリ因テ合谷鍼ヲ刺スニ果シテ稀薄ノ水注射ス血瘤ニ非サル「明ナレハ乃チ鑷子ヲ以テ瘤根ヲ横ニ緊ク挾ミ預メ出血ヲ防キ

鑷子ノ上ニ從テ剪斷スル一寸餘ニシテ急ニ瘡口ヲ糾絡ニ縫合シ又鑷子ヲ先ヘ進メテ剪斷シ了リ前法ノ如クニ縫合ス瘡口横徑三寸許其上ヘ前衝ヲ貼シ繃帶ヲ施シ第七日ニ絲ヲ去ルニ氣力モ格別ニ衰弱セス寒熱腫痛等モ少ク二十餘日ニシテ全愈ス斷瘤ハ乍チ牽縮シテ嚢口ヲ括リタルヤウニナリ瘤内ハ膜白クシテ一點ノ穢物ナシ之ヲ解剖スルニ膜ト皮トノ間ニ血脈有リ出タル水ハ清稀ニシテ少シモ臭氣ナシ愚按スルニ敗液ノ類ニアラス蓋シ水脈ノ留滯シテ瘤ト成タルナルヘシ

因テ私ニ水脈瘤ト名ツケテ此ニ載ス

水脈瘤應用方

前衝



水豚褶圖



第二圖
截取完瘤
水盡出而
膜自縮



粉瘤

粉瘤ノ療治ハ膜ヲ取リ盡スヲ緊要トス若シ膜少シニテモ殘ル片ハ再發シテ故ノ如クニナル者ナリ或ハ殘リタル膜ヨリ翻花瘡ニ變スル者亦少カラス近頃粉瘤ヲ取ルニ膜ヘ疵ヲ附ケス粉ノ入タルマヽ完瘤ヲ拔取ルノ新手段ヲ得タリ其法左ノ手ニテ瘤根ヲ緊シク撮ミ右ノ手ニ「ランセツタ」ヲ取リ瘤頭ノ緊脹シタル處ヲ淺ク一文字ニ截リ膜ニ疵ノ附ヌヤウニ消息シ創口ヨリ瘤膜ノ微ク露ハレタル片皮ヲ左右ヘ引キ分ケ瘤膜ヲ鑷子ニテ引

雄山閣藏

キ更ニ佝(ヲ)者ヲシテ皮ヲ左右ヘ引キ分ケサセ膜ト皮トノ間ヘ鯨(ヘラ)篦ヲ徐徐ニ入レテ分解シ離レ兼ル所ハ「ランセツタ」ニテ截リ指ニテ撮(ツマ)マル、程ニ成リタル時カヲ極テ引クトキハ自ラ分離スル者ナリ尚離レサル處ハ鯨篦ヲ用ヒ或ハ「ランセツタ」ニテ切リ離シ再ヒカヲ極テ引クトキハ脱然トシテ拔ケ出ルナリ其法庖人(リヤウリニン)ノ鳥ノ糞(クソ)壤ヲ剥(ムク)ク手段ニ同シ粉瘤ヲ療治スル毎ニ弟子等瘤ヲ干シテ風窓ニ懸ケ貯フル一數十枚ニ至レリ瘤ヲ取タル跡ハ小瘤ナレハ焼酎等ニテ洗フニ及ハス棉布ニテ血ヲ能ク拭ヒ去リ縫合スル一金創ノ法ノ如クニシ其上ヘ前衝ヲ棉片ヘ攤テ貼シ其上ヲ遊奕ニテ蓋ヒ置ケハ數日ニシテ全愈スルナリ

一孀婦缺盆ノ下邊ニ宿瘤アリ大サ梅子ノ如シ後自ラ潰テ膿血淋漓トシテ止マサル一年餘瘡口翻花シテ漸漸ニ大ニナルヲ覺ユ前醫腐藥ヲ貼シ或ハ藥線ニテ腐肉ヲ取レトモ亦一夜ノ内ニ肉怒生シテ翻花スル一故ノ如シ予熟視スルニ翻肉ノ中ニ一小孔アリ鯨(ヘラ)篦ヲ挿シテ瘡裏ヲ探ルニ篦頭ニ粉ヲ帯テ出ツ於是始テ粉瘤ノ翻花ナル一ヲ曉(サト)リ因

テ前法ノ如ク療治スルニ瘤膜脱出シテ瘡口十餘日ニシテ愈ユ翻花シタルハ即チ瘤膜ノ一端ナリ一少年舌下ニ粉瘤ヲ生シ大サ雞卵ノ如ク皮薄クシテ粉モ白ク透テ見ヘ舌モ拘攣シ言語飲食共ニ不自由ニナリ頷下ヘモ大ニ腫レ出シ舌下ノ一ユユ其勢手ヲ下シ難キヤウニ見ユ然レ𪜈粉瘤ナル一著明ナレハ前法ヲ施シ膜ノマヽ完瘤ヲ拔取テ愈ヘタリ

粉瘤應用方

前衝　遊奕

粉瘤圖

一男子額上粉瘤以刀輕輕截皮瘤頭微露

拔去完瘤鮮血淋漓

剖瘤視膜内

蚘蟲瘤

本州那珂湊商家某ノ兒結喉ノ下邊ニ瘤ヲ生シ大サ梅子ノ如シ神水膏ヲ摩擦スル丁數十日ニシテ初テ赤色ニ變シ自潰シテ糊ノ如キモノ陸續トシテ出ツ熟視スルニ盡ク細蟲ニシテ長サ四五分許既ニ死シテ蠕動セサレ氏即蚘蟲ナリ愚按スルニ水銀ハ殺蟲ノ劑ニテ蟲ヲモ殺ス程ノ者ナレハ神水膏ヲ摩擦スル間ニ蚘蟲自ラ死シテ瘤モ亦自ラ潰タルナルヘシ蚘蟲ハ内臓及肉中ニ生シテ不思議ノ丁ノ有モノナリ一男子目ノ外眥焮腫スル丁數

日遂ニ自潰シテ四五寸許ノ蚘蟲ノ出タルヿアリ

鼬鼠ヲ解剖スルニ細蟲一塊ヲ成シテ腸胃ノ外ニ在タルヿアリ又雞肝ヲ蚘蟲ノ貫キ居タルヲ見ル

我塾ノ諸生屢犬ヲ解剖スルヲ傍觀スルニ心臟ニ必ラス銀線ノ如キ蚘蟲アリ此等ニ因テ考ルニ蚘蟲ノ瘤中ニ生活スルヿ亦怪ニ足ラス

蚘蟲瘤應用方

神水膏

包莖翻花瘡

包莖ニ外皮少シモ脫ズ唯尿口ノ煙管ノ吸口程有ルノミニテ終身龜頭ヲ見ルヿ能ハサル者アリ之ヲ眞ノ包莖ト為ス此性ノ者ハ瘀液皮中ヘ鬱滯シ遂ニ翻花瘡ヲ發スルヿアリ最初ハ瘀水ノミ出テ、痛痒モナキユヱ輕證ト心得居ルニ瘡漸漸ニ大ニナリ堅キヿ石ノ如ク初テ痛ヲ發シ瘀水愈多ク出臭氣薫蒸シテ一室ニ滿チ包皮モ亦焮熱腫痛スルニ至ル然レトモ其瘡ヲ見ルヿ能ハサルユヱ本人ハ勿論醫者モ徒ニ臆度シテ黴毒ト為シ水銀輕粉生

自雄書藏

生乳。加魯墨兒。ノ類ヲ更與フレ𪜈本ヨリ見込違ユエ唯身體ノ疲勞スルノミニテ寸効ヲ奏セス半年或一年ニシテ包皮モ亦腐リ穿ケ外ヘモ翻花シテ其形狀宛モ乳岩舌疽等ニ似タリ愈翻花シテ愈堅ク遂ニ毛際マテ消爍シ腹ノ中マテ見ユル樣ニナリテ死スルモノナリ此證神丹名膏アリト雖𪜈決シテ寸効ヲ奏セス百死ニシテ一生ヲ得ルモノナシ唯斷截ノ法ヲ以テ必ラス回生ヲ期スヘシ

治法毛際ヨリ斷截シテ餘毒ヲ遺スヘカラス若シ瘡根微シニテモ殘ル𪜈ハ必ス再發スルモノナリ然レ𪜈陰莖ハ他ノ部ニ比スレハ動脈太クシテ多ク出血スルモノナリ包莖ヲ截斷シテモ血ノ止リカヌル丁有レハ況ヤ毛際ヨリ截斷スレハ血ノ止マスシテ死スル丁アリ昔シ予カ隣里ノ一僧自ラ陰莖ヲ斷チ出血止マス數日ニシテ死セリ本州額田村ノ民儀十郎願事アリテ神祇ニ誓ヒ竊ニ陰莖ヲ半ヨリ截リ出血止マスシテ數日ニ至レ𪜈妻孥ニモ深ク秘シタル丁ナレハ醫治ヲモ請フヲ得ス既ニ死地ニ墜ントス自ラ皮ヲ引キ延シ細帶ニテ縛リ括囊ノ如クニシテ血ハ止タレ𪜈創口愈ルニ從

國會圖書館藏

テ尿道漸漸ニ狹窄ニナリ小便閉ヲ患ヒテ予カ療治ヲ請ヘリ談次出血ノ量ヲ問フニ數日出タル血約スルニ五六升ニ下ラスト云フ去レハ幸ニシテ死ヲ免レタル者ナリ又陶九成ノ輟耕錄ニ杭州沉生犯姦事露引刀自割其勢流血經月不止或令尋所割勢擣粉酒服不數日而愈ト有レハ漢土ニテモ男勢ヲ截テ血ノ止リカ子タルヿアリ宮刑ハ罪人ノヿユヱ死生ヲ論セスシテ截ル者ナレハ數多ノ中ニハ出血止マヾシテ死スルモ亦有ルヘシ此術最危險ナレ𪜈陰莖ノ動脈ヲ紮ルヿヲ心得ル𪜈ハ亦

施シ易キノミ其法先ツ麻沸湯ヲ與ヘ仰卧セシメ瘡根ノ淺深ヲ摸索シ截斷ノ部分ヲ定メ中黄ノ紙撚膏ヲ尿道ヘ挿入シテ會陰ノ邊ニ至ルヿ淋病ニ用ユル法ノ如クシ龍鬚刀ヲ以テ陰莖ト陰嚢ト相連ル處ヲ一寸許截放シ陰莖ヲ延テ毛際ヨリ截斷スルニ便ナラシメ陰嚢ノ創ハ縫合シテ血ヲ止メ陰莖ノ創ハ其儘ニ置キ疝緒ヲシテ鑷子ヲ以テ横骨ノ方ヨリ毛際ヲ横ニ緊シク挾ミ預メ出血ヲ防キ金創鍼ヲ以テ鑷子ノ下ヲ尿道ヲ避テ右ヨリ左ヘ穿チ一尺許ノ絲ヲ貫キ置キ剪刀ヲ創口ヘ入レ

皮ヲ左右ヨリ截リ廻セハ左側ノ動脈現ハルヽナリ之ヲ絲ニテ紮レハ大出血ハ無キモノナリ龍鬚刀ヲ以テ横骨ノ方ヨリ陰莖ヲ截斷スレハ斷頭忽チ牽縮シテ鑷子ヲ脫ケ創口濶大ニナリ血大ニ迸リ出ツ手ハヤク先ニ貫キ置タル絲ノ両端ヲ把テ斷頭ヲ引上ケ結束スレハ出血ノ減スルモノナリ紙撚膏ヲ引出スヿ一寸許ニシテ尿道ヲ失ハサルヿヲ要シ動脈ヲ紮リタル絲ハ創外ヘ出シ縫合スルヿ五六鍼ニシテ後破敵ヲ綿片ニ攤テ貼ス其上ヘ安定巾ヲ置テ丁字帶ヲ施スヿ法ノ如クニシテ

尚仰卧セシメ小便瀦留スル寸ハ繃帶ヲ去リ紙撚膏ヲ拔キ小便ヲ取テ後又膏藥及繃帶ヲ施スヿ前法ノ如クス毎日此ノ通リニスヘシ創口愈テ後モ尿道ヘハ中黃紙撚膏ヲ挿入シテ口ノ窄クナラヌ様ニスヘシ前日ヨリ疲勞シタル者ヘハ十全大補湯ヲ與ヘ疲勞漸復シ唯小便不利或尿道痛痒或ハ創痕ニ微腫アル者ハ龍膽瀉肝湯ニ宜シ

包莖翻花瘡應用方

十全大補湯　龍膽瀉肝湯　麻沸湯

破敵　中黃

包莖翻花瘡圖

先截囊莖相連處，而縫合之，又抻入紙撚膏於尿道。



第二圖

貫絲莖根而未截斷，先環截其皮以檢動脈。



第三圖
截斷後以所貫絲結束創口



第四圖
縫合創口



莖皮硬腫

包莖ノ者自ラ耻テ無理ニ皮ヲ脱キ故ヘ復セサル寸ハ忽チ腫痛ヲ發ス即大人ノ蚯蚓吹ナリ事ハ蚯蚓吹門ニ詳ニス其時療治セサレハ頑硬ニ變シ害ヲ為ㄱアリ又包莖ヲ截斷シテ後龜頭ノ下邊ノ皮ノ硬腫シテ消散セヌㄱアリ何レモ藥カニテハ治シ難シ宜ク截斷法ヲ行フヘシ

治法麻藥ヲ用ユルニ及ハス先鑷子ニテ患處ノ右皮ヲ緊ク挾ミ剪刀ニテ鑷子ノ際ヨリ剪斷シ創口ヲ斜絡ニ縫合シテ更ニ左皮ヲ剪斷スルㄱ古法ノ如

クス跡ヘハ前衝ヲ綿片ニ攤テ貼シ繃帯ヲ施スヘシ青洲先生ノ遺教ニ凡陰莖ノ截断ニ尿口下部ノ筋ヲ断スルヿヲ禁スレ氏屢此筋ヲ截断スルニ少モ害ノ無キモノナレハ腫ノ殘ラヌ樣ニ筋ヲモ剪リ去ルヘシ

莖皮硬腫應用方

前衝

包莖

包莖ニ皮ノ餘リテ蒙ルトロノ狹シテ脫ヌト二通リアリ何レモ濕氣皮ノ内ヘ滯リテ爛レ或ハ翻花瘡ヲ生スルヿアリ又黴毒ヲ受ル片ハ殊ニ難澁スルヿヨリ皮ヲ截テ療治スルヲ第一ノ良策トス先年ハ麻藥ヲ用ヒ餘レル皮ヲ截リ去リタレ氏又工夫シテ龜頭ノ皮ヲ竪ニ一鉸ニ截ルニ龜頭モ能ク露ハレ皮モ格別ニ腫レス至極簡便ナリ其術先ヅ截ルヘキ通リノ左右ヲ鑷子ニ挺ニテ斜ニ緊シク挾ミ鑷子ノ先ノ兩方ヨリ相合ミテ三隅形ヲナスヤウ

ニスヘシ右ノ鑷子ハ价者ヲシテ持シメ左ノ鑷子ハ自分ニテ持ヘシ脈絡及神經ヲ壓シ斷ユヱ血モ出テス痛モ少ナシ醫右手ニ剪刀ヲ持チ二鑷子ニテ挾ミタル中央ヘサシコミテ截ルヘシ截テ後モ鑷子ヲ放スヘカラス自分ニテ持タル鑷子ハ別ノ价者ニ持シムヘシ缺唇ニ用ユル細キ金創鍼ニテ第一ニ截リ留リヲ縫ヒ合セ次ニ左右ノ創口ヲ斜絡ニ縫合シ鑷子ヲ放スヒハ皮左右ヘ分リ龜頭能ク露ハルヽナリ創上ヘハ前衝ヲ綿片ヘ攤テ貼シ其上ヲ棉布ニテ一通リ卷テヨシ創口ノ愈タル後ニ腫ノ消シ無ルモノハ中黄ヲ棉片ニ攤テ貼スルヒハ自ラ消散スルナリ此術屢試ルニ從前ノ治法ヨリモ勝レリトス

包莖應用方

前衝　中黄

小便閉

老人ノ小便閉ハ多クハ治シ難シ一旦全快スルモ再發シテ死ヲ免カレ難シ其病由ヲ考ルニ血氣衰殘シ膀胱不遂シテ開闔ノ機關ヲ失シタルナルヘシ故ニ後ニハ却テ小便失禁ニナルモノ多シ然レトモ滴瀝スルノミニテ快利セヌユエ少腹膨脹シ鞠子ノ如クニナリテ遂ニ死スルナリ測肥子ノ通ラヌモノハ速ニ死スルユエ按腹シテ小便ヲ出スヘシ其法患者ヲ仰卧セシメ両手ニテ少腹ヲ左右ヨリ壓スヘシ此術ヲ施スニハ常ニ人身ノ内景ヲ詳ニ

シ膀胱ノ質ト位置トヲ心得テ按腹スヘキ丁ナリ

府下矢田村ノ一農夫年老テ小便閉ヲ患ヒ諸醫更測胞子ヲ挿入スレ𪜈血ノミ出テヽ通ラス尿道モ焮腫シタルヤウニ見ユルユヱ測胞子ヲ用ヒス按腹ノ法ニテ小便ヲ取ルニ一旦通スレ𪜈又閉テ一滴モ通セス家人等數子ヲ迎ル丁ヲ乙甲ニ思ヒ其妻子予カ術ニ倣テ患者ノ少腹ヲ左右ヨリカヲ極テ壓スルニ乍チ泛ト聲アリテ腹滿卒ニ消シ腹中刺痛スル丁甚シ一夜ヲ經ルニ及テ腹一圓ニ脹滿シテ煩躁セリ愚按スルニ膀胱ノ破裂シテ小便ノ溢レタルナレハ少腹ヲ刺シテ小便ヲ去リタレ𪜈遂ニ數日ニシテ死セリ畢竟素人ニテ膀胱ノ厚薄ヲ知ラヌユヱ誤リタルナリ醫モ内景ヲ心得サレハ此誤ヲ致ス丁ナシト云フヘカラス

測胞子ヲ挿入スルノ法已ニ前編ノ中ニ述タレ𪜈近頃又新手段ヲ得タリ其術患者ヲ側卧セシメ測胞子ノ銀線ヲ納タル儘尿道ヘ挿入シ肛門ノ邊ニ至リタル頃銀線ヲ拔丁一寸五分許ニシ左手ノ食指ヲ肛門ノ中ヘ容ル丁二寸許内應シテ測胞子ノ上ヘ向ヤウニ消息シカヲ入レテ挿入スル寸ハ如何

程ノ小便閉ニテモ通ラヌヿナシ銀線ヲ納タル儘ニテ挿入スルト食指ヲ肛門ニ容ルトノ進退ヲ會得スルヿ肝要ナリ常ニハ當リノ柔カナルヤウニ銀線ヲ拔テ挿入スルナリ若シ通リ難キ證ニ銀線ヲ拔テ挿入スレハ會陰ノ邊ヘ撓屈シ疊リテ先ヘハ行ヌモノナリ又測胞子ノ膀胱ヘ届テ小便ノ出ヌヿアリ是ハ銀線ヲ出入シ氷銃ニテ水ヲ吸上ル意味合ニスル片ハ小便乍チ出ルモノナリ

石淋

石淋モ是迚ニハ多ク療治シタレ𪜈石ノ形狀小ナルモノハ大豆ノ如ク大ナルモノモ蠶豆ニ過ス府下戸村ノ一農夫年四十六歳淋疾ヲ患フルヿ幾十八年初發ハ小便赤澁熱痛シ膿血淋瀝トシテ下リ常ニ床蓐ニ卧シ久ク經テ陰嚢及會陰ノ邊卒ニ焮熱腫痛シ遂ニ潰テ膿血ヲ出シ漸次ニ瘡口ヲ穿ツヿ五六箇所ニナリ小便七分ハ瘡口ヨリ漏泄シテ止マス即チ淋漏ナリ又數年ヲ經テ石淋トナリ一年ニ二石ヲ出シ或ハ二年ニ一石ヲ出シ石ノ出ルヿ

約スルニ十五六箇ニ至リ大ナルモノハ鳩卵ノ如ク小ナルモノハ雀卵ノ如ク石ノ出ル前ニハ尿道燃熱腫痛シテ小便癃閉シ或ハ尿口ヨリ出ルヿモアリ或ハ尿道及陰嚢ヲ穿テ出ルヿモアリ瘡口或ハ愈ヘ或ハ漏口ニナリ瘢痕凹凸磥砢ニナリ小便及膿血合併シテ滴瀝シ常ニ褌ヲ漬シ穢氣薫蒸シテ傍侍ノモノ鼻ヲ掩ハサルハナシ諸治寸効ヲ奏セス日夜痛苦シテ肉爛骨立シ自ラ不起ヲ決セリ家人深ク之ヲ悲ミテ予カ療治ヲ請フ予熟察スルニ陰莖ノ根堅ク凝リタル所アリ殊ニ痛ミ劇ク結

石ノアルヤウニ見ユ因テ「ランセツタ」ニテ瘡頭ヲ截ルニ鍼尖忽チ石ニ觸ルヽヲ覺ユルヿヱヱ又横ニ截テ結石ヲ撮ミ出セリ石大サ雞卵ノ如シ直ニ瘡口ヲ縫ヒ合セ尿道ヘ太キ「メイチサ」ヘ中黄ヲ塗テ挿入シ其他ノ漏口ヲモ或ハ截リ或ハ腐藥ヲ貼シ猪苓湯加木通車前子ヲ與ヘ内外ヨリ療スルヿ數月ニシテ全愈ニハアラサレヒ漏口過半塞リ小便モ快利スルヤウニナリ初テ床蓐ヲ去リ徒行ニテ予カ家ヘモ往復スルヤウニナレリ凡尿道ノ諸病ニ紙撚子ヘ中黄ヲ塗リ挿入シテ尿道ヲ開キ小便

南葵文庫藏

ヲ快利シ穢物ヲ灑除スルヿ第一ノ良策トス

石淋應用方

猪苓湯加木通車前子　中黄

淋石圖

戸村一農夫所出、計十六箇、今寫其尤大者五、





痔漏

勞瘵ノ萌シアル人痔漏ヲ併病スル片ハ鍼ヲ刺スモ自ラ潰ルモ俱ニ瘡口濶大ニナリテ收小ニナラヌモノナリ此證ヲ斷截スレハ決シテ長肉スルヿナシ又壯實ノモノヽ痔漏ヲ斷截シテ後長肉シ難ク或ハ愈ルモ乍チ再發シテ瘀水出テ遂ニ全愈セヌモノハ後必勞瘵ヲ患フルモノナリ然レハ勞瘵ノ毒内ニアル片ハ證候外ニ顯ハレストテモ勞毒已ニ總身ヘ散漫シテアルモノト見ヘタリ本州平磯村一漁夫年二十七身體肥大ニシテ至テ壯實ノ稟

賦ナリシカ痔漏ヲ患ヘテ予カ治ヲ請フ予熟視スルニ少シモ顧慮スヘキ處ナキユヱ直ニ絲ヲ掛ケ不日ニ斷截スルニ後瘡口何レニモ長肉セス永ク愈カ子最初ノ見込ト相違セシユヱ脈ヲ診スルニ數ナリ數十日ヲ經テ瘡口ハ過半愈ヘタレトモ全快ナラス又數脈モ去リ無ルユヱ後必ス勞瘵ヲ患フヘシ其親族ノモノヘ告ケルニ後果シテ勞瘵ヲ病テ死セリ

喉癬

喉癬ハ喉科指掌ニ其脈證ヲ明辨ス先醒齋筆記ニ載セタルハ癰瘡ヨリ喉癬ニナリタルニテ眞ノ喉癬ニ非ス此病老大ノ者ニ多ク少壯ノ者ニ稀ナリ人年四十以上ニナリ營衛盛ナラス身體稍衰フルニ及ンテ房室ヲ愼マス腎虛火旺シテ發スル者ナリ少年モ稟賦虛弱ノ者房事過度ニ至ル寸ハ此證ヲ患フル一アリ十人カ九人迫ハ鬼簿ヲ免ルヽ能ハス初發ハ音聲嗜啞咽喉微痛シテ咽喉結毒ニ混シ易ク世醫誤テ粉劑薫藥等ヲ用ユル一アリ輕證

ノヤウニ見ユレ𪜈諸藥寸効ヲ奏セス荏苒トシテ日ヲ延キ咽痛漸加ヘ頷下ヘモ累累ト核ヲ結ヒ咽中ハ一圓ニ淺ク糜爛シ或ハ蘚紋ノ如ク匡鄭ヲ成シテ幾處モ糜爛シテ赤肌ニナリ然レ𪜈結毒ノ樣ニ深ク疳蝕スルコトナシ鹽味熱物ハ染ミテモ格別ニ非ス只酒ハ甚浸刺シテ飲ミ難シ外ヨリ咽喉ヲ按スレハ疼痛ニ堪ヘス咽中常ニ乾燥シテ狹窄ニナリタルヲ覺ヘ言語ハ出テ難ク飲食ハ下リ易カラス睡リテ覺タル時ハ別シテ滋潤ヲ失シ先ツ湯茶ニテモ一口飲マサレハ容體ヲ言フ𪜈モナラス

頻頻ニ涎沫ヲ吐クノ夥シク晝夜出ル所約スルニ五六合或ハ一升餘ニ至ルコトアリ微ニ潮熱ヲ發シ飲食漸漸ニ減少シ且嚥穀ハ食シ難ク糊飲ノミヲ啜リ肉鑠骨立シテ死スルモノナリ又諸證前件ノ如ク數月ヲ涉リ疲勞スルニ及テ嗽嗽出テ痰ニ血線ヲ引キ或ハ膿血ヲ吐テ肺癰狀ニナリ或ハ盜汗出テ日晡潮熱ヲ發シ脈モ細數ニナリ勞瘵ノ諸證ヲ備ヘテ死スルモアリ愚按スルニ勞瘵ヲ患フル者死スル頃ニ及テ咽痛スルコトアリ喉癬ハ初ニ咽痛シテ後ニ虛勞ニ變ス咽痛ニ先後アリテ判然ト

シテ二病ノヤウニ見ユル故喉癬ト名ツケテ別ニ咽喉病ヘ入レタル者ナルヘシ實ハ肺痿虛勞ノ一證ト爲シテ可ナリ

治法初發但聲啞咽痛ノミニテ他證ナキ者ハ增損涼膈散若クハ喉癬湯ヲ與ヘ金鎖匕ヲ吹クヘシ若シ寸効ナキ片ハ甘露飲ニ轉ゲシテ氷硼散或ハ五寶散ヲ吹クヘシ津液枯竭シテ虛火旺盛ニナリ脈芤數ニシテ虛陽上泛兩顴嬌紅ナル丨粧フカ如シ即桃花蛀ナリ虛里及心下悸動スル者ハ滋陰降火湯ニ宜シ麥門冬湯加桔梗及ヒ四陰煎養肺湯ノ類ヲ撰用スヘシ

喉癬應用方

滋陰降火湯萬病回春 治陰虛火動發熱欬嗽吐痰喘急盜汗口乾

當歸一錢二分　白芍一錢三分　熟芐　天門冬　麥門冬
白朮各一錢　生芐八分　陳皮七分　黃栢炒　知母
甘艸各五分

右十一味姜棗煎服

四陰煎景岳全書 此保肺清金之劑治陰虛勞損相火熾盛津液枯竭欬嗽吐血多熱

生地三錢 麥門 芍藥 百合 砂仁各二錢

茯苓一錢半

右六味煎服

養肺湯袖珍方 治肺萎聲啞。欬嗽連綿。胸脇掣痛。午後熱多。吐痰沫或咯血。羸瘦日甚於一日者。

人參 阿膠 桔梗 甘艸 五味子 貝母

杏仁 茯苓 桑白 枳實 大棗 柴胡

右十二味煎服

喉癬湯華岡方 治咽喉結毒。漸漸腐爛者。

甘艸 桔梗 山豆根 龍膽 射干 遺糧

右六味煎服

麥門冬湯加桔梗 甘露飲 增損凉膈散

五寶散 金鎖匕 氷硼散

續瘍科秘錄卷之二 終



終