

卷
510.87
12-1
3

3



63274

重刊孫真人備急千金要方卷之三 婦人方中

虛損第一

論一首二條

方二十

盜汗附

論曰凡婦人非止臨產須憂至於產後六須將慎危篤之
至其在於斯勿以產時無他乃縱心恣意無所不犯犯時
微若秋毫感病積於高岱何則產後之病難治於餘疾也
婦人產訖五臟虛羸惟得將補不可轉瀉若其有病不須
駛藥若行駛藥轉更增虛就中更虛向生路遠所以婦人
產後百日已來極須懇勸憂畏勿縱心犯觸及即便行房
若有所犯必身反強直猶如角弓反張名曰瘳風則是其
犯候也若似角弓命同轉燭凡百女人宜好思之苟或在
微不慎戲笑作病一朝困卧控告無所縱多出財寶遍處
求醫醫者未必解此縱得醫來大命已去何處追尋學者

於此一方大須精熟不得同於常方耳特恐上廁便和宜
至中益上佳

凡產後滿百日乃可合會不爾至死虛羸百病滋長慎之
凡婦人皆患風氣臍下虛冷莫不由此早行等故也

凡產後七日內惡血未盡不可服湯候臍下塊散乃進羊
肉湯有痛甚切者不在此例後三兩日消息可服澤蘭丸
比至滿月丸益爲佳不爾虛損不可平復也全極消瘦不
可救者服五石澤蘭丸凡在葶藶必須服澤蘭丸補之服法
必七日分不得早服也

凡婦人因暑月產乳取涼太多得風冷腹中積聚百病竟
起迄至於老百方治不能達桃人煎主之出葶藶後服之婦
火縱之無病每至秋冬須服一两劑以至年內常將服之

佳

西順理中圓已產訖可服此方

甘草 豆豉 人參 白朮 乾薑 各壹兩

右四味為末蜜和丸如梧子服十丸稍增至二十丸新
牛藏虛此所以養臟氣也

桃人圓治婦人產後百疾諸氣補益快澤方

桃人壹斤貳伯枚擣令細熟以上好酒一斗五升研
漚三四遍如作麥粥法以極細為佳內長項瓷瓶中
密塞以麪封之內湯中煮一伏時不停火亦勿令火
猛使瓶口常出在湯上無令沈沒熟訖出溫酒服
合日再雖丈夫亦可服之

石斛地黃圓治婦人虛羸短氣骨逆滿悶風氣方

石斛

甘草

紫苑各肆兩

桃人

生升

桂心貳斤

大黃捌兩

麥門冬貳斤

生地黄汁

淳酒

各捌升

一方用人參三兩

右斗味為末於銅器中炭火二熬內鹿角膠一斤耗得
一斗次內飴二斤白蜜二升和調更於銅器中金丁煎
微耗以生竹攪無令著耗令用得藥成先食酒服如彈
子一丸日三不知稍加至二丸

地黃羊脂煎

治婦人產後欲令肥白飲食平調方

生地黄汁

壹斗

生薑汁

伍升

白蜜

各伍升

羊脂貳斤

右四味先煎地黄入之得五升次內羊脂令煎減半內薑
汁復煎令減合蜜著銅器中煎如飴取雞子大一丸

熱酒中服日三

酒 治產後百病未產前一月當預釀之產後以此釀酒

之方

地黃汁 壹升 好麴 好米 各貳升

右三味先以地黃汁漬麴令發準家法醞之至熟封七日取清服之常使酒氣相接勿令斷絕慎蒜生冷酢滑猪雞魚一切婦人皆須忌之但夏二月熱不可合春秋冬並得合服地黃并滓內米中炊合用之一石十石一準此一升為率先服羊肉當歸湯二劑乃服之佳

酒 治產後虛羸喘乏自汗出腹中絞痛方

肥羊肉 叁斤 去脂 當歸 燒白用 芍藥 各貳兩 子母秘 甘草 各貳兩 子母秘

生薑 各肆兩

乾地黄 伍兩

右八味以水一斗半先煮肉取七升去肉以餘藥

煮取三升去滓分三服不瘥重作子金翼有自壹斤

熱加黃芩今本又門冬各壹兩頭痛加石膏壹兩中風加

風壹兩大便不利加大黃壹兩小便澀難加葱子壹兩

宿食湯 治產後虛羸喘乏下寒乍熱病如瘧狀名瘧方

猪腎 壹具去脂四破若無用羊腎

香豉 綿裹

白粳米

葱白 各壹斤

右四味以水三斗煮取五升去滓任情服之不瘥更作

廣濟方有人參當歸

羊肉黃耆湯 治產後虛乏之補益方

羊肉 叁斤 黃耆 叁兩 大棗 叁拾 茯苓 甘草

當歸

桂心

麥門冬

乾地黄

為藥各二兩

右十味咀咀以水二斗煮羊肉取一斗去肉肉諸藥煎取三升去滓分三服日三

產後虛羸勞損補方

鹿肉其片

乾地黄

甘草

芎藭

黃耆

為藥

麥門冬

茯苓各二兩

人參

當歸

生薑略

半夏壹升

大棗貳拾枚

右十二味咀咀以水二斗五升煮肉以一斗二升去肉

內藥煎取五升去滓分四服日三夜一

產後虛之五勞七傷虛損不足臟腑冷熱不調

麋骨壹具

遠志

黃耆

芍藥

乾薑

防風

茯苓壹斤

厚朴各二兩

當歸

橘皮

甘草

獨活

芫蕪各貳兩

桂心

小薑各肆

右十五味以水二斗煮取一斗二升分五服
取五升去滓分五服

㊞藥湯治產後虛損逆害飲食方

當歸壹兩半

芍藥

人參

桂心

生薑

乾地黄

甘草各壹兩

大棗貳拾枚

右八味以水七升煮取二升去滓分三服日三

㊞杏人湯治產後虛氣方

杏人

橘皮

白朮

人參各叁兩

蘇葉

半夏各壹兩

桂心肆兩

生薑拾兩

麥門冬貳兩

右九味以水一斗二升煮取一斗二升去滓分五服

治產後上氣及婦人背脈氣痛等症氣不足胃中煩

元以下如懷五千冬狀方

厚朴

桂心

當歸

細辛

芍藥

石膏

桔梗各三兩

甘草

黃芩

澤瀉各二兩

吳茱萸

五兩千金 黃作大黃

乾地黄四兩

乾姜一兩

右十三味 以水一斗二升 煮取三升 去滓 分三服

服三劑 佳

乳蜜湯 治產後七傷 虛損少氣不足 并腎勞 寒冷 補氣方

牛乳

柴升 惡則 用羊乳

白蜜

一升半

當歸

人參

獨活

各二兩

大棗二十枚

甘草

桂心各二兩

右八味 以乳蜜中煮取三升 去滓 分四服

三石湯 治產後虛冷 七傷 時寒熱 體痛 之力 補腎 治百病

紫石英

鍾乳

白石英

赤石脂

石膏

茯苓

白朮

桂心

芎藭

甘草各二

薤白六兩
人參

當歸各二

生薑八兩

大棗各一十

右十五味五石並為末諸藥各以咀以水一斗二升煮

取三升六合去滓分六服若中風加葛根獨活各二兩

下加龍骨一兩

三石湯生百病如前方

紫石英

生薑

當歸

人參

甘草各一兩

白石英

鍾乳各二兩

茯苓

乾地黄

桂心各二兩

半夏五兩

大棗十五枚

右十二味三石為末咀諸藥以水一斗二升煮取三

升去滓分四服若中風加葛根四兩

內補黃芩湯

治婦人七傷身體疼痛小復急蒲面黃黑

不能食飲并諸虛羸之不足少氣心悸不安方

黃耆

當歸

芍藥

乾地黄

半夏各二三兩

茯苓

人參

桂心

遠志

麥門冬

甘草

五味子

白朮

澤瀉各二兩 乾薑四兩

大棗三十枚

右十六味以水一斗煮取三升去滓一服五合日

三夜一服

吳茱萸湯治產後虛瀉盜汗瀉瀉惡寒方

吳茱萸三兩以清酒二升漬一宿煮如蟻鼻沸減得

一二升許中分之頓服一升日再間日再作服亦治產

後腹中疼痛

猪膏煎治產後體虛寒熱自汗出方

猪膏

生薑汁

白蜜各壹升

清酒伍合

右四味煎令調和五上五下膏成隨意以酒服方寸已當炭火上熬

鯉魚湯治婦人體虛流汗不止或時盜汗方

鯉魚貳斤 豉

葱白切各一升 乾薑

桂心各一兩

右五味咬咀三物以水一斗煮魚取六升去魚肉諸藥

微火煮取二升去滓分二服取微汗即愈勿用生魚

桂枝附子湯治產後風虛汗出不正小便難四肢微急難以屈伸者方

桂枝

芍藥

生薑各二兩

甘草一兩半

附子一枚

大棗二十枚

右六味咬咀以水七升煎取三升分為三服

虛煩第二 方十一首

白湯 治產後胃中煩熱逆氣方

薤白

半夏

甘草

人參

知母 各二兩

石膏 肆兩

栝蒌根 冬二兩 麥門冬 半升

右八味以水一斗三升煮取四升去滓分五服日
三夜二執甚即加石膏知母各一兩

竹根湯 治產後虛煩方

甘竹根細切一斗五升以水二斗煮取七升去滓內
小麥二升大棗二十枚復煮麥熟三四沸內甘草一
兩麥門冬一升湯成去滓服五合不瘥更服取瘥復
氣亦服之

大麥湯 治產後煩悶不安方

人參

當歸

麥門冬

乾地黃

桂心各壹

大棗貳拾

粳米

壹升

芍藥

肆兩

淡竹葉

叁升

右九味以水一斗二升先煮竹葉及米取八升去

滓內藥煮取三升去滓分二服若煩悶不安者當取豉

一升以水二斗煮取一升盡服之甚良

甘竹茹湯

治產後內虛煩熱短氣方

甘竹茹壹

人參

茯苓

甘草

各壹

黃芩

叁兩

右五味以水六升煮取一升去滓分二服日三

知母湯

治產後乍寒乍熱遍身溫壯芻月心煩悶方

知母

叁兩

芍藥

黃芩

各壹

桂心

甘草

各壹

右五味以水五升煮取一升半分二服一方不用

桂心加生地黃

竹葉湯 治產後心中煩悶不解方

生淡竹葉 麥門冬各口書 甘草貳兩 生薑

茯苓各口書 大棗拾肆枚 小麥各口書

右七味 咀咀以水一斗 先煮竹葉小麥取八升 內諸藥

煮取三升 去滓分三服 若心中虛悸者 加入參一兩 其

人食少無穀氣者 加粳米五合 氣逆者 加半夏一兩

茯苓湯 治產後虛煩頭痛短氣欲絕心中悶亂不解方

生淡竹茹壹升 麥門冬 小麥各口書

甘草壹兩 生薑兩 大棗拾肆枚

右六味 咀咀以水一斗 煮竹茹小麥取八升 去滓 乃內

諸藥 煮取二升 去滓 分三服 羸人分作三服 若有人參

入一兩 若無人參 內茯苓一兩 半亦佳 人參茯苓皆治

心煩悶及心虛驚悸安定精神有則為良無自依方服
一劑不瘥更作若氣逆者加半身一兩

赤小豆散 治產後煩悶不能食虛滿方

赤小豆二三七枚燒作末以冷水和頓服之

蒲黃散 治產後煩悶方

蒲黃以東流水和方寸匕服極良

黃芩湯 治產後虛熱往來心胃煩滿骨節疼痛及頭痛壯

熱晡時輒甚又如微瘧方

蜀漆葉 桂心 甘草 黃芩 各壹兩

黃耆 伍兩 知母 芍藥 各貳兩 生地黃 壹兩

右八味以水一斗煮取二升分二服治寒熱不

芍藥湯 治產後虛熱頭痛方

白雲藥

乾地黄

牡蠣各伍兩桂心叁兩

右四味咬咀以水一斗煮取二升半去滓分三服日三
此湯不傷損入無毒亦治腹中拘急痛若通身發熱却
黃芩二兩

中風第二論一首 方二十首

論曰凡產後角弓反張及諸風病不得用毒藥惟宜單行
一兩味亦不得大發汗特忌心轉瀉吐利必死無疑大豆紫
湯產後大善

大豆紫湯 治產後百病及中風痲痺或背強口噤或但煩
熱苦渴或頭身皆重或身痠劇者嘔逆直視此皆因虛風
冷濕及勞傷所為方

大豆 伍升 清酒壹斗

右二味以鐵鍋猛火熬豆令極熟焦烟出以酒沃之去
滓服一升日夜數服服盡更合小汗則愈一以去風二
則消血結如姙娠傷折胎死在腹中二日服此酒即瘥
獨活湯治產後百日中風瘳口噤不開并治血氣痛勞
傷補腎方

獨活 壹斤

大豆 伍升

舊酒 壹斗叁升

右二味先以酒漬獨活再宿若急須微火煮之令減三
升去滓別熬大豆極焦使煙出以獨活酒沃之去豆服
一升日三夜二

小獨活湯治如前狀方

獨活 捌兩

葛根

生薑

各陸兩

甘草 貳兩

右四味以水九升煮取二升去滓分四服微汗佳

治產後中風背強不得轉動名曰風痙方

甘草 乾地黃 麥門冬 麻黃各一兩 枳實一兩

芎藭 黃芩各一兩 杏仁一兩 葛根半斤

右九味以水一斗五升酒五升合煮葛根取八升

去滓內諸藥煮取三升去滓分再服一劑不瘥更合良

千金翼崔氏有前胡參兩

獨活湯 治產後中風口噤不能言方

獨活 生薑各五兩 防風 秦艽

桂心 白朮 甘草 當歸

附子各一兩 葛根一兩 防己一兩

右十一味以水一斗一升煮取三升去滓分三服

續命酒 治產後中風及百病并男子中一切風神效方

雞糞壹升升熬令黃烏豆壹升熬令聲絕勿焦

右二味以清酒二升半先淋雞糞次淋豆取汁一服一
升溫服取汗病重者凡四五日服之無不愈

竹葉湯治產後中風發熱面正赤喘氣頭痛方

淡竹葉握葛根各二兩防風貳兩桔梗 甘草

人參 桂心各壹兩大附子壹枚生薑伍兩大棗拾伍

右十味以水一斗煮取一升半去滓分三服日三

溫覆使汗出若頸項強者用大附子若嘔者加半夏四

麻湯治產後中風背急短氣方千金翼傳裏急短氣

防風 獨活 葛根各伍兩當歸

芍藥 人參 甘草 乾薑各貳兩

右八味以水九升煮取二升分三服日三

治產後風虛頭痛壯熱言語邪僻方

鹿肉 叁斤 芍藥

獨活

秦艽

黃芩

黃耆 各叁斤

半夏 壹升

乾地黄

桂心

芎藭 各壹斤

生薑 陸兩

甘草

阿膠 各壹斤

人參

茯苓

各肆兩 千金翼作陸兩

右十五味 咀咀以水二斗 煮肉得一斗 一升去肉內藥 煎取二升 去滓內膠令烊 分四服 日三夜一

獨活酒 治產後中風方

獨活 壹斤

桂心 叁兩

秦艽 伍兩

右三味 咀咀以酒一斗半 漬二日 飲五合 稍加至一升 不能多飲 隨性服

大田湯 治產後卒中風 發病倒悶 不知人 及姪娠挾風 兼

治在尊諸疾方

大豆五升炒焦葛根

獨活各切兩防已陸兩

右四味咬咀以酒一斗二升煮豆取八升去滓內藥煮取四升去滓分六服日四夜二

石湯

治產後卒中風發疾口噤倒悶吐沫瘳瘳眩冒不

知人及濕痺緩弱身體痠疼妊娠百病方

紫石英兩鍾乳

赤石脂

石膏

白石英

牡蠣

人參

黃芩

白朮

甘草

括萎根

芍藥

桂心

防已

當歸

乾薑兩

各一兩獨活參兩葛根肆兩

右十八味末五石咬咀諸藥以水一斗四升煮取二升

半分五服日二夜二一方有滑石寒水石各二兩

治產後卒中風發疾口噤痙瘕悶滿不知人并緩
急諸風毒痺身體羸強及挾胎中風婦人百病方

紫石英

白石英

石膏

赤石脂各二兩

獨活

生薑各二兩

葛根肆兩

桂心

芎藭

甘草

芍藥

黃芩各二兩

右十二味以水一斗二升煮取二升半去滓分五

服

小柴胡湯治婦人在尊得風蓋四肢苦煩執皆自發露所

為若頭不痛但煩執與二物黃芩湯頭痛與小柴胡湯方

柴胡半斤

黃芩

人參

甘草各二兩

生薑貳兩

大棗拾貳枚

半夏半升

右七味以水一斗二升煮取六升去滓每服一升

三物黃芩湯方

黃芩

苦參

各貳兩

乾地黄

肆兩

右以咀以水八升煮取一升去滓適寒温服一升日二
多吐下蟲

甘肅湯

治產後腹中傷絕寒熱恍惚狂言見鬼此病中風

內絕藏氣虛所為方

甘草

芍藥

各伍兩

羊肉

通草

參三兩產實用當歸

右四味以咀以水一斗六升煮肉取一斗去肉內藥煮
取六升去滓分五服日三夜二

羊肉湯

治產後中風久絕不產月水不利乍赤乍白及

子虛勞冷盛方

羊肉

香豉

成澤大蒜

去支研各叁升

右二味以水一斗二升煮取五升去滓內蘇一升更煮
取二升分溫三服

獨活湯治產後中風口噤痺痺氣息迫急眩冒因頸并產

後諸症疾方

葛根 生薑各陸兩獨活肆兩當歸冬三兩甘草

桂心 茯苓 五苓膏 人參 白朮

芎藭 防風各異此

右十二味以水一斗二升煮取二升去滓分三服

防風酒治產後中風方

防風 獨活各異此 女萎

桂心各異此 茵苳各異此 石斛伍兩

右六味以酒一斗漬一宿初服一合稍加至三四

木防己膏 治產後中風方

木防己 半升 茵芋 伍兩

右二味以水一斗，煮酒九升，漬一斗，猪膏四升，煎二上三下，膏成，炙手摩之，遍瘥。

治產後中風，舉體疼痛，自汗出者，及餘百疾方。

獨活 捌兩 當歸 肆兩

右二味以酒八升，煮取四升，去滓，分四服，日三夜。

一取微汗。葛氏單用獨活，小品加當歸，若氣者，加桂心貳兩，不差更作。

湯 治產後中風流腫方

鹽 伍升 熬令赤 雞毛 壹把 燒作灰

右二味以水一石，煮鹽作湯，內雞毛，煎有湯中，適冷暖。

以浴大良又治婦人陰冷腫痛凡風腫面欲裂破者以
紫湯一服瘥神效紫湯是炒黑且作者

產後中風頭面手足臂通滿方

大豆叁升以水六升煮取一升半去豆澄清更煎取
一升內白朮捌兩附子叁兩獨活叁兩生薑捌兩添
水一斗前煎五升內好酒五升合煎取五升去滓分
五服日一夜二間粥頻服二劑

茯苓湯 治產後忽若心中衝悸或志意不定恍恍惚惚言
語錯謬心虛所致方

茯苓肆兩 人參

茯苓各叁兩 芍藥

甘草

當歸

桂心各貳兩

生薑捌兩

大棗

叁拾枚

右九味以水一斗煮取三升去滓分三服日三夜

遺志湯 治產後忽心苦心虛中衝悸不定志意不安言語錯謬
惚惚憤憤情不自覺方

遠志

麥門冬

人參

甘草

當歸

桂心

各二兩

芍藥

茯苓

伍兩

生薑

陸兩

大棗

貳拾枚

右十味以水一斗煮取三升去滓分三服日三服
者分四服產後得此正足心虛所致無當歸用芍藥若
其人心胃逆氣加半夏二兩

茯苓湯 治產後暴苦心悸不定言語錯謬恍惚心中
憤憤此皆心虛所致方

茯苓

伍兩

甘草

芍藥

桂心

當歸

各貳兩

生薑

陸兩

麥門冬

壹升

大棗

叁拾枚

右八味以水一斗煮取三升去滓分三服日三

當歸可用芍藥若苦心志不定加人參一兩亦可內
志一兩若苦煩悶短氣加生竹葉一升先以水一斗三
升煮竹葉取一斗內藥若有微風加獨活二兩麻黃一
兩桂心二兩用水一斗五升若頸項苦急背膊強者加
獨活葛根各二兩麻黃桂心各二兩生薑八兩用水一
斗半

心湯 治產後心衝悸不定恍恍惚惚不自知覺言語錯
誤虛煩短氣志意不定此是心虛所致方

遠志

甘草

各貳兩

人參

茯神

當歸

芍藥

各參兩

麥門冬

壹升

大棗

各伍拾枚

右八味以水一斗煮取三升去滓分三服日三若
苦虛煩短氣者加淡竹葉一升水一斗一升煮竹葉取

一斗內藥若芻中少氣者有益甘草為二兩善

三圓治產後心虛不足虛悸心神不安吸吸之氣或若

恍惚惚不自知覺者方

甘草

遠志

葛蒲各三兩

人參

麥門冬

乾薑

茯苓

各二兩澤瀉

桂心

各二兩

大棗

伍拾枚

右十味為末蜜丸如大豆酒服二十九日四五服夜再

服不知稍加若無澤瀉以白朮代之若芻中冷增乾薑

人參圓治產後大虛心悸志意不安不自覺恍惚恐畏夜

不得眠虛煩少氣方

人參

甘草

茯苓

各三兩

麥門冬

葛蒲

澤瀉

薯蕷

乾薑

各二兩

桂心

各二兩

大棗

伍拾枚

右十味為末以蜜棗膏和丸如梧子未食酒服二十

日三夜一不知稍增若有遠志內一兩為善若煩
當歸獨活二兩亦治男子虛損心悸

大補丸治產後心虛不足心下驚悸志意不安恍惚
惚腹中拘急痛夜卧不安胃中吸吸少氣內補傷損益氣
安定心神亦治虛損方

遠志 甘草 乾地黃 桂心 茯苓

麥門冬 人參 當歸 白朮 澤瀉

獨活 芎藭各二兩 薯蕷 阿膠各二兩 乾薑肆兩

右十五味為末蜜和如大豆末食溫酒服二十九日三
不知稍增至五十九若大虛身體冷少津液加鍾乳二兩為善

心腹痛第四方二十六首

蜀椒湯治產後心痛此大寒冷所為方

蜀椒 貳合 芍藥

當歸

半夏

甘草

桂心 人參

茯苓 各貳兩 蜜 壹升

生薑汁 合

右十味 咀咀以水九升 煮椒令沸 然後內諸藥 煮取二升半 去滓 內薑汁及蜜 煎取二升 一服 五合 漸加至六合 禁勿冷食

天麻養湯 治產後心痛方

乾地黄

當歸

獨活

甘草

芍藥

桂心

細辛

小草 各貳兩

吳茱萸 壹升 乾薑 貳兩

右十味 咀咀以水九升 煮取二升 內蜜五合 重煮 分三服 日二 胡洽不用 獨活 桂心 小草 千金翼 不用 蜜

黃湯 治產後兩脅滿痛 兼除百病方

乾地黄

芍藥

各貳兩

當歸

蒲黃

文口

生薑

伍兩

桂心

陸兩

甘草

壹兩

大棗

貳拾

右八味以水一斗煮取二升半去滓分服日三

芍藥湯

治產後苦腹少痛方

芍藥

陸兩

桂心

生薑

各伍兩

甘草

貳兩

膠飴

大棗

拾貳枚

右六味以水七升煮取四升去滓內膠飴令烊分

三服日三

當歸湯

治婦人寒疝虛勞不足若產後腹中絞痛方

當歸

芍藥

各貳兩子母秘錄作甘草

生薑

伍兩

羊肉壹斤

右四味以水八升煮羊肉熟取汁煎藥得二升適

寒溫服七合日三

金匱要略各胡洽不用芍藥名小羊肉湯

桃人芍藥湯

治產後腹中疼痛方

桃人半升 芍藥

黃芩

當歸

乾漆 桂心

甘草 各貳兩

右七味 以水八升 煮取三升 分三服

余四湯 治產後及傷寒大虛上氣腹痛兼微風方

肥羊肉貳斤無羊肉代 茯苓

黃耆 乾薑各叁兩

甘草 獨活 桂心

人參各兩 麥門冬各叁兩

生地黄貳兩 大棗拾貳枚

右十一味 以水二斗 煮肉取一斗 去肉 內藥 煮取

三升半 分四服 日三夜一 千金翼經無乾薑

羊肉當歸湯 治產後腹中心下切痛不能食往來寒熱若

中風之氣力方

羊肉叁斤

當歸

黃芩時後用 芍藥

防風用後用甘草各貳兩芍藥參兩生薑肆兩

右八味以咀以水一斗一升先煮肉熟減半內餘藥取

三升去滓分三服日三胡洽以黃耆代黃芩白朮代芍藥各夫羊肉湯子母秘錄以桂

心代防風加大棗拾柒枚

白朮湯治產後腰痛欬嗽方

芍藥肆斤杜仲 紫苑 當歸 桂心

白朮各參兩五味子 細辛 款冬花 人參

厚朴 芎藭 附子 草薺 甘草

黃耆各貳兩生薑捌兩大棗叁拾枚

右十八味以咀以水一斗半煮肉取汁一斗五升去肉

內藥煎取三升半去滓分五服日三夜二

白朮黃耆湯治產後二日腹痛補中益氣強氣力消血

羊肉 參斤

生地黄 物 桂心

當歸

甘草

芍藥

人參 各一兩 芍藥 參兩

右八味 咀咀以水一斗 煮肉取一斗 去肉內藥煎取三

升分四服 日三夜

當歸建中湯 治產後虛羸不足 腹中疝痛不止 吸吸

少氣或苦小腹拘急痛引腰背不能飲食 產後一月日得

服四五劑為善 令人力壯方

當歸 肆兩

芍藥 伍兩

甘草 貳兩

生薑 陸兩

桂心 參兩

大棗 拾捌枚

右六味 咀咀以水一斗 煮取三升 去滓分三服 一日令

盡 若大虛內飴糖六兩 作湯成內之 於火上飴消若無

生薑則以乾薑二兩代之 若其人去血過多崩傷內竭

不止加地黃六兩阿膠二兩合八種作湯或去滓內膠若無當歸以芎藭代之

大補中當歸湯治婦人產後虛羸及崩傷過多虛竭腹中

芎藭

乾地黃各二兩

芍藥五兩

桂心貳兩

甘草

乾薑各二兩

大棗肆拾枚

右七味以水一斗一升煮取三升去滓分三服日

三不瘥復作至三劑若有寒苦微下加附子三兩治婦

人虛羸少氣傷絕腹中拘急痛崩傷虛竭面目無色及

唾吐血甚良

大補中當歸湯治產後虛損不足腹中拘急或漏血少腹

苦痛或從高墮下犯內及余瘡血多內傷男子亦宜服之

當歸

續斷

桂心

芎藭

乾薑

麥門冬

芍藥

桂枝

吳茱萸

壹升

乾地黄

陸兩

甘草

白芷

文曰貳兩

大棗

肆拾枚

右十二味以酒一斗漬藥一宿明日以水一斗合

煮取五升去滓分五服日二夜三有黃耆入二兩益桂

桂心酒

治產後疼痛及卒心腹痛方

桂心二兩以酒二升煮取一升去滓分三服日三

生牛膝酒

治產後腹中苦痛方

生牛膝根五兩以酒五升煮取三升分二服若用乾

牛膝根以酒漬之一宿然後可煮

治產後腹中如弦常堅痛無聊賴方

當歸末二方寸匕內蜜一升煎之適寒溫頓服

養血湯 治婦人先有寒人冷胃滿痛或心腹刺痛或嘔吐

後少或腫或寒或下痢氣息綿懶欲絕產後益劇以官主之

吳茱萸貳兩 防風 桔槔 乾薑

甘草 細辛 當歸各拾 乾地黃拾捌

右八味以水四升煮取一升半去滓分再服

補遺湯治產後餘疾胃中少氣腹痛頭疼餘血未盡除胸

中脹滿欲死方

蒲黃 生地黄 生薑各伍兩 芎藭

桂心各壹兩 芒消貳兩 桃人貳拾枚 大棗拾伍枚

右八味以水九升煮取一升半去滓內芒消分三

服日三良驗

敗腎湯治產後疼引腰腹中如錐刀所刺方

敗腎各二兩 桂心 芎藭各壹兩 當歸壹兩

右四味以清酒一升水四升微火煮取一升去滓
適寒温服七合日二三食前服之

一湯 治產後腹痛方

芍藥

甘草

蒲黃

女萎

芍藥

大黃

當歸

桂心

挑人

黃耆

前胡

生地黃

右十二味以水一斗酒一升合煮取三升去滓
四服日三夜一

獨活湯 治產後腹痛引腰背拘急痛方

獨活

當歸

桂心

芍藥

生薑

甘草

大棗

右七味以水八升煮取三升去滓分二服服後相

去如人行十里又再進

益母草湯 治產後心腹疼痛方

芍藥 肆兩

黃耆

白芷

桂心

生薑

人參

芍藥

當歸

乾地黄

甘草 各貳兩

茯苓 冬三兩

大棗 拾枚

右十二味以酒水各伍升合煮取三升去滓先食

服一升日二

千金翼無人參當歸芍藥
窮地黄茯苓為七味

治產後腹脹痛不可忍者方

煮黍粘根為飲 一服即愈

治婦人心痛方

赤棗鹽如彈丸燒作灰酒服愈

又方 燒秤錘投酒中服亦佳 **又方** 炒大豆投酒中服佳

乾地黃湯 治產後惡露不盡腹內諸疾補不足方

乾地黃 各二兩 芍藥 桂心 黃耆

當歸 各二兩 人參 防風 茯苓

細辛 芍藥 甘草 各一兩

右十一味以水一斗煮取二升去滓分二服日再

桃人湯 治產後往來寒熱惡露不盡方

桃人 伍兩 吳茱萸 一升 黃耆 當歸

芍藥 各二兩 生薑 酸棗 柴胡 各一兩

右八味以酒一斗水二升合煮取三升去滓適寒

溫先食服一升日二

蘭湯 治產後惡露不盡腹痛不除小腹急痛方

少氣方

澤蘭

當歸

生地黄各二兩

甘草

壹兩半

生薑

叁兩

芍藥

壹兩

大棗

拾枚

右七味，以水九升，煮取三升，去滓，分三服，日三服。

身欲死，服亦瘥。

甘草湯 治產乳餘血不盡，逆搶心，胃手足逆冷，脣乾，腹痛。

短氣方

甘草

芍藥

桂心

阿膠

各二兩

大黃 肆兩

右五味，以東流水一斗，煮取三升，去滓，內阿膠，令

烊分三服，一服入腹中，面即有顏色，一日一夜盡，此三

升，即下腹中惡血，一升立瘥，當養之，如新產者。

大黃湯 治產後惡露不盡方

大黃

當歸

甘草

生薑

牡丹

芍藥 各二兩 吳茱萸 壹升

右七味咬咀以水一斗煮取四升去滓分四服一日令

盡加人參二兩名人參大黃湯

柴胡湯 治產後往來寒熱惡露不盡方

柴胡

生薑 各一兩 枳實 伍拾枚 當歸

黃耆

芍藥 各二兩 吳茱萸 貳升

右七味咬咀以水一斗三升煮取二升去滓先食服一

升旦二 千金翼以清酒一斗煮

蒲黃湯 治產後餘疾有積血不去腹大短氣不得飲食上

衝胃背時時煩憤逆滿手足指疼胃中結熱方

蒲黃 半兩

大黃

芒消

甘草

黃芩 各壹兩

大棗 叁拾枚

右六味改咀以水五升煮取一升清朝服至日中下若不止進冷粥半盞即止若不下與少熱飲自下人羸者半之 千金翼名大黃湯而不用芒消

銅鏡鼻湯 治產後餘疾惡露不除積聚作病血氣結搏心腹疼痛方

銅鏡鼻 拾捌銖燒末

大黃 貳兩 芍藥

乾地黃

芍藥 乾漆

芒消 各貳兩 亂髮 雞子大燒 大棗 叁拾枚

右九味改咀以水七升煮取二升一合去滓內髮灰鏡

鼻末分二服

銅鏡鼻湯 治如前狀方

銅鏡鼻 拾捌銖燒末 大黃

甘草

黃芩

芒消

乾地黄各一斤

桃人伍拾枚

右七味以酒六升煮取三升去滓內鏡鼻末分三

服亦治道尸心腹痛及三十六尸疾

梔子湯

治產後覺生處空流血不盡小腹絞痛方

梔子二十枚以水一斗煮取六升內當歸芍藥各二

兩蜜五合生薑五兩羊脂一兩於梔子汁中煎取二

升分三服日三

生地黄湯

治產後二日至七日腹中餘血未盡絞痛強滿

氣息不通方

生地黄

伍兩

生薑

冬二兩

大黃

芍藥

茯苓

細辛

桂心

當歸

甘草

黃芩各一斤

大棗貳拾枚

日三

十一 味咬咀以水八升 煮取一升半 去滓 分三服

治新產後有血腹中妨痛方

大黃 乾檫 乾地黃 桂心 乾薑 各一升

右五味咬咀以水二升 清酒五升 煮取一升 去滓 溫服

一升 血當下 若不瘥 明日服一升 滿二服 病無不瘥

治產後血不去方

麻子五升 擣以酒一斗 漬一宿 明日去滓 溫服一升

先食服不瘥 夜服一升 不吐下 忌房事一月 將養如

初產法

治產後惡物不盡或經一月半歲一歲方

升麻二兩 以清酒五升 煮取一升 去滓 分再服 苦吐

下惡物 勿恠良

方 搗生藕取汁飲一升其驗

方 生地黃汁一升酒三合和溫頓服之

方 赤小豆搗散取東流水和服方寸匕不瘥更服

治產後血痲痛方

古鐵一斤秤鍊去頭鐵杵亦得炭火燒令赤內酒五

升中稍稍服之神妙

治婦人血痲心腹積聚乳餘疾絕生小腹堅滿貫臍中熱腰痛小便不利大便難不下食有伏蝕臙脹瘰癧疽腫久寒留熱胃管有邪氣方

半夏壹兩 陸銖石膏 藜蘆 牡蒙 從容各拾

桂心 乾薑各壹兩烏喙半兩巴豆陸拾枚以八研如膏

右九味為末蜜丸如小豆服二丸日三及治男子疝瘕

右六味以水七升煮取一升半去滓內膠令烺分
二服日二

續命湯治產後早起中風冷泄利及帶下方

鱉甲如手大

當歸

黃連

乾薑各貳兩

黃蘗長一尺廣二寸

右五味以水七升煮取二升去滓分二服日二針

翼加白頭
公羽壹兩

龍骨丸治產後虛冷下血及穀下晝夜無數兼治產後惡露

露不斷方

龍骨肆兩

乾薑

甘草

桂心各貳兩

右四味為末蜜和暖酒服二十九如梧子日二一方用

人參地黃各一兩

治產後虛冷洞下心腹絞痛兼泄瀉不止方

人參 甘草 龍骨 桂心

乾地黄 白朮 黃連 當歸 附子

右十味為末蜜丸如梧子溫酒服二十九日三

湯治產後餘疾寒下凍脹裏急胃脇滿痛欬嘔血

赤熱小便赤黃大便不利方

澤 石膏 當歸 甘草

厚朴 遠志 藁本 芍藥 乾薑

人參 桔梗 乾地黄 白朮

蜀椒 白芷 拍子人 防風 山茱萸

細辛 桑白皮 麻子人

右二十一味以水一斗五升先內桑白皮煮取十

升半去之內諸藥煮取二升五合去滓分二服

乾地黄湯 治產後下痢方

乾地黄 貳兩

白頭翁

苦連 各壹兩

蜜臘 壹方寸

阿膠 如手掌大壹枚

右五味以水五升煮取一升半去滓內膠蠟令烺分二服日三 千金翼用乾薑壹兩

生地黄湯 治產後忽著寒熱下痢方

生地黄 伍兩

甘草

黃連

桂心 各壹兩

大棗 貳拾枚

淡竹葉 貳升 一作竹皮

赤石脂 貳兩

右七味以水一斗煮竹葉取七升去滓內藥煮取

一升半分二服日三

生地黄湯 治產後下痢方

藍青熱

附子

鬼臼

蜀椒略半壹兩厚朴

阿膠

甘草略艾葉

龍骨

黃連

當歸各壹兩

黃藥

茯苓

人參各壹兩

右十四味為末蜜和丸如梧子每服二十九丸空腹飲下

一方用赤石脂四兩

赤石脂圓治產後虛冷下痢方

赤石脂略當歸

白朮

黃連

乾薑

秦皮

干草各壹兩蜀椒

附子各壹兩

右九味為末蜜丸如梧子酒服二十九日千金翼作散空腹飲

服方寸匕

赤散治產後下痢方

赤石脂

代赭各壹兩

桂心壹兩

右三味治下篩酒服方寸匕日二十日愈

果散 治產後下痢方

麻黃

貫衆

桂心 各壹兩

甘草

乾漆 各叁兩

細辛 各貳兩

右六味治下篩酒服五撮日再五日愈麥粥下尤佳

黃散 治產後下痢方

黃連 貳兩

黃芩

麩蟲 乾地黄 各壹兩

右四味治下篩酒服方寸匕日二十日愈

龍骨散 治產後痢方

五色龍骨

代赭

黃蘗根皮 蜜炙令焦

赤石脂

艾格骨

黃連 貳兩

右六味治下篩飲服方寸匕日二

淋瀝第七方九首

和氣湯 治產後小便數兼渴方

括婁根 麥門冬 甘草 黃連 各貳兩

人參 生薑 各貳兩 大棗 拾伍枚 桑螵蛸 貳拾枚

右八味以水七升煮取一升半分三服

又方 治產後渴不止方

栝婁根 肆兩 人參 麥門冬 各叁兩 甘草 崔氏不用

乾地黄 各貳兩 大棗 貳拾枚 土瓜根 伍兩 崔氏用蘆根

右七味以水一斗一升煮取六升分六服

新煎湯 治產後小便數方

雞臍脰 具一二二 雞腸 各叁具洗 乾地黄 當歸

甘草 各貳兩 麻黃 肆兩 厚朴 人參 各叁兩

生薑伍兩

大棗貳拾枚

右十味以水一斗煮脫腔及腸大棗取七升去滓

內諸藥煎取三升半分三服

治婦人結氣成淋小便引痛上至小腹或時溺血或如豆

汁或如膠飴每發欲死食不生肌面目萎黃師所不能治

貝齒肆枚燒末 葵子壹升

石膏伍兩碎 滑石貳兩末

右四味以水七升煮一物取一升去滓內一末及猪脂

一合更煎二沸分三服日三不瘥再合服

石葦湯 治產後卒淋氣淋血淋石淋方

石葦

黃芩

通草

甘草各貳兩

榆皮伍兩

生薑伍兩

大棗叁拾枚

葵子貳升

白朮

產寶用芍藥

生薑伍兩

生薑伍兩

右九味以水八升煮取一升半分二服藥驗

氏同產寶
不用薑棗

葵根湯 治產後淋瀝方

葵根貳兩 車前子升壹 亂髮燒灰 大黃 桂心

消石略壹兩 通草各兩 生薑陸兩 冬瓜練菜 合口一作汁

右九味以水七升煮取一升半分二服用冬瓜練

茅根湯 治產後淋方

白茅根壹兩 瞿麥 茯苓各肆兩 地脉 人參各貳兩

生薑參兩 桃膠 甘草各壹兩 鯉魚齒壹伯枚

右九味以水一斗煮取一升半分二服

滑石散 治產後淋方

滑石伍兩 通草 車前子 葵子各肆兩

右四味治下篩酢漿水服方寸匕稍加至一匕

前藥湯 治產後虛渴少氣力方

竹葉叁升 生薑 半夏各叁兩 大棗拾肆枚 小麥伍台

甘草 茯苓 人參各壹兩 麥門冬伍兩

右九味以水九升煮竹葉小麥取七升去滓內諸

藥更煎取一升半一服五合日二夜一

雜治第八方五十九首 灸法九首

治婦人勞氣食氣胃滿吐逆其病頭重結痛小便赤黃大

下氣方

烏頭 黃芩 巴豆各半兩 半夏叁兩

大黃捌兩 戎鹽壹兩半 蜃蟲 桂心

苦參各拾捌銖 人參 消石各壹兩

右十一味為末以蜜膏半斤 膠梓和搗二 萬杵丸如梧子

宿不食酒服五九安卧須臾當下下黃者小腹積也青者
者孤也白者內風也如水者留飲也青如粥汁膈上邪
氣也血如腐肉者傷也赤如血者乳餘疾也如蟲刺者
蠱也既下必渴渴飲粥飢食酥糜二日後當溫食食必
肥濃二十日平復亦名破積烏頭丸主心腹積聚氣閉
脹疝瘕內傷痰血產乳餘疾及諸不足

竹茹湯治婦人汗血吐血尿血下血方

竹茹貳升人參

芍藥

桔梗

芎藭

當歸 甘草

桂心各壹兩

乾地黄

肆兩

右九味以水一斗煮取二升分二服

治婦人自少患風頭疼眼眩方

石南一方用

細辛

天雄

茵芋各貳兩

薯蕷

防風

貫衆

獨活

蕪蘇各肆兩

乾薑

山茱萸各叁兩

右十一味以酒二斗漬五日初飲二合日三服後

稍稍加之

治婦人經服硫黃丸忽患頭痛項冷冷歇又心腎燥熱皆骨眼皆癢痛有時生瘡喉中乾燥四體痛癢方

栝婁根

麥門冬

龍膽各叁兩

大黃貳兩

杏仁貳升

土瓜根捌兩

右六味為末蜜丸如梧子大飲服十枚日二後漸加之

治婦人患癖按時如有自二五箇而作水聲殊不得寢食當

心悶方

牽牛子二升治下篩飲服方寸匕日一服二十服後

可服好硫黃一兩

治婦人忽與鬼交通方

松脂貳兩

雄黃壹兩末

右二味先煇松脂乃內雄黃末以虎爪攪令相得藥成
取如雞子中黃夜卧以著燻籠中燒令病人取自昇其
上以被自覆惟出頭勿令過熱及令氣得泄也

厚朴湯

治婦人下焦勞冷膀胱腎氣指弱白汁小便俱出

厚朴如手大長四寸以酒五升煮兩沸去滓取桂一
尺為末內汁中調和一宿勿食日頓服之

溫經湯

治婦人小腹痛方

茯苓陸兩

土瓜根

芍藥

各參兩

薏苡仁半升

右四味以酒二升漬一宿白加水七升煎取二升

分再服

半夏厚朴湯 治婦人胃滿心下堅咽中帖帖如有炙肉鬱吐之不出咽之不下方

半夏壹升 厚朴叁兩 茯苓肆兩 生薑伍兩 蘇葉貳兩

右五味以水七升煮取四升分四服日三夜一不

嗟頓服一方無蘇葉生薑

治婦人氣方

平日服烏牛尿日一止

昆布圓 治婦人胃中伏氣方

昆布 海藻 芍藥 桂心 白石英

款冬花 桑白皮 人參各貳兩 柏子仁 茯苓

鍾乳貳斤 紫苑 甘草貳兩 乾薑貳兩 吳茱萸壹斤

五味子 細辛 醋精 杏仁 百枚 搗及 蘇子 各伍

右二十味為末蜜和丸如梧子酒服二十丸日再加至

四十丸

治婦人無故憂恚胃中迫塞氣不下方

芍藥 滑石 黃連 石膏

山茱萸 前胡 各壹兩 陸銖 大黃 麥門冬

細辛 生薑 各壹兩 半夏 拾捌銖 桂心 半兩

右十二味為末蜜丸如梧子酒服二十丸加至三十丸

日三服

婦人斷產方

蠶子故紙方 一尺燒為末酒服之終身不產

又方 油煎水銀 一 日勿息空肚服棗大一枚永斷不損人

治勞損產後無子陰中冷溢出了子明閉積年不瘥身體寒冷方

防風壹兩 桔梗拾 人參壹兩 菖蒲 半夏

丹參 厚朴 乾薑 紫葳 杜蘅各拾

秦芫 白斂 牛膝 沙參各半兩

右十四味為末白蜜和丸如小豆食後服十五丸日二服不知增至二十丸有娠止夫不在勿服之服藥後十日方合陰陽

五加酒 治產後癰瘦玉門冷方

五加皮 枸杞子升 蛇牀子升 杜仲壹斤 乳牀半斤

乾地黃 丹參各貳兩 乾薑壹兩 天門冬肆兩

右九味以絹袋子盛酒二斗漬一宿一服五合日

再稍加至十合佳

治子門閉血聚腹中生肉癥藏寒所致方

乾擦半斤

生地黃汁叁升

生牛膝汁壹斤

右二味先擣擦為散內汁中攪微火煎為丸如梧子大酒服三九日再若覺腹中痛食後服之

治產勞玉門閉而不閉方

硫黃肆兩

吳茱萸壹兩

黃絲子壹兩

陸銖蛇牀子壹兩

壹兩

右四味為散以水一升煎一方寸匕洗玉門日再

治產後陰道開而不閉方

石灰一斗熬令燒草以水二斗投之適寒溫入汁中

坐漬之須申復易坐如常法此方已效千金不傳

黃公散治婦人陰脫方

黃芩

蝟皮

當歸

芍藥

牡蠣

竹皮

狐莖

疏黃散

治同前

硫黃

烏賊魚骨

各半

五味子

冬三銖

右二味治下篩以粉其上良日再二粉之

當歸散

治同前

當歸

黃芩

蝟皮

半兩

牡蠣

精兩

芍藥

壹兩

右五味治下篩酒服方寸匕日二服禁舉重良

治產後陰下脫方

蛇床子一升布裹灸熨之亦治產後陰中痛

又方

燒人屎為末酒服方寸匕日二

又方燒弊帚頭為灰酒服方寸匕

又方鼈頭五枚燒末以井花水服方寸匕日二

又方皂莢半兩半夏大黃

細辛各拾蛇床子各拾

右五味治下篩用薄絹囊盛大如指內陰中日一易

又方吳茱萸

蜀椒各壹升

戎鹽如雞子大

右二味皆燻令變色為末以綿裹如半雞子大肉陰中

日一易二十日差

治婦人陰下脫若脫肛方

羊脂煎訖適冷暖取塗上以鐵精傅脂上多少令調

以火炙布令暖熨肛上漸漸推內之然後末磁石酒服

方寸匕日二

治陰下挺出方

蜀椒 不用

烏頭

白及 各半兩

右三味治末以方寸匕綿裹內陰中入三寸腹中熱易之日一度明日乃復著七日愈

當歸湯 治產後臟中風陰腫痛方

當歸

獨活

白芷

地榆 各參三兩

敗醬 不用

礬石 各貳兩

右六味以水一斗半煮取五升適冷暖稍稍洗陰日三

人參 熟搗桃人傳之良日二度

治男女陰瘡方

米粉 壹酒杯許 芍藥

黃芩

牡蠣

附子

白芷 各拾捌銖

右六味以不中水猪膏一斤微火上煎二上二下

候白芷黃膏成絞去滓內白粉和令相得傅瘡上併治
口瘡

治陰中痛生瘡方

羊脂壹斤 杏仁壹升 當歸 白芷 芎藭各壹

右五味為末以羊脂和諸藥內鉢中置甑內蒸之二三升
米頃藥成取如大豆許綿裹內陰中白

治男女陰中瘡濕癢方

黃連 梔子 甘草 黃蘗略壹斤 蛇床子壹

右五味治平篩為細末以粉瘡上無汁以猪脂和塗之
深者用綿裹內瘡中白

治陰瘡方

蕪荑 芎藭 黃芩 甘草 礬石

雄黃

附子

白芷

黃連 各陸錄

右九味咬咀取猪膏四兩合煎傳之

治陰中癢如蟲行狀方

礬石 拾捌錄

芎藭 壹兩

丹砂 少許

右三味治下篩取綿裹藥著陰中蟲自死

治陰中癢入骨困

大黃

黃芩

黃耆 各壹兩 芍藥 半兩

玄參

丹參

吳茱萸 各拾錄

右七味治下篩酒服方寸匕日二

又方 狼牙兩把以水五升煮取一升洗日五六度

治男女陰蝕略盡方

蝮蟻

兔屎

右一味等分為末取傅諸上

又方 蛇床子一方用當歸

芍藥

甘草各壹兩 地榆叁兩

右五味咬咀以水五升煮取一升洗日二夜一

又方 蒲黃壹升 水銀壹兩

右一味研以粉其上

又方 肥猪肉十斤以水煮取熟去肉盆中浸之冷易不過

三兩度亦治陰中瘻有蟲

治女人交接輒血出方

桂心 伏龍肝各貳兩

右二味為末酒服方寸匕立止

治童女交接陽道違理及為他物所傷血出流離不止方

取金底墨少許所胡麻以傳之

燒青布并髮灰傳之立愈

治合陰 兩脚痛不可忍方

牛膝

甘草 各二兩

右二味咬咀以水四升煮取一升洗日四度

治女人傷於丈夫四體沈重嗑吸頭痛方

香豉

葱白 各一升

生地黃 捌兩

生薑 肆兩

甘草 貳兩

芍藥 伍兩

右六味咬咀以水七升煮取一升半分二服不瘥重作

慎房事

集驗方無生薑甘草

白濁湯 治婦人陰陽過度玉門疼痛小便不通方

白玉 貳兩 白朮

當歸 伍兩 澤瀉

茯苓 貳兩

右五味以水一斗煎至五升去滓內藥煎取
二三升分再服相去一炊頃

治動胎見血腰痛小腹疼月水不通陰中腫痛方

蒲黃 當歸煨 葱白煨 吳茱萸 阿膠各壹兩

右五味以水九升煮取二升半去滓內膠令烊分三服

治妊娠為夫所動欲死單行竹瀝汁方

取淡竹斷兩頭節火燒中央器盛兩頭得汁飲之立
效

桑根白皮湯 治傷於丈夫苦頭痛欲嘔心悶方

桑根白皮半兩 乾薑貳兩 桂心伍寸 大棗貳拾枚

右四味以酒一斗煮取二升去滓分二服適衣無

令汗出

治嫁痛單行方

大黃十八銖取好酒一升煮二沸頓服之佳

治小戶嫁痛連日方

甘草參兩芍藥半兩生薑拾捌銖桂心陸銖

右四味以酒一升煮二沸去滓盡服神效

又方牛膝五兩以酒二升煮取一升半去滓分二服

治小戶嫁痛方

烏賊魚骨燒為骨酒服方寸匕日二

治陰寬大令窄小方

兔屎 乾漆各半兩 鼠頭骨貳枚

雌雞肝貳箇陰乾百日

右四味為末蜜丸如小豆月初七日合時著一九陰

金徐徐內入二三日知十日小五十日如十五歲童女
治陰冷令熱方

內食茱萸於牛膽中令滿陰乾白日每取一二七枚綿
裹之齒嚼令碎內陰中良久熱如火

灸法

月水不利貫脈上下并無子灸四滿二十壯穴在丹田兩
邊相去各一寸半丹田在臍上一寸是也

婦人胞落類灸臍中二百壯○又灸身交五十壯一報在

臍下橫文中○又灸背脊當臍五十壯○又灸五泉五十

壯一報○又灸龍門一十壯一報在玉泉下女人入陰內

外之際此穴卑令感不針灸

婦人胞下垂注陰下脫灸便下玉泉一寸隨年壯三報

婦人陰冷腫痛灸歸來二十壯二報俠玉泉五寸是封兌
婦人欲斷產灸右踝上一寸一壯即斷

重刊孫真人備急千金要方卷之二

還書日期

本校畢業生，現讀生及研究生均須照上述日期還書，若無其他讀者借閱，即可續借，本校教員與其他人員則須在每年第三學期末歸還所借書籍。

善

510.87

12-1

書 號 碼

著 譯 者

孫.恩.觀

書

名(重刊孫真人)備急千金要方

1377 v.3

號 數

借 期

還 期

號 數

借 期

還 期

出借不得

出借不得

借閱者注意

(一)加意愛護勿失原有
形狀

(二)損壞或遺失應照原價加倍
賠償

(三)借閱以二星期為限期滿欲續借者
須持書至館聲明但本館於必要收回時須
即繳還

(四)逾期不歸還者應照章納金

善

510.87

12-1

圖書號數

圖書冊數

登記號數

63274

v.3.

