

詳校官助教 李巖

欽定四庫全書

普濟方卷三百七十四

嬰孩驚風門

一切驚風

硃砂膏指出直指方治驚風涎盛

硃砂 馬牙硝各二錢 川靈脂 蘆薈各一錢半 麝少許 腦

明

周王



撰

字一

右研細末甘草膏為丸綠豆大箔為衣每服一九薄荷湯調下

生氣散出直指方治諸風疎利後以此調氣

丁香二字白朮 青皮各二錢 甘草 木香 人參

右為末每服半錢沸湯點服或用和劑調氣散亦得

塗顛法一名塗顛香教出醫方大成不但效生有風證即用

麝香 蝎稍 薄荷葉 蜈蚣 牛黃 青黛

右末研勻用棗肉膏調新綿上塗勻火炙煖手熨之

百日外兒更可用浴體法

浴體法出危氏方驚風及傷風不醒漸傳風證僵仆皆可用

天麻 蝎尾 硃砂 烏蛇肉酒浸 白礬 麝香

青黛

右為末每服三錢水一碗桃枝一握并葉煎十沸温

熱

小牛黃丸出幼幼新書治小兒膈熱痰涎稠盛心神不寧睡

不安穩煩燥怔忡四體作熱宜服之但痰熱驚風常

服有效

乾葛兩一分甘草一分黃芩一分麝香半字山梔子半兩  
取仁去皮

右為細末入麝香少許和勻如皂角子煉蜜丸常服  
薄荷湯化下

議曰此四名證已述前遍兼載八候續今復舉驚熱并  
風痰未發陰陽二癇之前醫者即先於化禦風退熱利  
驚如此逐病推究不惟繁難乃治所治是故難於療理  
若以向病於證何憑凡此四證相隨不可忽其一也利

其驚則風縱退其熱則痰壅久尋此理未究書善忽一  
日省悟錢氏方宣明風散正為此等兒孩病設有痰即  
壅有熱即閉有風即隘有驚即悶昏沉沉輕藥不能徹  
散重劑恐傷害但與服疎風散驚輕之宣風散只欠一  
味一服之間風痰驚熱悉此消去神情慶悅四肢安觀  
其此藥似有虎狼用之即和順推痰利驚風散風解熱  
只與一服不移其時可見功效嘗見醫功調治此等證  
候多是疑惑或進退怯怛若過其時涎其日則後傳變

自驚作風自驚作風自風生痰自痰壅盛自熱聚成慢  
八候相從反覆傳變遞至發越之時不可得而進此藥  
然疎風致作害及其聚而自散者流自諸經或絡或經  
或脈故作搐搦引掣等證矣

大效疎風方散

出幼幼新書

治小兒嬰孩驚熱風痰四證聚

於臆之間令兒昏困沉重闕竅不通諸脈氣閉所以  
默默欲食不食欲起倦伏不知其證候者但不經吐  
利宜與服之立見甦省

錦文大黃

三錢 鷄心檳榔

二錢 舊陳桐皮

二錢 黑牽牛一分

半朴硝一錢

右為末二歲兒服半錢三歲一錢先用生蜜調就次  
煎薄荷湯服之不拘時候一方無朴硝風痰在上即  
吐在下即瀉謂膈上下也一服之間即便安樂未可  
便投他藥恐相致誤常人致之用腦麝參苓朮附香  
子無擔負之藥似此四證如此和調理也

正舌膏

出御院藥方

治小兒風病搐搦機關不利喫乳難至

於不能發聲者此因病作之後風邪客於舌之服而致此也服之累效

天麻明大者白殭蠶去絲炒大葉華薄荷各半麝香

一錢好硃砂飛研一分計三錢腦子少許

右除研者及為末勻煉蜜和丸如榛子大每服一九薄荷湯化下時時服少許硃砂為衣

清心散一名牛黃散截風驚方見本門天

星香全蝎散 治小兒驚風

人參 陳皮各一錢甘草一錢木香一錢南星

右吹咀每服一錢紫蘓薑棗煎服有熱加防風一方不用木香

鐵粉丸出御院藥書墜風痰潮搐吐逆咳嗽涎盛

水銀 鉛二味同結硃砂 鐵粉 天南星各一錢輕粉一錢

右一處研至水銀星盡為度生薑汁麪糊為丸如粟米大每服十五丸生薑湯下名太乙丹

已風丹 出幼幼新書

風退熱

天竺黃 一兩 防風 一兩 鈎藤 一兩 白殭蠶 半兩 乾全蝎 半兩 白附子 半兩

右為細末煉蜜為丸如鷄頭子大每服一粒至二粒薄荷荆芥湯化下

金箔膏 出醫方妙選 治大便不通者

金箔 十片 水銀 一分 棗肉 少許 硃砂 一分 雄黃 一分 鉛霜 一分 乾蝎 一分 為末

右研為細末鵝梨汁和丸如綠豆大每服二粒至三粒麝香湯化下

銀箔丹 出醫方妙選 治伏熱潮發者

銀箔 十片 續隨子 一分 青黛 一分 蘆薈 一分 胡黃連 一分 麝香 一分

右通研勻細以糯米飯和如綠豆大每服一粒至二粒煎薄荷湯下大小加減

白殭蠶丹 出醫方妙選 治驚風潮搐生痰上喘急宜服之

白殭蠶 乾全蝎二十箇 白附子兩半 半夏兩半 夏次已上 搗

細末 硃砂水飛 金箔十片 膩粉一錢

右同拌勻棗肉和丸如黍米大每服七粒至十粒點

麝荊芥湯下量大小加減

木通散出驗方 能瀉肝風降心火利驚熱

山梔錢二 大黃錢一 羌活錢二 木通 赤茯苓 甘草各一

錢

右剉紫蘓煎服每一

七珍丸直指方 治諸風頑麻痰壅盛大小通用

細辛 川靈脂 直殭蠶各一錢半 白附子一錢 硃砂半錢

全蝎四箇

右為細末南星生為末煮糊丸麻子大每服五九薑

湯送下

透關散出幼幼新書 治卒中感厥諸癇小兒驚風涎滿口噤

立效

硃砂二錢 龍腦一錢 牛黃一錢 膩粉一錢 水銀同硃砂

右同研為細末分作三服用煎薄荷湯調下取出惡物五七日後更一服一月更一服小兒每服一字薄荷湯下口噤者拗開灌之甚妙

龍角丸 一名大黃丸 出幼幼新書

遠志 牡蠣 赤煨 大黃 二分 黃芩 四分

右為末蜜丸二歲小兒豆大五九日再一歲麻子大盛癩者入牛黃一分一方乳汁下三九量大小以意加減

硃砂散 出幼幼新書 治小兒驚熱和氣

硃砂 白茯苓 人參 山藥 等分 甘草 減半半生半熟

右為末驚金銀薄荷湯下和氣米飯下熱竹茹湯下量大小下一字或半錢或三字

天麻神妙丸 出幼幼新書 治驚風

天麻 殭蠶 各酒浸一宿 輕粉 蝎 炒 白附子 米泔水浸一夜

以上各等分

右為末煉蜜如綠豆大入硃砂麝為衣每服一九薄

荷湯下

分金散出幼幼新書治四時驚風大效

礪砂 馬牙硝各半錢 腦各半錢 麝香各一錢 人參 甘草各

兩半

右為細末每服一字四時驚風發動如羊服後內無

涎用腦麝冷水下一字

開關散出危氏方通關治驚

赤蜈蚣一條炙 直殭蠶 南星一炮各錢 麝香一字 猪牙皂

角三梃田各燒存性

右為末以手點薑汁蘓藥少許擦牙或用物引滴入

藥兩三點入鼻內涎出自開

開牙散出直指方

華陰細辛 南星 朴硝各一錢 麝香半錢 蝎稍五條

右為末以少許用烏梅肉搗末和擦牙並用細辛皂

角荊芥末吹入鼻中

一字散一名蜈蚣蝎稍散 截風定搐出微生家寶方

全蝎褐色者赤蜈蚣一條並硃砂半錢腦許少麝許少

右為末每服一字薄荷湯調下先以此少用管子吹入鼻中自然通竅一方無腦

撩痰散

川烏

右為末鵝翎點醋藥攪後引痰出

鎮肝丸 治小兒失心驚氣風證

全蝎一枚麝香許少酸棗仁一錢腦子一字辰砂一錢

右為細末猪心血丸如菜子大每服七丸燈心湯送

下

治小兒驚風方出本事方

茯苓 甘草 硃砂 青黛 膩粉

右各等分入麝香少許每服一錢蜜水調下

抱龍丸出鮑氏方理一切驚風潮搐傷風瘟疫身熱昏睡氣

龕熱痰實壅嗽中暑沐浴後並宜進此及治痘瘡熱

發毒搐并盡毒中暑冒悶

金定四庫全書

卷三百七十四

南星四兩臘月醋浸陰乾一日夜如無以生者去皮臍炒熟一方臘月牛膽中陰乾如無生者

水浸三日焙用辰砂另研麝香半兩雄黃一分天竺黃一兩

右為末煮甘草水和丸指頭大每服一九溫水化下

壯實小兒宜時服

控痰散出直指方治風噤先用控痰散吐風涎次與益脾散

和胃又辰砂膏利驚即愈或手足拳噤口不開者不

治

蝎尾 銅青各半兩 硃砂一錢 膩粉一字 麝香少許

右為末每服一字臘茶清調下先吐風涎然後和胃

或後段甘草方吐痰隨輕重用

龍腦膏出幼幼新書治小兒驚風搐搦痰壅用在瞪目直視

或眼不開口噤四肢或冷或熱大便或秘或洩等證

腦子一錢 石腦油半兩 南星二錢 輕粉一錢 水銀半兩 臘茶一兩

而棗大同研無星

右為末研和為丸如小兒一歲一九乳香湯下如不

得化破取下惡物後愈

次定回車全書

善濟方

土

神寶丹 出幼幼新書 治小兒體熱喘麓嗽心煩頰赤大小便

不利夜眠不穩

滑石 兩半 膩粉 兩半 青黛 兩半 南星 十二兩 巴豆 七百箇

右為末麪為丸如麻子大每一歲一九薄荷溫水下

如急驚風頭熱足冷口噤面青筋脈抽掣上膈頑涎

疾壯甚者加一兩九煎桃符湯下疎下蘊熱涎立便

安愈小兒瘡疹後餘毒不解宜服食後一方無巴豆

青黛加蝎稍半錢

安神丹 出醫集方 治小兒心神不寧困卧多睡及痰壅塞恍

惚不定

硃砂 三錢半 人參 半錢 南乳香 兩半 酸棗仁 一兩 遠志 一錢半

右為細末蜜丸榛子大金箔為衣每服一九人參湯

化下每兩作三十九

反砂膏 出仁存方 治驚風痰搐傷風咳嗽

南星 一兩又同半夏用白水浸二日煖乾又橫浸焙乾 半夏 一兩 全蝎 二十

箇天麻 半兩 硃砂 二錢

右為末蜜丸如龍眼大每服一九薄荷湯化下

珍珠散一名直丸  
出仁存方治驚風發搐化痰退熱

硃砂一分珍珠末二錢雄黃一分全蝎一錢蟬退七箇

右為末每服一字至半錢煎金銀薄荷湯下竹瀝調

尤好一方作丸有輕粉不用蟬退粳米飯為丸如粟

米大每服二十九薄荷湯下

保生丸一名保生丹一名延壽  
睡驚丸出楊氏家傳方治小兒胎中驚積盤腸

內癆偃身巡視啼哭不止或潮熱風痰驟成急驚吐

瀉日久變成慢驚手脚搐搦哭而鴉聲脾胃虛損不

進乳食如能服令小兒永無驚風之疾睡眠安穩乳

食增進雖是傷風瘡痘之候服亦能解利寒邪透肌

消毒大人手足頑麻運動疼痛睡中驚悸心神不寧

以兩丸依方臨睡化下

硃砂一分麝香一分天南星半兩白

附子半兩一兩薑汁製蛇含石四箇大者於地上放方

紅醋浸七次反字只於反字上用瓦  
襯如出痰火須預時製下臨時入藥

右為末於重午日修合三五家糞子尖搜為丸如梧  
桐子大每服一九薄荷湯磨下若肚疼用瀉荊芥湯  
磨化入薑汁兩三點調服一方每用一九蘸竹瀝如  
膏服不食以乳解送下

急風膏 出醫方選要 治小兒截驚風利胸膈

好硃砂兩半 天漿子二十 乾全蝎二十 膩粉一錢 青黛

一分

右都拌勻腦子半錢研細用軟飯和丸成膏如皂角

子大每服一粒人參荊芥湯下

碧霞丹 出惠聖方 治小腸實涎盛者

硫黃一分 膩粉一分 青黛一分 硃砂一分 巴豆五粒  
水飛去油

右都研勻細滴水和黍米大每服五粒以薄荷湯下  
一方無硃砂軟飯和丸

聖金丹 出醫方妙選 治小兒痰實潮搐者

白殭蠶兩半 夏一兩 湯洗七遍 烏蛇頭一枚 酥炙令黃  
以上搗羅為末

青黛一分 蟬酥三片 鐵器上焙乾

右都研勻酒煮麪糊和如黍米大每服十粒點龍腦

湯下量兒大小加減

祛風丹一名宜風丸治潮發盛者服尤佳兼治急驚風

頭熱足冷口噤面青筋脈抽掣多痰涎

川烏頭一箇大者炮白附子一分天南星一分炮以

細末巴豆五箇膩粉一分

右再研勻以棗肉為丸如黍米大每服三粒至煎生

薑湯冷下量兒大小加減一方薄荷湯下

追風丹一名追風丸治潮發至困者

大川烏頭一箇去皮炮白殭蠶半兩白附子一分天南星

一分炮

右搗為細末煮膠丸黍米大每服十九溫酒下量兒

大小加減一方有乾蝎每服五丸

寸金丹出醫方治利生後驚風及心肺中風尤宜服之

蛇頭一箇酒浸焙乾赤蜈蚣一條乾全蝎一錢草烏頭去皮麻黃

各一錢去節

鐵定四廣錄

右為細末每服一字炒龍腦一字同温酒調下量兒大小宜服加減

鐵粉散出醫方妙選治小兒驚風或多面赤口乾大便不利

尤宜服

鐵粉研半兩珍珠研一分鬱金研一分牛黃研一分

右拌勻研細每服一字温蜜湯調下

油珠膏出幼幼新書補脾胃潤心肺治氣逆嘔吐風痰作搐

石亭脂即生硫黃如明色者滑石各半兩附子去皮半兩半夏去皮南星

去皮臍各一錢

右為末每服一錢以清蠶水半盞滴清油一點如錢大抄藥在油珠上須臾下却去蠶水止取油珠藥再服清蠶水三四口並空心下候時方與服如乳壅涎痰壅塞眼睛斜視速宜服之

生金湯出幼幼新書治小兒生七日後忽患口鼻青微驚胸

中冷視物高

生金黑豆大一粒無生用熟全蝎一分茯苓一分甘草一分

欽定四庫全書

卷三百七十四

右水一升煮五合一服棗大日五夜三

人參丸 出幼幼 鎮心驚 新書

人參 芍藥 甘草 各一錢 大黃 二錢

右為末煉蜜丸如麻子大每服一九米飯下

鉛白霜丸 出幼幼 鎮心驚 新書

鉛白霜 人參 茯苓 各一錢 麝香 少許

右為末煉蜜丸如青豆大薄荷湯下五九

鎮心丸 出幼幼 治驚 新書

硃砂 犀角 升麻 大黃 各半兩

右為細末煉蜜為丸如綠豆大每服三九薄荷湯下

天麻丸 出幼幼 治小兒驚風 新書

天麻 全蝎炒 天南星 去皮 白殭蠶 直者炒 各等分

右為細末酒糊丸如麻子大加至十五九荊芥湯下

茯苓性温可以常服永除諸風

茯神膏 出幼幼 治小兒驚風 新書

蝎稍 茯神 各半兩 白殭蠶 一兩 硃砂 一錢

欽定四庫全書

普濟方

十七

金匱要略卷之四

卷三百七十四

右為末用蜜丸為膏每服一九皂角子大煎金銀薄

荷湯化下

撫驚丸 出幼幼新書 治小兒一切驚風

青黛 各二兩 茯苓 各二兩 天麻 四兩 蝎 半兩

右為末蜜為丸鷄頭子大薄荷湯化下

人中白 一兩 麝香 一錢 蜈蚣 一條 盆硝 二錢

右為細末每用少許鼻內搗

宣風散 出傅氏活嬰方 鎮心壓驚利痰退熱

膽星丸 出直指方 鎮心壓驚利痰解熱

牛膽南星 半兩 硃砂 兩 防風 各二錢 麝香 一字

右用臘月黃牛膽汁和南星末作餅子掛當風處四  
十日和項下藥末研細浸牛膽皮湯丸如梧桐子大  
每服一九井花水調下

疎隔丸 出宿州陳氏方 治驚亦治疳

青黛 一錢 乾蝦蟇 燒存性 木香 一錢 檳榔 一錢 麝香 一錢 續隨

子一錢

欠定四庫全書

普濟方

十八

右為末外青黛麝香續隨子仁三味外為細末共和再研細煉蜜為丸如綠豆大一歲時服十五丸米飯送下量兒大小加減丸數

涎壽散 一名鷄舌香 散出全嬰方 治小兒驚搐不定或因驚風已經

取下舊病傷作

鷄舌香 一錢 硃砂 半錢 五靈脂 半錢 黃耆 半錢

右為末一歲半錢糯米泔調飯湯亦可王氏云用鷄舌香一錢黃耆一分蜜炙辰砂兩錢五靈脂半錢治

療亦同

一字散 出仁存方 治驚風神困不醒 方見本門大疾驚風類

又方 出上方 治驚風不省用藥不效者

蜈蚣 蝎稍 白附子 半錢又腦子少 各半錢

右為細末每服一字薄荷水調勻吹兩鼻內得睡安

小兒驚風

殭蠶 蝎稍 等分 天雄尖 附子尖 一錢

右為末每服一字或半錢生薑酒灌之

鐘定回車全書

卷三百七十四

治諸風 如吐不止用十一味藿香正氣散吐止後服此

藥

防風 三兩 南星 三兩 金沸草 兩 加硃砂 少許

右用無灰酒調服或用油煎豆腐食後吐痰淨用此

藥

丹砂散 治小兒驚搐

丹砂 一錢 膩粉 一錢 蜈蚣 一條 酒 浸炙 蝎 稍 四十九枚 炒

右搗研為末每服一字用薄荷汁調下

犀角散 治小兒多驚身體壯熱吐乳不止

犀角 鎊半 青黛 研 牛黃 一錢 龍膽 各一分

保命丹

腦子 片一 硃砂 粒一 全蝎 一箇 殭蠶 一條

右為細末妳乳調服之立效

軟紅膏 出醫方妙選 治小兒潮搐涎盛者

南星 一兩 硃砂 半兩 水銀 一分 用真明臘 乾蝎稍 四

九枚

欠定回車全書

普濟方

三

右一處入龍腦麝香各一錢再研棗肉和於石臼中搗三五百下硬軟得成膏如皂角子大每服一粒煎薄荷湯下神驗小大加減

萬金丸 一名萬金丹 出瑞竹堂 治慢驚風十無一失

萬節內蠶 七月初五日 或五日取 辰砂 輕粉 麝香 少許 一方

不用 麝

右先以辰砂輕粉為末蒿蟲研勻入麝丸如黍米大每服半歲一歲兒一九二歲三歲三九乳食下或冷

水亦得一方男取女乳女取男乳名如聖丸

定志丸 一名遠志丸 出幼幼新書 治心氣不定安神志小兒驚風心

忪多汗咽乾煩熱

遠志 去心 三兩 人參 三兩 石菖蒲 三兩 白茯苓 三兩

右為末煉蜜和丸硃砂為衣每服三十九米飲下方加桂薄荷荊芥湯下

搐鼻藥 出典 藥方

蜈蚣 一條 蝎稍 四尾 僵蠶 七箇直者 去嘴生用

錄效四庫全書

卷三百七十四

右為細末用鵝毛管吹入鼻中便打噴嚏者三五箇更有啼哭者可治却用妙齊散等藥治之如無噴嚏者不可治也

弄舌散 出全嬰方 治小兒驚弄舌瀉黃散亦治

蛇皮一分 牛黃一錢 硃砂一錢 麝香一字

右為末每服一字薄荷湯調

碧雲散 出富明調方 治小兒驚風有涎

膽礬半兩 銅青一分 粉霜 輕粉各一

右為細末每服一字薄荷湯下中風漿水下如吐多不定煎葱白湯投之立效

小丹砂丸 出王氏傳濟方 治小兒驚積鎮心化涎

小丹砂一分 巴豆 去皮心膜出油盡三十粒 杏仁 先炮過後湯浸去皮尖雙

仁研五粒

右研末麪糊為丸如綠豆大每服一九薄荷湯下三

歲二丸五歲三丸如驚伏在內即驚積行盡仍舊藥

出如無驚積藥更不下

蝎稍丸 治小兒胎虛氣弱吐利生風昏困嗜卧潮搐

全蝎 白附子兩半半夏一兩七片薑汁製焙乾

右為末薑汁糊丸如麻子大每服三十九荊芥湯下

大小加減服

硃砂散出幼幼新書 治小兒不喫乳眼目不開手足牽搖此

為驚風

硃砂 龍齒 滑石各一分

右為細散每服煎竹葉湯放溫調下一字如二歲以

上兒每服半錢

殊聖辰砂膏一名保命丸 治小兒驚風手足動搖精神不爽

一切驚邪狂叫不寧

辰砂光明有祥璧者研極細一兩 酸棗仁用一兩 乳香研半兩

右同研或為膏每服一兩大豆許煎人參湯化下一

方煉蜜為丸棗湯下一方為末如發熱小麥煎湯調

下名寧心散

虎眼丸出幼幼新書 鎮心化涎夜卧不穩夢中驚啼或多虛

汗並宜服之

硃砂 白殭蠶 天南星 生各一分

右為末麩糊丸如綠豆大每服至七九薄荷湯吞下

治驚和氣止瀉痢

白朮 一錢切薄片蜜畧塗紙襯錢慢火炒 甘草 半錢生一 蝎 兩箇全用龍腦

薄荷葉同炒去之只用蝎如無生者細繫錦竹麥炙薄荷焦薄荷乾者同炙焦用

右為末止驚金銀薄荷湯下和氣止瀉痢米飯湯下

治驚風上吐下瀉吐痰涎方

硃砂 錢一 麝香 少許 蝎 箇一

右先研蝎為末後研硃砂麝香極細每服半字茶調

下乳汁下亦得

瑞紅散 出幼幼新書 治小兒諸驚

硃砂 分一 蝎 稍 殭蠶 三十箇直者

右為末每服一字半錢金銀薄荷湯調下逐一日可

常服之

鎮心丸 出幼幼新書 治驚心墜涎

半夏十箇 礞砂 硃砂各一錢  
為末

右半夏以刀切開中心却將礞砂等末細在內用好瓦一片安半夏却將好醋滴在礞砂等內久炙取乾碾爛用粟米糊為丸如桐子每服五七丸金銀薄荷湯下

珍珠丸出幼幼新書 治小兒驚風又名白丸子

右研為末用糯米汁為丸如芥子大每服三丸糯米湯下

牛黃丸出錢氏方

雄黃研 牽牛末一錢 天竺黃一錢

右同研麵糊為丸粟米大每服三丸至五丸食後薄荷水下煎治疳消積常服尤佳大者加丸數

三聖丸出錢氏方 化痰涎寬胸膈消乳癖化驚風倉諸癰疔

積小兒周歲已裏常服極妙又名小丸

青黛 牽牛末各三分 膩粉一分

右研勻麵糊為丸黍米大薄荷湯下

欽定四庫全書

卷三百七十四  
卷三百七十四

小黃丸 出錢氏方

生半夏 末 巴豆霜 一字 黃蘗 末

右研勻薑汁糊丸黍米大已上百日者各一九一周  
二九隨乳下

妙聖散 出錢氏方 治小兒驚風潮搐不定者

蜈蚣 一條 蔥汁浸 麝香一錢 草烏尖汁 四箇 薄荷生薑汁浸一晝

夜焙乾

右以腦子半錢同為末半字蘆管吹鼻搐定為效可

兼服諸驚風藥

分肢散 出宣明論 治小兒卒風大人眼喎斜風涎裏心驚

天癩走馬喉閉急驚一切風熱

巴豆 不去油 朴硝 半兩 川大黃 一兩

右大黃為末後入巴豆朴硝一處細研用油單貼起  
如有前患每服半錢熱茶下吐下頑涎立愈如小兒  
胸候驚弔等痰先服龍腦地黃膏一服次服此藥一  
字看虛實加減只是三服見效不宜頻服如吐瀉不

定以葱白湯調立效

控心丸 出仁存方 治驚風發熱涎盛喉皮鳴

天南星 一箇 乾薄荷末 一錢 大活地龍 九條入南星末令須涎取用

右用白麵少許為丸如麻子大每服五丸薄荷湯化

下

治驚風不省用藥無效者 出濟名方

稍蝎 硃砂 各半錢 地龍 二條

右為末地龍水浸取涎和作丸子放地龍於舊處煎

金銀薄荷湯下

鎮心丸 出直指方 治諸風頑痰喉風纏喉痺

北礬 火煨枯水飛過 直殭蠶 米醋浸焙各一兩 天南星 切片角水浸一宿

焙二分

右為末稀糕糊為丸麻子大每服五丸薑湯下喉風

用皂角水研開灌

寒水石散 出幼幼新書 小兒之病多因驚則心氣不行鬱而

生涎遂成大疾宜常服利小腸去心熱自少驚涎亦

不成疾一名墜痰散

寒水石 滑石 甘草  
各三兩 各三兩

右以水研如泔漿細研無聲量兒大小暑月冷水調

下寒月溫湯調下被驚及心熱坐卧不安者服之即

安加薄荷龍腦又好

南星散 一名南星飲 驅風豁痰

南星 重八九錢以上者用一箇就地上作坑深七寸用火炙五遍作燒通紅以好米醋半盞

灑入坑中即納南星於內以火燒蜂蜜薑汁又入用盆

右為末入琥珀全蝎研勻每服半錢薑防風湯調下

三黃丸 出典藥方 治小兒驚風入腸一切咳嗽氣急有痰解

諸三焦壅身上生瘡及消瘡氣

雄黃 研 鬱金 各一錢 江子 去皮 三粒

右為細末和勻用飯丸蘿蔔子大每服五丸至八九

丸丸薄荷湯下米飲亦得此藥拖丸用

通膈丸

大黃 牽牛 木通

右為細末滴水丸如粟粒大每服三十五丸量虛實  
加減

大黃散

出幼幼  
新書

大黃

芍藥

等分

右為末猪膽汁調貼之

乳香散

出幼幼  
新書

治小兒驚風涎溢悶絕暴死宜用亦不

吐出涎只此壓發搐

甘草

乳香

各末一  
錢七

右為細末每服半錢或一字童子小便下妙

注唇膏

出幼幼  
新書

治小兒常永不生風痰症心無驚多紅

潤唇臉如丹常服無疳積諸癖疾患

直彊蠶

一兩去頭足直者為末以生薑汁和為餅  
子於火上炙乾再為末復以汁為餅乾為

度硃砂

二錢細研用水一碗浸洗三遍  
去黃色傾紙上候乾研如細粉

右同合和研勻煉蜜為膏入甕盒子內貯每用如鷄  
頭大三歲一丸量兒大小加減

噫驚散

出危  
氏方

半夏生一錢 白角半錢

右為末用豆許用管子吹入鼻立醒

開關聖散

一名迴命又名聖散子出直指方

治驚風釣眼

赤足蜈蚣

一條中分為兩各用葱汁浸一夜焙乾

全蝎

一條中分為兩片各記左

右以二味記

右為末左眼翻左手搐以左藥末入左鼻孔右眼翻

右手搐以右藥末入右鼻孔雙眼翻雙手搐兼用之

神效

不驚圓

出鮑氏方

治驚風上視氣急

枳殼

炒黃 淡豆豉等分

右為末每服一字或半錢急風薄荷自然汁下慢風

荆芥湯下入酒五滴非慢脾風足冷者不治

猪牙皂角

四定不灣者去皮

白礬

半錢

右為細末小者一字大者半錢温湯調下此藥不治

大吐但微吐冷涎便醒

驚風後瞳人不正

阿膠錢三人參錢一

治小兒驚風出洛生候梓方

白羊頭一箇丁香一兩

右同熬至軟用乳母盡食之空心

二聖膏一名蟬殼散治小兒眼口喎斜

蟬蛻一兩五月五日取東行枝上者寒食日麵一兩

右為末醞醋調傅紙攤如膏藥貼患處左斜貼右右斜貼左如口正水洗下一方取七月七日東行枝上

蟬退依前法用

防風丹出仁存方治驚風神困睡

全蝎 白附子

右為末蜜丸如龍眼大每服一丸用麝香荆芥湯下

南星醒神散指出直指方治小兒驚風痰熱

天南星不去皮切片生薑切片

右用竹枝一條以南星并薑相間挿定次用輕粉腦子摻南星生薑片間風乾為末每服一字薄荷紫蘓

泡湯調下大人服半錢或吐或汗或下即病氣出也

奪命散

一名辟名散  
出醫方大成

大控風涎不問慢風急驚風壅痰

塞咽間其響如大潮百藥不能過咽命在須臾醫者

技窮以待其盡殊不知世有妙方服此藥裏良久藥

裏涎隨有便過如稠滓膠粘乃藥之神效之功然後

隨證用藥調理如無此證不須服一方次服花蛇川

烏全蝎蜈蚣等藥治慢驚此藥神驗不動臟不傷真

氣

青礞石

焰硝各一兩

右沙窩子鹽泥固濟炭火煨通赤須待硝盡為灰藥

令加金色取出研為極細末靈膏薄糊丸菴豆大每

服二丸如急驚風痰壅上身熱如火濃煎薄荷湯入

少許調勻微溫服之煎荊芥湯調下如慢驚風脾用

南木香煎湯調下礞石焰硝古文錢古文錢葦雖能

利痰然其性非胃家所好須以木香佐之加青州丸

三粒研為細末用生薑自然汁調若稀入熱蜜調勻

微温服但先用此藥入喉其痰墜下功有萬全奪天地之造原得之聖僧累累有驗

治小兒驚神不安

出本草

以虎膽研水服之

治大人小兒口噤牙關不開者

天南星

生末一錢腦子少許

右和研用指蘸生薑自然汁蘸藥於左右大牙根上立開

治小兒夜驚大人因驚失心方

取震肉作脯與食之此畜為天雷所霹靈者是也服之神效

羚羊角丸

出全嬰方

治小兒驚風退後諸病之後筋脈緩弱

骨氣虛裏脾腎不足五六歲不能行

羚羊角

虎脛骨

生乾地黄

酸棗仁

去皮

白茯苓

苓

各半兩

桂心皮

防風

當歸

黃芪

各一分

右為末煉蜜為丸如鷄頭子大兩歲一丸白湯化下

錄定四庫全書

卷三百七十四

意飲散 出全 治小兒因驚風及諸病之後手攣不展是

肝氣不足內傷風邪

薏苡仁 分三 當歸 桂心 各一 酸棗仁 去皮 甘草 防

風 秦艽 去苗各半兩

右為咀三歲一錢水半盞煎至三分去滓無時服

當歸散 出全 治小兒驚因風及諸病後脚不展指攣縮

不伸

當歸 麻黃 各半兩 羌活 人參 杜仲 去皮 酸棗仁

去桂心一分

右為末一歲一錢水一盞薑三片煎三分去滓無時

服

治小兒未滿月驚看似中風欲死者

用硃砂以新汲水濃磨汁塗五心上立瘥最有神

效

小兒浴湯主驚忤 出幼幼新書

以升麻取葉搗汁作湯浴之

治小兒驚方

取鷺窠與鷺屎同作多少以作湯浴兒療驚邪也

治小兒被驚方卒驚似有痛處而不知疾狀

取鷄冠血一二歲每服用少許滴在口中三四歲

如每服取一掬斗子詐滴在口中一日二服

治小兒生便喜驚方

出聖惠方

用剪父母指甲燒灰并花水丸麻子大日進三服

夜一服亦治客忤一方麵糊為丸

全蝎散

出直指方

治小兒驚風不語通竅豁痰大小通用

全蝎七枚各用紫蘓葉包塗蜜炙為細末每服一

字薑汁入蜜搜和含化亦治大人風涎一方薄荷

葉裏灸同研為末湯下

治驚風墜涎

出傅氏活嬰方

用天南星一箇重一兩酒浸七伏時取出於新瓦

上周迴炭火炙令乾裂置於濕地上去火毒用麩

器盒盛之冷搗末用硃砂一錢每服半錢荊芥湯

調下每日空心午時進一二服

一方治小兒牙關不開

用天南星一箇煨熟紙裹封角不要透氣於細處

煎鷄頭大一竅子透氣於鼻中牙關立開

又方出全嬰方治小兒眼中喎斜

以巴豆七粒爛研喎右塗右手喎左塗左手心喎

仍用水一盞安手心須臾即止洗去藥并頻抽掣

中指立效

治小兒驚風出本草

用蝎一箇不去頭尾薄荷四葉裹合火上炙令薄

荷焦同碾為末作四服湯下大人風涎只一服

治小兒驚疾皆因積氣風熱成痰涎驚藥多用硃蝎附

性烈力大凡嬰兒腸胃脆弱多不堪任致害用遠志

去心煎湯隨時飲之

辰砂丸 治驚風涎潮作及胃熱吐逆不止

辰砂另研水銀沙子各一分龍腦 麝香半錢天麻一分牛

黃半錢 蟬蛻去頭足 白殭蠶 乾蝎一分去毒炒 牛犀末

麻黃節去 天南星酒浸七次切焙乾各二分

右為末再研勻熱蜜為丸如菉豆大硃砂為衣每服一二丸或五七十九食後服薄荷湯送下

大青膏

天麻一分末 附子末生一錢半 青黛一錢研 麝香一字七 烏

稍肉酒浸為末半錢 天竺黃一字七

右同再研細末生蜜和成膏每服皂角子大月中兒

粳米大同牛黃膏温薄荷水化一處之五歲已上同甘露飲服之此謂膏也應服藥多少遂方說不盡並時以意加減

羌活散指出直指方 散風邪止驚搐退熱解肌

羌活 粉草 天麻生 茯苓 川芎二錢 荆芥穗

白殭蠶 白朮 白附子一錢 桔梗二錢半 防風一錢半

全蝎半錢 硃砂 南星一字

右為細末薄荷湯下如傷風鼻塞流清涕葱白煎湯

下或嗽氣促桑白湯下常服白湯亦可

甘露飲出朱氏集驗方治驚風潮熱不退

寒水石 石膏 防風 荆芥 薄荷 甘草各

分

右為末每服半錢用井花水下或薄荷湯亦可調下

桃花散出朱氏集驗方治驚風潮熱煩悶

天竺黃 白茯苓 硃砂各等分 腦 麝少許

右為末每服一字薄荷湯下一日二服

酸棗仁丸出楊氏家藏方治小兒心神不安取睡不穩常服壓

驚邪寧卧睡

酸棗仁 人參去蘆 硃砂研 白茯苓去皮 真珠末

右件為細末煉蜜為丸每一兩作四十九丸每服一丸

荆芥湯化下二歲以上小兒服一丸食後服

透驚散出楊氏加減方治小兒筋脈拘攣不舒手足軟弱虛羸

無力驚風搐之後偏癱不舉常服透經絡或血脈及

行步遲慢者

天麻酒浸一宿焙乾 白附子 牛膝酒浸一宿 木鱉子去殼研 當

歸酒浸一宿焙乾 羌活去蘆頭六味合半兩 地龍去土一分 乳香二錢別研 硃

砂一錢別研 沒藥二錢

右件為細末次入木鱉子乳香硃砂沒藥研勻煉蜜

為丸每一兩四十九每服一九煎薄荷湯化溫酒少

許同調下

定痛散出幼幼新書 治小兒筋脈因驚之後觸冒風邪客傳

經絡走注疼痛或在手指腿足往來刺痛不可忍者

天麻去苗 防風去蘆 地龍去土 白殭蠶去絲嘴 乳香研 五靈

脂去沙 沒藥各等分

右為細末次入沒藥乳香同研合勻三歲兒每服半

錢溫酒白湯合一半調下不拘時候服

蜈蚣丸出朱氏集驗方 治驚風

白附子 天南星 赤脚蜈蚣 防風 半夏各等分

右剉研諸藥剉地一小竅用炭火煅煉約半日尤好

地脈透熱入好醋在竅八分滿傾諸藥入醋煮之用  
 甕盆一隻快種蓋住以泥封四圍至次日相對方取  
 出焙乾碾為末用獺猪心血研同蜜煉熟為丸不拘  
 丸子大小同薄荷湯下仍量兒大小投藥余年七歲  
 感患得此方而愈神效難言

防風導赤散 治小兒初驚

生乾地黄 川木通 防風 甘草 各等分

右生用吹咀每服三錢水一盞竹葉少許同煎

神寧膏 後用此藥

茯神 硃砂 各一兩 麥門冬 去心一兩 麝香 一分

右碾細煉蜜為小餅子每服一餅臨睡同薄荷湯化  
 服一夜一服二方阿絕制智大云昨在江州日兒子  
 偶有驚作遂訪一老醫求藥劑服三服隨全愈遂師  
 問之渠云三代小兒科家傳只有四五藥加減愈人  
 無數且如驚搐多是熱證若首先便用驚風藥白附  
 子全蝎殭蠶川烏之類便成壞證家中驚藥只用導

赤散加此防風進一二服導去心經邪熱其搐隨便  
上次服寧神膏是家傳此本自後當以二藥救人取  
效甚多

羌活膏 祛小兒驚風定驚

羌活 防風 川芎 茯苓二錢 茯神去木二錢 白朮

白殭蠶薑汁炒各二錢 全蝎半錢

右為末煉蜜為丸每服紫豆大麥門冬薄荷湯化下

防風天麻散 治驚風頭疼

防風 天麻 川芎 白芷 甘草 川烏一箇炮

麻黃去節

右等分為細末葱蜜湯下薄荷湯亦可如驚搐加全  
蝎一箇烏蛇肉尾白附子麝香各少許羌活煎湯下  
無不效者如傷加零陵香羌活

辰砂丸 治小兒伏驚積在內壅併痰涎疝及癖取虛

中積轉驚

辰砂錢一 定粉兩半 粉霜分半 膩粉錢一 麝香少許 乳香半字

次定四庫全書

普濟方

四十一

右用研細末用粟米飯和丸如菉豆大捏作餅子慢取火用微炮令紫色用粟米飲下一丸微利為度

錢湯丸 治小兒驚積壯熱

猪牙皂角灰錢一 硃砂錢一 天南星錢半 滑石錢末一 輕粉

錢二 巴豆二十四粒  
去皮尖

右為細末研以寒食麵為糊丸如菉豆大每服一歲

二丸三歲三丸煎錢湯睡時服之

睡應丸 治驚吐漸止得睡方用之

南星 白附子 青黛 硃砂錢一 雄黃錢一 輕粉字一

全蝎 金箔片三 腦子 麝香許少 巴豆七粒去殼  
心膜去油

右為末用生薑汁糊為丸鐵鹽粉為衣每服七丸荆芥湯下如常服木瓜湯下如驚風麝香湯下

金箔丸 治一切驚風

麻黃兩半 羌活錢三 殭蠶錢三 南星錢二 防風錢二 蟬退三十箇去

鬚硃砂錢二 麝香錢一 人參兩半 茯苓兩半 茯神錢三 全蝎兩半

山藥錢三 遠志去心半錢 金箔片十 銀箔片十

右件為末砂腦麝另研入藥煉蜜為丸如指頭大每服用一丸臨睡薄荷湯下痰多皂角子湯化下

蚰蛸丸 治一切驚風心神驚悸夢中佯啼蹠嘆潮熱

上盛蒸驚熱自青色丹火灼手足抽之捉抽弱無時

情性憔悴

茯苓 茯神 山藥 天麻 殭蠶炒 蟬退 防

風 羌活 人參 白附 遠志去心 川芎 白芍

蟬花三隻 荆芥 全蝎 赭石 粉草 琥珀 珍

珠 硃砂 腦子 麝香 金箔 牛黃另研 早伏

即紫荷車酒浸過

右為末用木瓜蒸麵糊為丸煎作定子如粟米樣硃砂為衣如驚時麝香湯下如尋常鈎藤湯下

小蚰蛸丸 治一切驚風手足搖動心神恐悸卧睡不

安

蟬蛸是蝎雄 白附子 朶粉 硃砂 青黛 香墨

金箔 青柳條 細茶 麝香 防風 羌活

白礬 天麻 茯神 遠志 山藥

右為末棗肉木瓜同搗爛飯為丸煎作定子硃砂為衣周歲一二粒金銀薄荷湯下或麝香湯下

聖蠶丸 治小兒胃虛生風壯熱精神恍惚痰涎壅塞

目睛上視睡卧不安頭痛頰赤多驚恐四肢體倦不

思乳食

白殭蠶微炒 防風去蘆 天南星漿水煮五七沸 半夏先洗淨用水煮五七

沸 白附子漿水煮五七沸 人參一兩 藿香半兩

右為細末麵打薄荷糊為丸如麻子大周歲兒每服五七丸用生薑薄荷湯下不拘時候兩三歲兒可服十五丸餘當以意加減

青金丹 出傳氏指新方 治驚風身熱手足搐搦喉中涎鳴心中

不快睡卧不安面赤嗽咳口眼喎斜不消人事或天

弔角弓反張

輕粉 天南星 滑石 青黛各一字 巴豆十粒去皮去

膜 全蝎十箇 辰砂一字 蟬退七箇 夜明砂半錢 天將子一錢 白

附子一錢麝香許少

一方加天麻酒浸一錢殭蠶錢一半夏半錢或水煎

右為細末用麵糊丸如麻子大每服二十九看大小加減與服如不利更加錢環薄荷湯下疝腮或痰甚葱白湯下脈壅杏仁湯下如不語急與服之風痰退愈

寬熱散 治驚風潮熱客忤甘痰等積

枳殼一兩大黃二兩朴硝研甘草半兩

右為末用錫盒藏之每服一字薄荷煎湯下

茯苓散 出傳氏活嬰方 治驚風徧搐

茯苓 牙硝 雄黃 硃砂各半兩

右為末金銀薄荷湯下

蝎紅丸 出傳氏活嬰方 治驚風頑痰上視

南星 全蝎 硃砂 膩粉 腦子

右為末金銀薄荷湯下

小驚藥 出傳氏活嬰方 下痰疎風

茯苓 茯神 山藥 蟬退 羌活 遠志去心 僵

蠶 白朮 白附子 荊芥 川芎 赭石 鐵

朶粉 硃砂 金箔 麻黃 甘草

右為末木瓜蒸和爛飯搗成丸如粟米大剪成粒子

每服用一九金銀薄荷煎湯化下或以木瓜皂角湯

下

羌活膏出微生家寶方 治驚

羌活 五靈脂 荊芥穗末 青黛 蟬殼 龍腦

薄荷 白殭蠶 茯苓一錢 輕粉半錢 天南星

右處為末煉蜜為膏每周歲一搗梅核大薄荷湯化

下一日三服於牛黃散相間服

牛黃散指出直指方 治驚風搐搦心經伏涎不作聲悶絕身體

強直

雄黃一錢極細 地龍半錢在裏提去土新瓦上焙乾

右二味一處為末每服周歲半錢已下薄荷酒調下

服一稔驚再作可進此藥一日二服不可多服要快

用細赤地龍一條和酒研加稠

防附湯 出微氏加減寶方 治小兒驚風及一切頭風

防風 一分 殭蠶 一分 白附子 一分 川芎 二分 荆芥 一分 雄黃 錢一

全蝎 七箇 硃砂 麝香 少許

右為細末每服半錢用好茶清調下小兒驚風用冬

瓜子湯下一日兩服

育嬰丸 出微生家寶方 治小兒驚風

用京墨末不以多少入鷄冠血拌和為丸如菘豆

大用生薑薄荷湯吞下每服二三丸不計候

治小兒貓鼠驚風 出十便即方

用雄鼠糞七粒火煨出於地下去火毒研為細末

薄荷湯調服麝香少許尤佳

全蝎散 出微生家寶方 治小兒驚風

全蝎 七箇 生薄荷麻黃不拘多少外以線纏定再

炙如乾又入薑汁內浸再炙以薑汁煉為度焙乾為末却入後藥 附子尖 三箇 麝香

一真腦子 一字

右為細末同前藥拌勻煎金銀薄荷湯調下小兒半

錢量歲數虛實加減服之

銀箔散出微生家寶方治小兒驚風

白朮一兩到以一合 乾藥一兩 白附子半錢以文武火上炮黃地

上去 人參一兩 白茯苓一兩 直殭蠶一分洗去灰木

香一分 黃芪一兩 白扁豆一兩 川升麻一分失過 糯粟米

半兩 天麻半兩到如寒 甘草一分 藿香半兩去土生用

右為末以好菟罐盛過有浣衣湯便用常服米飯調

下小兒半錢歲數以上加減用慢驚搐搦用麝香飲

調下日進六服急驚定後用陳米飲調下驚吐不止

陳米飲調下天桂倒行步脚軟濃米飲下夾驚傷寒

發搐者薄荷葱白湯調下疝氣常急多渴者百合湯

調下赤白痢不思乳食者生薑三片棗五箇陳米一

合煎飲調下飲食不知饑飽不長肌肉麥藥一把炒

生薑湯調下暴瀉湯紫蘇木瓜湯調下形神脫段言

不正及大人吐瀉藿香湯下二錢

牛黃膏 出微生家寶方 常服鎮心化驚涎

鬱金 錢一 天南星 錢一 粉霜 錢一 巴豆 七粒連殼

右一處為末麵糊丸如芥菜子大每服周歲四粒薄荷湯下日二服食後臨睡時服凡小兒驚涎未可與巴豆粉霜等藥恐虛邪脾轉不好治且宜服惺惺散涎積不退却進此藥

生犀散 治驚積潮熱及五心積熱及驚吐涎傷乳食卧睡不靜常服寧心安神

五靈脂 一兩 猪牙皂角 一兩 芫花 一兩 醋 浸炒焦

右三味一處為末次用巴豆六十粒連殼碾如膏用小錢桃藥四十錢入巴豆內一處再研令極勻用醋糊丸如粟米大周歲四粒食後臨卧薄荷湯下日二服驚吐丁香湯下或淡醋湯下咳嗽皂角子煨軟搥泡湯下白痢甘草薑湯下潮熱薄荷礬力水下驚熱亦用柴胡湯下磨積及癖塊溫水下

青州白丸子 出錢氏方 治小兒驚風大小諸風

半夏七兩生 天南星三兩生 白附子二兩 川烏頭半兩生 去皮臍

右搗篩為細末生絹袋盛一處用井花水擺末出者更以手揉令出如有滓更研再入絹袋內盡為度於甕盆中日照夜露至曉棄水別用井花水攪又照至來日早再換新水攪如此春五日夏三日秋七日冬十日一法四時只浸一宿去水照乾後如玉片研細以糯米粉煎清粥丸綠豆大每服三五丸薄荷湯下癰瘕風溫酒下並不以時候服

不驚丸

出宿州 陳氏方

治小兒因驚氣而吐逆作搐痰涎壅塞手足掣縮眼睛斜視若睛珠上視或上氣急足脛冷者難愈也

枳殼去穰炒黃 取末一兩 淡豆豉七錢 蕪荑仁三錢 蝎稍十二尾 鹽者去毒

右四味同碾為細末醋糊丸如麻子大每服百丸乳汁下清水飲亦得量兒大小輕重加減

夫治驚各因用藥不同外物驚宜鎮之以黃連安神丸

若氣動而致驚宜寒水石安神丸大忌防風丸治風辛  
 溫之藥必殺人何也辛散浮溫熱者也能令母風動流  
 動風之氣盛故殺人也因驚而泄青色先鎮之以硃砂  
 汁之類勿用寒涼之藥氣大禁涼驚丸風木旺必尅脾  
 胃當先實其土後瀉其木閻孝忠編集錢氏方以益黃  
 補土多以其藥有丁香辛熱助火火旺愈虛矣青橘皮  
 瀉肺金丁香辛熱大瀉肺與大腸脾實當瀉子令脾胃  
 虛反瀉子而助火重虛其土殺人無疑矣其風木旺證

右關脈洪大掌中熱腹皮熱豈可以助火瀉金如寒水  
 來乘脾土其病嘔吐腸痛瀉痢青血益黃散聖藥也今  
 立一方先瀉火補金是為神治

黃耆湯

人參 炙甘草 黃耆

右三味皆甘溫能補元氣甘能瀉火內經云熱淫于  
 內以甘瀉之以酸收之

白芍藥

酸寒能瀉火酸未  
 補得金土之位火旺火虛風木何由散來

剋土然後  
瀉風之旺

右等分吹咀白水煎服

治小兒暴驚鬼魅寒熱

用野獼猴頭煎湯浴之人家養者不治病不可用

神仙聚寶丹

出保集方

治一切驚風內吊腸肚緊便夜啼發

目睛上視手足搐掣角弓反張忽然倒地不省人事

係是急慢驚風悉皆治之

全蝎

二三箇

珍珠

三錢

硃砂

五錢

防風

五錢

天麻

五錢

白附子

五錢半夏

三錢南星

三錢半

蟬殼

三錢

麝香

一錢

金箔

十五片

右為末十三味用粟米粥為丸如鷄頭子大每服一

丸用薄荷湯磨化下如驚風痰實加南星末同研化

下如驚風內吊用吊藤湯化下

神妙防風散

出保生集

治小兒一切驚風搐搦諸般惡候治

之

防風

二錢

細辛

二錢

僵蠶

二錢

白附子

一錢

硃砂

一錢

地龍

一錢

三錢全蝎

三錢火炒

蟬殼

三錢

蜈蚣

各三錢

天麻

一錢

荆芥

一錢

一錢 木香 一錢 麝香 一錢 甘草 二錢 白芷 一錢 辰砂 二錢 人參 一錢

金箔 少許 輕粉 少許

右為細末每服一字用燈心煎湯調下有痰薑湯下

南星丸 治小兒驚熱喉中響咬齒牙

南星 半錢 天麻 半錢 全蝎 半錢 硃砂 麝香 少許

右為末麵糊為丸每服七丸用金銀薄荷湯送下

鎮心丸 治小兒涎潮壅盛喘急壯熱膈上涎鳴如服

此藥只取下涎藥立隨涎出

辰砂 半夏 杏仁 江子 三

粒去皮膜 去油五分

右拌勻和煮陳米粥為丸如芥子大量大小加減每

服三五丸生薑薄荷湯溫下利涎

消乳痰丸 治小兒無痰亦宜常服

大半夏 神草 二

半兩切作豆子大用蘿蔔一箇也 切作豆子大半一碗水煮盡為妙 半去蘆取 末二錢

右二味焙乾為末生薑自然汁煮麵糊為丸如綠豆

大每服二十九薑湯食後下量大小加減

牛黃丸 治小兒驚風涎盛

右用天南星二兩為末取臘月日牛膽黃牛者良一枚以汁和之却入膽內陰乾為細末入硃砂一錢麝香少許煎甘草水和丸如鷄頭子大一歲半粒熱水下不拘時日進二服

墜驚散 治小兒驚熱甚效

天竺黃 鉛霜 馬牙硝

右為末每服半錢用熱水調下

青雲散 孩兒咬啣即因驚唇赤饒于面色青睡起有時頻叫喚青雲散下早惺惺

石蓮心一錢 南星炮 殭蠶直者 全蝎 鉛霜一錢 雄黃

鬱金皂角煮乾

右為末每服一字或半錢用蜜下

羌活膏出保生集 治肝驚壅目直視手足拳攣伸舒立地不

得寬筋定搐

羌活 蝎稍 回草即防風 天麻 神草 木瓜

當歸 紫蘓根 麝香一分 硃砂 白附子半錢

右除麝香外細剉用酒浸一宿日慢火焙乾為末入麝香和勻用炒砂糖為膏常服一皂角子大如驚急作搐瘈瘲每服一龍眼大荆芥湯化下先搐鼻後下藥若石疔連難治

翫月散出保生方治小兒驚風搐搦眼目上視此藥搐鼻日時便下搐搦便定絕搐鼻如嚏噴可治不爾死也

獨角仙一箇竹刀中切作二片 輕粉 大全蝎一箇竹刀切作二片

右用輕粉拌和炙令乾二味在邊歸左右為末入細辛末半錢麝香一豆大研勻成藥在邊獨角仙同前法却書藥上字記左右邊二字男左女右用

奪命散出保集方治小兒驚風涎潮搐搦眼上下喘急急

慢驚風並皆治之

赤脚蜈蚣一條去足生用 瓜葉 藜蘆 葱白去鬚一分

右為末每發搐用一字吹鼻中

琥珀珍珠散 出保生集 治驚風

全蝎 殭蠶 硃砂 輕粉

右為末各等分每一字用妳乳調下

辰砂妙聖丸 治小兒驚風生痰涎時作搐搦壯熱驚

掣夜卧不寧牙關緊急

麝香 川芎 羌活 天麻 當歸 膽釀南星

半夏 湯洗七次煮一伏時各半錢 蝎稍 殭蠶 辰砂 一錢半一錢

半入藥 一半衣

右末拌勻糯米清糊為丸如鷄頭子大每服一九荆

芥湯化下如噤口用藥擦牙上

滾痰丸 治小兒喉中涎響手足瘈瘲目睛上視即急

慢驚風證

江子 半夏 硃砂 膩粉 雄黃 鬱金 或加南星

尤妙

右等分為末飯丸如麻子大每服七丸用薄荷湯送

下量大小加減服之利痰涎為度未利再服

辰砂丸出保生集治驚證嘔逆乳食不卧不寧治之

人參一兩茯苓半兩防風半兩山藥 甘草半兩黃耆 牙

硝三錢麝香三錢硃砂一兩

右為末蜜丸每一丸薄荷湯下

普濟方卷三百七十四

欽定四庫全書

普濟方卷三百七十五

明 周王朱橚 撰

嬰孩驚風門

急慢驚風 附論

夫急驚因聞大聲而發或大聲搖發過則如常此無陰也當下利驚丸主之小兒急驚者本因熱生於心身熱面赤飲引口中熱氣大小便黃赤處則搖也蓋熱甚則

生風風屬肝此陽盛陰虛也故利驚丸主之以消其痰  
熱不可與巴豆及溫藥大下之恐搖虛熱消也小兒客  
痰熱於心胃因聞聲非常則動而驚搖矣若熱極雖不  
聞聲及驚亦自發搖慢驚病因後或瀉吐脾胃虛損遍  
身冷口鼻氣出亦冷手足時候癡昏睡露睛此兒無陽  
也括萋湯主之

凡繁陰陽異証切而辨治之急驚合涼瀉慢驚合溫補世界俗方多不分別証

誤小兒甚多

又小兒傷於風病吐瀉醫謂脾虛以溫補之不  
以清涼藥治之不能察其本來之病而任意亂攻之因

脾氣本虛內不能散外不能解至十餘日其證多睡露  
睛身溫風在脾胃故大便不聚而瀉當去脾間風風退  
則利止以宣風散主之後用史君子丸補其胃亦有吐  
利久不瘥者脾虛生風而成散慢驚 驚癇發搖目作  
左視無聲右視有聲膏發搖目右視無聲相勝故也更  
有發時症 早晨發搖因潮熱當卯辰時骨身壯熱上  
視手足動搖口内生熱涎項頸急此肝旺當補腎也地  
黃丸治肝瀉青丸主之早發搖因潮熱巳午未時搖發

心神驚悸目上視白睛赤色牙關緊口內涎手足動搖  
此心旺也當補肝治心導赤散涼驚丸補肝地黃丸主  
之 日晚發搐因潮熱申酉戌時不甚搐而喘目微斜  
視身如熱火旺露睛手足冷大便淡黃水是肺旺當補  
脾益黃散治肝瀉青丸治之心導赤散主之 夜間發  
搐因潮熱亥子丑時不甚搐而卧不穩身體溫壯目睛  
緊斜視喉中有痰大便銀褐色乳食不進多睡不省當  
補脾治之益黃散涼驚丸主之 傷風後發搐傷風後

得之口中出氣熱呵欠煩悶手足動搖當發散大青膏  
主之小兒生來怯弱者多此病也口傷食後得之身體  
多唾或吐不思食而發搐當先定搐退白餅子下之後  
服安身丸 百日內發搐真者不過三四次必死假者  
頻發不為重真者內生驚癇假者外傷風冷蓋血氣未  
實不能勝任及發搐也欲知假者吊氣出熱也治之可  
發散大青膏主之及用塗顙浴體法口李司戶生病百  
日發搐三五次請二衆醫治或作天癇或作胎驚癇皆

無効後錢氏用大青膏如小豆許作一服發之復與塗  
顛治節之及浴法三日而愈所以然者陽初生肌骨嫩  
怯被風傷之子不能任故發搐頻發者輕何者客風在  
內每遇不任即搐搐稀者是內臟發病不可救也頻搐  
者宜散風冷故用大青膏不可多服蓋兒至小易虛易  
實多即生熱止一服而已更當封浴無不効者 李寺  
丞子三歲病搐自卯已至數醫不治召錢氏治之搐目  
右視大叫哭李曰何以搐右錢曰逆也李曰何以逆曰

男為陽而本發左女為陰而發右若男目左視發搐時  
無聲女發時右視無聲左視有聲所以然者左肝右肺  
肺金肝木男目上視肺勝肝也金來刑木二臟相載故  
有聲也治之瀉其強而補弱心實者亦當瀉之肺虛不  
可瀉肺虛之候悶亂哽氣長出氣此病男反女故男易  
治於女也假令女發搐目左視肺之勝肝若病在秋即  
肝魚旺位肝不為任故哭叫當大瀉其肝然後治心續  
肝所以俱言目反右視者乃肝其主目也凡搐者風熱

相搏於內風屬肝故引之見於木也錢氏用瀉肝湯瀉之二日不悶亂當知肝病退後用地黃丸補腎三服後用瀉青涼驚丸各二服丸凡用瀉心肝藥五日方愈不忘治也又言肺虛不大瀉者何也曰設令男目右視木反尅金肝肺勝肝而但瀉肝若更病在春夏金氣極虛當補具肝慎勿瀉也 凡治急慢驚風合溫補此是古人多用凡藥性涼者不可泛用宜審別之錢氏云急驚合涼瀉慢驚風合溫補此是定法也其間有急驚涼瀉

不愈變為慢驚有慢驚溫補而不愈者變為急驚至相更變者亦多矣所以古人撰一方藥治急慢驚觀前或變之證其意有理惜乎當時有失詳註而兩交互者宜用通治急慢藥 急驚變為慢驚者因壯熱精神恍惚忽發驚搐醫以吐下藥太過多以涼驚藥不愈在再經日脾虛不實昏睡露睛涎鳴氣籠肢冷腸疼時作瘕瘕此急驚變成慢驚也張氏云急驚不除進退不定在再經日乍靜乍發嘔吐痰涎氣鳴潮搐為慢驚 慢驚變

為急驚者因傷乳食或吐或瀉時作瘳瘳醫以溫熱藥太過以暖驚藥不愈體熱痰盛面赤目紅大便不通小便赤澁舌白唇紅或發驚搐此慢驚變成急驚也錢氏云慢驚多因性太溫及熱藥治之有驚未退而別生熱證者有病愈而致熱證者有反為驚者甚多以上二證互相更變者蓋小兒易虛易實也夫驚搐握拳者有陰陽兩證陰者拇指在內陽者拇指在外陽拳者順陰拳者逆也 夫因驚則氣亂故上下不通併於中焦氣壅

則痰聚不散故氣結噎哽抑而虛歎此驚之先兆也 有久患癩疾者必須哽氣實者天霜散吐涎或珍珠丸利驚丸下涎或命散吹鼻令關膈通利更與安神膏補之琥珀散除驚氣虛者對證用藥 驗驚搐先證目斜目眈目青目斜目闕目瞪聲啞聲顫聲輕啞口弄舌捲舌露筋噓氣哽氣噎氣撮唇忽然定睛吐涎吐沫拗頭仰身搖頭擦面藏頭畏明手攣手顫脚弓不伸忽撩忽亂精神恍惚失張眠睡不寧睡中喜笑因憂甚艱心煩

躁熱啼哭咬人面臉弄色或紅或青伸舒用力微微作聲以上證候不久必發驚癇須預防之驅風膏琥珀散更擇對證藥頻吮乳大便青吐痰吐食瀉酸瀉醒吐嫌多因瀉怕脫形晝眠黑夜起頻動瘡痢無度涎喘作聲虛腫臍冷盜汗骨蒸諸竅失血諸渴七津諸病進退必戒慢驚以上證候久則必發陰驚預防安神膏琥珀散更擇對證藥治之活幼口議云驚者總名也嬰孩小兒心氣不足智志率伏恍惚無定神不守舍怯人怕物

漸成怖畏怖畏之盛已作恐懼恐懼多之乃抱怔忡怔忡之久則自惕愕惕愕既有瘳瘳已為斯乃心氣不足而生之漸但分輕重耳又有心氣虛弱暴觸作驚更不由漸便即面青唇白視之定睛目無所見聽之閉瞶耳無所聞精神頽亡心智全失及至良久收斂且五臟六腑虛處所受驚風而作疾世之幼幼者多因乳母不意之間耗動其心氣乃以漸而作驚凡小兒之驚因水火所加者悸也自跌撲所致者恐也自人物所觸者愕也

惕惕不散鬱鬱結於胸中者怔忡也由是觀之積驚難散皆由平日氣壅不能自化如恐恐悸悸者蓋亦不能知之矣不能自知所以常生怖畏偶因觸動心神發驚其肝主風其肝生痰其肺作熱其心發驚四證相臨重者先假如雷聲霹靂至響不為咎者何蓋聲相應情無所加矣惟有小兒在僻靜處或神廟中存怖畏之時忽被無知小人戲叫鬼來且兒奔走無門驚氣入心若不速利其驚氣少頃則指甲黑唇青所用重害不可得療

理自古及今調理嬰孩最為難事悉皆憑藥取愈其驚風至難也慢驚又難也慢脾尤難也急驚頭額角心背原被灸了者次定發癇不可常嘗謂風癇可灸驚熱不可灸蓋風與癇痰涎壅成胃胸胸堂昏亂不能省知心如所失登灸看穴痰化心散開即漸安愈驚之與熱心神常聞知被灸忍痛不能驚悸轉盛其痰差重所以用艾在先藥必未用驚風痰愈未嘗見因灸而活每見老嫗鄙婦無術只投炷兒生三日五日之間便以艾燒

之不惟失穴因痛增悖經絡未全如何愈病智者當詳不可炷灸 小兒急慢驚風古所謂陰陽癇是爾急者熱屬陽陽盛而陰虧慢者屬陰陽虧而陰盛陽動而燥疾陰靜而遲緩其治也皆因臟腑虛而得之虛能發熱熱則生風是以脾熱則風生于脾肺熱則風生于肺心亦然官天疾醫注云肺氣熱心氣傳也 驚風痰合為四證于是八候生焉搖擗掣頭反引窺視日穴候凡搭眼搖頭張口出舌唇檢一面青唇青瀉青大陽除即當青筋三關虎口紋

紅紫或青者此自驚風壯也大抵熱論虛實證別逆順治有先後蓋實熱為急驚風虛熱為慢驚風慢驚本無熱所以發熱者虛使然爾急驚屬陽用藥以寒慢驚屬陰用藥以溫其不可以陰陽無別故曰熱論虛實者此也男搖左視左女搖右視右男眼上窺女眼下窺男握拇指出外女握拇指入裏男引手挽左直右曲女引手挽右直左曲凡此順反之則逆亦有先搖左而後雙搖者但搖順則無聲搖逆則有聲其指紋刑熱掣弓入裏

者順出外者逆出入相半者難療目痒肝肝受風熱則目直視或上竄或兩背頻搭若無驗赤五心煩熱之證却不發搐必挾心熱則肝火心風二者交爭而發搐也但竄視直與瀉青丸更加發搐者以導赤散兼之大抵肝風心火乃受病之處瀉青丸去肝氣導赤散兼之大抵降心火幼幼新書以為要藥故曰別逆順者此也陽病陰脉陰病陽脉亦為反症熱盛生風風盛發搐先於截風治風先於利驚治驚先於豁痰治痰先於解熱其

若四證俱有又當兼施並理一或有遺必生他證故曰治有先後者此也綱領如此若以急慢脾風而言之則暴烈者為急驚沉重者為慢驚而慢脾則重而深矣急驚之候牙關緊急壯熱涎潮竄視反張搐搦顛動搦者十指開合唇口眉眼引頻併口中熱氣頰赤唇紅大小便黃赤其脉浮數洪緊蓋由內外有實熱外挾風邪心家受熱而積驚肝家受風而發搐肝風心火二臟爭交血亂氣并痰涎壅塞所以百脉凝滯關竅不通風氣

蕃盛而無所流故暴烈也治法大要用藥有次序通關以後且與截風定搐痰熱尚作乃下之痰熱一泄又須急與和胃定心之劑如搐定而痰熱無多則但用輕藥消痰除熱可也然急驚雖當下切不可過用寒涼及錫粉巴硝葷蕩滌太驟水銀輕粉巴豆芒硝巴霜蟾酥腦麝等劑醫家不得用之僅去疾即止或不當用而用或當用而過焉往往由此成慢驚矣下痰熱不慎用銀粉巴硝但能斟酌大略可也欲下之法須當審問前日已

下未下或曾經吐瀉否已下及吐瀉者不可再下但驅風化痰消熱而已大約痰熱十分且泄其三之二下劑中須以枳殼菖蒲寬氣通心之類佐之蓋急驚急在一時治之不可寬緩稍緩則證候轉深若一時體認未明又不可妄施藥餌截風定搐先用通關噴驚輩次則人參羌活散截風丸一字散陽痲散擒風湯定搐散瀉青丸木通青寧散阿膠散以急擇用下劑有三輕下則用定命散防風利驚防風湯宣風散枳殼散小柴胡湯葷

稍重下則用揭風湯殊砂疎風散柴胡加大黃湯重下  
則用青金丹天麻丸蘆薈丸牛黃涼膏丸青金丹王監  
驚黑丸輩後和氣助胃氣如生氣散銀白散苓二陳湯  
異功散天麻蘇合香丸參苓白朮散和中散醒脾散之  
類皆可選用定志寧神則以定神丸溫膽湯定心丸柏  
枝膏與之他如太乙保生丹聚寶丹蟬蝎散不冷不熱  
祛風鎮驚之劑又當繼此以防其再發也下之後諸證  
猶存者未易痊愈更發再下當作慢驚理之具有搐搦

反張斜視而牙關不緊口無涎痰者未可直指以為驚  
風恐是傷風傷寒傷食成三等證成夾驚傷寒錢氏假  
搐之說傷風夾驚神困昏悖頭疼氣熱先用人參羌活  
散怪怪散消風散輩微取其表次與天麻防風丸傷食  
夾驚身熱溫壯或吐不思食大便酸臭先用人參羌活  
散加青皮紫蘇取表消積次用驅風鎮驚之劑凡搐搦  
者不可把掘但持之風則風癇逆入經絡遂使手足拘  
攣以成廢疾此治急驚之大要也慢驚之候或吐或瀉

涎鳴微喘眼開神緩睡則露睛驚兆搐搦乍發乍靜或身熱或身冷或四肢熱或口鼻氣面色淡白淡青眉間唇間或青或黯其脉泥遲散緩蓋由急驚過用寒涼或轉下大驟傳變成之又有吐利不止而成者有氣虛暴吐瀉而成者錢氏云夏月脾胃伏熱大吐瀉者當解暑熱不可專只陽有臟腑虛洩成者成邪入于腸胃故大便不足而瀉有久痢氣脫成者有下積取瀉成者有吐血瀉血成者有感風不解誤藥成者有寒傷傳變陰

成證者得之久嗽作癇不已者有得之蟲積衝心者有得之目腫疝氣腹痛者其或日夜汗出脾困多睡煩燥引飲四肢浮腫大小便閉丹瘤腫毒龍帶纏腰走馬急疳並傳慢候惟吐瀉積痢或虛致之則證變甚速纔經吐瀉便是慢驚須用溫中扶裏或搐束緊急及慢驚初傳尚有陽證不可作急驚用藥世言陰慢驚非也若泥此往往指慢脾為慢驚矣凡慢驚男子以瀉得之為重女子以吐得之為重治法大要須當審問源流不可槩

曰慢證如吐瀉得之則理中湯加木香以溫其中五苓散以尊其水臟寒洄泄得之則先與末附湯下積取轉得之則先與調氣散外感寒邪得之則先與桂枝湯解肌湯輩其他可以類推矣然慢驚雖屬陰亦須準較陰陽虧盛淺深如何不可純用溫湯及燥烈大熱之劑惟於生胃氣中加以截風定搐如全蝎花蛇殭蠶白附天麻南星輩為良方傳慢驚候而尚有陽證者八候尚在必回陽但與截風調慢可冷可熱均平陰陽而已太

一保生丹聚寶丹蟬蝎散神保既濟丹東復丹王氏惺惺散醒脾散大醒肝散溫白丸可選用之若陽虧陰盛病已傳過純屬慢驚無搐掣反引竄視之證而但昏沉者與星香全蝎散定命飲四聖散烏蛇四君子湯天南星散烏沉香全散之屬若手足冷者方可回陽用礞黃附子慢驚下痰身煖者天南星丸蘇合香丸白丸子痰盛者神保既濟丹礞石散虛甚而不可下痰者靈脂丸七珍丸加腦麝銀粉已霜寒涼通關利腸輩一切禁止

麝雖溫然惟屬陰能化陽通脹具有陽已傳陰或者不知但有見引搐誤用腦麝銀粉及寒涼輩必為慢脾陰證者慢驚之候其眼半開半合則當預作慢脾風調理之於斯時也陰氣易盛微時刻少涎則藥方不及頻併投藥則勢又不可纔進一二劑須審有無傳變稍定則和平為愈勢篤則以剛劑投之此治投慢驚之大要然也慢脾之候面青額汗舌短頭低眼合不開困睡中搖頭吐舌頻嘔腥臭噤口咬牙手足微搐而不收或身冷

或身溫而四肢冷其脉沉微陰氣極盛胃氣極虛十樣一二益由慢驚之後吐瀉損脾病傳已極總歸處虛為脾所受故曰脾風若逐風無風可逐若瘡驚則無驚可瘡但脾間痰涎虛弱往來其眼合者脾困氣乏神志沉迷痰涎凝滯然爾世所謂慢風難療者慢脾風是也然慢一名虛氣凡小兒或吐或瀉之後面色虛黃大勢虛損若因虛而發熱繼此為得慢脾風纔見搖頭斜視以手摸人昏困喜睡額上汗多身亦粘汗其聲沉小而焦即

是脾風之證不必昏由急慢風傳次而至又當識之治法大要生胃回陽黑附湯川烏散金疫丹白丸子各半生附四君子湯可斟酌用胃氣漸復則異功散輩溫平而調理之如蝎附散靈砂散等亦可參用若其眼半開半合手足不冷證候尚在慢驚則勿回陽或已入慢脾而陽氣未盛脫者亦不可用硫黃附子丸服回陽湯劑手足漸煖者仍以醒脾散等繼其後以調之慢脾下痰輕者神保既濟丹白蠶丸重者人參膏甚則七寶散慢

驚慢脾逆惡證侯諸藥不效者如有太衝脉則取百會穴灸之此治慢脾風之大要然也雖然小兒有病問之則勿不能言望之易驚易喜診之則或慢或動自六歲以下黃帝不載其說者以其難也又瘧瘵發癇卒中天癩撮口亦風之種類焉瘧者手足冰冷瘵者舉身僵仆瘵瘵本一病當以陽剛陰柔者有汗柔肢體強直腰身反張甚於風癇大抵不治癇者目瞪涎流身神氣鬱勃四體不收沉黙昏潰似死其聲惡叫身軟時醒有聲者

為癩身強不醒無聲者為瘧瘵凡治驚遇咬牙啼叫者須與通心利小便劑癩亦多效錢氏有羊牛鷄犬猪之說大抵以驚風食三證別以治之中風者五臟各有脉證隨五臟愈以施灸法與科則同時小小分劑耳天癆者身體壯熱翻眼擡體手足搐掣其狀如天之釣又內釣腸痛多啼唇黑陰腫偃僵反張眼有紅筋斑血乃寒熱壅結蕪驚得之撮口者一臘內之驚疾臍風鎖肚癆疝症俱至撮口蓋風入心脾故令小兒氣促口撮如囊

而不乳也其初生百日頻頻吐兒呵吹來噴睡裏多驚眼翻肚脹手足緩怠煩燥多喘者當作胎驚風理之又

有變蒸亦發微驚不治自愈又瘡痘欲發亦或搐掣如風右鼻冷尻冷耳後有紅腫者必是瘡痘之症戒不可以腦麝開腠及銀粉巴豆硝轉下而水壓之是則辨之不可不審也至若眼陷無光白睛無瞳人爪甲青黑四體垂鞞一臟氣絕不可勉強下藥面赤如緋面青背冷目仰後足冷目青腹脹胸高手擎胸膈唇舌鼻黑豆魚

口氣麤顛眼顛坑啼哭無淚冷汗不止汗出如珠如油  
睛青瀉黑黑血悶涎入脉噓舌出口咬人五硬五冷五  
乾皆惡證也急驚眼時翻轉口中出血兩足擺跳腹肚  
搖動或神緩而摸體尋衣或證罷而神昏氣促噴藥不  
下通關不噤心中痛絕忽大叫者難愈慢驚四肢厥冷  
泄瀉加嗽面黯神慘胃痛顛聲兩脇動氣口生瘡胃閉  
損也髮直搖頭眼睛睜不轉涎鳴喘噎口眼手足一邊  
牽引者難痊慢脾身冷粘汗宜卧如尸喘嗽頭軟大小

便不禁背冷口噤頭搖者最難為力或者慢驚欲絕之  
時虛痰上攻咽喉氣呼吸聲大脉浮數是謂陰盛強陽  
錯認久為陽氣已後直與峻藥下痰痰隨藥下氣隨痰  
絕人以醫實殺之此則不識覆燈將絕之證雖不下藥  
亦無生意矣又有喉中痰涎聲如拽鋸一兩日間但閉  
目不絕開者此為虛候之極痰飽眷其氣然也若處下  
痰亦未可保姑以蘇合香丸白丸子輩與之他如急驚  
安靜之後兩日再發面色變易又三四日定而復發其

後淹涎必至沉重若急驚證候徒知定搐不去驚熱纔是見定遂指為安未幾復搐是為過街候若慢驚之候藥服已瘥尚須調理數日不知者或忘攻治終必復發是體認之不可不精也

方

南星丸 治小兒急慢驚風已經火炙諸般癇病

- 蛇含石 一分 石燕 並火煨酒 代赭石 硃砂 鐵粉
- 雄黃 各一錢 五靈脂 乳香 川烏 去皮 天漿子

- 二十枚 烏蛇肉 酒浸炙去 蛇皮 炙 蛇頭 一箇酒浸炙 僵蠶 去嘴角水 蟬蛻 天麻 蜂房 炒 蜈蚣 大赤足者二錢 全蝎 二錢新薄荷自然 羌活 川芎 麝香 一字 腦子 半錢

右為末糊為丸雞頭子大金箔為衣三歲一丸薄荷湯入酒少許磨或作散亦可一方酸棗仁炒去皮二錢如吐瀉後加附子炮去皮隨輕重入藥

鎮心丸 治小兒一切諸風慢驚癇常服此藥療毒不

生其驗不可盡述

烏鳥屎

一應烏鳥飛禽皆又名蘇子屎用新瓦焙乾

京墨 虎睛 麻

黃豆鼓 牛黃 黃蠟 麝香少許 珍珠 地龍

活者旋用 乾蝎十箇 南星作厚片用童子小便浸三日陰乾焙

防風 白蘚

皮 狗獾骨 硃砂 風化硝

右除麝蝎另外餘藥各等分研為細末用水飛過用銀圈杵作餅子另用麝砂為衣用井水磨一錢臨卧服而時病身熱瘡癩熱毒用薑汁磨化服急驚用水

磨二錢服餘藥對證 煩渴盤脹肚癆諸瘡疽證此

因之而發風須當體認隨某證療其病症病證去則風自去矣按錢氏方小兒搐身熱喘急目斜露睛四肢逆冷李醫業槩以定驚搐一劑與之無殊主對錢遂白之曰發搐為肝實身熱喘急為肺虛目斜露睛為肝肺四肢冷為脾虛治法先用益脾補肺胃氣稍然後瀉肝涼驚而安一證直視而不能食或謂神祟使然錢知其為肝旺勝脾與之瀉肝而愈以證吐瀉

或利小便過多以至肝脾虛不食錢用益黃散作効已經數日忽爾不語衆醫數以失音湯劑與之竟無寸効錢氏用地黃丸數劑補腎於是能言此其所以然者前乎清利小便大過遂伏脾胃俱虛難以補腎而腎尚虛故爾至論肺虛痰實治法下當下故下之必先益脾然後瀉肺經云欲瀉其子先瀉其母此錢氏要記錢氏方瀉青丸瀉白散導赤散瀉黃散宣黃散力瀉五臟藥益黃散白朮散阿膠地黃散皆補五

臟藥心中驚熱清心而熱不退則與之助胃胃不虛則熱不生或胃虛不實又且大小便難則不為之疎利益利之則胃愈虛而身必冷其有傷風寒而吐瀉者欲止吐瀉不恃溫脾須以發散之劑先之風寒散而吐瀉自止矣不恃此爾小兒平常服藥過多頑臟腑調和劑不與則易之以反擊固守之劑大過則恃和而疎利之緊小兒臟腑柔弱易實錫易熱兒有大小壯弱病有輕重淺深所貴乎目視之切意度心惟

醫權衡酌量對治用之得中為上矣頂門百會上慢驚用驚封臍或吐或瀉立効

睡紅散 治小兒急慢驚風手足搐搦目瞪神昏口眼

相引

牛黃 硼砂 腦子 珍珠 水銀半錢麝香一字青

黛 蝎尾炒 京墨炒煙 南星薑汁浸一宿 半夏薑汁浸一宿

蛇含石半錢 金箔十片 銀箔十片 烏蛇尾并項下七寸並酒浸一宿取去

皮骨炙一錢

右牛黃麝香腦子硼砂金箔銀箔先研極細末勻次入水銀砂子再將餘藥搗羅為末一處研勻每服孩嬰半字半歲一字一二歲半錢三四歲一錢以意加減金銀薄荷湯下如服搗定即使用調胃氣觀音散二三服如小兒再作氣麝發搗宜進鷄古散二三服一方薄荷無南星加味

至寶丹

雞朮一箇烏骨者凡炒去淨 牛蟾膏 天南星取心三錢 馬牙硝

欽定四庫全書

善濟方

三

二錢 血竭 三錢如無以狼猪心血代之 硼砂 蝎稍 九 枯礬 二錢

半 腦子 麝香 少許

以上為細末入雞膝內扎了用碗蒸一飯久取出懸掛却入後

至寶丹 二兩 沉香 木香 各一錢 白芷稍 一錢半 猪牙皂

角 三條去皮絃去

右為末夏加花蜘蛛一箇和前藥糊丸如蘇合香丸大硃砂金箔為衣每服一丸薄荷湯磨服

奪命金丹 治急慢驚風無藥可理者一服見効

南星 為未用臘月黃牛膽汁甘和入於膽內掛當風處陰乾百日可用 天麻 防

風 去蘆 白附子 炮 白殭蠶 炒去絲嘴 硃砂 別研 蟬蛻 去土

麝香 二錢另研 天漿子 炒二十箇 牛黃 半錢 蝎稍 四十九箇炒 赤

足蜈蚣 一條臍上開路入麝香一錢於脚用紙裏焙乾用 乾蟾 一枚炙黃去足

右為末用東流水煮白麵糊為丸如雞頭子大每服先下白朮子即和劑方者青州白丸子研為末每服半錢薄荷湯下後用生薑自然汁磨下一粒立見功

效量兒大小增減不拘時

琥珀丸 治小兒驚急慢風涎潮昏冒目瞪搐搦驚釣

腹疼及和順瘡痘小兒驚哭眠卧不安入口立効驚

癇時復發作常服永除病根

辰砂一錢半 琥珀 牛黃 僵蠶炒去絲嘴 全蝎去毒 南星

水浸夏三日春秋五日冬七日牛胆中製佳 白附子 代赭石 天麻

乳香 蟬退各一錢 麝香半字 腦子一字

右為末一歲半字薄荷湯調下慢驚加附子

保命丹 治小兒急慢驚風潮作不定涎盛氣急精神不爽病退常服除根

牛黃 辰砂二錢 麝香半錢 腦子 乳香 五靈脂

鐵粉 代赭石各一錢 全蝎半錢 蜈蚣 附子 僵蠶

炒 蛇含石煨醋淬三次各半錢

右為末白麵糊丸如雞頭子大三歲一丸薄荷湯下

萬金丹 治小兒急慢驚風亦增効

硃砂五錢 麝香二錢 珍珠錢半 白僵蠶 琥珀一錢 全蝎十箇

去尾腦子 犀角劍 乾胭脂以上三味不多 天南星錢 鈎藤

巴豆五粒 去油

右為細末薄荷湯打糊為丸如麻子大二歲小兒服一十八丸看兒大小加減丸數之急驚煎薄荷湯送下慢驚煎地龍湯下

神應丸 治小兒急慢驚風及卒中并五種癇疾或有目視髮面如桃花口眼俱閉或即俱開喉中作聲汗出如油驚風不洩時瀉黑色以上惡候但一服救之

灌藥一粒神效

真牛黃 麝香 輕粉半兩 金銀箔百片 磁石 石碌

硃砂 蛇含石 粉霜 雄黃一兩 石燕子兩箇 火煨

醋滓 七次

右為末酒糊丸梧桐子大一歲一丸薄荷湯化下入酒少許丸妙癇病薄荷自然汁和酒化下

香金丸 治小兒急慢驚風來去不定鳴昏務日

天麻 雄黃半兩 白附子 大川烏去皮 鐵粉 青黛

南星炮各一錢麝香半錢石燕子醋煨硃砂

右為末糊丸雞頭子大三歲一丸薄荷湯磨下

蛇頭丸 治小兒急慢驚風涎盛痰寒搐搦不問陰陽

但是驚後服立效

蛇頭一箇蜈蚣三條赤足者硃砂三錢鉛白霜輕粉二錢腦

子一錢麝香一錢鐵液粉 百草霜半兩蛇含石一兩

右為末糯米糊為丸雞頭大三歲半丸薄荷湯磨下

一方慢驚加附子半兩去皮尖血竭一分一方加全

蝎一分

睡紅散 治小兒急慢驚風手足搐搦目瞪口眼相引

烏蛇項下七寸寸用酒浸一宿去皮骨炙黃一錢青黛二錢牛黃半錢蝎稍

麝香一字硼砂半錢水銀砂子半錢金箔十片真珠末半錢

烏蛇尾酒浸一宿去皮骨炙黃色一分蛇黃

右牛黃麝香硼砂金箔先研極細勻次入水銀子再

研將餘藥一搗罷羅為末作一處研勻每服嬰孩半

字一二歲半錢以意加減金銀薄荷湯調下一服搐

定即使用調胃氣藥服之並無治一切風癩上視涎  
盛宜服如瀉吐後成驚手足冷者不可服

麝香膏 治小兒急慢驚風涎熱發搐

麝香 防風 草龍膽錢三 甘草 龍腦錢一 硃砂錢三

乳香兩半 天南星錢半 膩粉錢一 墨錢半 青黛兩半

右研勻蜜劑成膏每二歲兒服半皂子大薄荷湯化

下

天王補心丸 治小兒急慢驚風金箔鎮心丸蜜丸加

金箔為衣

硃砂 半夏浸十日換十遍 人參 南木香 琥

珀 杏仁炒黃色却 麝香 青木香 檳榔 葶

歷子炒黃色 江子七粒去

右各研細麵為丸蘿蔔子大每服一歲五七丸三歲

二十七丸虛者減丸數壯者加丸數硃砂為衣荆芥

湯下用蜜丸大雞頭子大為金箔鎮心丸磨化服

麝香餅子 治小兒急慢驚風進退不定日入乍靜人

動吐嘔痰涎潮搐風痲潮熱口眼偏斜項背強目睛上視及因吐利生風心肺中風宜尤服之

麝香 蝎尾 南星 蜈蚣赤足三條 川烏 白花蛇

酒浸一夕去骨皮半兩 乳香 膩粉 硃砂 牛黃各一錢

右為末酒糊丸如鷄頭子大拍作餅子三歲一餅人

參薄荷湯化下大小加減

篤龍丹一名烏稍丹出全嬰方 治小兒急慢驚風潮發不時神昏

涎盛及因吐利後生風及心脉中風尤宜服之

白附子 人參 南星 半夏泡洗七次 烏蛇尾酒浸去皮

骨焙一方用三兩水浸 天麻 全蝎去毒 防風 川附子一天

漿子二十七箇一方二十一箇

右作一處酒浸三宿取出焙為末次用水磨雄黃一兩辰砂一兩並飛同和拌入麝香二錢生龍腦一錢糯米餅為丸如粟米大三歲十九薄荷湯下有効亦作散子調下尤効

睡安丸 治小兒急慢驚風搐不定不得安睡

辰砂 乳香 血竭 麝香 全蝎 蜈蚣

酥炙黃酒 浸一宿

右為末二歲一字薄荷湯好酒煎令沸調下得睡易効

至聖保命丹 出鮑氏方 治小兒脫驚內癩腹肚堅硬夜啼發

熱目睛上視手足搐掣角弓反張但是痰涎壅盛一

切急慢驚風並皆治之

全蝎 十四箇 白附子 天南星 炮 白僵蠶 直者炒 硃砂

研麝香 研各一分 金箔 十片 防風 去蘆 天麻 各二錢 蟬退 去泥二錢

右為細末入研藥和勻粳米炊飯取中心軟者搜為

丸每服一兩作十丸初生兒半丸乳汁化下周歲兒

一丸金銀薄荷湯化下一丸一歲以上有急侯者二

丸薄荷湯化下常服鎮心安神湯化痰除一切驚風

證候一方無金銀硃砂為衣一方無天麻

蛇頭丸 出頭劑方 治小兒急慢驚風手足抽掣眼睛直視角

弓反張證候危急者

蛇含石 十箇煨三次醋淬却用甘草湯煮出酸氣研飛為末 鐵膩粉 白附

子鬱金 二兩 麝香 一兩 龍腦 別研半兩 花蛇頭 一箇酒浸用薑并肉

右為細末麵糊為丸如雞頭子大每服一丸薄荷自

然汁磨以花水開量大小加減與服

大天南星丸 出御院藥方 治小兒急慢驚風涎潮發搐目睛

上視口眼相引牙關緊急背脊絃直精神昏塞連日

不省

龍腦 研 牛黃 研 乳香 一錢 天南星 牛膽製者半兩 人參 天

麻 去蘆 防風 去蘆各一分 硃砂 研三錢 麝香 一錢半 乾蝎 十四箇湯

浸潤去土微炒

右研杵令勻煉蜜丸如雞頭子大每服一丸荆芥薄荷湯化下量小兒大小加減服不拘時

生硃膏 出醫方集要 治急慢驚風

天麻 一分 硃砂 二錢 僵蠶 白附子 全蝎 二十箇 黑附

子 一錢 麝香 半錢 蜈蚣 一條 南星 一錢 花蛇 酒浸炙乾各二錢

右為末和勻煉蜜為丸如雞頭子大每服一丸用金

銀薄荷湯化下

金銀丸 治小兒急慢驚風積

青黛三錢水銀一皂子大同寒食麵 黃明膠二錢硃

砂一兩巴豆十二箇腦麝少

右都研勻細滴水為丸如麻子大捏令褊曝乾篋盒盛一歲一丸隨意加減煎皂角子湯送下不得化破

龍腦散出錢氏方治小兒慢驚多用性太溫及熱藥治之有

驚未退而病生熱證有病愈而治熱證者反為急驚

甚多當問病者幾日因何得之曾以藥療之可用毒解之藥無不効

大黃蒸半夏湯洗剉薑汁浸一日焙乾炒甘草炒金星石 銀

星石 寒水石 禹餘糧 不灰木 青蛤粉各半

兩

右為細末研入龍腦一字再研勻新水調一字至半錢量大小與之通解毒本舊方仙暘添入甘松三兩枝藿香葉末一錢牙石一分減大黃一半治藥毒吐

血神効

奪命散出全嬰方治小兒急慢驚風諸藥不効者一丸見効

白附子炮去皮 黑附子炮去皮 南星炮 天麻 防風 半

夏泡七次 麻黃去節 硃砂 全蝎生薄荷葉裏吐生薑汁醃炙三兩度黃色

一錢

右入麝香半錢為末三歲半錢薄荷薑汁更同酒泡湯調下急驚硃砂輕粉二味加入

治急慢驚風大有神効

蘇合香丸貼一 鎮心丸貼一 牛黃清心丸貼一 天南星丸貼一

一貼 硃砂一錢 貫珠子根不拘多為末 地龍九條用半錢 真砂

糖不拘多少 麝香不拘多少

右為末極細一處拌勻每服抄一錢無根水調下

黑神丸一名醉驚丸出幼幼新書 治小兒急慢驚風

膩粉一錢 墨 白麵 蘆薈一錢 麝香研 龍腦研 牛

黃研 青黛 史君子去殼麩裏炮熟半錢

右為研勻細麵糊為丸如梧桐子大每服半丸薄荷

湯研下要利即服一丸俗名睡驚丸少不同耳前後用之重者一服即瘥一方有糖三箇或二箇不用牛黃德生堂云昔有小兒王醫賣此藥以効至富予因得方與常人治驚風極効當用之神効

妙香丸

出全嬰方

治小兒急慢驚風及傷風壯熱或結胸五

七日以上面赤大躁復腸喘簾面易五色者以龍腦水吞下一丸下惡物并藥丸即瘥

硃砂

一兩

牛黃

腦子

麝香

輕粉

各三字

金箔

十片

巴豆

二十粒去油

黃腦

六錢

右為末熬蠟為丸如小豆大三歲一丸薄荷湯下或以腦子水下如驚癇年深不過五服不復作如驚風小芥子大三兩丸馬涎積熱頰赤口乾患驚經五七日以上但是驚疳食病小兒方脉能曉者十歲菘豆大七丸虛中有積吐瀉諸痢不止臟腑疔痛者服之立効食前一方入白蜜三分同研令勻為丸

黑龍膏

出全嬰方

治小兒急慢驚風潮搐頻并胎癇發口欺

不定

烏蛇

蠶紙

一張燒灰

蟬蛻

全蝎

各半兩

硃砂

兩半

腦子

麝香

各半錢

金箔

二十片

右為末煉蜜為丸如皂子大三歲一丸薄荷湯化下

一方人參薄荷湯一名烏金膏

銀硃丹

出全嬰方

治小兒急慢驚風搐搦不定涎壅不通并

胎癩

全蝎

去毒

天漿子

炒

蜂房

各一分

硃砂

兩半

水銀

黑鉛

錫嗽

一兩二錢結炒了

牛黃

麝香

各一錢

右為末糊為丸如小豆大二歲五丸金銀薄荷湯下

全蝎散

出全嬰方

治小兒急慢驚風諸癩涎盛頭頸強直如

弓

蝎尾

一錢半

蜈蚣

字一

麝香

字一

腦子

字一

川烏尖

七箇生

星

半錢薑汁浸一宿

花蛇肉

酒浸炒一錢

右為細末一歲一字薄荷湯調下

定命丹

一名定生丹出放合用

治小兒急慢驚風天疔臍風撮口

次定命丹

普濟方

三五

搗搦奶痲壯熱

蝎尾十四箇泡 天麻半 天南星 膩粉一兩 青黛半 硃砂

砂研白附子各半 麝香二

右再研勻用燒粟米飯為丸如菜豆大薄荷湯化下凡急驚者水化滴入鼻中立即搗定一方用腦子一字

麝香丸一名天漿子 治小兒急慢驚風上膈多涎精神昏悶

麝香一分 牛黃半兩 白附子半兩炮製兩片 犀角

屑三分 蟾酥如柳葉大 猪膽一枚乾者一方取 天漿子十

麵炒黃一分 半夏一分湯泡

右為末用麵糊為丸如黍米大一二歲兒每服五丸未瘥頻服量兒大小以意加減薄荷湯下三丸

龍骨散出全 治小兒急慢驚風諸藥不効可用

天漿子二十粒 蜈蚣一條 蝎尾去鈎 烏蛇肉酒浸 硃砂

錢腦子一字 麝香一字

右為末三歲一字薄荷煎湯調下

七味羌活膏出御藥院方治小兒急慢驚風壯熱發搐胎癩

昏困不省

天麻 全蝎 人參 白殭蠶各半兩 羌活 獨活

烏蛇肉酒浸一宿各一兩焙

右為細末煉蜜為丸每一兩作五十九丸每服一丸荆

芥薄荷湯化下一方麝香荆芥湯化下

辰砂茯苓膏出永類鈴方治小兒急慢驚風涎潮搐搦手足

抽掣心膈煩躁治驚啼睡不安怙腸中疝痛

酸棗仁淨去殼 代赭石 乳香各一兩 茯神一兩 硃砂

半兩 麝香一錢

右為細末煉蜜為丸如雞頭子大每服一丸用金銀

薄荷湯研下更量歲數加減與服鎮心安神定志此

藥與他驚藥不同温平不冷

定命丹出幼幼新書治小兒急慢驚風天癇撮口潮發搐搦

奶癩及壯熱昏寒不省

青黛半錢蟾酥乾者酒浸一宿一分麝香一錢乾蝎全者九枚為妙炒一方生

用白附子搗為末半分一方生用天南星炮為末一分

右細研勻令以粟米粥和丸如菉豆大別以青黛為衣每服一丸荆芥薄荷湯化下後因睡無疑但有患者先化半丸滴入鼻中嚏噴必瘥本不用天南星一方新生兒用膩粉二粒生油一兩點新汲水數點藥一米許化破與服取下胎中所受驚熱

保命丹 治小兒急慢驚風四肢逆冷眼張口噤涎口

不止

虎睛半錢箭頭砂半錢全蝎半錢天麻一分麝香半分蜈蚣

二條赤足去頭尾

右為細末煉蜜為丸如雞頭大瓦罐貯之入腦麝定急驚風薄荷蜜湯下慢驚風薄荷湯化下各三丸更量兒大小加減與之多少驚悸亦可服之

紅霞散出全嬰方治小兒急慢驚風潮作涎盛進退不定

天漿子二十箇一錢半僵蠶半錢麝香一字硃砂一分

右為細末二歲一字煎麻黃湯日調三服汗出是効  
緩風散 治小兒急慢驚風正搐被人持促風涎流滯  
氣血不通遂成戾不隨

自然銅 蜈蚣 全蝎 地龍 殭蠶各等分

右為末竹管一個上鑽孔四十九箇入半自然銅在  
箇次入蜈蚣一層全蝎一層地龍一層殭蠶一層自  
然銅一層蓋面實頃油單紙封閉皂角水煮一百十  
沸焙乾為末三歲半錢麝香酒調下治大小兒癱瘓

尤佳

五味天漿散

出御藥院方

治小兒急慢驚風

天漿子

龍腦各一錢

蜈蚣十條

硃砂末一錢半

乾蝎十箇

炒

右為細末每服一字薄荷湯調下不拘時侯

龍腦地黃膏

出宣明論

治小兒急慢驚風痰涎上潮心胸天

癆驚纏喉風小兒胸膈不利一切熱毒大有神驗如

病不已與分肢散三服吐利常服此藥

川大黃

錦紋者另研

甘草

別研

雄黃

一錢

麝香

別研

生腦子

欽定四庫全書

普濟方

三天

一錢  
別研

右各修製了在乳鉢內同研細煉蜜為膏油單裏如  
有病煎薄荷湯下施丸如皂角子大化下如小兒大  
人睡驚及心神恍惚金銀薄荷湯下一丸常服新汲  
水下大解星毒如孕婦常服所生男女永無疾病如  
有大人陽毒傷寒加輕粉二匣子龍腦少許水化下  
一丸杏核大小兒看年歲大小加減服之立效

延壽睡驚丹

一名保生丸

治小兒急慢驚風熱痰壅塞咽膈

不利癩癩潮發手足搐搦口眼相引項強直精神昏  
憤睡中啼哭此藥大安神鎮心定驚控痰每用一丸  
濃煎薄荷湯磨下五歲以下兒分三服三歲以下

兒分四服

方在本門一  
切驚風類

蝎稍散 治小兒急慢驚風

附子一分丹砂半錢

蝎稍七枚

烏頭尖七枚

半夏一枚

漿  
水煮過

右為細末每服一字七煎茺枝湯調下

豆卷散

出全  
嬰方

治小兒慢驚多用性太溫及熱藥治之有

欽定四庫全書

普濟方

三九

驚未退而別生熱證有病愈而致熱者有反為急驚者甚多當問病者幾日因何得之曾以何藥療之可用解毒之藥無不効

貫衆 板藍根 大豆黃卷 水浸黑豆生芽是也入乾 甘草 各一

兩

右為細末每服半錢水煎去滓服甚者三錢漿用內入油點煎又治吐瀉蟲不拘時服

問命丹 出全 治小兒急慢驚風諸藥不効神昏惡候

躑躅花 半 蝎尾 一分 腦子 半 麝香 半

右為細末少許吹鼻如眼淚鼻涕俱出者可治

一醉散 治小兒急慢驚風潮發進退并十歲孩兒風狂胡走揮颺手足

辰砂 乳香 半 酸棗仁 去皮 全蝎 三錢

右為末三歲兒半錢好酒調下盡醉服之睡著忌勿驚動自覺即安治大人風狂亦効

麝珠丹 出全 治小兒急慢驚風眼上涎鳴發搐來去

欽定四庫全書

普濟方

四十

硃砂錢二輕粉錢一地龍

一條安磁盒內疎放硃砂滲在身上令適合一宿取出上

刮身上紅用麝香一字

右為末一歲一字生薄荷自然汁調下良久取下黑

黃涎如慢驚與少許神寶丹方見本門慢驚風類

桂玉枝散

出神樂院方

治小兒急慢驚風發不省人事

全蝎

七箇筒葉

薄荷

十四箇葉

麻黃

七條

白朮

半兩

右以溫湯浴潤以兩葉裏蝎一箇用麻黃縛定炒至

焦黑次入白朮半兩生薑自然汁浸透焙乾每服半

錢煎丁香柿蒂湯調下不拘時

全蝎散

出御藥院方

治小兒急慢驚風搐掣瘈瘲痰實壅塞

胸膈不利

全蝎

十一枚

硃砂

研

乾胭脂

各一錢

薄荷

四錢

右為細末每服半錢乳汁調下服之

萬金丹

出御藥院方

治小兒急慢驚風

硃砂

一錢

輕粉

十小粒

全蝎

十箇微炒去稍

雀兒飯糞

二箇其壯女省

柳樹刺上有枝去殼取肉生用侯前三味研細方入用研

右為細末以男兒乳汁為丸如雞頭子大半歲半丸  
一周丸一歲加一丸至三歲三丸止用金銀薄荷  
湯化下藥後必昏睡雖終日亦不可驚覺自醒即無  
事其驚涎隨有大便出然藥性微冷若慢驚風服

奪命散 出百一  
選方 治小兒急慢驚風

全蝎 二七  
筒 蛇含石 一  
兩 鐵朶粉 一  
兩 丁頭代赭石 一  
兩

右為細末薄荷湯調下如身熱入硃砂末少許一方  
入雄雞冠血少許潮熱入硃砂

青金丹 治小兒急慢驚風

黃連 二錢 黃柏 二錢 青黛 二錢 巴豆 十四粒去殼  
心油膜研 全蝎

二枚

右為細末糊為丸如黍米作餅子量兒大小服金銀  
薄荷湯化服

星香散 治小兒急慢驚風搐搦窺視涎潮

南星 一錢  
半 木香 橘紅 各半  
錢 全蝎 一  
枚

右剉散紅入薑四錢四片慢煎灌下大便出涎即愈

危氏用水二盞煎服

又方出本氏方治小兒急慢驚風四肢逆冷張噤口涎口

不止

赤脚蜈蚣一條去頭尾 蝎稍半錢 草烏尖七筒 半夏三筒

右焙乾為末入麝香二十文輕粉半錢用生薑自然

汁丸如雞頭子大每服三丸金銀薄荷湯化下次用

生硃砂調塗病兒脚心中妙

慈救丹出典藥方

硃砂二錢先研 全蝎不去毒文武火微焙 江子不去油心膜大

白者四十粒 麝香當門子一錢四下乳鉢俱研至無聲則可用

右研細末煮麵塊為丸如麻子大陰乾一歲一丸驗

歲數服急驚薄荷湯下慢驚曲蟾泥泡湯下候一茶

時調無憂散服賣與人必與兩服後忽吐再喫一服

不吐則瀉其病退休服此藥服後或吐其病瘥矣

無憂散出典藥方

朴硝 青黛

右各等分為極細末白湯調下慢驚二錢急驚三錢

觀音妙濟散出典藥方治小兒急慢驚風

僵蠶直者去 嗜生用全蝎全用輕粉加減生硃砂少許

右等分為末每服一錢用乳汁下男用女乳女用男乳或薄荷湯下三五行減輕粉用後藥調前藥再服不利加輕粉後加金箔琥珀珍珠末三味等分入前藥調服

蝎稍散出全氏方治小兒急慢驚風涎痰喉中有聲

全蝎薄荷葉裏線孔炙粉霜 輕粉

右等分為末一歲一字薄荷汁調下良久吐涎咽喉不利取驚積及胸膈脹滿

硃砂半兩天南星一兩巴豆霜半錢

右為末麵糊為丸如黍米大看病虛實大小每服二丸或天癩戴上眼每服四五丸薄荷汁下立愈一方薑汁麵糊丸乳下一方滴水丸乳下

又方 治小兒急慢驚風

螳螂

一箇全者炙黃研為細末

硃砂

麝香

半錢

右為細末如二歲兒分作四服四五歲分作兩服六七歲兒分作一服金銀薄荷湯調下慢驚風加生硫黃一豆大同為末急驚風則不用硫黃前二方世所未有醫者知乃貴家不傳之方

鬱金散

一名一捻金散出宣明論

治小兒急慢驚風手足搐搦目視

上口不開涎潮悶絕

鬱金

一枚大者

巴豆

七粒去皮不去油

右細研為末每服一字竹葉放溫調下把藥抄盞唇止放以湯充下喉咽為妙一方面北門限上杵一千杵每服一字薄荷湯下治天癆急驚風熱一方用硃半棗豆大再研極細勻周歲一字並用生薑沒茶酒清調下發時服了吐瀉然後再作不可再服却可服硃砂膏羌活膏半薺散牛黃散惺惺散可選用之雄黃散

出再選方

治小兒急慢驚風

白礬

生用

右研細蠟櫃丸如菜豆大麝香硃砂養之量兒大小與服取青綠物自大便通中出即愈

又方 一名保生湯  
出抵合方

通治小兒急慢驚風手足搐搦日數十發搖頭弄舌百治不効者

蛇蛻 分一牛黃  
研一錢

右以水一盞先煎蛇皮至五分去滓調牛黃頓服五

歲以上倍服

治小兒急慢驚風

出傳信  
適用方

天南星 一箇  
全蝎一箇

右為末用父母津唾調膏稀稠得所塗顙上看顙大小塗之移時驚住不須塗之若未住再塗之

一方治小兒顙門陷并發熱用後藥貼之

出典  
藥方

詩曰

三箇葱頭及一龍 各各捉來三處同

頂門脚心俱貼上 管甚急驚契慢驚

備急丸 治急慢驚風

以五月五日取地龍數條用竹刀分中兩截看地龍  
 跳得急者慢者各另一處研爛用硃砂末同研和勻  
 得所丸如菉豆大急驚用跳急者慢驚用慢跳者用  
 金銀薄荷湯下量兒大小加減丸數如合藥後分明  
 寫記急慢各另包裏收贈一方脾蚯蚓子研細沙糖  
 井花水調服不用硃砂

又方 治小兒急慢驚風

用楊柳樹虫不拘多少研細取汁并華水調服

飛花散 治小兒急慢驚風諸般驚悸心熱

硃砂一分 蝎梢九筒 膩粉錢一 天竺黃 馬牙硝一兩 腦

麝許少

右為細末每服半錢用金銀薄荷湯調下

全蝎散 治小兒急慢驚風一切諸風發搐服之甚効

急慢驚風加減方在法內

全蝎

二十四箇新薄荷葉穿包裏綿繫定用竹永

酒浸開

僵蠶

半兩先炙去絲頭用

天南星

一兩取

法製可

薄荷酒依前法製之

一兩切作片子新薄荷葉三兩如無新者用乾葉  
一兩作餅子取乾用了如急驚風不用南星加大  
黃煨一兩若慢驚風不白附子三錢防風 天

麻 甘草 硃砂 川芎半兩

右為末每服一錢一歲兒服半錢三歲兒一錢薄荷  
湯調下量小兒大小加減服之定鎮心神煎金銀薄  
荷湯調下身熱發搐煎火府散調下慢驚吐瀉發搐  
煎生薑湯下急驚風發火府散加大黃煎湯調下

鎮心丸

出王氏轉濟方

治小兒急慢驚風搐搦不定中焦壅熱

化痰理驚

金銀箔各三片 牛黃一錢 茯神半兩 鐵粉半兩 龍腦一錢 防

葵半兩 人參兩 雄黃一分 硃砂半兩 犀角一分 大黃一分 龍齒

一錢

右都研勻細末煉蜜和丸如小雞頭子大每服看兒  
大小薄荷湯化下如大人心神不定怔忡亦宜服之  
六神丹 治小兒急慢驚風涎潮氣壅安神養魄去風  
邪定嗽喘利膈

白殭蠶 直者一錢 浴淨 辰砂 一錢 蜈蚣 大者一條 去頭足利去服

用酒浸 蝎稍 一錢 去尖 半夏 陳者一錢 刮去 真麝香 一錢

甘草 一錢 人參一錢 去蘆 藿香 一錢

右為細末煉蜜為丸如鷄頭子大周歲兒每服一丸

薄荷湯化下二三周及一周者以意加減

硃砂膏 出生加 治急慢驚風形候一般皆治

硃砂 一錢 蝸牛 五箇 輕粉 一錢

右一處為末煉蜜為膏每服周歲一黑豆大薄荷汁

調下日三服與蠶半散相間或間惺惺散亦得不退

服羗活膏與蠶半散用蝸牛連殼先用瓦摻黃丹將

蝸牛在上連丸將在火上焙乾

醉紅散 出宿川 治小兒急慢驚風潮搐涎盛口眼偏斜

精神昏悶若腹急脹睛上視則難愈

蜈蚣 白殭蠶 全蝎 去毒二 香白芷 硃砂 一錢

天仙子 一字 蔓陀羅花 七枚 天南星 一枚 大者作盒子

來寒之用無反酒浸濕紙裹入地坑內蓋合坑角 炭火二分煨乾時取開入酒浸洗之候火盡方取

出焙 乾

右件為細末每服一匙病甚者服半錢急驚用薄荷自然汁調慢驚荊芥湯入酒三五滴同調下不拘時

乳香丸 治急慢驚風頑痰壅上日時上視

乳香 龍腦 牛黃 硃砂 麝香 天麻 人參 防風 全蝎 甘草 茯苓

右件為細末用蜜為丸如雞頭大荊芥湯下

雄黃散 治小兒急慢驚風手足搐掣壯熱口噤不省

人事

天麻 蟬退 南星 桂心 半夏薑汁製 白附子

雄黃 麝香 天竺黃 膩粉 全蝎

右為末用棗肉為丸菜豆大薄荷湯下

梨漿飲出傳氏活嬰方 治急慢驚風後餘熱不退或被醫人進

熱藥致令孩子煩燥

硼砂錢一 全蝎錢一 白附子錢半 麝香 鉛霜錢一 荊芥錢一

硃砂錢一 腦子許少 朶粉錢半 南星大者一箇牛膽汁浸三面裏煨

右為末每服一字燈心金銀薄荷湯下

靈砂救命散 治小兒急慢驚風身熱涎盛目時上視

牙關緊急頻發搐搦或利生風手足痙瘓哽氣神昏

五靈脂 一兩醋浸化去砂石慢火熬成膏 羌活 去蘆 蔓陀羅花 四天

麻 酒浸焙乾 烏蛇尾 滑石 別研 鈎藤

右件為細末煮醋施滴水為丸每一兩作四十九陰

乾每服半丸至一丸煎生薑荆芥湯磨下不拘時候

琥珀真珠丸 治小兒急慢驚風涎留心經上逆作吐

目睛直視手足搐搦風癇瘈瘲痰潮昏塞啼舌搖頭  
作聲狂叫

巴豆 七粒取霜 附子尖 十四枚半生半炮 半夏 十一枚半生半炮 白花

蛇頭 一枚酒浸焙乾 白殭蠶 十四枚葉裏煨炙焦去薄荷不用

白附子 二枚半生半炮 全蝎 十四枚荷拌炙黃色去薄荷不用 天

南星 二錢 羌活 去蘆頭 白鮮皮 琥珀 別研 天麻 真珠

末 別研 麝香 一字別研 硃砂 別研 龍腦 一錢 雄黃 別研 烏蛇頭

蛇黃 火煨醋淬三遍 白殭蠶 防風 去蘆頭 天麻 以上五味各一

五靈脂兩全蝎一錢代赭石半兩火煨

右為細末糯米煮糊為丸每一兩作十四丸金箔為衣一歲兒一丸分三服薄荷湯磨下急驚再磨慢驚荆芥湯磨下不拘時候

天南星丸出楊氏加減方治小兒急慢驚風涎盛搐搦嘔吐涎沫神昏貪睡

全蝎去毒白附子 五靈脂去沙石 蟬蛻 天南星各

分

右件為細末煮米醋施滴為丸每一兩作四十九陰乾每服半丸至一丸煎生薑荆芥湯磨下不拘時候  
琥珀珍珠丸 治小兒急慢驚風涎留心經上逆作吐目睛直視手足搐搦及治風癇癩瘕痰潮昏寒嚙舌搖頭作聲狂叫

巴豆七粒附子尖十四枚半夏十四枚白花蛇

白僵蠶十四枚半熟用薄荷白附子二枚

全蝎十四箇半熟用薄荷天南星半生羌

活 白鮮皮 琥珀 天麻 真珠末 麝香

珠砂 龍腦錢一 雄黃錢半

右件為細末以猪心血薄荷自然汁煮麵糊和圓如蘿蔔子大每服十丸煎人參湯送下不拘時候

利驚丸出楊氏家藏方 治小兒急慢驚風涎壅吐嚔不下神志

昏憤目瞪搐搦

硃砂 阿魏濕紙裏湯上薰令軟 乳香錢一 蜈蚣一條 蝎稍七枚

去毒 巴豆大一枚去皮水浸三日

右件為細末次入阿魏巴豆同研成膏加末成即用重湯煮之為丸如黍米大一歲兒每服三丸濃煎蘿蔔子湯送下利下涎即効不拘時候

葱涎丸出楊氏家藏方 治小兒急慢驚風涎潮搐搦項反背折

蜒蚰一條 天南星生一分為細末摻蚰焚身用竹篦子刮下不用蚰 蜈蚣一條

全蝎十枚去毒用薄荷葉裏慢火炙了去薄荷 巴豆五粒

右件為細末生葱涎為丸如小菘豆大妙用硃砂為衣每服五丸壁上塵湯送下不拘時候

長生丸

出楊氏家藏方

治小兒急慢驚風睡目斜視項背強直

牙關緊急

蜈蚣

全蝎

十枚 去皮

天南星

二錢以上二味用薑汁半盞入磁器中慢火熬

盡取去 焙乾

棘剛子

十枚去殼只取出生用前藥末研勻和如散下乾碾為用

右件為細末湯浸雪糕為丸如芥子大周歲兒每服十丸兩歲兒每服十五丸用千金散作湯便送下

千金散

作湯便送下藥

白花蛇頭

一枚

麻黃

二十四根去節新瓦上焙黃色

右件為細末如急驚入研細腦子少許濕湯調藥一字送下不拘時候

蝮蜥散 治小兒急慢驚風身熱涎盛頻發搐搦神志

昏憤

白附子

一枚

天麻

去苗

全蝎

去毒

白僵蠶

天南星

人

參

去蘆

附子

去皮臍尖

甘草

六味二錢

鉤藤

硃砂

末各一錢

腦

子

一字

麝香

一字

研

右件為細末次入腦麝研勻半歲兒每服一字週歲

兒每服半錢用薄荷荆芥湯調下不拘時候

嚏驚丸 治小兒急慢驚風搐搦不定頭項反折神志

昏塞

螳螂 一枚大者去足翅  
雄黃半錢同研  
蜈蚣 三枚去頭足翅入

蛇 大者入硃砂  
一錢半同研  
石龍子 一枚入硃砂一錢同研如  
無以活葛氏更無以易微

四十九枚  
不去毒

以上四味遂族收油紙裏窰乾入後藥

真珠末 麝香一錢 龍腦一錢 瓜蒂七枚 細辛末半錢 白花

蛇頭 酒浸焙 乾半錢 蟾酥一分

右件同研為細末取孩兒乳汁和丸如蘿蔔子大每  
用一丸以奶汁磨化滴鼻中得嚏立瘥次用薄荷湯  
化下五七丸不拘時候

水仙散 出楊氏家藏方 治小兒急慢驚風神昏不省

水仙子 瓜蒂半錢 躑躅三錢 腦子半字 賊不食草三錢 蝎

稍半兩 蜈蚣一條 麝香一字

右件研為細末每服半米粒大吹入鼻中得嚏為度

白附子丸

出楊氏家藏方

治小兒急慢驚風潮搐生涎上氣喘

急

白附子

研

半夏

硃砂

各半兩

白僵蠶

一兩

全蝎

二十枚

去毒

膩粉

一分

麝香

一分

金箔

一片

右件將白附子等五味研為細末次入研者藥一處勻煮棗肉和丸如黍米大每服十丸煎荊芥湯送下不拘時候

蛇黃丸

出楊氏家藏方

治小兒急慢驚風涎壅驚悸或作癇疾

人參

去蘆

硃砂

研

蛇黃

七分別研

半夏

茯神

去木上味各半兩

鐵粉

二錢半

麝香

半兩

右件為細末入研者藥和勻煮麵為丸如黍米大每服十丸生薑湯送下乳食後服

通關散

治小兒急慢驚風搐搦作潮

蜈蚣

一條乾者葱涎浸一日一夜

麝香

一字

草烏頭

十四箇薄荷生薑自然汁

浸一日一夜焙乾

右件為細末每潮一搗時男左女右同一米粒吹入

鼻中

神應散 治小兒急慢驚風出東坡家傳方有應

雄黃二兩 硃砂錢一 全蝎七箇 蜈蚣一條 僵蠶一箇直者炒

右為細末每用半錢薄荷湯調服

萬應丹 出東坡生蘭室秘藏方

一斗紅雲一斗雪 神妙却在青蒿節

不論急驚與慢驚 臨時須用生人血

右於七月二十五日取青蒿上物研和為丸如梧桐

子大每量大小輕重加減乳汁磨下半歲一丸一歲二丸二歲三丸如黄豆大

延壽丹 治小兒急慢驚風胃受驚氣腹痛盤腸內作

鴉聲邪叫角弓反張眼或視上手足搐搦涎潮壅塞不醒或一切心神煩悶睡卧不安並宜服之

天南星 白附子 蛇黃 辰錦 生硃 當門

子

右為細末和勻粉糊糯米為丸如雞頭子大週歲兒

每服一丸嬰兒半丸薄荷湯浸軟磨乳化下後腹復塞痘俱不妨碍藥性温平

治小兒急慢驚風

出得生 堂經方

右速以男左女右之手第二指屈勻拳取其第二第縫頭用麻子大艾炷一丸灸之即愈危者二三次此法本堂試用萬無一失其應効如響

治小兒急慢驚風

乳香

半兩味辛 熱微毒

甘遂

半兩味黃寒有毒之壅遠志 甘草水浸三兩日換東流水

淘淨候乾 炒脆用

右二味同研細末每服半錢用乳香湯調下或小便調更妙

治小兒急慢驚風并慢脾風

右用青州白丸子并金夜當等分為末飯飲調下量虛實大小與服

黑子散 治小兒急慢驚風

右用猪牙皂角不拘多少燒為炭為末入麝香少許

金銀薄荷湯調下一字量兒大小與服燒時令帶性不得過

至聖保命丹 治小兒急慢驚風並皆治之

全蝎五兩南星十兩蚯蚓屎十兩硃砂一兩輕粉二兩年螺螄

二兩

右為末糕糊為丸如雞頭子大每一丸用薄荷湯化

下

葱湯丸 治小兒急慢驚風

滑石一錢輕粉一錢全蝎半錢白附子一錢半巴豆半熟

南星

右為末蒸餅丸如麻子大每丸對歲數一歲以下七

丸未出月一丸氣積驚積金銀薄荷湯下

蒼皂丸 治小兒急慢驚風及去風疾利胸膈次常服

永無痰疾

北星二兩半夏一兩薑汁浸一宿焙乾南星一兩切作片濃煎皂角水浸一宿火焙乾

僵蠶直者可用一兩醋浸一宿半生半熟各半兩

右為末薑糊丸桐子大每服十粒至二十粒薑湯下  
 如喉閉熱痛含化爛嚼薄荷新汲水送下甚者及纏  
 喉風皂角水一搽脚研一二十粒灌下小兒急慢驚  
 風涎盛皂角水研搯齒上常服食後臨卧薑湯下不  
 損津液化痰為水

問命丹

出保生集

治小兒急慢驚風發搐

蜈蚣

一條 僵蠶

一條 蜈蚣

長

右為細末男左女右搐一字

普濟方卷三百七十五

總校官候補知府臣葉佩蓀

校對官學錄臣常循

膳錄監生臣孟裕觀