



0092952

外傷諸瘡

金鏃竹木傷

跌撲折傷

五絕

諸蟲傷

諸獸傷

諸毒

蠱毒

諸物哽咽

婦人經水

帶下

本草類方 辛

本草類方卷之八

外傷諸方第九十

湯火灼瘡

灰末

塗之

凍瘡不瘥

熱湯

湯火傷灼

多能鄙事用青瓷盤片為末水飛過和桐油傅數次瘥

湯火傷灼

打碎埋竈內炭火鋪上一夜取出去火毒為末入黃丹少許傅之立愈

湯火燒瘡

取多年屋上吻獸為末油和塗之立效

灸瘡腫痛

竈中與干木煮汁淋之

本草類方

外傷諸瘡

湯火傷灼

餅爐中灰麻油調傅不得着水仍避風

抓傷面皮

香油調蠶粉搽之

湯火傷瘡

青竹燒油同鐵鏞搽之

火瘡敗壞

雲母粉和生羊髓塗之

湯火灼傷

銀末研細菜油調傅二次愈

油傷火灼

痛不可忍石膏末傅之良

湯火傷灼

年久石灰搽之或加油調

脚上凍瘡

濃煎黃蠟之

漆瘡作痒

猪膏頻塗之

漆瘡作痒

千金方



凍瘡破爛

大黃末水調塗之。膏生黃蠶

湯火傷灼

寒水石燒研傳之。膏生易筋方

漆瘡作痒

白礬湯拭之。千金方

湯火傷灼

苦參末油調傳之。衛主易筋

湯火傷灼

白及末油調傳之。趙眞人方

湯火傷灼

舊壺蘆瓢燒傳之。胡集簡方

凍瘡發裂

甘草煎湯洗之。次以黃連黃蘗黃芩未入輕粉麻油調傳。談望翁方

灸瘡不發

酸漿葉

湯火傷灼

甘草煎蜜塗之。李樓奇方

本草類方

外傷諸瘡。卷八

漆瘡作瘡

油調黃末塗之。千金方

熱油火灼

除痛生肌用參八兩剉以水微調取半脂二斤煎三七三下以塗瘡上。肘後方

手足皸裂

白及末水調塗之。及犯水。唐急方

湯火傷灼

皂礬和涼水澆之。其衷卽正腫亦消。楊誠經驗方

湯火傷瘡

煎赤漬爛用此生肌按熱止痛當歸蜜蠟各一兩麻油四兩以油煎當歸焦黃色薄

納蠟攪成膏出火毒。攤貼之。御劑局方

湯火灼傷

用瓶盛麻油以筋就樹夾取黃葵花取入瓶內勿犯人手密封收之。遇有傷者以油塗之。其妙

。經驗方

湯火傷灼

劉奇奴湯末先以糯米袋雜細掃去後乃磨末並不痛亦無痕大駭之方。此湯火傷

湯火灼傷

先以鹽末擦之。護肉不糜。後乃擦藥為妙。本事方。薤白子仁哈粉等分研膏湯傷以油調火灼以水調塗之。古今錄驗。

漆瘡搔痒

蕘菜煎湯洗之。

手足凍裂

附子去皮為末以麩調塗之。良。談塗翁試驗方。

湯火灼爛

白飯末傳之。外臺。

湯火傷灼

莊浪大黃生研蜜調塗之不惟止痛又且滅癢此乃金山寺神人所傳方。洪邁夷

志

湯盪火燒

卮子末和雞子清濃搗之。救急方。

湯火傷灼

生薑搗搗塗之。亦可。聖濟總錄。

本草類方

外傷諸瘡

三

湯火灼傷

木成瘡者黍米女麩等分各炒焦研末。雞子白調塗之。煮粥亦可。用後方。

熱油燒痛

以白蜜塗之。梅師方。

湯火灼傷

粟米炒焦投水澄取汁煎稠如糖。梅師傳之。誰止痛滅癢痕一方半生半炒研末酒調。

行功。梅師。

炙瘡腫痛

薤白一升豬脂一斤切以苦酒浸一宿。微火煎三上三下去滓塗之。梅師方。

湯火灼瘡

油調芙蓉末傳之。奇效方。

海水傷裂

凡人為海水鹹物所傷及風吹刺痛不可忍。用蜜半斤水酒三十斤防風當歸羌活。

荆芥各二兩為末煎湯浴之。一夕即愈。使琉球錄。

灸瘡不斂

瓦松陰乾為末先以槐枝葱白湯洗後擦之立效。濟生秘覽。

湯火傷灼

五月五日摘黃瓜入瓶內封掛
簪下取赤刺之良。醫方摘要

入水肢腫

傳之。千金方

湯火傷灼

之。外臺秘要

手足凍瘡

老綠瓜燒存性和鹽
豬脂塗之。海上方

湯火灼瘡

大豆煮汁飲之易愈
無毒。子厚秘錄

湯火傷瘡

用蕎麥麵炒黃研末水
和傅之如神。奇效方

湯火傷瘡

用稻草灰冷水海七遍帶濕攤上乾即易
若瘡濕者焙乾油傅二三次可愈。衛生
易簡方

湯火傷灼

菜子油調蚯蚓屎搽
之。楊起簡便單方

本草類方

外傷諸瘡

湯火傷灼

大麥炒黑研
末調搽之

火瘡滅瘢

赤地利末油
調塗。聖惠

湯火傷瘡

經霜桑葉燒存性為末油和
傅之三日愈。醫學正傳

手足凍瘡

山菜一截磨泥傅
之。儒門事親

湯火傷灼

絲瓜葉焙研入辰粉一錢蜜調搽之
生者搗傅一日即好也。海上名方

湯火傷灼

雞腸草搗塗
之。肘后方

湯火傷灼

芥菜煎湯洗
之。千金方

湯火灼傷

瓦松生柏葉同傅乾
者為末。醫方摘要

湯火灼傷

非葉杵傅
之。斗門方

火燒成瘡炒麵入厄子仁末和油傅之。千金方

足上凍瘡以醋洗之研藕傅之。

湯火傷灼未成瘡者用小麥炒黑研入膩粉油調塗之勿犯冷水必致爛。補珍方

漆瘡作瘁援慎火草塗之。外臺

火燒成瘡白糖燒灰粉之即。小品方

湯火傷灼餅燒存性研末油調塗傅之。肘后方

手足皴裂椒四合以水煮之去滓漬之半食頃出令燥須臾再浸候乾塗猪羊腦髓極妙。勝

金方

火毒生瘡凡人冬月向火火氣入內兩股生瘡其汁淋漓用黃蘗末擦之立愈一婦病此人無

本草類方外傷諸瘡

識者有用此而愈。張景醫說

凍瘡裂痛乳汁調黃蘗末塗之。儒門事親

耳足凍瘡椒攪核燒研油調塗之。乾坤生意

熱油灼傷柏白皮以臘猪脂煎油塗瘡上。肘后方

手足皴裂生白果嚼爛夜夜塗之即愈。

凍脚裂坼蒸熟藕搗爛塗之。

漆瘡作瘁乾荷葉煎湯洗之良。集驗方

漆瘡作瘁譚氏方用漢椒煎湯洗之。相感志云凡至漆所觸川椒塗鼻上不生漆瘡

火燒成瘡黑頭傅

手足皸裂

紅潤臘脂膏汁鹽等分研爛炒熱擦之
裂內甚痛少頃即合再擦數次即安。補

凍瘡皸裂

桐油一盃髮一握熬化瓶收每以
溫水洗令軟傅之即安。救急方

手背皸裂

大風子搗泥塗
之。壽域方

火瘡未起

卮子仁燒研麻油和封之已成
瘡燒白糖灰粉之。千金方

火灼爛瘡

榆白皮嚼塗
之。千金方

湯火灼瘡

柳皮燒灰塗之亦可以根白
皮煎猪脂頻傅之。肘后方

炙瘡不愈

芙蓉花研末傅
之。奇效方

湯火燒灼

柏葉生搗塗之繫定二三
日止痛滅癩。本草圖經

本草類方

外傷諸瘡
卷八

六

灸瘡不瘥

痒痛不瘥楸葉頭及根
皮為末傅之。聖惠方

湯火傷瘡

竹蠹蛙末傅之
外臺秘要

冬月皸裂

牛鼻繩末和五倍子末填
入薄紙貼之。救急方

灸瘡血出

不止用死蛻螂燒研
猪脂和塗。千金方

湯火傷瘡

疔赤疼痛毒腐成膿用此拔熱毒止疼痛
斂瘡口用麻油四兩當歸一兩煎焦去滓
入黃臘一兩捏化放冷攤
帛貼之神效。醫林集要

灸瘡不瘥

車短脂塗之
良。千金方

漆瘡作痒

羊乳傅之
。千金方

手足皸裂

五倍子末同牛骨髓煎納
縫中即安也。醫方大成

灸瘡不瘥 烏賊骨白礬等分爲末 日口塗之。千金方

湯火傷瘡 用多年乾白螺螄殼 取研油調傅。瘡容 宜吹猪肉嚼擦穀

漆瘡作痒 雞子清和酒調洗勤洗卽易生肌息 塗之。千金方

湯火燒灼 發物或生傅之亦可。經驗秘方 虎骨炙焦研傅神

湯火傷灼 效。龔氏易簡方 兔腹下白毛貼之候

火燒成瘡 毛落卽瘥。白一方 狗毛細剪以烱膠和臣

湯火傷瘡 敷之痂落卽瘥。梅師 熟雞子一個取黃炒取油入膩粉十支

湯火傷瘡 擦勻搽上三五日永除癢痕。集驗方

手足皸裂 用虎腦髓生塗 之。聖惠方

本草類方 外傷諸瘡 卷八

手足皸破 猪脂着熱酒中 洗之。千金方

凍指欲墮 馬糞煮水漬半 日卽愈。千金

湯火燒灼 濕牛屎搗塗 之。姚和衆

湯火傷瘡 猪膽調黃蘗末 塗之。外臺

湯火灼瘡 白膠水煎令稠待 冷塗之。斗門方

湯火傷灼 水煎膠如糊冷掃 塗之。斗門方

火燒悶絕 不省人事者新尿頓服 二三升良。千金方

湯火傷灼 死鼠頭以臍月猪脂煎令消盡 傅之則不作瘡神效。千金方

湯火傷灼 令不痛易愈無痕附后用人精鷹屎白 日塗之。千金用女人精汁頓塗之

湯火傷瘡

小老鼠泥包燒研菜油調塗之。談楚翁方

手足皴裂

以酒醱猪胆洗并傳之。肘後方

湯火傷灼

即以酸醋淋洗并以醋泥塗之甚妙亦無破痕也

凍耳成瘡

白斂黃藥等分為末生油調擦。談楚翁方

湯火傷灼

醋調黃土塗之談楚翁方

兩耳凍瘡

生薑自然汁熬膏塗。眼日記

抓破面皮

生薑自然汁調輕粉未搽之更無痕跡。救急方

漆瘡作痒

鉄漿頻洗愈。外臺

漆瘡作痒

芒硝湯塗之。千金

本草類方

外傷諸瘡
卷八

本草類方卷之八

金鏃竹木傷第九十三

金瘡血出

不止冷水洗之即止。延壽方

金瘡血出

湯會之。延壽書

金瘡困頓

虱朝尿求水服方寸七日三服。千金方

金瘡出血

雲母粉傅之絕妙。事林廣記

金瘡出血

不可以藥速合則肉潰傷肉只以黃丹滑石等分爲末傅之。集玄方

金瘡出血

急以石炭末厚傅之瘡深不宜速合者加滑石。醫學集成

金瘡腸出

納人以葱石滑石各三兩爲末米飲服方寸七日再。劉涓子鬼遺方

本草類方

金鏃竹木傷

刀斧金瘡

白礬黃丹等分爲末傅之最妙。救急方

花藥石散

治一切金刃箭簇傷及打撲傷損狗咬至死者急以藥擦傷處其血化爲黃水再塗

便活更不疼痛如內損血入臟腑煎童子

小腸入酒少許熱調一錢服立效畜牲

傷腸出不損者急納入桑白皮線縫之捺

藥血止立活婦人產後敗血不盡血運惡

血奔心胎死腹中胎衣不下至死但心頭

溫暖者急以童子小便調服一錢取下噫

物如猪肝終身不患血風血氣若膈上有

血化爲黃水即時吐出或隨小便出甚效

乾安在西方

磚上書八卦五行

炭一秤簇匝從巳午時自下生火

瓶收用。和劑局方

金瘡血出

白微為末貼之。儒門事親

刀斧傷損

白及石膏煨等分為末擦之亦可收口。濟急方

竹木入肉

白茅根燒末豬膽和塗之風入成腫者亦良。肘后方

金瘡出血

不止以嫩紫蘇葉桑葉同搗貼之。承頤鈴方

金瘡內漏

牡丹皮為末水服三指撮立尿出血也。千金方

刀箭傷瘡

香白芷嚼爛塗之。集簡方

割甲傷肉

不愈鬼針草黃鼠粘子根搗汁和臘豬脂塗。千金方

金瘡血出

白芍藥一兩熬黃為末酒或米飲服二錢漸加之仍以末傅瘡上即止良驗。廣利

本草類方

金鏃竹木傷

十

金瘡亡血

王不留行散治身被刀斧傷亡血用王不留行十分八月八日採之蒴藿細葉十分

七月七日採之桑東南根白皮十分八月三日採之川椒三分甘草十分黃芩乾薑

芍藥厚朴各二分以前三味燒存性後六味為散合之每大瘡飲服方寸七小瘡但

粉之產後亦可服。張仲景金匱要略

竹木鍼刺

在肉中不出疼痛以王不留行為末熟水服方寸匕兼以根傅即出。梅師方

竹木入肉

瞿麥為末水服方寸七或煮汁日飲三次。梅師方

箭刀在肉

及咽喉胸膈諸隱處不出酒服瞿麥末方寸七。千金方

金瘡出血

蛇含草搗傅之。肘后方

金瘡血出

車前葉搗傅之。千金方

撲傷金瘡

夏枯草口嚼爛罨上愈。衛生易簡方

金瘡出血

不止小蘗苗搗爛塗之。孟詵食療本草

毒箭傷人

以青布漬汁飲之如無藍用青蒿麻葉石灰等分五月五日搗和晒乾臨時爲末擦之

金瘡撲損

肘后方用青蒿搗對之血止則愈。一方用青蒿麻葉石灰等分五月五日搗和晒乾臨時爲末擦之

金瘡作痛

生牛膝搗傅立止。梅師方

毒箭入肉

煎生地黃汁作丸服至百日箇出。千金方

金瘡出血

狼牙草莖葉熟搗貼之。肘后方

刺在肉中

用白飯半夏泡等分爲末酒服半錢日二服。聖惠方

本草類方

金鐵竹木傷

鍼刺入肉

菟麻子去殼一個先以帛襯傷處傅之頻看若見刺出卽拔去恐藥緊弩出好肉或加白梅肉同研充好。衛生易簡方

金刃不出

入骨脈中者半夏四兩等分爲末酒服方寸匕日三服至二十日自出。李筌太白經

筋頭不出

萬聖神應丹端午前一日不語尋見莨若科根本枝葉花實全好者道云先生你却

金瘡出血

在這裏道罷用柴灰白東南起圍了以木柀子掘取根下周廻土次日日未出時依前不語用錢頭取出洗淨勿令雞犬婦人見于淨室中以石拍搗如泥丸彈子犬黃

金瘡作痛

丹爲衣以紙袋封懸高處陰乾遇有筋頭不出者先以象牙末貼瘡口後用緋帛袋

毒箭入肉

盛此藥放臍中錦兜肚繫了當便出也。張子和儒門事親方

金瘡撲損

乾臨時爲末擦之

金瘡作痛

生牛膝搗傅立止

毒箭入肉

煎生地黃汁作丸服至百日箇出

金瘡出血

狼牙草莖葉熟搗貼之

今瘡腫痛

薔薇根燒灰每白湯服方寸七一日三服。抱朴子

金瘡血出

不血用生麵乾傳五七日即愈。蘭氏經驗方

箭刺入肉

膿囊不出以薔薇根末擦之服鼠糞十日即穿皮出也。外臺秘要

被斫斷筋

旋葛根搗汁灑瘡中仍以淳傅之口三易半月即斷筋便續此方出蘇景中瘡奴有效者。王燾

外臺秘要

金瘡煩痛

大便不利大黃黃芩等分爲末蜜丸先食水下十九日三服。千金方

刺瘡金瘡

百治不效葱煎濃汁漬之甚良

刀瘡神藥

古石灰新石灰絲瓜根葉初種放兩葉者韭菜根各等分搗一千下作餅陰乾爲末擦之止血定痛生肌如神效侍

御蘇海峰所傳。董炳集驗方

本草類方

金瓶竹木傷

五

金瘡腸出

用小麥五升水九升煮去四升綿濾取汁待極冷令病人臥席上含汁嚥之腸漸入

嚥其背竝勿令病人知及多見傍人語

再腸不入也乃搗席四角垂湯使腸自入日中但略食美物慎勿驚

竹木刀傷

地黃嚼爛卷之。救急方

金瘡煩滿

赤小豆一升苦酒浸一日熬燥再浸滿三日令黑色爲末每服方寸七日服。

方金

瘡傷損

生肌破血用紫葛二兩順流水三升煮一盞半分三服酒煎亦妙。紅紋

刺入肉

栝樓根搗傅之口三易自出。崔元亮海上方

針在咽

或刀及針咽諸處枰杏心傅之。肘后方

金瘡癰腫

及竹木蜜刺等每用糯米三升
四十九日以冷水浸之一
博勿令攪碎至端午日取出
甚通風處每用旋取炒黑
膏藥隨瘡大小裹定瘡口
動直候瘡瘳若金瘡犯生
者急裹一二食久卸不作
初發纔覺癢腫急貼之一
夜便消○靈芝

金瘡入血

在腹者大蔥白二十段蘇子三升杵碎水
九升煮一升半頓服當吐出膿血而愈案
盡再服○
千金方

金瘡入肉內

不出者雙杏仁搗爛以車脂
調貼其鍼自出○瑞竹堂方

金瘡出血

酒灌下○危氏方

本草類方

金鐵竹木傷

三

金瘡跌折

通草煮汁
釀酒日飲

箭鏃不出

枯蔓根搗傅之日三易
自出○崔元亮海上方

金瘡出血

不止血見愁草研爛
塗之○危氏得效方

金瘡出血

韭汁和風化石灰日乾每用
為末傅之效○瀕湖集簡方

卒被毒箭

麻仁數升杵
汁飲○時后

刺在肉中

嚼破塗之
○千金方

金瘡苦痛

楊木白皮熬燥碾末水服方寸
匕仍傅之日三次○千金方

金刃所傷

未透膜者乳香沒藥各一錢以童子小便
半盞酒半盞温化服之為未亦可○奇效

良方

金瘡出血

立止。廣利方。

金瘡出血

用少許傅之立止。崔元亮方。

金瘡出血

降真香五倍子銅花等分。為末傅之。醫林集要。

金瘡內漏

蘇勃一兩蒲黃二兩為末酒服。錢七日夜一。外臺秘要。

金瘡惡心

白檀榔四兩橘皮一兩為末每。空心生蜜湯服二錢。聖惠方。

金瘡斷筋

楓香末傅之。危氏方。

金瘡出血

花蕊石刮末傅之即合。仍不作膿。嘉祐主治。

金及斧傷

用獨殼大栗研傅或倉。卒嚼傅亦可。集簡方。

刀斧傷瘡

荷葉燒研搽。之。集簡方。

本草類方

全鐵竹木傷。卷八。

古

葦刺入肉

生嚼栗子傅。之。外臺。

刺傷手足

犯露水腫痛多殺人以桑枝三條燂火。熱斷之以頭熨瘡上令熱冷即易之盡二。條則瘡自爛仍取韭白或薤白傅上。

急以帛裹之有腫更作。千金方。

刺入肉中

百理不瘥松脂流出如乳頭香者傅上以。帛裹三五日當有根出不痛不痒不覺自。安。兵。

郢手集。

箭鏃入肉

不可拔出者用新巴豆仁略熬與蜈蚣。同。初塗之斯須痛定微痒忍之待極痒不可。忍便感拔動之取出速以生肌膏傅之而。痊亦治瘡腫夏候在潤州得此方後至。

洪州旅舍士人妻病背瘡呻吟不已。經。驗方。

赤鱗鱗即古松皮煨存性研。之。最止痛。永類鈴方。

金瘡杖瘡

赤鱗鱗即古松皮煨存性研。之。最止痛。永類鈴方。

金瘡接指凡指斷及刀斧傷用真蘇木末敷之外以蠶繭包縛完固數日如故。攝生方

金瘡傷重被驚者以女人中交舊者灸燻熨之。李肇太白經註

一切金瘡及刀斧傷白蠟釐沙黃研末傅之立愈。斗門

金瘡悶絕不識人琥珀研粉童子小便調一錢三服瘳。鬼遺方

金瘡出血搗子搗傅之。外臺秘要

金刀傷瘡新桑白皮燒灰和馬糞塗瘡上敷易之亦可煮汁服之。廣利方

金瘡作痛桑柴灰篩細傅之。梅師方

金瘡犯肉血出不止取所交婦人巾衣帶三寸燒末水服。千金方

金瘡血出柳絮封之即止。外臺秘要

本草類方卷八 金鐵竹漆湯

刺入肉中酸棗核燒末水服立出。外臺秘要

金瘡出血濕青末少加生銅屑末擦之立愈。唐璠靈驗方

鍼刺入肉車脂攤紙上如錢大貼上二日一易三五次即出。集玄方

箭鏃入肉不可拔者用蟬蛻一個巴豆半個同研傅傷處微痒且忍極痒乃撼拔之以黃連貫衆湯洗拭

石灰傅之

刀斧金瘡端午午時取晚籬蠶石灰茅花搗成團草蓋令發熱過收貯每用刮下末擦之

竹刺入肉五月五日取晚蠶蛾生投竹筒中令自乾死為末取少許津和塗之。便民圖纂

金瘡出血不止者五倍子末貼之若閉氣者以五倍子末二枚和龍骨末少許湯服立效。談

方 墊翁

止血生肌

蠶蛾散治刀斧傷割血出如筋用晚蠶蛾炒為末傅之即止甚效。勝金方

金瘡出血

牡蠣粉傅之。別后

箭鏃入肉

用天水牛取一角者小瓶盛之入爾砂一錢同水數滴在內待自然化水取滴傷處

即出也

一切金瘡

五倍子降真香等分炒研末傅之皮肉自痊名啄合山。拔萃方

鐵箭入肉

象牙刮末水敷之即出也

木刺入肉

乾羊屎燒灰猪脂和塗不覺自出。千金

竹木入肉

不出者鹿角燒末水和塗上立出久者不過一夕。千金方

金瘡出血

不止成內漏用蝙蝠二枚燒末水服方寸七當下水面血消也。鬼遺方

本草類方

金鏃竹木傷

共

刺傷中水

服烏牛尿二升三服止。梅師方

骨刺入肉

象牙刮末以水煮白梅肉調塗自軟。簡要濟衆

箭鏃入肉

乾羊屎燒灰猪脂和塗不覺自出。千金方

刺在肉中

温小便漬之。千金

箭鏃入腹

或肉中有聚血以婦人月經衣燒灰酒服方寸七。千金方

鐵刺入肉

凡針折入肉及竹木刺者刮人指甲末用酸棗搗爛塗之次日定出。聖惠方

金瘡出血

不止飲人尿五升。千金方

金瘡內漏

取瘡中所出血以水和服之。千金

鐵瘡出血

不止用人屎燒研傅之。千金方

竹木刺肉

不出頭垢塗之即出。劉涓子

金瘡腸出

乾人屎末粉之即入。千金方

箭鏃入肉

以蜈蚣杵汁滴上三五度自出。千金方

箭鏃不出

時珍發明集異記云刑曹進河朔健將也為飛矢中日拔矢而鏃留於中錯之不動痛因俟死一日一僧丐食肖所夢者叩之僧云但以寒食餠點之如法用之清涼頓

減痛楚至夜啗痒用力一鉗而出旬日而癒

箭鏃入肉

大雄鼠一枚取肉薄此研每服二錢執酒下瘡痒則出矣。集要

竹木入肉

針撥不盡者以人齒垢封之即不爛也。葉氏通變要法

杖瘡腫痛

釜月下土為末油和塗之卧羊皮上頓塗。千金方

本草類方

金鏃竹木傷

七

杖瘡腫痛

油拌成膏攤油紙貼之肉消者填滿緊縛

急方

金瘡內漏

雄黃半豆大納之仍以小便服五錢血枯化為水。肘后方

金瘡出血

寒水石瀝青等分為末乾擦勿經水。積德堂方

刀瘡傷濕

未洗傅甚者加龍骨一錢孩兒茶一錢。實爛不生肌寒水石散一兩黃丹二錢為

堂種

杖瘡腫痛

雄黃二分蜜陀僧一分研末水調傅之極妙。救急方

杖瘡腫痛

新石灰麻油調搽甚妙。集簡方

杖瘡腫痛

滑石赤石脂大黃等分為末茶湯洗淨貼。趙氏經驗方

臨杖預報 無名異末臨時湯服三五錢則杖不
甚痛亦不甚傷。談望翁試效方

刀刃金瘡 石灰裏之定痛止血又速愈瘡深不
宜速合者入少膏石傳之。肘后方

金瘡出血 甚多若血冷則殺人宜炒鹽
三撮酒調服之。梅師方

金瘡出血 慈石末傅之止痛
斷血。千金方

金瘡中風 煎鹽令熱以匙抄瀝却水熱瀉瘡上冷
更膏一日勿在取瘡大效。肘后方

金瘡瘀血 在腹中用大麻仁三升葱白十四枚搗熟
水九升煮一升半頓服血出不盡更服。

千金

杖瘡潰爛 乳香煎油搽瘡
口。永類鈴方

杖瘡腫痛 芙蓉花葉研末入皂莢末少許
雞子清調塗之。方廣附餘

本草類方 金銖竹木傷
卷八

杖瘡腫痛 水蛭炒研同朴硝等分研末
水調傅之。周密志雅堂抄

代杖 燒過人骨為末空心酒服三錢受杖不
腫不作瘡久服皮亦厚也。醫林集要

杖瘡腫痛 未毛鼠同桑椹子入麻油中浸
釀臨時取塗甚效。西湖志

杖瘡腫毒 服童便良
。千金方

杖瘡疼痛 綠豆粉研以雞子白
和塗之妙。生生編

杖瘡青腫 用濕綿紙鋪傷處以燒過酒糟搗爛厚鋪
紙上良久痛處如蟻行熱氣上乃即散。
簡便

方

杖瘡焮腫 六月六日取黃瓜入甕瓶中小水浸之
每以水掃於瘡上立效。醫林集要

杖瘡已破 雞子黃熬油搽之其
效。唐瑤經驗方

金瘡腸出

以乾人屎未抹入藥皮線縫合熱雞血塗之。生肌編

杖瘡出血

和血一升石灰七升和劑燒灰再以水

杖瘡腫痛

大黃末醋調塗之童尿亦可調。醫方摘玄

杖瘡青腫

豆腐切片貼之頻易一法以燒酒煮貼之色紅即易不紅乃已。拔萃方

割甲成瘡

連年不愈用烏頭尖黃蘗等分為末洗了貼之以愈為度。古今錄驗

刺傷中水

腫痛者非熱搨之。千金

杖瘡未破

乾黃上末童尿入雞子清調塗刷上乾即上隨以熱水洗去復搨復洗數十次以紫

轉紅為度仍刷兩膊以防血攻陰也。攝生方

惡刺傷人

黃若根水煮汁浸之冷即易神方也。千金

本草類方

卷八 金銖竹木傷

九

割甲侵肉

久不瘡的砂礬石為末裹之以瘡為度。外臺秘要

杖瘡腫痛

五倍子去穢米醋浸一日慢火炒黃研末乾摻之不破者醋調塗之。衛生易簡方

本草類方卷之八

跌撲折傷第九十四

折傷筋骨

秘傳神效散治跌撲傷損骨折骨碎筋斷痛不可忍此藥極能理傷續斷累用累驗用路上墻脚下往來入便溺處久碎死片一塊洗淨火煨米醋淬五次黃色為度刀刮細末每服三錢好酒調下在上食前在下食後不可以輕易而賤之誠神方也。鄧以正真人經驗方

墜撲瘀血

從高落下瘀血滄心面青氣短欲死胡粉一錢和水服即安。肘后方

折傷接骨

官粉硼砂等分為末每服一錢蘇木湯調下仍煩飲蘇木湯大效。接骨方

接骨續筋

止痛活血定粉當歸各一錢硼砂一錢半為末每服一錢蘇木煎湯調下仍煩飲湯

本草類方

跌撲折傷

辛

易簡衛生

跌撲傷損

半兩錢五個火煨醋淬四十九次甜瓜子五錢真珠二錢研末每服一字好酒調隨上下食前

後。青囊

打撲瘀血

在骨節及脇外不去以生錄一觔酒三升煮一升服。肘后方

癩撲傷損

紫蘇搗傅之磨口自合。談楚翁試驗方

損傷接骨

無名異甜瓜子各一兩乳香沒藥各一錢為末每服五錢熱酒調服小兒三錢服畢

以黃米粥塗紙上擦左額牡蠣末裹之竹篾夾住。多能鄙事

打傷腫痛

無名異為末酒服起下四股之末血皆散矣。集驗方

折傷止痛

白礬末一匙泡湯一盆帕蘸乘熱熨傷處少時痛止然後捋整筋骨點藥。靈苑方

墜落車馬 筋骨痛不止 延胡索末豆淋酒服二錢日二服。聖惠方

打撲傷損 黃葵子研酒服二錢。海上方

打跌骨折 酒調白及末二錢服其功不減自然銅古銖錢也。永類

破傷出血 燈心草嚼爛傅之立止。勝金方

傷損血出 不止以陳紫蘇葉煎所出血接爛傅之血不作膿且愈後無癢甚妙也。永類鈐方

打傷青腫 炙豬肉搗之。千金

損傷瘀腫 澤蘭搗傅之良。巢簡方

從高墜下 欲死者取老鴉眼睛草莖葉搗汁服以渣傅患處。唐鑑經驗方

打撲傷損 閃內骨節用接骨草葉搗爛罨之立效。衛生易簡方

本草類方 跌撲折傷 卷八

折傷閃胸 土牛膝搗罨之。衛生易簡方

打撲折傷 羊脂調芫荽子末傅之。千金方

打撲瘀痕 小調半夏末塗之一宿即沒也。永類鈐方

折腕損傷 卓氏膏用大附子四枚生切以猪脂煎三年苦醋同漬三宿取脂煎三上三下日摩傅之。深師方

打撲損傷

骨節及筋傷爛用生地黃熬膏裝之以竹簡編夾急縛勿令轉動一日一夕可十易之則瘥。類說云許元公過橋墮馬右臂

白脫左右急接入白巾昏迷不知痛苦急召田錄事視之曰尚可救乃以藥封腫處

中夜方甦達日痛止痛處已白日以換貼其瘀腫移至肩背乃以藥下去黑血三升

而愈即上方也。西對后方中。損傷打撲

傷損瘀血

瘀血在腹者用生地黃汁三升酒一升半煮二升半分三服。出千金方
一切傷損瘀血積痛不可忍並以此藥推陳致新大黃酒蒸一兩去皮三七粒細研一匙煎六分雞鴨時服至曉取下瘀血即愈。和濟方治跌壓瘀血在內服滿大黃當歸等分炒研每服四錢溫酒服取下惡物愈

接

骨

燒過童子骨一兩乳香二錢喜紅絹一方燒灰為末熱酒調服先以桐木片紫定立效。醫林集要

打撲傷痕

瘀血流注或作潮熱者大黃末薑汁調一夜黑者紫二夜紫者白也。瀕湖集方

本草類方

跌撲折傷

三

折傷腫痛

芎藭根鴉塗重布裹之熱除痛即止。葛洪肘后方

一切折傷

寒食蒸餅為末每服二錢酒下甚驗。肘后方

寬筋治

何首烏十斤生黑豆半斤同煎熟皂莢斤燒存性牽牛十兩炒取頭末薄荷十兩木香牛膝各五兩川烏頭炮二兩為末酒糊丸梧子大每服三十九茶湯下。永類

破傷血出

何首烏末傅之即止神效。筆峰齋方

蹉跌破傷

筋骨用鼓三升水三升漬濃汁飲之止心悶。千金

磕撲青腫

老茄極大者切片如一指厚新瓦焙研為末欲臥時溫酒調服一錢匕。醫方類聚無痕迹也。勝金

跌人瘀損 白麵梔子仁同搗

墜損跌撲

散血止痛重陽日取老茄子百枚去蒂切破切之消石十二兩搗碎以不津器先蒸

茄子一重乃下消石一重如此間鋪合書以紙數層密封安置淨處上下以新磚承中曝之逐日如至二月後取出紙兩重口瓶頸出濾去滓別入新器中以薄綿蓋頭又曝至成膏乃可用每以酒調半匙穿腹飲之日再惡血散則痛止而愈矣若膏久乾硬卽以飯飲化動用之○圖經本草

跌撲傷損

薑汁和酒調生麵貼之

多年損傷

不瘡冬瓜子末溫酒服之○孫真人方

跌撲傷損

用乾冬瓜皮一兩真牛皮膠一兩剉入鍋內炒存性研末每服五錢好酒熱服仍飲

本草類方

跌撲折傷

酒一甌厚蓋取微汗其痛卽止一宿如初極效○摘玄方

傷筋出血

葛根搗汁飲乾者煎服仍蒸屑傅之○外臺秘要

打撲損傷

用綠豆粉新銚炒紫新汲井水調傅以杉木皮縛定其效如神此汀人陳氏夢傳之方○澹

毆傷瘀聚

腹中悶滿或一升水三升煮三沸分服不瘡再作○千金方

打頭青腫

豆黃木傅之○千金方

傷損接骨

薑薑子一兩小黃米炒二合龍骨少許爲末醋調成膏攤紙上貼之○乾坤秘韞

打撲血聚

皮不瘡者用羅毒或藥搗封之○邵氏方

腦破骨折

密和葱白搗勻厚封立效○肘后方

折傷墮墜 瘀血在腹氣極大者五升水一斗煮汁二升頓服劇者不過三升○千金方

跌撲折傷 疼痛接骨方黃麻燒灰頭髮灰各一兩乳香錢為末每服三錢溫酒下立效○王仲勉經

驗方

閃胸脫臼 赤黑腫痛湯黍米粉鐵漿粉各半斤蒸一斤同炒存性研末以醋調服三次後水調

之○集威

筋骨傷破 以熱白馬屎薄之無壞○千金

跌撲損傷 五爪龍為汁和童尿熬酒服之取汗○簡便方

墜傷撲損 瘀血在內頓服者痛黃末空心溫酒服三錢○寒上方

損傷血出 痛不可忍用龜上凌寒誠袋兒插水服渣吞常口立效○補珍

本草類方 跌撲折傷

閃拗手足 牛薑葱白搗爛和麴炒熱之

打撲傷損 諸瘡寒浸糯米逐日易水至小滿厚出日乾用水調塗之○便民圖纂

打撲傷腫 熱麻油和酒飲之或以火燒熱地臥之覺則疼痛俱消松陽民相醫用此法經官驗之了無痕迹○趙

藥行營雜錄

墜馬血瘀 積在胸腹吐血無數者乾藕根為末酒服方寸匕日二次○千金方

折傷金瘡 乾梅燒存性傅之宿瘡○千金方

墜損嘔血 墜跌積血心胃嘔血不止用乾荷葉每酒服方寸匕其效如神○張

要

一切損傷 止血生肌令無痕用鹽葶藶湯

如泥做或搽于以竹筒吹之

未傳之神聖絕

妙心經驗方

打撲傷損

瘀血調悶身體疼痛辣桂
為末酒服二錢。直指方

壓撲傷損

胡桃仁搗和溫酒頓
服便差。圖經本草

撲損折骨

夜合樹皮即合歡皮去粗皮炒黑色
芥菜子炒一兩為末每服二錢溫酒
服以滓傳之接骨甚
妙。王粲百一選方

筋骨損傷

米粉四兩炒黃入沒藥乳香末各
兩酒調成膏攤貼之。御藥院方

顛撲傷損

松節煎酒服
談堊翁方

打撲損傷

惡血攻心悶亂疼痛者以乾荷葉五升
存性為末每服一錢童子熱尿一盞食前
調下日三服利下惡
物為度。聖惠方

本草類方

跌撲折傷

三

墜損腸出

新汲井水冷噴其身面則
腸自入也。嘉祐主治

跌撲傷損

水調經度去青溜白
醋炒搗傷。集簡方

折傷腫痛

龜子白麴同搗塗
之甚效。集簡方

墜馬拗損

桑根白皮五斤為末水一升煎膏傅之便
止已後亦無宿血終不發動。經驗後方

折傷筋骨

接骨木半兩乳香半錢芍藥當歸芍藥白
然銅各一兩為末化黃蠟四兩沒藥攪勻
衆手丸如灸子大者。折傷損酒化一丸若

從高墜下

碎傷筋骨先用此傅貼乃服。衛生易簡
有瘀血在內則琥珀屑酒服方寸七分

折傷接骨

蒲黃三二七服四錢。外臺秘要
市上乞兒破鞋底一雙
醋調成糊傅患處以絹
灰白麵等分好

折傷接骨

東甯止骨節有聲為
效。楊誠經驗方

折傷接骨

陽拱摘髮方用土警啗存一為春每服二
三錢接骨神效一方生者搗汁酒服○袖
珍方用阿膠皮即土驚六錢隔紙砂鍋內焙
乾自然銅二兩用火煨醋淬七次為末每
服二錢酒調下病在上食後病在下食
前神效○董炳集驗方用土警燻乾一個
臨時旋研入藥乳香投藥龍骨自然銅火
煨醋淬各等分磨香少許為末每服三分
入土驚末以酒調下須臾整言者乃服藥
否則接挫也此乃家傳秘法救之又可代
杖

跌撲損傷

瘀血症心腹脹痛走臥不便不通飲死川
江蘇石女燒黃半兩火煨醋淬末各二
兩為末每服二錢熱酒下○齊生
惡血以毒為畏名奪命丹○齊生
控 出骨竅等症雙料○齊生
炒黃柏礬二兩巴豆末○齊生

跌撲傷損

本草類方

拆傷疼痛

調劑神定換三四次即愈忌酒
婦近之○邵廣人經驗良方
水蛭新瓦焙碎末酒服二錢全具作實
可更一服痛止便將折骨藥封以物夾定
調理○

折傷出血

但不透膜者以海味中鹹白鯨大片包
有紅絲者成片鋪在傷處以帛綢之即愈
○普濟方

折傷接骨

大蝦蟇生研如泥劈竹裹縛
其骨自痊○奚臺備急方

跌磕傷損

黃牛屎炒熟封
裹之即效○

墜跌打擊

內傷神效方
烟出為末酒
其效如神○
古今錢驗方
麝香各一兩每服
錢當下高血承

骨節離脫 生肌獨爛以熱酒傾入連飲數碗其渣塗之半日內骨肉谷谷有聲即好乾額燒灰

聖瑤經驗方

跌破出血 烏賊魚骨末傅之直指方

損傷接骨 牛蹄甲一個乳香末藥各二錢為末入甲內燒灰以黃米粉糊即成膏傅之。秘製

墜損疼痛 故馬糞兩段酒五升鹽一抄煮熱聚之令即易三五度痊。廣濟方

骨折腫痛 五靈脂白芨各一兩乳香沒藥各三錢為末煎水同香油調塗患處。乾坤秘旨

打傷攔撲 及牛馬觸動胸腹破血四肢摧折以烏雞一隻連毛炸一千二百下苦酒三筋和勻以袱布搗病處將膏塗布上覺寒振欲脫徐徐取下須臾再上一雞少頃再作以愈為度。

刑后方 跌撲折傷

本草類方 跌撲折傷

傷損不食 凡打撲傷損三五日水食不入口用生猪肉二大錢打爛湯水洗去血水再搗爛以陰陽湯打和以半錢用雞毛送入咽內却以陰陽湯灌下之其食虫聞香實則瘀血而上胸中自然開解此乃損血凝聚心間虫食血飽他物虫不來探故也謂之驅通之法。

鄧氏 跌撲傷損 黃牛皮膠一兩乾冬瓜皮一兩剉同炒惟研末每服五錢熱酒一鍾調服仍飲用三鍾暖附微汗痛止

跌撲損傷 一宿接元如故。簡氏 血藥骨痛鹿角末酒服方寸七日三。千金方

跌跌損傷 用下竈烏即鷄也取骨燒存性以占銅錢一個假紅醋淬七次為末等分酒服一錢不可過多病在下空心在上食後服極有效驗須先夾縛走乃服此。唐蘭道太方

損傷接骨

五靈脂一兩 茴香一錢 烏末先以乳香末于棉布處傅上以小量米粥塗之乃擦二

末于粥上帛裹木牌子夾 定三五日效。需門事親

打撲傷痛

羊角灰以沙糖水拌瓦焙焦為末 每熱酒下二錢仍探痛處。簡便

脇破腸出

以香油抹手送入煎人參枸杞子汁 温淋之喫羊腎粥十日即愈。危氏

損傷青腫

用新羊肉貼 之。千金方

打擊青腫

大豆黃為末水和 塗之。外臺秘要

筋骨折傷

急取雄雞一翼刺血量患人酒量或 碗或半碗和飲痛立止神驗。青囊

打擊青腫

炙猪肝貼 之。千金

打損接骨

狗頭一個燒存性為末熱 醋調塗暖日。衛生易簡

本草類方

跌撲折傷 卷八

折傷跌撲

童便入少酒飲之推陳致新其功甚大。 薛已云予在居庸見覆車被傷七人仆地

呻吟俱令灌此皆得無事凡一切傷損不 問壯弱及有無瘀血俱宜服此若脇脹或

作痛或發熱煩燥口渴惟服此一服勝似 他藥他藥雖效恐無瘀血反致誤人童便

不動臍胸不傳氣而動無一失軍 中多用此屢試有驗。外科發揮

折傷

水瀨一個支解入罐內固濟待乾煨存性 為末以黃米煮粥攤患處擦額末於粥上

布裹之立止疼 痛。經驗後方

折傷

死童子骨煨過香瓜子仁炒乾為 末好酒下止痛極速。扶壽精方

打傷出血

竹節草即馬蘭同旱蓮草松香皂子葉即 柅子葉冬用皮為末搽入刀口。又玄方

打墜腰痛

瘀血凝滯破故紙炒香炒辣桂等分為 末每熱酒服二錢破故紙之腰痛行血。

直拾方

傷損內痛

兵杖所加木石所逆血在胸背脇下刺痛用青竹茹亂髮各一團炭火炙煎為末酒

一升煮三沸服之
三服愈。千金方

擗撲欲死

一切傷損從高墜下及木石所逆落馬撲車瘀血凝滯氣絕欲死者亦活用淨土五升蒸熱以故布重裹作二包更互熨之勿大熱恐破肉取痛止則已神效之方。孫

真人千
金方

本草類方

跌撲折傷
卷八

完

本草類方卷之八

五絕第九十五

忤惡卒死 銅器或瓦器盛熱湯隔衣熨其腹上冷即易立愈。陳藏器本草

夜卧禁魘 凡卧時以鞋一併一覆則無魘及惡夢。起居雜忌

自縊垂死 葱心刺耳鼻中

五種通尸 其狀腹脹氣急冲心或螺蛳踊起或率腰脊以雞卵白七枚頓吞之良。千金

卒自縊死 以薑汁灌之

好魘多夢 燒人灰置枕中屢中

夜臥魘死 勿用火照急取梁塵納鼻中即活。真粹錄

本草類方 五絕

尸厥卒死 不知人者燒尸塲土二三錢搗細湯泡灌之即活如無以竈心土代之。何氏方

臥忽不寤 勿以火照但痛齒其踵及足拇趾甲際而多唾其面以井底泥塗其目令人垂頭入

井中呼其姓名便甦也。肘后方

卒中惡氣 伏龍肝末一雞子大水服取吐。千金方

魘寐暴絕 竈心對鍋底土研末水服二錢更吹入鼻。千金方

尸厥不醒 脉動如故竈突墨彈丸漿水和飲仍針百會足大趾中趾甲側。千金方

魘寐卒死 銅底墨水灌二錢并吹鼻。醫說

客忤中惡 多於道間門外得之令人心腹絞痛脹滿氣冲心胸不即治殺人搗墨水和服二錢

後方

卒自縊死

梁上塵如豆大各納一筒中四人同時極力吹兩耳及鼻中卽活。外臺秘要

人溺水死

時珍曰古方治人溺水死用甕中灰一石埋之從頭至足惟露七孔良久卽甦凡婦溺水死試以灰埋之少頃卽便

墮水凍死

活甚驗蓋灰性暖而能反水也。普濟心頭冷卽易待眼開以溫酒與之。

客忤中惡

道間門外得之令人心裏刺痛氣衝心胸脹滿不治害人真丹方寸七蜜三合和灌之。肘後方

客忤卒死

貞丹方寸七蜜三合和灌之。肘後方

人落水死

裹石灰納下部中水出盡卽活。千金方

本草類方

五絕卷八

人溺水死

白沙炒覆死人面上下惟露七孔卒濕卽易。千金方

鬼擊卒死

吹醋少許入鼻中。千金

救溺水死

以大瓮卧之後足放高用鹽擦臍中待水自流出切勿倒提出水。救急方

鬼擊中惡

卒然着人如刀刺狀胸膈腹內疔刺切痛不可按或卽吐血鼻中出血下血一名鬼

拼以熟艾如雞子大三枚水五升煎二升頓服。肘后方

五絕急病

一曰自縊二曰墮壓三曰溺水四曰魘魅五曰產乳並以半夏末納大豆一丸入鼻

中心溫者一日可活也。子母秘錄

人好魘寐

桃仁熬去皮尖三七枚以小便服之。千金方

水瀉卒死

一宿者尚可活紙裹皂莢末納下部須臾出水卽活。外臺秘要

自縊將死

皂莢末吹鼻中。外一方

卒中惡死

斷猪尾取血飲并縛豚梳之卽活此乃長桑君授扁鵲法也出魏夫人傳。肘后方

卒縊垂死

心口猶溫者勿斷繩刺雞冠血滴口中以安心神或云男用雌女用雄。肘后

縊死未絕

雞血塗喉下。千金

卒魔死昏

京門上雞頭爲末消服之。千金方

縊死未絕

蓋和灌口鼻。肘后

臥忽不寤

若以火照之則寤人道唾其面痛齒其腫及大趾甲際許訶以犀角爲枕卽令不魔

夜夢魘寐

以赤繩一尺枕之卽安。肘后

中惡不醒

令人尿其面上卽醒此扁鵲法也。肘后方

本草類方

五絕卷八

三

本草類方卷之八

諸蟲傷第九十六

蠍螫傷

以水浸故布揭之
暖即易。千金方

蠍螫傷

温湯漬之數易至且愈
○華陀治彭城夫人方

蛇咬毒攻

人腹以兩刀於水中相
摩飲其汁。按急方

百蟲咬傷

以燈火熏之出
水炒。濟急方

蛇繞不解

熱湯淋之即
脫。千金方

蜈蚣螫傷

畫地作王字內取土
擦之即愈。集簡方

蜂蟻叮螫

反手取地上土傳之
或入醋調。千金方

本草類方

諸蟲傷
卷八

蠟螫尿瘡

畫地作蠟螫形以刀細取腹中土唾和塗
之再塗即愈孫真人云予得此疾經五六
日不愈或教此法遂瘳乃知萬
物相感莫曉其由也。千金方

蜈蚣螫傷

蚯蚓泥傅之
效。集效方

蜈蚣螫人

井底泥頻傅
之。千金方

諸蛇螫毒

銅青傅之
。千金方

蜂蠶螫傷

瓦摩其上唾二七遍置
瓦於故處。千金方

百蟲入耳

生油調銅絲滴入
。衛生家寶方

諸蛇螫傷

胡粉和蒜搗
塗。千金方

蠟螫尿瘡

醉和胡粉塗
之。千金方

嗽薑蟄人

醋和黃丹塗之。附后方

蚰蜒入耳

黃丹酥蜜杏仁等分熬膏綿裹包塞之聞香即出抽取。聖惠方

蜂蠶螫傷

人參末傅之。證治要訣

蛇骨刺人

毒痛鐵精粉豆許吹入密內。肘后方

百蟲入耳

青錢十四文煎膏二合以少滴之。聖濟錄

沙蜂叮螫

朱砂末水塗之。摘玄方

水蛭毒瘡

南方多雨有物曰水蛭大類鼻涕生於古木之上聞人氣則閃閃而動人過其下陰人體間即立成瘡久則通體摧以

朱砂麝香塗之愈。張杲醫說

百蟲入耳

水銀豆許傾入耳中以耳向下擊銅物數聲即出能食人腦非急切勿用。聖濟錄

本草類方

諸蟲傷卷八

毒

百蟲入耳

雄黃燒燃熏之自出。十便良方

蜘蛛傷人

雄黃末傅之。朝野僉載

蚯蚓咬人

其毒如大風眉鬚皆落確濃煎鹽湯浸身數石灰水浸之良。經驗方

蠍蝎咬人

醋和石灰塗之。聖惠方

蚯蚓咬毒

形如大風眉鬚皆落確濃煎鹽湯浸身數遍即愈浙西軍將張詔病此每夕蚯蚓鳴

子體一僧用此方而安。別畏鹽也。經驗方

毒蛇傷螫

嚼鹽塗之。灸三壯仍嚼鹽塗之。徐伯至方

蠟螻尿瘡

鹽湯浸綿搗瘡上。食療本草

解黃蠅毒

烏蒙山峽多小黃蠅生毒蛇鱗中醫人初無所覺漸痒爲瘡勿搔但以冷水沃之擦

鹽少許卽不爲
瘡。方輿勝覽

百虫入耳
嚼鹽塗之或鹽湯
即出。千金方

蜈蚣咬人
嚼鹽塗之
梅師方

蜂蠆螫叮
紫蘇葉搗飲
之。千金方

蛇虺傷人
燒刀茅頭令赤置白礬于上汁出熱滴之
立愈。千金方

蛇咬蠍螫
立瘥此神驗之方也真元十三年有兩僧
流南方到鄧州俱爲蛇蠍令用此法
便瘥更無他苦。劉禹錫傳信方

水調確砂塗之
立愈。千金方

蠍蠆叮螫
確砂膽礬等分爲末每吹
一字虫化爲水。聖濟錄

虫涎入耳
確砂膽礬等分爲末每吹
一字虫化爲水。聖濟錄

本草類方
諸蟲傷
卷八

蟲蛇獸毒
及蠱毒生明礬明雄黃等分于端午日研
末黃蠟和九椀子大每服七丸念藥王菩薩
七遍熱水送下。東坡良方

毒氣入腹白礬甘草等分爲末冷水服二
錢。瑞

蛇蟲諸毒
毒蛇射工沙虱等傷人口噤目黑手足直
下。東坡良方

竹堂方

射工溪毒
升麻烏嬰煎水服以
薄塗之。肘後方

蜈蚣咬傷
嚼鹽塗之
○醫學集成

蜘蛛咬傷
縛定咬處勿使毒行以貝母末酒服半兩
至醉良久酒化爲水自瘡口出水盡仍塞
瘡口甚妙。

仁齋直指方

蛇蠍咬傷
縛定咬處勿使毒行以貝母末酒服半兩
至醉良久酒化爲水自瘡口出水盡仍塞

瘡口甚妙。
仁濟直指方。

蜈蚣咬傷 效。補珍方。

蛇虺螫傷 龍腦薄荷葉研末酒服并塗之。易簡方。

溪毒射工 凡中溪毒知母連根葉搗作散服亦可。水搗絞汁飲一二升。夏月出行多取其葉自隨。欲入水先取少許投水上流便無患。兼辟射工亦可。煮湯浴之甚佳。肘後方。

薄荷葉按貼之。外臺秘要。

蜂蠆螫傷 新地榆根搗汁飲兼

毒蛇螫人 以漬瘡。肘后方。

惡蛇虺傷 青木香不拘多少煎水服效不可述。補珍方。

本草類方 諸蟲傷 卷八

蚰蜒入耳 水調綠礬灌之。普濟方。

諸毒虫傷 青黛雄黃等分研末新汲水服二錢。古今錄驗。

蜈蚣螫傷 蛇啣援傳之。古今錄驗。

毒蜂螫人 蟾膏封之即安。肘后方。

蜂螫螫毒 五月五日午時收蜀葵花石榴花艾心等分陰乾為末水調塗之。肘后方。

蛇虺咬傷 青麻嫩頭搗汁和酒等分服三盞以渣傳之。毒從竅中出以清藥水中即不發。看傷處有竅是雄蛇無竅是雌蛇。以針挑破傷處成竅傳藥。摘玄方。

蛇毒螫傷 以竹筒含瘡上落蠅灌之效。徐玉方。

蠅虻屎瘡 遠腰者敗醬煎汁塗之良。楊氏產乳。

蠖蠖尿瘡

避身即死以蒺藜葉搗傳之無葉用子。備急方

花蜘蛛毒

咬人與毒蛇無異用野繸絲即道人頭搗汁一盞服仍以渣傳之。摘玄方

蝸牛咬毒

毒行遍身者蓼子煎水浸之立愈不可近陰冷弱也。陳藏器本草

諸蟲蛇傷

艾炙數壯甚良。集簡方

蛇虺螫傷

衛生易簡方用小青一握細研入杏仁芒半兩酒調服手按患處候黃水出為效。摘玄方用小青大青牛膝葉同搗汁和酒服以渣傳之

惡蛇咬傷

地松搗傳之。易簡方

毒蛇傷螫

臨川有人被蝮傷即昏死一臂如股少遍身皮脹黃黑色一道人以新汲水調香白芷末一斤灌之覺臍中搗搯然黃水自口出腥穢逆人良久消縮如故云以麥門冬湯調尤妙仍以末擦之又經山寺僧馬蛇傷一脚潰爛百藥不愈一遊僧以香木數洗淨腐敗見白筋思乾以白芷末入香粉麝香少許擦之惡水湧出日日如一

本草類方

諸蟲傷

卷八

冬湯調尤妙仍以末擦之又經山寺僧馬蛇傷一脚潰爛百藥不愈一遊僧以香木數洗淨腐敗見白筋思乾以白芷末入香粉麝香少許擦之惡水湧出日日如一

蚰蜒入耳

地龍為末入葱內化水點入則蚰蜒亦作為水。聖惠方

射工中人

寒熱發瘡鬼白葉一把苦取汁服之一日二服。聖惠方

中射工毒

生瘡者烏髮片麻各二面升溫服以萍傅瘡上。聖惠方

毒蛇溪毒

沙虱射工等瘡傷口紫眼攻腹內成塊。聖惠方

厚傅復處。聖惠方

惡蟲咬人

紫草煎油塗之。聖惠方

變石不輕
瀉山。普濟方

咬瘡
大黃末塗之。醫說

赤瘡
天芥葉鋪於席下。次日盡死

三中人
有瘡。狼牙冬取根。夏取葉。搗汁。飲。西。五。合。并。傅。之。千金方

蛇傷螫
獨莖。狼子根。或葉。搗。搗。脂。和。塗。立。差。崔氏方

蛇咬傷瘡
生。董。仲。汗。塗。之。萬。畢。術

雙螻尿瘡
螻。蛉。窠。水。調。傅。之。集。玄。方

誤吞水蛭
必。吐。出。德。生。堂。方。藜。蘆。炒。為。末。水。服。一。錢

蝸蠹螫人
半。夏。末。水。調。塗。之。立。止。錢。相。公。篋。中。方

本草類方
諸蟲傷
卷八

飛蟲入耳
生。半。夏。麻。油。調。塗。耳。門。也。本。事。方

蛇咬腫悶
欲。死。用。重。臺。六。分。續。隨。子。仁。七。粒。搗。篩。為。散。酒。服。方。寸。匕。兼。唾。和。少。許。塗。咬。處。立。效。崔。元。亮

海上方

蛇蝎螫人
射。附。傅。之。顯。易。血。由。愈。梅。師。方

蛇咬瘡
生。杵。莖。汁。塗。之。萬。畢。術

惡蛇所傷
青。木。香。半。兩。煎。湯。飲。之。按。青。木。香。乃。馬。兜。鈴。根。也。與。廣。木。香。亦。名。青。木。香。者。不。同。方

小蒜搗汁服以

蛇螫螫人
小。蒜。搗。汁。服。以。滓。傅。之。肘。后

蝮蛇螫傷
楮。葉。麻。葉。合。搗。取。汁。漬。之。千。金。方

飛蟲入耳

石封條去。如筒子一。則中。就左出。示。

八耳中。正熏右耳。

蛇咬成瘡

暖酒淋洗瘡上。日。二次。廣利方。

蜘蛛咬人

炮薑切片貼之。良。千金。

毒蛇螫傷

牙入肉中痛不可堪者。勿令人知。私以符葉覆其上。穿以物。旬之一時。折牙自出也。

后方。

毒蛇螫傷

急飲好清油一二錢。解毒。然後用藥也。濟急良方。

蜈蚣咬瘡

嚼小蒜塗之。良。別后方。

螫刺螫人

醉磨附子汁傳之。醫學心鏡。

本草類方

蘇蔣草根燒灰傳之。外臺秘要。

蛇傷醫

蘇蔣草根燒灰傳之。外臺秘要。

受水瘡

杵鼓傳之。良。千金。

入耳

香油合稻桿灰汁滴之。聖濟總錄。

螫傷

人傳之。

螫人

人麥嚼傳之。日三。傷寒要。

螫人

薑末傳之。乾。

目

葉接熟寒之。或搗汁滴之。枕枕一夕自出。藥師。

蜈蚣傷

履底炙熱搽之。即安。外臺秘要。

蜘蛛咬傷

油裏研爛傳之。後方。

蜈蚣蜂傷

棟樹枝葉汁塗之
良。楊起簡便方

蠟燭尿瘡

隨身汗出以燕窠中土和猪
脂苦酒傳之。外臺秘要

蜈蚣螫傷

即止。梅師

蜈蚣螫傷

孟詵曰。即時嚼蒜封之。六七易仍。以蒜
升去皮以乳二升煮熱空心頓服。明
進外以去皮蒜一升搗細小便一升
四沸浸損處。梅師用獨頭蒜

百蟲入耳

高荳搗汁滴入自
出也。聖濟總錄

蜈蚣螫痛

苦杏仁嚼塗之
良。古今錄驗

射工中人

成瘡者以雞腸草搗塗
之。經曰。即愈。盧氏方

本草類方

卷八

百蟲入耳

薑汁少
許滴之

蛇虺咬傷

蜘蛛搗爛
傳之甚效

蛇咬久潰

小茴香搗末
傳之。千金

惡蛇蟲傷

魚鱉草。緞面草。槐樹葉。草。決明
一處杵爛。傳其效。救急易方

射工中人

狀如傷寒。寒熱發瘡。偏在一處。有異於常
者。取赤脫合葉。煎搗汁飲。一升。日再服之。

蟲刺螫人

鼓心嚼。傳少頃。見鼓中有毛。即差。若不
見。再傳。晝夜勿絕。見毛為度。外臺

蛇虺螫傷

胡荽苗。合口椒。等分
搗塗之。千金方

蛇螫腫痛

蒲公英。搗爛
貼。急救方

蛇螫腫痛

貼。急救方

蛇螫腫痛

貼。急救方

蛇螫腫痛

貼。急救方

蝮蛇入耳 萬昔葉乾者一分雄黃一分爲末糊丸棗核大蘸生油塞耳中引出。聖惠方

蜈蚣咬毒 醋磨生鐵傳之。篋中方

壁虱蜈蚣 蕎麥楷作薦并燒烟熏之

射工中人 有瘡用芥子末和酒厚塗之半日痛即止。千金翼

射工溪毒 馬齒莧搗汁一升服以滓傳之日四五次良。崔元亮海上方

蝮蛇入耳 胡麻炒研作袋枕之。梅師

蝮蛇入耳 劉禹錫傳信方用胡麻油作煎餅枕臥須臾自出李元淳尚書在河陽日蝮蛇入耳無計可爲腦悶有聲至以頭擊門柱奏狀危困因發御醫療之不驗忽有人獻此方乃愈。

圖經

本草類方

諸蟲傷 卷八

聖

毒殺傷螫 清醋急飲一二碗令毒氣不散然後用藥。濟急方

諸蟲入耳 凡百節蝮螻蟻入耳以苦酒注入起行即出。錢相公篋中方

蝮蛇中人 成瘡者取蒜切片貼上灸七壯。千金

毒蛇螫傷 姓白鳩傳。徐玉方

蜘蛛咬毒 羊桃葉搗傳之。愈。備急方

毒蛇螫人 紫莧搗汁飲之。一。三。五。錢。神效。神效。神效。

毒蜂螫人 紫莧搗汁飲之。一。三。五。錢。神效。神效。神效。

毒蜂螫人 紫莧搗汁飲之。一。三。五。錢。神效。神效。神效。

毒蜂螫人 紫莧搗汁飲之。一。三。五。錢。神效。神效。神效。

蜘蛛咬瘡

在身生瘡之類
在內府出此瘡
一在皮膚入成瘡
一在皮膚入成瘡
一在皮膚入成瘡

百蟲入耳

非汁灌之即
出○千金方

虻蟲攻心

如刺吐清汁者
之商一兩祥
一兩祥
一兩祥

蛆入耳中

綠碧摻之即
為水○備玄方

蜈蚣螫傷

菜子油傾地上
擦地上油摻之即好
另令四眼人見○陸氏積德堂方

毒蜂螫傷

清油搽之妙○
趙原陽濟急方

蜘蛛咬毒

醋磨生鐵博
之○義中坊

蟲咬

以酥和血塗
之○聖惠方

本草類方

諸蟲傷
卷八

星

射工溪毒

獨頭蒜切三分
厚貼上灸之
合蒜氣射入仰蹙○梅師方

蜈蚣螫傷

取灰莧葉擦之即
止○談楚翁方

毛蟲螫人

赤痛不止馬齒莧搗
熟封之妙○靈苑方

蜈蚣咬傷

馬莧汁塗
之○肘後

蚰蜒入耳

小蒜洗淨搗汁滴之未出
再滴○李絳兵部手集

蜘蛛咬毒

香油和鹽摻
之○普濟方

百蟲入耳

椒末一錢醋半盞浸良久少
少滴入自出○千金方

毒蛇咬螫

以閉口椒及葉搗
封之良○肘后方

蛇入人口

因熱取涼則地上有蛇入口
不能出者用
刀破蛇尾納生椒二三粒裹定須臾即自

退出也。
聖惠方。

蛇螫人

乾薑雄黃等分為末袋盛佩之。
遇螫即以傅之便定。廣利方。

蜈蚣咬傷

胡椒嚼封之即不痛。多能驅毒。

蠅虻尿瘡

初如漆粟漸大如豆更大如火。藥炮疼痛至甚者連以草茶并蠟茶俱可以生油調傅藥至痛乃止。勝金方。

諸蛇傷毒

桂心栝蒌等分為末竹筒密塞遇毒蛇傷即傅之塞不密即不中用也。

桑螵螫人

丁香香末蜜調塗。聖惠方。

蠚螫作痛

川椒嚼細塗之微傅即止。杏林摘要。

蠅虻尿瘡

出黃水用梨葉搗塗之乾即易。簡中方。

本草類方

諸蟲傷 卷八

百蟲入耳

川椒研細浸醋灌之自出。危氏方。

射工水毒

煎汁熬如飴塗之。肘后方。

蜘蛛咬瘡

遍身皆有以葱一枝去尖頭將蚯蚓入葉中緊捏兩頭勿令洩氣頭搖動即化為水。以點咬處甚效。

譚氏小兒方。

螫痛楚

烏賊骨一錢白礬二分為末。嚙鼻在左壁者嚙左鼻在右壁者嚙右鼻。衛生寶鑑。

螫腫疼

蜂房為末猪脂和傅。或煎水洗。千金方。

螫傷

以木盥合瘡處神驗。不傅。古今錄驗。

螫血出

九竅皆塞者取虫初食牛馬血。噴滿口。七葉鏡。傷銀。肘后。

三宜內

卷八

聖

毒螫傷
囊
陰乾每以一星敷上卽止神效

射工溪毒

鼠婦豆豉巴豆各三枚脂和塗之。肘后

九里蜂毒

鼠黃鑽孔貼于處艾炙孔上三五壯卽安。救急方

諸蟲入耳

以紙塞耳鼻留虫入之耳不塞閉口勿言少頃虫當出也。集玄方

蜘蛛入耳

生油調雞心血滴之卽出

中沙虱毒

斑蝥二枚一枚末服一枚燒至烟盡研末傅瘡中立瘥。肘后

瓠蝮惡瘡

槐白皮醋浸半日洗之。孫真人千金翼

本草類方

諸蟲傷

醫

工毒瘡

大蜈蚣一枚炙研和醋傅之。千金方

蛇入耳

蝸牛椎爛置于耳邊卽出也。瑞竹堂方

咬毒瘡

用吳茱萸一兩爲末冷水和作三服立安。勝金方

蛇螫傷

生蝦蟆一枚搗爛傅之。外臺

蠱螫傷

蟹殼燒存性研末密調塗之。證治要訣

虱叮螫

油木梳炙熱熨之。救急方

入耳

車釐脂塗孔中自出。梅師方

咬傷

生蠶蛾研傅之。必效方

蜈咬傷

白蠶皮貼之。集成

山行辟蛭 山中草木枝上有石蛭着人足則穿肌入肉中害人但以蠟猪膏和鹽塗足脛趾卽

不着人也

蠶咬成瘡 密調麝香傳之廣利方

毒蛇傷 凡咬蝮蛇蟻毒出傷以五靈脂末塗之立愈。金匱鈞玄

蜘蛛咬瘡 雞冠血塗之。或相公篋中方

蛇入七孔 卽出也。千金方

蠮螋尿瘡 烏雞翅毛燒灰油調傳之。蟲畏雞故也。瓊碎錄

諸蟲入耳 雞冠血滴入卽出。勝金

蜈蚣入腹 猪血灌之或飽食少頃飲桐油當吐出

本草類方 諸蟲傷

蝮蛇入耳 華陀方用牛酪灌入卽出若入腹則飲二升卽化為黃水。廣利方

蠮螋尿瘡 雞子一個輕敲小孔合之立瘥。兵部手集

蛇傷手腫 新剝羊肚一個帶糞割一口將手入浸卽時痛止腫消。集要

射工溪毒 白雞矢白者二枚以錫和塗瘡上。肘后

食蝨吞蛭 蛭噉臟血腸痛黃瘦飲熱羊血一二升次早化猪脂一升飲之蛭卽下也。肘后方

蠮螋尿瘡 鹿角燒末苦酒調服。外臺

百蟲入耳 雞肉炙香塞耳中引出。總錄

痰吞水蛭 腸痛黃瘦血熱飲一升立瘥。肘后

墨

愈三元延壽書

誤吞水蛭

以蒸餅半個絞出狗涎喫之連食二三其物自散○德生堂方

蜂蠆螫痛

牛屎燒灰苦酒和敷○千金方

蜂蠆螫瘡

牛角脂燒灰醋和傅之○肘后方

蟹螯作痛

貓兒屎塗之三五次即瘥○心鏡

蛛蟻蛇傷

雞子一個輕敲小孔合之立瘥○兵部手集

蟲虺螫蠶

凡蜈蚣蛇螫毒虫傷以五靈脂末塗之立愈○金匱鈞玄

水弩射人

熊膽塗之更以雄黃同酒磨服即愈○斗門方

蠹蝮尿瘡

狀如菜莢中央白膿惡寒壯熱磨犀角汁塗之○千金方

本草類方

諸蟲傷卷八

異

蜘蛛瘡毒

牛乳飲之良○生生編

蜈蚣入耳

炙豬肪掩耳自出○梅師

蜈蚣咬瘡

雞冠血塗之○錢相公篋中方

蟲蟻入耳

炙豬助掩耳自出○梅師

蟲蟻螫人

梳垢封之○集簡方

此蠅入耳

牛乳少少滴入即出若入腹者飲一二升即化為水○聖惠方

諸蛇毒入

梳垢一團尿和傅上炙梳出汗瘥之○千金方

蜘蛛咬毒

久臭人溺于大甕中坐浸仍取烏雞屎炒浸酒服之不爾恐毒殺人○陳藏器本草

百蟲入耳

小便少少滴入○聖惠方

毒蛇螫傷

先以小便洗去血次以牙塗封而護之甚妙且不腫痛○醫方摘要

蛇骨刺人

痛甚用死鼠燒傳○肘后

毒蛇傷螫

野鼠屎水調塗之○邵真人經驗方

蜈蚣入

頭垢苦參末酒調傳之○篋中

毒蛇螫傷

急以小便洗去血隨取口中唾頻塗之○湯拱醫方摘要

毒蛇咬螫

人尿厚封之○即濟○千金

蜂蠶螫人

頭垢封之○集簡方

百蟲入耳

人乳滴之即出○聖惠方

蛇纏人足

就令尿之便解○肘后方

本草類方

諸蟲傷卷八

蜂蠶螫傷

人尿洗之○肘后方

蜈蚣螫咬

頭髮燒烟熏之

蛇蟲螫傷

人耳垢蚯蚓屎和塗出盡黃水立愈○壽域方

蜂螫

用酥塗之○聖惠

蜈蚣咬傷

蜘蛛研汁塗之并以生者安咬處吸其毒○廣利方

蜂螫螫傷

蜘蛛研汁塗之并以生者安咬處吸其毒○廣利方

百蟲入耳

于耳門上○聖濟錄

蚤虱入耳

葛蒲末炒熱袋盛枕之即愈○聖濟錄

地蟲入耳

杏仁搗泥取油滴入非

本草類方卷之八

諸獸傷第九十七

犬咬血出以水洗至血止綿裹之。千金方

馬汗入瘡或馬毛入瘡腫入腹殺人。以冷水浸之。頭易水仍飲好酒立瘥。千金方

馬氣入瘡或馬汗馬毛入瘡皆致腫痛。頭熱入腹則殺人。多飲醇酒至醉即愈。妙。肘后方

照虎傷毒生。煮令有味洗之。肘后方

黑狗咬傷雄黃五錢。麝香一錢。為末酒下作二服。救急良方

風犬咬毒瞻礬末傅之立愈。濟急方

虎傷人礬末納入罌之止痛。尤妙。肘后方

牛類方諸獸傷卷八

驢馬汗毒所傷瘡痛白。礬飛過黃丹炒紫等分。醋之。王氏博濟方

元咬蛇傷山漆研末。米飲服三錢。仍嚼塗之。類湖集簡方

心狗咬傷紫蘇葉嚼傅之。千金方

元犬咬傷地榆煮汁飲。并為末。傅之亦可為末。白湯服。日三。忌酒。梅師方

狗咬風傷腫痛人參置桑柴炭上。燒存性。以鹽覆定。少頃為末。珍之。立瘥。經驗方

心咬傷藜蘆搗泥傅之。肘后

汗毒氣入腹。葶藶子一兩。炒研水一升。浸湯服。取下惡血。續十全方

惡蠶傷人蘆藿一大把。以水一升。漬須臾。取汁飲。以滓傅之。張文仲備急方

咬成瘡苦低草。即茺蔚。乃益母草也。切細和醋炒塗之。孫真人方

犬咬傷 地黃湯汁飯餅塗之
百度愈。百一方

犬咬昏悶 浸椒水調茶草末
傅之。便民圖纂

犬咬傷 黃苔子七枚吞之
日三服。千金方

犬咬傷 蓖麻子五十粒去殼以井花水研膏先
以鹽水洗吹痛處乃貼此膏。袖珍方

犬咬傷 嚼藥塗之粟即小
米也。葛氏方

犬咬人 荇菜根和鹽搗傅日
三上。外臺秘要

犬咬瘡痛 貓頭燒灰油調傅之
以麝為度。趙氏方

犬咬成瘡 備屎揉之即
愈。壽域方

咬傷瘡 香用蔓菁根
服佳。肘後

草類方 獸傷
八

汗入 心療之遲則毒深以生烏頭末傅
良久有黃水出即愈。靈苑方

狗咬傷 杏仁塗
寇氏

犬咬 舊屋瓦上刮下青苔屑
按之即止。經驗方

犬咬傷人 先吃清油一碗仍以油淋
洗瘡口。趙原陽濟急方

犬咬傷人瘡 但飲酒常令大醉
當吐毛出。梅師

犬咬傷人瘡 生葛煮濃汁洗之仍搗末水服
方寸七日夜五六服。梅師方

犬咬傷 蘇白搗汁飲之并塗之
三服。乃止。葛洪方

犬咬傷人 並飲生薑汁
解。小品

犬咬傷 糯米一合斑蝥七枚同炒蜜黃末
七枚再炒黃末之。王仁壽方

隆為末油調傅之小使
則下作○醫方大成

鼠咬成瘡

麝香封之
妙○經驗

馬咬人瘡

入心者馬齒莧
煮食之○聖惠

虎傷人瘡

內服生薑汁外以汁洗之
用白礬末傅上○經驗

馬汗入瘡

作痛用烏梅連核搗爛以頭醋和傅仍先
刺避出去紫血乃傅之繫定○經驗方

虎狼傷人

乾薑末傅
之○肘后

獼犬傷人

乾薑末水服二七生薑汁
服亦良前以薑炙熱熨之

虎傷人瘡

水化砂糖一碗服
并塗之○摘玄方

馬咬成瘡

獨顆栗子燒研
傅之○醫說

本草類方

諸獸傷
卷八

狗咬成瘡

白果仁嚼
細塗之

熊虎爪傷

獨顆菜燒研
傅之○醫說

獼犬傷毒

烏梅末酒服
二錢○千金

猪鬣成瘡

松脂煉作餅
貼之○金

狐尿刺瘡

麻鞋網
一片貼

如粟大婦人內衣有血者手大
棘針二七枚并燒研以猪脂調

傅當左
陳藏

獼犬咬傷

紫劑
中仍

砂糖調塗留口退腫口
杏仁去毒○仙傳外科

狐尿刺人

腫痛欲死
之冷即易○用後方

獼犬吠傷

梔子皮燒研石硫黃等分
為末傅之日三○梅師方

狂犬嚙人 蛇脯為末水服五分日三服無
蚰蛇他蛇亦可○外臺秘要

犬咬瘡發 瘡中○葛氏方

風狗咬傷 衛生易簡方云此方九死一生之病急用
斑蝥七枚以糯米炒黃去米為末酒一盞

煎半盞空心溫服取下內消三四枚
為盡如數少數日再服七次無狗形永不

再發也屢試屢驗○醫方大成用大斑蝥
三七枚去頭翅足用糯米一勾略炒過去

斑蝥別以七枚如前炒色變復去之別以
七枚如前至青烟為度去殼只以米為粉

用冷水入清油少許空心調服須臾再進
一服以小便利下毒物為度如不利再進

利復壯瘳急用冷水調青龍服之以解其
毒否則有傷黃連水亦可解之但不宜服

物也

本上類方

諸獸傷

毒

狐公刺瘡 痛甚者熱白馬
尿漬之○千金

獬犬咬傷 肘后治刺犬傷每七日一發生食蝦蟇
絕良亦可燒炙食之勿令本人知之自後

再不發也○補珍論風犬傷即用蠟蟄後
足搗爛水調服之先於頂心拔去血髮三

兩根則小便
內見沫也

獬犬咬傷 故梳非根各二枚水二升
煮一升頓服○外臺秘要

人咬傷瘡 適飯骨蟹肚骨各一片燒
餅油調塗之○葉氏摘要

猪咬成瘡 龜板燒研香油調
搽之○葉氏摘要

風狗咬傷 不洽即死用紅娘子二箇斑蝥五箇
翅是若四十歲各加一個五十歲各加二

個青娘子三個去翅足四十歲各加二
十六十歲加二個海馬牛個

乳香沉香栝柳各半分煎出少許
歲者作四服十五歲作三服二

服三十歲作一服
服○談塾翁方

狐尿刺人

腫痛用熱蠟着瘡并州煎
之令汗出即愈○別後方

獾犬嚙傷

目死蛇一枚燒焦為末
納入瘡中○千金方

虎傷人瘡

上○唐瑤經驗方
蟾蜍搗爛塗之日

馬咬成瘡

腫痛用雞冠血塗之
雞雞牡馬用雄雞○別后方

惡犬咬傷

虎骨剉末水服方寸
匕并傳之○小品方

馬汗入瘡

乾冬瓜燒餅
洗淨傳之

馬汗入瘡

雞毛燒灰酒服方
寸七○集驗方

本草類方

諸獸傷
卷八

惡犬咬傷

洗淨毒口熱牛屎封
之即止痛止○千金

獾犬傷人

蝟皮頭髮等分燒
灰水服○外臺方

馬汗入瘡

雄黃白礬各一錢烏梅三個巴豆一個
合調以油調半錢傳之良○經驗方

蛇犬咬傷

治蝮蛇傷人合婦人尿於瘡上良
日華子云以熱尿淋患處○千金方

獾犬毒人

頭垢蝟皮燒灰等分水服一盃口噤者用
灌之○犬咬人瘡重發者以頭垢少許納

瘡中用熱牛屎
封之○千金方

馬咬踏瘡

腫痛作熱鼠屎二七枚故馬嚼五
寸和燒研末猪脂和敷之○梅師

惡犬咬傷

左盤龍卽人尿也厚封之
數日卽愈○蘭氏經驗方

獾咬成瘡

雄鼠屎燒灰油和傳
之曾經效驗○壽域

虎狼傷瘡 月經衣燒末酒服方寸七日三〇陳藏器

虎爪傷人 刺蝟脂日傳之內服香油

狂犬咬傷 鼠屎二升燒末傳之〇梅師方

刺馬刺傷 以婦人月水塗之神效〇宿坦集驗方

狼烟入口 以醋調飲之〇方

馬汗入瘡 腫痛發死沸湯洗即痊一千金方

馬汗入瘡 石灰傅之〇諸方

人咬指爛 久欲脫者驚甲燒灰傅之〇葉氏摘玄方

鼠咬成瘡 鼠毛燒灰入麝香少許唾和封之〇諸方

本草類方 諸獸傷

獬犬咬傷 七日當一發三七日不發乃脫也急于無風處以冷水洗淨即服非汁一盞七日

又一盞四十九日共服七盞須百日忌食酸醢一年忌食魚腥終身忌食狗肉鳥獸

保全否則十有九死徐本齋云此法出野后方有風犬一日咬三人止一人用此法

活親見有

效〇簡便

本草類方卷之八

諸毒第九十八

中砒石毒

多飲新汲井水得吐利佳。○集簡方

中烏喙毒

多飲新汲井水得吐利佳。○集簡方

中蒙汗毒

飲冷水即安。○濟急方

中煤炭毒

一時運倒不救殺人急以清永灌之。○唐瑤經驗方

中砒霜毒

地漿調銀粉服之。○立解。○集玄方

中野芋毒

土漿飲之。○集簡方

黃鱔魚毒

食此魚犯荆芥能害人。○服地漿解之。○集簡方

本草類方

諸毒卷八

五

閉口椒毒

吐白沫身冷欲死者地漿飲之。○張仲景金匱方

牛馬肉毒

及肝毒取好土三升水煮清一升服即愈。○一方入頭髮寸截和之皆貫肝而出也。○肘后

解烏頭毒

不拘川烏草烏毒用多年陳壁土泡湯服之冷水亦可。○通變要法

解蜀椒毒

冬葵子煮汁飲之。○千金方

六畜肉毒

東壁土沫水服之。○錢即安。○集玄方

藥毒煩悶

欲死者東壁土調水三升頓飲之。○肘後方

皮膚中毒

名癩症用醋和燕窠土傅之。○千金方

解射罔毒

蚯蚓屎末并水服二方寸匕。○千金方

解砒霜毒 煩躁 任心腹疼痛四肢厥冷命在須臾

金石藥毒 黑鉛一斤鎔化投酒一升如此十餘次待酒至半升頓飲○勝金方

解硫黃毒 黑錫煎湯服即解○集簡方

水銀入耳 能蝕人腦以瓦枕耳邊自出也○仲景方

水銀入肉 令人筋攣惟以金物熨之水銀當出蝕金候金白色是也頓用取效此北齊徐玉方也○本草拾遺

解藜蘆毒 水服雄黃末一錢○外臺

取輕粉毒 出山黑鉛五斤打壺一把盛燒酒十五斤納土茯苓半斤乳香三錢封固重湯煮一日夜埋土中出火毒每日早晚任飲數盃後用瓦盆接小便自有粉出為驗

本草類方

諸毒 卷八

筋骨不痛乃止 醫方摘要

藥箭毒氣 鹽貼瘡上灸三十壯良○集驗方

輕粉破口 凡水腫及疼痛服輕粉後口瘡毒盡外煮汁頓頓含漱能殺粉毒以毒為良○外臺秘

要

解砒霜毒 錫器於粗石上磨水服之○濟急方

解金銀毒 水銀一兩服之即出○千金方

中飲食毒 雄黃青黛等分為末水服之雄黃末傅之淋洗○外臺秘

中藥箭毒 雄黃末傅之淋洗○外臺秘

解狼毒毒 鹽汁飲之

毒

解野菌毒

防風煎汁飲之。千金方

飲食毒物

細砂四兩甘草四兩真香油一斤瓶內浸之遇有毒者投油一小盞久浸尤佳。瑞竹堂經

竹堂經

壁鏡毒人

必死白礬塗之。太平廣記

解蕘砒毒

升串煮汁多服之。外臺秘要

解諸藥毒

已死只要心間溫暖者乃是熱物犯之只用防風一味搗冷水灌之。萬氏黃善堂

食蟹中毒

生藕汁飲之。聖惠

解烏頭毒

附子天雄毒並用防風煎汁飲之。千金方

解芫花毒

防風煎汁飲之。千金方

本草類方

諸毒卷八

要

解五石毒

薺菴生搗汁多服之。立糜。蘇頌圖經

中巴豆毒

下利不止黃連乾薑等分爲末水服方寸匕。明後方

中諸魚毒

香蘇濃煮汁飲之。良。肘后方

牛馬肉毒

甘草煮濃汁飲一二升或煎酒服取吐或下如渴不可飲水飲之即死。千金方

飲饌中毒

未審何物卒急無藥只煎甘草薺菴菴湯入口便活。金匱玉函方

食魚蟹毒

橘皮去白煎湯飲之甚良。肘后方

解釣吻毒

釣吻葉與荊葉相似誤食之殺入惟以薺菴人兩水六升煮取三升每服五合日五服。仲景

金匱玉函

解中酒毒

恐爛五臟茅根汁飲一月。千金方

水荑碧毒

菜中有水荑碧葉圓而光有毒誤食令人
任亂狀若中風或作吐以甘草煮汁服之

卽解○金園
玉函妙方

食蟹中毒

紫蘇了煮沖飲
之○金匱要略

中砒霜毒

鶴金末二錢入蜜少許
冷水調服○事廣記

萬病解毒丸

一名太乙紫金丹一名正乙丹解諸毒療
諸毒利節治百病起死回生不可盡述

凡居家遠出行兵動衆不可無此山慈姑
去皮洗極淨焙二兩用五倍子洗刮焙二
兩千金子白面者研紙華去油一兩紅茅
大戟去蘆洗焙一兩半廣香三錢以端午
之夕重陽或天德月德黃道上吉日領先
齋戒盛服精心治藥爲末陳設拜禱乃重
羅合勻用糯米濃餳和之末曰杵干下作
一錢一錠病甚者連服取利一二行用溫

本草類方

諸毒
卷八

五

粥補之凡一切飲食染毒蠱毒障氣河豚
上菌死牛馬等毒並用涼水磨服一錠或
吐或利卽愈癰疽發背疔腫楊梅等一切
惡瘡風疹赤遊痔瘡並用涼水或酒磨塗
日敷次立消陰陽二毒傷寒狂亂癩痰喉
痺瘧風並用冷水入薑黃汁數匙化下
氣痛並諸氣用淡酒化下泄瀉痢下望亂
絞腸沙用薄荷湯下中氣中風口緊眼歪
五癩五癩兒邪鬼胎筋攣骨痛並暖酒下
自縊弱水鬼迷心頭溫者冷水磨醴之傳
尸癩瘡涼水化服取下惡物蟲積爲妙久
近瘡疾將發時東流水煎桃枝湯化服女
人經閉紅花酒化服小兒驚風五疳五疳
薄荷湯下頭風頭痛酒研貼兩太陽上諸
腹鼓脹麥芽湯化下風蟲牙痛酒磨塗之
亦吞少許打撲傷損松節煎酒下湯火傷
毒蛇惡犬一切虫傷並冷水磨
塗仍服之○王宗百一選方

解輕粉毒

齒縫出血臭腫貫泉黃連各半兩煎水入水片少許時時漱之。陸氏積德堂方

解桐油毒

乾柿餅食之。普濟

食牛馬毒

殺入者省頭草連根葉煎水服即消。唐瑤經驗方

一切食毒

縮砂仁末水服一錢。事林廣記

食蟹中毒

紫蘇煮汁二升服之。金匱要略

食丹藥毒

萱草根研汁服之。事林廣記

金石藥發

麥門冬六兩人參四兩甘草炙二兩為末蜜丸梧子大每服五十九丸飲下日再服。

本草

服藥過劑

煩悶及中毒煩悶欲死搗藍汁服數升。肘后方

本草類方

諸毒卷八

奕

卒中水毒

搗藍青汁傅頭身合匪。肘后方

一切菌毒

因蛇虫毒氣薰蒸所致用芫花生研新汲水服一錢以利為度。危氏得效方

解砒石毒

白芷末井水服二錢。事林廣記

自死肉毒

自死六畜有毒以黃藥末水服方寸匕。肘后方

閉口椒毒

氣欲絕或出自沫身體冷急桂汁服之多飲新汲水一二升。梅師方

解芫青毒

煮桂汁服

中鈞吻毒

煮桂汁服

卒中水毒

初覺頭目微痛惡寒骨節強急日醒暮劇手足逆冷三日則虫蝕下部六七日濃潰食至五臟殺人也搗常恩草絞汁服

二升并以綿染導其下部。肘后方

中鼠莽毒

金線重樓根磨水服即愈。集簡方

食狗肉毒

心下堅或腹脹口乾忽發熱。梅師方

中馬

母。心下堅或腹脹口乾忽發熱。聖惠方

鯁鯁魚毒

心下堅或腹脹口乾忽發熱。千金方

食鱧中毒

心下堅或腹脹口乾忽發熱。千金方

中藥箭毒

心下堅或腹脹口乾忽發熱。千金方

中沙虱毒

射開傅之。千金方

解蜀椒毒

致汁飲之。千金方

水中毒病

蛇毒根搗末服之並導下部亦可飲汁一二升夏月欲入水先以少末投中流更無

本草類方

諸毒卷八

堯

所畏又辟射工家中以器貯水浴身亦宜投少許。肘后方

解鴉酒毒

合水調服。豆粉二

解鴆毒

氣欲絕者葛粉三合水三盞調服口噤者灌之。聖惠方

解雄黃毒

防已煎汁服之

水毒中人

一名中溪一名中濕一名水病。射工。無物初得惡寒頭目微痛三醒。劇。逆冷三日則重。食下不禁。以小麥三升煮

日中食五臟注下不禁。以小便。熱大熱即無力以浴身若身發赤斑。文者母以他病治之也。肘后方

食物中毒

生薑汁服。吐下血不止。後黃。汁冷服。牛。下血不止。後黃。汁冷服。牛。

食毒又毒

吐下血不止。後黃。汁冷服。牛。

瘕本

一切毒藥及諸毒煩悶不止甲乙草三兩水五升或二升去滓入黍米粉一兩白蜜二兩煮

如薄粥食之。外臺

中水毒病手足指冷至膝肘即是以浮萍日乾為未飲服方寸匕良。姚僧坦集驗方

解鼠芥毒鏡前草自然汁清油各一盃和服即下毒三五次以肉苁補之不可遲。張杲醫說

諸鳥肉毒生扁豆末冷水服之。事林廣記

解諸藥毒已死但心頭溫者用綠豆粉調水服。衛生易簡方

解肉脯毒凡肉密器蓋過夜者為變肉屋漏沾著者為漏脯皆有毒搗韭汁飲之。張文仲備

方急

本草類方

諸毒

卒

解砒石毒稻草燒灰淋汁調青黛三錢服。醫方摘要

六畜肉毒小豆一升燒研水服三寸匕神效。千金方

解河豚毒一時倉卒無藥急以清麻油多灌取吐出毒物即愈。衛生易簡方

沙蠱水毒蒿莒菜搗汁塗之良。肘后方

解砒石毒綠豆粉寒水石等分以藍根汁調服三五錢。衛生易簡方

解一切毒石菖蒲白礬等分為末新汲水下。事林廣記

中沙虱毒沙虱在水中人澡浴則着人身鑽入皮裡初得皮上正赤如小豆黍粟摩之痛如刺三日後寒熱發瘡毒若入骨殺人嶺南多

此即以茅葉刮去以苦菜汁塗之佳。肘方

食雞子毒

飲醋少許卽消。廣記

草烏頭毒

及天雄附子毒並食餘餽卽解。總錄

解舉砒毒

大豆煮汁飲之。良。肘后

六畜肉毒

白扁豆燒存性研塗水服之。良。事林廣記

中砒霜毒

白扁豆生研水絞汁飲。永類方

酒食諸毒

大豆一升煮汁服得吐卽愈。廣記

食蟹中毒

乾蒜煮汁飲之。集驗方

食魚中毒

冬瓜汁飲之。良。小品方

解射罔毒

大麻子汁飲之。良。千金

本草類方

諸毒卷八

解諸魚毒

大豆煮汁飲之。衛生方

鬱肉脯毒

枳殼汁服二三升。良。葛洪方

解砒石毒

麻油一碗灌之。衛生方

中野菌毒

急採鴛鴦草啖之卽愈。忍冬草也。洪邁夷堅志

中砒石毒

飲醖醋得吐卽愈。不可飲水。廣記

服石毒發

胡豆半升搗所以水八合絞汁飲之卽愈。外臺

解金銀毒

葱白煮汁飲之。外臺

解燒酒毒

綠豆初煮反多食之卽解

解巴豆毒

下利不止入豆汁

閉口椒毒

氣閉欲絕者煮蒜食之。張仲景方

解輕粉毒

服輕粉口破者以三年陳醬化水頻漱之。類湖集簡方

丹石毒發

發熱者不得食熱物不用火為使但着厚衣暖卧取油一匙含嚙戒怒二七日也。

稅中記云服丹石人先宜以麻油一升。每服三升切納油中微火煎黑去滓合酒每

服三合百日氣血充盈也

中水毒病

初起頭痛惡寒心煩拘急且醒暮劇梅葉搗汁三升飲之良。肘后

食蟹致傷

丁香末薑湯服五分。譚治要訣

解諸中毒

芽茶白礬等分研末冷水調下。簡便方

中砒毒

心腹絞痛欲吐不吐面青肢冷用楊梅樹皮煎湯二三碗服之即愈。王碩易簡方

本草類方

諸毒卷八

空

硫黃毒發

令人背膊疼痛目暗漠漠胡椒肉焙一兩沙糖半兩漿水一大盞煎七分呷之。聖

濟總錄

服石毒發

或熱噤向冷地卧五加皮二兩水四升煮二升半發時使服。外臺秘要

解中藥毒

巴豆去皮不去油馬牙硝等分研丸冷水服一彈丸。廣利方

解百毒氣

桑白汁一合服之須臾吐利自出。肘后方

鼠莽砒毒

烏白根半兩搗水服之。此方人成

中諸藥毒

用蠶紙數張燒灰冷水服。衛生易簡方

中河豚毒

五倍子白礬末等分以水調下。山事林廣記

藥齏簇毒

貝齒燒研服三錢目三服。千金方

藥毒上攻

如聖散用蜂房甘草等分炒研末
為末水二碗煎八分服即愈
聖物

食物中毒

一服合之即愈
瀉毒及引隔在
研水調
半錢服

蝮蛇牛毒

手喉蛇者毛髮
飲人乳汁一升即愈
余國立

蝮蛇牛毒

牛肝細切水一斗煮一升
服取汗即瘥
金震要略

中鰱魚毒

食蟹即解
黃炳驗方

胡蔓野毒

即斷腸草一葉入口百發流
風胎即雞卵抱未成雛者
爛和麻油灌之吐出毒物乃
生少遲即死
嶺南衛生方

本草類方

諸毒
卷八

乳石發動

煩熱用白鴨通一合湯一盞
瀉之澄清冷飲
聖惠方

痼砂損陰

積蹄一具浮萍二兩水三升煮汁半升
漬之冷即出以粉傅之
外臺秘要

解蜀椒毒

雞毛燒烟吸之并水調
一錢服之
千金方

食金中毒

已死取雞矢半升水淋取汁
一升飲之日三
肘后方

硫黃毒發

氣悶用羊血熱服
一合效
聖惠方

中諸肝毒

猪膏頓服一
升
千金方

解野葛毒

已死者扶開口後灌雞子三枚
須與吐出野葛乃甦
肘后方

中毒煩困

犀角燒末水服
方寸七
外臺

漏脯中毒

犬屎燒末酒服
方寸七
肘後

言二氣毒

八風吹之

聖丹石毒

熱口舌用吧猪肉五斤葱薑半斤煮食
或作雞食其腹鳴毒下以水淘之沙石盡
則愈。

千金翼

甲諸菜毒

發且性下欲死服雞矢燒
末服方寸匕。葛氏方

食雉中毒

新要小誦服即瘥。聖惠方

解鍾乳毒

則愈。千金翼
白鵬屎為末水服

百藥過劑

錢效。百一
方

中射四毒

猪血飲之即
解。肘后方

者毒空惡

熱悶欲死者新糞汁水和服或乾
者燒末漬汁飲名破棺湯。蘇恭

本草類方

諸毒
卷八

畜

解諸菜毒

小兒尿和乳汁服
二升。海上方

十中毒

欲死者并飲糞汁一
升即活。肘后方

野為芋毒

升即活。肘后方

羶肉脯毒

入屎燒灰酒服方
寸七。肘后方

菜毒脯毒

凡野菜諸脯肉馬肝馬肉毒以頭垢棗核
大含之嚙汁能起死人或白湯下亦可。

小品

中諸毒

猪屎燒灰水服
方寸匕。外臺

第一切毒

厚猪屎水和
服之。千金

中土菌毒

入尿飲之
肘后方

發珍發明按張果醫說云一人中仙茅膏

舌脹出口漸大與肩齊口以小刀剪之隨

破隨合莠至百數始有血一點出口可放

矣煮大黃村硝與服以藥摻之應時消縮

此皆大盛在淫之人過服之害也大抵仙

茅性熱補三焦命門之藥也惟陽弱精寒

稟賦素怯者宜之若體壯相火熾甚者服

之反能動火放治開東海張朝梅紫仙茅

詩有使君昨日纔持去今日人來乞菓銘

之句皆不知服食之理惟藉藥縱慾以速

其生者於

仙茅何尤

及皂莢水入口熱痛不止以皂莢子燒存

性一分沙糖半兩和膏含之○博濟方

朱姑藥烏爛塗之生冬間

之藥如蒜葉○外臺秘要

伏龍肝末一雞子大

水服取吐○千金方

諸毒

中溪毒生瘡

六畜肉毒

本草類方

中水毒病

小蝦蟇毒

自死肉毒

中馬肝毒

中牛馬毒

解藥箭毒

毒箭有三種交廣夷人用焦銅作箭鏃

北諸處以蛇毒整物汁著筒中漬箭鏃此

二種纏傷皮肉便洪濃沸爛而死若中之

便飲糞汁并塗之惟此最妙又一種用射

初起頭痛惡寒拘急心煩用梨葉一
把搗爛以酒一盞攪飲○錢中
小蝦蟇有毒食之令人小便秘澀臍下悶
痛有至死者以生蠟一合投新汲水半碗
浸濃汁頓飲之即愈○茆亭客語
故頭申中藥一
錢熱水服取吐
雄鼠屎三七枚和
水研飲之○梅師
鼓汁和人乳頻服
之效○衛生易簡
毒箭有
三種交廣夷人用焦銅作箭鏃
北諸處以蛇毒整物汁著筒中漬箭鏃此
二種纏傷皮肉便洪濃沸爛而死若中之
便飲糞汁并塗之惟此最妙又一種用射
方○姚僧坦集驗方

卷八

毒

海身青毒

交州夷人以焦銅為毒藥于鐵鋒上中人即沸爛須臾骨壞但服月水尿汁解之。

博物志

剝馬中毒

破骨刺破欲死以馬腹中粟屎搗傳以尿洗之大效按汁飲之亦可。外臺

解砒石毒

制油二升灌之吐即毒解。華陀危病方

解斑蝥毒

玉簪根搗水服之即解。趙真人濟急方

中蜈蚣毒

舌脹出口是也雞冠血浸舌并咽之。青囊雜纂

解狼犬毒

杏仁搗爛水服之。千金方

本草類方

諸毒卷八

套

本草類方卷之八

蠱毒第九十

中諸蠱毒

伏龍肝去水服取吐

雞子大

食中有蠱

腹內堅痛向目青黃淋露骨立病變無常用爐中鐵精研末雞肝和九梧子大食前

酒下五丸不過十日愈○肘后

蠱毒蠱毒

雄黃生礬等分端午日研化蠟九梧子大每服七丸念藥王菩薩七遍熱水下○蘇

東坡

良方

挑生蠱毒

胸口痛者膽礬二錢茶清泡服卽吐出一嶺南衛生方

或下血如肝鹽一升苦酒一升煎化頓服得吐卽愈乃支太醫方也○小品方

蠱毒

卷八

本草類

錢源

起茶等分爲末新汲水調下二

挑生蠱毒

野葛毒并以升麻多煎飲之○直指方

丹根烏末服一錢七

解中蠱毒

草節以真麻油浸之年久愈妙每再曬或水煎服神效○直指方

雞肝書夜出血石餘四臟皆損惟心未毀或鼻破將死者苦桂梗爲末以酒服去

寸七日三服不能下藥以物搗口灌之心

中當須與自定七日止當食豬肝肺以

補之神良一方加犀角

解諸蠱毒

薺芫根烏末等分○初虞吉

立膝○陳延之

力

七

蛇蝎蠱毒

中下血

如雞肝書夜出血石餘四臟皆損惟心未毀或鼻破將死者苦桂梗爲末以酒服去

寸七日三服不能下藥以物搗口灌之心

中當須與自定七日止當食豬肝肺以

補之神良一方加犀角

等分○初虞吉

解諸蠱毒

薺芫根烏末等分○初虞吉

立膝○陳延之

力

七

蛇蝎蠱毒

蛇蝎蠱毒

大力子煮汁服

衛生易簡方

水蠱腹大

惡實微炒一兩為末麩糊丸梧子大每米飲下十丸。張文仲方下

解百蠱毒

白鴨血無飲之。廣記

挑生蠱毒

嶺南有挑生之害於飲食中行厭勝法魚肉能反生于人腹中而人以死則陰役其家初得覺胸腹痛次日刺人十口則主在腹中也凡胸膈痛即升麻或膽礬吐之若膈下痛急以湯調鬱金末二錢服即瀉出惡物或合升麻鬱金服之不吐則下李異巖侍郎為雷州推官鞠獄得

此方活人甚多。范石湖文集

卒中蠱毒

下血如雞肝書夜不絕藏腑敗壞待死者以藜荷葉密置病人席下勿令知之必自呼蠱主姓名也。梅師方

蠱毒下血

獨皮燒末水服方寸匕當吐出毒。千金方

本草類方

蠱毒 卷八

突

中草蠱毒

此術在西夏之西及嶺南人中此毒入咽欲死者用此鈴出一兩為末溫水調服一錢即消化蠱出神效。聖惠方

中諸蠱毒

土瓜根大如指長三寸切以酒半升以一宿服當吐下。外臺祕要

五種蠱毒

時后方云席旃刺史言嶺南裡人多于食都淋籐即馬兜鈴連根籐者十兩水一斗酒二升煮三升分三服毒逐小便出十日慎食毒物不啻更服土人呼為三百兩銀藥。又支太醫云兜鈴根一兩為末水煎頓服當吐蠱出未盡再服

解中蠱毒

密取山豆根和水研服少許未定再服已禁聲者亦愈

卒中蠱毒

或吐血或下血皆如爛肝者苦瓠一枚水二升煎一升服立吐即愈又方用苦酒一

升者令帶服之反吐神驗。附后方。

中蠱吐血

小麥麩二合水調服。半日當下出。黃記。

中蠱欲死

馬齒莧搗汁一升飲并傳之。日四五次。青城。

解中蠱毒

吐下血如猪肝茵草根葉荷葉各三分水。四升煮二升服。即愈。自當呼蠱主姓名也。

○陳延之小品方

解中蠱毒

胡荽根搗汁半升和酒服。立下神效。必效方。

吐解蠱毒

以清油熱飲。取吐。嶺南方。

金鬻蠱毒

吮白礬味甘嚼黑豆不醒者。即是中蠱也。石榴根皮煎。麩熱服。即吐。出活蠱無不愈者。丹溪。

摘玄方

本草類方

蠱毒

堯

解百蠱毒

白雞血熱飲之。廣記。

蠱毒下血

桐木北陰白皮一大握。長五寸。以水三升煮。取一升。空腹分服。即吐。毒出也。

解中蠱毒

必效方。用未斃相思子十四枚。杵碎。為末。溫水半盞。和服。欲吐。抑之。勿吐。少頃。當大吐。非常輕者。但服七枚。神效。外臺秘要。

令人腹內堅痛。面黃。青色。淋漓。骨立。病變。不常。桑木。心。剉一斛。着釜中。以水淹。三斗。煮。取二斗。澄。清。微火。煎。得五升。空心。服。五合。則吐。蠱毒。出也。肘後方。

解中蠱毒

一升。頓服。當下。蠱出。千金方。

蠱毒下血

生羊肺一具。割開。入雄黃。麝香。等分。吞之。濟生方。

解中蠱毒

雖面青。脈絕。腹脹。吐血。者。服之。即活。用蠱。脫紙。燒存性。為末。煎。汲水。服一錢。嶺南。

中蠱藥毒

脫紙。燒存性。為末。煎。汲水。服一錢。嶺南。

中蠱藥毒

脫紙。燒存性。為末。煎。汲水。服一錢。嶺南。

衛生

解蠱毒

生衣瑁磨濃汁水服一
蓋即消。楊氏產乳

蝦蟇蠱病

及蝦蟇蠱心腹脹滿痛口乾思水不能食
悶亂大常用车轄指半筋斬積服之其蠱
即出。

聖惠方

中惡蠱毒

臘月狐腸燒末水
服方寸匕。千金

中惡蠱毒

車缸脂如雞子大
酒化服。千金方

中蠱毒

術師方云凡中蠱毒或下血如鷲肝或吐
血或心腹切痛如有物咬不即治之食人
五臟即死若如是蠱但令病人吐水沉者
是浮者非也用鼓皮虎灰酒服方寸七
須臾自呼蠱主姓名。外臺秘要云治蠱
收敗鼓皮廣五寸長一月蓄蔽根五寸加

本草類方

蠱毒
卷八

半

胡指大水一升酒三升者
二升服之當下蠱即愈

解蠱毒

藏器曰取燕屎三合炒獨蒜去皮十枚和
搗九梧子大每服三九蠱當隨利而出

蠱毒百毒

及諸熱毒時氣熱病口鼻出血用人屎尖
七枚燒灰水調頓服溫覆取汗即愈勿輕
此方神驗者也

外臺秘要

中蠱腹痛

麥太醫秘方以猪肝一具蜜一升
共煎分二十服或為丸服。肘后

解諸蠱毒

不拘草蠱蛇蠱蜺蝦蠱其狀入咽刺癢欲
死取胞衣一具洗切曝乾為末熟水調服
一錢七。

梅師方

五種蠱毒

麝香雄黃等分為末以生羊肝如
指大以刀割開裹葉吞之。衛生

解中蠱毒

平胃散末以生漆和九梧子大每空
心溫酒下七十九至百丸。直指方

梁中蛇蠱

吐青入菜葉中食之令人得病名

解蛇蠱毒

蛇蠱大豆為末酒清絞汁服半升
飲食中得之咽中如有物蠱不下吐不出
心下熱悶甕鈴一兩煎水服即吐

行功纂要方

本草類方



蠱毒
卷八

圭

本草類方卷之八

諸物哽咽第一百

魚骨哽咽 取水一盃合口向水漲口取

魚骨哽咽 水氣哽當自下。射后方

魚骨哽咽 白芍藥嚼細嚥
汁。○事林廣記
磁石火煨醋淬陳橘紅焙多年漿水脚炒
等分爲末別以漿水脚和丸芟子大每含

燕一丸。○
聖濟錄

誤吞諸物 金銀銅錢等物不化者濃煎縮
砂湯飲之即下。○危氏得效方

魚骨哽咽 下。○外臺秘要
咽砂少許嚼嚥立

咽喉骨哽 乳香一錢水研服
之。○衛生易簡方

本草類方 諸物哽咽 卷八 圭

雞魚骨哽 如龍眼大魚骨魚
湯下雞骨雞湯下
之。○效驗方大成用野苧苧根搗碎丸

如龍眼大魚骨魚
湯下雞骨雞湯下

骨哽在咽 洪邁夷堅志云鄱陽汪友良因食誤吞一
骨哽上咽中百計不下恍惚夢一朱衣人
曰淮南老叟妙法遂取一塊含化

曰淮南老叟妙法遂取一塊含化

諸骨哽咽 地菘馬鞭草各一握去根白梅肉一箇白
錢搗作彈丸綿裹含嚥其骨自軟而

下也。○
普濟方

下魚骨哽 玉簪花根山裏紅果根同搗自然汁以竹
筒灌入咽中其骨自下不可着牙齒。○臞

生也。○
普濟方

甲骨哽 欲死 白雁童子研米一大呷以竹筒灌
入咽 物卸解。○經牙或爲未吹之。

苦濟

雞魚骨硬

芫麻子仁研爛入百藥煎研丸
彈子大并花水化下半丸卽下

骨硬不出

薔薇根末水服方寸
七日三〇外臺秘要

魚骨哽咽

馬勃末蜜丸彈子
大筒丸〇聖濟方

竹木骨哽

芫麻子仁一兩凝水石二兩研勻每以一
捻置舌根嚙自然不見〇又方芫麻油

紅麴等分研細沙糖丸皂
子大綿裹含嚙痰出大良

骨哽在咽

半夏白芷等分爲末水服方寸
七當嘔出忌羊肉〇外臺秘要

鐵刺諸哽

及竹木哽在咽中白斂半夏迺等分
爲末酒服半錢日二服〇聖惠方

諸物哽咽

白斂白芷等分爲末
水服二錢〇聖惠方

本草類方

諸物哽咽

三

諸魚骨哽

葑白嚼茶繩繫中吞到
嘔處引之卽出〇葛洪方

諸骨哽咽

威靈仙一兩二錢炒白一兩沙糖一盞水
二鐘煎一鐘溫服乾坤生意用威靈仙

朱醋浸二日晒研末醋糊丸梧子大每服
二三丸半茶半湯下如欲吐以銅青末半

匙入油一二點茶服探吐〇聖濟錄治雞
鷲骨哽赤莖或靈仙五錢并花水煎服卽

軟如綿卷
下也甚效

魚骨哽咽

白膠香細細吞
之〇聖惠方

魚骨哽咽

不能出用飴餈九雞子黃
大吞之不下再吞〇朋后

魚骨哽咽

獨頭蒜塞鼻中自
出〇十便良方

魚骨哽咽

百合五兩研末蜜水調開頸項
包往不過三五次卽下〇聖濟

魚竹哽咽

橘皮常含咽汁

諸骨哽咽

白蘗煎米醋細嚼在上即吐

骨硬在咽

聖濟錄用栗子肉上皮半兩為一鮎

魚肝一

聖濟錄用栗子肉上皮半兩為一鮎

聖惠方

普濟方

聖濟錄用栗子肉上皮半兩為一鮎

本草類方

諸物哽咽

毒

雞魚骨哽

芻粟縮砂甘草等分為粗末綿包少許

魚骨哽咽

雞筋竹皮泥朝末蜜九茨子大綿裹

諸骨哽咽

水送下乾者亦可○聖惠方

魚骨哽咽

楮葉搗汁噴之

魚骨哽咽

六七日不用用琥珀珠一串推人

魚骨哽咽

聖惠方

魚骨哽咽

楮樹嫩皮搗爛為丸水下

咽喉骨哽

豬牙皂莢二條切碎生絹袋盛

諸骨哽咽

狗涎頻滴骨上白

骨鯁在喉

栗子勻上皮半兩研末乳香鮫魚肝各一分同研九梧了人以酒裝一丸吞下釣出

錄

諸魚骨鯁

鯽春三十六鱗焙研涼水服之其刺自跳出神妙○筆峰雜興

諸魚骨鯁

以好蜜搗和服之令下○葛氏

骨硬在喉

鳥賊魚骨陳橘紅焙等分爲末寒食麵和錫化炙子大海用一丸含化藥汁○聖濟

總錄

魚骨入腹

刺痛不得出者吳茱萸水煮一盞溫服其骨必軟出未出再服○孟詵食療

咽喉骨哽

鹿角爲末含之熨津○斗門方

喉中物哽

用生鯁魚線縛其頭以尾先入喉中牽拽出之○普濟方

本草類方

出物哽咽

卷八

誤吞鈎線

蜈蚣去身吞其頭數枚勿令本人知○聖惠方

雞骨哽咽

五倍子末摻入痰中仰化下○海上名方

咽喉骨哽

桑木上虫盡米醋煎咽○永類錄方

通氣散

治誤吞銀錢及鈎繩鴉毛一錢燒存性爲末每服半錢新汲水下

○醫方妙選

雞骨哽咽

活雞一隻打死取出雞內金洗淨燈草裹于火上燒存性竹筒吹入咽內即消不可見肉○

攝生方

骨

鯁

鹿筋漬軟搗索合蜜大如彈丸持筋端吞至便處徐徐引之便著筋出○外臺

魚骨哽咽

鷓鴣屎研水服方寸匕并以水調含喉外○范汪方

咽喉骨哽

白雄雞左石副大毛吞一枚燒灰水服。外臺

誤吞銅錢

羊脛骨燒灰以煮稀粥食神效。談坐翁方

誤吞鐵釘

然裴出。普濟方

誤吞釘鍼

多食猪羊脂久則自出。肘后

咽喉骨哽

羊脛骨灰米飲服一錢。聖惠

咽喉骨哽

吞脂膏一團不瘥更吞之。千金方

獸骨哽咽

虎骨爲末水服方寸七。外臺

鍼刺在咽

以螻蛄杵汁滴上三五度自出。千金方

誤吞稻芒

白錫類食簡便方

本草類方

諸物哽咽卷八

諸獸骨哽

象牙磨水吞之。承類方

桃李哽咽

狗骨煮湯摩頭上。子母秘錄

咽喉骨哽

七月七日取絲瓜根陰乾燒存性每服二錢以原鯁物煮湯服之。筆峰雜興

誤吞竹木

秤錘燒紅淬酒飲之。集玄方

誤吞金銀

及錢胡粉一兩猪脂調分再服合消烱出也。外臺秘要

誤吞珠錢

哽在咽者銅弩牙燒赤納水中冷飲汁立愈。聖惠方

誤吞鐵錢

古文銅錢十個白梅肉十個淹過卽爛搗丸綠豆大每服一九流水吞下卽吐出。聖濟

誤吞銅錢

煉蜜服二升可出矣。葛氏方

誤吞金銀

及錢在腹中不下者光明石炭一杏核
人硫黃一皂子大為末酒下○普濟方

誤吞金銀

或錢在腹內不下石灰硫黃一皂子大
同何為末酒調服之○孫用和秘寶方

誤吞鍼鐵

真慈石棗核大鑽孔線穿吞
拽之立出○錢相公篋中方

誤吞鐵石

骨刺不下危急者王不留行黃蘗等分為
末湯浸蒸餅丸服者王不留行黃蘗等分為
風處用一九冷水化

灌之○百一選方

誤吞銅錢

蒼耳頭一把以水一升浸水
中十餘度飲水愈○肘后方

誤吞銅鉄

艾蒿一把水五升煎一升頓
服便下○錢相公篋中方

誤吞鍼錢

葵花煮汁服
之○普濟方

誤吞銅錢

木賊為末雞子白調
服一錢○聖惠方

本草類方

諸物哽咽

七

誤吞錢釵

及竹木取節儲一斤漸漸
食盡便出○外臺秘要

誤吞釵銀

取薤白曝萎煮熱切食一
大束釵即隨出○葛洪方

誤吞銅錢

百部根四兩酒一升漬一宿溫
服一升日再服○外臺秘要

誤吞銅鐵

不用南燭根燒研熟水
調服一錢即下○聖惠方

誤吞金銀

及環子釵子以汞半兩吞
之再服即出○聖惠方

誤吞銅錢

多食胡桃自化出也胡桃與銅錢
共食即成粉可證矣○李樓方

誤吞銅錢

生皂莢研汁細細呷之自然
消化成水○王璆百一選方

稻芒粘咽

不得出者箭頭草嚼
嚥下○乾坤秘鑑

咽喉骨哽

五月五日午時非唾中河東勿語取蚯蚓
泥收之每用少許擦喉外其骨自消名六

咽喉骨哽

聖
麥爲末水服一寸
口二〇外臺秘要

本草類方



諸物哽咽
卷八

表

本草類方卷之八

婦人經水第一百一

經血不止 烏龍尾炒烟盡荆芥穗各半兩
為末每服二錢茶下。聖濟錄

室女經閉 恍惚煩熱鈔霜半兩生地黃汁
一合調下日三服。聖惠方

婦人久冷 血氣攻心痛不止以葉子雄黃二兩細研
醋一升煎濃和丸小豆大每服十五丸醋
湯下。

聖惠方

月經不通 巴豆去油如綠豆大三丸以烏金石末
一錢調湯送下即通。衛生易簡方

經水過多 赤石脂破故紙一兩為末每
服二錢米飲下。普濟方

月水不通 臍腹積聚疼痛咽砂一兩皂莢五挺去皮
子判為末以頭醋一大盞熬膏入陳脩皮

本草類方 婦人經水

末二兩搗三百杵丸梧子大
每溫酒下五丸。聖惠方

婦女血氣 腹中刺痛經候不調用玄胡索去皮醋炒
當歸酒浸炒各一兩橘紅二兩為末酒煮

米糊丸梧子大每服一百丸
空心艾醋湯下。濟生方

經水不調 芩心丸治婦人四十九歲已後天癸虛住
每月却行或過多不止用條芩心二兩末

醋浸七日炙乾又浸如此七次為末醋糊
丸梧子大每服七十丸空心溫酒下日二

次。瑞竹堂方

丹參散 治婦人經脈不調或前或後或多或少或
胎不安產一惡血不下兼治冷熱勞腰痛

痛骨節煩痛用丹參洗淨切曬為末
每服二錢溫酒調下。婦人明理方

婦人惡血 攻聚上面多怒牡丹皮半兩乾漆煨烟
盡半兩水二鍾煎一鍾服。諸證類方

婦人氣盛

作痛及下血無時月水不調用華菱鹽炒蒲根炒等分爲末煉蜜九梧子大每空心

溫酒服三十丸兩服卽止名二神丸。陳氏方

經血不止

五靈脂炒烟盡研每服二錢當歸兩片酒一盞煎六分熱服三五度取效。經效方

婦人氣盛

血衰變生諸症頭暈腹滿皆宜抑氣散王之香附子四兩炒茯苓甘草炙各一兩橘

紅二兩爲末每服錢沸湯下。濟生方

女人諸病

瑞竹堂方四製香附丸治婦人女子經候不調兼諸病大香附子擦去毛一斤分作

四分四兩醇酒浸四兩醇醋浸四兩鹽水浸四兩童子小便浸春三秋五夏一冬七

口淘洗淨晒乾搗爛微焙爲末醋煮麵糊丸梧子大每酒下七十九瘦人卽澤蘭赤

茯苓末二兩氣虛加四君子料血虛加四物料。法生堂方煮附濟陰丸治婦人月

本草類方

婦人經水

全

經不調久成癥積一切風氣用香附子一斤分作四分以童溲鹽水酒醋各浸三日

艾葉一斤漿水浸過醋糊和作餅晒乾晚蠶砂半斤炒莪朮四兩酒浸當歸四兩酒

浸各焙爲末醋糊丸梧子大每服七十九米飲下日二。難附丸治婦人室女一切

經候不調血氣刺痛腹膨脹心怔乏力面色痿黃頭暈惡心崩漏帶下便血癥瘕

積聚及婦人數墮胎出氣不升降服此丸妙香附子米醋浸半日砂鍋煮乾搗焙石

白爲末醋糊爲丸醋湯下。瘧瘵方艾附丸治同上香附子一斤熟艾四兩醋煮當

歸酒浸二兩爲木如上丸服

諸虛不足者當歸四兩地黃二兩爲末密

九梧子大每食前米飲下十五丸。太醫

婦人百病

支法

婦人血氣

躄下氣脹月經不利血氣上攻欲嘔不得
睡當歸四錢乾漆燒存性二錢為末煉蜜

九梧子大每服十五
九溫酒下○永類方

月經逆行

從口鼻先以京墨磨汁服止之次用當
其尾紅花各三錢水一鐘半煎八分瀝服

其經即通
○簡便方

室女經閉

當歸尾沒藥各一錢為末紅花浸
酒西北飲之一日一服○普濟方

女子小腹痛

月經初來便覺腰中切痛連脊間如刀錐
所刺不可忍者眾醫不別謂是鬼瘧妄服

諸藥終無所益其疾轉增審察前狀相當
即用此藥其藥用連錢草即續命草夏五

月正放花時即采曝乾搗篩為粉每服二
方寸匕和好醋二小合攪勻平旦空腹頓

服之每旦一服以知為度如女子陰冷者

本草類方

婦人經水

全

即取前藥五兩加桃仁一百枚去皮尖熬
搗為散以蜜為丸如梧子大每旦空腹以

酒下三十九日再服以愈為
藤子蕎麥○調經本草方

經閉驗胎

經水三個月不行驗胎法用芎生為末空
心煎艾湯服一匙腹內微動者是有胎不

動者非也
○靈苑方

月水不通

葶藶一升為末蜜丸彈子大綿裹納陰
中二寸一宿易之有汗出止○千金方

月經不利

杜蒺藜當歸等分為末
飲每服三錢○儒門事親

月水不利

短欲死虎杖一斤去頭曝乾切土瓜根汁
眼一錢○又方治月經不通腹大如瓠氣

牛膝汁二斗水一斛浸虎杖一宿煎取二
斗入二汁同煎如餵每酒服一合

日再夜一宿血當下○聖惠方

益母膏

近效方治產婦諸疾及折傷內損有瘀血
每天陰則痛神方也三月採益母草一名
負擔一名夏枯草連根葉莖花洗擇令淨
子箔上攤曝水乾以竹刀切長五寸勿用
鐵刀置子 鍋中以水浸過二三寸煎煮
笑草爛水 三之二濾去草取汁約五六
斗入盆中添半日以綿濾去濁滓以清汁
入釜中慢火煎取一斗如稀飴狀充瓶封
收每取梨大暖酒和服日再服或和羹粥
亦可知遠行即更煉至可免收之服至七
日則寒漸平復也產婦惡露不盡及血運
一二服便瘳其藥無忌又能治風益心力

○外臺

婦人血塊

秘要 土牛膝根洗切焙搗為末酒煎溫服
極效福州人單服之○圖經本草

濟陰返魂丹

晉殷產寶曰此方乃古安文江高師禹備
禮求于名醫所得者其效神妙活人甚多

本草類方

婦人經水

全

婦人血塊

能治婦人胎前產後諸疾危症用野天麻
又名益母又名火欬又名負擔卽莞藟子
也葉似艾葉莖類火麻方梗兩高四五六
月節節開花紅紫色如蓼花南北隨處皆
有白花者不是于端午小暑或六月六日
花正開時連根收采陰乾用葉及花子忌
鐵器以石器碾為細末煉蜜丸如彈子大
隨證嚼服用湯使其根燒存性為末酒服
功與黑神散不相上下其藥不取丸數以
病愈為度或丸如梧子大每服五十丸
又可搗汁濾淨熬膏服之○胎前臍腹痛
或作聲者米飲下○胎前產後臍腹刺痛
童子小便化○胎前產後臍腹刺痛
然調順諸病不生又能破血痛養脈息調
經絡前溫酒下○胎衣不下及橫生不順
死胎不下○胎前產後臍腹刺痛
湯下○胎前產後臍腹刺痛

見鬼神狂言不省人事以童子小便和酒化下。產後結成血塊臍腹奔痛時發寒熱有冷汗或面垢頰赤五心煩熱並用童子小便酒下或薄荷自然汁下。產後惡露不盡結滯刺痛以衝心胸滿悶童子小便酒下。產後瀉血水以棗湯下。產後痢疾米湯下。產後血崩漏下糯米湯下。產後赤白帶下煎膠艾湯下。月水不調溫酒下。產後中風牙關緊急半身不遂失音不語童便酒下。產後氣喘咳嗽胸膈不利惡心吐酸水面目浮腫兩脇疼痛舉動失力溫酒下。產後月內咳嗽自汗發熱久則變為骨蒸童便酒下。產後鼻衄舌黑口乾童便酒下。產後雨太陽穴痛呵欠心忪氣短羸瘦不思飲食血風身熱手足頑麻百節疼痛並米飲化下。產後大小便不通煩躁口苦者薄荷湯下。婦人久無子息溫酒下。

本草類方

婦人經水

全

經水不調

血臟冷痛此方平易捷徑熱附子去皮當歸等分每服三錢水煎服。普濟方

女人血病

萬病尤治女人月經林閉月信不來遠勝寒疝痛及產後血氣不調腹中結瘕散不

散諸病牛膝酒浸一宿焙乾漆炒令烟盡各一兩為末生地黃汁一升入石器內慢

火熬至可丸丸如梧子大每服二九空心米飲下。拔萃方

血脈不調

苦蕒菜晒乾為末每服二錢溫酒下。衛生易簡方

月水不調

結成癥塊腹肋脹大欲死牛蒡根二斤剉蒸三遍以生絹袋盛之以酒二斗浸五日

每食前溫服一盞。普濟方

月水不通

婦人宿有風冷留血積聚月水不通菴藷子一升桃仁二升酒浸去皮尖研勻入瓶

內以酒二斗浸封五日後每飲二合日三服。聖惠方

月信澀滯

藜荷根細切水煎取二升
空心入酒和服。經驗方

月經不調

久而無子乃衝任伏熱也熟地黃半斤當
歸二兩黃連一兩誰酒浸一夜焙研為末

煉蜜丸梧子大每服七十丸
米飲溫酒任下。禹講師方

女經不行

菱膏花為末每服二錢食
前溫酒下。徐氏胎產方

婦人血風

虛冷月候不勻或手脚心煩熱或頭面浮
腫頭麻用烏頭一斤清油四兩鹽四兩

錯內同熬令裂如桑椹色為度去皮脐五
靈脂四兩為末搗勻蒸餅丸如梧子大空

心溫酒鹽湯下二十九亦
治丈夫風疾。梅師方

乾血氣痛

錦紋大黃酒浸晒乾四兩為末好醋一升
熬成膏丸芡子大卧時酒化一丸服大便

利一二行紅漏自下乃調經仙
藥也或加香附。董氏集驗方

本草類方

婦人經水

論

婦人血奔

昔敗蒲蒂燒灰酒
服二錢。勝金方

婦人夜熱

痰嗽月經不調形瘦者用瓜蒌仁一兩青
黛香附童尿浸晒一兩五錢為末蜜調陰

化之。丹
溪心法

婦人血癖

作痛大黃一兩酒二升煮
十沸頓服取利。千金翼

婦人血氣

紫荆皮為末醋糊丸櫻桃大
每酒化服一丸。熊氏補遺

男女諸病

無極丸治婦人經血不通赤白帶下崩漏
不止腸風下血五淋產後積血癥瘕腹痛

男子五勞七傷小兒骨蒸潮熱等證其效
甚速宜六癸日合之用錦紋大黃一斤分

作四分一分用童尿一碗食鹽二錢浸一
日切晒一分用醇酒一碗浸一日切晒再

以巴豆仁三十五粒同炒豆黃去豆不用
一分用紅花四兩泡水一碗浸一日切晒

一分用當歸四兩入淡醋一確同浸一日
去歸切酒為末煨蜜丸帶子大每服五上
丸空心温酒下取下惡物為驗未下再服
此武當高士孫碧雲方也。醫林集要

婦人血氣

木通濃煎三五盞飲
之即通。孟詵本草

經水不利

帶下少腹滿或經一月再見者上瓜根散
主之土瓜根芍藥桂枝蟄虫各三兩為末
酒服方寸七日三

服。仲景金匱方

月經不斷

用前紫湯
服之作

月經不通

或兩三月或半年一年者用麻子仁二升
桃仁二兩研勻熟酒一升浸一夜日服一

升。普濟

女人血氣

婦人不曾生長血氣疼痛不可忍及治丈
夫疝氣小腸氣撮痛者宜服二聖丸濕

本草類方

婦人經水

金

漆一兩熬一食頃入乾漆末一兩和丸梧
子大每服三四丸温酒下怕漆人不可服

驗方

乾血氣痛

婦人血氣不行上衝心膈變為乾血氣者
用絲瓜一枚燒存性空心温酒服。壽域

神方

通經破血

舊屋陰處瓦花潘者五兩熬膏當歸鬚乾
漆一兩燒烟盡當門子二錢為末棗肉和
丸梧子大每服七丸

紅花湯下。摘玄方

婦人經閉

不行至一年者臍腹痛腰腿沉重寒熱往
來用芥子二兩為末每服二錢熱酒食前

服。仁

經脉不通

乾絲瓜一個為末用口鷄血調成餅日乾
研末每服二錢空心酒下先服四物湯。

眼○海
上名方

女子經閉

時珍發明茜根色赤而氣溫味微酸而帶鹹色赤入營氣品行滯味酸入肝而鹹走血手足厥陰血分之藥也專于行活血俗方用治女子經水不通以一兩煎酒服之一日即

通甚效

女子經閉

不通用酢榴根東生者一握炙乾水二大蓋濃煎一盞空心服之未通再服○斗門刺痛用荔枝枝燒存性半兩香附子炒一兩為末每服二錢鹽湯米飲任下名蠲痛散○婦

人良方

婦人血氣

時珍發明李樓奇方云一婦病心痛數年不愈一醫用人言半分茶末一分白湯調下吐痰血一塊而愈得日華子治婦人血氣心痛之旨乎

本草類方

婦人經水

矣

月水不斷

羊前左脚脛骨一條紙裹泥封令乾煨赤入棕櫚灰等分每服一錢溫酒服之

月水不止

阿膠炒焦為末酒服二錢○秘製拒霜花蓮蓬散等分為末每用米飲下二錢○婦人良方

月水不通

茶清一甌入沙糖少許毒一夜服雖三個月胎亦通不可輕視○節氏樵粹因證喘滿虛煩喘喘少氣發熱多汗口乾苦澀不思飲食名血風勞油煎散用五加皮杜丹皮赤芍芍藥當歸各一兩為末每用一錢水一盞用許錢一文薰油入藥煎七分溫服常服能肥婦

人○太平惠民和劑局方

月水不通

厚朴三兩炙切水三升煎一升分二服空心飲不過三四劑神效一加桃仁紅花○梅師方

婦人經閉

指南方萬應先治女人月經閉閉不來
病用乾漆一兩打碎炒烟盡半盞本一兩
以生地黃汁一升入銀石器中慢熬候可
九九如梧子大每服一丸加至三五丸酒
飲任下以通為度。產寶方治女人月經
不調血氣上攻欲嘔不得睡用當歸四錢
乾漆炒三錢烟盡為末煉蜜丸梧子大每
服十五丸空心溫酒下。千金治女人月
水不通臍下堅如盃時發熱往來下痢羸
瘦此為血疲若生肉腋不可治也乾漆一
斤燒研生地黃二十斤取汁和煎至可丸
九梧子大每服

經血逆行

魚膠切炒新綿燒灰每服二錢
米飲調下即愈。多能鄙事

經脈不通

婦人經脈不通厥塊張滿腹有鬼胎用葛
上亭長五枚以糙米和炒去翅足研末分
婦人經水

本草類方

三服空心甘草湯下須臾覺臍腹急
痛以黑豆煎湯服之當通。聖惠方

月經久閉

蠶沙四兩砂調炒半黃色入無灰酒
一盞煮神滲去沙每溫服一盞即通

經脈不通

積血不散用烏鴉散主之烏鴉去皮毛炙
三分當歸焙好墨各三分延胡索炒蒲黃
炒水蛭以糯米炒過各半兩茺青糯米
炒過一分為末每服一錢酒下。總錄

經六不止

及血崩用黑驢屎燒存性麴糊丸梧子大
每空心黃酒下五七十九神妙。龔雲林

月水不調

膠一錢炒成珠研末熟
膠即安一方入辰砂末半錢

月水不調

黃連木通方寸七分三服。子金

婦人血病

用白朮熟地黃研末酒服方寸七日

月水不通

心腹帶悶四肢疼痛用赤馬肝一片炙
切食前熟酒服一錢通乃止。聖惠

更血氣痛

一錢即愈。生編

月水不通

去汗日各一分水蛭炒黃十枚為末醋
丸藜豆大每服五九常

聖惠方

月水不通

童男童女髮各三兩燒灰晚蛰二十一枚
糯米炒黃麝香一錢為末每服一錢食前

普濟方

女子經閉

老鼠屎一兩炒研空心
溫酒服二錢。千金方

月經不通

合。千金方

女子血枯

時珍發明按素問云有病胸脇支滿者妨
於食病至則先聞腥臊臭出清液先唾血

本草類方

婦人經水

矣

四肢清目眩時時前後血病名曰血枯得
之年少時有所大脫血或醉入房中氣竭
肝腸故月事衰少不來治之以四烏鯽骨
一蔥茹為末丸以雀卵大如小豆每服五
丸飲以鮑魚汁所以利腸中及傷肝也此
素問原文按烏鯽骨即烏賊骨用四兩蔥
茹即茜根用一兩本草作茹蔥甲乙太素

婦人經閉

誤作薔茹致王太僕亦作薔茹者皆非也
結成癥塊助張大欲死者馬鞭草根苗五
斤細細水五斗煎至一斗去滓熬成膏每
服半匙熱酒化下

聖惠方

經水不通

意取根一兩水煎服之
不過數服效。海上方

經水不止

白芍藥香附子熟艾葉各一
錢半水煎服之。熊氏補遺

經水不止

心酒漏下忌食腥豬肉。孫氏集效方

月水不斷

木賊炒三錢水一盞煎七分溫服日一服○聖惠方

月水不止

生地黃汁每服一盞酒一盞煎服日二次○千金方

經血不止

箸葉灰蠶紙灰等分爲末每服二錢未飲下○聖濟總錄

月水不斷

勞損黃瘦暫止復發小勞輒劇者槐蛾炒黃赤石脂各一兩爲末食前熱酒服二錢

○聖惠方
桑黃亦可

月水不斷

肉色黃瘦血竭暫止數日復發小勞輒劇久疾失治者皆可服之桑黃焙研每服二錢食前熱酒下日

二服○普濟方

五旬行經

婦人五十後經水不止者作敗血論用茜根一名過山姜一兩阿膠側柏葉炙黃芩各五錢生地黃一兩小兒胎髮一枚燒灰分作六帖每帖水一盞半煎七分入髮灰

本草類方

婦人經水

完

服之○唐

月水不止

梅葉焙楮皮灰各等分爲末每服二錢酒調下○聖濟總錄

經血不止

瑞蓮散用陳蓮蓬殼燒存性研末每服二錢熱酒下○婦人經驗方

月水不斷

側柏葉炙芍藥等分每用三錢水酒各半煎服○室女用側柏葉木賊炒微焦等分爲末每服二錢米

飲下○聖濟總錄

月經不絕

來無時者案紙三十張燒灰清酒半升和服頓定冬月用暖酒服之○劉禹錫傳信

方

月水不斷

靛茹一斤淨洗河水四升半煮二升半分二服○千金方

月水不斷

青竹茹微炙爲末每服三錢水一盞煎服○普濟方

經水不止

日漸黃瘦紫曠末每服二錢
空心白湯下○楊氏家藏方

月水不止

牡蠣煨研米醋搜成團再煨研末以米醋
調艾葉末熬膏丸梧子大每醋湯下四五

十九○
普濟方

本草類方

婦人經水
卷八

卒

本草類方卷之八

帶下第一百二

赤白帶下

日久 瘵六脉微瀉伏龍肝炒令刺盡搗
稠灰厚築上塵炒過盡等分爲末入龍腦
麝香各少許每服三錢溫酒或淡醋

婦人白帶

百草霜一兩香金墨半兩研末每服三錢
猪肝一葉批開入藥在內紙裹煨熟
溫酒送之
○永類方

赤白帶下

銅錢四十文酒四正
三升分三服○干
取

赤白帶下

米飲每服二錢
水和雲母粉方寸

婦人帶下

立見神效○千金

本草類方

卷八

空

赤白帶下

多年不止石燕一枚磨水
服立效○徐氏家傳方

白帶白淫

風化 灰一兩白茯苓三兩爲糊丸梧
子大每服二三十丸空心米飲下絕妙○
集玄

婦人白濁

經水不利子臟堅
腎石燒杏仁
研勻煉蜜丸棗核大納

赤白帶下

入陰中日一
○張仲景金匱
禹餘糧火煨

乾姜等分赤下乾姜
二錢七○勝金方

赤白帶下

減半爲末空
苦參二兩甘蠟
肚一個水三碗

兩五錢爲末以雀
鴉泥和丸梧子大每

婦人白帶

多因七情內傷或
爲末每服二錢米

虛冷所致沙
下○證治要

室女白帶

衝任虛寒鹿茸丸用金毛狗脊煆去毛白
飲各一兩鹿茸酒蒸焙二兩為末用艾煎
醋汁打糯米糊丸梧子大每服

五十九空心和童尿露一夜空
非根搗汁和童尿露一夜空

赤白帶下

心溫服取效。海上仙方

赤白帶下

及血崩不止香附子赤芍藥等分為末鹽
一捻水二盞煎一盞食前溫服。聖惠方

赤白帶下

連皮草果一枚乳香一小塊麵裹煨焦黃
同麵粉細每米飲服二錢日二服。衛生
易簡方

司水下來用蛇棘子枯白礬等分為末醋
麩搗丸彈子大酒醋為衣綿裹納入陰戶
如無極再換日一
次。儒門事親方

赤白帶下

白芷四兩以石灰半斤淹三宿去灰切片
炒研末酒服二錢日二服。醫學集成

婦人白帶

年深月久不痊者取白芍藥三兩並乾薑
半兩封熬令黃搗末空心水飲服二錢七
日再服。廣濟方只用芍藥炒黑
研末酒服之。貞元廣利方

本草類方

益母草花開時採搗為末每服
二錢食前溫湯下。集驗方

赤白帶下

桑耳切碎酒煎
服。蘇頌圖經

赤白帶下

白雞冠花晒乾為末每日空心酒服
三錢赤帶用紅耆。孫氏集效方

白帶沙淋

白雞冠花苦葫蘆等分麩
唯空心火酒服之。廣玄

赤白帶下

三葉葶草陰乾為末空心
溫酒服三錢七。千金方

婦人白帶

臍腹冷痛面色痿黃日漸虛困用葵花一
兩陰乾為末每空心溫酒服二錢七赤帶
用赤葵白帶用

赤白帶下

白葵。聖惠方

婦人白帶

白葵。聖惠方

赤白帶下

白葵。聖惠方

赤白帶下

白葵。聖惠方

白葵。聖惠方

赤白帶下 夏枯草花開時采陰乾為末每服二錢米飲下食前。徐氏家傳方

赤白帶下 常炙猪腎食之。張文仲方

女人帶下 及男子腎虛冷夢遺用韭子七升醋煮干佛焙研末凍蜜丸梧子大每服三十九空

心温酒下
千金方

赤白帶下 不問老稚孕婦悉可服取馬齒莧搗絞汁三大合和雞子白二枚先温合熟乃下煎

汁候温頓飲之不遇再作
卽愈。崔元亮每上方

赤白帶下 石菖蒲破故紙等分炒為末每服二錢更以菖蒲浸酒調服日一。婦人良方

赤白帶下 魏元君濟生丹用收麥炒焦為末雞子白九梧子大每服五十九鹽湯下日三服

醃帶煮汁温服一盞
日二服。千金方

本草類方

帶下
卷八

奎

赤白帶下 下元虛憊白粳蓮肉江米各五錢胡椒一錢半為末用烏骨雞一隻去腸盛藥瓦器

煮爛空心食
之。巢簡方

帶下脉數 狗杞根一斤生地黃五斤酒一斗煮五升日服之。千金方

赤白帶下 欖子石菖蒲等分為末每旦鹽酒温服二錢。經驗方

女人白帶 椿根白皮滑石等分為末搗丸梧子大每空暖白湯下一百丸。又方椿根白皮一兩半乾姜炒黑白芍藥炒黑黃蘗炒黑

各二錢為末如上法丸服。丹溪方
咸喜丸治丈夫元陽虛憊情氣不固小便

濁遺帶下

下濁餘瀝常流夢寐多驚頻頻遺洩婦人白淫白帶並治之白茯苓去皮四兩作匱

以猪苓四錢半入內煮二十餘沸取出日乾擇去猪苓為末化黃蠟搜和丸彈子大每嚼一九空心澤下以小便清為度思水

醋。李時珍曰：飽朴子言，挾芥千萬歲，其
上生小木，狀似蓮花，名曰木威喜，芝夜視
有光燒之，不焦，帶之，辟兵，服之，長生。

和劑局方威喜丸之名，蓋取諸此。

白帶不止

槐花炒牡蠣，等分，為末，每
酒服三錢，取效。○摘玄方

婦人帶下

兔皮燒烟盡，為末，酒服方
寸七，以麩為度。○外臺

赤白帶下

檳榔皮二兩，切以白酒一
碗半煎，一碗空
心服之，白帶用紅酒甚妙。○鼻要奇方

婦人白帶

松香五兩，酒二升，煮乾，水
白，杵細，酒糊丸
如梧子大，每服百丸，溫酒下。○摘玄方

女子白帶

陳冬瓜仁炒，為末，每空
心
米飲服五錢。○救急易方

赤白帶下

直秋石研末，蒸棗肉，為丸，梧子大，每
服六十九，空心，溫湯下。○摘玄方

帶下排膿

宗爽野鴉糞一兩，炒微焦，白木麝香各一
分，赤芍藥、青木香各半兩，延胡索炒，赤一

本草類方

卷八

齒

赤白帶下

兩柴胡三分，為末，溫無灰酒，空心調
服一錢，候膿盡，即止，多服，補子藏藥

赤白帶下

牛角，燒令烟，為粉，子以鹽水浸七度，去
皮，等分為末，每空心溫酒服二錢七。○孫

赤白帶下

白果、蓮肉、江米各五錢，胡椒一錢，為末，烏
骨雞一隻，如常治淨，裝木瓜、瓜腹，煮熟，空心

赤白帶下

前胡、頰脂三合，酒五合，
煎，佛頰服。○千金方

婦人白帶

羊脂一具，以醋滌淨，空心食之，不過
三次，忌魚肉、滑物，犯之即死。○外臺

婦人白濁

滑數虛冷者，鹿角屑炒黃，為
末，酒服二錢。○婦人良方

五色帶下

白馬左蹄燒灰，酒服
方寸七，日三。○外臺

赤白帶下

不止者狗頭燒灰爲末每
酒服一錢日三服。醒志

婦人白帶

用酒及艾葉煮雞卵
日食之。袖珍方

本草類方

帶下
卷八

七

