

本草易讀卷五目錄

甘遂 一百三十二

續隨子 子十金 一百三十三

蓖麻子 一百三十四

常山 一百三十五

蜀漆 又

藜蘆 山慈 一百三十六

附子 一百三十七

烏頭 又

草烏頭 一百三十八

白附子 一百三十九

南星 一百四十

黃精 一百四十一

半夏 一百四十二

射干 烏骨 一百四十三

玉簪 一百四十四

鳳仙子花
指甲桃花

芫花 一百四十六

茵蘚 一百四十七

草薺 一百四十八

上茯苓 一百四十九

白薺 一百五十

山豆根 一百五十一

威靈仙 一百五十二

防己 一百五十三

木通 通草 一百五十四

鈎藤 一百五十五

金銀花 葉名毛花淨花
忍冬一百五十六

兔絲子 一百五十七

五味子 一百五十八

覆盆子 一百五十九

使君子 一百六十

木鱉子 一百六十一

馬錢子 香木別 一百六十二

馬兜鈴 一百六十三

牽牛子 黑且 一百六十四

凌霄花 一百六十五

薔薇根 一百六十六

月季花 一百六十七

栝篋子 一百六十八

天花粉 括葉根 一百六十九

土瓜根 一百七十

葛根 一百七十一

天冬 一百七十二

百部 一百七十三

何首烏 一百七十四

澤瀉 一百七十五

菖蒲 一百七十六

蒲黃 一百七十七

浮萍 一百七十八

海藻 一百七十九

昆布 一百八十

石斛 一百八十一

骨碎補 毛並 一百八十二

石葦 一百八十三

野苧 蔓不食草 一百八十四

卷栢 一百八十五

瓦松 一百八十六

馬勃 色 一百八十七

薺尾 一百八十八

仙茅 一百八十九

水仙 一百九十

菖蓉子 一百九十一

茜草 一百九十二

白藥子 一百九十三

黃藥子 一百九十四

胡麻 一百九十五

香油 一百九十五

大麻仁 一百九十六

小麥 一百九十七

浮麥	二百九十七	麥麵	二百九十七	浮麥	二百九十七	麥麵	二百九十七
大麥芽	又	大麥	二百九十八	大麥	二百九十八	大麥麵	二百九十八
浙二泔	又	蕎麥	二百九十九	糯米	二百零一	粳米	二百
稷米	二百零三	丹黍米	二百零二	粟米	二百零四	黍米	二百零二
玉蜀秫	又	粟米	二百零四	杆頭糠	又	蜀秫	二百零三
谷芽	又	鴉片	二百零六	又		粟米泔	又
粟壳	二百零六	黃豆	二百零八	意苡仁	二百零五	黑豆	二百零七
豆黃卷	又	赤小豆	二百零九	赤小豆	二百零九	赤小豆	二百零九

本草易讀卷五

汪詔庵先生秘本
清御醫吳謙審定

甘遂二百三十二

舊製已燬用瓜蒂為使惡遠志反甘草

苦寒有毒。入足太陽經。除大腹之腫滿。消晝目之浮腫。解陰囊之腫墜。傳脚氣之腫核。留飲宿食之滯。癥瘕積裂之堅。痰迷癲癩之疾。隔噎痞塞之疴。虛人忌之。

生中山。二八月采根。今陝西江東亦有之。苗似澤漆。莖短小而葉有汁。根皮肉赤。自作連珠。亦有色白者。

水腫腹滿

同黑丑為末。水煎時呷。

○身晝洪腫

為末入猪腎內煨食。日三。

○四肢腫痛腿膝攣急

上方加木香。

水腫喘急

二便秘同大戟。花為末。棗肉丸服。

○二便不通

為末。麩合傅臍及丹田。再艾灸。三壯內服甘草湯。以通為度。

○偏墜

同茴香末酒下。

麻木疼痛

甘遂二兩。比麻子四兩。樟腦一兩。祥帖之內服甘草水。

○耳卒聾

甘遂半兩。綿色納耳內。口嚼甘草。

甘遂半夏湯

甘遂半夏白芍甘草蜜水煎。治心下堅滿有水。脉伏沉自

利反快者。

遂心丹

甘遂末二錢。以猪心血和之。入猪心內煨熟。取

末入長砂一錢。分作四丸。每一丸猪心湯下。大便惡物為效。不下再用。

續隨子百三十三

紙色去油取霜用千金子。

辛溫有毒。行水氣而破血結。消癥結而除腫滿。化痰飲而祛冷氣。利二便而下惡物滯。瘡癬疥癩之疾。蠱虫鬼疰之疴。

生蜀郡。今南中多有。苗大如戟。初生一莖。莖端生葉。葉中復出葉。花亦類大戟。自葉中抽幹而生。實青有壳。人家園田中多種植。莖中亦有白汁。可結水銀。

蓖麻子百三十四

外壳無刺。內實紅色者良。

辛甘有毒。通諸關。開諸竅。帖偏風。喝斜。療水氣浮腫。擣爛塞鼻室耳聾。燒煙薰喉痹舌脹。下脫衣而收子腸。傳療癰而平惡瘡。拔針刺之入肉。下骨木之哽咽。追膿拔毒最靈。齁喘咳嗽悉效。

在處有之。其莖有亦有白。中空。葉如瓠葉。每葉凡五尖。夏秋極間出花。

穗纍纍黃紫。每枝結實數十。壳如巴豆壳。內有子大如豆。有斑點狀如

牛蟬。其外壳有刺者。內實不紅。外壳無刺者。內實發紅。

手^方臂^一塊腫痛^一 搗付之一 ○ 偏頭氣痛^二 同乳香食鹽 搗付太陽穴 ○ 子腸不收^三 搗付丹田 ○

手足偏枯^四 取油同羊脂射香山甲煎膏。日摩數次。月餘瘰內服搜風化痰養血劑。 ○ 口目斜^五 杆膏左帖右右左 ○ 風氣頭痛^六 同

香杆餅付 ○ 鼻室不聞香臭^七 膏塞之日易一月愈 ○ 舌上血出^八 取油燃紙燒烟薰鼻 ○ 舌脹^九 同

滿口^十 同上 ○ 喉痹口噤^十 同上 ○ 小便不通^{十一} 取油燃紙插入莖中即愈 ○ 催生下胞^{十二} 以七立杆

即連 ○ 子宮脫出^{十三} 搗付頭頂 ○ 下生胎^{十四} 一月一粒 ○ 一切腫毒^{十五} 甚付 ○ 耳卒聾^{十六} 百粒大棗十五。乳汁丸綿色塞之。日易耳熱為度。二十日愈 ○ 面上雀斑^{十七} 同院僧硫黃為末。羊

淨仁香油煎焦去。 ○ 湯火傷^{十八} 同給粉杆香湯傷油調火傷水調付之 ○ 針刺入肉^{十九} 淨仁一粒杆膏以帛襯傷處付之 ○ 癩渣^{二十} 三日後頭刷之 ○ 風鼻塌^{二十一} 手指學曲節間痛甚。淨仁一兩黃連一兩。以小瓶入水。同浸三日。後取淨仁一粒。劈開面東。以

若再發再服之。 ○ 鼻喘痰嗽^{二十二} 經霜絕麻葉霜桑葉米壳蜜丸豆大每五丸白湯下 ○ 腳氣風腫木痹^{二十三} 芭麻葉蒸

直候不發乃上 ○ 鼻血^{二十四} 以香油塗芭麻葉炙熱發額上 ○ 鐵針入肉^{二十五} 芭麻肉石灰紅椽谷米飯搗膏貼之即出 ○ 項側結核如卵

易 ○ 鼻血^{二十六} 以香油塗芭麻葉炙熱發額上 ○ 鐵針入肉^{二十七} 芭麻肉石灰紅椽谷米飯搗膏貼之即出 ○ 項側結核如卵

易 ○ 鼻血^{二十八} 以香油塗芭麻葉炙熱發額上 ○ 鐵針入肉^{二十九} 芭麻肉石灰紅椽谷米飯搗膏貼之即出 ○ 項側結核如卵

易 ○ 鼻血^{三十} 以香油塗芭麻葉炙熱發額上 ○ 鐵針入肉^{三十一} 芭麻肉石灰紅椽谷米飯搗膏貼之即出 ○ 項側結核如卵

同山藥
膏敷之

常山百三十五

酒浸蒸熟
用忌息菜

辛苦微寒有毒。專截諸瘧。最吐老痰。

生益州川谷及澤中。二八月採根。今汴西湖南淮浙亦有之。而海州出者。葉似楸葉。八月有花紅白色。又莖圓有節。高者三四尺。葉似茗而狹長。兩兩相當。二月生白花青萼。五月結實青圓。

蜀漆

常山苗也。八
九月採之。

辛苦微溫有毒。治與常山略同。生用大劑則吐。熟用小劑則否。得甘草則吐。得大黃則瀉。

溫瘧熱多

常山小麥竹葉
水煎五更服。

○牝瘧寒多

蜀漆雲目龍骨為末。發
日平旦一服。發前一服。

○腎瘧四肢冷

腰脊痛。大便難。溲溲而寒。常山香
豉竹葉烏梅蔥白水煎。發前分服。

○肺瘧胸多痰

心寒寒甚乃熱。熱間時發。常山三錢。甘
草五分。秫米三十五粒。水煎。發前分服。

○肝

瘧少腹滿

喘息如死。或小便如膿。寒多熱少。常山一兩。
醋浸一宿。瓦器焙乾。每二錢。水煎五更服。

○妊娠瘧疾

常山石黃高梅甘草
酒浸一宿。平旦溫分。

積年久瘡

常山黃連每一兩酒漬一宿發日早服發前再服熱當吐冷當利

○截諸瘡湯

常山三兩水漬一宿發前服輒吐

○截諸瘡

酒常山一兩酒漬三日平旦二服發時一服

○間日瘡常山大黃炙草水煎五更服發時又服

○久瘡不止

常山檳榔丁香烏梅酒浸一宿五更

服之○胸中瘦飲

常山甘草每一兩蜜水煎輒吐不吐再服

截瘡常山丸

常山二兩雞子白合丸豆大煮熟日乾收之每二十九竹

葉湯下五更一服天明一服發時一服或吐或否○截瘡黃丹丸常

山二兩黃丹半兩烏梅一兩糯米湯丸豆大每二十九涼酒下隔夜一

服平旦一服午後方食○不二飲

常山二錢檳榔要一雉一唯大奇

貝母二錢知母

二錢酒一盞十分酒煎至暎八分不可過熬過則不效露一宿○臨發日

五更溫服勿令婦人煎藥治一切新久瘡疾一劑截住神效

藜蘆百三十六

去頭糯米泔煮之日乾即山慈也

辛苦微寒有毒吐風癩痰涎療疥癬惡瘡

生泰山之谷二八月採今所在山谷皆有苗葉似車前莖似蔥白有黑

本草易言 卷五 三
皮裏莖似蔥皮。有花肉紅色。此有二種。一種水藜蘆。莖葉大同。只是生在近水。根須百餘莖。不中藥用。今用者名蔥白藜蘆。根須甚少。

中風不省

牙急每末服五分。以吐痰為度。不吐再。

○諸風有痰

同上

○久瘧瘦多

同上

○頭上生虱

為末

○反花惡瘡

為末搗

○誤吞水蛭

為末水

附子百三十七

生用去皮臍入藥。熟用水泡。全折去皮臍。米熟切片炒之。○地膽為使。惡蜈蚣畏。防風黑甘草人參黃芪萊菔。○生用發散。熟用峻補。○切片色光黑而潤。較今時

一種附子。片色暗黑而乾。焦。全失附子氣味。用者慎之。

辛甘大溫無毒。入足太陰脾。少陰腎。通行十二經。煖腎燥脾。除濕逐冷。退手足之厥逆。舒蹠膝之拘攣。回將絕之元陽。降逆上之濁陰。破癥瘕積聚。兼治寒疝。療癩癩麻痺。並息慢驚。嘔噦膈噎之疾。沉寒痼冷之疴。瀉痢清谷之厄。霍亂轉筋之症。通筋脉而墜胎子。斂瘡口而塞耳聾。

烏頭

製同附子。○初種為烏頭。象烏之頭也。附烏頭而生者為附子。如子附母也。烏頭如子冠。附子如子子。蓋一物也。別有草烏。白附。故以黑附川烏別之。

辛甘大溫有毒。除諸風風痺風邪。半身不遂之風。祛諸寒濕寒冷。堅痞

老積之寒。功同附子。助陽之力稍緩。祛風之力則盛。烏附尖吐風痰。治癩癩。取其鋒銳。無他意也。

生健為山谷。及廣漢。冬采為附子。春采為烏頭。今綿州乃廣漢故地。綿州所屬彰明所產尤多。蓋十一月播種。春月生苗。莖類野艾而澤。葉類地麻而厚。其花紫瓣黃蕤。長苞而圓。其初種之小者為烏頭。附烏頭旁生者為附子。又左右附而倚生者為烏喙。附而長生者為天雄。附而上出者為側子。春末生子。故曰春采為烏頭。冬月生子已成。故冬采為附子。蓋附子乃烏頭所生之子也。

腰脚冷痺痛

生川烏為末。醋合敷之。

脚氣腫痛

久者生附子為末。薑汁合塗。

年久頭痛

川烏南星末。薑汁合。

敷太

頭風斧劈

川烏末燒煙薰。碗中茶泡服之。

耳鳴不已

生烏頭燒末。葛下蒿分。綿色塞之日易之。

耳卒聾

附子煎火。插入耳中。

手足凍裂

附子為末。合麩敷之。

附子湯

附子茯苓白朮人參白芍。治身體骨節俱疼。手足寒脉沉微。

桂枝加附子湯 桂枝芍藥甘草薑棗附子。治因發汗成漏。小便難。四肢急。屈伸不便。惡風。○附子瀉心湯 附子大黃黃連黃芩附子煎。三

黃用水漬之。治心下痞。惡寒汗出者。○桂枝附子湯 桂枝附子甘草

生薑大棗。治骨節痛。小水不利。不渴者。○仙桃丸 生烏頭五靈脂威

靈仙酒丸。豆大。每水下七丸。忌茶。治手足麻痺疼痛。或癱瘓疼痛。或腰

膝痠痛。○薑附湯 附子乾薑。治中寒困昏。臍腹冷痛。霍亂轉筋。○烏

頭煎 烏頭煎去渣。納蜜再煎。治遠臍寒疝疼。手足冷。自汗脈緊。○再

造散 烏頭當歸白參桂枝川斷烏蛇甘草茅朮川芎羌活松節牛夕

防風治癱瘓。○小活絡丹 舒筋最宜。天麻白附子牛夕木別子羌活

各五錢。烏頭錢一地龍焙乳香沒藥各一錢硃砂錢一南星錢五酒丸豆大。治兩脚

無力。小兒不能行。成痿症者。

草烏頭百三十八

黑豆同煮。用莽草連志為使。反半夏瓜蒌貝母白薇白朮惡藜蘆。畏鉛糖冷水黑豆。

辛苦大熱大毒。搜諸風。除諸濕。開頑痰。療頑瘡。墜胎孕。○以汁熬膏名射岡。傳箭射物。見血立死。

出江左山南等處。今處處有之。其根苗花實。並與川烏相似。但此係野生。又無釀造之法。其根外黑內白。皺而枯燥為異爾。所附生亦有天雄烏喙。

遍身生瘡

陰囊兩脚尤甚。○草烏一兩。鹽水浸一宿。炒末。搗末。子一具。煨熟。竹刀切。搗合丸。菜豆大。每三十九。末。以袋盛。豆腐半袋。入烏末在內。再將豆腐填滿。壓乾。入釜中煮一宿。其藥即堅。取出日乾。為末。每五分。薑蔥湯下。

○積年麻痺

或歷節走風疼。以草烏半斤為

白附子百三十九

炮用

辛甘大溫有小毒。陽明經藥也。除頭面遊風。斑痕。肝黯。悉療。解陰下濕痒。疥癬。風瘡亦醫。止心痛。而散血痺。療足弱。而補肝虛。中風失音之疾。風痰眩運之疴。

生蜀郡。三月采。又曰。此物久絕。後無具者。時珍曰。根如草烏之小者。乾

者。皺文有節。又曰。其根苗悉與附子同。按今所用白附。類川烏而內心色白。未知此何物也。而除風亦有效驗。

中風口斜

同姜蕪全
出酒下衣

○偏墜疝氣

為末津合傳臍
灸三五壯

○慢驚風

同南星黑附
為末姜水下

玉真散 白附子十兩。羌活防風南星白芷各一兩。細末收貯。治打跌損傷。已破或傷口潰爛。進風口目斜歪。內服外敷。

南星百四十

去皮臍湯泡用。或濕紙色煨火煨用。
蜀漆為使。念奔草。畏附子乾薑生薑。

辛苦大溫有毒。入肝脾腎三經。治中風麻痺。除風癰痰。消癰腫而散血。攻堅積而墜胎。療金瘡折傷之瘡。除口喎目斜之疾。得防風不麻。得牛膽不燥。得火炮不毒。○牛膽合勻入膽中。懸風處乾之。為膽星。

生澤中及窰甸。二八月采根。今河北州郡亦有之。初生根如豆大。漸長似半夏而扁。年久者根圓及寸。寸大者如雞卵。周匝生圓牙。四月生苗。高尺餘。獨莖。上有葉如瓜。一窠生七八莖。時出一莖作穗。

一切金瘡折傷同防風為散外傳內服

○破傷中風同上

○諸風口噤同生薑蘇葉入糖少許煎服

○口

噤不開一枚煨之用紙斜色剪小孔透氣入口關自開也

○小兒驚風佐辰砂末荆芥下

○風癇痰迷薑汁為丸參湯下

○口

小兒癇後不言為末猪膽合服

○口目斜為末薑汁合貼之左貼右右左

○婦人風氣攻目作痛醋炙南星為末

○中風中

酒下○風痰頭痛同荆芥葉薑汁丸服

○頭暈目眩吐逆同半夏天麻倍白麩水丸豆大每三十九將丸煮熟用

○中風中

○中風中

氣初起少依本香薑水煎服

○右臂疼痛痰濕同生薑蒼水丸服

○氣痰咳嗽同半夏陳皮薑水丸之脉寸盛者宜之

○

解頰脫臼為末薑汁合傳兩頰一夜而上

○小兒解頰為末淡醋傳帛上貼頰門炙手熨之立效

○小兒口瘡白屑

如鵝口為末醋合傅足心男左女右

○走馬疳蝕透骨穿腮生南星碗中孔入雄黃一塊髮色燒之候雄黃作汁以蓋子合定出火毒為末入麝香少許搽瘡數日愈

黃精百四十一蒸過日乾用

甘平無毒。補中氣而安五臟。益脾胃而潤心肺。填精髓而助筋骨。除風濕而下三虫。

南北皆有。以茅山高山者良。苗高一二尺。葉如竹而短。兩兩相對。莖梗柔脆。頗似桃枝。本黃末赤。四月開青白花。狀如小豆花。結子白如黍粒。

亦有無子者。根如嫩生薑而黃。二八月米根亦可劈根稀種之。一年後極稠。子亦可種。以所來多偽。近世稀用矣。

半夏百四十二

湯泡數日。薑汁製用。射干為使。惡吳角。畏雄黃生薑。乾薑秦皮龜甲。反烏頭。忘羊血海藻。飴糖。陳久者良。

辛溫有毒。入足陽明胃。手陽明太陰少陰諸經。降胃止嘔。驅痰除濕。解傷寒之寒熱。消心胸之結滿。欬逆頭眩之疾。癰腫咽痛之疔。○胎前勿用。在處有之。以齊州者為良。二月生苗一莖。莖端三葉。淺綠色。頗似竹葉。

生江南者似芍藥。葉根下相重。上大下小。皮黃肉白。八月采根。

小兒吐瀉

同生薑陳粟米煎服。

○小兒腹脹

酒丸藥大每十九。薑水。下或薑汁合末傳臍上。

○霍亂腹脹

同肉桂末服。

白濁夢遺

與猪苓同炒。去猪苓。入糖粉丸服。

○八般頭風

為末入百草霜少許。作紙煨燒。就鼻內噓之。口中含水。有涎吐去再含。

○喉痹

腫塞

生末噓鼻。涎出效。

○木舌脹大

醋煎。合嗽。

○面上黑氣

焙末。米醋合傳。忌片連傳三日。皂角湯洗面如玉也。

○子腸

不收

生末吹鼻。

○小兒驚風不省

同上。

○卒死不寤

同上。

○五絕急死

同上。

○癰疽

發背

雞子清合末傅之。

○吹奶腫疼

蝦末薑酒下立。痰又取末入鼻。

○打扑癢痕

為末水調敷。一宿即沒。

○遠行

走趺^{十六}同

○飛虫入耳^{十七}

生末香油合
傅耳門外

○蝎蟻螫人^{十八}

水合
未傅

○骨哽咽中^{十九}

同白芷末
服取吐

○心痛止在心上^{二十}

按之益痛

半夏瓜蒌黃連乾薑白芍甘草偏左右
者加柴戶無火者去黃連小脈弱加參

○眉稜骨痛^{二十一}

夏

羌活酒
芎白芷

○子懸逆上捧心^{二十二}

半夏枳壳栝蒌香附揀砂白芍蘇梗
陳皮生薑去半夏加丹麥青皮尤良

半夏瀉心湯

半夏人參甘草乾薑黃芩黃連大棗治心下痞滿不痛

又治嘔而腸鳴心下痞○大半夏湯 半夏人參蜜取流水揚之二百

四十遍治反胃○薑半湯 半夏生薑末服治乾嘔吐涎○小半夏湯

半夏生薑治嘔而不渴○越婢加半夏湯 麻黃石羔甘草生薑大

棗半夏治肺脹喘咳上氣目頭脫脈浮大○半夏湯散 半夏甘草桂

枝湯散俱可治少陰咽痛○半夏麻黃丸 半夏麻黃蜜治心下悸者

射干^{二十三}

米泔浸
烏頭

味苦微寒有小毒治欬逆上氣療咽喉痺痛祛瘀血而通經破癥結而消痰塗癰腫而解瘡母降實火而利大腸

本草綱目 卷五
在處有之。人家種之。今人所種。多是紫花者。呼為紫蝴蝶。葉如烏翼。故又名烏扇羽。葉中抽莖。莖上分枝開花。秋月結實。作房。中子黑色。三月

采根。

論本第一 咽腫痛同豆根末吹之如神

○咽閉第二 塞腫痛同猪脂油台煎令焦去渣每服少許

○咽閉不通第三 含之煎汁

○二便第四

不通諸藥不效者水煎服

○水腫腹大動搖有水聲 搗汁服

射干麻黃湯 射干紫苑冬花五味細辛半夏薑棗治欬而上氣諸方第一 喉中水

雞聲。

玉簪百四十四

甘寒有小毒。

處處有之。人家栽為花草。二月生苗成叢。柔莖如白松。葉大如掌。圓而有尖。葉上紋如車前葉。六七月抽莖。莖上有細葉。中有花朵。白色。下小末大。中吐黃蕊。頗香。結子。

乳癰初起

取根搗酒服以渣敷之

斷產

同鳳仙子紫威花長砂等分蜜丸每經見後服之不可着牙

解斑貓毒

以根搗水服之

刮骨取牙

用乾根一錢白砒三分白礬七分硼砂二分靈仙三分馬頭半分為末以少許點疼處自落也

鳳仙子花百四十五

子炒用甲指桃花

苦平有小毒透骨軟堅損齒通竅催生落胎攻積除噎○根苗主治略同

塗打扑腫痛

齒牙欲去

為末入砒少許煎取之

咽中骨哽

欲死者研水以竹筒灌入其骨即軟勿著牙又以末火之

噎食不

下

酒浸三宿為末酒丸服兼立大每八九酒下

催生

為末水下二錢勿近牙再以芫麻子敷足心

小兒痞積

鳳仙子水紅花子大黃芒硝為細末

白鷄一個去毛腸剖腹勿犯水以布拭淨將藥末入內用綿扎

打扑腫痛

取根葉搗敷

定沙鍋煮乾將鷄焙黃早晨食之日西時疾軟三日便血而愈

骨

皮硝鳳仙子石榴皮各五錢肉陳四錢煎水洗不可用手洗婦女洗

之易義○又方鳳仙花連根搗爛煎洗亦佳

芫花百四十六

醋炒用決明為使反甘草

辛苦有毒入足太陽經泄水破氣逐飲滌痰療咳嗽而除上氣平癰瘡而

消腹滿。○莧花治同。

芫花生淮源川谷。春采花。秋采根。今在處有之。宿根舊枝。莖紫根白似榆根。苗葉似柳。二月開紫花作穗。又似藤花而細。今絳州出者花黃。為之黃芫花。或曰黃色者即莧花。或曰生時色黃。乾則白耳。

贅瘤焦法

甘草熬膏。筆粧瘤之四圍。上數次。次用芫花大戟甘遂為末。醋合。另以筆粧其

○便

毒初起

用根搗出小煎服以渣敷之。得下則消。

○**瘰癧初起**

壯人用芫根搗水服。大吐利則平。

○**一點痛甚**

背腿間根末合醋敷

芫東

○**鬼胎癥瘕**

經不通。以根炒末。桃仁湯下。下惡物為度。

○**酒疸尿黃**

同椒目燒末。每水下半錢。

茵蘘百四十七

用莖葉。

辛苦微溫有毒。治一切風濕。拘攣痺痛。療諸般風冷。筋骨怯弱。

生泰山之谷。三月采葉。今雍華絳杭諸州亦有之。苗高三四尺。莖亦葉似石榴而短厚。四月開細白花。五月結實。

萆薢百四十八

薏仁為使。畏葵根。大黃。紫胡。前胡。

甘苦無毒。入足陽明。破陰經。除腰脊之痛。強散骨節之風濕。療痔瘻之壞瘡。起腰脚之癱緩。溺數莖疼之疾。白濁陰痿之疴。益精明目最良。中風失音亦效。

時珍曰。萹薺蔓生。葉似菝葜而大。其根長硬。大者如商陸而堅。今人皆以土茯苓為萹薺。則誤矣。

此方第一
腰脚痹軟

佐杜仲末。每酒下二錢。忘牛肉。

○小便數第二
酒九豆大。每酒下七十九。

萹薺分清飲 萹薺菖蒲益智烏藥等分。水煎治白濁頻數。

菝葜

生山野中。莖似蔓而堅強。植生有刺。其葉圍大。狀如馬蹄。光澤似柿葉。秋開黃花。結紅子。其根甚硬。有硬鬚如刺。主治萹薺。

土茯苓百四十九

忘茶葉

甘淡無毒。健脾立胃。祛風除濕。強筋骨而利關節。舒拘攣而止泄瀉。解膩

粉銀朱之毒。平惡瘡癰腫之邪。

生海畔山谷。楚蜀亦有之。蔓生。莖細有點。其葉不對。狀類大竹葉而實厚滑如瑞香葉。而長五六寸。其根狀如菝葜而圓。其大若雞鴨子。連綴而生。遠者離尺許。近或數寸。其肉軟可生啖。有赤白二種。入藥用白者良。

白藪百五十

代赭石為使反烏頭

甘苦辛平無毒。除熱散結。止痛生肌。解癰疽瘡腫。療金瘡折傷。治小兒驚癇。平女子陰腫。腸風痔漏之疾。面疱瘰癧之疔。

生衡山山谷。二八月采根。江淮荆襄懷孟商齊諸處皆有之。二月生苗。

多在林中。生蔓赤莖。葉如小桑。五月開花。七月結實。根如雞鴨卵而長。

三五枚同一窠。皮黑肉白。一種赤藪。花實功用皆同。但表裏俱赤耳。

山豆根百五十一

苦寒無毒。瀉熱解毒。消腫止痛。治咽喉風癰。療心腹脹痛。諸瘡皆醫。五痔並療。解人馬之急黃。平蛇犬之暴傷。

生劍南及宜州果州。廣西忠州萬州諸處。苗蔓如豆。葉青。經久不凋。八

月采根。

亦白熱痢。

第一方

喉風急痛。

第二方

牙閉同白藥

○五般急黃。

第三方

水下

威靈仙百五十二。

茶

辛鹹甘平無毒。入太陽經。通十二經絡。祛風行氣。宜通五臟。除腰膝之冷痛。却臟腑之滯積。破癥瘕而退痰癖。解宿膿而去惡水。黃疽浮腫之邪。皮膚大腸之風。

生商州上洛山及華山。今陝西河東河北汴東江湖皆有之。初生作蔓狀如釵股。七月生花六出。淺紫或碧白色。作穗似蒲公英。亦有似菊花頭者。其根叢鬚數百條。初時黃黑色。乾則深黑。此別有數種。根鬚一樣。

但色或黃或白皆不可用。

腰脚諸痛第一 或末或丸酒下

腰脚膝沉重第二 同上以利

破傷風第三 半兩獨頭蒜一個香油一錢同搗爛酒下汗出愈

手足麻痺痛第四 或癰或打扑痛甚同馬頭靈脂醋丸服

噎塞隔氣第五 醋蜜煎服吐痰為度

停痰喘咳而嘔第六 一兩砂仁一兩沙糖一兩水煎

同半夏末皂角水丸薑下

大腸冷積第七 蜜丸薑水下

痔瘡腫痛第八 水煎

諸骨哽咽第九 一兩砂仁一兩沙糖一兩水煎

薰芥神方第十 威靈仙白芥子雄黃山枝為末捲紙燒薰之

防已百五十三

去皮酒洗用惡細辛畏草解女苑肉鹹伏硝石。治風宜木防已。治水宜漢防已。

辛苦而寒無毒。足太陰太陽經藥。通行十二經絡。解臟腑之水氣。泄經絡之濕邪。除脚氣之腫痛。退下焦之濕熱。手足攣急之疾。關節腫痛之疴。乃驅風逐水之要劑。為除濕解熱之靈丹。

出漢中川谷及黔中。二八月采根。其莖如葛蔓。延其根外白內黃。如桔梗內有黑紋。但漢中出者破之文作車輻解。黃實而香。莖梗甚嫩。苗葉小類牽牛。折其莖一頭吹之。氣從中貫如木通。他處者有白虛軟。又有

腥氣皮皺。上足下不足。子名木防已。或以木防已不任用。而張仲景孫思

邈皆用之。是木防已亦可甚棄也。

方第一肺痿喘嗽。漢防已未水煎細呷。

○肺痿咯血。

汗防已葶力為末糯米湯下。

○霍亂吐利。

防已白芷末新水下。

○目

第四睛卒痛。酒浸為末酒下。

○解雄黃毒。

水煎服。

○小便淋瀝。

木防已防風葵子水煎服。

木防已湯。

防已石羔人參桂枝。治膈間支飲。喘滿心下痞。面赤黎黑。脈

沉緊者。○防已茯苓湯。防已黃芪桂枝茯苓甘草水煎服。治皮水。肘

腫。按之沒指。○防已黃芪湯。防已黃芪白朮炙甘草薑棗。治風水皮腫。

汗出脈浮。○又治風濕相搏。關節沉痛。微腫惡風。

木通百五十四。

古名通草。古方所用。與今之木通而俗間所謂通草。即通脫木也。鮮用矣。

甘淡無毒。入心肝膀胱諸經。利水通淋。止渴退熱。安心除煩。通經下乳。耳

聾鼻塞之滯。喉痹咽腫之疾。○通草治同。

生石城山谷。及陽城。正二月采幹。澤潞漢中江淮湖南亦有之。藤生蔓

大如指。其莖幹大者徑三寸。一枝五葉。頗類石葦。又似芍藥。二葉相對。

夏秋紫花。亦有白花者。結實如木瓜。食之甘美。

導赤散 木通生地 炙甘草 竹葉 治心熱尿赤。

鈎藤百五十五

甘苦微寒無毒。手足厥陰藥也。除心熱。平肝風。治大人頭旋目眩。療小兒驚癇寒熱發斑疹而止。內鈎除客忤而息胎風。

出建平秦中興元等處。三月采。兩湖兩江山中皆有之。狀如葡萄藤而

有鈎。紫色。古方多用皮。後者多用鈎。取其力銳耳。

驗方第一 小兒驚熱 同滑石 炙甘草末服 ○卒得癇疾 同炙草煎服 日五夜三 ○斑疹不快 同紫草末酒下

金銀花百五十六 乃冬俗名淨花 葉名毛花

辛甘微苦無毒。退熱解毒。養血止渴。療風除濕。補虛祛脹。治熱毒血痢腸

癖。療腫毒癰疽疥癬。

在處有之。附樹延蔓。莖微紫色。對節生葉。葉似辟荔而青。有濇毛。三四
月花開長寸許。一蒂兩花二瓣。一大一小。俱色白。經二三日則色黃。新

舊相參。黃白相映。故呼金銀花。四月米花。籐葉不拘時采。

一切腫毒

初起發熱。已潰未潰。連莖葉煎服。以渣敷之。

○疔瘡便毒

同上

○喉痹乳蛾

毒

同大黃。始末酒水合敷。四圍。藤葉亦可。

○癰疽內托

已成未成。同黃芪當歸甘草末服。以渣敷之。葉亦可。

雄黃五分。瓦器煎之。紙封七重。穿一空。薰瘡。火出黃水。再用生肌肉取錢。

○輕粉毒癰

同上

○瘡久成漏

痢瀉煎。

○鬼打身青

水煎。脚氣疼。或煎或末常服。

忍冬膏

淨花四兩。磁石三錢。香油一斤。熬枯去渣。入黃丹八兩。熬至滴

水成珠。攤用。治諸般腫痛。金刀傷惡瘡。○忍冬酒 淨花五兩。甘草一

兩。水煎成。再入酒少煎。分服。治癰疽發背。一切惡瘡初起。○活命飲

山甲

錢五分 皂刺 錢五分 甘草 錢一 淨花 錢三 赤芍 錢一 乳香 錢一 沒藥 錢一 花粉 錢二 防風 錢一

貝母

錢五分 白芷 錢五分 陳皮 錢二 一切癰疽初起。未成即消。已成即潰。○又當歸

五錢 生芪 五錢 淨花 五錢 甘草 三錢 治同上第三。尤宜於婦人。

吐絲子百五十七 酒浸蒸晒數次。拌粉用山藥為使。

辛甘無毒。入足三陰經。強陰益精。祛風明目。除腰膝之冷痛。息便溺之淋。

瀝助筋脈而益氣力。解燥渴而止白濁。

消渴不已 第一方。任意煎飲。 小便淋瀝 第二方。同上。 益腎添精 第三方。同熟地酒丸服。 白濁遺精 第四方。同伏

赤濁口乾煩熱 第五方。同杏仁蜜丸。 腰膝疼 第六方。同牛膝酒丸服。 肝傷目暗 第七方。酒浸為末。雞子白丸。

身面卒腫 第八方。洪大酒浸常服。 橫生 第九方。酒下。 谷道赤痛 第十方。蒸黑為末。雞子白合服。 痔如虫

咬同

五味子百五十八 生用止。熟用入補。從八容為使。忌姜。畏馬頭。

味酸微苦。微鹹無毒。入手太陰肺經。欬肺滋腎。益氣生津。補虛明目。強陰。

清精。定喘嗽而止嘔瀉。除煩渴而消水腫。嗽初起。脈數有火者勿用。

出齊山代郡遼東等處。河東陝西越杭亦有之。苗引亦蔓於高木。葉尖。

圓似杏葉。三四月開黃白花。類蓮花狀。七月成實。叢生莖端。今有二種。有南北之分。南產者色紅。北產者色黑。用滋補必用北產者良。亦可取根種之。當年就旺。若二月種子。次年乃旺。

第方第一赤遊風丹

漸漸種大為末服之

○爛眼風眩

同荆子煎服洗

○女人陰冷

五味子四兩為末口中玉泉冷丸納陰中

第四五更腎瀉

五味子二兩吳芋半兩炒末每旦陳米湯下

○白濁脇脊穿痛

醋丸服

○遺精

為末蜜煎膏服 ○陽

第七事不起

每酒下一錢用一斤忌猪魚蒜醋

○痰嗽且喘

同白丸末每三錢以猪肺尖熟煎食之

○久咳不止

佐甘草五倍于風化

硝末乾含咽

○久咳肺脹

同柴壳蜜丸彈子大每煎服一丸

覆盆百五十九

酒蒸用

甘酸微溫無毒。益腎臟而固精。補肝虛而明目。起陰痿而縮小便。潤肌膚而烏鬚髮。

處處有之。四五月紅熟。狀如覆盆。味酸甘。大如櫻桃。軟紅可愛。又曰色黑烏耳。紅者乃藉田蔗也不入藥。

男陽不起驗方第一
酒浸焙末酒下

令女人多孕同上

使君子百六十

甘溫無毒。治小兒百病。五疳悉療。解小便白濁。瀉痢亦醫。最殺諸虫。兼益脾胃。

原出海南交趾。今閩之紹武。蜀之眉州。少栽時之。其藤如葛。繞樹而上。葉青如五加葉。五月花開。一簇一二十葩。紅色輕盈如海棠。其實長寸

許。五瓣合成有稜。

腹有虫病驗方第一
每月上旬。清晨空腹。食使君子仁數粒。或以壳煎湯送下。或七生七煨。

○小兒痞塊第二
腹大肌瘦。同木別子丸。三豆大。雞子一個。孔破入內。蒸熟食之。

○虫牙痛第三
煎漱之

木鱉子百六十一去油用

味苦微寒。有小毒。療癰痔瘡瘰癧。治疔積痞塊瀉痢。

生郎州及南中。七八月采實。湖廣杭越全岳諸州亦有之。藤生。葉有五

極狀如山藥青色面光。四月生黃花。六月結實如枯萼而大。半青熟紅黃色。每一實有核三四十枚。其狀扁而如鱉。

馬錢子百六十二番木鱉子。

苦寒無毒。療咽喉痛痺。消痞塊堅硬。

生回回國。今西土邛州諸處亦有之。蔓生。夏開花。七八月結實如枯萼。生青熟赤。亦如木鱉。而核小色白。彼人言能治一百二十種病。每症各有湯引。或云以豆腐制過用之良。

病欲去胎方第一 梓膏納陰中。

馬兜鈴百六十三去革膜取仁培用。肺虛寒者勿用。

苦寒無毒。手太陰肺藥也。清肺熱而降氣。止痰咳而定喘。血痔痿瘡之疾。水腫心痛之疴。

生平澤叢林中。七八月采實。關中河東河北江淮夔浙皆有之。作蔓繞

樹而生。葉如山蘊葉。而厚大背白。六月黃紫花。頗類枸杞。七月結實。如

大棗似鈴。作四五瓣。

水腫大腹喘急

水煎服。喘急第二同炙草煎服。

一切心痛

燈上燒末。酒下立止。

痔瘻腫痛中平

燒煙薰之。

牽牛子百六十四

研取頭末用。得青木香乾薑。良或半生半炒。黑豆白豆。

苦寒有小毒。專消水腫。最利二便。解一切氣壅。逐諸般痰飲。消腫滿而攻

癖。落胎孕而殺虫。

處處有之。蔓生。葉似扁豆而三尖。有黑白二種。

一切積氣

第一宿食不化。頭末四兩。取萊菔剉孔。入藥。蒸熟加白叩末一錢。每服二十九。

大便不通

第二半生半熟為末。薑湯下。

水腫

卒脹

第三黑白各頭末二錢。白麩合餅燒食。因虛者不用。

水腫尿瀦

取頭末每五分同上。

小兒腫

第五頭末丸服二。

面

上雀斑

第六為末雞子白合敷。旦洗去。

小兒夜啼

第七為末敷臍。

小便血淋

為末魚水。下二錢。

不拘氣水

腹鼓

同上第三。因虛者不用。

奪命散

黑白各炒末。大黃、檳榔等分。每蜜水下五分。治小兒馬脾風急。

驚肺脹喘滿。胸高氣急。脇縮鼻脹。悶亂咳嗽。煩渴痰潮。聲啞是也。○舟

車丸

黑丑四兩。生軍二兩。甘遂一兩。麩用橘紅一兩。大戟一兩。麩。芫花一兩。青

皮一兩。木香

錢。檳榔一錢。輕粉一錢。丸。豆大。每三錢。以大便利三次為度。不知

加之。諸水腫形脈俱實者。

凌霄花百六十五

畏鹹。陶紫威。

味鹹甘寒無毒。入厥陰肝。破血去瘀。通秘落胎。甚止崩帶。最攻癥瘕。

生西海川谷。及山陽。今處處有之。蔓生數尺。得木而上。即高數丈。年久

者籐大如杯。一枝數葉。尖長有齒。自夏至秋開花。一枝十餘朵。大如牽

牛。而頭開五瓣。赭黃色。有細點。八月結莢如豆莢。

驗方第一。浸酒。

○血崩

第二。為末酒下。後服四物。

○消渴

第三。水煎一兩服。

○通身風痒

第四。為末酒下。

風。同地龍。姜。蠶全。蠟炒末酒下。

○酒鼓鼻

同山梔末服。

○經脈不行

酒下末。

本草綱目卷五
薔薇根百六十六

味苦。瀋冷無毒。入手足陽明經。除風濕諸熱。解赤白諸痢。息癰疽疥癬之毒。平金瘡打扑之腫。殺疔虫而治肚痛。通血結而治牙痛。遺尿消渴之疾。頭瘡白禿之疔。子名營實治同。

生零陵及蜀郡。八九月采根。今在處有之。叢生似蔓而莖硬多刺。小葉

尖薄有細齒。四五月開花有紅白諸色。

消渴尿多第一方煎服。○小便失禁第二方同上。○尿床第三方煎服。○小兒疳痢第四方煎服以愈為度。○口

舌糜爛第五方煎服。○金瘡腫痛第六方燒末白湯下。○骨硬不出第七方為末水下。○下疳瘡第八方同葉焙末敷之。

月季花百六十七

甘溫無毒。活血消腫傳毒。

療癰疔第一方用花二錢。沉香五錢。芫花炒三錢。人大鯽魚腹中以魚腸封固。酒水煮熟食之。

栝篋子百六十八古方用實。今惟取仁炒用。

甘寒無毒。入手太陰肺。下氣定喘。止嗽消痰。瀉火潤肺。滑腸止血。平乳癰而通乳。汁療胸痹而滌胸鬱。解赤白熱痢。通二便秘瀉。○瀉者忌用。

所在有之。蔓生。葉如甜瓜而小薄。七月開花淺黃色。結實在花下如拳。

秋月采實。

痰嗽不止 第一

姜仁一兩為末。文蛤七分。薑汁發濃。丸彈大。含化之。

乾咳無痰 第二

薑實一枚。絞汁入蜜。加白。卷一錢。熬膏常含之。

效而有 第三

痰 第四

薑實十個。白礬二兩。全搗為餅。陰乾為末。丸豆大。每五十丸。

熱咳不止 第五

濃茶一盞。蜜一盞。薑實去皮。將。酥入茶中。去子。煎熱常食之。

痰咳胸 第六

滿有熱 第七

用子同半夏丸服。薑下。心下塞者。

肺痿嗽血 第八

薑實一個。烏梅肉十個。杏仁二十一。焙末。每用一撮。豬肺一片。搽末入肉。炙熱食之。

酒 第九

痰咳嗽 第十

同青代薑汁。丸每含化之。

飲酒發熱 第十一

方同。酒痞脇脹。時嘔。同神曲末。每。恩水下二錢。

小 第十二

兒痰喘咳內熱 第十三

薑仁為末。白麩合餅。炙黃為末。每湯下一錢。日三。餅食亦可。

婦人犯熱痰咳經不調 第十四

薑仁青。代香附。為末。蜜。含化。

為末蜜 第十五

痰咳胸滿氣塞 第十六

薑仁炒丸。豆。每三。大。每三。

小兒黃疸 第十七

薑實為末。水下。下黃水為度。

酒疸 第十八

吐血不止 第十九

薑實泥固煨之。每末服三錢。

下鮮血 第二十

薑實燒末。同赤小。豆末。每酒下一錢。

面黑令白 第二十一

薑淨。取三兩。杏。仁。一兩。豬肚。一。具。杵如膏。每夜塗之。

具杵如膏 第二十二

下胞衣 第二十三

用仁為末。酒。與童尿煎。

乳癰初發 第二十四

薑實大者。一。個。酒煎。取汁。

諸癰發背 第二十五

便毒初起 第二十一 萹實黃連 水煎服。

枯萹薤白白酒湯

萹實一枚薤白三兩白酒一斤治胸痹氣短喘息咳

唾胸背痛寸口脈沉而起關上小緊數者○枯萹半夏湯 前方加半

夏半斤治胸痹不得卧心痛徹背○小陷胸湯 萹實一枚半夏半斤

黃連一兩治小結胸痛疼止在心下寸關浮滑心不熱者去黃連

天花粉百六十九 取粉用拘杞為使忌乾薑畏牛膝乾漆反馬頭○即括

甘酸微苦寒無毒解消渴除煩熱療黃疸治毒癰排膿生肌扑損血瘀

發黃煩渴 第一 蜜煎服之 ○一切煩渴 第二 水煎服 ○小兒發黃 第三 同蜜服之 ○小兒壯熱頭痛

乳汁合末服 ○小兒囊腫 第四 佐炙草水煎服 ○耳卒烘烘 第五 刺火以猪油煎三沸塞之 ○耳聾未久 第六 用三十斤煎汁

如常服酒服之 ○乳汁不下 第七 煎服 ○癰腫初起 第八 同赤小豆末醋合敷 ○折傷腫痛熱 第九 搗敷之 ○

箭簇不出 第十 搗敷日 ○針入肉中 第十一 上方同 ○痘後目障 第十二 同蟬蛻焙末將羊肝批開入藥末水泔煮熟食之 ○

土瓜根百七十 即王瓜月令四月王瓜生即此也

味苦微寒無毒。入厥陰肝。通經瘀而破癥結。利二便而消癰腫。

生魯地平澤田野。及人家垣墻間。三月采根。三月生苗。其蔓多鬚。嫩時可茹。其葉圓如馬蹄而有尖。面青背淡色而不光。六七月開五出小黃花。成簇結子。熟時有紅黃二色。根如栝萸根之小者。澄粉甚白。須深掘二三尺。乃得正根。

葛根百七十一

辛甘無毒。入足陽明經。解肌退熱。升陽散火。止嘔除瀉。生津解渴。降冲逆而定喘。解酒毒而散鬱。除眼眶項背之強痛。退胸膈心下之邪熱。血痢溫瘧之疾。腸風疹痘之疴。

在處有之。其根外紫內白。蔓生。其葉有三尖。面青背淡。其花成穗紅紫色。其莢如小黃豆。莢亦有毛。

金瘡中風

始方第一
煙強欲死。水煎四兩服。仍合竹瀝服。

○服藥過劑

水煎服。

○中服藥毒

上方同。

○酒醉不

醒同上○心熱吐血水煎服○衄血第六同上○熱毒下血與葛節合服○乾嘔不已第八煎

服○傷寒頭痛發熱脈洪水煎服○癰子初起第十葛蔓燒末水合敷○消酒第十一葛花煎服飲酒不醉

目眶痛第十一葛根煎服

葛根湯 桂枝白芍炙甘草薑棗葛根麻黃治項背強几几無汗惡風○又

治下利兼太陽表症者○又治剛瘕口噤氣冲項強溺少無汗○桂枝

加葛根湯 桂枝白芍炙甘草薑棗葛根治項背強几几有汗惡風○葛

連芩甘湯 葛根黃連黃芩甘草治下後下利脈促喘而汗出者

天冬百七十二去心蒸用地黃貝母為使畏曾育忌鯉魚誤食鯉魚浮萍可解之

甘寒微苦無毒入手太陽手足少陰經滋腎潤燥止渴消痰除陰火而療

骨蒸潤五臟而利二便痰咳喘促之邪熱消渴嗌乾之火熱肺痿肺癰之

熱毒吐膿吐血之熱鬱○內無熱者與素渴者勿用○殺三虫而去伏尸

強骨髓而澤肌膚

生奉高山谷春秋采根。今處處有之。春生籐蔓大如釵股。高大餘。葉如
苗香。極尖細而粗滑。有逆刺。亦有澁而無刺者。夏生細白花。亦有黃紫
花者。根頗同百部根。

驗方第一

婦人骨蒸煩熱

盜汗口乾。同冬冬末
生地汁煎丸服。

○口瘡連年

上方去地黃加
元參蜜丸含化。

○諸般癰腫

取

酒下。

百部百七十三

酒浸
焙用。

良效。甘苦微溫無毒。溫肺殺虫。除咳嗽上氣。治傳尸骨蒸。解疔疾最易。療疥癬

處處山野有之。春苗作籐蔓。葉大而尖長。頗似竹葉。面青色而光。根下

一撮十五六枚。黃白色。春秋采根。

驗方第一

暴咳嗽

漬酒服
日三。

○三十年嗽

同蜜
煎服。

○薰衣去虱

同秦光末
入筒燒薰。

何首烏百七十四

米泔浸拌黑豆同蒸。忌鐵。茯苓
為使。忌猪血。無鱗魚。蒜。蔥菜服。

本草綱目 卷五
苦澆微溫無毒。足厥陰少陰藥也。益腎補肝。養血祛風。黑髭髮而悅顏色。長筋骨而益精髓。治瘰癧而消癰腫。止崩帶而除瘧疾。

生順州南河縣。今在處有之。以西洛高山河南栢縣者為勝。春生苗蔓延竹木墻壁間。紫莖色葉葉相對如山藥而不光澤。夏秋開黃白花如葛勒花結子。有稜似蕎麥而小。根如拳有五稜。瓣似小甜瓜。有赤白二種。秋冬取根。

疥瘡滿身

不可治者同艾葉煎薰之

○大麻風

一斤。胡麻四兩。九蒸。九晒為末。酒下二錢。

○傷破血出

為末敷神效。

○瘰

癰結核

已破未破。嚼服日二。

○腸風下血

末二錢。未飲下。

○皮裡作痛

不問何處為末。薑汁合膏。敷之。帛色炙熱。鞋底熨之。

○骨

軟腰膝痛

行步不得。遍身痠。酒制棗肉。凡豆大。每三十九酒下。

○紫白癩風

多起面頰。初無痛痒。後漸微痒。延蔓成片。或遠走遍身。純紫斑者。紫癩粉。紅有白斑。者為白。均有汗。初起以萬靈丹汗之。○首烏。荆芥。蒼朮。苦參。皂刺。凡服治白癩。○又附子。硫黃。薑汁。調勻。茄蒂。搽之。治紫白二癩。○又硫黃一錢。陀僧一錢。信石。分陳醋。合敷之。良效。又陀僧為末。醋敷之。

七寶美髯丹

首烏赤白各一斤。米泔浸三日。去皮。鋪黑豆上。砂釜蒸之。

如此九次。赤白茯苓各半斤。吐絲子半斤。酒蒸。當歸身半斤。故紙酒浸。

黑芝麻同炒。牛膝半斤。共為末。蜜丸。龍眼大。每酒下二三丸。黑鬚髮壯筋骨。固精氣。續嗣延年。

澤瀉百七十五

酒浸乾用。畏海蛤文蛤。

甘淡微鹹。微寒無毒。入足太陽少陰經。利水通淋。止嘔除瀉。滲濕解渴。治疝補陰。祛心下之水痞。逐膀胱之濕熱。消腫脹而除脚氣。明耳目而舒筋骨。

生汝南池澤。九月采根。今山東河陝江淮亦有之。以漢中者為勝。春苗

多在淺水中。葉似牛舌。獨莖而長。秋開白花。作叢似谷精草。

驗方第一 胃暑霍亂

小便不利。同白朮茯苓生薑燈心煎。

○水腫

同白朮為末。或丸服。

澤瀉湯

澤瀉五兩。白朮四兩。水煎分服。治心下支飲。苦眩冒。脈沉弦。

菖蒲百七十六

去毛微炒。秦皮秦朮為使。忌地糖麻黃。忌飴糖。羊肉。鐵器。石。菖蒲良。

辛溫苦平無毒。手少陽足厥陰藥也。開心孔。通耳竅。明目發音。祛濕逐風。

除痰消積。開胃寬中。療噤口毒痢。除風痺驚癇。崩帶胎漏之疾。癰瘡疥癩之疔。

生上洛池澤。及蜀郡嚴道。一寸九節者良。今處處有之。而池州戎州者佳。時珍曰。菖蒲凡五種。生於池澤。蒲葉肥根高二三尺者泥菖蒲也。生於溪間。葉蒲瘦根高二三尺者水菖蒲也。生於石水之間。葉有劍脊瘦根蜜節高尺餘者石菖蒲也。人家以砂栽之。每春剪愈剪愈細。高四五寸。葉如韭。根如是柄粗者亦石菖蒲也。

遍身生瘡

痛而不痒。粘着衣被。曉夕不卧。以數斤為細末。布席上。卧之。既不粘衣。又得安卧。五七日瘡神效。

○**飛絲入目**

捷碎左目塞右鼻。右塞左神效。

頭瘡不瘥

為末香油。台敷日三。

○**陰汗濕痒**

同蛇床末搽之。

○**病後耳聾**

取汁滴之。

子持丸

綿包塞耳。日易之。七日愈。

○**產後崩中**

酒煎服。兩半。

○**赤白帶下**

同故紙炒。末酒下。

○**胎動不安**

或下血。取汁服。

○**肺損吐血**

同白起。新水下。

○**諸積鼓脹**

半斤。半毛。四兩。同炒。去毛。醋丸。服三十丸。

○**霍亂脹痛**

四兩。每服一兩。

○**尸厥如死**

脈如常。為末。吹鼻。仍煎服。

○**魔死不寤**

勿以火照。但痛咬其踵。以菖蒲末吹鼻。且煎服。

○**聰耳明**

目益智不忘為末酒常服之

蒲黃百七十七

甘平無毒。手足厥陰藥也。生用性滑。行血消瘀。通經脈而利小便。祛心腹膀胱寒熱。諸邪。療打扑損傷。瘡癤諸腫。炒黑性瀉。止一切吐血崩帶便血痢血煎止洩精。

處處有之。以秦州者為良。初生嫩葉出水時紅白色。至夏抽莖於叢葉

中。花挹莖端如搥。俗名蒲棒是也。蒲棒即花中莖屑也。

心腹第一血氣痛同靈脂末服 ○ 舌脹滿口為末搽之 ○ 重舌生瘡以末敷之 ○ 衄血第四

吐血唾血二兩每涼水下三錢 ○ 血吐不已為末生地湯下 ○ 小便血第七 ○ 衄血第四

胎動欲產井花水下 ○ 胞衣不下同上 ○ 產後血瘀水煎 ○ 衄血第四

兒枕血末湯下 ○ 產後煩悶東流水下 ○ 墜傷扑損內瘀酒下 ○ 陰處濕痒為末

○ 聾耳出膿之 ○ 耳中出血妙黑搽之 ○ 口耳大血急以帛縛兩乳全阿膠生地煎服

浮萍百七十八

即水中小浮萍非大類也

辛酸無毒。入手太陰經。除膚熱而解表。消癰疹而祛風。下水氣而利小便。

止癢痒而解消渴。麻痺癰瘰之疾。打扑吐血之疴。

處處地澤水中有之。春生。或云楊柳花所化。一葉經宿即生數葉。葉下

有微鬚。即其根也。一種背面皆綠者。一種面青背紫。赤若血者。為之紫

背浮萍。入藥為良。春采根取貯篩中。篩下坐大盆水。即易乾也。

海藻百七十九

鹹寒無毒。瀉熱行水。軟堅為痰。消癭瘤結核。解癩疔癥結。平水腫而利二

便。治奔豚而療脚氣。諸隔痰壅之疾。癰腫宿食之疴。

海帶

下水消癭。功同海藻。

海藻生東海。七月采。今登萊諸州皆有之。黑色如亂髮。

海藻酒 海藻一斤。絹袋盛。浸酒中。數日。服盡。再作。將渣丸服。治癭氣瘰。請方第一

癭。

昆布百八十煮去鹹味
焙乾用。

鹹寒無毒。治水腫癭瘤。陰癘隔噎。功同海藻。

生東海。時珍曰。生登萊。接如繩索之狀。出閩浙者。大葉似菜。

瘦氣結核。

為散。每一錢用綿包好。醋中
浸過。含嚙。汁盡再易之。

○隔噎第一
含嚙汁。

石斛百八十一去頭與根。酒浸。日晒。酥蒸。用。陸英
為使。惡。殺水。石。已。丑。畏。雷。丸。殭。蠶。

甘淡微鹹無毒。強陰益精。煖水補虛。平胃氣而壯筋骨。療風痺而治脚弱。夢遺滑精之疾。發熱自汗之疴。

生六安山谷。水旁石上。七八月采。莖色如金者佳。荆襄澤中江左亦有之。叢生石上。其根糾結甚繁。乾則自軟。其莖葉皆生青色。乾則黃色。紅花節上自生根鬚。人亦折下。以砂石栽之。短而中實者石斛也。長而中虛者木斛也。木斛不入散丸。

骨碎補百八十二

去淨毛蜜蒸用焙亦可。忘鐵即毛蕪亦名中蕪。

苦溫無毒。入手少陰經。及手足厥陰。專治折傷。最補腎虛。耳鳴牙痛悉療。破血止血皆醫。

江南淮浙陝西夔路皆有之。其根扁長。略似薑形。其葉有極缺。頗似貫

仲。

筋骨折傷

為末法第合敷之。

○久瀉腎虛

為末入猪腎中煨食。

○牙痛

炒黑末搽之。下。

○髮落欲生

同

薇嫩皮煎汁刷之。

○耳鳴耳閉

削條火泡。乘熱塞之。

○風虫牙痛

同乳香丸塞孔中。

石葦百八十三

去毛搜炭用滑石杏仁射干為使得葛下良。

辛甘微寒無毒。通膀胱而利水。益精氣而治淋。崩中漏下之疾。發背金瘡

之疔。

處處有之。多生陰崖險罅處。其葉長者近尺。濶寸許。柔韌如皮。皆有黃

毛。亦有金星者。

野苧萋百八十四

即萋不食草也。石胡荽。

辛平無毒。避臭氣而通九竅。吐風痰而散瘡腫。去目翳而開鼻塞。解耳聾而療痔病。頭痛腦酸之疾。痰瘧駒貽之疔。生石縫及陰濕處。細莖小葉。狀類苧萋。

卷栢百八十五

先以鹽水煮次以井水煮焙乾之。

辛平無毒。生用破血通經。治癥瘕淋結。灸用止血。治腸風脫瀉。

生常山山谷石間。關陝沂蒙諸處亦有之。宿根紫色多鬚。苗似栢葉而細。拳攣如雞足。高三五寸。無花子。多生石上。

瓦松百八十六

昨葉荷葉。

酸平無毒。止血住痢。生髮斂瘡。

處處有之。生年久瓦屋上。如蓬高尺許。遠望如松栽。六七月采苗。

馬勃百八十七

俗名灰包。生濕地中。

本草綱目卷五
辛平無毒。散血熱而清肺。止喉痹而解毒。傳諸瘡甚良。止吐衄亦效。
生濕地久腐處。或腐木上。紫色虛軟如狗肝。彈之粉出。有大如小斗者。

薺芫百八十八

甘寒無毒。利肺氣而和中。止咳嗽而明目。解消渴而除痛。治強中而解毒。
以蜀江浙皆有之。苗似桂梗。根似沙參。而姦商每以此偽作人參。

猪腎薺芫湯

猪腎一具黑豆一斤薺芫三人參石膏茯苓神磁石知母葛根黃

根黃芩甘草括篋根

每二兩治強中莖長輿不交精自出消渴

未入

仙茅百八十九

糯米泔浸去赤汁用忌鐵

辛溫有毒。除腰脚之冷痺。去心腹之冷氣。助陽道而生子。添精髓而通神。
聰耳明目。開胃消食。最安五臟。尤治虛勞。

生西域今處處大山中有之。葉似茅。四五月抽莖四五寸。開小花。深黃色。其根獨莖而直。大如小指。下有短細肉根相付。外皮稍粗。褐色。內肉

黃白色。二八月采根。

水仙百九十

苦辛滑寒無毒。最消癰腫。甚下骨哽。

叢生下濕處。其根似蒜薤而長。外有赤皮。冬月生葉似蒜薤。春初抽莖如蔥。莖頭開花數朵。大如簪頭。

葭若子百九十一

醋煮乾
牛乳浸

苦辛熱有毒。療癩疾風癩。治肉痺拘急。薰虫牙而洗陰汗。止冷痢而收脫肛。安心定志。聰耳明目。除邪逐風。通神見鬼。

茜草百九十二

苦酸無毒。補中益氣。祛寒除濕。解黃疸而通經。止風痺而活血。吐衄崩中。便血諸血。治痔瘻瘡癬。息扑損諸傷。

生喬山谷。二八月采根。今國人亦作根種時。苗蔓生。方莖。中空有筋。外

有細刺。數寸一節。每節五葉。七八月開花。結實如水椒。中有細子。
白藥子百九十三

辛溫無毒。散血降火。生肌解毒。消腫癰而解喉痹。除咳嗽而療損傷。

出原州。夔施合州。江西嶺南亦有之。三月生苗葉。四月抽莖。莖似壺蘆。蔓。六月開白花。八月結果。九月葉落枝折。根皮赤色。名白藥子。

黃藥子百九十四

苦平無毒。涼血降火。消癭解毒。

出嶺南。夔陝州郡。及明越秦隴山中。以忠州萬州者為勝。今處處人家種之。莖高二三尺。柔而有節。似籐。葉大如拳。其根外褐內黃。亦有黃亦色者。

胡麻百九十五

酒蒸用。烏者良。

甘平無毒。潤養五臟。添補精髓。堅筋骨而明耳目。黑鬚髮而利二便。最逐

風而除濕亦涼血而解毒。

小便尿血

碗許為末。米流水洗。一宿。平旦絞汁。煎服。

○瘡口不合炒痔數之。

○蜘蛛咬瘡杵爛數之。

○諸虫

咬傷

同上。

○湯火傷同上。

○婦人乳少炒研入少。有食之。

○陰痒生瘡嚼數。

○小兒瘰癧

同連呂末。常食之。

○小兒軟癩炒焦。嚼數。

○小兒痢下亦白搗合蜜。湯食之。

足酸疼

浸常服。

○偶感風寒

炒研搗酒。服取汁。

○腰脚酸痛

煎香杵。末服。

香油百九十五

甘微寒無毒。涼血解毒。止痛生肌。解諸毒而殺虫。消癰腫而滑腸。

髮落不生

塗之。

○令髮長黑人桑葉煎過。去浸沫髮。

○耳聾有塞日滴。數次。

○蝮蛇入耳油以。

作餅

○蜘蛛咬傷

合鹽。搽之。

○冬月唇裂

塗之。

○小兒丹毒

塗之。

傷蛇

急飲之。再治外。

○喉痹腫痛

唯之。立愈。

○腫毒初起

煎熟乘熱。通手旋塗。

○癰疽發香油一斤。銅斧煎沸。

入好醋二碗作五

○血乾產難

煎服。

○胎死腹中

同上。湯服之。

○辛熱心痛

服一。

小兒初生二便不通

少入皮。確煎服。

○小兒諸熱

蔥涎入油內。手蘸油厚五。心頭而項背。能解毒涼肌。

○傷寒發

黃香油一盞水半○中

砒石毒一

○腰

痛牽心發則氣絕以香油服之

○小兒

黃香油一盞水半○中毒難子白合服

鹽哮脂麻搗瓦上焙

○眉毛不生脂麻花陰乾為末

○湯火傷香油數兩入落陽花漬

○小兒香油數兩入落陽花漬

痛消腫水不

潰爛神效即黃葵

大麻仁百九十六去壳取仁用

○甘平無毒手陽明足太陰藥也潤燥滑腸通乳催生破積血而利小便止

消渴而通關節

風水腹大腰膝重痛不可轉側

便不通產後秘塞

○老人風秘

○五淋瀉痛

○大

月水不通同桃仁各二兩酒煎分

○嘔逆不止枳煎水研取

○妊娠心痛水煎

○虛勞內熱骨

痛大便數口燥熱

○脚氣腫渴煎汁入赤小豆

○血痢不止取汁煮菜豆

○大腸

頭出寸飲乾則自落又出坐香油中漬

○金瘡內瘡二兩蔥白七個搗水

○小兒頭

○小兒頭

瘡研細絞汁

○白禿無髮炒焦為末搗脂合敷髮生

○小兒丹毒持末水

○小兒丹毒

合蜜塗之

○白禿無髮炒焦為末搗脂合敷髮生

○小兒丹毒持末水

○小兒丹毒

小麥百九十七

新者性熱。陳者和平。

甘微寒無毒。除客熱而止煩渴。利小便而止漏血。

論者第一消渴心煩

作粥食之

○老人五淋

同木通一兩

○白癩風

攤石上燒鐵物。壁油搽之良。

浮麥

甘寒無毒。益氣除熱。自汗盜汗最宜。骨蒸勞熱尤良。

麥蘖百九十七

止痛散血。調中去熱。醋蒸熨手足痺痛。寒濕脚氣。醋炒。署損傷血瘀湯火

傷爛

一切虛汗盜汗

或炒末服。或煎服。

○氣走作痛

醋炒布包熨之。

○小兒眉瘡

炒黑末酒合敷。

小便尿血

炒香猪肉煎食之。

陳小粉百九十七

用麩皮水澄乾之。愈久愈佳。

炒黑醋熬膏。傅一切赤腫焮痛湯火諸傷。犬咬馬毒。久不愈者。

麩麵百九十七

甘溫無毒。補虛養氣。厚腸強力。助益五臟。充實體膚。傳癰腫損傷。止鼻衄。

吐血最散血瘀。尤止痛疼。

熱渴心悶第六 溫水合服一兩 ○ 中暈卒死第二 水合服一抄 ○ 吐血第三 各炒磨京墨合服 ○ 大衄口耳皆第四

血入鹽少許 嘔噦不止第五 醋合作小彈丸。煮熟投漿水中。每吞三丸未定再嚼。 ○ 寒痢白色第六 炒入粥中食之。 ○ 瀉痢不第七

固炒焦斤每水下二錢 ○ 頭皮虛腫如裹水嚼麩 ○ 咽腫疼第九 醋合傳外腫處 ○ 乳癰不消第十 煎

破傷中風第十一 同炒鹽新水合傳 ○ 金瘡出血第十二 ○ 遠行脚趺成泥第十三 水合傳一夜滴 ○ 折

傷瘀血第十四 同山枝水合傳 ○ 火燎成瘡第十五 同山枝香油傳之 ○ 瘡中惡肉第十六 寒食麩麩二兩。巴豆五分。水合餅燒末傳之。

兒口瘡第十七 寒食麩麩硝石水合傳足下。心男左女右 ○ 婦人斷產第十八 一斤。酒煮泔去渣。分三服。經水至時。前日夜次日早天明服之。

瘡同鹽合團 ○ 瘡累累如赤豆第十九 生手足肩背瘡。疔也。酒合傳之 ○ 一切疔腫第二十 豬油合封 ○ 傷米食積第二十一

傷肉積第二十三 同上山查湯下 ○ 一切腹痛第二十四 麥稽草燒灰。淋汁服 ○ 接骨外傳方第二十五 生梳一錢。飛白麩三錢。薑汁調

傳。○ 損傷腫痛。極查水合傳之。

大麥百九十八

止渴除熱。益氣調中。補虛養血。消食止瀉。充實臟腑。滑肥肌膚。

大麥麩

平胃止渴。消食除脹。寬胸下氣。涼血進食。

食飽脹煩

大麥麩炒香。白湯下。以愈為度。

小兒脹煩欲睡

此傷乳也。用麩微炒。水下一錢。

麥芒入目

大麥

煎洗

湯火傷

大麥炒黑。為末。油合敷之。

破傷腸出

大麥粥。湯洗腸納入。但飲米糜。百日可愈。

辛患淋痛

大麥

三兩煎。潘入。薑汁蜜代茶。

小便不通

陳大麥。煎汁服之。

大麥芽

炒

開胃補脾。和中寬腸。散氣破血。通乳落胎。化一切米麵果食。消諸般脹結。

痰氣

婦人乳脹

因喪子。水煎。三錢。立效。

脹飽

谷勞嗜卧

飽食便卧。四肢煩重。大麥芽三兩。椒一兩。俱炒。乾薑三兩。為末。白湯

下二錢。

蕎麥百九十九

甘平微寒無毒。寬腸降氣。磨積消癰。除白濁白帶。治脾積瀉。洩塗丹腫毒。

消熱腫。療痢疾而止絞腸。

絞腸痧痛用麩炒焦熱水沖服 ○脾積痢疾炒麩少糖水合常服 ○赤腫熱痛醋合麩 ○嗽而上第四

氣麩四兩。茶末二錢。蜜二兩。水一碗。順手攪。下。服之。良久。氣下。不止。即愈矣。 ○十水腫喘同大戟末。作餅。炙熟。為末。茶下。以痢為度。 ○男子白濁

炒末。雞子清。合丸。豆大。每五十。鹽水下。 ○赤白帶下同上 ○噤口痢疾每沙糖水。下麩二錢。 ○癰疽發背麥麩硫黃各二

兩。并水。合餅。日乾。每用一餅。磨水。傳之。痛。令。不。痛。不。痛。令。痛。 ○瘡頭黑凹用麩煮食。即發起。 ○痘瘡潰爛用麩。頭。傳。 ○湯火

傷炒麩水合。傳神效。 ○男子敗積同大黃。末。酒下。 ○女子敗血同上。 ○頭風畏冷水調餅。傳之。數。作。汗。出。愈。

染髮令黑 ○噎食善本。稽。統。灰。淋。汁。煎。取。白。霜。一。錢。礪。砂。一。錢。為。末。每。酒。下。五。分。

粳米二百陳者下氣。宜病人。

甘平微寒無毒。補中和胃。益氣除煩。清熱止渴。壯筋骨而益腸胃。和五臟

而好顏色。

霍亂吐瀉煩渴

入水研汁合竹瀝服之

○亦痢熱燥

入水研汁入瓶中貯井底一宿平旦服之

○自汗不止

枵粉

綱色

○五種尸病

水煮一沸常服之

○卒心氣痛

水煎一沸即服

○初生無皮

枵粉

○小兒

面耳生瘡

濟傳

○胎動腹痛下黃

同黃芪煎服

浙二泔

即大赤泔第二次也

止煩渴而清熱利小便而涼血

吐血不止

溫服

○鼻血上

○服藥過劑

糯米二百零一

糯性粘滯小兒病人忌之痘病喜之

甘溫無毒補脾益肺益氣止瀉堅大便而縮小便收自汗而發痘瘡

自汗不止

枵粉入龍骨壯燥扑之

○霍亂煩渴

蜜水研汁服之大赤尤良

○消渴不止

同上

○下痢噤

口

○久渴食減

糯米二兩水浸一宿炒熟為末入山藥一兩每日平旦用半盞入沙糖二匕胡椒不少許以滾湯調食其味極佳久服令人有子神方也

○鼻血不止

諸藥不效用糯米炒黃為末每新水下二錢仍吹鼻少許

○自汗不止

同麩皮炒末每米飲下二錢

○女人白淫

同花椒醋丸服

○風犬咬傷

糯米一合磁毛七枚同炒黃去毛再入七枚炒黃去毛又入七枚得毛出煙去毛為末香油合服小便利佳

虛勞不足

人猪肚內蒸乾倚丸日日食之

○腰痛虛寒

炒熟袋盛投藥痛處內研服八角茴酒下

○金瘡癰腫

搗末不拘多少

端午前四十九日以冷水浸之一日再換水輕淘轉勿攪碎至端午日取出陰乾絹袋盛懸通風處每用旋出炒黑為末冷水調如膏塗瘡大小裏定瘡口外以布色勿令動直候瘡痊若腫毒初起傳之一夜即消

○喉痹此腮

用前膏帖之乾再易

○竹木簽刺

以前膏帖之一夜刺出在藥內也

○煩渴不止

搗末泔水任意飲之

黍米二百零二

多食發疾閉氣

甘溫無毒益氣補中

杖蒼腫痛

燒灰香油敷之不作癩

○小兒鵝口

嚼汁敷之

○心痛不瘥

四十年者取泔汁溫服

○閃肭

脫臼

赤黑腫痛黍米切鐵漿粉各半斤蔥一斤同炒研末醋合敷三次再入少醋帖之

稷米

甘寒益氣補中涼血解毒

避除瘟疫

令不相染稷米為末頓服之

丹黍米二百零二

止嗽下氣退熱除渴甚治霍亂亦調瀉痢

令婦不垢同慈仁丸服。

○男子陰易酒煎三兩於沃。

蜀秫二百零三

甘澆溫無毒。溫中澆腸。○蜀秫根利小便止喘。燒灰酒服。治難產。主治第二

小便不通

蜀秫根三兩。爲竹一兩。燈草百莖。每流水煎服半兩。

玉蜀秫

甘平。調平開胃。玉蜀根葉。治小便淋沙石痛甚。煎湯服。

粟米二百零四

甘鹹微寒。養腎益氣。治胃熱而止渴。除霍亂而利小便。

反胃吐食

爲粉水丸。豆大。煮七枚。納醋中吞之。

○胃熱消渴

陳粟米炊飯乾食之。

○鼻血

爲粉水煮服。

粟米泔

飲服止霍亂煩渴。

洗浴療皮膚瘙疥。

穀芽

甘溫。開胃快脾。下氣合中。消食化積。

杵頭細糠

粟米之糠也。

氣隔噎塞刮取含之亦可煎呷之亦可蜜丸含服

咽中如有物吞吐不利杵頭棘台參蓮肉煎服

薏苡仁二百零五糯米同炒用

甘微寒入足太陰足陽明經利水瀉濕退熱除淋舒筋急拘攣止咳唾膿血治脚氣而除風止消渴而殺虫

水腫喘急用郁李仁二兩水研取汁煮意以飯食

咳唾膿血用半斤杵破水煮入酒少許服

薏苡附子散 苡仁半斤附子二兩煎服治胸中痹塞或隱痛○薏苡附

漿散 上方加敗漿為散煎服治腸癰身甲錯腹皮急按之濡如腫狀

腹無積身無熱脈數者○薏苡粥 治久風濕痺水腫胸痹筋攣等症

蓋薏苡仁杵粉同大米作粥食是也

粟壳二百零六去蒂筋膜醋炒武蜜火用

酸渣微寒無毒斂肺瀉腸止瀉痢而固脫肛療遺精而止久嗽

瀉痢赤白蜜炙蜜丸服

熱痢便血醋炙同陳皮為末烏梅湯下

久痢不已蜜丸彈大每薑末下一丸病危者不

用 ○水瀉不止

同烏梅大葉煎服

○久嗽不止

各氣素壯者即效蜜炙木蜜水下

○久嗽虛嗽

多平不愈同烏梅為

末白湯下

○壯人卒痢

同烏梅燈心草引煎服

○嗽而遺溺

同五味子服

燥枯

粟米 甘平無毒。行風氣而逐邪熱。治反胃而開胸痰。甚止瀉痢。尤潤

鴉片二百零六

酸瀉溫有小毒。治瀉痢脫肛。瀉丈夫精氣。

一粒金丹 真鴉片一分。大米飯搗合三丸。每重錢許。每服一丸。未效再

進。不可多服。忌醋。通治百病。風癱酒下。○口目不正。羌活湯下。○百節

痛。獨活下。○正頭風。羌活湯下。○偏頭風。川芎湯下。○眩暈防風下。○

陰毒豆淋酒下。○瘧疾挑柳枝下。○痰喘葶藶湯下。○久嗽乾薑阿膠

湯下。○勞嗽冬花湯下。○吐瀉藿香湯下。○赤痢黃連湯下。○白痢乾

薑湯下。○噤口痢白朮湯下。○臍下痛燈心湯下。○諸氣痛木香酒下。

○熱痛梔子湯下。○小腸氣小茴湯下。○血氣痛乳香湯下。○脇痛酒下。○噎食生薑丁香下。○血崩靈脂湯下。○慢脾風砂仁湯下。○其餘諸症審其所引可也。

黑豆二百零七

炒食極熱煮食則寒紫小者良

甘平微寒無毒補腎鎮心解毒散熱利水下氣活血去瘀塗一切腫毒解

諸般風熱除心腹之痛滿散產後之滯瘀

頸項強硬

不得回顧蒸熱布色枕之

○風毒攻心

煩燥恍惚水煎服

○卒風不語

煮汁服

○痺喉不

語

同上

○目赤腫痛

蒸數色五更時更互熨之

○腸痛如打

炒焦入酒煮沸服之取醉

○腸脇卒痛

同上

卒然腰痛

并炒熱熨之

○腳氣冲心

水煎服

○身面浮腫

水煎再入酒煮服

○新久水腫

○腹中痞硬

薑引水煎

○水痢不止

炒末每米飲下三錢

○霍亂脹痛

微炒末水下

○男子便

血炒焦熱酒淋服

○一切下血

皂角湯浸炒熱猪油丸服

○小兒沙淋

百二十粒生草一錢南滑一錢水煎服

○腎虛消

同上

渴難治者炒同花粉丸服

○晝夜不眠

以新布火熨目再蒸黑豆數色更枕之

○天行疫癘發腫

炒同史草煎服

一

第二十一
切菜石食物毒

同甘

○酒食毒

煮食得

○信石毒

服

○巴

第二十五
豆毒

利不止者煮服

○湯火傷

煮食

○打頭青腫

炒末水

○隨跌內瘀

服

二十九
瘡濕爛

為末

○小兒頭瘡

炒末水

○染髮令黑

醋煮熱

○牙痛

服

二十三
水不斷

炒煙盡入酒沃之服或不見心熱者忌

○妊娠腰痛

酒煎

○子死腹中

醋煎

○胞衣不

服

下

○菜中蛇毒

為末酒浸

○身如虫行

水浸絞汁

○脚膝腫

服

○中痒

出

水風疽瘡也。以青竹筒三尺。將黑豆入內。以馬糞糠火燒薰。以器兩頭取汁搽之。先以未泔合鹽洗之。

○小兒血淋

黑豆葉

煮汁服

豆淋酒

黑豆三升。炒熟入瓶中。以熱酒沃之。經一日。每取溫服。取汗。

○治產後百病。產後諸風。或背強口喙。或煩熱癩癢。或身頭皆腫。或身痒

嘔逆直視。或手足頑痹。頭眩目昏。皆虛熱中風也。

○中風口斜

服

○頭風

服

頭痛

○破傷中風

○黑豆補虛丸

黑豆五升。煮爛去皮。搗末猪膏作丸。

○豆大

每酒下百丸。長

肌增顏。填髓益氣。補虛能食。肥人不可服。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

肌增顏。填髓益氣。補虛能食。肥人不可服。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

○荒年避谷神丹。黑豆五斗。

蒸三遍。去皮。大麻子三升。浸一宿。蒸二遍。令口開。取各搗為末。再合搗作團。如拳大。入甑中蒸之。從戌至子。寅時出甑。午時曬乾為末。乾服之。以飽為度。不得食一切他物。第一頓得七日不饑。第二頓四十九日不饑。第三頓三百日不饑。第四頓二千四百日不饑。更不必服。永不饑也。令人強壯。永不憔悴。口渴即研大麻子湯飲之。轉更滋潤腸腑。若要重食他物。用葵子三合。研末煎湯令服。取下芽如金色。任食諸物。並無所損。真仙方也。

豆黃卷二百零八

妙用。○黑豆生芽乾之。

甘平無毒。益氣宜腎。破血止痛。除胃中積熱。消水病脹滿。舒筋攣而止膝痛。潤肌膚而除黑肝。

此方第一

水腫喘急。二便滯。同。大黃為末。每息白。陳皮湯下二錢。以利為度。

○頭風筋攣膝痛

第二。便結妙。水。下。日。二。

黃豆二百零八

甘溫無毒。寬中下氣。利腸消水。豆油。辛甘熱微毒。

痘後生瘡 煨豆為末。香油合敷。 損傷腫痛爛 豆腐渣炒熱。製之良效。

赤小豆二百零九

甘酸無毒。散血消腫。排膿清熱。止渴解酒。通乳下胎。利小便而消水腫。治

脚氣而療瀉痢。敷一切瘡癰。塗諸般熱毒。

水氣腫脹 亦小豆五合。大蒜一顆。生薑五錢。商陸一條。同搗爛。去藥。空心食豆。從旋吸汁。令盡。腫自消也。 腫從脚起 入腹殺人。亦小豆三斤。煮爛。取汁。溫

漬足膝。若已入腹。但食小豆。勿雜他食。亦愈。水腫腹大 人白茅根同煮。食之以消為度。 下部卒痛 同黑豆蒸熟。作二色。更互生燂之。

水谷痢疾 一合。同黃蠟。三兩煎服之。 熱毒下痢 為末。水服。 舌上出血 如有孔。水研絞汁服。 熱淋

血淋 炒末。同煨蔥。搗爛。酒下。 重舌鵝口 為末。醋合敷。 小兒不語 為末。酒合。數舌下。 牙痛 為末。搽之。吐涎吹鼻。

中風嘔逆 水煎服。 常患隨胎 為末。酒服。 妊娠行經 同上。 難產 研取汁。入黃明膠煎服。又生吞。

脆衣不下 男七枚。女二七枚。東流水吞下。 乳汁不通 煮汁服。 吹乳 酒研服。以渣敷之。 癰腫

初作 水合末。敷之。 痘後癰腫 雞子清合末敷。 顯頰熱毒 為末。蜜合敷。 丹毒如火 雞子

清合

○風瘙癢疹

第二十三

合荆穗末雜

子清合散

○中六畜肉毒

第二十

坑末

水下

諸方

第一

赤小豆當歸散

小豆當歸為末漿水下治狐惑病脉數無熱微煩默默

欲卧目赤皆黃黑若能食者膿已成也○又治先血後便

第

一

方

第

一