

剪草散

治砂疥蛇末子三錢寒水石蕪美各二錢剪雄黃各五分輕粉一錢

硫黃餅

治虫疥及喜湯火灸燙者製硫黃一兩為末用水調成餅貼磁底覆轉用熟艾一兩

三黃散

治膿疱疥瘡治熱為主黃芩黃連大黃各三分輕粉無名異白益大香各

升麻和氣飲

治疥瘡痛痒乾葛二錢陳皮甘草各一分半大黃五分半夏當歸茯苓白芷各一錢赤芍藥

一掃散

治一切瘡疥癩蘆皮三錢蚌粉鉛粉各一錢半雄黃七分輕粉一石為末另用大鯽魚

神異膏

治同上全蝸七箇皂角二錢巴豆去皮七箇油一兩黃蠟半兩右先用全蝸皂角巴豆入油煎

如聖散

治肺癆風癩生瘡疥浸展胡粉一兩黃連七錢半蛇床子五錢水銀二錢半右為末生麻

油調立效散

治濕疥浸淫久不差輕粉綠礬黃栢硫黃各等分右為末生麻油調洗瘡後塗

麻豆膏

治諸癬疥油二兩八巴豆肉草麻子肉各四粒斑蝥七粒蒸煎成膏塗擦之去滓即愈

身生癬

獨莖羊蹄根另搗白礬末以米醋調成膏

一箇入香油煎候熟去魚鱗冷調藥擦瘡癬

油調

搗



塗擦之加輕粉
黃丹尤妙

蝟膏

治牛皮癬全蝟各十枚巴豆肉二十枚
香油一兩右同熬候色焦者先去之去盡三
肉了乃入黃蠟一錢候熔收則朝捺暮愈不損皮
物蝟乃一方治遍身疥癩烏單熬至白

胡粉散

治神效胡粉硫黃雄黃各二錢半砥搗七
錢少許常挑一匙空心酒調下
醋搽動患處用藥少許擦之得效
枝麝香二分右為末先以羊脂報煎

連粉散

治風濕瘡黃連胡粉石各五分右為末乾粉
五錢輕粉龍骨連胡粉石各五分右為末乾粉
或油調

秘傳一擦光

治疥癬及諸般惡瘡神效白礬枯六錢
椒大風子肉各一錢半輕粉樟腦
各一錢右為末生指脂調付

當歸飲子

治遍身疥癬腫疥赤芍藥川芎
首烏黃芪生地黃防風荊芥白朮
作鳥貼入薑三片煎服

何首烏散

治遍身疥癬何首烏防風甘草各等分右
溫酒調每取二錢

蕪萸散

治疥癬無問新久亦治癬白蕪萸一兩橫押吳
茶葉各五錢硫黃二錢右為末猪脂或香油
調擦

浮萍散

治諸疥癬及癩瘡浮萍四兩當歸川芎赤芍
藥荊芥蕪麻黃甘草各二錢右剉分作二貼
十箇同煎服出汗

洗藥

治疥癬瘡疥生瘡細辛荊芥白芷川芎黃芩防
風地骨皮甘草各等分右窰末每取二兩水二
大掬煎十餘沸乘溫淋患處名曰八仙散
何首烏陳艾等分濃煎洗治遍身疥癬



瓜藤煎湯浸洗亦佳

單方

研麻油調塗疥癬殺虱立效
雄黃治疥癬殺虱立效
雄黃治疥癬殺虱立效
雄黃治疥癬殺虱立效
雄黃治疥癬殺虱立效
雄黃治疥癬殺虱立效
雄黃治疥癬殺虱立效
雄黃治疥癬殺虱立效

鍼灸

取穴治瘡
取穴治瘡
取穴治瘡
取穴治瘡
取穴治瘡
取穴治瘡
取穴治瘡
取穴治瘡

癩頭瘡

下至膝痒痛流黃水百藥不效
刺血不可
於血不可
於血不可
於血不可
於血不可
於血不可
於血不可

長官寶錄卷之八

四一四



酒歸飲治頭瘡酒當歸白朮各一錢半酒芍藥

神應膏治白頭瘡羊糞塗存性為末

連末散治小兒頭瘡一錢半輕粉少許右為末煎芥

如聖黑膏治小兒白頭瘡豆豉半升草龍膽蕪荑

人面瘡清心悔過內服十六味流氣飲藥久者大苦

左醫者教以歷試諸藥皆無苦至貝母其瘡乃聚

大苦參丸治人面瘡赤芍藥何首烏川芎獨活菴子

陰蝕瘡三曰陰瘡大槩有三等一曰濕陰瘡二曰如精瘡

瘡久必成癩癩者由血毒未盡與之交合痛癢入物



栢蛤散 治下疳濕瘡黃栢以磁鉢刮取末焙粉濕也
津調散 治下疳濕瘡黃栢以磁鉢刮取末焙粉濕也
鳳衣散 治下疳濕瘡黃栢以磁鉢刮取末焙粉濕也

旱螺散 治同上白田螺殼煨入脂磨輕粉各少許
 為末香油調搽門○治如精瘡溪港中陳久

珍珠散 治下疳瘡黃連黃栢乳香沒藥孩兒茶輕粉
 妙散為末香油調搽門○治如精瘡溪港中陳久

磨風膏 治陰蝕瘡蛇床子五錢大風子十四箇杏仁
 各三錢雄黃一箇白礬檀腦各二錢川椒輕粉水銀


一方 治下疳瘡并耳黑錢五錢化開投采二錢半研如
 右為極細末先以意炒煎水洗患處乾擦之亦

又方 治初年少陽道與強當泄不泄強泄腹瀉
 膿腫以荊芥黃栢甘草生蔥地骨皮煎水洗去

又方 治初年少陽道與強當泄不泄強泄腹瀉
 膿腫以荊芥黃栢甘草生蔥地骨皮煎水洗去

又方 治初年少陽道與強當泄不泄強泄腹瀉
 膿腫以荊芥黃栢甘草生蔥地骨皮煎水洗去

又方 治初年少陽道與強當泄不泄強泄腹瀉
 膿腫以荊芥黃栢甘草生蔥地骨皮煎水洗去



不治證

廉瘡

重生於兩脚腫爛臭穢步履艱辛此瘡生於臙骨為
 後多行復毒可全愈體九難視之類須翹足端坐
 勿作痛三陰虛也宜入湯親若患黑點惡
 瘡少食屬肝腎虛宜入湯親若患黑點惡
 或馬齒觀肚○外蜜土膏以內臨瘡先貼龍骨膏
 後貼黃蠟蠟○內外通膏以內臨瘡先貼龍骨膏
 神黃九動觀肚○內外通膏以內臨瘡先貼龍骨膏
 洗法洗馬齒觀肚○內外通膏以內臨瘡先貼龍骨膏
 交綿紙兩重貼瘡上隔日翻貼之藥
 龍骨膏 治外臙瘡久再熬成膏塗之
 馬齒膏 治臙瘡馬齒煎取付一釜入
 蜜土膏 治外臙瘡久再熬成膏塗之
 蠟紙 治內臙瘡神效綿紙疊十二重看瘡大小剪
 四十九粒慢火熬黑去渣入黃蠟一兩攪化入龍骨膏
 即入前紙令油淨透勿令焦黃取時先以藥
 水洗拭用紙齊貼上以巾緊縛周時取下近瘡
 畫則瘡全愈取
 黃蠟膏 治內外臙瘡香油一兩入油巖如梅大熬消
 石脂血竭末各三錢攪勻候冷盛磁器每用捏
 作薄片貼瘡上縮帛縛定三日後翻過貼之門

馬齒膏

治外臙瘡久再熬成膏塗之
 馬齒膏 治臙瘡馬齒煎取付一釜入

蜜土膏


治外臙瘡久再熬成膏塗之
 蜜土膏 治外臙瘡久再熬成膏塗之

蠟紙

治內臙瘡神效綿紙疊十二重看瘡大小剪
 蠟紙 治內臙瘡神效綿紙疊十二重看瘡大小剪

黃蠟膏

治內外臙瘡香油一兩入油巖如梅大熬消
 黃蠟膏 治內外臙瘡香油一兩入油巖如梅大熬消



粉麝散

治外腫瘡臭爛數十年不愈生龜殼一箇醋
一搽塗灸醋盡為度火燬放冷右為末入輕
粉麝香各一錢和勻先
以葱湯洗後塗上

神捷膏

治內外腫瘡久年不愈清油半斤先煎入黃
蠟一兩松脂五錢熬至成珠候冷入乳香沒
藥輕粉血竭孩兒茶枯白礬龍骨各三錢川椒
四錢右為末攪勻收貯先以藥水洗淨用油紙以
鐵刺孔攤藥貼瘡上二日換三次上

翠玉膏

治腫瘡腫青四兩黃蠟銅錢各五錢沒藥三
錢右將香油半斤同黃蠟銅錢各五錢沒藥三
錢下銅錢炒藥末旋旋攪勻成稠將藥傾冷水中
看瘡大小捻作餅子貼之白膠香赤石脂枯白礬各五
錢治內外腫瘡白膠香赤石脂枯白礬各五
錢黃丹乳香沒藥輕粉各二錢右為末乾

單方

治腫瘡黃蠟一兩猪膽一箇輕粉二錢右燻化
和勻攤油紙上貼之。又方白膠香黃拮較

石膏各一兩青黛五錢龍骨一錢右為末香油調
付。又方羯羊屎煉存性五錢石膏二錢半赤
研。冷腫瘡鹿角灰油髮灰乳香為末清油調付
。腫瘡成白久不乾好砂糖屑津調塗付日二
真珠煨二分枯礬炭灰白黏各一分右

為未黃蠟二兩熔化調白黏各一分右
真珠煨二分枯礬炭灰白黏各一分右
真珠煨二分枯礬炭灰白黏各一分右

鐵法

治腫瘡色紫黑先以三稜鐵刺去惡血冷水洗淨
乃貼青藥忌日光火氣陽氣如有黑腫未盡可
再出血以紫黑

熏洗方

治腫瘡臭爛先以海桐皮石榴皮煎湯洗後
骨皮代之。槐枝蔥白煎煎湯
或茶清淋洗把乾後乃貼膏藥

取蟲方

治腫瘡宜取虫生鱸魚數條以清油塗腹下
後取視腹下有小蟲皆虫也末盡再付却用死人
脚脛骨燒交油調付。以腫瘡蠶魚腸以五味



火上去之點

腎臟風瘡

初起兩足時熱脚跟作痛多於內脛或臍上
 生瘡如癰癩大失治則延及股腿遍身者有
 之。以腎氣丸動發為主治。以四生散末每取二錢
 入猪腎內煨熟空心蓋湯燻下。妙。每取二錢
 與腎藏風瘡相類。乃三陰經風熱蘊火血燥所致
 瘡。痒不常膿水淋漓。潮熱盜汗。宜治。瘡。青。坊。見
 浮萍。黃。茶。或。當。歸。木。淋。結。痛。陽。盜。汗。宜。治。瘡。青。坊。見
 大馬齒。青。陰。之。門。下。疔。瘡。亦。與。腎。藏。風。瘡。相。類
 生於脚脛。或打撲。而成。其瘡。口狹。皮內。極。開。皮。薄
 如竹膜。極痒。痛。取。非。菜。地。龍。糞。為。末。入。輕。粉。清
 患。者。須。忌。房。室。取。非。菜。地。龍。糞。為。末。入。輕。粉。清
 油。調。付。或。白。犬。血。塗。之。又。付。檳。榔。散。門。○
 腎藏風。宜服。活。血。驅。風。散。外。用。雞。心。散。○
 大馬齒膏。拓。治。兩。足。血。風。瘡。馬。齒。煎。粉。一。錢。黃。丹。黃
 以桐油或麻油洗。把乾後。乃貼之。門

大馬齒膏

以桐油或麻油洗。把乾後。乃貼之。門

擯榔散

治足上生瘡。潰爛。臭。撮。全。蝎。七。箇。豕。獨。半。四
 箇。火。煎。先。入。豆。肉。十。四。粒。擯。榔。一。箇。香。油。一。兩。半。右
 入。擯。一。兩。候。燉。去。滓。只。取。汁。入。豆。肉。十。四。粒。擯。榔。一。箇。香。油。一。兩。半。右
 連。杏。仁。輕。粉。各。半。錢。右。為。末。入。擯。油。中。調。勻。藥。水
 立。效。○

活血驅風散

治腎藏風瘡。痒。痛。此。由。肝。腎。虛。為。風。濕
 並。艾。仁。搗。紅。攪。厚。米。炒。沖。薑。升。炒。肉。桂。天。麻
 益。細。辛。白。蒺。藜。沙。挑。仁。白。芍。藥。各。六。分。當。歸。川。芎。白
 各。五。分。右。剉。作。一。貼。薑。五。片。棗。二
 夜。同。煎。入。乳。香。末。少。許。薑。心。服。○

雞心散

治腎藏風瘡。痒。痛。此。由。肝。腎。虛。為。風。濕
 錢。八。兩。輕。粉。青。黛。各。半。錢。麝。香。少。許。右。和。勻。磁。器。收
 貯。每。用。少。許。清。油。調。下。兩。掌。掩。外。腎。女。掩。兩。乳。各
 用。至。醒。次。日。又

東醫醫監惟丙補

五十一





單方

肚上生瘡漸大祀換不已痒不可忍石榴根
 皮煮取汁稍冷掃瘡上冷如冰雪即成亦
 初生甚小先痒後痛汁出浸濕爛肌肉延至
 遍身用苦練根燒存性為朱猪脂調付濕則乾

浸淫瘡

流先四股者可治從四股洗之淨口者不可治
 宜小兒浸淫瘡

苦瓠散

苦瓠二兩蛇燒死擊身散炒各五錢
 上塵一合右為末油調攤帛貼之

單方

辛得浸淫瘡不調守水調付乾人胡麻生潤
 付之煎末小蘆調守水調付乾人胡麻生潤

陳瘡

冬月神效成流本浴呼為陳瘡爛具母未乾
 散如神效成流本浴呼為陳瘡爛具母未乾

生附散

治末盡水調付之調
 治末盡水調付之調

白欬散

治末盡水調付之調
 治末盡水調付之調

如神散

治末盡水調付之調
 治末盡水調付之調

臘享膏

治末盡水調付之調
 治末盡水調付之調

湯火瘡

治末盡水調付之調
 治末盡水調付之調

後取兔腦髓

治末盡水調付之調
 治末盡水調付之調

生附散

治末盡水調付之調
 治末盡水調付之調

白欬散

治末盡水調付之調
 治末盡水調付之調

如神散

治末盡水調付之調
 治末盡水調付之調

臘享膏

治末盡水調付之調
 治末盡水調付之調

湯火瘡

治末盡水調付之調
 治末盡水調付之調

後取兔腦髓

治末盡水調付之調
 治末盡水調付之調

生附散

治末盡水調付之調
 治末盡水調付之調

白欬散

治末盡水調付之調
 治末盡水調付之調

如神散

治末盡水調付之調
 治末盡水調付之調

東醫家世准百卷

五十二

酒調付之。○湯火燒
瘡大黃當歸油調付。

赤石脂散

治湯火傷瘡赤石脂寒水石大黃
各等分右為末新水調塗之。

保生救苦散

治湯火熱油所傷爛痛寒水石大黃黃
柏各等分右為末生麻油調塗或乾糝

瘡

黃柏散

治同上雞子殼黃柏朴硝大黃寒水
石各等分右為末新水調塗之。

水霜散

治湯火熱油所傷皮爛肉痛寒水石朴硝青
黛牡蠣煨各五錢輕粉半錢右為末新水或

油調塗

四黃散

治同上大黃黃芩黃連黃柏白芩
各等分右為末新水調塗之。

單方

治湯火瘡黃蜀葵花為末油調付炒或滴水研爛
倒。○生梨切片貼之不爛止痛。○生胡麻爛搗

如泥付之。○生白礬為末香油調塗。○湯火
傷及熱油傷白蜜塗之。○竹中白膜貼之。○日三瘡立
無痕。○豆醬汁。○醋泥。○妙。○

翻花瘡

付之內服十全大補湯或八物湯。○動。○


漸復。○木。○小。○用。○煎。○毒。○將。○脂。○塗。○自。○日。○八。○百。○易。○化。○元。○氣。○
出。○若。○誤。○用。○鐵。○刀。○蝕。○灸。○必。○危。○瘡。○一。○名。○廣。○東。○藥。○子。○專。○
治。○翻。○花。○瘡。○一。○名。○綿。○花。○瘡。○一。○名。○廣。○東。○藥。○子。○專。○
半。○粉。○香。○五。○錢。○輕。○粉。○二。○錢。○半。○朱。○砂。○雄。○黃。○各。○一。○錢。○川。○芩。○天。○
花。○粉。○香。○五。○錢。○輕。○粉。○二。○錢。○半。○朱。○砂。○雄。○黃。○各。○一。○錢。○川。○芩。○天。○
至。○九。○丸。○濕。○

中品錠子

專治翻花瘡及癰瘤白礬三兩八錢半乳
香。○沒。○藥。○各。○五。○錢。○半。○朱。○砂。○三。○錢。○牛。○黃。○七。○分。○半。○

單方

治翻花瘡馬齒莧灰猪脂調付。○



漆瘡

人有惡漆者因見漆中毒生瘡而腫遍身癢痛生蟹取黃塗之罌中石蟹取汁類塗之鞣冷洗茶未油調付柳枝葉煎洗即乾○井中荅搗付之鞣○紫蘇葉搗

爛

川椒子煎湯洗之鞣○愈非葉研付之鞣○紫蘇葉搗

軟癬

內有小疔也世謂之熱癬如酸棗或如豆色赤而

猪頭散

出上其破膜去殼磨令入口粉少許油調塗四唇覆貼癬

三物散

效此方未付之鞣○愈非葉研付之鞣○紫蘇葉搗

大黃膏

屎一枚右為末加輕粉少許清油調付

有名無名諸惡瘡

瘡火斑瘡此皆有洗瘡法殺虫法生肌法諸瘡中風水作

蒲菖瘡

瘡頭如蒲菖色四圍腫起先追

天行斑瘡

人身發天行斑瘡日必死差後瘡癩一歲

月蝕瘡

少許右為末香油調塗

香少許

又黃連拈末付之妙



內疔

疔生於口上唇初發如蓮花根蒂小而下垂乃

以雄黃輕粉粉霜白芷白欒為未付之以提枝作
批支其牙頰間毋使口合一兩時許瘡癰定合口
自便散付之

疔瘡

久生手足間相對如新柴葉痒痛拆裂有孔如蠅
化為末麻油三錢入黃蠟五錢熔

走皮癰瘡

燒存性黃少許煎湯洗之候血盡收用皂莢竹笋皮
黃連各少許煎湯洗之候血盡收用皂莢竹笋皮

蛇纏瘡

葉生艾葉入蜜搗付生藍
皮蔥白煎湯洗後生藍
門○小兒胎癰頭生紅餅瘡先以艾葉白芷大腹

魚目瘡

九○通身生瘡狀如蛇頭取蟪蔡
九○通身生瘡狀如蛇頭取蟪蔡

熱毒瘡

其瘡如失應手神驗
宜用紫草青葵花散

火斑瘡

薄人常近火則多生火斑瘡出汗痛痒黃拍
薄人常近火則多生火斑瘡出汗痛痒黃拍


諸般惡瘡

疎風解毒散合掌散松脂貼散二黃膏貝母膏金
華散燻灰膏青金錠子一掃光生肌散黃蠟膏洗

平血飲

加生薑薄荷生地
黃麥門冬煎服

瘡方後重方單方諸
瘡中風水方單方諸
瘡方後重方單方諸



TIFFEN Color Control Patches

© The Tiffen Company, 2007

涼血飲

治血熱生瘡赤芍藥黃芩川芎前芥生苧麥門冬天花粉甘草各一錢右剉作一貼入燈

心十莖竹葉
十片煎服

連翹飲

治惡瘡遍身痛痒及血風瘡連翹赤芍藥當歸荆芥防風惡實川芎梔子黃芩瞿麥木通

生乾地黃瓜萸根麥門冬甘草各七分
右剉作一貼入燈心一塊水煎服

疎風解毒散

治遍身瘡癩痛生乾細辛蒺藜子炒麻黃檳榔當歸生乾地黃川芎赤芍藥

獨沽白牽牛微炒桑白皮炒蒼朮炒枳殼甘草炙
各七分右剉作一貼入黑豆七十粒紫蘇五葉生

薑五片同煎服

紫草膏

治熱毒瘡紫草茸黃連黃柏獨蘆各五錢赤小豆末萊豆粉各一合右為末猪脂或清油

調日三付

葵花散

治一切熱瘡鬱金黃連黃柏地黃芍藥花各等分右為末冷水調膏貼之神效

合掌散

治遍身生瘡百藥不效檳榔五箇為末硫黃內油調夜臥時塗外腎右為末每二錢安手掌

手但擦手令乾一二日即愈

松脂貼散

治一切惡瘡及無名瘡黃柏黃連松脂翻粉土蜂窠燂甘草各一錢右為末另

取水銀一錢放在掌心以唾藥為泥入磁器中和藥末及清油令如稀餒先以藥水洗瘡拭乾塗之

即愈治疥尤妙

二黃膏

治一切惡瘡清油三兩煎巴豆肉二十粒微末各一錢和勻成膏以藥水洗瘡後擦付二三次神效

貝母膏

治諸惡瘡貝母三錢半夏南星各一錢半雄黃一錢右為末蜜水調付或乾搽

金華散

治一切濕熱惡瘡亦瘰癧小兒黃丹一兩黃柏黃連各五錢輕粉一錢右為末藥水洗後搽



之之
貼貼

爐灰膏

治一切惡瘡除去

青金錠子

治諸惡瘡膿出不快及多年疔瘻瘰癧白丁

掃光

治小兒頭瘡及多風子瘡癩成瘡膿水不止

生肌散

治一切瘡口大效寒水石煨滑石各一兩

黃蠟膏

治諸瘡能生肌香油黃蠟松脂各等分

洗藥方

治諸惡瘡黃柏茵陳芥蔥白藿香煎水

殺蟲方

治惡瘡有虫膽藥粉乳香各一錢硃砂各

生肌方

治惡瘡令生肌宜用生肌散

諸瘡中風水發腫痛

九瘡瘍未合風入為破傷風濕

白挑枝柳枝川椒

入鹽頻洗細

枯白

用消餘之藥直待黑肉去盡方可上生肌散

禁

如開瘡口用生肌散

諸瘡中風水發腫痛

九瘡瘍未合風入為破傷風濕

慎之

因諸瘡入皂角水及惡水熱病人忌急宜

子燒存性研二錢半

砂糖末五錢和勻如瘡

即愈諸魚目並得

得。又方川椒一升和麩作餅



東醫寶鑑雜病篇卷之八

瘡貝母末入雄
黃少許摻之
鞋


單方治惡瘡及諸瘡生胡麻油塗之妙生麻油亦可
 妙犬膽亦可鞋馬齒莧爛搗付上便愈鞋熊膽汁塗之
 朝生暮落花一名鬼蓋即朝菌也生糞穢處如菌
 作末和油塗之甚佳牛糞上黑菌充佳鞋○一切
 惡瘡癩銀十枝端午日水乾作妙鞋○履鼠膏主
 惡瘡塗之妙鞋○經霜芭蕉葉為末香油調付
 ○石女淋取汁溫洗妙鞋○雜黃硫黃治惡瘡為
 第一小便溢出一婦人臍下連二陰患惡瘡熱痒而痛
 大取馬齒莧四兩青黛一兩同研勻付瘡上乾則
 易新者仍服八正散妙鞋二十日全愈鞋○上乾則
 易新者仍服八正散妙鞋二十日全愈鞋○上乾則


友火煨熟開口封合瘡上冷則易出水即差鞋
 ○又方桑柴灰淋汁漬之冷復易鞋○又方慈白
 連鬚煮湯洗之或連莖葉煨研罽付鞋○又方薤
 白搗爛火炙令熱付瘡上以帛裹定冷則易出水
 鞋即差



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

九





東醫寶鑑雜病篇卷之九

御醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君臣許俊奉 教撰

諸傷

金刃傷

金瘡腸斷者視病淺深各有生死腸一頭見者

半死不可連也若腹痛短氣不得飲食者大腸一

日即推納之但出稍飲者作大麥粥取其汁洗腸以

須忍之常乃可進飯可與肥脂之物以止其渴又

動多飲粥則血溢酸熱酒又忌嗔怒及大言笑

飲冷水血見寒則疑入心即死不可

不治證

難過。左脇下傷透內者。腸傷斷一半可



者。血出盡者。老人左股壓碎者。傷破陰子。用藥。內陰股兩乳出髓而不能語戴眼直視喉中沸。皆死陰股兩乳出髓而不能語戴眼直視喉中沸。

皆死陰股兩乳出髓而不能語戴眼直視喉中沸。皆死陰股兩乳出髓而不能語戴眼直視喉中沸。

皆死陰股兩乳出髓而不能語戴眼直視喉中沸。皆死陰股兩乳出髓而不能語戴眼直視喉中沸。

皆死陰股兩乳出髓而不能語戴眼直視喉中沸。皆死陰股兩乳出髓而不能語戴眼直視喉中沸。

皆死陰股兩乳出髓而不能語戴眼直視喉中沸。皆死陰股兩乳出髓而不能語戴眼直視喉中沸。

皆死陰股兩乳出髓而不能語戴眼直視喉中沸。皆死陰股兩乳出髓而不能語戴眼直視喉中沸。

皆死陰股兩乳出髓而不能語戴眼直視喉中沸。皆死陰股兩乳出髓而不能語戴眼直視喉中沸。

皆死陰股兩乳出髓而不能語戴眼直視喉中沸。皆死陰股兩乳出髓而不能語戴眼直視喉中沸。

皆死陰股兩乳出髓而不能語戴眼直視喉中沸。皆死陰股兩乳出髓而不能語戴眼直視喉中沸。

皆死陰股兩乳出髓而不能語戴眼直視喉中沸。皆死陰股兩乳出髓而不能語戴眼直視喉中沸。

皆死陰股兩乳出髓而不能語戴眼直視喉中沸。皆死陰股兩乳出髓而不能語戴眼直視喉中沸。

皆死陰股兩乳出髓而不能語戴眼直視喉中沸。皆死陰股兩乳出髓而不能語戴眼直視喉中沸。

皆死陰股兩乳出髓而不能語戴眼直視喉中沸。皆死陰股兩乳出髓而不能語戴眼直視喉中沸。

皆死陰股兩乳出髓而不能語戴眼直視喉中沸。皆死陰股兩乳出髓而不能語戴眼直視喉中沸。

皆死陰股兩乳出髓而不能語戴眼直視喉中沸。皆死陰股兩乳出髓而不能語戴眼直視喉中沸。

皆死陰股兩乳出髓而不能語戴眼直視喉中沸。皆死陰股兩乳出髓而不能語戴眼直視喉中沸。

皆死陰股兩乳出髓而不能語戴眼直視喉中沸。皆死陰股兩乳出髓而不能語戴眼直視喉中沸。

金瘡脉

腸肚傷

法

可治

湯藥

金瘡脉。金瘡出血。血脈太多。其脉虛細者。生數實者。死。

腸肚傷。法。可治。腸。出在外。若腸全斷。難醫。不。斷者。

法。可治。腸。出在外。若腸全斷。難醫。不。斷者。

湯藥。如活。血散。佛手。散。破。肚。皮。膜。與。膜。

湯藥。如活。血散。佛手。散。破。肚。皮。膜。與。膜。

湯藥。如活。血散。佛手。散。破。肚。皮。膜。與。膜。

湯藥。如活。血散。佛手。散。破。肚。皮。膜。與。膜。

湯藥。如活。血散。佛手。散。破。肚。皮。膜。與。膜。

湯藥。如活。血散。佛手。散。破。肚。皮。膜。與。膜。

湯藥。如活。血散。佛手。散。破。肚。皮。膜。與。膜。

湯藥。如活。血散。佛手。散。破。肚。皮。膜。與。膜。

湯藥。如活。血散。佛手。散。破。肚。皮。膜。與。膜。

湯藥。如活。血散。佛手。散。破。肚。皮。膜。與。膜。

湯藥。如活。血散。佛手。散。破。肚。皮。膜。與。膜。

湯藥。如活。血散。佛手。散。破。肚。皮。膜。與。膜。

金瘡先宜調血

止血生肌

合瘡藥

血竭未付

荷葉效貼

下子蛋燒

勢火燬為

合用而愈

用。手。去。膏。不。妨。此。是。開。肉。放。心。去。之。然。後。推。腸。

血。竭。未。付。白。膠。香。老。松。皮。白。芷。血。竭。為。未。付。之。單。

荷。葉。效。貼。一。日。一。次。以。藥。水。湯。洗。爛。為。未。收。之。單。

下。子。蛋。燒。灰。一。日。一。次。以。藥。水。湯。洗。爛。為。未。收。之。單。

勢。火。燬。為。未。酒。調。服。昔。有。一。人。自。割。其。勢。瘡。久。不。割。

合。用。而。愈。門。不。

箭。鏃。及。金。刃。中。骨。脉。不。出。一。白。欵。半。夏。等。分。為。末。每。取。

水。塗。其。上。又。雙。蝮。取。汁。頻。塗。又。鼠。脂。塗。之。又。好。牙。和。



石着其上
自出腫

救急方

其入于牛腹重痛悶欲死取牛一隻剖腹納未醋傷調飲出血而愈或戰陣死所傷血脈滿體氣貫胃膈悶絕者亦甦門。傷重暈絕不省人熱尿多灌即甦

活血散

續斷赤芍藥鹿茸黃芩細辛乾薑附子炮各酒調服日三立驗門

花藥石散

或至死者急於傷處搽藥其血化為黃水并服藥便活更不疼痛如藏府有瘀血內損煩悶發死服此藥則化為黃水或土出或下泄出花藥石四兩碎黃一兩為末入瓦罐內鹽泥固濟晒乾安四方磚上以炭火從巳午時煨至經宿候冷取出研細每取一大匙童尿入酒煎熱調服門

奪命散

治金刃所傷及從高墮落木石壓損瘀血瘀錢大黃黑牽牛頭末各二兩右為末每取二錢煎酒調下過數時無效再服一服以下惡血為度熱

雞鳴散

治金刃傷打撲傷血瘀凝積煩悶欲絕天黃酒蒸五錢當歸尾三錢桃仁二七粒研右到

道滯散


治傷損內有瘀血大便不通壅滯欲死大黃下瘀血即愈治折傷亦妙日

破血消痛湯

治傷損墮落惡血流於脇下痛楚不能當歸指各二錢蘇木一錢半羌活防風桂皮各一錢歸身少許右除水一錢半羌活防風桂皮各一

復元活血湯

治同上大黃二錢半當歸一錢七分柴胡一錢半穿山甲炒研瓜蒌根甘草各調服空心兩貼立愈



一錢桃仁十箇為泥紅花五分

金傷散

石到作一切金瘡重午日早朝使四人各出四方

同搗極爛擊大桑木三兩珠作孔納藥實等以桑

單方四種

新汲水

人飲金瘡及損傷腸出以新汲

石灰

瘰癧金瘡甚良人為金刃所傷以石灰末罌之

葛根

瘰癧取汁服之

桑白皮

瘰癧取汁服之

螻蛄

瘰癧取汁服之

蠅

瘰癧取汁服之

象牙

瘰癧取汁服之

蝙蝠

瘰癧取汁服之

葱

瘰癧取汁服之



辨

小麥

主腸出不入小麥五升水九升煮取四升去滓

令衆人見辨

石榴花

治金瘡血流不止石榴花和

壁錢

主金瘡血不止取

鼠腦

治箭鏃及鐵刃在咽喉胃膈諸隱處

紫檀香

治金瘡血不止血止痛至妙

血竭

療金瘡止血止痛生肌最妙

琥珀

生肌止血生肌最妙

蛇含草

主金瘡搗付之佳云

青蒿

生拔付金瘡止血最妙

熟艾

或煎湯或熏烟亦好

小蘗

按葉封之

藍葉汁

藍汁飲之

車胎

鐵入肉不出取車胎紙上

擲撲墮

初覺氣絕急擊開口以熱小便灌之利去瘀

血

辛墮顛壓倒打心頭溫者皆可救將本

人

如角末吹入鼻內如活却以薑汁香油打勻灌

之

脚人若取藥不及急扶開口以熱小便灌之

筋

骨皮肉皆出血不止或或墮危險地或撲身體損傷



血黃連降大白未和中以童便煎服妙傷在上宜
 飲非汁。九類打壓傷或徒高墮落皆驚動四
 肢童便服之立效大小內享怕惡心先用通二便藥
 心之患矣。解。九傷損專主血論於腹而作脹痛
 經所傷惡血必歸於肝。承氣湯。散。調。命。散。助
 實者下之宜通導散。桃。見。當。氣。湯。散。調。命。散。助
 上虛者復元。活。血。湯。功。見。當。氣。湯。散。調。命。散。助
 出。血。已。多。元。活。血。湯。功。見。當。氣。湯。散。調。命。散。助
 調。血。已。多。元。活。血。湯。功。見。當。氣。湯。散。調。命。散。助
 香。散。雙。烏。散。專。痛。元。諸。傷。疾。痛。宜。用。蘇。木。煎。湯
 合。香。元。治。打。撲。墮。落。跌。驚。骨。節。氣。錯。亂。昏。迷。不。省
 急。取。三。五。九。溫。酒。童。便。調。灌。即。愈。角。縛。不。使。傷。風
 上。有。傷。或。打。破。或。金。刃。傷。用。藥。糊。角。縛。不。使。傷。風
 仁。冬。一。貼。水。煎。空。心。眼。通。一。名。大。成。湯。右
通導散 治傷損極重大小便不通心腹脹悶宜用此
 藥。之。

當歸鬚散

治打撲損傷。氣。凝。血。結。曾。腹。脇。痛。當。歸
 錢。紅。花。一。錢。半。赤。芍。藥。烏。藥。香。附。子。蘇。木。各。一
 尾。一。錢。半。赤。芍。藥。烏。藥。香。附。子。蘇。木。各。一

蚌霜散

治傷損。大。吐。血。蚌。粉。百。草。霜。各。等
 分。右。為。末。每。一。錢。溫。酒。童。便。各。半。調

乳香定痛散


治諸傷損。乳。香。沒。藥。甘。草。各。等。分。右。為。末。每。一。錢
 勻。服。之。每。一。錢。溫。酒。童。便。各。半。調

乳香散

治打撲傷。乳。香。沒。藥。甘。草。各。等。分。右。為。末。每。一。錢
 下。溫。酒。調

雙烏散

治諸傷。百。損。久。後。時。常。疼。者。及。新。被。傷。作
 蘇。木。大。黃。生。乾。地。黃。紅。麴。炒。各。五。錢。麝。香。少。許。右
 為。末。入。瓦。瓶。以。酒。煮。成。冷。服。如。覺。麻。痺。無。害。但。草
 烏。生。用。恐。太。狂
 所以。果。炮。門



尋痛元

治諸傷止痛清心行氣活血如神章烏生用

少許右為末酒糊九如指頭大朱砂

陣王丹

治諸折傷止血去火毒搗篩為末敷傷處妙

門

補損當歸散

治墮撲折傷疼痛斗號服此藥不復大

散當歸甘草各七錢半附子炮澤蘭各二

打撲傷消腫滅瘀

汗外用杏仁搗爛入白麩少許新酒水調付瘡上

腫即消○治傷損腫痛瘀血凝注紫黑或傷眼

將軍青黧○散被毀癰痕亦治跌撲麻油清酒各

止腫消無痕有被傷者仇家陰令術士以此治之

脈候及不洽證

夜消盡無痕一

單方

治命處一觀其脈虛促危矣

當虛細若得急疾大數者死○打撲傷損去血過多脈

骨者可治內損藏府裏膜及破陰子耳後者並下

蒲黃

治撲損瘀血在內煩悶蒲

白楊樹皮

取樹皮酒漬服之不可忍

生龜

肉生研厚塗傷處立效

蟾蜍

取汁和酒服又研付傷處



鼠屎 治落傷筋骨痛不可忍取屎燒為末猪脂調急裹之不過半日愈

荷葉 治打撲落傷惡血攻心悶亂乾葉燒為末童便調服

胡桃 壓撲傷損胡桃肉搗爛和酒服便差

麻根 搗取汁飲或煮服之非時則取乾麻煮汁飲

稻稈灰 治墮落撲損痛楚稻稈燒灰和酒

芥子 研微搗爛貼患處即效

葱白 治打撲傷損痛不可忍取葱白入糖火煨乘熱

人尿 主撲損傷瘀血攻心暈絕熱尿頓服一二升即愈

烏雞 被壓窄墮舟車轆馬蹄牛觸胃腹破陷四股

烏鴉羽 治墮落損傷瘀血眼心面青氣短取右

犬膽 治撲損刀箭傷內有瘀血取膽熱酒調服

水蛭 主墮撲落傷折傷內有瘀血水蛭炒焦為末

骨折筋斷傷 九脚手各有三處出白手掌根出白其骨交

酒糟 打撲墮落損傷瘀血腫痛和醋淬蒸溫熨之妙

效亦有奇 犬屎燒存性為末熱酒調下二三錢

亦 效亦有奇 犬屎燒存性為末熱酒調下二三錢

骨折筋斷傷 九脚手各有三處出白手掌根出白其骨交

互相鑽或出白則是挫出鑽骨之外須是搗骨於



入外方入窠臼只用手拽斷難入窠十有八九成
 痼疾也。歸元先用麻藥與服使不知痛然後定一
 法整頓。歸元不用文須存屈直處。時拽屈伸直不
 手法。歸元不用文須存屈直處。時拽屈伸直不
 邊一。邊不用文須存屈直處。時拽屈伸直不
 則愈。後用不用文須存屈直處。時拽屈伸直不
 與服。或用不用文須存屈直處。時拽屈伸直不
 肉。或有不用文須存屈直處。時拽屈伸直不
 一日。一。不用文須存屈直處。時拽屈伸直不
 上。化。不用文須存屈直處。時拽屈伸直不
 骨。丹。不用文須存屈直處。時拽屈伸直不
 骨。散。不用文須存屈直處。時拽屈伸直不
 草。烏。不用文須存屈直處。時拽屈伸直不
 歸。川。不用文須存屈直處。時拽屈伸直不
 二。錢。不用文須存屈直處。時拽屈伸直不
 白。藥。不用文須存屈直處。時拽屈伸直不
 後。或。不用文須存屈直處。時拽屈伸直不
 用。交。不用文須存屈直處。時拽屈伸直不
 麻。後。不用文須存屈直處。時拽屈伸直不

夾骨法
 小蝦蟆四五箇皮硝三分生薑一兩酒糟一
 搥腫者加紅內消腫。同搥敷折傷之處。


活血散
 治折傷菜豆粉炒紫色新汲水調成膏厚付
 折傷處以桑皮夾定其效如神一方熟酒醋

接骨丹
 當歸七錢半川芎錢半芍藥骨碎補各五錢川烏
 煨四錢古錢文香木香六兩香油七次乳香二

錢半末和油成膏攤油紙貼患處如骨碎筋斷用此復
 初細如

二生膏
 治折傷手足生地黃一斤生薑四兩右搗爛

骨痛不可忍神效。黃搗爛攤油紙上以糝木香末一層又攤地黃貼



患處明日痛即止
搗取汁好酒和服日二三
次最妙又搗爛蒸熱封

傷處二月筋骨連
續蓋地黃屬骨連

糯米膏
治撲傷筋斷骨折
糯米一升皂角切碎半升
銅錢百箇同炒至焦黑去
錢右為末酒調膏

貼患處
神效

麥斗散
治跌傷骨節生贅一箇
在上燻巴豆一箇去
殼醋淬七次用些少右為
細末溫清酒調服一盞
如重車行十里之久其骨
接之有聲初跌之時須
整理如舊以綿衣蓋覆方
服

沒藥降聖丹
治打撲閃筋斷骨折痛不
可忍生乾
藥各一錢右為末薑汁與
蜜等分和白勻每一兩作
一錢同煎去蘇木調藥空
心熱服

接骨散
治骨折乳香沒藥各二錢
半自然銅煨碎另
研五錢滑石一兩龍骨乾
炒燥為末臨睡服
時少許右為末好醋調
下煮乾炒骨已接去龍骨
赤石脂而服極效
乾為末黃蠟五錢熔化乃
入麝和勻作丸彈子大
散空一丸酒煎以東南柳
枝攪

自然銅散
治打撲筋骨折傷乳香沒
藥蘇木降真香
半各五錢地龍油炒骨生
浸煨右為末每五錢
吹各五錢龍油炒骨生浸
煨右為末每五錢
好酒調下自頂心尋病處
則風有聲

接骨紫金丹
治跌打骨折瘀血攻心發
熱昏暈生聲
碎補大黃生薑打骨折瘀
血攻心發熱昏暈生聲
錢右為末每取八錢熱酒
調服其骨自接

蔓荊散
治打落筋骨折傷瘀血結
痛煩荊葉煎
蔓荊子白芷細辛防風川
芎桂皮丁香皮羌

蔓荊散
治打落筋骨折傷瘀血結
痛煩荊葉煎
蔓荊子白芷細辛防風川
芎桂皮丁香皮羌



活各一兩右為倉末每兩八益一匙連鬚葱
白五莖漿水五升煎七沸淋洗痛處冷則易明

單方九種

赤銅屑

治打撲墮落骨折傷取赤銅火煨醋碎七次
或九次細研溫酒調一字或半錢服直入骨

自然銅

療傷損骨折火煨醋碎七次研細水飛同當
症亡後十餘年改裝視腫骨折處有銅束之韌

合歡皮

主骨折專能接骨取皮炒黑色四兩芥子
炒一兩右末酒調二錢服以洋罌傷處

生地黄

爛搗蒸熱裹傷處日再易韌
主屬骨若傷損骨碎生地黄

續斷

治撲損瘀血能續筋骨
煮汁內服外搗也療被斫筋斷取根搗汁瀝

旋菴根

即旋花根也療被斫筋斷取根搗汁瀝
瘡中以滓封瘡上日二三易筋便續韌

白蠟

屬金粟收斂堅緩之氣外抃之要藥生肌止血
定痛接骨續筋補虛與合歡皮同用極神效

蟹脚

中髓及腦并肢中黃並能續斷折筋骨取碎之
微熬納瘡中即連筋骨折傷生持妙惡良韌

蟾蜍

和酒服又搗付傷處韌
治因挫跌撲傷骨極重人中

人中白

白煨為末溫酒調五分服
治因挫跌撲傷骨極重人中

牡鼠

療折傷筋骨生搏付傷處
三日一易新能續筋骨韌

生栗

主筋骨折碎血瘀腫痛細嚼生栗塗付
之栗揆充好三箇共一窠居末酒韌

烏雄

主痿折骨傷骨痛取血和酒服仍破腹罌傷
處妙韌。又取骨末一兩自煨銅末四錢和

療傷斷耳鼻舌方

治擦落耳鼻用油錢灰末乘急以所
落耳鼻蘸灰錢定以軟帛縛定有



杖傷

人為鞭所交下鼻一僧用此綴之神效。鬚所斷。自行
 處其血即止。仍用蒲黃杏仁鵬砂少許為末。蜜調
 翁化而愈。嗣。接指方蘇木為末。敷斷指。未接定
 所。用蠶包縛完。因數日如故。未。一。人。落。馬。波
 往。諸。藥。不。效。子。教。人。漫。漫。托。上。多。取。壁
 錢。敷。貼。傷。處。日。漸。施。安。其。藥。如。故。豈
 心。甚。妙。實。用。童。便。好。酒。各。一。鍾。合。兩。溫。服。免。血。攻
 上。加。柴。胡。羌。活。煎。服。仍。用。葱。白。搗。爛。炒。熱。搭。杖。處
 冷。則。易。止。痛。散。煎。服。仍。用。葱。白。搗。爛。炒。熱。搭。杖。處
 鋪。撲。者。亦。宜。熨。其。甚。者。內。服。乳。香。散。貼。之。散。為。見
 腫。先。刺。熱。酒。盡。量。而。飲。外。貼。黃。蠟。膏。調。敷。有。血。瘀
 熱。以。五。散。或。大。黃。黃。拓。為。先。須。服。雞。鳴。散。只。是。血
 貼。野。苧。根。嫩。者。洗。淨。同。鹽。搗。付。神。妙。汁。調。付。之
 仙。花。科。連。根。葉。搗。爛。貼。患。處。乾。則。易。一。夜。血。散。即

愈。鬚。乳。香。散。化。瘀。散。補。氣。生。血。湯。烏。龍。解毒。散。痔
 宜。服。乳。香。散。化。瘀。散。補。氣。生。血。湯。烏。龍。解毒。散。痔
 大。藥。通。滯。血。皆。以。酒。化。服。蓋。血。滯。則。氣。壅。散。着
 肌。肉。須。腫。痛。者。以。經。絡。傷。氣。血。不。行。故。如。是。狀。者
 九。杖。瘡。認。乾。黑。疔。毒。氣。攻。心。恍惚。煩。悶。嘔。吐。者。死

五黃散

治杖瘡止痛黃丹黃連黃芩黃柏大黃乳香
 各等分右為末新水調成膏以排絹攤貼傷

乳香散

治杖瘡腫痛自然銅火煨醋淬七次當歸各
 五錢茴香四錢乳香煨藥各三錢右末瘡三

化瘀散

治杖打重血上攻心煩悶蘇木當歸尾各三
 錢大黃紅花各二錢右為末每三錢溫酒童



補氣生血湯

治狀瘡潰爛久不愈人參白朮白茯苓
地黃甘草各一錢右剉作

烏龍解毒散

治入受試責後疥甲爛肉疼難忍不
木耳四兩入砂鍋內炒焦存性為末右每服五錢
熱酒一椀調服後少時流血水即以藥水洗淨

肉裹透如鐵刺痒甚不時流膿水即藥香少許以銀
貼膏藥如去疔甲取雞子清入藥香少許以銀
爛取去一日一換貼膏藥化盡死肉數日如故矣
糊打成一水用替去輕藥化盡死肉數日如故矣

打著不痛方

未打之前先取白蠟一兩細切入碗內
滾酒泡服則雖打着不痛名寄拔散

單方九種

蘿蔔根

治扶瘡皮不破而內損者
蘿蔔根搗爛蒸傷處良補

馬糞

治瘡入風疼痛馬或驢糞
替換熱發日五十遍極效

沒藥

治打傷瘡生鼠一枝和腸付瘡上妙藥
煎令焦黑取之雞羽蘸付瘡上妙藥

鼠

治打傷瘡生鼠一枝和腸付瘡上妙藥

飴糖

和酒服能下惡血或

人咬傷

煎甲燒灰油調付脚

諸獸傷

虎傷

被虎咬先飲清油一椀又白礬為末納傷處
取青布緊捲燒一頭納竹筒中向瘡口令烟熏

之佳


虎犬咬人并搗取汁飲之又生薑汁飲之又洗
鞣虎狼傷人生雞肉食之又生薑汁飲之又洗

瘡又

婦人月經赤衣燒為灰和

瘡服

乾薑末納瘡妙藥



熊傷

熊傷人燒青布取烟熏瘡口令毒出。熊傷人搗薑根為末調。熊傷人搗薑根為末調。熊傷人搗薑根為末調。

馬

馬咬傷。馬咬傷。馬咬傷。馬咬傷。馬咬傷。馬咬傷。馬咬傷。馬咬傷。馬咬傷。馬咬傷。

牛

牛傷。牛傷。牛傷。牛傷。牛傷。牛傷。牛傷。牛傷。牛傷。牛傷。牛傷。牛傷。牛傷。牛傷。牛傷。牛傷。

犬傷

犬傷。犬傷。犬傷。犬傷。犬傷。犬傷。犬傷。犬傷。犬傷。犬傷。犬傷。犬傷。犬傷。犬傷。犬傷。犬傷。

犬咬毒防再發

犬咬毒防再發。犬咬毒防再發。犬咬毒防再發。犬咬毒防再發。犬咬毒防再發。犬咬毒防再發。犬咬毒防再發。犬咬毒防再發。犬咬毒防再發。犬咬毒防再發。



結尿如狗形乃不發極驗者小便益元散酌水
無狗形妙於三○狂犬咬先口醫漿水洗淨用
調服最妙於三○狂犬咬先口醫漿水洗淨用
真散取腦乾貼之更不再發神效○又或經
復發無藥可療雄黃明者五錢麝香五分右為
酒調二錢服後必使得睡切勿驚動任其自醒
須到效驗

狂犬傷出毒法

宜用扶危散○防風五錢大黃黑丑
頭末各三錢斑蝥一錢麝香三分雄
黃二錢半右為末每二錢滾水調服惡物從小便
而出○狂犬傷並刺糞封之出大毛神效○
又生麻油研豆豉為膏九如彈子大常帶帶拭所
交處却搽開看豉丸內若有狗毛茸茸然此毒氣
已出盡可勿三毛

扶危散

治風狗咬十日十箇百日百箇去翅足糯米同

狂犬毒心

調服石一兩維黃一錢麝香一字右為末溫酒
調服不飲酒者未飲下毒從大小便出即愈
狂犬咬人久不羞口吐白沫者為犬毒入心
天靈蓋燒灰為末心煩亂已作
犬聲天靈蓋燒灰為末心煩亂已作
犬咬人久不羞口吐白沫者為犬毒入心
犬咬人久不羞口吐白沫者為犬毒入心

禁忌法

房事常食杏仁忌飲酒
犬咬傷人忌飲酒
犬咬傷人忌飲酒

單方

白礬


犬咬白礬末納
犬咬白礬末納

葛根

犬咬葛根搗取汁服
犬咬葛根搗取汁服

杏仁

殺狗毒作粥常食之
殺狗毒作粥常食之



野菊 調主風狗咬研細酒服盡醉止效

革麻子 去殼研為膏付之

蟾蜍 勿令狂咬人當先刺去惡血仍灸瘡中

鍼灸法 狂犬咬者無出於灸乃止常食韭蔬上灸之一日三壯灸至一百二十日乃止

獾犬傷毒不出發寒熱速以艾灸外丘穴二發

獾犬傷毒不出發寒熱速以艾灸外丘穴二發

貓傷 人為貓所傷取薄荷葉細嚼付之

鼠咬傷 調取貓毛燒灰入麝香少許津唾

諸蟲傷

蛇咬傷 中蛇咬毒昏困五靈脂五錢雄黃二錢半為末酒調二錢灌之

五靈脂 雄黃 貝母 白芷 等分 為末 酒調 二錢 灌之

細末 貼瘡口 立效 如雄黃 若取汁 痛即消 膿則速

子候乾 為未貼 瘡口 立效 如雄黃 若取汁 痛即消 膿則速

被蛇傷 白芷 雄黃 貝母 白芷 等分 為末 酒調 二錢 灌之

分葉 未付 傷處 乾 雄黃 若取汁 痛即消 膿則速

白芷 雄黃 貝母 白芷 等分 為末 酒調 二錢 灌之

益各 末 雄黃 貝母 白芷 等分 為末 酒調 二錢 灌之

調酒 自傷 處 雄黃 貝母 白芷 等分 為末 酒調 二錢 灌之

又白 蔡甘 草 等分 為末 酒調 二錢 灌之

牙疔 毒 取獨 頭 蒜 或 小 蒜 或 苦 苣 或 水 蘆 或 豆 葉 或 荏 葉 皆 搗 飲 汁 以 淬 付 傷 處 乾 或 水 蘆 或 豆 葉 或 荏 葉 皆 搗 飲 汁 以 淬 付 傷 處 乾





搗研生酒調吃一醉立已。或雙搗付之。幹○

交飲。眼中。猪耳。酸。猪。子。犯。之。羊。角。燒。灰。付。之。幹○

牛耳。中人。忌食。乾。帶。之。蛇。速。避。又。養。鶴。辟。蛇。即。遠○

被。蛇。毒。為。雄。黃。帶。之。蛇。速。避。又。養。鶴。辟。蛇。即。遠○

制。此。毒。為。雄。黃。帶。之。蛇。速。避。又。養。鶴。辟。蛇。即。遠○

去。制。此。毒。為。雄。黃。帶。之。蛇。速。避。又。養。鶴。辟。蛇。即。遠○

屋。上。痛。下。微。泥。用。鞋。即。錫。新。水。不。可。忍。時。新。水。從○

白。禁。半。夏。為。醋。貼。之。痛。止。毒。出。研。付。之。幹○

生。一。字。雄。黃。一。字。巴。豆。一。箇。右。同。研。付。之。幹○

中。指。或。薄。尿。塗。之。痛。止。毒。出。研。付。之。幹○

塗。之。或。薄。尿。塗。之。痛。止。毒。出。研。付。之。幹○

水。中。救。如。蜈。蚣。而。痛。未。止。更。易。生。者。如。蜈。蚣。當。自。吸。毒○

取。研。煙。薰。之。又。人。頭。塗。之。又。不。痛。不。火。上。熔。又。清。油。滴。患。處○

靴

蜘蛛咬傷

酒。飲。未。幾。日。而。平。大。如。孕。一。身。生。絲。羊。乳。取。好○

香。飲。羊。乳。可。制。其。毒。幹。咬。入。雄。黃。死。者○

調。此。毒。為。雄。黃。帶。之。蛇。速。避。又。養。鶴。辟。蛇。即。遠○

尿。灌。之。穴。王。居。赤。黑。油。和。付。之。幹○

浸。酒。服。未。付。之。血。塗。之。幹○

蜻。子。研。油。調。付。之。小。薔。皮。汁。塗。之。幹○

蚯。傷。先。飲。用。鹽。水。浸。之。而。愈。有。如。蜈。蚣。濕。地。中。其。毒○

蜈蚣傷

又老茶葉細末油調付之。此虫又名八角虫。隱於壁間。雜子清調塗之。小蜈蚣色青黑長足。取扁豆葉按付即差。雞屎塗之。又胡燕窠中土。猪胎苦酒和塗之。又雞腸草

蜂叮傷

磨雄黃塗之。又清油擦之。又薄荷按貼之。醋塗之。又醬塗之。又冬瓜葉按付之。麝香調塗之。又醬塗之。又冬瓜葉按付之。麝香調塗之。

蝨咬傷

芋汁飲之。又塗之。芋近香。不塗之。又塗之。芋近香。不塗之。

蝮牛傷

者蓼子汁浸之。即差。身塗之。樹葉

蜈蚣傷

燒灰以泔水和浸洗。以滓付之。樹葉

壁鏡傷

壁鏡交毒人必死。桑灰淋濃汁調白。未塗之。又醋磨雄黃塗之。

夏月諸瘡

辟蠅蛆法。夏月諸般瘡。損爛蛆虫。極

黃酒調

下日二名曰蟬花散。又寒水石治夏月諸

瘡臭爛

一人夏月收來。被曬。倒不能救。一

人見之

傳以此方。修合服之。極

雜色蟲傷

肉皆爛。該一搽。清油半盞。入生瘡。疥癩。骨

無一宿

取骨未付之。即愈。腫上。又依龍肝醋和作

圍於傷


公葵根。轉其毛。皆出。在上。痛立止。神效。研


人以刺割

便腫痛。肉爛。若着。手足。痛節。墮落。研

水調下

二錢。又外塗之。毒傷。青黛。雄黃。等分。為末。新





非癩天蛇即草間黃花紅蛛也入被其螫因為露
 木所濡乃成此疾遂煮秦皮汁一斗飲之差幹○
 諸毒五傷大紙搵燕香油燒火吹滅以烟熏之即
 愈○蛇蝎蜘蛛交齋香塗之及小箭或藍葉搗汁飲又
 幹付之

簽刺傷

竹木刺入肉不出瞿麥濃煎取汁飲日三幹○
 鹿角燒為末水和塗立出幹○又人頭垢塗之即
 死○又烏雄雞生搗搗之亦出幹○又白梅肉搗封
 之刺即出又栗殼生膏曬之亦出又鹽醋碎付膏上四邊
 妙又牛膝根搗爛塗之亦出又魚鱗取付膏上四邊
 肉爛刺即出幹○魚骨在肉中不出雷吳茶葉封
 之骨當爛出又取海獺皮者汁服之幹○狗鳥燒為
 末和飲頓服又象牙末厚塗自軟出幹○鐵棘竹
 木刺入肉不出鼠
 腦厚塗之即出幹

灸法

九蛇蝎蜈蚣毒虫咬
 傷於傷處灸五壯或七壯即
 愈○被惡蛇螫即貼蛇皮於螫處灸火灸其上
 即止痛

解毒

蠱毒富養家

凡有蠱之鄉見人家門限屋梁無火蠱絮
 人取三五等者其家必畜蠱當用血盛之蠱待飛使
 其自相咬食餘一存者名為蠱而能變化入有造
 作敬事以酒肉祭之取出殺毒於飲食中其
 毒心悶腹痛面色青黃或吐唾腥血盡則死急病者
 十數日便死物皆化為虫引歲月後病氣漸注染着
 人故謂之蠱症針○中蠱者面色青黃吐虫成
 面色赤黃是蠱蠱面青色白者內脹滿吐虫成
 吐虫如鏡銀者是蠱蠱面色青白者內脹滿吐虫成

辟蠱毒法

如入蠱鄉飲食即潛於初下箭時收一
 塊在手儘喫不妨少頭却將所藏一塊潛

埋於人行十字路下即盡於其家作開蟲主必反
求末救或食時讓主家先動筋或明問主家云莫
有蟲麼以筋等卓而後食

驗毒法 直下病人朝起取井華水唾水中垂如柱脚
黑豆不腥白紫味甘皆中蟲無疑非也
遇飲食以犀角攪之白沫味起者是蟲也否則非
也出看霜露中朝卯去皮日夕含口中破夜
薄或微赤者是蟲也

蟲毒中毒 藥丸中蟲傷脈類如銀咬之
死微細而數者死而遲者
生微細而數者死而遲者

送毒法 人中蟲毒當服藥如知蟲主姓名呼取以
即愈 斂調服一錢病人須史呼蟲主姓名取皮燒為末
斂調服一錢病人須史呼蟲主姓名取皮燒為末

養荷葉密安病人卧席下勿令起病者自呼盡主
姓名令取去即愈 斂調服一錢病人須史呼蟲主姓名取皮燒為末

日盡我者張小也乃收心小走驚
家人密以藥荷置同席下忽大笑
姓人密以藥荷置同席下忽大笑

蟲毒治法 黃或吐血或心腹切痛治有五藏盡則死
宜服太乙紫金丹玉樞丹萬病解毒元雄藥丸雄
麝散辰砂丸保靈丹獨勝散國老飲或吐或下之
而愈

太乙紫金丹 一名紫金錠 一名萬病解毒丹 治蟲毒
毒山嵐瘴氣諸藥石蒜木烏蛇百五一切諸
毒鼓哈去虫土二兩山石蒜木烏蛇百五一切諸
戰洗糖一兩半續隨子去皮油一兩香三錢右
為末糯米粥和勻搗千餘杵每一料分作四十錢

宜服太乙紫金丹玉樞丹萬病解毒元雄藥丸雄
麝散辰砂丸保靈丹獨勝散國老飲或吐或下之
而愈

宜服太乙紫金丹玉樞丹萬病解毒元雄藥丸雄
麝散辰砂丸保靈丹獨勝散國老飲或吐或下之
而愈

宜服太乙紫金丹玉樞丹萬病解毒元雄藥丸雄
麝散辰砂丸保靈丹獨勝散國老飲或吐或下之
而愈

宜服太乙紫金丹玉樞丹萬病解毒元雄藥丸雄
麝散辰砂丸保靈丹獨勝散國老飲或吐或下之
而愈



宜傷以酒化服

玉樞丹

一名追毒丹治病服法同上○即上太乙紫
水牽塗傷處

萬病解毒元

治毒世不疾即服也錢或
一兩半山茨菰一兩大戟七錢半山豆
根錢全蠅五枝右為末糯米糊九分作三十五丸

雄攀丸

治毒及或純毒即蠟攀丸視加雄黃
下井水研付所傷處

雄麝散

治毒如指大以刀開裹藥吞之
辰砂九續隨子各一兩麝香二錢半右為末糯米飯

端千日合○一名丹砂云化下

保靈丹

治毒諸毒一切藥毒神效朱砂一兩山豆
赤足銀錢五錢華黃丹麝香子續隨子去皮

糊右用糯米重陽臘日修合大陰乾磁盒收貯每
藥一丸茶清吞下不得嚼破須臾將毒物或吐或利
急則禱合禱曰

獨勝散

治毒及藥毒玉蛇諸毒大甘草節麻油浸
精製修合禱曰


國老飲

治毒白蔡甘草等分為末清水
調下或吐黑涎或瀉下即瘥

金蠶蠱毒

買富而遣之極難水火兵刃所不能害必多以金
銀置蚕其中投諸路隅人或收之蚕隨以往謂之

蠶蠱毒買富而遣之極難水火兵刃所不能害必多以金
銀置蚕其中投諸路隅人或收之蚕隨以往謂之



疥全蚕頭。○人中金蚕。蠱毒先嚼白蠟。味甘不澁。
 次嚼黑生豆。不醒者是也。石榴根皮。濃煎汁飲之。
 吐活。即愈。

挑生毒

生能初覺。有挑生毒。乃挑毒。於飲食中。以害於人。其
 五分。投熱茶內。化服。探吐。則漸覺刺。痛。在上者。甘
 米飲。調服。有人惡物。後以四君子。去甘。草煎。中
 調。理。毒。也。咳。五。更。助。下。腫。起。頃。刻。間。去。甜。是。也。
 挑。生。毒。也。咳。五。更。助。下。腫。起。頃。刻。間。去。甜。是。也。
 分。麻。毒。也。咳。五。更。助。下。腫。起。頃。刻。間。去。甜。是。也。
 仍。服。平。胃。散。用。藥。已。差。自。後。飲。食。永。不。得。喫。冷
 縮。食。帶。冷。則。鬼。氣。乘。之。毒。重。復。生。竟。不。能。救。

灸法


灸蠱毒法。於足小指尖上。灸三壯。即有物出。酒飯
 得之。隨酒飯。出肉。柔得之。隨肉。柔出。即愈。神驗。皆

吐蠱藥

於灸毒。上出針。中蠱。煮甘草湯。服之。當吐。出蠱。○又升麻
 蠱下血。如雞肝。四錢。燒。取蠱。○又升麻
 根。根。葉。搗。汁。服。當。吐。出。蠱。○又升麻
 取。根。葉。搗。汁。服。當。吐。出。蠱。○又升麻
 發。根。葉。搗。汁。服。當。吐。出。蠱。○又升麻
 出。若。飲。或。酒。化。服。即。吐。蠱。○又升麻
 又。若。飲。或。酒。化。服。即。吐。蠱。○又升麻
 出。若。飲。或。酒。化。服。即。吐。蠱。○又升麻
 又。若。飲。或。酒。化。服。即。吐。蠱。○又升麻

下蠱藥

下蠱藥。九中蠱。毒。高。陸。未。和。水。服。即。下。蠱。○又續
 下蠱藥。九中蠱。毒。高。陸。未。和。水。服。即。下。蠱。○又續
 下蠱藥。九中蠱。毒。高。陸。未。和。水。服。即。下。蠱。○又續
 下蠱藥。九中蠱。毒。高。陸。未。和。水。服。即。下。蠱。○又續
 下蠱藥。九中蠱。毒。高。陸。未。和。水。服。即。下。蠱。○又續



奇效只單眼大戰亦好大眼三九蟲常隨利下頭

林出

通治單方

絕昏迷口禁吐血者服汲水調一錢以麻油紙擦
煎飲數升即愈乾○又甚根濃煎服之○九中蟲毒青
服並魚肝油○如燒○未○紅○水○十○服○中○取○重○汁○者○亦○未○服
但飲其汁已死○者皆可○胡○毒○胡○荜○根○取○汁○半○升○為○未
飲服亦下○大○蒜○或○小○安○蒜○並○常○食○之○須○云○羹○似○犬○非
二毒○亦○及○腸○治○如○食○法○並○道○味○煮○須○云○羹○似○犬○非
狐食○亦○及○腸○治○如○食○法○並○道○味○煮○須○云○羹○似○犬○非
殺以貓非食遂差白氏六帖云青血狐食之令人室不

救諸中毒方

中蟲人常服燒酒與大蒜眼之妙
亦吐不救治法上宜吐○則不救又手足面青過時者
探吐之○治法上宜吐○則不救又手足面青過時者
或為人○所陷始自服毒○急○人○遇○事○急○只○以○吐○草○藜○藜
能灌香毒吐法即安毒

解毒丸

九種子大取青黛另為衣稍覺精神下神即解是
中諸毒急取十五丸爛服如狂心腹覺痛頭旋
砥礪毒欲吐面口青黑其證煩燥如狂心腹覺痛頭旋

砥礪毒

肉飯中得之則易治於酒中得之則其毒散歸百
瀉病解毒丹如無黑餘急取青藍汁一兩煎水灌服○



箇葦毒

或香油一二升灌服又取地漿三椀和粉頻灌
 服旋刺猪狗羊雞鴨熱血飲之又糞汁灌之
 △又白痢豆青黛甘草各一錢巴豆去殼一箇
 辭為末砂糖大一塊水化調一盞飲之毒隨利下
 和豆汁飲月冷解水一椀毒隨利下解
 漿取汁飲而解水一椀毒隨利下解
 藍根砂糖汁飲而解水一椀毒隨利下解
 熟者煮說照人無影者欲爛無虫者皆有毒不可
 食○冬春則無毒秋夏有毒者因蛇虫毒氣熏蒸
 所致也○人中其毒地漿飲之頭垢入糞汁飲之
 馬蘭根葉搗取汁服之刺取熱血飲之和水煎
 度又六畜搗取汁飲之刺取熱血飲之和水煎
 草冷飲只多飲香油亦好刺取熱血飲之和水煎
 細茶芽脚雜為末煎汁飲即愈○又荷葉搗
 和人笑不止而頭煮汁飲即愈○又荷葉搗
 人糞汁次之錄不能救最妙

河狔毒

諸魚中河狔最毒其卵尤毒入中其毒必死
 油多灌吐即愈又白漿末白湯調下又白
 扁豆未和水服又羊蹄葉搗取汁飲之○或入糞汁或香
 椒毒解之○川椒開口者有毒人誤吞之便氣欲
 絕或下白沫身體冷痺宜急治之飲并水一二升
 便差飲之○又桂皮煎湯飲之

杏仁毒


雙仁者有毒人誤食必死若中其毒藍
 葉汁雙仁者有毒人誤食必死若中其毒藍
 多灌之妙斡油

苦練毒

服苦練根瀉不止
 飲冷粥止之斡

蘼蘆毒

黃人中此毒令吐逆不止葱白煎湯飲之
 黃人中此毒令吐逆不止葱白煎湯飲之
 黃人中此毒令吐逆不止葱白煎湯飲之



水石磨水服之
水浸手足忌食熱物
水服


草烏川烏天雄附子毒
皆黑必死煎黑豆汁
濃煎飲汁又防風甘草煎湯冷飲之
濃煎服入口即定又囊肉飽糖服之
煮汁冷飲之又多飲并水大吐瀉即愈
毒則令人痲痺暈問甘豆連湯飲之
汁飲之又童尿飲之又黃連湯飲之

礬石毒
飲之
黑豆煎汁
能解金銀中錫毒
或藍葉汁水升取汁飲之
又白鴨屎水升取汁飲之
煮磁石取黑銚一升銅內煨成汁投酒一升如此

斑猫茺青毒
升去銚頓服酒至半
飲之又猪肪服之又
澤蘭葉按取汁飲之
硃砂毒
一二升飲之
硫黃毒
鴨肉羹吟食之
又黑錫煎取汁飲之又生羊

雄黃毒
汁飲之
水銀毒
肥猪肉煮冷食之
大戟毒
汁飲之又葱白研水服之
狼毒
白飯為末和水服之

十數遍候酒至半
升去銚頓服酒至半
飲之又猪肪服之又
澤蘭葉按取汁飲之
硃砂毒
一二升飲之
硫黃毒
鴨肉羹吟食之
又黑錫煎取汁飲之又生羊
雄黃毒
汁飲之
水銀毒
肥猪肉煮冷食之
大戟毒
汁飲之又葱白研水服之
狼毒
白飯為末和水服之



躑躅毒 梔子煎取汁飲之又

甘遂毒 黑豆煎汁

半夏毒 乾薑煮汁飲之又

芫花毒 或防風煎汁飲之又

苦若毒 走見鬼毒則衛心大煩悶眼生星火狂亂奔

苦瓠毒 食之又犀角磨水服之又蟹

石藥毒 入服諸石藥中毒入參者汁服之又

艾毒 禁至久服亦有瘡出血者甘豆湯冷服之狂躁不能

海菜毒 沫飲熱醋即安允海菜傷皆同此

馬毒 閉刺死牛馬中毒過身生紫疔俱潰叫痛急服

絕燒栗得反濃淋作汁熱煮煎於灰汁中須史

肉中三兩日使腫連心則死有人刺馬被骨傷手

如紅線先以鐵刺瘡口出血為梅和核爛研醋調

瘡腫痛以冷水浸瘡數易飲好酒立愈

安入月經血塗之又生

諸獸肉毒 食馬畜肉中毒水浸豆絞取汁敷

水調服不解再服

升眼之翳 食自死六畜肉中毒黃栢末二三錢

水調服不解再服

升眼之翳 食自死六畜肉中毒黃栢末二三錢

水調服不解再服

水調服不解再服

水調服不解再服



夏... 毒... 藥...

燒存性為末和酒服二

芥果毒

食菜中毒即出毒... 芥果毒食菜中毒即出毒...

下過多腹脹氣急... 下過多腹脹氣急...

飯九葉豆大再服... 飯九葉豆大再服...

菜蔬毒

食桃得病取毒... 菜蔬毒食桃得病取毒...

油多飲之生諸... 油多飲之生諸...

燒酒毒

覺便流衣推身... 燒酒毒覺便流衣推身...

襪體浸灌常令... 襪體浸灌常令...

豆腐毒

遺精白濁... 豆腐毒遺精白濁...

麵毒

赤服即愈... 麵毒赤服即愈...

服藥過劑或中


水取汁服之... 服藥過劑或中...

飲之乾... 飲之乾...

通治百物毒

二名茶散... 通治百物毒...

即吐在下... 即吐在下...



量飲水酒量多少好酒調服須臾大吐瀉雖渴不
 可飲水飲水則難救嘔。臍雪水解口便活。新水調下
 之。藥毒。又甘草蒼朮煎。黃等分。為末。新水調下。
 諸藥毒。又甘草蒼朮煎。黃等分。為末。新水調下。
 二錢。又犀角。以水磨。取汁。服。能解百毒。神效。
 根。又犀角。以水磨。取汁。服。能解百毒。神效。
 油。多飲。或吐。或下。神效。和服。黑豆。湯。為解。
 白狗。尿。絞。汁。服。或下。神效。和服。黑豆。湯。為解。
 一毒。餅。尤。或。加。薺。芫。

甘豆湯

甘草黑豆皆解百藥百物毒各取五錢作一
 貼水煎取汁溫冷任意服之神效或加薺芫

水毒

江無利耳能聽在水射人聾輒以口中
 工毒射人其毒寒熱悶亂頭目俱痛亦如中尸卒不

消水毒飲子

吳茱萸半升生薑犀角升麻陳皮各一
 兩烏梅七箇右剉水七椀煎至二椀分

救急

十件危病

十妙方以救之不可不知。又云。見一時氣絕。便
 風為死。更不知有可救之理。可救之方。故以所歷
 經驗。數方。錄。以廣其傳。便可對證。尋方。服藥。急

能語。又有水毒。一名。溪溫。其病。與射工。相似。但
 有瘡。為射工。無瘡。為溪溫。又有沙虱。乃毒。蟻。鱗。
 中。虫。也。夏。月。蛇。為。風。所。苦。倒。身。江。灘。刷。其。風。入
 沙。中。刺。入。中。其。毒。如。瘡。如。疥。如。癩。如。癩。如。癩。如。癩。
 文。復。刺。入。小。肉。即。愈。不。然。三。兩。日。死。四。射。工。五。色。
 皆。能。殺。人。治。法。取。湯。數。斛。以。煮。五。升。投。湯。中。溫。浴。
 之。身。體。發。赤。痲。者。水。毒。又。
 消。水。毒。飲。子。吳。茱。萸。半。升。生。薑。犀。角。升。麻。陳。皮。各。一。
 兩。烏。梅。七。箇。右。剉。水。七。椀。煎。至。二。椀。分。



救庶幾倉卒無矢橫之患矣
○四○中○砥○礪○毒○射○限○箭
○七○脫○陽○入○鬼○魔○鬼○打○
○九○孕○婦○橫○逆○產○帶○
○門○下○坊○胎○衣

中惡

九中惡容忤鬼氣之證
凡人暮夜或登廁或出郊
野或遊空冷屋室或行人
所不知之地忽見眼見
鬼物口鼻出清血性命遂
倒地四肢厥冷兩手
握拳口鼻出清血性命遂
倒地四肢厥冷兩手
醒人團繞打鼓燒火或燒
麝香安息香直俟記
或溫酒化下移歸燐
○先○用○蘇○香○元○結○
或和親且用朱犀散備急
九粒視○急取半丹末
或皂角末吹兩鼻中即活
衣女用男衣洗交為未每
內衣久遭汗者佳男用女
刺鼻中入深四五六令目
中出血即活又生薑汁

醉酒各半盞同煎百沸灌服之
又白犬斷頭取汁灌
血一升灌之又非什灌口鼻中
又菖蒲搗取汁灌
蜜三合和服口禁者折齒灌之
一錢

鬼擊鬼打鬼排

此等病皆得之無漸卒者人如刃刺
狀胃腹痛不可按抑或吐衄下血

治法同
中惡斡

朱犀散

犀角五錢朱砂麝香各二錢半
右為末每二錢新汲水調灌

脉候

日暴厥之脉緊細易治
浮大難痊細如寸口脉沉大而

滑沉則為實滑則為氣相搏血氣入脈沉大而
入府即愈此為卒厥不知人何謂也
何謂血氣入脈沉大而
冷為入藏則死身溫不知人何謂也
何謂血氣入脈沉大而
脈逆連藏則死身溫不知人何謂也
何謂血氣入脈沉大而
也納中惡腹大呼四肢滿脉大而緩者生
緊小而微者亦生細而




尸厥

尸厥者脉動而無氣氣閉不通故靜如死也還魂
傷主之附○卒然不省人事全如死尸但氣不絕
而心曾煖者是也附○尸厥者即中惡之類九吊
死問疾或入墓登塚卒中邪惡興頭旋暈昏相昏忽然
手或錯言妄語急取蘇合香丸三九溫酒或薑湯
灌下又煎還魂湯灌之又故汗衣燒灰未二錢百
沸上則為大厥厥則暴死氣復○明之絡此五絡皆
於上則為手足少陰太陽俱燭令入身脉皆動而
會○形無知也其狀若尸名曰尸厥動四肢冷腹中
即馳走如雷鳴聽其耳如微聲者是也急用硫
黃散朱犀散吹其耳中
黃散朱犀散吹其耳中
酒灌之如無則薑汁半盞
前灌之如無則薑汁半盞
還魂湯尸奄忽口禁氣絕麻黃三錢杏仁二十五粒

疏黃散

鬼魘

疏黃散治尸厥奄然死右細研如粉分作三服
好酒一盞同煎半兩起一服於內蓋着候溫灌
服之如人行五里又進一服於內蓋着候溫灌
則久睡不得寤乃至氣絕為邪所魘屈助其神弱
街治之針房○鬼魘乃鬼物所魘但聞其聲吃驛
無人居於房中為鬼物所魘但聞其聲吃驛
聲便令人叫喚如鬼物所魘但聞其聲吃驛
用雄朱砂散吹入為鬼物所魘但聞其聲吃驛
不得近前急喚入為鬼物所魘但聞其聲吃驛
甲邊并多唾其面即活如不醒交其足動處子徐
燈照仍用筆管吹兩耳可吹半臈如未或角未用
兩鼻中雄黃末吹入鼻中又酒調一錢服日三能
滿欲死雄黃末吹入鼻中又酒調一錢服日三能



虛者乘年之衰逢月之空失時之滿和因爲賊風有所傷是爲三虛不能危之是爲三實而卒死何相搏則爲暴病卒死入於藏府者不病而卒死赤色出矣兩公曰病愈而卒死者必知死之帝色出矣兩公曰病愈而卒死者必知死之

神不守神見五色非常氣目閉口暴亡者爲氣絕神不守神見五色非常氣目閉口暴亡者爲氣絕

或聖童尿和灌服○九救卒死取半夏未

或聖童尿和灌服○九救卒死取半夏未

備急丸

主諸卒死暴疾百病及中惡客忤鬼擊打


脫陽證

九人因大吐大瀉之後元氣不接四肢逆冷面

大固陽湯

五附子一枚炮切作八片白朮乾薑炮各

進一服神效



救自縊

自縊死者自旦至暮雖已冷必可活自暮至

當徐徐其心却熱不可斷繩子以手安其口中

鼻勿令透氣急活勿使縱緩一以脚踏其兩肩

漸強摩動之如此一人牽持臂屈伸之若呼強直

開仍引按勿止解其項手厚從口出呼強直

管吹其兩耳待其氣回方收手便活分男氣

則不難取矣仲景刺雞冠血滴口中即活

又或以藍汁灌之取梁大酒和灌鼻中

夏未與皂管同極力吹入鼻中即活

者少與溫粥清或壁潤漸入鼻中即活

心頭濕者雖一日皆可活

夏區對縣縣丞

三十三

救溺水

九溺水死者一宿尚可使急急拯出先以刀

耳服取魚口中二綿約半寸許入水用燕香

元下九盞調灌又將解毒丹一錢冷水磨化

神砂一匙死埋其身只出頭面又法取中熱

用人扶策徐頭將死者腹覆在背上用酒

上或膈上冷錢人把燒場中急以覆死人以

救凍死 後先溫粥清或壁潤漸入鼻中即活



和脚

救餓死

者頃喫飯及肉物則必死與稀粥漿
之過令日乃與稠粥軟飯則自然生
沙此與乾霍亂同由山嵐瘴氣或
陽暴亂而致也。所感如傷寒頭痛
熱手足指未微厥或感痛悶流
煎艾湯試之如吐即是也。治法
未熱酒調服立效又欲鹽湯吐
陰以香二證除沙火燒而手足冷
指湯近瓜甲半愈陽沙腹痛而手
其惡血令聚指頭血出為好。又
血即愈。患痛之人兩臂處以鐵
色用砂鐵擊刺出紫黑血痛即止
神效。

攪腸

沙此與乾霍亂同由山嵐瘴氣或
陽暴亂而致也。所感如傷寒頭痛
熱手足指未微厥或感痛悶流
煎艾湯試之如吐即是也。治法
未熱酒調服立效又欲鹽湯吐
陰以香二證除沙火燒而手足冷
指湯近瓜甲半愈陽沙腹痛而手
其惡血令聚指頭血出為好。又
血即愈。患痛之人兩臂處以鐵
色用砂鐵擊刺出紫黑血痛即止
神效。

入井塚卒死

九入井塚須先以雞鴨毛投之直下則無
毒若徘徊不下則有毒當先以酒數升酒
其中停久乃入。夏月有伏氣若入五六
尤甚古塚中及深井中皆有伏氣若入
悶奄忽而死即取井水糞其面并冷水調
足一灸臍左邊二十壯又用生薑四兩投
盞濃煎湯服又醋煮衣絮令熱徹濕裹
濃煎鹽湯浸手足洗胃臨間即甦。新
疑有枯井一口有客入兩者於五月間
亦久不出傍人怪之與家主議用繩
人登踏下井看之其人亦無聲即牽上
昏迷不省用冷水救甦更用繩縛上井
死馬逐折駁井畔見傷痕此其中毒而
審則身尸青黑了無傷痕此其中毒而
上。

蛇入七竅

夏月因熱纏喉嚨有蛇入耳鼻口中挽不
出急以刀傷蛇尾納川椒胡椒二三粒裹着



三十一

即出又以艾灸蛇尾即出又割豕猪尾頭瀝血入

口中并孔中亦出後取雄黃末調人參湯服制蛇

毒無湯則令人尿之解解明之絡此五絡俱

淋邪客於手足少陰太陽足陽明之絡若尸名曰尸

鍼灸法 厥先刺隱白後刺涌泉後刺厲兌後刺少商後刺

神門刺隱白厥後刺期門巨關中極氣海百大

灸金門壯壯身厥後刺期門巨關中極氣海百大

臍中百壯壯身厥後刺期門巨關中極氣海百大

下兩寸後二七壯壯身厥後刺期門巨關中極氣海百大

足兩寸後二七壯壯身厥後刺期門巨關中極氣海百大

兩脚大指內離爪一韭葉許各七壯壯即活調○

卒被思擊如中箭用桃皮一片安患頭灸之即差門

頭安桃皮上用艾胡椒大安患頭灸之即差門

怪疾異常有怪證異於常忌之

怪疾異常有怪證異於常忌之

怪疾異常有怪證異於常忌之

怪疾異常有怪證異於常忌之

怪疾異常有怪證異於常忌之

怪疾異常有怪證異於常忌之

怪疾異常有怪證異於常忌之

怪疾異常有怪證異於常忌之

肉癥

肉癥者思肉不食訖復思白馬尿

酒癥

酒癥者思酒不飲訖復思酒

藥癥

藥癥者思藥不飲訖復思藥

全狀

全狀如蛇醜乾以視青黃酒癥也

就瘦

就瘦弱家中談策令人用酒呼任手足却取

就飲

就飲堅於口邊打開其中氣衝入口中病者以

以物蓋

以物蓋覆猛火燒滾約乾一半却開取之其物


數計

數計棄之於江自後雖滴酒不能飲矣

髮癥

髮癥則病此是疑入胃化為虫快意常與則安





衆以為肉癩徐文伯視之曰此癩也油投之
 即吐物如錢引之長三尺頭已成能動門
 上涌盡惟一錢而已。一婦人病胃膈不利口
 流涎味自言咽下胃中常有雷聲心膈微痛時復
 發昏鐵灸藥餌三載不愈戴人用藥築於涎中病
 者惡而斷一條長五六寸有口鼻牙齒走於涎中病
 癩一莖此癩癩也柯

雞瘕 重瘕為具郡太守李道念到郡澄見謂曰汝有
 非冬非熱當是食白輪雞子過多疔致令取森一
 雞難之羽瓜昨悉具能行走澄曰此未盡
 令更服藥又吐如向者十三頭而安
蛟龍瘕 春秋二時龍帶精入芥菜中入謂食之得病
 龍病發則似痢面色青黃腹滿痛下可忍名為蛟
 子用錫糖熬龍子生煎芥菜中食之入腹變成龍
 升口三服吐交龍子有兩頭可驗

蛇瘕 華佗行道見車載一人病壺塞食不下呻吟
 之果吐大蛇一丈餘而愈
 至胃便即吐出一枝而愈
 蛇肉不消致斯病但搦心腹上微利即愈形也
 視之果然遂用硝黃合服之見頭足時
驚瘕 轉動作痛白馬尿飲之即消昔有人與奴俱得時
 此病奴先死剖其腹得驚置庭中知其奇效取求
 看其馬放尿難上即便消置庭中知其奇效取求
 以猪脂煎飯與之取其屎煎食令過一宿明
 錢日三服須消盡之
 止好了後難消盡之

蛤精疾 一人患脚腫痛諸醫莫識徐之曰蛤精
 愈而

眼見五色物 一人酒色過度眼見空中有五色物精
 近變成一羞婦人亭亭而立徐之才曰

此色慾多太虛所致乃虛

視物倒植

皆因大醉極吐熟睡至次早眼中現物

致倒瞻府故視物皆倒法當復吐以正其瞻則自

四肢堅如石

寒熱不止經日後四肢堅如石以物擊

化生鰈魚

梗米大走躍不住以手捉即化為水此肉

腹如鐵石

腹中如鐵石暗中水出旋變作虫行之狀

遍身波浪聲

身忽皮底渾渾如皮浪聲不可忍

身出斑毛

眼中熱毒氣結於下焦白礬滑石各一兩

十指斷壞


十指節斷壞惟有筋連無節肉虫出如

有蟲如蟹

肉之化雷凡雄黃各一兩為未糝於指肉

肉出如錐

此名血壅若不速治潰而膿出赤皮愈燒



毛竅血出

過身毛竅節次血出若不出皮膚腫脹如藪
須更眼鼻口被氣脹合此各府溢飲生蘆

計一盞
即安

身生猫眼瘡

面上及遍身生瘡似猫兒眼有光彩無
膿血但痛痒不常久則透脛名曰寒瘡

多喫魚雞非葱
等物則自愈

口鼻氣出不散

過十日漸至肩背與內相連匿痰金
口鼻中氣出盤旋不散疑如黑蓋色

織多因瘡後得之煎
湯日飲三五日乃愈

渾身生瘡

有石一片煖如甘棠梨每箇破出水內
肉不可治三稜蓬末各五兩

為未分三點酒調服自愈

人身作兩

人亦覺其形作兩人是所不辨真假不語
煎場服之真者氣

爽假者化也

生瘡如櫻桃

項上生瘡如櫻桃大有五色瘡破
則項上生瘡如櫻桃大有五色瘡破

四肢節脫

用酒浸黃蘆三兩經一宿焙乾為末每二
錢酒調

下愈

身腫如蛇狀

身上及頭面肉上浮腫如蛇狀取兩滴
階壇上苔痕一錢水化開塗蛇頭立消

雜方

身有光色


頭面發熱有光色他人手近之如火燒
人用蒜汁半兩酒調服如蛇狀遂安

雜方

救荒辟穀方

粒食者生人所資數日之絕便能致命本
草有不飢之文而醫方不言斯術者必其

步在仙奇非庸俗所能達也遂使荒饑之歲餓死
橫路良可哀哉今畧載其易為者云若箇奔竄在
絕無可以藉口者便須飲水服氣其法如左
絕無可以藉口者便須飲水服氣其法如左



燕津服水法

飢餓欲死便閉口以舌攪上下齒取津液而燕之一日得三百六十嚥便住漸習乃可至于自然不飢三五日小瘦極過此便漸輕強若有水處卒無器便以左手掬水嚥曰孟詵曰單三叩齒右手持三平左手如手如三連便飲之有孟詵曰水充佳如法

服六天氣法

六天氣服之處如龜蛇令人不飢人有急難阻絕言春食朝霞日出時向東氣則不死陵陽子明經言中氣夜秋食飛泉日飲後時向西氣也冬食沆瀣北方不飢延年無疾并天玄地黃平明為朝霞日中為正陽日八為飛泉穴中其日蛇蟠并天玄地黃為六其人依蛇時節飢時便服日蛇蟠一時躍出焉針之似能輕舉啓蟄之後入與蛇一時躍出焉針

斷穀不飢藥

餌松栢葉法

周行山澤間取松栢葉細切和水服一人無衣服身皆生黑毛跳坑越澗如飛乃合取獲則乃一婦人言我是秦宮人隔東賊至秦王出降驚走入山飢無所食有一人老公教我食松栢葉初時苦澁後稍便契遂不復飢冬不寒夏不熱有秦時至漢成帝時已三百餘年矣

黃精

久服斷穀不飢甘美易食根葉花實皆可服解或蒸熟或晒乾九散隨宜四年之時可休採斫

天門冬

取根蒸熟或晒乾九散隨宜四年之時可休採斫

木

取木作丸散久服可以代糧。一人避亂山中飢困欲死有人穀以服木遂不飢數十年還鄉

薯蕷

取根蒸熟食之或搗粉作麪食

旋菑根

蒸熟食之可服餓不飢



葛根

採根蒸曝九散任意

何首烏

採根蒸曝九散任意

百合

採根蒸者食之甚

松葉

守中不飽斷穀所宜取細切如粟和水或米飲

柏葉

服法同松葉久

榆白皮

荒歲人食之以當

白茯苓

善能斷穀和水服之

和得附以黃蠟代油

三日後飲脂

湯少潤腸胃

橡實

去皮煮食最益人實中令

臘

仙經斷穀最為要用今人但嚼食方寸者終日不

胡桃肉

即解○白麩一斤黃蠟為油作煎餅飽食

可百日不飢

○合松脂杏仁棗肉茯苓等分為末

作丸服五十九便不飢

○古入荒歲多

食蠟以度飢當合大棗咀嚼即易爛

栗

人耐飢之令

藕蒸食可休糧食之最佳

○蓮子去皮心蒸熟

海松子

食之令

大棗

久服不

菱芰

粉蜜和食之可以代糧不飢斷穀長生



NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN

芋

煮食之可以當

烏芋

作粉食之或煮熟食令

桃膠

補中不飢以桑灰漬之

胡椒

九蒸九曝熬搗餅之斷穀不飢斷穀○胡椒

之糧入重

白脂麻

餅方蒸曝服

榛子

久飢令人

大麻子

未蜜九日二服令不飢○又麻子一升白羊

合脂七兩搗蒸食之不飢

黑豆

投荒年法擇取雄黑豆三七粒生者熟搗之令

暖氣微豆心先一日不食次早以冷水吞下魚肉

菜方壯健不復經口渴則飲冷水初雖小困十數日後

體大黃末服餅之可辟穀度飢方製

粳米

荒年穀實無以充糧取粳米一升酒三升漬之

水出曝乾又漬又曝酒盡不止稍食之渴飲之

炒過以黃蠟二兩熔鉢內入米炒令乾任便食之

糯米

數日不飢如食胡椒一箇即思食

餅未遇凶年穀貴取糯米一斗淘洗百蒸百曝搗

青梁米

青梁米一斗以苦酒一斗漬之三日出百蒸

十日不飢○青梁醋拌百

蔓菁子

取錢日三久漸增服可以辟穀○又蔓菁子取



本草綱目卷之九

四十二

苗葉莖根四時長
服可以備饑歲
時

荏子

辟穀

絕食方 欲休穀貴或遠方水豆五升淘洗蒸三遍

晒乾去皮為末大罇子三升五升用糯米糲合和搗

西乾蒸三遍令口開去皮為末入甑蒸之從夜至子住火至寅

取出磁器盛蓋勿令風乾每服一匙以飽為度

不得喫一切物第一頓七日不食第二頓末不飢容貌佳

勝更不燥碎如渴則飲大麻汁三合并碎煎湯冷服

與物服葵菜湯解之或葵子三合并碎煎湯冷服

亦可○一方有
白茯苓五兩麩

千金

水調下可經百日不飢其麩於絹袋盛之可留至

辟穀

不飢方 甘菊苳白茯苓黃蠟松脂蜂蜜等分為

九白湯 未先煉蜜吹下藥和勻丸如彈子每

避難

大道丸 黑豆一升去皮費衆甘草各一兩茯苓

慢火熬煎直至水盡揀去藥取豆搗如泥作堯實

大磁器密封每尊一丸則恣食苗葉可為終日飽

同異草方黑豆一斤不識亦無毒細切同煮飯雜一

反覆令食盡餘汁無妨忌魚肉菜果及熱湯數日

五七粒任食草木無妨忌魚肉菜果及熱湯數日

思食不復

諸法

取水火法 陽燧向日然而為火許慎云陽燧金也取



承之則然得火也。日者太陽真火以水精珠或
心四輔鏡向日射之以艾承接其光聚處火出故
知之。方諸大詳也。向月承取

磁石指南

水二三合如朝露主明目承取
以磁石磨錢鋒則能指南其法取新鐵中
之則鐵常指南以鐵橫貫燈心淨水上亦指南然
常偏丙位不全南向也蓋丙為大火庚辛金受其
制故如是物

不畏寒

酒服二錢日再則天寒時單衣可出鞋
不畏寒酒服二錢日再則天寒時單衣可出鞋
香身法煮服之亦可零陵香亦香身飲浴皆佳鞋
令人勇雄雞鳴中穢爛生食之令人勇雄雞鳴

去鬼通神

見鬼方要見鬼者取生赤子石菖蒲鬼白等分為末
蜜丸彈子大每朝向日服一九服滿百日即

見鬼

隱形法

九服能令人隱形青犬光妙鞋
令夫婦相愛即相和取鴛鴦肉作羹臚私與食之
骨帶之亦令夫

去妬方

去衣油及衣垢合壁皮及葉可洗衣垢及梅葉搗碎
湯洗衣垢易脫又羊煮汁洗垢衣白如玉又赤小
豆粉解油衣粘綴甚妙。又皂角湯去垢最妙鞋

軟玉法

特雕琢非人功者多是昆
吾刀及鑿餘助所刻也鞋

爛石法

地榆根燒灰能爛石鞋



香譜

香譜 通 四 香 疑 花 百 碎 雲 寶 真 清

文苑 二沉香 白檀 一沉香 一甘松 二玄參 一丁香 一麝香

新料 五降真 五甘松 五麝香 五白芷 四兩香

笑蘭 三白檀 一沉香 一麝香 一腦子 五甲香

清遠 五錢 一錢 一錢 一錢 五白檀

錦囊 一腦子 五錢 一錢 一錢 一錢

醒心 一麝香 一錢 一錢 一錢 一錢

凝和 一麝香 一錢 一錢 一錢 一錢

瑞雲香 子白芷 各三兩 白檀 茅香 艾納香 坤熟

未以酸棗仁膏搜和入麝香和勻并令不散
尺許結成毬于空中飛時不散
笑香 沉末香 白檀 各二兩 零陵香 甘松 香 茅香 各


芙蓉香 沉末香 白檀 各二兩 零陵香 甘松 香 茅香 各

聚仙香 沉末香 白檀 各二兩 零陵香 甘松 香 茅香 各

淹藏果實法 酒糟藏物不敗可淹果實良
心上一陰乾燒之
硝燒令十分和勻用一色乾末作粉手塗擦竹

香肥皂 沉香 白檀 丁香 零陵香 三皂角 末五兩 黑糖

香肥皂 沉香 白檀 丁香 零陵香 三皂角 末五兩 黑糖



拘杞子酒 日能補益拘杞子五升清酒二升研搗浸七

地黃酒 麴米一斗生地黃三斤細切同蒸爛熟入白

天門冬酒 補益天門冬去皮心搗取汁二斗廣麴二

戊戌酒 糯米三升蒸熟為泥連汁與飯同拌勻用白麴

神仙固本酒 龍龜白鹿胎氣老還童牛膝八兩首烏

蒲萄酒 蒲萄熟者接取汁同糯米飯白麴和釀

蜜酒 蜜二斤水去沫令極冷下麴每日常三兩日

雞鳴酒 先將粘米三升淨淘水六升同下鍋煮細

白花香 熟糯米一斗浸水洗淨入白麴如常法釀之過三

煮酒 釀成美酒佳釀白

冷厚出 於其上重湯煮之其米成飯



作酒

本待米透一斗洗淨浸水中冬十春秋五夏三日

造神麴法

六月過此日謂諸神麴也最故此為神麴

五科至上寅口踏麴亦是○白虎即帶麴白麴野十
自然汁一升去皮尖○青龍即青蒿自然汁三合○朱
雀即赤小豆煮熟搗如泥又一分右共寅合三寅寅
用上寅日踏極實為度○又一分右共寅合三寅寅
也必乃三奇也○謂之神也麴

百藥煎法

烏梅煎不作為多水要得其所却不見風候生并禁
取和勻乾聽用藥糞

者加得藥四而吟

造豉法

以大豆為黃蒸餅末每二斗加鹽四升川椒

熟加生薑細切五兩拌勻入器內封七月乃取用
草中厚覆之或馬糞中過七日乃取用

造飴糖法

以糯米煮粥候冷入麥芽末使熟取清再

造半夏麴法

入藥○風痰以皂角煮汁去渣煉膏和○火痰老

痰以竹瀝入薑汁和○濕痰寒痰以生薑煎湯
加於白麴天膏之限加白芥子三分之二薑汁

造海粉法

紫海蛤一斤火煨紅重便碎過九次為



夏曆... 卷之...

造

麻純穿貫懸當風處
吹乾為未聽用醬
輕粉法起食鹽綠各等分同故銅中煮令黃色取
如法同齊勿入瓦罐內候氣乾用鐵炭蓋旋定外用水黃泥
以法滴鐵燈內候氣乾用鐵炭蓋旋定外用水黃泥

作

熟地黃法採生地黃半斤成輕粉入藥聽用
天黃其人黃天黃及細根取汁其地黃浸之
柳木醃或无醃盛地黃蒸取晒乾又浸汁中
一宿又蒸之十份無色如蒸九兩蒸時就矣乃
未清酒蒸之十份無色如蒸九兩蒸時就矣乃
藥聽用拾入

煮

鹿角膠霜法取鹿角無斷一寸長置長流水中浸
旋添熱水勿令欠歇如是三日候角爛軟酥即止
旋添熱水勿令欠歇如是三日候角爛軟酥即止

取角晒乾謂之鹿角霜其汁澄濾取清候凝作片
風中吹乾謂之鹿角膠膠霜收取聽用入藥○勿
用自落角者連膠

取

蟾酥法五月五日取活蟾蜍捉住後以誠刺破眉
陰下塗油紙上

晒


乾人乳法刮取之入乳數椀八元盆內莫覺動四圍晒乾
之晒用

酒

煮蠟法黃蠟十兩於銀石器內熔化作汁用重綿
其蠟自浮於水
上去酒取用

製

牛膽南星法南星為末臘月取黃牛膽汁拌勻入
陰煉秋石法人尿多聚置大盆中以新水相和攪轉



以新水同攪水多為妙又傾去清水如此十餘次
直候無臭氣水香為止鋪厚紙於篩內傾在紙上
中暴乾如此九度色如粉白蓋候計太陽氣也謂之日
陰降火能

陽煉秋石法

尿交聚置盆中入皂角汁少許以數
破去清更只取濁脚又入水攪入爭銅內蒸乾
去水取濁更以布濾去滓取濃汁入淨銅內蒸乾
刮下搗篩再入鍋以清水煮令化乃於其背內布
厚紙兩重傾汁其上淋過去水再入銅蒸乾又
用錫煮化布紙淋入固濟砂盒內固濟頂訣四
如霜雪即止因入固濟砂盒內固濟頂訣四
兩養七晝夜即止無善謂之煉秋石謂之取龍
本疾久年虛損服之即愈男婦老幼各宜煉淨室精
水法龍屬木虎屬金即愈男婦老幼各宜煉淨室精
三四十五六無疾病未破陰一陽者各置淨室精
飲食用磁缸收貯小便積至二石煉用但功

甚大故只取無病人小
便積多亦可煉用

葵冬造化糕

和勻八穀中以外竹刀劃為片子以麩布覆醃蒸
熟取出晒乾任食之若覆木蓋則不熟矣
秘傳三仙糕
米三升外粳米七升外各搗作末和勻蒸出
晒乾再為末每取一大匙白湯調勻
造煎藥法
消三升外
取用

六香膏

治冬寒傷敗白檀香沉香末三錢冬瓜
中浸之封入口經七日或十日取出於火上微温下
篩去滓乃入三錢瓜

取用
消三升外
取用
消三升外
取用



衣香

十香膏

琥珀膏

仁細末七團或十兩攪勻再下疎篩之
 其滓依團於火中燒之甚佳謂之江梅香
 芽香蜜炒八角香丁香沉香白檀香零陵
 香甘松香八角香丁香沉香白檀香零陵
 香末衣箱中最佳夏月尤好
 匙置衣箱中最佳夏月尤好
 油文武火煎二日却入內畏火養五日煉
 以文火煎二日却入內畏火養五日煉
 珠然香末二鐵半攪勻三五百遍候凝作片用
 五錢麝香末二鐵半攪勻三五百遍候凝作片用
 時貼之紅綃
 上貼之紅綃
 琥珀膏
 並對右除琥珀防風丁香木香各七錢半通桂心當
 一匙對右除琥珀防風丁香木香各七錢半通桂心當
 下松脂浸化滴去滓再熬下黃丹一匙以柳篋不
 住手攪令黑色滴去滓再熬下黃丹一匙以柳篋不

神仙太乙膏

救苦膏

玉容膏

片候凝作
 玄參白芷當歸肉桂赤芍藥大黃生地
 黃各一兩當歸肉桂赤芍藥大黃生地
 七冬十日慢火煎中成珠乃候凝作片聽用
 一匙對右除琥珀防風丁香木香各七錢半通桂心當
 各錢對右除琥珀防風丁香木香各七錢半通桂心當
 一兩以香油調紙付患處化每
 玉容膏
 一名王容西施香粉黃芪當歸白芷
 白芨杏仁各一兩瓜蒌白檀香附子白芷
 黃芩杏仁各一兩瓜蒌白檀香附子白芷
 冬十日滿於石龍腦煎攪勻密封用之冬則蠟燭
 蠟燭化又去滓入龍腦煎攪勻密封用之冬則蠟燭



聖母膏

藥肉桂當歸補腦花黃芪
白銀防風合歡乳香桔梗
木草龍兩情油香附子
丹十麝香黃丹益花外餘藥
乳煎麝香百粒附丹益花外
火煎麝香百粒附丹益花外
滴丹中成珠為細度順在柳
腫外貼內膠九神效痲
臘享膏治凍瘡神效痲

神異膏

待各煉去陣塔化膏
神異膏洗淨房杏仁各
候丹五兩右先將油及
杏仁黑色綿瀝去滓乃
入黑先將油及

萬應膏

黃官桂玄參波藥乳香各
斤兩兩右玄參波藥乳香各
以白芷焦黃色為度綿瀝
成珠乃入乳後蠟溶此攪
日取久攤用治一

善應膏

黃川芎瀝青另研烏乳香
黃川芎瀝青另研烏乳香
三箱慢火熬至黑色再入
成珠不散乃入乳液膠香
惡瘡腫毒及諸傷治

豬痔膏

豬痔入蜂房蛇退費熬至
熟下黃丹急攪千餘轉滴水
收癰疔治諸

萬應膏

萬應膏大黃黃芩各二兩
黃官桂玄參波藥乳香各
斤兩兩右玄參波藥乳香各
以白芷焦黃色為度綿瀝
成珠乃入乳後蠟溶此攪
日取久攤用治一

善應膏

善應膏黃丹八兩白膠香
日取久攤用治一

神異膏

神異膏洗淨房杏仁各
候丹五兩右先將油及
杏仁黑色綿瀝去滓乃
入黑先將油及

聖母膏

藥肉桂當歸補腦花黃芪
白銀防風合歡乳香桔梗
木草龍兩情油香附子
丹十麝香黃丹益花外餘藥
乳煎麝香百粒附丹益花外
火煎麝香百粒附丹益花外
滴丹中成珠為細度順在柳
腫外貼內膠九神效痲

神異膏

待各煉去陣塔化膏
神異膏洗淨房杏仁各
候丹五兩右先將油及
杏仁黑色綿瀝去滓乃
入黑先將油及

萬應膏

萬應膏大黃黃芩各二兩
黃官桂玄參波藥乳香各
斤兩兩右玄參波藥乳香各
以白芷焦黃色為度綿瀝
成珠乃入乳後蠟溶此攪
日取久攤用治一

善應膏

善應膏黃丹八兩白膠香
日取久攤用治一

神異膏

神異膏洗淨房杏仁各
候丹五兩右先將油及
杏仁黑色綿瀝去滓乃
入黑先將油及

聖母膏

藥肉桂當歸補腦花黃芪
白銀防風合歡乳香桔梗
木草龍兩情油香附子
丹十麝香黃丹益花外餘藥
乳煎麝香百粒附丹益花外
火煎麝香百粒附丹益花外
滴丹中成珠為細度順在柳
腫外貼內膠九神效痲

神異膏

待各煉去陣塔化膏
神異膏洗淨房杏仁各
候丹五兩右先將油及
杏仁黑色綿瀝去滓乃
入黑先將油及

萬應膏


萬應膏大黃黃芩各二兩
黃官桂玄參波藥乳香各
斤兩兩右玄參波藥乳香各
以白芷焦黃色為度綿瀝
成珠乃入乳後蠟溶此攪
日取久攤用治一

善應膏

善應膏黃丹八兩白膠香
日取久攤用治一

神異膏

神異膏洗淨房杏仁各
候丹五兩右先將油及
杏仁黑色綿瀝去滓乃
入黑先將油及



白龍膏

白龍膏各一兩輕白益白粉五錢黃芪商陸根柳白皮桑白皮

靈應膏

靈應膏燒白麩飯石火煨醋碎久炙至令毒化出

爐灰膏

爐灰膏治癰疽疔毒乳癰惡瘡內升風化石灰妙用

造黃丹法

造黃丹法黑汁下釵一匙黃丹入藥又炒令色變細研水

取竹瀝法

取竹瀝法戴青大塊排定將竹片架於埽上兩水一宿

造紅燒酒法

造紅燒酒法九燒酒煮取時先將紫草細切納於缸

飛二

飛二用之門

錢白

錢白丁香末五分石反炒一錢攪勻再熬如乾

挑取

挑取許放指藥上研勿氣調勻如泥上用鐵

撥開

撥開慮處指藥上研勿氣調勻如泥上用鐵

稍少

稍少許沸下釵一匙黃丹入藥又炒令色變細研水

黃亦

黃亦盡炒為末成丹矣入藥又炒令色變細研水

飛二

飛二用之門

取竹瀝

取竹瀝法戴青大塊排定將竹片架於埽上兩水一宿

一

一以樽二塊排定將竹片架於埽上兩水一宿

瀝去

瀝去滓下釵一匙黃丹入藥又炒令色變細研水

月


月置傷處

造紅燒酒法

造紅燒酒法九燒酒煮取時先將紫草細切納於缸

停久

停久則其色鮮紅可愛



東醫寶鑑雜病篇卷之九

碎果樹上烏鳥法

取生人頭發與樹上則烏鳥不敢

於緯車上却轉之則

鹿角粥

大能補髓腦牙齒益精血固元氣每白粥

山芋粥

能潤肺益氣山芋生者去皮於石鐘乳或新瓦

避難止小兒哭法


用綿作一小碗略使滿口而不可


積之臨時縛置兒口中傷兒口蓋不幸而遇禍難
自不能作聲為賊所聞棄之道傍哀
帝聲不止恐人甚象不可不知
哉用此法活人甚象不可不知





國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.






東醫寶鑑雜病篇卷之十


御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許後奉教撰

婦人

求嗣

生入之道始於求子求子之法莫先調經每見婦
 人之無子者其經必或前或後或多或少或不調不
 痛或行後作痛或紫或黑或淡或疑而少或不將行
 則血氣乘爭不能成孕或○求嗣之道婦人變
 調則血氣乘爭不能成孕或○求嗣之道婦人變
 經調男子要神足又寡慾清心為上策寡慾則不
 妄交合積氣儲精待時而動故能有子是以慾寡
 則神完不惟多子抑亦多壽○男子陽精微薄
 則雖遇血海虛靜流而不能直射子宮多不成胎
 蓋因平時嗜慾不節補泄太多宜補精元無用靜
 工存養無令火動候陽精充足依時而合一舉而
 成矣○丹溫腎丸五子衍宗丸○男子脉微弱
 而痿為無子精氣清冷也宜陽起石元鱗○女宜
 識動微陽宜玉鑰登榮丸蠡斯丸煖宮蠡斯丸





婦人無子多由血少不能攝精宜調養經血宜百
 子附歸丸琥珀調經丸加味養榮丸加味益母丸
 濟陰調經養血丹溫種玉湯先歸血衰弱難投
 益精不能攝入子宮雖交不孕雖孕不育是以男
 女配合必當其年門無子婦人瘦法者乃子宮
 乾涸宜滋陰養血四物湯炒痰星加香附黃芩
 軀滿溢子宮宜行濕燥痰星加香附黃芩滑石
 防已羌活或導
 痰湯防眼或導

相女法 未辨之婦陰氣未行慾感之婦不生多女性行
 刑重者調經易扶性不肥脂滿子宮太

脉法 求嗣之脉專非福尺惟沉滑易為生息如左
 尺偏旺陰虛非福尺惟沉滑易為生息如左
 瘦子宮無血俱不宜子不可不知門
 精清無遲冷極○若見微濡入房無力○女不
 生赤尺脉濡細○男子脉微弱而溢為無子精氣

也清冷
 也清冷

固本律陽丹 凡人無子多是精血清冷或房勞過傷
 以致腎水不足虛寒耶熱遠志製丸
 三專責於母血之不足虛寒耶熱遠志製丸
 炒各一兩半白茯苓山藥酒蒸牛膝酒浸五味子
 洗切酥炒去絲當歸身酒洗肉苁蓉酒浸五子
 益智仁益水炒鹿茸酥灸各一兩加枸杞子三兩
 下參二兩右為未蜜丸梧子大空心益湯或溫酒
 臨再服九

續嗣丹 破故紙炒山茱萸天門冬麥門冬各二兩半
 子巴戟熟地黃各一兩半龍骨黃芪杜蠟
 山藥當歸瑤陽各一兩半人參杜仲各七錢半陳皮
 白木各五錢狗外腎蘇灸二對為未用紫河車
 一具蒸製同門冬地黃爛搗他藥並為細末煉蜜
 和勻搗千杵作丸梧子大每取百九空
 心及臨臥以溫酒或藍湯任意吞下門
 溫腎丸

溫腎丸 兔絲子當歸鹿茸益智杜冲生乾地黃茯苓
 心及臨臥以溫酒或藍湯任意吞下門
 和勻搗千杵作丸梧子大每取百九空
 一具蒸製同門冬地黃爛搗他藥並為細末煉蜜

山藥遠志續斷蛇床子各一兩右為末蜜九經子
大空心溫酒下五七十九精不固倍鹿茸加龍骨

五子衍宗丸

治男子無明拘祀子九兩兔絲子酒浸
製七兩覆盆子五兩車前子三兩五味

子一兩右搗為末蜜九梧子大空心溫酒下九
十九臨卧鹽湯吞下五十九春寅卯須上旬晴日
合忌見雀尼寡女孝子六畜不淨之物續○貫遺
精者去車前子代蓮子門

陽起石元

治丈夫精冷真精氣不濃不化施是以無
子陽起石火煨研兔絲子酒浸製鹿茸酒

蒸焙天雄炮韭子炒肉苁蓉酒浸各一兩覆盆子
酒浸石斛桑寄生沉香原委蛾酒灸五味子各五
錢右為末酒煮糯米糊和九搗
子大空心鹽湯下七十九細末十五兩當歸二兩白芍

玉鑰啓榮丸

治婦人無子香附子搗去皮毛醋水浸
三日炒乾細末十五兩當歸二兩白芍

藥川芎赤石脂葉本人參牡丹皮白茯苓白朮
心白芷白朮玄胡索煨藥各一兩右除石脂後
細入別研赤石脂後藥未煉蜜和九彈子重羅江
細一丸空心雞未鳴時先以溫茶或薄荷湯漱
效或無痰火等疾經候亦調容願不鹹但久無
子或子宮有陰無陽不能生發宜服此氣虛勞請
乃即效或赤白帶下崩漏及血風血氣虛勞請
月即效或赤白帶下崩漏及血風血氣虛勞請
中無所不治真女

蠡斯丸

經補受補者眼七日即交合孕後勿服香附
子白薇半夏白茯苓杜仲厚朴當歸秦苑各附

參各二錢三分右為末煉蜜和九梧子大空心酒
下五錢三分右為末煉蜜和九梧子大空心酒

媛宮蠡斯丸

婦人無子者服之厚朴一兩二錢半具
菜萸白茯苓白芍白朮石菖蒲白附子



桂心人參淡藥各一兩細辛香當歸酒浸牛膝
酒徒各七錢半右為末蜜丸小豆大酒下二
一丸名王子日修合

百子附歸丸 久服有孕及治月水參差不調四製香
熟地黃阿膠珠陳艾糊葉各二兩右為末用石搗心
投連皮搗碎煎水打糊連中

琥珀調經丸 治婦人胎冷無子能令經正香附米
為度艾四兩芎藭白芍藥熟半生辛波藥內同煮乾
爭入川芎當歸芍藥熟半生辛波藥內同煮乾

琥珀調經丸 治婦人胎冷無子能令經正香附米
為度艾四兩芎藭白芍藥熟半生辛波藥內同煮乾

加味養榮丸 治經閉下血胎前胎動胎漏常服可無
大琥珀百兩空經心以笑醋糊和九梧子

黃芩香附子各一兩半陳皮貝母白茯苓麥門冬
各一兩阿膠七錢甘草五錢黑豆炒去皮四十九
或鹽湯下末蜜丸梧子大空心溫酒

加味益母丸 芍藥木香各二兩右為末蜜丸加當歸赤
百兩陽下

濟陰丹 治婦人久冷無子及數經墮胎皆因衝任虛
冷六疾皆令孕育不疾無子絕嗣亦治產後百病
令入有孕各四兩入參實至絕嗣亦治產後百病

地黃澤蘭各二兩當歸桂心乾薑細辛牡丹皮川芎各
甘草各二兩當歸桂心乾薑細辛牡丹皮川芎各

藥各七錢半香白茯苓京墨燒桃仁各一兩川椒山
末煉蜜和勻兩作炒六九并一大豆黃卷炒半升右為

九細當溫酒或醋湯送下

勝金丹 治月水愆期久無嗣息及血癖氣痛百般諸
疾壯丹皮藥本入參當歸白茯苓赤石脂白

勝金丹 治月水愆期久無嗣息及血癖氣痛百般諸
疾壯丹皮藥本入參當歸白茯苓赤石脂白


勝金丹 治月水愆期久無嗣息及血癖氣痛百般諸
疾壯丹皮藥本入參當歸白茯苓赤石脂白

勝金丹 治月水愆期久無嗣息及血癖氣痛百般諸
疾壯丹皮藥本入參當歸白茯苓赤石脂白

勝金丹 治月水愆期久無嗣息及血癖氣痛百般諸
疾壯丹皮藥本入參當歸白茯苓赤石脂白

勝金丹 治月水愆期久無嗣息及血癖氣痛百般諸
疾壯丹皮藥本入參當歸白茯苓赤石脂白

勝金丹 治月水愆期久無嗣息及血癖氣痛百般諸
疾壯丹皮藥本入參當歸白茯苓赤石脂白



並肉桂白薇川芎玄胡索白芍藥白朮各一兩
香甘草各五錢右為末蜜丸彈子大每一丸空
溫酒下服二

調經種玉湯

治婦人無子多因七情所傷致經水不
能受孕熱地黃香附子炒各六錢
當歸身酒洗具柴芎各四錢白芍藥白茯苓
陳皮玄胡索牡丹皮黃芩各三錢官桂熟艾各
二錢右到分作四服走日每貼藥盡交燻必成孕
待經至之日服走日每貼藥盡交燻必成孕矣

此藥百發百中
四春無薑桂艾三味

先天歸一湯

當歸身酒洗具柴芎各四錢白芍藥白茯苓
陳皮玄胡索牡丹皮黃芩各三錢官桂熟艾各
二錢右到分作四服走日每貼藥盡交燻必成孕
待經至之日服走日每貼藥盡交燻必成孕矣

神仙附益丹

後煎空服藥盡即效
浸香附米一石童便透水洗宿
再露再晒如童便透水洗宿
再露再晒如童便透水洗宿

宿晒乾為末益母草十二兩東流水洗淨
醋七分和煎不惟治婦人百病而生育之功
下七十九不惟治婦人百病而生育之功

調經養血元

白芍藥酒炒生乾地黃酒洗牡丹皮酒洗各二兩
川芎白茯苓白芍藥酒炒生乾地黃酒洗牡丹皮酒洗各二兩
夏草炒阿膠珠各一兩玄胡索六錢蓬朮煨醋炒
甘草炙各五錢商香炒二錢右為末醋糊丸九

溫經湯治逾任虛損月事不調或前或後或多或少
停留唇口乾燥五心煩熱小腹痛久不孕胎
胎腫一名調經散散紅一名大溫經湯

一方

男子陽旺則能直射子宮種子之仙方也又治
男子精冷無子免緣子酒浸煮釀細末雀卵清

男子精冷無子免緣子酒浸煮釀細末雀卵清



又方

肉久食令人有子。男子無嗣者，多灸臍中。

胎孕

九欲求嗣，必先視其婦之經脈調否。其或未調，必

行時子宮正開，乃受孕。結胎之候，妙合太極之時。

過此佳期，則子宮閉而不孕。胎氣既成，日六日行會。

者，或女過此則不孕。亦要在子時後方可也。亦

有棉人血旺氣盛，六七口淨者，三日而淨者，亦

顏面何如耳氣，或綿或帛夾之，于戶

口取而目之，全色者佳。期也，鮮紅者未淨，不及也。

佳期此時交合無不成矣。精血則為女子，乃四日血

後始淨一日，身生謂之神。又謂之精道，與釋人門謂

相薄六先身是也。欲求子者，如待婦人，二月經

絕後一辛冬，壬癸以生。氣時夜半後，乃施有子。

皆男必辛冬，壬癸以生。氣時夜半後，乃施有子。

過六日後勿為。施有子必女。

陰陽交合避忌

九男女大當避丙丁日及弦望晦朔

震天晦冥日月薄蝕虹霓地動則損人神，大霹

損男百倍，多病短壽。不孝仁又避日月星辰火

光之下，神廟佛寺之中，井竈厠之側，塚墓尸柩

降之傍，胎中不可行交。合道有福德，大如善則

成福惡人來託胎，中令性行凶險，所作不



十月

養胎少婦人懷胎一月之時足厥陰脈養○二月少

陽脈養○五月足太陽脈養○六月明脈養○九月

三少陰脈養○十月足少陰脈養○胎前

乳汁活兒養母○四時之令始于春木故胎養始

於肝膽也○胎前婦人不可交刺其母之血室方開

一月父之精潮旋至胎不覺如蟻如布袋絞紐而精血

乘衝氣自旋九日如蟻如布袋絞紐而精血

黃相與雞子黃漸厚如米飲豆漿面入自結二

皮中窠衣初薄漸厚如米飲豆漿面入自結二

然疑成九粒如九珠然乃七日即成一月之數一窠自

水謂之胎一月之數一窠自

稍異平日不可觸犯及輕率服藥

二月

足少陽脈養胎又三九二十七日期二月數此

三月

手少陰脈養胎又三九二十七日期二月數此

四月

足太陽脈養胎又三九二十七日期二月數此

五月

足少陰脈養胎又三九二十七日期二月數此

六月

足太陽脈養胎又三九二十七日期二月數此

安胎

以成血脈三焦像胎是月男已分始受水精

五月

足少陰脈養胎又三九二十七日期二月數此

六月

足太陽脈養胎又三九二十七日期二月數此

安胎

以成血脈三焦像胎是月男已分始受水精



七月

手足太陰肺脈養胎始受木精以成

八月

形骸漸長九竅皆成遊胎受土精以成皮膚

九月

足少陰腎脈養胎始受石精以成

十月

天地氣於丹田使關節入神皆備待時而生

惟手少陰心脈養胎受氣足五藏六府齊通納

而貧賤而天一生貴子門

娠

月而產必生貴子門

搖也搏謂搏綱於手也尺脈搏擊與寸口殊別陽

中氣挺然不為有娠之兆者胎中不止者是胎也

按之脈不重以手按之散者五月也○已三月也胎重

况正等按之無絕者娠也○細者死○娠婦脈細

驗胎法

氣散難產續三個月經不行疑是兩身却疑血帶心煩

神方驗胎散用七錢右二味細末分作二服濃煎好

艾醋湯

艾醋湯必有神效

辨男女

核是男右乳房起者女也○如覆盂者則男也如肘

艾醋湯

艾醋湯必有神效

辨男女

核是男右乳房起者女也○如覆盂者則男也如肘

艾醋湯

艾醋湯必有神效

辨男女

核是男右乳房起者女也○如覆盂者則男也如肘



之。物妊惡食但必愈思
陳湯婦人月事不行全不入食日就瘦弱全似靈

陳湯勞然而穀雖不入果百雜物常喜也但二
陳湯有孕誌而謂謂孕婦便入薑棗烏梅煎服消痰順氣自

陳湯安平縮砂括梗入薑棗烏梅煎服消痰順氣自
皆用半夏豈不知此而論半夏動胎而不用仲景方

董製炒黃用之未嘗動胎
董製炒黃用之未嘗動胎

參橋散治惡阻病嘔吐痰水全不入食橋皮赤茯苓
參橋散各一錢半麥門冬白木厚朴入食橋皮赤茯苓

白朮散治惡阻吐清水十餘日藥不入白朮五分
白朮散治惡阻吐清水十餘日藥不入白朮五分

保生湯治婦人月經不行身無病似病脈滑大而六
保生湯治婦人月經不行身無病似病脈滑大而六

半夏茯苓湯治惡阻病嘔吐心煩頭目眩暈惡聞食
半夏茯苓湯治惡阻病嘔吐心煩頭目眩暈惡聞食

苓連半夏湯治惡阻病胃脘痛黃芩一錢二分半
苓連半夏湯治惡阻病胃脘痛黃芩一錢二分半

歸元散治惡阻全不入食白朮當歸芍藥皮各一錢
歸元散治惡阻全不入食白朮當歸芍藥皮各一錢

竹茹湯治惡阻青竹茹麥門冬各一錢前胡二錢
竹茹湯治惡阻青竹茹麥門冬各一錢前胡二錢

陳皮當歸白朮半夏茯苓湯治惡阻病胃脘痛黃芩一錢二分半
陳皮當歸白朮半夏茯苓湯治惡阻病胃脘痛黃芩一錢二分半

草各五分枳梗一錢入參白芍藥川芎各七分右到作
草各五分枳梗一錢入參白芍藥川芎各七分右到作

入薑五錢五分枳梗一錢入參白芍藥川芎各七分右到作
入薑五錢五分枳梗一錢入參白芍藥川芎各七分右到作



一方一婦孕兩月嘔吐甚此氣未可甘陳皮痰也

宜服之果發肝氣既通左為胎氣參朮煎惡阻也

禁酒及孕後調藥限酒散百胎致成諸疾止用

水煎服為好酒宜避之經云刀犯者忌胎所犯

相拘寧甚打擊者青黥繫縛者

飲禁食驢馬肉過月難產食無鱗魚雞肉

食鰾蟹令食兔肉令食牛肝令食鴨肉及卵令

雀子斑食薑肉令食項肉令食多無取或生

鹽胎食葷菜胎氣食黏芽消胎氣食薑菜

食山羊肉令子驚風而食諸

藥物禁忌與天雄野葛水蛭及虫烏頭附子

連蜈蚣三棱代硝壯丹掛麝香大戟純乾黃雌

同半夏南星與通草犀角乾薑甲爪忌藥

砂龍漆無飛仁地膽茅狼莫用好和又忌藥


子犀角皮鬼箭羽擣雞馬刀衣魚大養神麩藥

娠龍鱗蛇皮鬼箭羽擣雞馬刀衣魚大養神麩藥

姓將理法衣毋太溫勿食無太飽飲無大醉高

胎漏胎動胎漏謂有胎而血漏下也屬氣虛有熱因物

也艾少許加糯加阿膠服葉救之下胎者漏胎動



東醫寶鑑卷之九
杜續丸 治胎動不安腰痛以此防其發墮
杜續丸 治胎動不安腰痛以此防其發墮
杜續丸 治胎動不安腰痛以此防其發墮

五七十

當歸地黃湯 治胎痛熱地黃四錢當歸二錢
當歸地黃湯 治胎痛熱地黃四錢當歸二錢

安胎散 治因驚胎動腹痛下血熱地黃三錢川芎枳
安胎散 治因驚胎動腹痛下血熱地黃三錢川芎枳

二水煎

安胎飲 治胎動不安五六箇月常服數貼甚妙
安胎飲 治胎動不安五六箇月常服數貼甚妙

所陳皮各一錢川芎紫蘇葉各八分甘草四分
所陳皮各一錢川芎紫蘇葉各八分甘草四分

生胎者降火也縮砂安胎者行氣也若血虛而胎
生胎者降火也縮砂安胎者行氣也若血虛而胎

不安
主之

黃芩湯 治胎動不安黃芩白朮縮砂當歸
黃芩湯 治胎動不安黃芩白朮縮砂當歸

內補丸 治衝任脈虛補血安胎熱地黃二兩當歸一
內補丸 治衝任脈虛補血安胎熱地黃二兩當歸一

九七
轉十

獨聖散 治因墮落傷損致胎動不安腹痛不可忍
獨聖散 治因墮落傷損致胎動不安腹痛不可忍

不飲酒者米飲調下覺腹內極熱胎已安矣神效
不飲酒者米飲調下覺腹內極熱胎已安矣神效

行氣安胎也
知母丸 治推娠子日月未足而孕產者腹痛知母為末
知母丸 治推娠子日月未足而孕產者腹痛知母為末

時
生地黃粥 治胎漏糯米二合煮粥臨熟入
生地黃粥 治胎漏糯米二合煮粥臨熟入

葱粥 治胎動不安腰疼搶心或下血葱白
葱粥 治胎動不安腰疼搶心或下血葱白

葱白湯 治胎動不安腰疼搶心或下血葱白
葱白湯 治胎動不安腰疼搶心或下血葱白

葱白湯 治胎動不安腰疼搶心或下血葱白
葱白湯 治胎動不安腰疼搶心或下血葱白

葱白湯 治胎動不安腰疼搶心或下血葱白
葱白湯 治胎動不安腰疼搶心或下血葱白



佛手散一名立效散治胎動不安腹痛等症

一方古方治胎動不安一月用烏雞汁入藥煎服

又方孕婦為夫所困胎動氣欲

又方孕婦為夫所困胎動氣欲

半產墮胎乃血氣虛損不能榮養而自墮者視子蒲黃等

胎源乃謂其木入折其枝也火能消物造化大抵

胎源乃謂其木入折其枝也火能消物造化大抵

胎源乃謂其木入折其枝也火能消物造化大抵

胎源乃謂其木入折其枝也火能消物造化大抵

胎源乃謂其木入折其枝也火能消物造化大抵

白扁豆散治毒藥攻胎藥毒補心口驚悸等自汗不

新汲水調下二三錢即

芩朮湯治懷孕四五月常墮不安者內熱甚故也子

三五服發則五日十日一服安胎易產所生之兒



又無胎毒蓋孕脾主運化遲帶則生濕濕則胎生
熱故以黃芩清熱以養血白朮健脾以燥濕安胎生
九金匱當歸散皆
此方而推之也
安胎九 梧子大白湯米湯材為末粥九
胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九

安胎九

歸當歸散 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九

五味安胎丸

五味安胎丸 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九

芎歸補中湯

芎歸補中湯 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九

安樂湯

安樂湯 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九

千金保胎丸

千金保胎丸 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九

子米飲

子米飲 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九

陳皮各五錢

陳皮各五錢 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九

二兩當歸酒

二兩當歸酒 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九

此藥胎孕至此

此藥胎孕至此 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九

養胎孕至此

養胎孕至此 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九 胎九



真醫寶鑑卷之八

和痛湯治小產心腹痛當歸川芎芍藥酒炒熟地

貼皮各八分桃仁紅花各五分右剉作一

一方四婦人每懷至三箇月紅藥小黃米者臻食之

又方未渴調黃芩末一錢服三四貼遂得保全蓋

脈法少陰脈浮而緊則沉痾腹中痛半產而墮

卒墮胎此非時孤漿預下故也胎漏者徐徐下水

察色驗胎生死胎動不安甚者當以母形色察之

欲產候此是兒轉蓋腎繫於腰胞繫於腎故腰痛中火

脈法歌曰欲產之婦欲產之婦欲產之婦欲產之婦

欲產候此是兒轉蓋腎繫於腰胞繫於腎故腰痛中火

脈法歌曰欲產之婦欲產之婦欲產之婦欲產之婦

欲產候此是兒轉蓋腎繫於腰胞繫於腎故腰痛中火

脈法歌曰欲產之婦欲產之婦欲產之婦欲產之婦

欲產候此是兒轉蓋腎繫於腰胞繫於腎故腰痛中火

脈法歌曰欲產之婦欲產之婦欲產之婦欲產之婦

欲產候此是兒轉蓋腎繫於腰胞繫於腎故腰痛中火

脈法歌曰欲產之婦欲產之婦欲產之婦欲產之婦

欲產候此是兒轉蓋腎繫於腰胞繫於腎故腰痛中火

脈法歌曰欲產之婦欲產之婦欲產之婦欲產之婦



保產

呼三至日離經一呼一
胎切絕轉珠者即產日
如沉細而滑陣痛連腰
難產之婦皆大不可生
生滑胎等藥又不可坐
幸苦者無有也古方有
主作也以其奉養而氣
觸非去之論也一婦人
觸而男之快因名紫蘇
能轉動行甚舒伸忍痛
以欠日動以動有橫逆
以恐難產紫蘇飲則無
以母腹中如愛覺自能
頃備忽如愛覺自能

瘦胎

胎內養兒之水也若胎
漿而下故易產也其因
汚血閉塞道路是以難
退散三六一散免胎元
端散臨產不可喧閑且
行若不進則生藥待兒
坐草且進坐宜用露丹
易產吐沫者宜用露丹
口禁吐沫者宜用露丹
令易產者宜用露丹
而佛手散益母丸縮胎
散佛手散益母丸縮胎
易產者宜用露丹

連散

一錢人參陳皮紫蘇葉枳殼
一貼入青蔥五葉水煎服
孕婦臨月服二十餘貼
易產無病大腹皮酒



一母九名縮胎飲

瘦胎散 二錢白湯服 胎散 或香附一兩 胎散 或香附一兩 胎散 或香附一兩

救生散 名滑胎散 婦人肉神麴麥芽白朮搗紅各等分 右倉末

佛手散 煎服 每三錢水 煎服 每三錢水 煎服 每三錢水

益母丸 入酒少許 再煎服 益母丸 入酒少許 再煎服 益母丸 入酒少許 再煎服

縮胎丸 兩陳皮 三兩 右為末 縮胎丸 兩陳皮 三兩 右為末 縮胎丸 兩陳皮 三兩 右為末

東胎丸 子大 白朮 三兩 右為末 東胎丸 子大 白朮 三兩 右為末 東胎丸 子大 白朮 三兩 右為末

神寢元 練蜜 九 子大 白朮 三兩 右為末 神寢元 練蜜 九 子大 白朮 三兩 右為末

十產候 橫產 五日 逆產 六日 偏產 七日 礙產 八日 盤腸

正產 臨產 下藥 水 數 已 滿 忽 然 腹 陣 痛 胎 生 娘

坐產 當於 高處 懸 吊 手 巾 令 產 婦 攀 引 輕 屈 足



兒
生
娘
即
順

卧

横

曲則兒不其道自然易產娘
收生先露手或臂者治法當令直上冲通手以
中指摩其肩推上而正之漸引手攀其耳令頭正
候兒身正門路順却服催生藥安詳上草自蒸易

逆

逆產者先露足橫產者先露手坐產者先露臀
皆用力太早之過也若手足先露者用細鐵刺
兒手足心入一二分三四次刺生心因急
輕送之入胎痛急以語陰兒脚生
者謂之臨盆花急以語陰兒脚生
撮之併以論摩腹上則自然生矣
偏

偏

即兒下○又有兒後骨偏杜囊道者當以綿衣
露額角者治法令兒頭端正向產門輕推
兒頭偏柱一傍雖通近產門初非露正頂止
撮之併以論摩腹上則自然生矣
者謂之臨盆花急以語陰兒脚生
輕送之入胎痛急以語陰兒脚生

礙

火令熱暑手急於道外傍徐推之
漸近上令頭正然後上草即產節
產兒轉雖正產門已露其頂致不能生
產母仰收生之臍帶輕推兒身正順用力一送
中指按兒兩肩理脫臍帶候兒身正順用力一送

盤

謂孕婦胎產時子腸先出兒即隨產治法頂
上貼如聖膏防見自然收縮即水洗去如
腸頭為風吹乾不能收入以磨刀水微溫調湯煎
好湯石錫一盃產母飲之則言安慰却用好醋半
溫新以水七分調和忽誤產母之面或背則收每
蓋新以水七分調和忽誤產母之面或背則收每
縮一已縮三矣
一盤三矣

熱

臨產時當盛夏宜居深幽靜室日色遠處開
陰處冬多貯清水照房內外生火常令煖
產時當盛夏宜居深幽靜室日色遠處開
陰處冬多貯清水照房內外生火常令煖

凍

謂嚴冬仍厚覆下體常使溫和免致難產
氣如春仍厚覆下體常使溫和免致難產

凍

謂嚴冬仍厚覆下體常使溫和免致難產
氣如春仍厚覆下體常使溫和免致難產



傷產 傷產者過月而產有經一二年至三四五年而

用勝金散或新級水磨京

產 產之日久產母困倦宜服

交骨不開難產 難產垂死及錢石女子交骨不開者用

湯丸產時交骨不開者陰虛也亦用加味芎歸湯

服便令勝骨軟

催生如聖散 治難產及漏血胎乾者立效黃蜀葵子

歌曰一方用蜀葵子炒百餘粒研爛酒調濟寒急若患

全胎難產時得

催生丹 治產難及攪產逆產臘月兔腦一箇取髓去

錢齋香二分半右拌勻和丸雞頭實大伸茨陰乾
油紙裹每取一九溫水磨化服即產隨男左女右
手握藥出是驗
須臾日合妙

神效乳珠丹 研細取豬心血和九芟實大朱砂為衣

端乾每九除夜收令下再服

如神散 治產難退一名神驗散

生男右足者生女覆者兒死則者

二退散 治產難退一名神驗散


有驚自然理也一名神驗散

三退散 治產難退一名神驗散

燒存性為末分二服酒調下

三退六一散 治產難退一名神驗散





兔腦丸

五枚穿山甲一片右各燒存性為末用薑水煎
 二辨入錢及調服立下門一名滑胎散
 治產難日久血乾宜用此滑之臘月免腦髓
 香二錢為衣油紙裹陰乾每丸未醋湯化下即產男
 朱砂為衣油紙裹陰乾每丸未醋湯化下即產男
 左手女右手握

龍蛇散

龍蛇散催生後傳蟬退一兩大蛇蛻一條並燒存性
 藥出是驗

黑神散

黑神散治產難及橫逆產九坐草日又漿水多下後
 不可使熱湯調服
 草霜白芷各等分右為末每服二大錢清酒童便
 各半盞入麝香少許外用葱白二斤搗爛於小
 腹上取急服此藥後一斗炒熟布裹於葱上輕
 器探即產

明

黑龍丹

黑龍丹治產難及死胎不下胎衣不下產後兒疝疔
 活神驗不可言五靈脂當歸川芎良薑熟地黃各
 一兩右剉碎磁砂盆紙筋鹽泥固濟炭一斤煨候冷
 取出如百草霜三錢研黃乳香各一錢半花藥
 石散瑛珀各一錢右研細末醋麩糊和九彈子大
 每丸一錢入薑汁童便溫酒中研服之
 靈脂當歸川芎良薑石各一錢製法同上
 內益泥固濟火煨百草霜一兩研黃乳香
 各二錢琥珀花藥石各一錢製法同上

催生散

催生散治產難未芎歸湯煎水調下二三錢等分
 勝金散治產難及橫逆產益鼓一兩以青布裹了燒
 存性入麝香一錢右未秤錘燒紅淬酒調下

霹靂丹

霹靂丹治臨產暴然氣爽目翻口紫面黑唇青口中
 味出于母俱項兩臉微紅子死母活急用此



東醫圖書集成

救之蛇退一條委退紙並燒存性各二錢男子頭

發燒灰路上左脚草鞋燒存性各一錢乳香五分

黑鉛二錢羊水銀七分半二物入鉊中火上熔化

結砂子研細右為末以黃指心血和九梧子大金

箔為衣每取二三九箇流奪命丹如

下化開灌之即一名霍亂奪命丹如

龜殼散治產難日久垂死及錢石女子交骨不開者

考當歸各一兩右為末每三錢

水煎服良久生胎死胎恨下

來甦散治臨產用力太過氣衰脈微精神昏暈口紫

膠白芍藥各一錢神麴陳皮麥芽黃芪阿

加味芎歸湯治臨產交骨不開難產

催生宜用滑利藥凡催生多用滑利迅速之藥如兔腦

尿糞子牛乳滑石榆白皮之類是也。若風冷或

水血多下子道乾澀者如猪脂香油蜂蜜酒童

八氣血凝滯者牛膝蔥白桂心生薑之類是也。

若觸犯惡氣心煩躁悶而難產者宜麝香朱砂乳

香兒不得下類是也。難產日久變水調滑下石

未一兩攪服之分以油蜜牽母臍腹上即發。白

油蜜童尿和服最治難產和益母膏尤妙。搗白

皮湯亦

榆白皮湯治產難乾不下榆白皮冬葵子瞿麥各

二錢牛膝乾杏仁去殼各一錢半木通一錢

水煎服一貼

穰法口則易產勿令產母知。臨產取赤馬皮鋪之

外貼法全九難產催生內服湯丸外用藥付貼庶有十



如神丹

巴豆三枚單麻子七粒並去接入麝香少許
 捏作餅于貼臍中分產即溫湯洗去歌

如聖膏

治難產及死胎不
 下十粒急者巴豆
 同

立聖丹

治橫逆產惡候
 及死胎不
 下十粒急者巴豆
 同

遇仙丹

治法同上單麻子
 十四粒去殼朱砂雄
 黃各

下死胎

須參考上驗胎生
 死條治之胎死則
 母舌必

佛手散

治胎傷心腹痛
 口紫欲絕用此探
 之胎不損

香桂散

下死胎桂心三錢
 麝香半錢右為

桂香丸

下死胎肉桂一兩
 麝香一錢右為

馬金散

治胎傷心腹痛
 口紫欲絕用此探
 之胎不損

佛手散

治胎傷心腹痛
 口紫欲絕用此探
 之胎不損

香桂散

下死胎桂心三錢
 麝香半錢右為

桂香丸

下死胎肉桂一兩
 麝香一錢右為

馬金散

治胎傷心腹痛
 口紫欲絕用此探
 之胎不損

佛手散

治胎傷心腹痛
 口紫欲絕用此探
 之胎不損

香桂散

下死胎桂心三錢
 麝香半錢右為

桂香丸

下死胎肉桂一兩
 麝香一錢右為

馬金散

治胎傷心腹痛
 口紫欲絕用此探
 之胎不損

佛手散

治胎傷心腹痛
 口紫欲絕用此探
 之胎不損

香桂散

下死胎桂心三錢
 麝香半錢右為

桂香丸

下死胎肉桂一兩
 麝香一錢右為

馬金散

治胎傷心腹痛
 口紫欲絕用此探
 之胎不損

佛手散

治胎傷心腹痛
 口紫欲絕用此探
 之胎不損

奪命丸

服之可下或胎動胎氣未損服之可安胎已死

赤茯苓三丹皮赤芍藥仁各等分蜜丸一實大
即仲景方桂枝茯苓丸也治婦人宿有癥病而孕
胎及三月而漏血不止胎動在臍上故知是癥害姓
娠九胎動多在當臍今動在臍上故知是癥害姓
下其癥宜用桂枝茯苓丸

烏金散

胎死難產胎乾則進此藥後更進香桂散即下

一方

死胎不下取烏雞一隻去尾細剉水三升煮取
如聖膏塗胎右腳心上即出胎見

胞衣不下

血所脹上衝心胃喘急疼痛必致危篤宜為

入胞中則胞衣自當棄縮而下縱淹延數日亦不
害人有驗○因○而○胞衣不損或破血流入衣中為血疔脹
謹取取○兒之○初生惡血流入衣中為血疔脹
塞故不能見○須臾衝上逼心即死急服奪命丹貼
如聖膏塗胎見○須臾衝上逼心即死急服奪命丹貼
魂丹功見一字神散逐

奪命丹


治產後血入臍衣脹滿衝心日久不下危急

花藥石散

胎衣不下惟花藥石散最為要緊若胎衣

牛膝湯

治產後胎衣不下或胎動胎氣未損服之可安胎已死



冬葵子二錢右剉
作一貼水煎服稠

三退飲治胎衣不下神效
此方神效退一併燒存性為未順流水

一字神散治胎衣不下
此方神效退一併燒存性為未順流水

一方治胎衣不下
此方神效退一併燒存性為未順流水

一法化溫分二服
此方神效退一併燒存性為未順流水

一法化溫分二服
此方神效退一併燒存性為未順流水

一法化溫分二服
此方神效退一併燒存性為未順流水

一法化溫分二服
此方神效退一併燒存性為未順流水

一法化溫分二服
此方神效退一併燒存性為未順流水

一法化溫分二服
此方神效退一併燒存性為未順流水

產前諸證有子痲子煩子腫子赤子刺子疔子瘰子癰
此方神效退一併燒存性為未順流水

子痲子煩子腫子赤子刺子疔子瘰子癰
此方神效退一併燒存性為未順流水

子痲子煩子腫子赤子刺子疔子瘰子癰
此方神效退一併燒存性為未順流水

子痲子煩子腫子赤子刺子疔子瘰子癰
此方神效退一併燒存性為未順流水

子痲子煩子腫子赤子刺子疔子瘰子癰
此方神效退一併燒存性為未順流水

子痲子煩子腫子赤子刺子疔子瘰子癰
此方神效退一併燒存性為未順流水

子痲子煩子腫子赤子刺子疔子瘰子癰
此方神效退一併燒存性為未順流水

子痲子煩子腫子赤子刺子疔子瘰子癰
此方神效退一併燒存性為未順流水

子痲子煩子腫子赤子刺子疔子瘰子癰
此方神效退一併燒存性為未順流水

子痲子煩子腫子赤子刺子疔子瘰子癰
此方神效退一併燒存性為未順流水



子腫

平婦因胎中有水多於五六箇月以致遍身浮腫
眼脹喘急或腹大異常高過心胃氣逆不安若不
治必損其胎宜用鯉魚湯因常食鯉魚粥又茯苓
湯防已湯全生白朮散亦腫至膝腿足或頭面不腫兩脚
微浮甚則自脚腫平胃散助瀨加赤茯苓桑白
謂之子氣亦曰腫脚平胃散助瀨加赤茯苓桑白

皮煎服

鯉魚湯

治子腫白朮赤茯苓各二錢白芍藥當歸各
一錢半橘紅五分右剉作一貼先取鯉魚一
箇修事如食法水者取清汁一盞半入藥又薑
七片煎至一盞空心溫服以水盡腫消為度糖

茯苓湯

治子腫當歸川芎芍藥冬厚朴甘草各七
分右剉作一貼薑
五分右剉作一貼薑

防已湯

治同上桑白皮赤茯苓紫蘇葉各二錢防已
一錢半香白皮五分右剉作一貼入薑五片水
煎服

全生白朮散

治同上白朮一兩生薑皮大腹皮陳皮
茯苓皮桑白皮各五錢右為末每二錢
米飲調

一方

治子腫山栳子仁炒為末每一錢米飲調服不
拘時服

子淋

子淋又謂之子滿宜譚馮湯安榮散地膚子湯葵
子茯苓散忘憂散或芎歸湯時見加木通麥門冬
人參燈心甘草臨月加滑石煎服
胎氣受弱者憂悶者性急躁食味厚者大
率有之因思胎者為胎所壓轉在一邊胎系水厚者
通耳胎若舉起懸在中央胞系得疎則水道自行
宜用參朮飲空心煎飲隨以指捺吐候氣定又換
不得小便立通

澤瀉湯

治子淋澤瀉桑白皮赤茯苓枳殼檳榔木通
各一錢半右剉作一貼入薑五片空心煎服



安榮散

治同上入參川芎麥門冬木通滑石當歸燈

地膚子湯

治同上地膚子車前子各一錢升麻通草

甘草各七分右剉

葵子茯苓散

治孕婦小便不利冬葵子赤茯苓各

忘憂散

治孕婦一握煎湯調下

參朮飲

治孕婦參朮半煎飲後探吐

作一貼入薑三小水煎飲後探吐

一方

治轉胎閉下立通

一法

治轉胎閉下立通

孕婦倒豎起
尿自出亦妙

子嗽

紫菀湯治外感風寒久嗽不止謂之子嗽宜

紫菀湯

一貼入竹茹雞子大水煎去

百合散

治子嗽百合一錢甘草五分右剉作一貼入薑

馬兜鈴散

治子嗽氣壅喘急陳皮大腹皮桑白皮紫

天門冬飲

治子嗽天門冬紫菀茸和母桑白皮各一

煎服

錢半五味甘草各七分半右剉

煎服

錢半五味甘草各七分半右剉

煎服

錢半五味甘草各七分半右剉



子劑

一方 治子嗽貝母去心炒黃芩未以砂糖
肩拌和作八櫻挑大常用舍化神效
子劑 治赤白腹中疝痛急後重名曰子劑宜
當歸芍藥湯 白芍湯 雞黃散 鴉子煎 姪泄瀉
宜用詞木 散大寧散

當歸芍藥湯

治子痢白芍藥白木各一錢半當歸白
茯苓澤瀉條苓各一錢木香續狗黃連
甘草各七分右到作一貼水煎服

白木湯

治子痢白木當歸黃芩
各三錢右到作一貼水煎服

雞黃散

治子痢烏雞內厚紙出清留黃黃丹一錢
研為末右每取二錢米飲調下
服愈者是男二服愈者是女

鴉子煎

治同上生薑年少者百錢年老者二百錢搗
取自然汁鴉子一箇打破入薑汁內攪勻右
煎五七沸空心溫服立效

訶木散

治泄瀉由食生冷當風涼所致訶子皮
白朮各一錢半陳皮良薑木香白馬藥酒炒
肉豆蔻煨甘草各一錢右

大寧散

治五粒鴉子赤白或泄瀉腹痛垂死者黑豆
半生半炒右為倉末都作一貼
八薑三片同煎空心服之效

子瘧

治子瘧寒熱往來謂之神效
飲子露薑飲熱往來謂之神效
醒脾飲子 治子瘧寒熱往來謂之神效

驅邪湯

治姪感冷發瘧良薑白朮草果橘紅藿香
入薑五片棗二
按水煎服

濟生石膏湯

治姪熱瘧渴飲無度石膏二錢生地
黃一錢半黃芩麥門冬入參知母乾葛



各一錢甘草五分右剉作一貼入烏梅一箇同煎服

子懸

難婦胎氣不和逆上心胃脹滿赤痛

紫蘇飲

治子懸及胎產驚惶氣結難產最妙紫蘇葉

葱白湯

治子懸葱白二莖水煎服

感寒

孕婦傷寒症前安胎產後補血為主治法無犯胃

氣及上二焦為三柴胡湯不可汗不可下不可利小便也但當和解少柴胡湯主之欬呢一名三禁湯

芎蘇散

川芎紫蘇葉白芍藥白朮麥門冬陳皮乾葛

黃龍湯

治孕婦感寒寒熱如瘧柴胡四錢黃芩

保安白朮散

治孕婦傷寒安胎白朮黃芩各等分剉

葱白湯

治孕婦傷寒當發散宜用此葱白十莖

孕婦不語

內經曰人有重身九月而產此為何病岐伯

脈貫腎繫舌本故不能言無治也當十月復註曰



物湯鈞時時呼服心火下降肺金自清則能言矣

兒在腹中哭

兒在腹中哭者因妊母登高取物跌出兒口以此作聲也令妊母由腰向地拾物使兒復得含入口中則其聲即止。一方黃連濃煎汁令母呼康亦止。一又方多年空屋下鼠

孕婦腹中鐘鳴

孕婦腹中鐘鳴者因酒服或乾噙之即止。產後諸證有兒枕腹痛血暈妄崩血帶或逆產後下乳汁產後陰脫產後驚胃產後風熱產後頭痛產後心腹腰痛胎產後疝痛產後瀝遺尿產後

兒枕痛

兒枕痛者胎側有成形塊作痛不可忍乃血瘀也宜用敗血不下則戒塊作痛不可忍乃血瘀也宜用

失笑散 治產後兒枕腹痛欲死百藥不效五靈脂

紫金丸 治產後兒枕痛不可忍當歸一兩玄胡索

三聖散 治產後兒枕痛不可忍當歸一兩玄胡索

起枕散 治兒枕痛極苦當歸白芍藥各二錢川芎

立效散 治兒枕痛五靈脂炒為末每二錢溫酒調下

立效散 治兒枕痛五靈脂炒為末每二錢溫酒調下

立效散 治兒枕痛五靈脂炒為末每二錢溫酒調下

立效散 治兒枕痛五靈脂炒為末每二錢溫酒調下

立效散 治兒枕痛五靈脂炒為末每二錢溫酒調下



一方治兒枕痛百藥不效鱉蟹一箇燒存性研為末

用團睛蟹一錢白濁調下又大芥燒赤投酒中溫服

產後生花甚者問純口紫神氣冷宜用清魂散

而巳當補血宜用芎歸湯防見有下血少而暈者

當破血行血宜用四味湯散花藥石散吹

清魂散治產後血暈芥穗五分甘草一錢右為末以

奪命散治血暈諸妄談藥血竭各等分右為末每二

四味湯治產後血暈當歸玄胡索血竭各一錢


醋墨法細每五分收醋湯調下即效

一方醋罌其氣細口又乾燥或舊漆器燒烟重鼻即醒

又方治產後忽昏悶不省人事者暴虛故也生雞卵

血崩產後血崩不止是謂重傷宜大劑芍歸湯

考藥煎服救之若小腹痛滿痛是肝藏已壞為難治



TIFFEN Color Control Patches

Color calibration chart with labels: Blue, Cyan, Green, Yellow, Red, Magenta, White, Black, 3/Color.

婦○產後血崩不止因物傷○加蒲黃生地黃
汁○膠薔根陳艾白芷煎服○產時下血過多
老急宜用濟危○血崩宜多散十及九鱈肉冷
補氣養血湯○時下血須更切不可用正風藥
濟危上丹○出胎時命在須臾切不可用正風藥
此乳香硫黃五靈脂太陰玄精石陳皮桑寄生
膠卷栝各等分右將前四石藥研微火炒再研細
方○後四藥為末以生地黄汁和

濟危上丹

此乳香硫黃五靈脂太陰玄精石陳皮桑寄生
膠卷栝各等分右將前四石藥研微火炒再研細
方○後四藥為末以生地黄汁和

補氣養血湯

附子炒結末白芍藥炒艾葉阿膠川芎青皮香
錢右到作砂研甘草炙各一
一方○治產後血崩取木耳及一斤或半斤者燒存性
為末入麝香末一錢煨枳殼末二錢右和勻煎
取一錢以烏梅煎

衄血

衄血不可治急用荊芥散坊見及攘法損○產後氣血
取後口鼻黑起及鼻衄者名曰胃絕肺敗此證
傷調下鼻止

攘法


攘法○取絛線一條并產母頭心處兩
因○下過多紫血暴起難治宜用大劑芎歸湯小
喘嗽○此名孫陽絕陰為難治宜用大劑芎歸湯小
童飲酒各半盞調和煎服○或入參茯苓水煎服
用獨參湯亦可○方視

二母散

二母散○治產後惡露流八肺經咳嗽知母貝母白茯苓
貼水煎服

小參蘇飲

小參蘇飲○治產後敗血入肺面黑發喘欲死者蘇木
錢服



茯苓散

治產後心虛怔忡不安言語錯亂人參當歸
山藥甘草各一錢半遠志茯苓神桂心麥門冬

各七分半右剉作一貼
八薑二棗二水煎服

栝子仁散

治產後訕言妄語皆心血虧久心神不守
所致栝子仁遠志人參麥寄生防風琥珀

當歸熟地黃甘草各半分右剉每五錢先以白羊
心十枚煮汁取二盞乃入藥煎至一盞去渣溫服

傳正

產後發熱

產後血虛熱入血室以致發熱煩躁晝輕夜
重或譫語如見鬼或往來寒熱宜用柴胡四

物湯涼血地黃湯牛黃青帶丸產後發熱有胡
去血過多者脉心虛大無力腹內無痛宜芍藥調

血飲○有惡露不盡者必大小腹有塊介痛宜黑
神散○有傷飲食者當消導○有感冒寒者當發

散○有蒸乳者必眼痛但捏去乳汁自愈胡破
產後曰傷寒熱病必入血室或有痰血宜柴胡破

柴胡防歸湯竹葉防風湯○產後發熱渴宜煎地黃

柴胡四物湯

治產後發熱赤白帶下血室小柴胡
各二錢川芎赤芍藥當歸黃芩各一錢

入參半夏甘草各五分右剉作一湯服

涼血地黃湯

治產後發熱生地黃三錢赤芍藥當歸
川芎各一錢半右剉作一湯服

牛黃膏

治產後入血室一貼赤芍藥當歸
錢半牡丹皮二錢甘草一錢龍腦五分右為

末蜜丸包于大每
一丸并水化下

芎歸調血飲

治產後去血過多以致發熱心煩腹痛
頭暈眼花或口燥神昏當歸川芎白朮

白茯苓熟地黃陳皮便香附烏藥乾薑益母草杜
丹皮甘草各七分半右剉作一貼入薑五葉二煎

雙料

黑神散

治產後惡露不下以致發熱煩躁當歸熟地
黃白芍藥酒炒肉桂甘草熟地各五錢沉香



柴胡破瘀湯

一錢五分 治產後因傷寒熱病入血室或惡露
歸生地黃各一錢 桃仁五靈脂
冬五分 右到作一錢 煎服

柴胡地黃湯

治產後熱入血室 兼瘧疾如見
錢甘草五分 右到作一錢 煎服

柴胡防歸湯

治產後發熱不亡血蓄血傷食
錢川芎一錢 柴胡一錢 防風一錢
各八分 甘草五分 右到作一錢 煎服

竹葉防風湯

治產後傷風頭痛發熱 青竹葉二十四
錢 防風一錢 石膏一錢 炙甘草一錢
各一錢 右到作一錢 煎服

熟地黃湯

治產後虛渴 天花粉二錢 入參麥門冬各
一錢 熟地黃一錢 甘草五分 右到作一
貼 煎服

人參當歸散


治產後亡血生內熱煩渴 當歸熟地黃
人參各一錢 芍藥一錢 麥門冬一錢 桂枝五分
右到作一貼 先以粳米八前藥及薑三棗二再煎服

產後乳脹證詳見

方治產後發熱煩渴 生藕汁飲一升 合生地黃汁
尤妙 詳見

下乳汁

產後乳汁不行 有氣血盛而壅閉 不行者
括酒則宜用通乳湯 是散 豬蹄 狼 下乳汁治法



當參考乳
部用之

玉露散

京脯一錢 下乳汁 桔梗 川芎 白芷 各二錢 赤茯苓 甘草 各一錢 當歸 貼五分 右剉作一

猪蹄粥

取乳一斗 去滓入土 氈通草 漏蘆 各三兩 剉取六升 去滓入葱 豉及

一方

下乳汁 立效 蒿 苜蓿 子 糯米 各一合 右細研 水一 攪勻 入甘草 末一錢 煎 頓服 妙 又

又方

治乳無汁 且多 可取 五兒 臍月 胎尤 佳 乾 母 酒 服 良 諸 服

產後陰脫

產後陰門脫出 蓋努力太過 所致 若脫肛 黃 追腫痛 請水 續續 小便 淋露 宜用 當歸 黃


茂飲外用 研黃烏賊骨 各五錢 五倍子 二錢 半為 未付處 即效 須用 酒炒 黃芪 為君 煎服 外以 摻根 加防風 升麻 須用 酒炒 黃芪 為君 煎服 外以 摻根 白皮 又錢 荊芥 升麻 薤香 各二錢 煎湯 熏洗 患處 除入突 出四物 湯洗 患處 且取 聖齊 坊見 貼頂 上 外以 香油 和湯 洗患 處 且取 聖齊 坊見 貼頂 上 蔥入 乾香 末同 搗成 泥 安於 陰戶 兩傍 舒用 四季 洗又 為末 搽之 門可 產後 玉門 不斂 宜用 硫黃 湯 煎末 吹鼻 作壺 即收 熏熱 盛坐 其中 一食 頃以 魚 煎油 點火 吹藏 以烟 熏母 臍即 上 煨 當歸 黃芪 飲升 府各 二錢 甘草 一錢 右剉 作一 貼水 煎服 日

當歸黃芪飲

升府各二錢 甘草一錢 右剉作一貼水

硫黃湯

治產後玉門不斂 硫黃四兩 吳茱萸 宛絲子 一兩 半蛇床子 一兩 右研 每五錢 水一 批



煎湯乘溫頻熏
洗患處自斂解

陰

脫胎驗二婦人產後陰戶中下一物如合針狀有
片當歸黃芪大料二貼必與氣血弱已收但乾破用升
非如掌大落於席上其婦恐賜破失位予思破此
必可生滿用補拍也肌肉破尚賜破失位予思破此
大劑一響連收三年以復物生加
參百餘貼連收三年以復物生加

又


法臨產驚動用力太過以致育膜有傷陰戶中垂
生薑動則痛若欲先驅引腹痛不可忍以
手微動則痛若欲先驅引腹痛不可忍以
以油乾為度却用熱曲作一尺摺作數層令婦人輕
綉袋兜異油蓋令稍溫付在內線上熏之覺薑冷
又用熨斗火熨之如薑氣已盡又用新者如薑冷
肉線盡一夜中其病全安却再眼失笑散芍歸湯

醫

婦人經水不通而發其汗則鬱冒不知人何也師
曰經水不通而發其汗則鬱冒不知人何也師
裏俱虛故令鬱冒也經血厥立倉公散鬱冒不省發
時方悟名曰鬱冒也經血厥立倉公散鬱冒不省發
不省瞑目無所知蓋因血暴亡心神無所養故也
不省瞑目無所知蓋因血暴亡心神無所養故也
不省瞑目無所知蓋因血暴亡心神無所養故也

產後

風症九產後發熱若舌蹇唇急手足痲痺發死宜愈風散
荆湯如口噤反張延潮者虛宜發表加散豆淋酒
當歸散最妙喉咽產後血虛宜發表加散豆淋酒
後產因虛遇風扶大效針中風治而用發表出汗之
竹瀝一升頻服大效針中風治而用發表出汗之
血然後治痰切加減用之為可
藥入物湯



入成症者
難治門

歸荊湯 治產後風症 荊芥穗微炒當歸身尾各等分 右為末 每三錢豆淋酒調下 門

獨活酒 治產後風症 獨活白鮮皮各五錢 右劉酒後 風症 荊芥穗炒為末 每三錢 煎取一升 皮各二服 門

愈風散 治產後中風 荊芥穗炒為末 每三錢 煎取一升 皮各二服 門

交加散 治產後症 生地黃汁沙生薑滓以生薑汁炒生 地黃汁沙生薑滓以生薑汁炒生

豆淋酒 治產後風症 黑豆一升炒熱乘熱投 每三錢 煎取一升 皮各二服 門

紫湯 治同上 黑豆一升炒熱乘熱投 每三錢 煎取一升 皮各二服 門

防風當歸散 治產後風症 防風當歸各二錢 煎取一升 皮各二服 門

血風湯 治產後風症 白朮茯苓各一兩 芍藥秦朮羌活白芷

各七錢 防風五錢 右以一半為細末 溫酒吞下 五錢 調下 九錢 以一半為末 蜜九 和子 大溫酒吞下 五錢 調下 九錢

產後頭痛 此症多是發熱身痛 頭夜不可便作 感冒治見

或四物湯加柴胡煎服 必效 煙。一用婦產

散見頭項痛與心痛 五錢 煎服 必效 煙。一用婦產

後患頭項痛與心痛 五錢 煎服 必效 煙。一用婦產

產後心腹腰痛 神散後心腹腰痛 全見失散 宜入味

產後心腹腰痛 神散後心腹腰痛 全見失散 宜入味

產後心腹腰痛 神散後心腹腰痛 全見失散 宜入味

產後心腹腰痛 神散後心腹腰痛 全見失散 宜入味



調服

八味黑神散

治產後惡露不盡心胃臍腹撮痛及血暈補黃赤芍藥乾薑肉桂當歸熟地黃甘草各一兩黑石四兩炒右為末右為末右為末右為末

散名烏金

桃仁湯

治產後惡露不行急斷絕腰腹重痛或流水經並炒各三十枚右為末每三錢水一盞煎至六分去滓溫服惡血下即止如有大痛處必作

桃桂當歸丸

治產後惡露方行忽斷絕腰腹重痛或流水經並炒各三十枚右為末每三錢水一盞煎至六分去滓溫服惡血下即止如有大痛處必作

沒藥散

治產後血瘀作痛沒藥三錢蜜炙炒二錢水

養血佐肝丸


治產後左脇脹悶一塊痛卧不着席香皮丹夏油炒白朮炒青皮炒神芎藥酒炒

推氣養血丸

治產後右脇脹悶如弦一餘着入錢草龍睛酒洗六錢三空選木湯下炒各錢

羊肉湯

治產後寒痲也羊肉四兩當歸陳皮各二兩生薑



產後嘔逆

產後腹脹滿悶嘔吐不定此由敗血入脾
胃故不能飲食也宜用抵聖湯香靈丸

抵聖湯

治產後嘔逆惡心不能飲食赤芍藥半夏
煎服

一貼入薑七片水煎服

香靈丸

治產後嘔逆不止丁香辰砂另研各六分五靈
脂一錢右研勻用狗膽或豬膽和丸

以生薑陳皮煎湯
磨化一丸服之

產後淋瀝遺尿

婦人產後不順致傷遺尿無時宜用參
朮膏

後遺尿宜參朮膏
散黃芪芍藥湯

參朮膏

治產後損成淋人參二錢半白朮二錢黃
芪一錢半陳皮挑仁白茯苓各一錢甘草五

分右剉作一貼水煎服
服空心中一症婦因收生者不謹損破尿而致
完診其脈歷甚試與峻補服家木膏至一月而安

茅根湯

治產後淋白茅根四兩白茯苓二兩瞿麥
紫貝五箇石首魚頭中三十錢燈心同煎服亦可

桑螵散

治產後淋數及遺尿桑螵蛸十五箇炒鹿
茸酥炙黃芪各一兩半牡蠣粉入參赤石

脂厚朴各一兩右為末空心以米飲調下二錢
○又桑螵蛸酒炒為末薑湯調以米飲調下二錢

黃芪芍藥湯

治產後遺尿不禁黃芪當歸尾白芍藥
甘草各三分心到作

一貼水煎服
○當歸芍藥散亦可


產後泄瀉

治產後泄瀉惡露不行此餘血滲入大腸為
煎服

○當歸芍藥散亦可

的奇散

治產後泄瀉惡露不行此餘血滲入大腸為
煎服



身圖寶金新亦系

燒存性不得犯油火入麝香少許研為末每取一錢後有三種疾蓄胃則多汗多則大便秘結便難蓋新產血虛多汗致胃燥亡津

產後大便秘結便後不通 宜蘇滿氣急難以及坐卧取麥仁末

酒調效下酒調效下 合神效下合神效下

滋腸五仁丸治產後陰血虛其大便閉澀橘紅二錢半前李仁挑仁各一兩研為膏合

產後浮腫消腫愈或敗血停蓄 宜大調經散宜大調經散

大調經散治產後浮腫 宜大調經散宜大調經散

小調經散治產後浮腫 宜大調經散宜大調經散


正脾散治產後浮腫 宜大調經散宜大調經散

五味白朮散治產後浮腫 宜大調經散宜大調經散

澤蘭散治產後浮腫 宜大調經散宜大調經散

產後脉法治產後浮腫 宜大調經散宜大調經散

強急死來復又云沉細附骨不絕生脈



柴胡抑肝湯

治寒熱類瘧疾無陽筋心萌而多不遂以

芍藥牡丹皮各一錢地骨皮香附子梔子蒼朮各

七分川芎神麴少各五分生地黃連翹各三分甘

芙蓉散

治男無室女無夫思慾動火以致胃痛自汗

一朶搗爛和井水瀝去渣服之即效門

抑陰地黃丸

治寒濕勞瘵生乾地黃二兩赤芍藥一

梧子大烏梅湯下三五丸門

茯神黃芪湯

味子麥門冬石菖蒲黃芪各一錢甘草

五分右剉作一貼水煎服門

歲燥證

婦人歲燥悲傷發尖象如神靈所作數久伸甘

甘麥大棗湯

甘草一兩小麥三合大棗七枚右剉作

一貼水二升煎至一升溫服產前產後

治驗

里有一婦人數欠無故悲泣不止或謂之有

祈懷請博皆不應予急治甘麥大棗湯服三

臨產預備藥物

芎歸湯。四物湯。惟生丹。香桂散

命散。三退散。益母丸。還魂丹。催生如神散

涼血地黃湯。黑龍丹。霹靂丹。催生如神散

子。犀角地黃湯。如聖膏。生慈。益母草。麝

白蜜。阿膠。雞卵。清酒。生地黃。滑石。麝

香。荆茶。蒲黃。陳艾。生地黃。滑石。麝

葵。鼠皮。



婦人雜病

婦人雜病 婦人者衆陰之所集常與濕居十五以上陰氣滯滯百想經之內傷五藏外損安容月水去留前後以交牙痠血停疑中道斷絕其中傷墮不可具論所以婦人別立方者以其氣血不調胎產其前緒之異故也婦人倍於男子加十倍如憂也其前緒之異故也婦人倍於男子加十倍如憂也其前緒之異故也婦人倍於男子加十倍如憂也

抑氣散 一兩附子四兩陳皮二錢佛手散三錢烏藥二錢甘草一兩

異香四神散 一錢香附子四兩陳皮二錢佛手散三錢烏藥二錢甘草一兩

滋陰百補丸

滋陰百補丸 治氣血不足乍寒乍熱不思飲食

人參煎茶散 治血風體痛寒熱盜汗煩赤口乾痰嗽

逍遙散 治月經不調及血虛五心煩熱寒熱如膏

加味逍遙散 治血虛熱潮熱汗夜嗽似勞白芍





見醫方全錄卷一

各五錢白茯苓麥冬各三分地黃各八分梳子黃柏

滋血湯 治婦人肺俱損血脈虛弱皮聚毛落或月

錢半右到作一貼水煎空吞服

滋陰地黃丸 治虛勞吐血或經水不調不通熱地黃薑汁浸焙

四兩山茱萸山藥天門冬麥門冬生乾地黃酒洗

茯苓湯 治婦人風虛夢與鬼交有疝見言語謔亂

赤芍藥五分右到作一貼水煎空吞服

三合湯 治婦人虛勞鐵灸不效者白朮當歸白芍藥

各七分黃芪白茯苓熟地黃川芎各一分柴胡人參

橘歸丸 治婦人肌膚手足俱有血線路此怒氣傷肝

蜜九梧子大溫酒

神仙聚寶丹 治經候不調及血氣攻注腹脇疼痛積

後藥乳香各二錢半辰砂木香麝香各一錢右為

滋陰至寶湯 治婦人諸虛百損五勞七傷經脈不調

皮知母貝母便香附地骨皮麥門冬白芍藥酒炒


安產室 胎娠八月便寫產圖一本貼掛產母房內止登

符借地法 又貼催生

○又貼催生

符借地法

安產方位圖



產圖及催生
符借地法並
母朱書於壁
上先貼於內
次貼催產符
讀此借地法


安產藏胎衣吉方

正二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月

天德丁坤壬辛乾甲癸艮丙乙巽庚
月德丙甲壬庚丙甲壬庚丙甲壬庚
月空壬庚丙甲壬庚丙甲壬庚丙甲

九逐月安產藏胎衣並向月德月空方位所有十
三神後並須避忌若交得次月即換次月產圖有
人從入節十日作產圖者非也假如正月十四日立
春若從婦十三日乳豈可作去年十二月用也
必依每月初三日乳豈可作去年十二月用也
隨德所在方德向不拘遠近棄之切忌閉肚方
○如正月德在丙可安產室月空在壬可藏胎
衣餘做

九月德安產室
月空藏衣為準



生氣子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

催生符



體玄子借地法

右符以朱砂書之貼於房內北壁上遇坐草之時
 剗於鎮上燒之不得飛揚溫水調服妙
 步登房之中四餘步安產借地恐有穢污或有
 東海神王或有西海神王或有南海神王或有北
 招搖舉高卜丈天符將軍白虎夫人遠去十丈軒轅
 體玄子借地法

月遊胎殺所


產婦某氏安居無所妨礙無所畏忌諸神
 掃讓百邪逐去急急如律令勅讀三遍
 月在床倉十月在來房十一月在廁戶九月在
 月在房十月在來房十一月在廁戶九月在

日遊胎殺所

日在米倉○子在門○乙亥日在確磨○丙
 日在米倉○子在門○乙亥日在確磨○丙
 日在米倉○子在門○乙亥日在確磨○丙
 日在米倉○子在門○乙亥日在確磨○丙

房中日遊神所

丙午丁未日在房內東○六戊六己日在房內
 庚子辛丑日在房內南○九道神所在房中
 庚子辛丑日在房內南○九道神所在房中



推婦人行年法

宋換帳致重物於床
中必主傷產墮胎病

逐一排行年吉凶後按
七神詳斷吉凶禍

宜宜生禍絕門八支
方方方方方方方方方
衣着氣害命旺症月方
方方方方方方方方方

十三歲庚申 西南黃衣 坤 巽 辛 甲 正 七 辰 戌

十四歲己未 正南赤衣 巽 兌 壬 癸 二 八 卯 酉

十五歲戊午 正北黑衣 坎 乾 艮 癸 壬 三 九 寅 申

十六歲丁巳 正東青衣 震 艮 乾 甲 辛 四 十 丑 未

十七歲丙辰 東北黃衣 艮 震 坎 乙 庚 五 十 子 午

十八歲乙卯 西北黑衣 乾 坎 震 丙 丁 六 十 巳 亥

十九歲甲寅 正西白衣 兌 巽 離 丁 丙 正 七 辰 戌

二十歲癸丑 東南黃衣 巽 兌 坤 庚 乙 二 八 卯 酉

二十一歲壬子 西南黃衣 坤 離 巽 辛 甲 三 九 寅 申

二十二歲辛亥 正南赤衣 離 坤 兌 壬 癸 四 十 丑 未

二十三歲庚戌 正北黑衣 坎 乾 艮 癸 壬 五 十 子 午

二十四歲己酉 正東青衣 震 艮 乾 甲 辛 六 十 巳 亥

二十五歲戊申 東北黃衣 艮 震 坎 乙 庚 正 七 辰 戌

二十六歲丁未 西北白衣 乾 坎 震 丙 丁 二 八 卯 酉

二十七歲丙午 正西白衣 兌 巽 離 丁 丙 三 九 寅 申

二十八歲乙巳 東南青衣 巽 兌 坤 庚 甲 四 十 丑 未



四十八歲	四十七歲	四十六歲	四十五歲	四十四歲	四十三歲	四十二歲	四十一歲	四十歲	三十九歲
酉乙	戌丙	亥丁	子戊	丑己	寅庚	卯辛	辰壬	巳癸	午甲
正東青衣	正北黑衣	正南赤衣	西南黃衣	東南黃衣	正西白衣	西北黃衣	東北黃衣	正東青衣	正北黑衣
震	坎	離	坤	巽	兌	乾	艮	震	坎
艮	乾	艮	坤	兌	巽	坎	震	艮	乾
甲辛	癸壬	癸壬	甲辛	甲辛	乙庚	乙庚	丙丁	丙丁	丁巳
六	十	四	九	二	七	六	一	十	三
巳	子	丑	寅	卯	辰	巳	子	丑	寅
亥	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅

三十八歲	三十七歲	三十六歲	三十五歲	三十四歲	三十三歲	三十二歲	三十一歲	三十歲	二十九歲
未乙	申丙	酉丁	戌戊	亥己	子庚	丑辛	寅壬	卯癸	辰甲
正南赤衣	西南黃衣	東南黃衣	正西白衣	西北白衣	東北黃衣	正東青衣	正北黑衣	正南赤衣	西南黃衣
離	坤	巽	兌	乾	艮	震	坎	離	坤
坤	兌	巽	坎	震	坎	乾	艮	乾	艮
癸壬	甲辛	甲辛	乙庚	乙庚	丙丁	丙丁	丁巳	丁巳	戊午
八	七	六	五	四	三	二	一	十	九
卯	辰	巳	子	丑	寅	卯	辰	巳	午
酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午



四九歲甲 東北黃衣 艮震坎乙庚正七 辰戌

一生氣方 產婦宜向之坐卧及床

二反支月 過此月即鋪灰用牛皮或馬驢

三禍害月 不得於其上產又不得向

四絕命方 不得於其上產又不得向

五懸尸方 懸馬轡攀之大吉 繩宜

六閉肚方 便及棄不淨之 水謹之吉 禍

七八疰方 產門忌之大吉 禍

小兒初生救急 九除 小兒初生氣欲絕不能啼必是難產或冒寒所致急

中燒之仔作大紙燃 煎油點火於臍帶下熏之令

火氣入腹更以熱醋 湯盪洗臍帶須令氣回 啼失

如常方可 斷臍帶 小兒初生面青身冷口禁刁胎寒也 用白殭蚕散急

小兒初生白殭蚕才香肉 淫陳皮檳榔甘草灸各五

小兒初生有印死者急看兒口中懸雍前 膊上有危

小兒初生忽患撮口不飲乳名曰馬牙不治則百無

鐵挑口血用墨磨薄荷汁斷時即差 俗呼此

小兒初生殺道無孔以蘇合香元少許作錠納孔中

小兒初生殺道無孔以蘇合香元少許作錠納孔中



或以油紙搽維

小兒

初生以乳汁煎銀石器灌入口中效

小兒

初生赤茯苓等分為末蜜九梧子大乳汁調一丸灌

小兒

初生湯灌口中亦妙

小兒

初生大便不通腹脹氣欲絕急令婦入以溫

小兒

初生每自通不爾則死四○又葱白汁乳汁各半調

小兒

初生香各少許麥門冬燈心退紙燒灰入朱砂龍腦研

小兒

初生口大便不通先以硬葱尖維入肛門內如不

小兒

初生口大便不通先以硬葱尖維入肛門內如不

右為末糊丸黍米大薄荷

小兒

初生口大便不通先以硬葱尖維入肛門內如不

小兒

初生口大便不通先以硬葱尖維入肛門內如不

小兒

初生口大便不通先以硬葱尖維入肛門內如不

小兒

初生口大便不通先以硬葱尖維入肛門內如不

小兒

初生口大便不通先以硬葱尖維入肛門內如不

小兒

初生口大便不通先以硬葱尖維入肛門內如不

小兒


初生口大便不通先以硬葱尖維入肛門內如不

小兒

初生口大便不通先以硬葱尖維入肛門內如不

小兒

初生口大便不通先以硬葱尖維入肛門內如不





小兒

初生外腎縮入取硫黃吳茱萸各五錢為末以大蒜汁調塗臍腹上仍以蛇床子燒烟微熏之妙

小兒

初生發驚不胎驚也朱砂雄黃各等分右為末取少許豬乳汁調抹口中即效入麝香少許尤妙

小兒

初生赤白胎毒赤腫走若入腹或砂鐵隨赤

單方

又疳疔一分冷水調和塗之

朱砂

三四匙調和納地龍一條于藥裏轉取去地

大斧

治產後血暈神效

伏龍肝

治產後血暈神效

甚妙。難產三日不下伏龍肝細末一錢酒調服

石燕子

治產後血暈神效

生地黃

治產後血暈神效

茅蕪

治產後血暈神效

蒲黃

治產後血暈神效

當歸

治產後血暈神效

仁若

治產後血暈神效

紅花

治產後血暈神效

當歸

治產後血暈神效

當歸

治產後血暈神效

當歸

治產後血暈神效

芍藥

主婦人諸疾并產前後諸病

艾葉

使婦人有胎又能安胎止腹痛。胎涌生艾汁

黃芩

產前安胎黃芩白朮妙藥也。黃芩安胎者能

紅花

主產後血暈口紫閉絕紅花一兩酒

玄胡索

主產後血暈及惡血衝心或兒枕痛發絕為

桂心

治產後血瘀痛悶發絕桂心為末狗

桑寄生

治胎漏不止能安胎令胎牢

蘇木

治產後血暈或惡露不盡下腹痛

桑螵蛸

每主一錢婦人兩到酒下為末

鯉魚鱗

研產後血瘀痛悶發絕鯉魚鱗

烏賊魚肉

有墨主絕嗣無子久食令人痛甚者名曰殺血心

凌乘


主產後血積聚可煮久食之

蛇蛻

治產後血積聚可煮久食之

藕汁

主產後煩悶及血上衝心痛生藕汁飲二升



柑子皮

主產後吐瀉腫痛煎服之雷公云

蒲葇根

治孕婦下血而胎不安者

挑仁

主婦人產後下血而胎不安者

重湯

以清酒一斗半研如麥粉服之

細末

以清酒一斗半研如麥粉服之

五倍子

主產後血暈未醒者

胡麻油

主產後血暈未醒者

大麻根

主產後血暈未醒者

黑豆

主產後血暈未醒者

神麴

主產後血暈未醒者

大麥蘗

主產後血暈未醒者

醋

治孕婦胎死不出醋三升煮黑豆

冬葵子

主難產取子一升合搗碎水煎服

蔥白

主胎動不安或胎上搶心煩悶意白大者二十

馬齒覓

主產後血崩腹痛取汁服之

驚蕒

主產後血崩腹痛取汁服之

雞子

主產後血崩腹痛取汁服之

鹿角膠

能安胎止瀉下血

阿膠

能安胎止瀉下血

鹿角

能安胎止瀉下血

鹿角

能安胎止瀉下血

鹿角

能安胎止瀉下血



兔頭骨

主確生瘡脫并產後惡血不下老頭骨
治難產催生甚驗頭骨兔頭骨各一首火
研為末每二錢芎歸湯煎水調下即產狃

貓頭骨

治難產催生甚驗頭骨兔頭骨各一首火
研為末每二錢芎歸湯煎水調下即產狃

羊腎

主產後虛羸瘦弱無力羊腎一雙炮
和五味後入米煮骨節痛汗不止猪腎細切造稀糜

猪腎

和五味後入米煮骨節痛汗不止猪腎細切造稀糜

麝香

取麝香一錢生薑調下乾衣
取麝香一錢生薑調下乾衣

榆白皮

取榆白皮一錢生薑調下乾衣
取榆白皮一錢生薑調下乾衣

甘竹根

治胎動不安甘竹
治胎動不安甘竹

芋根

治產後腹痛不可忍芋根
治產後腹痛不可忍芋根

瞿麥

治產後腹痛不可忍芋根
治產後腹痛不可忍芋根

車前子

治產後腹痛不可忍芋根
治產後腹痛不可忍芋根

水銀

治產後腹痛不可忍芋根
治產後腹痛不可忍芋根

大黃

治產後腹痛不可忍芋根
治產後腹痛不可忍芋根


鍼灸法

男子無兩者以蓋填臍灸炷灸之連日灸至二
男子無兩者以蓋填臍灸炷灸之連日灸至二




東醫寶鑑雜病篇卷之十

時分解。子上衝。遍取巨關。令產母正。生使人
 頭抱。腰後。偃。鐵。入。六。分。留。七。呼。得。氣。即。瀉。立。愈。
 如子。補。丹。心。生。下。兒。手。心。有。鐵。痕。子。頂。母。心。兒。入
 中。有。鐵。痕。向。後。則。沈。骨。有。鐵。痕。是。其。驗。也。神。效。最
 壯。而。一。婦。入。產。後。暴。卒。其。母。也。錢。上。灸。三。逆。產。諸。藥。不
 效。急。於。產。母。右。脚。小。指。尖。頭。上。灸。三。逆。產。諸。藥。不
 脫。衣。不。下。醫。繼。云。即。至。陰。穴。解。上。灸。三。逆。產。諸。藥。不
 陰。交。中。極。照。海。內。關。崑。崙。脚。○。產。後。陰。下。脫。暈。取。三。里
 三。陰。交。二。七。壯。心。又。取。照。海。狼。○。婦。人。無。子。或。產。後。久
 橫。紋。二。七。壯。心。又。取。照。海。狼。○。婦。人。無。子。或。產。後。久
 不。再。孕。取。釋。心。一。條。長。同。身。寸。之。四。寸。令。婦。人。仰
 墨。點。託。後。以。此。釋。心。一。條。長。同。身。寸。之。四。寸。令。婦。人。仰
 是。穴。按。之。自。有。動。脈。應。手。各。灸。三。七。處。兩。頭。盡。處
 壯。神。驗。即。上。所。云。脫。門。子。穴。也。醫。



國家圖書館 國家圖書局 國家圖書局





國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.





國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

171



風類見日寒
暑順天時

蒸

小兒變蒸俗謂之牙生骨長比如委之有龍
於血氣而使形體成就至五歲之變蒸而七情之
所由生也蓋兒生之日至三十一日一變每變蒸
畢即覺性情有異於前何者長生藏府意智故也
骨何謂三十二日長骨期脉添精神入二經絡百六十五
九三十二日一變生腎六十四日二變一蒸生膀胱
三十八日一變生心六十四日一變生肺九日一變生脾
百八日一變生胃八日一變生心九日一變生脾
三焦無形之氣入四肢變者變生於五臟也
大舍公云氣入四肢變者變生於五臟也
蒸既畢兒乃成人也變者變生於五臟也

小兒變病

六府也又云變者上氣蒸者體熱每經一變一蒸
輕則汗或熱微汗其狀似驚重則壯熱脈亂而數或
吐或汗或煩或嘔或泄或痢或喘或咳或痰或涕或
其候與傷寒相似但變蒸則耳冷尻冷上唇中心解
發白亮狀如魚目珠者是也治法和平之劑微表
之宜用惺惺散疳疔見者實則微利之宜用紫霜丸
可安我藥餌及鍼灸切不

身軀瘦弱名爲疳積或以粥飲調下五分日四五次
母更使如金論小兒此病者先令小兒黃瘦骨立
發熱腹中如蟻行小兒此病者先令小兒黃瘦骨立
導其腹中如蟻行小兒此病者先令小兒黃瘦骨立
不悅者利寒熱往來毛髮皆聳



龍膽湯

赤芍藥赤茯苓甘草胡黃苓枳椇二箇右剉

相見命長短法

一合十歲以下服三歲以上十歲以下服一月內兒眼
過人者多夭○預知其夭壽○兒少時識悟通敏
骨法成純威嚴○預知其夭壽○費神形瑒者壽
不壽○初生啼聲連延相屬舒稍費神形瑒者壽
胎膏常搖手足○頭毛不潤○頭破而復揚急者壽
無血者好○臍小者不周○胎弱無骨者汗血者
多厄○並不好○臍大者非佳○胎強坐早者壽
目視不正○數動者○大非佳○胎強坐早者壽
語皆惡性非佳○人○或早貴○胎強坐早者壽
上○有旋毛○妨父母○或早貴○胎強坐早者壽
而○死○旋骨不成○能行而死○胎強坐早者壽
長○者○壽○陰不起者○死○間無生肉者○死○赤者亦
長者壽○陰不起者死○間無生肉者死○赤者亦

虎口

禱死

三關脈法

初生曰嬰兒三歲曰小兒十歲曰童子
五歲六歲曰細○生曰嬰兒三歲曰小兒十歲曰童子
女右手次指內有紅紋○似線者為驗第一節名曰氣

關脈無則病重○有治則病輕○第二節名曰命脈見
關脈無則病重○有治則病輕○第二節名曰命脈見
則病極○乃九死一生○若直射三關○青黑紋者死○
是急風○驚青紋○乃天雷○四足○驚內隱青紋○微屈則
傳肝○白色紋○乃疳積○黃色紋○乃疳積○黑色紋
難安○第五節○青黑紋○乃疳積○黃色紋○乃疳積○黑
治癩○五色之中○紅黃易安○紅盛作紫○紫盛作青
青盛作黑○黑盛作青○紫盛作青
紫風紅傷寒則困脾端幹
時因中惡黃則困脾端幹



