


續瘍科秘錄

五

特 279

469

第千百廿九號



始



續癆科秘錄卷之五

目錄

目録

顛骨疽

附圖

膿耳流注



頭瘟

蝦蟆瘟

涎囊損傷

會厭腫

胃脘癰



續癆科秘錄

卷五 目次

一

自序

76W11093

解廬

附圖

蚯蚓吹

蹠戾

附圖

誤吞硝子球

莽草毒

河豚毒

礞石毒

菌毒

鴉片毒



リ百死ニシテ一生ナシ初發顴骨ノ上微ニ硬腫シ  
 テ色ヲ變セス日久シクシテ顴骨ヨリ齒牙ニ連リ  
 隱隱トシテ痛ミ或ハ涕淚頻ニ流レ或ハ衄血數出  
 テ宛モ偏頭痛ノ如ク又齩齒痛ニモ似タリ漸腫テ  
 愈堅ク幾處モ凸起シテ疼痛モ亦加ヘ始テ紫色ニ  
 變シ漸次ニ自潰シテ瘡口深ク巖岫ノヤウニナリ  
 稀膿臭水淋漓トシテ止マズ穢氣薰蒸シテ一室ニ  
 滿チ瘡口ヨリ瘰肉翻出シ藥線或ハ腐藥ニテ之ヲ  
 去ルニ去ルニ隨テ又生シ乳岩癭瘤等ノ翻花肉ト  
 同質ナリ若シ誤テ措損スレハ鮮血迸リ出ルモノ

ナリ面貌異狀ニナリテ偏眼腫レ塞カリ或ハ瞳孔  
 散大シテ明ヲ失シ鼻モ曲リ或ハ瘰肉ニテ鼻孔塞  
 カリ上齩ヘモ潰エ齒牙モ脱落シ膿血滴瀝シテ口  
 中臭ク或ハ翻花シタル肉ニテ咽喉ヲ塞キ微ニ往  
 來寒熱シ脈沉遲或ハ細數ニナリ飲食漸減少シ苦  
 楚日ニ加ヘ半年或ハ一年ニ至リ疲勞極テ死スル  
 モアリ或ハ癩ヲ發シテ死スルモアリ

治法此病必死ナレハ決シテ救フヘキノ手段ナシ然  
 レ氏療治ヲ誤ラス調理ヲ得ル時ハ苟モ歲月ヲ延  
 フヘシ初起腫痛ノ微ナルモノハ涼膈散加石膏ヲ

服シ神水膏ヲ摩擦スヘシ漸漸ニ高ク腫レ堅硬石  
ノ如キモノハ仙方活命飲ニ宜シ瘡頂紫色ニ變ス  
ル寸ハ先鋒ヲ貼スヘシ潰爛翻花スルニ至ラハ破  
敵ヲ綿片ヘ攤テ貼スヘシ翻肉高ク出ルモノハ消  
疣水ヲ點シ後衝ヲ貼スレハ一旦ハ消スルナリ其  
證ニ應シテハ藥線ニテ緊紮スルヲアリ若シ截斷  
スル片ハ血ノ多ク出ル者ナレハ妄ニ刀ヲ下スヘ  
カラス稀膿臭水多ク出テ、疲勞スル者ニハ十全  
大補湯ヲ專用スヘシ寒熱アリテ飲食ヲ思ハサル  
者ニハ補中益氣湯ヲ與フヘシ口中へ潰爛翻花ス

ル者ニハ冰硼散金鎖ヒノ類ヲ吹ヘシ  
顴骨疽應用方

涼膈散加石膏	仙方活命飲	十全大補湯
補中益氣湯	冰硼散	金鎖ヒ
先鋒	破敵	消疣水
		後衝
		神水膏

頰骨疽圖



續癩科種錄

卷五

能止癩癩

又圖



續癩科種錄

卷五

四

能止癩癩

膿耳流注

膿耳流注ハ膿耳ノ流注ナリ初發ハ常ノ膿耳ニテ耳  
中痛ミ微シク惡寒發熱シ數日ニシテ膿出レ且痛  
尚減セス寒熱彌增加シテ耳輪及ヒ耳根ノ周圍焮  
熱腫痛シテ頭モ半分ハ微ク腫レ偏頭痛ノ如クニ  
痛ミ舌ハ黃苔ニナリ或ハ黑苔ニ變シ或ハ渴シ或  
ハ喜嘔シテ飲食ヲ思ハス或ハ眩暈スルコト有リ大  
便多クハ秘結シテ通セス七八日ニシテ先ツ耳後  
ニ膿ヲ成スモノナリ早ク之ヲ割開スヘシ若シ鍼  
ヲ刺ス度ヲ失スルハ外ヘ流注シテ或ハ鼻ヘ潰



工腦漏ノ如クナル者アリ或ハ耳上及ヒ耳前へ潰  
 工或ハ廣ク流注シテ鬢髮ノ中マテ膿ニナルニア  
 リ膿出テモ腫速ニ消散セス瘡口ハ盡ク耳底へ通  
 スレバ膿管曲折シテ紙捻膏及ヒ消息子モ深ク入  
 カタキモノナリ膿ノ快出セヌ工或ハ腫レ或ハ  
 消シ荏苒トシテ日ヲ延キ數月或ハ半年一年ニ及  
 フ者アリ老人ハ遂ニ疲勞シテ死スル者有リ此證  
 フ患フル者腫痛甚シキ寸ハ卒然トシテ癩ヲ發シ  
 及覆顛倒手足搐搦口眼喎斜號叫妄語或笑或悲人  
 事ヲ省ス直視失洩等ノ諸證蜂起スル者ハ毒ノ腦

海へ入タルニテ必死ナリ凡頭面ノ諸病頭項打撲  
 偏正頭痛結毒頭痛解顛疔瘡顴骨疽對口疽等或ハ  
 妄ニ齒牙ヲ抜ノ類モ亦癩ヲ發スルノアルハ膿  
 耳ニテ癩ヲ發スルト同シ世ニ此證ヲ頭疽ト為ス  
 者アリ是大ナル誤ナリ頭疽ハ皮膚ノ病ニテ腦海  
 へ内攻スルノ無シ又此證ノ鼻ヨリ膿ノ出ルヲ見  
 テ誤テ腦漏ト為モノアリ腦漏ハ其病腦ヨリ起テ  
 鼻及耳ヨリ膿ノ出ルナリ此證ハ毒ノ耳ヨリ生シ  
 テ腦へ波及スルモノナレハ其病因判然トシテ自  
 ラ異ナリ能ク明辨シテ治療ヲ誤ルヘカラス

治法初發耳中痛之寒熱強ク未夕膿ヲ成サ、ルモノ  
 ハ葛根湯ノ證ナレ凡頭面ノ諸病腫痛スル者ニ  
 ハ石膏ニテ奇効ノ有モノナレハ大青龍湯桂枝ニ  
 越婢一湯ヲ撰用スヘシ膿出テモ腫痛減セス往來  
 寒熱喜嘔頭眩スル者ハ小柴胡湯加石膏ニ宜シ又  
 柴胡清肝湯ヲモ用ユヘシ舌上黑苔ニナリテ乾燥  
 シ或ハ渴シ大便秘結スル者ハ涼膈散加石膏ニ宜  
 シ外治ハ鯨篋ニ綿ヲ纏ミ耳竅ノ膿ヲ拭ヒ去リテ  
 潤肌油ヲ滴入スル一日ニ三次スヘシ耳後耳上  
 ニ膿候アラハ早ク割開スヘシ瘡口潤クシテ膿快

ク出レハ腫痛從テ退クナリ若シ瘡口狭クシテ膿  
 滯フル時ハ又外へ流注スルモノナリ瘡口へ努肉  
 ヲ生スルハ猛汞丹赤汞丹ノ類ヲ點シテ之ヲ除キ  
 去リ膿ノ快出スルヲ專要トス鍼ヲ刺シテ後ハ托  
 裏消毒飲ニ宜シ日久クシテ身體疲勞シ潮熱盜汗  
 等ノ出ル者ハ補中益氣湯ヲ與フヘシ毒ノ腦海へ  
 入テ鼻ヨリ膿ノ出ル者ハ何方ヘモ辛夷ヲ加フ  
 ヘシ癰ヲ發スル者ハ專ラ癰ヲ療治スヘシ實證ノ  
 者ハハ三黃湯加辰砂柴胡加龍骨牡蠣湯及ヒ瓜蒂  
 吐酒石ノ類ヲ撰用ス虛證ノ者ニハ沉香天麻湯抑

肝散加羚羊角等二宜三

膿耳流注應用方

柴胡清肝湯 正宗 治膿耳焮熱腫痛

川芎 當歸 白芍 生地黃 柴胡

黃芩 山梔 天花粉 防風 牛蒡子

連翹 各一錢 甘艸節

右十二味煎服

大青龍湯 桂枝二越婢一湯 小柴胡湯加石膏

三黃湯加辰砂 柴胡加龍骨牡蠣湯 瓜蒂散

涼膈散加石膏 托裏消毒飲 補中益氣湯

沉香天麻湯 抑肝散加羚羊角 吐酒石 潤肌油

猛承丹 赤承丹

頭瘟

頭瘟ハ古書ニ見ヘス宋元ノ頃ヨリ唱ヘタル名ナリ  
 多クハ大頭瘟ト稱ス又大頭腫ト名ク瘟疫論ニ雜  
 氣ニ中リテ發スルト論シタル通り即チ外感ナリ  
 初發ハ惡寒發熱脈浮數ニシテ瘟疫ノ如ク頭痛甚  
 シク頭面赤ク腫レ迅速ニ轉遷シ朝ニ右ノ耳邊ヨ  
 リ起テ夕ニ左ノ耳邊ニ及ヒ或ハ頭項ヨリ發シテ  
 面目ニ至リ水泡疣瘡トシテ發シ忽チ破レテ脂水  
 ヲ流シ一旦經過シタル跡ハ腫消散シテ平肉ニナ  
 リ五六日ノ間ニ頭項耳目ノ邊ヲ一周シテ速ニ愈

ルモノヲ一通リノ頭瘟ト為ス頭瘟ハ急卒ノ病ナ  
レ氏大抵治スルモノ多シ稀ニハ劇證ニテ死スル  
トアリ其證表裏共ニ灼熱シ舌上黒苔ニ變シ煩渴  
シテ水數椀ヲ飲ミ脈洪大ニナリ胸滿喘急困睡シ  
テ人事ヲ省ミス頭面大ニ赤腫シテ目モ閉チ耳モ  
塞カリ數嘔吐シテ黄水酸液ヲ吐キ絶食ニ至テ死  
ス又赤腫消散シ熱モ全ク解シテ後頭痛隱隱トシ  
テ久ク止マズ數月或ハ半年ニ至ル者アリ雷頭風  
ヲ頭瘟ト同病ニ論シタル人モ有レ氏其因自ラ異  
ナリ雷頭風ハ第一瞳子ノ散大スルヲ定候トス頭

瘟ハ頭痛甚シト雖氏瞳子ノ散大スルト無シ頭瘟  
ハ赤腫ノ轉遷スルヲ定候トス雷頭風ハ頭痛甚シ  
ト雖氏赤腫轉遷ノ證ナシ是其判然トシテ自ラ異  
ナル所ナリ雷頭風ハ前編頭痛ノ門ニ詳ニス宜ク  
參考スヘシ

治法發熱惡寒脈浮數頭痛スル者ハ桂枝加葛根防風  
湯葛根湯ニ宜シ灼熱表裏へ散漫シ舌上乾燥シテ  
煩渴スル者ハ大青龍湯白虎加桂湯ノ類ヲ撰用ス  
往来寒熱シテ喜嘔スル者ハ小柴胡湯ニ宜シ腫上  
疣瘡トシテ脂水ヲ流シ下チ凝結シテ松脂ノ如ク

ニナリ頭痛止マサル者ハ防風通聖散ヲ與フヘシ  
腫痛甚シキ者ハ亂刺シテ瀉血スヘシ又紫雲ヲ塗  
リ或ハ中黄ヲ紙ニ攤テ貼スルモ可ナリ

頭瘟應用方

桂枝加葛根防風湯 葛根湯 大青龍湯

白虎加桂湯 小柴胡湯 防風通聖散

紫雲 中黄

蝦蟆瘟

蝦蟆瘟ハ俗ニ「ハサミ」ハコト云フ即天行病ノ一證ニ  
シテ一人病ム片ハ舉家盡ク患ヒ或ハ閭郷比屋ニ  
及フ有リ初發惡寒發熱シテ風邪ノ如ク耳下ヨ  
リ頰へ漫腫シテ微痛シ色ハ變セヌ初メ偏腫レテ  
兩方ニナル有リ或ハ左右一齊ニ腫ル、モ有リ  
此證何ホト腫レテモ膿ヲナサス頷下ニ核ヲ結テ  
痛ミ喉モ腫レテ喉痺ノ如クニナリ津唾頻ニ出テ  
或ハ口中乾燥シ或ハ聲啞シテ發セヌ大抵五六日  
モ過レハ全愈スル者ナリ

治法熱強キ者ハ桂枝加葛根湯葛根湯大ニ腫レタル者ハ小柴胡湯加石膏奇驗アリ患處へハ中黄ヲ貼スヘシ

蝦蟆瘟應用方

桂枝加葛根湯

葛根湯

小柴胡湯加石膏

中黄

涎囊損傷

涎囊損傷ハ始テ證治準繩ニ見ユ涎囊ハ即耳前ニアリテ涎唾ヲ生スルノ器ナリ素靈及千金外臺等ニ載セス蓋王肯堂ノ發明スル所ナルヘシ西洋ノ解剖書ニ所謂唾管是ナリ打撲金創及瘡瘍等ニテ此器ヲ損傷スレハ涎唾瘡口ヨリ漏テ永ク愈ヘス痔漏淋漏目眇瘍ノ類ト同シ或ハ誤リ認テ骨槽風ト為テアリ骨槽風ハ其毒齒牙ノ根ヨリ起テ病因自ラ異ナル者ナレハ混淆スヘカラス又骨槽風ノ涎囊へ流注スルテアリ一磨工年六十骨槽風ヲ患ヒ

前醫ノ療治緩慢ニシテ披鍼割開ノ度ヲ失ヒ其毒  
 咽喉及耳邊へ流注シ膿水淋漓トシテ多ク出テ潮  
 熱盜汗等ノ證アリテ疲勞日ニ加ヘ殆ト危篤ニ及  
 へリ先瘡口ヲ盡ク割開シ膿水ヲ快出セシメ病根  
 ノ齒牙ヲ拔去ルニ諸證速ニ退キ瘡口愈ルト過半  
 ニ及ヘ且但耳前ノ瘡口ノミ自若トシテ愈ヘス出  
 ル所ノ水ヲ熟視スルニ膿ニアラス清稀ノ水滴瀝  
 トシテ出テ微モ臭氣ナシ即涎囊ヲ損傷シテ津唾  
 ノ出ルナリ數消疣水ヲ點シ後衝ヲ貼シテ全愈ス  
 治法瘡口へ紙捻膏ヲ挿入スルヲ禁シ消疣水ヲ點

シ或ハ赤汞丹ヲ傳ケ後衝ヲ貼スヘシ又前編骨槽  
 風ノ門ヲ參考シテ療治スヘシ

涎囊損傷應用方

後衝 消疣水 赤汞丹



會厭腫

心氣病ヲ患フル者常ニ取越<sup>ト</sup>苦勞シテ格別ニ患フル  
 處モナケレ<sup>レ</sup><sub>レ</sub>氏病ノアルヤウニ心得テ色色ト思慮  
 フ費シ身體ヲ探索シ適<sup>ニ</sup>指ヲ口中へ入レテ會厭ヲ  
 探リ當テ固有ノ物ナル<sup>ヲ</sup>辨ヘス妄ニ瘡瘍ノ類  
 ト為シ常ニ氣ニ掛ケテ屢<sup>ニ</sup>摩<sup>シ</sup>シ會厭モ亦是カ為  
 ニ腫痛シ多ク涎沫ヲ吐キ初テ病トナリ愈<sup>ニ</sup>摩<sup>シ</sup>シ  
 テ愈腫レ<sup>レ</sup>百方スレ<sup>レ</sup>氏愈ヘスシテ永ク難<sup>ク</sup>澁スルモ  
 ノアリ愚昧ノ醫者ハ會厭ナル<sup>ヲ</sup>知ラス重舌ノ  
 類ト為シテ藥ヲ吹キ或ハ鍼ヲ刺ス<sup>ト</sup>アリ捧腹ス

ヘキナリ

治法第一ニ瘡瘍ニ非ス有用ノ道具ナルヲ論シ會  
厭ヲ摩挲スルヲ禁シ乳香散ヲ吹キ半夏厚朴湯  
ヲ與フヘシ若シ効ナキハ涼膈散ヲ投シ金鎖ヒ  
ヲ吹テ專ニ腫痛ヲ治スヘシ

會厭腫應用方

半夏厚朴湯 涼膈散 乳香散 金鎖ヒ

胃脘癰

胃脘癰ノ名ハ素門ニ出テ古ク有ル疾ナレ氏其病候  
ヲ知ルモノハ勿論其名ヲ唱ルモノモ少シ故ニ胃  
脘癰ヲ患ルモノアリテモ痰飲ノ類トナシテ人ヲ  
誤ルハ實ニ歎スヘキナリ胃ト腸トハ形状ハ異  
ナレ氏同體同用ノモノナリ故ニ腸ノ病ムハ胃  
モ亦病ミ胃ノ病ムハ腸モ亦病ムモノナリ假令  
ハ痢病ニテ下利スルハ必嘔吐ヲ發シ霍亂ニテ  
嘔吐スルハ必下利ヲ發スルノ類ニテ知ルヘシ  
腸ニ腸癰ヲ發スルヲアレハ胃ニモ亦胃脘癰ヲ發

スル一必有ノ理ナリ胃脘癰ノ候最初胸膈ノ内隱  
隱トシテ微痛シ飲食膈中ノ邊ニ滯リテ下リ難ク  
懊膿シテ乍チ吐キ出シ或ハ飲食半途ニ窒碍シテ  
上ヘモ出テス下ヘモ下ラス只多ク涎沫ヲ吐キ宛  
モ膈噎ノ如シ其患狀ヲ熟察スルニ二口三口ハ強  
テ吞ミ下セト胃管ニ滿ルキハ乍チ吐逆スルニ似  
タリ胃口ノ腫テ開カサル故ナルヘシ數日ノ間ニ  
疾増加シテ時時欬嗽モアリ屢涎沫ヲ吐キ口舌乾  
燥シテ冷水ニ漱キ晝夜ニテハ水數斗ヲ傾クルニ  
至ル漸漸ニ口中ノ腥臭ヲ覺ヘ涎沫ヘモ膿血ヲ交

ヘ項背強リ頭痛モアリ惡寒發熱モアリ脈浮數ニ  
ナリ虚里ノ悸動築築トシテ亢ク呼吸促迫シ後ニ  
ハ一滴ノ水モ飲ムトヲ得ス若シ一滴ノ水咽ニ下  
ルキハ煩悶ヲ發シ反覆顛倒シテ死セント欲スル  
ニ至ル遂ニ飲食ハ勿論水藥ヲモ絶チ十餘日ニシ  
テ死スルモノナリ予モ初ハ膈噎ノ急證ト心得タ  
レト屢經驗シテ胃脘癰ナルトヲ知レリ

治法藥ノ飲ノ又病ユエ外ニ手段ノナキモノナリ桔  
梗白散甘草桔梗湯麻杏甘石湯涼膈散加石膏等試  
用シタレト反テ苦惱ヲ加ルノミニテ寸効ヲ得ル

一能ハス又一時ノ新工夫ニテ沈香艾葉乳香沒藥  
等ヲ薰劑ト為シテ嗅シメ又西洋ノ「ハンテルマチ  
セ法ヲ用テ臍ニ發泡ヲ施シ龍腦麝香等ノ細末ヲ  
附ケ遊奕ニテ蓋ヒ綿帶ヲ施シ種痘ノ法ノ如クニ  
シテ藥氣ヲ入レタレト是モ亦寸効ヲ得ルヲ能ハ  
ス實ニ必死ノ疾ト謂フヘシ

解顛

解顛ノ名ハ初テ病源候論ニ出ツ頭顛ノ開解スル病  
ユエ解顛ト名ツク先ツ必死ノモノト定ムヘシ發  
シテ後二三月ニシテ死スル者アリ或ハ半年一年  
ニシテ死スルモノアリ至極ノ輕證ナレハ僥倖ニ  
死ヲ免カル、者モアレト成人ノ後モ頭大ニシテ  
身體不相應ニ見ユルモノナリ大抵初生二三月ノ  
間ニ發スルモノ多シ初發ハ顛門高ク脹リ出シ頭  
ノ皮一圓ニ張テ晃晃トシテ光リ青筋怒脹シ黒暗  
ハ下ヘヨリテ白眼ノミ多クナルナリ頭顛ハ前後

左右ヨリ湊合シタルモノユエ開解スルニ從ヒ湊合シタル界ハ溝ヲナシ指ヲ段スルヤウニナリ其開キタル隙へ頭腦張り出シ柔軟ニテ手ニ應ス頭ノミ次第ニ大ニナリ後ニハ胸ヨリモ大ニシテ且重ク總體ノ釣リ合惡ク抱クモナラヌホトニナリ四肢ハ瘦セ元氣モ惡ク乳哺モ減少シ遂ニ驚癇ヲ發シ四肢搐搦直視上竄口眼喎斜等ノ證ヲ發シ數發作スルニ從ヒ漸漸ニ疲勞シテ死ス又初ニ驚癇ヲ患ヒ後ニ解顛ニナルモクモ有リ

治法古人ノ論ニ小兒ハ腎氣未成ユエ多ク此病ヲ患

ク腎ハ骨髓ヲ主リ頭腦ハ骨髓ノ根本ユエ腎氣成ラサル寸ハ頭腦モ亦不足ニシテ開解スルト云ヘリ愚按ニモ腦病ノヤウニ思ハル試ニ解顛ノ顛門ヲ刺スニ必瘰水流レ出テ腦モ腐敗シテ豆腐ヲ碎キタルヤウニナリテ出ルナリ因テ考フルニ頭腦腫レ瘰水停蓄シテ頭顛合縫ノ開解スルナリ骨ノ病ニハ非スト知ルヘシ古方ニ棉布ヲ以テ頭顛ヲ緊束シテ保合スルノ術アレ氏臆度ノ療治ニテ實驗ノ法ニ非ス何程緊縛シテモ腦髓ノ腫消シ瘰水去ラサレハ頭顛吻合スルノ理ナシ此病必癇ヲ發

シ又癩ヨリ此病ニ變スルモノアレハ解顛モ亦癩ノ一證ナルヘシ上文ニモ云フ通り難治ノ病ナレ氏治法ヲ盡シテ百死ニ一生ヲ求ムヘシ古人ハ腎氣ノ未タ盈タスシテ腦海ノ虚シタル見込ニテ六味地黄丸加鹿茸ハ物湯補中益氣湯等ヲ用ヒ顛門へ天南星ノ末ヲ糊ニ和シテ貼スルノ法アリ青洲先生ハ葛根加朮烏湯ヲ用ヒテ敗液ヲ驅除スルヲ專一トセラル予ハ癩ノ見込ニテ羚羊飲ヲ與ヘ頭上へ龍腦水ヲ摩挐シ又石灰水ニテ蒸スナリ便秘スルモノヘハ草兵丸ヲ與フヘシ先年江戸僑居ノ

頃堺町ノ觀物場ニ解顛ノ出タル一アリ年三歳ニシテ頭顛ノ大サ茶罐ノ如ク頭重クシテ須臾モ坐スルコト能ハス又抱クコトモナラス終日蒲團ノ上ニ仰卧セシムルノミ

解顛應用方

羚羊飲 高階家試 治驚癩


羚羊角 柴胡 當歸 川芎 釣藤 白朮

茯苓 甘州

右八味煎服

龍腦水 散腫消痰

解顛圖



○  
干

火酒九錢 龍腦二錢

右二味研和摩擦患處

六味地黄丸加鹿茸 八物湯 補中益氣湯

葛根加朮烏湯 石灰水 草兵丸

蚯蚓吹

小兒ノ腹卒ニ腫テ硝子ノ如クニナルトアリ世俗ニ

蚯蚓ニ小便ヲ注瀉テ腫レタルナリトテ其蚯蚓ヲ

尋子テ洗ヘハ自ラ愈ルト云ヒ傳ヘリ本艸綱目蚯

蚓ノ條ニ云今小兒陰腫多以為此物所吹又吹火筒

條ニ云小兒陰被蚯蚓呵令婦人以筒吹其腫所トア

レハ世人ノ言モ本ツク所ナキニアラサレモ予此

事ヲ實驗スルニ一兒モ蚯蚓ニ吹カル、者ナシ小

兒ハ腹ヲ玩弄スルト常ナレハ戲ニ自ラ皮ヲ剥ク

モアリ或ハ他ノ兒童ノ為ニ剥カル、モアリ或ハ



看護スル女子年頃ニナリ春竇自ラ動キ戯ニ小兒  
 ノ股皮ヲ剥ク<sup>ハ</sup>アリ極幼稚ノ兒ノ蚯蚓吹ヲ患フ  
 ルハ皆人ノ為ニ剥カル、ナリ初ハ手輕ク剥ル者  
 ナレ<sup>レ</sup>小兒ハ皮ノ口狭窄ナルユエ龜裂ノ太キ處  
 ニ至リ縊<sup>ミ</sup>レテ鐔<sup>ツ</sup>ノヤウニナリ故ニ復シカ子痛ミ  
 テ大ニ腫レ小便ノ通シラモ妨ケ難儀スルナリ此  
 證特小兒ノミニ非ス大人ニモ度度アル<sup>ナ</sup>ナリ大  
 人ノ包莖ヲ近世ノ俚語ニ「エチゼ」ト稱シテ大ニ  
 耻ル<sup>ナ</sup>ナリ故ニ自ラ強テ皮ヲ剥キ大ニ腫テ熱痛  
 シ後悔スレ<sup>レ</sup>故ニ復シ難ク醫ノ療治ヲ請フ<sup>ナ</sup>ア

リ自分モ耻テ其因ヲ明サマニ告ル<sup>ナ</sup>能ハス醫モ  
 蚯蚓吹ノ<sup>ナ</sup>ヲ心得ヌモノハ微毒トナシテ粉劑等  
 ヲ與ヘ大ニ難儀スル<sup>ナ</sup>アリ小兒ハ其儘ニ置テモ  
 大害ハナケレ<sup>レ</sup>大人ハ腫レタル處頑固シテ甚タ  
 難澁スル<sup>ナ</sup>アリ早ク皮ヲ故ニ復スルヲ專要トス  
 治法先ツ腫處ヲ亂刺シテ水ヲ絞リ去リ腫脹ノ弛<sup>カ</sup>ミ  
 タル處ニテ醫左手ニ陰莖ヲ握リ引キ出ス氣味ニ  
 シ右手ノ大拇指ニテ龜頭ヲ押シ込ミ左右ノ手ニ  
 テ互ニ按排シ其疼痛スルヲ顧ミスカ<sup>ラ</sup>極テ故ヘ  
 復スル寸ハ年ヲ痛ミ去リ腫モ從テ消スルナリ跡

へハ中黄ヲ貼スヘシ内服ハ猪苓湯加大黄ヲ宜シ  
 トス又小兒ヲ襁負シタル時股被服ニテ擦瀝シ水  
 泡ニナルコト有リ又蚯蚓吹ノ皮ヲ直ニ故へ復シテ  
 モ股ノ少シク腫ルハモノナリ是等ハ皆中黄ニテ  
 治スルナリ

蚯蚓吹應用方

猪苓湯加大黄

中黄

蹠戾

小兒生レテ一脚或ハ兩脚共ニ蹠ノ内へ乖戾スルモ  
 ノアリ稍成長シテ歩行頃ニ及へハ蹠横ニナリテ  
 直ニ歩行コト能ハス木履艸履ヲモ正シク着コト得  
 ス大人ニナリテモ杖ニ扶ケラレテ歩行シ終身廢  
 人ニテ終ルモノアリ實ニ可憐コトナリ醫書ニ此事  
 ヲ載セス漢書賈誼傳ニ蹠盤トアルハ是ナリ其因  
 ヲ考ルニ胚胎ノ時其母鎮帶ニテ緊シク腹ヲ縛リ  
 或ハ顛仆等ニテ兒ノ居様ヲ誤リ惡ク癖ノ付キタ  
 ルナリ古ヨリ廢人ニ定メテ其治法ヲ工夫スルモ

ノ無シ予カ新工夫ニテ數人ヲ療治スルニ皆全愈  
シテ平人ノ如クニナリ少シモ芥鑿ノ痕ヲ遺ス者  
ナシ

此術初生ノ時速ニ施スヘシ成長シタルモノハ療治  
スルモ治シ難シ其法一人ノ价者小兒ヲ膝上ニ載  
セ動かヌヤウニ緊シク抱クヘシ又一人ノ价者左  
手ニテ脚腕後ヲ緊シク握リ少シモ動かサラシメ  
右手ニテ兒ノ脚腕前ヲ持チ徐徐ニ搥括シテ垂尻  
ヲ正シ常ノ足ノ如クニスル寸ハ外踝へ皮襪積シ  
テ有餘ヲ生スルナリ醫左手ニテ有餘ノ皮ヲ撮ミ

上ケ右手ニ反剪カヲ把テ剪断シ創口ヲ缺唇鍼ニ  
テ小鍼ニ縫ヒ合セ餘ハ金創ノ法ノ如ク雞子白金  
公水棉布ヲ各一片ツ、貼シ其上ヲ先鋒ノ棉布ニ  
テ蓋ヒ又其上ヲ棉布ニテ輕ク卷キ別ニ甲乙ノ二  
帶ヲ製シ創口ノ開カヌヤウ搥括ノ復ラヌヤ  
ウニ縮縛スヘシ甲帶ノ法棉布幅七分長サ八寸ニ  
裁シ一端三寸許へ遊奕ヲ攤へ跌陽ノ邊へ粘シ蹠  
ヲ一二廻シテ一端ハ足心ヲ過テ外側へ出ス乙帶  
ノ法先ツ長短二帶ヲ裁シ長帶幅七分長サ九寸短  
帶ハ幅七分長サ七寸ニ裁シ短帶ノ一端ヲ長帶ノ


中央へ縫ツケ丁字形ニ製シ長帯ノ兩端三寸許へ  
 遊奕ヲ攤へ兒ノ膝上ヲ左右兩端ニテ互ニ轉廻シ  
 固ク粘著セシメ少シモ動カヌヤウニスルヲ肝要  
 トス短帯ハ其儘脚ノ外面へ下ケ甲乙ノ二端ヲ合  
 シテ結束スベシ結束ノ法緩急適宜ニシテ穩括ノ  
 弛マヌヤウニ工夫スヘシ療治シタル日ハ至極大  
 切ニテ缺唇ノ療治ト同様ニ心得テヨシ夜モ父母  
 ハ眠ラスニ意ヲ注キ足ヲ物ニ觸レヌヤウニ繙帶  
 ノ弛マヌヤウニスヘシ若シ緩ム寸ハ結ヒ直スヘ  
 シ明日更貼ニ繙帶ヲ解クハ亦一人ノ价者ヲシ

テ兒ノ脚腕ノ前後ヲ持チ穩括シ創口ノ開カヌヤ  
 ウニ將息スヘシ第四日ニ至ラハ前衝ヲ貼シ第七  
 日ニ至リテ絲ヲ去リ創痕へハ遊奕ヲ棉布へ攤テ  
 貼シ甲乙繙帶ハ續テ施スヘシ大略五十日ヲ經ル  
 片ハ蹠形常ニ復スルモノナリ少シモ乖戾セヌヤ  
 ウニ成リタルヲ見定テ繙帶ヲ去ルヘシ

蹠戾應用方

雞子白 金公水 先鋒 前衝 遊奕

蹠戾圖



蹠戾復正則外  
 靨皮成蹠積以  
 反剪刀斷之其  
 創狹長如鳥卵  
 形




斷去贅皮而縫合  
 刀痕逐針相近為  
 佳

甲乙繡帶林墨  
即攤膏煎



甲乙繡帶兩端相  
結束今勿少弛



誤吞硝子球

同藩某氏ノ男年十四習字ノ席上ニテ硝子球ヲ含弄  
シ誤テ吞ミ下シ尚胸膈ノ間ニ留滯スルヲ覺フ吐  
ケ出テス吞メ下ラス深ク念ニ懸テ止マズ一  
二日ノ後發熱惡寒黙黙トシテ飲食ヲ欲セス同僚  
藤谷春永瘦ト為シテ球ノ致ス所ニ非サルヲ諭  
セ氏本<sup>人</sup>及ヒ家人共ニ其言ヲ疑ヒ更ニ予カ療治  
ヲ請フ予診スルニ脈浮數ニシテ寒熱交起リ咳嗽  
喘急等アリ瘦ニ相違モナキトユエ小青龍湯加石  
膏ヲ與ヘ球ノ害ニ非ザルヲ辨スルニ亦予カ言

ヲ信セス再ヒ療治ヲ藤谷ニ託スルニ荏苒トシテ  
諸證退カス加之盜汗多ク出テ羸瘦日ニ加ヘ勞狀  
備リタルユエ藤谷モ勞ノ見込ニテ緩痰湯ヲ與フ  
ル丁數月ニシテ諸證過半退キタル頃四花患門ノ  
灸ヲ炷ヘル案ニ據テ熱痛ヲ忍フニ一聲喝ト云テ  
忽チ硝子球ヲ吐キ出セリ球胸中ニアル丁已ニ八  
十一日其色幽黯ニ變セリ球出テ後ハ神思愈快爽  
ニナリテ速ニ全愈セリ予因テ按スルニ某ノ疾疫  
ニ非ス又勞ニ非ス蓋シ硝子球ノ肺中へ入テ病ミ  
タルモノナルヘシ凡潮熱盜汗欬嗽喘急等ノ諸證

ハ肺臟諸病ノ定候ニテ勞瘵ニ限リタル丁ニ非ス  
肺臟ハ勿論附骨疽流注毒及打撲金創等モ肺臟ヲ  
侵ス寸ハ必ス勞狀ヲ見スモノナリ今硝子球肺中  
ニ入テ留滯シタルユエ勞ノ如ク病ミタルモノナ  
ルヘシ喉嚨ハ至極ノ要處ユエ一滴ノ水入リテモ  
忽チ咳嗽ヲ發シテ吐キ出ス程ノ處ナレハ球ノ入  
ルヘキ理ハナキヤウナレ氏稀ニハ物ノ誤テ肺管  
へ入ル丁モ有丁ナリ本州太田村某神祠ノ池中ニ  
奇石ヲ生ス色瑪瑙ノ如ク玲瓏トシテ愛スヘシ方  
言  
ニト云フイ  
シト云フ  
里中ノ女子其神祠ニ詣リ石ヲ採テ戲ニ



口中へ含ムニ誤テ肺管へ入りテ出テス呼吸ニ從  
 ヒ升降シテ聲ヲ成シ潮熱欬喘急等ノ諸證起リ  
 五六日ノ後ニ馬脾風ノ如クニナリテ死セリト村  
 醫奥山鳥長ノ物語ナリ又門人烏山醫員川又玄玠  
 ノ話ニ一賈豎ノ兒乾癩ヲ口ニ含ミ戲ニ凡上ヨリ  
 跳下スルニ誤テ氣道ニ入り喉中塞カリ聲啞欬  
 呼吸促迫等ノ諸證竝起リ少頃ニシテ死セリト云  
 フ此二事ニ依テ考レハ某ノ病モ硝子球ノ肺中ニ  
 入テ癆狀ヲ病タルヲ明カナリ

治法西洋ノ醫籍ヲ閱スルニ李核木片等ノ誤テ肺管

ニ入タルハ肺管穿孔法ヲ施シテ誤吞ノ物ヲ呼吸  
 ニテ噴キ出サシムルノ治法アリト雖氏其術詳ナ  
 ラス予此ニ本キテ心匠シタル治法アリ先ツ患者  
 ラシテ仰卧セシメ人迎ノ動脈ヲ避ケテ結喉ノ下  
 ラ横ニ徐徐ト截リ動脈断ツキハ或ハ烙シ或ハ紮  
 リ出血ヲ禁シテ後肺管ヲ切貫ケハ創口ヨリ呼吸  
 ヲ起シ吞タル物ヲ噴出ス一必然ナリ若シ截タル  
 ノミニテ創口狭ク出テ難キハ輪ニナリタル者  
 ヲ一枚切去ルヘシ肺管へ切貫タレバトテ死スル  
 者ニ非ス咽喉ヲ刺シテ死スル者ハ多クハ出血ニ

因ルモノナリ年来歴驗スルノ頗多シ金創ノ條ヲ  
參攷シテ知ルヘシ物ノ出タル跡ハ縫合繃帶等總  
テ金創ノ治法ニ從フヘシ屢肺管ノ創ヲ療治スル  
ニ思ノ外治シ易ク又西洋ニ肺管穿孔法ニテ此證  
ヲ救ヒタル實驗アレハ右ノ手段ヲ行フノ難事ニ  
非ス試驗シテ回生ヲ萬一ニ求ムヘシ

莽草毒

莽草ハ大毒ノ物ニテ本草綱目ノ毒草ノ部ニ組入テ  
其毒ノ人ヲ殺スノヲ云ヘリ小野蘭山カ本草啓蒙  
ニ姦商莽草實ヲ大茴香ノ偽物ニスルノヲ載タリ  
今眼前ニ藥店ニテ此品ヲ鬻キ又枝葉共ニ抹香ト  
ナシ又枝葉ヲ墳墓ニ手向ケ畜禽家ニテ「ヤマガラ」  
ニ啄シメテ人人常ニ手ニ觸レ目ニ慣レテ其大毒  
ノ物ナルヲ知ラス先年予カ舊郷ノ隣里三箇村  
ト云ヘル處ノ寺ヘ村童習字ニ集リ五六人ニテ適  
庭前ノ莽草ノ實ヲ食スルニ忽顛倒煩亂シテ危篤

ニ見ヘタレ氏暫ク有テ多ク涎沫ヲ吐キ其毒モ隨テ出タルト見ヘテ幸ニ死ヲ免レタリ近頃府下南街村田屋吉五郎ト云ヘル者ノ宅ニテ莽草ノ實ヲ「ヤマカラ」ノ餌ニ為サントテ檐前ニ晒スニ其家ノ兒二人比隣ノ兒二人俱ニ之ヲ食スルニ忽瞑眩悶絶シテ幾人事ヲ省ミス四肢微ニ搐搦シ面目赤ク瞳孔散大ニナリ牙關緊閉シテ白沫ヲ吐キ或ハ飲食ヲ吐シ或ハ血ヲ吐シ其病狀癩症ノ如ク又烏頭曼陀羅花等ノ毒ニ中リタルニ似タリ四人ノ内二人午食前ニテ腹ノ饑タルモノハ一時許ニシテ死

セリ午食後ニテ腹ノ饑サル者ハ患狀ヤ、輕シ先ツ草兵丸ヲ與ヘ續テ甘豆湯ヲ冷服セシムルニ下利十餘行ニシテ死ヲ免レタリ

莽草毒應用方

甘豆湯奇効醫述解礬石。砒石。甘遂。天雄。附子。射藺。巴豆。芫菁。斑蝥。百藥之毒。

黑豆一兩 甘草半兩

右二味煎服

草兵丸

河豚毒

河豚一名ヲ鰐鯪ト云フ鰐鯪毒ノ治法ハ金匱要略ニ  
 初テ見ユ五雜俎云。河豚最毒殺人。所忌血與子耳。又  
 云。以燕脂染不紅者。即有毒。紅者即無毒。本草綱目云  
 煮忌煤。始落中。今世人ノ血ト鰐<sub>ト</sub>ニ毒ノアルト煤  
 始<sub>ス</sub>ヲ河豚ニ合スル寸ハ必ス人ヲ殺スト云フ。フ  
 口實ト為ス皆本ツク所アリ。然レ氏但血鰐ノ二物  
 ニノ毒ノアルニ非ス。割烹ヲ丁寧ニシテモ又燕  
 脂ニテ染テ紅ニナルモ又枯魚ニシタルモ皆其毒  
 ニ中リタル者アレハ古人ノ言モ必信用スヘカラ

ス常ニ有毒ノ物ト定メテ決シテ食スヘカラス中  
毒ノ候最初ハ唇舌麻痺シテ言語蹇澁シ須臾ニシ  
テ總身麻痺痿弱。骨節緩縱ニシテ起居スルコトヲ得  
ス精神恍惚トシテ中風ノ如ク癱ノ如ク又麻藥ヲ  
服シタル者ニ似タリ或ハ四肢拘急搐搦或ハ厥逆  
スルモアリ或ハ眩暈或ハ喜笑スルモ有リ脈初メ  
ハ沉伏シ發熱スレハ浮大數ニナリ面目赤クシテ  
染ルカ如ク重キ者ハ但沉醉シタル狀ニナリテ其  
儘ニ死スル者ナリ輕キ者ハ煩亂シテ嘔吐ヲ發ス  
宿食ヲ吐ク者ハ幸ニ死ラ免ル、コトヲ得ルナリ其

毒ニ中ル者腹滿腹痛等ノ證ナク但心中懊懐シテ  
煩悶スルノミ風胎兒烏頭等ノ毒ニ中リタル者ニ  
彷彿タリ

安政三年辰ノ冬明年己ノ春東海ニテ河豚ヲ捕ルコト  
尤多ク府下ノ人其毒ニ中リテ死シタル者尠カラ  
ス予カ親ク聞見スル所下街裏五町目ニテ小兒一  
人高野村ニテ婦人一人平磯村ニテ一人太田村ニ  
テ一人飯田村ニテ一人豊食村ニテ二人青柳村ニ  
テ二人本州笠間ニテ二人都合十一人但毒ニ中リ  
病タル者ハ枚舉ニ遑アラス青柳村農夫彌兵衛總

身麻痺痿弱。四支逆冷。昏沉如醉。醫者紫金錠ヲ與フ  
續ヒテ備急圓。黃龍湯。魚油。地漿。鐵漿等ヲ頻服セシ  
ムルニ微モ吐ク催サス又惡心モナク已ニ死地ニ  
墜タル所ヘ予馳附テ先吐酒石一分ヲ與フルニ乍  
宿食及飲タル所ノ穢物ヲ吐ク一升許ニシテ諸證  
退キ二三日ニシテ全瘥ス

治法ハ吐法ヲ第一ノ良策ト為ス吐酒石一分急ニ研  
末ト為シ頓服セシメ續テ鹽湯ヲ二三椀與フヘシ  
乍ニ宿食ヲ吐スナリ快吐ヲ得レハ豁然トシテ神  
思快爽ヲ覺ヘ諸證從テ緩ミ初テ言語スルヲ得

ルモノナリ但發熱脈浮。麻痺痿弱等ノ證ノミ殘ラ  
ハ東洞ノ黃連解毒湯ニ宜シ或ハ橘皮大黃朴硝湯  
中正湯ヲ撰用スベシ若シ吐酒石無キ寸ハ瓜蒂一  
味研末シ五六分白湯ニテ送下スヘシ世ニ黃龍湯。  
地漿。菜油。魚油。藍澱等ヲ用ユルハ皆吐法ナルヘシ  
然レモ吐酒石ノ少量ニテ快吐ヲ得ルニ如カス其  
毒已ニ腸中ヘ下リ吐劑ヲ投スレモ吐セサル者ハ  
救ヒ難キモノナレモ走馬湯ヲ用ユヘシゴロトン  
油ト云フ物即巴豆ノ油ニテ薩摩ヨリ出ツ峻下劑  
ニテ走馬湯ヨリモ神効アリ宜シク試用スヘシ河

豚毒ヲ解スルノ方世ニ傳フルモノ極テ多シ今此ニ數方ヲ舉テ廣ク救急ニ備フ

河豚毒應用方

中正湯原氏藏方治陳舊宿食及一切傷食

半夏五分 木四分 藿香 橘皮 乾薑 厚朴

大黃各三分 黃連二分 木香 甘草各一分

右十味煎服

糞清 黃龍湯。人中黃ト云フモ皆一名ナリ本法ハ淡竹ヲ切テ兩端ノ節ヲ留メ青皮ヲ去リ漢缸ノ中ヘ浸入シテ稀汁ヲ取り用ユ急ニ取ルニハ先糞上ヘ

綿布ヲ布キ其上ヘ目ノ細ナル籠ヲ置キ押付テ汁ヲ取ルヘシ

地漿 又土漿氏云フ黃土地ヲ掘テ坎ヲ作り深サ一尺許新汲水ヲ沃キ攪濁シ少頃アツテ清ヲ取り用ユ

橄欖 水ニ浸シ龍腦少許ヲ入テ用ユヘシ

藍澱 水ニ和シテ用ユヘシ藍ノ葉ヲ揉ミ汁ヲ絞リ用ユルモ可ナリ

荏油 若シナキ寸ハ魚油菜油ニテモ可ナリ

白燄 煮テ汁ヲ飲テ宜シ又燒テ食スルモ可ナリ

蘆根 搗爛シテ汁ヲ取り服スヘシ又煎汁ヲ服スル

モ可ナリ

橘皮大黃朴硝湯 走馬湯 黃連解毒湯

吐酒石 瓜蒂 コロトン油

礞石毒

礞石ハ大毒ノモノニテ藥店ニテモ素人シロウトヘ賣ル<sub>1</sub>ヲ  
禁シ素人モ亦之ヲ恐ルレ氏世ニ礞石ノ末ヲ白砂  
糖或ハ炒豆粉ト誤認ミカテ嘗メテ死スル者尠ナカラ  
ス又毒鼠劑ノ誤テ食物ニ混シ毒ニ中ル<sub>1</sub>アリ初  
メ面目色ヲ失シ心腹蒸蒸トシテ煩熱スルヲ覺ヘ  
須臾ニシテ腹滿シ愠愠憤憤トシテ悶絶セント欲  
シ卒然トシテ嘔吐ヲ發シ初メハ宿食ヲ吐キ續テ  
涎沫或ハ膽汁肝液等ヲ吐キ煩渴シテ水ヲ飲ミ水  
入ル寸ハ乍吐テ水逆ノ證ノ如ク反覆顛倒シ肉瞤



筋惕等ノ證並起テ即死スル者多シ即死セサル者ハ煩熱スルノ傷寒ノ如ク煩渴引飲舌上黃胎ニナリテ食ヲ思ハス面目微腫シテ萎黃ニナリ身體酸痛痿弱シテ歩行不自由ニナリ遂ニ死スルナリ分量ヲ多ク飲ミタルハ百死ニシテ一生無シ少量ナレハ速ニ吐シテ死ヲ免ル者有リ礬石ヲ瘡ニ用ルル本草綱目ニモ見ヘテ今世ニ賣藥ニスル所メ截瘡ノ方ハ即礬石ナリ瘡ヲ患フル者此賣藥ヲ服シテ嘔吐ヲ極ノ胃氣ヲ損シ久ク飲食ヲ思ハス危篤ニ至ル者亦尠カラス

治法是モ河豚毒ヲ治スル法ノ如ク毒ヲ吐カシムルヲ第一ノ良策ト為ス巳ニ醫學入門ニ瓜蒂ヲ用テ有レ氏吐酒石ノ捷功アルニ如カス大抵ハ自カラ嘔吐ヲ發スルモノナリ假令嘔吐ヲ發スル氏更ニ吐法ヲ行テ胃中ヲ一洗スヘシ吐シテ後ハ當歸甘草ノ煎汁ニテ黃礬散ヲ送下スヘシ若藥物ヲ缺ク氏ハ糞清人尿醎醋麻油ノ類ヲ服スヘシ秋燈叢話ニ白礬一味ヲ冷水ニテ服スルノ法アリ宜シク試用スヘシ大熱如灼煩渴引飲スル者ハ黃連解毒湯參連白虎湯及紫雪ヲ撰用スヘシ水逆ニテ藥餌共

ニ下ラサルモノハ五苓散。小半夏加茯苓湯ニ宜シ  
其毒已ニ盡テ尚精神了了タラサル者ハ甘豆湯。三  
豆飲等ヲ服スヘシ

礬石毒應用方

三豆飲得効方 踈解熱毒。又解金石草木一切諸毒

綠豆 赤小豆 黑豆各一升 甘草二兩

右四味以水八升煮極熟。任意食豆飲汁。七日乃止。

黃礬散醫學心悟 解砒毒

大黃 明礬各等分

右二味散服

苦參湯求古館方譜 解砒毒

苦參研末 苦酒各適宜

右二味混和頓服

瓜蒂散醫學入門 治砒毒在膈上者

萬病解毒丹同上 治砒毒在腹中者

五苓散 小半夏加茯苓湯 黃連解毒湯

參連白虎湯 紫雪 吐酒石 瓜蒂

黑鉛 白礬 香油 地漿 青藍汁

醃醋 糞清 人尿

菌毒

菌ハ種類ノ多キモノナリ松茸紫茸香茸ノ類人ノ知  
 リテ常ニ食スルモノハ中ル<sup>タケノコ</sup>ナシ名ノ知レヌ菌  
 ハ必ス毒アリ凡<sup>カ</sup>蓋ノ上ニ毛茸ノアルモノ蓋ノ裏  
 ニ<sup>欄</sup>無キモノ蓋ト莖ト脆ク離ル、モノ夜見テ  
 光ノアルモノ採リ置テ色ヲ變スルモノハ皆毒ア  
 リト云フ夜見テ光ノアルモノヲ吾郷ノ方言ニ「ツ  
 キヨタケト云フ」シメシニ<sup>疑</sup>似シキモノナリ若シ  
 誤テ食スルキハ其毒ニ中リテ醉ルカ如ク喃喃ト  
 シテ妄言止マス或ハ喜笑或ハ欣躍或ハ歌舞シ一

時ノ狂ヲ發スルノミニテ死スル者稀ナリ又「テン  
グタケト云フアリ是モ「ツルタケニ疑似シ若シ誤  
テ食スルキハ亦一時ノ狂ヲ發スルモノナリ菌毒  
ノ劇證ハ迅速ニシテ救ヒ難キモノ多シ食シ了レ  
ハ乍チ心腹卒痛。反覆顛倒シテ即死ス較緩ナル者  
ハ霍亂ト略相類シ腹痛煩亂。嘔吐下利惡寒發熱。脈  
沉ニシテ四肢厥逆シ或ハ轉筋等ノ諸證蜂起シテ  
死スルモアリ又幸ニ生路ヲ得ルモ有リ

治法急證ユエ急ニ救フヘシ第一糞清ヲ用ユルヲ良  
方ト為ス鶴林玉露ニ日本ノ僧某衆僧ト同シク菌

ヲ採リ食スルニ皆其毒ニ中リ糞清ヲ服シ死ヲ免  
レタル時日本ノ僧寧死スル氏穢物ヲ食ハスト云  
テ獨リ死シタルヲ載セタリ又紫金錠ニテ効ヲ  
取ルト多シ太田村ハ松茸ノ名物ニテ同村ノ弟子  
ヨリ松茸ヲ贈ラレタルヲアリ舉家之ヲ食スルニ  
人人惡心ヲ發シ或ハ嘔吐スル者アリ予モ亦惡心  
ヲ催セリ茸毒ナルヲ覺ユルユエ直ニ自ラ紫金  
錠ヲ服シ其外ノ者ヘモ與フルニ錠ヲ服シタル者  
ハ惡心乍ニ止ミ嘔吐モ無シ實ニ紫金錠ノ効ナリ  
最初心腹卒痛シテ吐瀉ノ無キ者ハ麻油。草兵丸。備

急圓吐酒石ノ類ヲ撰用スヘシ吐下ノ後餘毒尚盡  
ザル者ハ中正湯大柴胡湯ニ宜シ四肢厥冷脈沉微  
ナル者ハ四逆加人參湯附子理中湯ニ宜シ煩渴水  
逆等ノ證アル者ハ五苓散ヲ與フ大抵霍亂ノ諸方  
ヲ撰用シテ可ナリ

菌毒應用方

- 大柴胡湯 四逆加人參湯 附子理中湯
- 五苓散 紫金錠 草兵丸 備急圓 吐酒石
- 麻油 糞清

鴉片毒

鴉片ハ奇効ノ有モノニテ疾疾ヲ救フヲ最多シ然レ  
ト大毒ノ有モノユエ分量ヲ妄ニシ服法ヲ慎マサ  
レハ人ヲ殺スヲ亦鮮ナカラス洋烟ノ毒ハ人人既  
ニ知ル所ナレハ復此ニ論セス今洋烟ノ外ニ鴉片  
ノ一大害有リ世ニ賣買スル調劑丸活兒丸痢病丸  
ノ類總テ痢病ノ妙藥ト云フハ皆鴉片ナリ輕痢或  
ハ泄瀉等ニテ熱ノナキ證ヘ用ユル寸ハ下利速ニ  
止ミテ奇驗ノアル者ユエ下利ニハ一概ニ宜シキ  
ヤウニ心得熱ノ強ク下利ノ多キ證ヘ用ヒ下利速

ニ止ミ腹滿嘔吐。脉沉伏。四肢厥冷等ノ證竝起リテ  
死スル者夥シ凡小兒ノ痢病ニ下利ノ俄ニ減シ嘔  
氣出テ、乳ヲ嘔<sup>ホ</sup>マヤウニナリ乍ニ容體ノ變スル  
ハ必竊ニ痢病ノ賣藥ヲ用ヒタルモノナリ右ノ諸  
候アラハ病家ヲ詰問シテ鴉片ノ毒ナルコトヲ知ル  
ヘシ如此害ハ有ル藥ヲ賣ル者モ其非ヲ省ミス服  
スル者モ亦其禍ヲ悟ラス賣買ノ益行ハル、ハ其  
害洋烟ニ異ナラス

予カ家ノ轎夫欬嗽出テ、毎夜喧シク傍人安眠スル  
コトヲ得ス弟子等之ヲ厭ヒテ阿芙蓉液ノ量ヲ定法

ヨリモ倍シテ與フルニ終夜昏睡シ明旦ニ至テ起  
タレ<sup>レ</sup>氏瞑眩尚未タ解セス予ハ阿芙蓉液ヲ服シタ  
ルコトヲ知ラサル故轎夫ヲ使令シテ市中へ遣ハス  
ニ精神恍惚トシテ行ク處ヲ忘レ方角ヲモ辨スル  
コト能ハスシテ同シ道ヲ幾回モ往來シ大ニ時ヲ移  
シ日晡ニシテ歸リタレ<sup>レ</sup>氏用モ辨セス又往來シタ  
ル處ヲ回顧スレハ夢ノ如シト云ヘリ是過量ニ服  
セシムル故ナリ然レ<sup>レ</sup>氏痼疾ノ欬嗽全治シテ再發  
セサルハ鴉片ノ神効ナリ府下常盤山圓淨寺ノ僕  
柳治年五十歳泄瀉ヲ患ヘテ久シク愈ヘス因テ阿

芙蓉液六十滴ヲ與ヘニ夕ニ用ユヘシト教ユルニ  
誤テ一度ニ服シ昏睡シテ明旦ニ至リ忽チ高ク喚  
一一聲同室ノ者驚テ之ヲ視ルニ人事ヲ省セスシ  
テ中風ノ如ク癲癇ノ如ク又醉人ニ似タリ煩亂シ  
テ衣被ヲ發開シ直視口噤或ハ涎沫ヲ吐キ氣息微  
急脈沉遲ニシテ四肢微冷シ昏睡シテ居レ氏至極  
苦痛ノアルヤウニ見ユ弟子等代診シテ必死ト爲  
シ先ツ吐劑ヲ與ヘント欲スレ氏牙關噤閉シテ用  
ヒ難キユ工醞醋ヲ齒隙ヨリ吹込ミ又顔ヘモ嚙テ  
介抱スルニ日晡ニ及ンテ稍安靜ニナリ又鼻息麁

給トシテ昏睡スルユ工其儘卧サシムルニ第三日  
ノ旦ニ及ヒ初テ醒覺シ常ニ復セリ瞑眩中ノ事ヲ  
問フニ少シモ覺ヘスト云ヘリ是ハ服法ヲ誤リテ  
死地ニ隣スルニ至レリ嘗テ崎港ニ遊學ノ時洋醫  
「シイボルト」一男子ノ粉瘤ヲ截斷シ縫合スルノ後  
焮熱腫痛殊ニ甚シクシテ阿芙蓉液ヲ與フルニ本  
人ハ勿論看病ノ者モ其痛ノ止ムヲ喜テ頻服セシ  
ムルニ昏睡シテ遂ニ死セシ一有リ又城南ニ一里  
塚ト稱スル地アリ此ニ盲人長門一ト云ヘル者ア  
リ頗占法ヲ善クシ且人ノ口氣ニ因テ其懷抱ヲ迎

へ知り百占百中ニシテ一失ナキニ近シ世俗皆其  
妙ヲ稱シ請者遠近ヨリ輻湊シ旦ヨリ暮マテ絡繹  
トシテ絶ヘス履常ニ其門ヲ填ニ至ル一草醫ノ旦  
ニ過テ占ヲ請フアリ時ニ長門不寐ヲ患フル日  
久シ談次治法ヲ尋ヌルニ草醫鴉片ヲ服スヘシト  
テ教ユ長門大ニ喜テ遽ニ人ヲ藥舗ヘ走ラシメ錢  
二百文ニテ鴉片ヲ買フ僅僅一撮ニ過キス其三  
分ノ一ヲ分チ水ニテ頻服スルニ須臾ニシテ睡ヲ  
催シ鼻息齟齬タリ家人其容體ノ異常ナルヲ見テ  
大ニ驚キ喚ヒ起セ氏沉昏シテ醒ス倉皇テ醫者ヲ

迎ヘ診セシムルニ六脈已ニ絶シ藥餌鍼灸交施セ  
氏遂ニ蘇セス予自ラ其家ニ就テ其首末ヲ詰問ス  
ルニ家人飲ミ殘シタル藥ヲ示セリ即チ津輕鴉片  
ニテ重サ七分アリ藥舗ヲ審問スルニ鴉片ノ定價  
孔方二百文ニ付一匁ナリ因テ考ルニ服スル所ノ  
鴉片ハ纔カ三分許ノミ鴉片ノ分量五分ヲ服スル  
片ハ死スルヲ西洋ノ書ニモ見ヘタレ氏僅ニ三分  
ニテモ死スル者ト見ヘタリ以上ニ述ル通り奇驗  
モアレ氏又酷毒ノ物ナレハ分量服法等ハ謹慎シ  
テ使用スヘキナリ



治法鴉片ノ毒モ他ノ中毒ト同様ニテ吐法ヲ第一ノ  
 良策トス吐酒石ハ七厘「イペカコア」ハ一錢瓜蒂  
 ハ五分用ヒテ可ナリ口ヲ噤シテ藥ノ入り難キモ  
 ノハ鼻孔ヨリ灌クヘシ又醎醋ハ鴉片風茄兒等ノ  
 麻毒ヲ解スルノ聖藥ナレハ頻服セシメ又面目及  
 身體ヘモ喫ヘシ又醎醋ヲ以テ灌腸スヘシ又尺澤  
 ヲ刺絡スルヲ善トス

鴉片毒應用方

吐酒石 「イペカコア」 瓜蒂 醎醋

續癆科秘錄卷之五 終

棗軒本間先生著述目錄

傷寒論類釋	十卷	近刻
傷寒論取策	五卷	近刻
内科秘錄	十五卷	
癆科秘錄	十卷	既刻
續癆科秘錄	十卷	既刻
療治知要	五卷	近刻
醫方纂要	五卷	近刻
醫方纂要分註	七卷	近刻
經穴撮要	一卷	近刻

皇朝醫林談

七卷

近刻

藥室雜識

三十卷

近刻

日新醫談

三卷

近刻

我素軒先生折衷漢蘭兼精內外平生生死肉骨不可勝紀所著之書凡若干種盡出于實驗往往發前賢所未發誠臨證施治之指南卓矣非世之掇緝古人陳言紙上逞空談者之比也門人相謀將陸續開雕以公諸天下茲揭其目以誌四方學者

門人 川又誠等謹識

京都三條通外屋町

出雲寺文次郎

同 東洞院通三條上町

村上勘兵衛

大坂心齋橋通比久太郎町

河內屋喜兵衛

同 南久宝寺町

伊丹屋善兵衛

東京日本橋通二丁目

須原屋茂兵衛

同 淺草茅町二丁目

須原屋伊八

同 日本橋通二丁目

山城屋佐兵衛

同 同所

須原屋新兵衛

同 芝神明前

和泉屋吉兵衛

同 同所

岡田屋嘉七

同 神田須田町

和泉屋勘右衛門

同 横山町三丁目

和泉屋金右衛門版

終