

程

新刊痘疹傳心錄卷之二

西吳朱惠民 著

○春夏為順秋冬為逆辨

論曰四時者陰陽之功序也氣血者人身之根蒂也蓋陰陽有消長氣血有盛衰痘毒有淺深豈可槩以順逆論哉今之人皆曰春夏為順秋冬為逆但能述古人之言而不能繹古人立言之義也以意逆之痘之順逆之說有二有四時之順逆有合四時之順逆今以四時之順逆論之曰痘疹屬陽

而春乃為發陳之時。夏為蕃秀之令。在人則玄府空竦，榮衛通利，脂膏潤澤，故痘易出而易解。樂其生長以為順也。若乃秋為容平之候，冬為閉藏之司。在人則氣血凝泣，腠理固密，脂膏澁滯，故痘難出難解。惡其收藏以為逆也。故經曰：順其時則順，逆其時則逆。是以聖人春夏養陽，秋冬養陰也。然而痘合四時之順逆者，又何如哉？且初出猶春之生，起發猶夏之長，成膿猶秋之收，結痂猶冬之藏，循循有序，迺相成功，以為順也。如初出而便見秋

之膿泡，起發而便見冬之黑陷成漿，而猶見夏之紅艷結痂，而猶見季月之疹黃。此四時之失序，五臟之更張，以為逆也。故經曰：陰陽從則生，逆則亂。是以聖人謹熟陰陽，無失氣宜也。然以其分而言之，則雖有四時之順逆，統而言之，則歸於氣血之盛衰。痘毒之微甚，氣血盛痘毒微者，雖發於秋冬，不為逆；氣血衰痘毒盛者，雖發於春夏，不為順。豈可拘拘於時令之說耶？由是觀之，順逆之說，信不在於四時，而在於氣血。欲求四時順逆之說者，豈

可外氣血而言之哉

痘

有當汗下者有不當汗下者

錢氏論痘瘡發散利下皆不可妄又曰非微微者也過汗則表不解非微下則裡不解蓋言表熱方熾痘點未見之先或外感寒邪約束腠理痘目出不快此當微汗之令陰陽和榮衛通俾痘易出而毒易解也不然則邪無疎洩留伏於內未免閉門留寇之禍乎若原無閉塞不快之症妄用藥以汗之則又成表虛痒塌斑爛之患也如痘出時煩熱譫

語喘脹便秘此毒蓄於腸胃之間當微下之俾臟腑疏通陳莖滌去氣血和平而毒易升發也不然則藏滯蓄毒煎熬於中寧無養虎貽害之悔乎若原無裡實壅熱之患而妄用藥以下之則又元氣下陷痘致灰白而變為虛脫之症矣可不審其表裡虛實之宜而妄為汗下之哉

○痘症驚搐

古人謂先發驚而後發痘者是熱在痘而不在心曰生先發痘而後發驚者是熱在心而不在痘曰

死蓋驚搐

驚出於心搐發於脾其候駛然而之所厥則同而其所以致之者則異內經曰諸痛痒瘡

瘍皆屬心火且痘毒之始作蓋曰火熱已極熱極

生風風撼肝木木來侮土土受邪而歸於心心之

神氣不安故發驚搐治法宜疏透祛風利小便疏

透則毒易出祛風則肝自平利小便則心熱自退

毒與風熱既洩則心神自安而痘出自愈矣亦有

曰風寒所激而發者有曰脾氣虛弱而作者不可

不辨若痘後而發驚搐者痘既出之後脾氣尚弱

陰血尚虧而心神游溢溢則舍空邪曰入而容之

是以發搐也此類慢驚治見慢驚條凡驚搐發一

二三次即止而見痘者必稀而順發之十數次而

報點者必密而重報痘一二日而驚搐不止者多

重故曰痘前驚搐者吉若發之不止乃毒伏於心

未可以言吉也

○吐利不食

凡痘疹發熱有嘔吐者有泄瀉者有吐利兼作者

有不食者皆曰毒火所致而然也內經曰諸嘔吐

暴注皆屬於熱蓋三焦為水谷傳化之道路毒火  
內迫傳化失常而吐利併作火性燥動迅歛故也  
又曰邪在上焦則吐邪在下焦則利邪在中焦則  
吐瀉兼作但不可驟止吐利中有疏通之義邪氣  
上下分消無壅遏也治宜平和疏通升提發散之  
劑俾引毒達表則吐瀉自止如不止乃脾胃有虧  
治兼調脾為上其不嗜食者此亦脾經受熱毒而  
然也亦當以升提發散之劑主之俾毒得外出飲  
食自進矣若悞認嘔吐泄瀉不食之症為裡寒而

用丁桂姜附者是以熱投熱而轉增其煩劇也若  
悞認嘔吐泄瀉不食之症為裡虛而用參芪苓朮  
者是以實投實而反增壅遏也此專為痘毒初出  
未透者而言若漿正行之時或漿既足之後而吐  
利不食者乃脾胃虛弱也其能免內虛倒靨喘脹  
之禍乎至若更受寒邪口食寒物脾胃停寒而泄  
瀉清冷痘色灰白手足厥而寒戰咬牙則陳氏異  
攻溫補之法庶可用也

○嘔吐噦

有聲有物為之嘔有物無聲為之吐有聲無物為之噦噦者乾嘔也乾嘔者其聲輕小而短噦者其聲重大而長嘔吐噦皆屬於胃蓋胃為水谷之海主納而不出如初出而有是症者此火邪犯胃其氣上逆而然也若起發以至收靨而有是症者胃氣不足而不能容受也夫人以胃氣為本故曰有胃氣則生無胃氣則死內經曰胃敗者其聲噦蓋嘔吐噦痘疹最為惡候不可不辨虛實而治之

○渴

三焦者水谷之道路津液者水谷之精華變化流行以灌溉乎三焦也痘疹之火起于內銷鑠水谷不得變化津液故渴也又曰有氣虛火盛津液枯竭而渴者宜大補元氣其渴自止若毒火盛實便秘溺澀煩渴壯熱痘色乾紅焦紫而渴者治以清涼降火之劑如火熾則水不涸又痘疹稠密津液外洩化為膿漿不能滋養真氣而渴者常病也宜生脈散或炒米湯亦好切不可冷水梨橘西瓜等物恐損脾胃致生後災也

一兒痘九日尚空殼無漿根血乾紅壯熱口渴津液乾涸咸謂氣虛以保元湯加麥門芎桂而愈甚余謂火盛水涸之羨若專補氣反助其陽而陰愈虧矣經曰津液者由腎水而生也盛則能制諸經之火不足則火盛而水衰火毒既亢君相之火並起煎熬腎水銷鑠肺金金銷則水不生矣治法滋腎水為主腎水既生津液盈足則諸火自退病机曰治諸熱者宜滋腎水以六味地黃湯加人蔘麥門當歸枸杞子兔絲子知母

### 治之愈

一兒十九歲患痘六朝勿朗綻凸淡白少神渴甚不已余為精虛氣弱而津液枯竭以人蔘<sub>二</sub>麥<sub>兩</sub>門冬<sub>半</sub>枸杞<sub>兩</sub>水六碗煎四碗漸服又以補中益氣湯加枸杞二劑再以保元加麥門冬枸杞子歸芍治之九朝漿足渴止計用人蔘一觔愈予回驗而錄之

一兒十七歲新婚後出痘煩渴躁熱時求冷飲余謂水弱火炎治宜壯水之主以八味地黃丸料



加生脉散又補中益氣湯愈又一男痘症額前以冷水飲即睡甦則復求不已余謂腎水乾涸不能制火乃孤陽絕陰者也又天令大寒尚不能制其熱藥何能為不治也遂易醫治之漿雖行不能收斂二七日而卒內經曰陽無陰不化正此謂也

○身痛論

經曰諸寒為痛又曰甚熱則痛又曰諸痛為實三說不同各有其理試陳其畧且當熱作之時毒始

方運忽遇暴寒折之內熱為外寒閉而不得伸外寒為內熱拒而不得入毒邪壅於皮膚之間不能宣發此曰寒而痛也治宜透肌運表之劑主之如煩躁渴甚狂言譫語便秘溺赤更值春暄夏炎之時痘見乾紅焦紫就火熱而痛甚就陰冷而痛衰此曰熱而痛也宜清涼化毒之劑治之若身不壯熱口不煩渴飲食如常二便清調痘見尖綻紅澤至七八日漿極充滿之時惟覺根窠脹痛者此諸痛為實也宜平和疏養之劑治之三者各合經旨

加生脉散又補中益氣湯愈又一男痘症類前  
以冷水飲即睡甦則復求不已余謂腎水乾涸  
不能制火乃孤陽絕陰者也又天令大寒尚不  
能制其熱藥何能為不治也遂易醫治之漿雖  
行不能收斂二七日而卒內經曰陽無陰不化  
正此謂也

○身痛論

經曰諸寒為痛又曰甚熱則痛又曰諸痛為實三  
說不同各有其理試陳其畧且當熱作之時毒始

方運忽遇暴寒折之內熱為外寒閉而不得伸外  
寒為內熱拒而不得入毒邪壅於皮膚之間不能  
宣發此曰寒而痛也治宜透肌運表之劑主之如  
煩躁渴甚狂言譫語便秘溺赤更值春暄夏炎之  
時痘見乾紅焦紫就火熱而痛甚就陰冷而痛衰  
此曰熱而痛也宜清涼化毒之劑治之若身不壯  
熱口不煩渴飲食如常二便清調痘見尖綻紅澤  
至七八日漿極充滿之時惟覺根窠脹痛者此諸  
痛為實也宜平和疏養之劑治之三者各合經旨

何有不同之疑乎

○腹脹痛

錢氏曰：發熱腹中痛，斑瘡腹內攻，蓋痘出而腹痛者，皆由毒鬱於三陰。臍以上痛者屬太陰，脾當臍痛者屬足少陰，腎小腹痛者屬足厥陰。肝宜分別之。又腹脹者，由毒鬱於腸胃而然也。皆宜化毒疏利為主，使毒氣內外分消，則痛與脹自止。經曰：痛隨利減，脹以利消。又曰：通則不痛，痛則不通。此之謂也。○有食物不消化而脹痛者，香砂丸。乳食不化者，麥牙散。○有曰風寒所激，毒

留於中，不能盡達而痛者，疎利為主。○痘六七日，曰胃氣不調，氣逆而脹痛者，行氣理脾為主。○痘八九日，脾虛少食，蛇虫無依而動痛者，宜保元湯加白朮、炮薑、史君子、陳皮、煖胃安虫為主。○亦有曰食寒物有過，投寒藥而痛者，宜理中湯加藥肉桂主之。○有痘初發時而心腹痛劇，煩悶啼叫，喘促者，此毒伏不透逆也。○有氣虛倒靨而脹痛者，如其人事清爽便調，能食宜攻，發而痘復腫，灌為吉。若悶亂煩躁者，逆也。○有痘生長時而倒陷腹

何有不同之疑乎

○腹脹痛

錢氏曰：發熱腹中痛，斑瘡腹內攻，蓋痘出而腹痛者，皆由毒鬱於三陰。臍以上痛者屬太陰，脾當臍痛者屬足少陰，腎小腹痛者屬足厥陰。宜分別之。又腹脹者，由毒鬱於腸胃而然也。皆宜化毒疏利為主，使毒氣內外分消，則痛與脹自止。經曰：痛隨利減，脹以利消。又曰：通則不痛，痛則不通。此之謂也。○有食物不消化而脹痛者，香砂丸、乳食不化者，麥牙散。○有因風寒所激，毒

留於中不能盡達而痛者，疎利為主。○痘六七日，因胃氣不調，氣逆而脹痛者，行氣理脾為主。○痘八、九日，脾虛少食，蛇虫無依而動痛者，宜保元湯加白朮、炮薑、史君子、陳皮、煖胃安虫為主。○亦有因食寒物有過，投寒藥而痛者，宜理中湯加藥肉桂主之。○有痘初發時而心腹痛劇，煩悶啼叫，喘促者，此毒伏不透也。○有氣虛倒靨而脹痛者，如其人事清爽便調，能食宜攻，發而痘復腫，灌為吉。若悶亂煩躁者，逆也。○有痘生長時而倒陷腹

脹者不治。○有實症誤投溫補有虛症過於補益而上膈飽脹者寬中湯解之善治者宜當詳審。

○腰痛

凡痘疹發熱腰痛或痛連背脊轉側不能其候為至惡經曰腰者腎之府又曰太陽所至為腰痛蓋足太陽膀胱經其脉俠脊抵腰中入循脊絡腎痘毒起於腎腎屬水乃天一所生人之根蒂循足太陽散於諸經由裡傳於表也若腎郭虛損邪火亢盛真陰不能勝邪故毒乘腎而腰痛也痘色必紫

黑宜解毒以瀉少陰之邪發表以通太陽之經使邪氣不能以深入若熱毒得解然後調理氣血庶可挽回。如此治之而痛不止形色不活者終不能救矣。

○附治驗

或問曰一兒初發熱腰痛報點黑色不盡斂形而死又一兒雖斂形而紅變紫紫變黑而卒此二者何也余曰夫痘之為症得陰陽交濟四時順布乃為全道內經曰陰無陽不生陽無陰不化二者互

相為用一有乖離亢若矛盾則痘之惡形亦必感于中而應于外也故曰痘之出雖藉氣血甲胆以為升發甲胆者陽木也藉癸水之漬而得生若腎水不足則木無生氣故春升之令不行而痘為之伏也伏者悶也毒既韞於內而痘豈有能彰形者哉雖彰形而紅變紫紫變黑者此曰腎水枯竭毒火亢盛火食其氣熱耗其血不能潤乎皮膚滋乎腠理而瘡中之血亦以乾涸而變黑色也蓋血色本赤而乾則變黑也伏變之理雖有緩急之分要

知其原則歸於一也

一兒十四歲初發熱腰痛痛連背脊不能轉側初見點於左耳側余視腰左一點如筋頭大平而紫又舌中心一點黑而聳余曰此乃稟賦腎間陽氣不足故毒滯於腎逆也父母不忍強以四牙散發出俱紫黑點五日而逝

一庠友十八歲初發熱腰痛不已咸謂腰痛出痘症屬腎經不治召余視見點在左額角而又紅綻光澤實心經所發原其腰痛之故乃非腎氣

稟賦不足而逆也。只須滋其腎水，可保無虞。以六味、地黃丸料，加枸杞、杜仲與升、熟、藥間服。腰痛止及痘盡出，至八九朝，煩渴，謔妄，唇燥，舌黑，睡卧不寧。余謂腎水不足，火炎無制，不能上潤於舌，故舌乾而渴也。治以保元湯，加歸、芍、麥、門、枸杞、酸、棗、仁、龍、眼、肉，間服八味、地黃丸。又以人蔘、麥、門、冬、枸杞子煎湯，漸服愈。

又一兒痘症，似前醫只補元而不滋陰，以致陽愈盛而陰愈虛，雖死粘着不脫，津液枯涸而卒。

### 咳嗽

咳者謂無痰而有聲，肺氣傷而不清也。嗽者謂有痰而無聲，脾濕動而生痰也。有痰有聲方為咳嗽。蓋痘之咳嗽，有曰毒火刑金，肺氣焦舉，故發聲而為嗽。治宜清肺解毒為主。○身熱頭疼，咳嗽者乃風寒客肺，則肌腠窒塞，肺氣不能宣發而然。治宜疎風清熱為主。○痘歛而乾咳者，乃肺氣虛耗也。治宜滋補正氣為主。○亦有肺腕有痘，淫淫如痒，習習如梗，阻碍氣道而為咳嗽，痘收自愈，不須治。

之臨症更宜詳究虛實不同一治

痰

內經曰諸氣臍鬱皆屬於肺肺氣鬱則成熱熱盛則生痰痰者津液所生也蓋痘出而痰者由毒火盛榮衛不清氣血濁敗凝結而成也治宜清火解毒為主○咳嗽身熱脉浮數者乃風邪客肺肺氣不能通暢邪鬱為熱而生痰者治宜散風利氣為主○舌乾唇燥左尺脉弱而痰涎者乃水弱火炎肺受火侮不得清肅下行由是津液凝濁而為痰

也治宜壯水之主○腹痛瀉泄者乃食飲傷脾胃弱失其健運之常不能致精於肺而生痰者治宜調脾為主○有氣實而誤投補益有氣虛而過用參芪氣滯而生痰者治宜導氣為主○有毒氣倒陷氣逆而為痰者難治也

喘

喘呼吸不有虛虛喘必微氣實而氣息且長不同

要皆熱毒擁遏肺金受制而然也經曰五臟之氣皆統於肺故肺為氣之主居至高之分喜清虛而



不欲窒碍若為邪氣相干則肺竅壅塞痰而為喘也○如痘初出噴嚏鼻流清水而喘者此風寒客肺而然也宜葶蘇飲主之○痘點乾紅腹脹便秘而喘者乃毒火盛實而氣不能舒暢宜清火解利為主○有正氣虛不能逐邪外出毒伏於內而為喘脹者乃悶痘症不治○有瀉後而喘者乃元氣下陷虛火上擁下氣不續此脾氣不足而然也宜補中益氣湯主之○有吐後而喘者此胃虛不能制伏相火火逆上冲而然也宜六君子湯主之○

痘四五日倒陷而喘脹者必再攻痰而痘復起者可治○痘漿半足而倒靨喘脹者宜補兼攻痰而復腫灌為吉○有過補而喘有悞補而生痰喘者宜寬氣飲以消葶著之滯○有痘密以致鼻塞而口中氣促似乎喘者非喘也槩以喘治悞矣

### 聲啞

痘之始終最要語聲清亮為吉經曰心之氣發於肺而為聲其喉之竅猶管籥也肺屬金金空則鳴實則啞若毒火上薰於肺肺受火鬱故竅塞而聲

啞也宜導赤散合甘桔牛旁湯主之。○痘初出客  
胃風寒痰壅而聲啞者疎解為主。○有毒盛擁窒  
肺竅而聲啞者清火解毒為主。○五六月後脾虛  
不能制其相火至令上冲肺金而聲啞者宜六君  
子湯加潤肺之藥主之。○有氣虛倒靨而聲啞者  
不治有氣虛宜補補而聲啞者不治。○若漿足而  
聲啞者乃氣道不清也宜甘桔湯主之。○有痘出  
咽喉初小而不覺及至成漿壅窒以致氣道不利  
而聲啞也痘收自愈。○有喉舌潰爛而失聲者不

治有痘黑陷伏則毒入腎而失聲者不治

### 水噎

或問噎水者何蓋水入則噎者由毒壅咽喉也蓋  
咽喉司納飲食通於口入於胃今為毒所壅則飲  
不得入而乃溢入氣喉喉司氣之出入通於鼻而  
統於肺至清至虛有形之物不容毫末故氣逆噴  
出而噎也治宜甘桔牛旁湯主之又有痘出咽喉  
外痘生長內亦生長故壅窒道路而然者痘收自  
愈或進穀食而不噎者蓋食有渣滓自能入其門

也故曰聾啞主於肺嗆水主於胃也

### 自汗

汗者心之液諸瘡皆屬心火蓋痘出而汗者由毒火薰蒸臟腑而生熱熱搏於心為邪所勝故液不能內藏溢於皮膚而為汗汗者邪氣外洩痘易出而解也若汗出不止而熱甚為陽虛恐成瘁塌潰爛之患治宜固表清熱解毒為主○又有風寒外客身熱頭疼咳嗽清涕而汗者乃邪從汗解無害○又有痘出平陷淡白少神身涼而汗者乃表虛

自汗治宜保元實表之劑○又有肌表脆嫩醫過發表之劑而自汗者此虛其虛也治從虛例○又有重帷煖炕厚衣衾蓋燻蒸而汗者宜漸減而清涼之其汗自止也為治者宜辨其從來不可妄耳

### 失血

夫血屬陰所主在心統化在脾藏內在肝宣布在肺輸泄在腎灌溉一身滋養百脉諸經由由此而生毓焉然血之所統者氣也故曰氣主响之血主濡之是以氣行則血行氣止則血止氣溫則血滑氣

寒則血凝蓋痘出而失血者由毒火薰灼於內迫血妄行隨火而動或上逆而吐衄或下注而便血也○若氣血足毒火亢盛而失血者乃邪從血解無害亦當清血解毒若治之不止者凶也○有氣血虛而毒盛失血者不治有悶痘而五竅流血者不治有痘倒陷而鼻流血水者不治○又有熱症悞投熱劑而失血者治宜清涼解毒為主○痘未盡出而用寒涼毒為涼激傷脾氣不能運動其血致逆於臟腑之中內毒擊搏滯於膏膈之上積成

穢血妄行而暴吐衄昏運軟倒痘色淡白陷伏者宜溫補為主理中湯獨參湯故仲景治血脫益氣東垣論陽生陰長是也○痘尖綻紫滯而衄者乃毒火刑金宜四物湯俱炒黑加紅花丹皮黑山梔為主○有靨後餘毒乘脾脾氣受傷不能統血歸經妄行而衄者宜用芍藥黃連俱炒黑合參苓白朮為主若燥熱悶亂口乾渴而衄者宜犀角地黃湯加黃連黑山梔黑薑為主○有毒甚壅熾肺金受制流注大腸而便血者宜四物湯加苓連地榆

荆芥丹皮或犀角地黃湯加紅花熟艾清火涼血為主○凡諸失血惟從鼻出者多有可治從口便出血者多有不治也

### 煩躁啼叫

蓋痘疹之有煩躁者皆由毒火盛則金熾而水涸也故曰火入於肺則煩火入於腎則躁又曰煩向心生躁從腎發皆心火盛而為之也若痘未出而煩躁者乃毒火內鬱或風寒壅遏不能即出治宜發散為主痘未盡出而煩躁者亦毒火盛也治宜

升發疏利為主痘盡出而煩躁者乃血熱毒盛也治宜涼血解毒為主痘養漿時而煩躁者當辨虛實療之若痘頂平淡白少神漿不易充者此氣血不足治宜保元湯加麥門冬酸棗仁歸芍主之若綻凸紫滯便秘溺澀者乃正氣足而毒盛不解治宜解利為主四順清涼飲三黃丸若痘倒陷喘脹而煩躁悶亂者乃正氣虛而毒盛不治也○啼叫者由毒乘於心心神為熱所迫不能自安而然也治宜清金化毒為主亦有腰腿痛而啼叫者治宜

六味地黄湯加人蔘當歸羌活肉桂牛膝主之亦  
有內傷腹脹痛而啼叫者治宜香砂丸消之有正  
氣弱不能逐邪外出毒壅而腹脹啼叫者逆也臨  
症當辨及之

### 痒塌

經曰氣虛則為陷伏血虛則為痒塌諸痛為實諸  
痒為虛又曰火盛則痛火微則痒痘初出而遍身  
作痒者此邪氣欲出曰風寒封閉腠理其火游移  
往來故痒也與傷寒汗不出而身痒者同治宜疏

散而瀉肝木使腠理開通邪氣得洩痘出而痒自  
止所謂火鬱則發之者是也○痘收斂而作痒者  
膿成毒解火氣漸微宜爾作痒也與癰癤將痊而  
痒者同○痘養漿時淡白平塌少食便溏漿清而  
痒爬抓不寧者此脾胃弱而氣血俱虛也治宜補  
氣和中托裡為主不應藥者凶也○痘色紅紫乾  
滯二便秘口渴煩躁漿充而痒抓破血流者此氣  
盛血熱也治宜清血解毒為主○如作痒而人事  
清爽自知其悞抓破者或言其痒欲人拊之吉如

作痒而悶亂煩躁語禁不止搖頭扭頸手足舞亂  
破損而眼劄目開凶也若他處破損而正面不破  
者其臟腑精華不散尚宜治之若破處復腫灌成  
瘡者此正氣不虧而又能成功也若破不結靨如  
無膚之木寒戰咬牙便泄噦噎者逆也

### 寒顫咬牙

寒顫者侶寒而實熱也蓋痘正出外為寒邪所襲  
則肌腠閉塞而不能宣達故邪正相拒而戰爭也  
與傷寒發顫者同論治宜疏解之○咬牙者陽明

經主之其經走上下齒齦邪併陽明故閉齒也主  
胃熱治宜清解之此以毒未透者而言也○若養  
漿時寒顫者乃陰凝於陽陽分虛則陰入氣道而  
作顫也宜保元湯加丁桂而溫陽分○咬牙者乃  
陽陷於陰陰分虛則陽入血道故咬牙也宜保元  
湯加芎歸以益陰分○若二症並見喘促悶亂腹  
脹泄瀉乃正氣虛寒而痘倒陷不治也又曰二症  
並見者屬足少陰腎腎者主蟄藏之本在變動為  
慄牙為骨之餘寒顫則鼓頷而兩牙相軋也治宜

異攻散主之

夾痧

形如雲頭而突色赤成片而無頭粒謂之班班乃血之餘也因毒火鬱遏煎熬陰血血熱相搏故與痘相夾而發之於外片片如錦紋者是也宜清血解散之劑荆防升葛蟬蛻之類其班既退宜辨虛實療之若養漿時而發班者乃血熱不解浮於肌肉散漫於皮膚而為班宜涼血化班湯主之若結痂之後而發班者此餘毒而發也治宜解毒化班

湯主之故曰班發七日之前多宜表散七日之後多用解利慎在得中若延滯日久則血液乾枯痘難成功也班色紅活為吉紫滯者毒盛也藍班黑班者凶也

一兒痘倒靨余審其能食便調以清血解毒蒸二七日遍身紅班乃餘毒悉於此而盡間有班爛以長肌散敷之愈

夾疹

痘已見形間有頭粒細密如麻子者此夾疹也心



鑑曰痘毒之發被風寒壅閉腠理濕蒸火熾觸動  
腑毒故與痘並出也夫疹痘者穢液之一氣也但  
所受有淺深之殊而所發有臟腑之異蓋痘出於  
臟疹出於腑臟屬陰乃為積受之地其受毒最深  
腑屬陽而為傳送之所其受毒尚淺故痘之始終  
每以二旬日為限疹之消長一晷時而已可不從  
其急而先其治乎經曰急者先治治宜先散其疹  
而後治其痘疹不散則痘不起疹一散則痘勃然  
而興莫能禦之矣若不先散其疹而妄治之則疹

邪留滯於肌表故痘不起而有煩喘悶亂之患若  
疹散痘起綻凸勻朗紅潤其勢吉矣若疹雖散而  
痘稠密平塌灰白紫滯其勢亦險也經曰痘夾疹  
者半輕半重也又有痘出時客冒風寒鬱於肌表  
不能作汗而解其風火相搏發而為疹與傷寒發  
疹者同亦當先散其疹而後治其痘也

### 夾癭

夫癭為痰毒由風熱與血熱相搏凝結而成也或  
結於頸項或結於耳後大者如菴小者如李若痘

標之始而癭紅腫將膿恐毒膿一潰元氣澆漓焉  
能生毒若痘起脹之時而癭紅腫將膿恐痘隨毒  
洩焉能昂峻若痘正作漿之始而癭紅腫將膿恐  
漿隨毒化元氣不足焉能充灌大抵痘漸能生長  
而癭漸退者為吉若癭起凸而痘反退伏者為凶  
若癭起成膿而痘亦生長成膿亦主無恙

先疹後痘

謂疹已愈而  
後報痘也

或問先疹後痘者重何也曰痘毒必賴氣血而發  
乃解若先發班疹已愈而後報痘者氣血受傷於

前恐不能任痘之宜發而難化漿故重也

治驗

一兒疹後報痘不易長大乾咳連聲不續原其疹  
時過於發散以致肺氣虛耗以保元湯加貝母  
麥門五味桔梗橘紅等治之愈

一兒疹後痘出三日痰嗽喘急詢其疹時失之解  
散以致疹毒留滯於肺余以甘桔湯加前胡牛  
旁蘇子橘紅連翹蟬蛻疏邪解毒清肺而愈  
又一兒疹後出痘皆由疹時失於解散咽喉腫閉

聲啞水噎飲食不能痘倒陷而死

### 先痘後疹

或問先痘後疹者輕何也曰若痘後餘毒鬱而不散遂相煽搏於肌膚之間倏然狀如麻疹而痘所遺之毒火悉於此盡矣故輕也

### 附治驗

一兒痘後發疹余謂此痘時過用實表之劑故也宜解散之以荆芥防風白芷連翹牛蒡甘草陳皮只殼黃連等加減治之愈

一兒痘後發疹咳嗽氣急身熱余謂六淫外襲以升麻葛根湯加密炒麻黃治之又防風荆芥甘草桔梗前胡杏仁桑皮地骨皮黃連治之愈

一兒痘後發疹一醫擬痘後氣血兩虧以補散兼治喘脹而逝

一丙申夏月一兒痘後發疹壯熱痰喘煩渴謔語便閉余審其表裡實而過投溫補致毒乘脾胃也與胃熱發癍同論先以三黃丸利之又竹葉石膏湯加黃連人中黃治之愈

二便閉澀

蓋痘疹要小便長而清大便踈而潤謂之裡氣和若一有艱阻論見本門二便俱閉則毒邪內畜腸胃壅遏不能傳化而然也故曰一息不運則机絨穹治宜清解而利之得大便通溺自利矣三黃丸四順飲胆道法之類此專為痘始發時而言之若痘正養漿時而二便秘者宜審虛實治之中病即止若飲食如常二便如昔內症平和不可溫補亦不可妄攻擊也

大便秘結

經曰腎主液腎實則津液足而便滋潤腎虛則津液竭而便燥結蓋痘疹便秘者由毒火內乘脂膏外暴耗損津液以致腸胃乾燥故便秘也若痘白色少神不食嘔清水者虛秘也宜補氣血為主○若血熱症口乾煩躁腹脹便秘者宜六味清涼飲治之而便自通矣○又有熱毒燥結於大腸而秘者四順飲又蜜導之或胆導亦可○有醫人過利小便以致津液乾涸而秘者生脉散加當歸益之

亦可○又有氣血拘化成漿而四五日不大便者  
漿足自利也臨症更宜詳審虛實而治之可也  
一男子十九歲出痘便結初云便實為佳至十二  
朝尚不能便口乾煩渴左尺脉浮大余謂陰水  
不足而津液虧少故便結也以當歸生地只殼  
人蔘麥門知母枸杞子兔絲子治之便利而愈

小便赤澁

痘疹小便赤澁者由毒火盛膀胱受熱而不利也  
經曰諸痛痒瘡皆屬心火心移熱於小腸小腸移

熱於膀胱膀胱為津液之府氣化則出氣為火食  
則津液內涸而溺澁也東垣曰膀胱者主足太陽  
寒水之化其体有下口而無上口肺金為之母以  
資其化肺金清肅則水道通調滲營於下肺金為  
火邪之制不能清利水道而小便赤澁也治宜清  
金解毒以泄其熱而小便自利矣○又有毒流在  
肺積痰塞其氣道以致上竅閉而下竅不利者宜  
清肺以開竅則溺自利矣○又有元氣虛弱不能  
清理傳導則清氣不升濁氣不降而溺澁者宜補

中益氣湯加知母麥門冬主之業是者當求其所  
因活潑施治

附治驗

一兒靨後小便赤澁余謂熱滲膀胱以導赤散加  
赤茯苓車前子山梔子淡竹葉燈心治之愈

痘出必合避慎

凡痘之出賴胃氣以助其內避風寒以護其外慎  
穢臭以觸其痘苟胃氣虧損風寒侵襲穢氣觸犯  
則為患可勝言哉又不可失饒傷飽不得妄投藥

餌以致胃氣有傷寢生異証如天大寒蓋覆常宜  
溫煖勿使受寒恐毒氣為寒所滯而痘不得生發  
也如天大炎宜清涼之勿使客熱與毒相併致增  
煩躁使毒潰爛也痘之房帷貴乎潔淨常微燒大  
束芫荽或茵陳膏取清香之氣以逼穢氣也溝渠  
溷廁勿動狐臭經行酒醉行房等人勿入及屍氣  
最毒五辛煎燂之氣亦宜避之恐至冲犯則禍患  
踵至痘兒卧處須要明亮切忌幽暗夜不斷燈火  
門戶須常關閉服事之人擇其謹厚潔淨者使之

看守保護內者不出外者不入或有痒痛與之撫摩勿使其誤犯破之若膿成漿熟之時而犯破者只復灌爛不成痂也若漿未成之時犯破者泄氣而為塌陷凶也所以不離親人看守者為此故也  
古人有輕寢重重寢輕之言具述於左

輕寢重

人見其輕遽生急忽之心而不忌口不慎飲食胃

風寒感胃風寒悞藥餌藥不對症穢氣相觸血氣

則順聞生人輒至恐外人帶穢氣觸犯房室房事必有穢氣觸犯而

寢為重矣

痘若先輕寢重只曰觸冒風寒行房不避食加餐酒醉五暈葱蒜尤畏婦人經候最嫌外客羶煎油燒骨及蚊烟總是諸香休見

右調西江月一首

附治驗

一兒三歲患痘咸曰順父母恃其順而與兒同衾

曰房事寢紫色不治

一兒二歲痘順父母恃其順而傷於乳食寢為泄

瀉倒靨而卒

重寢輕

父母曰其重常存保護之心而節飲食

不失饒避

風寒

母令出外有風

謹帷帳

不以生人輒至

適寒

暑

寒則添衣熱則減衣

依方調理

虛補實

而寢為輕也

重寢寢輕何以衣衾和煖調勻房中謹密少人行

飲食如常添進柿橘瓜薑藕栗魚羊葱蒜酸辛肥

醎油膩不沾唇更遇折肱司命

右調西江月一首

所感輕重

或問時氣之盛衰而痘出之輕重者何蓋痘之出

必假天行時氣而發天時疫氣有盛而有衰人之

生稟有強而有弱也疫氣盛行雖輕亦能寢重稟

弱者當之必致於危厲氣已衰雖重亦能寢輕稟

強者當之益見其輕故貧賤家兒多歷辛勤風寒

水濕之苦更無厚味傷脾即有重症亦能抵當古

人所謂百煉成剛此類是也富貴家兒煖衣厚味

少見風日脾胃薄弱不耐勞苦風霜乍遇小疾亦



為大病重症何當古人譬猶陰地草木是也臨症當辨人稟之強弱貴賤參時氣之盛衰輕重斯無失矣

### 忌食毒物酵痘辨

予觀諸書有曰痘之發解惟藉氣血之功不可以虫甲牙骨毛血羶羶等物發之余謂諸家之言執一而少圓神者也蓋氣血厚而毒淺者痘固自能發解豈可以藥物酵之苟毒盛之甚不惟氣血弱者不能發解縱氣血厚者亦為毒所壅滯若不以

毒物酵之則必不易起脹雖起脹而不易成漿結疔且餘毒不盡痘後或上損乎目下害肢體而為患多矣譬諸草木所生而有沙石壓之萌蘖何能得透使不假物以開之則草木豈易發生而茂實哉是以毒物酵痘之功不可少也但用之各有所宜不可槩施耳假如毒壅心肺二經宜雞冠頂血至清高取其以發之毒壅脾經桑蛙虫以酵之毒升發之意壅肝經宜紫草茸以鬆之或芫荽酒櫻桃湯而雜治之毒滯腎經宜人牙屬腎善散以攻之毒滯經

絡穿山甲以透之至如鯁魚等腥羶之物性損脾胃切不可用世人昧此不分經絡而妄投之致損中氣故有氣血不外旺或氣血本弱正氣不能勝邪毒反攻內或毒勢轉烈不可救治之弊也是諸家論痘之發解必藉氣血信矣而槩云不可以物酵之可盡信乎蓋用酵物仍有常驗不可廢者治之宜辨經絡消息虛實而慎用之斯無失矣

附治驗

一兒於戊子仲冬患痘順妄以毒物發之致中氣

耗脫漿清痒塌十四日而逝發解之過於斯驗矣

一兒於丁亥季春患痘勻朗光澤十二朝痘俱成膿瘡身熱煩躁召余視曰此毒壅失於發解賴正氣不虧內不容邪發為瘡毒遂以當歸生地芍藥牛旁連翹米仁防風白芷金銀花治之愈余每見毒壅症失於發解或損肢或害目者多矣予目錄之以為不發解証

死而復甦

氣血偕則生、氣血離則死、故生死係於氣血、氣血係於真元、真元入之根蒂也、痘有死而復生者、非血氣相離也、乃為毒火彌熾、氣血被其壅遏而不行、故身肢俱冷而氣絕也、然有本不終絕、雖絕必通、毒火有時而少、解則正氣漸復、氣血行而甦也、然雖氣絕而死、其心膏必溫煖、若膏冷、氣絕復生者、未之有也。

一雉邑倪姓子三歲患痘死殮城下三日偶過聞

啼聲詢其家抱歸余謂毒火彌盛得土而解更以黃連解毒湯治之愈

一楊姓女二歲患痘九日而死屍棄溪灘二日余舟過此見兒手足動掣近視其色焦紫而形綻突乃毒火壅窒悶膻一時而死得水氣火逢水滅故復甦詢其家抱回以犀角地黃湯治之愈

樹小荅多

斯乃兒小痘密之症蓋小兒未週或週而未壯氣血未足若痘出來稠密正氣不勝其毒經曰邪勝

正者凶至於灌膿將半忽然顛大頂塌漿水鋪開  
痒瀉破損元氣並洩或有漿不能蒼老而死或不  
能起脹而倒陷或雖起脹不能行漿成實或漿清  
結疔餘毒變遷卒至於斃諺曰樹小者多難結果  
小舟重載定傾危此善喻也若見時行發痘而孩  
尚小避之他處亦多有不出者屢驗斯症十或挽  
回一二若得脾胃堅固能乳便調用保元固中氣  
之藥可保無危若便溏減乳痒塌破損命難存矣

聖