

新刻圖註傷寒活人指掌卷之二

●傷寒問答四十六證歌

○咳嗽一首

往來寒熱胃中滿此證誠知嗽在陽屬太陽陰證嗽時頻下利四

支沉重更清涼屬少陰

太陽證咳嗽小柴胡湯(三十八)小柴胡湯(四十三)○少陽往來寒熱胃脇滿痛或

泄利而咳嗽小柴胡湯(四十三)或湯中去棗(四十八)○少陰四支厥逆

腹中痛或泄利而咳嗽四逆散(百九)或乾姜(百九)○少陰證咳嗽真武湯(百三十一)

九四逆(百八)○四逆散主少陰四逆或咳或悸或小便不利○嘔渴心

煩不得眠猪苓湯(百二)○表未解心下有水乾嘔發熱而嗽小柴胡湯(三十一)

○小便不利小腹滿者小柴胡湯(四十一)



太陽少陽陽明雜証 少陰

咳

嗽

太陽發汗而咳腹滿脉浮弦欬
小青龍湯(三十八)咳潮熱小便難
太陽發熱嘔歲脇痛鼻乾不得
而咳小柴胡湯汗嗜卧陽明中
風也小柴胡湯
四十三
太陽証罷表未汗後傷水欬咳
鮮心下有水乾而喘小青龍去
區發熱而咳小麻黃加杏子湯
青龍湯(三十九)

少陽寒熱往來傷寒有痰而嗽
而嗽胃脇滿或大半夏湯(百五)
泄利小柴胡去療春冬傷寒秋
束人參加五味夏傷冷濕欬嗽
子乾姜湯(百八)喉中鳴上氣不
嘔渴而嗽心煩得下橋皮湯
不得眠猪苓湯(百七十)

少陰四肢厥逆
腹中痛或溏泄
而咳四逆散加
五味子乾姜湯
百九
○肺為五藏
華蓋猶覆釜
之器專主於
氣象之清濁
既分則無射
清氣不分濁
氣上加於華
蓋加以不水
停飲肺不得

少陰咳真武
○少陰欬嗽
或四肢沉重小便不利或自下利清也若太陽
真武湯加五味
子乾姜(百九)
少陰或欬或悸
小便不利四逆
散(百十二)
寒法當溫之

○咳逆二名一首活人書云歲逆兩字連呼是以咳為咳
以噦為嘔吐也大抵噦者皆謂逆
也逆氣謂之咳逆逆食謂之嘔逆

咳逆皆因胃有寒此名惡候古今傳橋皮半夏并姜附不瘥依方

炙乳邊橘皮乾姜湯(百七十二)半夏生姜湯(百二十八)

不差即灸之婦人屈乳頭向下盡處骨間丈夫及乳小者以一

指為率男左女右艾炷如小豆許三壯陷中有動脉是穴證

治論云嘔噦手足逆冷者小橋皮湯(百六十九)嘔噦胸滿虛煩不安(百七十)

(百六)(十七)

小柴胡主陽家噦或用陳皮與竹茹即陳皮竹茹湯(百六十九)腹滿須看前後

部猪苓承氣莫相拘活人書云有陽家噦逆者小柴胡湯(四十三)橋皮湯(百七十)

前後部乃大小便也前部不利猪苓湯(百廿四)後部不利(調胃承氣湯(六十八)陽

明中風脉弦浮小便難潮熱而噦者柴胡加茯苓湯詳見小便條

寒證

熱證

失下

逆 咳

脉微細咳逆者 胃有寒橘皮乾 姜半夏夏生薑湯 百七十五活附子 湯百廿八灸期門 三百三十八	脉浮洪或有少陰失下咳 熱證而咳逆逆大便實小 者乃火熱奔承氣湯 急上行肺不 得納故也甘 草瀉心湯 黃蘗法	若胃有寒又飲以 水水寒相搏而 咳逆則當溫之倘 加以頭汗譎語腹 滿微喘又見故逆 此危殆 甚矣
--	---	---

○惡風三一首

病人衛中八方風脉緩而浮是本宗自與傷寒分兩証不堪例作

一般攻桂枝湯

○惡寒四一首情寒即惡寒也

惡寒發熱發於陽陰病憎寒身體涼解表桂枝并越婢温中須索理中湯

發熱微惡寒者柴胡桂枝湯發汗後反惡寒者虛也

太陽或發熱或未發熱必惡寒有汗桂枝湯無汗麻黃湯

陽明證俱宜下惟惡寒中寒係與太陽病也可汗麻黃湯自汗

出多微惡寒者表未解也桂枝湯少陽頭汗而微惡寒者用柴

惡寒大綱多屬表雖惡寒而脉必沉細也宜用四逆理

中輩以温之可也四逆湯少陰病惡寒而踈下利手足

温者須以小建中湯或惡寒而踈時時自煩不欲厚衣者大柴

四十七

太陽

少陽

少陰

汗吐下後

惡

寒

太陽發汗無少陽頭惡寒脈
 汗惡寒麻黃痛發汗沉細少
 湯發熱有汗惡寒小陰也四
 惡寒桂枝湯柴胡湯逆理中
 陽明雖有下柴胡湯百八
 證但惡寒者枝湯五
 表未解也麻黃湯三十
 陽明脈遲汗惡寒柴微少陰惡
 出多微惡寒胡桂枝時自
 表未解也桂枝湯越婢厚衣大
 枝湯二

十一湯
 四十一湯
 用小便建中湯

○惡寒大率多屬
 表若無汗惡寒可
 發汗有汗惡寒可
 解肌經回發熱惡
 寒發於陽也無熱
 惡寒發於陰也傷
 寒發熱惡寒太陽
 証也若無熱惡寒
 而卷手足溫小建
 中湯汗吐下後七
 八日不解發熱而
 渴時惡寒表裏俱
 俱熱白虎湯七十
 大下後復發汗心
 下病惡寒無汗先
 用桂枝湯然後攻
 痞尺寸脈微而惡
 寒此陰陽表裏俱
 虛不可更吐下可
 慎皆惡寒自有本
 條

○身軀痛五 三首

脈緊而浮身軀痛太陽經病不堪任更兼中濕并風濕若是陰寒

脈帶沉

太陽脈浮無汗當以汗解麻黃湯尺脈遲者血不足也黃芪建

次弟浮者麻黃湯中濕風濕本條陰家脈沉身軀痛四逆

八真武湯百三十九
附子湯百三十六

清便自可身疼痛救表元來有桂枝若還下利多清穀四逆設之

不必疑兩感條通

身如被杖名陰毒酒向陰中調理之陰毒自汗後有時加霍亂渾

身痛脈沉遲自有霍

汗後霍亂身痛不休少與桂枝汗後身疼痛脈沉遲者與黃芪

建中湯五十仲景桂枝芍藥人

陽證

陰證

濕證

○太陽之痛

身

太陽脉浮身痛無汗麻黃湯(二十七)

陰毒黑逆下相身痛如被杖唇青面黑陰毒甘草湯(百七)四逆湯(百八)真武湯(百三九)

中濕身痛小便不利大便反利者甘草附子湯(百九)便利者木附濕之痛不可

轉側陰毒之痛體熱沉篤宛如被杖以

痛

汗後霍亂身痛少與桂枝湯(一)

汗後脉沉遲身痛血不足也黃芪建中湯(五十)桂枝芍藥半夏生姜湯(七)

中濕身痛小便不利五苓散(百七)太陽中風因傷濕身痛重麻黃湯(七十三)

痛體熱沉篤宛如被杖以

○咽痛六 腎傷寒附一首

發斑垂血成陽毒自有本條

陰證咽中必有瘡汗出陰陽俱緊澁還當

咽痛號亡陽

陰證者少陰也陰陽脉俱緊主無汗有汗者曰亡陽屬少陰法

當咽痛 治在自汗亡陽條 大抵咽痛 皆枯湯(百七)不問

陰陽證皆可用也 ○證治論口瘡赤爛 審清黃藥燕汁(八十三)

又有非時暴寒伏於少陰之經脉微弱而咽痛必下利古方

謂之腎傷寒先用半夏桂枝湯(百二十七)次四逆散(百十三)一二日當差應少陰

經傷皆謂腎傷寒也亦多表裏無熱但苦煩憤默默而極不欲

見光明有時腹痛或脉沉細舊用四順湯古人恨其熱不堪用

云腎病而脉猶有熱者可服黃連龍骨湯(八十一)若已十餘日下利不止

手足徹冷無熱證者四順湯(百五十二)諸方書中即不曾載黃連龍骨湯

亦於黃連鷄子湯去鷄子加龍骨半兩也四順湯元即理中湯

元中加甘草一倍是也四順湯(百五十二)

少陰有熱

少陰無熱

熱證

○咽痛有寒有熱太陰之脉絡

咽

少陰腹痛脉沉細猶有熱咽痛者黃連龍骨湯(八十)

少陰脉微弱而咽痛必下利先用半夏桂枝湯(百十七)

密漬黃連汁升麻六物(百三)咽中

納受太陽脾土

痛

脈陰陽緊主無汗四逆湯二百十一
有汗曰亡陽屬少
陰法當啞痛通用
猪膏湯二百六廿桔
湯百七十二

閉塞不可下烏
痛湯三百十一
陽厥應下反發
汗則必口赤爛

之氣邪熱乘之
乃生啞痛若汗
多下利虛而生
熱亦能啞痛也

○筋惕肉瞤七

一首

筋上左下右有動氣者皆不可
汗仍不可下詳見不可表條中

大九發汗過多時筋惕肉瞤也要知動氣左邊須忌汗若還發
便難醫

俱屬

真武湯

羸甚者去芍藥惡熱藥或有熱證去附子虛弱

人微發汗便有此證也

吐下後身振搖者

茯苓桂枝甘草
白木湯百三二應

發汗而動氣在左不可發汗發汗則筋惕肉瞤此為逆難治也

且先服

防風白木杜
湯百七十六

次服小建中湯

陽虛

動氣

逆證

○內經曰陽氣有精

筋惕肉瞤

太陽汗出不解仍發動氣在左不
熱頭眩身動脈脈可發汗發汗則
欲擗地真武湯虛
甚者去芍藥惡熱
者去附子又可服
茯苓桂枝甘草
白不湯

筋惕肉瞤此
為逆先服防
風白木杜礪
湯次服小建
中湯百七十七

傷寒吐下後發
汗脈微心忪惕
汗及下後津液
枯槁

則養神柔則養筋
陽氣大虛筋內失所
故惕然而跳瞤然
而動治以溫經益陽
則可矣若犯其逆津
液寒竭此危証也

○傷寒無汗八

一首

冬陽明詳見潮熱條
寒別名剛瘧三陰
陰易詳見傷
陰太陽其五証

並各有
本條

傷寒無汗分為八剛瘧三陰與太陽冬病陽明皆係數下連陰陽

易應魁罡

○傷寒自汗九

一首

陽明證無汗附

九般汗自傷風始風濕風溫胃不和中暑亡陽并霍亂陽明柔瘧

傷風 桂枝湯 若渴者 五苓散 若不渴者 茯苓甘草湯 若自汗

出而小便難者 桂枝湯 自汗出而小便數者不可行桂枝也

為藥其草湯 風濕風溫 各本條胃不和病人藏無他病時發熱自

汗是也 桂枝湯 中暑 本條亡陽凡發汗多而漏不止曰漏風亡

陽 桂枝湯 附子湯 尺寸脈俱緊主無汗而反汗出曰亡陽 桂枝湯 法當

陰痛 桂枝湯 四肢疼而厥逆惡寒者 四逆湯 大抵陰病

四肢逆冷額上及手背冷者法當無汗而有汗者曰亡陽 四逆

煩燥惡風汗出 防風白朮牡蠣 次服 小建中湯 汗多不止者

濕粉撲之 霍亂手足逆冷者 四逆湯 有熱證而霍亂及中暑者

香薷散 信效多用 小柴胡湯 依常法煎俟極冷服之效 陽

明汗多而渴者 調胃承氣湯 陽明法當多汗亦有無汗者不可

不知也 小便自利者不可用承氣湯攻之 惡寒者

表未解 桂枝湯 反无汗惡寒者 升麻葛根湯 反無汗而喘者 黃

湯 桑瘞 本條

太陽 陽明 中暑 陰證

發熱惡風自汗 陽明汗 中暑霍亂 陰証四肢逆冷

太陽中風也 桂枝湯 多而渴 內熱自汗 有汗四逆湯

枝湯若小便數 不大便 草白虎 發汗多遂漏不

者不可行桂枝 者調胃 香薷散 吐利止汗出而

可為藥其草湯 承氣湯 二百七 厥脈微欲絕通

熱脈沉細 搖頭 六八 小柴胡 脈四逆加猪膽

口禁 反張 汗 陽明自 湯 利自汗 少陰小便白咽

自汗

桂枝湯 通自利此 利自汗 乾嘔吐厥逆其

。經曰寒則傷榮 脈受傷戰慄無汗無 汗者當發表風則傷 衛脈受傷緩弛自 汗自汗者當實表實 表多用桂枝然桂枝 須用詳細若浮而弱 服桂枝後煩而小便 數者不可再服也仲 景云太陽病自汗四 肢拘急難以屈伸小 便難者可服桂枝附 子湯若小便數者慎

用續命湯五津液內手足冷
煩燥惡風自汗竭大便不渴者絕汗多不止溫汗反發汗過多遂漏
不得卧防風白百七雖硬不可攻可百八中湯百四粉撲之次服五十四黃芪建中湯
木牡蛎湯百七可攻可百八中湯百四黃芪建中湯
小建中湯五十八竅道百六煎百四黃芪建中湯
自汗自有本條

○口燥咽乾十 一首

病在陽經背惡寒人參白虎煎咽乾柴胡專主少陽證若是法家
下即安

陽經者即陽明經也又一證無大熱背微惡寒並主燥渴白虎

參湯少陽小柴胡湯少陰證口燥咽乾而渴者急下之治在三

陰三陽謂少陰條 狐惑亦有咽乾證本自有

陽明燥渴此和熱在內

口燥咽乾 陽明無大少陽脉弦急下之大承氣湯 加人參滋津液水少陽
熱背微惡寒熱往來 咽乾者此津液枯燥 和在中焦口苦舌乾則
寒口燥咽而嘔口苦 慎不可汗 以少柴胡和之若少陰
乾煩渴白 舌乾小柴 若默默欲眠声嘎咽 熱在下焦銷燥腎水當
虎加人參 胡湯 乾者當作狐惑治之 急下之不可緩也

○寒熱往來十一 一首

往來寒熱陰陽搏大小柴胡及桂姜結熱心煩仍喜嘔渴兼頭汗
相當

結熱在裏大柴胡湯心煩喜嘔胸脇滿不欲食小柴胡湯渴而

不嘔頭汗出而痛胃脇滿小便不利柴胡姜桂湯

和鮮 如瘧 可下

心煩喜嘔脇滿婦人中風續得 經曰和氣分爭則為性 寒和與陰爭反發熱此 半表半裏証也病至六

寒 熱 往 來

寒熱往來不
欲食少柴胡
或泄而嗽小
柴胡去參棗
加五味子湯
渴而不嘔頭
汗出小便不
利胃滿寒熱
性柴胡桂枝
湯五不嘔清
便寒熱日二
三發桂枝麻
黃各半湯干
脈緩惡寒而
熱不可更發
汗桂枝二
越婢一湯十
寒熱發作有
經水適斷此
熱入血室其
必結故使如
小柴胡湯四
陽証以瘧一
再發脈洪大
桂枝二麻黃
湯十二厥陰
寒發熱似瘧
欲愈桂枝麻
各半湯干三
病至十
餘日結
清便日下
湯桂枝麻黃
解之然婦人
經水適來而
適斷而續得
留和必須治
傷寒結熱經
明暮昏如見
無犯胃氣及
自愈蓋經水
血去必自愈
氣不必服小
期也無犯中
期門動榮氣

○發狂十三

一首

黑奴丸火渴燥盛倍常方可與不渴者與之則反為禍也

及大黃

頂秉王言乃面赤熱朝因痛號重陽更於陽毒經中治葶藶升麻
葶藶苦酒湯百九六 梔子仁湯百六二 素問云重陽者狂重陰者
陽毒升麻湯百五十 黑奴丸百六二

顛脫陽者見鬼脫陰者目盲

血證狂言或發狂唇焦漱水遍身黃小便自利大便黑去血須還
抵當湯

漱水謂漱水不欲下咽自有本條又有因火劫驚狂謂之火邪其

人亡陽煩躁卧起不安金匱風引湯柴胡加龍骨牡蛎更捷仲景云太陽病不

解熱結膀胱其人如狂其血自下下者愈外不解者宜湯桂枝外

已解但小腹結急者乃可攻之挑仁承氣湯六十九血證依發黃門中血證法治之

陽毒

畜血

火邪

陽毒狂躁發畜血下焦其人如火邪者醫以虛矣精神悶亂故如見

經曰重陽者狂蓋陽主動陽氣重盛則陰火

發

狂

血證

火

邪

班甚者踰垣
上屋湯毒升
麻湯六十四
枝子仁湯八
十七桔梗大
黃湯百三五
黑奴九百六二
陽氣獨勝陰
氣暴熱必發
躁狂走妄言
面赤咽痛發
斑或下利赤
黃脈洪實或
滑促宜用酸
苦之藥令陰
氣復大汗解
矣葶藶苦酒
湯百九六

狂小腹痛小便自
利大便反黑臍下
痛低當湯百五
太陽不解熱結
膀胱其人如狂血自
下下者愈外不解
者與桂枝湯
血上逆則喜忘
血下畜則內爭
其人如狂須用
抵當湯須用抵
當湯取盡惡物
為效輕者犀角
地蘆湯百五
喜忘如狂身黃
屎黑血證論也
抵當湯外已解
獨小腹痛急結者
乃可攻桃仁承
氣湯六十九

火於床下或
周身出汗其人
亡陽煩燥驚
狂臥起不安
桂枝去芍藥
加蜀漆牡蠣
龍骨救逆湯
干五桂枝湯
草龍骨牡蠣
湯六
九灸及燒針
後証似火劫
發狂者並用
劫法治之柴
胡加龍骨牡
湯五十五

小復滿更
腹硬小便自利
如狂血証也
湯應小傷寒有
利者有血也
抵當湯

喜忘喜訊
陽明者必有蓄血
硬其色黑抵當湯百四
無表裏證發熱七八日
脈雖浮數可下之假令
已下脈數不解消穀散
至六七日不大便有膿
抵當湯

血乃人身之河渠
患耳若為邪熱所攻
折而不行初為畜血
次為瘀血故以抵當
湯治之

傷寒脈浮以火迫之
亡陽驚狂起不安
桂枝去芍藥加蜀漆
牡蠣骨救逆湯柴
胡龍骨湯五十五
火逆下之因燒針煩
燥桂枝下之草龍骨
炳湯十五
太陽汗下加心下痞
裏俱虛復加燒胃
煩面青身潤者難色
黃手足温者可治
少陰欬利語被火

實邪
太陽中風以火劫之
因火熱兩陽薰灼
熱發於外身必發黃
熱搏於內則小便難
熱甚則手足難治燥
火熱衣摸床為難劇
擾便利者火氣未劇
尚不可治也太陽以
熨之不可得也發躁
解必下清血者名為
火邪犀角地黃湯百
五

火邪者謂其不當
用火而用之故謂
之火邪九傷寒汗
不出服發汗藥至
于再三而汗不行
此津液內竭也其
證固危若尋常汗
証藥未至切而汗
不行處以火迫於
床榻之下劫奪取
汗炎氣薰灼邪熱
交併變為驚狂等
証實者則煩燥不

氣劫故也少使又難

出病從腰以下必重而痺名火逆麻黃杏仁薏苡甘草湯

已虛者真陽脫亡當量其虛實而解散之

喘十四 二首

脈浮無汗更加喘宜與麻黃屬太陽若不惡寒知在胃汗多潮熱下何妨

無汗喘者麻黃湯有汗喘者葛根黃芩湯太陽病下之微喘者

表未解桂枝湯加厚朴杏子十四太陽病汗之後不可行桂枝汗出而喘無

大熱者麻黃杏子甘草石膏湯廿三汗後潮熱不惡寒腹滿而喘者陽明胃經

也宜下之承氣湯六十七陽明脈浮而喘無汗者汗之愈麻黃廿

汗後水停微發喘青龍加杏去麻黃二陽合病胃中滿只用麻黃

安古方

太陽汗後飲水多致而微喘加杏仁三十九小腹滿者去麻黃

加茯苓二陽者太陽陽明也麻黃湯喘促脈伏而厥者湯百七十九

緣麻黃專主喘所以多用麻黃為之也

太陽

陽明

陰厥

太陽無汗而喘麻黃湯 <small>桂枝証反下之利</small>	汗後潮熱不惡寒腹滿大喘促脈伏	傷寒喘只有太陽
遂不止脈促者表未	有潮熱者宜下太	熱頭疼無汗而喘
解也喘而汗出者葛	陽陽明合病胃病	宜汗出麻黃湯而喘
根黃連黃芩湯 <small>三十四</small>	而喘則當先散表	有汗出麻黃湯而喘
太陽與陽明合病	而喘亦用麻黃湯	熱頭疼無汗而喘
喘而胸滿者不可	至若飲水過多水	宜汗出麻黃湯而喘
下宜麻黃湯	而喘則下肺氣中逆	有汗出麻黃湯而喘
<small>二十</small>	而喘則下肺氣中逆	宜汗出麻黃湯而喘
太陽汗之後不可	而喘則下肺氣中逆	有汗出麻黃湯而喘
行桂枝汗出而喘	而喘則下肺氣中逆	宜汗出麻黃湯而喘
無大熱者麻黃杏	而喘則下肺氣中逆	有汗出麻黃湯而喘
子甘草石膏湯	而喘則下肺氣中逆	宜汗出麻黃湯而喘
水停心下小	而喘則下肺氣中逆	有汗出麻黃湯而喘
便不利腹滿喘	而喘則下肺氣中逆	宜汗出麻黃湯而喘
小青龍去麻黃	而喘則下肺氣中逆	有汗出麻黃湯而喘
喘不休者	而喘則下肺氣中逆	宜汗出麻黃湯而喘
汗出髮潤	而喘則下肺氣中逆	有汗出麻黃湯而喘
若大便行其水也	而喘則下肺氣中逆	宜汗出麻黃湯而喘
可下若脈伏而厥	而喘則下肺氣中逆	有汗出麻黃湯而喘

喘

證

太湯 似厚表太
者喘朴未陽
生非杏未下
姜喘子也解
汁徹湯桂微
半心十支喘
夏債八加者

加後汗加
茯苓湯四
飲水多欬
而微喘小
去麻黃加
三十九湯

此為肺絕
不可治

喘促者此陰陽相
背非吉兆也姑以
五味子湯和之取
其酸收其甘緩之
倘身汗如油喘而
不休此為命絕矣

表不解

裏

表裏

水

氣

傷寒表不解心下
有欬或氣乾嘔發熱
喘欬或不利用或利
小便不利或腹滿
小便利或腹滿
病在陽當以汗解
以冷水噴之其熱
却不得去更益
堅肉上粟起飲水
反不渴女胎五苓
散傷寒心下有水
氣欬而喘熱木渴
去飲解小青龍湯

結胸無大熱此
水結在胸脇但
頭汗出者大隔
胸湯百一
傷寒厥而心下悸
宜先治水後苓
草湯百十九
少陰腹痛小便不
利四肢疼痛下利
此有水氣或欬嘔
或小便不利真武
湯百二十九

中風發熱六七
日頗渴飲水即
飲水入即吐有表
裏証名表裏証
水逆五

水為至陰其性
則寒病有內熱
熱內消燦之若
寒相持故水停
下用小青龍湯
乾姜細辛半夏
類行其水也餘
茯苓之劑取其
下畜不若水結
胸但頭汗出偏
無汗是水飲不
外油用隔胃湯
之生陰內寒必
温也

○渴十五一首

太陽六脉浮而渴汗是陽明利少陰陽毒倍常兼中暑其人引飲喜杯深

太陽表不解心下有水氣渴者小青龍去半夏加括萎湯三八 太陽病服桂

枝大汗出煩渴者白虎人參湯小便不利而渴者五苓散百 風温

渴者括萎根湯百九十八脇下滿手足温而渴者小柴胡去半夏加人參湯四十九

欲飲水水入則吐名曰水逆五苓散主之陽明有汗不大便而

嘔舌上白胎而渴者小柴胡去半夏加人參湯四十九 頭汗出而渴小便不

利者必發黃茵陳五苓散少陰咳而嘔渴者猪苓湯百 下利者

白頭翁湯二百一十二 太陽病無汗而渴者不可與白虎湯宜小柴胡湯四十三

得汗後脉洪大而渴者方可與白虎湯凡七陽明病汗多而渴不可與五苓散宜竹葉湯八十五小便不利汗少脉浮者方可與五苓散百七十九陽毒百六十三中暑白虎加人參湯七十二

內熱

吐汗下後

少陰

渴

證

脉浮發熱渴飲水小便不利	吐汗下後七八日	少陰下利	○汗之大率有二一則熱盛於內銷燥津液而然二則汗利過多耗奪津液而然治之之法不過損其有餘益其不足也傷寒始傳三陽則未渴及傳三陰熱氣熱氣漸深則渴矣若病至六
利而渴必發黃	少陰下利	與 <small>百廿四</small>	者不可與
茵陳五苓散	咳而嘔渴	而渴小便	半表裏証惡風
陽毒發狂煩躁	煩不得眠	色白下焦	脇滿而渴小柴
大渴潮熱咽痛	多者不可	甚欲水不可逆	胡湯
黑奴丸不大渴	與 <small>百廿四</small>	之但勿令極意	

○霍亂十六一首吐而利也

四肢拘急仍兼厥發熱憎寒四逆湯吐利止而身軀痛桂枝和鮮最為良

吐利止汗出而厥四肢拘脉微欲絕者通脉四逆加猪膽湯二百二十四汗後霍

亂身體痛桂枝湯熱多而渴者五苓散百十九寒多不渴者理中湯百四十八腹

痛四肢拘急下利轉筋理中湯去木加附子百四五中暑霍亂四肢冷汗出

脚轉筋目有中暑霍亂條千金方云欲得水者皆用理中湯百四五轉筋者中

湯加石膏百四十七

熱證

寒證

霍亂

吐利大渴煩燥冷
汗自出雨脚轉筋
但尺脈沉強雖手
足微厥此暑証霍
亂也白虎加人參
湯七十一香薷湯二
百十四五苓散百七
千九
嘔利熱多而渴五
苓散百七十九小柴
胡湯百四十三俱冷
服者但有熱証而
但切不可用附子
等燥熱藥如抱薪
救火也止可用白
虎湯及解身藥極
冷服百七十六

吐利止汗出而厥
不欲飲水四肢拘急
脈微欲絕通脈四
逆加猪膽汗湯二
百二十四
汗後霍亂身體痛
重者桂枝湯二
霍亂轉筋理中加
石膏湯百四十七
吐利寒多不用水
者理中丸百四五
乾霍亂者上不得
吐下不得泄所傷
之物不得出正氣
隔絕多不可治

○霍亂者猶飲食過度
胃土不能勝加以陽盛
於外陰生於內暑者陰
相搏陰陽交爭吐利並
作揮霍撩亂也邪在上
焦吐而不利邪在下焦
利而不吐邪在中焦既
吐且利所以此疾多生
於醉飽盛於夏秋縱寒
月有之亦猶伏暑而然
脈候雖沉手足雖厥亦
不可遽用熱藥若煩渴
甚者當以五苓散治之
先分利陰陽不得已而
用溫藥當稍涼服之蓋
邪熱遇熱亦相競也近世劉
守真用益元散治霍亂亦此義

○讖語十七一首

讖語元來屬胃家胃家若實下為佳三陽合病煩遺溺瘀血強言
有等差

胃實讖語 下利讖語並用

調胃承氣湯六十八 小承氣湯
大承氣湯六十六 六十七

或已得汗身和讖語

柴胡桂枝湯
五十三

三陽合病口中不仁面垢

讖語遺溺脉必滑實

白虎湯
七十

瘀血狂言小便自利大便黑小

腹滿手不可近者

抵當湯百四 發狂發黃
澀水不欲飲條並通

大抵讖語是熱屬陽

反見陰證者逆

婦人熱入血室讖語刺期門

小柴胡湯
四十三

喜忘

小腹滿小便利

抵當湯百四
血結胸通

濕温一証若妄言大便

叔讖語不惡寒反惡熱

白虎湯
七十

實熱

瘀血

虛證

○讖語有實有虛

識

語

胃實識語下
利識語並用
調胃承氣湯
六十八大小承
氣湯六十六七
身熱四五日
大便秘小
赤發厥者昏
反也急用大
厥也急用大
柴胡湯四十三
大小呼氣湯
六十七大便
秘識語不惡
寒反惡熱白
虎湯七十一
陽合病腹滿
身重難以轉
側口中遺溺
面垢必滑實
語脈必滑實
不可下宜用
白虎湯
湯者亦用白虎

發汗多亡陽
實則易治虛則難
愈實者胃熱上乘
於心神氣昏亂語
言訛謬及瘀血攻
衝脈行大數劇則
不識人當下之此
為順虛者汗多亡
陽或吐下之後重
虛陽氣及風溫之
証重發其汗以致
陽脫陰勝又見沉
微之脈此陽病見
陰危殆又矣又有
鄭聲者非識語也
鄭聲乃虛而聲鄭
重也當溫藥治之
若下利脈實溫者
燥屎却當下之

下利十八
三首
三陽下利則身熱太陰下利則身不熱也
足溫少陰厥陰下利身不熱也

傷寒下利多般數須辨陰陽勿差互惟有陽明合少陽若還尅賊
名為負

腎虛下利苦咽乾渴而利也
不渴誠知藏有寒陰屬太
協熱胃寒并
溫毒血利而識語下之安
調胃承氣湯
下利而識語者

太陽陽明合病脈浮大而長下利者
高根湯
太陽少陽合病
下利脈必浮而弦
黃芩湯
嘔者湯中加半夏生姜也
少陽陽
明合病下利胃脇滿乾嘔或往來寒熱也
脈長大而弦者為負
負者死但長大而不弦為順
脈數而滑或遲而滑者有宿食

下利脈必浮而弦
黃芩湯
嘔者湯中加半夏生姜也
少陽陽
明合病下利胃脇滿乾嘔或往來寒熱也
脈長大而弦者為負
負者死但長大而不弦為順
脈數而滑或遲而滑者有宿食

宜下小承氣湯 自利不渴屬太陰四逆湯百八 理自利而渴

屬少陰 脉微者白虎湯 厥逆脉不至者白虎通脉四逆湯

百四 咳而嘔渴心煩不得眠猪苓湯 三陰下利法當溫之

若自利清水心下痛口乾燥者即宜下不可不知也 溫之四

逆理中輩 下之大柴胡承氣也 三陽下利亦有飲水者乃

有熱也治如腸 下利心中痞自有痞而

大便鞭結雖宜下亦有諸般不可攻腸垢鴛溆分冷熱不妨步躡

古人蹤

華陀云寒即溆熱即垢古人云歲火不及寒乃大行民病鴨塘

應大便鞭結宜下之若有表証及不可下之証即依法調之有

不可腸后即熱也協熱而利臍下必熱黃芩湯 七上三白又赤

百九 鴨塘者寒也脇寒而利臍下必寒中湯百四五 溫毒

者膿血桃花湯百

協熱

協寒

合病

腸垢即熱也 鴨塘者寒也 協熱而利臍下必熱 黃芩湯 七上三白 又赤

下必熱而利臍下必熱 黃芩湯 七上三白 又赤

赤石脂丸 自利不渴屬太陰 四逆湯 百八

利而渴屬少陰 四逆湯 百八

欬而嘔下 少陰自利不渴屬太陰 四逆湯 百八

利心煩不得下 加豬膽汁湯 三

自利清水心下痛 口乾燥者即宜下 不可不知也 溫之四

下利黃芩湯 必為逆又三陽合病 大

即宜下 小承氣湯 利無熱証 四順

利 下

柴胡湯 四 歲火不及寒乃

脈數而滑或大行民病驚漉陽合病身挽協則脈弦上被木賊
利者大柴胡湯或利膿血寒熱必自下利又下利既極直無
湯謂有宿食黃連阿膠散○脈長者承氣湯脈弦者為負死
也者赤石脂禹餘糧也

○發黃十九 二首 黃即瘵也 瘵即黃也

小便自利大便黑血證無疑定發狂若是小便全不利黃名瘵病

瘵名黃

血證抵當湯輕者桃仁承氣湯黃瘵茵陳湯九十六茵

太陽發熱渾身痛身目俱黃是溫家腹滿脈弦心脇痛陽明經裏
中風和

仲景云傷寒發汗已身目俱黃所以然者以寒溫在裏不解故

也只當於濕中求之溫條發熱一身盡痛而身目俱黃者

太陽中溫也 腹滿鼻乾心脇痛潮熱身黃者陽明中風也溫

家枝子葉皮湯八九麻黃欲發黃者急用瓜蒂末一字許搗

鼻中溫家條下大抵發黃與溫家不利小便非其治也 腹滿

脈浮弦咳嗽潮熱小便不利脇疼短氣鼻中乾不得汗嗜卧此

陽明中風也小柴胡湯噦者湯中加蒼朮也見小便

畜熱

陰黃

畜血

頭汗出劑頸而小便不利四畜血下焦其人黃當利小便不利
黃証也茵陳湯發黃欲發黃者急用瓜蒂末一字許搗
沉浮大短氣腹茵陳湯九十六或桃仁承氣
滿心脇痛鼻乾茵陳湯九十六或桃仁承氣
無汗者抵一身茵陳湯九十六或桃仁承氣

發

黃

及目悉黃小便... 難有朝熱少陽... 湯便自利而黃... 者茵陳湯... 連三物湯... 往來寒熱一身... 痛小柴胡湯... 扼子(四十三)...

發斑二十一首

多亦發斑也病是陽証而... 謾下熱藥即發黃斑也

下之太早熱氣承虛入胃故發斑下... 之太遲熱留胃中亦發斑服湯藥過

溫毒成斑肌肉焦黑膏一劑毒須消若還熱毒乘虛出疹豆斑瘡
別有條

大抵發斑不可用表藥蓋表虛裏實若發其汗重令開洩增斑

因痛玄參升麻 狂出大青四物湯又名阿... 升麻

斑瘡豌豆 汁黃連(八十一)物者濃 又方好青黛大如棗 又方青木

治論用化斑湯 乃白虎加人參湯 孫兆用紫雪方 第四百六 有下

證者調胃承氣湯 別名也(七十一) 孫兆用紫雪方 第四百六 有下

陽毒

溫毒

咽痛

發

陽毒已深內外結... 熱舌卷焦黑鼻如... 烟煤狂言見鬼面... 赤發斑如綿五月... 可治六七日不可... 治陽毒升麻湯或... 用白虎加人參名... 化斑湯(六十四)...

斑

班毒始因熾熱發... 身無大熱煩渴... 清汗眼赤... 赤斑出五死五

下之太早熱... 氣乘虛入胃故... 發斑也下之大... 遲熱留胃中亦... 藥過多胃熱焦... 爛亦發斑也汗... 若汗之重令開... 洩更增斑爛也

為赤斑熱証甚者大便實或腹痛口瘡下部生黑斑出十死
可用大青四物湯玄者調胃承氣湯下利黃連一或曰黑斑
參升麻湯以解之黃連橘皮湯傷下利黃連七出干無一生蓋
若熱毒深入班發寒五六日生班七毒氣入胃深故
紫黑是毒熱陷於出諸膽雞子湯也

○痞二十一 三首 肢結附

滿而不痛名為痞枳桔頻投氣自寬枳梗枳壳湯也 閉上脉沉知審實若
還浮者瀉其肝

結胸與痞閉脉須沉若浮者為結執當服三黃湯以瀉其肝也

惡寒汗出者附子瀉心湯乃三黃湯中加附子也百三十七

下利心中痞結時瀉心服罷病愆期下焦有病人難會須用餘糧
赤石脂

下利而心下痞服生薑瀉心湯又甘草瀉心湯而利不止者當

治其下焦赤石脂瀉心湯活人書論理中元并生薑甘草只治

中焦者病在下焦須餘糧石脂也

結胃與痞皆應下表未除時莫妄投散痞三黃并脂實陷胃其遂
與瓜樓

表證未除者當先解表表解乃可攻痞活人書惡寒問中云傷

寒大下後復發其汗心下痞而惡寒者表未解也未可攻痞當

先解表表解乃可攻痞兩項事躰一同

解表桂枝湯攻痞三黃湯外證未解心下妨悶者謂之肢結必浮

宜柴胡桂枝湯胃脇滿微結者小柴胡加乾姜發熱嘔吐下利汗

出而痞者大柴胡湯表證罷身涼不惡寒汗出發作有時頭

疼心下痞引脇乾嘔短氣十束湯發汗吐下後心下痞噫氣不

除旋復代猪湯為良百六十六者先理中九次服旋復代

有此證而或咳逆氣虛者先服四逆湯胃寒

胃滿而硬 胃滿而濡 肢結

○痞發於陰下之太早為痞氣胃與痞雖同而異結胃為實邪痞為虛邪也蓋表邪因下乘虛入於中焦但滿而不痛為虛邪也治之之法宜先用桔梗枳殼等藥疎通其氣表証未解者又當用桂枝解散然後諸瀉心湯引而伸之直至表証俱無脉皆沉實惟痞滿未散方可用十棗湯之類

痞 滿

胃滿硬按之不舒夏瀉心湯旋復代者大柴胡湯數胃滿而濡小柴成肢結者小半夏茯苓湯百二十邪也治之之法宜先用桔梗枳殼等藥疎通其氣表証未解者又當用桂枝解散然後諸瀉心湯引而伸之直至表証俱無脉皆沉實惟痞滿未散方可用十棗湯之類

○結胃二十二首 宜先服小柴胡湯表解然後下結胃等藥也

傷寒本是三陽証下早因而有結胸陰證下之成痞氣依方調理

有神功

結胸五種須分別大小結胸并水結熱實結胸煩躁多寒實結胸渾不熱

大結胃大陷胃湯論云此藥太峻不可輕用若不得已即用大

陷胃百三小結胃小陷胃湯水結胃小半夏茯苓湯柴胡去末加牡

熱實結胸心下懊懷煩躁煩渴大陷胃湯寒實結胸八十三枳實

理中丸證治論云者諸結胸宜對酌用藥不愈痞枯梗枳壳湯未

成結胃急與理中丸者增損理中丸百四九一若大段為醫轉損有厥逆証者兼與

四逆湯百八婦人有血結胃此為熱入血室當刺期門穴與柴

胡湯四若喜忘小腹滿小便利屬抵當湯百四載讖語條

熱實

寒實

血結

水結

○病發於陽下

結

汗未解誤下無熱証而結此
之邪氣乘虛寒實結胃也枳
結於心下硬實理中丸百五
滿而痛或喘三物白散百八
為大結胃二太陰証下之胸
陷胃湯百二結胃藥不效者
汗已行未全結胃損理中丸
小結胃下之為醫轉損致厥
胃湯煩渴小脈証者四逆湯
心湯百三馬用陷胸等藥不
或煩渴嘔噦九渴者枳實理中
宜先服小柴五下者加枳實
藥方解表結胃中覺結胸急
胃藥結胃脈服之散便中湯
浮者不是表未如未之散候
解功不可用吐不下已口有微
下藥

胃

○短氣者似喘非喘氣短不相接續
也經曰微虛相搏也為短氣本虛証
也如腹滿潮熱及結胃短氣者則當
散其和若水停心下可分而利之
去末加表未解下之及死又當先解表
後攻裏也大陷胃湯用藥頗峻
可先用小陷胃湯或枳實理中
丸分理中焦極為穩當

結胃

風濕

○短氣者似喘非喘氣短不相接續

短氣

太陽病醫反下之煩燥短氣心中懊憹心煩
下硬則為結胸大陷胸湯百八
胸短氣汗出不惡
乾嘔短氣汗出不惡
寒十束湯百八二
風濕相搏汗出氣短
小便不利惡風不欲
去衣甘草附子湯水
散其和若水停心下
可分而利之

○煩躁二十三 一首

中開脉浮身熱而煩者太陽証脉也尺寸俱沉手足厥自利煩躁者

乃少陰証脉也

陰氣忽為陽氣勝熱而煩躁太陽鈔陰亦有煩躁者此是陽虛陰所乘

太陽無汗煩躁大青龍湯渴者五苓散無熱但狂言煩躁五

散吐之心中悸而煩躁小建中湯自汗心煩小便數者不可用

桂枝宜湯芍藥甘草五七日不大便繞臍痛煩躁發作有時此有

燥屎也屬陽明宜承氣湯之類隨輕重下之 少陰心煩不得

卧黃連鷄子吐利手足逆冷煩躁欲死者吳茱萸湯下利咽痛

滿而煩猪膚湯下利欬而嘔渴煩不得卧者猪苓湯惡寒而汗

時時自煩欲去衣被大柴胡湯若陰病發躁謂之陰燥或陰毒

之邪危篤而用火慰之或進熱藥而發煩躁不可妄投涼藥煩

躁甚者宜再與熱藥如四逆湯陰盛隔陽病人身冷脉細沉疾

煩躁而不飲水者霹靂散主之

表證裏證 陽虛 陰盛

煩

躁

太陽無五六日下之復發汗	大青龍繞臍痛得眠夜而安	少陰吐利手足	燥為不安不安
汗煩躁不大便晝日煩躁不	煩躁此靜不渴無熱	厥逆煩燥欲死	所勝則脉浮大
湯三六煩躁此証乾姜附子	後煩躁小承氣証乾姜附子	吳茱萸湯百五	也治以寒涼証
太煩躁有燥屎証乾姜附子	不煩躁湯六二	黃連鷄子湯七	微厥而利乃陰
後煩躁湯六二	少水者日無大	下利咳而嘔煩	証也治以溫熱
少煩躁與熱此為	散用五苓通	陰盛發躁名陰	增此陰極而躁
之煩躁陽去陰	阿膠湯	也厥物極則反	發厥物極則反
消渴通	汗心煩小便	而脉沉謂之虛也	而脉沉謂之虛也
散用五苓通	傷寒六七日無	不可便謂躁熱	不可便謂躁熱

寒而躁時數者不可與身冷脉細煩燥當以冰別之可
時自煩欬桂枝宜芍藥不飲水露靈散當以冰別之可
去衣大柴甘草湯百十六飲水者不可與也
胡湯四三小建中在五六三百四十一

○嘔吐二十四 二首

大抵水穀不吐謂之嘔吐思謂未
下咽而出曰吐已下咽而出曰嘔

大凡嘔吐屬陽明須要陽明氣下行若是上行為氣逆胃家由是
不和平

胃家有熱難停食胃冷無緣納水漿二証皆令人嘔吐嘔家聖藥
是生姜

孫真云生姜是嘔吐聖藥嘔家證甚多然小柴胡專主嘔也

傷寒差後有餘熱在胃腕而嘔者竹葉湯加生此不獨差後可

用應有執証而嘔者用之佳 嘔而肯滿者吳茱萸湯得湯反

劇者小柴胡也四十金匱方穀不下而嘔吐者小半夏湯背脊中

喘不喘似嘔不嘔似噦不噦徹心憤憤然無柰者湯百二十八

嘔而渴者猪苓湯嘔後渴者此為欲解急與之水先嘔後嘔者

為水停心下此屬飲家柴胡不中與也赤茯苓湯活人書謂吐

食為嘔吐水為吐也渴欲飲水水入即吐名曰水逆五苓散百

發汗後水藥不入者為逆小半夏湯寒多而吐者理中湯不飲

水而吐者湯中去朮加生姜百四十五嘔噦手足逆冷者小橘皮湯

嘔噦虛煩者大橘皮湯二件並載

熱

寒

水飲

有聲曰嘔無聲
曰吐嘔則旋出

嘔吐而發熱者寒多而嘔者理先渴後嘔水
小柴胡湯嘔吐中湯不飲水而
而渴者猪苓湯吐者湯中去朮
胸脇滿而嘔吐加生姜百四十五
曰嘔發潮熱小

表和欲傳裏裏
氣上逆則為嘔
故表裏証多云

嘔

吐

柴胡湯加芒硝
嘔噦胃滿虛煩
不寒大橘皮湯
百六十八
太陽與陽明合
病嘔吐不利但
嘔吐者肩根加
半夏湯三十五
胸中有熱胃中
嘔者黃連湯欲
吐不止心下急
欬者微煩大柴
胡四十二
差後有餘熱在
胃而嘔吐者竹
葉加生薑汁湯
太陽少陽合病
自利而嘔黃芩
半夏生薑湯五
栝梗湯百七十二

○頭汗出二十五
一首

若患嘔而後
脚弱或疼乃
是脚氣當作
脚氣治之

嘔也吐則飲食
入口即吐是也
嘔而有熱有寒或
嘔而渴虛煩發
熱而嘔者此熱
嘔也故用小柴
胡之類嘔而胃
滿乾嘔吐涎沫
頭痛膈上有寒
者方為寒嘔故
用四逆吐則雖
緣多寒必多溫
之如水逆水飲
當用茯苓半夏
寬中行水之劑

要知頭汗非陰證

頭汗非陰證而還是發黃心下滿時名水結曾經汗下

發黃茵陳湯九十六茵水結小半夏茯苓應有餘證及半在裏

半在表者四十三柴胡湯汗下後胃脇滿結小便不利往來寒熱心

煩者宜柴胡桂姜湯五十四

汗下後

發黃水結餘證

○遍身有汗謂之熱越熱氣越於四

頭

汗下後胃脇滿結
頭汗出心下滿
應有餘證及半
熱越熱氣越於四
躄也若厥熱在裏
不能發越鬱於陽
經况頭乃諸陽所
會是以但頭汗知
其熱瘀於內及發
黃也餘則隨証以
解之

汗下後胃脇滿結
頭汗出心下滿
應有餘證及半
熱越熱氣越於四
躄也若厥熱在裏
不能發越鬱於陽
經况頭乃諸陽所
會是以但頭汗知
其熱瘀於內及發
黃也餘則隨証以
解之

汗

汗下後胃脇滿結
頭汗出心下滿
應有餘證及半
熱越熱氣越於四
躄也若厥熱在裏
不能發越鬱於陽
經况頭乃諸陽所
會是以但頭汗知
其熱瘀於內及發
黃也餘則隨証以
解之

○可水不可水二十六 一首

小渴者使病人盡意飲之因成其禍不可勝數

仲景云得病反能飲水此為欲愈後人或此見其發

大渴飲時能一斗常令只為二三升若還不與非其治強飲無疑別病生

飲水過多水停心下氣上乘心則為悸為喘 結於胃協則為

水結胃 胃中虛冷則為嘔為噎為噎冷氣相搏則為噎上迫於肺

則為咳嗽 潰腸中則為利 邪熱所薄畜於下焦則為小便

不利小腹滿或裏急溢於皮膚則為腫以此知不可強飲明矣

全不與水則發喘而死則又非其治也

○漱水不欲嚥二十七 一首

陽明口燥苦頭疼水不下咽將衄血瘀血停留定發狂病家外證

無寒熱

發明身熱頭痛者必發 衄 脉微者 犀角地黃湯 又 茅花湯 外

証無寒熱者必發 狂 此瘀血停留也輕者 犀角地黃湯 百五十九

甚者 抵當湯 取盡黑物為度

陽明

瘀血

漱水不欲飲

陽明身熱頭疼嗽 水不欲飲必發 衄 脉微者犀角地黃湯

外証無寒熱嗽水不飲 欲飲 衄 脉微者犀角地黃湯 取尺黑物為度

○此屬陽明証凡內有熱者欲飲水今欲嗽而不欲飲是熱有經而裏無熱也陽明氣血俱多經中熱甚迫血妄行故知天作衄也

背惡寒二十八 一首

背上惡寒人少會少陰之病口中和三陽合病口乾燥以此區分

免薦瘥

口中和附子湯百三十一

口乾燥白虎湯七十

背 口燥渴

口中和

惡

傷寒無大熱口燥少陰病一二日口

寒

渴心煩背微惡寒中和背惡寒無熱

白虎加人參湯也附子湯百廿六

吐血二十九 一首 嘔血附

因邪熱中三陽當汗醫家失料量熱毒入深晉五藏故成吐血

可驚惶

言當汗而失汗也遂致熱毒入深故吐血也厥血甚者抵當丸

輕者桃仁承氣湯六十九兼服犀角地黄湯百十八証治論百三十三又

地血散二百七大下後寸脉沉遲尺脉不至咽喉不利唾膿血者升麻黃湯

湯二服桂枝湯吐者其後必吐膿血犀角地黄湯百五十八

熱毒

虛煩

吐

當汗失汗熱毒深入太下後寸脉沉遲尺脉不至咽喉不利唾甚故宜治以寒涼

故吐血者抵當丸九輕者犀角地黃湯三十二若寒氣凝血則當

湯三黃芩心湯栝皮湯脉遲細其人無熱所温之使血得熱則

血

服桂枝湯吐者必吐則凝也理中湯

膿血犀角地黃湯百五十八千金鼻病論云此時竹蚬不宜斷之

衄血三十 一首

如二三升以上恐多者可斷即以龍

骨次之九竅出血者皆可用

太陽衄血病將解衄后仍將脉審詳有汗脉浮須用桂緊而無汗用麻黃

桂即桂枝湯也方第一麻黃即麻黃湯也方第二十太陽病自衄及服

諸表藥後自衄者為欲解也有汗脉浮再與桂枝湯脉微者犀

地黃湯百又黃芩芍藥湯七十四衄而渴欲飲水水入即吐先

服五苓散次以八十五大抵陰證無緣有血少陰証但厥而無

汗強發之必動血動血者死或出口鼻或出耳目也是謂下厥

上竭

太陽

少陰脉微

衄

太陽病自衄及服麻黃湯后衄者為

強發少陰汗必衄血為大引下厥上竭為

則為汗血與汗一也則解經曰其人發煩

血

無汗脉浮緊者再與麻黃湯三十一血不止茅花湯

脉微者犀角地黃湯百五十八黃芩芍藥湯七十四衄而渴欲飲水

故也若不常汗而強汗之必動血或從口鼻耳口中出是為衄

多眠三十一首

多眠四証先看脉若是風温情嘿嘿太陽外証欲解時更有少陰

與狐惑

脉浮自汗風温也萎蕤湯百九十六脉細者太陽外已解也小柴胡湯

但浮無汗者麻黃湯三十一沉細者少陰也四逆湯百八

太陽

少陰

風温

狐惑

多

太陽病脉尺寸俱沉陽脉浮滑狀如傷寒者其說有二惟細多眠外細但欲寐多汗或發忽喜腫如少陰脉沉細

眠

已解也小

者少陰証

(四十三)

(百八)

汗后身犹若

上下唇但欲寐

神昏

不得眠三十二 二首

傷寒差后不得眠者何也蓋熱氣與諸陽相并陰氣未復所以

病后不得睡也

太陽大汗胃中乾燥悶虛煩不得眠下後更加重發汗夜間安靜

晝煩寃

渾身大熱仍嘔乾錯語呻吟睡不安吐汗下之心懊憹精神顛倒

更虛煩

太陽大汗出胃中乾欲飲水者少與之胃中和則愈脉浮小便

不利而渴者五苓散下後復發汗而下得眠者無表証脉

沉微者可與乾姜附子湯汗下後仍不解煩燥者茯苓四逆湯大

熱乾嘔錯語呻吟黃連解毒湯吐汗下後心懊憹虛煩顛倒梔子湯

八十吐下後晝夜不得眠黃連湯下利而渴不得眠猪苓湯

大凡傷寒差後不得眠梔子烏梅湯

吐下後

汗後差後

煩熱

不

吐下後懊憹虛煩不得眠梔子湯晝夜不得眠酸

太陽大熱汗下後仍不解煩燥者茯苓四逆湯大

液汗為心之神昏故不眠大

吐下後晝夜不得眠酸

大便熱嘔錯語故則神不清

則動血心主

眠

不得眠無表証脉沉乾利利

大便熱嘔錯語故則神不清

則動血心主

潮熱三十三 一首

脉浮弦而惡寒者皆屬表証也

傷寒其脉弦細身熱或往來寒熱至於煩渴微嘔則熱在半表
半裏以少陽一證止用小柴胡和解之三陰無身熱惟少陰則
有熱是未離表故用麻黃細辛附子藥發散溫中也發汗已身
灼熱名風溫是風與溫相合故用去風解溫之劑若汗後勞復
食寒熱者隨証治之經有翕發熱若翕所覆熇而熱明其熱在
外也若蒸蒸發熱者如薰蒸之蒸明其熱在內也若脉陰陽俱
虛熱不止者死發汗脉燥盛重表之無汗者死大汗後發熱愈
盛者死發熱下利厥逆煩躁不得卧者死此皆藥所不及也

○不可表三十五 一首 應下而汗者為亡陽 為譏語為下厥上竭

汗最難 脉弱無陽遲少血濕溫何逆與虛煩婦人經水適然下動氣虛家

脉弱者無陽也 桂枝二越婢 一湯十二 尺脉遲者血少也先以黃芪建中

湯以養血脉尚遲者再作一劑次用小柴胡湯桂枝二越婢一

湯和解之 三方並載熱 多寒少條下 濕溫自有 本條何逆者乃四種壞病也 有各

本條○溫 疫溫毒風溫 疫 虛煩熱 自有本條 婦人經水適下發汗則鬱冒不

知蓋緣表裏皆虛也 小柴胡湯 四十二 動氣不可汗仍不可下証治論

用 柴胡桂枝 五十三 在左發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤此為難治有

筋惕肉 瞤條 在右發汗則衄血而渴心苦煩飲則吐水先服一二服

五苓散 百七十九 次服 竹葉湯 八十五 在上發汗則氣上衝正在心端 李根湯 百


在下發汗則無汗心中大煩骨節疼頭痛目運惡寒食而反吐

穀不得下前 大陳皮湯 百六十八 先服 小建中湯 五十八 吐止後服

虛家六證

一咽中閉塞 二咽喉乾燥 三亡血 四衄家 五淋家
 六瘡家皆不可表宜小柴胡湯四十三誤汗後諸

不可汗圖



汗後惡寒三十六 三首

汗後惡寒附 汗後發熱附

汗後惡寒宜芍藥脉沉發熱下尤良四肢疼倦仍兼利厥逆須投四逆湯

汗後渾身熱似炮精神狂亂語譊譊更加不食脉躁疾醫經號曰陰陽交

汗後依前寒熱者仍須看候脉何如若還有表重加汗裏証終當下即除

發汗宜用麻黃湯下即宜用大柴胡湯四十二大承氣湯六十七芍藥者乃芍

藥甘草附子湯百十七陰陽交交者死言發汗後不為汗衰脉

準前躁疾者若汗後脉靜者生 汗後發昏而熱不退狂言者

承氣湯下之立愈未差再服

汗為在表之邪始自
 得病時腠理不密寒
 邪客之故令人洒淅
 惡寒頭痛自熱而腰
 脊強乃用極劑就表
 而以汗解既汗之後
 病尤未愈雖裏証悉
 具微有惡寒亦表未
 解則當先解表而後
 攻裏也若表已解脉
 不浮與夫諸虛温温
 動氣暑暈等証其梗
 汗之是重虛其虛此
 為逆也以致病之反
 覆表裏外雜至于不
 救為醫者可不慎與

汗表未解

大便實

大便利

後汗後惡

大便實微惡

汗後陽微惡

惡解者汗

寒者先解表

者芍藥附子

寒之麻黃

柴胡湯四十一

甘草湯百十七

○汗後惡寒但表解者
盡則為輕証法當再汗
之若陽微於外寒積於
內厥逆自利則用四逆
湯陽微於外熱伏於內
大便實者下之若汗後
脈不為汗衰准前躁疾
者此名陰陽交交者死

不可下三十七

一首應汗而下為痞
為結胃為懊憹

脈浮有表并虛細嘔吐惡寒無失氣大便堅硬小便清或少或多

或自利

脈浮者為有表也不可下

大抵脈浮而惡寒者為有表也

表証未罷不可下

脈虛細可吐虛細不可下

嘔吐仲景云嘔多雖有陽明證切

不可下惡寒者太陽陽明合病屬表可發汗若是少陰証宜

溫之

無失氣者謂不轉失氣也依潮熱條大承氣湯法及藥

評承氣湯條下法

大便堅而小便清者知不在裏也

桂枝湯

大便堅而小便少恐津液不入胃而先鞭後溏也

每日三四行

今日再行此津液還入胃不又當自大便也

大便堅而小便

多其脾為約詳見小便數條及三陽合病條

陽明病自汗出而小便自利者

津液內竭也可用蜜道煎法

方載小便

小便自如乃可攻之

謂知常也每日三行今日亦三行不多不少故曰小便自如也

方可下

諸氣在右下之則津液內竭咽燥鼻乾頭眩心悸宜

竹葉湯

諸動氣諸虛家厥逆皆不可下動氣在左下之則腹

裏拘急不止動氣反劇身雖有熱反欲拳先服湯百十四次服

小建中湯

動氣在上下之則掌握煩身熱汗自泄欲水自灌

葉竹

葉

五十八

葉

下地記

湯(八)動氣在下下之則腹滿卒起頭眩食則下清穀心下痞堅
 甘草瀉心(百三十一)咽中閉塞不可下(烏扇湯(百三十二)厥逆(三百二十三)虛家
 附子湯(百三十六)

無失氣
 咽中閉塞
 嘔吐
 脉虛細
 結胃脉浮大
 脉浮有表
 動氣在右
 動氣在左
 動氣在上
 動氣在下



○初病之時和在於表
 故汗之若太陽証罷轉
 屬陽明翌日不大便不
 惡寒反惡熱脉沉而實
 方為可下此至表証已
 罷悉歸於裏若火陰脉
 沉細口燥咽乾此熱結
 下焦銷燦腎水故當急
 下余如胃實識語腹滿
 而喘潮熱畜血無表証
 不大便皆可下也若大
 便雖硬小便清者知不
 在裏猶未可下小便少
 者津液未充亦未可下如以浮虛之
 脉動氣時証或下之太早皆致危篤
 汗後惡寒差後差後
 遺熱勞復食復附

下後有熱三十八

三首

汗後惡寒差後差後
 遺熱勞復食復附

汗後陽微即惡寒下之陰弱還生熱皆緣醫者誤調停致使病家
 多失血

發汗則損氣損氣則脉微故惡寒也(四逆湯)惡寒條中用(芍藥

附子湯)大下之則傷血傷血則脉瀋故發熱也(葶藶散酒湯)此

皆仲景所謂不當汗下而誤汗下者故有此二証也致有失血

者血本屬陰得氣而流因下之亡陽陽不主陰寒氣加之所以

脉瀋此下之之過傷其血也

曾經下後身猶熱漸覺心中成痛結香豉梔子恰相宜去病還如

湯沃雪

大下後身熱不去心中結痛(梔子豉湯)主

湯沃雪

傷寒差後熱還生因食因勞輒動經脈實下之浮即汗大柴鼠糞最温平

差後發熱謂之遺熱小柴胡湯 脈實者下之大柴胡湯 又承氣

湯四十一 脈浮者汗之麻黃湯 證治論用柴胡桂枝湯 渴者五苓散

下利腹中雷鳴痞生姜瀉心 勞復枳實湯 食復枳實湯

外腎腫腹中絞痛欲痛竹皮湯 治交接勞復枳實湯 食復枳實湯

下後熱圖下附懊憹勞食復汗吐下後不解過經不解共七

圖

下

太陽

陽明

○仲景云大發其汗使陽氣微又大下之使陰氣

後

太陽証服桂枝湯

陽明下之仍外熱心

弱其人亡血病當寒後

執

或下之乃頭項強

下出飽子鼓湯八

乃發熱無休止時陰

懊

可下

可吐

○懊憹者心中惛亂不安也經曰表未解

懷

陽明病下之心中

吐下後虛煩不得眠

醫反下之胃中空虛

勞

燥屎也煩胃中有

懊憹者反復顛倒心中

客氣動焉心中懊憹

懷

陽明病無汗小便

熱手足温而不結胃

當隨其虛實復逐其

勞

發黃也中懊憹必

頭汗出枝子鼓湯

和方可安也

勞

勞復

食復

○傷寒大病和毒犯於府藏如水浸墻壁水退止尚

勞

新差後津液未復

新差後胃氣尚弱

未堅再犯之熱乃隨至是

血氣尚虛勞動則

飲食稍多則為食

謂勞復非但強力持重若

食後

生熱宜用枳壳枳實復發熱腹滿宜服梳洛動氣則為勞矣食後子湯鼠矢鼓湯假枳壳枳實大黃湯者經曰病已差尚微煩設鼠糞湯麥門冬湯

百九十四湯八十五竹葉石膏

氣故令微寒損穀則愈

汗吐下後

發汗吐下後

虛煩不眠劇發上衝後心下逆滿氣者反覆顛倒木湯百七十八

汗後下

下後汗

吐

心中懊懷枝

吐下後七十八

汗後下

下後汗

下

夫陽汗吐下

乾上燥煩飲水白虎

汗後下

下後汗

後

硬噫氣不除

日下後餘大便五

汗後下

下後汗

末

湯百六六

見鬼循衣摸床語如

汗後下

下後汗

解

邪熱入胃也

湯六十六七

汗後下

下後汗

汗

發汗病不解反惡

實

渴

病之初感

後

虛

實

渴

病之初感

發汗病不解反惡

實

渴

病之初感

解

本柴胡証下之而不得利
今反利者知醫以九藥下
之非其治也潮熱者實也
先宜小柴胡湯以解外後
服柴胡加芒硝湯
煩若不經吐下者
當與柴胡湯若胃
經吐下者則邪氣
乘虛入胃為實調
胃承氣湯
候若不愈至
于十三日乃
再傳經盡所
以謂之過經
也

熱多寒少三十九一首
若脈浮絮雖熱多寒少亦自
可發汗或遲或弱皆不可也

熱多寒少分三証不嘔清便各半湯尺脈尚遲為血少脈皆微弱

號無陽

清便者大小便如常也
桂枝麻黃各半湯
尺脈遲者黃芪建中脈

尚遲再作一劑次第用
越婢湯和之桂枝二無陽者越婢一

乾嘔四十一首
一咨琬謂嘔而無物出也

嘔而無物名乾嘔下利三般屬少陰脇痛頭疼并水氣个中自是

少知音

少陰下利三証利不止厥逆無脈乾嘔煩者
白通加猪膽汁湯百四十一脈

微者百四十一裏寒外熱脈微欲絕或乾嘔者
通脈四逆湯百二十四乾嘔

吐涎沫頭痛者百六十五得藥而反劇者
小柴胡湯百二十三汗出頭痛

乾嘔者桂枝心下有水氣乾嘔發熱者屬表
小青龙湯百三十八身涼汗

出兩脇痛乾嘔知氣不惡寒此表解裏未和也
兩上有寒飲乾

嘔者可溫之百八証治論乾嘔而利者
黃芩半夏生薑湯百七十五

寒

熱

水氣

乾

嘔

少陰下利裏寒外自汗頭疼身熱表不解心
受納之府裏氣不和或為熱嘔或為
嘔而無物為乾嘔本屬胃胃之
三腕是謂陽土為
受納之府裏氣不和或為熱嘔或為
寒嘔故不能納又
不能出乃乾嘔也
千金曰嘔家多
服乾姜取其散
兩脇痛乾
身涼汗出
三十八
小青龙湯
乾嘔發熱
乾嘔有水氣
下有水氣
表不解心
受納之府裏氣不和或為熱嘔或為
寒嘔故不能納又
不能出乃乾嘔也
千金曰嘔家多
服乾姜取其散

飲乾嘔者當溫之用五苓散百七
四逆湯百八
乾嘔而利黃芩半胃熱乾嘔桔梗
夏生薑湯七十五湯百七
嘔十束湯百八
逆氣金匱要畧
多用半夏取其
散結氣此治乾
嘔之大法也

傷寒不得汗四十一 二首

傷寒躁盛身無汗或用麻黃汗不行此是諸陽之脉極百中無一
可全生

若還無汗渾身痒脉更浮遲本屬虛自是無陽難作汗建中木附
載醫書

無陽身痒桂枝麻黃各半湯十二陽明主有汗今反無汗如虫行皮中木

湯百三十七建中湯五十八汗不流是汗出時益覆不周汗出不勻致手足

腰背牽搐也用牛蒡根湯百八十七

陽虛表實

汗不得
脉浮而遲為無陽傷寒無汗服麻黃湯葱豉湯等藥汗不出者死不得汗解今汗証雖具不行此陽虛津枯不能為汗故云熱病脉燥盛不得汗者謂陽脉極故不可治也

頭疼四十二 二首

惡寒發熱太陽經急熱頭疼胃氣蒸脉細而弦兼發熱少陽頭痛
自分明

三陰本沒頭疼痛若有頭疼屬厥陰非次頭疼涎作病心煩鼻塞
濕家尋

太陽惡寒發熱頭疼無汗麻黃湯二十七有汗桂枝湯一已發汗未發汗頭
痛如破者連續蔥白湯百九十一不已者葛根蔥白湯三十二陽明頭疼胃氣所蒸

也調胃承氣少陽頭疼小柴胡湯涎病頭疼瓜蒂搗鼻法二百

云無頭疼下濕家鼻塞頭疼瓜蒂搗出鼻中黃水即愈厥陰頭

疼脉必微浮浮者欲愈也不愈者小建外證發熱似瘧者欲愈

也宜桂枝麻黃各活人書云三陰無頭疼唯厥陰有頭疼至吳

茱萸證却云乾嘔吐涎沫頭疼屬少陰以此論之少陰亦有頭

疼但稀少耳孫真人云少陰傷寒不壯熱不頭疼其稀少可知

少陰身雖有熱而無頭疼厥陰有頭疼而無身熱若身熱而又頭疼屬陽証無疑矣

太陽

頭

太陽頭無汗麻黃湯頭有汗桂枝湯細小柴胡湯陽明頭厥陰

痛

頭痛小便清知芩白湯葛根葱發熱頭痛似瘧為寒溫故鼻塞聲重而頭痛瓜蒂搗鼻法三百二十五

百

○百合四十三一首百脉一宗悉致其病無復經絡也故謂之百合傷寒

知妙訣

坐不能坐行不行寒又無寒熱無熱飲食美時不美時百合少大

百

○百合者百脉一宗悉致其病無復經絡其狀欲食復不能

百

食欲卧復不能卧欲行復不能行如有寒又無寒如有熱又

百

無執常默默不知所以口苦小便赤服藥入口即吐利如有

百合知母湯

百合地黃湯

百合洗方

滑石代赭湯

合

鬼邪蓋此病因病後失於調理餘證在陰則攻陽餘證在陽則攻陰攻陰者或發其汗攻陽者或反下之以此為逆各不得解故用百合等藥取其和合於百脉也

○腹脹四十四 一首

問君腹脹是如何只謂陰陽氣不和若是曾經汗吐下依方調治莫蹉跎

腹脹者何也陰陽不和也桔梗半夏湯最良百七十三仲景云太陽

證發汗後腹脹滿者厚朴半夏甘草人參湯百二十九太陽證下後心煩腹脹

滿卧起不安者梔子厚朴湯九十七吐後腹脹滿者調胃承氣湯六十八

腹

汗下後可下
○腹脹者陰陽氣偏而不和也若汗下吐而後動氣傷血編而不

脹

太厚利半夏甘草人參湯百二十五
太陽証下之後心煩腹脹卧起不安
梔子厚朴湯九十七
調胃承氣湯六十八
少陰六七日不大便
腹脹急下之小承氣湯六十七通用桔梗實腹堅渴不大便此

○小便不利四十五 二首
小便難小便自利及利小便一

傷寒汗下亡津液故使胃中乾燥極法主小便多不通醫家友利名為逆

熱在下焦偏喜飲小便又却不通時脉浮自屬五苓散沉脉猪苓亦頗宜

汗下後亡津液胃中乾極故小便不利醫見不利往往利之誤矣若得小便利者病必自愈但不可用藥行之也

熱在下焦小便不利脉浮者五苓散脉沉者猪苓湯表不解心

下有水發熱而咳小腹滿小便不利小青龙去麻黃加茯苓湯(四十)翕翕發

熱頭頂心痛小便不利桂枝去桂加茯苓湯(十九)嘔而發熱胃腸滿心下

怔忡小便不利小柴胡去黃芩加茯苓湯(四十六)少陰小便不利四逆散加茯苓(百十三)

陽明經病饒多汗切戒醫家利小便若是發黃并中溫是中專以利為先

傷寒有所不利者行之取其滲泄也大病差後從腰已下有水

氣者牡礪澤瀉(三百四)此利水道滲泄之義也發黃中溫各有本條小便難而

黃者陰虛為黃所湊中有熱也故小便難而黃萬全木通散(二百十八)小

便難者太陽病汗後漏不止惡風四肢拘急難以屈伸小便難

也桂枝加附子湯(六)陽明中風脉弦浮大短氣腹滿脇下及

心痛鼻乾不得汗嗜卧身黃小便難潮熱而噦者小柴胡加茯苓湯(四十四)

○發黃條通小便自利者太陽證下焦有熱小腹必滿小便不利而

反利者下血證也抵當湯(一百四)陽明証自汗出應小便不利而反利

者津液內竭也屎雖硬不可攻之宜蜜煎導(二百二十七)諸膽導法(二百二十八)少陰

證四逆而小便自利者虛寒也四逆湯(百八)真武湯(去茯苓百三十九)

膀胱與腎盡皆虛客熱從虛由此入虛則令人數小便熱則小便

行道澁趺陽澁與浮相搏瀋主腎虛便溺數浮為胃實大便鞭方

書所論為脾約

經云大抵溲數則大便難也脾約丸(百五十二)○亦見二太陽病

自汗四肢拘急難以屈伸心煩微惡寒脚挛急若小便數者切

不可行桂枝也宜與甘草乾姜湯(百十四)芍藥甘草湯(百六)太陽病汗吐下後小

便數大便因鞭者小承氣湯(利類六十七)傷寒自汗脉浮小便數者而胃

不和讖語者少與調胃承氣湯六十八尿血證治論用延胡索散仲景云
 跌陽浮濇少陰脉如經也其病在脾法當下利注云脾虛不能
 制水腎氣平和故少陰如經也浮則胃熱濇則脾寒所以不能
 刻消水穀故下利也與前所論不同 下利則依下利條隨冷
 熱治 脾約者依本條治

熱

寒熱

陰濕

小 便 不 利

太陽汗後脉浮小便傷寒五六日已少陽四五
 便不利微熱甚者猪便不利下寒熱心
 五苓散渴甚者猪便不利下寒熱心
 傷寒七八日身黃渴者小柴胡湯
 如橘色小便不利利心下悸小便不利
 利腹微滿茵陳湯利心下悸小便不利
 頭汗出小便不利利心下悸小便不利
 湯引水漿厥熱在九日下之胃滿其
 內必發黃茵陳湯加龍骨牡蠣胡
 難下易微熱者加龍骨牡蠣胡
 有燥屎也大便承氣湯

○膀胱主藏津液邪熱畜於內
 津液不下行故
 小便不利則當
 遂熱行津如濕
 勝水氣不得行
 即當溫中散溫
 以辛其發散也
 仲景有或小便
 不利二証用
 武湯四散散為
 重故不載

○膀胱主藏津液邪熱畜於內
 津液不下行故
 小便不利則當
 遂熱行津如濕
 勝水氣不得行
 即當溫中散溫
 以辛其發散也
 仲景有或小便
 不利二証用
 武湯四散散為
 重故不載

小 便 自 利

太陽身黃小便當狂不
 利反自利其人如狂
 血証諦也抵當湯
 傷寒有熱小腹痛滿應
 小便不利也抵當丸
 為有血也抵當丸
 之不可餘藥尿血延
 胡索散

血 證
 陽明
 少陰

○小便秘小便
 赤知其內有熱
 小便自利其人
 如狂小腹痛知
 不為熱乃畜血
 也結陽明津竭
 自利與夫少陰
 自利乃胞寒不
 禁利不溫乎

○小便秘小便
 赤知其內有熱
 小便自利其人
 如狂小腹痛知
 不為熱乃畜血
 也結陽明津竭
 自利與夫少陰
 自利乃胞寒不
 禁利不溫乎

可 溫

可 利

小 便

太陽自汗四肢拘
 急難以屈伸心煩
 微惡寒不可行桂
 便數者不可行桂

太陽汗吐下後小便
 胃不和氣湯
 胃承氣湯
 胃承氣湯
 胃承氣湯

○小便數者乃頻數
 與膀胱俱虛客
 虛不能制水
 熱則水行溢
 小便熱則水行溢
 小便熱則水行溢
 小便熱則水行溢

數

枝宜與甘草乾姜
湯百十四芍藥
草湯百十六

大便因硬者小承氣
湯六七
數大便堅脾約九百五

主為胃行其津液今
胃強脾弱約束不行
致小便數大便難也

○藏結四十六一首

狀如結胃飲食如故時時
下利前舌上白胎者是也

飲食如常時下利更加舌上白胎時連臍痛引陰筋者藏結元來
死不醫

無陽証不往來寒熱一云寒而不熱其人反靜舌上白胎者不

可攻也可刺關元穴仍與小柴胡湯

藏

藏結之候其狀如結胃飲食如故時、自下利舌上白胎脉
痛引陰筋不往來寒熱一云寒而不熱其人反靜此藏結也仲景謂

結

病脇下素有痞連在臍傍痛引小腹入陰筋者此名藏結死蓋宿昔
之積結為脇下為痞今因傷寒邪氣入裏與宿昔相合使真藏之氣
結而不通致連在臍傍痛引小腹入陰筋而死仲景無治法舌上白
胎者不可攻可刺關元二百三十一仍與小柴胡湯四十三

新刺圖註傷寒活人指掌卷之二終