

醫方類聚卷之二百四十八

小兒疔毒 疔毒 疔毒 疔毒

癰疽

聖惠方二

治小兒癰諸方

夫小兒腫結長壹寸至二寸名之為癰不似

魚氏病源癰熱痛久則膿潰担巢源作膿血

盡便差亦是風熱之氣客於皮膚而氣壅結

所成凡癰癢担膿不盡而瘡口便合其惡口



在裏雖差終能更發皆變成瘻也

治小兒初生瘡癩丘歲癰熱宜服大黃散方

川大黃半兩到碎 梔子一分 黃芩半兩 川升麻

半兩 甘草生用

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水壹小

盞煎至五分去滓放溫量兒大小分減服

之以利為度

治小兒熱毒氣壅外攻皮膚生癩赤腫炊痛
或時煩熱少得睡卧犀角丸方

犀角屑三分 川升麻半兩 黃芩半兩 玄參半兩 黃耆

半兩 人參半兩 去蘆頭 皂莢壹兩 去皮塗酥炙令黃 煨去子用

坐拏半兩 川大黃壹兩 到碎微炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸

如麻子大每服以生甘草湯下七丸量兒

大小加減服之

治小兒虛熱消瘡癩地黃丸方

生乾地黄壹兩 梓心半兩 川大黃壹兩 到碎微炒 赤芍

藥半兩 赤茯苓半兩 王不留行半兩 甘草壹分 生用

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如菜豆大每服以熟水下七丸量兒大小加減服之

治小兒瘡癩初生熱氣始結疼痛妨悶塗之便令內消消石散方

消石兩半 紫檀香兩半 甜葶藶壹分 葶藶壹分 生用 葶藶壹分

川大黃兩半 白藥壹分 白欬兩半

右件藥搗細羅為散以漿水和稀稠得所用竹篦子塗於腫上乾即易之以熱退腫消為度

治小兒軟癩乳香膏方

乳香兩半 膩粉一分 油兩壹 黃蠟兩半 松脂一分 蜜壹

僧壹分 細研

右件藥先取油煎蠟松脂乳香洋後下粉又蜜隨僧調和成膏看癩大小攤膏於故帛上貼之

治小兒軟癩赤腫疼痛不可忍方

天靈蓋壹枚 塗壹隻 麻鞋底多半 故者燒灰

右件藥搗細羅為散每使以油調塗之

治小兒軟癩雖出膿水熱痛不止方

赤小豆四十九粒乳香半分膩粉半分

右件藥搗細羅為散先去膿水後摻散藥於瘡上立効

又方右以油麻子炒熱爛嚼傅之

治小兒軟癩有膿不穴宜用此方

巴豆一粒豆豉五十粒葱白一寸

右件藥同研令爛塗在癩上別以醋麵糊對之神巧萬全方同

治小兒軟癩立効方

石灰半兩乾薑半兩

右件藥搗細羅為散以生油和担作椀子

罨在癩上立差

又方百草霜半兩藍花半兩黃蘗一分乳香一分寒

食麵半兩

又右件藥搗細羅為散每以醋和塗於故帛

上貼之

又方豆豉半兩藍半兩葱白七莖

右件藥都搗作餅子可瘡貼之如瘡大口
大艾炷灸之効

又方生椒 麩 伏竜肝已土各等分

右件藥細研爲散以醋和封之乾卽易之効

又方狗頭骨炙冷 雲臺子等分

右件藥搗細羅爲散以醋調塗之

治小兒瘡癩焮熱方右取半夏未以水調塗之乾卽更塗

又方右以葛蔓燒灰細研封之

治小兒癩無頭者方右取鼠粘葉爛搗傅之

又方右雀糞細研水調傅之

又方右以葵子壹枚以水下之卽有頭

治小兒月蝕瘡諸方

夫小兒耳鼻口間生瘡者世謂之月蝕瘡其瘡隨月生死因以爲名也世云小兒見月初生以手指之則令耳下生瘡故呼爲月蝕瘡也

治小兒月蝕瘡生在兩耳上出膿水不止宜
傅水銀膏方

水銀二兩 胡粉壹兩 點少水與水
黃連二兩 去鬚
為末 松脂壹兩 銀同研令星盡

右件藥入乳鉢內研令勻以粉瘡上瘡若
乾用鍊成猪脂和如膏每用先以菹湯洗
瘡令淨拭乾然後塗之

治小兒月蝕瘡立効方

敗鼓皮壹兩 蝦蟆壹枚
燒灰 煨灰

右件藥細研為散以鍊成猪脂和如膏塗
之即差

治小兒月蝕瘡久不差班猫散方

班猫半斤 以糟米同炒 硫黃半兩 蘭茹半兩

右件藥搗細羅為散重入乳鉢內同研如
粉貼於瘡上即差或瘡乾即以猪脂和塗
之

又方乾蟾壹枚 五月五日 硫黃壹兩 白礬二兩

右件藥同細研為散用傅瘡上

治小兒月蝕瘡吳茱萸根散方

吳茱萸根 地榆根 薔薇根 各半

右件藥都剉搗細羅為散每用先以溫掠

水洗瘡令淨拭乾傅

又方青蜓 壹枚 母猪蹄甲 壹枚 救月杖 二分

右件藥燒為灰細研為散以蜜水和塗

又方虎頭骨 二兩

右搗細羅為散以猪脂壹升煎令黃色膏

成傾於不津器中候冷即塗之

又方右以小麥蘗搗羅為末傅之

又方右以貴連搗羅為末傅之 壽域神方同

又方右胡粉和土等分研如粉傅之 壽域神方用胡

粉塗之

又方右蠟燭灰細研以猪脂和傅之

又方右敗鼓皮燒灰細研以猪脂和傅之

治小兒瘰癧諸方

夫小兒身體生熱瘡久不差者必生瘰癧其

狀作結核在肉皮間三兩箇相連瘰也是風

邪搏於血氣焮結所生也

治小兒瘰癧焮腫疼痛身體壯熱大腸壅滯

小便赤澀心神煩燥少得眠卧犀角散方

犀角屑兩半牛蒡子半兩連翹兩半麝香壹分

木通三分玄參三分沉香兩壹丁香兩半川朴消

兩一

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水壹小

盞煎至五分去滓量兒大小分溫服○聖

濟總錄犀角銹屑壹兩惡貫壹兩連翹兩二麝香壹

兩木通壹兩玄參兩二沉香兩壹丁香兩半

朴消壹兩右丸味麤搗篩每二錢以水壹

盞煎至六分去滓分溫三服早晨日午晚

後各一以利為度更量兒大小以意加減

治小兒瘰癧發盛壯熱煩躁坐臥不安木通

散方

木通壹兩大麻人壹兩玄參兩壹川升麻兩壹敗

醬兩二連翹兩壹川大黃兩壹川芎兩壹犀

角屑兩一

右件藥搗麤羅爲散每服壹錢以水壹小
盞煎至五分去滓量兒大小分減溫服當
利下惡物筋膜爲効

治小兒瘰癧除根本膩粉散方

膩粉青黃耆壹分糯米三七班猫二七
以糯米拌炒微黃

右件藥搗細羅爲散每服空腹以溫酒調
下壹字良久喫少許醋湯病隨小便中出
量兒大小加減服之

治小兒瘰癧不消麝香散方

麝香青分○聖鴿糞青分○微炒○
濟總錄研

右件藥細研爲散每服以溫酒調下半錢

日二服總錄早晨量兒大小加減服之

治小兒瘰癧發寒熱項頸生結核腫硬如石
腹脇背裏有如堅急不通連翹丸方

連翹半兩桑根白皮半兩犀角屑半兩白頭翁

兩漏蘆半兩黃蘗半兩牛蒡子半兩川大黃

兩青秦艽半兩川升麻半兩

右件藥搗羅爲末鍊蜜和丸如菜豆大每服以粥飲下五丸日三服量兒大小加減服之

治小兒瘰癧難消皂莢丸方

皂莢八兩不艸者水浸壹宿薄荷五兩荆芥五兩雄黃半兩麝香一分

右件藥搗羅爲末都研令勻用白羊肉四兩去筋膜細切以鍊成蜜相和搗三五百杵丸如菜豆大每服以薄荷湯下十九量

兒大小加減服之

治小兒腫結久不消散結成癰癧宜服麝香

丸方

麝香一分牛黃壹分蝸牛子壹兩皂莢壹兩子壹兩皂莢壹兩針炙黃壹兩薄荷壹兩雄鴿糞壹兩

右件藥搗羅爲末鍊蜜和丸如○
每服以薄荷湯下七丸日三服○
小加減服之○

治小兒癩癧五香膏方

沉香兩半煎香兩半木香兩半丁香兩半麝香兩半細研

熊膽壹分膚會壹分黃丹二兩黃蠟二兩亂髮壹兩油

斤半

右件藥細剉先以慢火煎油令沸下亂髮煎令消即下諸藥煎三上三下以絲濾去滓下黃蠟次下黃丹麝香攪令勻膏成以瓷合盛每使先以米泔洗拭乾以膏攤於故帛上貼之

治小兒癩癧穴後宜用生肌膏方

黃丹兩半杏仁壹兩湯壹兩蛇蛻皮壹條黃蠟兩半亂

髮壹兩菜子油六兩皂莢三寸水浸去黑皮子

右件藥先取杏仁蛇皮皂莢搗碎然以菜油於銚子中煎亂髮令消次下杏仁等三味同煎三上三下以絲濾去滓下黃蠟次下黃丹以桃篋子不住手攪令勻候膏成以瓷器盛於故帛上塗貼之

治小兒癩癧不穴宜貼斑猫膏方

班猫三枚去翅足 松脂三兩 巴豆一枚去皮心以漿水煮過與班

猫研令細 雄雀糞壹兩為末

右件藥先取松脂入銚子內鎔化入班猫

巴豆熬成膏担作餅子熱貼在癩瘰上候

穴用牛肌膏貼之日再換差為度

治小兒癩瘰穿潰膿水不止蜜陀僧散方

蜜陀僧二兩 胡粉二兩 熊膽壹兩 盧會壹兩 白及壹兩

白欽一兩

右件藥搗細羅為散傅瘡口內效

治小兒癩瘰腫硬皂莢刺散方

皂莢刺壹斤

右於盆中燒候火盛時取牛蒡子半斤撒

於火中與皂莢刺都成灰為度待冷收之

搗細羅為散每服以井華水調下一錢日

三服三五日內必有惡物下如膠餒狀下

盡即永斷根本

治小兒癩瘰結硬令內消方

膩粉半兩 雞子二枚取白用

右件藥調如稀麵糊以文火炒之用火筋
急攪勿令粘著銚子候焦黑色卽涅入上
好朱砂半兩同研如麵每服以粥飲調下
半錢五更與服良久腹痛便瀉出病根棗
核之狀如未差卽隔日再服之若已成瘡
者宜用後散貼之

又方毒蛇皮

三條 吳茱萸 半合

右件藥燒爲灰細研以生油和塗之須用
帛子遮藥氣不得衝眼切須忌之

治小兒癩癧結核腫硬欲令穴碯砂丸方

碯砂一分 硃黃壹分

右件藥同研令細以糯米飯和丸如小麥
粒大先焙破內壹丸五日內其癩子當壞
爛自出後用生肌膏貼之

治小兒癩癧蝸牛散法

蝸牛數兩 真牛乳半升

右件藥入銚子中於慢火上熬令乳盡取
蝸牛殼研如粉入此黃末壹分更研令細

每服以皂莢子入湯調下半錢大小便中
利出惡物即差

又方皂莢子四十枚

右用手指許大竹筒安得皂莢子者壘在
竹筒中緊塞竹筒口投在溷坑中浸四十
九日取出淨洗曝乾擣細羅為散每服以
粥飲調下半錢日三服量兒大小加減服
之

又方白蔞蛇

五兩以酥塗炙令黃燥色

命火風燥式

右擣細羅為散每服以粥飲調下半錢日
三服量兒大小以意加減

又方右白殭蠶炒擣細羅為散每服以溫水
調下半錢日三服量兒大小以意加減
治小兒惡核諸方

夫小兒惡核者是風毒氣與血氣相搏結成
核生頸邊又遇風寒所折遂不消不潰名為
惡核也

治小兒風熱項邊生惡核寒熱腫痛五香散

方

木香壹分麝香一分薰陸香壹分沉香兩鷄舌

香壹分黃芩兩麻黃壹分去連翹兩海藻壹分

洗去射干一分川升麻兩枳實兩川大

黃一兩到碎微炒

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水壹小

盞煎至五分去滓入竹瀝半合更煎壹兩

沸量兒大小分減溫服

治小兒風熱項腋下有惡核不消大便多秘

心神煩熱丹參散方

丹參兩露蜂房壹分川升麻兩防風兩

頭連翹兩黃耆兩川大黃兩甘草

微半兩赤兩到兩牛蒡子兩枳殼三分微去去去去去

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水壹小

盞煎至五分去滓放溫量兒大小分減服

之

治小兒項生惡核壯熱不與升麻散亦壹小

川升麻兩射干兩連翹兩犀角屑兩川大

黃半兩到川朴消兩半

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水豎小
盞煎至五分去滓放溫量兒大小分減服
之

治小兒胃間積熱毒風氣不散連項生惡核
煩熱不已玄參丸方

玄參兩半漢防已兩半羌活兩半川大黃壹兩到

木香兩半梔子兩半赤芍藥兩半連翹三分川升

麻兩半牛蒡子微炒兩半

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如棗豆大每

服以粥飲下五九日三服量兒大小加減

服之

治小兒熱毒風腫生惡核令內消赤小豆散

方

赤小豆兩半猪牙皂兩半消石兩半黃藥兩半川

大黃壹兩到木鼈子兩半

右件藥搗細羅為散用雞子清調塗日三

四用之

治小兒惡瘡諸方

夫小兒身體生瘡者皆是藏熱熱漸衝於外
外有風濕相搏所生而風濕之氣挾熱毒者
其瘡則痒腫焮痛久不差者故名惡瘡也
治小兒惡瘡久不差并瘦瘡及疥癬等症宜
塗雄黃膏方

雄黃

壹兩

細研

藺茹

壹兩

蛇床子

壹兩

礬石

壹兩

水銀

半兩

以津研如泥

黃連

一兩

去鬚

右件藥搗羅為末與水銀相和以蠟月猪

脂同研如膏於瓷合中盛每用先以泔清
洗瘡令淨拭乾後塗瘡上仍以黃礬末用
絲搵撲之令不污衣日三兩度用之

治小兒惡瘡人不識者宜傳雌黃散方

雌黃

半兩

細研

黃小豆

半兩

胡粉

半兩

吳茱萸

半兩

生黃連

半兩

去鬚

黃礬

半兩

乾薑

半兩

生用

蛇床子

膩粉

半兩

研入

右件藥搗羅為末以生油旋調如而脂塗
於瘡上每用先以槐枝湯洗瘡令淨拭乾

然後傅藥

治小兒惡瘡久不差 蘭茹散方

蘭茹 桑螵蛸 地竜 乳香 黃丹

黃蘗 劉各壹兩 麝香 細研 糯米粉 膩粉 各壹分

右件藥搗細羅爲散每使不食井水和砂

糖調藥傅之

治小兒惡瘡一身如麻豆帶膿乍痛乍痒煩

熱宜用此方 聖濟總錄名甘草散

甘草 三分到 赤芍藥 三分 白欽 三分 黃 總錄生用

芩 三分 總錄去黑心 黃連 半兩 黃蘗 半兩 到 總錄去蘆皮各

右件藥搗細羅爲散用白養和如膏塗於瘡上日再用亦可作湯洗之佳

治小兒惡瘡神水膏方

蜜陀僧 半兩 細研 菰蘆根 半兩 澱花 半兩 丁香 半兩 附

子 半兩 皮 半兩 麝香 半兩 苘蓉子 半兩 水淘皂

萊 壹挺 去 防風 半兩 去 朱砂 半兩 細研 土花消

一沙參 半兩 去 人參 半兩 去 芎藭 半兩 龍骨

半
分
檀榔半桂心半清麻油壹斤黃蠟二兩

右件藥搗羅為末先取油入鐺中下諸藥末以慢火煎三兩沸然下黃蠟令消次下麝香攪令勻膏成以堯合小盛但小兒瘡不識者塗於故帛上貼之不過三五上去除根本

治小兒惡瘡焮腫疼痛黃連膏方

黃連末壹兩砒黃一分膩粉壹分松脂壹兩臘月猪脂一兩

右件藥先取猪脂入銚子內以慢火煎令化去滓次下松脂候鎔次下黃連等末以柳木篋子不住手攪令勻候膏成以堯合盛塗於瘡上日三用之

治小兒諸般惡瘡及軟癬末次作膿攻刺疼痛不可忍走馬膏方

坐拏壹兩黃蘗一兩甘草半兩木鼈子人兩拘糞兩半菜豆壹兩石槐皮兩右件藥搗羅為末每使取牛蒡根搗取自

然汁調藥末塗於瘡癩上日三換之如已破即不用貼此藥

治小兒惡瘡淋洗大黃湯方

川大黃 黃連去鬚 黃芩 澤蘭 白礬研

石南已上各青兩 戎菝壹分 蛇床子三合

右件藥細剉和勻每用二兩以水三大盞煮至二盞去滓適寒溫淋洗患處日三用之

治小兒惡瘡方

水銀壹兩 黃連壹兩去鬚為末 胡粉一兩

右件藥入乳鉢內點少蜜研令水銀星盡為度傳於瘡上立效

又方膩粉三分 黃連三分 蛇床子三分

右件藥擣細羅為散每使時先以溫棉湯洗瘡令淨拭乾以生油調塗之不過三五

上永差

又方楸樹葉一兩 乾漆一分 擣碎乾者炒令煙盡

右件藥擣細羅為散以大麻油調塗日三

用之

又方藜蘆

壹兩去蘆頭燒為灰

虎頭骨

一兩燒灰

右件藥細研為散以臘月猪脂調塗日三用之

治小兒惡瘡及沙虱水弩甲疽凡是惡瘡並

宜用此方

蟻蜋

十枚端午日收者佳

右件藥擣羅為末以生油調傅之立效

治小兒卒得惡瘡不可名識宜用此方

淡竹葉

二兩燒為灰

右細研以鷄子黃調塗之

又方右蛇蛻皮燒灰細研以臘月猪脂和塗

又方右馬骨燒灰細研以臘月猪脂和塗之

又方右鷄子殼燒灰細研以臘月猪脂和塗

又方右頭垢膩以臘月猪脂和塗之

治小兒瘰癧方

夫小兒瘰癧者由寒熱邪氣客於經絡使血氣否澁初生作細瘰瘰形或如梅李核或如

筋斡或圓或長長者至五六分不過寸或
壹或二三相連時發寒熱潰膿血不止者謂
之癩也是五藏六腑之氣不和致血氣不足
而受寒熱邪氣所為也然癩者有鼠癩螻蛄
癩蚯蚓癩蟻螻癩今各以壹方治療之也

治小兒一切癩出膿水項強頭疼四肢寒熱
宜服赤小豆散方

赤小豆壹合白歛壹兩露蜂房壹兩蛇蛻皮二尺
燒灰

右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下半
錢量兒大小加減服之

治小兒久癩移易三數處皆生瘡孔者宜傳
夜明沙散方

夜明沙壹兩白殭蠶半兩雄蠶蛾半兩乳香半兩
面茶兩

右件藥搗細羅為散傅於瘡上以差效
治小兒諸般癩瘡久不差宜傅烏蛇散方

烏蛇肉三分麩子三分曲頭棘針兩馬

齒寬三分 增上者 亂髮燒灰 雄黃壹分 細研細研

燒灰 右件藥搗細羅為散以酒調內瘡孔中以

差為度

治小兒諸瘡久不差作瘻孔丹砂方

丹砂壹兩 雄黃壹兩 苦參壹兩 白礬灰半兩

川大黃壹兩 黃連壹兩 莽草壹兩 蘭茹壹兩

右件藥並細剉用鍊字猪脂二升於鍋中

煎藥候紫色以絲濾去滓以丹砂等三味

以柳木篦攪令勻以堯合盛塗於瘡上每

日換之○保童祕要諸瘡久不差作瘻孔

方丹沙研 茵草各二分 雄黃研 苦蔘粉蘭茹

七頭者白礬 枯過大黃 黃連各五分 右除別

各四分 研外餘並細剉篩裏以成鍊了猪脂詳酌

多少同藥慢火三上三下煎藥紫色即濾

取候凝下別研者藥壹處以木槌研一二

千轉即成每用以少許於瘡瘦處塗之

治小兒諸瘻穿穴成瘡痛不可忍方

治小兒諸瘻穿穴成瘡痛不可忍方

治小兒諸瘻穿穴成瘡痛不可忍方

治小兒諸瘻穿穴成瘡痛不可忍方

馬齒莧八兩 榭樹白皮三兩 麝香三錢 杏仁三兩

湯浸去皮炒令微焦研如膏

右件藥除麝香杏仁外細判以水五升煎至壹升濾去滓澄清入麝香杏仁相和令勻更煎令稀稠得所以麤合盛每使塗於故帛上貼日二換之

又方右以牛糞堆上赤菌壹名朝生暮落花乾者擣羅為末傳瘡上効

又方右以乾楸葉搗羅為末以生油調傳之

又方右以鍊成松瘡末填瘡孔令滿日三用之効

又方右以霜下瓠花曝乾擣末傳之治小兒疳瘡諸方

夫小兒疳瘡生於面鼻上不痒不痛但有汁出汁所流處隨即成瘡亦生身上小兒多患

之亦是風濕搏於血氣所以不痒不痛故名疳瘡也

治小兒而鼻身生疳瘡及近口生濕瘡并赤

本草綱目
卷之五
三

白芥等及疔氣入腹漸漸羸瘦方

白狗糞半斤燒灰半斤蝦蟆半斤地竜半斤蝸牛殼

半兩蘭香半兩和半兩人糞半兩熊膽一分膚會

一分麝香一分

右件藥細研為散拮口中生瘡患以搗漿

水淨漱口以絲裏藥少許含之若鼻內生

瘡吹少許在鼻中如鼻外生瘡去痂傅之

疔氣入腹以新汲水空心調服半錢

治小兒疔瘡生於身上諸處宜用此方

蝦蟆壹分大麻子一分麝香壹分

糞灰壹分綠錢半錢

右件藥都細研為散以麻子膏同研令勻

傅於瘡上若下部即內藥少許日二度必

須慎口微有効即減藥

治小兒口中及諸處生疔瘡鴿糞散方

鴿糞壹分人糞兩白礬灰壹分青黛一分麝香一分

右件藥細研為散日三上傳之

右件藥細研為散日三上傳之

治小兒疳瘡或生口面或生身上宜服青黛散方

青黛壹分人糞半兩蝸牛半兩麝香壹分

右件藥細研為散量瘡大小傅之若鼻內有瘡以散少許吹在鼻內日三用之

治小兒頭面生疳瘡口中臭氣麝香散方

麝香壹分蚘蛇膽壹分黃礬一分瓜盧會壹分

右件藥細研為散先以溫水洗瘡然取藥壹字傅於瘡上口內惡氣貼藥壹字日三

用之

治小兒身上及口面生疳瘡并諸般疳疾並

宜用熊膽膏方

熊膽一分蚘蛇膽一分盧會一分牛黃一分麝香兩半

又龜腦一分

右件藥細研為末以井華水三合和勻堯器中盛於重湯內煮數添水可半日投三五粒糯米煮爛即成仍數以篋子攪藥四畔勿令藥乾每取兩豆許漸漸吹鼻中及

金口瘡頻使藥兩日即停壹日看兒髮變
青即止

治小兒身上及口面生疔瘡方右取狗糞中
米燒灰細研傅之
又方右馬銜蟲壹枚曬乾搗末傅之

治小兒熱瘡諸方

夫小兒熱瘡者是諸陽氣在表陽氣盛則表
熱小兒解脫腠理開則為風邪所客風熱相
搏留於皮膚則生瘡初作癩漿黃汁出風多

則痒熱多則痛血氣乘之則多膿而故名熱
瘡也

治小兒熱瘡生於身體黃芩散方

黃芩三分川升麻壹兩石膏壹兩甘草半兩炙玄

參半兩柴胡壹兩川大黃壹兩剉

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水壹小

盞煎至五分去滓放溫量兒大小分減服

之神巧萬
全方同

治小兒身上生熱瘡心躁皮膚焮疼枳殼散

方

枳殼

半兩 透小

甘草

半兩 炙

黃連

半兩 去鬚

右件藥搗細羅為散每服以蜜水調下半

錢

神巧萬全方同

量兒大小加減服之

治小兒熱毒瘡梔子膏方

梔子

壹兩 川升麻

壹兩 犀角屑

三分 蛇銜

一分 藍

藥

切五 生地黃

兩 黃芩

兩 黃芩

兩 黃芩

兩 黃芩

兩 黃芩

兩 黃芩

兩 黃芩

右件藥細剉以猪脂壹斤半同入鐺內於

微火上煎十餘沸濾去滓膏成於甕中

盛塗於故帛上貼之

治小兒熱瘡黃膿出黃芩膏方

黃芩

壹兩

黃蘗

三分

梔子

一分

黃連

三分

竹葉

二兩

生地黃

二兩

胡粉

三分

水銀

壹兩

胡粉同研

川大黃

壹兩

右件藥除水銀胡粉外並剉如豆大以新

絲裹用猪脂一斤半入鐺內於慢火上煎

十餘沸候藥色紫去絲以布絞取汁候凝

下水銀胡粉以柳木篋攪令勻膏成以甕

盛

盛塗於故帛上貼之

合盛日夜三四度塗之。○保童秘要熱瘡

黃腫出膿方淡竹葉黃茶各六分黃連一分龜子

各五分大黃四分黃藥胡粉各三分生地黄十分水

銀多不計右除水銀胡粉外餘重切如豆大

以新篩裏取成練了猪脂詳酌多少以慢

火與藥同煎候藥紫色卽濾去滓入盆中

下水銀胡粉以柳木槌子研勻候凝每日

三五度少少傅之夜亦然

又方黃藥壹兩白礬一兩燒令汁盡

右件藥搗細羅爲散傅於瘡上日三用之

又方黃連半兩去鬚爲末膩粉壹分

右件藥研令勻以甜菜汁和塗於瘡上口

三用之

又方右以豆豉炒乾搗末傅之

又方右以伏龍肝搗末用雞子白和塗之

治小兒疥諸方

夫小兒疥多生於手足指間染漸生於身體

癢痒有膿血汁出案九蟲論云蟻蟲多所變

化亦變作疥其瘡裏有細蟲亦甚難見小兒
多因乳養之人病疥而染著小兒也
治小兒疥癢痒搔之成瘡膿血不止宜用雄
黃膏方

雄黃壹兩雌黃壹兩烏頭壹枚去皮臍壹分松脂壹分

亂髮壹分

右件藥除雄黃雌黃外以鍊成猪脂壹斤
於鍋中煎下烏頭松脂亂髮等候烏頭色
黑亂髮消盡膏成篩濾去滓入雄黃雌黃

攪令勻盛於不津器中候冷塗瘡上日三
用之

治小兒疥癢痒不止蛇牀子散方

蛇牀子一分吳茱萸壹分鳳粉壹錢硫黃壹分蕪
荑壹分

右件藥搗細羅爲散入硫黃研勻用油壹
合葱青莖切入油內煎葱黃黑色去葱候
油冷調散塗之

治小兒疥徧身皆有痛痒不止蕪連散方

黃連二兩胡粉一兩吳茱萸壹兩赤小豆壹百粒

水銀二兩與胡粉點少水同研星盡

右件藥除胡粉水銀外搗羅為末入胡粉

水銀同研令勻以臘月猪脂和塗之亦治

癩瘡

治小兒疥及上身熱瘡並治之黃藥散方

黃藥壹兩黃連一兩赤小豆壹兩梟黃兩水

銀半兩硫黃一分與水銀兩結作沙子

右件藥搗羅為末與梟黃水銀砂子同研

令細用生油調日三塗之

治小兒胎中受風長後或身體生疥癢痒不

止梟黃膏方

梟黃一分硫黃一分葱白壹莖細切

右件藥研令細用清油一兩入銚子內熬

令熟下少許蠟及葱白次下硫黃梟黃攪

令勻膏成以蕘合中盛旋旋塗之

治小兒疥及諸般瘡洗浴苦參湯方

苦參半兩丹參半兩苦棟根半兩防風半兩去萌

擻根

三兩

右件藥細剉和勻以水一斗煎至五升濾去滓於密室中洗浴兒以故帛拭乾即塗前膏

治小兒疥痒不止方

硫黃

二兩

白礬灰

四兩

右件藥細研為散以烏麻油調如稀麪糊炙疥令熱薄塗摩之

治小兒疥痒痛不可忍方

消石

兩

右細研以生油調如膏每用時先以泔清洗之拭乾塗之

又方右取羊蹄草根搗末以猪脂和塗之

又方右用硫黃細研以醋調和塗之

又方右搗蛇牀子末以猪脂和塗之

治小兒癬諸方

夫小兒癬者由風邪與血氣相搏於皮膚之間不散變生癰疹上如粟大作暈或斜或圓

浸淫長大痒痛搔之有汁名之爲癬小兒面上生癬皮如甲錯起乾燥謂之乳癬言兒飲乳乳汁漬汚兒面變乃生之以乳汁洗之便差也

治小兒癬痒痛不止白礬膏方

白礬壹分 硫黃壹錢 膩粉壹錢 綠礬半錢 川大黃壹分

右件藥同研爲末以米醋壹升熬如黑飴收於甕器中旋取塗之

治小兒濕癬附子散方

附子半兩 去皮○ 聖雄黃壹分 白礬壹分 吳茱萸半分 總錄壹分 米粉半合 總錄半兩

右件藥搗細爲散每日三度以酥搵撲

治小兒癬久不差雄黃膏方

雄黃細研 多年薤根 白礬 藜蘆去蘆頭 瓜

帶胡粉各壹分 水銀三分 與胡粉點少 水同研令星子盡

右件藥搗羅爲末入胡粉水銀同研令勻用猪脂調爲膏輕搯塗之

治小兒癬不計乾濕癢痒不絕雌黃膏方

雌黃半兩黃連半兩蛇牀子半兩黃藥半兩

蕪荑半兩藜蘆半兩消石半兩莽草半兩苦參

半兩兩松脂三兩杏仁一兩湯浸去皮別研如膏

右件藥搗細羅為散以臘月猪脂半斤和

松脂煎令鎔先下杏人次下諸藥攪令勻

煎成膏收於不津器中用時先以泔清淨

洗瘡拭乾塗於故帛上貼日二換之○聖

濟總錄治小兒癩癬風痒雌黃研黃連去

莽草蛇牀子炒黃藥去麁皮炙苦參蕪荑炒

藜蘆消石研各壹分松脂二兩杏仁湯浸去皮尖

研如膏右一十壹味除雌黃松脂杏仁外

搗羅為末取臘月猪脂半斤和脂入鍋中

煎令沸下杏仁次下諸藥末攪勻凝為膏

每用先以醋泔洗拭乾塗之日三

又方羊蹄根壹兩乾笋壹兩燒灰

右件藥搗羅為末以麻油調塗

治小兒久癩方

獨蓄根去土一把附子二枚去皮

右件藥搗令爛以好酒和塗之每塗藥時

先以皂荚湯淨洗拭乾後用藥日二塗之

治小兒乾癬方

水銀半兩胡粉壹兩

右件藥點少水同研令星盡以鷄冠血和

塗之

治小兒乾濕癬方

聖濟總錄名雄黃散

雄黃壹分麝香壹錢○總錄各壹分

右件藥細研用甲煎油調塗之

總錄乾再上

又方右取乾蟾燒灰細研以猪脂和塗之

治小兒癬久不差方

黃礬壹兩燒灰

又右細研每用先以水淨洗拭乾塗之

又方右以薤根搗醋和塗之

又方右以醬瓣雀糞相和研塗之

又方右取羊蹄草根爛搗以蜜和絞取汁先

指破壅之○聖濟總錄治小兒諸癬及瘙

痒痒蹄根搗取右一味以蜜和勻先刮瘡

四邊以藥塗之半日許拭去更以陳米醋

和羊蹄根搗碎傅瘡上

又方右以楮樹白汁塗之

又方右取亂髮燒灰細研以猪脂和塗之

治小兒痲瘡諸方

夫小兒痲瘡者由風濕搏於血氣所成多著手足節腕間匝匝然搔之痒痛浸淫呼之為痲以其瘡有細蟲如痲蟲故也

治小兒痲瘡及濕癬蛇牀子散方

蛇牀子壹分附子壹分雄黃一分吳茱萸壹分

紫參壹分

右件藥搗細羅為散傅瘡上日三用之

治小兒痲瘡痒痛螺殼散方

螺殼青兩爛者亂髮半兩龍膽末半兩胡粉半兩

右件藥細研為散以油脚調塗之

治小兒痲瘡及疥癬惡瘡水銀膏方

水銀壹兩白礬兩蛇牀子兩黃連壹兩

右件藥除水銀外搗羅爲末以臘月猪脂
七兩入水銀和研以不見水銀膏成傅瘡
神効

治小兒濕癩瘡方

胡鷲窠

膏枚取大寬抱
子處餘處不用

右搗細羅爲散每使時先以水煎甘草入
塩少許作湯溫溫淨洗瘡拭乾以散傅之
三兩上便差若患惡刺以醋和用帛裹之
日三易當愈

治小兒癩瘡及疥癬方

苦參 三兩

右件藥搗羅爲末以蜜和塗之

治小兒乾癩濕癩疥癬方

右取棟根皮葱白

搗如膏以猪脂和塗

治小兒久癩瘡及疥瘡內黃冰汁

方右取

羊蹄草根爛搗以白蜜相和絞取汁塗之

治小兒癩瘡方右取桃葉爛搗以醋和傅之

大小兒爛瘡者由風起熱毒之氣所傷客於皮膚生爛漿而潰成瘡故名之爛瘡者也

治小兒爛瘡梔子膏方

梔子人半川升麻兩犀角屑兩蛇衝分三藍

藥兩生地黄兩黃芩兩川大黃兩

右件藥細剉以猪脂壹斤桐於鍋內以微

火煎令藥色變摭去滓以瓷合盛候冷塗

之

又方水銀兩膩粉一分與水銀於手松脂兩

士蜂房兩黃蘗兩川大黃兩

右件藥擣羅為末以鍊成猪脂壹斤與藥

末同入錯內慢火熬令稀稠得所將水銀

末膩粉入膏中攪令勻膏成以瓷合盛候冷

塗之不過三五七差

治小兒頭上爛漿起如釘蓋壹兩日後面上

及背皆生瘡口用朱砂膏方

朱砂兩胡粉兩水銀兩

右件藥點少水都研冷水銀星盡以臘月

猪脂三兩入銚子內慢火上鎔化去滓入

朱砂等□□□膏以堯合盛候冷塗之

差

又方右燒鑊鐵水中淬二七遍以淬水洗之

塗治小兒漆瘡諸方

夫人無問男女大小有稟性不耐漆者凡是

見漆及新漆器便著漆毒令頭面身體腫起

癰疹色赤生瘡痒痛者是也

治小兒漆瘡四肢壯熱驚蕪散方

藍葉半兩 麥門冬半兩 川升麻半兩 犀角屑三分

木通半兩 茯神半兩 馬牙消三分 甘草半兩 微赤到

右俵藥搗羅為散每服壹錢以水煎小

為煎至五分去滓放溫量兒大小分減服

又之垂側外

又方

木通三分 川升麻三分 川大黃三分 桑根

白皮三分 木防已三分 川朴消三分

右俵藥搗羅為散每服壹錢以水煎小

蓋煎至五分去滓放溫量兒大小分減服之○保童秘要通草小麻大黃桑皮木防

分各書朴消分右以水五升煎取二升半

夫滓壹歲兒壹日連夜服壹合

又方垂柳枝五兩苦參二兩黃連壹兩去鬚

右件藥細剉以水三升煎至半升去滓入

黑末壹合攪令勻熬成膏以麝合盛候冷

塗於瘡上

又方右濃煎蔓菁湯看冷熱洗之

又方右川芒消細研擣七菰草汁和塗之

又方右取蟹二枚保童秘要五枚生者爛擣以水二

合內絞取汁塗之

又方右糯米嚼令爛塗之

又方右濃煮柳葉湯看冷熱洗之

又方右茅香漬汁頻洗之

又方右小麥麴擣末以雞子白和塗之

又方右羊乳汁塗之

又方右濃煎荷葉湯看冷熱頻洗之

又方右以磨刀石下泥塗之
又方右貫衆搗末以生油調塗之

又方右以猪脂塗之
又方右以馬尿洗之

又方右薤白生搗如泥塗之煮汁洗之亦佳
又方右濃煎黃蘗湯看冷熱洗之

又方右以茱子油塗之
又方右濃煎新糜蒂湯看冷熱洗之

又方右搗菹汁塗之

又治小兒魚臍瘡諸方

夫小兒魚臍瘡者此瘡頭黑深破之黃水出
四畔浮癢起狹長似魚臍故謂之魚臍瘡

也

治小兒魚臍瘡方

蛇蛭皮一枚 鷄子一枚

右件藥以水壹大盞煎蛇皮至五分去滓

入鷄子清攪令勻更煎三兩沸放溫量兒

大小分減服之

又方芫花根二兩猪牙皂莢五挺黑豆三分白礬

三兩燒令細判汁盡細研

右件藥用醋七升先浸芫花根及皂莢煎

豆三日於釜中以文火煎至二升去滓後

却於別鍋中煎至壹升入白礬灰攪令勻

膏成以堯合盛攤於故帛上貼

又方右臘月猪脂并髓以鷄子清調令勻塗

又方右寒食乾餈燒灰細研傅之

又方右白蒿苣擣絞取汁先以針刺瘡上及

四畔滴汁於瘡中即差

又方右蛇蛻灰燒灰細研以雞子清調塗之

又方右當瘡上切大蒜片子貼定以艾炙二

七壯逐壯換蒜炙畢研豆豉厚菴定効

治小兒疔巢比病源音旺爛瘡諸疔塗之日三

夫小兒疔疔有熱熱熏皮膚外為濕氣所乘

則變生瘡其熱偏盛者其瘡發勢亦速初生

如麻子須與王夫汁流潰爛如湯火所灼故

名疔爛瘡也

治小兒王爛瘡壹身盡有如麻子有膿汁乍痛乍痒或時壯熱赤芍藥散方

赤芍藥三分甘草三分白飲三分黃芩兩黃連兩

去去黃藥兩微炙

右件藥搗細羅為散以蜜水調塗之日三

四上差

治小兒王爛瘡及惡瘡秫米散方

秫米等竹篠等

右件藥燒灰細研為散以田中禾下水調

塗之立効

治小兒王爛瘡初患壹日肉色變二日胞漿

出或四畔時赤漸長若胞漿匝身即不可療

其狀如湯火燒宜速用黃連散方

黃連末壹兩胡粉一兩

又右件藥細研令勻以生油調如膏塗之

治小兒王爛瘡初起胞漿似火燒瘡宜用此

方

桃人湯浸去皮

右搗令爛以面脂和塗之

又方右以艾燒灰傳之如瘡乾即以生油調

塗之

又方右取十字街上出井釜下黄土細研傳

之其良

又方右以牛糞燒灰細研傳之

又方右吳茱萸酒煎汁塗之

又方右赤地利搗末以酥和塗之

治小兒浸淫瘡諸方

夫小兒五藏有熱熏發皮膚為風濕所折濕熱相搏身體發瘡初出甚小後有膿汁浸淫漸大故謂之浸淫瘡也

治小兒浸淫瘡漸展不止苦瓠散方

苦瓠 一兩○拔 蛇蛻皮 半兩 露蜂房 半兩

樛上塵 壹合

又右件藥搗細羅為散以生油調塗故帛上

貼之

又方鯽魚 一枚長 豆鼓 三寸者

右件藥搗如膏塗之亦療馬鞍瘡若或先起四肢漸向頭面者難治也

又方右以雞冠血塗之

又方右煎鯽魚膏塗之

又方右以生鯽魚薄切大片和搗貼之

又方右取胡鷲窠燒灰以水和塗之

治小兒疣目諸方

夫小兒疣目者由附著肉生如麥豆大與肉色無異俗謂之疣子即疣目也亦有二數箇

相聚而生者割破裏狀如筋而強微有血而續後又生此多出風邪客於皮膚血氣變化所成故亦有藥治之亦有法術治之而並得差此疾多生於手足也
治小兒疣目方

桑柴灰

四升以湯淋取汁入

附子 二枚去皮臍生

用礶砂

壹分糯米

五十粒

研入 附子 少許 煎之

右件藥搗羅為末入煎內調冷勻每取少許點疣目上即自落兼治黑痣

又方桑皮灰各三艾灰各三

右件藥以外五升淋之又重淋三遍以五

色帛內汁中合煎令消點少許於疣目上

則爛脫矣

又方糯米五拾

布於濕石灰裏埋之以爛為度用針撥破

疣目傳之經宿自落

又方右礬黃細研以醋調塗疣目上六七度

又方右松脂栢脂擣末以石灰汁調點少許

於疣上自落

又方右七月七日以大豆壹合搗疣上三遍

即令病人自種豆於南屋東頭第二流中

豆生四葉以熱湯沃之差

又方右石灰以醋漬六七日取汁點疣上小

則作瘡即落

又方右以蜘蛛絲纏疣目即落

又方右以杏人燒令黑研膏塗之

又方右以牛涎數數塗疣上自落

治小兒夏月痲瘡諸方

夫盛夏之月小兒膚腠開易傷風熱風熱毒氣搏於皮膚則生痲瘡其狀如湯之潑輕者匝匝如粟粒重者熱浸漬成瘡因以為名世呼為痲子也

治小兒痲子磨破成瘡疼痛宜用止痛生肌

赤石脂散方

赤石脂半兩黃蘗半兩白麵二兩蠟兩茶末半兩

龍腦一分

右件藥同研冷勻每用絲搨撲於瘡上以差為度

治小兒夏月痲瘡及熱瘡葛粉散方

葛粉三兩甘草壹兩石灰壹兩

右件藥搗羅為末以絲搨撲於瘡上以差

為度

治小兒體熱痲瘡滑石散方

滑石末三兩白礬灰壹兩棗葉四兩

右件藥搗羅為末先以溫漿水洗瘡後取

藥傅之即差

又方英粉五兩白竜腦壹錢

右件藥細研先用棗葉湯洗後以散撲

治小兒癩瘡熱破痛不止方

乾藕節末二兩生油麻三合

右件藥先搗油麻如膏後下藕節末和別

入生蜜調稀稠得所塗於瘡上不過三五

度差

治小兒凍爛瘡諸方

夫小兒冬月為寒氣傷於肌膚寒搏於血氣
血氣壅澁因即生瘡亦焮腫而難差乃至皮
肉爛謂之凍爛瘡也

治小兒凍耳或瘡或痒或痛黃藥散方得効方醫

方集成南北經驗方袖珍方名白歛散

黃藥聖藥總錄去白歛各半兩

右件藥擣細羅為散先用湯洗瘡後以生

油總錄調塗之衛生易簡方同

治小兒凍脚成瘡或痒或痛宜用此方聖濟總錄

名小
麥湯

小麥半握 穰草三握 ○
總錄判

右件藥用醋壹升水二升同煮至二升去滓溫如人體洗兩脚夜間頻洗之効

治小兒凍手皴裂成瘡白歛散方

白歛末三分 ○聖白及 末半生油 麻二升

右件藥同研令勻更用蒸蘿蔔一箇爛研

壹處以酒調似稀膏先以童子小便洗淨

便塗之効

治小兒伐指諸方

夫小兒伐指者其指先腫焮焮熱痛其色不黯然後方始爪甲結膿劇者爪甲脫也亦名伐甲亦名糟指亦名土竈夫爪筋之餘也由筋骨熱盛氣滯不通故結腫生膿而爪甲脫也

治小兒伐指腫痛方

麻黃三兩

右搗碎以水二碗煎至壹碗乘熱略蘸在

其中日十餘度

又方右以猪脂和曲蟾研傅之數易之

又方右取梅核中人熟搗以淳苦酒和傅之

以差即止

又方右取梁米粉鐵鑊中熬令赤以眾人唾

和之塗上令厚壹寸即消

又方右以小便和搗作泥厚裹之數易即差

更用鑱針刺血出最妙

治小兒手足皸裂諸方

夫小兒肌膚軟弱冬時解脫觸冒風寒手足
肌肉破故謂之皸裂也

治小兒手足被凍皸裂欲脫方

川椒兩半芎藭兩半白芷壹分防風壹分乾薑壹分

右件藥搗碎以水一大盞煎令濃去滓稍

熱數用塗之

治小兒指凍傷皸裂腫痛欲隨方

馬糞十枚

右以水三升煮令沸看冷暖浸之冷即再

煖用之半日常愈

治小兒入水手足皴裂腫痛血出方右用生

胡麻爛搗塗之

又方猪脰壹具細切

右以棗酒一盞浸一宿每用洗之

又方右以棗煮取肉研細傅之一宿後用甘

草湯洗即差

治小兒脚瘰諸方

夫小兒脚瘰者是小兒肉嫩外風令中於是

掌中涌泉穴也兒是脚上皮膚間血氣與風

邪相感便肉硬血氣不通陽氣不達致使然

也

治小兒脚瘰腫硬疼痛宜用淋醮方

又川椒二指雨

右以清酒五升煎取三升頻頻醮之候冷

即住其藥重煖可五七度用之○保童秘

要蜀椒五指二右以清酒五升煎取二升

數數醮之每一粒藥可使得五六日不可

便棄之

又方附子

□兩○保童秘要二枚生用

乾薑

二兩○保童秘要二枚

右件藥搗羅為末入於絛中裝襪與兒著

也

又方右用猪脂日三二度塗之○保童秘要

如有瘡即濃熬臘脂塗之

治小兒陰瘡諸方

夫小兒下膺有熱則熱氣衝陰陰頭忽腫便溺不得乃至生瘡俗云因尿灰火所為也

治小兒陰瘡及腫方

黃連

半兩去鬚胡粉半

右件藥搗細羅為散以面脂調塗之

又方白礬灰

青胡粉微炒

右件藥同研令勻細用槐枝煎汁調塗兒

陰囊上

治小兒陰瘡不差方

貓兒骨

燒灰

右細研小調傅之

又方右以狼骨濃煎汁洗之

又方右以白犬骨燒灰細研水調傅之

又方右以狐陰莖炙微黃搗羅爲末以水調傅之

又方右燒犬糞灰傅之

又方右取蔓菁根搗研傅之

又方右取馬骨燒灰研如粉傅之

又方右以雄雀糞以陳醬汁和傅之

和劑局方

拔毒散治小兒丹毒肉色變異或着四肢或
胷背遊走不定炊熱疼痛拔毒消腫散熱定
疼

石膏三兩寒水石七兩甘草一兩黃蘗壹兩

右爲細末每用水調時復以雞翎刷掃以

芭蕉自然汁調妙

小兒藥譜直訣

命華散治小兒一切濕疥癬瘡等

黃蘗 黃連 各半兩並 黃丹 壹兩 輕粉 壹錢

爲細末

麝香

壹字研

右同研勻先以溫水洗後貼之

大令本草

子母秘錄治小兒頭瘡梁上塵和油取餅下

滓以皂莢湯洗後塗上

子母秘錄小兒耳後月蝕瘡末黃連傅之

又方小兒鼻下兩道赤者名曰蠶亦名赤鼻

疳鼻以米泔洗傅黃連末日三四度佳

陳藏器云馬藻搗傅小兒赤白遊癩火焮熱

瘡搗絞汁服去暴熱熱痢止渴

子母秘錄治小兒蓐瘡嚼澤蘭心封上

子母秘錄治小兒白禿葶藶末以湯洗訖

塗上

子母秘錄治小兒赤遊行於上下至心卽死

檣芭蕉根汁煎塗之

宮氣方治小兒口瘡角蒿灰貼瘡妙

子母秘錄治小兒卒腹皮青黑赤不能喘息

卽急用此方并治吐痢卒死用女青末內

口中酒服亦治大人

外臺秘要治小兒面及身上生瘡如水燒赤

地利擣末粉之良

圖經曰小兒白禿髮不生榆皮擣末苦酒調

塗之

千母祕錄小兒頭瘡耳上生瘡竹葉燒末和

猪脂塗上又以雞子白傅之亦妙

兵部手集小兒火灼瘡一名癩漿瘡一名火

爛瘡用酒煎茱萸拭上効

經驗方孩子熱瘡亂髮壹團梨許大鷄子黃

煮熟二物相和於銚子內炭火上熬初甚

乾少填髮焦遂有液出旋取置青瓷盞中

以液盡爲度取此液傅熱瘡上卽以苦參

粉粉之子在朗州生子在於蓐中便有熱

瘡出於臂腿間初以他藥傅無益加劇蔓

延半身狀候至重晝夜啼號不乳不睡予

閱本草見髮髮云合鷄子黃煎之消爲水

治小兒驚熱注云今俗中姬母爲小兒作

雞子煎用髮雜熬良久得汁令小兒服去
痰熱治百病凡用髮皆取梳頭亂者又檢
雞子云治火瘡因而用之果驗已後用之
無不差矣

小兒患赤白遊腫蝦蟇碎傅之

孟詵云小兒腦熱蚘蛇膽汁漬注鼻中

子母祕錄治小兒頭而身上生諸瘡蛇蛻燒

末和猪脂傅上

子母祕錄小兒瘡初起臛漿似火瘡壹各爛

瘡杵桃仁面脂傅上

又方小兒濕癬桃樹青皮爲末和醋傅上

白油麻生嚼傅小兒頭上諸瘡良外食抽人

脂肉

子母錄祕治小兒湯火瘡水者大瓦汁塗也

易差無斑

又方治小兒尿灰瘡黑豆皮熟嚼傅之

藥性論云赤小豆生小兒急黃爛瘡取汁冷

洗之不過三五度藥能令人養食本與鷄子

白調塗熱毒癰腫差通氣建脾胃與錄
半升秘錄小兒瘡疥燒麥根末傳述
五指小兒方

以瘡癰治

漏瘡方鍊成松脂末并髮灰生虢丹填傅得效

同方

諸瘡久不瘥方白膠香半兩碾末輕粉貳錢
研和猪脂調傅或猪筒骨髓調白膠亦治
大風卽是松脂鎔凍投冷水中爲末水調

空心常服

瘰癧方治卒得瘰癧赤爛牛糞燒灰研細傅

得效

魚臍瘡方瘡頭黑深破之黃水出四畔浮漿

蛇退皮燒存性細研鷄子清調傅得效

蠟螻瘡方燕窠土研細猪脂調傅得效

癬方水銀膏分胡粉二分水研入雞冠血傅

得效

前甲散得效方名治小兒眉叢中生瘡名曰

鍊銀癬穿山甲前膊鱗炙焦為細末麻油
輕粉調傅

宋氏集驗方
防風散治小兒身瘡

防風 大粉草 各壹錢半 川芎 刺茶 牛蒡

子連翹 各壹錢 右為細末每服二錢水壹盞煎五分空心

服風丹加薄荷下 又方以連翹煎下四君子湯

修月魯般繼後錄
治小兒流膿瘡

平搗散末 松香 干漆 煨蛤 合煎出

取右二味和勻清油調伏洗淨瘡付其
保童秘要 項頰及體育背赤腫方

升麻 八生地黄 十二犀角屑 夜下 黃

枳殼 梔子 藥女萎 五葶子 皮 芍藥 欒

羊角 大黃 黃蘗 黃蘗 分

分

分

分

分

分

分

分

分

右並細剉藤裏取成鍊子猪脂詳酌多少
以慢火與藥同煎候藥紫色即取出濾去
滓放冷用摩腫處

取腋脣頰上赤引諸方

夫赤引者或於頰上或近口傍其向下皮赤
如塗烟脂向上皮即疾剝漸漸引去此是心
熱血凝所為宜以小刀子鋒頭鎌破令血出
用此藥塗之

雄黃 蚺蛇膽

吳白礬

各壹分

礪沙

壹分 莢子

大杏仁

七枚

茵草

半分燒

麝香

壹分

右為末更細研每用詳酌多少以蘇調薄
薄塗於瘡上日三度塗之

又方竹茹

壹雞子大

麻黃

半分

枳殼

一片

丹蔘

黃芩

葛根

各壹分

右以水五大合煎取二合半去滓壹歲兒
壹日與壹合服之

腿上及坐處血諸疽方

夫小兒腿上但有赤色如烟脂漸引或如錢

大或手掌大皮膚光緊此名血疽因心熱所致然也緣心主血血得熱即凝聚不散其治宜用此方

黃蒿穗

不計多少

右穠煎取湯入塩少許於無風處洗之

又方黃蒿子

不計多少

右爲末以生油調塗之

又方白礬

不計多少

右爲末以生油調塗之

又方石灰

不計多少

右炒令極熱即以水沃之澄取清者日三度傅之

又方宜以力子鋒鎌令惡血出以白礬湯洗之

又方米粉

分蘇合

右熟調每日三度塗之

又方嚼生杏仁并塩塗之

又方雄黃

武都爲上降礬各壹分

右爲末以蘇調塗之

濕癬方

附子生用雄黃 降麝 吳茱萸各壹分 米粉

合半

右爲末每日三度以絛撲之

乾癬方

巴荳去皮斑猫各壹枚

右爲末取好口脂調每日三度薄薄塗之

風瘡諸方

夫風瘡者身上或如麻子或如豆大亂生多痒是也宜服此方

烏蛇去鱗炙者各一分麻黃去節防風各壹分枳

殼壹片朴消三分桂心半分

右以水五合煎取二合去滓下朴消壹歲

見一日一夜與服盡

又方鴿糞 赤小豆各二分吳茱萸生用皂莢生用

葶藶生用白礬各壹分藜蘆半分

右爲末先以湯洗瘡後用生油調此藥薄

薄塗之

皮膚風瘡諸方

凡小兒身上生小碎瘡子中有黃水或痒並是客風中於皮膚復因肉熱所致宜以此方洗之

垂柳壹枚 白礬四杏

右以清水五大升煎取二升半去滓於無

風處洗之

又方吳茱萸二分 蕪荑三分 蘆葶子五分 白礬半分

右為末以麻油調於瘡上薄薄塗之

又方雄黃 白礬 井塩各一分 茵草半分

右為末以麻油并酒調塗之

又方苦參 斑猶各半 葶藶草五分 芭荳半分

右以水五升煎取二升去滓逐日以少少於瘡上塗之勿近口眼

一切瘰腫不問有膿無膿發作壯熱並宜服

五香丹方

青木香一分 麝香半分 沉香一分 蘇合香 雞舌

香各三犀角屑分十吳藍菜黃連梔子

當歸甘草防風黃耆黃芩六分芍

藥仁蓼升麻各四分大黃六分芭豆九枚去

尖以油熬令紫色以紙裹於
灰中裏晝日去油熟研如泥

右並為末後入芭豆研勻以蜜為丸如梧

子大一歲兒每服二丸溫水研化下

燻毒瘡諸方

梔子仁蛇疔各五分犀角三分升麻四分生地

黃黃芩各八分青蘆葉五合切取

右細切如豆以絲裹取成鍊了猪脂詳酌

多少川慢火煎三上三下候藥色紫即取

日出去滓放冷每用以少許塗腫處

余鐵傷血不止方以酒調研而不用

東石灰壹大雞子筒一

又右破雞子兼黃與石灰相和溲作餅燒之

又令煙絕搗作末細羅日三四度摩之

漆毒諸方

垂柳枝五苦蔘二黃蓮壹黑荳末壹

右以水五升煎取壹升半下豈末勻攪候
成取出每用少許塗之

又方以冷水淋之令冷激三四次

又方以冷水浸消石熨之切不宜喫酒麵

東垣試効方

柴胡通經湯治小兒項側有瘡堅而不潰名

曰馬刀

柴胡二分連翹二分當歸尾二分紅花少黃連五分

黃芩二分生甘草二分黍粘子二分桔梗二分京三

稜二分

右件咬咀麻豆大都作壹服水二大盞煎

至壹盞去滓稍熱服食後忌苦藥泄大便

王機微
義同

得効方

瘡毒

平血飲合和敗毒散治諸般瘡毒生薑薄荷

生乾地黃麥門冬去心煎服方見大方科
諸瘡門及傷

寒
門

犀角消毒飲治同前

五福化毒丹小牛黃圓小圓服治同上方見

及大方科
諸瘡門

角無辜瘡毒右用黃連大柏為末芭蕉汁調
敷角留口搽瘡加輕粉有汁加黃丹煨麝
香各少許和勻乾糝

諸般惡瘡

土藜蘂取皮焙乾為末別研入不夾石雄黃大輕粉

水粉 蚌粉

右和勻先用鯽魚壹箇入真清油內煎候

熟去魚以油攤冷調藥傅瘡三日後以葱

湯遍身洗浴所穿衣服並脫去洗淨乳每

仍忌油膩肥汁紅酒煎炙及熱物等立效

癬瘡用真米醋調傅立效

濕癬瘡方右川蛇床子為末先以韭菜根煎

湯洗次用鴈月猪脂調藥傅之醫方大成
南北經驗

方袖珍方術
生易簡方同○聖濟總錄治小兒諸癬及

瘙痒蛇狀子散方蛇狀子炒二右一味搗

羅為散以豬白膏和傅之

三物散治鬢邊生軟癩名發鬢有數年不愈者此極妙

豬頸上毛 貓頸上毛 各壹撮 鼠屎 壹粒

右為末清油調傅或加輕粉尤妙

生附散治凍爛脚成瘡

生附子 半個去 皮臍

右為末麵水調貼之即愈 醫方大成集成 南北經驗方袖

珍方衛生 易簡方同

陰瘡方治陰股間汁出先痒後痛愈後復發

及陰囊生瘡以火炙瘡抓去痂令乾以蜜

傅却搜麵作燒餅炙熟以餛飩糖塗在餅上

乘熱熨之冷則再炙再熨三五度為妙

胎毒瘡方治壹歲至十歲內滿頭及遍身生

瘡皆因在胎中父母恣情交合所致名曰

胎蛆經久不瘳先用化毒丹消毒飲服却

用采小便以鴨翎刷洗上土毒黛為細末

乾糝效

疣自瘡方治遍身如魚目無膿又名正虜瘡
川并麻剉散煎百壹沸入蜜半匙以磁
器盛鵝翎蘸拭瘡上此藥世間新舊如味
藥軟瘡山紙中文曰治瘡交合此藥世間
猪頭散治軟瘡愈而再作用野蜂房壹二箇
燒灰存性以巴豆三七粒去殼煎清油三
白沸去巴豆以油調藥敷並效自礬粘為
末清油調傅亦效此藥有驗人以猪頭為
謝遂名之

又方大枳殼壹枚去穰令空地上磨令口平
以稠麪糊搽四唇露在瘡上自破膿溜出
盡更無般痕

又方治軟瘡屢安再作者右用桑螵消燒炙
存性以清油調傅此藥世間新舊如味
又方鷄抱卵殼燒灰存性為末入輕粉少許
清油調傅此物難得只以雞子抱退殼如
上法用亦可

歛瘡口方

白及 赤石脂 各壹錢 研 當歸 三錢 去蘆 龍骨 少許 研

右為細末乾糝

肘後方 治一切瘡毒及一切瘡毒

若身面卒生諸惡瘡燒蛇皮猪膏和傅之又

燂鷄子殼猪膏和傅之許又熬豉末傅之

又黃連胡粉水銀末傅之瘡乾則和猪膏

傅之又煮竹笋汁洗之

若身有惡熱氣數起瘡者熬豉令黃末傅之

兼數煮桃葉浴之

治小兒風瘡久不差燒菰蔣節末以傅之

治小兒凍瘡用雀兒腦髓塗之立差

簡要濟眾治小兒浸淫瘡疼痛不可忍發寒

熱刺刺末新水調傅瘡上乾即易之器內

外毒祕要治小兒初得月無瘡五須蝦蟆蟻

杵末猪膏和傅之

衛生寶鑑

瀝青膏治小兒粘瘡一各與散火膏每日

黃蠟末 溼青 各三錢 圓茶子 黃丹 各三錢

右為末小油三兩熬搽不須洗
千金膏治鵝姑如神一名螻姑又治多日諸般惡瘡

瘰癧青四兩黃蠟三兩散綠三錢

先用小油三兩熬溫以瘰癧青黃蠟化開攪勻入散綠取下火攪勻濾入水中磁器內收之每用時將藥入水捻作餅於絛絲上貼之

軟青膏治一切風熱瘡又治小兒頭瘡

歷青 黃蠟 脂麻油 各十 巴豆十

右先將歷青麻油黃蠟熬成汁次入巴豆不住手攪候巴豆焦黑去巴豆不用次入膩粉二錢再攪極勻放冷傅瘡上神良

羊蹄散治小兒頑癬久不差

白礬半兩羊蹄根四兩

右二味爛研入米醋小半錢同搽不住搽之候覺癬極痒至痛即止隔日洗去再搽

小兒大腸得惡瘡癰熱右以羌嶼杵絞取汁
傳其瘡上即安

聖濟總錄 凡人水腫小兒癰疽

小兒癰瘡

經謂六府不和則留結為癰蓋小兒榮衛不
澀不得通利逆於肉理致肌肉腫結皮薄而
澤是癰之狀也癰既不得內消則膿潰穿穴
而成瘡故謂癰瘡也

治小兒癰腫成瘡犀角湯方

犀角屑 葵藿 升麻 甘草 麥門冬

去心 焙二 末芍藥 薑芫 以玄參 附錄

右末味籠搗篩每服壹錢匕水半盞煎

四分更入消石末壹字匕再煎鎔去滓溫

服量兒大小加減薑棗甘草木香

治小兒癰瘡藏府壅熱心神煩躁大小便不

利大黃湯方 大黃 枳實 芍藥 甘草

大黃 枳實 枳殼 枳實 枳殼 枳實 枳殼

炒黃耆 枳實 枳殼 枳實 枳殼 枳實 枳殼

右六味龍骨節每服一錢匕水七分煎四分去滓溫服量兒大小加減

治小兒癰瘡煩熱疼痛黃芩湯方

黃芩去心 黑梔子人 玄參 升麻 小大黃

炒黃耆 劉連翹 藍葉 甘草 木香

芎藭 犀角屑各半 山豆根 大黃

右壹十二味麝香節每服壹錢匕水半盞

煎三分去滓溫服量兒大小加減

治小兒一切癰腫毒諸風熱神驗黃藥散方

黃藥去麩 破節金各壹 陳梅皮湯浸 人

參 葛根劉各 一匙 小大黃

右五味搗羅為散用溫水調下半錢匕量

兒大小加減日三兩服

治小兒癰瘡腫痛方右用薑石末和蒜搗封

去方右用人乳和麩封上至晚膿血出盡

小兒疔瘡

小兒因五藏不和寒邪壅滯榮衛閉塞逆於
膚肉遂生疔腫其狀腫結液強其如牛領然

癩癧

癩癧

癩癧堅韌深附筋骨既得膿後其癩可愈更須用排膿換肌之藥若餘毒未去封斂稍疾則源流復至或痒或痛肌汁不斷瘡窠不得全矣

治小兒癩疽瘡癰腫毒黃者湯方

黃耆判連翹判升麻判惡實判玄參判

丹參判露蜂房判枳殼判甘草判

右九味羅搗篩每服一錢匕水七分煎至

四分去滓食後臨臥溫服量大小加減人

治小兒疽瘡藍葉湯方

吳藍葉判犀角判升麻判黃耆判山梔子判

人參判連翹判甘草判黃芩判大青判

右一十一味羅搗篩每服一錢匕水七分

煎至四分去滓食後臨臥溫服量兒大小

加減

治小兒疽瘡木通湯方

木通判升麻判赤芍藥判黃芩判山梔子判

木通判升麻判赤芍藥判黃芩判山梔子判

子人 麥門冬 去心焙 犀角 鎊 大黃 剉炒

兩枳殼 去瓢炒

右九味麤擣篩每二錢匕水一盞入生地黃汁半合同煎至七分去滓分溫三服食後臨卧服量大小加減

治小兒瘡腫癰疽黃耆湯方

黃耆 剉 葛根 剉 麥門冬 去心焙 黃芩 去黑心 犀

角 鎊 升麻 甘草 炙各兩 木香 半兩

右八味麤擣篩每服一錢匕水七分煎至

四分去滓食後服量大小加減

治小兒癰疽犀角知母湯方

犀角 鎊 知母 焙 黃耆 剉 黃芩 去黑心 人參

丹參 葛根 剉 大黃 剉炒 甘草 炙各兩 玄參 三分

麥門冬 去心焙

右一十一味麤擣篩每服一錢匕水半盞

入生地黃汁半合同煎至四分去滓食後

臨卧溫服量大小加減

治小兒癰疽癩毒未破或膿未潰憎寒壯熱

五香丸方

木香壹分沉香壹分蘇合香三分麝香研半犀

角鎊二兩大黃生剉壹兩半鷄舌香研吳藍葉

梔子人一熟乾地黄二兩白芍藥壹兩人參壹兩

去蘆白茯苓兩

右一十三味罽羅為末鍊蜜和丸如梧桐

子大每服二十九煎黃耆湯下食前服

又方乾蝦蟆壹箇

右壹味燒灰細研以豬脂和傅之

又方敗鼓皮不以多燒灰以壹其正日帝射穿

右壹味細研以豬脂和傅之

治小兒瘰癧結核

小兒身生熱瘡久不瘥者必生瘰癧其狀作

結核在皮肉間三兩箇相連瘰也是風邪搏

於血氣焮結所生也

治小兒頸生瘰癧榆白皮傅方有以榆白皮

爛搗如泥封頸上頻易

治小兒瘰癧鈇丹塗方

右三味先研二味為粉次入松脂鎔化攪
令勻更博薑二百杵作餅熱貼在凍瘡上
藥力盡別換以差為度

治小兒腦熱結瘰癧連兩耳下腫痛身體寒
熱坐卧不安食飲不下玄參膏方

玄參 紫葛 黃藥子 大黃剉炒 木香令黃

卷栢 芩消 紫檀香各一兩

右八味搗羅為細末以雞子白調和稀稠
得所塗於瘡上猪腫破時則去芒消塗之

治小兒瘰癧結核寒熱防風丸方

防風法蘆頭 連翹 桑根白皮 牡丹皮

白頭翁 葶藶法蘆頭 破鼓法蘆頭 獨活法蘆頭

秦苑法蘆頭 海藻法蘆頭 小豆壹十味搗羅為細末鍊蜜和煉麻子大

每服三丸米飲下早晨日晚各壹服更量

兒大小加減

治小兒熱毒風腫瘰癧內消赤小豆散方

赤小豆 猪牙白莢炙去黑皮 黃藥子 消

小兒疔瘡木髓子 去殼各 藥干

右六味搗為散每用鼻瘡大小以不語津

唾調塗乾即易以差為度

小兒惡瘡不早 宜

小兒氣血純陽肌肉柔脆風毒邪熱易致

傷老榮氣不從逆於肉理結成悍毒疼痛腫

焮非常名惡瘡其候或痒或痛或赤根懸

肉鞭不作膿或穿穴作膿久不得差治法隨

內外證療之則瘡可愈

治小兒惡瘡鈆丹膏方

鈆丹十 風化石灰各壹 豬脂斤

右三味將二味同研細以豬脂按作餅火

燒通亦如此五度藥成擣羅為末濕瘡乾

點如乾瘡即作膏用豬脂調紙上貼

治小兒惡瘡大黃湯洗方

大黃生 黃連去 黃芩去 澤蘭 白礬枯

石南兩 戎鹽壹 蛇牀子 炒三

右八味搗篩每以二兩用水三升煮取

三升去滓適寒温以繇絮內湯中蘸洗之

日三

治小兒惡瘡茵芋湯浴方

茵芋煮兩甘草判

苦參各三兩

細辛去苗葉

黃連

去須各二十枚 麩人去皮

右六味麩搗篩每以三兩用水五升浸汁

煮取三升去滓浴兒逐日用

治小兒惡瘡人所不能識者胡粉散方

胡粉

炒令黃色五兩

黃連

去須

黃蘗

去麤皮剉各三兩

右三味搗羅二味為散與胡粉相和壹處

研勻傅瘡上日再立驗

又方豆豉炒黃一合

右壹味搗羅為末傅瘡上

又方蝦蟆一枚燒灰

右壹味搗羅為細散入麝香壹分一處同

研勻傅瘡上

又方柳枝葉三握

右壹味用水五升煮至三升去滓入塩少

許淋洗瘡上

治小兒頭上惡瘡黃粉膏方

胡粉 黃連末 各壹兩 水銀 三分 糯米 二拾二粒 研

赤小豆 十四粒 和

右五味先將水銀於手掌中唾研化後卽以麻油調藥入水銀和勻塗瘡上

小兒凍爛瘡

小兒肌肉柔脆外邪易侵故風寒搏於肌肉凝於氣血則致皴裂久而生瘡或痒或痛其

狀焮腫破出膿汁多在兩耳或手足間故謂之凍爛瘡

治小兒凍瘡蜀椒湯方

蜀椒 去目并閉口炒出汁 鹽 各二兩

右二味以清酒五升煎至二升數數蘸之其藥可五六日用

治小兒凍足爛瘡附子散方

附子 生剉 乾薑 炮二兩

右二味搗羅爲散入絲中裝鞮如有瘡膿

卽調臘月豬脂塗之

治小兒凍耳并手面皴痛獾豬脰膏方

獾豬脰具一

右壹味研如膏入漿水少許候稀稠得所
先用童子小便洗手面後以匙抄少許勻
塗手面上

治小兒凍瘡手足指欲墮及耳欲落栢葉膏

方

栢葉

炙乾爲末三兩

杏仁

二十枚湯浸去皮尖別擣如膏

麻油

三兩

頭髮

壹團如鷄子大

搯研

乳香

研半

蠟半

研

右七味并煎油蠟沸卽下諸藥以髮消爲

度攪勻貯瓷器中每用先以小便洗瘡緣

纏手指裏乾厚塗膏卽以軟帛裹之如脚

指相淹處尤須多用膏裏帛紗厚以絲裏

勿令寒氣得入每兩日壹洗瘡換藥稍愈

後三四日壹換

小兒疥

小兒瘡疥率因於蟻蟲變化而生小兒多此

卽調臘月豬脂塗之

治小兒凍耳并手面皴痛獾豬脰膏方

獾豬脰具一

右壹味研如膏入漿水少許候稀稠得所
先用童子小便洗手面後以匙抄少許勻
塗手而上

治小兒凍瘡手足指欲墮及耳欲落栢葉膏

方

栢葉炙乾爲末三兩杏仁二十枚湯浸去皮尖別擣如膏麻油三兩

頭髮

壹團如雞子大搯研半蠟半乳香研半

右七味并煎油蠟沸卽下諸藥以髮消爲

度攪勻貯瓷器中每用先以小便洗瘡絲

纏手指裏乾厚塗膏卽以軟帛裹之如脚

指相淹處尤須多用膏裹麻紗厚以絲裏

勿令寒氣得入每兩日壹洗瘡換藥稍愈

後三四日壹換

小兒疥

小兒瘡疥率因於蟻蟲變化而生小兒多此

疾仍喜生於手足指縫間浸漬徧體近煖及衣服過厚則痒悶不任搔之黃汁出疼痛不止蓋由風熱客於脾肺散於肌肉熏發皮膚便然也

治小兒風熱肺瘡皮膚生疥鼻內瘡癢苦參

丸方

苦參末

四兩以酒三升熬成膏

胡黃連

二分

黃連

棟實

去皮炒

蕪荑

炒

蜣螂

去皮炒

木香

各二兩

右七味搗羅六味爲末入苦參膏內和搗

千杵如鞭入蜜少許和丸如麻子大壹二歲兒每服五丸食後溫水下更量兒大小加減

治小兒瘡疥三黃散塗方

黃連

去須

黃蘗

去麤皮

臭黃

研

赤小豆

各二兩

銀

半兩研

右五味將黃連黃蘗赤小豆三味搗羅爲

散與水銀臭黃同研勻細旋取油調塗瘡

上

治小兒瘡疥體熱黃連散塗方

黃連去須黃蘗去皮秫米炒酥各小豆各膩

粉各壹分右五味搗研為散油調塗膏帛上先洗去

瘡痂封之

又方黃連去須糯米粉各二水銀壹兩胡粉

炒壹兩吳茱萸湯浸炒赤小豆壹未各

右六味先以水銀和津於手研中如泥次

以豬脂四兩入瓷器內慢火化去滓下五

味藥末攪勻成膏先洗瘡拭乾塗之

治小兒瘡疥蛇牀子散方

蛇牀子 吳茱萸湯浸炒硫黃研蕪荑人各

壹分膩粉少許右五味搗研為散用油壹合入葱一莖同

煎候葱黃色停令調藥塗之

治小兒頭面瘡疥癬大麻子塗方

大麻子研

右一味搗水和絞汁塗瘡上

右一味搗水和絞汁塗瘡上

右一味搗水和絞汁塗瘡上

小兒癬

小兒體有風熱脾肺不利或濕邪搏於皮膚
滯滯血氣皮膚頑厚則變諸癬或斜或圓漸
漸長大得寒則稍減暖則痒悶搔之即黃汁
出又或在面上皮如甲錯乾燥謂之妳癬此
由飲乳乳汁漬着乃生復以乳汁洗之即差
治小兒癬疥赤腫及濕癬久不差黃連膏方
黃連去蘆須黃蘗去蘆蛇牀子炒藺茹 礬石
火煨水銀手掌內唾研如泥
別研入膏中各壹兩

右六味搗羅前四味為末以臘月豬脂四
兩同入銚子內煎四五沸下礬石末又煎
三兩沸取下良久下水銀攪如稀泥候冷
先以清泔皂莢湯洗拭乾以火炙痒塗之
日三

治小兒壹切瘡癬痒痛不止桑螵蛸散方

桑螵蛸

十枚燒存
二分性

膩粉

壹錢

麝香

半錢

右三味研為細散生油脚調雞翎掃候乾
有裂處再掃

又方槐白皮五兩

右一味以水一升煎三五沸候冷數洗之

拔粹方

治小瘡癬

治法浸淫瘡宜用苦瓠散塗之乾癬宜用羊

蹄根絞自然汁調膩粉塗之濕癬宜用青

金散貼之

青金散治小兒濕癬浸淫瘡

白膠香二兩 蛤粉半兩 青黛二錢

右研勻為細末乾摻瘡上

瑞竹堂方

治小兒煉胤瘡方黑驢糞曬乾燒灰清油調

搽立効衛生易簡方同

醫方大成

錢氏方金華散治小兒一切濕瘡癬疥瘡等

黃蘗 黃連各半兩 黃丹壹兩 輕粉一錢 麝

香壹字

右同研勻先以溫水洗然後貼之小兒藥證直訣

醫方集成南北經驗方
袖珍方衛生易簡方同

經驗良方

治小兒生下遍身如魚泡又有如水晶碎則
成水流滲又生用蜜陀僧生研入紗絹滲
之仍服局方蘇合香丸

治小兒遍身如魚目無膿謂之疣目瘡東坡
謂之征虜瘡用升麻壹味煎百十沸却
入蜜壹二匙以磁器內盛用鵝翎拭瘡上
省翁活幼口議

治小兒脚腫生瘡及諸瘡口不合者生肌散
方

真地骨皮 五倍子 甘草各生 黃蘗炙 黃
連炒

右為細末乾摻瘡上以麤木用沸湯泡蘸
洗乾處津液調傳

治小兒遍身疥癬癢痒摩風膏方

苦參 歷青 蕪荑炒 黃蠟各壹錢 巴豆三
去輕粉五文 真麻油半 蠟二

右同油煎至巴蕉濾去所煎物入輕粉和
勻傅疥功效

神効名方

治小兒癬雜瘡

白膠香黃蘗黃連輕粉

右為細末羊骨髓調塗癬上

急救仙方

小兒頭瘡胎毒諸風熱惡瘡痘瘡用

黃指黃連白芷五倍子

右四味等分研細末用井花水調稀稠得
所塗開在碗內覆架兩磚上中空處灼艾
烟熏蒸以黑干為度仍取下煎藥再研作
末清油調塗如有蟲則用煎油調搽
又方五倍子白芷等分為末有濃水干滲
其上其膿水即收如乾痕以清油調塗

玉機微義

芫胡通經湯

方見東垣
試效方

按此手少陰太陰足少陽厥陰藥也東垣

諸法類此者甚多茲不詳錄郭氏亦有治
瘰癧數方本攻裏內消之劑故附于後雜
方內

衛生易簡方

治小兒乳癰用粉草擦之後用油醬抹秘傳外科

治小兒熱瘡用亂髮如梨大壹團鷄子黃煮
熟共置銚內炭火上熬初乾髮焦液出旋
取液盡為度以此液傅瘡即以苦參末摻

之

治小兒壯熱壹切瘡疥皮膚瘙痒用楸梓白
皮煎湯洗

治小兒浸淫瘡疼痛不可忍發寒熱用小薊
末新水調傅乾即易

治小兒軟癰用霜打不落乾桃子為末油調
傅

治骨痛或出膿血用水蛇皮壹條燒灰油調
傅

備預百要方

小兒浸淫瘡取東壁上土末厚付之日光先
照處土

小兒黃爛瘡胡妥灰付

湯火傷

千金翼方

目錄

聖惠方

治小兒湯火瘡諸方

大麻子膏 生地黃膏 羊髓膏 白膏

保童秘要

肘後方

省翁活幼口議

磁石散

蘇醫林方

烟霞聖效方

衛生易簡方

餘藥無名者散見本方

大...

...

...

...

...

...

千金翼方

...

目錄

千金翼方

治小兒火瘡方熟煮大豆濃汁溫浴之亦令

無癢

又方以蜜塗之日十遍

聖惠方

治小兒湯火瘡諸方

凡小兒被湯潑火燒者初時慎勿以冷物及
并下泥及尿泥并蜜塗搨之其熱氣得冷即
却深搏至骨爛人筋也所以人中湯火後筋

喜癢縮者良由此也

治小兒卒被湯潑火燒苦劇大麻子膏方

大麻子壹 栢白皮一兩 白芷一兩 甘草壹兩 梔子

人壹兩

右件藥細判以猪脂一斤煎白芷色黃為

度以絲濾去滓盛於堯器中候冷塗於瘡

上日三四度用之

治小兒被湯潑火燒赤痛生地黃膏方

生地黃一兩 栢白皮二兩 苦竹葉壹兩 甘草壹兩

右件藥細判以猪脂壹斤煎令地黃色黑

又以絲濾去滓盛於不津器中候冷日三度

塗之

治小兒火燒瘡敗壞宜用羊髓膏方

羊髓壹斤 栢白皮壹兩 生地黃壹兩 蛇銜草一兩 黃

芩壹兩 梔子人壹兩 苦竹葉壹兩

右件藥細判先於鍋中鍊羊髓令沸次下

諸藥同煎候地黃色黑為度以絲濾去滓

傾於堯器中候冷塗於瘡上日三度用

老成藥器中知公能成藥十日三更四

治小兒湯火瘡的膏方用成數以流氣去毒

白松脂一斤白欵半斤及粉半斤定粉半斤乳香

膏清油二黃蠟壹兩

右件藥搗羅為末先以油入堯鍋內用慢

火熬令香下蠟令鎔次下諸藥末不住手

攪熬成膏以瓷合盛候冷日三四度塗之

又方栢葉壹兩梔子壹兩胡粉半斤

右件藥搗羅為末以羊髓五合入鍋中於

微火上化之後下諸藥末不住手攪熬成

膏盛於不津器中候冷塗之以差為度

又方白礬二兩梔子三七枚燒令

右件藥細研為散以雞子白調塗之

又方栢白皮半斤

右以猪脂五兩入銚子內與栢白皮同煎

焦黃色取下絲濾去滓內入堯合中候冷

塗之

又方右丹參搗末以羊脂和傅之

又方右黑豆濃煮汁候冷塗之亦滅癩痕

又方死鼠壹枚

右以清油壹升煎令黑燠去滓日三度塗之

又方右榆白皮嚼熟塗之

又方右梔子人以水浸汁日五六度塗之

又方右菰蔣根去土燒灰細研以雞子白和塗之

又方柳白皮細剉半升

右以猪脂壹斤相和煎候柳皮黑去滓放冷日三塗之

又方右雄黃末以醋調塗之

又方右浮萍草搗末以溫水調塗之

又方右初被湯火所傷便取狗毛碎剪消膠和之徧塗於瘡上以帛封上壹封以至痂落更不易之亦不痛甚良

又方右新牛糞取汁塗之

又方右粟米熬令焦投水中却漉出爛研傅

之功

又方右黍米煮粥以雞子白和傅之

又方右乳頭香水研薄薄塗之

治小兒卒被湯潑方

牛皮膠

右以漿水同入瓷器內慢火煨令化厚塗

之立差

保童秘要

湯火傷方

栢葉

梔子人

各壹兩

胡粉

半兩

右為末以羊髓多少於以慢火上同熬候

藥紫色即取出以木梔子研三五百遍每

日以少許三度傅之

肘後方

治小兒火燒瘡滅癍痕黃明膠小雞翎掃之

于母祕錄治小兒湯火瘡水煮大豆汁塗上

易差無班

北夢鎖言云孫光憲家婢抱小兒不覺落炭

火上便以醋泥傅之無痕
省翁活幼口議

治小兒湯火傷磁石散方

景德鎮磁器

不拘多少

右打碎埋竈內炭火鋪上經一宿取出放
地上出火毒碾為末口黃丹水調傅湯火
傷處

醫林方

治小兒燒瘡

甘草

青黛

各等分

右為細末貼在瘡上即止

又方治小兒燒瘡

浮小麥

猪毛

二味各等分

砂鍋內同燒存性研細小油調貼之即効

煙霞聖効方

燒湯破方

菜豆粉

炒

輕粉

少許

右用好油調上大有神効

一方紙蘸醋貼不痛去紙卽無瘡癩

一方寒水石不以多少火燒成粉醋調掃之

卽愈

一方無石五靈芝不以多少為細末新水調掃

衛生易簡方

治小兒火燒瘡用赤地利為末小油調塗沒

癩痕

治火瘡滅癩痕用□□脂末雞翎掃□

醫方類聚卷之二十四十八