

醫案存真三



南京中医药大学图书馆版权所有

葉氏醫案存真

元孫萬青校刊

363

夏至陰氣不生乃損不能復矣今當大熱氣泄愈甚百脈諸氣皆空脂液盡耗難望再醒爲寒爲熱無非身中陰陽互乘陽由陰上越則頂巔痛風木之火入中則嘔逆哈咳總之液涸神竭進兩儀煎瓊玉膏扶至稍涼再爲斟酌

麥冬 竹葉 訂人參 烏梅肉 大麥 鮮荷葉汁
水煎澄冷服

初春脈動而不鼓亦收藏之司淺矣壯年未育晨吐黑
痰皆水虧火炎精氣不充之象胃旺能納穀當專理下
焦不必以痰爲慮

牛骨髓 羊骨髓 海參膠 線魚膠 龜鹿膠

芡實 菰絲粉 金櫻子粉 五味子 家韭子

大熟地 遠志肉 建蓮肉 淡菜膠 熟首烏

覆盆子 不土不燥不澀不寒今人多大熟地者其善也
下寒便難不寐液涸陽不潛伏用辛甘化風

熟地 歸身 肉桂 枸杞 懷牛膝 白芍

茯苓 甘菊 楚蓉 柏子仁

程舜文令郎 男子思念未遂陰火內燔五液日奪但
孤陽升騰薰蒸上竅已失交泰之義此非外來之症凡
陰精殘憊務在胃旺納穀生陰今咽喉耳鼻諸竅久遭
陰火之逼寒涼清解僅調六氣中之火而臟真陰火乃
閃電迅速莫遏清涼必不却病良由精血內空草木藥
餌不能生精充液耳

猪脊髓 阿膠 川斛 天冬 生地

胡樸菴 脹動於右氣熱易升陰不上承能食不能充

津液入春嗽血不止養少陰之陰勿苦降礙胃

雞子黃

阿膠

生地

炒柏葉

炒黑麥冬

薑草

轉方加天冬 抱木茯神

上假熱下真寒肝腎大虛用加減八味丸

熟地

茯苓

丹皮 山藥

五味

當歸

脈濶無神便溏食少肛有瘡瘍兩月未合已成漏症延
綿竟有痼疾之虞近日嗔怒氣擾中焦隱痛至於耗氣
劫奪萬難再餌議進東垣益氣湯減黃芪加木瓜白芍
煨薑南棗以制肝木

371.

脈數多遺脊痠腰墜此督任失固非通不能入脈非濡無以填精色蒼形瘦不宜溫補

熟地 牡蠣 遠志 五花龍骨 五味 茯苓

芡實 山藥 羊腎脊髓

372.
肝腎兩虧虛火燦金用納氣法

熟地 牛膝 白芍 青鉛 交童便 山藥

脈數小不飢瘦多陰虛伏熱

滑石 麥冬 竹葉 連翹 杏仁 鮮生地

374.
陰液枯槁陽氣獨升心熱驚惕倏熱汙泄議用復脈湯

甘以緩熱充養五液

人參 阿膠 炙草 麥冬 牡蠣 麻仁

細生地

脈大不斂神迷囁語陰陽不相交合爲欲脫之象救陰無速功急宜鎮固陰陽冀其甦息

生龍骨 生牡蠣 人參 阿膠 桂神 淮小麥

留熱未清營液已耗但論清邪恐神索氣奪臟滯陰藥防餘熱癰瘍議理心之用亦清補之意

人參 麥冬 竹心 淮小麥

377.

心中空洞下焦寒冷兼有遺精便溏議用三陰補方

人參 山藥 炒 茯神 五味 杞子 炒 建蓮

線魚膠 熟地 炒

脾胃陽微不運寒痰噫氣腎虛陰走遺精無夢

人參 山藥 炒 熟地 建蓮 生牡蠣 龍骨

杞子 麋角膠

男子脈大爲勞暑月陽不伏藏初夏陽升血溢皆內損
少固填精固氣是爲藥餌靜攝絕慾經年可復

線魚膠 真沙苑 五味 龜版 茯神 淡菜膠

378.

卷三 葉案

四

金櫻膏 石蓮 芙實

380.

陳 纔交春三月每夜寒熱渴飲汙出是皆陰損於下
孤陽獨自上冒也虛勞兼有漏瘍加以情懷悒鬱損傷
不在一處少腹及腰肋痛議治在肝胃之間

桃仁 旋覆花 丹皮 新絳 青蔥 柏子仁

許友官 幼年瘍潰成漏後天不能充長其吐血後嗽
不止夜熱晨汗熱止日見色奪肉消減食惡心便溏乃
勞怯陰陽中下並傷草木藥餌何能挽回生生真氣難
效之症



人參 山藥 茄實 紫草 五味 熟地炭

寒熱半年少時色黃氣短欬嘔是內損營衛迭偏勞怯

重病

人參 茯苓 黃芪 炙草 煙蠶 南棗

汪正中 填固包舉遺精已緩新正勞煩氣洩病後神耗精奪當此升泄氣候以安神固攝法

桑螵蛸 金櫻子粉 茯神 人參 生龍骨

當歸身 金箔 龜板

陳升葵弟 勞病先傷陰氣繼而陽傷夏季脾胃不和

腹脹腹鳴晨泄凡陽虛外寒陰虛熱蒸皆虛不肯復元
之象非草木可爲病人述腹中氣通小愈用藥當宗此
旨

人參 穀芽 茶芩 白芍 多草 新會皮

右癥舌瘡足痺頭岑面載陽呵欠微呃診脈小濡而緩
此腎納失司肝風震突但病起耳後暴腫必兼溫熱客
氣清上輕揚腫勢頗減七日以來當陰陽經氣一小周
天不必以時邪引病爲惑昔河間宣明方論中謂舌強
難言其咎在乎舌下筋脈不主流動以腎脈榮及舌本

耳其主地黃飲子取意潤藥清投機闢漸靈并無礙乎
上氣痰熱倣此爲法

熟地 肉蓯蓉

漂淡

遠志

炒黑

川石斛

茯神

枸杞子

牛膝

石菖蒲

脈象左部稍振水虧木中風動左牙痛蓋風從內旋乃
陽之化風祇以春深地氣上升之候多升少降無非下
元不司收納虛証何疑況因目恙頻用韭子烟薰查本
草藥性辛辣升騰助陽孫真人於遺濁用之藉其升陽
以涵陰更無漏泄耳今瘡中八日聲音漸振者乃精氣

畧有宦靜裏竅畧有靈機是順境也乃不明此理仍用
辛以泄氣加人參亦是清散上焦之藥以肝腎藏虛在
於至陰若再投辛以傷其陰必致虛症蜂起焉望其向
安倘必以上有火熱古稱實火宜清虛火宜補溫養柔
和與溫熱剛燥迥異幸勿疑訝

生地

川斛

麥冬

茯神

阿膠

女貞子

387.
十二日來干支一輪右肢痠木右跗足畧有痛象舌竅
未靈味少甘美虛象顯然三日前主家以齒痛爲熱醫
迎主見即投辛涼解散此症虛在肝腎下焦若不固納



維本漫無着落仍以前法加入涼肝可也

熟地 柏杞 牛膝 遠志肉 茶神 川斛

天冬 甘菊炭

388.

張石頑治春榜趙明遠平時六脈微弱己酉九月患類中風經歲不痊邀石頑診之其左手三部弦大而堅知爲腎藏陰傷壯火食氣之候且人迎斜內向寸又爲三陽經滿溢入陽維之脈是不能無顛仆不仁之虞右手三部浮緩而氣口以上微滑乃痰沫壅塞於鬲之象以清陽之位而爲痰氣占據未免侵漬心主是以神識不

清語言錯悞也或者以其神識不清語言錯悞口角常
有微涎目睛恒不易轉以爲邪滯經絡而用祛風導痰
之藥殊不知此本腎氣不能上通於心心藏虛熱生風
之症良非燥藥所宜或者以其小便清利倍常以爲腎
虛而用八味壯水之劑殊不知此症雖虛而虛陽伏於
肝臟所以陽事易舉飲食易飢又非益火銷陰藥所宜
或者以其向患休息久痢大便後常有淡紅漬沫而用
補中益氣殊不知脾氣陷於下焦者可用升舉之法此
陰血久利之餘疾有何清氣在下可升發乎若用升柴

升動肝腎虛陽鼓激鬲上痰飲能保其不爲喘脹逆滿之患乎是升舉藥不宜輕服也今舉河間地黃飲子助其腎通其心一舉而兩得之但不能薄滋味遠房室則藥雖應病終無益於治療也惟智者善爲調攝爲第一義

熟地 巴戟天 蔓荳 茅山萸肉 茯苓 薄荷

淡熟川附 肉桂 五味子 麥冬 川石斛

遠志 鮮石菖蒲

脈左大右濡肝風震動陽明脈空舌強肢硬是屬中絡

議用緩肝熄風

連翹 丹參 元參 茯神 細生地 獅羊角

390.

頭痛累月陽脈大陰脈濇此陰衰於下陽亢於上上盛下虛之候也陽氣居上體本虛也而濁氣干之則實陰氣居下體本實也而氣反上逆則虛頭爲清陽之位而受濁陰之邪陰陽混亂天地否塞而成病矣法用六味地黃湯加青鉛五錢

391.

頭痛經年不愈早則人事明了自午至亥神氣昏憒不寧風火之劑雜治無功兩脈俱沉且滑此太陰陽明痰

厥頭痛也當用礞石滾痰丸間服導痰湯以蕩滌其痰
次以六君子湯少加秦艽全蠍調理而安

392^v

五旬外不得安閒凡惱怒煩動多主五志之陽上舉而
肝膽相火爲甚幾年前製壯水之劑加礞石龜甲之沉
潛乃乙癸同治之義今年暴暖多風風熱上搏清竅爲
蒙濕熱蒸爲暎水此爲客邪乘本體之虛治標宜輕揚
以清上靜坐宅中可以向安

連翹 赤芍藥 草決明 羚羊角 薄荷梗

黃芩 山梔皮 荷葉梗 飯後服

393.
裏真氣衰不能貫通外膜致聲若甕中而蛙鳴蚊震之
聲不絕前之流膿水時令濕熱氣加也今議補下鎮納
收斂方法

龜膠 磁石 牛膝 牡蠣 遠志 菖蒲 淡菜

膠同蜜丸

曹漢臣 厥陰頭痛舌乾消渴心下煩疼無寐多躁小
腹脹滿小便滴瀝時時痙攣最怕厥竭

阿膠 鮮生地 雞子黃 小黑豆皮

煎半盞卽以湯藥送

滋腎丸

三錢

稚年陽有餘陰不足驟加驚恐厥陽直升爲頭痛身不
發熱二便自通豈是風寒停滯羨防葛薑辛溫混發陽
經愈升其陽必致損目宜養陰藥

勞倦傷中身痛

396

周身掣痛頭不可轉手不能握足不能運兩脈浮虛浮
雖風象而內虛者脈亦浮而無力以脈參症當是勞倦
傷中陽明不治之候陽明者五臟六腑之海主束筋骨
而利機關陽明不治則氣血不榮十二經絡無所稟受
而不用矣衛中空虛營行不利相搏而痛有由然也法
當大補陽明氣血不與風寒濕所致成痹者同治

人參

黃芪
歸身

甘草
桂枝

秦艽
白朮

307.
患痛風發熱神昏妄言見鬼手足癱瘓大便不行此少陰腎氣受傷也腎既受傷病累及肝肝旺火熾神明內亂木合火邪內入則便閉外攻則身痛法當滋其內則火自熄風自除痛自止矣

生首烏
蕷仁
桂枝
秦艽
桔梗
黃連

知母
枳殼

服一劑症漸減但心神不安身體如在舟車此腎氣虛而肝肺爲之不治正內經子虛母亦虛也母病子亦病而肝肺爲之不治正內經子虛母亦虛也母病子亦病

也夫肝藏魂肺藏魄二藏不治故魂魄爲之失守耳

人參 甘草 生地 麥冬 遠志 玉棗仁

羚羊角 川貝 橘紅 茯神

患風三月周身流走作腫手不能握足不能履診其脈浮大而數發熱口乾此陰虛生內熱熱勝則風生况風性善行火熱得之愈增其勢傷於筋脈則縱緩不收逆於肉理則攻腫爲楚也

生地 黃芩 黃連 酒炒 紅花 羌活

左脈如不右脈緩濶蓋陰虧本質暑熱爲瘡水穀氣蒸

濕流肢末遂成癓癆已經泄瀉食減陽明脈中氣衰極矣緩治可以冀功

生於术 茯苓 狗脊 茅术 仙靈脾 獨活

防已

靈仙

濕痹絡脈不通用滲濕苦溫藥小效但汙出形寒泄瀉食減陽氣大衰可知難以濕甚生熱例治通陽宣行以冀脈絡流通

生於术 茯苓 附子 米仁 金毛狗脊 草薢

高年液涸風動酒濕氣蒸足趾曾經腐瘍經年來或麻



痺或牽掣不能轉側已成筋骨之痺兼之火升眩暈頭
面清竅常似不爽大便艱滯四五日始一更衣陽氣不
能潛伏陰液日就枯槁老來痿躄原無復元之法診得
脈數動疾溫燥之補無益反害仿丹溪虎潛之製稍爲
加減冀得津液少存亦安閒永年之算非攻病也

大生地 一斤 淡天冬 三兩 肉蓴蓉 一兩五錢 懷牛膝
二兩 生白芍 三兩 虎骨膠 二兩 柏子仁 二兩 肥知母
一兩 川黃柏 一兩

長夏濕痺經脈流行氣鈍兼以下元脈絡已虛痿弱不

能步趨脊膂常似痠楚大便或結或溏都屬肝腎奇經
爲病蓋必佐宣通脈絡爲正治法倘徒呆補夏季後必
滋濕擾須爲預理

肉蓯蓉 小茴香 巴戟天 歸身 遠志

鹿角霜 桑椹子 生茅术 荸苓 熟地 薑汁製

另用金毛狗脊三斤煎膏和丸

俞天音 脉左大舌乾白胎腫痛流走四肢此行癰喘
急不食二十日外矣

羚羊角 木防已 白芍 桂枝 杏仁 薑黃



405.

脈微而濇微爲陽氣虛濇爲陰血傷去冬已下肢獨冷步趨無力高年內乏藏納之司入夏身動加喘肉腠麻痺若蟲行此真陽失蟄胃陽失護生生意少豈攻病藥石所宜喻嘉言先生所謂大封大固莫令真陽泄盡而暴脫皆爲此也錄嚴氏三因方

人參 白朮 附子

406.

俞文調先生 灵樞云神傷思慮則肉脫意傷憂愁則肢廢皆痿症也脈形大虛無力常飲補湯而今操持勞思猶未能免病必遷延

枸杞 歸身 甘菊 桂枝 虎骨

交冬宜藏老年下虛二氣少續忽然右癥舌瘖面亮戴
陽呵欠吸氣短欲喰此非外來客邪皆根本先怯平昔
眩暈肝藏虛風顯然水不生木坎中真陽內寓必溫理
其下凡陽主乎通陰主乎攝扶過七日少陽生氣再振
望其偏廢延永倘攻風劫痰之治非本氣自病法則

人參 熟附 遠志 蔴神 鮮菖蒲 搗汁冲

四十二歲右脈濶左脈微飲食不能健運嘔嘔間或溏
泄此中宮陽氣欲寂當用辛溫以補之

人參 乾薑 茯苓 淡吳萸 胡蘆巴

左脈弦大空虛右脈虛軟濡滯能食不能運便溏跗腫
此係積勞傷陽壯歲經年不復當作虛症宜補脾胃治
人參 於术 茯苓 煙益智 淡附子 白芍

甘草 乾薑 胡蘆巴

正氣已虛熱邪陷伏故間瘧延爲三日其象爲厥舌潤
胸痺噦嘔恐成翻胃呃逆之症先以全覆代赭鎮其上
逆之氣以瀉心散其胸中之熱

人參 川連 白芍 旋覆 代赭 牡蠣

漏柴

山人

陽氣結閉已成關格病屬不治姑用進退黃連湯上下

合法

黃連 白芍 人參 桂枝

頻頻勞怒肝氣攻觸胃脘胃陽日衰納食欲吐胃不主
降腸枯不便仿仲景食穀則噦用吳茱萸湯

人參 黃連 茶芩 乾薑 吳茱萸

陽微嘔吐不飢

人參 半夏 茶芩 白芍 淡附子

春夏陽升肝木乘胃嘔吐不已寢食減廢氣失下降腸

中不遇病乃懷抱抑鬱兩月之久不敢再以疏泄爲治

人參 川連 烏梅 川棟肉 生白芍

十九歲翻胃三月粒米不存在脈大空虛右脈細小虛濇納食少停卽湧出口面白神痺大便燥結此陰血枯槁陽氣鬱結已成膈症勉擬補中納下法

人參 於术 麥冬 草莖 牛涎 半夏 益智

茯苓

發熱痰喘胸滿身痛左邊睾丸不時逆上痛不可忍肝脈弦急肺脈獨大此肺肝受邪之故也肝爲木藏其化

風其生火風火合邪旺於本位則爲熱爲痛乘於肺金
則爲痰爲喘法宜滋達肺金兼疏肝木

418. 417.
薑仁 紫苑 半麯 川貝 桔梗 枳殼 杏仁

蘇子 柴胡 秦艽

狐疝 淡蕊蓉 枸杞 巴戟 袂苓 沙蒺藜

當歸 茵香 真肉桂

陰莖作痛痛甚而憤診兩脈浮虛而濇浮爲氣虛濇乃
精傷陰陽兩虛得之憂思勞鬱而傷中也經云陽明爲
氣血之海主潤宗筋又陽氣者精則養神柔則養筋今

多悒鬱則氣必傷口任勞倦則血必耗氣血兩傷宗筋失潤故令作痛治以當歸補血湯加

人參 甘草 泰丸 桂心 紅花 繼用歸脾湯
調理

患溺血症已三月矣前用升補法不應右脈虛濶無神左關獨弦莖中作痛下多血塊形色憔悴又多噯氣據脈論症乃肝脾積熱也肝熱則陰火不寧而陰血自動以血爲肝臟所藏而三焦之火又寄養於肝也故溺血莖中作痛脾熱則濕氣內壅而生氣不伸以脾爲濕土

之化而三焦之氣又運行於脾也故時時噯氣形色憔悴法當益肝之陰則火自平利脾之濕則氣自和

生地

白芍

草薢

丹皮

甘草

車前

繼用逍遙散加

車前

草薢

下血不已汗出躁煩心悸恍惚頭不安枕轉側不能兩脈虛濇虛爲氣虛濇爲陰傷入身陽根於陰陰附於陽兩相維繫者也今陰血暴亡虛陽無偶勢必外越矣虛陽外越而陰愈無主其能內固乎陰陽相離氣血兩虧法宜兼補然血有形難以驟致氣無形可以急固因其

氣則氣自充氣充則不必治血而血自守矣先用歸脾

湯繼以大造丸

人參 白朮 桂神 杞仁 黃芪 龍眼肉

當歸 遠志 木香 甘草 生薑 大棗

寒熱如瘡便血不已左脇有塊攻逆不已而作痛脈弦
數兼濶弦則爲風數則爲熱濶則氣結此肝脾之氣悒
鬱不宣胸中陽和抑而成火故神明不精肝之應爲風
肝氣動則風從之故表見寒熱也人身左半肝腎主之
肝風自逆故左脇攻楚有塊也肝爲藏血之地肝傷則

血不守且以風淫熱勝蓋爲亡血之由也

生首烏 黃連 柴胡 黃芩 知母 枳實

厚樸

下血既久真陰大損臨晚熾熱而咳乃陽失潛伏宜甘酸益陰爲治

424.

423.

熟地炭 甘草 莱菔肉 山藥 五味 茯苓

芡實

木瓜

屢進潤血燥熄虛風藥諸症向安入夏四月苦於便難寒熱此夏令陽氣大泄陰液更耗虛風動灼爲秘古人

每以辛甘化風主治因體瘦不受溫補復以酸苦味入
陰之意

鮮生地

胡麻

製首烏

天冬

柏子仁

杞子

茯神

肥知母

川斛膏

面目悉黃微見黑滯煩渴腹滿左脈弦數右脈空大此

內傷發黃爲厥陰肝木太陰脾土二臟交傷之候也夫
肝爲風藏其性喜伸而惡屈鬱則木不得伸而屈矣鬱
極則其氣盛而風乃發風發必挾其勢以賊脾脾爲濕
土之司土受剋而氣不行則濕勝矣風性雖善行遇濕

以留之反壅滯經絡而不解由是濕停熱瘀而煩渴有
加其發黃也必矣雖曰風濕所致實由木亢而不宣土
因而不舒非外來風濕之比况黑色見於面則知并傷
其腎以脾病不行胃中穀氣入腎反將脾中濁氣下流
故於黃中見黑滯耳卽其腹滿亦是中氣不行虛熱內
壅非結熱當下之比若悞下之則藏氣空虛風從內生
矣若悞汗之則陽氣外解濕愈不能行矣爲商治法乎
肝之亢扶土之虛兼解鬱熱以清氣道除濕蒸而和中

氣

人參 白朮 白芍 黃連 山梔 歸身 丹皮

茵陳 秦艽 柴胡 甘草 半麯

426.
產後下損八脈交虛形寒內熱骨痛耳鳴血液日耗生氣不充冬季不得復元春深發泄司令延爲勞瘵矣

427.
杞子 歸身 紫石英 沙蒺藜 荻神 蓼肉

產後陰傷寒熱瘧幾兩月病發白帶淋漓八脈空隙大著腹有動瘕下元虛憊已極議固下真通脈方

人參 鹿角霜 茯苓 歸身 蓼蓉 粗桂枝木

428.
產後十二日診脈數疾上湧下垂此血去陰傷孤陽上

冒內風燔燎肝魂不寧面赤頭痛晝輕夜重陰弱陽亢
上實下虛若不按法施治必增癥瘕厥逆議酸潤益下
和陽方

小生地 生牡蠣 淮小麥 阿膠 麥冬 元參

產後脈虛舌白背寒凜身痛乾咳不飢是血氣兩損不
肯復元有蓐勞之慮急當培養足三陰臟莫以肺經咳
嗽治再伐胃氣用貞元飲方

熟地 歸身 炙草 茯神 杞子 桂圓肉

飢時服

430.

產後五十餘日腹滿不減臍脹愈甚二便不爽此因下

焦空虛腑陽失氣化之司先宜通陽得脹勢稍緩再議

方用五苓加椒目

431.

方 此血痺之症產蓐百脈皆動春寒凜冽客氣乘隙襲入經絡始而熱勝繼則寒多邪漸陷於陰絡致夜分偏劇汗多神昏譖語由邪逼神明豈是小病正如仲景劫汗亡陽驚譖同例議救逆湯減芍藥方治

產後絡脈傷腹痛頻發嗔怒食物不宜則甚當調和脈

絡庶不延成痼疾宜葱白丸

433.

胎殞陰損於下厥陽上泛久有夙病痼症心營肺衛最易蒙蔽是神志或昏或清皆夾雜夙疾惡露自行豈是瘀癥姑用輕法以開上鬲

434.

枇杷葉 薏苡仁 杏仁 通草 雲苓

下焦陰虧不攝裏熱泄瀉厥陽上泛頭痛又產後兼病

損

甘草 熟地 茯神 茄實 山藥 建蓮 川斛

蓐勞下虛溏泄近有風溫咳嗽發熱暫用手太陰上焦

藥四五日

前日頭熱不眠翻覆食甚一動不來丸因

桑葉 沙參 麥冬 玉竹 甘草 扁豆

久瀉無不傷腎况兼產後起因補中必當理下是爲脾

腎兩補

五味子 生杜仲 雲茯苓 杜芡實 兔絲粉

臺人參 補骨脂 焦白朮

肝陽化風爲厥腎液下衰水不生木而藏納失職此壯
盛年歲已有下虛上實之象大意養腎主以溫潤治肝
須得清涼乃仿複方之法

大熟地 茯苓 遠志 蕤蓉 鹿茸 柏子仁

補骨脂 懷牛膝 黃柏 天冬 精羊肉煮爛搗

爲丸

438.

怒勞陽升暴厥苦降和陽使清神不爲濁蒙便可清爽此論平時調理養肝腎之陰宜至靜之劑從經旨下虛

上盛主治

生地

熟地

龜版

菖蒲

遠志

茯苓

脈右濇左微色悴不華食減不能健運嘔嘔溏泄此中宮陽氣欲寂法宜辛溫通補失治釀成中滿難調

人參

茯苓

泡茱萸

泡淡薑

胡蘆巴

439.

440

驟然驚駭經府氣亂有失常度之流行是以脹脹無定所飲食如常病不在裏何得紛紛雜治調其氣血以俟

營衛宣通

桑枝 遠志 歸身 桂枝 鈎鈎 白蒺藜

病傷久不肯復食入不運脾胃之陽日困與治中法

煨益智 茶芩 於木 廣皮 白芍 煨薑

南棗

脈沉右小左虛大臍上有動氣脢脹不嗜食難於大便此中氣大虛肝氣內變忌用攻伐消導宜泄肝和胃

茯苓 益智仁 麝金 穀芽 烏梅

寒濕損傷脾陽遂成中滿之症乃淡泊不堪所致

附子 乾薑 茯苓 白芍 胡蘆巴

脈沉屬水初因食物之滯繼爲下奪太速脾陽頓傷氣

室濕聚爲腫脹矣

大腹皮 茯苓皮 厚樸 猪苓 澤瀉 老薑皮
新會皮 甜葶苈 茯仁

懷抱抑鬱營血受傷入暮腕痛喜按乃傷陰絡非實痛

也

柏仁 桂圓 茯神 遠志 廣皮

446.

精氣不足體質再加思慮鬱結心脾營血受傷口味甜
血隨溢稍過飢脘中痛營主中焦宜以歸脾養營之屬
人參 大棗 遠志 茯神 甘草 歸身 白芍

桂圓

447.

脈左太堅弦肝風震動脾胃絡脈不和不知飢不安寐
口流涎右肢腫當兼理中焦之絡議用茯苓飲法

茯苓 枳實 人參 炙草 半夏 廣皮

遠志炭

金式兼 按太陽經之膀胱俞在脊骨間十九椎之旁

小便後從茲出汗是太陽之氣不固也 凡天將雨則頭
眩目花經云頭眩其過在巨陽是清氣之不升也 勞則
夢寐不安而遺飲食不適意卽作瀉是逆其志而運化
失常此瀉在下焦統屬太陽病諸陽不能保舉而生種
種之疾議茸珠丸大安腎丸理膀胱氣自必獲效

鹿茸 荻神 人參 蔴蓉 茅薜 兔絲餅

秋石 柏仁 川斛 補骨脂 白蒺藜 桑螵蛸

吳文生 胃中不和痛瀉

茅术

厚朴

廣皮

木香

炮薑

茯苓

猪苓

澤瀉

砂仁

汪介臣 鼻冷涕泪腹脹仍空形色衰奪脈微而濶陽氣已憊濁陰日聚爲脹滿不食危期至速勉議通陽方法

人參

茯苓

淡附子

淡乾薑

胃弱肝氣不和口中吞酸作苦食物無味擬進加味溫

胆湯法

溫胆湯加人參川斛

脾胃不和腹脹痛夜自汗先疏利氣滯保和丸焦鍋巴

陳茶薑湯下

脈沉遲腫脹腹滿壅縮澁不利起於上年冬底痰飲咳嗽氣逆不得卧誤認腎虛水泛之恙療治遂致增劇難調勉擬進濟川丸以通水道得小便頻利冀其勢緩

久瀉傷腎下午黃昏爲甚非通利藥所宜擬溫腎法
永隆號 屢通大便脹勢不減是陽氣愈傷陰濁益壅矣進通陽法真武湯去白芍加澤瀉椒目

腎陽虛則乏納氣之權濁陰凝痞少腹漸覺有形爲脹

脾陽虛則健運失司食少易滯受病既屬內傷固以理
臟真爲最要益火暖土使中下之陽得安迄今圖治至
冬至一陽來復必獲全效

川椒 附子 白芍 茯苓 甘草

因時病而不慎口腹以致咳痰嗆逆肌肉消爍食下脹
脹甚則吐食而成虛損矣病在土不生金金衰則不制
木互相戕剋有不能起之象議以養金制木使中焦無
賊邪之患壯火培土使上焦得清化之權亦是一法未
知何如

甜沙參 淮小麥 鮮蓮肉 南棗 懷山藥

雲茯苓 燕窩

繼進方 人參 不山藥 白芍 茯苓 矢草 南棗

鮮蓮肉

茹素胃弱向係肝陽熱熾今微眩耳鳴心怔議甘以養

胃緩熱少佐酸味

酸棗仁 柏子仁 炙甘草 鮮白蘿蔔汁 大生地

甜細真北沙參 大麥冬 雲茯苓 莱肉炭

肝風上巔頭旋耳鳴麻痺足寒微僵便濶經阻三年久

病治從血絡中法

菟蔚子 柏子仁 柑杞子 料豆皮 製首烏

甘菊

詢左脇下每日必有小痛逾時其痛勢佈散胸臆背部
從來不延及於腹中下焦是脈絡爲病凡久病從血治
爲多今既偏患於上仍氣分之阻而致水飲瘀濁之凝
此非守中補劑明甚但攻法必用丸以緩之非比驟攻
暴邪之治當用穩法議以陽明少陽方法俾樞機開闔
舒展諒必有裨益矣

生鉤藤

另研

生香附

水磨
澄粉

風化硝

炒半夏

茯苓

生白蒺藜

去刺

竹瀝薑汁泛丸

厥陰腹痛引胸脇便難舉九腫

當歸鬚

延胡索

小茴香

桃仁泥

川棟子

官桂

李隆吉

客寒入於腸絡欲大便必先腹痛便解痛已

旬日無濁氣下泄此屬腸痺

公丁香柄

柴胡

木香

白芍

烏藥

川棟子

化入更衣丸五粒

464.

朱客 肋稍隱隱痛卧起亥甚冷汗背有微寒兩足帶
冷身體仰卧稍安左右不堪轉側此皆脈絡中病良由
客寒閉其流行兩脈逆亂上犯過也治在血分通絡補
虛

枸杞子 炒酸朶乾 當歸小茴全炒黑 桃仁 炒炭山甲

脉數重按無力左腰脇痛不能轉側舌胎白邊紅心中
熱悶不欲飲是濕邪滯着經絡阻痹宜進氣分輕清之
藥庶幾不傷正氣

茲仁 杏仁 川貝 佩蘭葉 西瓜翠衣

卷三 葉案

毛

又 脈數左腰脇疼未止舌苔黃昨進芳香輕劑略安
仍不宜重藥

佩蘭葉 淋梔苓 南沙參 薏苡仁 川貝

又 脈數無力左腰脇疼未止舌色轉紅是病邪雖稍
緩却陰氣已經不振進清餘熱略兼養陰方

川貝 淩芩 麥冬 阿膠 川斛 知母

又案 脈數無力左腰脇疼未止舌苔已退雖病邪稍
緩但陰氣仍然不振議用清餘熱畧兼養陰方

川貝 淩芩 麥冬 阿膠 川斛 元參

胸中不爽是痰氣之阻倣小青龍法開太陽爲主蓋少
陰逆太陽氣化不至也

470. 五味 炙草 茯苓 杏仁 泡淡薑 生白芍

腑氣鬱滯爲熱中宮少穀爲虛腹滿濁濁口中味淡乃
幼科五疳之病

使君子肉 一兩 雞肫皮 一兩 肉果 五錢 川連 五錢

乾蟾 一隻 枳實 五錢 蕃蕷 五錢 新會陳皮 一兩

山楂肉 一兩 白芍 一兩 人參 三錢 飯灰 一兩

水泛爲丸米飲送下二錢每早空心服一服

471

尖田人案 腹痛三年夜分乃發發必腹滿嘔不出物
繼而泄瀉此爲脾厥脾爲太陰之臟在臟體屬陰其運
用則陽厥陰肝病必有前陰見症用治中法

人參 木瓜 炮薑 廣皮 青皮 生益智

茯苓

淋症愈後半年交五六月復發雖係肝胆鬱熱亦必是
暑邪內蘊六腑皆爲之不利胸腹如悶溺色赤混如血
宜先清熱宣腑陽然後再調本病

捲心竹葉 寒水石 車前子 牛膝根 廣橘紅

黑山梔 川鬱金 滑石

忍精而溺尿管閉塞此淋症也古云痛則不通用千金

方法

杜牛膝 麝香

三分研細調入

久瀉欲嘔腹中有形升起痛楚小便不利喜食麥麪皆
肝厥內風襲胃之症緣稚年驚恐多煩多哭氣逆風旋
蛔不自安而動久調必痊必當苦降辛宣酸泄風木得
和脾胃可安東垣老人治脾胃必先遠肝木矣

川黃連 白芍 烏梅 乾薑 桂木

卷三 葉案

三

川棟子 川椒紅 炒黑爲末烏梅肉爲丸每服二錢

米飲下忌食甘

老人久嗽古人但以溫養脾胃未必以肺藥見病治病

貽害但身小質薄絡脈單弱桂附雄猛液枯必犯肺癆

此溫劑通納爲無弊耳

薑汁製熟地

四兩

補骨脂

一兩

枸杞子

二兩

懷牛膝

一兩
五錢

茯苓

四兩

五味子

一兩
五錢

胡桃肉霜

三兩

淡蔻荳

一兩
五錢

車前子

一兩
五錢

角沉

五錢

蜜丸淡鹽湯送下

脈細有遺症是陰虛不主收納因沖氣上激爲咳嗽肺

藥無益今胃納頗好急宜填下絕慾安養尚可圖愈

熟地 杞子 建蓮 茯神 山藥 茄實

胃病治法

小川連 三錢 鹿角霜 一兩 炒當歸 一兩 淡薑 五錢
水炒

生香附 二兩 生晒茯苓 二兩 炒黑小茴 一兩
山楂肉

炒 二兩 生川棟子肉 一兩 水泛爲丸

右足痛方 此瘓症也因肝腎兩虛陽明脈絡失用筋
縮牽強足痛不堪動作當溫散下焦莫進疎解

川烏 北細辛 草薢 乳香 没藥

韭菜地上白頸地龍 晚蠶沙煎湯泛丸每日服二

錢陳酒下

形瘦身長稟乎木火肝風內動挾火上巔忽然眩厥跌仆況陽舉遺濁陰分久虛擬壯水之主以制陽光法

大生地 大熟地 天冬 麥冬 鹽水炒川柏

痛脹甚於暮夜病根已在陰經從前溫補相安今則服之不應因以寒凝痰滯爲患進神保丸卽上吐下瀉此非有形之滯矣斯臟液日耗爲虛腑經陽氣窒塞爲實行癰日久時愈時發脈來六至濕熱居多今關節腫痛



遊走不定是濕熱中又挾風火矣總宜養血清熱兼用

風劑庶幾有中病情耳

方失

陽邪入厥陰之陰嘔逆二三日不正腹痛便秘發熱口

乾手足冷

麥冬 蕃汗 枳實 沉香 川連 阿膠 赤石

人參 韭白 猴鼠糞

痧是肺胃氣分邪火內迫津液上焦受損元未全復更
爲夏熱內蒸其血不必爲陰虛治秋末入冬用清燥意

天冬 麥冬 知母 川貝 水梨肉

483

久嗽失音脈小痰冷衝氣入暮爲重此肺虛氣餒不易
驟愈酒家有飲邪

桂苓甘味湯

奔走煩勞暴熱上蒸致身中陽氣不交於陰四肢麻木
內風屬陽之化左屬肝肝性剛柔劑為宜若用酒藥益
助其動陽是矛盾矣

生地 天冬 白蘿蔔 沙蒺藜 桑寄生
女貞子 炒枸杞 川石斛

夏月足跗肌浮是地氣著人之濕傷在太陰陽明初病

485

484

失血繼而嘔涎拒食此脾胃濕傷漫延乃爾

五苓散去澤瀉加用益智仁厚朴、滑石、陳皮

吳江陳長
酒客脾胃自來不旺大便不實奔走勞動

失血乃形色之傷止血理嗽無非清滋聲音日啞肺痿

氣餒難治之症

人參、茯苓、米仁、炙草、白芨、黃精

楓橋汪厚
腸膈左右懊惱不舒嘔逆帶血凡人藏府

之外必有脉絡拘拌絡中乃聚血之地中年操持皆令耗血血不和氣氣攻入絡病狀難以自明宣通血分以

和絡俾不致瘀着可免噎膈反胃

新絳 青葱管 橘葉 桃仁 瓜蔞仁 鈎勾

瀉口 吳

面黃白削瘦無神腹大臍突足冷腫重自言

如著囊沙曾經用藥攻下下必傷陰而脹滿不減乃濁

陰錮閉陽傷見症病在不治之條但用藥究宜溫熱以

冀通陽泄濁之物土血壅逆無非散寒清火通利

吳生川附 椒目 炒乾薑 炒小茴 車前子

長善浜 歐罟大聲用力氣逆失音雖陰虛腦泄亦必

用輕揚肅上

或取食山楂胃熱要以

桑葉 桑葉 生甘草 象貝 米仁 沙參

490.
勞傷胃痛

熟桃仁 延胡索 柏子仁 當歸尾 炒丹皮

漏蘆

491.
楊十九 沖年陰火未宣情志不和易於動怒氣火逆逆

絡血隨之上溢間納食不旺氣衝血上必撫摩氣降血不出口但絡中離位之血恐致凝遏越日必氣升湧逆矣

蘇子 丹皮 降香末 炒桃仁 米仁 炒查炭

韭白汁

紹興卷三十一 少腹痛堅攻及當臍每午後必氣脹滯

痛貫串腰尻環跳肉腠之間肌膚亦漸浮腫再問經事
愆期僅得些微黃水是陰寒已入血絡病蓋起於產蓐
累及奇經入脈身偃不直俯不能仰此肝腎入奇經之
見症

炒枯腎氣湯

徽州四十六 此痰飲宿病勞怒遇冷卽發十年之久焉

能除根

桂苓五味甘草湯

楓橋 四十三

此肝病也 肝屬木主筋木藏內寄風火情

志不適熱自內起 樞筋襲脈肢體爲之牽強不舒 惟怡
悅靜養可希漸愈藥無除根之理

何首烏

枸杞子

桑寄生

當歸身

杜仲

沙苑蒺藜

師婆橋

六十三寒入厥陰之絡結爲氣亦痛則氣脹上

升氣消絕無形跡老年下元已乏勿與破氣攻疝宜溫
養下元爲主尿管脹是阻溺當佐以通陽倣香草丸法

鹿茸 麝香 當歸 青鹽 茜子 蛇牀子

覆盆子 大茴香

嘉興 廿八色脈是陰虛其喉妨食納乃陰乏上承熱氣

從左土升內應肝腎陰火前議復脈法大便滑泄知胃

氣久爲藥傷不受滋陰必當安閑靜室以調之豈偏寒

偏熱藥能愈

人參 筍神 扁豆 木瓜 石斛 北沙參

來安縣 四十六 痘起痰飲漸爲嗽喘外寒遇勞倦即發

發必胸膈氣脹吐出稀涎濁沫病退則痰濃氣降乃已

凡飲邪皆陰濁凝聚兩年之久漸漸腹中痞悶妨食肛門尻骨坐則無恙行動站立時時氣墜若欲大便顯係腎虛不能收攝惑於在前見痰治嗽苟非辛解卽屬寒降乃致釀成錮疾

腎氣湯加紫衣胡桃沉香汁

吳趨坊四十五

清竅在上焦氣分播鼻宣通固是好法

但久恙氣鉢濕痰必生茶調散卧時服五分

薄荷八錢

川芎四錢

荆芥四錢

羌活二錢

白芷二錢

防風

一錢細辛一錢

炙草二錢

茶調勻服

海寧 廿六
勞怯是腎精內損真陰枯槁龍雷之火閃爍
無制腎脈循喉屢受陰火燔灼必糜腐而痛冬無藏精
春生亦無生發胃氣已索草木何能挽回

猪膚湯

葑門 三十九 過勞熬夜陽升痰血在土旺之令中夜熱
非因外感肺尺中動左數肝腎內虛失收肅之令

北沙參 玉竹 麥冬 扁豆 生草 青甘蔗

嘉善 三十二 肺痿失音形枯氣損用甘藥調和不宜辛

散滋寒矣

黃芪 白芨 米仁 茯苓

503. 502.
主門六十九 望七精力不及壯盛 凡男子必下焦先虛

跌仆致損乃係外傷筋縱骨短屈不能伸是足外踝留
著瘀凝須俟夏月令瘍醫磁針砭刺可愈還少丹

熟地 山藥 枸杞 黃肉 茯苓 杜仲 遠志

五味 楮實 小茴 巴戟 茼蓉 石菖蒲

加棗肉爲丸

唯亭十八 讀書身靜心勞兼以夜坐浮陽易升年少雖
未完姻然情欲一萌多致不自保惜陰中龍雷挾木中

相火沸動失血咳嗽是藏陰不爲溢謐暫緩書卷早眠
晏起百日中勿加雜念擾亂可以全愈若以草木希愈
非要領也

知柏八味丸加五味子

江寧

廿一

食已夕頃酸水湧嘔饑時不食又不安適此

久病胃虛而陽乏運行濁陰凝聚使然春季以辛溫開
導氣分不效思虛中挾滯泄濁溫通必佐養正苟不知
避忌食物焉能取效

吳茱萸 淡乾薑 桉苓 熟川附 小川連



熟半夏

505
陝西 四十七

痰飲乃陰濁所化以漸有形阻礙陽氣不

得入於陰陽蹻穴空夜不熟寐靈樞用半夏秫米湯謂

通陰交陽痰飲不聚也天王補心丹一派寒涼陰藥轉

爲濁陰樹懶矣護陽爲要著仲景云凡痰飲當以溫藥

和之

小半夏湯加秫米

同里 五十三 瘦人多燥癰瘡熱氣由四末乘至中焦胃

中津液爲邪熱劫爞不飢不食五味不美是胃陰傷也

人身不過陰陽二氣偏則病離則不治矣

人參 麥冬汁 知母 生甘草

糧船

四十

氣塞填胸阻喉不飢不食問病起嗔怒寅卯

病來臨晚病減凡氣與火必由少陽之木而升故上午

爲劇

瓜蔞皮 黑梔皮 薄荷梗 神麴 新會皮

青蒿梗

淮安 三十九 性情古執氣鈍少靈慧凡心藏神腎藏精

少年先病精神不易充旺宜用六味加遠志菖蒲開通

心竅腎精俾得兩相交合

509
流貞菴 三十七眷 上年五箇月小產二次再加冬季服

事病人產虛在陰勞傷在陽此歟嗽吐粘濁氣逆嘔食之由來也 凡食入胃傳腸此歟是下虛不納氣衝湧水上泛胃乏運行食亦繼出奈庸工不明傷損陰中之陽僅僅消痰清肺一派寒涼必致胃倒敗壞

桂苓甘味湯

泰興 三十七眷 十年前因夜食凝滯閉氣食物遂胃脘

痛嘔吐病發腹大如懷姪得氣後洩而脹消經准不孕

來必腹痛病根全在氣分用藥必兼祛血分寒凝乃合
病機

吳茱萸 秦椒 川棟子 高良薑 延胡索

蓬莪逆 生香附 南山楂 生薑搗汁泛丸

舟里五十 肺痿聲啞胃減食入不安難治之虛損

戊己湯

東山六十 血痺氣滯腹中不和而大便燥夏季以柔
辛潤交霜降土旺之運連次腹痛目皆變黃此非黃疸
是濕熱瘀留阻壅乃爾

炒桃仁 郁李仁 茄蔚子 冬葵子 蒜菜葉

淮安 四十六 食物有形之滯從胃入腸若心胸之下皆

陽氣游行之所因初起停食幾年疑惑其實陽不轉旋而致結痺

括薑薤白白酒湯

揚州 四十四 痰飲哮喘遇寒勞怒卽發小青龍湯去麻

黃

木瀆 三十二 卷 經水不來是絡脈無血古云氣旺血自

生大忌通經

人參 歸身 茯苓 桂心 穀草

精羊肉膠和丸

黎里

四十四

形色脈象確是陽虛酒食聚濕濕注入腸

腸痔下血濕爲陰濁先傷脾陽陽微氣衰麻木起於夜

半氣血交代之時中年癥中大有可虞

人參 生於术 炮薑 炒黑附子 炙甘草

嘉興十八陰火必從晡暮而升寐中呻吟是浮陽不易

歸猶形瘦食少盜汗攝固其下爲是

六味加阿膠入中白

518.

嘉興十一腎肝內損必致奇經失職俗醫混稱陰虛僅以錢仲陽小兒所用六味曰補陰和陽益藏泄府要知此時仲陽非爲虛損設立

人參 紫河車 坎炁 人乳粉 秋石 袞苓

五味子 紫衣胡桃

婁門六十七 左右爲陰陽之道路向衰年歲操持經營且不獲利心境失暢氣血不和久則拘束爲痛甚於夜者陽氣衰微入夜陰用事而病加也十二味養營法

人參 白朮 茯苓 炙草 當歸 白芍 地黃

黃芪 陳皮 桂心 遠志

520

海鹽 四十二 據述緣季秋外邪變瘧延及百日始愈凡
秋瘧是夏月暑濕熱內伏新涼外觸引動伏邪而發俗
醫但知柴葛解肌暑濕傷在氣分因藥動血血傷攀痺
筋熱則弛筋寒則縱遂致釀成痠痺難效之症

當歸身 紫寄生 生虎骨 拘杞子 撫芎

沙苑蒺藜

521

東山 三十四 精損於下陰中龍雷燃燐莫制失血後肛
瘍膿漏卽陰火下墜所致行走喘促涎沫上湧是腎不

攝納真炁五液燮沫湧逆無治痰治嗽之理扶胃口攝
腎真乃爲對病之藥

人參 茯苓 坎炁 五味子 紫石英 艾實

湖蓮 山藥

閭門三十四 舌粉白心中寒嘔酸不止理胃陽必佐洩

肝逆

吳茱萸 川棟子 生炒黑附子 高良薑

延胡索 雲茯苓

萬年橋廿八卷 半產重於小產左脇下痕形是氣乘肝

絡攻之則變爲中滿從前有震動胎墜嘔逆寒熱之傷
今當培養氣血正旺則痕自消不可怠忽致延勞怯

當歸 白芍 鱉血製柴胡 茯苓 蒸於术

南棗 炙甘草

中由吉菴 廿八卷

人參 北沙參 袪神 青苧 真紋銀

關上十九 氣洩用陽藥固氣若治嗽滋陰引入勞病一

途 黃芪建中湯加人參

同里 廿七 幼年成婚太早精炁未充先洩上年洩瀉繼

526.

525.

524.



加瘦嗽納食較多形肌日瘦今秋深喉痛是腎精內乏
陰中龍雷閃爍無制當此秋令肅降藏職失司明歲穀
雨萬花開遍此病危矣

秋石拌人參 生紫石英 紫衣胡桃肉 茯神

女貞實 五味子

楓橋十八春正月寒威未去吸受寒氣先傷胸膈胃脘

之陽食已噯噫陳腐酸濁之氣是清陽不爲轉旋忌進
黏腥厚味暫用蔬食數日

草撥 益智仁 砂仁殼 土薑皮 生薑

528.

江宣 廿九 病人述上年五月住直隸白溝河北方不比

南地濕蒸則熱夜坐仍涼想是時寒熱亦是輕邪醫用
滾痰丸下奪表邪閉結不出肺痠音啞喉癟嚥物艱難
彷徐之才輕可去實用有氣無味之藥

射干 生甘草 大力子 麻黃苗 蟬衣

圓圓滑石 連皮杏仁

529.

無錫

廿二

嗽血秋季再發夜熱汗出全是陰虧見症大
忌肺藥理嗽絕欲百日助其收藏胃口尚好腎肝陰藥
中必佐攝納



熟地 五味子 山藥 茄實 湖蓮 茄神

無錫 三十 腸痛失血以柔劑緩肝之急

炒熟桃仁 柏子仁 當歸尾 炒黑丹皮

鉤藤鉤

鳳陽 三十八 膺後脾弱肝乃乘之中氣不舒所以易生

嗔怒

焦白朮 生益智 茶芩 廣皮 枳實皮

檀香末 水泛爲丸

徽州 三十五 仲景云厥陰病氣上撞心明示木中風火

上行多氣少血陰虛之象治以癥症痰火有餘大謬

女貞子 天冬肉 荸神 小生地 山萸肉

建蓮肉 赤金箔

淮安 甘二 露薑飲止瘧是益中氣以祛邪虛人治法皆

然脾胃未醒宜忌腥酒濁味

大半夏加益智橘紅薑汁泛丸

崑山 六十 老年形寒足痿喰痰男子下元肝腎先衰

真陰少承五液變痰倘情懷暴怒內風突來有癥中之憂戒酒節勞務自怡悅壯其下以清其上是根本治法

熟地 莪肉 淡蕊蓉 川石斛 青鹽 枸杞

淮牛膝 鹿角膠

山西 三十九 夏季吐血秋深入冬頻發診脈右弦空左

濡是形神兩傷絡血不得寧靜氣血因經營而耗不比

方壯矣

黃芪建中湯

開門橋

廿九 織梭肢體皆動過勞則氣血不流偏倚爲

病左脇痛失血肝絡傷瘀發久必重

炒桃仁

延胡索

降香末

炒丹皮

鈞藤勾

537.

湖州 廿四 少壯病不復元失於保養延爲勞嗽胃氣尚

好可與填精固下

都氣丸去丹澤加胡桃肉二仙膠

538.

吳江 廿七 肌肉日削竟夜內熱是內損陰虛漸延勞怯

安逸可久天暖氣洩病必漸加

早服牛乳一杯 另服補陰丸

539.

寧波 四十八 七疝肝病爲多病發有聲响爲氣疝寒入

募絡積病堅硬下墜宜用八味加大茴香葫蘆巴

540.

楓橋 廿七 眩暈嘔水心中熱神迷若癇皆操持運機君

相升舉蒙冒清神生薑辛可通神但氣溫先升佐入涼

降劑中乃可 温膽湯

南潯

廿三

凡外邪入肺而咳嗽者可用表散藥若內傷

累及於肺而致嗽者必從內傷治汗之則泄陽氣肺痿

音低顯然藥悞

黃芪 黃精 藜仁 白芨

運漕

四十四

冬藏失司嗽吐涎沫是腎病也醫見嗽咸

以肺藥治嗽宜其年餘無效

桂苓甘味湯

543.

黃家巷廿七 色奪脈促寒露霜降嗽甚風冷形肌凜凜

衛陽疏氣易泄也

小建中法

544.

徽州四十三 操持太過肝腎浮陽上升乘胃宿不成寐

金匱酸棗仁湯

545.

興化廿四 肝瘍成漏年餘真陰五液皆傷納食在胃傳

入小腸而始變化因欬痰不出必嘔盡所食乃已喉痛失音涎沫吐出喉中仍似存留明明少陰脈中陰火內燦上燔陰液蒸變涎沫內損精血醫見欬嗽音低咸進

清金潤肺不明此咳嗽之原是速其篤已

546.
猪膚湯

宜興十九
瘡痢後脾胃兩傷用繆氏法

547.
雙補九方

齊門外三十卷
上年產蓐無乳已見血虛之象延半年
後經水不來少腹瘕氣有形病人自述背脊常冷心腹
中熱視面黃色奪問食少不美夫督脈爲陽脈之海由
腰而起剝頸而還下元無力陽虛背寒任脈爲陰海之
衝氣攻入絡爲瘕考內經圖翼病機宛然在此產損

蓐勞非是小恙無如醫不讀書見寒熱經閉而妄治淹
纏日久速其篤已

548.
人參 鹿角膠霜 桂枝 當歸 小茴炒 枸杞子
沙蒺藜 白薇

金匱十七 夏伏暑濕秋季如瘧邪不盡解能食不化腹
中氣滯有形脾胃不和用東垣清暑益氣法

人參 黃芪 白术 青皮 陳皮 神曲 矢草
麥冬 五味 黃柏 澤瀉 當歸 升麻 葛根
蒼朮 薑棗煎



太平 四十九

左脇有形漸次腹大每投攻下泄奪大便

550

得瀉脹必少減繼則仍然不通頻頻攻下希圖暫緩病
中脹浮下部加鍼刺以決水之出腫消病仍不去病患
六年久已斷想此病之愈要知此病初由肝氣不和氣
聚成瘕屢發攻瀉脾胃反傷古云脾突傷脾今之所苦
二便欲出痛如刀刺蓋氣脹久下再奪其血血液枯氣
愈結矣宣通宜以利竅潤劑

琥珀屑一錢麝香一分大黑豆皮四錢杜牛膝一兩

二便通後接服

菟蔚子 郁李仁 杜牛膝 當歸身 冬葵子

南京 廿八環跳筋骨痠痛少年精傷陽維脈少護衛

當歸 巴戟 生虎脰骨 枸杞 沙苑蒺藜

川牛膝 羊內腎搗丸

橫溼 三十 労傷虛體脹病初愈因動怒氣鬱不食二

便皆阻從腸痺定議仿丹溪開肺法以肺主一身之氣
化

杏仁 蘇子 桑葉 紫菀 薤皮 桃仁

嘉興 五十三 情志內鬱心痛如絞形瘦液枯不可氣燥

熱藥

炒桃仁 柏子仁 小胡麻 炒丹皮 延胡索

鈎藤鈎

554.

中由吉卷

四十七
卷

病人述自腰以下頽然瘓

內麻

木枯寂二便不爽上下氣不接續顯然崩漏亡血一物不下交於陰中年日就衰奪惟辛補潤燥冀絡止氣以痛勢漸緩

郁李仁 枸杞子 肉蓯蓉 冬葵子 柏子仁

桑寄生 松子仁 黑芝麻

卷三 葉案

異

流貞巷

四十九

漏經繼下如卵形已見血損氣結故任

脈爲病女子帶下瘕聚少腹形象是也血傷忌投氣燥溫熱但血藥不取沉滯血中宣氣爲是

南山楂

茺蔚子

青葱

新絳

生香附

泰興三十七精未生成強洩最難充旺至今未有生育視形瘦問食少精薄易泄形脈不受剛猛陽藥議藉血肉有情溫養氣血

鹿鞭

羊內腎

淡蕊蓉

瑣陽

生兎絲子

枸杞子

舶茴香

牛膝

青鹽

557

楓橋 五十三

咽管似乎狹窄一身氣化全在於肺因胃

熱薰肺肺職失司年紀日多氣結癥阻以薄味肅清上
焦藥宜氣輕理燥

鮮枇杷葉 杜蘇子 米仁 桑葉 降香末

茯苓

558

陳家橋 三十六 濁止足踵膝首瘻痛病起夏秋必接地

氣之濕濕自下受酒客內濕互蒸內外合邪湯藥決不
取效 瘀痛丹一錢六服

閭門 中焦痛起四末逆冷汗出嘔延及食物此屬脾

厥門

龍溪四未山今平出酒

安身

四

炒黑附子

粗桂枝

草果仁

延胡索

片薑黃

太倉

卷十八

每交夏五六月喉間宿病俄發既愈後仍然

鼻塞火升上熱下冷經水或前或後形瘦脈小數是陰

弱不旺肝陽左升太速右降不及夏令陰伏於裏陽泄

上浮乃發病根由

阿膠

石決明

生地

天冬肉

丹皮

黑豆皮

銀花

白芍藥

丹參

十四歲室女無溫熱藥之例視色奪脈弱下焦未寒先

冷經事淋漓是衝任虛冷二炁不交冬宜藏陽用溫攝

升陽

麋茸 人參 沙蒺藜 鹿角霜 歸身 杞子

紫石英 小茴香 蛇牀子

同里 廿 夏令熱氣傷陰失血冬藏氣降血症必然不來
肉瘦精虧嗽不肯已但宜滋培藏陰預防春深升泄不
可以藥理嗽固本法加五味子

人參 熟地 生地 麥冬 其 天冬 五味子

沐陽 五十四 住居臨海風瘴癘氣不似平原人衆稠密

處瘴癘侵入腦髓骨骼氣血不和漸次壅遏上蒸頭面
清陽脾阻經年累月邪正混處其間草木不能驅逐憑
理而論當以蟲蟻向陽分疎通逐邪

564. 蟦蟻一兩仙靈脾五錢蜂房五錢川芎一錢

火酒飛飴泛丸

同里四十五心痛得食而緩是積勞營虛大忌辛通破

氣

桃仁 彌身 柏子仁 桂圓肉 炒黑芝麻

廿三病人述遇春季失血煩勞必有衄血凡冬月大氣

藏伏壯年自能聚精彙神不加保養春半陽生升發反爲發病根機是皆身中精氣之薄胃旺安納能自節欲靜養則神乃藏

熟地 莪肉 山藥 茄實 湘蓮 桃核

金櫻子 五味子 青龍骨

湖州 三十八 太陰腹脹是久勞傷陽不饑不能食二便不通暢溫以通陽苦溫疎滯

熟附子 熟大黃 草果仁 生厚樸 生薑

廣陳皮

567.

山塘七十五

立冬未冷溫熱之氣外入引動宿飲始而

狀如傷風稀痰數日繼則痰濃咽乾是少陰脈中乏津

土承五液盡化痰涎皆因下虛易受冷熱是以飲邪上

泛老年咳嗽大要宜調脾腎最忌發散泄肺理嗽暫用

越婢法

麻黃

石膏

甘草

芍藥

生薑

大棗

槐樹菴

廿三

自乳能令陰傷秋初巔脹失血是肝火上

衝使然令妊娠三月法當養陰固胎

人參

子芩

阿膠

桑寄生

白芍

黑殼建蓮



常熟

三十二卷

常熟

三十二卷

常熟

寡居無歡悅之念肝膽中氣火鬱勃直上

直下莫能制伏失其躁泄之用小溲成淋謂肝脈環遶

陰竅用龍膽瀉肝法

龍膽草

黃芩

梔子

當歸

生地

柴胡

澤瀉

木通

甘草

車前子

常熟

廿七卷

常熟

瘡母痕聚有形治有宣通氣血第所述病狀

已是產虛八脈交損不敢攻痕

當歸生薑羊肉湯

徽州三十九仲景論痰飲分二要外飲治脾內飲治腎

又云凡飲邪必以溫藥和之聞方從腎藏主治不爲背
謬陽氣微弱濁陰固聚自下上逆喘不著枕附子走而
通陽深爲合理第其餘一泓滋柔護陰東縛附子之剽
疾

真武湯

甘草 車前子

四十九 積勞傷陽腹膨仍硬脈弦無胃氣形肉衰削理
中宮陽氣之轉旋望其進食無能却病矣

人參 淡附子 穀芽 桂苓 益智仁 廣皮

炙草

北城下 三十六 溫疹是一股乖戾不正無形之氣役口
鼻吸受上竅阻塞喰物不得下咽醫不辨有形無形但
曰清火寒降至藥直入腸胃與咽中不相干涉

連翹心

馬勃

牛蒡子

銀花

鮮蘆根

574.

武進 四十六

陽傷胃反

熟附子

淡乾薑

桂枝

黃連

厚樸

茯苓

575.

宿遷 四十七

冬月涉水水寒深入筋骨積數年而脰膝

骨冷筋縱病在下爲陰水寒亦是陰邪久則氣血與邪
混亂草木不能驅逐古人取蟲蟻佐芳香直攻筋骨用

許學士法

炒烏頭 全蠍 麝香 飛麪火酒泛丸

同里五十六酒熱深入血分瘀嘔盈益越六七年病變

反胃妨食嘔吐涎沫問大便仍通結閉止在中脘先宜

通瘀開閉

韭白汁 金墨汁 生桃仁 生蒲黃 延胡索

片薑黃

吳江十六天癸尚未至肉瘦形悴嗰嗽著枕更劇暮夜

內外皆熱天明微汗熱減痰出或稠或稀咽中總不爽

利此先天稟賦之薄稍長真陰不旺陰虛則生內熱怡
悅勿事鍼黹必俟經來可得熱除不然卽世俗所稱乾
血勞怯

復脈法去麻仁

578.
無錫三十九

任脈爲病男子內結七疝女子帶下瘕聚
問經水仍至知是氣攻入絡漸次有形況產後又十六
年不育衝任之病顯然

小茴 川棟子 橘核 甜桂枝 蓬莪遂

生香附 南山楂 雲茯苓

57.

南京三十二通中焦氣血痛緩嘔食是胃氣虛逆

旋覆代赭湯

南京三十五 頻年發失血症嗽甚痰出繼以嘔哕日晡

寒熱夜深汗泄據述醫見血投以鬱金薑黃韭汁製大
黃逐瘀下走希圖血止此是有餘治法夫人稟陰陽偏
則致病自內損傷即是不足脈左動數尺不附骨明明
腎精肝血內奪弱陰無能交應其陽衝陽上逆吸氣不
入是以欬嗽氣并旋必嘔哕濁涎粘沫內經謂五臟六
腑皆令人欬柰何今人以欬治肺見痰降濁清熱損者

更損殆不復藏陰府陽消長之機雜藥徒伐胃氣經年

累月已非暴病填實下隙須藉有情之屬

人參 紫衣胡桃 紫石英 袪神 五味子

山萸肉 河車膠 秋石

官宰術三十一酒客多濕腸胃中如淖泥陽氣陷血下

注昔王損菴以剛藥劫胃水濕

理中湯加木瓜

無錫三十一夏月帶病經營暑濕乘虛內伏寒露霜降

天涼收肅暴冷引動宿邪寒熱數發形軟食減汗出醫

工治嗽恐其胃倒漸致勞怯變凶

歸耆建中湯

雙林菴廿六早食嘔吐酸水濁涎心口痛引腰膀此陽

微濁陰犯絡例以辛熱

川烏頭 高良薑 延胡索 川棟子 白豆蔻

茯苓

杭州廿一據述遺精頻致哮喘病發必甚此腎虛失納

真氣散越之疾少年形瘦難用溫藥治當導入任脈陰海以固之

人參 龜腹甲 坎炁 五味子 紫衣胡桃

黃柏 茄實 金櫻子膏

雙林

廿七

痛而喜按屬虛寒多肢冷是脾厥病大便三

四日一通乃津液約束

炒熟桃仁 火麻仁 片薑黃 當歸鬚

炒延胡索

無錫

三十九
眷

秋七月經停幾兩月繼下血塊疑是小產

遂經漏不止入冬血淨加五心脊椎骨熱天明微汗熱緩凡經漏胎定下元真陰先損任脈陰海少液督脈陽

海氣升所謂陰虛生熱矣以肝腎藏陰精血損傷醫投
芪术呆守中土是不究陰陽氣血不亦左乎

人參 阿膠 建蓮肉 茯神 女貞子 黃肉

生白芍 炙甘草 棠稻根

587.

包衡前四十五自胃痛起咽食又噎近加涌泛粘涎中
年經營勞瘁陽傷清氣不司轉旋上不知饑大便不爽
九竅不和都屬胃病

人參 熟半夏 胡盧巴 草撥 茯苓 老薑汁

陸家浜三十陰邪盛爲腫便溏濁短議通腑陽

生炒黑附子 炒黑遠志 生於木 生厚樸

椒目 茶芩 猪苓 青皮

58P.

南京三十七 外邪窒閉肺竅用輕劑治上食可下咽水
入必嗆者此喉氣有阻也仍以辛潤

杏仁 紫苑 桑葉 茶芩 米仁 通草

59P.

錢塘五十四 閱原案開列皆肝腎病男子中年以後下

元精血先虧有形既去自難充復五液耗奪內風陽氣
易越治宜從陰引陽勿以桂附之剛復

鹿茸 鹿角霜 天冬 天麻 茶芩 淡蕊蓉

卷三 葉案

三

枸杞子 黃甘菊

常山 四十三 食入脘悶嗳氣嘔吐覺爽少焉仍然痞悶

視形軀充偉按脈形小濡中年陽微不運卽爲不足洩
降氣分攻痰是爲有餘治法非此脈症所宜

治中法

淮安 三十二 武略用力逆氣與酒色精傷不同失血在
長夏熱洩之令胸脇跗骨皆痛是肝胃絡傷

桃仁 米仁 降香末 茯苓 蘇子 韭汁

炒山楂 丹皮

葉氏醫案存真三卷終

後學

鍾蟠根愚泉參校
曹維坤雲洲參校

卷三 葉案

五十一



北京中医药大学图书馆版权所有