會稽 張介賓 會卿著
會稽 魯 超 謙菴訂

傷寒下

温病暑病三十三

温病暑病之作本由冬時寒毒內藏故至春發爲温病至夏發爲暑病此以寒毒所化故總謂之傷寒仲景曰發熱不惡寒而渴者温病也暑病則尤甚矣蓋暑病者即熱病也是雖與寒證

不同然亦因時而名非謂其病必皆熱也此外如夏月中暑者亦謂之暑病則又非寒毒蓄留之證在仲景即名之爲中喝義詳暑證門所當參閱

一溫病暑病之治宜從涼散固其然也然必表裏俱有熱證方可治用清涼若值四時寒邪客勝感冒不正之氣表邪未解雖外熱如火而內無熱證可據者不得以溫暑之名執以爲熱而槩用涼藥

一冬有非時之煖或君相客熱之令而病熱者名曰冬溫此與冬月正傷寒大異法宜涼解此舍時從證也若夏有寒者其

宜温亦然

素問刺志論曰氣盛身寒得之傷寒氣虛身熱得之傷暑傷寒論曰脉盛身寒得之傷寒脉虛身熱得之傷暑此二論之言傷寒傷暑者非即温病暑病之謂蓋單指夏月感觸時氣者所當辨其爲寒爲暑而寒則宜温暑則宜清也身寒者言受寒憎寒身熱者言受熱發熱非口身冷者方是傷寒身熱者乃是傷暑也即此二論則一曰氣盛氣虛一曰脉盛脉虛詞若異而理則一也故凡察氣者當在形色察脉者當在本元合而觀之則見理精矣

發斑證輕則如疹子重則如錦紋其致此之由雖分數種然總由寒毒不解而然如當汗不汗則表邪不解當下不下則裏邪不解當清不清則火盛不解當補不補則無力不解或下之太早則邪陷不解或以陽證誤用温補則陽元不解或以陰證誤用寒涼則陰凝不解凡邪毒不解則血大陰分鬱而成熱乃致液涸血枯斑見肌表此實毒邪固結營衛俱劇之證也但斑有微甚勢有重輕輕者細如蚊迹或先紅而後黃重者成粒成片或先紅而後赤輕者只在四肢重者乃見胸腹輕者色淡而隱

重者色紫而顯若見黑斑或大便自利或短氣或二便不通則十死九矣凡病傷寒而汗下温清俱不能解及足冷耳聾煩悶咳嘔者便是發斑之候

一成無已曰大熱則傷血熱不散裏實表虛熱邪乘虛出於皮膚而爲斑也愼不可發汗若汗之重令開泄更增斑爛也自後諸家所述皆同此說予則以爲不然蓋凡傷寒之邪本自外而入深入不解則又自內而出此其表裏相乘勢所必至原非表虛證也但使內外通達則邪必由表而解矣即如犀角地黃湯乃治斑之要藥人知此湯但能涼血清毒而不知

此湯善於解表散邪若用之得宜則必遍身大汗熱邪頓解何爲不可汗耶由此言之則凡脉數無汗表證具在者必須仍從解散

一凡治發班須察表裏如瘟疫不解熱入血室舌焦煩熱發班者犀角地黃湯○內外俱熱陽明狂躁大渴發班者白虎湯或加人參○陽毒赤班狂言見血者陽毒升麻湯○疫癘發班大熱而燥者三黃石膏湯○火鬱於經寒邪不解脉仍滑數而發班者一柴胡飲○陽明外邪陽毒不解者升麻湯○脾腎本虛外邪不解而發班者五柴胡飲○陽明表邪不解

温熱發班者柴胡白虎煎○温熱毒盛咽痛發班者玄參升麻湯○陰虛水虧血熱發班者玉女煎○陰虛血燥大熱大渴發班者歸葛飲○內虛外實陰盛格陽發班者大温中飲○太陽陽明惡熱大便秘結邪毒在府發班者調胃承氣湯一凡本非陽證妄用寒涼者每令人泄瀉邪陷不解予常用大温中飲理陰煎之類解寒托邪始得大汗汗後邪達多有見赤班風餅隨汗而出隨出隨没頃刻即愈活者多人矣凡寒毒爲班即此可見使內托無方則此毒終無出期日深日甚難乎免矣此理甚微不可不察

發黃三十五

凡發黃黃疸等證多由濕熱如小水不利或黃或赤或小腹脹滿不痛或大便實而渴甚脈來沉實有力皆濕熱之證輕則茵陳五苓散重則茵陳湯分利小便清血瀉火則黃自退矣然黃有陰證及諸治法俱詳黃疸門宜參用之

仲景曰太陽病脈浮而動數頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反下之則爲結胸若不結胸但頭汗出小便不利身必發黃也○曰陽明病無汗小便不利心中懊憹者身必發黃○陽明病發熱汗出者此爲熱越不能發黃也但頭

汗出身無汗際頸而還小便不利渴飲水漿者此爲瘀熱在裏身必發黃茵陳蒿湯主之○曰傷寒脉浮而緩手足自温者繫在太陰身當發黃若小便自利者不能發黃至七八日大便鞕者爲陽明病也○曰傷寒發汗已身目爲黃所以然者以寒濕在裏不解故也以爲不可下也於寒濕中求之

傷寒身黃發熱者梔子蘗皮湯主之

孫眞人曰黃疸脉浮者當以汗解之宜桂枝加黃耆湯

發狂三十六

傷寒發狂本陽明實熱之病然復有如狂證者雖似狂而實非

狂此中虛實相反最宜詳辨不可忽也凡實熱之狂本屬陽明蓋陽明爲多氣多血之經陽邪傳入胃府熱結不解因而發狂內經陽明脉解篇曰胃者土也故聞木音而驚者土惡木也其惡火者熱甚則惡火也其惡人者以陽明厥則喘而惋惋則惡人也其病甚則棄衣而走登高而歌或數日不食或踰垣上屋者以四肢爲諸陽之本陽盛則四肢實實則能登高也其棄衣而走者以熱盛於身也其妄言罵詈不避親疎而歌者以陽盛爲邪也又曰陰不勝其陽則脉流薄疾并乃狂又曰邪入於陽則狂是皆以陽明熱邪上乘心肺故令神志昏亂若此此陽狂

也然傷寒病至發狂是爲邪熱已極使非峻逐火邪則不能已故但察其大便鞕結或腹滿而堅有可攻之證則宜以大小承氣或涼膈散六一順氣湯之類下之可也如無脹滿實堅等證而惟胃火致然者則但以白虎湯抽薪飲之類泄去火邪其病自愈

一如狂證本非實熱發狂其證亦有輕重如仲景曰太陽病不解熱結膀胱胱其人如狂其外不解者尚未可攻當先解外外已解但少腹急結者乃可攻之宜桃仁承氣湯○又曰太陽病六七日表證仍在脈微而沉反不結胸其人如狂者以熱

在下焦少腹當鞕滿小便自利者下其血乃愈抵當湯主之

按此二條以太陽熱邪不解隨經入府但未至發狂故曰如狂此以熱搏血分當衆下焦故宜下也

一近見傷寒家則別有如狂之證古人所未及言者蓋或由失志而病其病在心也或由悲憂而病其病在肺也或由勞倦思慮而病其病在肝脾也此其本病已傷於內而寒邪復感於外則病必隨邪而起矣其證如狂亦所謂虛狂也而虛狂之證必外無黃赤之色剛暴之氣內無胸腹之結滯實之脈雖或不時躁擾而禁之則止口

多妄誕而聲息不壯或眼見虛空或驚惶不定察其上則口無焦渴察其下則便無鞕結是皆精氣受傷神魂不守之證此與陽極爲狂者反如氷炭而時醫不能察但見錯亂便謂陽狂妄行攻瀉必致殺人凡治此者須辨陰陽其有虛而挾邪者邪在陽分則宜補中益氣湯之類邪在陰分則宜補陰益氣煎之類虛而無邪者在陽分則宜四君八珍十全大補湯大補元煎之類在陰分則宜四物六味左歸飲一陰煎之類陰虛挾火者宜加減一陰煎二陰煎之類陽虛挾寒者宜理中湯回陽飲八味湯右歸飲之類此方治之宜大畧如此

而變證之異則有言不能傳者能知意在言表則知所未言矣

一凡身有微熱或面赤戴陽或煩燥不寧欲坐卧於泥水中然脉則微弱無力此陰證似陽也名爲陰躁蓋以陽虛於下則氣不歸原故浮散於上而發躁如狂速當温補其下命門煖則火有所歸而病當自愈若醫不識此而誤用寒涼者必死

一發狂下利讝語者不治○狂言反目直視者爲腎絕死○汗出後輒復熱狂言不食者死

仲景論曰太陽病關節疼痛而煩脉沉而細者此名濕痺其人小便不利大便反快但當利其小便○曰濕家之爲病一身盡痛發熱身色如熏黃○濕家其人但頭汗出背强欲得被覆向火若下之早則噦胸滿小便不利舌上如胎者以丹田有熱胸中有寒渴欲得水而不能飲口燥煩也○濕家下之額上汗出微喘小便不利者死利下不止者亦死

論曰風濕相搏一身盡疼痛法當汗出而解值天陰雨不止醫云此可發汗汗之病不愈者何也曰發其汗汗大出者但風氣去濕氣在是故不愈也若治風濕者發其汗但微微似欲

汗出者風濕俱去也○濕家病身上疼痛發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脉大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕故鼻塞內藥鼻中則愈○病者一身盡疼發熱日晡所劇者此名風濕此病傷於汗出當風或久傷取冷所致也

論曰傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自轉側不嘔不渴脉浮虛而濇者桂枝附子湯主之○若其人大便鞕小便自利者桂枝湯去桂加白朮主之○風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之

仲景曰病有結胸其狀何如答曰按之痛寸脈浮關脈沉名曰結胸也○曰病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之因作痞所以成結胸者以下之太早故也○曰結胸脈浮大者不可下下之即死○曰結胸證悉具煩躁者亦死

論曰太陽病脈浮而動數頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反下之胃中空虛陽氣內陷心下因鞕而為結胸大陷胸湯主之○曰太陽病重發汗而復下之不大便五六

日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至少腹鞕滿而痛不可近者大陷胸湯主之○按此二條皆言太陽表證未解因誤下之而成結胸也

論曰傷寒五六日嘔而發熱者此柴胡湯證具而以他藥下之其柴胡證仍在者當復與柴胡湯必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而鞕痛者此爲結胸也大陷胸湯主之但滿而不痛者此爲痞柴胡不中與之宜半夏瀉心湯○按此二條以少陽表證未解因誤下之而成結胸也

論曰太陽少陽併病而反下之成結胸心下鞕下利不止水漿

不入其人煩心○按此一條以太陽少陽併病二經表邪未解亦因悞下而成結胸也

論曰陽明病心下鞕滿者不可攻之攻之利遂不止者死利止者愈○按此一條謂陽明邪氣入府者必腹滿便結今惟心下鞕只邪氣尚淺未全入府故不可攻此雖非結胸而實亦結胸之類蓋不由誤下而因陽明之邪漸深也

論曰傷寒六七日結胸熱實脈沉而緊心下痛按之石鞕者大陷胸湯主之○按此一條不云下早而云熱實其於六七日脈沉緊而心下鞕痛者此傷寒傳裏之實邪有不因誤下而

成結胸者乃傷寒之本病也

愚按結胸一證觀傷寒論所載如前數條凡太陽表邪未解而誤下者成結胸少陽證亦然太陽少陽併病者亦然此不當下而誤下之以致藏氣空虛外邪乘虛內陷結於胸膈之間是皆因下而結者也又曰傷寒六七日結胸熱實脉沉而緊心下痛按之石鞕者此不因下而邪實漸深結聚於胸者也然則結胸一證有因誤下而成者有不因下而由於本病者觀近代傷寒諸書云未經下者非結胸也豈不謬哉

一結胸證觀仲景所言惟太陽少陽二經誤下者有之而陽明

一經獨無言及者何也蓋凡病入陽明胃府已實故可下之而無害也然又曰陽明病心下鞕滿者不可攻之攻之利不止者死此豈非陽明在經表證邪未入府者亦爲不可下乎不惟三陽爲然即三陰之證其有發熱惡寒表邪未解者切不可下最當愼也

一結胸證治之辨凡心腹脹滿鞕痛而手不可近者方是結胸若但滿不痛者此爲痞滿非結胸也凡痞滿之證乃表邪傳至胸中未入於府此其將入未入猶兼乎表是即半表半裏之證只宜以小柴胡之屬加枳殼之類治之或以本方對小

陌胸湯亦妙今余新方製有柴陳煎及一柴胡飲之類皆可擇而用之也至於結胸之治則仲景俱用大陷胸湯主之然以余之見則惟傷寒本病其有不因誤下而實邪傳裏心下鞕滿痛連小腹而不可近或燥渴譫妄大便鞕脉來沉實有力者此皆大陷胸湯所正宜也其於太陽少陽表邪未解因下早而致結胸者此其表邪猶在若再用大陷胸湯是既因誤下而復下之此則余所未敢不若以痞滿門諸法酌其輕重而從乎雙解以緩治之或外用罨法以解散胸中實邪此余之屢用爲效而最穩最捷者也罨法見新方因類第三十

厥有二證曰陽厥曰陰厥也陽厥者熱厥也必其先自三陽傳入陰分故其初起必因頭疼發熱自淺入深然後及於三陰變爲四肢逆冷或時乍温其證必便結譫煩讝語發渴不惡寒反惡熱脉沉有力此以傳經熱證所化外雖手足厥冷內則因於熱邪陽證發厥故爲陽厥乃陽極似陰也其證由邪熱內結或伏陽失下之所致也凡厥微則熱亦微宜四逆散之類厥甚則熱亦甚宜承氣湯之類也○厥陰者寒厥也初無三陽傳經實熱等證而直寒直入三陰則畏寒厥冷腹痛吐瀉戰慄不渴脉

沉無力者此陰寒厥逆獨陰無陽也故爲陰厥輕則理中湯重則四逆同陽等湯主之

成無己曰四逆者四肢不温也傷寒邪在三陽則手足必熱傳到太陰手足自温至少陰則邪熱漸深故四肢逆而不温也及至厥陰則手足厥冷是又甚於逆故用四逆散以散其傳陰之熱證

論曰諸四逆厥者不可下之虛家亦然○成無己註曰四逆者四肢不温也厥者手足冷也甚於四逆也若陽氣少而陰氣多故不可下虛家亦然金匱玉函曰虛者十補勿以瀉之

論曰凡厥者陰陽氣不相順接便爲厥厥者手足逆冷是也○病者手足厥冷言我不結胸小腹滿按之痛者此冷結在膈脘關元也○傷寒發熱四日厥反三日復熱四日厥少熱多其病當愈○傷寒厥四日熱反三日復厥五日其病爲進寒多熱少陽氣退故爲進也○若厥而嘔胸脇煩滿者其後必便血

論曰少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脉微欲絕身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脉不出者通脉四逆湯主之○傷寒脉促手足厥逆者可灸之○傷寒

脉滑而厥者裏有熱也白虎湯主之○手足厥寒脉細欲絶者當歸四逆湯主之若其人內有久寒者宜當歸四逆加吳茱萸生薑湯主之○大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒者四逆湯主之○大汗若大下利而厥逆者四逆湯主之○病人手足厥冷脉乍緊者邪結在胸中心中滿而煩饑不能食者病在胸中當須吐之宜瓜蒂散○傷寒厥而心下悸者宜先治水當服茯苓甘草湯却治其厥不爾水漬入胃必作利也○下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脉四逆湯主之○嘔而脉弱小便復利身有微熱見厥者難治

四逆湯主之

按陽厥陰厥其辨如前此先哲之大法也然愚則猶有所辨如陰厥一證既無陽證陽脉而病寒若此明是陰證今人但曰中寒者即其病也然犯此者無幾知此者無難治宜温中無待辨也惟是陽厥一證則有不得不辨者夫厥由三陽所傳是爲陽厥此固然矣即以傳經者言之又豈盡無陰證乎故凡病真陽不足者即陽中之陰厥也脉弱無神者即陽中之陰厥也攻伐清涼太過者即陽中之陰厥也四肢爲諸陽之本使非有熱結煩渴脹實等證而見厥逆者皆由陽氣不足

也成無已曰大抵厥逆爲陰所主寒者多矣又曰厥爲陰之盛也故凡屬挾虛傷寒則雖自陽經傳入者是亦陽中之陰厥也陰中之陰者宜温陽中之陰者果宜涼乎學者勿謂其先有頭疼發熱但自三陽傳至者便爲陽厥而寒因熱用之則爲害不小矣

一臟厥證仲景曰傷寒脉微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安時者此爲臟厥臟厥者死陽氣絕也

一蚘厥證仲景曰蚘厥者其人當吐蚘令病者靜而復時煩此爲臟寒蚘上入膈故煩須臾復止得食而嘔又煩者蚘聞食

臭出其人當自吐蚘蚘厥者烏梅丸主之○成無己曰藏厥者死陽氣絕也蚘厥雖厥而煩吐蚘已則靜不若藏厥而躁無暫安時也病人藏寒胃虛故宜與烏梅丸温藏安蟲

讝語鄭聲 四十

論曰實則讝語虛則鄭聲此虛實之有不同也夫讝語鄭聲總由神魂昏亂而語言不正又何以分其虛實但讝語者狂妄之語也鄭聲者不正之聲也讝語爲實實者邪實也如傷寒陽明實熱上乘於心心爲熱盲則神魂昏亂而讝妄不休者此實邪也實邪爲病其聲必高其氣必壯其脉必強其色必厲凡登高

罵詈狂呼躁擾之類皆是也此之爲病有燥糞在胃而然者有瘀血在臟而然者有火盛熱極而然者有腹脹便秘口瘡咽爛而然者察其果實即當以三承氣或白虎湯涼膈散之類治之○鄭聲爲虛虛者神虛也如傷寒元神失守爲邪所乘神志昏沉而錯亂不正者此虛邪也虛邪爲病其聲必低其氣必短其脉必無力其色必萎悴凡其目言自語喃喃不全或見鬼惟或驚恐不休或問之不應答之不知之類皆是也此之爲病有因汗亡陽因下亡陰而然者有焦思抑鬱弱厥心氣而然者有勞力內傷致損脾胃而然者有日用消耗腎殘中氣而然者凡其

或雖起倒而遏之即止終不若實邪之難制者即虛邪也察其果虛最忌妄行攻伐少有差謬無不即死治此者速宜察其精氣辨其陰陽舍其外證救其根本稍遲猶恐不及而況於誤治乎甚至有自利身寒或尋衣撮空面壁啐啐者尤為逆候蓋讝妄一證最於虛損者不宜有之故凡身有微熱脉見洪滑者生心多煩燥脉見微弱細急而遲冷者死所以證逢虛損而見有讝妄者即大危之兆不可不加之意也

衄血 四十一

雜病衄血責熱在裏傷寒衄血責熱在表論曰傷寒小便清者

知不在裏仍在表也當發其汗若頭痛者必衄宜桂枝湯○曰傷寒脉浮緊不發汗因致衄者麻黃湯主之此以傷寒之衄爲其熱不在裏在表而然也然又論曰衄家不可發汗而何以復用桂枝麻黃等湯蓋衄由乎陰者以陰虛火動也故不宜再汗以亾陰衄由乎陽者以表邪未解也故當用桂枝麻黃以發散又論曰太陽病脉浮緊發熱身無汗自衄者愈此以表邪欲解不從汗而從血俗人謂之洪汗所以衄後當愈也由此觀之則有因衄而愈者以經通而邪散也有治衄仍當發散者以邪之將解未解而因散其餘邪也治衄之法於斯可見若寒氣不甚

而用麻黃桂枝似屬太剛或易以柴葛之類自無不可用者其酌之

論曰陽明病口燥但欲漱水不欲嚥者此必衄蓋陽明之脈絡於口鼻今其漱水不欲嚥者以熱在經而裏無熱故當鼻衄也

一有動陰血者又非衄血之謂論曰少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道出故或從口鼻或從目出者是名下厥上竭此陰血也乃為危證

傷寒畜血者以熱結在裏搏於血分留瘀下焦而不行也論曰傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者爲有血也○又曰太陽病身黃脈沉結少腹鞕小便不利者爲無血也小便自利其人如狂者血證諦也大抵熱畜血分留結下焦則生狂躁論曰熱結膀胱其人如狂者是也然又有陽明證其人喜忘屎雖鞕而大便反快其色黑者是亦畜血之證故凡診傷寒但其少腹鞕滿而痛便當問其小便若小水自利者知爲畜血之證蓋小水由於氣化病在血而不在氣故小便利而無恙也瘀於下者血去則愈其在仲景之法則以抵當湯抵當丸主之愚謂但

以承氣之類加桃仁紅花以逐之或其兼虛者以玉燭散之類下之則畜血自去而病無不除矣

成無己曰傷寒劒者以邪氣不得發散壅盛於經逼迫於血因而致劒也畜血者下焦結聚而不行不散也血菀於上而吐血者謂之薄厥語癊於下者謂之畜血此由太陽經癊熱在裏搏畜下焦所致經曰太陽病七八日表證仍在脉沉而微反不結胸其人如狂者以熱在下焦少腹當鞕滿小便自利者下血乃愈

論曰陽明病下血讝語者此爲熱入血室是兼男女而言也○
曰婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此爲熱
入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之○曰
婦人中風脉遲身涼而證如結胸者當刺期門○曰婦人傷寒
經水適來晝日了了暮則讝語者無犯胃氣及上二焦必自愈
按血室者即衝任血海也亦血分也凡血分之病有畜血者以
血因熱結而語畜不行也有熱入血室者以邪入血分而血
亂不調也故血畜者去之則愈血亂者調之則安調之之法
則熱者宜涼陷者宜舉虛者宜滋瘀者宜行邪未散者宜解

也然此皆病在下焦故曰無犯胃氣及上二焦必自愈是又不可不察

胸脇腹滿四十四

凡邪氣自表傳裏必先入胸膈以次漸從脇肋而後入胃邪氣入胃乃爲入府是以胸滿者猶屬表證脇滿則半表半裏也大抵胸脇滿者以邪氣初入於裏氣鬱不行所以生滿尚未停聚爲實故但從和解以小柴胡之屬則可愈矣若果實邪在上留滯不能散者乃可吐之華元化曰四日在胸吐之則愈是因邪已收聚而未及散漫者乃可吐也在仲景用梔子豉湯或瓜蒂

散之屬梔子豉湯可吐客熱瓜蒂散可吐實痰其或一時藥有不便余有吐法在新方攻陣中可以代之或即以和解之藥探而吐之無不可也

一腹滿證按華元化曰傷寒一日在皮二日在膚三日在肌四日在胸五日在腹六日在胃入胃即爲入府入府即在腹也若腹雖滿而未甚者猶是未全入府不可攻也然腹滿之證有虛實也有寒熱也不可一槩皆以實論觀金匱要畧曰腹滿不減減不足言當下之是不減者爲實滿也又曰腹滿時減復如故此虛寒從下上也當以溫藥和之是或進或退時

或滅而時復如故者本非結聚實邪此虛滿也大抵腹滿之證本屬太陰若是陽邪則必咽乾煩熱脉實有力若是陰邪則必腹滿吐食畏寒白利脉息無神可以辨之實熱者可清可攻虛寒者宜温宜補也

嘔吐噦證 四十五

嘔者有聲無物吐者吐出食物也嘔者有寒有熱吐則皆因胃寒也凡嘔而發熱煩悶者邪熱爲嘔也嘔而吞酸泠嚥涎沫沉沉者寒邪爲嘔也大抵傷寒表邪將傳入裏裏氣相逆則爲嘔是以半表半裏之邪其證多嘔若邪全在表無是證也凡邪在

半表半裏者和之散之氣逆者順之有痰者降之熱者清之寒者温之千金云嘔家多服生薑此是嘔家聖藥然嘔家雖有陽明證不可攻之蓋其氣逆在上而邪未入府本非胃實證也氣逆於上而攻其下下虚則逆氣乘之勢必大危若脉微弱者乃爲尤甚

凡傷寒三陽傳畢三陰當受邪矣若其人反能食而不嘔此爲邪不入陰是知邪之傳裏者乃致爲嘔也觀乾薑附子湯證治云不嘔不渴者爲裏無熱干棗湯證治云乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也即此觀之則凡嘔者知爲裏證

而兼煩渴者方爲內熱也

仲景論曰食穀欲嘔者屬陽明也吳茱萸湯主之得湯反劇者屬上焦也○曰少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之

論曰病人脉數數爲熱當消穀引飲而反吐者此以發汗令陽氣微膚氣虛脉乃數也數爲客熱不能消穀以胃中虛冷故吐也○東垣曰邪熱不殺穀故熱邪在胃則不食

論曰陽明病不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也以其人本虛故攻其熱必噦○若胃中虛冷不能食者飲水則

噦○若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也急溫之宜四逆湯

論曰傷寒噦而腹滿視其前後知何部不利利之則愈○治噦

諸法詳呃逆門

勞力感寒 四十六

凡因辛苦勞倦而病者多有患頭痛發熱惡寒或骨腿痠疼或微渴或無汗或自汗脉雖浮大而無力亦多緊數此勞力感寒之證即東垣云內傷證也宜補中益氣湯或補陰益氣煎及五福飲等劑爲良所謂溫能除大熱即此類也若或邪盛無汗脉見洪數而當和解者即當用新方散陣諸柴胡飲之類主之

一凡勞力感寒一證人皆以服役辛苦之人爲言而不知凡爲名利所牽有不自揣以致竭盡心力而患傷寒者皆其類也故凡有形勞而神不勞者勞之輕者也若既勞其神又勞其形內外俱勞則形神俱困斯其甚矣今人之病傷寒者率多此類輕者和解治宜如前重者速宜救本當於後開培補諸方擇而用之庶乎有濟倘不知其所致之由而槩施混治但知攻邪則未有不誤人者矣此即勞倦內傷之類諸義具詳本門

仲景曰陽微則惡寒陰弱則發熱是寒熱之有虛本虛是以發戰是戰汗之皆因虛也○曰耳聾無聞者陽氣虛也○曰面赤戴陽者陰不足也○曰無陽不能作汗必身冷而脈遲也○曰洛熱不能殺穀胃中虛冷也○曰病人脈數數為熱當消穀引食而反吐者此以發汗令陽氣微膈氣虛脈乃數也數為客熱不能消穀以胃中虛冷故吐也○曰虛則鄭聲以言語亂而不正也○曰身躁惡寒而利因冷氣而為厥逆也○曰尺中脈微此裏虛須表裏實津液自和便自汗出愈○曰脈促厥冷者宜灸以促脈有非四熱也○曰頭疼嘔吐之宜温以

頭疼之有屬陰也○曰不利而利發熱汗出者有陰無陽也○曰少陰脉沉者汗後熱不去而厥利惡寒者皆宜急温也○曰舊有微瘕者不可與梔子湯以裏虛而寒在下也○曰陽明病不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也飲之水亦噦也○曰小便色白者以下焦之虛寒也○曰自利不渴者以藏中之無火也○曰邪中於陰者必生內慄因表氣虛而裏氣不守也○曰發汗過多其人叉手自冒心心下悸而欲得按者亾其陽也○曰發汗病不解而反惡寒者虛故也○曰脉陰陽俱緊反汗出者亾其陽也

一諸脈有虛證見前卷

一忌汗下各有虛證見前卷

一表裏五藏各有虛實詳一卷傳忠錄虛實辨中俱當互閱

動氣四十八

論曰諸動氣者不可發汗亦不可下○按此動氣一證即築築然動於臍傍及左乳之下曰虛里者皆其聯絡者也考之難經則以臍之上下左右分心腎肝肺四臟而各列其證在傷寒論所載亦詳成無已曰動氣者臟氣不治正氣內虛也雖諸說如此然皆未盡其要所以今之醫家多不識此爲何證

而且疑爲未見此證也余嘗留心察此所見極多蓋動氣之在臍傍者皆本於下焦之陰分凡病關格勞損者多有此證而尤於瘦薄者易見之其動之微者則止於臍傍上下其動之甚者則連及虛里心脇眞若眷眷連續而混身皆振動者此以天一無根故氣不蓄藏而鼓動於下誠眞陰不守太虛之候也何以驗之但察於呼吸饑飽之頃可得其徵凡病此者倏時則動甚飽時則稍緩呼出則動甚吸入則稍緩但虛甚者動必甚虛微者動亦微豈非虛實之明證乎即在病者雖常覺其振動而無疼無癢尚不知爲何故醫家多不以爲

意弗能詳察故不知爲何病此動氣之不明也久矣此動氣之見於虛損者極多而見於傷寒者亦不少也精血者既不可汗陰虛者又不可下仲景但言其禁而不言其治然則動氣之治豈無法乎獨於霍亂條中云臍上築者腎氣動也用理中丸去朮加桂四兩以治之此其意在脾腎築可知也然余之治此則惟直救真陰以培根本使其氣有所歸無不獲效欲察虛實者最不可忽此一證類經虛里穴下有詳註當並考之

論曰脉浮而緊按之反乳此爲本虛故當戰而汗出也其人本虛是以發戰以其脉浮故當汗出而解○若脉浮大而數按之不乳此本不虛故其欲解則但汗出而不發戰也

一戰與慄異戰由乎外慄由乎內也凡傷寒欲解將汗之時若其正氣內實邪不能與之爭則但汗出自不作戰所謂不戰應知體不虛也若其人本虛邪與正爭微者爲振甚則爲戰正勝邪則戰而汗解矣故凡邪正之爭於外者則爲戰戰其愈者也邪正之爭於內者則爲慄慄其甚者也論曰陰中於邪必內慄也夫戰爲正氣將復慄則邪氣肆強故傷寒六七

日有但慄不戰竟成寒逆者多不可救此以正氣中虛陰邪內盛正不勝邪而反爲邪氣所勝凡遇此證使非用大補温熱之劑及艾灼回陽等法其他焉得而禦之

余嘗治一衰翁年踰七旬陡患傷寒初起即用温補調理至十日之外正氣將復忽爾作戰自旦至辰不能得汗寒慄危甚告急於余余用六味回陽飲人人參一兩薑附各三錢使之煎服下咽少頃即大汗如浴將將及午而漫汗不收身冷如脫鼻息幾無復以告余余令以前藥復煎與之告者曰先服此藥已大汗不堪今又服此尚堪再汗乎余笑謂曰此中有

神非爾所知也急令再進遂汗收神復不旬日而起矣嗚呼發汗用此而收汗復用此無惟乎人之疑之也而不知汗之出與汗之收皆元氣爲之樞機耳故余紀此欲人知閫闢之權不在乎能放能收而在乎所以主之者

頭汗五十

頭汗之證有二一爲邪熱上壅一爲陽氣內脫也蓋頭爲諸陽之會凡傷寒徧身得汗者謂之熱越若身無汗則熱不得越而上蒸陽分故但頭汗出也治熱蒸者可清可散甚者可下在去其熱而病自愈至若氣脫一證則多以妄下傷陰或剋伐太過

或泄瀉不止以致陰竭於下則陽脫於上小水不通而上見頭汗則大危矣

論曰傷寒五六日頭出汗微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便難脉細者此爲陽微結乃半在裏半在外也脉雖沉緊不得爲少陰病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也可與小柴胡湯得屎而解○曰傷寒五六日已發汗而復下之胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此爲未解也柴胡桂枝乾薑湯主之

論曰傷寒十餘日但結胸無大熱者此爲水結在胸脇也但頭

汗出者大陷胸湯主之○曰陽明病下血譫語者此爲熱入
血室但頭汗出者刺其門隨其實而瀉之濈然汗出則愈
論曰太陽病醫反下之若不結胸但頭汗出餘處無汗際頸而
還小便不利身必發黃也○曰陽明病但頭汗出小便不利
必發黃
論曰濕家下之額上汗出微喘小便不利者死若下利不止者
亦死
脈經曰陽氣上出汗見於頭者蓋陽脫也
一頭汗脈緊數有表邪當散者宜小柴胡湯或柴胡桂枝乾薑

湯及新方諸柴胡飲俱可酌用○若有火邪脉洪滑內多煩熱頭汗當清者宜人參白虎湯益元散之類主之○若水結胸心下滿頭汗出者或大陷胸湯或小半夏茯苓湯○若便結腹脹疼痛頭汗者宜承氣湯○若諸虛泄瀉陽脫頭汗者宜速用獨參湯或大補元煎六味回陽等飲作急救之庶可保全

吐蚘 玉十一

凡治傷寒若見吐蚘者雖有大熱忌用涼藥犯之必死蓋胃中有寒陽氣弱極則蚘逆而上此大凶之兆也急用炮薑理中湯

一服加烏梅二個花椒一二十粒服後待蚘定然後以小柴胡
或補中益氣等劑漸治其餘蓋蚘聞酸則靜見苦則安也〇仲
景曰病人有寒復發汗胃中冷必吐蚘〇蚘厥證見前三十九

腹痛 五十二

陶節菴曰傷寒腹痛有四若遠臍鞕痛大便結實煩渴者皆屬
燥屎痛急用寒藥下之因食積而痛者治亦同

一若小腹鞕痛小水自利大便黑身目黃者屬畜血痛亦用寒
劑加行血藥下盡黑物自愈

一凡傷寒腹中痛甚但將涼水一盞與病者飲而試之若飲水

後痛稍可者屬熱痛當用涼藥清之○以上三條皆實熱痛也必脈來沉實有力方是此證若微弱者仍當詳審從緩治之

一若飲水愈加作痛此爲寒痛當用溫藥和之和之不已而或四肢厥冷嘔吐瀉利者急用熱藥救之但須詳脈之有力無力方爲良法

下利五十三

凡雜證下利多責於寒傷寒下利有寒有熱蓋熱邪傳裏則亦有下利之證但寒利最多熱利則僅見耳治者當辨寒熱若誤

用之則爲害最大

仲景論曰自利不渴者屬太陰以其藏有寒故也當温之宜服四逆輩○少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止便膿血者桃花湯主之○少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之○少陰病下利白通湯主之○少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此爲有水氣其人或欬或小便利或下利或嘔者眞武湯主之○少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脉微欲絕身反不惡寒其人面色赤或腹痛或乾嘔或咽痛或利正脉

不出者四逆湯主之○大汗出熱不去內拘急四肢疼下利厥逆而惡寒者四逆湯主之○下利清穀不可攻表汗出必脹滿

按此諸論乃皆言寒利之當温也如所云手足厥逆惡寒腹痛脉微欲絶下利清穀之類此固陰寒之甚者也其於疑似之間則猶有眞辨凡傷寒下利由熱邪者必有煩躁大熱酷欲冷水等證亦必有洪滑強盛數實等脉如果表裏俱熱方可作火證論治若其脉雖數而無力外雖身熱而不惡熱內雖渴而不喜冷此其內本不熱而病爲下利者悉屬虛寒治

宜四逆湯理中湯溫胃飲胃關煎五苓散之類酌用可也或表裏寒邪俱甚則當以麻桂飲相兼用之爲最妥若以寒利作熱利妄用寒涼再損胃氣則無有不死

論曰下利腹脹滿身體疼痛者先温其裏乃攻其表温裏四逆湯攻表桂枝湯

按此一條乃言表裏俱病而下利者雖有表證所急在裏蓋裏有不實則表邪愈陷即欲表之而中氣無力亦不能散故凡見下利中虛者速當先温其裏裏實氣强則表邪自解温中可以散寒即此謂也

論曰熱利下重者白頭翁湯主之○下利脉數欲飲水者以有熱故也白頭翁湯主之○少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯主之

按此三條乃言熱利之當清也但既云脉數又欲飲水是誠熱矣然寒邪在表脉無不數但數而有力者爲陽證數而無力者卽陰證矣瀉利亡津無有不渴但渴欲飲水愈多愈快者爲陽證若口雖欲水而腹不欲熱者卽非陽證矣此外如渴欲茶湯者乃瀉渴之當然也不得悉認爲熱證○一凡傷寒表邪未解脉實滑數喜冷氣壯內外俱熱而下利者宜柴

苓煎主之

論曰少陰病自利清水色純青心下必痛口乾燥者急下之宜大承氣湯〇下利三部脈皆平按之心下鞕者急下之宜大承氣湯〇下利譫語者有燥屎也宜小承氣湯

按此三條乃言下利之當攻者也凡傷寒下利者本非陽明實邪不當譫語今既譫語故知有燥屎當去也又若少陰下利心下有痛有鞕者必有所積故亦當下

一凡自利家身涼脈小者爲順身熱脈大者爲逆此以外無表證而病之在臟者言也〇下利日十餘行脈反實者死〇發

熱下利至甚厥不止者死〇直視譫語下利者死〇下利無
脈手足厥冷灸之不温脈不還者死〇少陰病自利煩躁不
得卧寐者死〇大抵下利一證爲脫氣至急五奪之中惟此
爲甚金匱要畧曰六府氣絶於外者手足寒五藏氣絶於内
者利下不禁藏氣既脫不能治也

協熱下利五十四

仲景曰若不宜下而便攻之内扈熱入協熱遂利煩躁諸變不
可勝數輕者困篤重者必死矣〇太陽病二三日不能卧反下
之若利止必作結胸未止者四日復下之此作協熱利也〇太

陽病外證未除而數下之遂協熱而利利下不止心下痞鞕表裏不解者桂枝人參湯主之○陽明少陽合病若脉數不解而下不止必協熱而便膿血也

按此四條乃皆言表證未除而誤下之因致外熱未退內復作利故云協熱下利此一熱字乃言表熱也非言內熱也夫協者協同之協非挾藏之挾即表裏俱病之謂故治此者止有桂枝人參湯一方其義顯然可見即如成無己明理論曰表邪傳裏裏虛協熱則利乃亦以表邪為言也奈何後學不明此義止因協熱二字每每以表作裏以寒作熱但見作利

者無論表裏虛實即認爲內熱便云協熱下利且近有不必誤下而妄用芩連治表熱者表證得寒熱愈不退乃致下利或脾胃素弱逢寒即泄者皆是此證既見下利益云協熱其謬孰甚獨不觀仲景桂枝人參湯豈治內熱之劑乎寒熱倒施殺人多矣予因特表於此

小便五十五

凡傷寒小便清者病不在裏仍在表也當解表發汗〇小便利者病不在氣分而在血分以小水由於氣化也

陽盛則欲飲陰虛小便難

凡病傷寒而小水利者多吉以內邪不甚也

仲景曰陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多必胃燥故不可復利小水也

論曰濕家之爲病一身盡痛發熱身色如熏黃其人但頭汗出背强欲得被覆向火舌上如胎者以丹田有熱胸中有寒渴欲得水而不能飲此濕淫之候其人小便不利大便反快者但當利其小便

凡傷寒表證未除病在陽分者不可即利小便蓋走其津液取汗愈難且恐大便乾結也

死證 五十六

陶節菴曰凡看傷寒極要識各經中死證死脉須一一理會過免致臨病疑惑但見死證便當以脉參之如果有疑切莫下藥雖至親浼懇亦不可治倘有差失咎將歸於已矣

一脉浮而洪身汗如油喘而不休水漿不入形體不仁乍靜乍亂此命絕也○汗出髮潤喘而不休此肺絕也○形如烟煤直視搖頭此心絕也○脣吻色青四肢振動此肝絕也○環口黎黑冷汗發黃此脾絕也○溲便遺失狂言反目直視此腎絕也

一少陰病惡寒身蹉而利手足逆冷者不治○少陰病吐利躁煩四逆者死○少陰病四逆身蹉脈不至不煩而躁者死○少陰病六七日息高者死○少陰病至五六日自利煩燥不得卧寐者死○少陰病下利厥逆無脈服藥後脈微續者生脈暴出者死○少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道出或從口鼻或從目出是名下厥上竭爲難治

一陰病見陽脈者生陽病見陰脈者死○脈純弦者死○脈陰陽俱虛熱不止者死○脈陰陽俱盛大汗出熱不解者死○手足逆冷脈沉細讝言妄語者死○脈證俱虛而見讝妄者

死○傷寒六七日脈微手足厥冷煩躁灸厥陰厥不還者死○寸脈上不至關爲陽絕尺脈下不至關爲陰絕此皆不治決死也○傷寒下利日十餘行脈反實者死

一傷寒病脇下素有痞氣連於臍傍痛引少腹入陰筋者此名藏結死○發熱下利厥逆躁不得臥者死○發熱下利至甚厥不止者死○直視譫語喘滿者死下利者亦死○下利發熱者亦死○發熱而厥七日下利者難治○傷寒六七日發熱而利汗出不止者死有陰無陽故也○陽氣前絕陰氣後絕者陰證也其人死後身色必青○陰氣前絕陽氣後絕者

陽證也其人死後身色必赤腋下温心下熱也

金匱要畧曰六府氣絕於外者手足寒五藏氣絕於內者利下不禁蓋傷寒發熱爲邪氣獨甚若下利至甚厥不止此以邪未解而府藏之氣先絕故死

靈樞熱病篇曰熱病不可刺者有九一曰汗不出大顴發赤噦者死〇二曰泄而腹滿甚者死〇三曰目不明熱不已者死〇四曰老人嬰兒熱而腹滿者死〇五曰汗不出嘔下血者死〇六曰舌本爛熱不已者死〇七曰欬而衄汗不出出不至足者死〇八曰髓熱者死〇九曰熱而痙者死腰折瘈瘲

齒噤齘也

傷寒逆證賦　五十七

傷寒難療逆證須知陽病怕逢陰脉譫語陰證非宜乍疎乍數脉之忌口張目陷舌如煤乾嘔出氣骨節痛而呃逆弗已發斑發黃大便利而先赤後灰霍亂躁煩心下悶而喘脹腹膨呃逆下泄利而難溲四肢厥逆眼定腹疼如石內外關格頭汗陽脫溲遲頭連胸痛四肢冷聲嘔唇瘡瘡孤惑悲七日已過復大熱喘逆上氣脉散危陰陽易脉離經而外腎腫手足攣拳加腹痛陰陽交大汗後而熱愈甚躁疾狂言食更稀厥利無脉灸而不至

者腎殆唇青舌卷耳聾囊縮者肝離赤班黑班救五而救一尋衣撮空兩感者何疑凡諸汗證仍當備言只在頭面不遍身鼻衂不止口噤肉戰多喘促如油汗圓當汗無汗麻黃數劑不能遍尤嫌脉躁汗後嘔吐水藥不入證反劇言亂目眩濕家大汗必成痙風濕與膽皆譫言犯濕溫則身青而變耳聾不語各重瘕發少陰必九竅出血下厥上竭奚能登動氣脉遲弱皆忌風濕和中濕不堪其諸下利尤宜細參熱厥利而汗難止冷厥利而躁不眠少陽陽明合病脉弦者負少陰吐瀉無脉拳厥躁煩讝語直視而喘滿下利頻數而脉堅臟結者膽痛引陰白胎下

利除中則厥逆而利反能食為誤下濕家之頭汗漫難便利喘加添體如熏而搖頭直視心神已絕唇吻青而四肢多汗肝氣不全皆絕者直視狂言而遺尿反目肺絕者喘無休歇而汗潤髮黃庵汗發黃環口黑非脾經之吉兆孤陽偏勝脉暴出知陰絕之在先此傷寒之逆候勿僥倖以圖全

傷寒治例五十八

汗散類

溫散諸方

麻黃湯散一　大溫　凡太陽陽明傷寒而陰邪甚者

宜此

桂枝湯散九　大温　凡太陽中風兼寒有汗者宜此

麻桂飲新散七　大温　凡傷寒初感邪盛氣實者無論

諸經四孝先宜用此

二柴胡飲新散二　微温　凡邪感三陽及三陽併病寒

勝者宜此主之三陰初感者亦可用

葛根湯散二九　大温　治冬月太陽經傷寒項背强無

汗惡風者宜此

五積散散三九　微温　凡感寒邪而陰勝於陽外有表

證內有嘔吐腹痛及寒濕客於經絡筋骨痠疼等證宜
此

十神湯　散四十　微溫　凡時氣風寒瘟疫發熱憎寒頭
疼欬嗽無汗當溫散者宜此

麻黃附子細辛湯　散三　大溫　少陰傷寒脉沉發熱者
宜此

小青龍湯　散八　大溫　凡傷寒陰勝表邪不解及心下
有水氣嘔噦欬嗽發熱小腹滿者宜此

消風白解散　散四六　微溫　凡四時傷寒頭疼發熱及

風寒欬嗽鼻塞聲重者宜此

柴胡桂枝乾薑湯散百十四　微温　傷寒汗下後但頭汗出寒熱往來邪不解者宜此

桂枝加黃耆湯散十　大温　黃疸脉浮當以汗解者宜此

涼散諸方

一柴胡飲新散一　微涼　凡六經初感內外俱有熱者宜此

小柴胡湯散十九　微涼　凡邪在少陽及三陽併病但

麤半表半裏往來寒熱兼嘔者宜此

九味羌活湯　散四四　微涼　凡四時不正之氣風寒感冒憎寒壯熱頭疼身痛者宜此

柴葛解肌湯　散三一　微涼　凡足陽明證發熱脉洪者宜此

升麻葛根湯　散三十　微涼　陽明證具及小兒疫癘瘡疹等證宜此

歸葛飲　新散十三　次涼　凡陽明温暑大熱大渴津粘不能作汗者宜此

六神通解散 寒十五　大涼　凡發熱頭痛脉洪無汗三陽伏火而表邪不解者宜此

柴胡白虎煎 新散十二　大寒　凡温病熱極表裏不解者宜此

柴平湯 和二三三　微涼　凡温瘧身痛手足沉重寒熱者宜此

柴苓煎 新散十　大涼　凡表邪未解內外俱熱泄瀉不止者宜此

大青龍湯 散七　微寒　凡太陽中風發熱無汗而

躁煩者宜此

升麻湯 散百十三

宜此

四逆散 散二八

宜此

平散諸方

三柴胡飲 新散三

宜此

正柴胡飲 新散六

大寒 凡無汗而喘煩渴發班者

微涼 凡陽邪亢極四肢厥逆者

凡肝脾陰虛血少而偶感風寒者

凡血氣本無虧損而感冒寒邪者

宜此

柴陳煎 新散丸　凡感冒風寒發熱而兼欬嗽嘔惡者宜此

參蘇飲 散三四　凡四時感冒傷寒頭疼發熱無汗及欬嗽聲重往來潮熱者宜此

敗毒散 散三六　凡四時瘟疫寒熱身體疼痛及烟瘴之氣或處卑濕腳氣者宜此

升陽散火湯 散四一　凡胃虛血虛因寒邪冷物抑遏陽氣以致發熱者宜此發之

加減小柴胡湯 散二 凡少陽經寒熱往來脉弦腹痛者宜此

兼補兼散諸方

補中益氣湯 補三一 凡勞倦傷脾中氣不足以致外感發熱者宜此

補陰益氣煎 新補十六 凡邪陷陰中陰虛不能作汗身熱不退或往來寒熱者宜此

三柴胡飲 新散三 凡肝脾血分微虛而感外邪者宜此

四柴胡飲新散四　凡脾肺氣虛或勞倦感寒發熱者宜此

五柴胡飲新散五　凡脾腎血氣不足而感外邪發熱者宜此

理陰煎新熱三　大溫　凡真陰不足或因勞倦感寒陰虛假熱寒邪不解者速宜用此

大溫中飲新散八　大溫　凡中氣虛寒感邪發熱無汗表不能解者速宜用此

凡風寒濕熱所傷食少體重者宜

此

溫中和中類

大溫兼補諸方

人參理中湯 熱一 大溫 治太陰即病自利陰寒腹痛嘔吐中氣虛寒脹滿厥逆瘧痢等證

四逆湯 熱十四 大溫 治傷寒陰證自利脉沉身痛而厥

胃關煎 新熱九 大溫 凡脾腎虛寒瀉利不止者宜此

桂枝人參湯 散十三

大温 傷寒表裏不解協熱下利

者宜此

白通湯 熱一四六

大熱 少陰下利者宜此

桃花湯 熱一四七

微温 少陰下利膿血者宜此

真武湯 熱一四三

大温 少陰傷寒腹痛或嘔或利

者宜此

回陽返本湯 熱四五

大温 傷寒陰盛格陽陰極發躁

脉弱無力者宜此

四味回陽飲 新熱一

大温 陽脫氣虛者宜此

煖肝煎 新熱十五　大溫　凡肝腎陰寒小腹疼痛者宜此

吳茱萸湯 熱一三八　大熱　嘔而胸滿吐涎頭痛者宜此

當歸四逆湯 熱二十　微溫　傷寒厥逆脉細下利腸鳴者宜此

茯苓甘草湯 熱七六　大溫　水停心下作悸作利者宜此

甘草附子湯 熱三一　大熱　風濕相搏者宜此

桂枝附子湯 熱三十　大熱　風濕相搏筋骨疼痛者宜此

乾薑附子湯 熱三四　大熱　瘴毒陰證厥逆嘔吐自利汗出者宜此

華陀救陽脫方 熱六四　治陰寒直中三陰證

微温和中諸方

二陳湯 和一　微温　凡風寒咳嗽痰飲嘔惡脾胃不和者宜此

六君子湯 補五　微温　升脾胃虛弱或久患瘧痢

或嘔吐吞酸者宜此

金水六君煎 新和一 微温 凡陰虛受寒欬嘔喘促吞酸痞滿等證宜此

平胃散 和十七 微温 凡寒傷脾胃心腹脹滿嘔惡不思飲食身體疼痛瀉利者宜此

藿香正氣散 和二十 微温 凡外感風寒內停飲食頭疼寒熱吐瀉脹滿者宜此

烏梅丸 和三二三 微温 吐蚘蚘厥者宜此

清火諸方

抽薪飲 新寒三　大寒　凡熱邪內蓄之甚者宜此

徙薪飲 新寒四　次寒　凡熱邪內蓄將甚未甚者宜此

黃連解毒湯 寒一　大寒　凡熱邪內盛煩躁狂班口渴舌焦喘滿脈洪熱甚者宜此

白虎湯 寒二　大寒　凡脈洪大渴陽明熱甚或中暑虛煩等證宜此

人參白虎湯 寒三　大涼　凡赤班口燥煩躁暑熱脈

洪大浮虛者宜此

三黃石膏湯寒十一　大寒　凡疫瘟大熱而躁者宜此

一六甘露散新寒十五　大寒　陽明實熱煩躁班黃等證宜此

盆元散寒百十二　次寒　凡中暑身熱煩渴小水不利者宜此

玉女煎新寒十二　大寒　凡陰虛水虧陽明火盛煩渴內熱者宜此

陽毒升麻湯散百六　大涼　凡陽毒赤斑狂言失血者

宜此

竹葉石膏湯 寒五 微寒 陽明汗多而渴鼻衄喜水暑熱煩躁者宜此

桂苓甘露飲 寒八 微寒 凡伏暑發熱煩躁水道不利者宜此

黃芩清肺飲 寒三八 次寒 肺熱小水不利或便血者宜此

大連翹飲 寒七八 次寒 凡風熱熱毒大小便不利及瘡毒丹癗等證宜此

普濟消毒飲 寒十三 大寒 凡疫癘大行憎寒壯熱頭
腫目閉喘渴咽喉不利俗名大頭瘟熱毒等證宜此
梔子蘗皮湯 寒二三 大寒 傷寒身黃內外俱熱者宜
此
白頭翁湯 寒一八四 大寒 治傷寒熱利
玄參升麻湯 外四八 次寒 瘟疫頰腮腫痛發班咽痛
者宜此
小陷胸湯 寒十六 微涼 凡小結胸熱邪脹滿者宜
此

八正散寒百十五　大寒　凡心經蘊熱臟腑秘結小便赤澁血淋等證宜此

解瘟疫熱毒法寒二四

清血清便滋陰諸方

犀角地黃湯寒七九　微涼　凡熱入血分吐衄斑黃及血熱血燥不能作汗表不解者宜此

二陰煎新補十　大涼　心經有熱狂笑煩熱失血者宜此

加減一陰煎新補九　大涼　凡水虧火盛煩熱動血者

宜此

五苓散和一八二　微温　凡暑熱霍亂泄瀉小水不利濕腫脹滿者宜此

導赤散寒一二二　微涼　心火小腸熱秘小水不利者宜此

大分清飲新寒五　微寒　凡積熱閉結小水不通熱瀉等證宜此

小分清飲新和十　性平　凡小水不利濕滯腫脹泄瀉者宜此

猪苓湯和一八八　微涼　傷寒下後發熱小便不利
者宜此

清胃諸方

大和中飲新和七　性平　凡邪結胃脘氣逆食滯者
宜此

小和中飲新和八　性平　胸膈脹滿嘔惡氣滯者宜
此

小半夏茯苓湯和九　微温　膈間有水嘔吐心下痞者
宜此

半夏瀉心湯寒二八　微涼　噫而腸鳴心下痞者宜此

吐涌類

獨聖散攻百六　凡邪實上焦及痰涎積蓄者宜此

茶調散攻百七　治同前

吐劑新攻二　此有二法便而且易可隨宜用之

梔子豉湯寒二十　傷寒煩熱懊憹當吐者宜此

攻下類

峻下諸方

大承氣湯攻一　凡陽明太陰傷寒及各經實熱內

結者宜此

小承氣湯 攻二　凡病在太陰無表證潮熱脉實狂言腹脹者宜此

調胃承氣湯 攻三　凡太陽陽明不惡寒反惡熱潮熱邪入腑者宜此

桃仁承氣湯 攻四　凡傷寒蓄血證小腹急痛大便不通而黑者宜此

大柴胡湯 攻七　凡傷寒表證未除裏證又急當汗下兼行者宜此

大陷胸湯 攻九　凡結胸脹痛連腹手足不可近者宜此

六一順氣湯 攻八　凡傷寒熱邪傳裏便實口燥狂斑潮熱腹脹鞕痛等證宜用此以代三承氣湯

涼膈散 攻十九　凡三焦六經火邪內結不通者宜此

百順丸 新攻六　凡三焦熱秘邪不解者宜此

茵陳蒿湯 攻三一　穀疸發熱身黃便結者宜此

卷結胸法 新因三十

攻補兼用諸方

黃龍湯攻二一　凡傷寒熱邪傳裏當下而氣血兼虛者宜此

玉燭散攻二四　凡血虛有滯而熱邪傳裏腹脹作痛者宜此

培補類

峻補諸方

大補元煎　新補一　凡元氣大虛者雖有寒邪亦不可攻必單培根本正復邪將自散或眞寒假熱等證皆宜

用此

大營煎 新補十四　此大補元煎之次者也酌宜用之

三陰煎 新補十一　凡三陰不足及風瘧多汗而正氣不復寒熱不止者宜此

六味回陽飲 新熟二　凡陰陽大虛元氣將脫者非此不可

八珍湯 補十九　氣血兩虛者宜此

十全大補湯 補二十　凡氣血兩虛惡寒發熱倦卧眩運自汗諸虛者宜此

大建中湯補二三　凡中氣不足厥逆嘔吐虛疰虛火
筋骨疼痛等證宜此
獨參湯補三七　凡氣虛氣脫畏聞諸藥氣味及反
胃嘔吐垂危者惟此爲宜
參附湯補三八　凡真陽不足喘嘔呃逆腹痛厥冷
氣短者宜此
參歸湯補三九　凡心虛血虛盜汗等證宜此
補陰諸方
一陰煎新補八　凡腎水真陰不足而虛火爲邪者

宜此

小營煎 新補十五　凡血少陰虛而無火者宜此

左歸飲 新補二　凡命門真陰虧損雖有寒邪不可攻者宜此

右歸飲 新補三　凡命門陽衰或陰盛格陽感邪不可攻者宜此

四物湯 補八　凡陰虛營弱病在血分者宜此

生脉散 補五七　凡熱傷元氣口渴氣短煩躁倦怠汗出者宜此

六味地黃丸補一二　陰虛水虧發熱等證宜此

崔氏八味丸補一二　凡陰盛格陽火不歸原及真陽虛敗等證宜此

補中諸方

四君子湯補一　凡脾胃虛弱食少體瘦瘧痢勞倦等證宜此

五君子煎新熟六　凡脾胃氣分虛弱而微寒當温者宜此

五味異功散補四　凡脾胃虛寒飲食少思氣逆腹滿

者宜此

五福飲 新補六　凡五臟氣血俱虛者宜此爲主

溫胃飲 新熟五　凡中寒嘔吐吞酸者宜此

養中煎 心熟四　凡中氣虛寒爲嘔爲泄者宜此

歸脾湯 補三三　凡脾虛健忘怔忡少食困倦瘧痢等證宜此

參苓白朮散 補五五　凡脾胃虛弱吐瀉食少等證宜此

參朮湯 補四一　凡氣虛顫掉泄瀉嘔吐者宜此

景岳全書卷之九從集

會稽 張介賓 會卿著
會稽 魯 超 謙菴訂

從集

九卷

雜證謨目錄

十卷

諸風

經義

古今中風之辨 共三條

論中風屬風　論河間中風說
論東垣中風說 共二一條　論丹溪中風說
論眞中風　論續命等湯
論治中風 共八三條　述古治權宜
論風論列方目　論外備用方目

十一卷

非風

論正名　論有邪無邪
論肝邪　論氣虛

論痰之本
論治痰 共四條
論治血氣
論用藥佐使
不治證
灸法
備用方
厥逆
經義 附釋義

論經絡痰邪
論寒熱證 共二條
非風諸證治法 共十二條
辨經藏諸證 五條
述古 二條
諸列方
傷寒厥逆

論證
述古
備用方
傷風
經義
論治
備用方
十二卷
風痺
論治共七條
論列方
論證
論列方

經義　論證二條
風痺治法五條　歷節風痛
論列方　備用方
汗證
經義　論證三條
汗出不治證　論治八條
述古二條　論列方
備用方
痙證

經義　論證　共六條
論治八條　述註　二條
論列方　備用方
性集
十三卷
瘟疫
經義　論證　共二條
溫疫脉候　治法六要
汗有六要五忌　汗散法五條

補虛法三條　溫補法二條
清利法三條　吐法二條
下法二條　瘟疫熱毒辨治三條
大頭瘟證治　傷寒初感治法
傷寒飲食宜忌二條　避疫法二條
論列方　備用方

十四卷

瘧疾
經義　論證四條

論治 十二條　論汗
論標本　論厭瘧
論截瘧 四條　論似瘧非瘧
論溫瘧　論瘴瘧
論瘴瘧　述古 八條
辨古 四條　簡易方
鍼灸法　論列方
備用方

瘴氣

論證　瘴病所由

大梁李待詔瘴瘧論　指迷方瘴瘧論

嶺表十說　回頭瘴說

治瘴續說　藥宜預備

瘴病脉候　瘴病愈後將養法

論列方　備用方

十五卷

寒熱　論證

經義

論諸寒證治 五條
論寒熱往來證治 三條
論列方
暑證
經義
論治 五條
述古 六條
備用方
火證
論諸熱證治 四條
述古
備用方
論證 七條
論香薷飲
論列方

經義
論病機火證
論五志之火
論治火五條
論刻方
理集
十六卷
虛損
經義
論君火相火之病
論虛火三條
論火證三條
述古
備用方
論虛損病源共十一條

論證四條　論脈三條

辨瓜　論治七條

辨似損非損　虛損危候

述古四條　附按

論列方　備用方

勞傷內傷

經義　論證五條

論治四條　辨脈

述古三條　論列方

備用方

關格

經義

論治三條

十七卷

飲食

經義

論治十二條

述古四條

論證四條

論列方

論證五條

論脾胃二方三條

論列方

備用方

脾胃

經義

論東垣脾胃論

述古二條

備用方

眩運

經義

論證四條

論治三條

論脾胃
論治脾胃
論列方
述古

立法新按　論刻方
備用方
十八卷
怔忡
經義　論怔忡
論驚恐　論治三條
論刻方　備用方
不寐
經義　論證三條

論治二條　述古
論列方　備用方
三消
經義　論證二條
論治五條　述古六條
下消不寐新按　論列方
備用方
明集
十九卷

欬嗽
經義
外感嗽證治五條
辨古
灸法
備用方
喘促
經義
虛喘證治七條
論證四條
內傷嗽證治七條
述古六條
論刻方
論證
實喘證治七條

述古二條　灸法
論列方　備用方
呃逆
經義　論證三條
論治九條　傷寒呃逆二六條
述古三條　簡易方
灸法　論列方
備用方

經義
論脈
論鬱滯治法
附按
備用方
二十卷
嘔吐
經義
虛嘔證治三條
論內經五鬱之治
論情志三鬱證治四條
述古二條
論列方
論證四條
實嘔證治九條

吐虺　治嘔氣味論
述古五條　中寒毒吐瀉新按
吐蚘新按　論列方
備用方
霍亂
經義　論證三條
論治七條　述古三條
鍼灸法　論列方
備用方

惡心噯氣
經義
噯氣證治三條
備用方
二十一卷
吞酸
經義
論治七條
論列方
惡心證治三條
論列方
辨證五條
述古
備用方

反胃

論證

述古三條

灸法

備用方

噎膈

經義

論治七條

述古五條

論治七條

簡易方

論列方

論證四條

噎膈不治證

灸法

論列方　備用方
饋雜
論證　論治二條
論列方

心集

二十二卷

腫脹

經義　論證四條
腫脹危候　氣分諸脹論治八條

水腫論治七條　新按二條
述古五條　鍼灸法
論列方　備用方

二十三卷

積聚

經義　論證四條
論治十一條　述古六條
鍼灸法　論列方
備用方

痞滿
經義
論治四條
論列方
二十四卷
泄瀉
經義
分利治法二條
述古六條
論證
述古三條
備用方
論證
諸泄瀉論治九條
論列方

備用方

痢疾

經義

俚詞

論瀉痢寒熱

論五色

論裏急後重

論口渴

論陰陽疑似

論證二條

論瀉痢虛實二條

論積垢

論腹痛

論大孔腫痛

論小水

論治十條

述古八條　附按三條
論列方　備用方
二十五卷
心腹痛
經義　論證四條
論痛脉　論治十五條
述古二條　食停小腹新按
括沙新按　附按
簡易方　腹痛灸法

論列方　備用方
脇痛
經義　論證三條
論治三條　灸法
論列方　備用方
腰痛
經義　論證七條
述古三條　簡易方
鍼灸法　論列方

必集

二十六卷

頭痛

經義　論證二條

論治五條　述古三條

簡易方　灸法

論列方　備用方

面病

備用方

經義　論證二條

論治三條　論列方

備用方

口舌

經義　論證六條

論治九條　鍼灸法

論列方　備用方

二十七卷

眼目

經義
論治六條
鍼灸法
備用方
耳證
經義
論治五條
簡易方
論刻方
論證四條
述古七條
論刻方
論證三條
述古
灸法
備用方

鼻病

經義　論證

論治六條　灸法

論列方　備用方

二十八卷

聲瘖

經義　論證一條

論治七條　簡易方

論列方　備用方

咽喉

經義　論證三條

論治九條　述古二條

格陽喉痺新按　虛損喉痺新按

小兒吞釘新按　附按

論列方　備用方

齒牙

經義　論證四條

論治六條　述古二條

附按　鍼灸法

論列方　備用方

二十九卷

遺補

經義　論證三條

論治八條　述古五條

論列方　備用方

淋濇

經義　論證四條

論治六條　述古六條
論列方　備用方
遺論
經義　論證二條
論治六條　述古
論列方　備用方

經義
論治八條
吐血下血新按
吐血述古三條
欬血辨古
衄血新按
咯唾痰涎血論治三條
溺血論治五條
便血述古
論證四條
吐血論治十三條
吐血附按
欬血論治二條
衄血論治五條
齒衄舌血論治五條
咯血述古
便血論治十條
論刻方

備用方
三十一卷
痰飲
經義
論證六條
論治七條
先君吐法記
述古論八條
述古治七條
論列方
備用方
濕證
經義
論證

論治七條　述古二條
論列方　備用方
黃疸
經義　論證七條
論治五條　述古五條
論列方　備用方
三十二卷
脚氣
經義　論證五條

論治八條　敷熨淋洗
禁忌三條　述古
附按　鍼灸
論刻方　備用方
痿證
經義　論證二條
論治二條　述古四條
論刻方　備用方
陽痿

經義　論證三條
論治三條　述古
簡易方　論列方

三十三卷

疝氣

經義　論證三條
論治十一條　述古八條
諸經灸法　熨治法
論列方　備用方

脫肛

論證　論治

述古　簡易方

灸脫肛法　論刻方

備用方

天集

三十四卷

癲狂痴獃

經義　論證三條

論治五條
簡易方
論列方
癃閉
經義
論治七條
述古三條
備用方
秘結
述古四條
灸法
備用方
論證三條
通閉方法
論列方

經義　論證二條
論治七條　述古四條
陽結新按　陰結新按
論列方　備用方
詐病
論證　新按三條
鵝風
經義　論證
述古論　述古治法八條

述古變證治法三條　兼證治法
解諸毒　禁忌
論列方　備用方

三十五卷

諸蟲

經義　論證三條
論治四條　蚘蟲五條
寸白蟲三條　小兒疳蟲名曰疳蟹
應聲蟲　九蟲

狐惑二條　諸蟲方
論列方　備用方
諸毒附蠱毒
論飲食諸毒　解一切飲食諸毒
解一切藥毒　解諸毒通用簡易方
解一切蟲獸毒　蠱毒三條
驗蠱毒法　蠱證
蠱脉　防蠱
知禁忌　反蠱及主法

治蠱大法有二　呪語破蠱法
灸蠱毒法　解一切中惡邪鬼祟毒
法蠱毒方

三十六卷

諸氣

天地氣一　陰陽氣二
時氣三　運氣四
經氣藏氣五　脉氣六
形氣七　血氣八

營衛氣九　穀氣十
氣味十一　酒氣十二
邪氣十三　病氣十四
治氣十五　總論氣理十六
上俱經義
論調氣十七　遠古十八
二條
三十七卷
死生
壽夭一　神氣死證二
陰陽死證三　脈色死證四

病傳死證五　氣時死證六
諸經死證七　諸病死證八
傷寒死證九　誤治死證十
癰疽死證十一　絕穀死證十二
乳子死證十三　述古十四
上俱經義

景岳全書雜證謨目錄九卷終