


欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷二十五

五四



詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

備急千金要方卷二十四

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

風毒脚氣方

諸散第三

曰大注春秋宜服散

八風散治風虛面青黑土色不見日月光脚氣痺弱準

紅面青黑土色不見日月光主肝宜補腎治肝方

欽定四庫全書

備急千金要方

菊花 三兩

石斛

天雄 各一兩半

人參

附子

甘草 各一兩六銖

鍾乳

薯蕷

續斷

黃耆

澤瀉

麥門冬

遠志

細辛

龍膽

秦朮

石韋

菟絲子

牛膝

菖蒲

杜仲

茯苓

乾地黄

栝子仁

蛇牀子

防風

白朮

乾薑

革薺

山茱萸 各一兩

五味子

烏頭 各半兩

從蓉二兩

右三十三味治下篩酒服方寸七日三不效加至二  
七

大八風散治諸緩風濕痺脚弱方

巴戟天

黃耆

桂心

細辛

天雄

萆薢

從蓉

牡荊子

薯蕷

菊花

萎蕤

山茱萸

秦朮

黃芩

石斛

白朮

礬石 一作礬石

厚朴

龍膽

人參

蜀椒 各半兩

附子

五味子 各十銖

菖蒲

茯苓

牛膝 千金翼作乾薑

烏喙

遠志 各一兩

桔梗 三十銖

芎藭

白歛

芍藥 各六銖

右三十二味治下節酒服半寸匕日三未驗稍增令

微覺 胡洽無桔梗

內補石斛秦朮散治風虛脚弱手足拘攣疼痺不能行  
脚踏腫上膝小腹堅如繩約氣息常如憂恚不能食飲

者皆由五勞七傷腎氣不足受風濕故也此方悉主之

石斛

附子

天雄

桂心

獨活

天門冬

各一兩

秦朮

烏頭

人參

乾薑

當歸

防風

杜仲

各三十銖

山茱萸

莽草

桔梗

細辛

麻黃

前胡

五味子

各十八銖

蜀椒

白芷

白朮

各半兩

右二十三味治下節酒服方寸匕日再服不知稍增



至二七虛人三建皆炮實人亦可生用風氣者本因  
腎虛既得病後毒氣外滿則灸洩其氣內滿則藥馳  
之當其救急理必如此至于風消退四體虛弱餘毒  
未除不可便止宜服此散推陳致新極為良妙此既  
人情可解無可疑焉

秦朮散治風無久新卒得不知人四肢不仁一身盡痛  
偏枯不隨不能屈伸洒洒寒熱頭目眩倒或口面喎僻

方

秦朮

乾薑

桔梗

附子各一兩

天雄

當歸

天門冬

人參

白朮

蜀椒各十銖

烏頭

細辛各十銖

甘草

白芷

山茱萸

麻黃

前胡

防風

五味各半兩

右十九味治下節酒服方寸匕日三若老人少服之

胡洽無天門冬前胡有莽草桂心防已草解白欬黃耆為二十三味

單服松脂治一切風及大風脚弱風痺方薰陸法亦同

松脂三十斤以椶皮袋盛繫頭鐺底布竹木置袋於上以石三五顆壓之下水于鐺中令滿煮之膏浮出得盡以後量更二十沸接置于冷水中易袋洗鍋更煮如此九遍藥成擣篩為散以麤羅下之用酒服一方寸匕日二初和藥以冷酒藥入腹後飲熱酒行藥以知為度如覺熱即減不減令人大小便澀若澀宜食蔥羹仍自不通宜服生地黃汁微取泄利除忌大麻子以外無所禁若欲斷米加茯苓與松脂等分

蜜和為圓但食淡麩餽日兩度食一食一小椀勿多食也作餽餽法硬和麩熟按煮五十沸漉出冷水淘更置湯中煮十餘沸然後漉出食之服松脂三十日後即覺有驗兩脚似有水流下是效如恐秘澀和一斤松脂茯苓與棗栗許大酥即不澀服經一百日後脚氣當愈仙經曰服松脂一年增壽一年服二年增壽二年及服之十年則增壽十年

淮南八公石斛萬病散治風濕疼腰脚不隨方

防風

茯苓

菊花

細辛

蜀椒

乾薑

雲母

菴蓉

人參

乾地黄

附子

石斛

杜仲

遠志

菟絲子

天雄

草薢

桂心

牛膝

蛇牀子

白朮

薯蕷

巴戟

菖蒲

續斷

山茱萸

各一兩

五味子

半兩

右二十七味治下篩酒服方寸匕日再

治 茱萸散治冷風脚跛偏枯半身不隨晝夜呻吟醫所不

吳茱萸

乾薑

白斂

牡荊

千金翼  
作牡荊

附子

天雄

狗脊

乾漆

薯蕷

秦朮

防風

各半  
兩

右十一味治下節先食服方寸匕日三藥入肌膚中

淫淫然三日知一月瘥

酒醴第四

方例

例曰凡合酒皆薄切藥以絹袋盛藥內酒中密封頭春  
 夏四五日秋冬七八日皆以味足為度去滓服酒盡後  
 其滓擣酒服方寸匕日三大法冬宜服酒至立春宜停  
 石斛酒治風虛氣滿脚疼痺攣弱不能行方

石斛

丹參

五加皮

各五兩

側子

秦朮

杜仲

山茱萸

牛膝

各四兩

桂心

乾薑

羌活

芎藭

橘皮

黃耆

白朮

蜀椒

茵芋

當歸

各三兩

薏苡仁

一升

防風

二兩

鍾乳

八兩擣碎別絹袋盛繫大藥袋內

右二十一味㕮咀以清酒四斗漬三日初服三合日

再稍稍加以知為度

烏麻酒方

烏麻五升微熬擣碎以酒一斗漬一宿隨所能飲之

盡更作甚良

鍾乳酒治風虛勞損脚疼冷痺羸瘦攣弱不能行方



鍾乳八兩

丹參六兩

石斛

杜仲

天門冬各五兩

牛膝

防風

黃耆

芎藭

當歸各四兩

附子

桂心

秦朮

乾薑各三兩

山茱萸

薏苡仁各一升

右十六味呔咀以清酒三斗漬之三日初服三合日

再後稍加之以知為度

拘杞菖蒲酒治緩急風四肢不隨行步不正口急及四

體不得屈伸方

菖蒲

五斤

枸杞根

一斤

右二味細剉以水四石煮取一石六斗去滓釀二斛米酒熟稍稍飲之

虎骨酒治骨髓疼痛風經五臟方

虎骨一具炭火炙令黃色槌刮取碎擣研得數日清酒六升浸五宿隨性多少稍飲之易云虎嘯風生龍吟雲起此亦有情與無情相感治風之效故亦無疑

蓼酒治胃管冷不能飲食耳目不聰明四肢有氣冬卧

脚冷服此酒十日後目既精明體又充壯方

八月三日取蓼曝燥把之如五升大六十把水六石

煮取一石去滓以釀酒如常法隨多少飲之已用訖

效甚速

小黃耆酒大治風虛痰癖四肢偏枯兩脚弱手不能上

頭或小腹縮痛脇下攣急心下有伏水脇下有積飲夜喜

夢悲愁不樂恍惚善忘此由風虛五臟受邪所致或久

坐腰痛耳聾卒起眼眩頭重或舉體流腫疼痺飲食惡

冷瀟瀟惡寒胃中痰滿心下寒疝藥皆主之及婦人產後餘疾風虛積冷不除者方

黃耆

附子

蜀椒

防風

牛膝

細辛

桂心

獨活

白朮

芎藭

甘草

各三兩

秦朮

烏頭

集驗用著  
續三兩

大黃

葛根

乾薑

山茱萸

各二兩

當歸

二兩半

右十八味呿咀少壯人無所熬練虛老人微熬之以

絹袋中盛清酒二斗漬之春夏五日秋冬七日可先  
食服一合不知可至四五合日三服此藥攻痺甚佳  
亦不令人吐悶小熱宜冷飲食大虛加茯苓二兩下  
利加女萎三兩多忘加石斛菖蒲紫石各二兩心下  
多水者加茯苓人參各二兩薯蕷三兩酒盡可更以  
酒二斗重漬滓服之不爾可曝滓擣下酒服方寸匕  
不知稍增之服一劑得力令人耐寒冷補虛治諸風  
冷神良

黃耆酒治風虛脚疼痿弱氣悶不自收攝兼補方

黃耆

烏頭

附子

乾薑

秦朮

蜀椒

芎藭

獨活

白朮

牛膝

菴蓉

細辛

甘草

各三兩

葛根

當歸

菖蒲

各二兩半

山茱萸

桂心

鍾乳

栝子仁

天雄

石斛

防風

各二兩

大黃

石南

各一兩

右二十五味呿咀無所熬練清酒三斗漬之先食服

一合不知可至五合日三以攻痺為佳大虛加菘蓉

下利加女萎多忘加菖蒲各三兩

胡洽有澤瀉三兩茯苓二兩人參茵

芋半夏枯萋芍藥各一兩無秦艽芍藥牛膝菘蓉甘草葛根當歸菖蒲鍾乳大黃為二十二味名大黃者

湯

茵芋酒治大風頭眩重目瞽無所見或仆地氣絕半日

乃蘇口喎噤不開半身偏死拘急痺痛不能動搖歷節

腫痛骨中酸疼手不得上頭足不得屈伸不能躡履行

欲傾跛皮中動淫淫如有蟲啄軫癢搔之生瘡甚者狂  
走有此諸病藥皆主之方

茵蔯

烏頭

石南

防風

蜀椒

女萎

附子

細辛

獨活

卷栢

桂心

天雄

秦朮

防已 各一兩

躑躅 二兩

右十五味呔咀少壯人無所熬練虛老人薄熬之清  
酒二斗漬之冬七日夏三日春秋五日初服一合不



知加至二合寧從少起日再以微痺為度

胡椒獨活卷

栢為十  
二味

大金牙酒治瘴癘毒氣中人風冷濕痺口喎面戾半身

不遂手足拘攣歷節腫痛甚者小腹不仁名曰脚氣無

所不治方

金牙斤一

側子

附子

天雄

人參

菴蓉

茯苓

當歸

防風

黃耆

薯蕷

細辛

桂心

草薺

姜蕤

白芷

桔梗

黃芩

遠志

牡荊子

芎藭

地骨皮

五加皮

杜仲

厚朴

枳實

白朮

牛膝

丹參

各三兩

獨活

半斤

茵芋

石南

狗脊

各二兩

磁石

十兩

薏苡仁

麥門冬

各一升

生石斛

八兩

菟藿

四兩

生地黃

切二升

右三十九味㕮咀以酒八斗漬七日温服一合日四

五夜一石藥細研別絹袋盛共藥同漬藥力和善主治極多凡是風虛四體小覺有風痲者皆須將服之無所不治也服者一依方修合不得輒信人大言浪有加減

鍾乳酒治虛損通順血脉極補下氣方

鍾乳

石斛

茯苓

兩各五

附子

甘菊

兩各二

右五味以清酒三斗漬服二合日再稍增至一

升

秦朮酒治四肢風手臂不收髀脚疼弱或有拘急攣縮  
屈指偏枯痿躄痛小不仁頑痺者悉主之方

秦朮

天門冬

五加皮

牛膝

附子

桂心

各三兩

巴戟天

杜仲

石南

細辛

各二兩

獨活

一兩

薏苡仁

一兩

右十二味以酒二斗漬之得氣味可服三合漸  
加至五六合日三夜一

木膏酒治脚弱風虛五勞七傷萬病皆主之方

生白朮淨洗一石五斗

擣取汁三斗煎取半

濕荆二十五束束別三尺圍各長二尺五寸徑頭

二寸

燒取溼三斗煎取半

青竹三十束束別三尺圍各長二尺五寸徑一寸

燒取溼三斗煎取半

生地黄根五大斗麤大者

擣取汁三斗煎取半

生五加根

三十六斤淨洗訖對于大釜內以水四石煎之去滓澄清取汁七斗以銅器中

盛大釜內水上煎之取汁三斗  
五升其煎諸藥法一準五加例

右件白朮等五種藥總計得汁九斗五升好糯米一石五斗上小麥麴八斤曝乾為末以藥汁六斗浸麴五日待麴起第一投淨淘米七斗令得三十遍下米置淨席上以生布拭之勿令不淨然後炊之下饋以餘藥汁浸饋調強弱更蒸之待饋上痂生然後下于席上調強弱冷熱如常釀酒法醞之甕中密蓋頭三日後第二投更淘米四斗一如前法投之三日後即

加藥如左

桂心

甘草

白芷

細辛

防風

當歸

麻黃

芍藥

各六兩

附子

五兩

牛膝

九兩

乾薑

五加皮

各一斤

右十二味以咀訖第三投以米四斗淨淘如前法還

以餘汁澆饋重蒸待上痂生下置席上調冷熱如常

釀法和上件藥投之三日外然後嘗甘苦得中訖密

封頭二七日乃壓取清酒一服四合日再服細細加

以知為度溫酒不得過熱慎生冷酢滑猪鯉魚蒜牛肉等

松葉酒主脚弱十二風痺不能行服更生散數劑及衆治不得力服此一劑便能遠行不過兩劑方

松葉六十斤咬咀以水四石煮取四斗九升以釀五斗米如常法別煮松葉汁以漬米并饋飯泥釀封頭七日發澄飲之取醉得此力者甚衆神妙

治脚氣方



好豉三斗蒸一石米下曝乾如是三上以酒五斗漬  
七日去滓飲惟醉為佳酒盡更以二斗半漬之飲之  
如初

側子酒治風濕痺不仁脚弱不能行方

側子

牛膝

丹參

山茱萸

蒟藿根

杜仲

石斛

各四兩

防風

乾薑

蜀椒

細辛

獨活

秦朮

桂心

芎藭

當歸

白木

茵芋 各三兩

五加皮 五兩

薏苡仁 升

右二十味以咀絹袋盛清酒四斗漬六宿初服三合稍加以知為度患目昏頭眩者彌精

膏第五 方例

例曰凡作膏常以破除日無令喪孝污穢產婦下賤人雞犬禽獸見之病在外火灸摩之在內溫酒服如棗核許

神明白膏治百病中風惡氣及頭面諸病青盲風目爛

背管醫耳聾鼻塞齟齬齒根挺痛及癰痔瘡癬疥等方

吳茱萸 蜀椒 芎藭 白朮

前胡 崔氏作白前 白芷 各一升 附子 三十枚 桂心

當歸 細辛 各二兩

右十味呔咀淳苦酒於銅器中淹浸諸藥一宿以成煎猪膏十斤炭火上煎三沸三上三下白芷色黃為候病在腹內温酒服如彈丸一枚日三目痛取如黍米內兩背中以日向風無風可以扇扇之諸瘡痔齟

齒耳鼻百病主之皆以膏傅病在皮膚炙手摩病上

日三

肘後九味  
無桂心

衛侯青膏治百病久風頭眩鼻塞清涕淚出霍亂吐逆  
傷寒咽痛脊背頭項強偏枯拘攣或緩或急或心腹久  
寒積聚疼痛欬逆上氣往來寒熱鼠漏瘰癧歷節疼腫  
關節盡痛男子七傷臃脹腹滿羸瘦不能飲食婦人生  
產餘疾諸病痂疥惡瘡癰腫陰蝕黃疸發背馬鞍牛領  
瘡腫方

當歸

栝蒌根

乾地黄

甘草

蜀椒

兩各六

半夏

合七

桂心

芍藥

細辛

附子

兩各四

黃芩

桔梗

天雄

藜蘆

皂莢

兩各一

厚朴

烏頭

莽草

乾薑

人參

黃連

寄生

續斷

戎鹽

兩各三

黃野葛

分二

生竹茹

升六

巴豆

枚二十

石南

杏仁

兩各一

猪脂

三斗

苦酒

六升

右三十一味，以苦酒漬一宿，以猪脂微火  
上煎之，三下三上，膏成，病在内以酒服，如半棗在外  
摩之日三

神明青膏治鼻中干，灌之并摩服方

蜀椒

合五

皂莢

黄芩

石南

黄連

雄黄

桂心

藜蘆

各三  
銖

白朮

芎藭

大黄

澤瀉

各七  
銖

烏頭

莽草

續斷

人參

各五  
銖

半夏

當歸 各十  
二銖

乾地黄 十一  
銖

姜蕤

細辛

各十  
銖

附子

桔梗 各二  
銖

乾薑 六  
銖

戎鹽

杏子大  
一枚

右二十五味，以苦酒一斗漬之，羊髓一斤為東

南三隅竈內，諸藥炊以葦薪，作三聚，新好土藥沸，即

下置土聚，上三沸，三下訖，藥成以新布絞去滓，病在

外，火炙摩之，在內，溫酒服，如棗核，日三，後稍益，以知

為度

太傅白膏治百病傷寒咽喉不利頭項強痛腰脊兩脚  
疼有風痺濕腫難屈伸不能行步若風頭眩鼻塞有附  
息肉生瘡身體隱軫風搔鼠漏瘰癧諸疽惡瘡馬鞍牛  
領腫瘡及久寒結堅在心腹痛胃痺煩滿不得眠飲食  
欬逆上氣往來寒熱婦人產後餘疾耳目鼻口諸疾悉  
主之亦曰太一神效膏方

蜀椒

升一

升麻

升切一

附子

兩三

巴豆

芎藭

各三  
十銖

杏仁

合五

狸骨

細辛

各一  
兩半



白芷

兩半

甘草

兩二

白朮

兩六

一方用當歸三兩

右十二味以咀苦酒淹漬一宿以猪脂四斤微火煎之先削附子一枚以繩繫著膏中候色黃膏成去滓傷寒心腹積聚諸風腫疾頸項腰脊強偏枯不仁皆摩之日一癰腫惡瘡鼠痿癩瘰癧炙手摩之耳聾取如大豆灌之目痛淚出縹白翳如珠當瞳子視無所見取如粒米傅白上令其人自以手掩之須臾即愈便

以水洗視如平復且勿當風三十日後乃可行鼻中  
痛取如大豆內鼻中并以摩之齟齬痛以綿裹如大  
豆著痛齒上咋之中風面目鼻口喎僻以摩之若晨  
夜行辟霜霧眉睫落數數以鐵漿洗用膏摩之

曲魚膏治風濕疼痛痺四肢羸弱偏跛不仁并癱腫惡瘡  
方

大黃

黃芩

莽草

巴豆

野葛

牡丹

躑躅

芫花

蜀椒

皂莢

藜蘆

附子

各一兩

右十二味以苦酒漬藥一宿以成煎猪膏三斤

微火煎三沸一下別內白芷一片三上三下白芷色

黃藥成去滓微火炙手摩病上日三

野葛膏治惡風毒腫疼痺不仁瘰癧惡瘡癰疽腫脛脚

弱偏枯百病方

野葛

犀角

蛇銜

莽草

外臺作茵芋

烏頭

桔梗

升麻

防風

蜀椒

乾薑

鼈甲

雄黃

巴豆

各一兩

丹參

三兩

躑躅花

一升

右十五味㕮咀以苦酒四升漬之一宿以成煎猪膏

五斤微火煎三上三下藥色小黃去滓以摩病上此

方不可施之猥人慎之

胡洽無丹參躑躅有細辛又蘇恭以白芷防己吳茱萸附

子當歸代巴豆雄黃蛇銜防風鼈甲

蒼梧道士陳元膏治一切風濕骨肉疼痛痺方

當歸

細辛

芎藭

各一兩

桂心

五寸

天雄 三十枚

生地黄 三斤

白芷 一兩

丹砂 二兩

乾薑 十斤

烏頭 三兩

松脂 八兩

猪肪 十斤

右十二味 㕮咀 以地黄汁漬藥一宿 煎猪肪去滓 內

藥煎十五沸 去滓 內丹砂末 熟攪 用火炙手摩病上

日千遍 瘥 胡洽有人參防風各三兩附子三十枚雄黃二兩為十五味肘後千金翼有附子二

十二銖雄黃二兩半太酢三升為十五味崔氏與千金翼同

裴公八毒膏 治卒中風毒腹中絞刺痛 飛尸入臟及魔

寐不寤尸厥奄忽不知人宿食不消 溫酒服如棗核大

得下止若毒氣甚咽喉閉塞不能嚥者折齒內葱葉口中以膏灌葱葉中令下病腫者向火摩腫上若歲中多溫欲省病及行霧露中酒服之內鼻中亦得方

蜀椒

當歸

雄黃

丹砂

各二兩

烏頭

巴豆

各一升

薤白

一斤

莽草

四兩

右八味呔咀苦酒三升漬一宿用猪脂五斤東向竈葦薪火煎之五上五下候薤白黃色絞去滓研雄黃丹砂如粉內之攪至凝乃止膏成盛不津器中諸蜈

蚣蛇蜂等毒者以膏置瘡上病在外悉傅之摩之以破

除日合一方用礬石一兩蜈蚣二枚是名八毒膏

肘後

不用巴豆莽  
草名五毒膏

備急千金要方卷二十四

欽定四庫全書

備急千金要方卷二十五 唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

治諸風方

論雜風狀第一

岐伯曰中風大法有四一曰偏枯二曰風痲三曰風懿  
四曰風痺夫諸急卒病多是風初得輕微人所不悟宜  
速與續命湯依輸穴灸之夫風者百病之長岐伯所言



四者說其最重也

偏枯者半身不隨肌肉偏不用而痛言不變智不亂病

在分腠之間溫卧取汗益其不足損其有餘乃可復也

甲乙經云溫卧取汗則巨取之

風痺者身無痛四肢不收智亂不甚言微可知則可治

甚即不能言不可治

風懿者奄忽不知人咽中塞窒窒然

巢源作噫噫然有聲

舌彊不

能言病在臟腑先入陰後入陽治之先補于陰後瀉于

陽發其汗身轉軟者生汗不出身直者七日死

巢源作  
眼下及

鼻人中左右白者可治一  
黑一赤吐沫者不可治

風痺濕痺周痺筋痺脉痺肌痺皮痺骨痺胞痺各有證  
候形如風狀得脉別也脉微澀其證身體不仁

凡風多從背五臟輸入諸臟受病肺病最急肺主氣息  
又冒諸臟故也肺中風者其人偃卧而胃滿短氣冒悶  
汗出者肺風之證也視目下鼻上兩邊下行至口色白  
者尚可治急灸肺輸百壯服續命湯小兒減之若色黃

者此為肺已傷化為血矣不可復治其人當妄言撮空指地或自拈衣尋縫如此數日死若為急風邪所中便迷漠恍惚狂言妄語或少氣憒憒不能復言若不求師即治宿昔而死即覺便灸肺輸及膈輸肝輸數十壯急服續命湯可救也若涎唾出不收者既灸當並與湯也諸陽受風亦恍惚妄語與肺病相似然著緩可經久而死肝中風者其人但踞坐不得低頭繞兩目連額上色微有青者肝風之證也若脣色青面黃尚可治急灸肝輸

百壯服續命湯若大青黑面一黃一白者此為肝已傷不可復治數日而死

心中風者其人但得偃卧不得傾側悶亂冒絕汗出者心風之證也若脣正赤尚可治急灸心輸百壯服續命湯若脣或青或白或黃或黑者此為心已壞為水面目

亭亭時悚動者不可復治五六日死

一云旬日死

脾中風者其人但踞坐而腹滿身通黃吐鹹汁出者尚可治急灸脾輸百壯服續命湯若目下青手足青者不

可復治

腎中風者其人踞坐而腰痛視脇左右未有黃色如餅  
粢大者尚可治急灸腎輸百壯服續命湯若齒黃赤鬢  
髮直面土色者不可復治

大腸中風者卧而腸鳴不止灸大腸輸百壯可服續命  
湯賊風邪氣所中則傷於陽陽外先受之客于皮膚傳  
入于孫脉孫脉滿則入傳于絡脉絡脉滿則輸于大經  
中成病歸於六腑則為熱不時卧止為啼哭其脉堅大

為實實者外堅充滿不可按之按之則痛也經絡諸脉  
傍支去者皆為孫脉也

凡風之傷人或為寒中或為熱中或為厲風或為偏枯  
或為賊風故以春甲乙傷於風者為肝風以夏丙丁傷  
於風者為心風以四季戊己傷于風者為脾風以秋庚  
辛傷于風者為肺風以冬壬癸傷于風者為腎風風中  
五臟六腑之輸亦為臟腑之風各入其門戶所中則為  
偏風風氣循風府而上則為腦風風入頭則為目風眼

寒飲酒中風則為酒風入房汗出中風則為內風新沐  
中風則為首風久風入房中風則為腸風外在腠理則  
為泄風故曰風者百病之長也至其變化乃為他病無  
常方焉是知風者善行而數變在人肌膚中內不得泄  
外不得散因人動靜乃變其性有風遇寒則食不下遇  
熱則肌肉消而寒熱有風遇陽盛則不得汗遇陰盛則  
汗自出肥人有風肌肉厚則難泄喜為熱中目黃瘦人  
有風肌肉薄則常外汗身中寒目淚出有風遇于虛腠

理開則外出淒淒然如寒狀覺身中有水淋狀時如竹  
管吹處此是其證也有風遇于實腠理閉則內伏令人  
熱悶是其證也

新食竟取風為胃風其狀惡風頸多汗膈下塞不通食  
飲不下脹滿形瘦腹大矢衣則憤滿食寒即洞泄新熱  
食竟入水自漬及浴者令人大腹為水病

因醉取風為漏風其狀惡風多汗少氣口乾喜渴近衣  
則身如火燒臨食則汗流如雨骨節懈惰不欲自勞



新沐浴竟取風為首風其狀惡風而汗多頭痛

新房室竟取風為內風其狀惡風汗流沾衣勞風之為  
病法在肺下使人彊上而目脫唾出如涕惡風而振寒  
候之三日及五日中不精明者是也七八日微有青黃  
膿涕如彈丸大從口鼻出為善若不出則傷肺

風邪客于肌膚虛癢成風胗瘡風邪入深寒熱相搏  
則肉枯邪客半身入深真氣去則偏枯邪客關機中即  
攣筋中亦然邪淫于臟夢臟大形小淫於腑夢臟小形

大邪隨目系入腦則目轉眩邪中精則散視見兩物風邪入臟寒氣客於中不能發則瘖瘡喉痺舌緩不時服藥針灸風逐脉流入臟使人卒瘖緩縱噤瘖致死風入陽經則狂入陰經則癩陽邪入陰病則靜陰邪入陽病則怒

若因熱食汗浴通腠理得開其風自出則覺肉中如針刺步行運力欲汗亦如此也

凡覺肌肉中如刺皆由腠理閉邪氣閉在肌中因欲出

也宜解肌湯則善

夫目睵動口脣動偏喎皆風入脉故須急服小續命湯將八風散摩神明白膏丹參膏依經針灸之

諸痺由風寒濕二氣併客于分肉之間迫切而為沫得寒則聚聚則排分肉肉裂則痛痛則神歸之神歸之則熱熱則痛解痛解則厥厥則他痺發發則如是此內不在臟而外未發于皮膚居分肉之間真氣不能周故為痺也其風最多者不仁則腫為行痺走無常處其寒多

者則為痛痺其濕多者則為著痺冷汗濡但隨血脈上下不能左右去者則為周痺也痺在肌中更發更止左以應右以應右者為偏痺也

夫痺其陽氣少而陰氣多者故令身寒從中出其陽氣多而陰氣少者則痺且熱也

諸痺風勝者則易愈在皮間亦易愈在筋骨則難痊也久痺入深令榮衛澀經絡時踈則不知痛

風痺病不可已者足如履水時如入湯腹中股脛淫漑

煩心頭痛傷脾腎時嘔眩時自汗出傷心目眩傷肝悲  
恐短氣不樂傷肺不出三年死

一云三日死

太陽中風重感於寒濕則變瘖也瘖者口噤不開背彊  
而直如發瘖之狀搖頭馬鳴腰反折須臾十發氣息如  
絕汗出如雨時有脫易得之者新產婦人及金瘡血脉  
虛竭小兒瘖風大人涼濕得瘖風者皆死溫病熱盛入  
腎小兒瘖熱盛皆瘖瘖厥癩皆相似故久厥成癩宜  
審察之其重者患耳中策策痛皆風入腎經中也不治

流入腎則喜卒然體瘓直如死皆宜服小續命湯兩三劑也若耳痛腫生汁作癰癯者乃無害也惟風宜防耳針耳前動脈及風府神良

諸風第二方

灸法

小續命湯治卒中風欲死身體緩急口目不正舌強不能語奄奄息息神情悶亂諸風服之皆驗不令人虛方

麻黃

防己

崔氏外人參  
臺不用

黃芩

桂心

甘草

芍藥

芍藥

杏仁各一兩

防風一兩半

附子一枚

生薑五兩

右十二味哎咀以水一斗二升先煮麻黃三沸去沫

內諸藥煮取三升分三服甚良不瘥更合三四劑必

佳取汗隨人風輕重虛實也有人脚弱服此方至六

七劑得瘥有風疹家天陰節變輒合服之可以防瘡

一本云恍惚者加茯神遠志如骨節煩疼本有熱者

去附子倍芍藥

小品千金翼同深師古今錄驗有白木不用杏仁救急無芍藥杏仁止十

味延年無防風

小續命湯治中風冒昧不知痛處拘急不得轉側四肢  
緩急遺失便利此與大續命湯同偏宜產後失血并老  
小人

麻黃

桂心

甘草

各二兩

生薑

五兩

人參

芍藥

白朮

前方有杏仁

附子

防己

芍藥

黃芩

各一兩

防風

一兩半

右十二味以水一斗二升煮取三升分三服古今

錄驗無桂心名續命

湯胡洽千金翼同



又方治風歷年歲或歌或哭或大笑言語無所不及方

麻黃三兩

人參

桂心

白朮各二兩

芍藥

甘草

防已

黃芩

芎藭

當歸各一兩

右十味呔咀以水一斗二升煮取三升分三服日三

覆取汗

大續命湯治肝厲風卒然瘖瘂依古法用大小續命二

湯通治五臟偏枯賊風方

麻黃

兩八

石膏

兩四

桂心

乾薑

芍藥

兩各二

當歸

黃芩

兩各一

杏仁

枚三十

荆瀝

升一

右九味㕮咀以水一斗先煮麻黃兩沸掠去沫下諸

藥煮取四升去滓又下荆瀝煮數沸分四服能言未

瘥後服小續命湯舊無荆瀝今增之效如神

千金翼有甘草

又方治大風經臟奄忽不能言四肢垂曳皮肉痛癢不

自知

獨活

麻黃 各三兩

芍藥

防風

當歸

葛根

生薑

桂心

茯苓

附子

細辛

甘草 各一兩

右十二味以水一斗二升煮取四升分五服老

小半之若初得病便自大汗者減麻黃不汗者依方

上氣者加吳茱萸二兩厚朴一兩乾嘔者倍加附子

一兩啗者加橘皮二兩若胸中吸吸少氣者加大棗

十二枚心下驚悸者加茯苓一兩若熱者可除生薑

加葛根初得風未須加減便且作三劑停四五日已  
後更候視病虛實平論之行湯行針依穴灸之  
又方治與前大續命湯同宜產婦及老小等方

麻黃

芍藥

各三兩

乾薑

石膏

人參

當歸

桂心

甘草

各二兩

杏仁

四十枚

右九味㕮咀以水一斗煮取三升分三服

外臺名續命湯范注

同云是張仲景方本欠兩味

西州續命湯治中風痲

一作入臟

身體不知自收口不能言

冒昧不識人拘急背痛不得轉側方

麻黃

六兩

石膏

四兩

桂心

二兩

甘草

芍藥

乾薑

黃芩

當歸

各一兩

杏仁

三十枚

右九味以水一斗二升煮麻黃再沸掠去上沫

後下諸藥煮取四升初服一升猶能自覺者勿熟眠

卧可厚覆小小汗出已漸減衣勿復大覆可熟眠矣

前服不汗者後復一升汗後稍稍五合一服安穩乃服勿頓服也汗出則愈勿復服飲食如常無禁忌勿見風并治上氣欬逆若面目大腫但得卧服之大善凡服此湯不下者人口噓其背湯則下過矣病人先患冷汗者不可服此湯若虛羸人但當稍與五合為佳間有輒行此湯與產婦及羸人喜有死者皆為頓服二升傷多且湯濁不清故也但得清澄而稍稍服微取汗者皆無害也

胡洽方古今錄  
名大續命湯

大續命散治八風十二痺偏枯不仁手足拘急疼痛不  
 得伸屈頭眩不能自舉起止顛倒或卧苦驚如墮地狀  
 盜汗臨事不起婦人帶下無子風入五臟甚者恐怖見  
 鬼來收攝或與鬼神交通悲愁哭泣忽忽欲走方

麻黃

烏頭

防風

桂心

甘草

蜀椒

杏仁

石膏

人參

芍藥

當歸

蘭茹

翼作  
莠

黃芩

茯苓

乾薑

各一兩

右十五味治下節以酒服方寸七日再後加以知為度

續命煮散治風無輕重皆主之方

麻黃

芍藥

獨活

防已

甘草

杏仁

各三兩

桂心

附子

茯苓

升麻

細辛

人參

防風

各二兩

石膏

五兩

白朮

四兩

右十五味粗篩下以五方寸匕內小絹袋子中以水



四升和生薑三兩煮取二升半分三服日日勿絕慎  
風冷大良吾嘗中風言語蹇澀四肢痠曳處此方日  
服四服十日十夜服之不絕得愈

排風湯治男子婦人風虛濕冷邪氣入臟狂言妄語精  
神錯亂其肝風發則面青心悶亂吐逆嘔沫脇滿頭眩  
重耳不聞人聲偏枯筋急曲拳而卧其心風發則面赤  
翕然而熱悲傷瞋怒張目呼喚其脾風發則面黃身體  
不仁不能行步飲食失味夢寐倒錯與亡人相隨其肺

風發則面白欬逆唾膿血上氣奄然而極其腎風發則  
面黑手足不遂腰痛難以俛仰痺冷骨疼諸有此候令  
人心驚志意不定恍惚多忘服此安心定志聰耳明目  
通臟腑諸風悉主之

白鮮皮

白朮

芍藥

桂心

芎藭

當歸

杏仁

防風

甘草

各一兩

獨活

麻黃

茯苓

各三兩

生薑

四兩

右十三味呔咀以水一斗煮取三升每服一升覆取  
微汗可服三劑

大八風湯治毒風頑痺躄曳手脚不遂身體偏枯或毒  
弱不仁或風入五臟恍恍惚惚多語喜忘有時恐怖或  
肢節疼痛頭眩煩悶或腰脊彊直不得俛仰腹滿不食  
欬嗽或始遇病時卒倒悶絕即不能語便失瘖半身不  
遂不仁沉重皆由體虛恃少不避風冷所致治之方

當歸 二兩

五味子

升麻

各一兩半

烏頭

黃芩

芍藥

遠志

獨活

防風

芍藥

麻黃

秦朮

石斛

人參

茯苓

石膏

黃芪

紫苑各一兩

杏仁四十枚

甘草

桂心

乾薑各二兩

大豆一升千金翼云二合

右二十三味以水一斗三升酒二升合煮取四

升彊人分四服羸人分六服

八風散治八風十二痺猥退半身不遂歷節疼痛肌肉

枯焦皮膚暈動或筋緩急痛不在一處卒起目眩失心  
 恍惚妄言倒錯身上痞癩面上起疱或黃汁出更相染  
 漬或燥或濕顏色乍赤乍白或青或黑角弓反張乍寒  
 乍熱方

麻黃

白朮

羌活

黃芩

大黃

栝蒌根

甘草

欒荊

天雄

白芷

防風

芍藥

天門冬

石膏

山茱萸

食茱萸

斤半

斤各一

斤二

一斤五兩

各十兩

躑躅各五升

茵芋十四兩

附子三十枚

細辛

乾薑

桂心各五兩

雄黃

硃砂

丹參各六兩

右二十五味治下篩酒服方寸匕初每日一服三十

日後日再五十日知百日瘥一年平復長服不已佳

先食服

小八風散治迷惑如醉狂言妄語驚悸恐怖恍惚見鬼  
喜怒哀憂煩滿顛倒邑邑短氣不得語語則失忘或心

痛徹背不嗜飲食惡風不得去帷帳時復疼熱惡聞人  
 聲不知痛癢身悉振搖汗出猥退頭重浮腫爪不知痛  
 頸項強直口面喎戾四肢不隨不仁偏枯攣掣不得屈  
 伸悉主之方

天雄

當歸

人參各五分

附子

天門冬

防風

蜀椒

獨活各四分

烏頭

秦朮

細辛

白朮

乾薑各三分

麻黃

山茱萸

五味子

桔梗

白芷

柴胡

莽草  
各二分

右二十味治下篩合相得酒服半方寸匕漸至一匕  
日三服以身中覺如針刺狀則藥行也

烏頭湯治八風五尸惡氣遊走胃心流出四肢來往不  
住短氣欲死方

烏頭

芍藥

乾薑

桂心

細辛

乾地黄

當歸

吳茱萸

甘草

各二兩



右丸味呔咀以水七升煮取二升半分三服

葉耳散治諸風方

當以五月五日午時乾地刈取葉耳葉洗曝燥擣下  
篩酒若漿服一方寸匕日三作散若吐逆可蜜和為  
丸服十九準前計一方寸匕數也風輕易治者日再  
服若身體有風者皆作粟肌出或如麻豆粒此為風  
毒出也可以鉞針刺潰去之皆黃汁出盡乃止五月五  
日多取陰乾之著大甕中稍取用之此草辟惡若欲

看病省疾者便服之令人無所畏若時氣不和舉家  
服之若病胃脹滿心悶發熱即服之并殺三蟲腸痔  
能進食一周年服之佳七月七月九月九皆可採用  
治心風虛熱發即恍惚煩悶半身不仁攣急方

荆瀝

竹瀝

各五升

枸杞根白皮

生麥門冬

各一升

香豉

三合

人參

茯苓

梔子仁

黃芩

芎藭

桂心

細辛

杏仁

防風

白鮮皮各二兩

生薑

石膏

甘草各三兩

右十八味呖咀以水二斗和竹瀝荆瀝者取三升分

四服相去如人行六七里凡五劑間三日服一劑用一

防已三兩

治虛熱恍惚驚邪恐懼方

荆瀝升三

竹瀝升二

香豉合三

牛黃銖十八

生麥門冬

人參各三兩

升麻

鐵精

天門冬

龍齒

茯苓

梔子各二兩

右十二味㕮咀以水二斗煮取三升去滓下牛黃鐵  
精更煎五六沸取二升七合分五服溫服相去十里  
久

地黃煎治熱風心煩悶及脾胃間熱不下食冷所致

生地黃汁

枸杞根汁

升二生薑汁

酥

各三升

荆瀝

竹瀝

各五升

天門冬

人參

各八兩

茯苓

六兩

大黃

梔子仁

各四兩

右十一味搗篩五物為散先煎地黃等汁成煎次內

散藥攪調每服一匕日再漸加至三匕覺利減之

又方黃芩

乾藍

芍藥

鼠尾草

各三兩

梔子仁

生葛

各六兩

羚羊角

五兩

豉

一升綿裹

右八味哎咀以水七升煮取二升五合分三服

治積熱風方

地骨皮

萎蕤

丹參

黃芪

麥門冬

澤瀉

各三兩

清蜜

薑汁

各一合

生地黃汁

一升

右九味以水六升煮取二升去滓內地黃汁更緩火煮減一升內蜜及薑汁又煮一沸藥成溫服三合日再大防風湯治中風發熱無汗肢節煩腹急痛大小便不利方

防風

當歸

麻黃

白朮

甘草

各十八銖

黃芩

三十銖

乾地黄

山茱萸

茯苓

附子

各一兩

右十味以水九升煮取二升半一服七合大小

便不利內大黃人參各十八銖大棗三十枚生薑三

兩煮取三升分三服

深師加天門冬一兩

大戟洗湯治中風發熱方

大戟

苦參各等分

右二味為末以藥半升白酢漿一斗煮三沸適寒溫洗從上下寒乃止立瘥小兒三指撮許漿水四升煮洗之

金牙酒療積年八風五疰舉身躡曳不得轉側行步跛

躄不能收攝又暴口噤失音言語不正四肢背脊筋急  
 腫痛流走不常勞冷積聚少氣乍寒乍熱三焦不調脾  
 胃不磨飲滯結實逆害飲食酢咽嘔吐食不生肌醫所  
 不能治者方

金牙

碎如米粒用  
小絹袋盛

乾地黄

地膚子

無子用莖蘇  
恭用蛇床子

蒟蒻根

附子

防風

細辛

莽草

各四兩

羌活

一斤胡洽  
用獨活

蜀椒

四合



右十味以咀盛以絹袋用酒四斗於瓷甕中漬密閉  
 頭勿令洩氣春夏三四宿秋冬六七宿酒成去滓日  
 服一合此酒無毒及可小醉常令酒氣相接不盡一  
 劑病無不愈又令人肥健酒盡自可加諸藥各三兩  
 惟蜀椒五兩用酒如前勿加金牙也冷加乾薑四兩

服此酒勝灸刺起三十諸風痺曳神驗  
肘後備急用  
 升麻乾薑各

四兩人參二兩石斛牛膝各五兩不用蒟蒻根為十  
 四味蘇恭不用地黃為十三味一方用疾藜四兩黃  
 芪三兩胡洽用續斷四兩為十一  
 味千金翼用茵芋四兩無莽草

常山太守馬灌酒除風氣通血脉益精華定六腑聰明  
耳目悅澤顏色頭白更黑齒落更生服藥二十日力勢  
倍六十日志氣充盈八十日能夜書百日致神明房中  
強壯如三十時力能引弩年八十人服之亦當有子病  
在腰膝藥悉主之方

天雄

二兩  
生用

商陸根

躑躅

蜀椒

各一  
兩

烏頭

一枚  
大者

附子

五枚

桂心

白斂

茵芋

乾薑

各三  
兩

右十味呔咀以絹袋盛酒三斗漬春夏五日秋冬七  
日去滓初服半合稍加至兩三合擣滓為散酒服方  
寸匕日三以知為度夏日恐酒酸以油單覆之下井

中近水令不酸也

千金翼無商陸  
桂心為八味

蠻夷酒治久風枯攣三十年著床及諸惡風眉毛墮落

方

乾地黄

獨活

丹參

礬石

各一兩

麥門冬

附子

甘遂

各二兩

赤石脂

二兩半

乾薑

蕪荑

芫花

栝子仁  
各合

蘇子升一

茯苓

茯神翼作茯苓

金牙

薯蕷

白朮

杜仲

石南

牡荊子

山茱萸

款冬各十八銖

白芷

烏喙

烏頭

人參

狼毒

蜀椒

防風

細辛

礬石

寒水石

牛膝

麻黃

芎藭

當歸

柴胡

芍藥

牡蠣

桔梗

狗脊翼作  
枸杞

天雄各半  
兩

石斛

桂心各六  
銖

右四十五味以酒二斗漬夏三日春秋六日冬

九日一服半合密室中合藥勿令女人六畜見之三

日清齋乃合千金翼無芎藭云加  
大棗四十枚更佳

又方治八風十二痺偏枯不隨宿食久寒虛冷五勞七

傷及婦人產後餘疾月水不調皆主之方

礬石

桂心

白朮

狼毒

半夏

石南

白石脂

龍膽

續斷

芫花

白石英

代赭

蘭茹

石韋

玄參

天雄

防風

山茱萸

桔梗

藜蘆

卷栢

細辛

寒水石

烏頭

躑躅

蜀椒

白芷

秦朮

菖蒲

各一兩

礬石

附子

遠志

各二兩

石膏

二兩半

蜈蚣

一枚

右三十四味呔咀以酒二斗漬四日每服一合日再

十日後去滓曝乾擣篩為散酒服方寸匕日再以知

為度胡洽四十二味無桂心細辛烏頭躑躅蜀椒而有芒硝恒山黃芩黃連大黃麻黃地黃前胡甘

草菟絲子芍藥紫苑各一兩杏仁一十枚同擣篩絹袋盛用水三斗麴三斤黍米三斗作飯依釀酒法以

藥袋置釀中春秋七日冬十日夏三日酒成服半雞子殼日三服曝藥為末酒服方寸匕以身體暖為度

魯王酒治風眩心亂耳聾目暗淚出鼻不聞香臭口爛

生瘡風齒瘰癧喉下生瘡煩熱厥逆上氣胸脇肩膊痛

手不能上頭不能帶衣腰脊不能俯仰脚酸不仁難以

久立八風十二痺五緩六急半身不遂四肢偏枯筋攣  
不可屈伸賊風咽喉閉塞哽哽不利或如錐刀所刺行  
人皮膚中無有常處久久不治入人五臟或在心下或  
在膏肓遊走四肢偏有冷處如風所吹久寒積聚風濕  
五勞七傷虛損百病悉主之方

茵芋

烏頭

躑躅 各三  
十銖

天雄

防己

石斛 二十  
四銖

細辛

牛膝

甘草

栝子仁

通草

桂心



秦朮

茵陳

山茱萸

黃芩

胡洽竹黃者

附子

瞿麥

乾地黄

王不留行

胡洽作天門冬千金翼作王蓀

杜仲

澤瀉

石南

防風

遠志

各十八銖

右二十五味，以酒四斗漬十日，每服一合，加至

四五合，以知為度。

千金翼名此為魯公酒有乾薑胡洽無防已以絹囊盛藥用水二斗

法麴二斤同漬三四宿出藥囊炊二斗黍米內汁釀之酒熟飲如雞子大日二服稍稍飲之以知為度

又方治風偏枯半死行勞得風若鬼所擊四肢不遂不

能行步不自帶衣攀躄五緩六急婦人帶下產乳中風  
五勞七傷

乾薑

躑躅

桂心

甘草

芍藥

續斷

細辛

附子

秦朮

天雄

石膏

紫苑

各五兩

葛根

通草

防風

栝子仁

巴戟天

石斛

石南

山茱萸

石龍芮

四兩

天門冬

牛膝

各八兩

烏頭

二十枚

蜀椒升半

右二十五味㕮咀以水五升漬三宿法麴一斤合漬  
秫米二斗合釀三宿去滓炊糯米一斗醞三宿藥成先  
食服半合日再待米極消盡乃去滓曝乾末服

獨活酒治八風十二痺方

獨活

石南

各四兩

防風

三兩

附子

烏頭

天雄

茵芋

各二兩

右七味㕮咀以酒二斗漬七日每服半合日三以知

為度

灸法

扁鵲云治卒中惡風心悶煩毒欲死急灸足大趾下橫  
文隨年壯立愈

若筋急不能行者內踝筋急灸內踝上四十壯外踝筋  
急灸外踝上三十壯立愈

若眼戴精上插灸目兩眥後二十壯

若不能語灸第三椎上百壯

若不識人灸季肋頭七壯

若眼反口噤腹中切痛灸陰囊下第一橫理十四壯灸卒死亦良

治久風卒風緩急諸風卒發動不自覺知或心腹脹滿或半身不隨或口噤不言涎唾自出目閉耳聾或身冷直或煩悶恍惚喜怒無常或脣青口白戴眼角弓反張始覺發動即灸神庭一處七壯穴在當鼻直上髮際是○次灸曲差二處各七壯穴在神庭兩傍各一寸半是

○次灸上關二處各七壯一名客主人穴在耳前起骨  
上廉陷者中是○次灸下關二處各七壯穴在耳前下  
廉動脈陷者中是○次灸頰車二穴各七壯穴在曲頰  
陷者中是○次灸廉泉一處七壯穴在當頤直下骨後  
陷者中是○次灸凶會一處七壯穴在神庭上二寸是  
○次灸百會一處七壯穴在當頂上正中央是○次灸  
本神二處各七壯穴在耳正直上入髮際二分是又作四分  
○次灸天柱二處各七壯穴在項後兩大筋外入髮際

陷者中是。○次灸陶道一處七壯穴在大椎節下間是。  
○次灸風門二處各七壯穴在第二椎下兩傍各一寸  
半是。○次灸心輸二處各七壯穴在第五椎下兩傍各  
一寸半是。○次灸肝輸二處各七壯穴在第九椎下兩  
傍各一寸半是。○次灸腎輸二處各七壯穴在第十四  
椎下兩傍各一寸半是。○次灸膀胱輸二處各七壯穴  
在第十九椎下兩傍各一寸半是。○次灸曲池二處各  
七壯穴在兩肘外曲頭陷者中屈肘取之是。○次灸肩

髑二處各七壯穴在兩肩頭正中兩骨間陷者中是○  
次灸支溝二處各七壯穴在手腕後臂外三寸兩骨間  
是○次灸合谷二處各七壯穴在手大指虎口兩骨間  
陷者中是○次灸間使二處各七壯穴在掌後三寸兩  
筋間是○次灸陽陵泉二處各七壯穴在膝下外尖骨  
前陷者中是○次灸陽輔二處各七壯穴在外踝上絕  
骨端陷者中是○次灸崑崙二處各七壯穴在外踝後  
跟骨上陷者中是



治風灸上星及百會各二百壯前頂二百四十壯腦戶

及風府各三百壯

一云治大風灸百會七百壯

治百種風灸腦後項大椎平處兩廂量二寸三分須取

病人指寸量兩廂各灸百壯得瘥

治風耳鳴從耳後量八分半裏許有孔灸一切風得瘥

狂者亦瘥兩耳門前後各灸一百壯

治卒病惡風欲死不能語及肉痺不知人灸第五椎名

曰臑輸百五十壯多至三百壯便愈

心輸穴在第五節一云第七節對心橫三間寸主心風  
腹脹滿食不消化吐血酸削四肢羸露不欲飲食鼻衄  
目眴眈眈不明肩頭脇下痛小腹急灸二三百壯

大腸輸在十六椎兩邊相去一寸半主風腹中雷鳴腸  
澀泄利食不消化小腹絞痛腰脊疼彊或大小便難不  
能飲食灸百壯三日一報

掖門在掖下攢毛中一寸名太陽陰一名掖間灸五十  
壯主風

絕骨在外踝上三寸灸百壯治風身重心煩足脛疼



備急千金要方卷二十五

總校官中書臣朱 鈐

校對官中書臣胡紹基

謄錄監生臣邱繹曾