

赤水玄珠第十四卷

新安生生子孫一奎著輯

癲狂癇門

此二證大旨已於醫旨緒  
國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

餘中詳言之矣當參看

生生子曰靈樞云癲癇癲癇不知所苦兩蹠之下

男陽女陰

後人以癲癇為  
一門者述此也

又曰暴擊癇眩足不

任身取天柱

後人言風癇  
者述此也

明癲症

書云多喜為癲多怒為狂難經謂重陰者癲重陽  
者狂

素問厥論篇曰陽明之厥則癲疾欲走呼腹滿不得卧面赤而熱妄見而妄言長刺節論篇曰病之初也歲一發不治月一發不治月四五發名曰癲病又通評虛實論篇曰癲疾厥狂久逆之所生也脉搏大滑久自己小堅急死不治虛可治實則死

靈樞癲狂篇曰癲疾始生先不樂頭重痛視舉目赤甚則極已而煩心喘呼喘悸先反僵因而瞀痛又有骨癲筋癲脈癲嘔多沫沫氣下泄者不

治又曰癲疾者疾發如狂者死不治

據此言疾發如狂者

素問奇病論篇黃帝曰人生而有病

癲疾者病名何矣所淂之岐伯曰病名為胎病此得之在母

腹中時其母有所大驚氣上而不下精氣并居

故令子發為癲疾

啓玄子註曰癲謂上巔即頭首也

綱目曰以其病在頭巔故曰巔疾治之者或吐痰而就高越之或鎮墜痰而從高抑之或內消其痰邪使氣不逆或隨風寒暑濕之法用輕劑養

散上焦或針灸頭中脉絡而導其氣皆可使頭  
顛脈道流通孔竅開發而不致昏眩也是知癲  
癇之癲與厥成癲疾眩冒癲疾之癲一疾也王  
註悞分癲為二疾獨孫真人始能一之今特冠  
此氣亂頭癲等經文於癲癇篇首使人知疾有  
所歸而治有所據也

王機微義曰按內經言癲而不言癇古方以癲癇  
或併言或言風癇或言風癲或言癲狂所指不  
一蓋癲病歸于五臟癲病屬之於心故今以風

癇另立一門而癲狂合為一門也

生生子曰按此以風癇另立一門明其不與癲狂  
相類則是之矣而云癲狂合為一門今終集考  
之並無癲狂門目豈未之補歟

孫兆治相國寺僧充忽患癲疾半年名醫皆不効  
召孫療之孫曰但有醣物儘與食之但待云渴  
可來取藥今夜睡着明日便愈也至夜僧果渴  
孫乃與酒一角調藥一服與之有頃再索酒詢  
之半角其僧遂睡兩晝夜乃覺人事如故僧謝

之問其治法曰衆人能安神矣而不能使神昏得睡此乃靈芝方中硫砂酸棗仁乳香散也人不能用耳

辰砂散 治風痰諸癇狂言妄走精神恍惚思慮迷亂乍歌乍哭飲食失常疾發仆地吐沫戴目竈魄不守醫藥無驗

辰砂

光明有牆  
壁者一兩

酸棗仁

微炒

乳香

半兩

各為末右量患人能飲酒幾何先令恣飲但勿令吐至靜室中以前藥都作一帖溫酒調

下作一盞調之令頓飲如飲酒素少者但隨量取醉服藥訖便安置床枕令卧病淺者半日至一日病深者二三日令家人伺之鼻息勻調但勿喚覺亦不可驚觸使覺湏待其自醒則神魄定矣萬一驚寤不可復治正肅吳公少時心病服此一劑五日方寤遂瘥

經云悲哀動中則傷魂竈傷則狂妄不精不精則不正此悲哀傷竈而狂當用溫藥補魂之陽仲景方以地黃湯本事驚氣丸之類即

是也

經云喜樂無極則傷魄魄傷則狂狂者意不存人此喜樂傷魄而狂當用涼藥補魄之陰辰砂鬱金白礬之類是也

濟世方 治失心

鬱金

七兩項  
蟬肚者乃真

明礬

三兩

為末薄糊為丸桐子大每六十丸湯水任下昔有婦人癲狂數年不愈後遇至人授此方初服覺心胸中有物脫去神氣酒然再服頓

甦至人云此病裏驚得之痰累心竅此藥能

去鬱痰

明狂症

靈樞癲狂篇曰狂之始生也先自悲也喜忘善怒善恐得之憂飢及狂之發少卧不飢自高賢也自辨智也自貴倨也善罵詈日夜不休狂言驚善笑好歌舞妄行不休者得之大恐目妄見耳妄聞善呼多食善見鬼神善笑而不發于外者得之有所大喜

林億公曰狂為痰火盛實癲為心血不足狂病宜

大吐下

生生子曰據此言心血不足者乃醫治攻尅太過以致中氣餒弱而神志不安非癲病一起初便有此不足症也

丹溪曰神不守舍狂言妄作經年不愈如心經蓄熱當清心除熱如痰遂心竅當去痰寧心大率多因痰結於心胸間治當鎮心神開痰結亦有中邪而成此疾者大槩是熱又曰狂病宜大吐

下則除之

素問云陽厥強怒飲以鉄落狂怒出于肝肝屬木  
之意予曾用數次果効考本草能治鬼打鬼注  
安心神治驚邪主癲癇鎮心熱狂走除冒膈中  
熱氣痰涎

病能篇帝曰有病狂怒者此病安生岐伯曰生于陽也帝曰陽何以使人狂岐伯曰陽氣者因暴折而難決故善怒也病名曰陽厥曰何以知之曰陽明者常動巨陽少陽不動不動而動大疔此其候也曰治之柰何曰奪其食即已夫食入

於陰長氣于陽故奪其食即已使之服以生鐵落為飲生鐵落者下氣疾也

夫狂之為病少卧少卧則衛獨行陽不行陰故陽盛陰虛令昏其神得睡則衛得入於陰而陰得衛填則不虛陽無衛助不盛故陰陽均平而愈矣

王海藏治許氏病陽厥狂怒罵詈親踈或哭或歌六脉舉按無力身表如水石發則呌呼聲高內經云奪其食即已因不與之食乃以大承氣湯

下之得臟腑積穢數升狂稍寧數日復發下如此五七次行大便數斗疾瘥身溫脉生良愈此內經奪食法也

保命當歸承氣湯

當歸 大黃各一兩 芒硝七錢 甘草五錢

右每二兩水一大碗姜五片枣十枚煎至一半溫服若陽狂奔走罵詈不知親踈此陽有餘陰不足大黃芒硝去胃中實熱當歸補血益陰甘草緩中加姜棗者胃屬土此引入胃

也經所謂微者逆之甚者從之此之謂也以  
大利為度微緩以瓜蒂散入防風末藜蘆末  
吐之其病立安後用調心散洗心散涼膈散  
解毒湯等調之安

### 明癥症

生生子曰癇痰火所致前人有稱為風癇者劉河  
間謂由熱甚而風燥為其薰化涎溢胸膈而癲  
痰昏冒僵仆也

東垣曰病癇者涎沫出于口冷汗出于身清涕出

于鼻皆陽躋陰躋督衝四脉之邪上行腎不任  
煎熬沸騰上行為之也此奇邪為病不係五行  
陰陽十二經所拘當從督衝二躋四穴奇邪之  
法治之

癇症亦從衝任督三脉氣逆而發者當尋此三脉  
治之○督脈尋長強撥骨間灸之○任脈尋氣  
海陰交衝脉附足少陰脉上行去中行各五分  
陰交穴乃任脈陰衝之會

潔古曰晝發灸陽躋夜發灸陰躋各二七壯陽躋

起於跟中循外踝上行入風池申脉穴也陰躋亦起于跟中循內踝上行至咽喉交貫衝脉照海穴也

劉宗厚曰癇與痓畧相類而實不同其病發身軟時醒者謂之癇身強直反張如弓不時醒者謂之痓病隨其痰之潮作故有時而醒痓病比癇為甚而有挾虛者故因其昏冒而遂致亡者多矣

綱目曰癲癇即頭眩癱在腦間則眩微不仆痰溢

膈上則眩甚仆倒于地而不知人名之曰癲癇徐嗣伯云大人曰癲小兒曰癇其實一疾也然與中風中寒中暑尸厥等仆倒不同凡癲癇仆時口中作聲將省時吐涎沫省後又復發時作時止而不休息中風中寒中暑尸厥之類則仆時無聲省時無涎沫後不復發間有發者亦非如癲癇常發狀也

千金方云病先身熱掣瘓驚啼叫喚而後發癇脉浮者為陽癇病在六腑外在肌膚猶易治也病

先身冷不驚掣不啼呼而病發時脉沉者為陰  
癇病在五臟內在骨髓為難治也劉宗厚謂此  
論癇之陰陽後世有認為寒熱者悞也蓋此疾  
皆以痰熱所作而得在表而淺為陽故云易治  
入裏而深為陰故曰難治乃表裏淺深之謂非  
寒熱之謂也

張子和曰夫癇病不至目瞪如愚者用三聖散投  
之更用火盆于煖室中令汗吐下三法並行次  
服通聖散百餘日則愈矣至于目瞪愚者不可

治內經曰神不守謂神亂也大凡此疾乃肝經  
有熱吐後可服瀉青丸下之劉宗厚謂多由風  
痰膠固胸膈上下故大法先宜吐之吐後可用  
清熱之藥如東垣安神丸守真龍會丸之類皆  
可服不獨通聖散也痰實在裏不解宜導痰清  
熱亦不獨瀉青丸也

劉宗厚曰按癇病古方或云風或云驚癇或云癲  
癇由此疾與中風顛狂急慢驚相類故命名不  
同也原其所由或在母腹中受驚或因聞大驚

而得蓋小兒神氣尚弱驚則神不守舍空則痰涎歸之或飲食失節脾胃有傷積為痰飲以致痰迷心竅而作者治法必當尋火尋痰而論前人多用鎮墜清心之藥固可以治熱可以清痰若有頑痰膠固者此藥未易驅逐在上者必先用吐吐後方宜服此更有痰實在裏者亦須下之隨病輕重而用也或曰癇有陰陽何也予曰此與急慢驚者可同論也陽癇不因吐下由其有痰有熱客于心胸之間因聞大驚而作若

盛熱雖不聞驚亦自作也宜用寒藥以攻治之陰癇亦本于痰熱所作醫以寒涼攻下太過損一傷脾胃变而成陰宜用溫平補胃燥痰之藥治之若曰不因壞症而有陰陽之分則是指痰熱所客表裏臟腑淺深而言癇病豈本自有陰寒者哉

丹溪曰癇屬驚與痰不必分五等大率行痰為主  
黃芩黃連瓜萎半夏南星隨痰火多少治之無有不愈 有熱以涼藥清其心 此症必用吐

豆大每服十九至二十丸橘皮湯下

元戎二白丸 治癩與癇

白礬一兩以濕麵包蒸熟去麵入輕粉三五分  
量虛實加減丸如桐子大每服二三十丸生  
姜湯下小兒丸小此

鴟頭丸

皂角五條

酥炙

鴟頭一枚燒

性

號丹五錢

研細

右末糯米糊為丸菉豆大每服十五丸加至  
二十丸米飲下

神應丸 治風癩久服其痰隨糞而下

生明礬一兩

臘茶五錢

右末蜜丸桐子大每服三十丸臘茶下

乳碌丹

乳香 砥砂飛

右用乳香熔化拌和硃砂丸如龍眼大每服  
一丸以側柏葉浸酒磨化溫服

天冬散 治風癩脇痛耳鳴吐逆

天門冬去皮心乾為末酒調下二錢

寶鑑龍腦安神丸 治男婦五種癲癇無問遠近

發作無時

地骨皮

麥門冬

桑白皮

甘草

人參各二

茯神三

馬牙硝二錢

射香

冰片各三錢

牛黃五錢

烏犀一兩

硃砂二錢

金箔大者五帖

右細末煉蜜丸彈子大金箔為衣如風癇病  
冬月溫水化下夏月涼水化下不拘時二三  
歲者日進二服小兒一丸分作二服 虛勞  
發熱咳嗽新汲水化下

茯苓丸 常服治心疾良驗

人參

菖蒲

遠志

茯神

茯苓

辰砂

飛

南星

半夏

麯

真鐵粉各等分

右末姜汁打糊丸桐子大另用辰砂為衣每  
服十九加至三十丸夜卧姜湯下

養心湯 治心虛血少驚惕癲癇

黃蓍

灸

茯苓

茯神

半夏

川芎

川芎

各五錢

錢

酸棗仁

柏子仁

五味子

人參

遠志

桂心

各二錢半

甘草

錢四

加姜枣水煎服

加赤茯苓檳榔治停水怔悸

星黃湯 治心風及邪祟

南星 大黃 等分水煎服 吐痰

益珠丸 治心恙及邪祟

猪心血 砂石一兩 乾青龍花一匙

先將豬心血同龍花研勻入砂石末和丸桐子大每二十丸茶酒任下 甚者不過三服

治癲癇經驗方 一宗 四方 先服此一劑伐邪

竹茹錢半夏曲八分 枳實 橘紅 甘草各

五分 山梔子炒黑一錢 半夏粉 灯草各三分 加姜東

水煎服

第二次服方可服三劑 又服前方一劑又再服此

方三剂

人參一錢

黃芪五錢

歸身一錢

百合二錢

酸棗仁四錢

貝母一錢

小草一錢

甘草梢三錢

酸棗仁生三分

熟酸棗仁四分

分

分

分

分

麥門冬五分

白芍藥各二錢

吳茱萸八錢

炒

八分

分

分

茯神 酒紅花各二錢

各二錢

姜三片

二枚

水煎服

第三方服前二方半月覺神氣稍完繼服此藥

紫河車一具洗淨砂鍋煮爛入鹽少許與服後

半月勿服藥覺少減又服前方一劑第二方三  
劑又再服下項丸藥仍將前二藥間服

丸藥方

牛膽南星八錢

真牛黃四錢

辰砂三錢

真射香三分五

煮甘草膏為丸艾實大金箔為衣薄荷湯下丸

清神湯

治痰迷包絡心熱癲癇

茯神

黃連各二錢

酸棗仁炒

柏子仁

辰砂

仁肉

遠志各一錢

甘草五分

水煎服

痰盛者加南星半夏橘紅瓜萎竹瀝姜汁

海藏治癲癇狂邪不欲眠自賢自智妄行不休此  
方能安五臟下心氣

白雄鷄一隻煮熟五味調和作羹粥食之

仲景防已地黃湯

治病如狂狀妄行獨語不休

無寒熱其脉浮

防已一錢

桂枝

防風各三錢

甘草二錢

右以酒一杯漬一宿絞取汁生地黃二

斤蒸之如斗米飯以銅器盛其汁更絞地

黃汁和勻分二服効

一醉膏 治心恙 無灰酒二碗香油四兩和勻

用楊柳枝二十條逐條攬一二百下候香油與酒相入成膏煎至八分灌之熟睡則醒時或吐下即安矣

治狂之劑

鴻心湯 治心受積熱譏語發狂踰牆上屋

大黃 黃芩 黃連

每四錢水煎服鴻數行然後用安神藥調理  
古參丸 治狂發無時披髮大叫殺人不避水火  
苦參為末蜜丸梧子大每服十五丸薄荷湯下

調胃承氣湯 治狂方在火熱門

大承氣湯 治陽明大實發狂 方在傷寒門

抱膽丸 治癲狂不定非輕劑所能愈者

水銀二兩 黑鉛一兩 辰砂各一兩 乳香各一

右將鉛入銚內熔化離火畧冷入水銀攬硬研碎入辰砂乳香乘熱用柳木槌擂勻丸如芡實大每服一丸灯心湯下病者得睡切莫驚動覺來即安再進一丸又方以猪心血為丸井水吞下用治狂言妄語

牛黃瀉心湯 治心經邪熱狂言妄語心神不安

牛黃

冰片

硃砂各一錢半

大黃生一兩

右末每服三錢生姜蜜水調下

六神散

治發狂

此二方皆禁方

寒水石

黃連

童便炒各一兩

丹皮

青礞石

過燶錢

龍膽草

錢各五分

冰片

二分

右末

童便調下

鎮心丹 治驚悸自汗心煩短氣喜怒悲惡不自知忘魂失魄狀若神靈所憑及男子遺泄女子

帶下

辰砂

飛

白礬

枯

右末水丸鷄豆大每一丸人參湯下

婦人熟入血室發狂不認人以保命集牛黃膏妙

牛黃

二錢半

硃砂

礬金

丹皮

各三錢

甘草

冰片

各一錢

右末煉蜜丸東子大新汲水化下

本事方寧志膏 治狂不睡

人參

酸棗仁

各一兩

辰砂

五錢

乳香

二錢半

右末煉蜜丸彈子大每一丸薄荷湯化下

予族弟緣六火失心與此方服二十丸良愈

親舊多傳云服之皆驗

治癇之劑

碧霞丹 治五種癇疾時作搐掣痰涎壅塞牙關緊急心神迷悶目睛上視

石碌

研九度  
飛一兩

附子尖

七枚

烏頭尖

七枚

鷄梢

七枚

右末麵糊丸萸實大每用等荷湯化下一丸更以酒半合溫服之湏臾吐出痰涎然後隨症治之口噤者幹開灌之

仲景風引湯 除熱治癲癇又治大人風引小小驚癇癲癎日數十發醫所不療又治腳風

大黃

龍骨

乾姜

各四兩

桂枝

三兩

甘草

牡蠣

各二兩

寒水石

各六兩

赤石脂

白石脂

滑石

各二兩

膏 紫石英

各六兩

右粗末以韋囊盛之取三指

撮井花水三升煮三沸溫服一升

之無不効

不用渣

治風熱脚癱

後量多少少

犀角丸 治風癲癇發作有時揚手擲足口吐痰涎不省人事暗倒屈伸

犀角末

五錢

赤石脂

三兩

朴硝

二兩

白芷

一兩

薄荷葉

一兩

右末麵糊丸梧子大每服二十粒

至三十丸溫水下日三服不拘時如覺痰多即減數忌油膩燙炙

楊氏家藏五癇丸 治癲癇不問新久並宜服之

南星 泡烏蛇肉 酒浸一宿去皮骨焙乾 半全蝎 二錢 去尾炒 半夏 酒洗焙雄黃 一錢 蟦蟻 二錢 半足炙姜參 半兩 白附子 兩 炮半兩 射香 三錢 皂角 兩

右先將皂角搗碎水半升搗汁與白礬同熬乾為末入各藥末以姜汁打麵糊丸桐子大

每服三十丸姜湯下

丹溪金丸丸 治諸癇

明礬 鏈金 防風 牙皂角 各一 川芎 二

蜈蚣 条 右末蒸餅糊丸梧子大空心茶下十五丸一日除根

錢氏五色丸 治五癇

辰砂 五錢 水銀 二錢 雄黃 飛珍珠 一鉛 三兩 同水

右末蜜丸麻子大每四五丸金銀薄荷湯下三因六珍丹 治風癇失性顛倒欲死或作五畜等聾掣縱吐沫久而方甦

丹砂五錢

水銀一兩

鉛二兩

銀結砂子雄黃

雌黃

珍珠各兩

一右細末

煉蜜丸梧子大每服三五丸

姜束湯下丸此藥須要搗二三萬杵不然難

嚴氏控涎丸

治諸癇久不愈頑涎聚散無時

生川烏半夏

姜蚕不炒以生姜自然

汁浸一夕各五錢

全蝎

去尾枝七枚

鐵粉三錢

甘遂半錢

右生姜自然汁打薄糊為丸菉豆大硃砂為衣每服十五丸食後姜湯下忌甘草此下痰

刺也

千金龍膽湯

治嬰兒血脉盛實四肢驚掣發熱

并諸驚癇

龍膽草

鈎藤

柴胡

黃芩

桂枝

芍藥

茯苓

甘草各六錢

蟬殼二枚

大黃一兩

右水一升煮取五合服之

本事人參散

治諸癇并慢脾風神昏痰盛

人參五錢

南星一兩切片

以生姜汁并漿水浸煮過性晒乾為末

右每服一錢姜三片水煎服加冬瓜仁少許

斷癇丹

治因驚成癇者

黃芪

鈎藤

細辛

半夏

南星

菖蒲

各

錢蟬退

甘草

桂心

遠志

防風

露蜂

房各二  
錢杏仁半

錢

煉蜜丸菉豆大用硃砂麝少

許為衣每服二十丸東湯下日二服夜一服

甘遂丸甘遂不蛀者三錢為細末將猪心剖開

入甘遂以線縛定用紙裹數層慢火煨熟不可

令焦取甘遂乘潤入辰砂末一錢搗勻作四丸

每服一丸猪心煮湯下

蛇黃丸蛇黃小者二十枚以猪膽汁拌勻入火  
煅通紅取出地上出火毒研極細右用狗膽

一枚取汁和粟米飯丸菉豆大每服十五丸

溫酒下吐涎乃効

蛇黃丹治諸癇及小兒急驚風

蛇黃

四枚研盡內煅紅以

白附子

南星

辰

砂

另麝香各五  
錢研末

右末稭米糊丸桐子大每服量

大小或一二丸或三五丸溫酒米湯任下

當歸龍膽丸治腎水陰虛風熱蘊積時發驚悸

癇搐即龍會丸方在脇痛門

補胃燥痰丸治陰癇服涼藥大過損傷脾胃

白术

二錢

蒼朮

陳皮

半夏

南星

茯苓

各一錢

錢木香

一錢

藿香

七分

甘草

四分

甚者加附子

五分

姜五片水煎服

寶鑑沉香天麻丸

治一小兒四歲因長老摩頂

受記生人念呪恐懼發搐痰涎有聲目多白睛  
強項背一時許方醒後每見皂衣人即發多服  
犀珠腦射鎮墜之藥已四年餘無功又添行步  
動作神思如痴脉沉弦而急針經云心脉滿大  
癇癲筋挛病久氣弱多服鎮墜寒涼之劑復損

正氣故添動作如痴先灸兩蹻各二七壯次服  
此藥

又肝脉小急蓋小兒神氣尚弱因而被驚神思  
無依又動于肝肝主筋故癇癲筋挛

沉香

益智

川烏

各二錢

天麻

防風

半夏

附子

炮各三錢

羌活

五錢

甘草

當歸

姜桑

各一錢半

獨活

四錢

經云恐則氣下精氣怯而上焦閉以  
冤活獨活苦溫引氣上行又入太陽為引用以  
為君天麻防風辛溫以散之當歸甘草辛甘溫

以補氣血之不足養胃氣以為臣附子川烏益智大辛溫行陽退陰又治客寒傷胃腎主五液入脾為涎以生姜半夏燥濕化痰沉香辛溫躉重氣清去怯安神故以為使 每服五錢生姜三片水煎去渣溫服食前三劑愈

劉宗厚曰按癇症本從熱治然亦有壞症而成陰者如錢仲陽所治王氏子吐瀉諸醫藥下之至虛變慢驚手足癆瘻而身冷醫復與八正散錢氏曰不能食而胃中虛若利大小便即死久則

脾腎俱虛當身冷而閉目必用益黃散史君子丸補脾遂能飲食後又不語錢氏以地黃丸補腎一月而安皆此意也此方用大熱之藥乃從權以救前治之失非常治之道也

蜜陀僧 治暗風癲癇以開痰迷心竅

蜜陀僧成塊者纏以鐵線又用鐵線掛火中煅紅用酒醋一升淬盡出火毒為極細末每服一錢射香湯調下

許學士驚氣丸 發則牙關緊急涎潮昏塞醒則

精神若痴

附子

木香

姜棗

白花蛇

橘紅

天麻

麻黃

乾蝎

天南星

姜汁浸一夜各五錢

蘿子

一兩

硃砂

二錢半為衣

右為末加冰射少許煉蜜丸如龍眼大每服一丸金銀薄荷湯化下溫酒亦可此予家秘方也一軍人犯法臨刑得繩縛精神頓失如痴與一丸服訖而寐及覺病已失矣一婦因避盜失心數年授此方不終劑而愈又一婦

狂厥者十年諸治不驗予授此方去附子加鐵落亦不終劑而愈鉄粉非但化痰鎮心至如摧抑肝邪特異若多憤怒肝邪大盛鉄粉能制伏之此金制木之意也

顫振門

生生子曰顫振者非寒禁鼓慄乃木火上盛腎陰不充下虛上實實為痰火虛則腎虧法則清上補下

新寨馬叟年五十九因秋欠稅官杖六十得驚氣

成風搐已三年矣病大發則手足顫掉不能持物食則令人代哺口目張睞唇舌嚼爛抖擗之狀如線引傀儡每發市人皆聚觀夜卧發熱衣被盡蹇遍身燥痒中熱而反外寒久欲自盡手不能繩傾產求醫至破其家而病益堅叟之子邑中舊小吏也以父母病訊戴人戴人曰此病甚易治若隆暑時不過一涌再涌奪則愈矣今已秋寒可三之如未更刺腧穴必愈先以通聖散汗之繼服涌劑則痰一二升至晚又下五七

行其疾小愈待五日再一涌出痰三四升如鷄黃成塊狀如湯熟叟以手顫不能自探妻與代探咽嗌腫傷昏憒如醉約一二時許稍省又下數行立覺足輕顫減熱亦不作足亦能步手能巾擲自持匙筋未至三涌病去如濯病後但覺極寒戴人曰當以食補之久則自退蓋大疾之去衛氣未復故宜以散風導氣之藥切不可以熱劑溫之恐反成他病也

生生子曰據戴人此治非真知其為痰火盛實者

莫敢如此療也木之有餘由金之衰弱病既久  
恐亦有始同而終異者况吐汗下之後謂絕不  
必補養得乎病之輕者或可用補金平木清痰  
調氣之法在人自斟酌之

摧肝丸 鎮火平肝消痰定顫

膽星 鈎藤 黃連酒炒 滑石飛 鐵華粉各一錢  
青黛三錢 姜蚕炒五錢 天麻酒洗二兩 辰砂飛五錢 大甘草  
右末以竹瀝一碗姜汁少許打糊丸蒙豆大  
食後及夜茶下一錢五分忌鷄羊

本事鈎藤散 治肝厥頭搖眩運能清頭目

鈎藤

陳皮

半夏

麥冬

茯苓各七錢

人參

甘菊

勿悞用野菊花

防風

各五分

石膏一錢

甘草

三分

姜二片水煎服

參木湯 氣虛顫掉

人參

白术

黃芪

各二錢

茯苓

甘草

陳皮

各一錢

甚者加附子

水煎服

統旨秘方補心丸 心虛手振

當歸

生地

兩半川芎

甘草

人參

各一兩

柏子仁

酸棗仁各三

遠志去心二

辰砂飛

膽星各五

金箔二十片

麝香一錢

琥珀三錢

石菖蒲六錢

茯神去皮七錢

為末餌餅糊丸

菉豆大辰砂為衣

每七八十丸津嚥下或姜湯下

統旨秘方定心丸

老人戰動風氣所致及血虛

而振

天麻蒸熟

秦艽去芦

金蝎尾

去頭細辛各一

熟地

生地

川歸

川芎

芍藥各二

防風

荆芥各七錢

白术

黃芪半錢

各兩

歲靈仙酒洗五錢

為末酒糊丸梧子大每服七八十丸食遠白

湯或酒送下

癆癰門

生生子曰癆縮也癰伸也伸縮不止手如拽鋸搐

之類也汗多不止為虛無汗能食為實

內經曰心脉急甚者為癆癰此心經虛寒治宜補

心牛黃散之類

又曰心脉滿大瘤癆筋挛此心火實熱也治宜瀉

心火涼驚丸主之

又曰肝脉小急亦癆筋挛此肝虛也宜續斷丸

主之若肝脉盛宜救脾加減建中湯內經謂脾  
脉急甚亦為癆瘕此脾虛肝乘之而癆也故宜  
實土瀉木之劑建中湯是也

劉河間曰諸熱瞀癆皆屬於火熟勝風搏并于經  
絡風主動而不寧風火相乘是以瞀癆生矣治  
以祛風涤熱之劑折其火熟瞀癆立愈若妄加  
灼艾或飲以發表之劑則死不旋踵矣

東垣人參益氣湯 熱傷元氣四肢困倦手指麻  
木時、癆癓 黃芪二錢甘草炙一錢升麻各五分柴胡

六分 五味子三粒 甘草生五分 人參一錢 白芍七分

水煎服

獨活湯 風虛昏曠不自知覺手足癆癓或為熱  
血虛不能服發汗藥及中風自汗尤宜服之

獨活羌活 人參 防風 川歸 細辛 茯

神 遠志 半夏 桂心 白薇 菖蒲 川

芎各五錢 甘草炙二錢半 每一兩姜五片煎溫服

胃風飲 虛風症能食麻木牙關緊急手足癆癓  
目肉瞞瞗胃中有風面腫

白芷

一錢

升麻

二錢

葛根

蒼朮

蔓荆子

川歸身

各一錢

甘草

紫胡

藁本

羌活

草豆仁

黃柏

麻黃

不去節各五分

姜三片東二  
枚水煎溫服

千金薯蕷丸

腎氣虛弱風氣百疾頭眩驚悸癆

癰

薯蕷

廿八分

當歸

十

桂心

七分

神曲

炒熟地黃

人參

各十

川芎

芍藥

白朮

麥冬

杏仁

各六

甘草

各十

柴胡

桔梗

茯苓

各五分

鹿角

膠

七分

乾姜

白斂

各八

防風

黃芩

各六分

大豆

黃卷

七分

大東

百枚

右末和東膏加煉蜜丸如  
彈子大空心酒服一丸日三服

續斷丸

肝勞虛寒腸痛脹滿眼昏不食李縮癆

癰

續斷

浸酒

桂心

甘草

炙各

乾

姜

炮各一兩

桂心

甘草

炙各五錢

右末煉蜜丸桐子大每百丸白湯下

牛黃散

心虛風筋脉痺搐神昏語澁

牛黃

冰片

硃砂

射

各一錢

烏蛇肉

各二

全蝎

炒姜蚕

桑螵蛸

羚羊角

天麻

阿膠

防風

甘菊

桂心

細辛

蔓荆子

側子

去皮

獨活

犀角

各五錢

麻黃

七半錢

右為末和勻再研每服一錢荳淋酒下

續命煮散 風氣畱滯心中昏曇四肢無力口眼

瞓動或時搐搦或渴或自汗

防風

獨活

當歸

人參

細辛

葛根

熟地黃

芍藥

川芎

甘草

遠志

荆芥

半夏

各五錢

官桂

七半錢

每一兩姜三片煎汗多者

加牡礪

一錢半

獨活散治風熱化痰

細辛

石膏

甘草

各五錢

獨活

防風

藁本

旋覆花

川芎

蔓荆

子

各二兩

一右每服三錢姜三片水煎服

瘡門

附勞風

生生子曰內經云肺移熱于腎傳為柔痓古云  
痙勁迫切之謂也仲景諸公傷寒書皆以為太陽  
風濕所致亦有兼陽明經者仲景謂汗下過多  
及瘡家發汗過度皆成痓此指外感之邪原係  
傷寒家法也陳無擇張子和諸公云亦有風火

痰熱之內因者謂此病多由亡血筋無所營故邪得以所襲丹溪謂比癇為虛此皆指內傷之症也觀剛柔二字則亦當有虛實之別大抵剛者多從外感柔者多從內傷故治斯疾者但明知從外感而來則用傷寒家法若從雜症而來則用陳無擇丹溪劉宗厚張子和諸家之法庶表裏詳盡始無遺此失彼之患矣

內經云諸痓項強皆属于湿王注太陽傷濕又云諸暴強直皆属于風王注陽內鬱行于外劉宗厚云按內經言

痓肺腎太陽督脈與夫六氣皆能為之大抵皆主于湿

仲景云太陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛痓成無已曰痓者痓也強也千金曰太陽中風重感寒濕則變痓太陽病發熱無汗為表實則不當惡寒今反惡寒者則太陽中風重感于寒為痓病也以表實感寒故曰剛痓

太陽病發熱汗出不惡寒者名曰柔痓成無已曰太陽病發熱汗出為表虛則當惡寒

其不惡寒者為陽明病今發熱汗出而不惡寒者非陽明証則是太陽中風重感于濕為柔痓也表虛感濕故曰柔痓

太陽病發熱脉沉而細者名曰痓

成無己曰太陽主表太陽病發熱為表病脉當浮大今脉反沉細既不愈則太陽中風重感于濕而為痓也金匱要畧曰太陽病其証備身體強兀兀然脉反沉細此為痓括蒌桂枝湯主之太陽病發汗太多因致痓

成無己曰太陽病發汗太多則亡陽內經曰陽氣去則養神柔則養筋陽微不能養筋則筋脉緊急而成痓也

病身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目脉赤獨搖頭卒口噤背反張者痓病也

成無己曰太陽中風為純中風也太陽中寒為純傷寒也皆不作痓惟是太陽中風重感寒濕乃變為痓也身熱足寒者寒濕傷下也時頭熱面赤目脉赤風傷于上也頭搖風主動也獨頭

搖者頭的諸陽之會風傷陽也若純傷風者身亦為動搖手足為之搐搦此皆內挾寒濕故頭搖也口噤者寒主急也卒口噤者不常噤也有時而緩若風寒相搏則口噤而不時開此皆加之風濕故卒口噤也足太陽之脉起于目內眎上額交顴上其支別者從顴入絡腦還出別下項循肩膊內夾脊抵腰中下貫臀以下至足風寒客于經中則筋脉拘急故頸項強急而背反張也

風病下之則痓復發汗必拘急

瘡家雖身疼痛不可發汗出則痓

劉宗厚曰按此謂汗下而致痓則不專于風寒溫之外傳矣是又因壞證而成也發汗下之太過皆亡津液損血之所由也

劉宗厚曰按痓症屬風寒溫所傷有汗者脉必浮緩無汗者脉必浮緊若其脉沉細者溫所傷也堅直上下行皆緊之象也發汗已其脉如蛇亡津液而無胃氣之象也

子和云呂君王妻年三十病風搐目眩角弓反張數日不食諸醫皆作驚風暗風風癇治之以南星雄黃烏附用之不効戴人曰諸風掉眩皆屬肝木曲直搖動風之用也陽主動陰主靜由火盛制金金泉不能平木肝木茂而自病因湧風痰二三升次以寒劑下十餘行又以排針刺百會穴出血一杯愈

劉宗厚曰按風搐本與痓症不同而痓症屬濕土極必兼風木動搖之化風搐屬木木極必見金

燥緊皴之形要之亦可同論故取此條以證痓病不專風寒濕之外至亦有風火熱之內作者  
也三因方云夫人之筋各隨經絡結束于身血氣內虛外為風寒濕熱之所中則痓以風散氣故有汗而不惡寒曰柔痓寒泣血無汗而惡寒曰剛痓原其所因多由亡血筋無所營故邪得以襲之所以傷寒汗下過多與夫病瘡人及產後致于斯疾者槩可見矣診其脉皆沉伏絃緊但陽緩陰急則久久拘挛陰緩陽急則反張強直二

證各異不可不別

丹溪曰痘切不可作風治兼用風藥 大率與癟相似比癟為甚為虛宜帶補 多是氣虛有火有痰宜用人參竹瀝之類 一男子二十餘歲患痘瘡膿謝後忽患口噤不開四肢強直不能屈時或邊脣腹痛一陣則冷汗如雨痛定則汗止時乍時休其脉絃緊而急如真弦狀向知此子極勤舌意其因勞倦傷血山居多風寒乘虛而感又因痘瘡其血愈虛當用辛溫養血辛涼

散風遂以當歸芍藥為君川芎青皮釣藤為臣白朮陳皮甘草為佐桂枝木香黃連為使更加紅花少許服二十帖而安

王海藏云發汗太過多因致痘身熱足寒項強惡寒頭熱面腫目赤頭搖口噤背反張者太陽痘也 若頭低視下手足牽引肘膝相攪陽明痘也 若一日或左右邪視并一手足搐搦者少陽痘也汗之止之和之下之各隨其經可使必已 在表無汗宜汗之有汗宜止之陽明痘屬

裏宜下之少陽痙半表半裏宜和之所謂各隨其經也

劉宗厚曰謹按傷寒痙病活人以太陽中風又感寒濕而致則專于外邪所傷然仲景亦有汗下過多之戒則又出于壞証所成矣蓋外邪所傷者通宜解散仲景言剛柔活人分陰陽難知論經絡等諸方詳矣至于治壞証補虛救失之法諸方則亡也又千金謂溫病熱入腎中亦為痙小兒病癇熱盛亦為痙若此治法俱未見之也

況此二者之外又有血氣本虛之人如產後汙出多而變痙者或因七情怒氣而發痙者或因濕熱內盛痰涎壅遏經絡而作痙者治各不同也大抵傷寒有外邪之可解宜用風藥發散風寒又風藥亦能勝湿耳至于邪熱入腎亦非風藥之所能療也其內證作痙本無外邪前人豈可仍用風藥處治惟宜補血降火敦土平木清痰去湿隨證而用不可不察也

海藏云若汙後不解乍靜乍躁目直視口噤往來

寒熱脉弦者少陽風痙宜柴胡防風湯

柴胡

防風

各一人參

黃芩

各五

半夏

製六

錢

生姜

甘草

各六

東枝

枝

每服一兩水煎服

若發汗過多發熱頭面搖卒口噤背反張者太陽

兼陽明也

宜去風養血防風當歸散主之

防風

當歸

川芎

地黃

每服一兩水煎

神木湯

治剛痙解利無汗

蒼木

錢

防風

錢

甘草

錢

一

姜葱水煎服

白术湯

加桂心黃芪

治柔痙解利有汗

白术

兩

防風

兩

甘草

一

每服五錢姜三片

水煎服一日二服漸止汗止為解

仲景葛根湯

太陽無汗而小便少氣上衝胸口

禁不得語欲作剛痙者

葛根

四兩

麻黃

兩

生姜

各

三

桂枝

兩

芍藥

三

甘草

五錢

草

各二兩

大東

十二枝

每服五錢煎服取微汗

若發熱無汗惡寒名曰剛痙宜麻黃加獨活防風

湯

麻黃

桂枝

各一兩

芍藥

三兩

甘草

五錢

獨活

防風

各一兩

每服一兩水煎溫服

瓜萎桂枝湯 太陽病其証備身體強兀兀然脉  
反沉遲此為柔痓

瓜萎根

甘草

芍藥各二兩

桂枝

生姜各三兩

大東枝十二枚

水九升煎取三升分三服取微汗

汗不出啜粥發之

海藏

治發汗自汗而不惡寒者名柔痓宜桂

枝加川芎防風湯

桂枝

芍藥

生姜各一兩半

甘草

防風

川芎

各二

大東枝六枚

每服一兩水煎服

凡剛柔二痓皆可與小續命湯 但要識加減法  
若柔痓自汗者去麻黃夏間及病有熱者減桂  
枝一半冬及初春去黃芩  
千金續命湯 卒中半身不遂手足拘急不得屈  
伸身體冷或智或痴或身強直不語或生或死  
狂言不可名狀角弓反張或欲得食或不用食  
大小便不利皆療之

人參

桂心

川歸

獨活

黃芩

甘草

炙

乾姜

炮各七錢半

石膏

一兩

杏仁

四十枚

以水九升煮

取三升分溫三服日二服無汗者加麻黃

若汗後不解乍靜乍躁目直視口噤往來寒熱脉

弦者少陽風症宜柴胡加防風湯

柴胡

防風

各兩

一人參

黃芩

各五錢

半夏

六錢生

姜

甘草

各六錢半束枝

每服一兩水煎

倉公當歸湯

賊風口噤角弓反張症証

川歸

防風

各七錢半

獨活

一兩附子

細辛

五錢

麻

黃

一兩三錢

酒

五升煮取三升

服一升口不開者

格口納之一服當蘇

二服小汗

三服大汗

活人八物白朮散

陰症一二日面腫手足厥冷

筋脉拘急汗不出恐陰氣內傷

麻黃

白朮

茯苓

五味子

羌活

各五錢

桂

心

附子

各三

良姜

一分

每四錢姜五片水煎服

附子散

陰症手足厥逆筋脉拘急汗出不止頭

項強直頭搖口噤

桂心

川芎

各三錢

附子

炮各一兩

白朮

各五

獨活

五錢

每三錢東一枚水煎服

桂心白朮湯

陰症手足厥冷筋脉拘急汗出不

解

口噤

頭搖

口噤

</div

止 白术 防風 甘草 桂心 川芎 附

子 每五錢 姜五片 束二枚 水煎温服

丹溪治虛婦因怒手足強直十指如束右手脉弦虛左手脉弦大而強稍堅此風木攻脾土宜速瀉肝氣助肺金補脾土之陰

黃連

二錢

南星

白术

人參

黃芩

天麻

川芎

木通

陳皮

青皮

各五錢

甘草

一分

水煎入姜汁辣服

肘後方

中風體強直不得屈伸反覆刮柏樹皮

細切一升以酒三升浸一宿每日溫服半升酒

盡再作

即枳實樹皮去風濕効

千金方

治口噤手足不隨而手體強直

伏龍肝

五升以水七升攏匀取汁飲之

痙痙辯

生生子曰丹溪云痙當作痙傳寫之悞耳攷之諸書亦未有能辯之詳註之確者惟郭雍氏云痙與痙當是二病謂昔劉寅氏有言病以時發者謂之痙不以時發者謂之痙似亦未能詳悉厥

後以其所歷見及治之効與不効者反覆考檄  
二症之名二字之義其用心可謂至勤至懇者  
矣然終未能昭著允若故後之人疑其為二症  
者不亦宜乎愚按靈素仲景以下諸書云痙云  
痙字雖兩般治多雷同殆亦不必犁而為二也  
苦辯之則愈支离膚見謂痙乃病之名痙乃病  
之狀原其有剛柔二種以病發之時而經筋脉  
絡僵勁角弓反張故曰痙痙是勁急也是以其  
病發之狀象而名之也不然何歷代諸公或以

治痙之方治痙或以治痙之方治痙諸皆能効  
治既同而不殊則症當一而不二也焉用分

勞風

即痙之類

丹溪云痙比癇為虛蓋因勞汗遇風內挾太陽寒  
濕之邪治亦與痙同法但當視其所勞則知虛  
在何臟如房勞則腎虛汗出腠理開風入皮腠  
得寒則閉風不能出與水俱行其人當目下腫  
如卧蚕之狀戴人云腎主水其經至于目下故  
也不禁房室則死明其虛在腎也所以閑于太

陽何也太陽主寒其經最在外腠理得寒則閉故太陽先受邪也治宜八物白术散倉公當湯

黃芪湯 汗多氣虛發症

黃芪蜜炙二錢 人參 白术 茯苓 白芍炒各一錢

甘草炙八分 桂枝五分 水煎服

當歸散 血虛及去血過多發症

當歸酒洗二錢 川芎 熟地 防風 黃芪各一錢

芍藥一錢半 甘草四分 水煎服

理氣平肝散 七情所傷發症

烏藥 香附各一錢半 青皮 枳殼 芍藥 川芎

柴胡 木香各一錢 甘草

姜三片水煎服木香磨水二匙加入

清痰湯 痰火攻作項強口噤角張反痙

山梔 黃芩 半夏炮炙浸一錢 橘紅 茯苓 瓜萎仁

枳殼 貝母 香附各一錢 甘草五分

水煎入竹瀝姜汁各三四匙食遠服

去濕青熱散

白术二錢 蒼朮二錢半 滾鷄 茯苓 天花粉 山

梔各一  
錢  
甘草四  
水煎服

芎枳丸治勞風強上其視肺熱上壅唾稠  
等分  
為末蜜丸桐子大每服三五

十九食後溫水下日三服

祛風清金散肺熱壅盛痰唾如膿

防風括萎根桔梗枳殼旋覆花川

芎各一  
錢

山梔黃芩貝母瓜萎仁炒

茯苓

天門冬麥門冬橘紅

各八分

五味子

十五粒

甘

草四水煎服

生生子曰按內經評難病論篇帝曰勞風之病何如岐伯曰勞風發在肺下其為病也使人強上冥視唾出若涕惡風而振寒此為勞風之病帝曰治之柰何岐伯曰以救俛仰巨陽引精者三日中年者五日不精者七日欬出清黃涕其狀如膿大如彈丸從口中若鼻中出不出則傷肺傷肺則死也

引精謂日中之精明  
引動能辨人與物也

啓玄子註曰勞風者從勞風生故曰勞風勞謂腎

勞也腎脉者從腎上實肝膈入肺中故腎勞風生上居肺下也強上好仰也冥視謂合眼視不明也腎精不足外吸膀胱膀胱氣不能上營故使人頭項強而視不明也肺被風薄勞氣上薰故令唾出若鼻涕狀腎氣不足陽氣內攻勞熱相合故惡風而振寒肺傷則營衛散解魄不內治故苑林氏謂強上者似角弓反張也冥視者目開不見物也凡瘡病皆同不識人或反視斜視也治法當與瘡同千金方冥視作目眩

不得卧

靈樞曰病而不得眠者何氣使然岐伯曰衛氣不得入于陰常留于陽晉于陽則陽氣滿陽氣滿則陽蹻盛不得入于陰則陰氣虛故目不瞑矣

大惑論

黃帝問于伯高曰夫邪氣之客人也或令人目不瞑不卧出者何氣使然伯高曰五穀入於胃也其糟粕津液宗氣分為三隧故宗氣積于胸中出於喉嚨以貫心脉而行呼吸焉營氣者泌其

津液注之於脉化以為血以榮四末內注五臟六腑以應刻數焉衛氣者出其悍氣之慄疾而先行于四末分肉皮膚之間而不休者也晝日行于陽夜行于陰常從足少陰之分間行于五臟六腑今厥氣客于五臟六腑則衛氣獨衛其外行于陽不得入於陰行于陽則陽氣盛陽氣盛則陽躋陷不得入于陰陰虛故目不瞑黃帝曰善治之柰何伯高曰補其不足瀉其有餘調其虛實以通其道而去其邪飲以半夏湯一劑

陰陽已通其卧立至黃帝曰善此所謂決瀆壅塞經絡大通陰陽和得者也願聞其方伯高曰其湯方以流水千里以外者八升揚之萬遍取其清者五升煮之炊以葦薪火沸置秫米一升治半夏五合徐炊令竭為一升半去其滓飲汁一小杯日三稍益以知為度故其病新發者覆杯則卧汗出則已矣久者三飲而已矣此去飲之劑也內經曰胃不和則卧不安帝曰人之不能偃卧者何也岐伯曰肺者臟之蓋也肺氣盛則肺大肺

大則不能偃卧

王海藏云膽虛不眠寒也

聖惠方酸棗仁炒為末以竹葉湯調服

張子和治一富家婦人因思慮過甚二年不得寐無藥可療其夫求治脉之兩手俱緩此脾受邪也脾主思故也乃與其夫囁以怒激之多取其財飲酒數日不處一法而去其婦大怒汗出是夜困眠如此者八九日不寐自是食其脉得平

此怒勝思法也

水腫病令人不得卧卧則驚驚則歎甚此水氣凌

肺也

溫膽湯治大病後虛煩不得眠或則驚悸極効丹溪治煩不得眠益元散加牛黃服之

有心血不足而不寐者用益榮湯

仲景酸棗湯 治虛煩不得眠

酸棗仁升甘草一知母

茯苓

川芎

各二兩

水八升煮酸棗仁得六升內諸藥煎取三升

分溫三服 一方加生姜二兩

本事鱉甲丸 膽虛不得眠四肢無力

酸棗仁 鱉甲 羌活 牛膝 黃芪 人參