

醫方類聚卷之五十五

傷寒門二十九

無求子活人書二

卷第十八

大半夏湯六十四 治膈間有寒痰治南陽活人書痰飲及脾

和胃不

半夏湯洗如法 白茯苓 生薑各一分

一兩

右細切水兩盞半煎至一盞濾去滓臨睡



溫呷如有熱痰加炙甘草一分如脾胃不和去甘草入陳橘皮一分同煎得效方同

越婢湯六十治風痺脚弱

石膏四兩白朮二兩附子一兩炮甘草一兩

草微赤剉麻黃三兩去節湯泡焙乾

右剉如麻豆人每服四錢水一盞半生薑

三片棗子一枚煎至八分去滓服傷寒活人書溫服

脾約圓六十治老人津液少大便澁及脚氣

有風大便結燥得效方治太陽陽明脾約是也大便堅小便利者其脾為約

大黃二兩酒浸枳殼麩炒厚朴刮去皮薑汁

人書合白芍藥以上各麻子仁一兩微

得效方杏仁去皮尖麩炒黃叁分別

右為細末煉蜜和杵千下圓如梧桐子大

每服二十圓溫水下水類鈴方溫不拘時

候未知加五圓十圓傷寒活人書未知加

丸至五十圓止下利服糜粥將理與正方

同分
各別
○傷寒明理論約者結約之約又
約束之約也內經曰飲入於胃遊溢精氣
上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道
下輸膀胱水精四布五經並行是脾為胃
行其津液者今胃強脾弱約束津液不得
四布但輸膀胱致小便數而大便鞅故曰
其脾為約麻仁味甘平杏仁味甘溫內經
曰脾欲緩急食甘以緩之麻仁杏仁潤物
也本草曰潤可去枯腸胃乾燥必以甘潤

之物為之主是以麻仁為君杏仁為臣枳
實味苦寒厚朴味苦溫潤燥者必以甘甘
以潤之破結者必以苦苦以泄之枳實厚
朴為佐以散脾之結芍藥味酸微寒大
黃味苦寒酸苦漏泄為陰芍藥大黃為使
以下脾之結燥腸潤結化津液還入胃大
便中則利小便少而愈不失矣麻子仁君
兩杏仁臣一升去皮枳實佐半斤炙厚朴尺炙
去芍藥使半斤大黃使一斤去皮右六味蜜和圓

如梧桐子大飲服十圓日三服漸加以知為度

黑神圓六十治温疫時氣有積食者

巴豆新好者一兩經槌去皮以急流水約

冷漉兩出去心膜以帛子拭去水然後研五

靈脂二分黑色大戟半兩生用去皮其裏

荆三稜半兩杏仁半兩燒過後豆豉二兩

新軟者為妙不得令噉

右三味為極細末方入巴豆豉研細後

入杏仁更研令細別入飛羅麵半匙以井

花水調如糊漸次拌藥搜和得所入臼中

擣三二千下圓如菜豆大噉乾入堇合內

頻噉或微火焙亦得如遇傷寒有食積者

脈沉結身體不熱卽下之量患人藏府實

加減圓數服用煎薑棗湯吞下取微利為

度不可大過溇泄身熱下之則為痞氣結

胃若病在上可吐者同生薑乾嚼三五圓

南陽活人書同

神功圓六十治三焦氣壅心腹痞悶六府風熱大便不通津液內枯大腸乾澀裏急後重或下鮮血痰唾稠粘風氣下流腰疼脚重臍下脹痛溺赤如金

大黃三兩人參半兩麻子人五兩兩呵子皮二兩炮取

右件研為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服二十圓溫水下日三服以通為度產後大便秘米飲下十圓

五柔圓六十老人虛人脚氣亡津液虛秘大

便結調補三焦

大黃四兩前胡一兩半夏洗七遍菴蓉浸酒芍藥

茯苓去皮細辛 當歸 葶藶炒各半兩

右搗羅為細末煉蜜為圓如梧桐子大溫水下二十圓以通為度得效方永類鈐方同

大三腕散七治三焦氣逆胃膈虛痞兩脅氣痛面手浮腫大便秘澀兼治脚氣

獨活一兩白木參分乾木瓜切焙乾甘草參分
 紫蘇一兩大復皮一兩沉香一兩木香參分陳橘

皮叁分川芎叁分檳榔叁分麩叁分

右十一味同一處杵為麩散每劑秤一分

水二盞同煎至一盞去滓分二服帶溫服

取便利為効如能臨晚常進半劑依法煎

服即腹藏調和風氣人多秘滯數宜服之

未通利者依法煎服此藥極不虛人氣經

驗多矣脚氣心腹氣悶大便秘滯者最良

椰檳散七十治脚腫

橘葉一大沙木一小便半酒半盞同已

握上藥煎

右煎數沸調檳榔末二錢食後服傷寒活人書指

掌圖永類

薏苡人酒法七十治脚痺

薏苡人 牛膝各二兩海桐皮 五加皮

獨活一兩防風一兩杜仲各一兩白朮半兩枳殼

一兩生乾地黃二兩

右判為麩末以生絹袋內無灰酒五勝浸

春秋冬各二七日夏月盛熱分作數劑逐

旋浸酒每日空心溫服一盞或半盞日三

四服常令酒氣醺醺不絕久服覺皮膚下
如數百條蟲行即風濕氣也 永類鈔方同

木瓜散 七十 治脚氣

大腹 一枚 紫蘇 一分 乾木瓜 一分 甘草 一分 木香 一分

一 羌活 一分

右細判為散分作三服每服用水一盞煎

至半盞去滓通口服之 永類鈔方同

葱豉湯 七十 治傷寒一二日頭項腰背痛惡

寒脉緊無汗

葱白 十五 豉 二大 乾葛 八分 麻黃 四分

右切以水二升先煎麻黃六七沸掠去白

沫乾葛煎二十餘沸下豉煎取八大合去

滓分溫兩服如人行五六里服訖良久煮

葱豉粥熱喫即以衣覆出汗 永類鈔方水

黃去白沫下餘藥煎取

連鬚葱白湯 七十 治傷寒已發汗或未發汗

頭疼如破

生薑 二兩 連鬚葱白 小切

右以水二升煮一升去滓分作二三服服
此湯不差者服葛根葱白湯傷寒活人書同○聖
濟總錄連須葱白寸切生薑兩切右二味
分作三服每服以水二盞煎至一盞去滓
通口服服此湯不差者服葛根葱白湯
葛根葱白湯七十治頭疼不止○經驗良方
治傷寒已發汗未發汗頭痛如破袖珍方治
感風熱頭疼不止

葛根 芍藥良方白芍藥 知母各半 葱白一川

芎一兩 生薑一兩

右剉如麻豆大水三升煎取一升半去滓
每服一湯盞永類鈔方同○良方右咬咀每服
四錢水三大盞煎至盞半小兒作三次熱
服袖珍方右咬咀每服一兩水二盞煎至
一盞去滓食遠溫服

雄鼠屎湯七十治勞復

梔子十四枚枳殼三枚炙○永雄鼠屎二七枚頭尖者

右為麤末每服四錢水一盞半入葱白二寸香豉三十粒同煎一盞分二服勿令病人知鼠屎

黃芩芍藥湯七十治鼻衄

黃芩三分芍藥 甘草各半兩

右為麤末每服三錢水一盞煎至六分去

滓溫服方類鈐

酒蒸黃連圓九十治暑毒伏深累取不差無

藥可治伏暑發渴者

黃連四兩以無灰好酒浸面上約一寸以重湯熬乾

右搗羅為末麵糊圓梧桐子大熟水下三

五十圓胃膈涼不渴為驗

茅花湯八治鼻衄不止

茅花一大把無花以根代之

右水三盞同煎濃汁一盞分二服袖珍方

即差傷寒活人書指掌

枳實理中圓八十一方

小半夏加茯苓湯八十治諸嘔噦心下堅痞

類聚五十五
九

膈間有水痰眩悸

半夏五兩湯浸洗七遍白茯苓三兩去黑軟皮

右剉如麻豆大每服半兩水三盞煎至一

盞秤生薑四錢取自然汁投藥中更煎一

兩沸熱喫不拘時候

桔梗枳殼湯八十三方見三方

赤茯苓湯四十治傷寒嘔噦心下滿胃膈間

宿有停水頭眩心悸

芎藭半兩或作人參一兩去蘆頭赤茯苓一兩或作

五錢半夏半兩湯洗七遍去滑白朮半兩陳橘皮一兩湯浸去白

煨

右搗羅為麤末每服四錢水一盞半生薑

五片煎至七分去滓溫服不拘時候

香薷散五十治陰陽不順清濁相干氣射中

焦名為霍亂此皆由飽食豚膾復啖乳酪海

陸百品無所不餐多飲寒漿眠臥冷蓆風冷

之氣傷於脾胃諸食結而不消陰陽二氣壅

而不反陽氣欲降陰氣欲升陰陽交錯變成

頁五十五

此利不已百脉昏亂榮衛俱虛冷搏於筋令轉筋宜服此方

香薷穗一兩半厚朴去皮二兩黃連二兩二味人生薑四兩同杵炒
色令紫

右搗為籠末每服三錢水一盞酒半盞同煎至七分去滓用新汲水頻頻浸換令極冷頓服之藥冷則効速也仍煎時不得犯鐵器慢火煎之傷寒活人書同兼治非時吐利霍亂腹中撮痛大渴煩躁四肢逆冷冷汗自

出兩脚轉筋疼痛不可忍者須井中沉令極冷頓服之乃有神効

犀角地黄湯八十治傷寒及温病應發汗而不發汗內有瘀血鼻衄吐血面黃大便黑此方主消化瘀血兼治瘡癰管見大全良方瘡癰出得太盛以此解之

芍藥分生地黃半斤○良方洗槌牡丹心一兩犀角一兩屑如無右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎

取一盞寶鑑八分有熱如狂者加黃芩二兩其

人脈大來遲腹不滿自言滿者為無熱更

不用黃芩也傷寒活人書同○王氏集驗方治傷

寒及溫病應汗而不汗之內畜血者及鼻

衄吐血不盡內餘瘀血面黃大便黑消瘀

血方犀角一兩生地黃八兩芍藥二兩牡丹皮

二兩右咬咀以水九升煮取三升分三服喜

忘如狂者加大黃二兩黃芩三兩其人脈

大來遲腹不滿自言滿者為無熱但依方

不須加也袖珍方治血証大便黑衄後脈

微發狂發黃當汗不汗內有瘀血芍藥二錢

生地黃一兩半牡丹皮二錢半犀角二錢半如

代之右咬咀分三服水二盞煎至一盞去滓

通口服食後

黃連解毒湯七十治時疾三日已汗解或因

飲酒復劇苦煩悶乾嘔口燥呻吟錯語不得

卧

黃連一分黃蘗半兩梔子四枚黃芩一分

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎取一湯盞去滓服未知再服進粥以此漸差外臺云凡大熱盛煩嘔呻吟錯語不得眠者傳此方諸人用之亦效此直解毒熱除酷熱不必飲酒劇者得効方同○宣明論治傷寒雜病躁熱毒煩悶乾嘔口燥吟呻喘滿陽厥極深畜熱內甚俗妄傳為陰毒者及下之前後袖珍方及汗下吐後寒涼諸藥不能退熱勢兩感證同法衛生寶鑑傷寒熱毒煩悶口燥或乾嘔用黃連解毒

湯治之春暖夏暑秋熱冬寒若病人舊有鬱熱亦可用也黃連

去鬚黃蘗黃芩大梔子各半右剉如麻豆大

每服秤半兩水一茶盞煎至四分袖珍方每服一

煎一盞絞去滓溫服或腹滿嘔吐或欲

作利者每服加半夏全用厚朴二錢茯苓

○二錢去皮剉用水一盞半生薑三片煎

至半盞絞汁溫服名曰半夏黃連解毒湯

酸棗湯八十治傷寒吐下後心煩乏氣晝夜

不眠

酸棗四升仁〇傷甘草一兩知母二茯苓

參芎兩乾薑兩麥門冬一升去心

右為麝散每服四錢水一盞煎至七分去

滓溫服活人書醫方大成集成南北經驗方袖珍方同

梔子烏梅湯九治傷寒後虛煩不得眠心

中懊懣

梔子半兩黃芩兩甘草半兩柴胡兩烏梅

肉十四枚微炒用

右為麝末每服四錢水一盞半生薑三片

竹葉用七片豉五十粒煎至七分去滓溫

服〇袖珍方梔子黃芩甘草各一錢柴胡二錢

烏梅去核右咬咀生薑三片竹葉二七片

豆豉五十粒水二盞煎至一盞去渣溫服

不拘時

橘皮乾薑湯九治噦

橘皮通草乾薑炮桂心各二兩〇傷

枝人參兩甘草兩

右剉如麻豆大每服四錢水一盞煎至六

類聚 五十五
類聚 五十五

十一
十一

分去滓溫服日三服 永類鈐方同

羌活附子散 九十 治欬逆

羌活 附子 炮 茴香 微炒各半兩 木香 乾薑

炮名大 蘇許大

右為細末每服二錢水一盞塩一捻同煎

一二十沸帶熱服一服止 永類鈐方同 ○袖珍

方治吐利後胃寒咳逆羌活附子 炮去 皮臍 茴

香 炒各五錢 乾薑 炮 丁香 各一兩 右咬咀每服二

錢水一盞塩少許煎至半盞溫服不拘時

活人方去丁香用木香三因方二香並用

半夏生薑湯 九十 治噦欲死

生薑 二兩切 半夏 洗一兩一分

右以水二盞煎至八分去滓分二服溫服

永類鈐方同

黑膏 九十 療溫毒發斑 肘後方此下云大疫難救

好豉 升 生地黃 半斤切

右二味以猪膏二斤合露之煎 肘後方合煎五大沸

令三分減一絞去滓用雄黃麝香如大豆

者內中攪和盡服之毒便從皮中出則愈

忌蕪荑方同

葛根橘皮湯九十療冬温未即病至春被積

寒所折不得發至夏得熱其寒解冬温始發

肌中斑爛癰瘡如錦紋而欬心悶但嘔吐青

汁服此湯即靜

葛根 橘皮 杏仁去皮尖 知母 黃芩

麻黃法節 甘草炙各半兩

右剉如麻豆大每服五錢以水一大盞煎

至壹中盡去滓温服得效方同

玄參升麻湯九十五方

大青四物湯九十治傷寒熱病十日已上發

汗及吐利後熱不除身上斑出

大青四兩 阿膠一兩 甘草一兩

右剉如麻豆大每服五錢水壹錢半煎至

一盞旋入膠再煎令烊傷寒活人書温服

短母桂心湯七十治傷寒後不差朝夕有熱

如瘧

麻黃一兩 甘草二兩 知母一兩 芍藥一兩

黃芩一兩 桂心二兩 或一作一兩

右剉如麻豆大每服四錢水一盞半生薑

四片煎壹盞去滓取八分清汁溫熱服日

三溫覆令微汗若心煩不眠其人欲飲水

當稍稍與之令胃中和則愈得効方同

三黃圓九十 治吐血黃疸

黃連二兩 大黃一兩 黃芩二兩

右檮羅為細末煉蜜為圓如梧桐子大每

服十五圓白湯吞下

桔梗半夏湯九十 治傷寒冷熱不和心腹痞

滿時發疼痛順陰陽消痞滿

桔梗微炒 半夏生薑汁製 陳橘皮湯浸去穢焙

枳實炒赤

右為麤末每服四錢水壹盞生薑三片同

煎七分去滓熱服

三黃熟艾湯百一 治傷寒四五日而大下熱利

時作白通湯諸藥多不得止宜服此湯除熱

止利

黃芩 黃連 黃蘗 各三兩 熟艾 半雞子大

右剉如麻豆大水二大盞煎取七分去滓溫服

薤白湯 一百 傷寒下利如爛肉汁赤帶下伏氣腹痛諸熱毒悉主之

豉 半斤 薤白 壹把 梔子 七枚大

右剉如麻豆大以水二升半先煎梔子十沸下薤白煎至一升許下豉煎取一升二

合去滓每服 湯盞

赤石脂圓 二百 傷寒熱利

黃連 當歸 各二兩 赤石脂 乾薑 炮各一兩

右持羅為末煉蜜為圓如梧桐子大每服三十圓米飲吞下日進三服 傷寒活人書指掌圖同

地榆散 一百 治傷寒毒熱不解日晚即壯熱腹痛便痢膿血

地榆 一兩 犀角屑 一兩 黃連 一兩 茜根 一兩 梔子 半兩 黃芩 一兩

類聚 卷之五

廿九

右搗為麤末每服四錢水一盞入薤白五寸煎至六分去滓不計時候溫服傷寒活人書永

類鈴方同

黃連阿膠湯一百四方見傷寒論注解 桃人湯一百九 黃連

犀角湯一百六 雄黃銳散見一百七方並 百合知

母湯八一百 滑石代赭湯九一百 雞子湯十 白

合洗方十一 百合地黃湯二百十 栝樓牡蠣散

百十 滑石散百十四方並見金匱方

治中湯百十 治脾胃傷冷物胃膈不快腹疼

氣不和

人參 乾薑炮 陳橘皮湯洗 白朮 甘草炙

青橘皮

右各等分為細末每服三錢水壹中蒸煎

數沸傷寒活人書四沸 熱服尋常入塩點之

陽旦湯百十 治中風傷寒脉浮發熱往來汗

出惡風項強鼻鳴乾嘔

桂心傷寒活人書桂枝 芍藥已上各 甘草 黃芩

各二兩

右判如麻豆大每服五錢水一盞半棗子
 一枚生薑三片煎至一盞取八分清汁温
 服白汗者去桂心加附子一枚炮渴者去
 桂心加栝樓三兩利者去芍藥桂加乾薑
 三兩心下悸者去芍藥加茯苓四兩虛勞
 裏急者正陽旦湯主之前煎時入膠飴為佳
 若脉浮緊無汗發熱者不可與也得効方同

白虎加蒼朮湯百十治濕温多汗

知母六兩 甘草炙二兩 石膏一斤 蒼朮叁兩 粳米兩

按白虎湯竹葉石膏湯皆用糯米此方亦合用糯米

右判如麻豆大每服五錢水一盞半煎至
 八九分去滓取六分清汁温服管見大合良方得効

方同

七味葱白湯百十許仁則治傷寒或因起動

勞復或因喫食稍多皆成此候若復甚者一

如傷寒初有此證宜服此湯

乾葛切叁合 麥門冬去心〇承類 葱白連鬚

切半斤〇南陽活人書叁合鈞方半斤 新豉半合 生薑切一合

乾地黄 參勞水 四升以杓泮之一

右七味用勞水煎之三分減二去滓分二

服漸漸覆之取汗

增損四物湯 百十 治少陰下利手足冷無熱

候者

甘草 二兩 人參 二兩 龍骨 二兩 黃連 兩 乾薑 壹

兩附子 一枚炮 去皮臍

右為細散每服三錢水一盞煎至七分日

三服不差復作 下利腹痛加當歸二兩

嘔者加橘皮一兩 南陽活人書得效 方永類鈐方同

化班湯 百二 治班毒

人參 半兩 石膏 半兩 萎蕤 知母 甘草 各一分

右判如麻豆大每服五錢匕水一盞半入

糯米一合煎至八分取米熟為度去滓溫

服 得効方永類鈐方同

官局桔梗湯 百二 治乾嘔

桔梗 半夏 陳橘皮 各一兩 枳實 七

右為麤末每服三錢匕水一盞生薑五片

煎至七分去滓服永類鈔方同

麻黃加朮湯百二治中濕

甘草半兩桂枝一兩麻黃節一兩去蒼朮半兩

杏仁去皮尖

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去

傷寒活人書括

古人云傷寒有輕重湯劑不可一例用明

當隨證加減謂如桂枝加桂湯即本方中

加桂若干減者即去桂若干餘皆倣此

麻黃湯一方見三方

麻黃葛根湯二

麻黃二赤芍藥二乾葛一兩豉一合葱白七莖

右剉如麻豆大每服肆錢水一盞半煎至

八分去滓溫服如人行五里每服厚衣蓋

覆取汗未得汗進少葱粥以助藥力

麻黃升麻湯寒論注解

麻黃甘草附子湯 四

麻黃 參兩 甘草 二兩 附子 一个

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服相次三兩服以身微汗為度

麻黃細辛附子湯 五方見傷寒論注解

麻黃杏子薏苡甘草湯 六

麻黃 二分 杏仁 十枚 薏苡仁 半兩 甘草 一分
右剉如麻豆大作一服水一盞半煎至八

分去滓溫服避風微汗 今用五錢

麻黃杏子甘草石膏湯 七

麻黃 兩 杏仁 五十个 石膏 兩 甘草 兩

右剉如麻豆大每服五錢水壹盞半煎至八分去滓溫服

麻黃連翹赤小豆湯 八

麻黃 甘草 連翹根 各一兩 赤小豆 半升 杏

仁 二十枚 大棗 六枚 生姜 一兩 梓白皮 升

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至

八分去滓溫服

桂枝湯

九加黃芩即名陽旦湯

桂枝

赤芍藥

各一兩半

甘草

一兩

生姜

一兩

大棗

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服取汗桂枝湯唯春初可行春末及夏至已前加黃芩夏至後加知母一兩石膏二兩或加升麻半兩若病人素虛寒者不用加減戒口小便數者及飲酒

家不喜甘者切不可行桂枝也

桂枝大黃湯

十

桂枝

一兩半

芍藥

二兩

甘草

大黃

各一兩

生姜

一兩

大棗

六枚

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服大實痛者用大黃通計一兩半

桂枝芍藥湯

十一即小建中湯也

即桂枝大黃湯中去

大黃是也餘同本方下利者先煮芍藥三

四沸下餘藥

桂枝葛根湯二十

桂枝芍藥

甘草各六錢

葛根一兩生

姜兩大棗四

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至

八分去滓溫服覆取微汗

桂枝附子湯三十

桂枝芍藥

生姜各一兩甘草一兩附子半

大棗六枚

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至

八分去滓溫服

桂枝甘草湯四十

桂枝二兩甘草

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至

八分去滓溫服

桂枝人參湯五十

桂枝一兩參一兩甘草一兩白朮一兩人參乾

姜各一兩

右除桂一味，餘剉如麻豆大，每服五錢，水二盞，煎至壹盞，入桂一錢，同煎至七分，去滓，溫服，日二夜壹。

桂枝加桂湯十桂枝湯中再加桂壹兩餘，同本方，所以加桂以桂能洩奔豚也。

桂枝去桂加茯苓白朮十

芍藥一兩甘草一兩生薑一兩大棗六枚茯苓

白朮各一兩半

右剉如麻豆大，每服五錢，水壹盞，半煎至

八分，去滓，溫服，小便利則愈。以茯苓能利小便也。

桂枝加芍藥生薑人參湯十

桂枝湯中加芍藥半兩生薑半兩人參一兩

右剉如麻豆大，每服五錢，水壹盞，半煎至八分，去滓，溫服。

桂枝括樓湯十

桂枝半兩括樓根一兩白芍藥一兩甘草一兩

右剉如麻豆大，每服五錢，水壹盞，半煎至

七片棗二枚煎至八分去滓溫服

桂枝括樓葛根湯十二

桂枝 白芍藥各一兩 甘草 葛根 括樓

根合二錢半

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半生姜

五片棗二枚煎至八分去滓溫服

桂枝去芍藥加附子湯二十

附子半 大棗六 桂枝一兩 甘草一兩 生姜一兩

半

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至

八分去滓溫服

桂枝二越婢一湯二十二越婢湯本方有木付二味

桂枝 芍藥 甘草 麻黃各參錢 石膏

半 生姜五錢 大棗參

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至

八分去滓溫服

桂枝厚朴杏子湯二十

桂枝 芍藥 甘草 厚朴各六錢 杏仁

十七 生姜兩一 大棗四枚

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服覆取微汗

桂枝麻黃各半湯四二十

抄桂枝湯二錢半麻黃湯二錢半共五錢煎依本方

大青龍湯五二十

麻黃兩參 桂枝兩一 杏仁二十個 甘草 石膏半雞
子生姜半一兩 大棗五介

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服取汗為度汗後不可盡劑也汗出多則為亡陽宜溫粉撲之

小青龍湯六二十

麻黃 半夏已上各參分 芍藥乙分 細辛 乾姜

甘草 桂枝已上各參分 五味子半兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

小青龍湯加蕤花湯七二十本方中加蕤花如

彈子大

小青龍去麻黃加茯苓湯二十本方中去麻

黃加茯苓一兩

小青龍去麻黃加杏子湯二十本方中去麻

黃加杏仁半兩

小青龍去半夏加括樓湯三十本方中去半夏

加括樓根三分

大柴胡湯三十

柴胡二黃芩參分芍藥參分半夏六錢枳殼一枚

生姜一分大棗參大黃兩半

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至

八分去滓溫服以利為度

小承氣湯三十

大黃兩厚朴兩半枳殼一枚

右剉如麻豆大作一服以水一大盞煎至

三分去滓溫服以利為度服湯更衣者止

後服未利者再服之

大承氣湯三十活人書讖語同中載外臺承

氣湯無芒硝尤穗若病輕當於本方中除芒硝也

大黃兩半厚朴兩一枳殼一枚芒硝兩半

右剉如麻豆大水二盞半先煎厚朴枳殼至一盞次下大黃煎取六分去滓次入硝煎一二沸放溫服以利為度未利再服

調胃承氣湯用五錢

甘草兩半芒硝錢九大黃兩一

右剉如麻豆大水一大盞先煎大黃甘草

至七分去滓下硝煎一二沸頓服之

桃仁承氣湯用五錢

桃仁個十二大黃兩一桂枝兩一甘草兩一芒硝兩一

各半

右剉如麻豆大水二盞煎至八分去滓下

硝煎一二沸溫服以利為度

小柴胡湯三升本方中法入參

柴胡兩二黃芩兩一人參已上各參分半夏六錢

草生姜上已各參分棗子參分

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至

八分去滓溫服日三

小柴胡加桂湯三十本方中去人參加桂三

分

小柴胡加五味子湯三十本方中加五味子

一合

小柴胡去半夏加人參括樓湯三十本方中

去半夏加人參三錢三字括樓根一兩

小柴胡去棗子加牡蠣湯四十本方中去棗子

加牡蠣一兩

小柴胡加乾姜牡蠣湯四十本方中加乾姜

半兩牡蠣一兩

小柴胡去人參棗子加五味子乾姜湯四十

本方中去人參棗子加五味子一合乾姜

半兩

小柴胡加茯苓湯四十本方中加茯苓三分

柴胡桂姜湯四十

柴胡二兩桂枝一分括樓根乙兩黃芩一分乾姜

甘草 牡蠣 已上各半兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

柴胡桂枝湯 四十

柴胡 乙兩 桂枝 黃芩 人參 已上各半

夏 四錢 大棗 叁分 甘草 乙字 生姜 半兩 芍藥 半兩

只於小柴胡湯本方中加芍藥桂枝各半兩亦得

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

柴胡龍骨牡蠣湯 四十

柴胡 二兩 黃芩 生姜 鈇丹 人參 桂

枝 茯苓 已上各三分 半夏 合一 大黃 大棗 叁分

龍骨 牡蠣 已上各三分

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

小柴胡去黃芩加茯苓湯 四十 本方中去黃

芩加茯苓一兩

小柴胡去黃芩加芍藥湯 四十 本方中去黃

苓加芍藥三分

四逆湯九十四

甘草兩一乾姜一分附子半介

右剉如麻豆大作一服水一盞半煎至七

分去滓溫服強人加附子半介乾姜三分

通前只作一服

茯苓四逆湯五十方見傷寒論註解

通脈四逆湯五十

甘草二兩附子一介去皮生用乾姜二兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服未差急更作一劑其脈續續出者生面赤者加連翹葱九莖同煎

通脈四逆加豬膽湯五十二今用五錢為率

甘草兩一乾姜錢叁附子一介豬膽汁半合

右三味剉如麻豆大水三盞煎至一盞半

去滓下豬膽汁攪勻分作二次溫服其脈

即來本方中只用乾姜二兩

通脈四逆加芍藥湯五十本方中加芍藥二

兩

當歸四逆湯 五十

桂枝 芍藥 細辛 上已各一兩 通草 甘草

已上各六錢三字

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半棗子壹枚煎至八分去滓溫服

當歸四逆加茱萸生薑湯 五十 本方中加茱萸

莢七合生薑二兩六錢依本方煎服

四逆散 五十

甘草 枳殼 柴胡 芍藥 已上一兩

右搗篩為細末米飲調下二錢欬嗽加五味子乾姜各半兩下利悸者加桂半兩小便不利者加茯苓半兩腹中脹者加附子炮裂半枚泄利下重者先濃煎薤白湯內藥末二錢再煮二兩沸溫服加附子者用水一盞半煎八分去滓

四逆加茯苓散 五十 本方中加茯苓半兩

四逆散加五味子乾姜湯 五十 本方中加五

味子乾姜各半兩

理中湯五十九

人參 甘草 乾姜 白木已上各參兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服腎氣動者去木加桂四兩吐多者去木加生姜三兩下多者還用木悸氣小便不利者加茯苓二兩渴者加木一兩半腹中痛者加人參一兩半寒者加乾姜一兩半或四肢拘急腹滿下利或轉

筋者去木加附子一枚生用

理中元十六

人參 甘草 乾姜 白木已上各參兩

右搗篩為細末煉蜜和元如彈子大沸湯半盞化一元服

增損理中元六十

人參二兩 白木二兩 乾姜參兩 甘草參兩 枳殼二十片 黃芩一兩

右為細末煉蜜和元如彈子大沸湯半盞

化一元服不過五六服胃中豁然矣用藥神速未嘗見也渴者加括樓根一兩不渴除之汗出者加牡蠣二兩不汗除之

枳殼理中元六十

枳殼十六片 茯苓 人參 白朮各二兩 乾姜

甘草各三兩

右為細末煉蜜和元如彈子大每服一元沸湯半盞化下

四順湯六十理中湯中加甘草一倍是也依

本方煎服

四順元六十理中元加甘草一倍煉蜜和丸

如彈子大依本方化服

理中加石膏湯六十本方四味各用壹兩加

石膏半兩

葛根湯六十

葛根一兩 麻黃一分 桂枝半兩 生姜一分 甘草 芍

藥各半兩 大棗三個

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至

八分去滓温服覆取汗為度

升麻葛根湯 六十

升麻 葛根 甘草 芍藥 各參兩

右剉如麻豆大每服五錢水壹盞半煎至八分去滓温服治傷寒中風頭痛憎寒壯熱百節疼痛發熱惡寒鼻乾不得睡兼治大人小兒瘡疹已發未發皆可服及寒暄不時人多疾疫乍暖脫著或暴熱之次忽變陰寒身體疼痛頭重如石若大段寒即

熱服若熱服温服以身涼為度

葛根黃芩黃連湯 六十

葛根 二兩 黃芩 參分 黃連 參分 甘草 半兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓温服

葛根橘皮湯 六十

葛根 橘皮 杏仁 知母 黃芩 麻

黃 甘草 已上各半兩

右剉如麻豆大每服五錢水壹盞半煎至

八分去滓溫服

葛根龍膽湯七十

葛根二兩 生姜二兩 升麻 大青 龍膽 桂

枝 甘草 麻黃 芍藥已上各半兩 萎蕤一兩

石膏一兩半

右剉如麻豆大每服五錢水壹盞半煎至

八分去滓溫服

葛根葱白湯七十

葛根 芍藥 知母已上各半兩 葱白一把

生姜已上各二兩

右剉如麻豆大每服五錢水壹盞半煎至

八分去滓溫服已上二方如要作湯劑秤

藥三兩水三升煎一升半去滓每服一湯

盞

解 甘草乾姜湯七十 甘草附子湯七十三方並見傷寒論注

甘桔湯七十

甘草二兩 桔梗

右剉如麻豆大每服五錢水壹盞半煎至八分去滓溫服

炙甘草湯七十

甘草 生姜參人參半生地黃兩桂枝分

麥門冬合一大棗八合麻仁合一

右剉如麻豆大每服五錢水壹盞半入酒

半盞煎至八分去滓下阿膠壹片煎膠烱

盡溫服日三

茯苓甘草湯七十

茯苓兩甘草兩桂枝兩生姜兩
右剉如麻豆大每服五錢水壹盞半煎至八分去滓溫服

芍藥甘草湯七十芍藥甘草附子湯七十八

傷寒論

甘草瀉心湯九十即半夏瀉心湯也但黃芩

人參甘草分兩稍差耳又名理中人參黃芩

湯

甘草兩黃芩 乾姜各半夏一分大棗

六黃連半兩八參半兩

右剉如麻豆大每服五錢水壹盞半煎至八分去滓溫服

生姜瀉心湯八

生姜二兩黃芩 甘草 人參各一兩半乾姜半兩

半夏一分黃連半兩大棗六個

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

大黃瀉心湯八十

大黃 黃連 黃芩各一兩

右剉如麻豆大作一服百沸湯二大盞熱漬之一時久絞去滓暖動分二服今用五錢

附子瀉心湯八十

附子一個

右剉如麻豆大水三大盞煎至七分去滓取汁入三黃瀉心湯中攪勻暖動分作二服

半夏桂甘湯八十

半夏 桂枝 甘草 各一兩

右剉如麻豆大每服四錢水壹盞半煎至

七分放冷少少呷良久嚥之

小半夏茯苓湯 四十

半夏 五兩 白茯苓 參兩證治論用赤者

右剉如麻豆大每服半兩水三盞煎一半

去滓秤四錢生姜取自然汁投藥中更煎

壹兩沸熱服

半夏生姜湯 八十五即金匱小半夏湯也今用五錢

半夏 一分 生姜 參兩

右剉如麻豆大水二盞煎至八分去滓分

二服

大半夏湯 八十六今用五錢

半夏 白茯苓 生姜 已上各一分

右剉碎遇有寒痰只作一服水三盞半煎

至一盞去滓臨臥溫服如有熱痰加甘草

一分如脾胃不和去甘草加陳皮一分同

煎

生姜汁半夏湯七十○傷寒指掌圖胃中似

喘不喘似嘔不嘔徹心憤憤無奈者

半夏不拘多少指掌圖

右剉碎每服半兩水一盞半生姜自然汁

半盞同煎七分去滓溫服

黃芩半夏生姜湯八十八今

黃芩一分生姜一分半夏六錢芍藥二分大棗

參甘草一分

右剉如麻豆大水三盞煎至八分去滓溫

服每服五錢

柴胡半夏湯八中

柴胡八兩人參三兩半夏三兩甘草二兩黃芩

麥門冬各三兩白朮二兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半生姜

五片棗子一枚煎至八分去滓溫服小柴

胡湯中加麥門冬白朮也

小建中湯九即桂枝芍藥湯是也

桂枝一兩芍藥三兩甘草一兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半生姜
五片棗二枚同煎八分去滓入稠餈一大
匙再煎餈烱盡溫服舊有微澹或嘔者去
餈不用

黃耆建中湯九十小建中湯加黃耆一兩半
煎法同本方

小續命湯九十

麻黃兩半防風一分芍藥 白朮 人參
芎 附子生防已 黃芩已上各桂枝半

甘草兩半

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至
八分去滓溫服柔痙自汗者去麻黃

小續命加生姜汁湯九十煎湯成去滓入生

姜自然汁三匙再煎一沸服

小續命去附子減桂一半湯九十本方中去

附子減桂一半謂如半兩只用一分也寒
熱相兼者宜用此

小續命去附子減桂一半加芍藥一倍湯九十

五謂如元用芍藥一分令加一倍足成半兩是也熱證多者宜用此

黃連橘皮湯九十

黃連四兩橘皮二兩杏仁枳殼麻黃葛

根已上各二兩厚朴一兩甘草一兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至

八分去滓溫服

大橘皮湯九十

橘皮一兩甘草一兩人參二兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半生姜

十五片煎至一盞去滓溫服

小橘皮湯九十又一名生桂陳皮湯今用五錢

陳皮一兩生姜二兩

右剉碎水三盞煎至二盞去滓分二服下

咽即愈

橘皮竹茹湯九十

陳皮一升竹茹半升甘草二兩人參半兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半生

姜十片棗二枚煎至一盞去滓溫服

橘皮乾姜湯一百方見無求子活人書

白虎湯百一

知母半一兩甘草半兩石膏四兩

右剉如麻豆大每服五錢粳米湯一盞半

同煎至八分去滓溫服

白虎加人參湯二百本方中加人參半兩煎如

前法

白虎加蒼朮湯三百白虎本方中加蒼朮三分

煎如前法

粳米湯法粳米一把水三盞煎至一盞半去

米取湯用如濃以清湯添取一盞半

竹葉石膏湯百四

石膏四兩半夏分參人參半兩麥門冬二兩甘草半兩

右剉如麻豆大每服五錢粳米湯一盞半

淡竹葉一小把煎至八分去滓入生姜自

然汁三匙再煎一沸服神效

竹葉湯五百卽是一百四竹葉石膏湯也

黃芩湯 用五錢

黃芩 芍藥 甘草 已上各一分 大棗 參

右剉如麻豆大水二盞半煮至八分去滓

溫服

黃芩芍藥湯 百七

黃芩 參 芍藥 甘草 已上各一分

右剉碎每服三錢水一盞煎至六分去滓

溫服

梔子仁湯 百八方見

梔子蘘皮湯 百九

梔子 介十五 黃蘘皮 二兩 甘草 一分

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至

七分去滓溫服

梔子升麻湯 百一

生地黄汁 斤半 梔子 介十 升麻 二兩 柴胡 二兩

石膏 二兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓服病不解更作若頭面赤去石

膏用乾葛二兩

梔子烏梅湯一百十

梔子兩半烏梅肉十四分甘草一分黃芩各半兩

柴胡兩一

右剉如麻豆大每服四錢水一盞半生姜三片竹葉二十七片豉五十粒煎至七分去滓溫服

梔子豉湯二百十○傷寒指掌圖吐下後心懊憹大下後身熱不去心中結痛

肥梔子四個香豉半兩

右水二盞先煮梔子至一盞內豉同煮取七分去滓溫服得快吐即止後服

枳殼梔子湯三百十

枳殼一個肥梔子叁分豉一分

右以清漿水二盞空煮退八分內枳殼梔子煮取八分下豉再煮五六沸去滓溫服

覆令汗出今用五錢

枳殼梔子大黃湯四百十

枳殼梔子湯每服加大黃如博棊子大五
六枚同煎服

黃連湯 水百十五今用五錢
蓋半煎七分

黃連 甘草 乾薑 已上各
參分 大棗 參
個人

二分半夏
一字 桂枝 參
分

右剉如麻豆大每服全劑水三盞煎至一
盞半去滓分二服

黃連犀角湯 百十六方
見三因方

黃連雞子湯 百十七今
用五錢

雞子黃 半
个 黃連 一
兩 黃芩 各
一分 芍藥 各
一分 阿膠

右剉前三味如麻豆大水二盞煎取八分
去滓入膠烱盡次下雞子黃攪令勻溫服
日三

黃連解毒湯 百十
八

黃連 一
分 黃芩 半
兩 黃蘗 半
兩 梔子 四
个

右剉如麻豆大每服五錢水壹盞半煎取
壹盞去滓溫服

黃連龍骨湯百十九

黃連一兩 黃芩一兩 芍藥已上各壹分 龍骨半兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

黃連阿膠湯百二十

黃連二兩 黃蘗一兩 阿膠一兩 梔子仁半兩

右剉碎每服四錢水壹盞煎至七分去滓溫服不計時候

陽旦湯百廿一方見無

陰立湯百二十二

桂枝四兩 大棗十五介 芍藥 甘草各二兩 乾姜

黃芩各叁兩

右剉如麻豆大每服五錢水壹盞半煎至八分去滓溫服小汗

抵當元百二十三 抵當湯百二十四 方並見傷寒論注解

大陷胃湯百廿五 今分作三服

大黃一兩 芒硝一兩 八錢 甘遂乙字細末

右水二盞煮大黃至八分去滓下硝一沸

次下計遂末溫服快利止後服証治論云此方大峻不可輕用若不得已即用大陷胃元也

大陷胃元 百二 十六

大黃 兩 葶藶 三分 芒消 三分 杏仁 一合 已上

右搗羅上二味為細末內杏仁芒硝合研如脂用白蜜少許和丸彈子大一元入甘遂末一字水二盞半煮取一盞頓服一宿乃下如不下再服

小陷胃湯 百廿七 今 分兩服

右剉如麻豆大水二盞先煮栝樓至一盞半下諸藥取八分去滓溫服未知再作微解黃涎即愈

茯苓桂甘大棗湯 百廿八

茯苓 二兩 桂枝 乙兩 甘草 半兩 大棗 四枚

右剉如麻豆大甘瀾水壹盞半抄藥五錢煎至壹盞去滓服甘瀾水法取水壹斗置大器中以杓揚之水上有珠子五六千顆

相逐取用之一名勞水蓋水性本鹹勞之則甘也

茯苓桂枝白朮湯百廿 白通湯百三十方並見傷寒論注

白通猪膽汁湯百卅

溺乙合二勺半 猪膽乙介用 附子乙枚生

用童子小便乙分 葱白乙个 附子乙枚生 去皮破

右水壹盞煎至五分去滓內尿膽汁和得所分溫服

犀角人青湯百卅

大青三兩 梔子四十枚 犀角屑乙兩 豉半合

右為麤末每服五錢水一盞半煎至八分

去滓溫服

犀角地黄湯百卅三方見無求子活人書

鼠矢鼓湯百卅

梔子十四枚 雄鼠矢二十介 枳殼叁介

右為麤末每服四錢水一盞半葱白二寸香豉三十粒同煎一盞分二服勿令病者

知鼠矢也

猥鼠糞湯百卅五方連須葱白湯百卅六方

活人書

麥門冬湯百卅七

麥門冬二甘草二

右判碎每服五錢粳米湯一盞半棗二个

竹葉十五片同煎壹盞去滓取不能服者

懸滴口中粳米湯法載在白虎湯中

防風白朮牡蠣湯百卅八方見無求子活人書

五味子湯百卅九

五味子半人參 麥門冬 杏仁 橘皮

乾姜已上各棗子叁

右判如麻豆大水二大盞煎至壹 去滓

分二服今用

猪苓湯百四

猪苓 茯苓 阿膠 澤瀉 滑石已上

兩

右判如麻豆大每服五錢水壹盞半煎至

七分去滓然後下阿膠候消盡溫服

白頭翁湯百四十一

白頭翁分 茜藥分 秦皮分 黃連分

右判如麻豆大每服五錢水二盞煎至八

分去滓溫服不差再服

治中湯百四十二 茅花湯百四十三 並見無求子活人書

桔梗枳殼湯百四十四 今用五錢

桔梗兩 枳殼兩

右判如麻豆大以水二盞煎至一盞去滓

分二服

十棗湯百四十五 方見傷寒論注解

旋復代赭湯百四十六

旋復花分 人參兩 生姜一分 代赭分 甘草分

半夏分 大棗分

右判如麻豆大每服五錢水一盞半煎至

八分去滓溫服

乾姜附子湯百四十七 方見傷寒論注解 酸棗湯百四十八 方見

無求子活人書

猪膚湯 百四十九今用五錢水盞半煎七分

猪膚 兩四

右以水二大盞半煎取一盞二分去滓加

白蜜二合半白粉一合二勺半炒香和令

相得溫分三服

陽毒升麻湯 百五十方 陰毒甘草湯 百五十方見

千金

金匱風引湯 百五十二

大黃 乾姜 龍骨 各四兩 桂枝 兩 甘草

牡蠣 兩二 凝水石 滑石 赤石脂 白

石之 石膏 紫石英 各六兩

右十二味杵為麤末以韋囊盛之取三指

撮井花水三升煮三沸去滓溫服一升

玄參升麻湯 百五十三方 太青四物湯 百五十四

猪膽雞子湯 百五十五方

五物木香湯 百五十六

青木香 兩二 丁香 薰陸香 白礬 各一 麝

香 二分

右剉如麻豆大每服四錢水壹盞半煎至八分去滓溫服熱盛者加犀角屑一兩輕者去白礬大效

藥皮湯

百五十七

藥皮兩黃芩兩黃連兩

右剉如麻豆大每服五錢水壹盞半煎至壹盞去滓入阿膠二片再煎膠散服腹痛甚者加梔子壹兩小便不利加茯苓壹兩半兼治久血痢甚驗

真武湯

仲景設此百五十八

茯苓參分芍藥參分生薑參分

利者去之附子一分加四分足成一兩

右剉如麻豆大每服五錢水壹盞半煎至八分去滓溫服

葶藶苦酒湯百五十九方見牡蠣澤瀉散百六

十方見傷寒論注解

治蜜桃仁湯百六十一方百合地黄湯百六

方見金匱方

李根湯 百六十三

半夏 半兩 當歸 一分 生姜 半兩 茯苓 一分 桂枝 一分 芍藥 一分

黃芩 一分 甘草 各一分 李根白皮 二分

右剉如麻豆大每服五錢水壹盞半煎至

八分去滓溫服

射干湯 百六十四

射干 二兩 半夏 五兩 杏仁 三兩 生姜 四兩 甘草 紫苑

肉桂 枳殼 當歸 橘皮 獨活

麻黃 已上各二兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至

八分去滓溫服

萎蕤湯 百六十五 栝樓根湯 百六十六 方並見

求附湯 百六十七

白朮 二兩 附子 一个 甘草 一兩 生姜 半兩 大棗

六介

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至

七分去滓溫服

杏仁湯 百六十八

桂心二兩 麻黃 芍藥 天門冬各一兩 生姜

一兩 杏仁五升

右判如麻豆大每服五錢水一盞半煎至

八分去滓溫服

越婢湯百六十九方見無求子活人書

吳茱萸湯百七

吳茱萸一兩 人參三分 生姜一分 大棗一兩

右判如麻豆大每服五錢水一盞半煎至

八分去滓溫服

赤茯苓湯百七

赤茯苓一兩 夏半兩 陳皮一兩 芎藭半兩 人參一兩

白朮半兩

右判如麻豆大每服四錢水一盞半煎至

七分去滓溫服無時

百合知母湯百七十二方見金匱方

桃花湯百七十三

赤石脂四兩 糯米二合 乾姜一分

右以水二大盞煮三味米熟去滓內赤石

脂細末一方寸匕温服六分蓋日三服愈
勿更服每服秤半兩除赤石脂末在外

赤石脂禹餘糧湯百七

赤石脂四兩禹餘糧四兩

右剉碎每服五錢水壹盞半煎至八分去

滓温服

茵陳湯百七今用五錢水蓋半依方加減服

茵陳蒿一兩大黃一分梔子小十個大

右剉如麻豆大水三大白盞先煮茵陳減

壹盞半內二味煮八分去滓温服日三小

便當利如皂角汁狀此黃從小便出也一

宿腹減

烏扇湯百七 ○傷寒指掌圖咽中閉塞

生烏扇一斤是射干苗猪脂一斤○指掌

右二味合煎藥成去滓取如半雞子大薄

絲裹之內喉中稍稍咽之取差

竹皮湯百七

調中湯百七 八方並見無求子活人書

解肌湯 百七十九

葛根 乙兩 麻黃 分參 黃芩 芍藥 各半 甘草 乙分

桂心 乙分

右六味剉如麻豆大每服五錢水一盞半棗子一个煎取八分去滓溫服如脉淨者再服發汗

知母乾葛湯 百八十八

知母 錢參 乾葛 錢八 石膏 錢六 甘草 錢二 黃芩 木香 升麻 各二錢 萎蕤 錢五 天南星 錢二 人參

二錢 麻黃 錢四 防風 杏仁 芎 羌活 各二錢

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至壹盞去滓溫服未解再服

漢防已湯 百八十一

漢防已 兩四 甘草 兩二 黃其 各二兩 生姜 白朮

各三大棗 分十二

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至一中盞去滓飲訖仍坐被中汗出如虫行或被卧取出汗

防已黃耆湯 二百八

生薑 四分 大棗 四分 黃其 一分 防已 兩 甘草 兩

白米 錢

右剉如麻豆大每服五錢水壹盞半煎至八分去滓溫服良久再服喘者但加麻黃半兩胃中不和者加芍藥三分氣上衝者加桂枝三分下有陳寒者加細辛三分服後常如虫行皮中後腰下如冰後坐被上又以一被繞腹以下溫之令微汗差

附子湯 三百八 燒禪散 四百八 五苓散 五百八 並見傷寒

論注

羌活附子散 六百八

羌活 木 附子 六 茴香 己上各半兩 木香 八 乾姜

各卓許大

右為細末每服二錢水壹盞蒸塩壹捻同煎壹二沸帶熱服壹服止

香薷散 百八 金沸草散 百八 方並見無求子活人書

五積散 百八

正蒼朮 二十兩 桔梗 十二兩 陳橘皮 八兩 枳殼 五兩 吳
 香白花 四兩 官桂 二兩 人參 二兩 厚朴 二兩 芍藥 白
 茯苓 當歸 乾姜 土麻黃 半夏 已上各三
 兩川芎 二兩 法草 二兩 水壹 熟 煎 四
 右作除枳殼肉桂橘皮其餘並一處生搗
 爲麤末分作六分於大鑊內用文武火炒
 令黃熟不得焦用紙攤於板床上候冷入
 前件枳殼官桂橘皮末一處和勻入瓷合
 盛每服二錢水壹盞薑生薑三片同煎至七

分去滓溫服傷寒入葱白豆豉七粒陰經
 傷寒加附子同煎臨時加減

牛蒡根散 百九 孫用和方

牛菜 十條 麻黃 二兩 牛膝 二兩 天南星 各二兩 地龍

乙兩

右先以牛菜去皮細剉并諸藥入在沙盆
 內研細後用好酒壹升同研爛用新布搵
 取汁後用炭火半秤燒一地坑子內通赤
 後去炭掃淨投藥汁於坑內再以火燒令

黑色將出於乳鉢內細研每服半錢温酒

調下每日三服

檳榔散 百九一方見無
求子活人書

茵陳五苓散 百九
十二

茵陳藁末 十五苓散末
五分

每服方寸匕食前米飲調服日三或濃煎

茵陳汁調五苓散亦得

霹靂散 百九三方見無
求子活人書

木通散 百九 ○傷寒指掌圖小便難而黃

蘧麥 半兩 木通 乙兩 赤茯苓 八兩 車前葉 滑石

已上各
乙兩

右為末每服四錢水一中盞煎至六分去

滓温服以通為度

雄黃銳散 百九五方
見三因方

敗毒散 百九
六

羌活 獨活 前胡 柴胡 芎藭 枳

殼 白茯苓 桔梗 人參 已上各
乙兩 甘草

半兩

右爲細末每服二錢水一盞入生姜二片煎至七分溫服或沸湯點亦得治傷寒溫疫風濕風眩拘蹇風痰頭疼目眩四肢痛憎寒壯熱項強睛疼及老人小兒皆可服或瘴煙之地或溫疫時行或人多風痰或處卑濕脚弱此藥不可闕也日三二服以知爲度

木瓜散 百九十七

大腹皮 介一 紫蘇 乾木瓜 甘草 木香

羌活 已上各乙分

右爲細末分作三服每服用水壹盞煎至半盞通口服

大三腕散 百九十八今用五錢水一盞半煎七分

獨活 木瓜 大腹皮 紫蘇 已上各白乙分

木 甘草 各叁分 陳橘皮 沉香 木香

川芎 檳榔 已上各叁分麵裹煨

右爲麤末每劑秤乙兩水三盞煎至壹盞去滓分二服帶溫服取便利爲效

三物白散百九

桔梗分叁巴豆分乙貝母分叁

右為末內巴豆研勻以白飲和服強人半錢七羸人或減之病在膈上必吐在膈下必利不利進熱粥壹盃利過不止進冷粥壹盃

地血散百二○傷寒指掌圖熱毒深入吐血

茜根兩四大豆兩二黃藥子兩二甘草各二兩○
兩一

右為細末每服三錢新汲水調下

地榆散二百一方見無

延胡索散二百○傷寒指掌圖尿血

延胡索一分朴硝分叁

右為細末每服四錢水一小盞半煎至壹

盞指掌圖水一盞去滓溫服

脾約元二百三方見無

烏梅元二百

烏梅七十細辛乙兩乾姜乙兩黃連兩四當

歸 蜀椒各乙 附子 桂 人參 黃蘗

各乙 兩半

右十味異擣篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸之五升米下飯熟杵成泥和藥令相得內白中與蜜杵二千下丸如桐子大先食飲服十九日三服稍加至二十九禁生冷滑物等

黑奴丸二百

麻黃兩叁 大黃兩叁 釜底煤 黃芩 芒消

竈突墨研入 梁上塵 小麥奴已上各

右為細末煉蜜為丸如彈子大以新汲水研下一丸渴者但與冷水盡足與之須臾當寒寒竟汗出便差若日移五尺不汗依前法服一丸差即止須臾利小麥奴乃小麥未熟時叢中不成麥捻之成黑勃是也無此亦得此藥須是病人大渴倍常盛渴者乃可與之不渴者與之反為禍耳

赤石脂元二百六方見無

神仙紫雪二百

黃金兩一 寒水石 石膏各四兩 犀角

羚羊角各半兩 玄參乙兩六錢 沉香 木香 丁

香各半兩 甘草八錢 升麻六錢

右以水五升煮黃金至三升去金入諸藥

再煎至一升濾去滓投朴硝三兩二錢微

火煎以柳木篦子攪勿停手候欲凝入盆

中更下研朱砂麝香各三錢急攪令勻候

冷凝成雪也每服壹錢七細細嚙之

黑膏二百 每服約川彈子大未效再服

生地黄半斤 好鼓乙升

右二味以猪膏二斤合露之前令三分減

一絞去滓川雄黃麝香如大豆者內中攪

和盡服之毒便從皮中出者則愈忌蕪荑

升麻六物湯二百

升麻 梔子仁各二兩 大青 杏仁 黃芩

已上各乙兩半

右剉如麻豆大每服五錢水壹盞半入葱

白三莖煎至壹盞去滓溫服

五苓散吐法二百右以五苓散二大錢白湯

調下當與新汲水飲一升許卽以指刺喉中卽吐

瓜蒂搐鼻法二百右以瓜蒂不以多少爲末

口含水搐一字許入鼻中卽

瓜蒂散吐法二百

赤小豆乙分瓜蒂乙分炒黃

右各搗篩已合治之取一錢匕豉一合湯

七合先漬之須臾煮作稀糜去滓取汁和

散溫頓服不吐少少加得快吐乃止諸亡

血虛家不可與只用熱湯調服亦可如不

吐服熱湯以助藥力若服藥過多者飲冷

水解之一法只用蒂瓜末一錢暖水調下

芒消猪膽塗瘡法二百右以芒硝猪膽相和

塗之卽痂落無瘢仍臥黃土末上良此病

小便澁有血者中壞也瘡皆黑靨不出膿

者死不療

蜜煎導法二百十四猪膽導法二百十五方並見傷寒論注解

溫粉二百十六方見三因方

著艾法二百十七右用乾艾如法擣事布隔去灰

令白色作艾炷徑三分若太小即覆穴不

著太大即侵燒生肉或至五十壯多至三

五百壯壹寸名氣海二寸名丹田三寸名

關元皆可著艾也

葱熨法二百十八方見三因方蒸法二百十九方見聖惠方

水漬法二百二十右以疊布數重新水漬之稍振

去水搭於背上須臾蒸熱又漬令冷如前

得之仍數易新水日數十易熱甚者置病

人於水中熱勢纔退則已亦良法也得效方同

黃連一物湯二百二十一右以黃連一物濃煮汁服

青黛一物湯二百二十二右以好青黛大如棗水研

服之

青木香一物湯二百二十三右以青木香一物濃煮

汁服

蜜漬栝皮二百二十四右以大槩去麤皮蜜漬一宿

各之吞汁勿絕差或用蜜炙焦黃色碾爲末每服半錢糝口中亦佳

百合洗方 二百廿五

百合 升一

右以水一斗漬之一宿以洗身洗已食煮餅勿令鹽鼓也卽淡熟麵條也

桔梗半夏湯 二百廿六

桔梗 微炒 半夏 生薑汁製 陳皮 去穢焙乾已上各一兩

右剉如麻豆大每服四錢水壹盞生薑三

片煎至七分去滓熱服

厚朴半夏甘草人參湯 二百廿七

人參 一分 厚朴 二兩去皮 生薑 二兩切 半夏 六錢乙字洗

甘草 半兩炙

右剉如麻豆大每服五錢水壹盞半煎至八分去滓溫服

梔子厚朴湯 二百廿八

梔子 大者 厚朴 乙兩去皮 枳殼 二片去穢炒

右剉碎分二服每服用水一盞半煎至八

分去滓溫服得吐止後服

梔子乾姜湯二百廿九

梔子四枚乾姜兩半

右剉如麻豆大水一大盞煎至七分去滓

溫服

知母麻黃湯二百三十方

桂枝石膏湯二百廿一方

桂枝兩半石膏兩黃芩兩半甘草兩半梔子四分

麻乾葛生薑已上各三分白藥子二分常不用

右剉如麻豆大每服五錢匕水壹盞半煎至八分去滓溫服食頃再服若得汗即停後服也

發汗法二百廿二凡發汗欲令手足俱周濺濺然

一時許為佳不欲如水淋漓服湯中病即

已不必盡劑然發汗須如常覆腰以上厚

衣覆腰以下蓋腰以上淋漓而腰以下至

足心微潤病終不解凡發汗病證仍至者

三日內可二三汗之令腰脚周遍為度得効

助道方 同方

治感風感寒證

感風感冷思昏沉寒熱酸疼力不憊半夏薑茶煎五積渾身清健直千金

風寒傷於形體令人頭目不爽寒熱俱發百節酸疼可用局方五積散一貼半夏麩一塊如錢大搥碎生姜十大片水壹盞半煎至八分去滓溫服頭疼甚者臨時入江

茶少許或小便赤加燈心十莖烏梅二箇全煎服即效

治傷風微咳嗽

傷風微嗽聲還重發熱頭疼身又痛芷湯薑汁調消風或塗或服雙行用

傷風之病令人頭疼聲重發熱微嗽可用局方消風散一貼分為二服用香白芷三塊煎湯調服如頭疼發熱用薑汁一合殼調消風散却用白湯八分盞點服之如頭

癢甚者用薑汁調消風散成膏子塗兩太陽尤妙

治感寒冷身疼體倦

身疼體倦感寒邪口渴頭昏熱更加面赤須煎和解散仍添赤芍病須差

感寒發熱頭疼體痛者可用局方和解散一貼加赤芍藥二錢水三盞生姜五片烏梅二个煎取壹盞半去滓作二次服之如頭疼甚者臨時入江茶少許服之

治寒熱身體倦疼

或寒或熱無定準體倦身疼渴欲飲半夏門冬菓與柴加煎四物便安寢

寒熱之病最難治療但用局方四物湯二貼加柴胡去蘆頭者一錢橘皮一錢半夏一錢麥門冬去心壹錢用水三大盞生姜十五片烏梅北棗各二个同煎取一盞半去滓分作二服留滓再煎服餌

治口乾心燥病

口乾心燥小便赤邪熱攻人要水喫薑梅芍藥與門冬冷點五苓病自釋

邪熱攻心令人小便赤渴欲引飲可用局方五苓散加白芍藥三寸三段剉碎用麥門冬五十粒去心水三盞生姜五片烏梅一個煎取壹觥半去滓作三服每用五分盞調五苓散半貼留滓再煎服

治感寒身體倦疼

身疼體倦感寒邪口渴頭昏熱更加面赤藿

香和解散仍添赤芍病須差

感寒發熱頭疼體痛者可用局方和解正氣各半貼赤芍藥一段如二寸長以水三盞人生姜五片烏梅二個煎取一盞半去滓一服

治感寒頭目痛

感風頭痛體昏沉寒熱酸疼力不禁茯苓姜茶煎五積渾身清健自然輕

風寒傷於形體令人頭目不爽寒熱俱發

百節酸疼可用局方五積散一貼赤茯苓一塊如錢大搥碎生姜十八片水一盞半煎至八分去滓溫服頭疼甚者臨時入江茶少許小便赤加燈心十莖烏梅二箇

是齋醫方

百解散治傷寒頭痛肢體沉重惡寒發熱痰逆咳嗽困倦少力及偏正頭疼此藥專解截四時傷寒常服清神爽氣瘟疫瘴癘不生龔子治方

防風

去根節各

白芷

白芍藥

二兩

川烏

半兩炮去皮尖

甘菊

去枝葉

荆芥穗

六兩

乾薑

各

兩

右為細末每服二錢葱茶或蝎茶點服不拘時候煎服亦可

順解散治傷寒凡初受疾未分陰陽表裏皆可服史仲華傳

蒼朮

半斤

藁本

水

桔梗

甘草

防風

獨

活

各四兩

厚朴

姜製

陳皮

各二兩

右爲細末每服二錢生薑七片水壹盞半煎八分去滓溫服

祭酒林謙之說韶州醫人劉從周云盛夏發熱有傷寒冒暑二證若熱有進退則爲冒暑若一向熱不間斷則爲傷寒但當以此別之冲和散居家必用有解利治寒溫不節將攝失宜或乍暖脫衣盛熱飲冷或坐卧當風屈處暴露或風雨行路衝冒霜冷凌晨早出呼吸冷氣或久晴暴暖忽變陰寒或久雨積寒

致生陰濕如此之候皆爲邪癘侵傷肌膚入于腠理使人身體沉重肢節酸疼項背拘急于膝理使人身體沉重肢節酸疼項背拘急于頭目不清鼻塞聲重伸欠泪出氣壅上盛咽渴不利胃隔凝滯飲食不入凡此之證若不便行解利伏留經絡傳變不已此藥治之姜侍郎方其子處度宰清流傳與趙學諭貨之其家遂溫

蒼朮 六十兩 ○得效方六
荆芥穗 參十兩 ○得效
甘草 十二兩 ○得效方一兩
甘半 一錢 澹寮方一兩二錢

右為麤末每服三錢澹寮方水壹盞半煎

至八分去滓熟服不計時候併滓再煎才

覺傷風及覺勞倦即須服之不問虛實老

幼悉皆主治簡易方朱氏集驗○必用蒼

朮泔浸去荆芥穗葉參兩春夏用甘草去

炙一兩半右三味為麤末每服半兩水二盞生

薑五片葱白連鬚者二枝棗二枚至煎壹

大盞去滓熟服不拘時候滓再煎服後與

葱醋湯半碗看四時加衣服荅蓋汗出為

候如無汗再進一服此方予用之屢有的

驗南北經驗方蒼朮六兩荆芥穗兩甘草一兩

半一錢右咬咀每服三錢水壹盞煎八分去

滓熟服不拘時醫方大成集

截傷寒不問陰陽決有神効蔣簽名蓋

乾薑 乾葛 白芷 甘草

右等分末之乾薑減少不妨每服三錢水

壹盞半煎八分入薑棗同煎不以時候服

了不出風被覆睡少時汗出即愈

治疫氣及一切傷寒不拘輕重聖僧散

吳白芷 半斤洗了陰乾剉 甘草 四兩生剉
○經驗良方一兩 兩 ○良方半

右並爲細末每服二錢生薑三片棗子壹
枚擘破葱白三寸水壹大盞煎至六分熱
服用衣被蓋之汗出卽差如人行五里久
又進一服以正邪氣

破證奪命散治傷寒陰陽二證不明或投藥
錯誤致患人困重垂死七日以後皆可服

傳者云千不失一好人參壹兩去蘆薄切
水一大升於銀石器內煎至壹盞以新水
沉之取冷一服而盡汗不自出只在鼻
梁尖上涓涓如水是其應也妙甚蘇翰光
云侍郎方丈嘗以救數十人余宰清流日
俸車申屠行父之子婦產後病時疫二十
餘日已成壞證偶見問因勸其一味只服
人參遂安是時未知有此方偶然暗合耳
治傷寒感冒不問陰陽證初覺卽服甚効

蒼朮

米泔浸一宿焙乾秤一兩

人苴蒲

半兩

甘草

二錢半炒

右峻咀每服五錢葱白三寸水壹盞半

煎至七分去滓熱服微汗即愈趙從簡方

普救散治傷寒不問陰陽表裏但三日以前

未分皆可服王叔咸方

甘草

四兩

生薑

二斤切

蒼朮

一斤制

削碎

右三味淹拌罨一宿次日焙乾碾為麤末

每服半兩葱白二三寸水一椀半煎至六

分一椀去滓熱服不拘時候如頭痛加香

白芷腹痛加香附子汗出即愈

大交泰丹治陰陽二毒傷寒或因下早亡陽

或致結伏胃膈四肢厥冷脉息俱無心躁如

火或因冷物傷脾夾臍疰痛生硬入胃中滿

痞塞及發潮熱并治翻胃噦逆霍亂吐瀉小

腸疝癖脇肋氣痛但是陰陽不順惡候傷寒

並皆治之每服一粒炭內煨火通赤良久取

出放冷細研如粉米飲壹盞煎至七分溫服

不拘時候隔半時辰再進一服甚効如神兼

治小兒瘡疹倒壓依法服半粒即愈

金星石 銀星石 太陰玄精石 代赭

石 雲母石 白色片 禹餘糧石 桂府滑

石 已上各 寒水石 吉州者 不灰木 色黑

一兩半 一方加麥飯石 一兩

右同入甕瓶子內炭火半秤煨火耗一半

取出放冷研為細末糯米粥為元如彈子

大候乾依前法服寒水石南人謂之軟石

膏

治身熱頭痛昏重未辨陰陽夾食傷寒傷暑
等疾

陳橘皮 水洗不去 生薑 槌碎不去

右以水四碗煎至一碗半每服一盞通口

併服呂侍講希哲屈和州歲疫服者多安

吳內翰家用之數効

神授太乙散治四時氣令不正瘟疫妄行人

多疾病此藥不問陰陽兩感風寒濕痺並皆

治之○經驗秘方治傷寒陰陽二證不問陰

陽兩感表裏未分皆効急救仙方
簡奇方同

川升麻 白芍藥 紫蘇葉 香附子

乾葛 香白芷 陳皮 川芎 青皮

甘草

右等分爲籠末每服三大錢水壹盞半生
姜三片煎至八分去滓通口服不以時候
連進二服如發熱頭痛加連鬚葱白三寸
同煎如中滿氣噎加枳殼數片產婦嬰兒
老人皆可服之 裏以此

導引經絡不致變動其効如神 陽公庫
歲施此藥

治壞證傷寒病十餘日之後過經已下已汗
而未愈者廬州郭醫名羽云渠義父李助
教大名府人善方脉嘗合以治四五人皆
安其方傳於天台一僧用藥甚異或謂其
効在撓取殊不可曉紅娘子二七個去頭
翅足細研大棗兩枚剝取肉同研勻爛元
如理中元大每服一元以白水煎服先頭

目次遍身覺微微有汗然後服小建中湯
如黃耆者病差即止郭醫但能記此說未
嘗敢用不可不錄以俟名醫問之

沃雪湯解利四時傷寒時行瘟疫風濕陰陽
兩感表證未解身體壯熱疼痛惡風聲重鼻
塞頭痛四肢項頸煩倦又治霧濕障氣觸冒
寒邪此藥溫和表裏適順陰陽老幼四時皆
可服才覺次著連進二服立差章滁州茂深
方

蒼朮八兩厚朴四兩當歸洗川芎 白芍

藥 防風 橘皮去白葛根 甘草各二兩

右咬咀每服三錢水一盞半煎至一盞去
滓溫服

香芎散治傷風感寒發散表邪胡氏方廬州
郭醫云屢用得効

香附子去毛炒藁本去蘆川芎剉 橘皮

二兩甘草一兩

右為細末每服三錢水一盞生薑三片煎

七分溫服方同無時

救疫神方夷堅庚志十四卷靖康三年春太學事

黑豆二合炒甘草二寸炒黃

右以水二盞煎至壹半時時呷之是時因疫發腫者服之無不効

神木煮散治感寒凡人寒則傷榮血為榮風則傷衛氣為衛故治傷寒當用當歸之類藥

蒼朮六兩當歸二兩厚朴二兩人參一兩白芍藥

半兩川芎半兩陳皮半兩

右咬咀每服三錢水一盞半生薑五片棗二个煎至八分去滓食前熱服

蒼朮七兩以竹籃水中洗淨不須去皮 乾葛參兩甘草一兩

右為細末每服三錢水壹盞煎至八分服

若細切葱頭與茶同點見効尤速酒調亦得

傷寒鼻塞出清涕不已

香白芷兩荆芥重錢

右為末臈茶清調服如不用荆芥薄荷壹錢亦佳

治腠理不密易致感冒只當先服此藥感冒自退右叔訪監丞云得之於一相識親服取効後以治數人其病皆愈

附子炮片以臍菴蓉酒浸一宿焙乾細辛 五味子

右等分為庵末以四味黃耆建中湯相對合和令勻如本方煎服不過三四服即安

瑣碎錄

傷寒

始得病無熱但狂言煩燥不安精采言語與人不相主當勿以火導但以五苓散三二錢服之可與新汲水一升或一升半可至二升強飲之指刺喉中吐之隨手便愈村落間未有贖藥處得病後即以白粳米煮稀粥入紫蘇葉四七葉生薑錢二七片同煮熱喫微汗即愈不問陰陽二證皆可用

傷寒三日內用截法方麻黃蒼朮甘草各等
分作末每服三錢水一盞煎至六分熱服
一併三服立効

傷寒爲證四時不同服藥亦異在於加減得
理無不差好凡傷寒不問表裏用五積散
敗毒散各一貼春三月加香蘇散一貼夏
三月加五苓散秋三月加金沸草散冬三
月加小柴胡湯不依時將所加藥合前二
藥和雜每服三錢重水壹盞半薑三片棗

壹枚煎至八分去滓熱服不拘時候此方
甚妙

又陰陽二毒傷寒及時疫用蒼朮壹斤淨洗
焙乾甘草四兩生用右件搗羅爲末每服
二大錢以熱葱茶清調下熱水漱口良久
稀粥飲投之汗出立差
春夏之交或夏秋之交霖雨乍歇地氣蒸鬱
令人驟病頭痛壯熱嘔逆有舉家皆病者
謂之風濕氣不知服藥漸成溫疫宜用五

苓散半貼入薑錢三片大棗壹枚同煎熟服一椀立効

又方取生葛根淨洗搗取汁壹大盞內豉壹合煎至六分去豉不計時候分爲二服有汗卽差無汗再服

時氣寒盛及在冬天不可近火毒氣入心變成陰證傷寒必死萬不救一

時氣得病一日宜發汗二日三日亦可發汗四日可吐五日宜下

傷寒得汗後不得飲酒飲之者殺人難救

感冒

睡中風吹手足或酸或疼或腫用炒熱鹽怕熨裏之微有汗出卽愈又方附木湯加羌活亦好

卒感風寒用生薑汁調熱酒壹盞則發散

林事

廣記 同 感風頭疼香蘇散加白朮川芎服之甚

佳

易簡方

參蘇飲治一切發熱頭疼體痛 若增寒壯熱者先服養胃湯次服此藥 單單發熱者止宜服此以熱退爲度 若因感冒亦如服養胃湯法以被蓋卧連進數服汗出卽愈或尚有餘熱更宜徐徐服之自然安平疑似之間皆令微汗不妨初無表散之藥且勿自謂紫蘇耗氣不肯多服 此藥治虛勞發熱其効驗尤著 因痰飲發熱者但連日頻連此藥以熱退後爲期不可使止蓋雖有前胡乾

葛但能解散肌熱而已而枳殼橘紅輩自能寬中快膈不致傷脾也 兼能大治中脘痞滿嘔逆惡心開胃進食無以踰此母徒以性涼爲疑但是發熱服之皆効不必拘其所因若小兒室女尤得其宜 兼治氣盛或氣虛人痰氣有上壅咽喉不利哮喘有聲氣息短急上盛下虛宜更加木香煎服其効尤驗○簡易方治一切發熱頭疼體痛服之皆効不必拘其所因小兒室女尤得其宜用藥至和

而平故也 痰飲停漬中脘閉塞眩暈嘈煩
忪悸愴懣嘔逆不食有如氣格 痰氣停滯
關節不利手足躡曳筋脉攣急類乎中風食
已卽吐發熱頭痛百節煩疼狀似傷寒但連
日頻進此藥以病退爲期不可預止蓋本方
乃集二陳湯茯苓半夏湯枳實半夏湯也

前胡 人參 紫蘇葉 乾葛 半夏簡易

方湯洗 白茯苓 各叁 枳殼 簡易方去 陳皮

七次 甘草 梗桔 各半 枳殼 穰麩炒 陳皮

右咬咀每服四錢水一盞半生薑七片棗
一介煎服簡易方煎八分去滓微熱服素
有痰飲者俟熱退後以二陳湯六君子湯
間服 本方治痰飲停積中脘閉塞眩暈
嘈煩忪悸嘔逆及痰氣中人停留關節手
脚躡曳口眼喎斜半身不遂食已卽嘔頭
痛發熱狀如傷寒者悉能主之 尋常感
冒風寒頭目昏重鼻流清涕宜用此藥加
川芎半兩煎服 疝氣初發必先增寒壯

熱甚者嘔逆惡心每用此藥加木香半兩服之兩日寒熱必退或陰癰尚腫牽引作楚再於此藥每服加燈心二十莖煎下青木香圓仍用五苓散多加燈心煎服或覺微渴卽是腎惡燥可於五苓散中去白朮加滑石末剉作飲子三藥日各三服以病退爲期能專心服之無不應手而愈此病乃寒氣下注入于癰中多令大小腑不通急服此三藥以通利爲効若大便已通利

則少服青木香圓多服增損五苓散或小便流利已多則少服五苓散多服木香圓切不可畏虛預止此等用藥甚淺近人多忽之信旣不及服必不多豈能作効也或謂病人腎經本虛不可更用此藥導利此大不然蓋因腎虛邪氣襲之若非逐去外邪病何由愈或畏虛用平穩之劑及熟藥堯住大小腑必秘入腹衝心痛不可當爲禍甚速只當依此療之俟流利之後病勢

已退徐服茱萸川練桃仁附子之類亦不為晚 一方用參蘇飲三兩更加以局方四物湯一兩半合和名茯苓補心湯大治男子婦人虛勞發熱或五心煩熱并治吐血衄血便血婦人下血過多致虛熱者並得其宜或因用心過度發熱及往來寒熱者亦宜用此但雜以四物湯須穀氣素壯乃可服也○臞仙活人心治四時感冒發熱頭疼咳嗽痰飲中脘痞滿嘔吐痰水寬

中快膈不致傷脾一切發熱皆能取効不問內外所感及小兒室女一切皆治之人

參參錢蘇葉桔梗乾葛前胡各四錢陳皮茯苓

各五錢枳殼參錢半木香一錢半甘草二錢半夏

錢四右依此方治療 咳嗽加五味子杏仁

久咳者加桑白皮柴胡鼻衄加麥門冬茅

根烏梅心盛去木香加黃芩柴胡嘔逆加

砂仁藿香鼻衄出過多加和四物湯頭疼

加川芎細辛脾泄加蓮肉黃耆白扁豆

生料五積散治感冒風寒肩背拘急發熱頭痛或為寒濕所搏一身凜凜然急用此藥如服養胃湯法以被蓋覆汗出即愈

蒼朮二兩 桔梗一兩 枳殼二兩 麻黃 橘

皮各六錢 白芍藥 白芷 川芎 當歸

甘草 官桂 半夏 茯苓各三錢 厚朴

乾薑各四錢

右咬咀每服四錢水壹盞半生薑三片葱白壹根煎至六分去滓食前熱服 尋常

被風寒濕氣交互為病頸項強直或半身

偏疼或復麻痺簡易方及卒 宜用此藥加

麝香末少許煎服簡易方連進 寒濕腰疼

每服加桃仁七枚去皮尖煎 疝癰癥瘕

膀胱小腸氣痛加炒茺萸半錢簡易方七粒 鹽

少許簡易方 婦人經候不調心腹撮痛或

閉壅不通加醋一合腹中血塊尤宜服之

產婦催生及胎死腹中亦用醋煎能飲者

更加酒半盞產後發熱不問感冒風寒及

惡露爲患均可治療煎如本方 傷寒手足逆冷面青嘔吐者宜加熟附子少許脚氣加茱萸木瓜大便秘加大黃脚氣下疔焮然赤腫者以大便流利爲度脚氣初發增寒壯熱者亦宜加大黃利之 一方治渾身瘡疥膿水淋淫經時不愈去麻黃加升麻大黃名升麻和氣飲蓋瘡癬爲患多因內有所蘊發在皮膚者只外傳以藥何由得愈不若以此滌之 若寒濕之氣

疔下作瘡瘡愈則毒氣入腹爲害不淺此藥尤効已上三證若覺壅盛多熱脾胃素壯者則以敗毒散剉作飲子亦加大黃煎服○簡易方又云定齋云如患冷氣加煨姜三塊鹽一捻煎服 傷寒用葱白豆豉煎服 惡寒厥冷加附子數片茱萸七粒煎服 五積散性溫敗毒散性涼凡人遇些小感冒對半雜和煎服名交加散亦多驗小小感冒因風雨寒冷所襲猝然得之

正氣未耗邪氣未深用此煎數方先以助其正氣使益壯則邪氣自當屏散若倉卒藥未能辦只以葱白連鬚數莖豆豉一捻生姜數片水煎熱啜連進三兩蓋亦能發散若邪氣已入經絡及時行疫癘則須依經按法表裏汗下不可差殊耀仙活人心治四時調中快氣化痰脾胃宿食不化臍腹脹滿胃膈停痰嘔逆惡心外感風寒內傷生冷心腹痛悶肩背拘急四肢浮腫寒

熱往來腰膝疼痛及婦人難產血氣經候

不調或不通一切治之枳殼麻黃去白芍

藥各四錢當歸半夏各二錢官桂川芎白芷厚

朴乾薑桔梗蒼朮茯苓陳皮各五錢甘草二錢

右依此治療每服生薑七片煎至六分入水酒半盞溫服無不効驗足浮腫加五加皮大腹皮已成風痺加羌活獨活防風腰疼加桃仁麝香茴香小腸氣痛加茱萸茴香手足攣拳加檳榔木瓜牛膝咳嗽加杏

仁馬兜苳桑白皮遍身疼痛加乳香沒藥
 北細辛難產加麝香交桂即交桂老人手足
 疼痛加和順元散手足風緩加和烏藥平
 氣散四肢濕痺加烏藥順氣散因濕所感
 加和檳蘇散

柴胡湯治傷寒瘟病身熱惡風頭項強急胃
 滿脇痛及煩渴嘔噦小便不利大便祕硬或
 過經未解潮熱有不除非汗非下之證
 並宜服之及治差後勞復及發熱頭疼或

往來寒熱 婦人傷寒經血適來或是經血
 適斷發熱惡寒晝日明了暮則譫語此為熱
 入於血室其血必結故使寒熱如瘧此藥主
 之 婦人有經事來少日晡發熱大便祕別
 無虛證者宜用此藥加大黃減柴胡數各等
 分加桃仁減甘草數各一半服之微利為効
 小兒溫熱亦能治療 此藥非止治傷寒其
 宅發熱並宜服之

柴胡二升 半夏 黃芩 人參各一分 甘草一分

右吹咀每服五錢水壹盞半生薑七片棗
一個煎至五分去滓食前服若腹痛去黃
芩加芍藥兩心下悸去黃芩加茯苓壹
兩若不渴外有熱者去人參加桂三分溫
被蓋覆令有汗則解若咳嗽去棗加五味
子三分乾薑半兩胃中煩而不嘔者去半
夏人參加括蕒實半兩渴者去半夏加括
蕒根一兩胃中痞鞭者去棗加煨了牡蠣
粉壹兩傷寒十三日不解胃脇滿而嘔日

晡則發潮熱已而微利乃醫以調藥利之
非其治也宜加芒消一兩傷寒十餘日結
熱在裏往來寒熱或心下急鬱鬱微煩或
口生白胎大便不通或發汗出或腹中滿
或日晡發熱如瘧或六七日日中不了了
睛不和無表裏證大便難身微熱者大實
也去人參加枳實半兩大黃一兩名大柴
胡湯服之以利爲度熱除不宜遽服補藥
仍忌酒羊肉腰子及難化之物或有所傷

是名食復難以治療飲食須是大段節省不可多食謹忌兩月仍避房室○簡易方張仲景小柴胡湯治傷寒溫熱病身熱惡風頸項強急胃滿脇痛嘔噦煩渴寒熱往來身面皆黃小便不利大便秘硬過經未解潮熱不除不汗不通之證瘥後勞役復發頭痛往來寒熱婦人太陽經中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷此為熱入血室其血必結故使如瘧狀

婦人產後傷寒頭痛發熱小兒寒熱亦

能治療柴胡二兩半夏黃芩人參粉草各三分

右咬咀每五錢水盞半姜七片棗一枚煎

至六分食前服若腹痛去黃芩加芍藥

三分心下悸小便不利去黃芩加茯苓

一兩不渴外有微熱去人參加桂三分

溫覆取微汗愈若咳嗽去人參大棗生

姜加五味子三分乾姜半兩胃中煩而

不嘔去半夏人參加括蕪實半兩渴者

去半夏加人參合前成一兩一錢括婁根
一兩脇下痞鞭去大棗加煨牡蠣粉一
兩傷寒十三日不解胃脇滿而嘔日晡
則發潮熱已而微利乃是誤以圓子藥利
之非其治也宜加芒消一兩定齋云引
飲有汗每服三錢加茯苓末桂枝末各半
錢胃膈痞鞭甚者加枳實一分身熱
臟腑微溼對加厚朴傷寒十餘日熱結
在內往來寒熱或心下急鬱鬱微煩或口

生白胎大便不通或發熱汗出或腹中滿
痛或日晡發熱如瘧或六七日日中不了
了睛不利無表裏證大便難身微熱者裏
實也去人參加大黃一兩赤芍藥各半兩
服之以利爲度熱除不宜遽服補藥仍忌
羊肉腰子酒并難化之物或有所傷是名
食復難以治療切宜戒之仍避房室名大
柴胡湯人之血氣隨時盛衰當月郭空
之時則爲血弱氣盡腠理開疎之時也邪

氣乘虛傷人則深針經日月廓空則海水
東盛人血氣虛衛氣去形獨居肌肉減皮
膚緩腠理開毛髮殘焦理薄垢落當是之
時遇賊風則其入深者是以邪因正虛自
表之裏而結於脇下與正分爭作往來寒
熱默默不欲飲食下爲自外之內經絡與
臟腑相連氣隨經必傳於裏故曰其痛下
邪在上焦爲邪高邪傳裏爲痛下正與邪
搏逆而上行故使嘔也與小柴胡湯以解

半表半裏之邪澹察方治傷寒頭項強身
熱氣急脇痛嘔噦煩渴或小便秘硬或過
經潮熱非汗下證婦人熱入血室暮則譫
語寒熱如瘧小兒溫熱柴胡二兩半夏洗七次
黃芩人參各參錢甘草半兩右咬咀每服五錢
水壹盞半姜五片棗一箇煎至六分食前
服若腹痛去黃芩加芍藥半兩心下悸去
黃芩加茯苓一兩若不渴外有熱者去參
加桂三分被覆令有汗若咳嗽去棗加五

味子三分乾薑半兩胃中煩而不嘔去半
夏人參加括蕒實半兩渴者去半夏加括
蕒根一兩傷寒過經脇滿而嘔潮熱已微
利醫以圓藥下非其治宜加芒消壹兩傷
寒日久熱結在裏寒熱或心下急微煩或
口生白胎大便不通或腹滿痛或潮熱如
瘧或目中不了了無表裏證大便秘身微
熱去人參甘草加枳實半兩大黃壹兩芍
藥三分如前煎服以利爲度名大柴胡湯

熱夫不宜服補藥

真武湯治傷寒數日以後發熱腹疼頭目昏
沉四肢疼痛大便自利小便或利或澁或咳
或嘔者皆宜服之若已經汗下不解仍發熱
者心下悸頭眩暈身瞶動振欲擗地者此
由渴後飲水停留中脘所致大宜服此

白茯苓 白芍藥 熟附子各三分 白朮二分

右咬咀每服四錢生姜五片水壹盞半煎
至六分去滓食前溫服小便利者去茯苓

大便利者去芍藥加乾姜二分嘔者每服加生姜五片咳者加五味子三分細辛乾姜各壹分發熱而泄瀉者單此藥或去止宜投四逆湯兼下震靈丹當應手而愈此藥不惟陰證傷寒可服若虛勞之人增寒壯熱咳嗽下利皆宜服之因易名固陽湯增損一如前法今人每見寒熱證多用地黃當歸鹿茸輩補益精血殊不知此等藥味多甘戀膈若脾胃大段充實服之却

能滋養然猶恐因時致傷胃氣胃爲倉稟之官受納水穀之處五臟皆取氣於胃所謂精氣血氣皆由穀氣而生若用地黃等藥未見其爲生血而穀氣已先有所損矣孫兆謂補腎不如補脾正謂是矣故莫若以固陽湯調其寒熱不致傷脾飲食不減則氣血自生若勞瘵之疾已成無藥能療惟膏肓灸法最爲効驗然或傷晚亦恐不及其他證狀胃風湯逍遙飲方中具言之

○簡易方白茯苓白芍藥白朮各叁兩○
 一熟附子一个炮右咬咀每四錢生姜五
 兩去皮片水蓋半煎六分去滓食前溫服小便利
 者去茯苓大便利者去芍藥加乾姜二兩
 欬者加五味子三分細辛乾姜各一兩嘔
 者去附子每服加生姜五片無求子云水
 飲內蓄上乘於肺為喘為咳古人治因水
 而欬病在陽則小青龍湯主之病在陰則
 真武湯主之

溫膽湯治大病後虛煩不得睡兼治心膽虛
 怯觸事易驚或夢寐不祥或異象眩惑遂致
 心驚膽懾氣鬱生涎涎與氣搏變生諸證或
 短氣悸乏或復自汗或四肢浮腫飲食無味
 心虛煩悶坐卧不安悉能主之

半夏管見大全枳實各二兩○良方去穢

一兩醫方集成袖橘紅一兩甘草良方各

茯苓分叁

右咬咀每服四錢水乙盞半生姜七片方

汁棗壹枚竹茹乙塊如錢大煎至六分與驗方七分去滓食前熱服竹茹即刮竹青也此藥大治傷寒後及一切病後虛煩夜睡不寧並宜用之若傷寒後尚有餘熱并熱在上焦兼汗下後表裏俱虛不可攻者宜用竹葉石膏湯下利發熱竹葉湯中去石膏加熟附子名既濟湯嘔者二陳湯一法治傷寒壞證時或發熱消渴煩燥用新羅參不拘多少煎湯浸令冰

冷候盛滿之時與之頓服熱則隨去大抵傷寒渴者不可多與之水水積胃中便為結胃然亦須濡沫之可也結胃治法見于理中湯方中傷寒後咳逆其證最危當用半夏壹兩生薑一兩半白朮煎服其他病亦惡咳逆當用丁香一十粒乾柿蒂一十五粒煎湯半盞乘熱頓服○衛生寶鑑大病差後虛煩不得眠此膽寒也半夏枳實竹茹各二兩橘皮二兩甘草一兩白茯苓一兩

半右六味到每服酌量多少水一盞半生薑五片棗一枚煎七分去粗食前溫服

簡易方

寒證

外公蔡醫博秘方保安散理傷寒時行壯熱極盛四肢疼痛煩躁昏迷睡卧不得

前胡

赤芍藥

川芎

瞿麥

甘草

炙

山梔子

麻黃

各等分

右細末每二錢水一盞姜二片煎七分溫

服

又方杜生散治傷寒時行瘟疫七日後不解變生諸證發熱斑生大小腑不通一切惡候

桔梗

一兩柴胡

陳皮

各半兩

大黃

山梔子

仁

甘草

炙北黃芩

赤芍藥

各一分

石末每三錢水盞半葱二寸豆豉四十九粒煎取七分熱服入口汗出或大腑通行卽解如七八日後每服用薄荷葱煎能調氣脉諸疾不生

又方治傷寒瘟疫已發未發皆可服

粉草一合 藜木皮兩 黃稗穀去芒

右細末再入鍋底煤壹錢重每三錢匕沸

湯點日一二服

傷寒治法以張仲景方論為祖而南陽活人書方論最為詳備蘭臺寶鑑及百問歌之類皆不過述而用之其區分經絡察脈用藥蓋毫釐不可差惟其表裏傳變各有處所淺深輕重時刻異同如用兵捕寇必審其見在何

地而為攻為守不然寇在東而攻其西盜已入室而備於門必無功矣此須專攻其術明於歲運氣候至精深者方可近世有為論破活人書者乃欲以眾病調度治傷寒多見其不知量也

醫方類聚卷之五十五