

醫方便覽卷之四

蜀遂寧放之屏詠註

崇城夏暹校正

外科

痔漏七十一

醉飽勞傷風濕侵結成十痔墜肛門因而飽食筋脉橫解腸澀為痔

能運化精微况醉飽勞役醉飽房勞則脾氣愈困筋脉橫解而不属

氣血擾亂清濁混淆而流入大腸之間宿滯不行又因風寒濕熱之

氣侵侮于外辟而為痔墜於肛門名狀雖殊病原則一治法以苦寒

瀉火芩連梔子槐花之類辛温和血芎歸苑仁之類風邪在下以秦

芫防風升麻之類提之燥熱佛鬱以大黃菴仁麻仁之類潤之腫痛  
 大便不利秦芫當歸湯清涼飲破後秦芫蒼木湯下垂痒甚秦芫  
 菴活湯下血不止芎歸丸氣虛參芪槐角湯血虛地黃丸小便不利  
 或痛或癢膿血曰壯痔槐角丸加昆布海藻皂仁連翹以消之外用  
 刺芥倍子朴硝湯洗腫痛用木鱉倍子姜黃末入片傳之或以熊胆  
 兒茶入片貼之猪胆亦可或用點法肛邊生瘡數日膿潰即散曰此  
 痔秦芫當歸湯加槐翹或地榆散潰後服參芪槐角湯腸頭顆瀉痛  
 痔出血淋漓曰脉痔清心丸秦芫菴活湯腸內結核有血登溷脫出  
 曰腸痔當歸郁李仁湯皂角煎丸大便則清血不止曰血痔槐角散  
 槐角丸肛邊血泡亦曰血痔針破即消飲酒則發曰酒痔乾葛湯憂  
 怒則發曰氣痔桐火湯腸頭濕熱生虫便蝕淫爛曰虫痔黑玉丹外  
 用蕪荑艾葉練根搗或洗末搽之又肛邊穿小孔下血如線秦  
 芫當歸湯加蒼連槐栝或地黃丸久則出白膿參芪槐角湯又有食  
 積成痔者黃連散諸痔治法雖不同而因循不愈瘡成漏補養清涼  
 解熱涼血順氣疎風升提之藥不可缺

可並行

應此疾者當禁口節欲謹避寒暑畏養七情勞求醫藥庶無  
 大患不然則因循歲月必成殘瘡甚至穿腸不可救者瘻者

漏也如缸甕之有孔漏也雖有三十六瘻之別治法不過補養清涼  
 而已腫痛則清涼為君虛痒則補養為君或以參芪白朮芎歸為君

槐角牽連升麻防風秦芫為佐外用附餅炙法

秦芫當歸湯

治痔漏大便結燥疼痛

大黃

秦芫

枳實

澤瀉

歸稍

皂仁

白朮

菴仁

紅花

水煎服

秦芫蒼木湯

治痔核已破謂之痔漏腸頭成塊者濕也大痛者風

也燥結者火邪也肺金主氣亦助病邪須兼破氣之藥其效如神

秦芫

菴仁

皂仁

蒼木

防風

酒

歸稍

澤瀉路三換柳末酒大黃路二右煎諸藥三五沸去粗入菴仁

皂仁泥椶柳末再煎空心熱服少時以美膳壓之不犯胃氣也忌

秦芫菴活湯

痔瘡成塊下垂痒不可忍

菴活

秦芫

黃芪

防風

升麻

炙甘草

麻黃



枯礬一猪懸蹄 菝葜存此 菝葜仁炒 川芎 北梗 甘肅炒 熟地

加味槐角丸 腸風痔漏通用

槐角 生地略 當歸 黃芪略 川芎 阿膠略 黃連 條苓 枳壳 秦艽 防風 連翹 地榆 升麻略 白芷酥

右末酒糊丸五十漸加七八十百丸米湯送下

點痔方 大雉鷄一隻單下下與食一二日別移淨板上用猪胰子

切碎旋煨收糞三兩日積糞四兩晒乾用明礬四兩柴半雌黃六

錢膽礬半兩朴硝一兩雌黃六錢各研末用砂鍋或銀鍋先鋪

雞糞一兩于底次鋪明礬一兩次膽礬次雌黃次朴硝雌黃後盡

下明礬盡下鷄屎貯藥之上要釘半節空鍋用新碗蓋鍋頂簇炭

火煨青烟盡為度放冷入乳香沒藥各半兩研細磁罐收貯先洗

淨痔瘡搥乾以津吐調藥膏貼之三日三五次夜二次黃水去最

妙三日後痔乾剥落湯洗白裡無處白紅軟惡毒即消色

則易之再和再灸如固則次日再灸至全愈為止

參芪芎歸補氣藥平後用補氣血藥作膏貼之

痔瘡用大烏頭一箇乾姜一錢百草霜一錢五分

為末蜜水調點

### 腸風臟毒七十二

膏梁醉飽更勞傷血熱流來入大腸 陰陽和順則血歸經絡榮養

熱毒積于腸胃加以醉飽房勞氣血濁亂 骸若嗜嗜濃酒厚味辛辣肥

血隨血滲于大腸之經此腸風臟毒之由也 新病腸風陳臟毒不拘遠

近熱為殃 暴發者為腸風色必鮮清腹中有痛地榆散黃連阿膠丸

為臟毒色必濁黯腹內微痛三黃丸挾風者升陽去熱和血湯槐花 散豬臟丸有先血後便者其來也近宜食前服藥有先便後血者其 來也遠宜食後服藥不拘新久遠近皆屬於熱血熱則行豈有屬寒 之理若夫脾胃虛弱當於涼血藥中加陳皮白朮氣虛者參芪槐角

湯<sub>三</sub>挾外感者敗毒散<sub>四</sub>二症愈後皆用茯苓芎歸湯熱加槐花寒加木香調之

地榆散 治腸風下血

地榆 黃連 茜根 黃芩 茯苓 梔子仁 槐花<sub>等</sub>

每服八錢 璣白五寸煎服胃弱加陳皮白朮

槐角秦艽湯 治腸風 黃芩 秦艽 槐角 升麻 青黛<sub>等</sub>

加減四物湯 治腸風下血不止

側柏葉 生地 酒歸 川芎 枳殼炒 荊芥 槐花炒

炙甘草<sub>各一分</sub> 錢一方加防風<sub>錢二分</sub> 姜三片烏梅肉少許煎服

升麻去熱和血湯 治腸癖下血其血有力而遠射陽明熱氣所作

生地 丹皮 甘草 黃芪 當歸 秦艽 熟地 白芍

陳皮 絡錢 蒼朮 肉桂 升麻 絡<sub>七</sub> 分二貼水煎食前服

槐花散 治藏毒下血 槐花炒 荊芥 枳殼炒 黃連 地榆 當歸 甘草<sub>等</sub>

右每服七錢水酒各半煎露一宿食後服

茯苓芎歸 川芎 當歸 茯苓 鮮熟 加槐花寒加木香煎服

豬臟丸 治遠年近日腸風藏毒痔漏等症

鷹爪黃連 白芷 枳殼 煨槐子 炒防風 粉草<sub>節</sub>

梔角 香附<sub>炒</sub> 牙皂<sub>去皮</sub> 木香<sub>兩半</sub>

右用陳倉米三合同香附為末裝入豬臟內線縛臍口瓦罐內

武火煨熟取出連臟切碎搗如泥和諸藥末乾則加煑臍湯為

丸每服八十九早午夜各一服米飲下戒酒熱煎炒等味一方

用槐花為末如前法煑臍為丸

當歸酒下

### 瘡癬七十三

諸瘡痛痒皆心火乾濕膿沙治不同 諸痛痒瘡瘍皆屬心火火甚而血實則痛火微而血虛則痒蓋

熱盛則灼而為瘡潰而為膿水熱微則鬱結小瘡搔痒而已然瘡有

五乾亦搔痒以開鬱活血為主當歸飲子吳茱萸散濕疥虫疥以燥

濕殺虫為主升麻和氣飲一上散沙瘡以活血清心為主活血

四物湯剪草散膿窠瘡以涼血為主通聖散諸瘡通用一上散 五癬

在皮原屬肺殺五清熱與疎風 癬亦有五皆由肺受風熱鬱于皮膚以生肉露濕熱生虫治法不過清熱

驅濕疎風散鬱涼血殺虫之劑風濕熱升麻和氣飲血熱通聖散風

疥濕癬馬癬吳茱萸散頑癬牛皮癬大風子散搽之

升麻和氣飲 治一切瘡癩腫毒疥癬痒痛  
甘草 陳皮各錢半芍藥七分大黃五錢乾葛 蒼木 桔更  
升麻錢一當歸 半夏 茯苓 白芷各二錢乾姜 只壳各

當歸飲子 治瘡疥濕毒燥痒  
當歸 白芍 川芎 生地 白蒺藜炒荆芥各一何首烏

黃芪 甘草各五  
治血四物 清心涼血 四物湯辨菟仁各酒紅花錢蘇木分連翹  
甘草 黃連 防風各六水煎

吳茱萸散 治乾疥春天花發瘡以開鬱為主  
吳茱萸 白礬各二錢寒水石半蛇床三錢或黃柏 大黃

硫黃錢樟腦 輕粉各五檳榔個油調搽  
剪草散 治沙瘡 寒水石 燕蕒各二錢剪草 枯礬 吳茱萸

黃栢錢一蒼木 厚朴 雄黃各五蛇床錢二輕粉分五油調

雄黃 硫黃 吳茱萸各三錢寒水石 黑狗脊 蛇床子 白礬

黃連錢五雄黃錢一乾疥加大風子十箇

腫甚倍寒水石痒甚倍蛇床虫倍雄黃如喜火灸湯盪者倍硫黃

為末香油調先用槐枝陳艾花椒細茶白礬煎水洗瘡透去乾痂

拭乾乘熱搽之搽時先用藥少許于手心中擦熱嗅鼻三五次才

搽瘡上一上即愈只嗅亦可愈一方無茱萸黃連白礬沙瘡用燕

窠泥同黃栢二味炒為末香油調搽  
大風子散 治頑癬久瘡牛皮癬  
大風子九箇杏仁箇六花椒三箇輕粉腳錢水銀錢四輕粉錢

蛇床子末錢蠟油調搽牛皮癬少加硃砂  
一方治風熱濕癬用吳茱萸三錢黃連錢七白礬三錢輕粉一錢水銀  
二錢出黃水加黃栢倍子各五錢  
黃水瘡用猪膽炒黃栢一兩五倍子五錢黃連一黃雄黃各三錢為  
末猪膽調搽蜘蛛丹火丹瘡天庖瘡亦可搽

天庖瘡內服通聖散外用黃栢滑石末調付

頭瘡用黃丹輕粉白礬等分油調付小兒頭瘡豬膽搽効

甲疽瘡用綠礬散綠礬錢五錢蘆薈錢射香字研細用絹包指上瘡即

去之甲疽有努肉用烏梅肉作餅貼之諸瘡努肉皆效夏月指縫

爛枯礬黃丹

月蝕瘡胡粉散胡粉錢微枯礬黃丹炒黃連輕粉錢一胆脂分

射訛右末漿水洗淨付之乾則油調付

下疳瘡輕粉散黃栢寢蜜陀僧黃丹高末茶乳香各三錢輕粉一

錢射香少許葱蕩洗瘡貼之一方黃連炒其石二味貼之熊膽片

腦亦可

火丹瘡偏身赤腫走痛寒水石膏各三兩黃栢甘草各一兩芭蕉

汁調敷火帶瘡百合根搗汁敷之

湯火盪燒痛處近火炙大痛片時即不痛如破用雞子黃炒黑成

油搽之

丹痛走痛不止金黃散寒水石二兩蔚金一對藍實大黃黃栢黃連

景天各一兩右末鷄子清或清水調貼

黃丹膏 貼腫瘡杖瘡及年久諸瘡

四物湯加苦參荆芥防風黃芩黃連川椒各一錢胎髮一箇猪油

四兩入藥同煎至油查枯瀉去查入龍骨兒茶乳沒血竭輕粉末

各一錢黃脂二兩黃丹一兩攪勻再少煎成膏

楊梅瘡先服通聖散次服加味還糧湯

當歸 防風 牛膝 羌活 甘草 槭木瓜 金銀花 皂子

熟地 連翹 川芎錢 土茯苓兩水煎空心服

又方土茯苓兩半旁子 地骨皮 常松 五加皮 白蘚皮 苦參

牙皂錢 荆芥分 一日一貼

點梅瘡方 血竭 兒茶 乳香 沒藥 焰硝錢 膽礬

銅綠錢 輕粉分 右為末搗破皮痂搽之一痛出水即愈

又方杏仁輕粉各一錢珠砂堆黃各五分研細猪膽調付

搔袋瘡陰囊瘡痒用雞子黃炒黑成油入枯礬末調搽

金絲瘡狀如繩線上下至心則死可於瘡頭盡處刺出血嚼萍草根

付之立愈 遍身虛痒四物加黃芩煎調浮萍末一錢服又方凌霄花末一錢酒

調服

手足皸裂用倍子末鉛粉黃蜡香油熬搽裂處炭之  
小兒癩頭用石黃一兩黃丹二錢樟腦一分共為末臨時用石灰一  
大撮煎水調勻加前藥少許搽頭上少頃以竹刀剝去毛髮瘡壳  
淨後用乾魚頭蜈蚣苦參螃蟹百草霜輕粉為末桐油調搽  
凍瘡生附為末麴水調貼橄欖燒存性入輕粉香油調付  
妬精瘡用地骨皮蛇床子煎湯洗挹乾以黃連欵花末津調付  
濕脚瘡流水敷平胃散內服酒煎五積散

癰疽七十四

膏梁積熱滯經中氣血因邪滯不通

膏梁之變足生大疔榮氣不從逆於肉理乃生癰腫夫榮氣即

胃氣也胃氣調和則榮衛之氣順流而無逆惟飲食無節肥甘過傷則濕熱蘊積于腸胃之間燒灼臟腑煎熬真陰以致八脉沸騰榮氣不能如常而氣血凝滯結而為癰腫矣若因寒邪搏之則氣血行遲而為不及熱邪搏之則沸騰而行速為太過

形狀小淺而大者為癰

疔發于五臟如陶室之燧肉滯肌骨其狀深小而惡難療而瘡速癰發于六府如燎

原之火外潰肌肉其狀淺大而輕易治而瘡遲始瘡之時不拘癰疽速用艾火隔濕紙餅或附餅灸之不痛者灸至痛痛則灸至痒使毒氣隨火而散最為良法稍遲則成瘡矣

諸經氣血分多少虛老尤當大補

凡癰疽先看發在何

經氣血多少如手足陽明氣血俱多大陽厥陰四經少氣多血瘡皆易愈太陰少陰少陽六經多氣少血便防肌肉難長瘡久不合必成大害戒用驅毒利藥以伐陰分之血當大補氣血方可收功又中年生瘡參之脉症但見虛弱便與滋補氣血可保終吉俱用復煎散益氣養

五善喜三七怕四未成已潰治難同

瘡有五善見三則喜動息自寧飲食知味一也便利

調勻二也膿潰腫消色鮮不臭三也神彩精明語声清朗四也体氣和平五也七惡見四則危煩燥時嗽腹滿渴甚泄利無度小便如淋一也膿血大泄焮腫尤甚膿色敗臭痛不可禁二也喘粗氣短惚惚嗜卧三也目視不正黑睛緊小白睛青腫背上青色四也肩項不便

四肢沉重五也飲食不下服藥嘔吐食不知味六也言嘶色脫唇鼻赤黑面白四肢浮腫七也初起即服真人活命飲神效托裏散寒熱往來者敗毒散加連翹金銀花陽瘡熱甚者黃連消毒飲煩渴者瀉心湯大便秘內疎黃連湯小便澀連翹導赤散泄瀉復煎散外用妙貼散鐵龍散針頭散癰疽惡毒氣入心者護心散虛寒裏氣不足內托千金散潰後即禁涼藥常服益氣養榮湯食少煩渴無睡黃芪人參湯去腐肉生新肉紅玉錠日久冷漏翠霞錠子取朽骨椎黃散肌肉不合完肌散通用神仙太乙膏紫金錠外塗內服俱效真人活命飲 治一切癰疽未成者即消已成者即潰

川山甲煅粉炒 天花粉 非草節 乳香 白芷 赤芍 貝母焙 防風分 沒藥 皂刺五分 歸尾 陳皮各 錢 金銀花三錢

瘡在背命皂刺為君在腹募白芷為君在胃次加瓜蒌仁二錢在四肢金銀花為君疔瘡加紫河車即金線重樓如無亦可右恁一服好酒一二鍾封瓶口煖服能飲者再煖服數杯神效托裏散 治一切癰疽無名腫毒發背奶癰腸癰等症忍冬 黃芪 當歸各五 甘草八

右藥末每服五錢酒煎分病上下合服凡瘡少頃再進一服未成即消已成即潰

內托復煎散 托裏健胃瘡生于手足太陰少陰少陽血少之經并虛弱老年之人服此使瘡易生不侵於肉

地骨皮 黃芩 茯苓 為藥妙人參 黃芪 白木 桂 甘草 防已 當歸各一 防風錢

右用茶末一斤水五升煎至三升去末入煎十二味煎至四盞取清汁分三四次終日飲之如未愈原茶末煎水再煎藥半料飲之如大便秘煩熱少服內疎黃連湯得微利熱止還服此散使宗衛俱行邪氣不能內傷也

內疎黃連湯 治陽瘡腫硬大便燥結脉洪實者 黃連 為藥 當歸 煨郎 木香 黃芩 梔子 薄荷 桔梗 甘草各八 連翹錢 大黃錢 姜三片空心服

益氣養榮湯 治瘡前後近虛者皆可服 白木炒 錢人參 陳皮 香附 甘草 白朮 熟地 貝母 酒歸 桔梗 白為錢 水煎隨瘡上下食前後服如口乾加五

益氣養榮湯 治瘡前後近虛者皆可服 白木炒 錢人參 陳皮 香附 甘草 白朮 熟地 貝母 酒歸 桔梗 白為錢 水煎隨瘡上下食前後服如口乾加五

味麥冬往來寒熱加軟柴胡地骨皮穠清加黃耆穠多加川芎肌  
肉遲生加白斂肉桂

黃連消毒飲 治瘡生于腦項皆太陽經分腫甚發熱麻木不痛者

宜先發黃連 黃芩 黃柏 生地 酒知母 羌活 獨活

防風 藁本 當歸 連翹 黃芪 人參 甘草 橘皮

蘇木 防已 澤瀉 桔梗 煎服

瀉心湯 治瘡毒腫盛煩渴脉實大而數

大黃 芩 黃連 山梔 漏蘆 澤蘭 連翹 黃芩 蘇木 錢二

每服三五錢量虛實加減煎服

護心散 治瘡生于項背毒氣攻心迷悶

明乳香 阿真菜豆粉 研甘草湯調服二三錢

內托千金散 治諸瘡虛寒裏氣不足

白芷 人參 當歸 黃芪 川芎 防風 甘草 芍藥

瓜蒌根 官桂 桔梗 金銀花 鮮木煎入酒少許再煎溫服痛

甚倍歸芍加乳香

黃芪 人參 白朮 麥冬 蒼朮 陳皮 當歸

甘草 神曲 炒升麻 黃柏 炒 五味子 炒 姜引少睡加酸棗

仁一錢瘡遲生加白斂一錢桂五分膿多倍參芪歸朮

拔毒膏 青葉用蒼朮防風草烏同淡醋水煮冬青葉候冷拭乾貼已

潰諸瘡後盡膿水自然生肌貼至肌肉平復不用生肌等藥

神功妙貼散 癰疽初起貼散已成箍頭已潰收暈斂毒

南星 草麻子 錢各半夏 姜黃 白芨 錢各三貝母 沒藥

乳香 錢二 花藥石散 亦貼無 石菖蒲 糝

右細末蜜水或醋調貼瘡黯悔姜汁調貼

鐵箍散 治癰疽腫痛赤暈散漫

乳香 沒藥 大黃 黃柏 黃連 南星 半夏 防風

皂刺 木鱉子 瓜蒌根 阿膠 甘草 節 草烏 錢

右末醋調成膏瓦器內熬黑敷之

針頭散 散一切腦背疽及惡毒危急欲死一服即愈

香附 血竭 蟾酥 輕粉 硼砂 錢各三 腦子 錢全 梔

蜈蚣 錢一 右末蜜和為丸黍米大如瘡有頭者用針挑破微有血

出將藥一丸納針眼中以紙貼住少時即愈

紅玉錠子 去腐肉生新肉 乾胭脂 枯礬略三 輕粉 砒霜

黃丹略一 腦子分射 香渺為末 稠糊和錠子納入瘡口內

翠霞錠子 日久冷漏惡瘡及肉冷漏內服補藥外用附餅灸法

銅綠 寒水石煨 滑石略三 明礬 膩粉 砒霜

雲母石略二 為末糊丸量瘡口大小深淺經之

治朽骨久疽取烏雞脛骨研上等雄黃實之鹽泥固濟火煨紅取出

研細飯丸粟米大以紙燃送入孔中膏藥貼之骨自出亦治痔漏

完肌散 定粉 枯礬 黃連 乳香 沒藥 龍骨略一 黃丹

輕粉略一 為末貼瘡上

神仙太乙膏 治一切惡瘡不問年深遠近已成未成蛇蝎犬傷刀

斧所傷並可外貼內服神效 玄參 白芷 當歸 赤芍 桂心 大黃 生地略一

右咀片麻油二斤浸春五夏三秋七冬十日文武火熬待白芷焦

黑煙查再熬用柳木棍不住攪旋入黃丹十二兩滴水成珠軟

便得所即成膏矣黃丹炒紫研極細水飛再炒黑用

肝肺十餘日死熱甚當歸羌活湯熱進內托千金散

當歸羌活湯 酒苳 酒連略三 酒柏略一 澤瀉錢 昆身二 錢連翹

防風 羌活 甘草 梔子略一 獨活 藜蘆本 附子略七

加酒少許煎食後稍熱服日進二服三日盡六服俱將藥汁調下

按柳散換柳木香各三錢為末煎藥汁調服大飲瘡口止痛外以

蜡油調塗瘡口生肌缺肉甚速凡髮際腦心發背以此法治之

耳後一寸三分至命之處發之必死名曰銳毒穿口穿狹者死急服

托裏散有結核破結散

托裏散 治一切惡瘡疔腫發背耳發腦疽

大黃杜 羈瓜婁 皂刺 朴硝略五 當歸 金銀花略錢 芍藥

黃芩略五 耳後發加柴胡括 水酒各半煎食後服

破結散 專治氣石筋血四癭如有核急服此藥及南星膏貼之

海藻洗 龍胆 海蛤 通草 貝母 昆布洗 枯礬 松蘿略二

神曲 半夏略一 為末二錢酒調服忌甘草雞魚五辛生冷果物

南星膏 專治皮膚頑面癭瘤大如拳小如粟或軟或硬宜用針微

出氣貼之用醋磨南星為膏如乾者為末醋調象瘤大小剪紙  
藥貼之乾則病之痒則不可以手動撥

膏名并疽狀如豆三四日起不早治入腹十日死急服  
內則清心散 治惡瘡熱甚焮痛煩渴以此解毒清心

辰砂研茯苓 人參 白朮 雄黃 藜蘆 朴硝 甘草  
鴈子 射香 皂角研為末一錢蜜湯調服

蜂窠發于胃乳疔乃心火熱或急服黃連消毒飲內固清心散

九發肺疽在胃毒心疽巨關紅毒下肝疽則門在左乳下脾疽章門  
在右乳下腎疽中脘胃疽貫門在左腹旁大腸疽天樞在右腹下

三焦疽在丹田小腸疽在關元穿潰出者可治在內傷膜膿從  
大便出者難治當隨各藏府之虛實而調之太乙膏黃耆丸

腸下瘰癧不可補湯氣蓋虛中得火則受熱則虛熱愈甚易傷  
骨膜

腸癰小腹墜痛不可按小便如淋身皮甲錯腹皮如腫脈遲者未有  
膿脈洪數已有膿也紫金錢酒磨服效

意以仁錢炮附子加敗醬分為末水煎連查服小便下膿血而愈

大黃牡丹湯 腸癰熱則瀉之

大黃<sup>四</sup>錢 丹皮<sup>兩</sup> 莖仁<sup>兩</sup> 芒硝<sup>三</sup> 瓜婁子<sup>升</sup>  
水六升煎取三升去查入硝再煎分三服有膿下膿無膿下血

內疽發在腔子裏頭向內宜以內托之藥托出于外以針開之先用  
四物加桔更香附生薑煎服膿出後亦服調理

囊癰發於外腎乃濕熱濁氣下流於肝腎二經又感寒濕之氣結而  
為癰宜服托裏散加木通車前淡竹葉或用補陰藥為主黃柏知

母之類踈肝治濕熱之藥佐之青皮黃連蒼朮香附連翹之類雖  
膿潰皮脫羣丸懸掛不死外用野蘇葉為末付之燥則用油調付

之外以野蘇葉或荷葉包之小便不利五苓散加車前木通燈草  
便癰即血疔初起用

消毒散 皂刺 金銀花 防風 當歸 大黃 甘草節 瓜仁

等分水酒各半煎食前服已成者用酒大黃連翹各五錢只實三  
錢厚朴甘草節各二錢莖仁三十分三服姜引煎服一方故紙鼠

粘黑丑各炒酒大黃等分每末一兩酒調服一方牡蠣大黃各二錢半甘草一錢瓜婁子一枚搗水煎服

瘰癧當初起隔濕紙餅灸七壯或以葱白炒熨五七次內服皂子七枚人面瘡寃業所致作善事解之服流氣飲苦參丸外用貝母末付之

苦參丸 苦參兩 防風 荆芥 白芷 川烏 赤芍 何首烏

川芎 獨活 梔子 牙皂 蔓荊子 茯苓 山藥

疾蒸酪 草烏 黃芪 羌活 白附子酪

為末麴糊丸如梧子大三五十九好酒或茶送下日三服

瘰癧瘡久不愈者多是腎水虛敗下流又有脾濕下流可服苦參丸以補腎水外用隔紙膏

隔紙膏 老松香 樟腦 國丹 水龍骨 灰各等分輕粉抄

不愈加白芷川芎礞硝為末溶化松香少加香油和藥以紙隨瘡

大小攤藥仍用川芎白芷礞硝煎湯洗瘡淨以膏傳之四日一換

十四味臙瘡膏 治臙瘡湯火刀斧杖瘡神效

香油兩 黃蜡三錢 夏銀珠 黃丹各一 乳香 沒藥 黃連

歸尾 血竭 龍骨 黃柏 輕粉各三年久不愈加猪羊膽各

一箇 右末將蠟油溶化先下銀珠黃丹次下餘藥攪煎冷

下輕粉成膏紙攤先洗後貼

脚背發得於消渴後發于足指名曰脫疽紫黑者不治赤黑者可

服流氣飲苦參丸外用解毒生肌藥貼之

十六味流氣飲 治奶岩癰疽下部諸瘡

人參 黃芪 川歸 川芎 肉桂 厚朴 白芷 甘草

防風 烏藥 枳榔 芍藥 枳壳 木香 蘇木 紫蘇

青皮 錢水煎服

水澄膏 拔毒消腫 雄黃 黃連 黃柏 大黃 蘇金

為末每用少許抄入新汲水中俟澄底去水紙攤貼之

### 發背七十五

發背瀆防正對心搭肩相串莫言輕 背屬太陽之經雖少氣多血而

與心膜相近最為可慮初起用

魏花酒并灸法若成瘡則以清心護膜為主內固清心散黃若丸不

傷膜不瓦若通背腫者難治對心發乃心火之盛邪熱會於此又

粘黑丑各炒酒大黃等分每末一兩酒調服一方牡蠣大黃各二錢半甘草一錢瓜婁子一枚搗水煎服

瘰癧初起隔濕紙餅灸七壯或以葱白炒熨五七次內服皂子七枚人面瘡寃業所致作善事解之服流氣飲苦參丸外用貝母末付之

苦參丸 苦參 防風 荆芥 白芷 川烏 赤芍 何首烏 川芎 獨活 梔子 牙皂 蔓荊子 茯苓 山藥

疾藜 酪一草烏 錢三黃芪 羌活 白附子 酪一 為末麴糊丸如梧子大三五十九好酒或茶送下日三服

瘡久不愈者多是腎水虛敗下流又有脾濕下流可服苦參丸以補腎水外用隔紙膏

隔紙膏 老松香 樟腦 國丹 水龍骨 即舊瓶石輕粉計 不愈加白芷川芎礞硝為末溶化松香少加香油和藥以紙隨瘡

大小攤藥仍用川芎白芷礞硝煎湯洗瘡淨以膏傅之四日一換四味臙瘡膏 治臙瘡湯火刀斧杖瘡神效

香油兩黃蜡三錢夏銀珠 黃丹各一乳香 沒藥 黃連 歸尾 血竭 龍骨 黃柏 輕粉各三年久不愈加猪羊膽各

一個 右末將蠟油溶化先下銀珠膏一尺次下餘藥攪煎冷定下下輕粉成膏紙攤先洗後貼

脚背發得於消渴後發于足指名曰脫疽紫黑者不治赤黑者可治服流氣飲苦參丸外用解毒生肌藥貼之

十六味流氣飲 治奶岩瘤瘦下部諸瘡

人參 黃芪 川歸 川芎 肉桂 厚朴 白芷 止草 防風 烏藥 檳榔 芍藥 枳壳 木香 枳實 蘇蘇

青皮 錢水煎服 水澄膏 拔毒消腫 雄黃 錢三 黃連 黃柏 土黃 各力 鮮金 錢二 為末每用少許抄入新汲水中俟澄底去水紙攤貼之

### 發背七十五

發背潰防正對心搭肩相串莫言輕 背屬太陽之經雖少氣多血而與心膜相近最為可慮初起用

槐花酒并灸法若成瘡則以清心護膜為主內固清心散 黃若丸不傷膜不瓦若通背腫者難治對心發乃心火之盛邪熱會於此又

有遺子蜂窠皆對心而灸須防毒氣入心急用黃連消毒飲熱退內托千金散去桂外用托毒生肌之藥開散者缺續散左右托有生於骨上動處勿治而難安真人活命飲熱甚兩頭脾壯腎俞列流黃連銅活紫若左搭串右右搭串左者難治

注皆因風熱成兩頭發者亦居背脊中四邊散攻上下兩頭却小乃因飲食所致氣血皆虛故開口而闊後煎散脾壯發

下脊上因飲食而成其毒廣一尺深一寸當治脾壯之毒由固渣心散腎俞發在脊下因受濕并怒氣飲熱酒而得之傷於內腎流

毒在腎俞宜解腎毒黃連消毒飲去毒防積若傷腎膜腫痛者下治流注因風熱之盛氣因熱而走乎四散急宜疎風定熱自然而

思黃連消毒飲若因傷寒而得表未盡者連翹敗毒散發表太過為冷流內托千金散

治一切發背惡瘡初起腫甚三服即消

黃連 歸尾 防風 薄荷 黃芩 黃連 人參 陳皮 甘草 芍藥 生地 黃歸 連翹 澤瀉 知母 桔梗 黃芪

作二服水煎入酒半鍾臨臥時服

神仙黃礬丸 消癰疽及發背腸癰托裏消毒固臟腑護膜止痛

真黃蜡兩明礬末先溶黃蜡待少濕入礬末和勻衆手速丸如吾子大二三十九食

前濕酒下此藥護膜止瀉消毒化膿內疽腸癰發背近腹之瘡尤

當服因服金石補藥發疽者非此莫治另用礬末每服一錢濕酒

調下尤效但宜於潰後服三四兩後尤見其功一切惡瘡蛇虫

所傷內服外塗皆効

乳屬陽明與厥陰兒吹欬怒兩相因乳頭厥陰所屬乳房陽明所經厥陰之氣不行則竅不通而汁

不出陽明之血沸騰則熱甚而化膿雖有兒者為外吹有孕者為內吹然未有不由厚味所釀忿怒所逆鬱悶所逼而成揉通吮

透收功易積滯如疝氣壽成初起即當忍痛揉軟吮令汁透易於消散失此成癰最難調理用青皮疎厥陰

之滯石膏清陽明之熱芎歸甘草節菝仁行汚濁之血瓜蒌連翹橘葉皂刺川山甲金銀花消腫導毒少佐以酒行藥力也或用活命飲或用蒲公英忍冬酒皆効灸二三壯尤妙切不可用針以傷乳房既潰以參芪芎歸芍藥青皮連翹瓜蒌甘草節調理更有不得于夫與田姑或白幼性急鬱悶朝夕積累遂成隱核數年始發任痛當以疎氣行血為主十六味流氣飲<sup>⑤</sup>單煮青皮湯橘葉散潰久不合則如岩穴之狀故名奶疔用紅玉錠子<sup>⑥</sup>以去毒生新漸可收功外敷妙貼散<sup>⑦</sup>氣血虛而難上者八珍湯<sup>⑧</sup>加疎氣藥調補之

橘葉散 青皮 石膏煨甘草節 歸身 金銀花 沒藥

蒲公英<sup>⑤</sup> 瓜蒌子 錢皂刺<sup>⑥</sup> 炒錢

青橘葉一小握酒煎服

丁香散 治乳頭破裂丁香為末津調付

### 附骨疽醫癰七十七

熱毒寒凝腿骨間厥陰尤易少陽難 附骨疽皆因厚味指毒於附骨之間及勞役酒後乘熱涉水附

濕寒濕入骨陽滯於陰疽發於貼骨最為難治然在腿內厥陰之經乃三陰脈絡往來之路藥力易到且厥陰多血尤為易治若在腿外少陽之經寒多熱少之地藥力難到少陽少血尤為難治凡見腿骨行步作痛或皮肉不變或漫腫光澤或按至骨痛甚便是附骨疽以蒼朮為君佐以黃柏之辛行以青皮肉桂夏加條芩冬加麻黃虛者加杜仲牛膝生甘草為使大劑服之外用火坑蒸法如在太陽太陰厥陰之分羗活防已湯在少陽分者黃芪酒煎湯熱甚黃連消毒飲<sup>⑨</sup>如已成膿須針得出切忌五灰膏巴罔等錠子藥毒深入再不得出愈加潰爛多致不救只服八珍湯加引下 醫癰地僻尤難治滋補焦之藥調養自然收功雖有朽骨亦待自處

先施可獲痊 醫居小腹之下乃陰中之陰道遠地僻雖曰太陽多血然氣運不到血亦罕來中年人尤慮慮此但見堅硬腫

痛即用灸法服內托羗活湯若瘡成便與滋補氣血可保終吉若無積補之功其禍多在結痂之後或半年已來多致失手慎之羗活防已湯 治附骨疽初發于太陽厥陰太陰分者

羗活 川芎 蒼朮 防已 木香 連翹 射干 甘草

白芍 木通 歸尾 蘇木各 水酒各半食前服美膳壓之

黃芪酒煎湯 治瘡生足少陽經分微侵陽明經

柴胡 穢連翹 肉桂各八 黃栢 甘草各五 升麻各七 大力子炒

黃芪 歸尾各二錢 白芷各一錢 水酒各半食前溫服

內托羗活湯 治尻醫生癰堅硬腫痛兩尺脉緊

羗活 酒栢各二錢 防風 藜本 歸尾各一錢 肉桂各三錢 連翹

炙甘草 蒼朮 陳皮各五錢 黃芪半錢 水酒各半煎空心熱服厚衣蓋癰上使藥力易行

蒸附骨疽法掘坑火煨通紅沃以小便病者脫下衣坐坑中以衣圍

抱下体使熱氣薰蒸腠理開泄氣血通暢而愈

### 疔毒七十八

膏梁暴氣足生疔畜類瘟瘧毒及人 膏梁之變足生大疔蓋人恣食

寒暑風霧暴冷之氣以致榮衛結滯火毒不泄而疔毒生焉未有內

定則多寒四肢沉重頭痛心驚眼花見火甚則嘔逆 三十六疔形

最惡餘疔十二毒稍輕 十三疔中惟有三十六疔形症最惡狀如黑

麻子疔次之其疔始末皆痒觸犯則難治餘如牛狗刀鏃浮瀝蛇日

盜膚水洗唯唯石火爛疔皆因其形象而名其毒雖輕色黑者重失

治皆危殆也治法當看表熱惡風四肢拘急不渴其毒在表宜連翹

敗毒散 三活散或逆菟丹汗之煩渴心驚疔黑毒在裏宜芍藥湯或

奪命丹下之紫金錠內服外塗皆效毒氣入腹嘔逆護心散 外以

紫金散重則用提疔錠子取之 二活散 羗活 獨活 當歸 烏藥 赤芍 金銀花 連翹

天花粉 甘草節 白芷各半錢 紅花 蘇木 荆芥 蟬腿 乾葛各三錢 檀香各二錢 為末三錢蒼耳湯調下

赤芍藥湯 金銀花 赤芍各三錢 大黃各半錢 瓜蔓各一 當歸 甘草 只壳各錢 分二貼水酒各半煎服

返菟丹 治疔發汗 乳香 沒藥 辰砂 雄黃各半錢 輕粉

片腦 射香 五海羊即燭牛不蟾酥 青黛 粉草

三箇細嚼下得微汗即解一方加銅綠寒水石枯礬各一錢

奪命丹 巴豆三錢 蟾黃 黃丹 硃砂 雄黃各三錢 乳香

博金散 大黃兩錢 輕粉錢 蟾酥五錢 或飛羅麵兩錢

為末滴水為丸如菜豆大二十九茶清送下量大小虛實加減

紫金散 信錢半 雄黃 硃砂各半

為末攤開瘡貼之二次瘡

提疔銀子 煎治癰瘡 雄黃 朱砂各二錢 青區 砒霜 白丁香

輕粉 斑猫去翅足 蟾蘇 射香各一錢 黃蜡七錢 草麻子七粒

銀器內溶化黃蜡和藥末九如梧子大捻作餅子刺破疔瘡放一

餅于瘡上又刺四邊五七十惡血出為妙却用膏藥貼之

### 癰癭結核七十九

氣滯痰凝血不周若生肌體便成瘤

人之元氣周流脈絡清順何有癰癭結核之症或因怒鬱悶

或則氣滯不舒以致氣滯不通痰血凝滯生於頭面皮膚者為瘡有

六骨肉腫痛者是也惟脂瘤可破去其脂粉而愈餘皆不可破用

南星香附之白服昆布九海藻丸根小者以芫花根

汁液絲或絲繫之面上小肉瘡用艾火灸熱自落 結於頤頤名

為癰核生癭不足憂

結於頸項兩頤者為癭有五氣血石筋肉大也俱不可破當破氣豁痰醃以軟之堅以削

之自然消散破結散

**海藻丸** 或用昆布一兩醋浸徐徐呷之嶺南

春亂多生癰癭者水土然也九項臂結核不痛不痒不紅不腫乃痰

注不散不足為憂用二陳加酒大黃連起粘梗柴胡散之或二陳加

皂刺防風黃芩蒼朮凡癭瘡不痛不痒不腫不長者皆不應藥難治

昆布丸 昆布 海藻俱洗淨 煉蜜丸如杏核大噲化

海藻丸 海藻 貝母 青皮 陳皮 三稜 莪朮 連翹

昆布 枯礬 黃連 桔梗 當歸尾等

右末蜜丸彈子大噲化一方海藻黃連為末掌中時時紙之

### 癰癭馬刀八十



附神應比天膏 治諸毒惡瘡無名腫毒三十六種風七十二般氣

打傷諸虛石損痰氣結核癰疽並皆治之如神

飛珀 血竭 阿膠 牛黃 射香 乳香 沒藥

白龍骨 赤石脂 輕粉 孩兒茶 姜蚕 蟬退 蛇退

人退 血餘 川山甲 蒼朮 白芨 白薇 當歸 大黃

麻黃 黃柏 川芎 白芷 薄荷 川烏 草烏 何首烏

烏藥 金蟬 防風 秦艽 連翹 黃芩 黃連 知母

貝母 羌活 獨活 槐子仁 桔梗 柴胡 荆芥 五倍子

海漂消 皂角 木鱉子 大風子 葶麻子 杜仲 苦參

地骨皮 蘇木 石斛 威靈仙 紫丹皮 石菖蒲 升麻

杏仁 細辛 紅花 官桂 松香 椿枝 桑枝 槐枝

柳枝 醋 右前十二味另研為末極細其諸藥俱到碎用香油十五斤浸春

夏三冬七日用弥陀僧三斤黃丹一斤俱極細末以浸藥

文武火煎藥焦枯無踪影退火待冷去滓復入火以黃丹弥陀僧

每起四五錢時時入用柳枝不住手攪用冷水一碗滴藥成珠不

得方入琥珀孩兒十二味攪勻入磁罐內收過一七日方可用如貼

身痛風濕等証取生姜搗爛連汁炒熱擦患處二三十遍拭乾大烘

膏藥貼上三日一換時常慰之煉膏時

擇淨室勿令貓犬婦人見之

### 婦人門

#### 經候八十一

婦人天癸有常經或在先期或後行 女子二七而天癸至任脈通太

與月之盈虧相似經行時將理失宜多成大病如勞力驚憂恚怒則

氣血錯亂逆與經絡每遇經行則諸痛皆作過期復安宜柴物湯加

牛膝紅花行之先期而來或後期而血多不止者血熱也紫黑者熱

之盛也四物用生地加知柏苓連血不止者三補丸如香附龜板

荆芥生地柴苓過期而來或依期無痛而血少者四物倍當歸熟地

加參朮陳皮少加苑仁紅花以生血潮熱加柴苓過期紫黑成塊作

痛者血熱氣滯也四物加香連玄胡狹痰過期或依期而色淡者四  
物二陳湯色淡而有水者胃本湯加芎歸肥人過期道痰湯加芎  
歸參木或先或後或多或少或一月再來或作寒熱者  
俱用柴物湯加木香青皮丹皮麥冬調之或菟仁散 氣滯氣虛兼

氣亂經枯經閉及瘦分 血因氣而行或塊者氣之凝將行而先痛者  
氣滯而血實也有行後瘀血未盡而作痛者

俱四物加菟仁紅花香附木香青皮莪朮熱加柴胡芩連行後作痛  
氣血俱虛也八珍湯 錯經妄行吐衄者氣亂而火逼之也三黃四

物湯加丹皮菟仁紅花木香枳即經枯者或因隨胎多產傷血或因  
清渴瀉瀉前潮熱盜汗銷血四物加糯米以養胃天麥冬以清肺知栢

以滋陰藥奉以退熱使血自生氣閉而不通或成瘕者四物加菟仁  
紅花青皮木香三稜莪朮香附瘕加熟桂乾漆作痛者加玄胡苦練

或通經丸肥人經閉導赤湯加芎歸香連莪朮忌地黃血分者經化  
為水四肢黃腫當歸導赤丸或因七情傷心心氣停結不語行血或

脾氣不行不能運化生血二陽之病發心脾是也四物加木通黃  
連香附菖蒲以開心氣或加橘木以養脾氣

桃仁散 治月水不調或淋瀝不絕斷後復來作痛飲食減少  
花仁炒炙甘草 半夏焙三赤芍 生地各一 澤蘭 牛膝

當歸 桂心 丹皮 人參 蒲黃 川芎各七 姜引空心服  
四物湯 乃婦人衆疾之檢司也隨上下引經寒熱加減

川芎 當歸 芍藥 地黃 右切等分水煎服  
調經湯 治婦人經水不調脘腹腰痛脊疼臨經澁痛或產後腹痛

義木煨熟地各錢玄胡 練肉 川芎 當歸 芍藥各二  
煨榔錢 紅花加每五錢水煎食前服

導經丸 治經不通脘腹連腰疼痛  
川芎 當歸 白芍 甘草 官桂 菟仁各一 大黃兩 血竭

紅花各二 地膽去翅足 一個煉蜜丸如梧子大三十九空心溫酒下  
量虛實加減

通經丸 治婦人室女經閉脘腹痛或成瘕  
川椒炒去閉 莪朮煨歸尾 青皮炒乾姜炒酒炒黃 菟仁研

紅花 桂心 乾漆炒熟烟 右末將四分之一醋煮成膏和餘末  
杵勻丸如梧子大二十漸加至四五十丸空心醋湯下溫酒亦可

性畏漆者雞子清和藥內紫金錠治血閉神効

通經下取方 海蛤粉兩 苦苧藤 皂角各半 巴豆去 天花粉

苦丁香 紅娘子各錢 射香鈔 為末每一錢葱涎搗丸綿裹以

五寸竹管納陰戶中候熱時先通黃水次則行經

養附丸 治經候不調腹脇刺痛膨脹頭眩惡心經閉崩漏帶下

香附去 毛醋浸 醋糊九 五十九 淡醋湯下一方酒醋盪水童便

四製一方加艾葉四兩當歸二兩名艾附丸

當歸蓴蘆丸 治血分經閉化水黃腫

人參 當歸 大黃 煨麩 赤芍 白茯苓 桂心各五

苦苧蘆丸 用益母草煉蜜為丸三五十九空心未飲下

益母丸 或用益母草煉蜜為丸 或如四物同丸治婦人諸疾

### 崩漏八十二

婦人行故成崩漏答在心肝與任衝 崩者暴下不止漏者時時滴瀝 所以欽此者何也蓋心主血而

肝納血七情過傷五志過極則心火坑甚而血相火隨起肝

不能納血故血不歸經而妄行甚則為崩微則為漏也又衝為血海

任主胞胎或因勞力過傷或因小產或因積勞傷胎有傷衝任不能

約束其經亦成崩漏治斯疾者當以養心神瀉肝火為主而補養衝

任次 氣熱勞傷虛並脫挾寒挾濕少溫中 因氣所使而崩者用炒黑

地白朮各一錢參芪川芎蒲黃地榆各五分升麻三分煎服挾熱四

物加知柏苓連麥冬青皮腎虛不能鎮相火者涼血地黃湯陰虛血

熱不止者黃芩湯紫黑成塊生地黃散勞役傷脾身熱自汗體倦不

食當歸芍藥湯勞傷衝任腹痛脈遲者伏龍肝散氣血兩虛而崩四

物加參芪不止小薊湯血虛不止四物加炒乾姜白芷百草霜棕櫚

灰心氣不足丁香膠艾湯氣血俱脫升陽舉經湯滑脫不止固經九

挾寒腹痛少加溫中之藥伏龍肝散挾濕而崩升麻除濕湯 涼血地黃湯 治婦人陰虛不能鎮守胞胎相火旺甚血走而崩 黃芩 荊芥 蔓荊子 絡 鐵黃栢 知母 藁本 細辛 川芎 絡 二 黃連 羌活 柴胡 升麻 防風 絡 三 生地

當歸 各五 甘草 錢 紅花 許少 水煎服

黃芩湯 黃芩為末每二錢燒秤錘淬酒下

生地黃散 治吐衄崩中血紫黑成塊

生地 熟地 枸杞 柴胡 黃芩 黃連 地骨皮 天冬

白芍 甘草 黃芪 下血加地榆 水煎服

當歸芍藥湯 治勞後傷脾經水漏下不止

柴胡 芍藥 甘草 生地 各三 黃芪 錢一 陳皮 白 熟地 各五 蒼木 錢

白木 川歸 白芍 各錢 水煎空心服

伏龍肝散 治勞傷衝任崩漏臍腹痛脉遲食少或赤白帶下

伏龍肝 赤石脂 麥冬 各一 炙甘草 桂心 各半 當歸

乾姜 各七 川芎 艾葉 各三 熟地 兩四 每服四錢 棗一枚煎服

小薊湯 崩中不止 小薊葉汁 生地汁 各一 白木 兩

水一盞煎白木數沸入汁再煎服一方荆芥末三錢童便調下

丁香膠艾湯 治心氣不足崩漏不止臍下水冷赤白帶下

熟地 白芍 各三 川芎 丁香 各四 阿膠 錢六 艾葉 錢一 當歸 二錢

右以川芎地黃丁香為末連歸芍艾葉煎數沸入阿膠再煎服

肉桂 兩 白芍 錢二 紅花 半 細辛 分三 人參 熟地 川芎 各半

獨活 附子 炮 炙甘草 各錢 羌活 藁本 防風 錢一 白木

當歸 黃芪 柴胡 各錢 薏苡仁 泥 許

右作二服水煎空心服

牛陽除濕湯 治崩漏挾濕下水漿之物

羌活 柴胡 蒼朮 黃芪 各錢 防風 炙甘草 升麻

藁本 錢一 蔓荊子 錢七 獨活 當歸 各五 水煎服

固經丸 治經水過多不止

黃芩 龜板 白芍 各一 檮根 白皮 半 錢 炒栢 錢三 香附 童便 浸

酒糊丸白湯空心下

肥人崩漏用南星蒼朮川芎香附丸服

帶下八十三

帶下八十三

帶下多因崩漏成濕痰濕熱未分熱 帶脉主約束胞門府臟濁氣下流則帶脉不能約束而下又崩

中日久為白帶蓋崩久則血少而白滑下流柴物湯加參朮陳皮餘若胃中濕熱清濁不分者胃苓湯加苓連以清之濕痰下流者二陳

湯加二朮熟加苓連久則加升麻柴胡提之實者小胃丹<sup>三</sup>十棗湯赤白<sup>四</sup>玉燭散<sup>五</sup>之類下之肥人白帶二陳湯海石丸瘦人用固真

湯二黃海石丸 須知赤白皆因熱久病虛寒少用溫 赤者熟干血分二陳加芎歸苓

通用檉白丸 連赤菴花白者熟干氣分二陳加參朮苓冬白菴花赤白相雜氣血俱熱益母丸苦練丸非獨赤白濕熱干于五臟五色皆見一以清熱

燥濕為主而隨色加減治之若久病虛脫者固真丸虛寒腹痛桂附湯玄胡苦練湯<sup>三</sup>

固真湯 治白帶臍腹痛甚 人參 陳皮<sup>各</sup>五炒栢 炒苓 白菴花<sup>各</sup>一郁李仁<sup>八</sup> 柴胡<sup>七</sup> 炙甘草<sup>於</sup>乾姜<sup>於</sup>赤帶易紅菴花 水煎空心服

桂附湯 治虛寒白帶腹痛腥臭 黃栢 知母 肉桂 附子<sup>炮</sup>各一錢 水煎空心服少食腹痛加白芍五分不思飲食加五味二十一粒氣虛加黃芪一錢人參七分

炙甘草升麻各五分 海石丸 治肥人白帶 海石 半夏 南星<sup>各</sup>製姜炒栢 蒼朮<sup>淋</sup>浸川芎<sup>洗</sup>檉皮 香附 乾姜<sup>暑</sup>不用

各等分醋糊丸空心白湯下 二黃海石丸 治瘦人帶下多熱 炒栢 黃芩 滑石 檉皮 川芎<sup>洗</sup>海石 青黛 酒歸 芍藥 等分醋糊丸服

檉白丸 治白帶 檉白皮 山茱萸 苦參 香附<sup>各</sup>錢五 龜板 梔子<sup>各</sup>兩二黃栢<sup>兩</sup>一乾姜 貝母<sup>各</sup>錢二 白朮 白芍<sup>各</sup>錢七 酒糊丸

苦練丸 治赤白湯下 練肉<sup>酒</sup>麩<sup>香</sup>炒當歸<sup>酒</sup>糊丸 固真丸 白帶久不止臍腹陰中痛目中溜火 酒栢 白芍<sup>各</sup>錢五 柴胡 白石脂<sup>各</sup>火煨水飛 白龍骨<sup>酒</sup>飛

酒歸<sup>各</sup>錢二 乾姜<sup>炮</sup>四 麵糊丸空心白湯下美食壓之 一方治赤白帶下黃荊子炒末溫酒調下二錢 一人上有頭風鼻涕下有白帶

南星 蒼朮 陳皮 滑石 半夏 川芎 辛荑 酒苓 牡蠣粉炒丸服

三

三

三

中子八十四

陰陽和合即胎成莫妄溫宮與益精

天地之道陰陽和而雨澤降夫婦之道陰陽和而男女生若妄

言子宮虛冷而用溫暖之藥妄言男精虛少而與性陽益精則陽愈  
炕而陰愈竭如天地不雨物從何生且熱藥煎焚真陰而虛疾隨起  
安望其節慾調經交以道自然生意合乾坤男子多因色慾過傷媵  
妾無數以耗其精不得

成胎慾求嗣者必先節慾以保養元精庶克有濟女子多因經候不  
調必先看其虛實前後依去調之瘦人子宮血少者四物加參朮黃

芩柴胡香附以養其血肥人痰閉子宮用道痰湯加芎歸香附黃連  
以豁其痰庶可成胎陰陽既和又當交接以道古歌云三十時中兩

日半二十八九若酒筭落紅滿地是佳期金水過時空霍亂霍亂之  
時枉費工樹頭樹尾覓殘紅但解開花能結子何愁丹桂不成叢蓋

言月經行盡金水總生子宮正開乃受精結胎之候妙合太和之時  
道此則血漸滿而子宮閉所謂霍亂之時枉費工也然乾道成男坤

道成女神妙莫測乃謂一三五日交感成男又謂陽內陰外為男理  
或有之不必究也

百子歸附丸 調經養血順氣安胎胎前產後並宜服之  
阿膠珠珀艾葉酒歸 川芎 懷熟地取泥酒芍各二

香附心者酒水浸 右為末大陳酸石榴一枚連皮搗煎水打糊  
為丸如吾子大每百丸空心淡醋湯下

胎前八十五

少陰心腎主胎元腑臟帶胎象一年

手少陰心主血足少陰腎主胞  
門子戶二脉滑動者胎元也故

曰三部沉正等無疑尺內不止真胎婦若夫左疾為男右疾女脉訣  
已詳言之妊娠十月府藏各養一月象一年四時初兩月象春肝膽

脉養之三四象夏心與小腸養之五六象長夏脾胃脉養之七八象  
秋肺與大腸養之九十象冬腎與膀胱養之至期當養之經氣血有

虛實故胎孕為之不安如厥陰太陽少氣多血太  
陰少陰少陽少血多氣惟有陽明多氣多血之類 按月醫調休犯禁

隨宜保重可生全 善醫者當按月所養之經視其氣血不足者補之太過者調之安胎之法以養胃為主血宜涼而不

宜熱氣宜順而不宜逆白朮安胎養其胃也黃芩治其火也陳皮只

後即以安胎飲調之八月九月即以東胎丸連生散順利之中間雜

病三十餘種一以安胎為主不可犯禁蓋汗下利小便謂之三禁犯

之能亡津液令胎枯燥不安若病勢有重於胎者不得已而用之可

也姪娘之婦尤當隨宜保養性宜靜而不宜燥体宜勤而不宜勞味

宜涼而不宜熱衣宜温而不宜寒又宜却一切油膩辛辣酸鹹生冷

魚鱉狐兔鷓鴣之物戒一切情慾憂愁忿怒粗言惡語庶可保全而

易生產後亦無諸病矣

安胎飲 孕成之後竟有不安或腰腹疼痛或飲食不美常服

白朮 當歸 白芍 熟地 人參 川芎 條芩

陳皮 砂仁 紫蘇 香附 天台烏藥

去熟地人參熟倍黃芩

東胎丸 七八箇月服 黃芩 炒夏一兩 秋陳皮 三兩 白朮 二兩

生散 八九箇月內服 大腹皮 一箇 人參 一錢 陳皮 一錢

紫蘇 一錢 白芍 一錢 當歸 一錢 熟地 一錢 人參 一錢 川芎 一錢 條芩 一錢

臨月養胎 芎歸 橘木 杏附 黃芩 各一錢 白朮 五分 甘草 二分 煎調 益

元散 一錢 服 虛者 如人參 七分

隨胎氣血 不能榮養 而白朮 者 滋枝 枯則 果 蒼 血 虛 四物 加 橘木 黃

芩 氣 血 俱 虛 加 參 芪 因 事 觸 傷 胎 借 風 撼 其 木 人 折 其 枝 也

胎 痛 乃 氣 虛 有 熱 熱 則 流 通 血 不 歸 經 以 養 胎 而 漏 下 有 漏 盡 則 胎

乾 之 忌 以 清 熱 養 血 為 主 四物 加 阿膠 白朮 條芩 少 如 香砂 下 血

不止 如 續斷 艾葉 熱 如 黃連 茯神 加 糯米 煎 服

惡阻 乃 惡心 而 阻 其 飲食 人參 橘皮 湯 橘木 麥冬 白茯苓 制朴 各 八分

人參 五分 甘草 三分 煎 服 或以 白朮 為丸 肥人多 從 痰 治 二陳 湯

加參朮香砂厚朴生薑有熱加苓冬無痰去半夏氣滯加天台烏  
紫蘇並頭眩加川芎知母乾薑一物乃一臟之虛如嗜酸乃肝臟  
養胎而虛也故初孕多愛酸

胎動乃火氣逼胎上逆或喘或脹四物加黃芩香附阿膠或安胎飲  
胎動用芎歸茯苓厚朴煎服一方當歸三錢阿膠甘草各二錢葱白  
煎服一方止用當歸地黃素有冷氣沖心刺痛川芎散芎歸各一  
錢人參吳茱萸制半夏五分茯苓桔梗各四分芍藥七分枳殼甘  
草各二分煎服客寒犯胃而痛火龍湯鹽炒艾葉炒茴香酒黃練  
肉各二錢半煎服草蔻丸客熱犯胃而痛二陳去半夏加炒施苓  
二朮腹中寒痛理中加香砂熱痛黃芩芍藥湯加白朮虛痛者四  
君子加歸為女人胞胎繫於腰腰痛酸急恐產也急服安胎飲少

加肉桂

子煩者為怯煩悶不安麥冬湯麥冬防風茯苓黃芩各三錢半竹葉  
一錢分二服一方有知母無黃芩犀角散胃也骨皮條芩麥冬赤  
茯苓各一錢甘草五分水煎入竹瀝當歸飲子芎歸阿膠五錢寄生  
葱白甘草一方有人參無寄生或用安神丸

子懸胎氣不和妻上心腹疼痛紫蘇飲大腹皮法川芎白芍陳皮紫

蘇當歸各一錢人參甘草各五分姜葱引有熱加枳芩香附

子腫面目肢體浮腫如水氣白朮散白朮一兩生薑皮大腹皮陳皮

白茯苓桑白皮各半兩每末二錢米飲下脹急小便利木通散

木通桑皮紫蘇香薷各一錢只壳枳榔條芩各五分木香椰子肉

各三分姜引浮腫喘急謂之子滿澤瀉散澤瀉桑皮枳殼枳榔木

通赤茯苓分姜引足腫行步艱難或出黃水謂之子氣天仙藤散

天仙藤炒即青木香藤也香附炒陳皮甘草烏藥木香等分生薑

紫蘇引足腫身不腫者謂之皴脚平胃散大便不通四物加枳實

厚朴黃芩

子淋小便澀少淋瀝安苜散麥冬通草滑石當歸燈心甘草各五錢

人參川芎各一兩每末二錢麥冬湯調下滑石太重臨月方可用

之或加梔子最穩瞿麥亦恐損胎地膚子散地膚草似茶葉車前

子各一錢知母黃芩赤茯苓只壳炒各七分升麻甘草通草各

二分或加冬菴子小便不通下焦有熱車前散枳榔木通陳皮赤

茯苓車前子赤芍當歸滑石石葶等分煎服遺尿白薇白芍酒調服

胞轉用四物加參朮陳皮半夏甘草煎服吐提其氣自通

子嗽因感風寒者參蘇飲去半夏加桑杏火傷肺者二陳去半夏加

貝母冬枳桔有痰加瓜蒌前胡桑皮久嗽不已有全分塊而後

止者天冬飲天冬紫苑知母桑白炙五味桔梗各五分嗽血者加

阿膠心煩者加麥冬百合竹茹咳嗽見紅加當歸熟地連以上十

二味煎服

胎暈逆婦卒倒頃刻即甦名子癇葛根湯貝母葛根丹皮防已防風

芎歸桂心茯苓澤瀉各五分炙草一字獨活石膏人參各一錢貝

母令人易產未臨月以升麻代之氣血俱虛者八珍湯頭眩目眩

視物不見顯頰腫核消風散石膏甘菊防風荆芥羌活羚羊角鎊

川芎大豆黃卷酒歸白芷各五分甘草二分芽茶五分煎服

子癇熱多者清脾飲寒多者人參養胃湯俱去半夏

子瘖忽然失音不語胎氣使然非藥可療分塊即語

兒在腹中叫哭多年空屋籠火中土一塊令婦人噙之

鬼胎用吳茱萸川烏秦光紫胡白姜蚕屎蜜丸酒送下

跌撲胎動不安用阿膠味一兩艾葉二兩秦花一兩分三服水煎

方川芎六一兩連進三服死胎即下

小產腹痛四物如玄胡香附青皮丹皮澤蘭紅花菝仁下血不止四

物去地黃加參芪白朮膠艾香砂青皮甘草

瀉痢泄瀉不渴小便清平胃散加白朮茯苓砂仁芍藥小便赤者黃

芩芍藥白朮茯苓木通煎服因食生冷或乘風取涼泄瀉腹痛用

白朮陳皮白芍炙甘草肉蔻良姜木香柯子肉姜引下痢赤白腹

痛當歸芍藥湯白芍一錢當歸白茯苓澤瀉白朮條芩各半錢甘草

黃連木香枳榔各三分如白痢痛甚者恐有寒去芩連加乾姜芍

朮香連丸阿膠珠白朮各五錢乳香木香各二錢半只壳乾姜各

二錢黃連一兩茱萸炒砂仁川芎各五錢醋糊丸服

傷風壯熱頭眩運芎蘇散蘇葉川芎白芍白朮麥冬陳皮乾葛各六

分甘草三分姜葱引咳嗽者參蘇飲去半夏有熱者通聖散去硝

黃石膏

傷寒百節疼痛壯熱不急治即落胎柴胡葛根知母石膏各錢半大

青梔子升麻各二錢葱白五根汗後不解小柴胡湯去半夏讞語

人參白虎湯錯語呻吟乾嘔黃連解毒湯六七日不大便大

柴胡湯陰症理中湯發赤斑升麻六物湯升麻梔子杏仁大青  
小草甘草各一錢葱引疫病敗毒散安胎白朮黃芩等分三錢

姜引

中風痰壅項強語澁羚羊角散羚羊角獨活棗仁五加皮各八分薏  
苡仁防風當歸川芎茯苓杏仁各四分木香甘草各二分姜引昏  
悶不省人事者古拜散荆芥穗焙末每二錢豆淋湯調下

### 臨產八十六

形神既備自分離壯易虛難不足危十月數足氣血完全形神既備胞自不能約束其子如果熟則

皮脫之類胞門既開水漿既下胎元壯健或胎前善保養者其子隨  
漿而下故為易產胎元虛弱及安逸鬱悶養厚之婦子路凝塞轉頭

遲慢漿水既乾汚血充塞故生理為之不順若夫胎氣不足或子死  
腹中如乾生之果青風之殺亦不易落子母無氣而性命危於頃臾

當驗舌紅則遲早吉凶皆有法催生催死及催衣有月前腹痛如欲產而不產者名為

試月有三五日胎水已來腹痛不密者名為弄痛臨時漿水雖下而  
腰腹未甚痛者名為試漿實非胞內真漿也且宜寬心中待不宜用  
力逼胎太早若胞漿既下腰腹痛甚踰時不分娩者即用催生之藥  
逐去汚血使子路通暢而易生如竟有橫逆凶勢即當以手輕輕扶  
正待其自生若先見手足或搔其足心令痛而搦或針手足心令痛  
而搦或送入撥正使生兒初生便不可洗浴軟布拭淨速抱母懷溫  
煖處三日方洗生下即洗者多成臍風凡胎衣未下速以產婦髮塞  
入口中令嘔即下如不得下先剪臍收兒胎衣一頭以物繫着用藥  
下之若待衣下而後剪臍兒受風冷即成驚風凡催生皆用芎歸朮  
仁逐汚血葵子滑石牛膝車前刺藜肉桂熱則流通之藥甚加射香  
下死胎下胎衣之藥皆同而死胎多用肉桂使之流通車前一沫能  
治產難下胎衣甚効矮石婦人交骨不開芎歸湯

三合濟生湯 治難產雖一二日不下者服之即轉動而生

枳殼炒二 粉草分川芎錢當歸錢蘇葉分大腹皮洗姜汁香附炒各

待腰腹痛時服之立產  
加味芎歸湯 臨月時服 當歸 川芎 黃芩 陳皮 白朮

香附各一錢 白芷五分 甘草三分 鹿角人參水煎調益元散一錢服

牛膝湯 催生下胎衣神效一方有當歸無瞿麥車前官桂

牛膝 瞿麥 車前 木通 滑石 各藥子研官桂 月各錢半 實

水煎溫服單用車前子一兩煎服即產單用葵子百粒研調酒服

一方用巴豆三粒草麻子七粒入射少許研膏貼臍立產

一方下胎衣用車麻子七粒研貼足心下即去之一方童便調下

朴硝三錢

催生散 白芷 百草霜 白滑石等分

為末芎歸湯調下小腹寒痛加肉桂或芎歸湯調益元散三錢素

難產者臨產日三服 一方益元散一料加葵子末五錢名滑胎散

香桂散下死胎 香附五錢 肉桂三錢

為末溫酒調下須臾即下

奪命丹 治胎衣不下血暈心腹作痛

黑附子 炮 丹皮 兩 乾漆 炒 烟 用 大黃 一兩 米醋 煮 膏 九 上 三 味

如柿桐子大每服五七丸溫酒送下

### 產後八十七

#### 產後須知氣血虛百邪先補莫先驅

十月懷胎氣血為兒食盡一旦分娩加以產勞其虛可知百邪

為病因虛所致當以大補氣血為先氣虛四君子血虛四物去芍藥加黃芪陳皮白朮新產不可用芍藥以其酸寒能伐發生之氣如腹

痛必用之以酒制炒氣血俱虛八珍湯甚則十全大補湯如有外感

風寒中風等症皆於補藥中佐以荊防羌活桂枝柴前胡之類散之

內有氣血痰火等症皆於補藥中加順氣化痰調血清熱之

劑治之不可驟用發散攻裏之藥重耗氣血而致危困也 **血瘀食**

#### 鬱三焦火急則從權一治之

若夫惡露未盡攻心作痛輕則芎歸湯重則黑神散三聖散之類治之如有飲

食鬱在胃中作腹痛頭疼等症輕則香砂平胃散加曲蘖消之重則

吐之利之如素有上焦痰火眩暈用酒芩石膏天麻之類清之中焦

實熱煩滿用芩連只實以降之下焦實火秘結用黃芩酒大黃厚朴

只實菴仁以潤之此皆急則治標之權而治愈之後補養之藥尤不

可緩也

黑神散 治產後惡露不盡胎衣不下血氣攻心及腹痛不止

黑豆炒半熟地 當歸 肉桂 乾姜 甘草 白芍炒

蒲黃酪四為末每服三錢童便酒各半調服一名烏金散一方有

生地一方用五灵脂香附為末甚加留尖苑仁醋煮神曲糊丸白

木陳皮湯下氣虛四君子湯下血刺痛用當歸苑仁紅花酒搗服

蒲黃散 治惡露不盡血上擔心煩悶喘急昏迷或狂言妄語

乾荷葉炙玄胡 丹皮 生地 甘草各二錢 蒲黃生六錢

分二貼水煎入蜜少許温服又失笑散蒲黃五灵脂為末酒調服

三聖散 治兒枕痛 當歸 肉桂 玄胡等為末二錢 酒調服

四物一黃散治血塊作痛四物各半兩炒蒲黃二錢半炒每末二錢

空心温酒下一方四物去芍藥加苑仁紅花陳皮香附甘草煎服

清魂散 治血運昏迷 澤蘭葉 人參各一錢 荆芥穗 鈔甘草各八錢

川芎錢二為末二錢温酒童便調下或用滾醋湯韭葉於有甯瓶內

以甯納產婦鼻內薰之即醒或於房燒醋炭燒漆器以醒血氣輕

者上用芍藥湯煮有痰火因產後眩運芎歸湯加苓連石膏清之

陳湯加芎歸苓連或用麥冬湯吞下安神丸

當歸 黃芪 湯治產後陰脫或子腸不收

當歸 白芍炒 黃芪 人參 歸二 升麻各五錢 水煎温服陰疼煩悶

苑仁五味栝櫞為末研膏付之玉門不斂硃黃四錢吳茱萸兔絲

子各錢半蛇床子一錢每四錢水煎頻洗自收一方荆芥藿香臭

椿皮煎洗

參末膏 治產後胞損淋瀝 人參仁錢 白朮錢二 苑仁 陳皮

茯苓各一錢 黃芪鐵甘草 五先煎猪羊胞後入藥煎服

產後乳汁不通用通草七分瞿麥柴胡天花粉各一錢桔梗二錢青

皮白芷木通赤芍連翹甘草各半錢水煎食後徐徐飲之更摩乳

房氣血虛少脉澹不行乳汁少者母猪蹄湯蹄一隻通草四兩煮

汁飲之少飲酒以行血肥盛脉壅乳不通或成腫痛漏芦湯漏芦

二兩半蛇退各一錢 土瓜根十根右末每二錢酒調下吃熟羹助之

或無子食乳歌消乳者用麥芽二兩炒為末分四服白湯調下

產後風寒痿弱血風散四物加菴菹菴防白芷白朮茯苓為細末酒

風五錢細辛一錢為末薄荷湯調下

產後中風麻木八珍湯加荆防羌活肉桂口眼歪邪加附子

產後怔忡錯語人參甘草山藥當歸各一錢遠志茯苓神麥冬桂心各

五分姜棗引

風寒咳嗽喘急痰壅二陳湯加前胡荆芥柴皮杏仁五味子旋覆花

芎歸甘草

遍身疼痛二妙趨痛散當歸牛膝杜心白木黃芪獨活生薑各半兩

甘草韭白各三錢每一兩煎服

產後泄瀉黃芪白朮川芎茯苓或胃苓湯通身浮腫四物加乳沒桂

心腹皮木通

產後惡血成痼作痛四物苑仁紅花三稜莪朮乳沒羌脂香附乾漆

經血淋瀝不止四物加白芷赤麻煎調血餘灰

產後去血過多陰虛內熱心胃煩滿頭痛時轉甚

當歸 白芍 熟地人參麥冬各二兩肉桂一兩熟地生地二兩

每四錢先煎竹葉十片糯米一合去查入藥棗一枚煎服

產後血虛增寒怔熱當歸白芍川芎黃芪白朮為末童便溫酒調下

虛汗不止黃芪二錢白朮防風熟地牡蠣白茯苓冬甘草各五分棗

一枚煎服

產後羸勞發熱自汗當歸羊肉湯當歸人參各七錢黃芪一兩生薑

半兩羊肉一斤煮汁五盞煎藥四盞分三服早晚頓服一方用猪

腰子一箇糯米一合煮粥加葱椒鹽醋調和食之一方用當歸人

參二味煎汁入腰子粥內服之

產後大便不通川歸防風只壳各四錢甘草二錢姜棗煎服一方麻

仁只壳人參大黃當歸等分煉蜜九服以開為度

二方棗杏仁各一兩松栢仁二錢半郁李仁一錢加橘皮四錢煉

蜜九服

### 老人八十八

高年陰氣已虧時厚味辛溫最不宜

人身之陰難成而易虧六七十以後髮白齒稿耳聾目昏顛倒

健忘溺數腸燥皆是陰虛之極孤陽無依幾於飛越因天生胃氣籍水穀之陰以養故稽糜而定耳凡一切厚味飲食如肥膩煎炒辛辣

燥熱濃酒濕麵魚鮮之類皆能助火銷陰一切辛溫之劑如姜桂烏  
附半夏防風蒼朮香附之類皆能耗散陰血最非養老所宜為子若  
孫者當量其脾胃之虛實寒熱而酌宜飲食以忠養之無事姑息苟  
從以致生疾病或有疾病又當擇其醫之良者較量藥餌以調治之  
毋致孟浪峻劑百病當攻須帶補休將壯健一同醫年高之人氣血俱憊凡外感風  
以損其天年

寒暑濕之候皆以扶養正氣為主而以攻邪之藥佐之凡內有氣血  
痰火積聚燥結之症皆以滋陰潤燥為主而以疎導之藥佐之寧可  
積遲討出萬全若不論其衰旺而與壯健之人一同醫治妄用劫藥  
以取速効豈不誤哉大抵老幼之藥與壯健皆同但老人之劑稍輕  
小兒之劑差小耳

三子養親湯 紫蘇子 荏欬 喘白芥子 荏欬 蘿蔔子 主食  
右二味淘淨微炒杵碎看何症多以所主者為君餘次之每三錢  
宜風潤肌散 老人風燥潮搐肢體腫痛痿軟

羌活 獨活 白芷 荆芥 山藥 黃芪 甘草 當歸  
生地 天麻 白朮 陳皮 炒栢略一細辛 川芎 各半

右為末每一二錢煎水調下

固真飲子 中年以上陰陽兩虛頭痛潮熱食少力倦腰痛胛酸

人參 山藥 歸身 黃芪 炒栢略一熟地 錢白朮 山茱萸  
澤瀉 故紙 絡五 五味 樹陳皮 白茯苓 杜仲 炒甘草 絡七  
水煎空心服

三黃只實丸 老人傷肉食濕麵辛辣厚味真寒悶亂不安

黃芩 黃連 大黃 煨酒 陳皮 白朮 神麩 炒兩  
枳實 炒半 湯浸蒸餅為丸

枳子大四五十九白湯下

潤腸湯 大便閉塞 麻仁 脂麻 各盡半研 菔仁泥 荆芥 絡一  
入鹽少許同煎可以代茶飲之以利為度

潤腸丸 杏仁泥 枳壳 麻仁 陳皮 絡半 阿膠 炒 防風 絡半  
煉蜜丸如枳子大五十九蘇子荆芥湯下

丹溪治老人虛損但覺小水短少即是病進宜參朮為君牛膝芍藥  
為臣陳皮茯苓為佐春加川芎夏加苓冬秋加歸身生薑一日一  
服小水之長復川乃止

小兒科

初生護養八十九

兒生脆似室中芽洗浴寒涼忌早加初生之兒若室中生芽未見天日不可卒受風冷速為短脐以

軟綿拭淨收抱近母温煖處必待三日後洗而亦不可頻浴以濕其脐庶免脐風撮口之患兒在腹中飲母之血生下飲乳肚中血屎三日始換盡不但口中有血而已所謂胎毒者乃稟受之氣而非干口

中之血也若拭去只與甘草汁法黃連朱砂寒涼之藥不可安與且乳食未進寒熱未辨若係胎熱投之尤可倘係胎寒豈不以陰投陰乎若脐帶乾脫之後而用延生之方純為逆理

分婉不啼 須急救脐風撮口最堪嗟分婉不啼即看口中上腭有泡摘破拭去血即啼或陰生不啼者且勿斷脐以綿袍

兒用香油紙燃燎脐帶以救之若七日之內應脐風撮口多因生下即院受風冷而致百無一活看齒齦上有小泡急以温水蘸青熟綿

搽指輕輕擦破用蠟靖散或牛黃散救之月中有疾分寒熱温飽隨宜勿過差心熱者胎中即發或二便不利或瘡疹日赤重舌木舌口瘡等症大連翹飲五

福化毒丹若過身赤丹內服牛黃散外塗藍葉散乳母服清涼飲過身黃色胎中受濕也其症壯熱二便不利生地黃湯胎寒者胎中受寒月中腹痛厥逆泄而不乳川白姜散當歸散發嘔未沉煎有痰作

嘔先用朱砂丸下之胎驚者月中即驚猪乳膏盤腸內疔腹脹夜啼眼上視手足掣至聖保命丹挾風邪者獨活散有熱涼驚丸因有痰

抱龍丸兒在月中温煖貴乎得宜太熱則易生熱病飢飽貴乎適中傷乳則有吐瀉腹痛痰涎之症月裏頻啼則胎熱得以伸散不可因

其啼哭而出月漸親風與日肥甘温飽不宜他兒之初生固忌風冷

過乳之也出月之後當以漸而慣親風日使肌体蒼厚堅勁可能風寒若愛恤太過則肌膚柔脆嬌

怯易感風寒如草木之方生而以物覆蓋則萎黃柔弱必夫安得以

遂其長養之性哉嬰兒脾胃嬌脆氣未成凡烹飪肥膩之物皆能

生熱生痰其美糖果之類皆能動五傷胃最不宜他至於衣被太温

能消陰氣飲食太飽反傷脾胃故云要得小兒安無非飢與寒思三分寒吃七分飽乃保嬰之要訣也

甘草汁法 兒初生未進乳時拭去口中血用甘草一寸炙去火毒煎汁滴口中須臾吐痰及瘀血方與乳食

延生方 初生五七日臍帶脫落取置新瓦上炭火炙燒存性地上出火毒研末每末四分加飛過辰砂二分生地當歸煎濃汁調納

兒口并母乳頭上一日藥盡次日遺下穢物永無痘疹諸疾

蝸蛸散 撮口疳風及胎風 蝸蛸 姜蚕 腦子 研射香 研先將蝸蛸逐箇用薄荷葉包

扎定炒薄荷葉乾去扎線姜蚕炒共末入腦射研勻每用二三分紫椹鷄肝二片煎湯調下

牛黃散 七日口禁 研牛黃每服一字竹瀝調嚙之更吃借乳

益脾散 治瘵風用此吐風痰次用益脾散 蝸尾 銅青 硃砂 賦粉 硃 每服一字茶湯調下

益脾散 和胃進食 白茯苓 人參 草果 煨木香 煨甘草 炙陳皮 厚朴 制 蘇子 炒 寺 為末 每一錢姜棗煎服查煎乳母服

大連翅飲 治胎熱二便不利丹毒瘡癩傷疹諸熱 連翅 瞿麥 荊芥 木通 赤芍 當歸 防風 柴胡

滑石 蟬退 甘草 一山梔 黃芩 每一錢加紫草煎服熱甚加大黃

五福化毒丹 治瘡疹丹毒驚惕燥渴口瘡 人參 玄參 青黛 甘草 牙硝 枯過 各 茯苓 桔梗 各一

射香 片腦 各五 一方無片腦有金箔 右末煉蜜丸一歲兒二分薄荷湯化下

牛黃散 月裏赤丹及治五腫丹毒 鬱金 甘草 炙 桔梗 天花粉 葛根 等 為末薄荷湯入蜜調服五分量兒大小用

藍葉散 塗丹毒赤腫風熱 藍葉 浮萍 水苔 同 研爛絞汁調朴硝土朱塗赤處 清涼飲 大黃 赤芍 當歸 甘草 水煎食後服

生地黃湯 小兒月裏發黃壯熱二便不利 生地 赤芍 川芎 當歸 天花粉 每五錢水煎服

川白姜散 胎寒腹痛不乳 木香 陳皮 官桂 枳榔 甘草

白姜餅每一錢水煎綿醪使吮之嘔加木瓜丁香

當歸散 胎寒內傷腹痛面青肢冷便青 當歸 桂心 川芎

白姜炮香附 木香 甘草餅每末一字乳汁調下日三服

朱砂丸 月裏生嘔以此下後用朱沉煎調之

朱砂 膽星 豆霜餅糊丸黍米大薄荷湯下二丸

米沉煎 小兒嘔吐不止

朱砂 飛錢 藿香 錢 滑石 飛錢 丁香 枳 每服五分新汲水一盞香

油滴成花抄藥在上須臾墜之澄去水別用水空心送下

猪乳膏 胎驚 琥珀 防風 錢 辰砂 每末一字猪乳調服或

加全蝎尤妙 至聖保命丹 胎驚內傷肚腹堅硬夜啼目上視手足掣急慢驚風

全蝎 去毒 個 防風 南星 炮 蟬退 足 翅 安 蚕 炒 天麻 煨 各 錢 白附 煨

辰砂 另 錢 各 射香 五 分 飯 九 黃 豆 大 金 箔 為 衣 鈞 藤 燈 心 湯 磨 下

有熟加牛黃片腦一方加羌活當服鎮心安神化痰

獨活散 胎驚發散風邪 枳榔 天麻 麻黃 甘草 各 二 羌 活

龍九 凡 藥 水 調 南 星 末 貼 額 門 上

雄黃 辰砂 天 旦 黃 錢 四 膽 星 八 射 香 錢

右研甘草膏丸如皂子大三歲兒一九小則減之薄荷湯化下

### 變蒸九十

兒形雖具未全神長養之時必變蒸 小兒初生形體藏府雖具而氣血未足精神志意竟竟未全故

血脈忘意長養之行必有變蒸之候每三十二日 變則氣休蒸則熱

為一變六十四日而一蒸胎毒亦盡變蒸而散 變則氣休蒸則熱

八蒸十變始成人 變者變生也 六府故變則上氣蒸則體熱

脈亂或吐或泄或煩或燥渴七日始解亦有變蒸之時外挾寒邪而

為病者當以小柴胡湯 為主而此証調之初變生癸水屬足少陰

腎主精志二變為一蒸生壬水屬太陽膀胱其候耳與尻冷三變生

丁火屬手少陰心主藏神其性為喜四變二蒸生丙火屬手太陽小

腸

腸其候下出而微驚五變生乙木屬足厥陰肝主藏魂喜哭六變三  
蒸主甲木屬足少陽膽其候目不閉而赤七變生辛金屬手大陰肺  
主藏魄生丙火屬足太陽脾主藏意與智十變五蒸生戊土屬足陽  
明胃其候不食喘痛而吐乳手厥陰心包絡手少陽三焦俱無形狀  
故不變蒸十變五蒸乃天地之數以生成之然後生志意能言詔知  
喜怒十變後六十四日為一大蒸計三百八十四日經脈漸盛破手  
得血而能持物足得血而能行立又六十四日為二大蒸計四百四  
十八日詔言意志乃異於前又六十四日為三大蒸計五百一十二  
日變蒸既畢兒乃成人亦有胎氣壯實而變蒸無寒熱者

惺惺散

治變蒸發熱驚風痰疹

四君子如芍藥散

更細碎天花粉等分每二錢姜引熟加柴胡  
紫陽黑散 鮮利熱氣 麥冬 麻黃 連翹 大黃 辟杏仁 兩半 炒

芎藭散

變蒸發熱不解胸中有痰痰癖宿乳食積大便酸臭

梨漿飲

變蒸潮熱瘡熱積熱脾積寒熱往來或一日或二日一發

青蒿

取花頭及葉曬乾 柴胡 人參 黃芩 前胡 秦艽 甘草

右各等分一歲兒五分兩歲一錢生梨一片薄荷一葉生地一寸  
生藕一片同煎溫服

調氣散

變蒸吐瀉不乳多啼 木香 香附 人參 陳皮

藿香

甘草 每錢姜棗引

變蒸有寒無熱當歸散

脈候形色九十一

嬰孩六歲驗三關

一歲至六歲曰嬰孩惟以男左女右手次指第一  
節為風關二節為氣關三節為命關以驗其病三

關無脈為風寒飲食輕病三關有脈為驚痺重病脈青為驚風青黑  
為慢驚脈赤為驚熱痺熱紫黑是驚痺之極重風關初見者輕淺易  
治氣關見者重而難治若過命關則病勢已劇九  
死一生多不可治慢驚雖三關無脈亦不可治也 鬚齒之年一指看

童非始堪容兩指脈來七至是平安七歲八歲曰亂九歲十歲曰髡

至八至為平脈十一至十四歲曰童非始可以二指診脈而以六至

七至為平過則為熱不及為寒浮則為虛為風沉則為實為積為痛

浮數為乳癩驚悸虛而軟者為慢驚痰涎緊而弦者為氣急為風寒洪數為

著為便秘沉而弦者為食積腹痛緊而弦者為氣急為風寒洪數為

熱伏結為傷食軟細為疳症氣促脈代散亂無先觀神色兼筋脈形

倫者死兩手忽無脈主中惡氣燥亂不寧者死

症如危治亦難小兒方脈古人謂之啞科必先觀其神色筋脈形症

然後察脈面色以紅淨為安如肝病則色青心病則

色赤脾病則面黃肺病則面白腎病則面黑面見赤色為外驚夜啼

青紫相雜主驚風驚熱紅紫相兼主症熱停痰紅紫有點主傷寒夾

食青黑黃暗主脾風慢驚左右太陽山根青筋脈見主頓驚青黑主

死肚上青筋主食積虫症慢驚難治瓜甲青黑忽作鴉聲顛門腫陷

鼻黑唇青虫出口鼻肚大青筋毛稀形脫血貫瞳仁喘滿汗流目不

睛皆不治之形症也

### 急慢驚風天鈞內鈞二症五癇夜啼客忤九十二

急驚暴發谷歸肝積熱生風驚與痰

諸風掉眩皆屬肝木小兒真水未壯心火自炎肺金受制而無

以平肝故肝木常有餘而脾土常不足心血未充神志不定故凡舉

動不常音響稍異皆易為驚或因調護失宜飲食不節內積熱而生

風或因驚恐神散舍空而痰聚或因外挾風邪氣鬱而生痰由是風

火並作痰涎潮壅百脉阻滯關竅不通而急驚暴烈之症作焉其狀

牙關緊急涎潮喘滿角弓反張拳緊搐搦頭竄視時驚時惺口熱

唇紅二便閉澀其脉浮數洪緊此皆肝木之餘之症以清熱散風鎮

驚豁痰為主初驚昏迷不省牙關緊者嚏驚散或通關散痰壅盛者

抱龍丸或奪命散白玉餅風盛者天麻防風丸熱盛者涼驚丸利

驚丸肝熱搐搦瀉肝丸小便赤導赤散加黃芩防風竹葉大

便秘者滾痰丸挾食癖驚搐者寬熱飲因驚而得者鎮驚丸脾弱

慢驚蕪癯夜啼客忤及風癇或因飲食不節久瀉久吐或因傷寒瘵痢致傷脾胃中氣太虛脾弱則生

風風甚則筋急因成慢驚其壯身口俱冷或時微熱手足痲痺奉散  
昏睡露睛驚無休時其脉虛軟此皆脾氣不足之症以補中和氣為  
主通用東垣黃芪湯初起蟬蜎散保命丹元氣未脫者姜蚕丸元  
氣脫甚四君子湯痰甚瓜蒌湯痰甚昏迷白玉餅四肢逆冷口不渴  
黑附湯脾虛吐瀉不食白朮散醒脾散天鈞者陽也壯熱驚搐目上  
視喜怒不常急驚多有之潮熱者鈞藤飲驚掣者涼驚丸有痰抱龍  
丸或痰痰丸食積乳癖寬熱飲內鈞者陰也腹疼啼哭唇黑囊腫  
便清樞機慢驚多有之腹中急痛魏香散白朮散鈞藤膏或保命丹  
外掣者鈞藤飲然二驚二鈞寒熱如天淵之隔急驚者十生一死  
慢驚者十死一生醫不暗此混為一途而治悞人多矣痊者身體強  
直終日不醒有汗曰柔痊枝枝葛根湯九無汗曰剛痊麻黃葛根湯  
九或小續命湯九加減便秘者細辛大黃湯夜啼有二熱者心煩臉  
赤舌白鈞藤散乳頭散小便赤泄蟬退導赤散寒者腹痛面青口  
冷肢厥便泄六神散白朮散客忤者外氣獸畜之類觸而忤之驚啼  
色變喘息口出黃白沫或口中有懸癭腫核宜針之射黃散黃上散  
痢有五心膈面赤口瞪吐舌心煩鎮心丸肝瀉面青上竄手足拳抽

及如驚風吐沫牛黃丸脾瀉面黃直視腹滿自利妙聖丹諸瀉氣  
實皆宜先其風痰後以本藥治之紫金錠治小兒驚風癇症瘡疹  
等疾薄荷湯磨下

驚風散 半夏錢一牙皂加為末少許吹鼻立醒

通關散 驚風搐搦關竅不通 南星炮姜蚕炒錢射香字牙皂條二

赤足蜈蚣錄 為末姜汁濕手點藥擦牙或少滴口中涎出則

琥珀抱龍丸 治驚搐及四時感冒邪熱煩燥痰嗽瘡疹等症

琥珀 人參 天竺黃 檀香 茯苓各半甘草兩只壳炒

只實炒辰砂飛山藥解膽星金箔珍珠一

右末新汲水丸如芡實大每一丸風寒葱湯痰盛姜湯驚悸燈草

湯痘疹白泐化下

白玉餅 小兒驚搐喘咳嗽 巴豆去油滑石兩大半夏個二

白麴一定腦一白附一滴水丸如茄子大量大小虛實用之

桂黃解毒丸 小兒驚熱并頭面瘡腫牙疳口瘡等症

雄黃 鬱金錢四半夏 滑石錢二巴豆一酒大黃錢三

麵糊為丸麻子大量大小虛實用姜湯下以利為度

奪命散 急慢驚風痰塞咽喉 青礞石并碎鎔研各一兩

每服五分或一錢急驚風痰薄荷自然汁入寮調下慢驚痰姜湯調下駒喘九室湯調下

奪命丹 急驚不省人事眼定牙緊面白并黑者

南星 半夏各四錢 錫鐵各一錢 金箔計珍珠 巴豆去油辰砂

銀箔計輕粉 射香各五 糊丸黍米大一歲兒一九燈心湯下

天麻防風丸 驚風吐熱痰壅搐搦

姜蚕炒半 天麻 煨防風 人參 全蝎各一 牛黃錢 辰砂

雄黃 射香各半 甘草酸二 煉蜜丸梧子大每三九薄荷湯下

涼驚丸 驚熱發搐心神恍惚牙關緊急上視潮熱手足動搖

黃連防風 青黛 龍膽各三 鈞藤錢二 片腦錢一 牛黃 射香字

右末起糊丸黍米大三歲兒一九或二九葱湯下

利驚丸 急驚身熱面赤飲二便黃赤四肢抽掣

天竺黃錢二 青黛 輕粉各一 黑足錢五

煉蜜丸如豆大一歲兒一九薄荷湯化下

瀉肝丸 急驚肝熱搐搦 羌活 大黃 煨川芎 梔仁 龍胆

當歸 防風 鮮為末煉蜜丸芡實大每半丸或一九竹葉湯下

鎮驚丸 寧神退熱化痰止咳夜啼 珍珠錢一 琥珀 天竺黃 雄黃錢三 金箔計膽星 牛黃錢二

射香錢半 朱砂錢半 糊丸梧子大五六丸姜蜜薄荷湯化下

寬熱飲 小兒驚搐天吊扶食積乳癖下惡臭等物

只壳九粒 兩水浸炒 起豆四 大黃兩 朴硝兩 甘草錢一

每末一字或五分薄荷湯下

東垣黃芪湯 慢驚之神藥也 黃芪錢二 人參 白芍錢一

甘草五 水煎食遠服能補元氣瀉肝火

益黃散 治胃中風熱 黃芪錢 陳皮 人參錢一 白芍錢 生甘草

炙甘草錢五 黃連錢 為末分三服水煎

錢氏白朮散 和胃生津消積止瀉欬成慢驚者急服之

四君子加藿香木香各一錢乾葛二錢每服一二錢水煎服瀉利

加山藥扁豆肉蔻各一錢入姜汁煎服若慢驚已作加細辛天麻

各一錢金蝎三箇白附八分

蟬竭散 慢驚可用 全蝎去毒 蟬退二十箇 甘草錢半 南星錢一

右末每服五分姜棗煎服

姜蚕九 慢脾風元氣未脫者 膽星錢 姜蚕炒 地龍 全蝎 炙

五灵脂錢一 右末煮半夏糊丸麻子大每五九姜湯下

瓜蒌湯 治慢驚痰盛 白甘遂錢一 括婁根錢二

同炒黃研末每一字煎薄荷射香湯下

黑附湯 慢脾風四肢厥逆 黑附錢三 白附錢一 木香錢半 甘草錢五

每三錢姜五片煎服手足溫暖而止

醒脾散 慢驚吐瀉脾困不食 南星 茯苓 橘紅各一 全蝎 炙

甘草 蓮肉 白附 人參 木香各半 陳米炒二粒 每三錢姜棗

鈎藤飲 天鈎潮熱 人參 犀角各半 甘草錢五 全蝎 天麻各一

鈎藤 每末一錢薄荷湯下

魏香散 菘木兩半 阿魏錢一 溫酒化為末每一錢紫蘇湯下

鈎藤膏 盤腸內吊腹痛乾啼 乳香研沒藥 研木香 姜黃各半

木鱉子箇十二 煉蜜九如皂子煎鈎藤湯下

細辛大黃湯 小兒疳症便秘 細辛 大黃煨 防風各半 甘草錢一

每末一錢磨犀角汁少許白湯調或加天麻

鈎藤散 夜啼 鈎藤 茯苓 茯神 川芎 當歸 木香錢一

甘草分五 每末二錢姜棗煎小便赤去木香當歸加辰砂木通湯下

乳頭散 夜啼腹痛 黃芪 當歸 赤芍 甘草 木香分

每末少許搽乳頭上令吃之

六神散 腹痛啼哭口冷肢逆便泄曲腰而啼

人參 山藥 白朮各半 甘草錢二 茯苓 扁豆炒 各

每末一錢姜棗煎服一方有當歸白芍

黃土散 客忤 炒中黃土 蚯蚓研水 塗頭上及五心

射黃散 客忤腹痛 雄黃錢一 乳香錢一 射字每末一字雞冠血調服

鎮心丸 心癇 遠志肉 雄黃 鈇粉 琥珀錢二 辰砂錢一

射香錢五 金銀箔錢二十 棗膏九黃豆大每一丸麥冬湯化下

牛黃丸 肺癇 膽星 全蝎 蟬退錢半 防風 白附 天麻

姜蚕炒 射錢五 棗膏九菉豆大三九荆芥生姜湯下

炒聖丹 脾癇 楮石醋 樅黃 蝎稍 辰砂錢一 輕粉

射香各一杏仁二錢巴豆二錢

素膏九梧子大每一丸杏仁湯下

散風丹 肝癰風癰 膳星錢羌活 獨活 防風 天麻 人參

荆芥 川芎 細辛 柴胡錢

煉蜜九梧子大每二九大兒三四九紫蘇湯磨下

獨活湯 腎癰 獨活 麻黃錢川芎 大黃 煨甘草各半

每服二錢姜三片煎服

治慢驚子母皆服 人參 白朮錢一茯苓 陳皮各五甘草

薄荷 細辛錢半夏 天麻錢全蝎錢姜三片水煎服

溫白丸 小兒脾虛吐瀉冷疳慢驚

天麻兩姜蚕炒白附生全蝎炒天南星泡七次

右細末寒食麴丸菜豆大五七至二三十丸空心姜湯下

小兒安驚健脾消痰熱 茯神分天麻分人參 半夏 黃連 青皮分五 只實分甘草分

姜三片煎服

牛黃丸 鎮驚清熱止軟化痰寧心安神急慢驚風胎驚俱可服

膽星錢辰砂分雄黃分射香 牛黃錢天分黃分金箔片珍珠

琥珀錢甘草膏九芡實大辰砂雄黃為衣薄荷湯化下

### 諸疳九十三

肥甘不節傷脾胃缺乳亡陰氣血銷小兒乳哺未息穀氣未充脾胃嬌嫩飲食易傷若飲食恣情肥

甘無度一切烹飪調和之味瓜果生冷之物朝傷暮積則脾胃受傷不能化腹滿泄利積熱生痰所以肌肉日削氣血日銷骨熱煩蒸漸成羸瘦經曰穀食肥令人內熱穀食甘令人中滿蓋其病因肥甘而得故以疳名或因幼小缺乳食穀太早脾陰失養或因久病吐瀉竭其津液或因停積滯塞下多亡陰三 者皆致疳之由又非止於肥疳已也 五臟五疳須審治餘疳十四

不同療 病傳五藏則為五疳心疳者面黃頰赤心煩滿吐熱虛驚口瘡當補心安神丸或茯苓丸肝疳者即風疳搖頭揉目白膜

遮睛合面而睡汗流潮熱面色青黃髮立青筋當補肝生熟地黃丸脾疳者即食疳體黃腹大氣麓下利酸臭好吃泥土當補脾益黃散

肥兒丸肺痺者即氣疳喘嗽氣逆揉鼻咬甲寒熱往來口鼻生瘡宜益黃散補脾虛則補其母也或清肺湯腎疳者即急疳寒熱頭熱脚冷肌體極瘦遍身瘡疥齒腫齲宜當補腎地黃丸五疳惟有腎疳最急故名走馬牙疳口瘡斷潰齒黑若不急治其齒俱脫銅青散通用五疳保童丸又云五疳皆補其母則子自安假令日中潮熱心經虛熱也宜先補肝肝實而後瀉心火心得母氣則內平而潮熱愈矣四臟做此病傳諸經則有十四疳之異治法不同熱疳者潮熱如火便澁胡黃連丸冷疳者泄利腹痛虛汗不止至聖丸疳勞者骨蒸潮熱盜汗腹急面黃飲食不為肌膚疳渴者藏中風熱加以乳母恣食辛辣酒麵及燥使兒心肺壅熱日則消渴飲水乳食不進夜則渴止乾疳者瘦瘁少血舌乾搭口乾啼便結目睛不轉身熱皮燥手足清冷三疳通用黃連丸脊疳者身熱黃瘦煩熱下痢脊如刀鋸或拍背如鼓鳴或垂食脊脊十指皆瘡頰嚙瓜甲大芫薺丸腦疳者頭悶腦熱頭瘡身汗顛腫腮高龍胆丸疳瀉者毛焦唇白額上青紋肚大腸鳴泄利香薷丸疳痢者外挾風邪內停宿滯冷熱不調水穀不聚頻下惡痢木香丸疳腫脹者虛中有積毒與氣并故肚腹頭面四肢浮腫疳用白朮散加猪苓澤瀉脹用蘇梗湯疳疳者多嘔吐清水腹脹張滿唇口紫黑腸頭及齒痒妙應丸丁奚疳者手足極細項小尻高肉削體瘦脘突胸陷號哭或生穀癥愛吃生米哺露疳者虛熱往來頭骨分開翻食吐虫煩渴嘔噦二疳通用十全丹無辜疳者腦後項邊有核如彈按之轉軟而不痛其間有虫如米粉不速破之則虫隨熱氣流散淫食臟腑以致肌體癢瘡便利膿血壯熱羸瘦頭露骨高初起可用鍼破膏藥貼之蚶蚶散大抵治疳當看冷熱肥瘦初病者為肥熱疳當用胡黃連丸久病者為冷瘦疳當用木香丸冷熱相魚如聖丸之類小兒藏府柔嫩不可痛擊大下必亡津液以成疳症為醫者當推幼幼之心以善調之不可妄為施治以傷生也

安神丸 治心疳面黃頰赤壯熱驚啼  
麥冬法牙硝 白茯苓 山藥 寒水石 甘草 煨酪朱砂兩

煉蜜丸如芡實大每半丸沙糖水化下慢驚參朮煎濃汁化下  
茯苓丸 心疳驚疳 茯苓神 芫薺 琥珀 黃連 赤茯苓各三

遠志肉黑 鉤藤 蝦蟆灰各 射少 菖蒲錢一

粟米糊丸麻子大每十九薄荷湯下

生熟地黃丸 肝疳白膜遮睛合面而卧色青黃髮立筋青熱而羸

生地 熟地各半川芎 赤茯苓 黃連 杏仁 半夏制天麻

甘草 當歸 只壳炒地骨皮各三錢黑豆四錢

煉蜜丸如棗豆大三四十九空心白湯下

益黃散 脾疳體黃腹大好吃泥土肺疳氣喘口鼻生瘡

陳皮一錢青皮 訶子肉 甘草一錢砂朮一錢丁香一分或加參朮各一錢煎服

肥兒丸 脾疳身黃肚急痞塊泄瀉瘦弱及諸疳

胡連 三稜 神曲炒木香 使君各一錢蘆薈 枳榔 香附

消肺湯 肺疳咳嗽氣逆多喘惡寒

黃芩 當歸 麥冬 連翹 防風 赤茯苓 桔梗 生地

甘草三錢赤白朮各三錢紫蘇 前胡各二錢水煎溫服

地黃丸 腎疳極瘦瘡疥面腫寒熱時作頭脚冷

熟地八錢山藥 山茱萸 澤瀉 丹皮 茯苓各二錢

或加使君川練煉蜜丸如梧子大每三九溫湯化下

疳疔散 走馬牙疳斷清齒黑或脫或出血

白芷兩牙硝一錢銅青 射香一錢為末搽之

五疳保童丸 通治五疳疳 龍胆 青皮 黃連 白礬 五倍

蟾頭 夜明砂 若練根 雄黃 射香 青黛 天漿子

熊膽 蘆薈 胡連分糯米糊丸麻子每一丸米飲吞下

五疳消食丸 消疳殺蟲退熱磨積進食

使君 麥蘖炒陳皮 燕蕒 神曲 龍胆 黃連炒唐棗子時

陳米飯丸黍米大每十九米飲下

胡黃連丸 熱疳 胡連 川連各半辰砂二錢蘆薈一錢射香一錢

右末入猪膽內以杖靠鈔弦上用線懸之勿令著底淡漿水煮一

炊時取出入蘆薈射香研勻揉飯和丸麻子大五七丸茶湯下

至聖丸 治冷疳疳瀉 丁香 丁皮各一錢木香 厚朴制使君肉

陳皮 肉蔻各二錢神曲丸麻子大米湯下十九

黃連丸 治疳渴疳勞乾疳 黃連兩射香一錢乾葛 烏梅 蓮肉

杏仁各二錢牛膽汁和丸麻子大十五丸烏梅湯下

大芩薈丸 疳疔 蘆薈 燕蕒 木香 青黛 枳榔 黃連兩

蟬退二箇胡連錢射香錢猪胆汁浸糕丸麻子大二十九米飲

龍胆丸 治腦疳 龍胆 升麻 練根皮防風 赤茯苓膏

油髮灰青黛 黃連醋半猪胆汁浸糕丸麻子大二十九薄荷湯

香薷丸 疳瀉 黃連錢肉蔻錢木香 訶子錢砂仁 茯苓錢

揉飯丸麻子大十五丸米飲下

木香丸 疳痢 黃連 木香 製朴 肉豆蔻 砂仁各三錢

訶子肉錢飯丸麻子大十五丸艾葉生姜湯下

蘇梗湯 疳脹 蘿蔔子研紫蘇梗 乾葛 陳皮錢甘草錢

妙應丸 疳虫蛻症 枳榔 大腹子 黃連各半 黑豆 白蔻兩

木香 蕪荑 使君肉各二錢皂角汁糊丸菘豆大二十九白湯下

十全丹 丁奚噴露疳 青皮 陳皮 菘木 川芎 五灵脂

白蔻 枳榔 芳薈各半 木香 使君肉蝦蟆錢

猪胆汁浸糕丸麻子大米飲下二十九

蚶蚶丸 無辜疳及諸疳 蟾酥一箇夏月清渠中腹大

取糞一杓置桶中以尿浸之待有虫殺蟾于內任虫食一晝夜用

布袋裝流水中一宿取出瓦上焙為末入射一字飯丸麻子大二十九

三十九米飲下

黃芪湯 勞疳喘嗽虛汗骨蒸渴而腹瀉少食

四物加黃芪錢蝦蟆錢炙鱉甲錢陳皮 人參 白茯苓 半夏泡

柴胡 使君肉甘草錢每二錢姜棗引

鱉甲散 疳勞骨蒸 鱉甲錢金龜錢黃芪錢白芍兩生地

熟地 當歸俱酒人參 地骨皮兩每二錢水煎服

胡連丸 疳積腹大青筋 胡連五分積錢阿魏錢醋浸神曲二錢

川連二錢積射香一錢猪膽汁丸如黍米大二三十九白木湯下

又方治兒疳 芳薈研胡連錢神曲錢川連 白木炒山查肉各

蕪荑二錢芳薈和猪胆汁丸粟米大六十九食煎米飲下

芳薈丸 消疳消黃消腹脹

芳薈錢木香 枳榔各三錢胡連兩砂仁 山查肉神曲 麥芽

甘草 厚朴酪蕪荑兩蝦蟆錢陳皮錢青皮兩

煉蜜丸如皂子大每一丸空心米湯化下一方無曲藥山查甘草

厚朴有巴豆猪胆汁九

肥兒丸 小兒缺乳成疳泄瀉虫動腹大髮立發熱無精神

黃連炒神曲醱一木香錢檳榔箇麥牙炒使君肉寇五錢

神曲糊丸如麻子大二三十九白瀉送下一方加山查肉蘿蔔子

砂仁只壳巴豆錢連同煮只用只壳名保和肥兒丸

肥兒丸 治疳積

芦薈研胡連錢炒曲錢川連 白木 山查肉炒各錢燕蕒炒二

右末猪膽汁丸粟米大六十九

食前米飲下

### 異症九十四

鮮顧龜背與龜背驚口瘡糜舌木重

解顧者頭縫不合因母氣虛與熱多也又云腎氣未成長必少

咳立入水湯有有熱加酒連子母俱服以白蘇末付之帛緊束之龜

背乃客風入脊逐於骨髓以龜尿點之骨節即平取龜于蓮葉上尿

口出肺熱脹滿攻于胸膈即成龜背或因乳母多食辛熱瀉白散加

黃芩口瘡白屑滿舌及兩腮故名驚口用線裹筋頭蘸井花水或粟

米汁拭洗之更以穀道黃丹搽之或用地鷄搗水塗瘡上人家磚石

下多有之口瘡糜爛用江茶粉草付之一方用青黛芒硝又方黃栢

細辛青鹽鴉吐涎出愈又方五倍黃丹江茶芒硝甘草為末敷之木

舌塞口用碧雪散塗之一方止用木片付之重舌須針舌下紫黑

筋出惡血仍以胆礬末塗之一方用鹿角末如豆許置舌下弄舌因

脾藏有微熱令舌絡微緊時時虛舌紙之勿用涼藥少與瀉黃散大

徐徐服之有飲水者胃中津不語行遲尻骨痛赤瘤白禿濕臍中小

液少非熱也切不可用下藥

四五歲不語酒和赤小豆末煩付舌下數歲不行服八珍湯仍盜莖

家食以哺之日三便起行尻尾骨痛屬陰虛有痰陰虛補血四物加

酒知栢少加桂為引痰用二陳加炒知栢少加澤瀉引二方俱用前

胡木香引痛不止俱加乳沒或先用玉燭散下其瘀血或先用小

胃丹降其痰熱毒鬱結於皮膚為赤瘤宜用生地木通荆芥苦寒

帶表之藥或加芍藥莖仁外以芒硝水洗之芭蕉油塗之白玉散付

之火丹用赤小豆末或伏龍肝鷄子清調付之白禿瘡內服酒制通

聖散外用白炭燒紅淬長流水洗之胡荽子伏龍肝梁上塵黃連白

礬為末油調付之瘡癬門亦有治法頭瘡用腊猪脂調雄黃水銀搽一方用牙皂胡椒枯礬輕粉樟腦為末燭油調茶猪胆搽頭瘡亦效  
脐中汁出用枯礬為末或黃栢末付之 吃泥胃熱蛇蕪冷囊脫羣垂野紫功 兒吃泥土乃胃中有

熟用石膏黃芩為君橘木茯苓甘草為佐一方膩粉和砂糖九服一方用黃連末和土與食一二次即愈冬月吐蛇多是胃寒胃虛白木散加黃連或以苦練根為君佐二陳湯煎服脫囊者外腎腫大用木通甘草連當歸煎服囊爛羣丸垂出者不死用野紫蘇葉為末油調付外以青荷葉包之脫肛用東壁土湯泡薰洗五倍末頻付托入七十門亦有治法

龜膏方 酒大黃錢三天冬錢百百合 木通 杏仁炒只壳炒柴白錢

葶蘆隔紙朴硝隔半煉蜜九芡實大食後温湯化下  
瀉白散 龜胃 柴白皮蜜水地骨皮 黃芩錢一甘草錢五煎服

白玉散 赤瘤火丹 白堊五錢善土 寒水石兩一米醋或新水調付

耳後月蝕瘡 黃連末枯礬 研勻付之

小兒鼻赤 雄黃 黃丹為末無根水調付之又蒼耳酒蒸焙乾為

末調服最鮮食毒鼻下一道赤者名曰壘黃連付之

小兒鼻流清涕不止辛夷膏 辛夷葉焙乾細辛 木通 白芷

木香醋半杏仁泥兩右細末羊骨髓諸脂各一兩和勻瓦器中熬

膏黃赤色出火毒入腦射各一錢

研勻塗額門上少許塗鼻中

小兒頭不生髮搗揪葉汁付之又燒鯽魚灰醬汁和付之

### 吐瀉九十五

吐瀉皆因濕熱成或因惡穢入陽明 諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱 又云濕盛則濡泄皆因乳食過

度傳化失常食鬱成熱熱鬱成酸鬱於胃口則吐白朮散 加石膏

和之脾熱吐黃色瀉黃散 胃熱而渴玉露散吐酸菜連九 有食

積或保和肥兒丸 消之白玉餅 下之濕熱鬱于大小腸之間則

瀉用胃茶湯 加木通清利之脾熱瀉黃散熱甚胡黃九 及月吐

瀉用益元散 有因初生口中惡 脾虛胃冷瀉温補五藏並虛有症

穢嚥入胃中作嘔者木瓜丸主之

形胃寒作嘔者唇口青白用丁香乾姜甘草煎汁綿醪令吃之脾虛  
不食而吐益黃散助胃膏温中丸下利清冷益黃散白朮散  
木香丸胃寒湯吐瀉五歲有煎病者肺病則睡而露睛喘氣心病  
則驚悸飲水脾病則困倦多睡肝則呵欠頓胸腎則不語畏明當詳  
其症而補之或太過則瀉之

玉露散 石膏 寒水石 生甘草 研末一子或五分調下

温中丸 人參 白朮 甘草 藜蘆汁 糊丸一二十九米飲下

木瓜丸 木瓜 木香 射香 膩粉 枳柳 餅

小兒吐瀉黃疸 三稜 莪朮 青皮 陳皮 炒曲 麥蘖 炒

黃連 甘草 炙白朮 茯苓 傷乳食 加山 肉時氣吐瀉如滑

石炭熱加薄荷

小兒吐瀉腹疼吐乳平胃散入熟蜜和蘇合名萬安膏米湯化下

和胃膏 冷氣入胃嘔吐不食

白朮 砂仁 附木香 肉菴 丁香 草果 乾山藥 兩

人參 白朮 茯苓 陳皮 甘草 二

每末一錢 紫蘇木 瓜湯下 或煉蜜丸 茯苓 實大米湯化下

瀉脾丸 小兒痞脹泄瀉不思飲食 白朮 陳皮 山查 肉各

蓮肉 山藥 神曲 麥牙 甘草 藜蘆香 人參

黃連 枳 木香 枳 飯丸 麻子 大三十九食遠米湯下

### 腫脹腹痛哮喘瘧痢九十六

腫脹皆因胃與脾腹疼因食或因蛔 脾胃虛弱不能運化精微而虛

苓湯 身面黃腫者茵陳五苓散小便赤囊腫如水晶者導赤散

加澤瀉猪苓渴者辰砂四苓散脾虛作脹者白朮散加厚朴只實枳

榔羅蔔子或搗氣丸實而脹滿者蘇梗湯 食積脹滿消積丸或三

稜消積丸 腹痛多因飲食所傷用白朮砂仁青陳曲蘗山查甘草

寒加藿香吳茱萸熱加黃芩為末米飲調下一錢食積作痛必惡食

或大便酸臭或目無精光三稜消積丸傷生冷作痛草寇丸 重則

三稜消積丸心腹痛面眊白中口沃沫清水吐出發痛有時乃胃冷

虫動與癩相似但目不斜手不搖耳白朮散加黃連或二陳加練根

煎服或安虫  
痰哮喘求虛實瘧痢瀉兼食積醫  
哮喘者喉中有痰聲  
乃肺虛有痰風寒

外束不得發泄故哮喘而有聲每遇陰寒則發九寶湯加牙皂煎調奪  
命散未發時以二陳湯加天冬麥冬阿膠百部以養肺化痰喘乃

肺火有餘瀉白散加黃芩紫金丸肺虛者定喘湯小兒瘧疾橋  
半三物湯食積瘧三稜消積丸久不止六一丹微吐之痢疾用芩

連陳皮甘草赤加棗仁紅花白加滑石煎服後重加木香檳榔只壳  
文不止加肉蔻粟壳氣脫加升麻柴胡食積痢用炒曲二木陳皮黃

芩芍藥滑石甘草茯苓煎下保和丸或先服木香檳榔丸損氣  
丸治小兒虛脹腹大者加蘿蔔子名揭丸字

胡椒解蝎尾半錢一方有木香一錢  
麵糊九粟米大五七九至一二十九陳米飲下

消積丸丁香訖砂仁薑巴豆去油麵糊九黍米大三九溫水下  
安虫散黃粉炒黃檳榔川練肉鶴虱各二錢  
每末一字大者五分一錢痛時米飲下或用米糊為丸

瀉半三物湯小兒瘧疾痞塊川芎錢生地白芍各錢陳皮

半夏炒茶各一北草分二姜片煎調中末五分前二時服  
一方常山三錢薑三錢檳榔即錢一溫酒調發前服小兒一料治三人

合九哮喘不止端午日合黑豆四十九粒泥鷲管石研  
人言錢九如黍米大朱砂衣每一丸空心冷茶下忌生冷葷腥

白附九痰喘胆星兩大半夏兩半枯礬半錢  
姜汁浸蒸餅丸麻子大姜蜜湯下有熱加薄荷葉

疳腫脹薤白子兩錢一陳皮青皮檳榔黑丑炒  
五靈脂赤茯苓兩木香半錢糊丸紫蘇桑皮湯下

### 風寒咳嗽癆疹九十七

風寒亦與大人同咳嗽先分熱與風小兒傷風傷寒亦與大人相同  
但其劑畧小耳傷風頭疼咳嗽

鼻清涕百解散無頭痛參蘇飲無咳嗽神木散并見第傷寒在太  
陽羌活散看有汗無汗加減發之在三陽敗毒散或人參羌活

散傳八陰經亦看當溫當下小兒風寒迷悶驚搐不能服藥者俱用  
外擦法以指蘸熱油擦周身關節及太陽經令膝理開而風寒散極

有理但擦時先唯姜湯挾執薄荷湯擦後須謹避風寒或大人與睡  
 令微汗為妙世俗不知此理禪負其子求醫擦之即乘風而還豈非  
 開鬼門以待賊邪者哉欲行此法須醫者至家擦之仍發其汗可也  
 形寒飲冷傷肺而咳為寒咳其痰必清用三拗湯茵九室湯俱加  
 柴杏以散其實若傷風咳嗽用參蘇飲以散其風肺氣實者瀉白散  
 或葶藶丸下之火熱咳嗽其痰必稠或聲嘶用人參散加黃芩麥  
 冬天冬五味飲而降之咳血者其桔湯加黃芩天冬阿膠火盛者涼  
 膈散或椎黃丸下之風痰壅盛半夏丸痰嗽久不止者澄清飲  
 咳而氣逆 癭疹根從脾與肺內清濕熱外消風 脾主肌肉故癭屬脾  
 紫蘇飲 風濕濕隱而不出皮 膚癢痒升麻葛根湯加茯苓蒼朮以去濕色紅痒盛加蟬退鼠粘  
 犀角汁或加芍藥以瀉脾火肺主皮毛故疹屬肺火發于皮有頭粒  
 隨出隨沒或一日三見俗名風麻月消風散 隨寒熱加減治之  
 葶藶丸 咳嗽面赤痰喘 葶藶丸 黑丑炒漢防已 杏仁泥各一  
 右末蒸陳棗膏搗為丸麻子大五七丸姜湯下  
 人參散 肺熱咳嗽面赤喘滿 人參 天花粉 詳

每末半錢蜜水調服或加黃芩天麥冬五味煎服

半夏丸 風痰壅盛膈不利 半夏 兩五 粘礬 錢一兩二 人參 兩一

姜汁和丸黍米大一二十九姜湯下

人參羌活散 小兒傷寒時疫瘡疹頭疼發熱咳嗽驚風

人參 羌活 獨活 柴胡 前胡 川芎 只壳 茯苓 錢各五

桔梗 天麻 地骨皮 薄荷 甘草 錢各二

右末每一錢姜湯調下或二三錢水煎服驚風加全蝎炒白附

姜蚕炒各二錢朱砂一錢防風二錢半痰多加半夏曲神曲各二

錢五味一錢咳甚加桑皮杏仁欬發汗加麻黃荊芥

澄清飲 治痰飲咳嗽不止 白礬 兩五 南星 兩五 半夏 兩五 蛤粉 知母

貝母 甘草 錢各一 人參 錢六分 三服姜三片烏梅半箇水煎澄清服

紫蘇飲 治咳逆上氣乳不得下

真蘇子 訶子肉 蘿蔔子 杏仁炒

木香 人參 錢各一 青皮 甘草 錢各七 每二錢

水煎溫服

痘瘡順症九十八

熱煎五冷耳紅文熱退身涼標放勻痘乃胎毒小兒正氣漸盛則毒氣自不能容又遇熱氣流行之時而發除發熱日數或多或少或輕或重外以放標起長貫膿收靨四三十二日為常期輕者不及常數重者過期不愈然初起與傷寒相似發熱煩燥面赤唇紅頭疼身痛乍寒乍熱噴嚏呵欠喘嗽痰壅但煎耳冷鼻尖冷尻冷手足冷乃看男左女右耳後紅文淡紅者痘輕赤縷紫黑者痘重如發熱和緩飲食二便如常熱退身涼始放紅標作兩三起出三日方齊足底有痘者為齊標數稀疎均勻而胸膈

稀少紅活光潤痘與肉色紅白分明并無別色此為順症雖微有驚搐吐瀉微汗亦不為害或少與鎮驚和中之藥若熱未退少與葛根湯出不快者

少與快斑易紅活堅圓高碍手膿稠落淡紅痕四日起長先出者先長紅活光澤而無慘暗青紫之色堅硬而不薄圓實而不散頂高碍手而不平塌飲食二便如常其吉可知七日貫膿血足而膿稠漸成黃蜡色而無濕

痘瘡之患至九日十日當收靨之期先服者先靨大勢已定而膿微消膿色漸乾結痂如蒼蜡或如葡萄之色從口邊收起以漸自上而下痂落痕紅蓋痕白為血虛宜四物加參芪養血痕紫為血熱宜四物加生地蟬退苓連涼血自始至終飲食二便如常此為全吉

中間小瘰須調治順症尤防異氣侵中間煩渴吐瀉眼痛喉疼雖順症亦所不免宜隨症調之尤恐

異氣相侵反能為害凡遠行乘馬野外耕牧醉酒忿怒體氣行經之人俱不可見房中更要明暗得所溫煖無過切忌炎火香科尤易入心而煩燥作痒倘有穢氣觸犯變色若少燒漆器解之或用人牙散升麻葛根湯解表熱

升麻葛根 甘草錢葱五根姜三片煎服

快斑散 痘出不快

紫草 蟬退錢 木通錢 人參 白芍 甘草錢 一水煎服

鼠粘子湯 痘出不快 牛蒡子錢 礞石錢 防風錢 甘草 荆芥錢 三

痘瘡險症九十九

發熱須分實與虛重輕先定放標時

初起發熱疑似未辨且與惺惺散傷風鼻流清涕蘇飲十

風寒咳嗽多驚人參羌活散驚不止紅綿散調辰砂益元散

壅薄荷湯化下抱龍丸時令不止感寒氣而嘔吐藿香止氣散

長虛白汗者不可過用表藥汗不止者芍藥甘草湯表實熱盛不能

食升麻葛根湯頭疼身痛敗毒散汗不出麻黃湯以汗出熱

退身涼為生煩渴譫狂便秘不惡寒而反惡熱者裏實也四順飲或

大柴胡湯利之聲變者清肺散吐衄使血濁血糞黑者犀角地黃

湯便實者三燭散下之若裏寒吐瀉不渴手足厥逆脈微不食

者理中湯小便不利而瀉胃苓湯泄瀉不止豆蔻丸口渴吐瀉四

苓散加黃連竹葉腹脹痛者毒氣與邪氣相搏欲出而不得出也

用參蘇飲去參苓加砂仁陳皮散之大抵發熱之時表實非汗不解

裏實非下不解熱毒非涼藥不解汗下得宜溫涼得所使毒氣發泄

重可變輕症亦稀少失此不治則熱毒漸深難以收斂如一星之火

必致燎原可不慎哉紅點既見即藥表藥然發熱未退汗充不通猶

當汗之虛寒者急當溫補實熱急當涼解不然則出既不快起長亦

難出不快者升麻葛根湯加山查大力子或決斑湯出太密表熱

者鼠粘子湯紅盛者犀角地黃湯胸膈蜜者消毒飲加山查黃芩

紫草放標三日輕重可定熱和而標稀者固不足慮倘有重症速當

救之蜜如蚕紙者化毒湯加紅花黃芩紅斑如錦文者化毒湯加紅

花黃芩升麻猴痛如玄參鼠粘犀角汁紅丹如雲頭突者敗毒散加

紫草黃芩紅花或玄參升麻湯慘暗不明者升麻葛根湯加紅花紫

草芩連芎歸根窠不紅者當歸活血散加酒炒芩連升麻乾葛痘色

與肉一般白者保元湯加芎歸紫草紅花灰白頂陷不起根窠不紅

身涼者虛寒也八物湯加姜桂木香少許瀉者參苓白朮散甚則

理中湯紅紫焦黑根窠成片身熱煩渴者實熱也解毒湯化毒湯

加紅花紫草蟬退二便不利者急利之世俗謂痘宜大便結實禁而

不下白實熱毒將何以泄以上二症調之必待紫者轉淡白者轉紅

根窠紅潤二便調勻飲食復舊而後起長員膿可保無虞若當補而

不補當涼而不涼當汗而不汗當下而不下徒有後日之悔也痘症

稀則無毒密則毒重雖別症亦當涼解庶免餘毒患眼癢腫之症故

標時或夾疹而出或有小痘附大痘之旁雜密者待汗下涼解成功

大痘長成小  
痘與疹必退  
不拘長肢和收靨表裏陰陽一例推  
放標三日以後毒  
氣盡出正該起長

之時如不起長者或因氣弱不能送毒或因雜病阻滯不得升發或因發熱放標時未得舒通此時尤可急急圖之緩則難為矣起長時但見脚漸開闊頂平形如豆壳者急服升發解毒補氣助血之藥泄瀉者止之痘已半起忽一日平塌色白者宜用補中益氣湯六加芎歸頭面漸腫而痘平塌者未解也麻黃湯加川山甲三錢汗後隨症調治灰白平塌者氣血不足保元加芎歸紫草紅花平陷有黑痘如釘者皆火盛血熱宜當歸活血散或化毒湯加芎歸升麻紅花紫草外用無價散挑破黑豆點以通之乾乾不起者水楊湯洗之內服補中益氣湯痘頂四陷者俗名辣子痘以為不足慮多致誤人虛則助氣血實則涼解有針症者治之須得頂起為佳觸穢氣而不起者燒漆器或淡醋炭解之日放標至七日以後正該貫膿脹眼滿之時血足則膿稠而滿血少則膿清而虛如不能貫膿多因元氣不克或因以前失治或治之錯悞猶有轉移之理急者紅白有無雜症以調之而以助氣活血為主灰白平塌葉少或皮薄易破者保元加芎歸酒

步升麻人乳好酒助之紅紫漿少欲成乾枯黑陷者四物合解毒湯加紫草紅花升麻葛根石膏二症如暫助暫起而復陷者仍以氣血藥助之若膿色可觀摸過軟而皮皺者膿必不足恐後難收或間有不貫膿者必變虛寒之症宜保元加芎歸隨雜症加減治之漿未滿而乾燥皮皺不可悞作收靨急宜助血解毒以救之貫膿之時以補氣血為主而涼藥次之若有雜症宜用涼藥亦所不避自放標至十日以後正該收靨成就之際如色淡或空如豆壳者急宜助血芎歸酒芍紅花之類色紫黑者急宜解毒升麻葛根酒芩連連翹之類甚者加犀角汁二便不利者利之瘡已成膿管靨不靨不結痂疔者或靨不快者宜補血清熱利小便泄瀉不渴肢冷咬牙寒戰者異攻散發痒者燒乳香熏之潰爛不收者敗草散白螺散靨時有腥臭氣者儘全無氣息者尚有餘毒未發也臭爛不可近者急服清熱活血之劑緩則悞事臭爛深坎不收口者生肌散綿壘散付之靨時熱不退或寒熱交作升麻湯加柴芩白芍唇口乾紫頰赤者欲成肺癰也解毒湯加麥冬知母百合靨後氣血未實雜病始終同治法餘潮餘毒肌肉嫩最宜謹風寒節飲食以調養之

亦同醫

不拘放標起脹貫膿收醫但有雜症皆同治法風寒閉塞膝理熱毒不得發泄或鼻流清涕或鼻燥咽乾或頭背身體疼

痛或遍身有青塊黑紋俱宜麻黃湯加石膏柴胡升麻熱氣上攻頭痛小柴胡加梔芩石膏身背痛升麻湯加黃芩芎歸羌活腰痛屬太陽者羌活當歸湯微汗之熱加梔芩屬血瘀者莖仁承氣湯身熱不退者毒氣太盛也始終皆用升麻湯加石膏黃芩如因二便不利者利之寒熱往來柴胡湯加知母石膏或大柴胡下之煩燥好啼悶亂不睡譫狂發驚此痘家必有之症熱毒蘊于心經不得發越故也始終皆以涼血解毒為主解毒湯梔子仁湯辰砂益元散二便不利者通利之驚發于痘感收醫之時宜急治抱龍丸亦不可多服只可一二次宜更他藥治之鈎藤飲九道赤散之類暑氣壅蔽熱毒內攻煩渴啼悶如狂者四苓散加辰砂麥冬或白虎湯解毒湯有表症亦宜發汗渴者胃中津液為熱所耗故渴而飲水始終用白虎湯加天花粉乾葛甘草有汗加人參小便不利者益元散四苓散大便秘者腸胃津液乾涸不潤也或因汗多利小便亦令便秘用四順散身熱者大柴胡湯煩渴有汗涼膈散無熱症而虛秘者

竅導法充膈時大腸中六有痘痂燥澁不通灌香油潤之小便赤澁心移熱於小腸也導赤散加滑石梔子有血加瞿麥生地丹皮無大熱者四苓散分利之唯者熱氣出入之戶故痘症喉病獨多而且暴或痛或燥或破或喉食或流涎俱以退火為主甘桔湯加牛旁玄參荆芥麥冬杏仁熱甚其桔合解毒湯燥用桔梗麥冬薄荷硼砂兒茶蜜丸陰下腫或玉鎖匙點之大便秘者涼膈散徐徐下之肺清則声清肺熱則声啞蓋熱能生痰以塞肺竅清肺散或甘桔湯加玄參杏仁麥冬牛榜石膏訶子口舌或白或黑或脹皆用解毒湯加牛榜石膏生地木通荆芥或涼膈散用玉鎖匙點之血熱則妄行始終俱用犀角地黃湯加芩連梔子白芍便實者下之女子最宜急治汗乃熱氣內蒸而泄保元加芩連白芍少加桂枝盜汗用六黃湯厥冷乃毒氣鬱遏元氣不得行保元湯加芎歸桂枝生姜或理中湯熱厥者鮮毒湯寒戰者熱毒與正氣相搏則筋脉因而動搖火極而似水也咬牙熱毒盛于陽明用和解毒散或解毒湯便秘者涼膈散瀉利不渴而戰者保元湯加川芎白芍黃連姜桂熱壅不食二和散加黃芩胃虛不食人參養胃湯熱鬱于胃欲發而不得發為暖氣半夏生姜

湯加陳皮黃芩嘔吐因熱毒鬱于胃或素有食積相搏四苓散加橘  
 半生姜有痰二陳湯加貝母天花粉胃虛陳皮湯熱盛竹葉石膏湯  
 散煎食積胃苓湯加曲蘗山查吐瀉兼作者黃芩湯半夏湯亦有  
 始終微瀉而獲吉者起脹貫臍切忌之腹痛作脹熱毒滯于腸胃也  
 二和散傷食加曲蘗虛痛者桂枝芍藥湯熱毒壅遏則痰塞肺竅  
 為咳痰喘之症三拗湯加麥冬桑皮石膏前胡杏仁桔更瓜仁  
 之類喘促而厥者五味子湯有汗葛根黃芩湯神氣為熱所蔽故精  
 神倦怠宜清熱而助氣保元湯加陳皮茯苓麥冬梔苓白芍之類症  
 症熱則生風亦如中風之狀消風散加戒治之痘初深紅者必變紫  
 紫必變黑紫黑必至於乾枯一定之機也紅紫不解必致乾枯頂雖  
 平陷禁用參芪以涼血退熱為主四順飲或解毒湯加當歸生地升  
 麻葛根荆芥之類或百祥九下之或導赤散利之舌黑者急清其心  
 解毒湯加生地犀角紫草白陷痒塌者不可專補氣血兼補使血  
 活氣行白變為紅矣補中益湯合四物湯有熱加解毒藥泡乃肺大  
 所發白而空者氣之虛有清水者氣之滯紫者血之熱初起有之

苓木通車前以利水如起脹胃臍時有泡者不論紅白皆症相併而  
 成不足為慮水氣盛者滲利之血熱則氣滯而作痛四物加荆芥紫  
 草石膏黃芩六日以前宜發散六日以後宜活血乾滯而痛者水揚  
 湯洗之火盛血虛則痒四物加黃芩石膏升麻六日以前解表涼血  
 六日以後專主涼血凡衣被溫厚近熱則痒者血熱也蟬花散屬後  
 餘熱不逃升麻湯加柴芩寒熱往來小柴胡湯氣虛者補中益氣湯  
 俱加黃芩石膏戰搖無熱症而便調者八珍湯加黃栢知母麥冬屬  
 後諸疾皆由勢毒未盡氣血俱損虛火易熾不可因循坐俟危殆除  
 泄瀉宜寒宜溫補之外其餘諸症皆以清涼為主不可妄用溫補之  
 劑以助熱傷陰加厚落遲癥紅者為吉痲薄落早癥白如粉者凶變  
 之兆也宜四物加知母黃芩表熱合升麻湯裏熱合解毒湯內渴者  
 益元散屬後痢疾四物加黃連白木茯苓甘草木香飲食不消平胃  
 散加山查神曲麥牙感觸遍身或黑肢厥涎潮發搐宜消風消加蟬  
 退生薑薄荷有卒然而死者亦以此藥嚙之虛煩不眠者竹葉石膏  
 湯因服桂附致生熱病者消毒飲眼目瘡痛有豆痕者洗心散菊花

散牙疳犀角黃連湯惟黃散玉鎖匙點之遍身肢節有疳蝕瘡者綠  
豆散生肌散有熱者解之癰毒未成膿者消毒飲或小柴胡湯加羌  
活連翹黃芩赤芍金銀花已成膿者消毒飲加黃芩茯苓白芍連翹  
目母白芷瓜蒌當歸之類引上用升麻桔梗引下用枳榔牛膝宜刺  
出膿血逆則傷筋骨其餘感冒風寒咳嗽痰喘驚搐吐瀉喉疼聲啞  
皆依前雜症亦同治之

和解散 解表和中

人參 升麻 防風 川芎各七 乾葛 白芍各一 甘草五

連翹飲 治內外壯熱 連翹 梔子 白芍 滑石 大力子

柴胡 黃芩各五 當歸 荊芥 防風 車前 木通各四

蟬退三分 甘草二分 四順飲 大黃 赤芍 當歸 甘草等

當歸活血散 活血行血 當歸 川芎 赤芍 紅花 紫草各一 生地錢

保元湯 人參錢三 黃芪錢三 甘草錢一 附子錢一 白朮錢一 陳皮 乾姜錢一

參苓白朮散 溫脾止瀉 白朮 人參 茯苓 甘草 薤白 乾葛各一 木香分三

木香異攻散 虛寒通利不渴寒戰 木香 當歸 桂心 白朮炒 茯苓 陳皮 厚朴 人參

半夏 丁香 肉蔻 附子炮 獨活 當歸 防風

羌活當歸湯 腰背痛 柴胡 羌活 獨活 當歸 防風

羌活 黃柏各一 桂枝各一 薤仁 紅花各一

如神湯 脘痛 當歸 玄胡各二 桂心錢一 為末酒調下

透骨解毒散 寒戰咬牙 紫草 甘草 當歸 防風 芍藥

陳皮等分水煎服

芍藥甘草湯 自汗 芍藥各三 甘草錢二

如聖散 咽喉腫痛 桔梗 甘草錢一 大力子錢三 麥冬錢三

消毒飲 咽喉膈不利 荊芥 大力子各二 甘草錢一 防風錢一

一方加黃連

清肺散 咽乾声啞 麻黃 葛根 麥冬 杏仁 荊芥 天花粉各錢

訶子 菖蒲各八 桔梗 射干 竹瀝 姜汁 煎服

犀角黃連湯 牙疳 犀角一分黃連一分薄荷二分煎服

王鎖匙 點咽喉腫痛牙疳立腫

珊瑚散 姜蘇片腦碎為末以竹管吹之

連栢散 牙疳破爛 黃連一分薄荷二分

右細末鷄羽批入燕窩或三七鎖匙尤妙

葛根黃芩湯 喘而有汗 乾葛 黃芩錢二甘草五分五味子分

黃連 芍藥 石膏各一

五味子湯 喘促而厥 五味子人參錢各一分麥冬杏仁錢各一分生薑片棗各一分

紫草下通湯 熱劇 柴胡 天花粉 黃芩 桔梗 茯苓

荆芥 紫草 大力子錢一分人參 川芎錢七分甘草加姜棗引

地子仁湯 煩燥譫語驚狂 枳子 黃芩 石膏錢各一分赤芍 大青

赤芍 柴胡 豆豉錢一分知母 杏仁錢一分甘草一分

犀角地黃湯 芍藥 生地 丹皮錢各二分犀角汁飲之

紅綿散 發驚痰盛 全蝎 天麻 麻黃 荆芥 甘草 薄荷

紫草 蟬退錢各一分 驚風散 驚風諸證強急口振直視

羌活 獨活 姜蚕 藿香 枳壳 防風 天麻 地骨皮

蝉退各八分前胡錢條茶錢芍藥 升麻錢二分甘草一分

半夏生姜湯 愛氣 半夏 生薑錢

陳皮湯 嘔噦胸滿虛煩 陳皮錢三分甘草錢二分生薑片三分

黃芩半夏湯 乾嘔而利

黃芩 芍藥錢二分半夏 甘草錢一分姜三片棗二箇

益黃散 胃冷吐利 青陳皮錢二分丁香五分木香分訶子分

黃芩湯 熱利 黃芩錢二分芍藥錢二分甘草錢一分

豆蔻丸 久瀉不止訶子 肉蔻 赤石脂錢各三分

砂仁錢一分枯礬錢一分木香分

為末飯九菜豆大二三十九米飲下

二和散 藿香 香附 為末溫水調下二三錢

白朮散 調胃進食麥冬 白朮錢一分人參 甘草錢一分陳皮錢厚朴分

人參養胃湯 補脾進食

人參 茯苓 梔子 黃芩錢各一分白朮 陳皮 神曲錢甘草分

玄參升麻湯 發斑 玄參 石膏錢各三分升麻錢二分甘草錢

醫方

四聖散 痘出不快 紫草 木通 甘草 只壳碎

水煎倒靨去只壳加黃芪

化毒湯 紫草錢升麻錢甘草錢糯米撮

蟬花散 發痒 蟬退 地骨皮等分每末二三匙白酒下二三次

水楊湯 乾尅不起 水楊柳細葉紅梗生水邊冬用枝春夏秋連

葉五枝切碎煎七分候溫適身浴之以久為妙起處有膿漿吉

安胎散 孕婦痘 八物去地黃加茯苓陳皮香砂紫蘇糯米

敗草散 蓋牆敗草去土晒為末摻之

白螺散 瘡爛古牆上白螺螭燒存性研末摻之

綿蠶散 治瘡爛 出蛾蠶燒灰入枯礬研摻之

生肌散 瘡爛深坎不生 地骨皮 黃連 倍子 黃栢 甘草 枯礬 為末摻之

白芷升麻湯 痘瘡 白芷 升麻 桔梗 甘草 黃芪 黃芩

紅花 連翹 當歸 羌活 黃栢

菊花散 痘眼 地黃 薺草 花二 當歸 柴胡 黃連 黃芩

天冬 麥冬 天花粉 芍藥 甘草五分二貼生醫加蟬退

紫草湯 紫草 木香 茯苓 白木各一甘草各一糯米百粒煎服

猪尾膏 倒靨 龍腦 猪尾血丸 友實 大紫草湯化下

無價散 痘瘡黑陷暗日採人猪猪糞入罐內虛泥固濟炭火煨烟

盡白色為度每一字蜜湯調服

### 痘瘡逆症一百

發熱先斑標太齊長時隱伏必傾危 發熱一二日先見紅紫斑或未

熱先斑或頭面頭項一片紅如

胭脂或各處有紅塊青斑或口唇紫黑破裂者皆不治腰身痛治

不効者齒放標一日出齊密如蚕種或有青黑紫斑如痣或肌肉有

成塊青者或如蚊咬燈刺之點而不出頭者或頂陷中有黑點如針

眼者或如水珠皮薄光潤易破而隨乾者或與肉色一般紅或與肉

色一片白而治不轉者皆不治如錦文丹如雲頭治之不退者極

凶當起長之時灰白不起漸成乾尅陷伏慘暗不明者歸腎不治遍身紫黑紅

不治紫黑不起漸成乾尅陷伏慘暗不明者歸腎不治遍身紫黑紅

點腰腹痛者不治平塌如蛇皮者不治肉起痘不起頭面紅腫如瓜

玃者不治點如菜萁外黑內白者不治形細如小豆灰白不起根實  
黑暈不明潤者不治大抵脹一分則毒出一分六七日不盡長而黑  
者次無生理六日以前逆症尤可  
救過此則氣血已壞次難為矣  
貫膿收靨無膿血色臭聲形變莫

醫 貫膿時痘中乾粘無血水此名空瘡次死灰白慘黯擦破無膿血  
者不治白泡擦破止有清水隨乾者紫泡擦破出紫黑血者紫黑

如煤乾尅成塌者頭面腫大瘡盡抓破臭不可近又足冷者痘爛無  
膿吐利不止二便下血乳食不化或二便不通目閉聲啞腹脹滿肌

肉黑者皆不治收靨時遍身發痒搔破無膿水皮捲如豆壳乾者遍  
身臭爛不可近目無神氣者目閉腹脹足冷過膝者寒戰咬牙禁口

者上氣痰喘聲啞目  
閉無神者皆不治  
雜病有凶須早辨耳尻反熱腎家虛亦有凶變

不可治者先慮腫毒或惡瘡或別疾後犯痘而重者凶上身無根窠  
下身雖有根窠而內症重不食者凶或微紅潤而無根窠內症重者

凶大熱日夜不退者凶亦有痘色止而愈者癘毒體熱喘麓者凶瘡  
黑面焦風吹頤頰唇項腫硬或胃高而突不治昏沉增寒四肢逆冷

者凶四肢如冰不轉者凶困倦甚不能食者凶頭暈足冷昏悶如痴  
渴飲者凶不時努氣如大便者凶目睛露白無神者凶齒齒閉目黑

睛蒙昧無神者凶舌黑鼻有黑氣者凶咬牙寒戰而渴不止或吐瀉  
者凶舌卷囊縮治不轉者凶目閉無魂腹脹足冷至膝者凶痘盛時

發驚不止者凶虛弱而驚者凶熱不解譫語煩燥悶亂不止二便秘  
者凶煩燥腹痛不止痘大臭者凶飲食噎噎不已者凶瀉而氣喘汗

不止或煩渴者凶忽瀉膿血黑如死肝豆汁者凶吐利不止二便流  
血食不化者凶泄瀉迷惑或在悶不食者凶吐瀉不止四肢冷者凶

腹脹氣虛鳴不已者凶腹脹口中爛肉氣者凶腹脹喘氣麓者凶上  
下失血不止凶婦人因熱絛來不止或因熱墮胎血不止者凶已上

凶症如痘色根窠微紅雜病或作或退或漸減輕者猶有生理不可  
不治凡痘身熱而耳尻獨涼者此腎不受邪為煩若黑陷而耳尻反

熱乃變壞歸腎最為惡候乾枯黑陷以百祥丸下之下後以四君子  
湯溫脾以勝水十枚一二若下後寒戰身耳尻尤熱者不治

百祥丸 紅牙大戟一味槩木煑透上青日中曝乾復入羹汁內浸  
晒以汁盡焙乾為末湯浸蒸餅為丸粟米大三十九研赤芝蘇湯

下量兒大小加減

人牙散 黑陷不起人牙燒存性研酒調服

醫方便覽卷之四

醫方便覽跋

醫方便覽者蜀遂寧儒醫殷次臺氏所集是  
集也取諸皇甫明醫指掌圖賦折衷成之命  
方甚約計效最奇信醫之關鍵也集成進我  
梅翁翁閱之適與濟人之心相默契焉即命  
工鋟梓播其方於世夫醫培元續命厥術仁  
矣我

翁素懷好生之心茲尤廣醫道之傳與斯世

新民共則次臺之術得

翁益彰我

翁之仁因方愈溥由是壽民壽國以壽天下  
盎然生意流通宇宙間矣此心此政豈獨冒  
西土已耶猷不佞敬跋末簡為達觀者告

萬曆壬午夏陸月望屬下吏狄道縣知縣張鴻猷頓首謹跋

