

大德重校聖濟總錄卷第七十一

積聚門

積聚心腹脹滿 積聚宿食不消

久積癥癖 食癥

諸癥



積聚心腹脹滿未合以酥餅或豆灰

論曰府藏不和則氣血留滯而成積聚其積聚蘊結氣

不宜通與藏氣相搏故令人心腹脹滿煩悶短氣若為

寒邪所并則搏於府藏陰陽相擊而致心腹疼痛甚則

泄利也經云以酒煮之

治積聚心腹脹滿食已腹痛飲食不化嘔噦惡心胸脇

脹悶大便秘利不定磨滯丸方不惡開食

木香大青橘皮湯浸去白桂去麤皮

吳茱萸湯浸焙乾礞石醋熬成霜

巴豆霜半錢和合末與酥餅巴豆散同

右六味搗羅四味為末與礞砂巴豆霜同拌勻醋煮  
麩糊為丸如菉豆大每服三九加至五九早晚後

臨寢服大便溇利時減丸數

治積聚不散心腹脹滿嘔吐酸水惡聞食氣臧府不調

或秘或泄礞砂丸方

礞砂膏兩以醋壺煮半同  
烏梅去核炒

巴豆霜壹錢沒藥壹兩蓬莪皮壹兩其限

不官丁香壹兩木香入心煎取末三稜壹兩其限

備白乾漆炒令煙出留帶而丸實寒其寒寒蘇蘇麻

右九味搗研入陳為末令勻以礞砂糊丸如菉豆大

每服三九至三九煎丁香烏梅湯下食後服更量虛

實加減三稜剉碎代糶羅為末一罇得已用重煎煮

治積聚心腹脹滿宿食不消疔刺疼痛惡心嘔吐可思

飲食積氣丸方

桂法壹兩附子地裂去皮丹砂研碎

桃人湯浸去皮尖變巴豆去皮心膜壓

京三稜剉煨乾漆炒煙鼈甲去裙細醋

礞砂研過不大黃生用麝香研壹

香木香壹兩

右藥十味搗研為末先以好醋一升熬成膏和煎

件藥丸如藜豉天每服三丸五丸量虛實加減煎木香湯下食後

治積聚心腹脹滿不思飲食沉香煎丸方

沉香

木香

胡椒

青橘皮

阿魏

沒藥

檳榔

丹砂

硫黃

治積聚心腹脹滿不思飲食

高良薑

巴豆霜

治積聚心腹脹滿不思飲食

右一十三味除研外搗羅爲末一處研勻用重湯煮

蜜丸如梧桐子大每服三丸煎橘皮湯下

治積聚不消心腹滿汚刺疼痛嘔逆醋心可思飲食代

齋丸方

木香

代齋

桂

丹砂

京三稜

杏仁

棗

巴豆

右八味搗研爲末以醋煮麵糊丸如梧桐子大每服

三丸食後溫橘皮湯或生薑湯下

治積聚不消心腹脹滿醋心嘔逆不思飲食木香三稜

丸方

木香

京三稜

檳榔

烏梅肉兩 炒貳 縮沙人兩 壹 青橘皮去白 貳兩半

式巴豆虫皮心膜研 出油壹分

右七味搗研為末用醋煮麵糊丸如麻子大陰乾丹

砂為衣每服三九至五九溫橘皮湯下食後服

治積聚心腹脹滿氣攻刺痛嘔逆惡心可思飲食小分

氣丸方治積聚心腹脹滿氣攻刺痛嘔逆惡心可思飲食小分

青橘皮湯浸去白 貳兩 胡蘆巴參壹分 去白 貳兩

沉香兩 壹 補骨脂炒半 兩 蓬莪莪煨剉 壹兩

菝葜白豆蔻人兩 半 藜香子船上者 炒壹兩

右七味搗羅為末酒煮麵糊丸如梧桐子大丹砂為

衣每服二十九食前生薑米飲下

治積聚心腹脹滿利胸膈散滯氣消宿食木香乾漆丸

方 木香兩 壹 乾漆炒煙出 參分 肉豆蔻去殼

京三稜兩 壹 青橘皮湯浸去白 貳兩 陳橘皮湯浸去白 貳兩

桂去蟲皮 兩 壹 檳榔剉 兩 壹 補骨脂炒各 兩 壹

牽牛子炒壹 兩 壹

右一十味搗羅為末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服

十九生薑湯下早晚食後服

治積聚心腹脹滿腸鳴醋心嘔吐冷痰可思飲食京三

穉散方

十京三稜煨

蓬莪茂煨

各分

益智煨

縮沙八分

檳榔剉

青橘皮湯浸去

白煨

薑黃各半

丁香壹分

甘草炙

右九味搗羅爲散每服二錢匕沸湯點服不拘時候

治積聚氣塊心腹膨脹胸膈痞悶氣逆噎塞三稜湯方

京三稜參

用文武火煮醋盡爲度再剉焙

枳殼去

青橘皮湯浸去

木香

檳榔剉

乾薑炮

桂去

波煨

太甘草炙

有人味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時候

治積聚不消心腹脹滿金翼丸方

古沉香剉 木香剉 青橘皮湯浸去

陳橘皮湯浸去

京三稜剉

五靈脂各半

芫花醋炒

乾漆炒

寒食麩炒

藥墨研 大藥不 金式

右十味搗研爲末每秤藥末一兩用去皮心膜已

豆入秤一錢入淨白內壽令極細方入藥末再搗勻

用礪砂末半錢新汲水浸化旋入白內再搗千百下

候鞭鞭得所先如麻子大每服三九食後臨卧温熱  
水下心胸痞悶不快温甘草湯下  
治老幼久積冷毒嘔吐酸水心腹膨脹疔痛不美飲食  
兼治小腸疝氣大便不通紫金丸方

硝砂別研

乾漆炒煙出

烏頭生去

乾薑生用各

三對

五靈散

右四味除硝砂外搗羅為細末太硝砂研勻別以巴  
豆去皮心膜秤三分細研厚紙壓出油與前藥同研  
勻以水煮棗肉和搗令得所作一團用好濕紙裹三  
五重別取好淨泥去砂石多紙筋鹽水拌和如膠

將前藥一團固濟可厚豆許暴令泥乾或於文武  
火灰中煨乾亦得次燒熟炭火十斤煨通亦取出候  
冷打去泥刮取裏面藥再搗更入少棗肉杵勻可丸  
即丸如梧桐子大每服三九五九量虛實加減元氣  
及諸般冷氣撮痛及泄瀉濃煎艾湯癖積脇下刺痛  
妨悶酒食過度膨脹木瓜湯婦人血刺醋湯下  
治久寒積聚心腹脹痛食飲不下烏頭丸方

烏頭炮裂生

吳茱萸湯洗乾

細辛去苗

附子炮裂生

藥本去醋和

右五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服五九

至十九空溫酒下  
治積聚心腹脹滿宿食不化氣刺疔痛泄瀉善噫吞酸  
食欲嘔吐手足逆冷白豆蔻散方

白豆蔻去皮 桂皮去 丁香

附子炮裂各半兩 高良薑各半兩 木香酒浸

肉豆蔻去殼各壹分 人參高良薑 枳殼去殼

甘草剉 陳橘皮去白焙炒

右一十一味搗羅為散每服三錢匕煎木瓜生薑湯

調下中興

治胃中諸食結滯不消心腹脹滿吐瀉不止白豆蔻散

方

白豆蔻去皮 乾木瓜各壹兩 生糯米合

乾薑炮參 甘草炙兩 縮沙人壹兩

右六味搗羅為散每服二錢匕新汲水調下

治積聚脹悶減食黃瘦參苓丸方

人參 赤茯苓去黑皮 細辛去苗

枳殼去殼 熟乾地黄焙 當歸切

麥門冬去心 附子炮裂去 乾薑炮

大黃剉 厚朴去麤皮塗 桂皮去

甘草炙到各壹兩 烏頭炮裂去 桔梗炒



紫苑去苗土 蜀椒去目并閉口炒

石一十七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

七九空心溫酒下日再漸加至十九以知為度

治榮衛壅滯流傳藏府心腹脹滿飲食不消腹痛不止

化氣丸方

紫蘇子炒研 乾薑炮 檳榔剉

萊菔子炒研 蕪荑炒各 青木香

訶梨勒煨各 甘草炙 青橘皮湯浸去

草豆蔻去皮各

右一十味搗羅為末以麴末作糊和丸如梧桐子大

每服二十九生薑鹽酒下

治府藏不和氣血留滯積聚脹滿心腹妨悶食物減少

煩悶短氣京三稜湯方

京三稜煨 大腹連皮 延胡索洗半入土

天雄炮裂去 芫蕪 白朮各壹

桃人湯浸去皮尖雙 桂去

當歸切 消石各壹 郁李人湯浸去皮

右一十一味咬咀如麻豆大每服四錢匕水一盞半

入生薑二片煎至七分去滓溫服

治積聚心腹脹滿甚則泄利及氣不升降芍藥湯方

赤芍藥

赤石脂

大腹皮

京三稜煨

桑根白皮剉焙各壹兩半

肉豆蔻去殼費枚

桃人炒參拾枚

桂去蘊皮半兩

附子炮裂去皮臍 白朮

木香

枳殼去穢 當歸切

麻黃節去根

黃連去須各壹兩

右一十五味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑三片同煎至八分去滓溫服

薑三片同煎至八分去滓溫服

治冷積不去氣澀腹痛飲食不下旋復花湯方

旋復花微炒參分

當歸切

黃連去須

陳麩炒

桑根白皮

牛膝切

治冷積不去氣澀腹痛飲食不下旋復花湯方

龍骨各壹兩 豆豉枳殼 麩炒 桂去蘊皮 蓮米炒 不

桑地榆各壹兩 杏仁湯浸去皮尖雙 藥代小兒

木附子炮裂去皮臍 赤石脂大 附子厚朴 法各 兩

黃芩半兩 黑豆壹合 黃芩實 草豆蔻兩 散

桃人去皮尖雙 炒貳拾壹枚

右二十一味細剉每服五錢匕水一盞半煎至八分

去滓溫服

金華

分去

治虛積潮熱心腹脹滿疼痛妙香丸方

丹砂研 麝香研 龍腦研

去麝香研各 金薄拾肆片 粉霜

膩粉各壹錢 巴豆去皮心壹伍 蠟半煎至八分

蠟兩

右丸味研細丸如彈丸量虛實加減夜半後龍腦漿

水下藏虛即旋丸如小豆大每服三丸龍腦米飲下

疾堅者加至十九皆以鍼刺作數孔以行藥力小兒

取積丸如藜豆每服三丸又治小兒吐逆並米飲下

治氣脹心腹滿悶胸脇痛氣壅不通沉香散方

沉香剉 青木香剉 陳橘皮湯浸去白

郁李人湯浸去皮別研 大黃壹兩 雜去蟲皮

枳殼去麩炒 檳榔半生 訶梨勒皮各分

右九味搗羅為散每服三錢匕炒生薑酒調下并退

治積聚心腹脹滿痞塞不通大腸結燥腰腹疔痛面赤

口乾香桂湯方

桂去麩 陳橘皮去白 檳榔剉

當歸剉 貫草剉 木香剉

芍藥 枳殼去麩炒 大黃剉炒各

右九味麝搗每服五錢匕水一盞半煎至入分去

滓食後溫服

治久積氣不散心膈滿悶四肢不收痞膈不通枳實丸

方

枳實

去鹹 湯浸兩

白朮

湯浸兩

檳榔

剉碎 湯浸兩

陳橘皮

湯浸兩 焙各三分

甘草

剉碎

生薑

切炒各壹分

赤茯苓

去黑皮

青木香

桂

去麩

昆布

洗去鹹焙

訶梨勒皮

大黃

煨剉各半兩

草豆蔻

去皮壹兩

右一十三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

二十九生薑木瓜湯下

積聚宿食不消

論曰飲食入胃脾藏化之若腹內素有積聚攝養乖度

食飲不時則脾胃愈弱飲食遲化故為宿食不消之病

其狀噫氣食臭胃脹煩滿是也

治積聚宿食不消中脘痞滯煩滿氣促腹內刺痛噫氣

不思飲食木香丸方

木香

兩

檳榔

剉壹兩

陳橘皮

湯浸兩 焙去白

丁香

壹兩

京三稜

煨壹兩

乾薑

炮壹兩

蓬莪茂

兩 煨半兩

巴豆

去皮心膜 砲砂半兩 出油半錢

右九味除研外搗羅為末入巴豆礪砂研令勻湯浸

蒸餅丸如菉豆大每服二九至三九溫生薑橘皮湯

下食後服

大豆大發二式至三次並去薑汁又煎

治積聚宿食不消胸膈痞悶腹肚脹滿痔痛不食下香

九方

丁香壹兩

青橘皮湯浸去白

乾薑壹兩

桂皮壹兩

乾薑壹兩

附子炮製去使

蓬莪茂壹兩

京三稜壹兩

乾漆炒烟出

豬牙皂莢壹兩

酥炙去

木香各壹兩

牽牛子細末

牽牛子貳兩

墨

大黃各貳兩

硃砂壹兩

末

巴豆壹兩去皮心

新瓦內攤

生油取霜

右一十五味先將後三味於石鍋內煎硃砂醋令熱

先下巴豆霜煎三兩沸次下大黃末熬成膏和前一

十二味藥末熟杵丸如菘豆大常服一丸至五丸茶湯

任下如要取積生薑湯下七丸更量力加減

治積聚宿食不化留滯成塊心腹疼痛脾倦多困日漸

黃瘦木香丸方

木香

蓬莪茂

京三稜各壹兩

巴豆

去皮心膜研

丹砂

分

右五味將前三味搗羅為末入巴豆丹砂同研令

醋煮麩糊丸如菘豆大每服三九至五九生薑橘皮

醋煮麩糊丸如菘豆大每服三九至五九生薑橘皮

醋煮麩糊丸如菘豆大每服三九至五九生薑橘皮

湯下食後臨臥服

治久積氣塊宿食不消胸膈痞悶痰逆惡心不思飲食

臍腹刺痛醋心噎塞小分氣丸方

木香兩

檳榔兩

陳橘皮湯浸去白

棟實兩

乾薑兩

青橘皮湯浸去白

蓬莪茂醋浸壹兩

煨壹兩

宿丸

巴豆湯浸去油

半夏湯洗柒遍

去滑焙

大黃煨剉各壹分

雄黃壹兩

右一十一味搗研為末醋煮麩糊丸如菜豆大每服

五九七丸溫生薑湯下食後臨臥服

逐積滯化宿食利胸膈寬中丸方

烏頭炮裂去皮臍

吳茱萸湯浸炒

高良薑

甘遂炒

大黃

梔子人各半兩

巴豆去皮心膜研出油肆拾玖粒

右七味搗研為末用棗肉丸如小棗豆大每服一丸

生薑橘皮湯下

消積化氣溫胃思食治食後心膈妨悶如意丸方

威靈仙去苗土

附子生去皮臍二味各半兩同為末用好醋半盞浸壹宿

硝砂細研

巴豆貳拾壹粒去皮心膜出油二味同研用酒半升醋半升同

煎與前貳味同熬成膏

蓬莪茂煨

木香各半兩

青橘皮湯浸去白

大黃剉炒

陳麴炒手 丁香壹

右一十味將後六味為末以前四味膏和更別熬醋少許研墨汁同丸如菉豆大每服五丸至七丸生薑湯下

消積滯化宿食痰飲治胸膈痞悶桂香勻氣丸方

桂去麩 丁香皮 縮砂人

益智去皮 陳橘皮湯浸去白 青橘皮湯浸去白

檳榔剉 木香 蓬莪茂煨各壹兩

烏梅和核壹兩半 巴豆去皮心膜研出油陸拾肆粒

右一十一味除巴豆外搗羅為末和勻煮麩糊丸如

麻子大每服七丸至十丸茶酒任下食後服

治一切積滯宿食不消痰逆惡心吐瀉霍亂膈氣痞滿

脇肋膨悶噎噦心疼泄痢宜服積氣丸方並搗羅為末

代赭研 赤石脂研各壹兩 大戟

木香 龍膽各半兩 杏仁湯浸去皮尖肆拾玖粒

巴豆去皮心膜研出油為霜參拾粒 木香

右七味除別研外搗羅為末入杏仁巴豆霜同研勻

用麩糊丸如梧桐子大每服三丸至五丸食後臨卧

木香湯下

治久積伏滯胸膈膨脹心腹刺痛不化飲食及婦人血

氣疼痛紫沉消積丸方

沉香剉

阿魏研醋化

巴豆霜各壹

礞石研肆兩肆味同研勻用蜜壹斤共合盛

丹砂研貳兩

硫黃研

杏青橘皮湯浸去

高良薑

檳榔剉

木香

人參

桂去麤

胡椒各肆

丁香

乾薑炮各兩

胡椒各肆

右一十五味將前四味蜜酒熬成膏餘並搗羅為末用膏和搗千百杵丸如菜豆大每服五九七九溫橘皮湯下如心痛溫酒下婦人血氣當歸湯下

消積化氣進食黑神丸方

木香

礞石研

蓬莖莢剉

京三稜煨剉各兩

桂去麤

附子炮裂去

乾薑炮

乾漆搗碎炒

大黃煨別去

青橘皮湯浸去

墨燒

巴豆去心膜細

兩豆

蘇剉

京三稜

右一十三味以好醋一大碗先熬礞石令沸入巴豆

又熬數沸次又入大黃末熬成膏餘藥並搗羅為末

以膏杵和丸如菜菔子大每服三九五九茶酒任下

如消食化氣生薑橘皮湯下小腸疝氣核香酒婦人



血氣常歸酒下前詳此藥下小觀此藥對香研破入

治積聚宿食留飲不消丁香丸方三此五飲茶研百十

丁香蘇大又入木香末沉香剉麝香末

安息香末乳香大剉武落礞礞剉巴豆

肉豆蔻末桂皮屬京三稜剉

當歸切白陳橘皮湯浸去檳榔剉

華澄茄各壹附子炮裂去皮巴豆揄揄於煨煨灰

右一十五味先將安息香乳香礞礞三味用少許酒

浸良久別研如膏更與巴豆研勻餘藥並搗羅為末

晉

同用酒煮麴糊丸如麻子大每服五丸至七丸熱水

下若大段氣痛加至十九用生薑湯下

治積聚氣滯胸膈滿悶心腹疔痛不化飲食乳香丸方

乳香研丁香各壹木香各壹

附子地裂去五靈脂末乾薑剉白

桂皮剉芫花醋拌炒人青橘皮湯浸去白

豬牙皂去皮麝香末巴豆去皮心膜別

取霜去油錢去丁香末

右一十一味除乳香五靈脂末巴豆霜外八味搗羅為末入上三味拌勻煮陳麴糊丸如菽豆大每服二

丸三九溫生薑湯下量虛實加減食後臨臥服

治積聚癰塊一切所傷喫食減少日漸黃瘦如聖丸方

巴豆去皮心膜研

丁香錢

烏梅去核壹兩 搗碎炒煙滑石壹兩

石五味先搗羅四味爲末然後入巴豆同研勻用棗

米飯同爛搗丸如粟米大每服二丸至三丸隨所傷

物下更量虛實加減香

木香兩

消食化氣利胸膈及積聚凝滯藏府刺痛飲食減少不

香丸方大 搗碎五 丸用 生薑湯

同木香錢 搗碎五 丸用 生薑湯

礞砂兩半 武二 大囊去皮 咬要 烏梅去核 烏梅末

右六味先將水拌白麩作一薄餅以麩肉鋪餅上次

以前四味藥末和勻復鋪麩肉上作饅頭裏就用炭

火四圍炙煨候麩焦黑約藥透取出地面上出火毒

候冷打破去焦麩不用將藥與烏梅末同搗稀麩糊

丸如黃米大每服二丸三丸食後生薑湯下或隨所

傷物湯下要 煎十 武更 煎散 實散

消食化氣破積聚治心腹脹滿噫醋惡心八仙充方小

京三稜錢 蓬莪茂錢 五靈脂兩 各錢 正

烏梅陸拾枚 和枝用去 縮砂壹佰枚 乾漆半兩 炒

巴豆肆拾粒去皮不出油研

木香壹兩

右八味攪雜為末用酸粟米飯三兩匙再入白杵五

七百下丸如菜豆大每服五丸至七丸生薑湯下小

兒一丸如要宣轉十五丸更量虛實加減

取積聚消宿食積榔丸方大食好生薑湯下短期阻

檳榔兩枚生卸煮酸巴豆去皮壹兩末同研蘇凌酥

青橘皮湯中兩乾漆炒壹分硃砂研壹兩用炭

大黃濕紙末乾漆炒壹分硃砂研壹兩用炭

右七味攪研羅為末湯浸蒸餅丸如棗豆大以丹砂

為衣每服一九二丸溫水下如要宣轉取食積三五

丸或七九十九丸量虛實空心煎葱白湯下宜後服和

氣人參湯白粉去

和氣人參湯方

人參 白茯苓去黑皮厚朴去蘆皮生炙

甘草炙肉豆蔻去殼陳橘皮去白

藜香子炒木香壹兩白朮壹兩

桂去蘆皮

右一十味為麤末每服二錢匕水一盞生薑三片

棗一枚擘同煎至七分去滓溫服

治脾胃虛冷積聚沉結宿食不消益智散方

益智去皮

蓬莪茂剉

京三稜剉

青橘皮

陳橘皮味並湯浸去白炒

白茯苓去黑皮

甘草剉各

木香分

厚朴去蘖皮生薑汁炙壹兩壹分

右一十味搗羅為散每服一錢匕入鹽少許沸湯煎

服不拘時候

治久積聚宿滯不消或翻胃吐逆惡心乾噦及脾寒疾等營香者散方

藿香葉

木香

陳橘皮湯浸去白

肉豆蔻去殼

訶梨勒皮

人參宜與

白茯苓去黑皮

甘草炙

草豆蔻去

麥藥炒

陳麴炒各

乾薑炮

高良薑剉炒香

厚朴去蘖皮生薑汁炙壹兩半

右一十四味搗羅為散每服二錢匕水一盞生薑一

塊拍破同煎至七分入鹽一捻熱服水瀉及腸風藏

毒熱陳米飲調下

治諸積宿食不消黑虺丸方

芫花炒

甘遂炒

烏頭炮裂去皮

大戟剉

京三稜剉

牽牛子炒

乾薑炮

陳橘皮去白焙 乾漆貳兩炒

右九味搗雜為末以醋煮麵糊丸如菜豆大每服二  
 丸消食化氣溫水下取積滯米湯下溫病傷寒葶醋  
 湯下氣痛艾湯下本藏氣虛炒檀香子酒下瘧疾桃  
 枝湯下婦人血氣勞氣醋湯下寸白蟲煎牛肉湯下  
 治一切積滯化氣消食補益真氣產後逐敗血補虛損  
 礞砂煎丸方

礞砂揀通明無石者別研如粉

雷歸酒浸壹宿去蘆頭切焙

肉苳蓉酒浸壹宿薄切作片焙乾

巴戟天酒浸壹宿去心焙

檳榔生各壹兩

棟實洗通切破肆兩酒浸壹宿候以刀子刮下瓢去皮核不用貳

檀香子微炒

木香

沉香剉

附子炮裂去皮臍

天雄用酒煮伍柴伯沸候候剉

去皮臍各壹兩

阿魏半兩米醋磨成膏入諸藥

右一十二味搗研為細末以無灰酒煮白麩糊丸如  
 梧桐子大每服三十九空心日午溫酒下嘗有婦人  
 病葶中下痢日久甚困篤百方不差醫曰葶中痢與  
 他痢不同常痢可用苦澀藥止之葶中痢生於血不  
 足投澀藥則血愈不行痢當愈甚產後痢者宜投礞  
 砂丸日三服痢頓減半次日遂愈此藥產後雖無病  
 亦宜服之能養血去積滯  
 治積聚宿食不消腸助堅韌心腹刺痛及諸病礞石丸

方

礞石研半兩 礞砂壹兩米醋 巴豆霜壹兩半

京三稜醋浸壹兩 大黃燬劉壹兩半

木香 檳榔劉 肉豆蔻去核

豬牙皂莢去皮炒 桂去麤 乾薑炮

丁香 芫花醋浸壹兩宿 蓬莪茂燬各壹兩

青橘皮去白 白豆蔻去 墨燒捌分過

胡椒 粉霜研各壹分 白麪貳兩酒

右二十味搗研各為末先以礞砂醋合巴豆煮兩食久投礞石三稜又投酒麪又投大黃相法皆半食久

乃入衆藥燉成稠膏丸如菘豆大每服三丸酒飲下凡堅積飲食所傷皆能愈

治肋下結塊連心腹痛食冷物即劇龍甲散方

龍甲去裙燬 莢藜子炒去角 黃芩去黑心

桂去麤 桔梗炒

人當歸燬 牛膝切燬 芍藥酒洗

赤茯苓去黑皮 大黃劉 人參

陳橘皮湯浸去白 檳榔劉 訶梨勒各壹分

右一十五味搗羅為散每服二錢匕煮棗湯調下

久積癥瘕

論曰癥之爲病雖有形證推之不動癥之爲病僻在脇  
肋按之水鳴此皆飲食留滯所致也不卽治日漸增長  
盤結牢固邪氣日盛令人正氣衰微累歲不已甚則身  
瘦腹大名曰久積癥瘕

治久積癥瘕冷熱不調痰逆痞悶心腹刺痛喘滿膨脹  
泄利羸困不思飲食消積丸方

代赭

煨研

參

礞石

研各

桂

去

去

白茯苓

去

黑

香橘皮

湯

去

巴豆

去

皮

京三稜

煨

棟實肉

各

壩砂

研

參

右九味搗研爲末拌白酒煮麩糊和丸如梧桐子大

每服二九至五九本香湯下看虛實加減

治久積伏滯成塊婦人血癖血塊及產後敗血不行兒  
枕刺痛小兒妳癖常服利胸膈除傷滯比金丸方

沒藥

研

五靈脂

兩

皂莢

去

皮

子

者

去

白丁香

雄

者

礞砂

研

乳香

研

巴豆

壹

佰

粒

去

皮

右七味同研爲細末用大棗十枚去核刮已豆實入

在棗內線纏了慢火炙熟去線搗爛與前項藥末合  
勻和搗成劑丸如棗豆大大人藏府實者五九虛者

三九小兒芥子大一歲三九五七歲以上七九十歲

以上十九取積用燒皂子濃煎湯放冷下利胸膈用  
養一枚爛嚼裹藥乾噤不得嚼藥並臨臥服急患不  
拘時

治久積癰氣心胸不和嘔吐痰逆脇肋脹滿疼痛如神

九方

烏頭去皮

乾漆

乾薑

桂去皮各壹兩

硝砂

巴豆半兩去皮心膜研爲霜

右六味合研令勻取炊聚肉和成塊用濕紙厚裹鹽

泥固濟厚一指許陰三日暴乾地坑子內以火三斤

簇燒候火銷半取出看鞭軟搗細爲丸如小豆大每

服三九至五九木瓜湯下不拘時

治久積令氣攻心腹疼痛痰癖嘔逆腹脹不思飲食肌

膚瘦痺腰膝倦痛下痢洩瀉瘧疾腸風并婦人血海久

冷無子陳橘皮煎丸方

陳橘皮湯浸去白絡拾伍 蜀椒巴戟天 三十丸

石斛根 牛膝酒浸 肉苁蓉酒浸 鹿茸酒炙

杜仲去毛 菟絲子酒浸三月 厚朴去薑汁炙

附子地裂去 吳茱萸乾炒 當歸切

陽起石酒浸 厚朴去薑汁炙



乾薑

京三稜

菓薺

甘草

人參

三稜

右一十七味搗羅爲末先以好酒五椀於銀石器內煎橘皮末令如錫入諸藥攪勻再搗三五百轉稍乾更入酒少許和丸如小豆大每服二十丸至三十九空心溫酒下鹽湯亦得

治藏府久積氣塊冷痞不思飲食沉香三稜煎丸方

沉香

人參

三稜

醋伍升 磁砂參分 細研同入在甕內燒化以銀器內慢火熬成膏

青橘皮 湯浸去白 焙乾 小豆大每

右四味搗羅三味爲末入三稜磁砂煎內和勻成劑如有餘煎更於火上慢熬同搗納千杵丸如梧桐子大每服三寸丸食前米飲下婦人醋湯下日再

治久積癥塊心腹脹滿胸膈不利痰實胃脹磁砂丸方

磁砂

狼毒

芫花

乾漆

龍甲

硫黃

巴豆 貳柒粒去皮心膜以好醋壹升煮令紫色

右七味搗研爲末和勻煮麩糊丸如豌豆大每服三

丸食後臨臥溫生薑湯下

治多年積氣癥癖三稜丸方

京三稜根

雞爪三稜根

陳橘皮湯浸去白焙

青橘皮湯浸去白焙

巴豆去皮心

石三稜根剉各

檳榔拾枚半生用半炮剉

肉豆蔻拾枚去殼醃浸貳宿

丁香

益智去皮各

木香貳

硃砂壹兩半研飛過

右一十二味搗研爲末醋煮麩糊和丸如梧桐子大每服三丸如當心氣塊茱萸湯下左右氣塊木香湯下本藏氣塊懷香子湯下

治久積食癖心腹時發疼痛胸膈不快痰逆惡心藏府不調不思飲食或下痢膿血裏急後重散惡氣逐滯結

丁香丸方

丁香

木香

桂去毒

阿魏麩裏煨去麩研

麝香研

硫黃研

水銀貳味於盞內結成沙子

硃砂研飛過

粉霜研

胡粉研各壹分

巴豆去皮心膜研取霜肆錢

右一十一味搗羅三味爲末與八味合研勻細用安息香半兩酒化濾過入蜜少許重湯同熬和劑旋丸如梧桐子大每服三丸至五丸臨臥煎生薑棗湯下更看虛實加減取下積聚惡物爲効

治男子婦人遠年積氣消磨癥塊取虛中積礫石丸方

礞石

半兩青色者生用搗羅為細末

礞砂

醋浸澄去沙石

丁香

桂皮

乾薑

炮各兩

木香

京二稜

蓬莪茂

炮

羌花

醋浸炒焦

豬牙皂荚

去皮槓榔煨剉

肉豆蔻人

各壹兩

白豆蔻人

青橘皮

湯浸去白皴

墨燒

捌分熟

巴豆

壹兩半去皮膜出油盡

大黃

壹兩半兩生用半兩煨熟半兩炒焦

胡椒

粉霜

細研各壹分

右一寸九味各搗研為末用醋三升飛礞砂於銀石

器中文武火熬二十沸次入巴豆又熬五七沸次入

礞石京三稜末又熬三五沸次取白麩二兩以無灰

酒半升調入藥中又熬一兩沸次入大黃末又熬三

兩沸次下諸藥末不住用柳木杖子攪勻候稠搗千

杵丸如菜豆大每服三丸不問男女長幼心膈醋湯

下左脇下疼煎薑棗湯下右脇下疼煎木香湯下婦

人血癖血氣炒生薑醋湯下久患冷痢煎黃連湯下

小兒常服冷水下有疳者不得服小兒以意減丸數

治久虛積癥癖水銀丸方

水銀香末

玻璃

礞石末

滴酒和勻

火逼乾

京三稜末

石三稜末

末入瓷

雞爪三稜末 膩粉蘇末

粉霜蘇末

白丁香末 礪砂研各參錢

麝香蘇末 豆蔻蘇末

檳榔各貳枚 丹參參錢

右共十三味合研勻細用棗肉和丸如菉豆大每服

五丸溫水下又一方治丈夫病及穠香補骨脂各十

分治婦人病入血竭沒藥各五分蘇木香豸可散

治遠年癥塊積聚香丸方不問男女長幼心脈諸患

酒水香不帶藥末礪砂研木林當歸切砂研附子

礪砂石研參中 大黃煨 陳麴研 又漆三

麴麥炒 蘇木又墨研 正曲炒 白麵研 以燕水

大戟炒 乾漆炒 膩粉各壹

鼓少 巴豆人壹兩壹分

右一十四味搗研為末以臘月雪水同搗三二百杵

丸如菉豆大每服一丸空心用乾柿爛嚼裹藥隨所

傷物煎湯下不得吐津

治男子婦人久氣塊癥癖兩脇下積冷胸腹氣刺痛紫

金丹方

鐵滓壹斤海 礪砂貳兩 硫黃半斤水

右三味先取鐵滓硫黃二味於瓷器內用米醋一斗

慢火煎候煎硫黃火止無焰即燂乾刮此二味入瓮



方

蓬莪茂兩 炒 壹

理去 壹 分

芍藥

檳榔剉

枳殼去 壹 炒

當歸焙 剉

木香

昆布洗 壹 汁

沉香剉

白芷炒 壹 兩

右一十味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二

十九煨薑木瓜湯下

治五毒五積五勞并一切氣疾癩癧塊及遠年積丁香

丸方

丁香兩

附子炮 裂 壹 皮 壹 兩

馬頭炮 裂 壹 皮 壹 兩

檳榔剉

芫花剉 壹 兩

大戟炒

甘遂炒

紫苑去 壹 土 壹 分

膩粉研 壹 分 半 大茴食

礞砂醋 飛 過 焙 壹 兩

右一十味先將八味搗羅爲細末入研藥和勻麩糊  
丸梧桐子大每服七丸至十九醋湯下

治久積癥癖不散心下結痛狀如伏梁三稜湯方

京三稜炒

鼈甲醋 炙 壹 兩

大腹剉 炒 壹 兩

桂皮壹 兩

芍藥

陳橘皮壹 兩

當歸剉

枳殼壹 兩

高良薑各 壹 分

木香

訶梨勒煨 壹 兩

右一吋一味細剉每服五錢匕水一盞半煎取八分  
去滓溫服

治久癖塊聚心腹脹滿人參丸方

人參

夏參

沙參

丹參

防風去

普參

附子

炮裂去皮巴豆去皮心煮研

蜀椒

去目并閉口炒出汗壹合

木乾薑炮半

麝香

拾

葶藶微炒研

右一十二味搗研爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每食

後米飲下一丸未利再服

治久癖結鞭兩脇臍下堅如石按之痛劇食飲不下籠

甲丸方

木龍甲

去裙爛醋炙貳兩

牛膝酒浸切焙

芎藭煎並藥

防葵

當歸切

乾薑炮

桂去

皮

附子炮裂去皮

甘草炙各壹兩

巴豆

貳枚去皮心膜研 大黃剉炒壹兩半

右一吋一味搗羅爲末鍊蜜和丸梧桐子大每服空

心溫酒下三九加至五九日三服以利爲度

治久積癖癥龍甲丸方

龍甲

大者壹枚淨洗去筋膜麩裏外面貳參分厚上面用紙固滿泥壹風爐子安龍甲在上面

別入挑人半斤去尖皮雙入研以米醋肆升無灰酒參升研砂參兩同攪拌旋入向籠甲中煎為膏取出用合盛却將籠甲去紙泥炙令黃色

青橘皮去白 麥蘖炒 沉香剉

肉豆蔻去殼各兩 丁香各兩 木香干大段

檳榔壹半 陳麴炒 京三稜煨

大黃生 厚朴去蘊皮生薑汁炒

芫胡半斤 桂去蘊皮

右一十四味壽羅為末再研令勻用桃人煎並熟蜜和丸如梧桐子大空心米飲下二十丸

治食癥

論曰脾胃虛弱飲食累傷積久不去結在腹內與正氣交爭則心腹鞅痛妨害飲食肢體消瘦以手按之積塊有形謂之食癥

治食癥氣檳榔丸方

檳榔煨剉 木香剉 郁李人去皮

芫胡去苗 大黃兩半 枳殼煨炒

桂去蘊 訶梨勒煨去核 乾薑炮半

草豆蔻去皮

右一十味搗羅丸味為末入郁李人同研令勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸空心溫酒下日晚再



服

治食癥噯酸吐津胸膈疼痛氣噎食飲進退麥蘖湯方

麥蘖炒

陳麩炒

厚朴去黑皮生升薑炙

檳榔剉

紫苑去苗土

鼈甲去裙襴醋炙

當歸切焙

大黃剉炒各半兩

右八味廩搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓溫服空心午時臨卧各一

治食癥冷氣及傷寒後一切氣疾食物不消木香散方

木香

檳榔剉

青橘皮湯浸去白焙

肉豆蔻去殼

食茱萸

紅豆蔻去皮

乾薑炮

白朮

葛根剉

草豆蔻去殼

虎杖

麻黃節去根

厚朴去麩皮生薑汁炙

桔梗炒

白豆蔻去殼

羌活去蘆頭

人參

苜蓿

右一十八味等分搗羅爲細散每服三錢匕空心炒

薑鹽湯調下

治食癥氣五通丸方

乾薑炮

巴豆半分去皮心膜醋煮

陳橘皮湯浸去白焙

黃連去須

白朮各壹分

右五味搗羅四味爲末與巴豆同研令勻煮麩糊和

丸如梧桐子大每服一九空心鹽湯下加至兩丸茶清下亦得如有滯積生薑橘皮湯下要轉冷茶下五丸熱茶投之

治食癥氣聚不消萬金丸方

檳榔

肉豆蔻

香橘皮

乾薑

木香

巴豆

研如膏

右六味搗羅五味為末入巴豆同研令勻浸研鹽破和丸如梧桐子大每服一二丸煎生薑橘皮湯下良久以粥飲投之以利為度

治食癥瘕癖聚血結刺痛一切疾黑金丸方

沉香

附子

木香

青橘皮

乾薑

細墨

京三稜

蓬莪茂

桂

大黃

乾漆

麝香

硃砂

大黃

石一十三味各搗研為末將京三稜蓬莪茂大黃硃砂四味用米醋煮爛研作糊入眾藥末和丸如梧桐子大每服十九至十五丸薑湯下不拘時

治食癥積氣成塊胸膈痞悶腹脹滿宿食不消心腹

疼痛不能飲食化積丸方

硝砂無石 羌花炒 巴豆去皮心膜研如膏出油盡

豬牙身去尖炙各參分 羅為末拌和令勻用米醋參升於銀石

器內慢火熬成膏 大黃帶兩蒸

籠甲去襖襖 青橘皮白焙 京三稜煨

當歸焙切 陳麴炒各兩 木香炒

桂去麤皮

右一十四味搗羅八味用前膏和丸如菘豆大每服

二九至三九茶酒任下如取積量虛實加減

治食穢結塊疼痛發歇化氣消滯食硝砂丸方

硝砂細 新漆炒烟出 木香

丁香 蓬莪茂剉 京三稜煨

青橘皮湯浸去白焙 芫花炒各兩 肉豆蔻伍枚大者去殼

巴豆心膜壓出油

石一十味將米醋一碗浸蓬莪茂芫花三稜一宿後

焙乾與五味同搗羅為末入硝砂巴豆拌勻醋煮麩

糊和丸如大麻子大每服三二九如要取轉看虛實

加減生薑湯下婦人血氣醋湯下小兒疳氣甘草湯下男子膈氣龍腦湯下瀉痢乾薑湯下

治食癥氣塊痰癖等疾八靈丸方

京三稜煨

石三稜煨

雞爪三稜煨

木香

檳榔剉各

兩豆蔻去殼

巴豆去皮心膜煎黃出油盡

硃砂研各

右八味搗羅六味爲末入巴豆霜硃砂末拌勻醋煮麩糊和丸如小豆大每服五七丸丈夫生薑湯下婦人醋湯下痰癖氣煎木香湯下

治食癥勞氣五積五膈脾胃久冷喫食無味飲食不化四肢少力痰毒氣脹胸膈不利三稜丸方

京三稜

石三稜

雞爪三稜

黑三稜

蓬莪荑各煨

巴豆連皮

乾薑炮

附子炮裂去皮臍各壹兩以上剉

煮令盡除巴豆不用外並切焙乾

丁香不

木香

桂去

青橘皮去白

檳榔剉

肉豆蔻去殼各

右二十四味搗羅爲末每秤一兩末別用巴豆七枚去皮心膜出油細研拌勻更用硃砂一分醋化煮麩糊和丸如大麻子大丹砂末爲衣每服三九至五九生薑湯下

治遠年食癥積氣并酒食所傷胸膈脹滿及婦人血塊

木香三稜丸方

木香

京三稜

補骨脂

牽牛子

丁香皮

乾漆

陳橘皮

烏梅肉

五靈脂

巴豆霜

靈脂

未用

沉香

右一十一味搗羅九味爲末入二味膏子和丸如棗

豆大每服五丸至七丸食後臨臥生薑湯下

治食癥氣堅腹中疼痛丁香丸方

丁香

乳香

木香

肉豆蔻

當歸

青橘皮

京三稜

紫苑

乾薑

附子

巴豆

龍甲

右一十三味搗羅十味爲末與丹砂巴豆乳香拌勻

又入蕎麥麩一匙旋滴新汲水和搗五千杵衆手丸

如菉豆大每服三丸至五丸先煎漿水令沸入藥煮

少頃漉出暴乾茶酒任下要轉利以冷茶下熱茶投

之

治食癥氣塊心腹脹滿吐逆酸水小三稜煎丸方

京三稜

蓬莖茂各學

光花壹

右三味同入瓷瓶內用米醋五升浸封瓶口以煿火煨微乾取出三稜並蓬莖茂杵碎芫花以餘醋炒微焦同焙乾為末米醋煮麩糊和丸如梧桐子大每服三九至五九生薑鹽湯下婦人醋湯下

諸癥

論曰積氣在腹中久不差牢固推之不移者癥也此由寒溫失宜飲食不節致府藏氣虛弱食飲不消按之其狀如盃盤牢結久不已令人身瘦而腹大至死不消診其脉弦而伏其堅不轉動者死之候也

治諸癥結痛起於脇下按之而堅妨痛不能飲食漸加羸瘦當歸煮散方

當歸切

龜甲用龜板

桂皮去粗皮

木香

枳梗炒

桃人湯浸去皮尖雙入炒別研

如青各壹兩半

吳茱萸

陳者水淘柴編炒乾半兩

右七味除桃人外搗羅為末入桃人同研令勻每服二錢匕水一盞煎至六分去滓溫服逐日空腹日午夜卧各一

治積年癥塊京三稜湯方

京三稜壹兩

青橘皮去白

桂去粗皮

壹分

大黃剉碎炒

木香壹分

檳榔剉半兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓溫服空腹日午夜臥各一

治癥塊衝心氣滿食不下手足煩悶鼈甲丸方

鼈甲

去裙襴醃訶梨勒各貳兩

防葵

甘草錄

人參

大黃剉炒各壹兩半

白朮

桂皮剉半兩

郁李人剉別

杏仁去皮尖雙入熟熱別研如膏各壹兩

右一十味除研外搗羅爲末入郁李人杏仁同研勻鍊蜜丸梧桐子太空腹溫酒下二十九漸加至三十

丸以穀利爲度

治積年癥塊血氣凝滯木香丸方

木香

吳茱萸陳者淘藥

青橘皮

去白焙各半兩巴豆生皮殼搗碎

礞砂

用沸湯化於瓷瓶中用慢火熱水盡收霜再研壹分

右五味除研外搗羅爲末入巴豆礞砂研令勻於煆火中煨粟米飯丸菴豆大每服溫酒下三九至五丸食後服溇利勿怪老小減服

治癥癖腹滿如鼓坐卧不安食即欲吐氣悶喘急核椰

湯方

檳榔 貳兩 微 赤茯苓 去黑皮 芍藥

京三稜 微煨 陳橘皮 湯浸去白

郁李人 湯浸退去皮壹兩 食茱萸 去葉參分

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服空腹午後各一盞未入豆豉每樽令白分

治瘕癖氣脹腹痛脇肋脹滿不思食飲此胡湯方

芫胡 去土白 赤茯苓 去黑皮 桔梗 炒

木通 剉各壹兩 芍藥 龍甲 去裙醋燻

郁李人 湯浸去皮

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服空腹午後各一盞未入豆豉每樽令白分

治瘕癖氣塊脇肋妨滿腹脹不能飲食腹痛防葵丸方

防葵 碎 芫胡 去土 赤茯苓 去黑皮

桂 去粗皮 木香 各半 龍甲 去裙醋燻

檳榔 剉各壹兩 枳梗 炒

郁李人 湯浸去皮尖別 大黃 剉碎微炒

雷歸 焙 京三稜 炒 五味子 各半

右一十三味除研外搗羅爲末入郁李人同研勻鍊

蜜丸梧桐子大空腹溫酒下二十丸

治瘕癖食氣食勞五膈痰澁夾食丸方



乳香

別研如粉

木香

丁香

肉豆蔻

法

當歸

焙

青橘皮

去白

京三稜

炮裂各

紫苑

去苗

乾薑

炮

附子

炮裂去

巴豆

去皮心別研紙裏壓出油各壹兩

龍甲

去帶用醋

煎

黃色

丹砂

壹分別研如粉

右一十三味除乳香丹砂巴豆外搗羅爲末然後入

乳香等三味同研令勻都入臼中用蕎麥麩與藥末

臨時以意看多少入麩攪徐徐入新汲水搗候可丸

卽止丸如菉豆大煎淡漿水令沸旋旋入藥煮三五

沸漉出於日中暴乾每服五丸食後用茶酒溫水下

治癥瘕氣塊龍甲丸方

龍甲

去帶用醋煎黃色

馬頭

炮裂去

此胡

壹兩

末京三稜

炮

當歸

切空心食海

桂

去鹽

厚朴

去鹽皮塗生薑汁炙令微煙出刺

陳橘皮

湯浸去白

甘草

炙

檳榔

剉各

大黃

剉碎

朴消

研如粉

右一十三味除朴消外搗羅爲末同研令勻鍊蜜丸

梧桐子大空腹用溫酒下十九飲下亦得

治癥塊粉砂餅方

粉霜

胡粉

粉砂

丹砂

白丁香

膩粉各半

右六味研為末入麪一兩水和捏作餅如碁子大慢

火燒熟每服一餅麝香米飲費破服衣

治積年血氣癥塊往來疼痛吐逆不納飲食保命丸方

當歸切

烏頭炮裂去

芍藥

桂皮去

乾薑炮

天黃剉炒

斑貓令

黃色為度去翅足

右七味搗羅為末醋煮麵糊丸梧桐子大空心食前

溫酒下一丸不香

治虛積食氣蠱脹水氣年深癥癖五食丸方

大戟刮去

甘遂各半

豬牙皂莢生去皮

胡椒分

芫花半兩

巴豆半兩

出明

梔花半兩

豆半兩

右六味搗研為末合研勻水煮麵糊和丸如菜豆大  
每服五丸用米麵菜豆肉煎湯放溫下量病人大小

加至七丸

治癥塊氣積下結胸一切積滯半夏礞石丸方

半夏剉

巴豆剉

杏仁去皮尖雙

豬牙皂莢

取出以布絞取汁熬成膏入衆藥

礞石研細抄

丁香

木香

蜜丸梧桐子大常服滋薑湯下一丸如取轉量藏府

虛實加減

治癥積五積食氣諸藥無効者沒藥丸方

沒藥研碎去心 硫黃研

白丁香生

當歸切焙

羌花醋浸手

硝砂通明研碎去

乳香研碎去心

丹砂研各水

巴豆研碎去

治癥積五積食氣諸藥無効者沒藥丸方

右九味搗研為末合研勻用水浸炊餅和劑搗一平

杵丸梧桐子菜豆麻子三等丸每服一丸婦人血氣

童子小便和酒下心頭高硬當歸酒下連年癥積五

大積食氣生薑湯下小兒脾積癖氣臘茶清下大人與

大丸十五以下與中等十歲以下與第二等者服

治積聚癥塊及涎積等積隨子丸方

續隨子去皮 膩粉研

青黛炒 鹽研

右三味先研續隨子令爛次下二味合研勻細以燒

糯米饅飯和丸如雞頭大每服先燒入聚一枚剝去

皮核爛嚼取藥一丸椎破并棗同用冷臘茶清下服

後便臥並不按攪至中夜後取下積聚惡物為効

破癥塊消積氣乾漆丸方

乾漆肆兩搗為末

五靈脂用瓶子盛

以火煨煙盡

取灰時兩  
皂莢長伍寸許到以麻繩定用泥固濟火煨煙盡取灰貳兩

藜香子炒令香

木香雞骨者 檳榔結實者

種去塵皮

附子炮裂去皮膽 青橘皮去白

陳橘皮炒去白

白牽牛炒令香熟 大黃劈開炒

蓬莪茂炮

京三稜用醋紙裏煨 羌花炒 麝香用各

兩

右一十五味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大生薑湯下二十九至三十九忌豬魚燕麪等物

大德重校聖濟總錄卷第七十二

大德重校聖濟總錄卷第七十三

積聚門

結積

疰氣

癰氣

寒癰

酒癰

癰癰不能食

結瘕黃連湯下最急小則不麻大則

論曰結瘕者積聚之類也結伏聚積久不散謂之結浮流腹內按抑有形謂之瘕結之證形體瘦瘁食不作肌膚遇陰寒冷濕之氣則發而腹脇塊鞭隱隱然痛者是也瘕之證腹中氣痛動轉橫連脇下有如癖氣遇脾胃有冷陽氣不足而發動者是也

治結瘕癰實腹滿如鼓食即欲吐喘息急其脉弦而緊防已散方

防已煮 一 調梨勒煨去核 郁李人湯退皮

白朮煮 檳榔剉各壹兩半 吳茱萸陳者海漆

右六味除郁李人外搗羅爲散入郁李人同研令勻  
每服三錢匕水一盞煎至六分和滓空心溫服

治結瘕脉弦腹滿坐臥不安食卽欲吐喘急檳榔湯方

檳榔白者剉

赤茯苓去黑皮

芍藥其根近而栗

陳橘皮湯浸去

吳茱萸陳者淘 郁李人湯退去皮

訶梨勒煨去核

京三稜剉

桑根白皮剉

右九味搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服食前後各一服若服後煩利卽減檳榔郁李

人

治結瘕氣積腹滿如石氣急少臥小便不利防已湯方

防已去心 白朮剉 芍藥去皮 郁李人去皮

木通剉 吳茱萸陳者淘

陳橘皮湯浸去 當歸切 赤茯苓去黑皮

右八味搗篩爲散每服三錢匕水一盞生薑半分煎

至六分去滓空心溫服

治結瘕喘嗽腹中疴痛飲食減少四肢乏力防葵丸方

防葵參 桂心半 木香半

吳茱萸半 獨活半 乾姜半 附子半 羌活半 獨活半 羌活半 獨活半

桔梗參 瓜蒂參 瓜蒂參 瓜蒂參 瓜蒂參

當歸半 微炒 京三稜參 微炒 赤芍藥參

五味子兩半

檳榔壹兩

郁李人壹兩湯洗

去皮微炒

右一寸三味搗羅為細末鍊蜜和搗三百杵丸如

梧桐子大每服二十九溫酒下

治結瘕久不差令人不思飲食羸瘦少力芎藭散方

芎藭壹兩

桂心壹兩

川大黃貳兩切

軍籠甲貳兩塗醋炙

京三稜壹兩微

檳榔壹兩

右六味搗篩為散每服三錢匕水一盞生薑半分煎

拍破同煎至七分去滓溫服空心日午夜臥各服

治結瘕氣塊飲食不消肺積氣發心胸痰逆氣喘卒中

風毒脚氣大腸秘澀奔豚氣痛羌活湯方

羌活去蘆

桂皮壹兩

芎藭

木香

檳榔壹兩

郁李人湯洗去皮

兩

大黃貳兩

右七味除郁李人外搗羅為末與郁李人研勻鍊蜜

和丸如梧桐子大每服二十九空腹煎生薑湯或薑

棗湯下氣痛溫酒下

治結瘕腹脹堅鞭如石肚上青筋浮起紫葛丸方

紫葛壹兩

芍藥壹兩

檳榔壹兩

紫菀去苗

赤香

訶梨勒皮各分

大黃剉熬壹兩半

牽牛子半兩半

生半炒

郁李人湯浸去皮

研壹兩

右九味搗研爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸空腹煎木通及薑湯下老幼量減丸數

治結瘕腹脹堅鞭不消木通湯方

木通剉

赤茯苓去黑皮壹兩

赤芍藥壹兩

檳榔白者煨壹枚

薑壹兩

吳茱萸湯洗焙炒各參分

郁李人去皮尖炒各半兩

檳榔白者煨壹枚

薑壹兩

紫苑去苗土

郁李人去皮尖炒各半兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎取七分空

腹服日再

治積聚氣塊癰瘕乾柿丸方

兩砂研

砒霜壹兩

粉霜壹兩

黃連去須各壹分

乾漆燒烟出

籠甲去穢補

黃連去須各壹分

杏仁去皮尖雙

旋復花炒

京三稜炮各半兩

杏仁去皮尖雙

杏仁去皮尖雙

乾薑炮各壹兩

皂莢肆挺不帥者去皮酥炙

巴豆肆拾粒去油去

右十二味各研搗爲細末先將乾漆籠甲京三稜

三味末用粟米半盞不淘洗以醪醋五升同熬成粥

入衆藥拌和丸如豌豆大每服三九爛嚼乾柿裹藥

臨臥溫水下

石遠年虛實積聚瘕塊木香湯方



木香

兩

海馬子

壹對雌雄者雌者黃色雄者青色

大黃

炒

青橘皮

湯浸去白

牽牛炒各兩

巴豆

肆拾玖粒

白牽牛

炒各

兩

右六味以童子小便浸青橘皮裏巴豆以線繫定入小便內再浸七日取出麩炒黃去巴豆只使青橘皮并餘藥羅搗篩每服二錢匕水一盞煎三五沸去滓臨臥溫服

治結瘕積聚血結刺痛木香煎丸方

木香

兩

巴豆

去皮心膜不

出油細研

大黃

炒

京三稜

生

筒子乾漆

碎炒

青橘皮

湯浸去

蓬莪菹

剉

附子

炮裂去

桂皮

去

乾薑

炮裂各

墨

壹指

硝砂

半兩好醋

砂

石

右一十二味各研搗為細末先將大黃京三稜巴豆等三味同於銀石器內用醋一升煎一二沸次入硝砂同熬成膏次入諸藥末和勻再入白粉于下花如菘豆大每服五丸傷冷食冷酒冷水不消結聚成氣塊痛者乾薑湯或橘皮湯下冷麩黏食不消者煮麩湯下牛羊髓肉等不消各以本肉煎淡汁下宿酒不消溫酒下婦人諸血氣當歸酒下妊娠不可服欲宜

轉者茶下七九小兒三九調服不致效不可服也宜

疝氣半蠶肉管不節各以木肉煎藥不可密小

論曰疝氣謂臍腹左右緊鞭而痛橫連如臂取象如弓

弦之急故謂之疝氣蓋因寒濕失宜房室過度真陽虛

億陰冷內生所以水飲入於胃而不能銷鑠流於臍下

經久不去遂成痼疾若遇陰寒或食冷物則作痛久則

不能飲食肌膚消瘦此症未決詳大黃東三熱巴豆

治疝氣急痛日漸黃瘦大黃湯方

大黃炒

芍藥各二

桂去

龍甲各二兩半

甘草炙

訶梨勒微煨 防葵各壹

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

下朴消一字攪勻溫服空心日晚各一以利下爛肉

血為驗

治疝氣口吐酸水醋心常似有物在胸膈間牽牛子丸

方

牽牛子生搗羅為末以生薑汁 礪砂湯中慢火熬

桃人湯退去皮尖雙入

附子炮裂去

檳榔煨

人參

乾薑炮

木香

丁香各參

右九味除煎研外搗羅為末入硃砂桃人研令勻同入牽牛子煎中和投丸如梧桐子大每日空心食後煎生薑湯下一十九漸加至二十九以利下積滯物為度

治疝氣胸臆多滿大腸常澀訶梨勒丸方

訶梨勒根去核 大黃炒 芍藥

防葵 桂皮去鹽 甘草炙

烏梅各壹兩 鼈甲去醋兩

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大空腹煎生薑湯下二十九日午臨臥再服

治疝氣急痛嘔吐酸水食物多噎枳殼丸方

枳殼去瓤炒 木香

薏苡人 黃連去 大黃炒

人參 白茯苓去 附子炮裂去

蠶實炒 郁李人研各壹兩

右一十味除薏苡研外搗羅為末入郁李人同研勻入枳殼煎中和投如鞭入少鍊熟蜜丸如梧桐子大空

腹煎黃耆湯下二十九日晚再服

治積冷疝氣口吐清水面色萎黃附子丸方

附子炮裂去 草豆蔻去 桂皮去

吳茱萸湯浸焙乾 丁香參

木香參 桃人湯去皮尖雙人

右七味除桃人外搗羅為末入桃人同研勻別搗羅

麴末煮糊和丸如梧桐子大每服三十丸空腹煎生

薑橘皮湯下日晚再服

治疝氣墮痛吐酸水大便不通大黃丸方

大黃貳兩搗羅為末以酒 檳榔煨如

丁香各參 訶梨勒煨去 桂皮參

木香各壹 木香參

右六味除煎外搗羅為末入大黃煎中和按丸如梧

桐子大每服食後臨臥溫酒下二十九漸加至三十

丸

治疝氣急痛多吐苦水日夜發歇無常木香丸方

木香 乾薑炮各 烏頭炮裂去皮

桂去麤皮

右四味搗羅為末用米醋三升慢火煎如稀糊和藥

末杵丸如梧桐子大每服一十五丸空腹煎生薑湯

下日晚再服

治疝氣上攻心脾注痛嘔吐酸水醋心烏頭丸方

烏頭生用去脂 附子生用去 乾薑生用各壹兩

為末 阿魏研末入前參味末中研勻別取生地黃汁肆升用銅銀器

中慢火煎成膏 木香 肉豆蔻去殼

龍膽去土 乾椿葉各分 當歸切焙壹兩半

桂去麤皮壹兩

右一十味將木香等六味搗羅為末入前煎中和為劑再入白搗勻熟鞭即入少蜜丸如梧桐子大每服空腹用溫水下二十九日三若心脾有痛溫水調蛤粉湯下

治痰氣心痛巴豆丸方

巴豆參枚去皮心膜炒黃研 杏仁柒枚去皮炒黃研

大黃壹兩剉炒搗末

右三味同研令勻鍊蜜和丸如梧桐子大每日空心

溫酒下兩丸

治痰氣甘遂丸方

甘遂微炒黃色 芫花醋炒黃色 桃人湯去皮尖雙炒黃別研

青蘗切末入 芫胡去

蜀椒去閉口及目炒出汗 吳茱萸湯淘柒遍焙乾炒

厚朴去麤皮薑汁炙 桂去麤皮各壹兩

右一十味除桃人外搗羅為末入桃人搗令勻鍊蜜和丸如梧桐子大每日空腹煎生薑湯下十九日二

治痲氣成塊在臍兩邊疼甘草丸方卷下十次廿二

甘草炙桂皮去粗皮末入盧食研令鹽蜜

蜀椒去目及閉豉微炒木香入

栝子人口蕪蔑各壹兩

右八味除盧會外搗羅為末入盧會研令勻鍊蜜和

丸如梧桐子大每食後臨卧用溫酒下二十丸漸加

至三十九

治痲痺氣塊龍甲丸方

龍甲醋炙去裙乾薑炮大黃炒丹日空心

礞砂去砂石各附子炮裂去檳榔剉

桂去風乾漆炒出京三稜煨

木香剉刺梨勒皮水銀與諸藥末同

墨隨兩

右一十三味搗研為末用麴末三兩濃醋二升同煎

成膏和上件藥丸如梧桐子大每服七丸加至十九

不拘時候日三丈夫溫酒下婦人醋湯下不嚼破取

下血塊如雞肝色是効

治痲癬氣及兩脇積聚并婦人血刺疼痛檳榔煎丸方

檳榔參兩剉搗為末吳茱萸為末醋煮

京三稜為末醋半硫黃剉碎

巴豆各壹兩去皮以絹袋子盛用水伍升與硫黃同煮及壹升將硫黃與巴豆同研

木香

白豆蔻皮法

肉豆蔻去漆法

桂皮去漆

陳橘皮湯浸去青橘皮白湯浸法

高良薑

草撥

訶梨勒皮

白朮各壹兩

胡椒炒

雷歸切下管翅更

乾漆炒煙出各半兩

草豆蔻去皮去漆法

右一十九味搗羅爲末與前三味膏同搜丸如菉豆

大每服生薑湯下三五丸食後服

治痲痺氣塊冷物所傷消積丸方

本藥研各壹兩與前藥大同

代赭

火燒爛碎參柴偏研

青礞石研末各壹兩

桂皮去漆

白茯苓去黑皮

青橘皮湯浸去白焙

巴豆去皮出油各半兩

京三稜炮

棟實各壹分

硃砂參分取霜

右九味研杵爲末拌合勻酒煮麩糊和丸如梧桐子

大每服一九至二丸木香湯下量虛實加減

治五積痲痺氣塊三稜丸方

雞爪三稜

石三稜

京三稜煨

木香

青橘皮湯浸去白焙各半兩

檳榔剉

肉豆蔻去漆各壹分

右八味搗羅爲末用生薑汁麩糊和丸如菉豆大每

服十五丸空心臨臥生薑湯下

治丈夫婦人痰癖氣一切積滯京三稜丸方

京三稜堆

芫花各參兩貳味醋浸五七日炒黃

蓬莪茂炒

桂去蟲皮各壹兩 附子炮裂去皮臍壹兩半

乳香研

硃砂細研各壹分

巴豆參拾箇用大黃壹皂子大

研細醋兩盞煎令醋盡為度只用巴豆

右八味搗研令勻每用藥末二兩鑿黃蠟一兩蜜少

許同和丸如梧桐子大丹砂為衣生薑木瓜湯下二

丸至三九甘草生薑湯下亦得看虛實臨時用

治痰癖結塊面黃肌瘦心腹引痛不欲飲食宿滯冷痰

二香三稜丸方

丁香

木香各壹兩

京三稜壹兩

雞爪三稜

石三稜各壹兩

硃砂研

牽牛子炒

天黃炮

蓬莪茂炮各半兩

檳榔剉壹兩

巴豆伍拾箇去皮心出油半身細研

烏梅肉特乾貳兩

右一十二味搗研為末再研勻酒煮麩糊和丸如棗

豆大每服五丸至七丸陳橘皮湯下食後服

治痰氣急痛腹脹胃管不下食緩中湯方

乾薑炮

檳榔

甘草炙各壹兩

鼈甲去裙襖醋炙

附子炮裂去皮臍

芍藥炒



陳橘皮湯浸去白焙 厚朴去鹽皮生 人參

枳殼去瓤炒 桂皮去鹽 半夏湯洗去屑米

右一十二味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半生薑

五片煎取八分去滓溫服

治疰氣胃中寒癖不思食肉豆蔻散方按時味成散

肉豆蔻人 枳殼去瓤炒 蕪荑炒 瓜

吳茱萸湯洗 木香各半 高良薑壹

生薑并皮用

右七味剉如麻豆拌勻麩裏煨令香熟去麩取藥搗

羅為散每服二錢匕冷生薑茶清調下一錢

治積冷疰氣口吐清水面色萎黃白朮丸方

白朮 蓬莖茂 木瓜切 長

桂皮去 陳麩炒 木香去 入

蕪荑炒 薑屑各半 北亭湯研濾清入

益智各半

右一十味搗羅九味為末用北亭膏摻和丸如梧桐

子大每服二十九炒生薑鹽湯下

治疰癖積聚腹脹氣逆煩滿嘔逆大通散方按時用

沉香剉 木香 白朮

陳橘皮湯浸去白焙 桑根白皮剉 木通剉 各

胡椒壹錢

黑牽牛參兩半生半炒搗取粉壹兩半餘者不用

右八味除牽牛外別搗羅爲細散每服一錢匕入牽牛末一錢七五更初以沸湯點臘茶調熱服却臥不住以熱茶及熱粥投取利爲効少壯多用牽牛少用藥末老弱多用藥末少用牽牛

癖氣

論曰癖氣者聚於兩脇間有時而痛是也以其癖在肋下故名癖氣又云飲水過多或臥覺飲水復臥久皆成癖此由氣脉不宜水飲停積寒氣加之故爲是病治癖氣脇肋妨滿腹脹痛不思食防葵丸

防葵

芫胡註

赤芍藥各參

枳去毒

木香

當歸切

五味子

各半兩

龍甲

生研兩

桔梗

炒壹兩

大黃

蒸參兩到壹分

京三稜

細切

郁李人

去皮

檳榔

煨剉壹兩半

右一十三味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九空心溫酒下

治癖氣腹痛兩脇脹滿不思飲食芫胡飲方

芫胡註

赤茯苓

去黑皮

赤芍藥

龍甲

去毒

郁李人

去皮

桔梗炒

木通剉炒各壹兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服日再

治癖氣在脇下痛久不去京三稜散方

京三稜煨剉半斤 枳殼去瓢麩炒壹兩 甘草炙剉參兩

右三味搗羅為散每服三錢匕入鹽半字沸湯點服

空心食前

治癖氣疼痛腹脇脹滿發歇不定可思飲食礪砂丸方

礪砂醋壹盞化盡熬成膏 芫花醋拌炒乾 乾薑炮

京三稜剉碎醋浸三宿焙乾各半兩

右四味除礪砂外搗羅為末入礪砂醋膏內和丸如

菘菜豆大每服十丸生薑橘皮湯下不計時候

治食氣癖塊胸膈噎塞冷氣攻刺吐酸水不美飲食腹

脇脹痛氣不升降三稜丸方

京三稜炮 芍藥剉 枳殼炒 吳茱萸湯浸焙乾炒

烏頭炮裂去皮 大黃煨 訶梨勒煨去核

龍甲去裙襴醋炙壹兩半 桃人湯浸去皮尖雙

右一十一味搗羅為末酒煮麩糊為丸如梧桐子大

每服十五丸炒橘皮鹽湯下如酒食所傷胸膈不快

腹脹醋心熟水下及鹽豉不咸酢食氣甜醜不封

治積年瘕氣及氣塊上攻心腹龍甲丸方取餅干大

龍甲去裙襖醋乾薑兩地手抄兩京三稜地兩

青橘皮湯浸去白黃巴豆去皮心膜研

青壹分壹吳茱萸湯浸

右五味除巴豆外搗羅為末入巴豆膏和丸如菽豆

大每服三五丸至五丸生薑湯下空心食前

治瘕氣塊聚心胸痛食不消婦人帶下淋瀝羸瘦困怠

無力溫白丸方十丸紫苑去毛貓人與茱萸乾炒

烏頭炮裂法紫苑去毛貓人與茱萸乾炒

菖蒲去心胡去厚朴去

桔梗去皂莢去赤茯苓去

乾薑去黃連去蜀椒去

人參去巴豆去

右二十四味等分除巴豆外搗羅為末入巴豆研勻

白蜜和膏杵干下龙如梧桐子大每服三丸不利漸

加至七九十五日後下惡膿血如雞肝谷許海露末

治瘕氣積氣血結刺疼木香確砂煎丸方

木香去確砂去

巴豆去大黃去京三稜去

乾漆炒煙 青橘皮浸去 蓬莪炭炒

附子炮裂去 卷去 乾薑炒

墨一指節 大研

右一十二味將大黃京三稜巴豆三味各搗研爲末  
同於銀石器內以醋一升煎一兩沸次入礞石同熬  
成膏次將諸藥搗羅爲末用膏和成劑杵干下爲丸  
如藁豆大每服五丸炒生薑湯下結聚腹內氣塊痛  
乾薑湯或橘皮湯下食冷麪黏食不消成塊聚者麵  
湯下食牛羊豕肉成氣塊不散各用本肉淡汁下宿  
酒不消溫酒下婦人諸般血氣當歸酒下妊娠不得

服如要宜轉茶清下加至七丸小兒三丸

治虛積導滯氣消癥塊如意丸方

礞石拾貳塊 巴豆參拾陸 大蘘拾貳枚

各入巴豆肉參攷礞石塊各用濕紙裹兩重  
火內煨焦候有煙取出去紙於地上以蓋子合定  
帝宿出水毒其餘棄  
并巴豆礞石並生用

膩粉鹽

白丁香捌拾肆箇

右五味將已去核棗六枚水煮熟同搗納餘藥成膏

丸如萊豆大每服五丸煎生薑湯下小兒二丸至三

丸煎皂子湯下臨臥服

治癩氣結鞭不消胸脇脹悶消癧丸方

巴豆去皮心研壓去油別研盡令

硃砂酒煮盡化盡慢火熬成膏

兩半 豬牙皂莢去皮酥炙肆兩

右三味先將皂莢搗羅爲末入巴豆研勻用硃砂膏

和丸如菜豆大每服一九食後臨臥粥飲下

治丈夫婦人腹內癖氣郁李人丸方

郁李人皮 京三稜

芫花

蓬莪茂剉 木香各壹兩

右五味用醋一升同煮醋盡焙乾搗羅爲末麵糊丸

如菜豆大每服三五丸生薑湯下日三

治男子婦人小兒虛中癖氣藏府不調食飲不消久致

瘦弱不可取轉者服之自然好安又治虛氣膨脹心胸

悶滯并婦人產後血積羸勞瘦瘁甚者龍甲三稜丸方

龍甲取助重肆兩以上者水浸洗去春骨襖曬乾爲末

東三稜水浸兩宿剉碎浸 乾漆炒烟出

木香 乾薑 補骨脂

檳榔剉爲末 沒藥 硃砂

墨研各壹分

右一十味搗研爲末再同研勻醋煮麩糊爲丸如菜

豆大每服二十九生薑鹽湯下婦人血病醋湯下

治癖氣鬱歇衝心疼痛不知人蓬莪茂散方

蓬莪茂根剉胡椒分人參附子炮裂去皮

右三味搗羅為散每服半錢七醋湯調下不計時候

治癰氣發歇疼痛不可忍者宜急服應痛方止

桂去粗乾漆炒烟京三稜煨切

雷歸炒切艾葉炒斷續炒

右四味等分搗羅為末醋煮麩糊為丸如梧桐子大

燒紙灰酒下十五丸至二十九神效

治癰積建脾胃消宿滯龍甲去毒大黃丸方

龍甲去毒大黃丸方檳榔甲三錢大

附子炮裂麥藥炒各烏藥酒

訶梨勒煨去木香白朮

桂去粗蓬莪茂炮京三稜炮切各

枳殼炒吳茱萸炒各

右一十四味並搗羅為末後將礞砂三兩細研醋三

升濾去滓將前藥末平分一半入礞砂內攪和於銚

子內煎成膏搜餘藥和丸如梧桐子太空心炒生薑

鹽湯下二十丸

治冷癰醋心嘔逆宿食不消中酒後腹藏雷鳴時發腹

痛一切虛冷等溫胃丸方

吳茱萸湯洗陳翹炒陳橘皮湯浸去

白朮

人參

桂

熟乾地黄

甘草

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大空心飯飲下十九

寒癖

論曰寒癖者有癖積在腸下遇寒即痛是也此由飲冷過度停積不散能使氣道升降胃府和調則飲食消化陳寒癖積亦自去矣

治寒癖積聚巴豆丸方

巴豆

杏仁

妙令懸

桔梗

皂莢

藜蘆

辛

白

右五味除研者外搗羅為末入研藥拌勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服食前米飲下一丸日三服欲利者服二丸

治久寒癖積胸脇痞滿心腹堅鞭短氣嘔逆手足厥冷

腰背引痛吳棗蕪丸方

吳萸

湯洗

附子

炮裂

厚朴

去

白礬

研

人參

半夏

湯洗



乾薑炮各

半斤

右九味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸空心溫酒下

枳實

治寒寒宿癖心腹刺痛痰逆嘔吐飲食不消下利羸瘦

白朮丸方枳實

白朮

吳茱萸湯洗各

枳椇炒

當歸切赤茯苓去

乾薑兩

桂皮去附子炮裂

生乾地黃

細辛去苗

椒去目并閉口

甘草炙到各

各

右一十二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每日

空心溫酒下二十九

治寒癖宿滯食飲不消千金丸方

丹參去蘆頭

乾薑炮

附子炮裂

人參

戎鹽研如粉

半夏湯洗去皮

大黃剉

苦參剉

桂去

石膏剉

巴豆剉

右一十一味搗研為末再同研勻鍊蜜和丸如小豆

大每日食後溫酒下三丸

治寒癖飲食不化心下虛滿如水狀枳實湯方

枳實炒

白朮各壹兩

半夏湯洗去滑暴乾

前胡去蘆頭各貳兩

桂去麩皮

甘草炙剉各壹兩

赤茯苓去黑皮貳兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑一小塊

拍碎同煎至八分去滓溫服空心日午臨臥各一

治寒冷癖積虛中積滯及下痢心腹疼痛木香丸方

木香

硝砂研各半分

附子去皮臍生用

高良薑

胡椒各壹分

硫黃研半

巴豆

貳拾捌粒去皮心膜出抽研

石七味搗研爲末再同研勻用粟米飯和丸如菜豆

大每服五丸煎乾柿湯下臨臥服大每服二十

治寒癖留滯不消葫蘆巴丸方

葫蘆巴

補骨脂各壹分

木香

藜香子炒各壹分

棟實炒壹分

硝砂研壹分

銅綠研壹分

五靈脂研壹分

膩粉研壹分

巴豆參錢去皮心膜不出油研

草烏頭半兩用麩和巴豆同

炒黑

右一十一味搗研爲末用樓葱汁和丸如豌豆大看

虛實炒鹽酒下三五丸空心服

治寒癖積氣疔痛下利大沉香煨薑丸方

沉香

壹兩

硝砂

木香

附子

壹枚炮裂去皮臍

黑三稜

雞爪三稜

京三稜

炮裂各半兩

青橘皮

湯浸去白焙

當歸

切焙各

右九味搗研爲末酒煮麩糊和丸如小櫻桃大每服

用生薑一塊剉作甕子入藥一九以濕紙裹煨令香

熟安地上出去火毒少時細嚼鹽湯下

治寒癖虛冷久積成塊進食化痰解風秘皂莢丸方

皂莢

不艸者去黑皮并子空取

肉荵菜

酒浸壹宿薄切焙乾

右四味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二寸

治寒癖積塊丁香丸方

充溫酒熱水任下空心食前服如關隔服暖藥不得

者服此便通快

治寒癖積塊丁香丸方

丁香

沉香

附子

炮裂去皮臍

硝砂

各半兩

陳麩

末

右五味除硝砂陳麩外搗羅爲末用木瓜一枚大者

破開去瓤入硝砂於木瓜內飯上蒸爛次入諸藥末

都研看鞭鞭次入陳麩末看得所爲丸如梧桐子大

每服五丸茶湯或溫酒嚥下如要踈轉可服十九小

見一

...

治冷痺氣困服熱藥發熱心驚虛悸下冷上熱頭風嘔

逆自末丸方其膏更難醫者不唯更難醫百劑十式小

淋白木與對大人陳橘皮 白白 各各 式式 成成 酥酥 酥酥 干干 大

蜂白芷蜂 人人 麻麻 防風防風 生生 肉肉 附附 土土 吳茱萸吳茱萸 湯湯 洗洗 柴柴 末

法芎藭法 細細 附附 細細 山山 羊羊 葛葛 厚厚 朴朴 去去 露露 皮皮 塗塗 生

桂桂 皮皮 薑薑 乾乾 薑薑 炮

防葵防葵 制制 各各 甘草甘草 炙炙 茯神茯神 木木 炙炙 末末

前前 寒寒 人人 參參 各各 體體 酒酒 去去 末末

右右 卅卅 五五 味味 搗搗 羅羅 爲爲 末末 鍊鍊 蜜蜜 和和 丸丸 如如 梧梧 桐桐 子子 大大 每每 日

空心溫酒下二十九空心溫酒下二十九

一酒癖一酒癖

論曰胃弱之人因飲酒過多酒性熱使渴而引飲遇氣

道否渣酒與飲俱不化停在脇肋結聚成癖其狀按之

有形或按之有聲脇下弦急脹滿或致痛悶肌瘦不能

食但因酒得之故謂之酒癖

治酒癖痰多脇脹氣喘大黃桃人丸方

大黃大黃 炒炒 桃人桃人 去去 皮皮 尖尖 雙雙 芎芎 藭藭

覆橘皮覆橘皮 湯湯 浸浸 去去 蜀椒蜀椒 去去 目目 并并 閉閉 口口 炒

乾薑乾薑 炮炮 高良薑高良薑 小阜小阜 各各 分分

右八味爲細末鍊蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每



右六味搗羅為細末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧相

子大每服三十丸粥飲下日三

又方

川芎壹兩

京三稜壹兩

白木兩

右二味搗羅為末每服二錢蒸白酒調下或水送下

治癖氣在兩胸結聚不散礪砂丸方

礪砂參錢

巴豆拾貳枚 川烏頭兩

羌花半兩

皂莢半兩 黑皮壹兩

五靈脂兩

乾薑炮

京三稜壹兩

右八味搗羅後六味為末入煎二味拌勻再羅每秤

此藥末一兩入去皮心膜油煎黑色巴豆十二枚研

和勻以醋煮麵糊丸如大麻子犬每服五丸加至七

丸茶酒熱水任下

治酒癖至妙通神丸方

乾薑炮

知母兩

烏頭炮裂去皮

巴豆去皮心膜出

油兩

右四味搗羅前三味為末入巴豆同研勻以酒煮麩

糊丸如菉豆大每服七丸加至十九臨卧生薑湯下

治酒癖食積逐痛氣紫金丸方

代赭石末

礪砂末

巴豆霜各壹

木香末

丹砂末各抄 膩粉

礞石末各抄

右七味合研勻細以燒粟米飴爲丸如小豆大每服  
三九至三九冷橘皮湯下

治酒癖脇下脹滿不能飲食枳椇散方

枳椇實

去殼焙乾壹兩 陳麴末半兩

右二味爲細散每服三錢匕葱白湯調下

治宿食酒癖籠甲大黃丸方

籠甲

生末

大黃

生末

吳茱萸末 蘇合末

硝砂

火枯半兩與上參味用米醋  
貳升慢火煎成膏入後藥

京三稜

炮

陳橘皮

湯浸去白焙

木香

去油炒

白朮

肉豆蔻

去殼

枳殼

去油炒

右十味搗羅後六味爲末將煎籠甲煎揆和丸如  
梧桐子大每服二十丸酒飲任下空心服加至三十  
九子相繼服滿三服日水一盞半入土薑半匙

痰癖不能食

中

論曰痰癖不能食者由脾胃虛弱爲寒氣所乘蓋脾胃  
者倉廩之官其氣宣通則能傳化糟粕受納水穀痰癖  
之人本於寒氣久積腹內不能榮養府藏脾胃既弱邪  
氣停滯故但虛滿而不能食也食則脹滿吐酸發熱





木香

兩半

生薑

斤并皮高良薑

右七味搗羅為散和小麥麩裹之以煨灰火煨令麩

黃熟去麩取散每服三錢匕空腹用冷生薑水調下

午後再服

治痰氣胃冷不入飲食木香方一匙半入生薑半棗

木香

蜀椒去閉口炭目

乾薑炮裂各壹兩

白木兩

右三味搗羅為末鑿蠟和丸梧桐子大空心溫酒下

七九

治痰氣積滯不消胸膈痞悶可思飲食京三稜湯方最

大京三稜

木香壹兩甘草壹兩

蓬莪茂壹兩

藿香葉壹兩

烏藥壹兩

檀香子壹兩

赤茯苓去黑皮參分

右八味搗篩每服三錢匕以水一盞煎至七分去

滓食前溫服

治痰癰氣每發疼痛不能飲食白朮湯方

白朮

木香

益智去皮壹兩

京三稜

檳榔壹兩

右五味搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

不計時稍熱服

治痲癬積氣不能飲食及五膈氣婦人血氣木香散方

木香壹分

蓬莪茂

陸兩

京三稜炮

益智貳兩

陳橘皮

肆兩

甘草

炙兩

右六味搗羅為散每服二錢匕入鹽點不計時候

治痲癬急痛不能飲食京三稜丸方

京三稜

伍兩搗末以好醋

蓬莪茂炮

益智去

青橘皮

各參兩

冬用檳榔去

夏用木香各壹兩

右五味內四味搗羅為末以京三稜膏和丸如菜豆

大每服二十九加至三十九生薑湯下食後

治腹內痲癬積聚心胸刺痛面無顏色鼈甲散方

鼈甲

去裙爛

附子

炮裂去

木香

白朮

京三稜炮

檳榔半生半熟

大黃微炒

桂皮

高良薑炒

芎藭各半兩

右一十味搗羅為散每服二錢匕炒生薑湯或炒生

薑酒調下

治痲癬不能食心脇刺痛發作有時并膀胱小腸冷滯

黑神丸方

漆陸兩半生用重湯煮半日令香

陳麩

懷香子各肆兩

木香細切

椒紅

丁香各貳兩

檳榔肆枚制除椒紅外  
伍物皆半生半炒

右七味內六味搗羅為末用漆和丸如彈子大取懷香子末十二兩鋪蓋陰乾并懷香收器中養藥極乾乃去懷香瓷合盛若腎餘氣小腸膀胱疝癖七疝下墜五膈血傷產後諸血漏下赤白並一丸分四服死胎一丸皆綿灰酒化下難產炒葵子四十枚搗碎酒煎濃汁化下一丸諸疾不過三服

大德重校聖濟總錄卷第七十三