

三因極一病證方論卷之八

內所因論

夫臟腑合手足三陰三陽爲十二經各有所主故爲十一官  
心者君主之官神明出焉肺者相傳之官治節出焉肝者將  
軍之官謀慮出焉脾者諫議之官中正出焉腎者作強之官  
伎巧出焉膽者中止之官決斷出焉膻中者臣使之官喜樂  
出焉小腸者受盛之官化物出焉大腸者傳送之官變化出  
焉胃者倉廩之官五味出焉三焦者決瀆之官水道出焉膀  
胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣故五臟爲陰六腑  
爲陽此十二官不得相失者正由陰陽消息盈虛當隨四序  
而調養之不可使其偏勝偏勝則偏復偏復則偏害勝剋流  
變則其病生焉夫陰陽虛實者乃臟腑更相勝復也若其子  
母相感則母虛能令子虛子實能令母實經曰實則瀉其母

虛則補其子如肝實則瀉腎肝虛則補心如白姓足君孰與不足此經之本意也難經則反是反觀金匱之論其得為多肝虛補用酸助用焦苦益用甘味之藥酸入肝焦苦入心甘入脾胃能制腎氣氣微弱則水不行水不行則心火盛心火盛則肺金受制肝氣乃舒肝氣舒則肝病自愈此補子之意也虛肝則用此實則反之子金亦云肝虛當補心心旺則感於肝皆此類也此正本藏十二官冷熱盈虛而為病非外感淫邪及故為督理者之比然內所因惟屬七情交錯愛惡相騰而為病能推而明之此約而不濫學者宜留神焉

內所因治論

論云治傷寒有法醫雜病有方方即義方法即法令外病用法今猶奸邪外擾非刑不除內病用義方猶父子兄弟不足以禮格之而已故內外之治由是而分外邪難辨當以例明

內證易知尺叙方諸文者不可不審

肝膽經虛實寒熱證治

治肝實熱陽氣伏邪脇痛於心悲怒發熱喘逆滿悶

目痛視物不明狂悖非意而言下實危急所依及帶

前胡去油 柴胡

黃芩 升麻

欬仁

決明子名等分

桑皮去毛 細辛去心 梔子仁

右劉散每服四錢水兩盞苦竹葉車前葉各五斤煎至蓋半內藥再煎至八分去滓入芒消壹錢前錢不以

時服

治膽實熱反洒洒惡寒腹中氣滿脇下硬口苦咽乾

頭疼不欲食

半夏洗去心 生地黄五兩 酸棗仁半兩 黃芩壹兩

遠志洗去心 煨茯苓各壹兩 甘草壹兩

右劉散長流水壹斗糯米壹升煮爛眼泔湯二三升過  
澄清每用貳盞抄藥四錢匕薑七片煎七分去滓不以  
時服

**補肝湯**

治肝虛寒兩脇滿筋急不得太息寒熱腹滿不欲飲  
食恒悒不樂四肢冷發搶心腹痛目視眩暈或左脇偏痛  
筋萎胸弱及治婦人小腹痛膝熱消渴瓜甲枯口而青  
山茱萸 甘草 桂心 細辛 茯苓  
桃仁 枳殼 栝子仁 防風 川烏頭 薑  
右劉散每服四大錢水壹斗薑五片棗二枚煎至七分  
去滓空心服

**溫膽湯**

治膽虛寒眩暈足痿指不能搖不能意懼仆目黃  
失精虛勞煩擾因驚膽痛奔氣在胸喘滿浮腫不睡  
半夏 麥門冬 茯苓 枳殼 橘皮 杏仁  
右劉散每服四大錢水壹斗薑五片棗二枚煎至七分  
去滓空心服

甘草 桂心 遠志 黃芩 蓮藕 人參

右烏劉散每服四大錢用長流水壹斗糯米煮如瀉膽  
湯注一方見虛煩新

心小腸經虛寒熱證治

**傷心湯**

治心實熱心下痞滿身重發熱乾嘔不安腹中雷鳴  
淫澀不利水穀不消欲吐不吐煩悶喘急

黃連 半夏 黃芩 甘草 人參

乾薑 兩半

右為劉散每服四大錢水兩盞棗三枚煎七分去滓服  
并治霍亂若寒加附子壹枚炮去皮脂若渴加栝樓根

嘔加橘皮痛加當歸各熱以生薑代乾薑

清脈湯 治小腸實熱身熱手足心熱汗不出心中煩滿結塞

不通口羸身重

柴胡

澤瀉

橘皮

芒消

枳實

黃芩

升麻

旋覆花

生地黃

各等分

右劉散每服四錢水盞半煎七分去滓下芒消再煎熟服不以時

六六六

治心虛寒病苦悸恐不樂心腹痛難以言心寒恍惚喜悲愁恚怒衄血面黃煩悶五心熱渴獨語不竟咽喉痛舌本強冷汗出善忘恐走及治婦人懷妊惡阻吐嘔眩暈四肢怠惰全不納食

白茯苓

人參

前胡

半夏

川芎

橘皮

枳殼

紫蘇

桔梗

甘草

乾薑

當歸

白芍藥

熟地黃

各兩半

右劉散每服四大錢水盞半煎五分去滓下芒消五斤棗一枚煎七分去滓食前服

六六六

治心氣鬱結怔忡昏悶四肢浮腫上氣喘急

大腹皮

香附

白茯苓

桔梗

木通

甘草

川芎

前胡

青橘

枳殼

白朮

細辛

木香

各半

右劉散每服四大錢水一盞薑棗斤棗一枚煎七分去滓食前服

六六六

治小腸虛寒苦頭偏痛耳額疼下痢赤白腸滑腹中疝痛裏急後重

乾薑

當歸

黃蘗

地榆

阿膠

茴香

石榴皮

黃連

右劉散每服四錢水盞半煎七分去滓溫服

脾胃經運實寒熱證治

六六六

治脾實熱病苦足寒胫熱腹脹滿煩擾不得卧舌本強壯重面黃頭痛右脇滿痛偏脹口唇乾裂寒熱如瘧

茯苓

橘皮

草薹

白朮

人參

桂心

白芷

甘草

川芎

半夏

右為劉散每服四大錢水或薑湯七次紫蘇三葉煎七分去滓服欲通利加大黃

餘症不除者于胃中四肢發熱口渴胃滿无汗

厚朴

射干

升麻

茯苓

右為劉散每服四錢水一盞煎七分去滓空心執服

治脾胃虛寒病泄瀉腹滿氣逆嘔吐心煩不得卧腸鳴虛脹飲食不消勞倦虛羸喜噦四肢節冷多卧少起

人參

茯苓

草薹

厚朴

橘皮

白朮

右為劉散每服四錢水一盞煎七分去滓空心服

治胃虛寒脘寒不揚吐泄惡風酒洒惡寒腹中虛鳴寒執如管唇口乾而嘔吐瀉四肢疼痛不思飲食或傷寒濕骨節痛

厚朴

薤香

半夏

茯苓

人參

甘草

附子

橘皮

草薹

白朮

右劉散每服四錢水盞半薑五片棗一枚烏梅半箇煎七分去滓空心服常服溫胃消痰進食不氣鬱寒痰

肺大腸經虛實寒熱證治

治肺實熱肺壅汗出苦露上氣喘逆咳嗽咽中塞如嘔狀短氣密熱或唾膿血

薤苳仁

防己

杏仁

冬瓜子仁

參分

右為劉散每服四錢先以薑葉切半搗水貳盞煎盡半入藥同煎至七分去滓食前服

**寫目湯** 治大腸實熱腹脹不通俠臍痛食不化喘不能久立

口生毒

橘皮 炎竹茹

黃芩

梔子仁

藥皮各半 茯苓

芒消略 生地黄血兩

右為劉散每服四錢水盞半姜棗煎七分空心服

**瀉肺湯** 治肺塞虛逆滿上氣咽中悶塞寒從背起口中如含

冰雪語无音舌本乾燥吐沫唾血不能飲食

欬冬花 桂心各壹 桑白皮破四 人參 紫苑茸

白石英壹 五味子 鍾乳粉各壹 麥門冬去心

右劉散每服四大錢水一盞半薑五片棗二枚粳米壹

撮同煎七分去滓食前服

**瀉腸湯** 治大腸虛寒利下青白腸中雷鳴相逐大便不節小便赤黃氣上衝逆不能久立身腫腹急常膈痛悉主之

酸石榴皮兩 黃連壹 地榆各壹 罌粟殼細切 茯苓各壹

右劉散每服四錢水盞半薑五片烏梅一箇煎七分去

滓空心服

腎膀胱經虛實寒熱證治

**寫目湯** 治腎實熱小腹脹滿四肢正黑耳聾骨熱小便赤黃

腰脊離解及伏水羊

茯苓 黃芩

菖蒲格 玄參

細辛略

大黃水浸 甘草炙 礞石兩

右為劉散每服四錢水一盞煎七分去滓熱服

**瀉肺湯** 治膀胱寒熱腰脊痛閉塞不通舌乾咽腫悉主之

茯苓 梔子仁

知母略 參

生地黄

淡竹葉 各五兩 石膏 八兩 煨

右為劉散每服四錢水盞半煎七分入蜜半匙煎兩沸  
熱服須利加芒消壹錢匕

溫腎丸 治腎虛寒陰痿腰脊痠身重緩弱足腰不可以按語  
音混濁陽氣頓絕

熟乾地黄 續命散 麥門冬 去心 牛膝 酒浸  
五味子 巴戟 去心 甘草 炙 茯苓 去木

乾姜 炮 杜仲 去骨炒 三劑  
右為末每服貳錢溫酒調下空心日三服

續命湯 治膀胱虛冷脚筋急腹痛引腰背不可屈伸耳聾目  
眩脈坐欲倒小便數遺白面黑如炭

黃芪 白茯苓 各直 杜仲 去皮 姜汁  
磁石 煨碎 五味子 各參 白朮 白石英 煨碎

右為劉散每服四錢水盞半煎七分去滓空心溫服

青膾湯 治石腎實熱身熱脊胸引痛足冷小便黃赤如柳  
心主三焦經虛寒寒熱治

子藥汁每欲小便即莖頭痛  
榆白皮 冬葵子 各五兩 石膏 四兩 黃芩 去毛

通草 瞿麥 各參 兩  
右為鹿朮先以水貳盞入車前葉數片煎至壹平入藥  
末四錢再煎七分去滓熱服

獨集湯 治三焦寔熱目兌背急痛腰脇熱脊背連膈中煩悶  
飲食未定頭面汗出閉格不通不吐不下或承逆不續走  
喘不禁或泄瀉溺澁遺癩

地骨皮 半夏 洗 柴胡 去苗 澤瀉 略 茯苓

麥門冬 法甘草 人參 各參



右劉散每服四錢水貳盞姜伍片竹茹煨前七分去滓空心服

**六宗湯**

治右腎虛寒小便數腰脇引痛短氣效滿四肢煩疼耳鳴面黑骨間熱震遺白濁目眩諸虛困乏

鹿茸併塗炙  
去毛

巴戟去心

熟乾地黄酒浸枸杞子

菝葜酒浸

牛膝酒浸附子炮去  
皮

桂心不

山茱萸 白芍藥

防風去叉

甘草

右劉散每服四大錢水盞半姜伍片益火許煎七分去

滓食別服

**安中散**

治三焦虛寒短氣不續腹不安食隨即洞下小便赤濁精洩不禁脚脛酸疼小腹脹滿

熟地黄

巴戟天  
去心

龍骨各  
炙

遠志去心

茯苓各  
兩

天雄炮  
去

五味子

山藥各  
兩半

菝葜酒浸

續斷各  
四蛇床子略炒烏筴子嚼  
碎

右為細末每服二錢匕溫酒調下夫三焦屬精腑精以養身係乎心脾腎三經人多以醉飽心虛而合陰限故此病作唯謹之為得

三焦精府辨正

古人謂左腎為腎藏其腑膀胱右腎為命門其腑三焦三焦者有脂膜如手大正与膀胱相對有三百脉自中出夾脊而上貫于腦所以經云丈夫藏精女子繫胞以理推之三焦當如上說有形可見為長扁鵲乃云三焦有位无形其意以為上中二焦如漚如霧下焦如瀆不可遍見故曰有位無形而王叔和輩失其旨意遽云无狀空有各俾後輩承緣不已且名以召寔无寔奚召果其无形尚何以藏精繫胞為哉其所謂三焦者何也上焦在膻中內應心中焦在中脘內應脾下



佳在臍下即腎間動氣分布一身有上中下之異方人甚寂  
慾相不與則精氣散在三焦榮華百脉及其想念一起慾火  
熾然翕撮三焦精氣流溢並命門輪焉而去故號此府為三  
焦耳孝者不悟可為長太息

痼冷積熱證治

夫以臟腑稟賦不同亦有將理失宜遂致偏冷偏熱故方論  
中有痼冷積熱之說痼冷者中寒也多因其氣既微胃氣不  
寔復啖生冷冰雪之屬致腸胃虛寒陰既停凝陽不能正大  
便洞泄小便頻併鼻多涕涕瀉吐涎沫水穀不化酒酒泚泚  
比皆陽虛陰盛之所為也積熱者臟腑燥也多因精血既衰三  
焦煩壅復餌丹石酒炙之屬致腸胃壅毒陽既熾盛陰不能  
制大便祕澀小便赤淋口苦咽乾涎稠膠液飲食无度揮  
熒熒皆陰虛陽盛之所為也治各有方

固真氣

固真氣服丹田堅筋骨壯陽消陰久寒痼冷補勞傷

虛損治男子腰腎久冷心腹積聚眩暈下冷瘕腹中諸虫失  
精遺濁形癯力弱脚膝疼痛冷風頑痺上氣劬血或逆寒  
熱霍亂轉筋虛滑下利又治痔瘻羸弱生疔下血不止及  
婦人血結寒熱陰蝕

硫黃

硫黃一十斤先飛燒去砂石研為末用鹽合鹽以  
水和赤石脂封固於地內乾地內先雙言

小罐子盛水一夜候反加鹽火一匙候冷取出

右研為細末每一兩用炊餅二兩湯浸搥去水脉為丸

如梧子大每服三十九多至百圓溫米飲下空心服之

又治傷寒陰證身冷脉微手足厥逆或吐或利自汗不

止或小便不禁不拘圓數併服得身熱脉出為度

補虛壯氣

補虛壯氣接腎祛邪益精髓溫脾胃進飲食悅顏色

治真氣虛羸暗腹冷痛肢酸疼腰背拘急脚膝緩弱面

色痿黃目眩耳鳴心怔氣短大便自利小便頻數口乾煩  
渴飲食无味大治婦人崩中帶下參拾陸病小兒驚風及  
一切痼冷風虛寒主之常服育神養氣輕身延年此藥制  
合陰陽功在造化留心服餌百病不生真濟世衛生之寶也  
丁頭代藟石 禹餘糧石 兼餘紫石 此紫石英  
赤石脂 各肆兩

右各為細末並入破合內用赤石脂固口縫以炭一秤  
簇頂煨候火消及七分存三分火取出合子令冷開却  
合先於地上搗一坑深尺餘用厚紙兩重襯定傾藥在  
上以新瓦盆子覆之四畔將黃土漏壅一宿取出再入  
乳香沒藥二兩玉麝脂二兩都為細末一處將前藥合  
和勻再研極細蒸糯米糊和勻杵數千下圓如雞頭大  
每服貳圓或伍圓空心濃煎薑棗湯下忌六辛魚血

治大人小兒臟腑精熱煩躁多渴面熱頭昏唇焦咽  
燥舌腫喉閉目赤鼻衄筋煩結硬口古生瘡瘻突不利涕  
唾稠粘睡臥謔妄及腸胃燥澁便秘結一切風壅

大黃 卷

朴消

耳草 各叁兩

山梔子仁

黃芩

薄荷 各壹連翹

右為末每服二錢水一盞竹葉七片蜜少許同煎七分  
去滓食後服

治風壅

頭目昏痛肩背拘急肢節煩疼熱氣上

衝口苦唇焦咽喉腫痛痰涎壅滯涕唾稠粘心神煩躁眼  
溢睛疼及大小便秘澁

大黃 卷

甘莫 卷

當歸

芍藥

麻黃 去節

荆芥 卷

白朮 壹兩半

右為末每服

錢水一盞生薑薄荷各少許煎七分去

淳溫服小兒豆倉欲發先狂語多渴及驚風積熱可服  
一錢臨卧服如大人五臟壅安欲要瀉轉加至四五錢  
乘熱服

五積證治

五積者五臟之所積皆臟氣不平遇時相逆而成其病如憂  
傷肺二以所勝傳肝遇長真脾王傳剋不行故成肝積名曰  
肥氣肥氣者以其積氣藏於肝木之下猶肥道於山林也失  
志傷腎二以所勝傳心遇秋肺王傳剋不行故成心積名曰  
伏梁伏梁者以其積氣橫繫於脊原也怒則傷肝所以所勝  
傳脾遇冬腎王傳剋不行故成脾積名曰痞氣痞者以積氣痞  
寒中脘也喜則傷心二以所勝傳肺遇春肝王傳剋不行故  
成肺積名曰息賁息賁者以積氣喘息賁益也思則傷脾二  
以所勝傳腎遇夏心王傳剋不行故成腎積名曰奔豚奔豚

者猶水畜奔衝於心火也難經又肥氣成於戊己伏梁成於  
庚辛以至奔豚成於丙丁者正合陰陽施化休王乘剋之大  
義也又論曰病有積有聚有繫有繫氣積者藏病也終始不移聚  
者府病也發无定处展轉痛移為可治繫氣者即宿食也由  
數齋飢之邪從口入更有息積病乃氣息滯滯於脇下非導引  
不行

**肥氣圓**治肝之積在左脇下如覆杯有頭足如龜鑿狀久久  
不愈發欬逆嘔痰壅連歲月不已其脉弦而細

青皮 如實

常歸鬚

蒼朮 枳實 蛇含石

蓬朮 切

三棱 切

鐵石 粉

同入 鹽水 煎 二 升 水

**伏梁圓**治心之積起於臍上土至心大如臂久久不已病煩  
心身躄脚肢皆腫環臍而痛其脉沉而乳

茯苓

厚朴去粗

人參

枳殼去穢

白木

半夏湯洗

三稜慢火煨熟

右等分為末，黃糊丸，梧子、大米飲下二十圓，食前日兩服，作散酒調服，絕勝。

**氣膈**

治脾之積在胃管，覆大如盤，久久不愈，病四肢不收。

黃連、飲食不為肌、膚心痛、徹背、痛、徹心脉、浮大而長。

大烏頭壹分炮

附子半兩炮

赤石脂煨研

川椒炒出

乾薑炮各

桂心半兩

右為末，蜜丸，如梧子大，朱砂為衣，每服五十九丸，米湯下，漸至十圓。

**息音**

治肺之積在右脇下，大如覆杯，久久不愈，病洒之寒。

執氣逆喘，咳發為肺癰，其脉浮而毛。

半夏湯洗

吳茱萸湯洗

桂心各半

人參

甘草炙

桑白皮炙

葶藶兩半

右為散，每服四錢水一盞，半姜七片，棗兩枚，煎七分，去滓，食前服。

**氣膈**

治腎之積發於小腹，上至心，如豚奔走之狀，上下无時，久不已，病喘逆骨痠，少氣，其脉沉而滑。

甘季根皮 乾葛各壹兩 當歸 川芎

白芍藥

甘草炙

黃芩炒

半夏湯洗

右為散，每服四錢水一盞，半煎七分，去滓服。

六聚證治

六府者，大小腸胃膽膀胱三焦者也，屬於三陽，太陽利清氣，陽明泄濁氣，少陽化精氣，如都會之府，主轉輸，以為常也。六府失常，則壅聚不通，故實而不轉，虛而輸隨，氣往來痛无定處，在上則格，在下則脹，傷攻兩脇，如有塊，塊易於轉變，非五

茯苓

厚朴煨

人參

枳殼去穢

白朮

半夏煨

三稜慢火煨熟

乘散

右等分為末煮糊丸梧子大米飲下二十圓食前日兩服作散酒調服絕勝

**氣膈**

治脾之積在胃管覆大如盤久久不愈病四肢不收

黃連飲食不為肌膚心痛徹背心痛徹心脉浮大而長

大烏頭煮分炮

附子去皮炮

赤石脂煨

川椒炒出

乾薑炮各

桂心半兩

右為末蜜丸如梧子大朱砂為衣每服五七丸米湯下漸至十圓

**息實湯**

治肺之積在右脇下大如覆杯久久不愈病洒之寒

執氣逆喘咳嗽為肺癰其脉浮而毛

半夏湯洗

吳茱萸湯洗

桂心各半

人參

甘草炙

桑白皮炙

葶藶兩半

右為散每服四錢水一盞平姜七片棗兩枚煎七分去滓食前服

**小腹湯**

治府之積發於小腹上至心如豚奔走之狀上下无

時久二不已病喘逆骨痠少氣其脉沉而滑

甘季椒皮干

乾薑各壹兩

當歸

白芍藥

甘草炙

黃芩略

半夏湯洗

右為散每服四錢水一盞平煎七分去滓服

六聚證治

六府者大小腸胃膽膀胱三焦者也屬於三陽太陽利清氣陽明泄濁氣少陽化精氣如都會之府主轉輸以為常也六府失常則壅聚不通故實而不轉虛而輸隨氣往來痛无定處在上則格在下則脹傷攻兩脇如有塊易於轉變非五

臟比

氣積治久氣積聚狀如蠟腹隨氣上下發依有時心腹絞痛攻利腰脇上氣窒塞喘咳滿悶小腹脹脹大小便不利或便泄瀉淋瀝无度遺精白濁狀若虛勞

半夏湯洗

檳榔

當歸各等分

橘皮

杏仁湯洗

桂心各等分

茯苓

甘草炙

附子炮去

川芎

枳殼炒

厚朴姜汁

吳茱萸湯洗

右剉散每服四錢水一盞半前七分去滓食前服大便不利加大黃

息積證治

病者脇下滿氣逆息難頻歲不愈名曰息積因氣留滯癖於脇下不在臟腑榮衛之間積久形成氣不干胃故不妨食及

之則火熱內燥刺之則反動其經雖服消化之藥不能獨愈宜積以導引助而行之

積積治腸胃因虛氣癖於百膜之外流於季脇氣逆息難

惕且頻年醫所不治久則榮衛停凝一旦敗濁潰為癰膿多致不效

胡椒各等分

木香實分

全蝎十個去毒

右為末粟米飲圓如菽豆大每服十五圓橘皮湯下

化氣湯治息積癖于脇脇之下形積滿不妨飲食鐵聚未

能取轉及治心脾疼痛嘔吐酸水丈夫小腸氣婦人脾氣

縮砂仁

桂心

木香各等分

甘草炙

丁香皮

青皮炒

陳皮

生薑乾

蓬朮炒

胡椒

沉香各等分

右為末每服二錢姜蘇益湯調下婦人醋湯調服

以兩手母指壓无名指本節作拳按脚跌坐扣齒三十  
六拜氣二十一息嘔氣三口再拜息再嘔如是三夜以  
氣通為效過子午卯酉時則行然按摩通引之法甚多  
隨意行之皆可不必拘此法

五勞證治

五勞者皆用意施為過傷五臟使五神不寧而為病故曰五  
勞以其心力謀慮則肝勞曲運神機則心勞意外致思則脾  
勞預事而憂則肺勞矜持志節則腎勞良皆不量稟賦臨事  
過差遂傷五臟以臟氣本有虛火因其虛火而分矣此世醫  
例以傳尸骨蒸為五勞者非也彼乃瘵疾各兩類不可不知  
**猪膏** 治肝勞其熱閉格年離閉塞不通毛悴色夭  
猪膏 生薑汁略一青蒿汁 天門冬汁略一

右以微火銀石器內熬成膏每服一匙酒湯調下不拘  
時作

虎骨 治肝勞虛寒口苦關節疼痛筋挛縮煩悶

虎骨 兩斤 丹參 二兩 地骨皮 乾薑 各一  
熟地黃 三兩 滑石 椒根 五加皮 枳實 白木 各一  
右為散以絹袋盛得酒四斗浸四日初服二三合漸  
加至一盞日再服食前

**泄瀉** 治心勞失枕口舌生瘡大便腸澀不通心滿痛小  
澀瀉 施子仁 黃芩 略 桂心 通草 略

石膏 兩 大黃 兩 甘草 各

右為散每服四錢水養半煎七分去滓食後熱盛者  
煎熟加芒消一錢煎不以時服

定 治心勞虛寒驚悸恍惚多忘心驚驚覺神志不定



茯苓四兩

桂心

甘草

白芍藥

乾薑

茯苓

人參

生真湯

右別散每服四錢水盞半漿兩枚煎七分去滓食前服  
治脾胃虛弱熱四肢不和五臟乖戾脹滿肩息氣急不安

茯苓

白朮

杏仁

橘皮

芍藥

半夏

右別散每服四錢水盞半生薑七片棗兩枚煎七分去滓  
不以時服

寒更膏

治脾胃虛寒氣脹咽滿食不下通噎宿食臭

吳茱萸

白朮

猪膏

宿姜汁

右搗茱萸白朮貳味為末內薑膏中煎成膠飴每服

大匙食前溫酒調下

引氣湯

治肺熱氣喘鼻張面目苦腫

橘皮

細辛

白朮

桂心

紫蘇

麻黃

杏仁

石膏

半夏

湯洗

右別散每服四錢水兩盞薑七片竹葉五片煎七分去滓食後服

治肺勞虛寒心腹冷氣逆澀氣脅脇氣滿微曾  
逆者痛喉逆飲食即吐虛乏不足

人參

厚朴

甘草

桂心

四兩

半夏

橘皮

麥門冬

三兩

右別散每服四錢水兩盞薑七片去滓食前服腹痛加  
當歸

治腎勞

治腎勞勞損小腹脹滿小便赤黃末有餘澀數而少

華中痛陰囊生瘡

梔子仁

芍藥

通草

石葦

各三兩

滑石八兩 牡蠣四兩 熟地黃 榆白皮 各二兩

古劉散每服四錢水盞半淡竹葉七片同煎七分去滓

不以時服

**五加皮湯** 治腎勞虛寒恐慮失志傷精損髓嘔吸短氣遺泄

白濁小便赤黃陰下濕痒腰脊如折顏色枯悴

五加皮附丹參附石斛酒浸杜仲酒浸附子炮去心

牛膝酒浸秦艽川芎 防風 杜心

獨活略茯苓麥門冬地骨皮各薏苡仁一

右為劉散每服四大錢水盞半姜五片大麻子一撮研

破同煎七分去滓食前服

六極證治

臟猶虛藏主秘藏腑效會府主轉輸藏實則腑无不實腑虛則臟亦因而致虛故六極者由腑虛致臟虛陰陽失度榮衛

是本无以養筋脉皮肉滑髓故六物皆極二者能強之謂也  
与洪範六極同意

**霍亂吐瀉** 治前寒極熱而兩脇小痛不可轉動脚下兩不

得遠行脚心痛不可忍手足八甲青黑四肢筋急煩滿

生地黃 犀角鑄 乾葛 玄參

梔子仁 升麻略 大黃剉 芍藥半

右為劉散每服四錢水盞半煎七分去滓不以時服惡寒

**烏麻酒** 治筋虛極好悲思四肢羸吸脚手拘亦伸動縮急腹

內轉痛十指甲頻數轉筋其則古卷如雞唇青面色蒼白

不得飲食

烏麻土 人參 防風 茯苓

秦椒炒 出黃芪 當歸 牛膝 桂枝略

乾地黄 丹参 薯蓣 鑿石 略山茱萸

川芎 麻黄 白术 五加皮 生地黄

大棗 鍾乳粉 各三兩

右為劑散用清酒貳斗半同浸五宿温服二合日再服

治脉实極气衰血焦髮落好怒唇舌赤其則言語不

快色不澤飲食不為肌膚

麥門冬 生地黄 遠志 茯苓 芍藥

右到散每服四錢水盡半前七分去滓不以時服

治脉虛極則效則心痛喉中介介如哽甚則咽睡

防風 桂心 通草 茯苓 人參

遠志 甘草 白石英 麥門冬

右為細末蜜丸如梧子大食前酒服三十圓

百病治肉浮極肌痺淫 如 風走津液脫膜理開汗大泄

或不仁四肢急痛或復緩弱 百壞皮薄安也

石南 天雄 枝麻 山茱萸 杏仁 芍藥

甘菊花 甘草 升麻 萎蕤 黃芪

辰砂 石膏 山茱萸

右為細末每服二大錢食前酒調下

大黃湯治肉虛極脉重急情四肢不欲空閉即疼痛不嗜

飲食食則效效則不脇下痛陰引官及有不可轉動

黃芪 桂心 巴戟 石斛 酒浸澤瀉

茯苓 乾薑 防風 獨活 人參 芍藥

天雄 芍藥 附子 干夏 細辛 白朮

右為劑散每服四錢水二盞生薑一片煎七分去滓食

前服

前服治氣逆極喘息衝胃常欲目悲心眩耳滿痛內外有熱  
煩嘔不安甚則唾血其短乏不欲食口燥咽乾

前胡 兩半夏 湯洗七遍湯洗七遍 麻黃 兩湯洗七遍 芍藥 六兩  
黃芩 三兩 枳實 兩湯洗七遍

右劉散每服四錢水二盞姜七片棗一個前七分去滓  
不以時服

種乳散 治氣虛極皮毛焦津液不流力乏腹脹甚則喘急氣  
短息塞晝差夜甚

煉成重乳 別研 乾薑 兩 桔梗 兩  
附子 炮去皮臍 細辛 兩 桂心 兩  
人參 各二兩

白朮 一兩 防風 兩 牡蠣 兩  
五朮 每服二大錢溫酒調下食前  
括樓根 兩半

治精實極眼視不明或信變落形裏通身虛熱甚則

膏中疔癩爛胸壯精

生乾地黃 五兩 芍藥 兩 黃芩 兩  
茯苓 兩  
澤瀉 兩 甘草 炙 麥門冬 去心 兩

右劉散每服四錢水盞半姜三片淡竹葉十片前七分  
去滓不以時服

治精虛極疰贏驚悸夢中遺泄尿後漉瀉小便白濁  
甚則逆弱核微小腹裏急

磁石 煅 龍齒 兩 茯苓 兩 茯苓 兩  
麥門冬 去心 兩 續斷 兩 赤石脂 兩  
人參 兩

鹿茸 兩 地黃 兩 韭子 兩 栝子仁 兩  
右為末蜜丸梧子大食前溫酒下三十圓至五十圓

治骨節振動耳鳴面色佳枯隱曲筋脈不通牙齒腦



**七氣湯** 治藏腑神氣不守正位為喜怒憂思悲恐驚存鬱不  
行遂泉涎飲結積堅牽有如塊塊心腹絞痛不能飲食時  
發時止發則效死

半真錫試去人參

桂心

甘草 各各一兩

右剉散每服四錢水五升姜七片棗二枚前七分去滓  
食前服

**天仁氣湯** 治喜怒不節憂兼并多生悲恐或時振驚致藏

氣不平增寒發熱心腹脹滿傍衝兩脇上塞咽味有如炙  
亦嚔吐酸不下皆七氣所生

半夏

煑研

白茯苓

四兩

厚朴

三兩

紫蘇

二兩

右剉散每服四錢水盞半姜七片前七分去滓食前服  
五噎證治

夫五噎者即氣噎痰噎勞思噎食噎雖五種不同皆以氣

為主所謂氣一者心悸上下不通噎噎不徹胃脘痛憂一者  
遇天陰寒手足厥冷不能自溫勞一者氣上衝胸下支滿胃  
中填塞攻背疼痛思一者心口悸喜忘目視眩人食噎者食  
无多亦胃中苦寒疼痛不得常息皆由喜怒不常憂思過度  
恐慮无時鬱而生涎、当以搏升而不降逆善飲食当五膈  
同但此在咽噎故名五

**五噎證治** 五種一食飲不下胃脘痛嘔噦不徹攻刺疼痛淚

与藥俱出

人參

茯苓

厚朴

去心

枳殼

去核

桂心

甘草炙

訶子

去核

白木

橘皮

白薑炮

三棱

炮

神麩

麥蘖

炒

木香

炮

檳榔

蓬

不翅

各半兩

右為末每服二錢水一盞生薑三片棗子一枚煎七分

空心温服 極湯點亦得

**五噎** 治五噎五膈胃中久寒 滯氣結 嘔逆 一室食飲不

化 結氣不消 常服 寬氣通一寬中進食

白朮

茯苓 略半 木通

當歸

橘皮

青皮

大腹子 大腹皮 木香

芍藥 略二

甘草 兩

白芷 三兩 紫蘇葉 枳殼 略三兩

右為末 每服二錢水一盞 薑三片 棗一枚 煎七分 空腹

温服

**胃寒散** 治中滿下虛 五噎五膈 胃不和 胃膈痞悶 脇肋脹

滿 心腹刺痛 可思飲食 如中焦虛痞 不任攻擊 臍膈虛寒

不受峻補 或因病氣 衰不復常 稟受怯弱 不能多食 尤宜

服之

批杷葉 去毛 薏苡仁 燻 縮砂仁 人參 茯苓 略

石斛

大腹子 沉香

木香 藜蘆香

杜仲 去皮 桑寄生 隨風子

如天 煨 各二兩 穀蘖 白豆蔻

五味子 炒

桑白皮

丁香

檳榔 青皮 略半

半夏 餅 炒

神麴 各一

甘草 炙 兩

陳皮 三白 木 炒 式

右為末 每服二錢水一盞 生薑三片 棗三枚 煎至七分

温服 不計時 五噎入 乾柿一枚 同煎 服見效 膈氣吐

逆 羸困入 雜白三寸 棗五枚 同煎

**五噎**

獨頭蒜 七粒 温時 煨 爛 研 為 膏 非 太 熱 也

丁香

橘紅

木香

藜蘆

胡椒

右等分 為末 用蒜膏 為丸 如梧子大 先嚼 薑少許 令生

津液 乾噎 貳粒 漸加 至三五圓 臨臥服

廣五行 託末 散中有 惟維 則病 噎不能食 語 粵子曰 吾死之





嘉禾散

沉香散 並治五疳

方見前五疳門

右為細末姜汁糊為丸梧子大食後米湯下二三十四

