

溼熱門

廣按溼熱痰熱風熱所因不同為病亦異溼熱者因溼而生熱也痰熱者因痰而生熱也風熱者因火而生風風則兼乎熱也火性炎上凡頭目腫痛眩暈昏目赤耳聾鼻塞口燥舌乾牙宣牙齦腫之類皆風熱之所為也水性潤下凡泄瀉下痢水腫鼓脹遺精白濁疝痛腰痛脚氣之類皆溼熱之所為也痰生於脾土居中央凡咽痛喉閉膈噎胸痞瘧癩顛狂驚悸怔忡健忘恍惚之類皆痰熱之所為也經曰治病必求其本此風熱痰熱溼熱乃病之根本也

吞酸 二十二附噉氣

丹溪心法

吞酸者溼熱鬱積於肝而出伏於脾胃之間必用糲食蔬菜自養 宜用炒吳茱萸順其性而折之此反佐之法必以炒黃連為君 二陳湯加茱萸黃連各炒隨時令迭其位使蒼朮茯苓為輔佐冬月倍茱萸夏月倍黃連湯浸炊餅丸如小豆吞之仍教以糲食蔬菜自養并戒忿怒即安

戴云溼熱在胃口上飲食入胃被溼熱鬱遏其食不得傳化故作酸也如穀肉在器則易為酸也入方 茱萸時浸兩法枝梗煮少 陳皮一兩 蒼朮米泔浸兩 黃連炒去土兩 黃芩上土炒如桔梗一兩

右為末神麩糊丸茱豆大每服二三十丸時時津液下食後服

黃連清化丸 黃連 一兩 吳茱萸 一錢 炒桃仁 二錢 四陳皮 半兩 半夏 一兩 半

右為末神麩糊丸茱豆大每服百丸姜湯下

溼熱門

廣按溼熱痰熱風熱所因不同為病亦異溼熱者因溼而生熱也痰熱者因痰而生熱也風熱者因火而生風風則兼乎熱也火性炎上凡頭目腫痛眩暈昏目赤耳聾鼻塞口燥舌乾牙宣牙齦腫之類皆風熱之所為也水性潤下凡泄瀉下痢水腫鼓脹遺精白濁疝痛腰痛脚氣之類皆溼熱之所為也痰生於脾土居中央凡咽痛喉閉膈噎胸痞瘰癧顛狂驚悸怔忡健忘恍惚之類皆痰熱之所為也經曰治病必求其本此風熱痰熱溼熱乃病之根本也

吞酸 二十二附噉氣

丹溪心法

吞酸者溼熱鬱積於肝而出伏於脾胃之間必用糲食蔬菜自養 宜用炒吳茱萸順其性而折之此反佐之法必以炒黃連為君 二陳湯加茱萸黃連各炒隨時令迭其位使蒼朮茯苓為輔佐冬月倍茱萸夏月倍黃連湯浸炊餅丸如小豆吞之仍教以糲食蔬菜自養并戒忿怒即安

戴云溼熱在胃口上飲食入胃被溼熱鬱遏其食不得傳化故作酸也如穀肉在器則易為酸也入方 茱萸時浸兩法枝梗煮少 陳皮一兩 蒼朮米泔浸兩 黃連炒去土兩 黃芩上土炒如桔梗一兩

右為末神麩糊丸茱豆大每服二三十丸時時津液下食後服

黃連清化丸 黃連一兩 吳茱萸浸炒桃仁二兩研 陳皮半兩 夏一兩 半

右為末神麩糊丸茱豆大每服百丸姜湯下

參萸丸 治溼而帶氣者溼熱甚者用之為向導上可治吞酸下可治自利

六一散 一料 吳茱萸 一兩製 右為末飯丸 六一散 見溫熱

回令丸 瀉肝火行溼為之反佐開痞結治肝邪可助補脾藥 黃連 六兩 吳茱萸 一兩

右為末粥丸 一方名左金丸治肝火茱萸或半兩水丸白湯下

附諸賢論

或問丹溪曰吐酸素問明以為熱東垣又以為寒何也答曰吐酸與吞酸不同吐酸是吐出酸水如醋平時津液隨上升之氣鬱積而成鬱積之久溼中生熱故從火化遂作酸味非熱而何其有積之於久不能自涌而出伏於肺胃之間咯不得上嚥不得下肌表得風寒則內熱愈鬱而酸味刺心肌表溫暖腠理開發或得香熱湯丸津液得行亦得暫解非寒而何素問言熱者言其本也東垣言寒者言其末也

附諸方

麩木丸 治中脘宿食留飲酸蜚心痛或口吐清水 神麩 炒三兩 蒼木 油浸炒一兩半 陳皮 一兩

右為末生姜汁煮神麩為丸每七十九丸姜湯下

加味平胃散 治吞酸或宿食不化 蒼木 陳皮 厚朴 甘草 神麩 炒 麥芽 炒

右吹咀每服五錢生姜三片水煎服

透膈湯 治脾胃不和中脘氣滯胸膈滿悶噎塞不通噫氣吞酸脇肋刺脹嘔逆痰涎飲食不下

木香 白豆蔻 縮砂仁 枳殼 厚朴 半夏 青皮 陳皮 甘草 大黃 炒

右各等分每服一兩水二盞生姜三片棗子一枚煎至一盞去滓通口服食後

丹溪心法

受氣 胃中有火有痰

入方 南星 半夏 軟石膏 香附 一本有炒梔子

右作丸或作湯服之蓋胃中有鬱火腸上有稠痰故也 軟石膏丸亦可服 本方痰條下云噫

氣吞酸此係食鬱有熱火氣衝上黃芩為君南星半夏陳皮為佐熱多加青黛

疸 二十二

丹溪心法

疸不用分其五同是溼熱如蠶麩相似 輕者小溫中丸 重者大溫中丸熱多加芩連 溼多

者茵陳五苓散加食積藥 溼熱因倒胃氣服下藥大便下利者參芪加山梔茵陳甘草

戴云五疸者周身皮膚并眼如梔子水染因食積黃者量人虛實下其食積其餘但利小便為先

小便利白其黃則自退矣

入方

小溫中丸 治疸又能去食積 蒼朮 川芎 香附 神麩 針砂 醋炒紅

春加芎夏加苦參或黃連冬加吳茱萸或乾姜

大溫中丸 治食積與黃腫又可借為制肝燥脾之用脾虛者以參朮芎藥陳皮甘草作湯使

陳皮 蒼朮 厚朴 三稜 蓬朮 青皮 略五 香附 一斤 甘草 二兩 針砂 二兩 醋炒紅

右為末醋糊丸空心姜盞湯下午後飯食可酒下忌犬肉菓菜

附脉理

脉訣舉要曰五疸實熱脉必洪數其或微瀋證屬虛弱

附諸方

足十...心去付余

黃疸

茵陳五苓散

右用五苓散五分茵陳蒿末十分和勻先食飯後服方寸匕日三服 五苓散 見溫熱

當歸白朮湯 三四方 治酒疸發黃結聚飲癖心胸堅滿不進飲食小便黃赤其脉絃澀

茯苓 三兩 當歸 兩 白朮 兩 黃芩 兩 半夏 兩 枳實 兩 杏仁 兩 前胡 兩

右咬咀每服四錢水一盞煎七分食後溫服

加減五苓散 濟生方 治飲酒伏暑鬱發為疸煩渴引飲小便不利

茵陳 赤茯苓 去皮 猪苓 去皮 白朮 澤瀉 各等分

右咬咀每服四錢水一盞煎八分溫服不拘時

黃耆散 濟生方 治黃疸

黃耆 去芦 赤芍藥 茵陳 略 石膏 四兩 麥門冬 去心 豆豉 略 甘草 炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎至八分溫服不拘時

茵陳散 濟生方 治黃疸

瓜萹 一箇 石膏 一兩 甘草 炙半兩 茵陳 木通 梔子仁 略 大黃 炒半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片葱白一莖煎服

葛根湯 濟生方 治酒疸 枳實 去白 梔子仁 豆豉 略 甘草 炙半兩 葛根 二兩

右咬咀每服四錢水一盞煎七分溫服不拘時

秦艽飲子 濟生方 治五疸涉虛口淡咽乾發熱微寒

秦艽 去芦 當歸 酒洗 芍藥 白朮 官桂 去皮 陳皮 茯苓 去皮 熟地黃 酒蒸 半夏 湯洗七

小草 徐遠 川芎 各一兩 甘草 炙半兩

右吹咀每服四錢水一盞姜五片煎七分溫服

茵陳湯 濟生方 治時行痰熱在裏鬱蒸不散通身發黃 茵陳二兩 大黃一兩 梔子仁三錢

右吹咀每服四錢水一盞煎七分溫服不拘時

搗藥瓜蒂散 拔粹方 治黃疸遍身如金色累效 瓜蒂二錢 母丁香一錢 黍米四升 赤小豆半錢

右先將瓜蒂為末次入三味再碾至夜令病人先含水一口次將藥半字搗入鼻內待下或吐去

水便睡至半夜或次日取下水直候利止即服黃連散或茵陳五苓散病輕者五日病重者半

月見效

黃連散 拔粹方 治黃疸大小便秘澀臟腑壅熱 黃連二兩 川大黃二兩 好 黃芩 法黑炙甘草各一

右為細末每服二錢食後溫水調下日三服

必效散 直指方 黃疸通用 葶藶 馬紙 龍膽草 山梔子 茵陳 黃芩

右等分每服一兩水二盞煎至一盞溫服不拘時

一清飲 危氏方 治疸證發熱諸熱通用 柴胡三兩 赤茯苓二兩 桑白皮 炒 川芎 略 甘草 炙半兩

每服一兩姜三片棗一枚水二盞煎至一盞食前服

山茵陳散 直指方 梔子 茵陳 略 枳實 七箇 茯苓 葶藶 甘草 各一錢半

每服一兩水二盞姜三片煎至一盞食前通口服

茯苓滲溼湯 治黃疸寒熱嘔吐渴飲冷水身體面目俱黃小便不利

白茯苓 五分 茵陳 六分 猪苓 澤瀉 略 三黃連 黃芩 梔子 漢防已 白朮 蒼朮

陳皮 青皮 枳實 炒 各三分

右每服水二鍾煎至一鍾去滓食前溫服

一方 治黃腫及積滯浮腫 皂礬半斤醋 膠囊去皮 平胃散四兩

右用棗搗爛入礬丸如梧桐子大以平胃散為衣每服三五十九丸臨卧溫酒送下

一方 治遍身黃不浮腫手足怠倦

針砂水搗淨 陳皮去白 蒼木去粗皮 青皮去白 百草霜炒 三稜煨 義木煨各二兩

右為末麵糊丸如梧桐子大每服三四十九丸米湯溫酒下

一方 用絲瓜全者燒灰為末如病因麵傷麵湯下因酒傷酒調下數服

### 水腫 二十四

#### 丹溪心法

水腫因脾虛不能制水水漬妄行當以參朮補脾使脾氣得實則自健運自能升降運動其樞機則水自行非五苓神佑之行水也宜補中行溼利小便切不可下用二陳湯加白朮人參蒼朮為主佐以黃芩麥門冬炒梔子制肝木若腹脹少佐以厚朴 氣不運加木香木通 氣若陷下加升麻柴胡提之隨病加減必須補中行溼二陳治溼加升提之藥能使大便潤而小便長 產後必須大補血氣為主少佐蒼朮茯苓使水自降用大劑白朮補脾若壅滿用半夏陳皮香附監之 有熱當清肺金麥門冬黃芩之屬 一方用山梔子去皮取仁炒槌碎米湯送下一抄若胃熱病在上者帶皮用 治熱水腫山梔子五錢木香一錢半白朮二錢半咬咀取急流順水煎服 水腫用大戟香薷濃煎汁成膏丸去暑利小水 大戟為末棗肉丸十九泄小水却快實者

戴云水腫者通身皮膚光腫如泡者是也以健脾滲水利小便進飲食元氣實者可下

#### 附脉理

脉訣舉要曰水腫之證有陰有陽察脉觀色問證須詳陰脉沉遲其色青白不渴而瀉小便清溢脉

或沉數色赤而黃燥莫亦溺兼渴為陽

附諸方

麻黃甘草湯濟生方 治水腫從腰以上俱腫以此湯發汗 麻黃四兩 甘草二兩

右吹咀每服三錢水一盞煮麻黃再滯後入甘草煎七分取汁慎冒風老人虛人不可輕用

五苓散方見溫熱 加木香茵陳 治水腫從腰以下俱腫以此湯利小便仲景曰腰以下腫宜利小便

便腰以上腫宜發汗也

五皮散和劑方 治風溼客於脾經氣血凝滯以致面目虛浮四肢腫滿心腹膨脹上氣促急

五加皮 地骨皮 生薑皮 大腹皮 茯苓皮

右吹咀每服二錢水一盞煎至八分熱服不拘時忌生冷油膩堅硬等物澹寮去五加皮地骨皮

用陳皮桑白皮

葶藶木香散御藥院方 治暑溼傷脾水腫腹脹小便赤大便滑

葶藶二錢半 木香五錢 茯苓錢半 肉桂錢半 滑石三錢 澤瀉錢半 木通 甘草各一兩 白木一兩

右為末每服二錢白湯下不拘時候

三茵當歸散 水腫之疾多由腎水不能攝心火心火不能養脾土脾土不能制水水氣盈溢氣脉

閉塞滲透經絡發為浮腫之證心腹堅脹喘滿不安

木香煨 赤茯苓 當歸洗 桂心 木通 赤芍藥 牡丹皮 枳榔 陳皮 白木各等分

右吹咀每服三錢水一盞紫蘇五葉木瓜一片煎八分溫服

加味腎氣丸濟生方 治脾腎虛損腰重脚重小便不利

白茯苓去皮 附子炮 澤瀉 官桂不見 川牛膝酒浸 車前子酒蒸 山藥炒 山茱萸取肉



牡丹皮去木各熟地黄半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服七十丸空心米飲下

實脾散濟生方治陰水發腫用此先實脾土

厚朴去皮白木木瓜木香不見乾乾姜各草菓仁 大腹子 白茯苓去皮甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚煎服不拘時

白木木香散宣明方治喘嗽腫滿欲變成水病者不能卧不能食小便閉者

白木 猪苓去甘草 澤瀉各半官桂錢赤茯苓兩木香 栝榔各三 陳皮去白滑石三兩

右咬咀每服一兩半生姜三片水二盞煎至一盞去滓通口服

聖靈丹拔粹方治脾肺有溼喘滿風盛小便赤澀

苦葶藶四兩防已二錢赤茯苓錢木香 栝榔 木通 人參各二錢半

右為末棗肉為丸如梧桐子大每服五十丸桑皮湯下

導氣通經湯拔粹方治脾氣有餘及氣不宣通面目手足浮腫

陳皮去白 桑白皮 白木 木香 茯苓去皮各一兩

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞通口服不拘時霖雨時加澤瀉六錢

沉香海金砂丸拔粹方治一切積聚脾溼腫脹肚大青筋羸瘦惡證

沉香二錢海金砂半錢輕粉一錢黑丑末一兩

石用獨蒜泥丸每服三十九丸煎燈心通草湯下空心量大小虛實

續隨子丸拔粹方治通身虛腫喘悶不快

續隨子 栝榔 續隨子 海金砂另炒各 苦葶藶四兩

右為末棗肉為丸如梧桐子大每服五十九丸桑皮湯下

退腫榻氣散 聖惠方 治積水驚水或飲水過多停積於脾故四肢腫而身熱宜用藥內消其腫自退

赤小豆 陳皮 蘿藦子 甘草 各五 木香 炮二錢半

右咬咀每服一兩生姜三片棗子一枚水二盞煎至一盞食前服

以上數方治陰水浮腫之劑

十棗丸 治水氣浮腫上氣喘急大小便不通 甘遂 大戟 芫花 各等分

右為末棗煑熟去皮核杵爛為丸如梧桐子大每服四十九丸清晨熱湯下以利去黃水為度不利

次日再服

順氣丸又名氣寶丸 聖惠方 治腰脇俱病如抱一甕肌膚堅硬按之如鼓脚腫不能伸屈自頭至臍

中瘦脊露骨胸膈痞滿四肢無力

木香 不見 茴香 炒 羌活 木瓜 川芎 當歸 酒浸各一兩 黑牽牛 兩 地骨皮 檳榔 陳皮 炒各一兩

大黃 半兩 皂角 四兩

右為細末熬皂角膏丸如梧桐子大每服五六十丸溫湯下食前一服無木瓜用生姜燈心煎湯

下治一切氣血凝滯風毒熾盛脚氣走注作腫或大便秘脚氣入腹滿悶寒熱往來壯如 傷寒並

三花神佑丸 宣明方 治中滿腹脹喘嗽淋瀝水熱脹滿溼熱腸垢沉積變生疾病久病不已黃瘦困

倦氣血壅滯不得宣通或風熱燥鬱肢體麻痺走注疼痛風疾涎嗽頭目旋運瘧疾不已癥瘕積

聚堅滿痞悶酒積食積一切痰飲嘔逆及婦人經病不快滯下淋瀝無問赤白并男子婦人傷寒

溼熱腹滿實痛久新瘦弱俗不能別辨或汎常只為轉動之藥兼瀉久新腰痛并一切下痢及小

兒驚疳積熱乳癖腫滿並宜服之

甘遂 大戟 芫花 醋拌溼炒 各半兩 牽牛 二兩 為細末 輕粉 一錢

右為末滴水為丸如小豆大初服五丸每服加五丸溫水下每日三服加至快利後却常服病去為度設病愈後老弱虛人平人常服保養宣通氣血消進酒食及痞悶極甚者便多服則頓攻不開轉加痛悶則初服兩丸每服加兩丸至快利為度以意消息小兒丸如麻子大隨強弱增損三四歲者三五丸依前法

一方 治水腫腹脹 大戟 甘遂 芫花 醋浸 巴戟 桑白皮 續隨子 各等分

右為末每服一匙空心菜豆湯下忌生冷油膩酸鹹等物

一方 治水腫鼓脹

苦葶藶 甘遂 麵裹煨熟 水浸冷用 商陸根 大戟 各半 大黃 芫花 各二錢 輕粉 少許 黑牽牛 頭末一兩

右為細末入輕粉再研每服二錢溫蜜水調下忌生冷鹽醬之物取下黑黃臭水為驗

以上數方治陽水浮腫之劑

回鶻五神散 治十腫水氣鼓脹 芫花獨根 洗淨 木香 青木香 商陸 白者 洗淨 烏柏根 取黃土內一

右各等分晒乾為末每服二錢如人弱服一錢半臨臥臘酒調下至寅卯時利下水氣辰時以白

粥補之若病淺日三服病深隔日一服限五六日後服金丹

金丹 蒼術 四錢 半米 水浸 草烏 二錢 去皮 羌活 二兩 山豆 一錢 半 去皮 杏仁 二十一箇 去皮尖 麵炒 另研

右為末麵糊丸如梧桐子大每服十一丸臨臥生薑湯送下忌鹽醬房事發病之物百日 此藥極

一方 用赤小豆高陸白者根各等分以雄猪肚一箇裝藥在內以篋籤封其口於瓦罐內煮爛取

出去藥乘熱食猪肚宜食五七箇見效

一方 用黑雄猪肚一箇先以茶湯清油洗淨用活蝦蟆三箇每箇口內放銅錢一枚銅錢上安胡

黃連末少許將蝦蟆活裝入肚內兩頭俱紫佳勿令走氣以文武火煮一日次日五更取出蝦蟆去皮腸肝不用餘肉連猪肚一同撕碎食盡以好酒厭下忌鹽醬雞鵝魚麵羊肉滯氣之物宜食猪肉鴨肉

一方 於五月五日取蜈蚣不拘多少不可見日焙乾凡一病以七箇為度先用七箇頭研為末治上次用腹研為末治中再用足研為末治下每服食前好酒調下

商陸散 治十腫水氣 商陸汁一盞甘遂一錢土狗一箇自死者

右為末以商陸汁調空心服日午利下水忌鹽一百日

一方 治水鼓 用商陸根赤者杵爛貼臍心以絹帛縛定病自小便出

又方 以商陸白根同生姜二兩煮粥服之忌赤者殺人

分水散 治面水浮腫 土狗一箇輕粉二分半

右為細末每用少許搗鼻中其黃水從鼻中出

塗臍膏 治水腫小便澁少 猪苓 地龍生研 針砂 醋煑甘遂各等分

右為末用葱搗爛取汁研成膏敷臍中約一寸高以帛縛之水從小便出為度日二次易之

煨腎丸 治脾虛邪水流注經絡腿膝寧急四肢腫痛 甘遂生半兩 木香一兩

右為末每服一錢以猪腰一枚剝開去筋膜摻藥在內用薄荷裏定外用紙四五層再裏以水溼於火內煨熟臨臥細嚼溫酒嚥下利去黃水為度

一方 治水腫 黑牽牛頭末 楨榔等分

右為末每服三錢好酒空心調下利去水三五次其腫自消忌鹽醬生冷一百日取虫積沙糖水

牽牛湯 治腹中溼熱氣足脛微腫中滿氣急咳嗽痰喘小便不利 牽牛頭末一兩 厚朴五錢 姜製

足下灸心去付餘

水腫 鼓脹

右為末每服二錢姜棗湯調下或以水為丸亦可

一方 治腫脹自去水

用真水銀粉二錢巴豆去油四兩生硫黃一兩同研成膏作餅子先以新綿一片鋪臍上次以藥餅當臍掩之外用帛縛定約人行五里自然瀉下惡水待三五次除去藥溫粥補之久患者開日

一方 治鼓脹氣滿

用苦丁香為末棗肉為丸如梧桐子大每服三十九丸空心棗湯下三服見效

一方 用青木香為末水調一錢服後得吐則效

一方 治水腫

用白高陸細切一升羊肉六兩水十升煮至六升去滓將肉和葱豉作膾食之

以上數方治腫脹劫奪之劑

廣按水腫之證蓋由脾虛溼勝凝閉滲道不得通故邪水隨氣流注經絡之中則一身浮腫皮薄而光手按成屈舉手即滿也先當補中燥溼使脾得健運次當開其滲道以決邪水則體用兼該標本兩盡病之不愈者鮮矣今之醫者徒知決水而不知補脾故暫消而隨腫何益之有哉古人治病之挾虛有先攻而後補者有先補而後攻者有攻補兼施者何嘗一於攻也又嘗論之水腫鼓脹之病忌用甘溫之藥蓋腫脹屬溼甘溫之藥能生溼熱而反助病邪經曰甘能作中滿是也惟用苦寒之藥以治之則愈蓋苦寒瀉溼熱苦溫除溼寒也又宜用風藥風能勝

鼓脹二十五

丹溪心法

鼓脹又名單鼓 宜大補中氣行溼此乃脾虛之甚必須遠音樂斷厚味大劑人參白朮佐以陳

皮茨苓蒼朮之類 有血虛者用四物湯行血藥 有脉實堅人壯盛者或可攻之便可收拾用  
木為主 凡補氣必帶厚朴寬滿 厚朴治腹脹因味辛以氣聚於下焦故也須用姜汁製之 如

肥胖之人腹脹者宜平胃五苓共服之 如白人腹脹者是氣虛宜參朮厚朴陳皮 如瘦人腹脹

者是熱宜黃連厚朴香附白芍 如因有故畜血而腹脹者宜抵當丸下死血 如因有食積而腹

脹者有熱用木香檳榔丸有寒用木香厚朴丁香砂仁神麴香附 如因外寒鬱內熱而腹脹者用

藿香麻黃升麻乾葛桂枝 因大怒而腹脹者宜青皮陳皮香附木香梔子仁蘆會 實者按之不

堅不痛治須實者下之消之次補之 虛者溼之升之補為要 朝寬暮急血虛暮寬朝急氣虛終

日急氣血皆虛 腹脹不覺滿者食肉多以黃連一兩阿魏半兩醋浸蒸餅為丸同溫中丸白朮湯

下 食肉多腹脹三補丸料內加香附半夏麴蒸餅丸服

心肺陽也居上腎肝陰也居下脾居中亦陰也屬土經曰飲食入胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散

精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行是脾具坤靜之德而有乾健之運故能使

心肺之陽降腎肝之陰升而成天地交之泰是為無病今也七情內傷六淫外侵飲食不節房勞

致虛脾土之陰受傷轉運之官失職胃雖受穀不能運化故陽自升陰自降而成天地不交之否

清濁相混隧道壅塞鬱而為熱熱留為溼溼熱相生遂成脹滿經曰鼓脹是也以其外雖堅滿中

空無物有似於鼓其病膠固難以治療又名曰蠱若虫侵蝕之義理宜補脾又須養肺金以制木

使脾無賊邪之患滋腎水以制火使肺得清化却厚味斷妄想遠音樂無有不安醫又不察虛實

急於作效病者苦於脹急喜行利藥以求通快不知寬得一日半日其腫愈甚病邪甚矣真氣傷

矣古方惟禹餘糧丸又名紫金丸制肝補脾殊為切當

四物湯 見補損

足下... 鼓脹

平胃散 見中溼

五苓散 見溼熱

溫中丸 見積聚

三補丸 見補損

附脉理

脉訣舉要曰脹滿脉絃脾制於肝洪數熱脹遲弱陰寒浮為虛滿緊則中實浮則可治虛則危急

附諸方

平肝飲子 濟生方 嵩治喜怒不節肝氣不平邪乘脾胃心腹脹滿頭暈嘔逆脉來浮絃

防風 去芦桂心不見 枳殼 赤芍藥 桔梗 去芦炒 甘草 炙 木香 不見 人參 枳榔 當歸 浸酒

川芎 陳皮 半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎不拘時服

紫蘇子湯 濟生方 治憂思過度致傷脾胃心腹膨脹喘促煩悶腸鳴氣走洩瀉有聲大小便不利脉

虛緊而滿 見氣滯

調中順氣丸 治怒氣傷肝三焦痞滯水飲停積脇下虛滿或時刺痛 見脇痛

木香順氣湯 拔粹方 治濁氣在上則生腹脹及七情所傷

陳皮 厚樸 各四 當歸 五 草豆蔻 面裹煨 蒼朮 浸 木香 各三 青皮 益智仁 白茯苓 去皮

澤瀉 乾生薑 半夏 湯洗七次 吳茱萸 升麻 柴胡 各二分

橘皮湯 直指方 治七情所傷中脘不快腹脇脹滿

香附米 炒 半夏 橘皮 各二兩 甘草 七錢半

右吹咀水二盞生姜五片棗二枚煎至一盞通口服

○已上數方治氣脹之劑

大半夏湯 三因方 治肝氣大盛勝尅於脾胃六能運化結聚涎沫閉塞臟腑胃冷中虛遂成脹滿之疾其脉多弦遲

半夏 湯洗七次 桂心 各五兩 附子 皮去 枳實 炒 茯苓 甘草 炙 厚樸 炒 當歸 各三兩 人參 兩 川椒 炒去目合口者百粒

右吹咀每服四錢水一盞姜五片棗二枚煎空心服

強中湯 濟生方 治食啖生冷過飲寒漿有傷脾胃遂成腹脹心下痞滿有妨飲食甚則腹痛

乾姜 地土 白朮 各二兩 青皮 去白 人參 丁香 各三兩 草果仁 附子 皮去 厚樸 姜炒 甘草 炙 各半兩

右吹咀每服四錢水一盞姜五片棗二枚煎七分溫服不拘時嘔者加半夏或食麩脹 滿加蘿蔔子各半兩

中滿分消湯 拔粹方 治中滿寒脹寒疝大小便不通陰躁足不收四肢厥冷食入反出下虛中滿腹

中寒心痞下焦躁寒沉厥奔豚不收

益智仁 半夏 木香 茯苓 升麻 各七錢 川烏 人參 青皮 當歸 生薑 柴胡

乾姜 萹澄茄 黃連 各半兩 黃耆 吳茱萸 草豆蔻 厚樸 各半兩 一方有 麻黃澤瀉各二錢半 黃蘗 半兩

右吹咀每服一兩水二盞煎至一盞溫服大忌房勞濕麵生冷硬物

木香分氣丸 拔萃方 善治脾胃不和心腹脹兩脇膨脹胸膈注滿痰嗽喘急刺心乾嘔咽喉不利飲食不化並皆治之有效

木香 檳榔 青皮 去心 蓬莪朮 炮 乾生薑 當歸 姜黃 玄胡 白朮 枳殼 炒 荆三

稜 濕紙暴 赤茯苓 陳皮 去白 肉豆蔻 各等分 秋冬加丁香炒

右為末白麩糊丸小豆大每服三五丸生薑湯下忌生妬馬齒莧

足十卷心六寸餘

鼓脹



禹餘糧丸 治水腫鼓脹上氣喘滿一切水氣脹氣脹

蛇含石

大者三兩以鉄鉋盛入炭火中煨藥與鉋子一真針砂五兩洗以水淘淨控乾更以鉄鉋通紅用鉋出鉋子以藥研醋中候冷研極細

醋二升就鉋內煮令醋乾為度却就鉋子同二藥入中煨令通赤鉋出鉋子順藥於淨磚地上候冷研極細末

木香 牛膝酒浸 白蒺藜 桂心 川芎 白豆蔻 土茴香炒 三稜炮 羌活 茯苓

乾姜地 青皮去 白附子炮 陳皮 當歸酒浸一夕

右各半兩虛人老人全用半兩實壯之人隨意減之

右為末拌勻以湯浸蒸餅攪去水和藥再搗極勻丸如梧桐子大每服五十丸空心温酒下最忌

食鹽否則發疾愈甚

○廣按此方劫劑也然腫脹乃寒濕痞閉積滯非此藥之熱燥而能開發流通之乎雖用此藥而

能去腫脹然腫脹少退即當服補氣補血補脾藥以繼之可以免於後患也大抵腫脹之病多

用十棗三花以攻决惟壯實者可用非虛老人所宜而此劑但取開散寒濕痞滯故宜於人也

○已上數方治寒脹之劑

中滿分消丸 按辨方治中滿鼓脹氣脹水氣脹大熱脹不治寒脹

人參去芦 白朮 姜黃 黃芩去腐剉碎 甘草炙 猪苓去黑皮 黃連去鬚剉碎 白茯苓去皮 縮砂仁

乾生薑鎔 二枳實麩炒 半夏湯炮七次 厚樸姜製 知母剉 澤瀉 三錢 陳皮 三錢去白

右細碾茯苓澤瀉生薑各為末另秤外共為末秤入上二味和白水浸餗餅為丸如梧桐子大每

服一百丸熱白湯送下寒因熱用故焙熟服之食遠量人虛實加減

沉香交泰丸 按辨方治濁氣在上而擾清陽之氣鬱而不伸為臌脹

沉香 白木 陳皮各三錢 枳實去穢 吳茱萸湯洗 大黃酒浸 白茯苓去皮 澤瀉 當歸酒浸 木

香 青皮去白 各二錢 厚樸 姜製五錢

右為末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服七八十丸溫白湯送下食前微利即止

廣茂潰堅湯 治中腹滿脹內有積塊堅硬如石令人坐臥不安大小便澀滯上氣喘促遍身虛腫

厚樸 黃芩 益智 草豆蔻 當歸各五錢 黃連六錢 半夏七錢 廣茂 升麻 紅花酒浸 吳

茱萸各二錢 甘草生 柴胡 澤瀉 神麴炒 青皮 陳皮各三錢 渴者加葛根四錢

右每服七錢生姜三片煎服

紺珠木香栴榔丸

木香 栴榔 當歸 黃連 枳殼 青皮 黃柏各一錢 黃芩 陳皮 三稜 香附 且末

各二兩 莢木 大黃各四兩

右為末麩糊丸梧桐子大每服五七十丸臨臥姜湯下尋常消導開胃只服三四十丸

○已上數方治熱脹之劑

抵當丸 水蛭七箇 石灰炒 赤蟲八箇 粳米炒 桃仁七箇 大黃一兩

右為末分作四丸水一盞煎一丸取七分大溫服當下血未下再服

人參芎歸湯 治血脹煩燥漱水不噤迷忘小便多大便異或虛厥逆婦人多有此証

當歸 半夏七錢 川芎一兩 蓬朮 木香 砂仁 白芍 甘草各半兩 人參 桂 五靈脂炒 各

右咬咀生姜三片棗一箇紫蘇四葉水煎服

一方 治血鼓腹如盆脹

三稜煨 莢木 乾漆炒 烟 牛膝去 沙 蠶虫炒 琥珀 肉桂 礪砂 水蛭炒 石灰 大黃各 等

足下... 心... 付余... 鼓脹赤白濁

右為末用生地黃自然汁和米醋調勻為丸如梧桐子大每服十丸空心溫酒送下童便下亦可  
鷄屎醴散 宣明方治 旦食不能暮食痞滿

大黃 桃仁 去皮尖 雞屎醴乾者

右等分為末每服一錢生姜三片煎調食後臨臥服

○已上數方治血脹之劑

○廣按水腫鼓脹皆因脾虛所致然水腫輕而鼓脹重不可不知也何則水腫則飲食如常鼓脹則飲食不及常也治水腫則惟補脾導水而已治鼓脹則補脾導水兼以消穀度乎可也雖然脹有氣血寒熱四者之殊多由怒氣傷肝木邪尅土所以脾病而不能運化水穀故爾又要養肺金以制肝木使脾土得其平則運化行而水穀消矣以此觀之治鼓脹之法必以補脾制肝導水消穀為主看其所挾而兼用藥焉挾氣則散氣挾血則破血挾寒則溫寒挾熱則清熱其施治一一清切如此則藥無不投病無不愈也又按鼓脹之病多不治者何哉此脾虛之極真臟病也如翻胃勞瘵亦然皆真臟病也凡人之病真臟不病則五行相生相制以適其平雖不服藥而自愈者如太極傷金則有水以制之有土以生之所謂亢則害承迺制也雖然亦有惡藥忌醫而誤之者蓋正氣與病邪不相兩立一勝則一負久則病劇正脫而不克於死矣夫藥所以助正去邪而使邪退正復也有病不服藥可乎不用醫可乎

赤白濁二十六

丹溪心法

○濁主濕熱 有痰 有虛 赤屬血 白屬氣 痢帶同治 寒則堅凝熱則流通 大率皆是濕痰流注宜燥中宮之濕用二陳加蒼朮白朮燥去其濕 赤者乃是濕傷血也加白芍藥仍用珍

珠粉丸加臭椿根白皮滑石青黛作丸藥 虛勞用補陰藥大藥不宜熱 作宜藥 肥白人必多

痰以二陳湯去其濕熱 胃弱者兼用人參以柴胡升麻升其胃中之氣 丸藥用黃柏炒褐色乾

姜炒微黑滑石蛤粉青黛糊丸服 胃中濁氣下流為赤白濁用二陳加柴胡升麻蒼朮白朮 丸

藥用樗皮末蛤粉炒乾姜炒黃柏 胃中濁氣下流滲入膀胱青黛蛤粉 肝脉弦者用青黛以瀉

肝 又方炒黃柏一兩生柏一兩滑石三兩神麴半兩為末滴水丸 燥溼痰南星半夏蛤粉青黛

為末神麴糊丸青黛為衣 有熱者青黛滑石黃柏之類水丸 張子元氣血兩虛有痰痛風時作

陰火間起小便白濁方在痛風類 一人便濁經年或時夢遺形瘦作心虛主治用珍珠粉丸和定

志丸服 一婦人年近六十形肥奉養膏粱飲食肥美中焦不清濁氣流入膀胱下注白濁白濁即

溼痰也用二陳去痰加升麻柴胡升胃中清氣加蒼朮去濕白朮補胃全在活法服四貼後濁減大

半却覺胃滿因柴胡升麻升動胃氣痰阻滿悶又用本湯加炒麴白朮香附素無痰者雖升動不也滿

入方 青黛 蛤粉 椿根末 滑石 乾姜 炒黃柏 炒褐色

右為末神麴糊丸仍用前燥溼痰丸子亦治帶下

法曰黃柏治濕熱青黛解鬱熱蛤粉鹹寒入腎滑石利竅乾姜味苦斂肺氣下降使陰血生乾姜 監制

又方 黃柏 炒黑一兩 生柏 二兩 一云生半 蛤粉 三兩 神麴 半兩

右為末水丸服

附脉理

脉訣舉要曰遺精白濁當驗於尺結芤動緊二證之的

附諸方

定志丸 遠志 去心 石菖蒲 各二兩 人參 白茯苓 各五兩

右為末蜜丸梧子大硃砂為衣每服七丸加至二十九空心米湯下

半夏丸 治白濁神效

半夏燥濕猪苓分水肝脉弦加青黛

○二陳湯治濁能使大便潤而小便長 濁氣只是濕痰 有白濁人服玄兔丹不愈服附子八

味丸即愈著不可不知 有小便如常停又纔方旋濁

茯苓丸 治思慮太過心腎虛損便溺餘瀝小便白濁夢寐頻泄

兔絲子五兩白茯苓二兩石蓮肉二兩

右為末酒糊為丸如梧子大每服三十丸空心鹽湯下

珍珠粉丸 治白淫夢泄遺精及滑出而不收

真蛤粉一斤黃柏一斤新瓦上炒赤

右為末滴水丸梧子大每服一百丸空心溫酒下

法曰陽盛陰虛故精泄也黃柏降心火蛤粉鹹而補腎陰

導赤散 治心虛蘊熱小便赤澁遂成赤濁見林類

葉氏定心湯 理心氣不足榮血衰少遇事多驚心神不守夢中遺精白濁不已

葉氏鎮心爽神湯 理心氣不足夜夢多驚小便白濁遺精並見補損

清心蓮子飲 治心虛有熱小便赤濁見淋類

瑞蓮丸 濟生方治思慮傷心小便赤濁

白茯苓去皮石蓮肉炒去龍骨生用天門冬洗去麥門冬洗去柏子仁炒別當歸去酒酸棗仁

洗去殼紫石英火煨七次遠志甘草煮乳香去心龍齒各一兩

右為末煉蜜丸梧子大硃砂為衣每服七十丸空心温酒棗湯下

單解分清飲 治真元不足下焦虛寒小便白濁頻數無度凝白如油光彩不定凝脚澄下凝如糖

益智仁 川草薢 石菖蒲 烏藥 各等分

右剉每服五錢水煎入鹽一捻食前服 一方加茯苓甘草

桑螵蛸散 經驗方 專治男子小便日數十次稠如米泔或赤或白心神恍惚瘦悴減食此說多因房

勞過度耗傷真氣得之

桑螵蛸 煮水 遠志 甘草湯煮 菖蒲 炒 龍骨 煨研 人參 去芦 茯苓 去皮 神桂 去皮 當歸 酒洗 龜甲 醋炙 各一兩

右為末每服二錢臨睡時人參湯下

猪苓丸 即前半夏丸 治年壯氣盛慙動所願不得意媯於外夢遺白濁右用半夏一兩破如豆大用

猪苓末四兩先將一半炒半夏黃色不令焦地上空出火毒半日取半夏為末糊丸如梧子候乾

更用前猪苓末二兩炒藥微裂同於沙甑內藏之空心温酒鹽湯下四五十丸

一方 治心經伏暑小便赤濁

人參 白朮 赤茯苓 去皮 香薷 澤瀉 木猪苓 去皮 蓮肉 麥門冬 去心 各等分

右咬咀每服四錢水一盞煎服

一方 治小便白濁出髓條

酸棗仁 炒 白朮 人參 白茯苓 破故紙 益智 洗淨 大茴香 左顧牡蠣 童便煨 各等分

右為末加青鹽酒為丸如梧桐子大每服三十丸温酒米飲任下

秘精丸 濟生方 專治下虛胞寒小便白濁或如米泔如凝脂

牡蠣 煨 兔絲子 酒蒸焙 龍骨 生用 五味子 韭子 炒 白茯苓 去皮 白石脂 煨 桑螵蛸 酒炙 各等分

足下... 心去付徐

赤白濁

右為末酒糊丸如梧桐每服七十丸空心鹽酒下

韭子丸 濟生方 治膀胱腎冷小便白濁滑數無度

赤石脂 煨 韭子 炒 川牛膝 酒浸 牡蠣 煨 覆盆子 酒浸 附子 炮去皮 桑螵蛸 酒炙 鹿茸 酒浸 肉苁蓉

酒浸 龍骨 生各一兩 雞臍脰 燒灰 沉香 鎊不見火各半兩

右為末酒糊丸如梧桐子每服七十丸空心鹽酒鹽湯任下

附子八味丸 治腎氣虛乏下元冷憊臍腹痛脚膝緩弱夜多漩溺淋澀白濁 見補損類

○廣按赤白濁雖多屬濕熱然亦有老人因虛寒而致之者已上二方乃治虛寒濕寒之劑也

遠志丸 濟生方 治因事有驚心神不定夜夢驚墜小便白濁

遠志 去心煮 石菖蒲 各二兩 茯神 去木 白茯苓 去皮 人參 龍齒 各一兩

右為末煉蜜丸梧子大辰砂為衣每七十丸熱湯下

葉氏育神散 簡易方 理心氣不寧怔忡健忘夜夢驚恐小便白濁 見驚悸類

妙應丸 治赤白濁

真龍骨 辰砂 石菖蒲 各半 川練子 取肉 白茯苓 益智仁 石蓮肉 縮砂仁 各半 桑螵

蛸 瓦上 兔絲子 酒浸一宿 焙各半兩 牡蠣 脚草鞋包火煨 細研

右以山藥碎炒為糊丸如梧桐子大每服五十丸間日煎人參酸棗仁湯下臨臥粳米飲湯下

丹溪心法附錄卷之九

痰門

痰二十七附痰熱

丹溪心法

○脉浮當吐 久得脉濇卒難開也必費調理 大凡治痰用利藥過多致脾氣虛則痰易生而多

濕痰用蒼朮白朮 熱痰用青黛黃連芩 食積痰用神麴麥芽山查 風痰用南星 老痰用

海石半夏瓜蒌香附五倍子作丸服 痰在膈上必用吐法瀉亦不能去 風痰多見奇証 濕痰

多見倦怠軟弱 氣實痰熱結在上者吐難得出 痰清者屬寒二陳湯之類膠固稠濁者必用吐

熱痰挾風外証為多熱者清之 食積者必用攻之兼氣虛者用補氣藥送 痰因火盛逆上者

以治火為先白朮黃芩軟石膏之類 內傷挾痰必用參芪白朮之屬多用姜汁傳送或加半夏虛

甚加竹瀝 中氣不足加參朮 痰之為物隨氣升降無處不到 脾虛者宜清中氣以運痰降下

二陳湯加白朮之類兼用升麻提起 中焦有痰則食積胃氣亦賴所養卒不便虛若攻之盡則虛

矣 痰成塊或吐咯不出兼氣鬱者難治 痰在腸胃間者可下而愈在經絡中非吐不可吐法中

就有發散之義焉假如癰病因驚而得驚則神出舍舍空則痰生也血氣入在舍而拒其神不能歸

焉 血傷必用姜汁傳送 黃芩治熱痰假其下火也 竹瀝滑痰非姜汁不能行經絡 五倍子

能治老痰佐他藥大治頑痰 二陳湯一身痰都治管如要下行加引下藥在上加引上藥 凡用

吐藥宜升提其氣便吐也如防風山梔川芎桔梗芽茶生薑薑汁之類或用瓜蒂散 凡風痰病必

用風痰藥如白附子天麻雄黃牛黃片芩姜蠶猪牙皂之類 諸吐法另具於後

○凡人身上中下有塊者多是痰問其平日好食何物吐下後方用藥 許學士用蒼朮治痰成窠

足下痰心去付余

痰門



囊邊行極妙痰挾瘀血遂成窠囊 眩運嘈雜乃火動其痰用二陳湯加山梔子黃連黃芩之類  
噫氣吞酸此食鬱有熱火氣上動以黃芩為君南星半夏為臣橘紅為使熱多加青黛 痰在脇下  
非白芥子不能達 痰在皮裏膜外非姜汁竹瀝不能導達 痰在四肢非竹瀝不開 痰結核在  
咽喉中燥不能出入用化痰藥加鹹藥軟堅之味瓜蒌仁杏仁海石桔梗連翹少佐礞硝以姜汁蜜  
和丸噙服之 海粉即海石熱痰能降濕痰能燥結痰能軟頑痰能消可入丸子末子不可入煎藥  
枳實瀉痰能衝墻壁 小胃丹治膈上痰熱風痰濕痰肩膊諸痛能損胃氣食積痰實者用之  
○喉中有物咯不出嚥不下此是老痰重者吐之輕者用瓜蒌葶氣實必用荆瀝 天花粉大能降  
膈上熱痰 痰在膈間使人顛狂或健忘或風痰皆用竹瀝亦能養血與荆瀝同功治稍重能食者  
用此二味効速穩當二瀝治痰結在皮裏膜外及經絡中痰必佐以姜汁 薑汁治血滯不行中焦  
有飲自然汁冷喫兩三銀盞必胃中煩燥不寧而後愈 參萸丸能消痰 見吞酸類

入方

青礞石丸 解食積去濕痰重在風化硝

南星

二兩切作片用白凡末五錢水 浸一二日曬乾 又云一兩 片黃芩 姜汁炒半夏 一兩 風石 二兩 枳實 炒

各一兩

法製硝 用蘿蔔水煮化去毒瀘令細入臘月牛胆內 礞石 二兩 掃碎煨硝 二兩 同入 縛定鹽泥固濟晒乾火煨紅候冷取出

右為末神麴糊丸梧子大每服三五十九白湯下

一方加蒼朮半兩滑石一兩看病冷熱虛實作湯使 一本礞石南星各一兩無枳實

又方 半夏 二兩 白朮 一兩 茯苓 七錢 黃芩 礞石 一兩 風化硝 二錢

右為末同煎

潤下丸 降痰甚妙

南星 一兩 半夏二兩 各依 黃芩 黃連 略一橘紅 再斤以水化 鹽五錢 甘草 炙一兩

右為末蒸餅丸如菘豆大每服五七十丸白湯下

一方單用陳皮半斤鹽半兩水拌煮陳皮候乾焙燥為末入甘草末一兩炊餅同上丸亦好去胃  
膈有痰兼嗽上熱加青金有熱濕加蒼朮或加參芎看虛實作湯使

又方 治濕痰喘急止心痛

半夏 一味不拘多少香油炒

右為末粥丸梧子大每服三五十九丸姜湯下

又方 黃芩 香附 半夏 姜製貝母 已上治濕痰加瓜蒌仁青黛作丸子治熱痰

又方 燥濕痰亦治白濁因痰者

南星 半夏 各一兩 蛤粉 二兩

右為末神麩糊丸如梧子大青黛為衣每服五十丸姜湯下 濕痰加蒼朮 食積痰加神麩麥

芽山查 熱痰加青黛

中和丸 治濕痰氣熱

蒼朮 黃芩 半夏 香附 等分

右為末粥丸如梧子大每服五七十丸姜湯下

又方 治痰嗽

黃芩 酒洗 兩半 貝母 南星 略一滑石 白芥子 各半 風化硝 二錢 半瓶 其

右為末湯泡蒸餅丸服

導痰湯 南星炮一兩 橘紅去白一兩 赤茯苓去皮一兩 枳殼去穢一兩 甘草炙半兩 半夏四兩

水煎生姜五片食前服

千縉湯 治喘 半夏七箇 泡製每筒作四片 皂角去皮炙一寸 甘草炙一寸

右咀作一服生姜如指大煎

小胃丹 芫花好醋浸勻過一宿瓦器不住手攪炒令黑不要焦 甘遂濕麩裏長流水浸半日再水洗晒乾 又大戟長流水

再洗晒乾 各半兩 大黃酒潤炒熱焙乾一兩半 黃柏三兩焙炒

右為末粥丸麻子大每服二三十丸臨卧津液吞下或白湯一口送下取其鬲上之濕痰熱積以

意消息之欲利則空心服

又方甘遂大戟減三分之一硃砂為衣名辰砂化痰丸

一方加木香檳榔各半兩蒸餅丸每服七八丸至十丸止

治酒痰 青黛 瓜蒌

右為末姜蜜丸噲化救肺

治鬱痰 白殭蚕 杏仁 瓜蒌仁 訶子 貝母 五倍子

右為末糊丸梧子大每服五十丸白湯下

導痰丸 吳茱萸製二錢 茯苓一兩 黃連半兩 滑石七錢 蒼朮油浸一兩

右為末糊丸梧子大每服八九十九丸姜湯下

茯苓丸 出千金方百一選方同

半夏四兩 茯苓二兩 枳殼一兩 風化硝半兩

右為末蒸餅或神麩姜汁糊丸梧子大每服三十丸姜湯下 此方治中脘停痰臂痛難舉手足不得轉有勁

又方 治食積痰火并瀉胃火

軟石膏不拘多少研細

右用醋糊丸如菉豆大每服二十九丸白湯下

又方 治陰虛內多食積痰

川芎七錢 黃連 瓜蒌仁 白朮 神麴 麥芽 各一兩 青黛 半兩 人中白 三錢

右為末姜汁蒸餅丸服

久吐痰喘 杏仁 去皮尖生用 來復丹 炒

右等分為末粥丸麻子大每服十五丸白湯下

黃連化痰丸 即黃連清化丸

半夏 一兩 黃連 一兩 吳茱萸 湯洗一錢 桃仁 管研 陳皮 一兩 半

右為末麴糊丸菉豆大每服一百丸姜湯送下

白玉丸 巴豆 三泔 筒南星 半夏 滑石 輕粉 各三錢

右為末皂角仁浸濃汁梧子大每服五七丸姜湯下

黃瓜萎丸 治食積痰壅滯喘急

瓜萎仁 半夏 山查 神麴 炒各等分

右為末瓜萎水凡姜湯竹瀝送下二三十丸

又方 瓜萎仁 半夏 一兩 蒼朮 二兩 香附 二兩 半 黃芩 黃連 半兩

又方 瓜萎仁 黃連 半兩 半夏 一兩

右為末糊丸梧子大每服五十丸

抑痰丸 瓜蒌仁 一兩 半夏 二錢 貝母 三錢

右為末蒸餅丸如麻子大每服一百丸姜湯下

清膈化痰丸 黃連 黃芩 一兩 黃柏 山梔 半兩 香附 一兩 半 蒼朮 二兩

右為末蒸餅丸白湯下

搜風化痰丸 人參 槐角子 殭蚕 白礬 陳皮 去天麻 荊芥 略 一兩 半 夏 汁 炒 兩 姜 辰砂 另 半 兩

右為末姜汁浸蒸餅為丸辰砂為衣服四十丸姜湯下

墜痰丸 治痰飲

黑丑 頭末 二兩 枳實 炒 一兩 半 白礬 三錢 枯朴硝 二錢 枳殼 半兩 猪牙皂角 一錢 酒炒

右為末用蘿蔔汁丸每服五十丸雞鳴時服初則有糞次則有痰

治濕痰 蒼朮 三錢 白朮 六錢 香附 一錢 半 白芍 酒浸炒 二錢 半

右為末蒸餅丸服

治肥人濕痰 苦參 半夏 各 一兩 半 白朮 三錢 半 陳皮 一錢

右咀作一服姜三片竹瀝半盞水煎食遠吞三補丸十五丸

祛風痰行濁氣

明礬 一兩 防風 二兩 川芎 猪牙皂角 麝金 各 一兩 蜈蚣 二條 用赤脚黃

右為末蒸餅丸梧子大每三十丸食前茶湯下春以芭蕉湯探吐

上焦風痰 瓜蒌 黃連 半夏 牙皂

姜汁浸炊餅丸

痰氣方 片苓 炒 半 夏 半 兩 白朮 白芍 一兩 茯苓 陳皮 三錢

右為末姜汁泡蒸餅丸服

利膈化痰丸 南星 蛤粉研細 半夏 瓜蒌仁 貝母去心治肺 香附半兩便浸

右為末用猪牙皂角十四挺敲碎水一碗半煮杏仁去皮尖一兩煮水將乾去皂角搗杏仁如泥入前藥搜和再入姜汁泡蒸餅丸如棗豆大青黛為衣每服五十丸姜湯下

清膈丸 黃芩炒 酒浸南星四兩生用 半夏湯泡七次

右為末姜汁打糊丸

清痰丸 專清中脘熱痰積

烏梅 枯礬 黃芩 蒼朮 陳皮 滑石炒 青皮 枳實略半 南星 半夏 神麴炒 山楂

乾生姜 香附各一兩

右為末湯浸蒸餅糊丸服

充按丹溪治病以痰為重諸病多因痰而生故前諸方間有別出者亦其平日常用故不另開於附方觀者詳焉

附諸賢論

劉宗厚曰痰之為病仲景論四飲六証無擇叙內外三因俱為切當蓋四飲則叙因痰而顯諸證者

三因則論其因有所傷而生痰者也唯王隱君論人之諸疾悉出於痰此發前人所未論可謂深

識痰之情狀而得其奧者矣製滾痰丸一方總治斯疾因為簡便較之仲景三因有表裏內外而

分汗下溫利之法則疎濶矣況又有虛實寒熱之不同者哉夫痰病之原有因熱而生痰者亦有

因痰而生熱者有因風寒暑溼而得者有因驚而得者有因氣而得者有因酒飲而得者有因食

積而得者有脾虛不能運化而生者有腎虛不能降火而生者若熱痰則多煩熱風痰多成癰瘰

奇證冷痰多成骨痺濕痰多倦怠軟弱驚痰多成心痛癱疾飲痰多成脇痛臂痛食積痰多成癖塊痞滿其為病狀種種難名王隱君論痰中頗為詳盡學者但察其病形脉證則知所挾之邪隨其表裏上下虛實以治也若夫子和謂飲無補法必當去水故用吐汗下之三法治人常愈又論熱藥治痰之誤固為詳切亦有挾寒挾虛之証不可不論夫久痰凝結膠固不通狀若寒凝不用溫藥引導必有拒格之患況有風寒外束痰氣內鬱者不用溫散亦何以開鬱行滯又有血氣虧乏之人痰客中焦閉塞清道以致四肢百骸發為諸病理宜導去痰滯必當補接兼行又難拘於子和之三法也大凡病久淹延卒不便死者多因食積痰飲所致何以然者蓋胃氣亦賴痰結所養飲食雖少胃氣卒不便虛故也亦有治痰用峻利過多則脾氣愈虛津液不運痰反生而愈盛法當補脾胃清中氣則痰自然運下此乃治本之法也謂腎中之王道者正此類也

附脉理

脉訣舉要曰偏弦為飲或沉弦滑或結或伏痰飲中節

脉理提綱曰痰脉弦滑

附諸方

金沸草散 和濟方 治外感風寒痰氣內鬱咳唾稠粘

參蘇飲 和劑方 亦治外感風寒痰飲停積胸膈咳嗽氣促言語不能相續者 並見傷風類

小青龍湯 和劑方 治外感風寒內生溢飲支飲倚息喘滿不得安臥者 見咳嗽類

法製半夏 御藥院方 消飲化痰健脾順氣

右用大半夏以湯泡洗一遍去臍再泡洗如此七遍焙乾用濃米泔浸一日夜取出控乾每半夏

一兩用白礬一兩半研細溫水化浸半夏止留水兩指許頓放浸冬月於暖處頓放浸五日夜取

出焙乾再用鉛白霜一錢溫水化又浸一日夜通前七日盡取出再用醬水放慢火內煮勿令滾  
候醬水極熱取出焙乾於銀石器或磁器內收貯每服一二粒食後細嚼生薑湯下 又一法依  
前製成半夏每一兩用龍腦半錢研極細同飛過硃砂於半夏上再為衣却鋪上灯草一層約厚  
一指單排半夏於上再用灯草蓋約厚一指以炒豆焙之候乾取出於器內收貯每服一二粒細  
嚼後溫水下或冷水送下

橘皮半夏湯宣明方痰嗽久不已者

橘皮去白半兩半夏二錢半湯洗七次

右為末分作二服每服水一盞半入生薑十片同煎六分溫服

茯苓半夏湯 治停痰留飲胸膈滿悶嘔逆惡心吐痰水

茯苓去皮三兩半夏湯泡七次五兩

右咬咀每服四錢水一盞姜七片煎六分空心服

大半夏湯御藥院方治痰飲及脾胃不和

半夏 陳皮 茯苓各二錢半

右咬咀水二盞生薑二錢半煎至八分去滓食後溫服

二陳湯和劑方治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩心悸或因食生冷飲酒過度脾胃不和並宜服之

半夏湯洗七次去滑衣橘紅是陳皮去白者各五兩白茯苓去皮三兩甘草炙一兩半

右咬咀每服四錢水一盞生薑七片烏梅一箇同煎至六分熱服

○廣按此方半夏豁痰燥濕橘紅消痰利氣茯苓降氣滲濕甘草補脾和中蓋補脾則不生濕燥  
濕滲濕則不生痰利氣降氣則痰消解可謂體用兼該標本兩盡之藥也今人但見半夏性燥



便以他藥代之殊失立方之旨若果血虛燥症用姜汁製用何妨抑嘗論之二陳湯治痰之主藥也如寒痰加附子姜桂濕痰加蒼白二朮食積痰加麩藥山查熱痰加芩連梔子風痰加南星皂角燥痰加瓜蒌青黛鬱痰加枳殼香附老痰加海石朴硝乃合其宜

丁香半夏丸 和劑方 治脾胃宿冷胸膈停痰嘔吐惡心吞酸噎氣心腹痞滿不思飲食

肉豆蔻 木香 丁香 人參 陳皮 去白各半 藿香葉 半兩 半夏 湯泡七次 姜製 三兩

右為末以生姜汁煮麩糊丸如小豆大每服二三十丸姜湯下

○已上數方治寒痰之劑

平胃散 治有濕痰倦怠軟弱嗜臥沉困無力 方見中濕

五苓散 治臍下有悸停飲癰眩吐涎沫 方見濕熱

化痰丸 本事方 治停痰宿食

半夏 湯泡 人參 去芦 桔梗 細切 白朮 枳實 香附子 白茯苓 略 前胡 去芦 甘草 略半

右為末用半夏姜汁煮糊丸如梧桐子大每服四五十丸姜湯下

檳榔散 濟生方 治胸膈停滯痰飲腹中虛鳴食不消化時或嘔逆

杏仁 法皮 旋覆花 枝 半夏 湯洗七次 枳實 各一兩 甘草 五錢 桔梗 去芦 白朮 各一兩 人參 五錢 乾姜 炮 橘紅 各一兩

右咬咀每服四錢水一盞半姜五片煎至八分溫服

半夏湯 瑞竹堂方 順陰消痞滿消酒化痰

半夏 一兩 橘紅 去白 桔梗 去芦 枳實 去穢炒

右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至七分半饑半飽熱服

海藏五飲湯 按詳方 一留飲心下二癖飲脇下三痰飲胃中四溢飲膈上五流飲腸間凡此五飲酒

後傷寒飲冷過多故有此疾

旋覆花 人參 陳皮 枳實 白朮 茯苓 厚樸 半夏 澤瀉 猪苓 前胡 桂心  
芍藥 甘草 各等分

右到每兩分四服水二盞生姜十片同煎至六分取清溫服不拘時候忌食肉生冷滋味等物因酒多飲加葛根葛花砂仁

蠲飲枳實丸 拔粹方 逐飲消痰導滯清膈

枳實 去穢炒 半夏 湯泡七次 陳皮 去白 各二兩 黑牽牛 半斤取頭末 三兩

右為末水煮麩糊為丸如梧桐子大每服五十丸食後生姜湯下

葛花解醒湯 拔粹方 治酒飲太過嘔吐痰逆心神煩亂胸膈痞塞手足戰搖飲食減少小便不利 見類

一方 治痰飲流注疼痛

用大半夏二兩湯浸為末風化朴硝二兩生姜自然汁糊丸如梧桐子大每服五丸姜湯下痛在上臨臥服痛在下空心服

○已上數方治濕痰食積痰之劑

清氣化痰丸 古巷方 清頭目涼膈化痰利氣

半夏 湯洗七次 二兩 陳皮 去白 茯苓 去皮 各一兩 薄荷葉 荆芥穗 各五錢 黃芩 酒浸炒 連

翹 梔子仁 炒 桔梗 去芦 甘草 炙 各一兩

右為末姜汁煎水打糊為丸如梧子大每服五十丸食後臨臥各一服如腸胃燥實加酒炒大黃

芒硝各一兩

○廣按此方即二陳湯與涼膈散相合是也蓋痰因火動故作胃膈痞滿頭目昏眩今因二陳以

足下

豁痰利氣涼膈以降火散風熱何病之不瘳哉  
和藥院方治三焦氣滯痰飲不利胸膈痞滿咳唾稠粘面目熱赤肢體倦怠不思飲食常服

升降滯氣清膈化痰

木香 檳榔 青皮去白 陳皮去白 京三稜煨 枳殼去穢 半夏洗七次 各一兩 大黃煨 一兩 黑牽牛微炒 二兩

右為末水糊丸梧桐子大每服四五十九丸姜湯食後下

利膈丸 按粹方 治風勝痰實喘滿咳嗽風氣上攻

黑牽牛炒四兩 半夏洗 皂角去皮 蘇青皮去白 槐角子炒 木香略 一檳榔 大黃各半兩

右為末生姜糊丸如梧桐子大每服七十丸食後生姜湯下

開結枳實丸 御藥院方 宣導滯氣消化痰飲升降陰陽通行三焦蕩滌脾胃流暢大小腸開導膀胱

專主胃中痞逆惡心嘔噦飲酒不消宿食停積兩脇膨悶咽嗝不利上氣喘嗽黃疸等症

枳實炒 白朮 半夏製 南星炮 白礬枯 苦苧蔴炒 大黃 青皮去白 各五錢 木香三錢 黑牽牛

頭末二兩 大皂角炙去皮 旋覆花各一兩

右為末生姜汁糊為丸梧桐子大每服五十丸姜湯下無時婦人乾血氣膈實腫滿或大便不通小

便不利生姜葱白湯下

王隱君滾痰丸

括曰翫裏翻身甲掛金於今頭戴草堂深相逢二八求斤正硝煨青礬倍若沉十七兩中零半兩

水凡桐子意當斟子般恠証如神效水瀉雙身却不任

大黃酒蒸 黃片苓酒洗淨各八兩 沉香半兩 礞石線 兩掩碎煨 一兩用入小砂 鐵內蓋之

一方加硃砂二兩 研為細末為衣

右為細末水丸梧子大每服四五十九丸量虛實加減服茶清溫水任下臨卧食後服

按此以大黃黃芩為君大瀉陽明濕熱之藥礞石以墜痰沉香則引諸氣上而至天下而至泉為使也

木香七錢板柳七錢厚樸一兩人參去蘆香葉當歸甘草炙枳實炒大黃酒浸焙

右為末水浸蒸餅丸如梧子大每服五十九丸溫水下食後或臨卧服

○已上數治熱痰之劑

辰砂化痰丸和劑方治風化痰安神定志利咽膈清頭目

白礬枯過別研辰砂飛研各半兩半夏洗七次姜汁搗作麩三兩南星一兩炮

右以白礬半夏麩天南星為末和勻生姜汁煮麩糊丸如梧桐子別用辰砂為衣每服二十九丸食後姜湯下

半夏利膈丸御藥院方治風痰壅盛頭疼目眩咽膈不利涕唾稠粘并治過酒停飲嘔逆惡心胸脇

引痛腹內有聲

半夏湯洗三兩白朮白茯苓去皮白礬生人參去蘆滑石貝母略白附子生用天南星生用

右為末麩糊丸如梧桐子大每服三十九丸食後姜湯下

葉氏分涎方簡易方治風痰留滯膈間喘滿惡心涎唾不利

陳皮去白棟參枳實桔梗半夏洗七次令最每個切天南星去另皮蒸餅包灰火燻香熟取出各等分

右吹咀每服二錢水一盞姜十片同煎食後服

靈砂白丸子澹寮方治元氣虛弱痰氣上攻風痰壅塞嘔吐不已

靈砂青州白丸子末各一兩各研

右為末和勻以生姜自然汁打黍米糊丸如梧桐子大每服三十九丸空心人參湯或棗湯下

大人參半夏丸 宣明方 化痰墜涎止咳定喘治諸痰不可盡述

茯苓 去皮人參 天南星 薄荷葉 各半 乾生姜 半夏 白礬 生 寒水石 蛤粉 二兩 藿香葉 二兩

右為麵糊丸如小豆大生薑湯下二三十丸食後溫水亦得一方加黃連半兩黃蘗一兩水丸取效愈速治酒病調和臟腑尤宜服之

治風痰不下 聖惠方

荊芥 四兩 白礬 生一兩 槐角 生二兩 陳皮 半夏 各二兩半

右為末水糊為丸如梧桐子大每服四十丸生薑湯下

辰砂祛痰丸 聖惠方 治酒食過多酸醜作成痰飲聚於胸中凝則嘔逆惡心流則臂痛頭目昏眩腰脚疼痛深則左癱右瘓淺則蹶然倒地此藥神效

硃砂 入藥一兩水飛一半為衣 半夏 四兩 槐角 炒 陳皮 白礬 生 荊芥 各一兩 生薑 四兩與半夏製作餅陰乾

右為末姜汁打糊丸如梧桐子每服五十丸生薑湯皂角子湯任下忌動風動氣物食後溫服

化痰丸 瑞竹堂方 快脾順氣化痰消食

半夏 洗淨 皂角 切碎 天南星 去皮膜 生薑 白礬

右件各四兩用砂鍋內同水煮天南星無白點為度揀去皂角不用將半夏天南星生薑切細晒

乾如無日色慢火焙乾加後藥

青皮 去穢 陳皮 乾葛 紫蘇子 神麩 麥蘗 炒 蘿蔔子 炒別 山查 香附子 去毛 杏仁 去皮另研

一方加枳實茯苓

右十味各一兩合煎藥碾末姜汁蒸餅打糊丸如梧桐子大每服五七十丸食後服臥茶酒任下

利膈化痰丸 白朮 四兩 皂角 去皮弦子三兩 生半夏 生白礬

右將皂角搽水半碗浸半夏白礬春五夏三秋七冬十日不用皂角晒乾為末姜汁糊為丸如梧桐子大每服三十丸姜湯下

○已上數方治風痰之劑

四七湯 和齊方 治七情氣鬱結聚痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉之間咯不出嚥不下并治中脘

痞滿痰涎壅盛上氣喘急

半夏 五兩 茯苓 四兩 紫蘇 三兩 厚樸 三兩

右吹咀每服四錢水一盞半生姜七片棗子一枚煎至六分熟服婦人有孕惡阻亦宜服之但半

夏用姜汁製過男子因氣而小便白濁用此湯下青州白丸子有效

三仙丸 百一選方 治中脘氣胸膈煩滿痰涎不利頭目不清

南星 皮生去半夏 湯洗七次二味各五兩為末用生薑自然汁和不可太軟但手捏得聚為度攤在篩中用楮葉蓋之令發黃色曬乾收之類在五六月內攸曲如醬黃法

香附子 畧炒於磚石上磨去毛 五兩

右為末麵糊丸如梧桐子大每服四十九丸食後姜湯下機要去香附加橘紅名玉粉丸治氣痰

沉香和中丸 秘方 治証同前

陳皮 白法青皮 枳殼 檳榔 木香 黃芩 青礞石 煨硝煨各半兩 大黃 一兩一分 沉香 二錢

滑石 二兩 黑牽牛 頭末二兩二錢

右為末滴水為丸如梧桐子大每服五十丸茶清下臨臥

節齊化痰丸

論曰痰者病名也人之一身氣血清順則津液流通何痰之有惟夫氣血濁逆則津液不清薰蒸成聚而變為痰焉痰之本水也原於腎痰之動濕也主於脾古人用二陳湯為治痰通劑者所以

實脾燥濕治其標也然以之而治濕痰寒痰飲痰涎則固是矣若夫痰因火上肺氣不清咳嗽時作及老痰鬱痰結成粘塊凝滯喉間吐咯難出此等之痰皆因火邪炎上薰於上焦肺氣被鬱故其津液之隨氣而升者為火薰蒸凝濁鬱結而成歲月積久根深蒂固故名老名鬱而其源則火邪也病在上焦心肺之分咽喉之間非中焦脾胃濕痰冷痰飲痰涎之比也故湯藥難治亦非半夏茯苓蒼朮枳殼南星等藥所能治也惟在開其鬱降其火清潤肺金而消化凝結之痰緩以治之庶可取效今製一方於后

天門冬去心 黃芩酒炒 海粉另研 灰菱仁另研 橘紅去白 桔梗去芦 香附子地研淡盐水浸炒 連翹五錢 青黛另研 芒硝三錢 另研

右為極細末煉蜜入生姜汁少許和藥末杵極力勻丸如小龍眼大噙化一丸或嚼爛清湯細嚥之或丸為細丸如黍米大淡姜湯送下五六十丸

此等老痰大率飲酒之人多有之酒氣上升為火肺與胃脘皆受火邪故鬱滯而成此方用天門冬黃芩泄肺火也海粉芒硝鹹以軟堅也灰菱仁潤肺降痰香附米開鬱降氣連翹開結降火青黛解鬱火故皆不用辛燥之藥

○已上數方治鬱痰老痰之劑

蘇子降氣湯和劑方治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛

川當歸去芦 甘草炙 前胡去芦 肉桂皮厚樸各二兩 半夏夏 紫蘇子各 陳皮去白

右咬咀每服五錢水一盞姜三片棗一枚煎服不拘時

俞山人降氣湯和劑方治上盛下虛痰氣壅盛或喘或滿咽乾不利并治脚氣上攻煩渴引飲

前胡去芦 五加皮姜制 黃芪 肉桂 當歸去芦 半夏夏 紫蘇子 陳皮去白 厚樸去皮

妙各一兩 桔梗 羌活去芦各五錢 甘草一兩 乾姜炮 附子炮去皮人參去芦各五錢

右吹咀每服五錢水一盞半紫蘇三葉姜三片棗一枚煎服

黑錫丹和劑方 治痰氣壅塞上盛下虛心火熾腎水枯竭及婦人血海久冷無子或赤白帶下皆

肉桂去皮半兩 沉香 附子炮去皮臍 胡芦巴酒浸 破故紙 茴香船上者妙 肉豆蔻麩裹煨 陽起

石研細水飛 金鈴子蒸去皮 木香各一兩 硫黃 黑錫去滓各二兩

右用黑盞或新鉄鉢內如常法結黑錫硫黃砂子地上出火毒研令極細餘藥並杵羅為末一處

和勻自朝至暮必研令黑光色為度酒糊為丸如梧桐子大陰乾入布袋內擦令光瑩每服四十

粒空心鹽姜湯下女人艾費湯下

靈砂丹和劑方 治上盛下虛痰涎壅塞此藥最能鎮墜升降陰陽安和五臟扶助元氣

水銀一兩 硫黃四兩

右用新鉄鉢炒成砂有烟即以醋洒候研細入水火鼎醋調赤石脂封口鉄線扎縛晒乾益泥固

濟用炭二十斤煨如鼎裂筆蘸赤石脂頻抹火盡為度經宿取出研為末糯米糊為丸如麻子大

每服二十九空心棗湯米飲人參湯任下

○廣按已上四方並係類聚溫熱之藥而出證皆云治上盛下虛氣不升降蓋謂盛者即心火之

炎虛者即腎水之弱火炎水弱則有升無降故津液湧而為痰稠粘膠固凝滯於胃膈之間非

金石丹藥溫熱香燥之劑而能流通開散之乎書云重可以去怯正所謂劫劑也用此劫劑之

後又當用兼補兼消之藥繼之如六味地黃丸之類是也

金匱腎氣丸即六味地黃丸 治腎氣有飲故用此藥補腎逐水見補損

○廣按腎水虛弱則心火上炎以致津液敗濁而為痰涎用此劑補腎逐水乃端本之藥也煎黑



本丹... 錫丹等劑溫脾劫痰乃治標之藥也

六君子湯 治脾虛不進飲食嘔吐痰水 方見調補脾胃

白朮湯 按料方 治胃中虛損及痰吐者

半夏麴 半兩 白朮 一錢 枳椇 二錢 半木香 甘草 炙各二錢 茯苓 二錢

右為末每服二錢生薑湯調下食前服

八味丸 治脾胃兩虛噉唾而不咳者 方見補損

○已上數方治虛痰之劑

○廣按痰本津液因熱而成熱則津液薰蒸而稠濁故名為痰也痰之為物隨氣升降無處不到或在臟腑或在經絡所以為病之多也若天寒痰濕痰熱痰則易治至於風燥痰老痰則難治也分而治焉寒則溫之濕則燥之熱則清之風則散之燥則潤之老則軟之總而治焉用人參甘草以補脾半夏白朮以燥濕陳皮青皮以利氣茯苓澤瀉以滲水是舉其綱也如寒痰加以附子姜桂濕痰加以蒼朮厚樸食積痰加以麴蘖山查熱痰加以岑連梔子風痰加以南星皂角燥痰加以瓜蒌杏仁鬱痰加以枳殼香附老痰加以海石芒硝是張其目也雖然痰證又有挾虛者不可不加補藥焉如挾氣虛加以四君血虛加以四物脾虛治以六君腎虛治以六味分其表裏上下審寒熱虛實而施治之未有不中其情者

痰飲治例 出明醫雜者

王節齋曰痰屬濕乃津液所化因風寒濕熱之感或七情飲食所傷以致氣逆液濁變為痰飲或吐咯上出或凝滯胃膈或留聚腸胃或流注經絡四肢隨氣升降遍身上下無處不到其為病也為喘為欬為惡心嘔吐為痞隔壅塞閉格異病為泄為眩暈為懵雜怔忡驚悸為癩狂為寒熱為

痛腫或胃間輒輒有聲或背心一點常如冰冷或四肢麻痺不仁皆痰所致百病中多有兼痰者世所不知也痰有新久輕重之殊新而輕者形色清白稀薄氣味亦淡久而重者黃濁稠粘凝結欬之難出漸成惡味酸辣腥臊鹹苦甚至帶血而出治法痰生於脾胃宜實脾胃燥濕又隨氣而升宜順氣為先分導次之又氣升屬火順氣在於降火熱痰則清之濕痰則燥之風痰則散之鬱痰則開之頑痰則軟之食積痰則消之在上者吐之在中者下之又中氣虛者固中氣以運痰若攻之太重則胃氣虛而痰愈盛矣

主方二陳湯 橘紅 半夏 湯泡 白茯苓 甘草 生姜

右方摠治一身之痰如要下行加引下藥上行加引上藥

濕痰多軟如身體倦怠之類加蒼朮白朮

寒痰痞塞胸中倍加半夏甚者加麻黃細辛烏頭之類痰厥頭痛亦加半夏

風痰加南星枳殼白附子天麻姜礮猪牙皂角之類氣虛者更加竹瀝氣實加荆瀝俱用姜汁熱痰加黃芩黃連痰因火盛逆上降火為先加白朮黃芩軟石膏黃連之類眩暈嘈雜者火動其痰也亦如山梔黃連黃芩

血虛有痰者加天門冬知母瓜蒌仁香附米竹瀝姜汁 滯血者更加黃芩白芍藥桑白皮

血滯不中行焦有飲者取竹瀝加生姜韭菜自然汁吃三五銀盞必胃中燥煩不宣後愈

氣虛有痰者加人參白朮 脾虛者宜補中虛以運痰降下加白朮白芍藥神麩麥芽兼用升

麻提起 內傷挾痰加人參黃耆白朮之類姜汁傳送或加竹瀝尤妙

食積痰加神麩麥芽山楂炒黃連枳實以消之甚者必用攻之宜凡藥兼血虛者用補血藥送

下中焦有痰者食積也胃氣亦賴所養卒不便虛若攻之盡則虛矣

老痰用海石半夏瓜蒌仁香附米連翹之類五倍子佐他藥大治頑痰宜凡藥 喉中有物咯  
不出嚙不下此痰結也用藥化之如鹹藥軟堅之類宜瓜蒌仁杏仁海石桔梗連翹香附少  
佐樸硝姜汁煉蜜和丸噙服之脉脉濇者卒難開必費調理氣實痰熱結者吐難得出或成  
塊吐咯不出氣滯者難治

痰在膈上必用吐法瀉之不吐膠固稠濁者必用吐脉浮者宜吐痰在經絡間非吐不可吐中  
就有發散之義凡用吐藥必升提其氣便吐如防風川芎桔梗芽茶生姜薑汁之類或瓜蒂  
散凡吐用布繫勒肚於不通風處行走

痰在腸胃間可下而愈枳實甘遂巴豆大黃芒硝之類凡痰用利藥過多脾氣易虛則痰而多  
痰在脇下非白芥子不能達

痰在皮裏膜外非姜汁竹瀝不可及在四肢非竹瀝不開在經絡中亦用竹瀝必佐以生姜  
汁膈間有痰或癩狂或健忘或風痰俱用竹瀝與荆瀝同功氣虛少食用竹瀝氣實能  
凡人身上中下有塊是痰也問其平日好食何物吐下後方用藥

凡人頭面頸項身中有結核不痛不紅不作膿者皆痰注也宜隨處用藥消之

滾痰丸攻瀉腸胃痰積及小兒食積痰急驚風痰盛者最為要藥常宜合備但須量人虛實而  
用之

○痰熱 新增

附諸賢論

劉宗厚曰夫痰熱之原有因熱而生痰者有因痰而生熱者廣按因熱而生痰者熱則薰蒸津液而  
成痰因痰而生熱者痰則阻碍氣道而生熱夫熱生痰而痰生熱始終新久之謂也

附諸方

四神丸 經驗良方 治痰涎壅盛頭首昏眩肩背拘急手足頑麻

天麻 大者南星各湯洗防風去芦各一兩薄荷葉半兩

右為末酒糊為丸如菜豆大每服二十丸荆芥生薑湯下食後

龍星丹 治諸風熱壅痰盛

解毒雄黃丸 治上膈壅熱痰涎不利 並見中風

鵬砂散 和刺方 治大人小兒風痰熱毒喉閉生瘡鼻衄出血

山藥六斤生腦子七兩另研牙硝十四兩甘草二十兩射香 四兩研鵬砂二十兩生另研

右為末每服半錢好茶點服

上清丸 治膈間痰熱口舌生瘡咽喉腫痛咳嗽喘滿煩燥不寧 風熱類

哮喘二十八

丹溪心法

哮喘必用薄滋味專主於痰宜大吐藥中用醋多不用涼藥須常帶表散此寒包熱也亦有虛而

不可吐者一法用二陳湯加蒼朮黃芩作湯下小胃丹看虛實用

入方 治寒包熱而喘

半夏 枳殼炒 桔梗 片苓炒 紫蘇 麻黃 杏仁 甘草

右水煎服 天寒加桂枝

治哮喘積方

用雞子一箇畧敲殼損膜不損浸尿缸內三四日夜取出煮熟喫之効蓋雞子能去風痰

紫金丹 治哮喘三年後可用

足子心去付余

卷九 痰門

用精猪肉二十兩一作三十兩切作骰子塊用信一兩明者研極細末拌在肉上令勻分作六分用紙筋黃泥包之用火烘令泥乾却用白炭火於無人處煨青烟出盡為度取放地上一宿出火毒研細以湯浸蒸餅丸如茶豆大食前茶湯下大人二十九丸小兒七八丸量大小虛實與之

喘二十九

丹溪心法

○喘病 氣虛 陰虛 有痰 凡久痰之証未發宜扶正氣為主已發用攻邪為主 氣虛短氣而喘甚不可用苦寒之藥火氣盛故也宜導痰湯加千緡湯有痰亦短氣而喘 陰虛自小腹下火起衝於上喘者宜降心火補陰 有火炎者宜降心火清肺金 有痰者用降痰下氣為主 上氣喘而躁者為肺脹欲作風水証宜發汗則愈 有喘急風痰上逆者大千方千緡湯佳或導痰湯加千緡湯 有陰虛挾痰喘者四物湯加枳殼半夏補陰降火 諸喘不止者用劫藥一二服則止劫之後因痰治痰因火治火劫藥以椒目研極細末一二錢生姜湯調下止之氣虛不用 又法蘿蔔子蒸熟為君皂角燒灰等分為末生姜汁煉蜜丸如小豆大服五七十丸喻化止之 氣虛者用人參蜜炙黃柏麥門冬地骨皮之類 氣實人因服則氏過多而喘者用三拗湯以瀉氣 若喘者須用阿膠若久病氣虛而發喘宜阿膠人參五味子以補之 若新病氣實而發喘者宜桑白皮苦瀉之戴云有痰喘有氣急喘有胃虛喘有火炎上喘痰喘者凡喘便有痰聲氣急喘者呼吸急促而無痰聲有胃氣虛喘者擡肩擗項喘而不休火炎上喘者乍進乍退得食則減食已則喘大槩胃中有實火膈上有稠痰得食入咽墜下稠痰喘即止稍久食已入胃反助其火痰再升上喘反大作俗不知此作胃虛治以燥熱之藥者以火濟火也葉都督患此諸醫作胃虛治之不愈後以導水丸利五六次而安

入方

痰喘方 南星 半夏 杏仁 灰萎仁 香附 陳皮去白皂角炭 蘿蔔子

右為末神麩糊丸每服六七十丸姜湯下

又方 蘿蔔子 蒸半兩皂角 半兩海粉 一兩南星 一兩白礬 一錢半姜汁浸

右用瓜萎仁姜蜜丸噙化

劫喘藥 好銅青 研細號丹 少許炒赤色

右為末每服半錢醋調空心服

附諸賢論

先

王節齋曰喘與脹二症相因必皆小便不利喘則必生脹脹則必生喘但要識得標本後先喘而後脹者主於肺先脹而後喘者主於脾何則肺金司降外主皮毛經曰肺朝百脉通調水道下輸膀胱又曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣是小便之行由於肺氣之降下而輸化也若肺受邪而上喘則失降下之令故小便漸短以致水溢皮膚而生腫滿焉此則喘為本而腫為標治當清金降氣為主而行水次之脾土惡濕外主肌肉土能尅水若脾土受傷不能制水則水濕妄行浸清肌肉水既上溢則邪反浸肺氣不得降而生喘矣此則腫為本而喘為標治當實脾行水為主而清金次之苟肺症而用燥脾之藥則金得燥而喘愈如脾病而用清肺之藥則脾得寒而脹愈甚矣近世治喘脹者但知實脾行水而不知分別肺脾二症予故為發明之

附脉理

袖珍方論曰凡此証脉滑而手足温者生脉濇而四肢寒者死

附諸方

足子心去寸余

痰門

三拗湯 和劑方 治感冒風寒鼻塞聲重語音不出咳嗽喘急

生甘草 麻黃不去節 杏仁 不去皮 炙各等分

右吹咀每服五錢水一盞姜五片煎服以得汗為度

華蓋散 和劑方 治風寒冷濕之氣傷於肺經上氣喘促不得睡臥或聲音不出者

小青龍湯 和劑方 治感寒咳嗽喘急不得睡臥

蘇沉九寶湯 簡易方 治老人小兒素有喘急遇寒暄不常發則連綿不已咳嗽吼哮夜不得睡 並見

分氣紫蘇散 和劑方 治脾胃不和氣逆喘促

五味子 去梗 桑白皮 茯苓 去皮 甘草 炙 草薺仁 大腹皮 陳皮 去白 桔梗 各二兩

右吹咀秤二兩入淨紫蘇一兩五錢搗碎同一處拌勻每服四錢水一盞姜三片入鹽少 許同煎

紫蘇子湯 濟生方 治因憂思過度邪傷脾肺心腹膨脹又喘促煩悶腸鳴氣走漉漉有聲大小便不利

利脉虛數而瀉 見氣滯

杏仁半夏湯 宣明方 治肺氣不足喘咳嗽不已并傷寒往來寒熱

杏仁 去皮 桔梗 陳皮 去白 茯苓 去皮 漢防己 桑白皮 白礬 各二錢 猪牙皂角 薄荷葉 各一錢 甘草 二寸

右為末作二服水一盞生薑三片煎至六分食後溫服

葶蘆散 濟生方 治過食煎煨或飲酒過度致肺壅喘不得安臥及肺癰咽燥不渴渴唾腥臭

甜葶蘆 炒 桔梗 去灰 萎仁 川升麻 薏苡仁 桑白皮 炙 葛根 各一兩 甘草 炙 五錢

右吹咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至八分去滓食後溫服

定肺湯 直指方 治上氣喘嗽

紫苑 五味子 橘皮去白 甘草炙 紫蘇子炒 杏仁去尖 桑白皮炒 半夏製 枳殼炒 等分

右吹咀每服一兩生薑五片紫蘇五葉水二盞煎至一盞食後溫服

○已上數方攻邪之劑

人參潤肺湯宣明方 治肺氣不足喘急咳嗽不已往來寒熱自汗見咳嗽

蘇子降氣湯和劑方 治虛陽上攻喘促咳嗽見痰類

杏蘇飲直指方 治上氣喘嗽浮腫

紫蘇葉二兩 五味子 大腹皮 烏梅去核 杏仁去皮尖 陳皮去白 桔梗 麻黃去節 桑白

皮炒 阿膠炒 各七錢半 紫苑 甘草各一兩

右吹咀每服五錢水一盞半生薑五片煎至八分去滓食後溫服

玉華散直指方 治咳嗽上喘調順肺金清利咽膈安和神氣

甜葶藶焙 桑白皮炒 天門冬去心 馬兜鈴 半夏製 紫苑 杏仁去皮尖 貝母炮 百合 人參

各五錢 百部 甘草炙 各二錢半

右吹咀每服一兩水二盞生薑四片棗子三枚煎至一盞去滓食後溫服一方無生薑煎

杏參散秘方 治胃膈脹滿上氣喘急咳嗽倚息睡臥不得見咳嗽

○已上數方半攻半補之劑

神秘湯三因方 治上氣喘急不得臥者

橘皮去白 桔梗 紫蘇 五味子 人參各等分

右吹咀每服四錢水一盞煎至六分食後服

知母茯苓湯宣明方 治肺痿喘嗽不已往來寒熱自汗見肺痿類



五味子湯 治人方治喘促脉伏而數者

五味子 半兩人參 麥門冬 去心 杏仁 煨 皮 生姜 陳皮 各一錢半 棗子 三枚

右吹咀作二服每服水二盞煎至一盞食後温服

宣肺湯 楊氏家藏方治榮衛俱虛發熱自汗肺氣喘急咳嗽痰唾稠黏 見咳嗽

人參保肺湯 治五勞七傷喘氣不接 見發熱

○已上數方補虛之劑

人參理肺散 按料方治喘不止

麻黃 去節炒 木香 各一兩 罌粟殼 三兩 炒 人參 二兩 杏仁 三兩 麩炒 當歸 一兩

右吹咀每服八錢水一盞半煎至八分去渣食後温服

紫參散 按料方治形寒飲冷傷肺喘促痰涎不得安卧

麻黃 桔梗 五味子 甘草 炙 紫參 各一兩 罌粟殼 二兩 蜜炒 黃色

右吹咀每服一兩水一盞半煎至八分温服食後

○已上二方止瀉之劑

惡心 三十

丹溪心法

○惡心有痰 有熱 有虛 皆用生姜隨證佐藥

戴云惡心者無聲無物心中欲吐不吐欲嘔不嘔雖曰惡心實非心經之病皆在胃口上宜用生

姜蓋能開胃豁痰也

附諸方

大半夏湯 半夏 陳皮 茯苓 各二錢半

右咬咀水二盞生姜二錢半煎八分食後服

小半夏茯苓湯 半夏 五兩 茯苓 三兩

右咬咀每服八錢用水一盞半煎至一盞入生姜自然汁投藥中更煎一二沸熱服無時 或用

生姜半兩同煎

加味二陳湯 半夏 橘紅 茯苓 甘草 炙黃連 姜汁炒 黃芩 姜汁炒 各一錢半

右作一服水二鍾姜五片煎八分溫服

加味生姜理中湯

人參 白朮 生姜 甘草 炙半夏 陳皮 各等分

右水煎服

嘔吐 三十一

丹溪心法

○凡有聲有物謂之嘔吐有聲無物謂之噦 胃中有熱膈上有痰者二陳湯加炒山梔黃連生姜

有久病嘔者胃虛不納穀也用人參生薑黃芪白朮香附之類 嘔吐朱奉議以半夏橘皮生姜

為主 劉河間謂嘔者火氣炎上此特一端耳 有痰膈中焦食不得下者 有氣逆者有寒氣

鬱於胃口者 有食滯心肺之分而新食不得下而反出者 有胃中有火與痰而嘔者 嘔吐

藥忌瓜蒌杏仁桃仁蘿蔔子山梔皆要吐丸藥帶香藥行散不妨注 船大吐渴飲水者即死童

便飲之最妙

附脉理

足丹溪心法付錄

卷九 痰門

脉訣舉要曰滑數為嘔代者霍亂微滑者生濇數凶斷

附諸方

香薷飲 和劑方治伏暑而嘔見中暑

四君子湯 拔粹方治久病胃虛而嘔

茯苓 白朮 人參 黃芪 各一兩

右以咀每服一兩水二盞姜五片煎一盞去滓溫服

錢氏白朮散 治症同前見痢類

加味理中湯 和劑方治胃感寒嘔吐不止

人參 白朮 乾姜 炮 甘草 炙 各一錢 丁香 十粒

右以咀生姜十片水煎服

大藿香散 濟生方治七情傷感氣鬱於中變成嘔吐或作寒熱眩暈痞滿不進飲食

藿香葉 洗去土 半夏 白朮 人參 去芦 木香 不見火 茯苓 去皮 桔梗 去芦對細 枇杷葉 刷去毛

橘皮 甘草 炙 各半兩

右為末每服五錢水一盞姜五片煎六分溫服棗一枚

養胃湯 徐氏方治脾胃虛冷不思飲食嘔吐翻胃

白豆蔻仁 人參 丁香 礞砂仁 肉豆蔻 附子 炮 甘草 沉香 橘紅 麥芽 神麴

各二錢半

右為末每服二錢姜鹽湯下

旋覆花湯 濟生方治中脘伏痰吐逆眩暈

旋覆花去梗半夏湯炮七次橘紅 乾姜地各枳榔 人參去芦甘草炙白朮各半兩

右吹咀每服四錢水一盞姜七片煎服不拘時

加味二陳湯 治停痰結氣而嘔

半夏 橘紅略白茯苓 三兩 甘草炙一兩半 砂仁 一兩 丁香 五錢 生姜 二兩

右水煎服

藿香養胃湯御藥院方 治嘔吐不已

藿香葉 一兩半 夏洗兩 湯 陳皮 一兩 去白 甘草 二兩 厚樸 二兩 姜製 蒼朮 三兩 米泔浸

右為粗末每服五錢水一盞半生姜五片棗一枚同煎去滓溫服

生姜橘皮湯活人方 治乾嘔噦或致手足厥冷

橘皮四兩 生姜半斤

右吹咀水七盞煮至三盞去滓逐旋溫服

濟生竹茹湯 治熱嘔或因飲酒過度而嘔者

葛根 半夏湯泡七次 二兩 甘草炙一兩

右吹咀每四錢水一盞入竹茹一小塊姜五片煎服

小柴胡加竹茹湯 治發熱而嘔

柴胡二錢 半夏湯洗 一錢 黃芩 人參 甘草炙各七分 半竹茹 一塊 橘皮 一錢

右吹咀水一盞生姜七片煎六分溫服

三一承氣湯宣明方 治嘔吐水漿不入食即吐大便秘或利而不鬆快時覺腹痛滿者或下利赤白

而嘔吐食不下者或大小腸膀胱結而不通上為嘔吐隔食煎熟入硝細細啜服

○廣按三因方言嘔吐証忌用利藥此言其常然大小腸膀胱熱結而不通上作嘔吐隔食若不  
用利藥開通發泄則嘔吐何由而止或止嘔吐而大小便不泌澀者此利藥又當所忌也三承氣湯  
見溫熱類

吐虫而嘔方 黑鉛炒成灰栝榔末等分米飲調下

欬逆 三十二

丹溪心法

○欬逆有痰 氣虛 陰火 視其有餘不足治之其詳在格致餘論不足者人參白朮湯下大補

丸 有餘并有痰者吐之人參蘆之類痰碍氣而吐逆者用蜜水吐此乃燥痰不出 痰者陳皮

半夏 氣虛人參白朮 陰火黃連黃柏滑石 欬逆自痢者滑石甘草炒黃柏白芍人參白朮

陳皮加竹瀝服

戴云吐逆者因痰與熱胃火者極多

附諸方

半夏生姜湯 治咳逆欲死

半夏一兩二錢半 生姜一兩

右以水二盞煎八分去滓分作二服

柿蒂湯濟生方 治胃膈痞滿咳逆不止

柿蒂 丁香 各一兩

右以水三錢水一盞姜五片煎服

羌活附子散濟生方 治吐利後胃寒咳逆

羌活 附子炮去皮 茴香炒各五錢 乾姜炮 木香各一兩 棗少許

右吹咀每服二錢水一盞鹽少許煎至半盞溫服不拘時一方去木香用丁香三因方二香並用

橘皮湯濟生方 治吐利後胃虛膈熱而咳逆者

橘皮去白二兩人參 甘草炙各半兩

右吹咀每服四錢水一盞竹茹一小塊生姜五片棗二枚煎七分溫服不拘時

○廣按欬逆之症乃胃火蒸薰津液成痰凝滯於胃膈之間阻碍氣道所以咳逆也已上二方治

吐利後胃寒胃熱咳逆然吐利後胃熱咳逆者常多而胃寒咳逆者千百中而一二也

人參白朮湯

人參 黃芩 柴胡 乾姜 梔子仁 甘草炙各半兩 白朮 防風 半夏炮七 五味子

右吹咀每服四錢姜三片煎

桂苓白朮散宣明方 消痰止咳逆散痞塞開堅結痛悶進飲食調和臟腑

揀桂 乾姜各二錢 茯苓去皮 半夏各一兩 白朮 陳皮去白 澤瀉各半兩

右為末麵糊丸如小豆生薑湯下二三十丸日三服病在上食後病在下食前在中不拘時一方

加黃連半兩黃柏二兩水丸取效愈妙

灸法見濕熱

大補丸見補損

翻胃三十三

丹溪心法

○翻胃大約有四 血虛 氣虛 有熱 有痰兼病 必用童便韭汁竹瀝牛羊乳生薑 氣虛

卷之六 痰門

入四君子湯右手脉無力 血虛入四物湯加童便左手脉無力 切不可用香燥之藥若服之必死宜薄滋味 治反胃用黃連三錢生姜汁浸炒山查肉二錢保和丸二錢同為末糊凡如麻子大胭脂為衣人參湯入竹瀝再煎一沸下六十九有痰二陳湯為主寸關脉沉或伏而大 有氣結宜開滯導氣之藥寸關沉而濇 有內虛陰火上炎而反胃者作陰火治之 年少者四物湯清胃院血燥不潤便故澁格致餘論甚詳 年老雖不治亦用參朮關防氣虛胃虛 氣虛者四君子湯加蘆根童便或參苓白朮散或菲汁羊牛乳或入駝駝尿 又有積血停於內而致當消息逐之大便澁者難治常令食兔肉則便利 翻胃即膈噎膈噎乃翻胃之漸 發揮備言 年高者不治 糞如羊屎者斷不可治大腸無血故也

戴云翻血虛者脉必數而無力氣虛者脉必緩而無力氣血俱虛者則口中多出沫但見沫大出者必死有熱者脉數而有力有痰者脉滑數二者可治血虛者四物為主氣虛者四君子為主熱以解毒為主痰以二陳為主

八方 用馬剝兒燒灰存性一錢好棗肉平胃散二錢

右和勻溫酒調服食即可下然後隨病源調理

又方 茱萸 黃連 貝母 瓜蒌 牛轉草

治翻胃 菲菜汁二兩牛乳一盞

右用生姜汁半兩和勻溫服效

治翻胃積飲通用

益元散生姜自然汁澄白脚丸小丸子時時服

溫清丸 治翻胃伐肝邪

乾姜一兩滑石甘草各二兩

右為末凡服

附諸方

撞氣阿魏丸 和劑方 治五種噎疾九般心痛疝癖氣塊腹痛腸鳴嘔吐酸水丈夫小腸氣婦人血氣  
並治之見諸氣

木香通氣飲子 御藥院方 治一切氣噎塞痰飲不下

青皮 去穢 木香 蓬莪朮 枳榔 陳皮 去白 蘿蔔子 炒各五錢 藿香葉一兩甘草 炙 人參去

芦枳殼各五錢香白芷二錢半

右為末每服五錢水二盞煎八分溫服

瓜蒌實丸 濟生方 治胸痞痛徹背脇喘急妨悶膈噎翻胃 方見痞類

人參利膈丸 按粹方 治胸中不利痰咳喘滿和脾胃壅滯推陳致新治膈氣聖藥

木香 檳榔 半錢 人參 當歸 藿香 甘草 枳實 各一兩 大黃 酒浸厚樸姜製一兩

右為末滴水為丸梧桐子大每服五十九丸溫水送下

棗肉平胃散 開胃進食

厚樸 姜制陳皮去白各三斤二兩 甘草 炙 紅棗 生姜 各二斤 蒼朮 泔浸一宿炒五斤

一方加茯苓人參

右剉拌勻以水浸過面上半寸許煮乾焙燥為末每服二錢鹽湯空心服

保和丸消食開胃 見積聚

寬中進食丸 滋形氣喜飲食

足母奚心去付人示

痰門



道宜純陽丹 治痰涎聚於中脘不得傳導 並見調補脾胃

○已上數方消導之劑

白朮和胃丸 治脾胃虛弱不能運化

和中散 同前

八珍湯 同前

參苓白朮散 同前 俱見調補脾胃

○已上數方消導之劑

燒針丸 此藥清鎮專主吐逆 黃丹 不以多少

右研細用去皮小棗肉丸如雞頭子大每用一丸針簽於燈上燒灰為末乳汁下

神仙奪命丹 專治噎食

烏梅浸去核三錢 水硃砂二錢 雄黃二錢 乳香一錢 百草霜五錢 菘豆 黑豆各四十九粒

右將烏梅杵爛前藥并豆為末入梅再搗和勻凡如彈子大以乳香少加硃砂為衣陰乾每服一

丸空心噲化待藥盡烙熱餅一箇摩碎入熱茶泡食之無碍為驗過三五日依法再服一丸即愈

極有神效

治膈氣經驗方

用大鱈魚自死者活者不效剖去腸留鱗用大蒜去皮薄切片填之魚腹內仍合魚用濕紙包定

次用麻縛之又用熟黃泥厚厚固日微乾炭火慢慢煨熟取出去鱗刺骨用平胃散杵丸如梧桐

子大日晒乾瓶收勿令泄氣每服空心米飲下三十九丸

槿花散 治翻胃

以千葉白槿花陰乾為末陳米湯調下三五口不轉再服

一方 治轉食

用翻翅雞一隻煮熟去骨入人參當歸鹽各五錢為細末再煮取與食之勿令人共食

一方 治翻胃不問新久冷熱二症

用虎脂半斤切如豆大用清油一斤瓦瓶浸虎脂一月厚綿紙封口勿令泄氣每用清油一两入無灰好酒一大鐘調勻不拘時溫服服盡病減其虎脂再添油再浸再可活二人若一時無虎脂只用珠子硫黃細研半兩水銀二錢半入硫黃末研至無水銀星再研如墨煤色每服三錢生姜四兩取自然汁入好濃酒一鐘盪熱調空心服後衾蓋覆當自足趾間汗出遍身皆汗透吐當立止不止再服此藥輕浮難調須先滴酒少許以指緩緩研之旋添酒調

一方 治噎食

用碓背上細糠蜜丸如彈子大每服一丸噙化津液嚥下

一方

用白麩二斤半蒸作大饅頭一箇頂上開口取空將皂礬裝滿用新瓦四圍遮護饅頭鹽泥封固却窰土窰安放以文武火燒一晝夜候紅色取出研為末棗肉丸如梧桐子大每服二十九空心酒湯任下忌酒色

○已上數方專治之劑

四君子湯

四物湯 俱見補損

二陳湯 見痰類

足子... 去付余

痰門

○廣按膈噎翻胃之証因火而成其來有漸病源不一有因思慮過度而動脾火者有因忿怒過度而動肝火者有因久食煎炒而生胃火者有因淫慾忘反而起腎火者蓋火氣炎上薰蒸津液成痰初則痰火未結咽膈乾燥飲食不得流利為膈為噎久則痰火已結胃之上脘不開飲食雖進停滯膈間煩更便出謂之嘔吐至於胃之下脘不開飲食雖進停滯胃中良久方出謂之翻胃丹溪云年高者不治蓋少年氣血未虛用藥却去痰火病不復生老年氣血已虛用藥却去痰火雖得暫愈其病復作所以然者氣虛則不能運化而生痰血虛則不能滋潤而生火故也丹溪又云此証切切不可用香燥之藥若服之必死宜薄滋味其局方尤用香燥之藥豈合宜乎夫証屬熱燥固不宜用香燥之藥又香散氣燥耗血而滋味助火而生痰也予嘗用霞天膏加於補虛藥中以治此証者一人則吐瀉以去積血一人則吐瀉以去積痰俱獲病安思食而彼二人俱不能節戒隨啖肥甘終不能免殊不知此証挾虛雖云病去而脾胃尚弱肥甘難化故病復也噫嘻得此証者不可知所謹哉知所懼哉若用霞天膏吐瀉後宜用人參補之

霞天膏

見倒倉法

人參膏見駐顏

嘈雜三十四

### 丹溪心法

○嘈雜是痰因火動治痰為先姜炒黃連入痰藥用炒山梔子黃芩為君南星半夏陳皮為佐熱多加青黛 嘈雜此乃食鬱有熱炒梔子姜炒黃連不可無 肥人嘈雜二陳湯少加撫芎蒼朮白朮炒山梔子 嘈雜若濕痰氣鬱不喜食三補丸加蒼朮倍香附子 醫按蔣氏子條云心嘈索食白朮黃連陳皮作丸白湯下七八十丸數服而止 又云眩暈嘈雜是火動其痰二陳湯加梔子芩連之類 戴云此則俗謂之心嘈也

二補丸 見補指

二陳湯 見痰類

關格 三十五

丹溪心法

○關格必用吐提其氣之橫格不必在出痰也 有痰宜吐者二陳湯吐之吐中便有降 有中氣虛不運者補氣藥中升降 寒在上熱在下脉兩手寸俱盛四倍以上

戴云關格者謂膈中覺有所得欲升不升欲降不降欲食不食此謂氣之橫格也

瘦氣 三十六

丹溪心法

○瘦氣先須斷厚味

入方 海藻二兩 黃連二兩 一云黃柏又云黃藥

右為末以少許置掌中時時舐之津嚥下如消三分之二止後服

附諸方

海帶丸 治瘦氣久不消者

海帶 貝母 青皮 陳皮

右各等分為末煉蜜丸如彈子大每服一丸食後嚙化

一方 海藻 海帶 昆布各一兩 廣茂 青鹽各半兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸食後嚙化

破結散 濟生方 治石瘦氣瘦筋瘦血瘦肉瘦等證

痰門

海藻洗龍胆草 海蛤 通草 昆布洗礬石 松蘿各七錢 麥麩一兩半 夏七次 貝母去心各三錢  
右為末每服二錢酒服忌甘草鯽魚雞肉五辛生菓等物

丹溪心法

○結核或在項在脛在臂在身如腫毒者多是濕痰流注作核不散

入方 治耳後項各一塊

姜蚕炒酒大黃 青黛 牛膽南星

右為末蜜丸噙化

又方 治項頸下生痰核

二陳湯 大黃 連翹 桔梗 柴胡

右以水煎食後服

又方 治臂核作痛

二陳湯加連翹 防風 川芎 皂角刺 蒼朮 酒黃芩

右以水煎服

丹溪心法附餘卷之十

痰熱門

三十七

丹溪心法

○痰切不可作風治兼用風藥 大率與癩病相似比癩為甚為虛宜帶補 多是氣虛有火兼痰

宜用人參竹瀝之類

附論

○廣按痰症發作則通身而戰掉皆因氣虛挾痰火所致正有火痰而旋轉也火能燥物而使氣

液之不足世人不知誤認為風而用風藥風能勝溼是不足之中而又見損也玉璽金鑰曰休

治風休治燥治了火時風燥了木火為風燥之本能治其火則是風散而潤燥何風燥之有哉

此症所以宜補氣液而兼散痰火也

癩 三十八

丹溪心法

○驚與痰宜吐 大率行痰為主用黃連南星瓜蒌半夏尋火尋痰分多分少治之無不愈者 分

痰與熱 有熱者以涼藥清其心 有痰者必用吐藥吐後用東垣安神丸 大法宜吐吐後用平

肝之劑青黛柴胡川芎之類龍會丸正宜服之 且如癩因驚而得驚則神不守舍舍空而痰聚也

戴云癩者俗曰猪癩風者是也

附脉理

脉訣舉要曰顛癩之脉浮洪大長滑大堅痰蓄心狂

足下

痰熱門

附諸方

通泄散 治風涎暴作氣塞倒仆

苦丁香 為末三錢

右加輕粉一字水半合調勻灌之良久涎自出如未出含砂糖一塊下咽涎出

墜痰丸 治風癇

天南星 九蒸九晒

右為末姜汁糊為丸如梧桐子大每服二十九人參湯菖蒲麥冬湯任下

一方治速年近日風癇心恙風狂中風涎潮牙關不開破傷風搐者用皂角不蛀肥者一斤去皮弦

切碎以酸漿水一碗浸春秋三四日夏一二日冬七日揉去滓將汁入銀器或砂鍋慢火熬以槐

柳枝攪成膏取出攤厚紙上陰乾杖頓用時取手掌大一片以溫漿水化在蓋內用竹筒灌入病

人鼻孔內良久涎出為驗欲涎止服溫益湯一二口便止忌雉魚生硬溼麵等物

五癇丸 楊氏方 治癲癇發作不問新久並宜服之

全蝎 去毒炒 皂角 汁四兩搥碎水半升將 雄黃 一錢半 白礬 兩 蜈蚣 半條 朱砂 二錢半 射香 三錢 白姜 一兩半 烏蛇 一兩 附子 兩

右為末姜汁煮麵糊丸如梧桐子大每三十九姜湯下

控涎丹 濟生方 治諸癇久不愈者頑涎結聚變生諸症並宜治之

全蝎 二錢 鐵粉 錢 甘遂 半錢 半夏 生川烏 姜蚕 三錢 不炒

右為末姜汁打糊丸如菘苳大硃砂為衣每服十五丸食後姜湯下忌甘草

遂心丹 治風疾癲癇婦人心風血邪

甘遂一錢堅實不姓者

右為末用猪心取管血三條和甘遂末將心批作兩邊甘遂末入在內令線縛定外用皮紙裹慢火煨熟不可焦取末細研入辰砂末一錢和勻分作四丸每服一丸將煨猪心煎湯化下大便下惡物為効

欝金丹 治痼疾

川芎二兩防風 欝金 猪牙皂角 明礬各一兩蜈蚣黃脚赤脚各一條

右為細末蒸餅丸如梧桐子大空心茶清下十五丸

追風丹 治風痼及破傷風暗風

川芎二兩細辛六錢半夏湯泡七次桔梗 附子皮去薄荷葉 川烏 白附子各二兩魚鱗 人參

去芦 硃砂另研各六錢白花蛇酒浸去皮骨取肉焙乾射香淨四錢南星 三錢 蜈蚣四條金頭赤 大蝎尾去錢

右為末生薑汁和刺為錠每服一錠溫酒化下以汗出為度

引神歸舍丹 百一選方 治心氣不足并治心風

附子一箇重七錢者炮去皮臍以上 朱砂一兩飛大天南星厚去皮取兩生用

右為末用猪心血并麵糊為丸如梧桐子大煎萱草根湯下子午之交各一服止五十九

驚氣丸 和劑方 治心受風邪涎潮昏塞牙關緊閉醒則精神若痴及驚憂積氣並皆治之

紫蘘子二兩附子去皮臍天麻去苗橘紅二兩白姜炒兩麻黃去根即南木香一兩

朱砂一錢研為末南星浸洗薄切姜汁白花蛇酒浸炙熟去皮骨半兩乾蝎去針尾錢

右為末入腦射以許同研極勻煉蜜杵丸如龍眼大每服一丸用金錢薄荷湯化下或溫酒亦可

○廣按痼症病本痰熱宜用辛寒之劑治之已上三方皆用附子何也蓋痼症乃痰結於心胃之



間每遇大動則發非附子熱性走而不守而能流通結滯開散頑痰可乎此從治之法乃劫劑也不得已而用之亦猶中風之證本風火陽邪而用烏附類也丹溪前條云癰症尋火尋痰分多分少則此三方只宜施之於肥白多痰之人用諸藥而不效者若夫黑瘦多火之人不宜用也

追風祛痰丸 治諸風癰暗風

防風 天麻 僵蚕炒去 白附子煨各 全蝎炒毒 木香各半 硃砂另為衣 猪牙皂角兩炒 白礬

兩粘半半夏用湯泡七次碾為末秤六兩分作二分一分 南星三兩到一半化白礬水

右為細末姜糊為丸如梧桐子大每服七八十丸食遠臨卧用淡姜湯或薄荷湯下

○廣按此方用藥之當製藥之精無過不及用之豈有不效者

○以上數方温脾化痰之劑

鎮心丹 治諸癰

好辰砂不拘多少

右為細末猪心血和勻以蒸餅裹剉蒸熟取出丸如梧桐子大每服一丸食後臨卧人參湯下

參砂丸 治風癰

人參 蛤粉 硃砂各等分

右三味為細末猪心血為丸如梧桐子大每服三十九食遠金錢薄荷湯下

歸神丹 治癰癩諸疾驚悸神不守舍

顛塊硃砂二兩猪心 金箔片二十 白茯苓 酸棗仁 羅參 當歸各二 銀箔片十 琥珀 遠志

姜製龍齒各一兩

右為細末酒煮糊為丸如梧桐子大每服二三十丸麥門冬湯下炒酸棗仁湯亦可

靈神丹 清熱養氣血不時潮作者可服

天麻 人參 陳皮 白朮 歸身 茯神 荆芥 疆蚕炒 獨活 遠志去犀角 麥門去

酸棗仁炒 辰砂各五錢 半夏 南星 石膏各一兩 甘草炙 白附子 川弓 鬱金 牛黃各三錢

珍珠錢 生苈 黃連錢 五金箔 三十片

右為末酒糊丸每服五十九白湯下

牛黃清心丸 和劑方 治心氣不足神志不定驚恐悸怖虛煩少睡常發狂癲言語錯亂 見中風

六珍丹 三因方 治風癰卒然暈倒或作牛吼馬嘶鷄鳴羊叫猪呼犬吠腑臟相引氣爭掣吐沫流

涎久而方醒

通明 雄黃 葉子雄黃 未鑽真珠各一兩 砂半兩 水銀一兩 黑鉛一兩 熬成屑

右為末研令極細蜜和杵二三萬下如梧桐子大每服五丸姜棗湯下

龍腦安神丸 拔粹方 治男子婦人五種癲癩無問遠年近日發作無時

茯苓三兩 人參 地骨皮 甘草各四兩 麥門冬去心 龍腦別研 射香各五錢 牛黃五錢 硃砂

牙硝各二錢 桑白皮 明犀末一兩 金箔十五片

右十三味為末煉蜜為丸如彈子大金箔為衣冬月溫水化下夏月涼水又治虛勞發熱咳嗽語

澁舌強日進三服

朱砂安神丸 拔粹方 治心煩懊懷心亂怔忡胸中氣亂心下痞悶食入反吐出

朱砂四錢 研 黃連五錢 生甘草二錢半

右為末蒸餅丸如黃米大每服十九唾津送下

虎睛丸 揚氏瀟方 治癩疾發作涎潮搐搦精神恍惚時作謔語

犀角屑一兩 虎睛微炒 大黃一兩 梔子仁半兩 遠志去心

右為末煉蜜丸如菜菔大每服二十九丸酒溫食後送下

滾痰丸 治膈熱太甚作癇 見痰類

龍會丸 治肝火太甚作癇 見協痛

○以上數方清心降火之劑

古方三癇丸 治小兒百二十種驚癇

荊芥穗三兩 白礬一兩半生半枯

右為末麵糊為丸黍米大硃砂為衣姜湯下二十九丸如慢驚用來復丹急驚三癇丸食癇醒脾丸可也

本事人參散 治小兒慢脾風神昏痰盛

人參半兩 員白大南星一兩切片以生薑汁并漿水各半陰燻帶性晒

右為末每服一錢水一盞姜三片冬瓜仁搗細少許同煎取半盞作二三次灌下

來復丹 見中暑

醒脾丸 見

顛狂三十九

丹溪心法

○癇屬陰狂屬陽癇多喜而狂多怒脉虛者可治實則死大率多因痰結於心胸間治當鎮心神開痰結亦有中邪而成此疾者則以治邪法治之原病式所論尤精蓋為世所謂重陰者癇重陽者狂是也大槩是熱 癇者神不守舍狂言如有見經年不愈心經有損是為真病如心經蓄熱當清心除熱如痰迷心竅當下痰寧志若癇哭呻吟為邪所憑非狂也燒蚤帛酒水下方寸七 卒狂言兒

語針大拇指甲下即止 風癲引脇痛發則耳鳴用天門冬去心日乾作末酒服方寸七 癲疾春  
治之入夏自安宜助心氣之藥 陽虛陰實則癲陰虛陽實則狂病宜大吐下則除之

入方 治癲風 麻仁四升

右以水六升猛火煮人牙生去滓煎取七合旦空心服或發或不發或多言語勿恠之但人摩手  
足須定凡進三劑愈

又方 治狂邪發無時披頭大叫欲殺人不避水火

若參 不以多少

右為末蜜丸如梧桐子大每服十五丸煎薄荷湯下

附脉理

脉訣舉要曰癲癩之脉浮洪大長滑大堅疾痰蓄心狂又曰乍大乍小乍長乍短此皆邪脉神志亂

附諸方

控涎丹 治痰迷心竅時作癲狂狂言有所見

甘遂 去心 紫大戟 去皮 白芥子 真者各等分

右為末煮麪糊丸如梧桐子大晒乾臨卧淡姜湯或熱水下三十九丸以下利去痰飲為愈

追風祛痰丸 治痰迷心竅顛狂妄語 見癲類

葉氏清心圓 簡易方 治心受邪熱精神恍惚狂言呼叫睡卧不寧

人參 蝎梢 鬱金 生地黃 天麻 天南星 為末入黃牛胆內令滿掛當風處吹乾 騰月造要用菘取各等分

右為末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服三十九丸人參湯下

龍星丹 治胸膈停痰蓄熱顛狂號叫 見中風類

足十... 痰熱門

本丹... 滾痰丸 治痰熱攻心顛狂唱哭 方見痰類

○已上數方下痰寧志之劑

牛黃清心丸 治心氣不足神志不定驚恐悸怖虛煩少睡常發狂癲言語錯亂 見中風

牛黃瀉心湯 治心經邪熱狂語精神不爽

腦子研牛黃研朱砂研各一錢大黃生一兩

右研為末每服三錢涼生薑蜜水調下

葉氏雄朱丸 簡易方治丈夫婦人因驚憂失心或思慮過多氣結不散積成痰涎留在心包穰塞心

竅狂言妄語叫呼奔走

顆塊硃砂一錢半白附子一錢雄黃明淨者一錢半

右為細末和勻以猪心血和丸如梧桐子大別用硃砂為衣每服三粒用人參菖蒲煎湯下常服

一粒能安魂定魄補心益氣

朱砂安神丸 治症同前

龍腦安神丸 治症同前 並見癩類

牛黃膏 聖惠方 治婦人熱入血室發狂不認人者

牛黃半錢硃砂 鬱金 三腦子 甘草 牡丹皮 三錢

右為細末煉蜜為丸如皂子大每服一丸新水化下

寧志膏 大全良方 治婦人因失血過多心神不安言語不常不得睡卧

辰砂 研酸棗仁 炒人參 白茯神 去木琥珀 各七錢半 滴乳香 一錢 研

右為末和勻每服一錢濃煎灯心棗子湯空心調下

一方無拔神琥珀蜜丸如彈子大薄荷湯化下一丸

拔神散 大 全 良 方 治婦人心虛與鬼交通妄有所見聞言語雜亂

拔神 一兩半 茯苓 人參 石菖蒲 各二兩 赤小豆 半兩

右咬咀每服八錢水一盞半煎至八分通口食前服

○已上數方清心除熱之劑

驚悸怔忡 四十

丹溪心法

○驚悸者血虛驚悸 時以朱砂安神丸 痰迷心膈者痰藥皆可定志丸加琥珀鬱金 怔忡者

血虛怔忡無時血少者多 有思慮便動屬虛 時作時止者痰因火動 瘦人多是血少 肥人

屬痰 尋常者多是痰 真覺心跳者是血少四物朱砂安神之類 假如病因驚而得驚則神出

舍舍空則痰生也

戴云怔忡者心中不安惕惕然如人將捕者是也

附諸賢論

心法附錄曰人之所主者心心之所養者血心血一虛神氣不守此驚悸怔忡之所肇端也曰驚悸

曰怔忡豈可無辨乎心虛而鬱痰則耳聞大聲目擊異物過險臨危觸事喪志心為之忤使人有

惕惕之狀是則為驚悸心虛而停水則胸中滲漉虛氣流動水既上乘心火惡之心不自安使人

有快快之是則怔忡治之之法驚悸者與之豁痰定驚之劑怔忡者與之逐水消飲之劑所謂扶

虛不過調養心血和平心氣而已

附脉理

足十...

...

疾熱門

五

本丹... 脉訣舉要曰心中驚悸脉必代結飲食之悸沉伏動滑

附諸方

茯苓飲子 濟生方 治痰飲蓄于心胸怔忡不已

赤茯苓 去皮 半夏 湯洗七次 茯神 去木 麥門冬 去心 橘皮 去白 沉香 不見火 甘草 檳榔 各五錢

右以咀每服八錢生薑五片煎至八分食後溫服

加味四七湯 治心氣鬱滯豁痰散驚

半夏 二兩半 白茯苓 厚樸 各一兩半 茯神 紫蘇 各一兩 遠志 炒 甘草 炙半兩

右每服四錢生薑五片石菖蒲一寸棗一箇水煎服

葉氏育神散 簡易方 治心氣不寧怔忡健忘夜夢驚恐小便白濁

赤石脂 別研細 白茯苓 甘草 遠志 心乾姜炮 當歸 酒洗 龍骨 另研入粉 紫苑茸 桂心 去皮

白茯苓 去木 防風 人參 去芦 赤芍藥 白朮 各一兩

右為末每服二錢水一盞姜三片棗一枚煎七分食後溫服

龍齒湯 問易方 理心下怔忡常懷憂慮神思多驚如墮險地小便或赤或濁

官桂 一兩半 半夏 二兩湯炮 人參 去芦 白茯苓 去皮 枳殼 去穢炒 甘草 炙 當歸 龍齒 研

桔梗 遠志 去心各一兩半 茯神 去木 黃芪 蜜炙各一兩

右為末每服二錢水一鐘姜三片棗一枚粳米百粒煎六分溫服

養心湯 治憂愁思慮傷心驚悸不寧

黃芪 蜜炙 白茯苓 茯神 半夏 麩 當歸 川芎 各半兩 甘草 炙四錢 遠志 去心 姜汁 炒 辣桂

栢子仁 五味子 酸棗仁 人參 各二錢半

右每服三錢水煎姜三片棗一箇食前服 治停水怔忡加檳榔赤茯苓

加味定志丸 治痰迷心膈驚悸怔忡

遠志二兩 人參一兩 菖蒲二兩 白茯苓三兩 琥珀 爵金

右為末煉蜜為丸如梧子大朱砂為衣每服三十九湯米下

○已上諸方消痰利氣之劑

四物湯 見補損

朱砂安神丸 治血虛心煩懊懷驚悸怔忡胸中氣亂

朱砂五錢水飛 黃連酒洗六錢 甘草炙二錢半 生地黃一錢半 當歸二錢半

右四味為細末蒸餅丸如黍米大朱砂為衣服三五丸津下

牛黃清心丸 治心氣不足神志不定驚恐悸怖虛煩少睡寤寐紛紜

歸神丹 治驚悸怔忡神不守舍 並見癩類

真珠丹 治肝經因虛內發風邪卧則魂散不守時或驚悸怔忡

栝子仁 人參 酸棗仁各一兩 熟地黃 當歸各半兩 犀角 茯神 沉香 龍齒各半兩 真珠母三錢

右為末煉蜜丸如梧子大辰砂為衣每服四五丸金錢薄荷湯下

益榮湯 治思慮過度耗傷心血天君不寧怔忡恍惚夜多夢寐小便赤白濁

當歸酒洗去蘆 黃芪去蘆 小阜 酸棗仁去殼 栝子仁炒 麥門冬法 茯神去木 白芍藥 紫石英各一兩

木香 不見火 人參 甘草炙各半兩

右吐咀每服四錢水一鍾姜五片棗一枚煎七分服

○已上數方補血安神之劑



丹溪心法

○健忘精神短少者多亦有痰者

戴云健忘者為事有始無終言談不知首尾此以為病之名非此生成之愚頑不知人事者

附諸方

靈志膏和劑方治心神恍惚一時健忘 見補損

定志丸 治心氣不定恍惚多忘

遠志 菖蒲各二兩人參一兩白茯苓三兩

右為末煉蜜丸如梧子大朱砂為衣服二十九米湯下

壽星丸和劑方治心膽被驚神不守舍或痰迷心竅恍惚健忘妄言如有所見

天南星一斤先用炭火三十斤燒地坑通紅去炭以酒五升傾坑內俟滲酒盡朱砂另研

右用生姜汁麵糊為丸如梧桐子大每服三十九加至五十九煎石菖蒲人參湯下

歸脾湯濟生方治思慮過制勞傷心脾健忘怔忡

白朮 茯神去木 黃耆去芦 龍眼肉 酸棗仁去殼 人參各一兩 木香半兩 甘草二錢

右以咀每服四錢水一鍾姜五片棗一枚煎七分溫服

朱雀丸百一選方治心神不定事多健忘

茯神一兩去皮 沉香半兩

右為細末煉蜜丸如小豆大每服三十九人參湯下食後

二丹丸 治健忘養神定志和血內以安神外華滕理 方見中風

人參遠志丸 聖惠方 治氣不足驚悸健忘神思不寧

天門冬去心 白苓朮

葛蒲各七 人參 遠志去心 酸棗仁

黃芪各半 桔梗

丹砂官桂去皮各二錢半

右為末蜜丸如豈大每服二十九丸至三十九丸米湯下

纏喉風喉痺四十二 附咽痛咽瘡

丹溪心法

○喉痺大槩多是痰熱 重者用桐油探吐 一方射干逆流水吐之 又方李寔根皮一片噙口

內更用李寔根研水敷項上一週用新菜園中者 纏喉風屬痰熱戴云謂其咽候裏外皆腫者是也用

桐油以鵝翎探吐 又法用灯油脚探吐 又用遠志去心為末水調傳項上一遭立効亦可吐

咽喉生瘡痛是虛熱血虛多屬虛火游行無制客於咽喉也用人參荊芥蜜炙黃栢 虛火用人參

竹瀝 血虛四物加竹瀝 寔熱者黃連荊芥薄荷硝蜜姜汁調噙化 治喉痛用倒滴刺根淨洗

入夢少好酒同研滴入喉中痛立止 喉痺風熱痰先以千緡湯後以四物加黃栢知母養陰則火

降 又方猪牙皂角為末和霜梅噙 又方木鱉子用鹽苦水浸久噙一丸 又方茜草一兩作一

服降血中之火 又方煖硝半錢枯礬半錢硃砂一錢為末杜~~末~~膝搗汁調 喉閉或有中垂一絲

結成小血珠垂在咽喉中用杜牛膝根即鼓槌草直而獨條者搗碎用好米醋些小和研取汁三五

滴滴在鼻中即破 喉痛必用荊芥陰虛火炎上必用玄參 又喉痺陳年白梅入蛭蚰令化噙梅

於口中

入方

雄黃解毒丸 治纏喉急喉風雙鵝腫痛湯藥不下

雄黃二兩 巴豆去油十四箇 麝金一錢

足丹溪心法去丹餘

痰熱

右為末醋糊丸如菜豈大熱茶清下七丸吐出頑涎即甦大効如口噤以物幹間灌之下咽無有不活者

潤喉散 治氣鬱夜熱咽乾硬塞  
桔梗半錢 甘草一錢 紫河車四錢 香附三錢 百藥煎半錢

右為末傳口內

又方 喉痛

鵬砂 膽礬 白彊蚕 陳霜梅

右為末和噲

附諸方

奪命散 秘方 治急喉風

白礬粘姜蚕 直者炒斷系 鵬砂 皂角末

右等分為末少許吹入喉中痰出瘥

如聖散 三因方 治風痰壅盛咽喉腫痛水穀不下牙關緊急不省人事或時纏喉風並用

雄黃細研 白礬粘 藜蘆厚者去皮心不可生用 猪牙皂角去皮炙黃等分

右為末用一字搗入鼻內吐痰為愈

治咽喉牙關緊閉 經驗方

右用巴豆去殼以紙包巴豆肉用竹管壓出巴豆油在紙上却以此紙作筒撚子點灯吹滅以煙

薰入鼻中一霎時口鼻涎流牙關開矣

治走馬咽喉痺 張子和方

右用巴豆去皮以綿子微裹隨左右塞於鼻中立透如右左俱有者用二枚塞左右鼻中

○愚按已上二方皆用巴豆盖巴豆乃斬關奪門之將熱則流通之理雖是以熱攻熱不妨碍也  
吹喉散 治咽喉腫痛急慢喉閉懸離乳鵝嚙物不下

訶子宿去核晒乾 黃苓酒浸一宿晒乾 膽礬一錢 明礬半錢 牛旁子 甘草生薄荷各五錢

一方有百藥煎

右為末先用好生姜擦舌上每用藥一錢芦管吹入喉中吐出涎痰便用熱茶喫下再吹第二次  
便用熱粥三次再吹用熱茶或熱粥乘熱食之加朴硝末少許如口舌生瘡用藥吹之口中立去  
痰涎為妙

奪命丹秘方 治咽喉一切腫毒木舌雙乳鵝喉風等証

紫荷車 蜜蛇僧各半 砂仁 管竹 姜蚕直者 烏魚骨 茯苓各一錢 射香少許

右為細末麩糊為丸如彈子大陰乾用一丸無根水浸一時頻食一丸作二服神効

奪命筋頭散聖惠方 治急喉痺咽喉腫痛堵塞氣不得痛欲死之狀

膽礬四錢 草烏四錢 礞礬六錢 雄黃一錢

右為末用一筋頭點上咽喉內急吐涎沫立應次以大黄甘草等分俱為麩末每服三錢水一鍾  
半煎至一鍾去滓化乳香一粒溫服滌去熱毒恐為再發一方加白礬二錢

治咽喉腫痛秘方

山豆根 射干花根

右同陰乾為末吹入喉中如神

治喉痺秘方

喉痺為急病 須臾命不通 急研新艾水 入口便和同 膈內無新艾

本丹... 蛇床瓶內燒 其烟繞入口 此病一時消

一方 治喉痺

青黛五分 猪牙皂角 去皮絃五錢 膽礬 熟者錢半

右為細末 醋薄糊為丸 如櫻桃大 每用一丸 以熟絹裹在筋頭上 用好醋潤透 將藥點在口內 喉瘡上 咬着筋 其涎如水 即解 後服防風通聖散

七寶散

殭蚕白直者 十箇 猪牙皂骨一挺 去皮 去毒 全蝎十箇 頭角 全者 去毒 硼砂 雄黃 明礬各一錢 膽礬

右為細末 每用一字 入喉中 即愈

碧雪散 治咽喉閉塞 一時不能言語 痰涎壅盛

灯心灰 二錢 硼砂 一錢

右研為細末 用鵝毛管吹入喉中 立效

噲化三黃丸 秘方 治咽喉痛 大效

山豆根 一兩 硼砂 二錢 龍腦 少許 射香 少許

右為末 用青魚膽為丸 如菘豆大 每服三五丸 噲化津嚥下

碧玉丸 藥院方 治心肺積熱 上攻咽喉 腫痛閉塞 水漿不下 或生瘡癰 重舌 木舌 並宜服之

青黛 盆硝 蒲黃 甘草 末各一錢

右同研 勻用沙糖為丸 每兩作五十九丸 每服一丸 噲化 或用乾藥末 糝咽喉 隔內亦好

龍腦散 御藥院方 治咽喉腫痛 皆因風熱 在於脾肺 邪毒蘊滯 胸膈不利 故發疼痛 急喉痺閉塞 腫

痛 粥飲難嚥

鵬砂 腦子 朱砂各一滑石三錢末石膏二兩甘草生取末炒小半錢重一字

右為細末每服半錢用新汲水調服或乾糝燕亦得

龍腦破毒散 御藥院方 治不測急慢喉痺咽喉腫塞不通

盆硝四錢白殭蚕微炒去嘴末八錢甘草生末八錢青黛八錢馬勃末三錢蒲黃半兩腦子一錢射香一錢

右同研令勻細用瓷合子收如有病證每服用藥一錢用新汲水小半鍾調勻細細呷嚥如是喉

痺即破出血便愈如不是喉痺自然消散也若是諸般舌脹用藥半錢以指蘸藥擦在舌上下嚥

津如是小兒一錢作四五服亦如前法用並不計時候

柑桔湯 活人方 治少陰咽痛

桔梗 甘草 各等分

右吹咀每服五錢水一鍾半煎至八分通口服

桔梗湯 御藥院方 治咽喉腫痛如有物妨悶

桔梗炒五錢半夏湯浸七遍切焙乾二錢半人參去芦頭甘草炙各一錢半

右吹咀每服一兩水一鍾煎七分去滓溫服食後

利膈湯 本事方 治脾肺有熱虛煩上壅咽喉生瘡

鷄蘘葉 荊芥穗 防風 桔梗 人參 牛旁子 隔布炒 甘草各一兩

右為末每服一錢沸湯點服如咽痛口瘡甚者加姜蚕一兩

通氣湯 應驗方 治喉痺疼痛閉塞不通氣水漿不下痰涎壅盛

牽牛頭末一兩鼠粘子半錢防半分半錢七枳殼分半錢甘草一錢二分半生用

右為細末每服三錢沸湯點服

甘露內消丸 應驗方 治咽喉腫痛不利咽乾痛上焦壅滯口舌生瘡

薄荷葉 一兩 川芎 二錢 桔梗 三錢 砂頭 甘草 一錢 人參 柯子 各半錢

右為細末煉蜜為丸如皂角子大硃砂為衣每服一丸噙化下無時

上清連翹散 精義 治諸瘡腫毒咽喉疼痛煩渴大便自利虛熱不寧

連翹 山梔子 甘草 防丰 各一錢

右用水二鍾煎至八分去滓溫服食後

玉鑰匙 大成 治風熱喉閉及纏喉風

煖硝 一錢半 硼砂 半錢 腦子 少許 白殭蚕 一厘半

右研勻以竹管吹半錢許入喉中立愈

鵬砂散 端效方 治咽喉瘡腫閉塞不通

硼砂 白殭蚕 百藥煎 三山豆根 盆硝 薄荷 紫荷車 兩 青黛 一錢 川芎 三錢

右為細末大人每服半錢小兒一字次摻咽中或水調服

三黃丸 大成 治丈夫婦人三焦積熱咽喉腫悶心腸燥煩小便赤澁大便秘結並宜服之

加味三黃丸 秘方

大黃 黃芩 黃連 兩半 硼砂 兩 黃藥子 白藥子 兩半 山豆根 黃栢 苦參 兩 各一 京墨 三錢

射香 少許 片腦 一錢半 冬加知母

右為末猪膽調攤瓶內蒸二次後 片麝礪為丸豆大噙化

荆黃湯 大成 治臟腑寔熱咽喉腫痛大便秘結咽喉之證多是風熱上壅然後成之非寔熱不可服

佛手散 應驗 治咽喉腫痛生瘡風熱喉痺腫塞

薄荷二兩 益硝一兩 甘草七錢 桔梗五錢 蒲黃五錢 青黛三錢

右為細末 每用少許 乾摻 又用竹管吹咽喉內 噙化 下時時用之

絳雪散 大成 治咽喉腫痛 嚔物悶及口舌生瘡

龍腦半錢 硼砂一錢 朱砂三錢 馬牙硝半錢 寒水石二錢煨熟

右研勻 每用一字 摻於舌上 津嚥之

人參清肺散 御藥院方 治脾肺不利 風熱攻衝 咽喉腫痛 嚔物妨悶 宜服此藥

連翹三錢 黃芩 川大黃 薄荷錢半 人參 甘草 梔子 益硝錢一 白附子七分 黃連錢

右用水一鍾 半煎至一鍾 去滓 溫服 食後

牛蒡子湯 大成 治風熱上壅 咽喉腫痛 或生癰瘡 有如肉腐

牛蒡子二錢 玄參 升麻 桔梗去芦 犀角 黃芩 木通去皮 甘草各一錢

右用水二鍾 生姜三片 煎至一鍾 去滓 溫服 食後

涼膈散 大成 治大人小兒 臟腑積熱 口舌生瘡 痰寔不利 咽喉煩燥 多渴 腸胃秘澁 小便不利 一切

風熱並皆治之 方見溫熱

大青湯 端效 治咽喉唇腫 口舌糜爛 疔惡口瘡

大青葉 升麻 大黃錢二 生地黃切焙二錢

右用水二鍾 煎至一鍾 去滓 溫服 食後微利 止

嗽口地黄散 御藥 治脾肺風熱 上攻咽喉 腫痛生瘡 閉塞不通 或生舌脹

黃芩四錢 甘草一錢二分半 荊芥穗一錢 薄荷葉半錢

右吹咀 用水一鍾 半煎至一鍾 去滓 熱嗽 冷吐 不拘時



一方 治喉痺

用射干即扁竹根也旋取新者不拘多少搗爛取汁吞下或動大膽解或用醎醋同研取汁噲引  
出涎更妙又名野萱花

炎累年喉痺舉發 秘方

男左女右以手大指甲第一節灸二三小壯

針喉閉

針少商出血立愈其穴在兩手大指內側去瓜甲角韭菜許三稜針針之 針合谷二穴在虎口

針五分 針尺澤二穴在臂中橫紋出血妙

四物湯見補損

牛縉湯見痰類

○廣按纏喉風喉痺之証其人膈間素有痰涎或因飲酒過度或因飲酒過度或因忿怒失常或因房室不節而  
發作也何則飲酒過度是胃火動也忿怒失常是肝火動也房室不節是腎火動也火動痰上  
而為痰熱燔灼壅塞於咽噎之間所以內外腫痛而水漿不入也其症可謂危且急矣治療之  
法急則治標緩則治本治標用丸散以吐痰散熱治本用湯藥以降火補虛已上方劑其於治  
標已詳悉矣其於治本有缺略也諸方出証但云治風熱而未云治痰熱但云治脾肺火而未  
云降肝腎火予雖不敏贅以管見如挾痰加以瓜蒌半夏或干縉湯之類如挾肝火加以柴胡  
黃連或小柴胡湯左金丸之類如挾腎火加以生地黃黃栢或四物湯加知黃栢之類未知賢  
哲以為何如 又常論之胃肝腎三經之火各有所因而生富貴之家醇酒厚味多生胃火婦  
人隱憂不發多生肝火男子房勞致虛多生腎火人之五臟六腑 皆有火不如此三經之火  
常定見而為病之多也 終