

何氏濟生論

已 4

66

共 8 册



記曰醫不三世不服其藥說者以為
針灸湯液是也然考周秦以來靈素
難經及太史公書其言治療鮮有不
道三事者則其說非也或又以為世
守其業傳之久則術精竊又以為不
然自古至今以醫名者夥矣竝由特

起非出家傳惟晉王莽和世為太醫
而其所作傷寒論序例後人用為詆
厲近世陶氏傷寒六書自稱家祕戒
其子孫勿以示人今其書具在鹵莽
膚受實為長沙亂臣然則世傳之
說其不然乎竊謂道之當然者為法

而所以然者為意，非可傳也。輪扁七十矣，而斲輪之道不能傳諸其子。所可傳者，獨其法焉。已耳。而古之深於其道者，雖世無可傳之人，而必著之於書，則以意不可傳，而法可傳。有善學者，於此親其法，可以得其意。故

往其子孫不能得而他人得之當
時不能得而後世得之得其人則糟
粕而神奇也不得其人則神奇而糟
粕也乃世之為子孫者不能得其先
人之神奇而獨取其糟粕而寶藏之
一朝朽蠹糟粕泯而神奇亦泯豈

不悖哉京江何氏培元者近代之善
醫者也及其後子孫世其業大江
北莫不知之其所著濟生論海內
欲觀其書者甚多而莫能得也今
其鄉莊君孝容求諸何氏之後人
將梓之以濟世而培元氏之從孫
鳳翽不私

其家傳而概然付之期以鍼俗醫之
聾瞶拯斯民於天札二君之用心亦
仁矣哉孔生繼治者僕門下士也與
於校讐之役因莊君之請郵書於
僕而問序焉僕親是書備列諸病而
系以治法方藥與近世方書畧同其

論治大抵融會諸家而參之已意其
方多取諸古人而間附新法不主一
家歸於純正無與渺難知之論無險
異難行之法蓋將使中人之資而循
途而造乎可不謂詳慎者歟抑僕更
有說焉許叔微氏有言曰醫者言也

天下之病無窮而方有限方者大法而
已得其意而後法可得而用也學者
誠能察十四經明四診溯之靈素本
草難經以濬其原求之玉函金匱以
明其道參之晉唐以下諸家以會
其通多問難習證候以盡其變而加

一
之以靜專純一之心思神明化裁之

運用以盡其神而後觀於斯書左右

采獲其益益不淺矣若沾以守此

一編而謂可以治天下之病執寒熱

虛實四字而謂可以盡天下之病情

則非培元氏著斯書之心亦豈莊君

何君刊是書之心哉是為序昔嘉慶
二十有一年歲在丙子季秋月朔
賜進士及第榮祿大夫 經筵講官
上書房行走 武英殿總裁禮部左
侍郎提督浙江學政山陽汪廷珍



何氏濟生論總目

京江河鎮培元甫纂集

再姪孫鳳翽紫庭節錄

卷一 卒中痿廢類 共計十九証

卷二 諸虛勞怯類 共計十八証

卷三 諸邪感冒類 共計二十二証

卷四 中州諸病類 共計十五証

卷五 內因雜症類 共計二十七証

卷六 形骸諸病類 共計二十九証

卷七 婦人諸病類 共計二十八証

卷八 產後諸病類 共計二十七証

共計一百七十五

卷五 內因諸証 共指二十小証

卷四 中風諸証 共指十五証

卷三 諸邪風目眩 共指二十二証

卷二 諸虛等証 共指十八証

卷一 卒中諸証 共指十小証

京山何巖亭示甫纂集 再致紙風隲業或前粹

何氏濟生論目



何氏濟生論

京江何鎮培元甫纂集

再姪孫鳳翹紫庭節錄

卷一目次 卒中痿廢類

中風論

中氣論

中寒論

中暑論

中濕論

中食論 附傷食論

可氏齊三論

卷一

目次

二

靜觀堂



何氏海生論
卷一
藏板

中惡論

痿症論

痺症論

白虎癰節風論

厲風論

厥論

瘳癰論

顛振論

攣論



南京中醫藥大學圖書館版權所有

譚妄論

循衣撮空論

喜笑不休論



南京中醫藥大學圖書館版權所有

何氏濟生論卷一

京江何鎮培元甫著輯

京江莊孝容刊刻

再姪孫鳳翹重訂

京江孔繼治校閱

龍眠吳文煥校閱

中風論

夫風者百病之長也由是觀之中風在傷寒之上為

病急卒岐伯所謂大法有四一曰偏枯二曰風痺三

曰風懿四曰風痺言其最重者也外有五臟諸風已

載在千金編茲不復敘大抵人之有生以元氣為根

偏枯者半身不遂風痺者身無痛楚四支不收風懿者奄忽而不知人風痺者



諸痺之類于風者也

按初得總宜調氣日久又當養血

榮衛爲本根氣強壯榮衛和平腠理緻密客氣焉能干之或因喜怒或因憂思或因驚恐或飲食不節或勞役過傷遂致真氣先虛榮衛失度腠理空疎邪氣乘虛而入及其感也爲半身不遂肌肉疼痛痰涎壅塞口眼喎斜偏廢不仁神智昏亂舌強不語頑痺不知精神恍惚驚惕恐怖或自汗惡風筋脉攣急變症多端治療之法當推其所自若內因七情而得者法當調氣不當治風外因六淫而得者然亦先調氣然後依所感六氣隨症治之此良法也若髮直吐沫搖

髮直以下皆脫
症以大劑參附
著木猶有可治

按半身不遂雖
有氣血之分而
養血尤為急務
所謂靜勝其燥
也經云風氣通
于肝風搏則熱
甚熱甚則水乾
水乾則氣不榮
精乃亡此風之
所由作也故曰

頭上撮面赤如粧或頭面青黑汗綴如珠眼閉口開
聲如鼾睡遺溺不知人事者皆不可治

夫中風之症大率多血虛有痰當以治痰為先次養
血行血亦有挾火與濕者更不可不分氣虛血虛之
不同也如半身不遂在左屬死血淤血血虛在右屬
痰熱氣虛在左用四物湯加桃仁紅花竹瀝薑汁在
右用二陳湯四君子湯亦加竹瀝薑汁夫竹瀝薑汁
能開經絡行血氣中風藥內決不可廢若能食則去
竹瀝加荊瀝亦可肥白人多濕用烏頭附子行經亦

治風先治血
行風乃滅古方
有順風行氣散

虎骨散外用蠶
沙二石分作三
袋蒸熱着患處
冷再易以癢為
度內用羊脂入
粳米葱白薑椒
豉煮熟日食一
具十日大效

中府亦有兼中
臟者如左關脉
浮面目青左脇
痛筋脉拘急目
瞶頭目眩手足

可如筋枯者動則必痛是無血以養經也為不治之症

經云風為百病之長善行而數變者也風本為熱熱極則生風宜靜勝其燥是養血也然風有中臟中腑中經脉之分中腑者宜汗之中臟者宜下之夫多汗則虛其衛多下則虛其榮而又不可無汗下之法者以經有風從汗泄之說也中腑之症脉必浮五色必顯于面惡風惡寒拘急不仁或中身之前或中身之後或中身之側皆曰中腑其治多易中臟之症唇吻



不收坐踞不得者中胆兼中肝
也用犀角散左
寸脉浮而洪面
赤汗多惡風心
神顛倒語言蹇
澁舌強口乾恫
悸恍惚者中胞
絡兼中心也加
味牛黃散右關
脉浮而緩面黃
汗多惡風口喎
語澁身重怠惰
嗜臥肌膚不仁
皮肉聳動腹脹
不食者中胃兼
中脾也宜防風
散右寸脉浮濇

不收舌不轉而失音鼻不聞而閉塞耳聾眼昏便溺
俱秘或目瞪直視手撒遺溺痰如拽鋸鼻鼾如雷皆
曰中臟多不治也大抵中腑多着四支中臟多滯九
竅若能順時令而調陰陽安臟腑而和榮衛久服藥
餌未有不愈者也又有中氣與中風相似但中風口
中多痰涎中氣口中無痰涎耳經言善治風者以順
氣理風氣順則痰自消除徐治其風庶可取效又有
中風語言不變志意不亂病在腠理之間只宜溫臥
取小汗為可復也凡中風脉必沉伏大抵浮遲者吉

而短鼻流涕
面白多喘胃中
昌悶短氣自汗
聲嘶四支痿弱
此中大腸兼中
肺也五味子湯
左尺脉浮滑面
目黛黑腰脊痛
引小腹不能俛
仰兩耳虛鳴骨
節疼痛足痿善
恐者中膀胱兼
中腎也宜獨活
散

急實者凶如中風昏沉口禁急以生半夏或皂角吹
鼻中噴嚏則生無噴嚏者死肥人中者以其氣勝于
外而歉于內也肺為氣出入之道肥者必氣急氣急
則肺邪必勝肺邪勝則肺金必尅肝木胆為肝之腑
肝傷則胆傷而痰涎未有不盛者也所以治法必先
理氣若氣未順痰未除調理之劑惟當以藿香散和
星香散服此藥非特可治中風即中氣中惡尤宜尋
常嘔吐多痰者亦宜用之大率治風之法初得之即
當順氣日久又當養血和血以四物湯吞活絡丹而

愈者正是此意若不先順氣化痰遽投烏藥附子又不活血養血徒用羌防天麻者未見其能治也又風中于膚腠輒用腦麝治之是引風入骨髓也若外無六經之形症內無便溺之阻隔但血弱不能榮筋以致手足不能運動舌強不能語言惟養血而筋自榮矣大秦朮湯此疾之要藥也

歌括

腑中風邪顯六經面加五色表之形若還中臟多偏阻絕症臨之命必傾半身不遂喎邪口此是風邪中

太陽經症頭痛
身熱脊強陽明
經症目痛鼻乾
不得臥少陽經

症耳聾脇痛寒
熱嘔吐口苦太
陰經症腹滿自
利咽乾少陰經
症舌乾口燥厥
陰經症煩滿囊
縮

在經有表汗之須續命六經加減認宜真須知在裡
溲便閉實者尤當三化行原無表裏秦芄治大要清
心靜養神

又

卒倒分明是氣虛濕痰能中左邊支右邊死血并無
血不語涎多吐最宜口噤拘攣風熱甚四肢不舉屬
於脾更兼痿蹙并麻痺休作風邪真中醫

不附錄

風為四時八方之氣八方之風從其鄉來者主長



中
中
中

養萬物若不從其鄉來者為虛賊風體虛者則中

之當時未必即發重感風邪遂發為病藏府有俞

俞皆在背中風多從俞入而有中府中藏中血脉

之分中府者其病在表多着四肢故肢節廢脉浮

惡風拘急不仁外有六經之形證以小續命湯及

疎風湯汗之中藏者其病在裏多滯九竅故唇緩

二便閉 脾中 不能言 心中 耳聾 腎中 鼻塞 肺中 目

瞽 肝中 以三化湯下之麻仁丸亦可中血脉者病

在半表半裏外無六經之證內無二便之閉但見



惟中藏之症是
閉而非脫者宜
蘇合丸若中腑
及中血脉者皆
不宜以內有冰
片恐引邪深入
也
傳心方云治男
婦涎潮于心卒
然中倒者當時
卽扶入煖室扶
好正坐當面作
醋炭薰之令醋

口眼喎邪半身作痛不可過汗恐虛其衛不可大
下恐虛其營惟當以大秦芫湯羌活愈風湯和之
凡中風昏倒先須分別閉與脫二證如牙關緊閉
兩手固握卽是閉證用蘇合丸或三生飲之類若
口開心絕手撒脾絕眼合肝絕遺尿腎絕聲如鼾
睡肺絕卽是脫症宜大劑理中湯灌之雖曰不治
亦可救十中之一若誤投蘇合牛黃至寶之類卽
不可救矣蓋斬關奪門之將原爲閉証設若施之
脫症如人旣入井而又下之石也

氣衝入鼻內良
久其涎潮聚于
心者自收歸舊
輕者即甦重者
亦醒人事必不
可喫一滴湯水
入喉若吃湯水
則其涎永繫心
絡不能去必成
廢人

諸中風或已甦
或未甦忽然吐
出紅紫血者不
治
靈樞經云卒中
僻急者頰經有

陰陽經絡周環於身風氣乘虛入于諸陽之經則
角弓反張有汗不惡風者為柔瘓無汗而惡寒者
為剛瘓手三陽之筋結于頷頰足陽明之筋上夾
于口風寒乘虛而入則攣故牙關緊閉而口噤脾
脉絡胃夾咽連舌本散舌下心之別脉系舌本心
脾受風則舌強不語亦有因腎脉不上循喉嚨挾
舌本者夫喉嚨者呼吸之塗會厭者音聲之戶舌
者聲之機唇者聲之扇風寒客于會壓則卒然無
音口眼喎斜多屬胃土而有筋脉之分經云足之

寒則急引頰移
頰有熱則縱緩
不收以桑鈎鈎
之以桑灰坐之
以馬膏熨其急
頰以白酒和桂
末塗其緩頰且
飲美酒噉炙肉
時珍曰左中寒
則逼熱于右右
中寒則逼熱于
左熱者緩而寒
者急馬膏甘以
緩急桂酒辛以
散熱也

陽明手之太陽筋急則口目為僻背急不能卒視
此胃土之筋為病也又云足陽明之脈挾口環唇
此胃土之脈為病也中風小便不利者不可以藥
利之自汗則津液外亡小便自少清熱止汗小便
自行也

劉河間云風病多因熱甚而俗云風者止言其末
而忘其本也有病風者亦非外中之風良由將息
失宜故心火暴熾腎虛不能納氣歸源使悉奔而
上是水少不能制火以致陰虛陽實而熱氣怫鬱

心神昏憤甚則率倒無知故主乎火也亦有因喜
怒悲憂恐五者過極而卒中者若所感微熱則身
雖強朴而氣血尙能流通是以筋脉不攣發過仍
復如故甚則熱氣太甚滯鬱不通陰氣暴絕陽氣
後竭其倉卒不救而至于死者有矣

風門選方

防風通聖散

治風熱壅滯并大腸乾燥小便不利驚惕暴瘖
癩症風熱火病及遍身雲斑紫黑癩風癩疹風

刺

通聖芍歸朮草硝

荆防梔子薄連翹

大黃赤芍黃芩桔

滑石麻黃及石膏

加減防風通聖散

諸風防中

減加通聖最奇方

中風預服可先防

除去硝黃梔膏滑

增入天麻烏蠶羌

涎盛只加星半實

體虛氣弱磨木香

通關散



通關

通關風閉牙關急
細辛牙皂末搐鼻

稀涎散

大取涎

礬用明光皂用肥
不蛀四枚去黑皮

每服半分溫水下
寒吐其涎末得生機

省風湯

省風防風天南星
甘草黃芩半夏同

小續命湯



治經絡通血氣兼治諸風傳經

小續芩麻草芍芎 杏仁桂附已參風

大醒風湯

治中風痰涎壅塞筋骨拘攣嚴冬卒中必用之

藥也

大醒湯中用星蝎 國老附子風獨活

八味順氣散

治風症挾虛服之令人神清氣爽

八味順氣芷陳青 烏藥人參草朮苓



順風勻氣散

勻氣天麻芷朮草 青皮烏藥沉香卵

烏藥順氣散

治寒澁頑麻諸症服有神效

烏順陳蠶與烏藥 薑麻芷桔草芎殼

排風湯

治風虛冷濕邪氣入臟狂言妄語

排風獨蘚桂麻芎 杏芍歸苓朮草風

羌活愈風湯

可天齊三論

卷一

風症選方

九

靜觀堂



南京中醫藥大學圖書館版權所有

愈風杞菊芎歸細

蒼朴柴胡防二地

參薯蔓草羌獨苓

藁芍荷朮桂知芷

守田杜仲地骨皮

麻黃黃芩殼防已

防風通聖散

見前

清氣散

清氣前柴羌獨芎

青皮木草殼參苓

大防風湯

祛風順氣活血養筋除寒濕逐冷氣并痢後脚

疼軟弱不能動履及兩膝腫疼脛骨粘細名鶴



膝風亦宜

大防杜草膝羌防 木附參著四物湯

川芎茶調散

治諸風上攻偏正頭痛鼻寒頭重身重爲末茶

調服

茶調羌芷細辛芎 荆薄防風國老同

大秦芎湯

治手足艱難言語蹇澁服之自能舒伸

大秦白朮茯苓防 羌獨芎歸二地黃



白芷黃芩兼白芍 石膏甘草細辛良

消風散

治諸風上攻頭目昏眩惡心嘔吐項背拘急鼻

嚏聲重耳鳴及皮膚頑麻癩疹并婦人血風頭

皮腫痒

消風芩朴卯芎羌 陳藿蟬蠶草芥防

胡麻散 治遊風癩疹

胡麻苦參荆芥穗 首烏甘草靈仙輩

清心化痰湯



治驚恐後言語妄誕不省人事

清心化痰山梔草 陳半香防木冬棗

石菖蒲與遠志苓 枳實乾山玄明少

四君子湯 氣虛 六君子湯

四君國老朮參苓 六君四君加半陳

四物湯 血虛

四物芎歸生地芍

二陳湯 化痰妙劑

二陳橘半草茯苓

可氏齊生論

卷一

中風選方

十一

靜觀堂



三化湯

中風便秘三化湯

厚朴將軍枳實羌

滌痰湯

治中風痰迷心竅舌強不能言

滌痰湯半實苓參

茹國菖蒲橘用陳

八仙散

治遍身風疹疥癩筋骨麻木痺濕腫痛

八仙荆芥葳靈芎

苦參何首羌活風

立效散

破傷風



立效雄黃香白芷
好酒濃煎服之愈

交加散 白虎癰節風

交加散除白虎病
局方五積敗毒共

羌活湯 治同上

羌活桃芎防碎補
秦牛當國呆官附

獨聖散 附二神散三仙

獨聖瓜蒂蠶汁調
二神藜蘆常山高

三仙防風與瓜蒂
葱管藜蘆蠶汁熬

四靈散



四靈赤豆草錢半 參蘆二錢瓜減半

蠶汁調服一二錢 虛者一錢除其半

五玄散

五玄赤豆牙皂同 明礬棗礬藜蘆攻

六應散

以上至獨聖散皆斬關奪門之法任選用之

六應滑石鬱金芎 等分蠶汁空心服

牽正膏又名改容膏

耑治口眼歪斜

用草麻子

兩

去殼研入冰片

三分

再研敷歪左敷右



歪右敷左

又方

用鱧魚血入冰片許亦照前法正即洗去

清神化痰丸

陳皮

去白一兩五錢

白殭蠶

炒去絲二兩

麥門冬

去心二兩

天竺黃

煨二兩

香附子

一兩

半夏

二兩五錢

琥珀

一兩

枳殼

炒二兩三錢

片黃芩

酒炒二兩

犀角

佩人身一晝夜七錢

防風

一兩五錢

黃連

一兩五錢

遠志

甘草水浸七錢

牛胆星

二兩有胎勿用

可氏齊生論

卷一

風症選方

三

靜觀堂



南京中醫藥大學圖書館版權所有

何氏濟生言 卷一 三 藏板

為細末竹瀝二大碗姜汁一小盃打薄麵糊和

丸食遠服

清氣天麻湯

治因氣怒頭眩胸滿脹痛手足麻木

香附子

蒼朮

天麻

陳皮

茯苓

僵蠶

半夏

川芎

天南星

防風

黃連

枳實

白芷

甘草

山梔

活絡丹



治半身不遂

川當歸

川續斷

水川杜仲

各二兩
五錢

牛蒡子

八兩

為細末煉蜜丸桐子大每服三錢空心開水下

又方

治中風手足無用日久不愈經絡中有濕痰死

血者此方主之

胆星

川

烏

炮去
皮臍

草

烏

炮去皮
各六兩

故龍

乳

香

去油

沒

藥

各二
兩

煉蜜丸

牛黃清心丸

牛胆星 一兩

白附子 煨一兩

鬱金 五錢

川烏 麵包煨去

麵一兩

半夏 用皮硝滾水泡五次又用
皂角水泡一次用礬水泡

一次共
制七次

右五味為末臘月黃牛胆二枚取汁和前藥拌

勻仍入胆內札口懸風簷下至次年可用再加

渡過淨芒硝 辰砂 各一錢
冰片 少許
南礪砂 一錢

麝 少許
取胆內藥一兩四錢稀糊丸大豆大金箔



當為衣每用一丸姜湯化下

省風化痰湯

治卒中風邪語言蹇澁口眼歪斜神智昏亂偏

廢不仁

藥天衣麻

殭蠶

半上夏

橘紅

黃芩

黃連

麥星冬

防四風

土薑十積木實

星遠精志

甘草

胆星

香附

一掛茯

神酉益食



加姜汁一匙竹瀝半酒盃食遠服

星香散

胆星八錢木香八錢每四錢生薑十片水一碗煎七分

温服

藥酒方

自製治渾身疼痛除濕氣壯筋骨

虎脛骨

五錢

蒼朮 薏仁

各三錢

省黃

芩

茯苓

葳靈仙

當歸

牛膝

川斷

各二錢



草

藓 一錢五分

川芎

知母

秦艽

天麻

黃

栢

各一錢二分

無灰酒二十五觔絹袋盛藥浸酒內壘口用箬

葉札緊上放淘過元米一撮以水浸壘大半截

煮待米成飯為度取出埋土中七日

蘇合丸

白朮

木香

犀角

香附

朱砂

研

訶梨勒

白檀

安息香

另末無灰酒一升熬膏



沉香

麝香研

丁香

萹撥

龍腦二兩研

蘇合香入安息膏內

薰陸香

一兩研

為細末入另研五味和勻用安息膏并煉白蜜

和劑每服旋丸如桐子大取井華水溫熱候冷

任意化服四丸小兒一丸用蠟紙裹一丸如

彈子大緋絹依當心帶之一切邪氣不敢近

三生飲

治卒中昏倒口眼喎斜一切風痰氣暈等症



南星一兩

川烏去皮

生附子五錢

木香二錢五分

每服五錢薑十片煎服若涎痰壅甚者每服加全蝎四枚氣盛只用星香氣虛全用卒中始作無不立效

犀角散

治肝藏中風

犀角

石膏一兩

羌活

羚羊角七錢五分

人參

甘菊



獨活

黃耆

川芎

白朮

黃芩

天麻煨

只

殼去穰炒

當歸

棗仁

防風

白芷五錢

甘草二錢五分

每煎服五錢

牛黃散

治心臟中風

牛黃

射香

犀角

羚羊角

龍齒各另研

防風



天麻煨

獨活

人參

沙棘參

茯神

升麻

甘草炙

白蘇

遠志

正天竺黃

二錢五分

龍腦

一錢

硃砂

鐵粉

另研

麥冬

五錢

爲末麥門冬湯調下二錢

防風散

黃治脾藏中風

防風

麻黃

人參



川芎

附子

桂心

黃芩

赤苓

棗仁

白朮

獨活

桑皮

羚羊角

七錢

甘草

五錢

每煎服四錢姜五片

五味子湯

甘治肺藏中風白

五味子

杏仁

桂心

防風

甘草

赤芍



南京中醫藥大學圖書館版權所有

川芎 羌活 獨活 天麻 附子 當歸 細辛 牛膝 甘草 黃芩 山茱萸 枳殼 丹參

每煎服五錢

獨活散

治腎藏中風

獨活

附子

當歸

防風

天麻

桂枝

心雨

川椒

甘菊

枳殼

山茱萸

黃芩

丹參

牛膝

甘草

細辛



菖蒲 白朮 草薺

每煎服四錢姜為引

易簡三生飲 重

治諸中諸逆厥卒倒不知人者諸脫症不宜服

南星 一兩 川烏 去皮 附子 五錢

木香 二錢

每服五錢煎溫服

史國公酒藥方

專治風痰半身偏枯手足拘攣不堪行步若飲



一升便手能梳頭二升足能屈伸久服肢體通

暖百節遂和舉步如飛

防

風 去蘆 二兩

秦

朮 去蘆 二兩

當

歸 三兩

草

薺 酥炙 三兩

羌

活 三兩

鱉

甲 九筋者 二兩

川牛膝

去蘆 二兩

虎脛骨

酥炙 二兩

白

朮 去蘆 二兩

油松節

二兩

杜

仲 三兩 姜汁炒

曉蠶沙

三兩 炒黃

蒼耳子

四兩 搥碎

拘杞子

五兩 炒

乾茄根

八兩 飯上蒸

布袋盛入大罈內下好酒三十五觔封口浸十

四日滿將壘入鍋懸煮一時取起埋土內三日



每日清晨午後各服五七盃大有補益衰年尤

宜

宜灸益人大輪肉不致配三十正儉挂口

香耳干四兩

味甘干五兩

草酸財土蒸

山公酒二兩

味甘干五兩

草酸財土蒸

椒半類二兩

椒半類二兩

椒半類二兩

草類三兩

草類三兩

草類三兩

風二兩

風二兩

風二兩

百濟滋味舉世收派

一長則平指赫顯二代以指風軒八期期斷能



七情之氣皆能
使中而怒氣爲
九

中氣論

凡人七情內傷氣逆爲病則痰潮昏塞牙關緊急大
畧與中風相似然中風與中氣有辨風中身溫氣中
身冷風中多痰氣中無痰風中脉浮應人迎氣中脉
沉應氣口以氣藥治中風則可以風藥治中氣則不
可如纔覺中氣急以蘇合香丸灌之候醒繼以八味
順氣散重加香附或木香調氣散餘痰未平宜多進
四七湯及星香散其人若虛痰氣上逆關隔不通或
大便虛秘宜用三和丹

大翻按外中風邪爲中風其餘非外中之風而卒倒
昏暈痰涎潮壅者俗醫則統而該之曰類中故醫
方亦多立真中類中二門不知類中內有中氣中
寒中暑中濕中食中惡之分差之毫厘謬以千里
存亾生死係于旦夕之間若不細加詳察遵照治
良例而統攏摩糊概用星香等藥不幾以人命爲兒
戲耶故特將抄本內類中論一則刪去照原刻分
出中氣中寒以下諸條庶讀者知所詳審也

中氣選方

八味順氣散

治中氣先服此藥次進治風之藥

白朮

茯苓

青皮

去白

白芷

陳皮

去白

天台烏藥

人參

一兩

甘草

炙五錢

為末水煎服三錢

木香調氣散

治氣滯胸膈虛痞惡心宿冷不消心腹刺痛

白荳蔻仁

丁香

檀香

二兩

二兩



木香 二兩

藿香葉 八兩

砂

仁 四兩

炙甘草 八兩

為細末每服二錢入鹽少許不拘時滾水點服

三和丹 即來復丹

治上盛下虛裏寒外熱伏暑泄瀉如水

硝石 同硫黃為末炒不
可太過研極細

太陰玄精石 研水飛

舶上硫黃 透明者上
各一兩

五靈脂 水澄去
砂晒

青皮 去白

陳皮 去白
二兩

為末好醋丸梧子大米飯下三十九



四七湯 見氣論

素問云冬三月是謂閉藏水冰地拆無復生

氣起必發也此去寒就溫之說也不善調攝

之者必傷陰虛口噤失音四肢痠重或洒洒惡寒

氣弱發熱而多汗夫抵中之狀必通於表裏

手足逆冷身熱而脈沉細痛疼治之之法

宜用溫散之

氣虛守中守中之意

守中之意

守中之意

可氏齊生論

卷一

中氣

三

靜觀堂



南京中醫藥大學圖書館版權所有

四子醫本具稟備得子大者飯下三十九



南京中醫藥大學圖書館版權所有
1964

中寒論

素問云冬三月是謂閉藏水冰地拆無擾乎陽蚤臥
晚起必待日光此去寒就溫之說也不善調攝觸冒
之者卒然眩暈口噤失音四支殭直或洒洒惡寒或
翁翁發熱面赤多汗大抵中寒脈必遲緊挾風則脈
浮眩暈不仁兼濕則脈濡腫滿疼痛治之之法切不
可妄下妄吐惟當溫散之

夫中寒之人胃氣虛冷寒毒中之膚腠疎豁一身受
邪難分經絡無熱可發溫補自解此因胃氣之大虛

也然傷寒雖熱甚不死中寒若不急治則死甚速其
虛實概可見矣

歌括

胃虛膚豁中寒深厥逆身涼脉細沉要辨內傷並外

感理中薑附倍加參

中寒方

薑附湯

薑附一方何所醫
體虛中寒昏不知

理中湯
附治中湯



理中甘草术姜参

治中理中加青陈

附子理中汤

附子理中療寒痼

理中方內加川附



中暑多汗而初起卽渴脉必虛大而無力傷寒初起不渴其脉浮緊而有力有此異耳

中暑論

夫中暑所以脉虛者蓋熱傷氣而不傷形也且暑者在天爲熱在地爲火在人藏爲心是以暑喜傷心令人身熱頭痛狀類傷寒但背寒面垢此爲異耳甚則昏倒不知人手足微冷煩渴口燥或吐或瀉或喘或滿此皆暑氣之所爲也大抵中暑悶亂切不可便與冷水及臥冷濕地得冷則死惟溫養宜用布蘸熱湯熨臍中及氣海或掬熱土置臍心得溺則漸甦醒以米湯徐徐灌之然後隨症調治近來江浙間中暑多

有搐搦不省人事者屢見之矣醫經之所不載診其
 脉浮而虛浮則為風虛則為暑此中暑而又傷風故
 有是症俗名謂之暑風若作驚癇治之多至不救倉
 卒之際宜以溫熱水化蘇合丸灌之俟其稍醒即以
 黃連香菇飲加羌活煎服作效者多矣
 暑之為病所感不同富貴之人避暑于涼亭大厦為
 陰寒所逼暑火不升靜而得之名曰中暑中暑者陰
 症也辛苦之人勤耕負重大暑行途動而得之名曰
 中暍中暍者陽症也陽症正氣必為所傷蓋熱能傷

此暑宜
 暑濕而得之
 暑不勝其熱
 大而無功
 跌打損傷
 中暑之類



甘草令人除...
東...
...

氣故也宜清暑益氣用香茹黃連扁豆參耆五味子
知膏是也陰症者爲陰寒抑遏使陽氣不能升越此
寒爲標熱爲本也法當辛溫之劑解表散寒朴蘇乾
葛羌藿蒼朮是也後以辛涼治本無不愈者如黃連
香茹扁豆天水益元之類治之若仍以辛熱之劑可
乎學者審脉察症斯無惑矣夏中人多喜食冷物及
過飲茶水致傷脾胃調治之法惟當溫脾消食治濕
利小便之藥乃治暑之要法若旣傷暑熱復傷生冷
是外熱而內寒宜先治其內溫中消食次治其外清

東坦云夏月服
生脈散加黃耆
甘草令人氣力
湧出

暑補氣而以理解為主乃先後緩急之良法也秋初
夏末頭痛脚軟食少體熱俗謂之暑風暑風未有不
挾痰挾火而得之者實者可吐虛則不宜又有疰夏
之症歲歲當此即便舉發此乃陰虛元氣不足故也
宜以補中益氣湯去柴胡升麻加炒黃栢白芍挾痰
者加南星半夏陳皮之類或中暑而值無醫之處急
以葱白入鼻中或研蒜汁以灌之蓋葱蒜之氣臭烈
能通諸竅故也

歌括

暑傷氣分汗如傾身熱頭疼躁不寧所感必須分動
靜陰陽二症自能明

選方

香薷飲 附黃香飲

香茹用茹扁豆厚 黃香加連去扁豆

清暑益氣湯

清暑益氣二木神 升陳著栢澤歸倫

青皮必用連花者 甘草參冬味葛根

補中益氣湯



補中益氣用升陳 柴草歸著白朮參

十味香菇飲

十味香菇朮朴茹 參苓陳草豆瓜薯

五苓散

五苓桂澤蒼苓猪 四苓五苓官桂除

縮脾飲

縮脾草果葛砂仁 白扁烏梅粉草成

六和湯

和六腑祛暑加香菇發表散寒加紫蘇



六和杏扁國參砂
半藿朮苓厚木瓜

二香散

二香散用藿香正
黃連香茹散相並

枇杷葉散

枇杷葉散治暑邪
香茹甘草陳木瓜

麥冬厚朴丁皮共
再用茅根實更佳

茹苓湯

瀉暑

茹苓香茹同五苓

實腸散



中濕論

丹溪曰東南之人多由濕土生痰痰生熱熱生風清燥湯主之

濕有自內生者有自外入者治之法當審其方土所致焉東南地卑土濕濕氣多從外入病起自下而腿腫脚氣者多治當溫汗表散久則滲泄之西北地高宜無濕矣然多食濕麵潼乳酒醪或酒後寒氣怫鬱濕不得越濕氣多從內生病起自中而腹皮脹滿水鼓浮腫者多治當通利二便甚則逐水以驅之然南北雖殊病亦互見但多少有不同耳濕之爲病又有上中下之分如上焦有濕及熱須用黃芩以其能

濕之在下者又宜升提

瀉肺火也若肺屬虛熱則宜天冬麥冬知母而已恐
 黃芩用多必傷肺也中焦有濕及熱須用黃連黃連
 能瀉心火用薑汁炒而用之下焦濕腫及痛並膀胱
 有火者須用龍胆草酒炒防已黃栢知母而已惟蒼
 朮一味上下皆宜大率以二陳湯加黃芩羌活蒼朮
 以散風行濕為治濕要法再者肥人多是濕疾宜蒼
 朮茯苓滑石肥白人多是氣虛宜二朮人參半夏草
 菓厚朴芍藥黑瘦人多熱宜白朮黃芩所見所錄惟
 止於此學者宜進而研之



夫中濕之變症多端挾風者爲煩熱爲流走爲拘急
兼寒者爲痛爲浮腫風寒二氣合則爲痺皆中濕之
後挾以異氣而然也治濕之法不可大發汗尤不可
以火攻惟當利小便使濕從下解經云治濕不利小
便非其治也

歌括

東南土薄濕多生風雨山蒸屬外因西北地高無水
氣乳醪濕麩內因成腰如石墜頭如裹聲壅如同甕
裡鳴肢節痛兮兼痿痺四肢緩縱不能行脉來沉緩

無疑惑疽腫虛浮瀉利頻上下分消須汗泄若然濕

鬱取風升

濕症選方

獨活寄生湯

治濕痛

獨活寄生牛活寄 人參國老秦防杜

細辛桂心白茯苓 白芍當歸四物輩

除濕湯

除濕用半夏

二朮陳苓藿



厚朴同甘草

生薑棗共酌

滲濕湯

滲濕人參附朮苓

乾薑芍藥桂枝并

當歸拈痛湯

拈痛羌防卯苦參

當歸二朮草茵苓

猪苓澤瀉黃芩製

知母升麻好葛根

祛濕化痰湯

祛濕化痰湯茯苓

陳皮防已薄南星

羌活獨芩靈附草

歸耆白朮半蒼倫



滲濕化痰湯

治風濕流注渾身疼痛手足艱于舉動

滲濕化痰半芫蒼 靈草天麻苓桂防

防已五加同薏苡 痛加附子引生姜

生附湯

生附二木草 乾姜杜仲好

茯苓牛膝朴 姜棗煎為寶

羌活滲濕湯

羌活滲濕草防風 芍夕歸苓二木重



苓柏澤青龍胆草 木瓜防已亦相同

除濕虎潛丸

虎脰骨

兩一

川草薺

兩二

香附

兩二

天麻

兩二

防已

兩二

桑寄生

兩二

黃柏

兩二

木瓜

兩二

白茯苓

兩一

五加皮

兩一

川牛膝

兩二

防風

兩二

當歸

兩二

獨活

兩二

釵石斛

兩一

茅朮

兩一

秦艽

兩一

稀簽膏為丸每服三錢空心開水下



治下部濕痰流注膝腫一方加貝母

薏仁

海櫻桃

牛膝

升麻

當歸

土茯苓

米泔洗淨
木槌打碎

各四兩

水十碗煎至七碗不拘時當茶飲

治濕氣單方

用臭梧桐葉吊風處陰乾每四兩無灰酒一觔浸
壘內不時飲

一方



桑葉

一劬

枸杞子

三兩

白蒺藜

三兩

巨勝子

炒三兩

白茯苓

二兩

生地黄

山藥

甘菊花

各二兩

苡仁

三兩

女貞實

炒三兩

當歸身

三兩

共為末煉蜜丸桐子大每服六七十丸空心開

水或酒下此藥能壯筋骨起痿疲補精神明眼

目活經絡除風濕治腰膝軟弱烏鬚黑髮延年

不老

五苓散



澤瀉

猪苓

白朮

茯苓

肉桂

煎服

澤瀉斜風馬齒頭煎澤瀉馬齒頭煎

水

水煎服不吐藥渣出後骨蒸熱來煎服

共

共煎末煎或煎干大轉煎六寸十式空心開

文真寶

三

當歸

三

山藥

三

甘藷

三

白朮

三

白朮

二

生肌黃

桑葉

一

淋沐子

三

白朮

三



中食論

飲食內傷變爲異常急暴之症狀如中風口不能言
目不識人四肢不舉急投蘇合香丸不效卽以生姜
鹽湯恣飲探吐得吐卽愈大抵此症多因飲食醉飽
之後或感風寒或因氣鬱以致飲食填胸胃氣不行
內傷特重若誤作中風中氣等症而用祛風解表行
氣之劑則胃氣重傷死在旦夕今後凡遇急症須審
問明白若方飲食醉飽或感風寒重複受傷但覺胸
膈有食滯者只作中食治之

東坦云輕則損其穀重則逐其滯蓋少壯新病宜用
推逐速去爲美老弱久病又宜導化漸去爲佳

歌括

胸膨噫氣爲傷食氣口緊盛端可識所傷仍辨熱和
寒元氣要分虛與實

傷食論

經云飲食自倍腸胃乃傷故傷食者氣口脉緊甚左
手脉和平胸膈痞塞噫氣如敗卵臭頭痛發熱絕似
傷寒但身不痛爲異耳所傷之物有辛辣香燥燻炙

傷寒物者半夏
 神麩乾姜三稜
 廣木巴豆之類
 傷熱物者枳實
 白朮青皮陳皮
 麥蘗大黃黃連
 之類

酒麵熱物者有生冷魚腥冰水瓜菓者有壯盛之人

縱飲大嚼者有虛弱之人多食不能剋化者醫家能

審其所傷之多少酌其人之虛實而消導之攻伐之

寒者溫之熱者清之則百發百中而無差矣

脾胃選方

歸脾湯

歸脾神朮參耆草

木香龍眼共酸棗

平胃散

和胃聖藥

附大平胃散

平胃國老陳朴蒼

大平胃增參苓強



和胃散 圓次刺林蒼 大平胃散 參苓散

和胃砂朴半丁香 陳皮蒼朮草乾姜

溫脾散 木香藟共類棗

溫脾桔朴草青陳 白芷良姜白朮均

麥蘖木香香附子 茴香紅豆葛砂仁

進食散 木香藟共類棗

進食參附半朴丁 其草陳寇蘖良菓青

內傷選方 香育氣陳心人送食不消咳外香鬱寒消

調中益氣湯 育生金魚蝦米木瓜菓香育其益心人

大藥 麥蘖大黃黃芩 白朮青朮刺朮 藟木四豆之散 藟木四豆之散 藟木四豆之散



調中益氣橘柴蒼
國老著升卯木香

參苓白朮散

參苓白朮山藥砂
苡蒿桔草蓮肉加

參朮調中湯

參朮調中著味苓
冬桑地骨草陳青

升陽補氣湯

升陽補氣澤獨防
地草柴朴芍升羌

育氣湯

育氣丁檀木藿參
澄茄白豆縮砂仁

河氏醫論

卷一

中食選方

三

靜觀堂



木苓甘草乾山藥 不獨青皮更有陳

益胃湯

益胃升陳智半歸 蒼苓柴草木參薯

升陽散火湯

升陽散火草柴風 獨活羌參葛芍升

升陽益胃湯

升陽益胃獨參朮 黃連黃薯芍藥橘

國老守田防澤羌 更有柴胡茯苓畢

木香化滯散

木香 柴胡 枳實 木香



化滯紅花實陳木
柴胡草蔻半歸國

厚朴温中湯

厚朴温中草木香
橘皮草豆茯苓姜

瀉陰火升麻湯

瀉陰芩連柴胡羌
參耆國老升膏蒼

四君子 六君子
補中益氣 俱見中風症

清燥湯 見痿症



蘇熟烏

貝類也

平補

治寒濕

木參

四散干

蘇中益煎

身良中風也

蘇劍茶

參蕃園

蘇劍火

蘇林區

蘇文草

蘇林區

蘇有柴胡

木升帶

柴胡草



南京中醫藥大學圖書館版權所有

中惡論

中惡之症因冒犯不正之氣忽然手足逆冷肌膚粟起頭面青黑精神不守或錯言妄語牙緊口噤或頭旋暈倒昏不知人此是卒中客忤飛尸鬼擊或弔死問喪入廟登塚多有此病急以蘇合丸灌之候稍甦進以調氣平胃散

中惡選方

調氣平散

木香

烏藥

白蔻

檀香

砂

仁錢一

藿

香

錢二分

蒼術

錢一分五分

厚

朴姜制

陳

皮

錢一分

甘草

五分

姜三片為引

問奕人麻登冠之育也訣念以糝合共藪之剡淋換
 或暈困昏不映人地景卒中容并疾只泉攀返印派
 或顛面青黑辭麻不守短齡言矣請干潔口製短顛
 中惡之益因員外不五之屬忽然手足並令朋亂粟

中惡篇



痿症論

痿者手足痿軟而無力百節緩縱而不收也古聖以
痿病在諸症尤爲切要夫人賴真氣以生穀氣以成
誠能調和五藏則血氣行而陰陽合斯筋骨濡而關
節利矣痿病何由而生倘不善調攝而色慾過度陰
血不足以養筋則五勞五志六淫七情盡得成五藏
之熱而爲痿矣內經云肺熱葉焦五藏因而受之發
爲痿歷心氣熱生脉痿脛縱不任地肝氣熱生筋痿
宗筋弛縱脾氣熱生肉痿痺而不仁腎氣熱生骨痿

翮案丹溪此論
 由四支痿而推
 本于脾土傷由
 脾土傷而推本
 于肝木旺由肝
 木旺而推本于
 肺金虛由肺金
 虛而推本于水
 失所養火無所

足不任體痿之為病不一古方多以治風之藥治痿
 何其謬也至丹溪始以風痿二症另立篇目源流不
 同治法各別千古之蔽乃明丹溪云內經謂諸痿起
 于肺熱又謂治痿獨取陽明蓋肺金主氣體燥居上
 而畏火者也脾主四肢體濕居中而畏木者也火性
 炎上若嗜慾無節則水失所養火無所畏而反侮其
 所勝肺得火邪而熱矣木性本急肺受邪熱則肺失
 所養木無所制而益急脾得木邪而傷矣是以肺熱
 則氣不能管揖一身脾傷則四支不能為用而諸痿

畏探委窮源深得內經肺熱生痿之旨而世猶不察遇痿廢者而猶曰類中也庸哉

之病作矣故必瀉火使肺金清而木不實脾可不傷
又必補腎水使心火降而金不虛肺可不熱此清金
降火乃治痿之急務也亦有濕熱濕痰或血虛氣虛
死血食積妨碍不得升降者能審而療之未有不效
益以淡薄滋味斯更無弗愈矣大率病痿以養肺清
金益血爲要若症兼濕熱宜東垣健步丸加以燥濕
降陰如蒼朮黃芩黃柏牛膝之類濕痰宜二陳湯加
蒼朮白朮黃芩黃柏竹瀝氣虛則四君子加黃芩蒼
朮血虛則四物加黃柏蒼朮此藥之分治而用者也

按痿痺二症俱能食而不能行症相同也但痺多實痿多虛痺多寒痿多熱苟不明辨調治卽差其要在有痛無痛中分辨痛爲痺不痛爲痿至于用藥又當隨其所挾審其所急卽如痿症雖虛或二便秘結腸胃燥熱能不用大黃以潤之乎痺症雖實若因勞役內傷懶言倦怠脉來無力能不用甘溫以補之乎至于五藏分治之法尤宜詳也肺熱者色白而毛敗宜黃耆天冬麥冬石斛百合山藥犀角通草桔梗枯苓梔子杏仁秦艽之屬主之心熱者色赤而絡脉溢宜



鐵粉銀屑黃連苦參龍胆石密牛黃龍腦秦艽白蘚
牡丹地骨雷丸犀角之屬主之肝熱者色青而爪枯
宜生地天冬百合紫葳白蒺藜杜仲草薺兔絲牛膝
防風黃芩黃連之屬主之脾熱者色黃而脉蠕動宜
蒼朮白朮二陳霞天膏之屬主之腎熱者色黑而齒
槁宜金剛丸東坦治痿以黃栢爲君黃耆等補藥爲
佐而無一定之方亦欲學者隨所挾而施治耳

歌括

痿症多因肺熱生又云痿獨取陽明分明自是膏梁

疾勿誤為風浪立名

痿症選方

東垣清燥湯

清燥蒼歸二朮升

猪苓澤瀉味門冬

橘柴參草兼生地

黃栢黃連麩茯苓

東垣健步丸

羌活

柴胡

胡錢五

防風

風錢三

川烏

錢一

滑石

石炒五

澤瀉

瀉錢三

防己

兩一

苦參

酒洗

肉桂

桂



甘草

天花粉

酒製
五錢

酒丸桐子大每服十九丸煎愈風湯下愈風湯即

愈風丹

愈風丹

治足三陰虧損手足麻木肢體不遂等症

天麻

牛膝

草薺

元

參

六兩

杜

仲

七兩

羌

活

十四兩

當歸

熟地

生

地

一兩

獨

活

五兩

肉

桂

三兩



蜜丸白湯下五七十九

天當歸

燕

土

散

示

冬

出

中

美

散

十四

天

麻

中

類

草

類

合

三

劍

瀉

手

鼠

木

應風

步

羌

愈

風

散

防

風

川

酥

大

每

煎

愈

風

散

甘

草

天

芥

肉

桂



南京中醫藥大學圖書館版權所有

痺症論

丹溪云麻屬氣
虛木屬濕痰死
血

翹案麻木人皆
以為風不知亦
有不盡因風者
如久坐及纏縛
皆致麻木豈盡
因風耶則知丹
溪氣虛血死之
說為至當不易

經謂風寒濕氣合而為痺皆因體虛氣弱腠理空疎
受之而成者也風勝者為行痺世稱為走注疼痛者
也寒勝者為痛痺世稱為痛風者也濕勝者為着痺
世稱為麻木不仁之類是也凡此三者以冬遇之為
骨痺以春遇之為筋痺以夏遇之為脉痺以至陰遇
之為肌痺以秋遇之為皮痺骨痺之為病應乎腎其
狀骨重不可舉不遂而痛善脹筋痺之為病應乎肝
其狀夜臥則驚飲食多小便數脉痺之為病應乎心



也

其狀血脈不流令人黃痿心下鼓氣卒然喘逆不通

嗑乾善噫肌痺之為病應乎脾其狀四支懈怠發喘

嘔吐皮痺之為病應乎肺其狀皮膚無所知覺氣奔

喘滿此痺之由五藏者也又有數飲而小便不通中

氣喘爭時發餐泄為腸痺少腹膀胱按之內痛若沃

以湯瀉于小便上為清涕者為胞痺又有風邪入于

血脈為血痺周身作痛為周痺手足麻痺臂痛不舉

多睡眩冒忍尿不便膝冷者為支飲作痺診其脈大

而濇者為痺脈來急者為痺脈濇而緊者亦為痺

血
直木風濕痺
世突江和濕痺

因風濕痺
世突江和濕痺
世突江和濕痺



舍歌括

痿症有五原歸一其原總屬風寒濕風能走注寒善
痛濕多重着脉來澹以致麻木皮不仁不能行動但
能食舒中湯用好姜黃當歸赤芍共白朮甘草羌活
海桐皮爲末三錢入姜汁盞半水煎至八分去渣磨
入沉香汁

又

風濕寒邪相雜至襲入經絡因成痺寒者痛而風者
行濕爲重着處不易或中皮脉肌骨筋內舍心肝腎

脾肺筋攣不仁類乎風局方風痺同論治因襲既久
未能明近代明師始分異內經風痺各有條諸病所
因出陳氏

附錄

內經論痺四時之氣皆能爲邪五藏之虛各能受
病六氣所感風寒濕氣爲多曰合曰勝則非偏受
一氣所能成痺但邪分輕重爾皮肉筋骨脉各有
五藏之合初病在外久而不去則各因其合而內
舍于藏在外者祛之猶易入藏者攻之實難治外

者散邪爲亟治藏者養正爲先治行痺者散風爲
主禦寒利濕仍不可廢大抵叅以補血之劑蓋治
風先治血血行風自滅也治痛痺者散寒爲主疎
風燥濕仍不可缺大抵叅以補火之劑非大辛大
溫不能釋其凝寒之害也治着痺者利濕爲主祛
風解寒亦不可少大抵叅以補脾補氣之劑蓋土
強可以勝濕而氣足自無頑麻也提其大綱約畧
如此

痺症選方

蠲痺湯

蠲痺歸防赤芍羌 黃耆甘草片姜黃

五痺湯

五痺羌活漢防已 白朮甘草片姜黃

三痺湯

三痺獨活草苓蒼 秦艽續斷卵兼防

蠲痺秦艽湯

秦艽 防風 獨活

白芍 五加皮 川續斷



防己

牛膝

杜仲

黃栢

羌活

生地

當歸身

薏苡仁

蒼朮

肉桂

如上身疼去牛膝續斷杜仲黃栢肉桂加天麻

黃芩川芎桂枝葳靈仙

治寒濕痛痺方

用馬齒莧搗濃熱敷患處再搗汁烹酒服之立效

加減五痺湯



人參

茯苓

當歸

白芍

川芎

各一錢心肝腎三症加倍

五味

十五粒

白朮

一錢脾胃症倍之

細辛

七分

甘草

五分

姜三片食遠服

肝痺加棗仁柴胡

心痺加

遠志茯神麥冬犀角

脾痺加厚朴枳實砂仁

神麴

肺痺加半夏紫苑杏仁麻黃

腎痺加

獨活官桂杜仲牛膝黃耆葶藶

五積散

治感冒寒邪頭疼身痛寒痺大痛內傷生冷外



感寒邪皆效

白芷 茯苓 半夏

當歸 川芎 炙甘草

肉桂 芍藥 枳殼炒

麻黃去根節 陳皮去白 桔梗十二兩

厚朴 乾姜各四兩 蒼朮泔浸去皮二十四兩

每服四錢水一鐘姜三片葱白三根煎七分熱

服挾氣加吳茱萸調經催生用艾葉

麝香丸



治白虎癱節疼痛遊走無定狀如虫嚙晝靜及

一切足痛

川烏

三個

全蠍

二十個

黑豆

二十個

地

龍

五錢

右生研為末入射香半分同研與糯米糊丸棗

豆大每服七丸甚者十丸夜臥令膈空温酒下

微出冷汗一身便瘥此方凡癱節及不測痰

痛一二服便愈



白虎癱節風一
名痛風血虛受
熱涉水受濕當
風受涼俱能致
之

治痛風必取薄
桂味淡者以其
藥能領南星蒼

白虎癱節風論

夫白虎癱節者體虛之人將理失宜受風寒濕毒之
氣使筋脉凝滯血氣不流蘊于骨節之間或在四肢
肉色不變其病晝靜夜劇痛如虎嚙故以名病也痛
如掣者多寒腫滿如脫者多濕汗出者多風肥人多
痰瘦人多熱痛甚者血以寒凝夜劇者行于陰分故
也大法以行氣流濕疎風導滯去淤養新升陰降陽
爲當耳痛在上者必用羌活桂枝葳靈仙在下者必
用防己木瓜川牛膝若痛有常處而赤腫灼熱及渾

白虎癱節

卷一

白虎癱節

見

靜觀堂



水等藥達四支
痛處也

身壯熱者此欲成風毒宜敗毒散散之學者又不可
不察也

白虎癰節選方

交加散

治痛風

交加散治白虎病 局方五積敗毒并

五積散

見痺症

麝香丸

治歷節風如虫嚙者

風受寒濕者
濕受水受濕者
各麻風血虛受
白虎癰節風一

川烏 八角者生用三個 全蝎 二十一個生用

黑豆 二十一個生用 地龍 五錢

為細末入麝少許同研糯米粥為丸菘豆大每溫酒下七丸甚者十丸出汗一身而愈

附子八物湯

治歷節風如鎚鍛者

附子 去皮臍 乾姜 炮 芍藥

茯苓 半夏 桂心 三兩

白朮 四兩 人參 三兩

河氏齊生論 卷一 白虎歷節選方 靜觀堂



白水煎服四錢

敗毒敗

治傷寒頭痛憎寒壯熱項強睛暗鼻寒風痰及

時疫等症

羌活

獨活

柴胡

前胡 川芎 枳殼

桔梗 茯苓 甘草 豆豉

姜三片煎服



厲風論

治厲者當先助胃壯氣使根本堅固而後治其風可也

臭梧桐孔搜葉洗最妙

厲風者大風也又名曰癩蓋感受天地肅殺之風暴悍酷烈之氣以得此疾也人之一身固不外乎氣血而血又隨氣以為運化者也外有所傷則氣為之滯矣氣滯則血必為之聚矣血聚則肉爛虫生鼻崩眉墮矣丹溪分在上在下之治在上以醉仙散取臭惡血于齒縫中出在下者以通天再造散取惡物虻虫于穀道中出所出雖有道路之異然皆不外乎陽明一經而已陽明主胃與大腸無物不受此風之入人



也身半以上陽先受之身半以下陰先受之丹溪以
二方分用如破敵之先鋒至于餘邪未除者但調和
榮衛藥中少加驅逐劑耳薛氏曰大抵此症多由勞
傷氣血腠理不密或醉飽房勞之後卽沐浴當風登
山涉水外邪所乘衛氣相搏濕熱交攻血隨火化而
致眉先落者毒在肺面發紫泡者毒在肝腳底先穿
或痛者毒在腎徧身如癱者毒在脾目先損者毒在
心此五藏受病之重者也一曰皮死麻木不仁二曰
肉死針刺不痛三曰血死肉潰爛四曰筋死肉脫五

曰骨死鼻柱壞此五藏受傷之可治者也治之之法
當辨本症兼症變症陰陽虛實而斟酌焉若妄投燥
熱之劑濃水淋漓則肝血愈燥腎水愈枯反成壞症
矣

厲風選方

瀉榮湯

瀉榮桐淚桔翹升

蘇木參耆射草并

生地生芩連白蔻

桃歸龍蝎蛭蚘虫

醉仙散

胡麻子 炒

牛蒡子 炒

枸杞子

蔓荊子 炒

白蒺藜

苦蕒參

防風

瓜蒌根

錢五

爲末每一兩五錢入輕粉二錢拌勻每服一錢

茶下晨午各一服至五七日于牙縫中出臭涎

令人如醉或下膿血病根乃去病重先服再造

丸

通天再造丸

鬱

金

錢五

大黃

煨

角

刺

兩炒一



白牽牛

六錢半
生半炒

為末每服五錢日未出時面東以無灰酒調下

忌一切口味只宜食粥

寶鑑換肌散

治厲風眉落鼻崩者其效如神

白花蛇

黑花蛇

三兩

地

龍

去土

當歸

細辛

白芷

天麻

蔓荊子

葳靈仙

荆芥穗

菊花

苦參



紫參

沙參

木賊

白蒺藜炒

不灰木

甘草

天冬

赤芍

九節菖蒲

定風草

首烏

胡麻

川芎

草烏頭

蒼朮

木鱉子

一兩

每五錢為末溫酒下

白花蛇丸

丹陽荆上舍得厲痰一僧療之而愈以數百金



求方秘不肯傳後因醉而竊焉用者多效

防

風去苗二兩

荆芥穗一兩五錢

金銀花去葉二兩

川芎

一兩

枸

杞二兩

黃芩

黃連

山梔

黃土柏

全蝎

酸浸一日一兩

蟬

蛻草鞋打碎二兩

蘆洗淨去苗四兩

烏藥

首

烏忌鐵

牛膝

牛蒡

連翹

花

粉

白蒺藜

葳靈仙

細

辛

金毛狗脊

胡麻

蔓荆子

一兩



槐手花春

苦參

生地黄

二兩

白花蛇

一條連骨生用去頭尾

烏梢蛇

同上

如上頭面者加香

白芷

一兩

肌肉潰爛者加大皂角

一兩

一僧加風藤

一兩

米糊丸空心午後臨臥各以清茶下五六十九

防風天麻丸

治厲風此方仙人所傳初服若吐不可即止服

後其效如神

防風

天麻

升麻

白附子

炮

定風草

即天麻苗

細辛

川芎

人參

丹參

苦參

元參

紫參

去蘆

蔓荊子

靈仙

穿山甲

炒

何首烏

一兩

蜈蚣

蚣

一對

每藥末二兩胡麻一觔淘淨晒干炒香熟碾為

細末與藥末一處拌勻蜜丸共作九十九丸細嚼

溫漿水下不拘時日三服宜食淡白粥一百二

十日忌房勞



十日息氣散

烏藥水不不研細日三服宜食淡白粥一

服末與藥末一匙并白蜜共研成十式味

再藥末二兩附和一倍隨氣調干炒香煎為

向首氣調此方幾人欲得初服時宜忌食

蔓藤子之如神靈山 寒山甲 炒

苦 參 天 參 紫 參 志

川 芎 人 參 丹 參



厥論

翻按厥者從下逆上之病也方書名目不一論中未備者有煎厥經云煩勞則張精絕辟積于夏令人煎厥蓋因腎水枯乾五火妄動至夏而陽暴張若煎熬者然令人暈厥也法宜壯水制火如方諸水生地龜膠之類有

夫厥之為症不一大約首辨陰陽次分痰氣其餘有

風厥酒厥骨厥肝厥尸厥痿厥痺厥之不同原病式

云陰厥者原其病脉証候皆為陰症身涼不渴脉遲

細而微也陽厥者原其病脉証候皆為陽症身熱而

渴脉數大而洪也若陽極熱深或失下而至于身涼

反見陰症脉微欲絕者正為熱極而然也誤作陰症

而用熱藥是遠其精魄絕而死矣急以大承氣湯隨

其輕重而治王安道曰熱極而成厥逆者陽極似陰



色厥精脫于下
 神昏于上宜大
 劑參朮有血厥
 血脫于外神亂
 于內治參吐血
 方有腎厥氣從
 背上攻宜椒附
 乾姜通腎陽而
 泄濁陰有虵厥
 宜參仲景安虵
 法

也寒極而成厥逆者獨陰無陽也陽極似陰宜用寒
 藥獨陰無陽宜用熱藥不可不辨也痰厥者暴不知
 人類于卒中但輕而未至卒倒者不可以諸中目之
 此厥有涎潮如曳鋸聲在喉竅中先用瓜蒂散或稀
 涎散探吐隨用導痰湯多加竹瀝少加姜汁治之氣
 厥者暴怒氣逆而昏運者也多與中風相似但身温
 身冷為異耳宜八味順氣散或四七湯手足搐搦為
 風厥宜小續命湯因酒而得者為酒厥宜二陳湯加
 乾葛青皮或葛花解醒湯又有骨枯爪痛為骨厥身

立如椽爲骭厥皆由氣逆故也通用四七湯亦有腹
滿不知人者卒然悶亂令人身脉不動而形體無知
其狀如尸故曰尸厥此因藏氣相形或與外邪相忤
則氣鬱不行閉于經絡諸脉伏匿昏不知人若寒則
熱之熱則寒之閉則通之隨宜以施治之也痿厥者
痿病與厥雜合兩足痿弱而無力也痺厥者痺病與
厥雜合脚氣頑麻而腫痛也至若仲景河間安道所
論厥證乃傷寒手足之厥冷也證旣不同治法亦異
總之厥症屬氣虛血虛者居多氣虛者手必麻蓋氣

虛有風濕而氣不充于手故也血虛者手必木蓋濕痰死血滯蓄于胃而不流通故也故手足心熱者乃熱鬱于內用火鬱湯發之足跟痛者乃血熱與痰熱相並用四物湯如黃栢知母牛膝之類服之因痰者白朮竹瀝其必用者也厥名雖一而其症多疎學者不可不察也

厥症選方

參耆益氣湯

治氣虛陽厥脉伏手足厥冷



桂枝
甘草炙
生薑三兩

芍藥六兩
大棗二十個
膠飴一升

五味以水七升煮取三升去滓後入膠飴煮化溫服一升日三服嘔家不可服

獨活湯

獨活
羌活
人參

防風
當歸
細辛

茯苓
遠志
半夏

桂心
白薇
菖蒲

何氏齊生論
卷一
廣痿方
三
靜觀堂



川芎

錢五

炙草

錢二分五分

每服一兩姜三片煎服

胃風湯

白芷

錢二分

升麻

錢二分

葛根

蒼朮

蔓荊子

當歸

錢一分

炙草

柴胡

藁本

羌活

黃芩

栝朮

麻黃

五分不
去節

大棗

二十

餘代

葛棗為引



金匱 顛振論

顛振搖動也約束不住而莫能任持風之象也木氣太過而剋脾土脾主四支四支者諸陽之末木氣鼓之故動經云風淫末疾者此也亦有頭動而手足不動者蓋頭乃諸陽之首木氣上衝故頭獨搖而手足不動若散于四支則手足動而頭不動也氣虛而振參朮湯補之心虛而振補心丸養之挾痰而振導痰湯主之如中風手足躄曳者星附散獨活散金牙酒之類無熱者宜之摧肝丸能鎮火平肝消痰定顛有

熱者宜之大抵此症壯年鮮有中年以後者可治老

而衰者難治亦不必治也

顛振選方

星附散

天南星

製

半夏

製

天南星

黑附子

白附子

太川

烏

罌

蠟

四

支

香

沒

等分

煎酒水各半煎服得汗為度

金牙酒



人參

黃耆

白朮

五分錢

五味子

二十粒

麥門冬

陳皮

甘草

一錢

姜三片棗二枚食前服

陽虛加附子

童便煮一錢

芎歸養榮湯

治血虛陰厥脉伏虛細四支厥冷

當歸

川芎

白芍

一錢五分

熟地

黃栢

酒炒

知母

一錢

枸杞子

麥冬

八分

甘草

五分



入竹瀝半盞姜汁三匙

燕

黃

味

當

川

白

欲血氣則氣分血味四支氣令

苦

姜王乳棗二味食前服

刺

童

甘

正

寒

刺

參

黃

白



癩瘕論

癩瘕論

癩瘕論

心病者神昏語
澀肝病者脇痛
脹滿

癩者筋脉拘急癩者筋脉張縱俗謂之搐者是也原
病式云諸熱瞽癩皆屬于火熱甚風搏并于經絡風
主動而不寧風火相乘是以熱瞽癩生矣治宜祛風
滌熱可以立愈若妄加灼艾或飲以表汗之劑則死
不旋踵矣大抵此症有心火虛寒者心脉必急甚宜
牛黃補心丸有心火實熱者心脉必滿大宜瀉心火
涼驚丸主之有肝虛者肝脉小急續斷丸主之有肝
實者肝脉滿盛宜先救脾宜加減建中湯主之有脾

河氏濟生論

卷一

癩瘕

七

靜觀堂



胃風者多因飲
食畢後即乘風
涼以致肚腹膨
飲食不下形瘦
惡風頸項多汗
隔塞不通亦時
痲癱胃風湯主
之

虛者脾脉急甚亦肝脉乘之也宜實脾瀉木
有熱傷

元氣者四支困倦麻木時時痲癱人參益榮湯主之

有風虛者心中昏憤口眼瞤動獨活湯主之能食麻

木者胃中有風胃風湯主之

痲癱選方

牛黃補心丸 末服亦可

牛黃 龍腦 硃砂

麝 錢一 蟬退 烏蛇肉 一兩 酒浸

全蝎 炒 姜 蠶 炒 桑螵蛸

羚羊角

阿膠炒

天麻

防風

菊花

蔓荊子

桂心

細辛

側子炮去皮

獨活

五錢

犀角

五錢

麻黃

七錢五分

為末研極細荳淋酒下

涼驚丸

龍膽

末

防風

末

青黛

三錢七分

鈎藤

一錢七分

牛黃

麝香

半分

黃連

末一錢七分

龍腦

一錢七分



麵糊丸粟米大每服三五丸至一二十丸金銀

煎湯下

續斷丸

治肝虛

續

斷

酒浸

川芎

當

歸

酒浸

半夏

製

橘紅

乾

姜

炮一兩

桂心

甘草

炙五錢

蜜丸桐子大白湯下百丸

加減建中湯



治中風手足躄曳不能收持極效

金牙

碎如米絹袋盛

地膚子

無子用莖葉

熟地黃

蒟藳根

附子

防風

細辛

莽草

川椒

四兩

四合

羌活

一兩

絹袋盛用酒四斗浸五六日服每飲

一盞令酒氣相接

摧肝丸

胆星

鈎藤

黃連

酒炒

滑石

鐵華粉

一兩

青黛

三錢



疆 蠶 五錢

天 華 麻 二兩

辰 砂 五錢

甘 草 二錢

竹瀝姜汁丸 梧子大茶下五分忌羊肉雞肉

補心丸秘方

當 歸 一兩 五錢

川 芎 粉 正 草 一兩

生 地 一兩 五錢

遠 志 二兩 五錢

棗 仁

栢 子 三兩 去油

人 參 一兩

硃 砂 五錢

金 泊 二十

麝 一錢

琥 珀 五錢

茯 神 去木 七錢

胆 星 五錢

石 菖 蒲 六錢



葱餅丸菘豆大硃砂爲衣津唾下七八十九或
姜湯下

何氏醫生論

卷二

顛振方

五

靜觀堂



南京中醫藥大學圖書館版權所有
1994

大慈濟共菜豆伏稱極益交華通不十八十共短

金羨遇不

相子

生也

當歸

御心

...

...

...



南京中醫藥大學圖書館版權所有

人學論

攣拘縮也內經云攣皆屬肝肝主身之筋故也又陽
明之復甚則入肝驚駭筋攣又脾移寒于肝癰腫筋
攣有熱有寒有虛有實熱攣者經所謂肝氣熱則筋
膜乾膜乾則筋急而攣生地當歸以濡之亦有因于
濕熱者經云因于濕首如裹濕熱不攘大筋纒短小
筋弛長纒短爲拘弛長爲痿之類是也薏仁散主之
寒攣者經所謂寒多則筋拳骨痛者是也宜烏頭湯
薏苡仁散虛攣者經所謂虛邪搏于筋則爲筋拳又

云木弗榮則筋急仲景亦云血虛則筋急宜四物湯
 養血地黃丸實孿者丹溪治一郵夫背偃僂而足孿
 已成廢人診其脉兩手皆沉弦而滑遂以戴人煨腎
 散與之上吐下瀉過月餘吐瀉交作如此凡三貼而
 平復由此推之則藥之投也無不中矣

孿症選方

烏頭湯

治寒濕留于筋脉冬月服之

大烏頭

細辛

川椒



甘草

秦艽

附子

官桂

白芍藥

一兩七錢五分

白茯苓

乾姜

防風

炙

當歸

一兩

獨活

一兩二錢五分

每煎服三錢棗為引

薏苡仁散

薏苡仁

一升炒

取末和粥服或澄粉調服

養血地黃丸

春夏服


熟地

蔓荊子

二錢五分

山萸

五錢



黑狗脊炙

地膚子

白朮

乾漆炒

蟾蜍炒

天雄

車前子

七錢五分

萆薢

淮山藥

澤瀉

牛膝

一兩

蜜丸酒下五十丸

煨腎散

甘遂末三錢雄猪腰子一對細批破少鹽淹透擦

藥末在內荷葉裹燒熱酒服

木瓜散



治中風虛極筋脉攣急屈伸短縮面青唇白舌
卷囊縮

木瓜

虎脛

醋炙

五加皮

當歸

桑寄

棗仁

人參

栝子仁

黃耆

一兩

甘草

五錢

每服四錢姜爲引

爭邪四逆變為汗

甘草正

人參正 附子正 黃耆一兩

當歸正 桑寄生正 棗正

木通正 炙甘草正 五爪艾正

卷之...

台中風能通利和掌急風中跌筋面青唇白舌



譫妄論

血氣者身之神也神既衰乏邪因而入理或有之若夫血氣兩虧痰客中焦妨碍升降不得運用以致十二官皆失其職視聽言動皆有虛妄若以法事治之則必驚以法尺是驚其神而血不寧也且必噴以法水是瀦其體蜜其膚使汗不得出也汗不出則蒸熱內燔血不寧則陰消而陽不能獨立不死何爲大抵譫妄有二一曰火邪助心經云歲火太過上臨少陰少陽病反譫妄狂越又云火太過曰赫曦其動炎灼

妄擾又云少陰所至爲譫妄又云少陽之勝心痛煩
心善驚譫妄治以鹹寒是也一日寒邪傷心經云歲
水太過寒氣流行邪害心火病身熱煩心躁悸陰厥
上中下寒譫妄心痛又云陽明司天之政四之氣寒
雨降振慄譫妄治以甘熱是也更有中風或歌哭或
笑語無所不至者宜加減續命湯中惡心腹脹滿吐
利不行如乾霍亂狀者由人精神不全心志多恐遂
爲邪鬼所擊或附着沉沉默默妄言譫語誹謗罵詈
訐露人事不避訛嫌口中好言未然事禍福皆驗人

翻按諸症皆狂
誕奇異愚人見
之必以爲靈奇
否則以冤業紛

紛怪說從此而起
即醫者亦為之束手推委矣
豈知皆由血氣不足精神不全
為之病而可以用藥施治哉

有起心已知其故登高陟險如履平地或悲泣呻吟

不欲見人如醉如狂其狀萬端宜八毒赤散為效諸

書以太乙神精丹蘇合香丸治此疾為第一或用雄

黃散亦可

譫妄選方

加減續命湯

麻黃三兩

人參

桂枝

白朮二兩

當歸

防己

黃芩

甘草

白芍



川芎

杏仁

一兩

每服四錢棗為引

八毒赤散

治鬼疰

雄黃

礬石

硃砂

丹皮

附子炮

藜蘆

巴豆

一兩

蜈蚣

一

蜜丸小豆大每服五七丸冷水下

太乙精神丹



治霍亂風顛蟲毒妖魅瘟瘧一切惡毒

雄黃

油煎七日

雌黃

硃砂

磁石

曾青

一兩

金牙石

六錢

各研極細將二黃及硃砂醋浸三日將曾青用

好酒于銅器中浸外用紙糊口晒七日天陰用

火焙乾同研勻用砂合盛藥合之大小約入藥

滿三分為率蓋定先以赤石脂末固縫外用六一

泥固濟訖候乾以晴明六合吉日另用泥作三

箇柱子高五寸令平穩如鼎足安合子下置炭



火三觔逐旋漸添炭常令及五觔只在合底不
 得過口煨五日為度放涼水中候泥透去泥將
 合子輕手取開其藥精英五色盡在蓋上研細
 棗肉丸如粟米大每服一丸米飲服之如口噤
 幹灌卽甦

六一泥

礬

石

黃泥裹燒
一伏時研

黃

礬

如金色黃土
裹燒通赤

蚯蚓糞

碱

土

一兩

黃泥

一觔

鹽

一兩

和泥

雄朱散

一名太乙
備急散

治中惡中蠱客忤飛尸并陰毒

雄

黃

研水
飛

硃

砂

研

川

椒

桂心

芫

花

醋炒
五錢

巴

豆

去皮膜
心油

藜

蘆

二錢
五分

附

子

炮去
皮臍

野

葛

七錢
五分

為細末磁器內封之勿令洩氣每服一錢溫水

酒調下老幼減半病在上則軀在膈則吐在腹

則瀉此藥隨手應之不可不備



何氏... 三 藏板

煎藥... 煎之... 煎之... 煎之...

煎藥... 煎之... 煎之... 煎之...

煎藥... 煎之... 煎之... 煎之...

煎藥... 煎之... 煎之... 煎之...

煎藥... 煎之... 煎之... 煎之...

煎藥... 煎之... 煎之... 煎之...

煎藥... 煎之... 煎之... 煎之...

煎藥... 煎之... 煎之... 煎之...

煎藥... 煎之... 煎之... 煎之...



南京中醫藥大學圖書館版權所有

循衣撮空論

凡病人循衣撮空摸床者不治然亦有可活者蓋病至此者非大實卽大虛當審其因察其脉叅其証以施治焉實而便秘大承氣湯瀉之虛而便滑獨參湯補之厥逆者加附子婁全善云嘗活循衣摸床者數人皆用大補氣血之劑惟一人兼潤振脉代遂于補劑之中加桂二分振止脉和而愈海藏云婦人血風症因大脫血崩或前後失血因而枯燥其熱不徐循衣撮空摸床閉目不醒揚手擲足搖動不寧錯語失

神脉弦浮而虛內燥熱之極也氣粗鼻乾不潤上下
通燥此爲難治宜地黃黃連湯

喜笑不休論

喜笑皆屬心火經曰心藏神神有餘則笑不休又云
在藏爲心在聲爲笑在志爲喜凡此者如火得風而
焰也戴人治一婦人以滄鹽成塊者二兩用火燒令
通赤放冷研細以河水一大碗同煎至三五沸放溫
分三次啜之以釵探其喉吐出熱痰數升次服黃連
解毒湯以降其火不數日而愈治一男子笑不休歇

口角流涎于黃連解毒湯內加半夏竹葉竹瀝姜汁
而止洵乎心火非苦莫解也

選方

地黃黃連丸

治循衣撮空摸床

川芎

生地

當

歸七錢

赤芍

梔子

黃芩

黃連

三錢

防風

一兩

每煎服三錢脉實者加大黃



黃連解毒湯

治喜笑不休

黃

連

七錢五分

黃

檟

梔

子

五錢

黃

芩

一兩

每煎服五錢





南京中医药大学图书馆版权所有