


欽定四庫全書

子部

肘後備急方卷二



詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

肘後備急方卷二



治卒霍亂諸急方第十二

晉 葛洪 撰

凡所以得霍亂者多起飲食或飲食生冷雜物以肥膩
酒醢而當風履濕薄衣露坐或夜卧失覆之所致

初得之便務令煖以炭火布其所卧下大熱減之又

並蒸被絮若衣絮自若冷易熱者亦可燒地令熱水

沃敷薄布席卧其上厚覆之亦可作灼灼爾熱湯著
甕中漬足令至膝并銅器貯湯以著腹上衣藉之冷
復易亦可以熨斗貯火著腹上如此而不淨者便急
灸之但明案次第莫為亂灸須有其病乃隨病灸之
未有病莫預灸灸之雖未即愈要萬不復死矣莫以
灸不即愈而止灸霍亂艾丸苦不大壯數亦不多本方
言七壯為可四五十無不便火下得活服舊方用理
中丸及厚朴大豆豉通脉半夏湯先輩所用藥皆難

得今但疏良灸之法及單行數方用之有效不減於
貴藥已死未久者猶可灸餘藥乃或難備而理中丸
四順厚朴諸湯不可不預合每向秋月常買自隨
卒得霍亂先腹痛者灸臍上十四壯名太倉在心厭下
四寸更度之

先洞下者灸臍邊一寸男左女右十四壯甚者至三十
四十壯名大腸募洞者宜瀉

先吐者灸心下一寸十四壯又并治下痢不止上氣灸

五十壯名巨闕正心厭尖頭下一寸是也

先手足逆冷者灸兩足內踝上一尖骨是也兩足各七壯不愈加數名三陰交在內踝尖上三寸是也

轉筋者灸蹶心當拇指大聚筋上六七壯名涌泉又灸足大指下約中一壯神驗

又方灸大指上爪甲際七壯

轉筋入腹痛者令四人捉手足灸臍左二寸十四壯股中大筋上去陰一寸

若腕者灸手腕第一約理中七壯名心主當中指

下利不止者灸足大指本節內側寸白肉際左右各七壯名大都

乾嘔者灸手腕後三寸兩筋間是左右各七壯名間使
若正厥嘔絕灸之便通

小品方起死

吐且下利者灸兩乳連黑外近腹白肉際各七壯亦可
至二七壯

若吐止而利不止者灸臍一夫納中七壯又云臍下一寸二七壯

若煩悶湊滿者灸心厭下三寸七壯名胃管

又方以鹽內臍中上灸二七壯

若遶臍痛急者灸臍下三寸三七壯名關元良

治霍亂神秘起死灸法以物橫度病人人中屈之從心

鳩尾飛度以下灸先灸中央畢更橫灸左右也又灸

脊上以物圍令正當心厭又夾脊左右一寸各七壯

是腹背各灸三處也

華佗治霍亂已死上屋喚魂又以諸治皆至而猶不差者

捧病人腹臥之伸臂對以繩度兩頭肘尖頭依繩下夾背脊大骨穴中去脊各一寸灸之百壯不治者可灸肘椎已試數百人皆灸畢即起坐佗以此術傳子孫代代皆祕之

右此前並是灸法

治霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下方

鹽二升以水五升煮取二升頓服得吐愈

又方生薑若乾薑一二斤咬咀以水六升煮三沸頓服
若不即愈更可作無新藥煮滓亦得

又方飲好苦酒三升小老羸者可飲一二升

又方溫酒一二升以蠟如彈丸一枚置酒中消乃飲無
蠟以鹽二方寸匕代亦得

又方桂屑半升以煖飲二升和之盡服之

又方濃煮竹葉湯五六升令灼已轉筋處

又方取楠若樟木大如掌者削之以水三升煮三沸去滓令灼之也

又方服乾薑屑三方寸匕

又方取蓼若葉細切二升水五升煮三沸頓服之煮乾蘇若生蘇汁即亦佳

又方小蒜一升哎咀以水三升煮取一升頓服之

又方以煖湯漬小蒜五升許取汁服之亦可

又方以人血合丹服如梧子大二丸

又方生薑一斤切以水七升煮取二升分為三服

又方取賣解家机上垢如雞子大溫酒服之差

又方飲竹瀝少許亦差

又方乾薑二兩甘草二兩附子一兩水三升煮取一升

內豬膽一合相和分為三服

又方蘆蓬茸一大把濃煮飲二升差

若轉筋方燒鐵令赤以灼踵白肉際上近後當縱鐵以

隨足為留停令成瘡兩足皆爾須臾間熱入腹不復轉筋便愈可脫刀燒蝦尾用之即差

又方煮苦酒三沸以摩之合少粉尤佳以絮胎縛當從膝下至足

又方燒梔子二七枚研末服之

又方桂半夏等分末方寸匕水一升和服之差

又方生大豆屑酒和服方寸匕

又方燒蜈蚣膏傅之即差

若轉筋入腸中如欲轉者

取鷄矢白一寸水六合煮三沸頓服之勿令病者知之

又方苦酒煮衣絮絮中令溫從轉筋處裹之

又方燒編薦索三撮仍酒服之即差

又方釜底黑末酒服之差

若腹中已轉筋者

當倒擔病人頭在下勿使及地腹中平乃止

若兩臂脚及胸脇轉筋

取鹽一升半水一斗煮令熱灼灼爾漬手足在胸脇者湯洗之轉筋入腹中倒擔病人令頭在下腹中平乃止若極者手引陰陰縮必死猶在倒擔之可活耳若注痢不止而轉筋入腹欲死

生薑一兩累擘破以酒升半煮令三四沸頓服之差治霍亂吐下後心腹煩滿方

梔子十四枚水三升煮取二升內豉七合煮取一升

頓服之嘔者加橘皮二兩若煩悶加豉一升甘草一兩蜜一升增水二升分為三服

治霍亂煩躁卧不安穩方

葱白二十莖大棗二十枚水三升煮取二升頓服之

治霍亂吐下後大渴多飲則煞人方

以黃米五升水一斗煮之令得三升清澄稍稍飲之莫飲餘物也

崔氏云理中丸方

甘草二兩乾薑人參白朮各一兩搗下篩蜜丸如彈丸覺不住更服一枚須臾不差仍溫湯一斗以麋肉內湯中服之頻頻三五度令差亦可用酒服

四順湯治吐下腹乾嘔手足冷不止

乾薑甘草人參附子各二兩水六升煮取三升半分為三服若下不止加龍骨一兩腹痛甚加當歸二兩胡洽用附子一枚桂一兩人霍亂亦不吐痢但四支脈沉肉冷汗出渴者即差

厚朴湯治煩嘔腹脹

厚朴四兩炙桂二兩枳實五枚炙生薑三兩以水六升煮取二升分為三服

凡此湯四種是霍亂諸患皆治之不可不合也霍亂若心痛尤甚者此為挾毒兼用中惡方治之

附方

孫真人治霍亂

以胡椒三四十粒以飲吞之

斗門方治霍亂

用黃杉木劈開作片一握以水濃煎一盞服之

外臺祕要治霍亂煩躁

燒亂髮如鷄子大鹽湯三升和服之不吐再服

又方治霍亂腹痛吐痢

取桃葉三升切以水五升煮取一升三合分溫二服

梅師方治霍亂心痛利無汗

取梨葉枝一大握水二升煎取一升服

又方治霍亂後煩躁卧不安穩

葱白二十莖大棗二十枚以水三升煎取二升分服
兵部手集救人霍亂頗有神效

漿水稍酸味者煎乾薑屑呷之夏月腹肚不調煎呷
之差

孫用和治大瀉霍亂不止

附子一枚重七錢炮去皮臍為末每服四錢水兩盞
鹽半錢煎取一盞溫服立止集效方治吐瀉不止或

致轉筋四肢發厥虛風不省人事服此四肢漸暖神
識便省

回陽散天南星為末每服三錢入京棗三枚水一盞半
同煎至八分溫服未省再服聖惠方治霍亂轉筋垂
死

敗蒲席一握細切漿水一盞煮汁溫溫頓服

又方治肝虛轉筋

用赤蓼莖葉切三合水一盞酒三合煎至四合去滓

溫分二服

又方治肝風虛轉筋入腹

以鹽半斤水煮少時熱漬之佳

孫尚藥治脚轉筋掣急者

松節一兩細剉如米粒乳香一錢右件藥用銀石器
內慢火炒令焦只留三分性出火毒研細每服一錢
至二錢熱木瓜酒調下應時筋病皆治之

古今錄驗方治霍亂轉筋

取蓼一手把去兩頭以水二升半煮取一升半頓服之

治傷寒時氣溫病方第十三

治傷寒及時氣溫病及頭痛壯熱脉大始得一日方須取旨朮根葉合搗三升許和之真丹一兩水一升合煮絞取汁頓服之得吐便差若重一升盡服厚覆取汗差

又方小蒜一升搗取汁三合頓服之不過再作便差

又方烏梅二七枚鹽五合以水三升煮取一升去滓頓服之

又方取生杼木削去黑皮細切裏白一升以水二升五合煎去滓一服八合三服差

又方取木丸子二七枚以水五升按之令熟去滓盡服汁當吐下愈

又方鷄子一枚著冷水半升攪與和乃復煮三升水極令沸以向所和水投湯中急攪令相得適寒溫頓服

取汗

又方以真丹塗身令遍面向火坐冷汗出差

又方取生蘘荷根葉合搗絞取汁服三四升

又方取乾艾三斤以水一斗煮取一升去滓頓服取汗

又方鹽一升食之以湯送之腹中當絞吐便覆取汗便
差

又方取比輪錢一百五十七枚以水一斗煮取七升服
汁盡之須臾復以五升水更煮令得一升以水二升

投中合令得三升出錢飲汁當吐毒出也

又方取猪膏如彈丸者温服之日三服三日九服

又方烏梅三十枚去核以豉一升苦酒三升煮取一升
半去滓頓服

又傷寒有數種人不能別令一藥盡治之者若初覺頭
痛肉熱脉洪起一二日便作葱豉湯用葱白一虎口
豉一升以水三升煮取一升頓服取汗不汗復更作
加葛根二兩升麻三兩五升水煎取二升分再服必

得汗若不汗更加麻黃二兩又用葱湯研米二合水
一升煮之少時下鹽豉後內葱白四物令火煎取三
升分服取汗也

又方豉一升小男溺三升煎取一升分為再服取汗

又方葛根四兩水一斗煎取三升乃內豉一升煎取升
半一服搗生葛汁服一二升亦為佳也

若汗出不歇已三四日胃中惡欲令吐者

豉三升水七升煮取二升半去滓內蜜一兩又煮三

沸頓服安卧當得吐不差更服取差秘法傳於子孫也

又方生地黃三斤細切水一斗煮取三升分三服亦可服藜蘆吐散及苦參龍膽散

若已五六日以上者

可多作青竹瀝少煎令減為數數飲之厚覆取汗

又方大黃黃連黃檗梔子各半兩水八升煮六七沸內豉一升葱白七莖煮取三升分服宜老少

又方苦參二兩黃芩二兩生地黃半斤水八升煮取一升分再服或吐下毒則愈

若已六七日熱極心下煩悶狂言見鬼欲起走

用乾茱萸三升水二升煮取一升後去滓寒溫服之得汗便愈此方恐不失必可用也秘之

又方大蚓一升破去以人溺煮令熟去滓服之直生絞汁及水煎之並善又絞糞汁飲數合至一二升謂之黃龍湯陳久者佳

又方取白犬從背破取血破之多多為佳當及熱以薄胸上冷乃去之此治垂死者活無白犬諸純色者亦可用之

又方取桐皮削去上黑者細擘之長斷令四寸一束以酒五合以水一升煮取一升去滓頓服之當吐下青黃汁數升即差

又方鷄子三枚芒硝方寸匕酒三合合攪散消盡服之
又方黃連三兩黃檗黃芩各二兩梔子十四枚水六升

煎取二升分再服治煩嘔不得眠

治時氣行垂死破棺千金煮湯苦參一兩呔咀以酒二升半舊方用苦參酒煮令得一升半去滓適寒溫盡服之當間苦寒吐毒如溶膠便愈

又方大錢百文水一斗煮取八升內麝香當門子李子大末稍稍與飲至盡或汗或吐之

治溫毒發斑大疫難救黑膏生地黃半斤切碎好豉一升猪脂二斤合煎五六沸令至三分減一絞去滓末

雄黃麝香如大豆者內中攪和盡服之毒從皮中出
即愈

又方用生蝦蟆正爾破腹去腸乃搗吞食之得五月五
日乾者燒末亦佳矣

黑奴丸胡洽小品同一名水解丸又一方加小麥黑殼
一兩名為麥奴丸支同此注

麻黃二兩 大黃二兩 黃芩一兩 芒硝一兩 釜底墨一
兩 竈突墨二兩 梁上塵二兩 搗蜜丸如彈丸 新汲水

五合末一九頓服之若渴但與水須臾寒寒了汗出
便解日移五尺不覺更服一九此治五六日胸中大
熱口噤名為壞病不可醫治用此黑奴丸

又方大青四兩甘草膠各二兩豉八合以水一斗煮二
物取三升半去滓內豉煮三沸去滓乃內膠分作四
服盡又合此治得至七八日發汗不解及吐下大熱
甚佳

又方大黃三兩甘草二兩麻黃二兩杏仁三十枚芒硝

五合黃芩一兩巴豆二十粒熬搗蜜丸和如大豆服
三丸當利毒利不止米飲止之家人視病者亦可先
服取利則不相染易也此丸亦可預合置

麻黃解肌一二月便服之

麻黃甘草升麻芍藥石膏各一兩杏仁三十枚貝齒
三枚末之以水三升煮取一升頓服覆取汗出即愈
便食豉粥補虛即宜也

又方麻黃二兩芩桂各一兩生薑三兩以水六升煮取

二升分為四服

亦可服葛根解肌湯葛根四兩芍藥二兩麻黃大青甘草黃芩石膏桂各一兩大棗四枚以水五升煮取二升半去滓分為三服微取汗

三日已上至七八日不解者可服小柴胡湯柴胡八兩人參甘草黃芩各三兩生薑八兩無者乾薑三兩半夏五兩湯洗之大棗十二枚水九升煮取二升半分為三服微覆取汗半日須臾便差若不好更作一劑

若有熱實得汗不解復滿痛煩躁欲謬語者可服大柴
胡湯方柴胡半斤大黃二兩黃芩三兩芍藥二兩枳
實十枚半夏五兩洗之生薑五兩大棗十二枚水一
斗煮取四升當分為四服當微利也

此四方最第一急須者若幸可得藥便可不營之保無
死憂諸小治為防以窮極耳若病失治及治不差十日
已上皆名壞病唯應服大小鼈甲湯此方藥分兩乃少
而種數多非備急家所辦故不載凡傷寒發汗皆不可

使流離過多一服得微汗汗絜便止未止粉之勿當風
初得傷寒便身重腰背痛煩悶不已脉浮面赤斑斑如
錦文喉咽痛或下痢或狂言欲走此名中陽毒五日可
治過此死宜用此方

雄黃甘草升麻當歸椒桂各一分水五升煮取二升
半分三服溫覆取汗服後不汗更作一劑

若身重背強蟄蟄如被打腹中痛心下強短氣嘔逆脣
青面黑四肢冷脉沉細而緊數此名中陰毒五日可治

過此死用此方

甘草升麻各二分當歸椒各一分鱉甲一兩以水五升煮取二升半分三服溫覆取汗汗不出湯煮更作也

陰毒傷口鼻冷者乾薑桂各一分末溫酒三合服之當大熱差凡陰陽二毒不但初得便爾或一二日變作者皆以今藥治之得此病多死治熱病不解而下痢困篤欲死者服此

大青湯方大青四兩甘草三兩膠二兩豉八合赤石脂
三兩以水一斗煮取三升分三服盡更作日夜兩劑
愈

又方但以水五升豉一升梔子十四枚韭白一把煮取
三升半分為三服

又方龍骨半斤搗碎以水一斗煮取五升使極冷稍稍
飲其間或得汗即愈矣

又方黃連當歸各二兩乾薑一兩赤石脂二兩蜜丸如

梧子服二十九日三夜再

又方黃連二兩熟艾如鴨卵大以水二斗煮取一升頓服立止

天行諸痢悉主之黃連三兩黃檗當歸龍骨各二兩以水六升煮取二升去滓入蜜七合又火煎取一升半分為三服效

天行毒病挾熱腹痛下痢升麻甘草黃連當歸芍藥桂心黃檗各半兩以水三升煮取一升服之當良

天行四五日大下熱痢黃連黃檗各三兩龍骨三兩艾
如鷄子大以水六升煮取二升分為二服忌食猪肉
冷水

若下膿血不止者赤石脂一斤乾薑一兩粳米一升水
七升煮米熟去滓服七合日三

又方赤石脂一斤乾薑二兩水五升煮取三升分二服
若絞臍痛加當歸一兩芍藥二兩加水一升也

若大便堅閉令利者大黃四兩厚朴二兩枳實四枚以

水四升煮取一升二合分再服得通者止之

若十餘日不大便者服承氣丸大黃杏仁各二兩枳實
一兩芒硝一合搗蜜和丸如彈丸和湯六七合服之
未通更服

若下痢不能食者黃連一斤烏梅二十枚炙燥並得搗
末蠟如棊子大蜜一升合於微火上令可丸丸如梧
子大一服二丸日三

若小腹滿不得小便者細末雌黃蜜和丸取如棊核大

內溺孔中令半寸亦以竹管注陰令痛朔之通

又方末滑石三兩葶藶子一合水二升煮取七合服

又方搗生葱傅小腹上參易之

治胸脇痞滿心塞氣急喘急方人參朮各一兩枳實二兩乾薑一兩搗蜜和丸一服一枚若嗽加桔萸二兩吐加牡蠣二兩日夜服五六丸不愈更服

毒病攻喉咽腫痛方切當陸炙令熱以布藉喉以熨布

上冷復易

又方取真蘭茄瓜甲大內口中以牙小嚼汁以漬喉當
微覺異為佳也

毒病後攻目方煮蜂窠以洗之日六七度佳

又方冷水漬青布以掩之

若生翳者燒豉二升粒末內管鼻中以吹之

治傷寒嘔不止方甘草一兩升麻半兩生薑三兩橘皮

二兩水三升煮取二升頓服之愈

又方乾薑六分附子四分末以苦酒丸如梧子大一服

三九日三服

治傷寒嘔不止方甘草三兩橘皮一斤水五升煮取三升分服日三取差

又方熟洗半夏末服之一錢一服

又方赤蘇一把水三升煮取二升稍稍飲

又方乾薑六分附子四分末苦酒丸如梧子大服三九日三服

比歲有病時行仍發瘡頭面及身須臾周匝狀如火瘡

皆戴白漿隨決隨生不即治劇者多死治得差後瘡癩
紫黑彌歲方滅此惡毒之氣世人云永徽四年此瘡從
西東流遍於海中煮葵菜以蒜蘸啖之即止初患急食
之少飯下菜亦得以建武中於南陽擊虜所得仍呼為
虜瘡諸醫參詳作治用之有效方

取好蜜通身上摩亦可以蜜煎升麻并數數食

又方以水濃煮升麻綿沾洗之苦酒漬彌好但痛難忍
其餘治猶依傷寒法但每多作毒意防之用地黃黑膏

亦好

治時行病發黃方茵陳六兩 大黃二兩 梔子十二枚 以水一斗 先煮茵陳取五升 去滓內二物 又煮取三升 分四服 亦可兼取黃疸中雜治法差

比歲又有虜黃病 初唯覺四體沉沉 不快 須臾見眼中黃 漸至面黃 及舉身皆黃 急令溺白紙 紙即如髒染者 此熱毒已入內 急治之 若初覺 便作苽蒂赤豆散 吹鼻中 鼻中黃汁出數升者 多差 若已深 應看其舌下兩邊

有白脉彌彌處蘆刀割破之紫血出數升亦歇然此須
慣解剖者不解割忽傷亂舌下青脉血出不止便煞人
方可燒紡軫鐵以灼此脉令焦兼瓜蒂雜巴豆搗為丸
服之大小便亦去黃汁破灼已後禁諸雜食又云有依
黃坐黃復須分別之方

切竹煮飲之如飲

又方搗生瓜根絞取汁飲一升至二三升

又方醋酒浸鷄子一宿吞其白數枚

又方竹葉切五升小麥七升石膏三兩末綿裹之以水
一斗五升煮取七升一服一升盡喫即差也

又方生葛根汁二升好豉一升梔子三七枚茵陳切一
升水五升煮取三升去滓內葛汁分為五服

又方金色脚鷄雌雞血在治如食法熟食宜飲汁令盡
不過再作亦可下少鹽豉佳

治毒攻手足腫疼痛欲斷方用虎杖根剉煮適寒溫以
漬足令踝上有尺許水止之

又方以稻穰灰汁漬足

又方酒煮苦參以漬足差

又方鹽豉及羊屎一升搗令熟以漬之

又方細剉黃蘗五斤以水三斗煮漬之亦治攻陰腫痛

又方作坎令深三尺少容兩足燒坎令熱以酒灌坎中

著屐踞坎中壅勿令泄

又方煮羊桃汁漬之雜少鹽豉尤好

又方煮馬矢若羊矢汁漬

又方猪膏和羊矢塗之亦佳

又方以牛肉裹腫處腫消痛止

又方搗常思草絞取汁以漬足

又方猪蹄一具合葱煮去滓內少鹽以漬之

毒病下部生瘡者燒鹽以深導之不過三

又方生漆塗之綿導之

又方大丸艾灸下部此謂窮無藥

又方取蚓三升以水五升得二升半盡服之

又方煮桃皮煎如粘以綿合導之

又方水中苜蓿菜搗綿導之日五易差

又方榨皮槲皮合煮汁如粘糖以導之又濃煮桃皮飲之最良

又方搗蛇莓汁服三合日三水漬烏梅令濃并內崖蜜數數飲

若病人齒無色舌上白或喜睡眠憤憤不知痛痒處或下痢急治下部不曉此者但攻其上不以下為意下部

生蟲食其肛肛爛見五臟便死治之方

取雞子白內漆合攪還內殼中仰頭吞之當吐蟲則愈
又方燒馬蹄作灰細末猪脂和塗綿以導下部日數度
差

又方桃仁十五枚苦酒二升鹽一合煮取六合服之

又方燒艾於管中薰之令煙入下部中少雜雄黃妙此
方是溪溫故爾兼取彼治法

又有病蠶下不止者烏頭二兩女萎雲實各一兩桂二

分蜜丸如桐子水服五丸一日三服

治下部卒痛如鳥啄之方赤小豆大豆各一升合搗兩囊貯蒸之令熟更互坐即愈

此本在雜治中亦是傷寒毒氣所攻故凡治傷寒方甚多其有諸麻黃葛根桂枝柴胡青龍白虎四順四逆二十餘方並是至要者而藥難盡備且診候須明悉別所在撰大方中今唯載前四方尤是急須者耳其黃膏赤散在辟病條中預合初覺患便服之傷寒時行瘟疫三名

同一種耳而源本小異其冬月傷於寒或疾行力作汗
出得風冷至夏發名為傷寒其冬月不甚寒多暖氣及
西風使人骨節緩墮受病至春發名為時行其年歲中
有癘氣兼挾鬼毒相注名為癘病如此診候並相似又
貴勝雅言惣名傷寒世俗因號為時行道術符刻言五
溫亦復殊大歸終止是共途也然自有陽明少陰陰毒
陽毒為異耳少陰病例不發熱而腹滿下痢最難治也

附方

必效方治天行一二日者麻黃一大兩去節以水四升
煮去沫取二升去滓著米一匙及豉為稀粥取強一
升先作熟湯浴淋頭百餘椀然後服粥厚覆取汗於
夜最佳

梅師方治傷寒汗出不解已三四日胃中悶吐豉一升
鹽一合以水四升煎取一升半分服當吐

聖惠方治傷寒四日已嘔吐更宜吐以苦參末酒下二
錢得吐差

又方治時氣熱毒心神煩躁用藍澱半大匙以新汲水
一盞服

又方治時氣頭痛不止用朴硝三兩搗羅為散生油調
塗頂上

又方治時氣煩渴用生藕汁一中盞入生蜜一合令勻
分二服

勝金方治時疾熱病狂言心躁苦參不限多少炒黃色
為末每服二錢水一盞煎至八分溫服連煎三服有

汗無汗皆差

博濟方治陰陽二毒傷寒黑龍丹舶上硫黃一兩以柳木槌研三兩日巴豆一兩和殼記箇數用二升錫子一口先安硫黃鋪錫底次安巴豆又以硫黃蓋之醃醋半斤以來澆之蓋子蓋合令緊密更以濕紙周回固濟縫勿令透氣縫紙乾更以醋濕之文武火熬常著人守之候裏面巴豆作聲數已半為度急將錫子離火便入臼中急搗令細再以少米醋并蒸餅少許再

搗令冷可丸如鷄頭大若是陰毒用椒四十九粒葱
白二莖水一盞煎至六分服一丸陽毒用豆豉四十
九粒葱白二莖水一盞同煎吞一丸不得嚼破

孫用和方治陽毒入胃下血頻疼痛不可忍鬱金五箇
大者牛黃一阜莢子別細研二味同為散每服用醋
漿水一盞同煎三沸溫服

孫兆口訣治陰毒傷寒手足逆冷脉息沉細頭疼腰重
兼治陰毒欬逆等疾方

川烏頭乾薑等分為麤散炒令轉色放冷再搗為細散每一錢水一盞鹽一撮煎取半盞溫服

又方治陰勝隔陽傷寒其人必躁熱而不欲飲水者是也宜服霹靂散附子一枚燒為灰存性為末蜜水調下為一服而愈此逼散寒氣然後熱氣上行而汗出乃愈

聖惠方治陰毒傷寒四肢逆冷宜熨以吳茱萸一升酒和勻濕絹袋二隻貯蒸令極熱熨脚心候氣通暢勻

暖即停熨累驗

唐崔元亮療時疾發黃心狂煩熱悶不認人者取大括
萋一枚黃者以新汲水九合浸淘取汁下蜜半大合
朴硝八分合攪令消盡分再服便差

外臺秘要治天行病四五日結胸滿痛壯熱身體熱苦
參一兩剉以醋二升煮取一升二合盡飲之當吐即
愈天行毒病非苦參醋藥不解及溫覆取汗愈

又方救急治天行後嘔逆不下食食入即出取羊肝如

食法作生淡食不過三度即止

又方以雞卵一枚煮三五沸出以水浸之外熟內熟則
吞之良

聖惠方治時氣嘔逆不下食用半夏半兩湯浸洗七遍
去滓生薑一兩同剉碎以水一大盞煎至六分去滓
分二服不計時候溫服

深師方治傷寒病嘔不止半夏熟洗乾末之生薑湯服

一錢七

簡要濟衆治傷寒咳噫不止及噦逆不定

丁香一兩乾柿蒂一兩焙乾搗末人參煎湯下一錢無
時服

外臺祕要治天行毒病衄鼻是熱毒血下數升者好墨
末之雞子白丸如梧子用生地黄汁下一二十九如
人行五里再服

又療傷寒已八九日至十餘日大煩渴熱勝而三焦有
瘡匿者多下或張口吐舌呵吁目爛口鼻生瘡吟語不

識人除熱毒止痢方

龍骨半斤碎以水一斗煮取四升沉之井底令冷服
五合漸漸進之恣意飲尤宜老少

梅師方治熱病後下痢膿血不止不能食

白龍骨末米飲調方寸匕服

食療治傷寒熱毒下血羚羊角末服之即差又療疝氣
聖惠方治傷寒狐惑毒蝕下部肛外如蠶痛痒不止雄
黃半兩先用瓶子一箇口大者內入灰上如裝香火

將雄黃燒之候煙出當病處熏之

又方主傷寒下部生蠶瘡用烏梅肉三兩炒令燥杵為末煉蜜丸如梧桐子大以石榴根皮煎湯食前下十丸

外臺祕要方崔氏療傷寒手足疼欲脫取羊屎煮汁以濯之差止亦療時疾陰囊及莖熱腫亦可煮黃檗等洗之

梅師方治傷寒發豌豆瘡未成膿研芒硝用猪膽和塗

上效

經驗後方治時疾發豌豆瘡及赤瘡子未透心煩狂躁
氣喘妄語或見鬼神

龍腦一錢細研旋滴猪心血和丸如鷄頭肉大每服
一丸紫草湯下少時心神便定得睡瘡復發透依常
將息取安

藥性論云虎杖治大熱煩躁止渴利小便壓一切熱毒
暑月和甘草煎色如琥珀可愛堪著嘗之甘美瓶置

井中令冷徹如水白磁器及銀器中貯似茶啜之時
人呼為冷飲子又且尊於茗能破女子經候不通搗
以酒浸常服有孕人勿服破血

治時氣病起諸勞復方第十四

凡得毒病愈後百日之內禁食猪犬羊肉并傷血及肥
魚大臙乾魚則必大下痢下則不可復救又禁食麪食
胡蒜韭薤生菜蝦魚輩食此多致復發則難治又令到
他年數發也

治篤病新起早勞及食飲多致欲死方

燒鱉甲服方寸匕

又方以水服胡粉少許

又方粉三升以煖水和服之厚覆取汗

又方乾蘇一把水五升煮取二升盡服之無乾者生亦

可用加生薑四兩豉一升

又方鼠矢兩頭尖者二七枚豉五合以水三升煎半頓服之可服溫覆取汗愈有麻子入內一升加水一升

彌良亦可內枳實葱白一虎口也

又方取伏雞子殼碎之熬令黃黑細末熱湯服一合溫
覆取汗

又方大黃麻黃各二兩梔子仁十四枚豉一升水五升
煮取二升分再服當小汗及下痢

又方濃煮甘草服之蘆根亦佳

食多而發復方燒飯節末服方寸七良

治交接勞復陰卵腫或縮入腹腹中絞痛或便絕方

燒婦人月經衣服方寸匕

又方取狨子一枚撞之三十六放於戶中逐使喘極乃刺脇下取血一升酒一升合和飲之若卒無者但服血慎勿使冷應用狨狨

又方取所交接婦人衣覆男子上一食久活之

又方取狨狨脰及血和酒飲之差

又方刮青竹茹二升以水三升煮令五六沸然後絞去滓以竹茹湯溫服之此方亦通治勞復

又方礬石一分硝三分末以大麥粥清可方寸七三服
熱毒隨大小便出

又方取蓼子一大把水按取汁飲一升乾者濃煎取汁服
之葱頭搗以苦酒和服亦佳

又方蚯蚓數升絞取汁服之良

若差後病男接女病女接男安者陰易病者發復復者
亦必死

卒陰易病男女溫病差後雖數十日血脉未和尚有熱

毒與之交接者即得病曰陰易殺人甚於時行宜急治之

治人身體重小腹急熱上腫胸頭重不能舉眼中生眵
膝脛拘急欲死方

取婦人禪親陰上者割取燒末服方寸匕日三小便
即利而陰微腫者此當愈得童女禪亦良若女病亦
可用男禪

又方鼠矢兩頭尖者二七枚藍一把水五升煮取二升

盡服之溫覆取汗

又方蚯蚓二十四枚水一斗煮取三升一服仍取汗並
良

又方末乾薑四兩湯和頓服溫覆取汗得解止

又方男初覺便灸陰三七壯若已盡甚至百壯即愈眼
無妨陰道瘡復常

兩男兩女並不自相易則易之為名陰陽交換之謂也
凡欲病人不復取女人手足爪二十枚又取女中下裳

帶一尺燒灰以酒若米飲服之

大病差後小勞便鼻衄方

左顧牡蠣十分石膏五分搗末酒服方寸七日三四
亦可蜜丸服如梧子大服之

大病差後多虛汗及眼中流汗方

杜仲牡蠣分等暮臥水服五匕則停不止更作

又方甘草二兩石膏二兩搗末以漿服方寸七日二服

差

又方龍骨牡蠣麻黃根末雜粉以粉身良

又差復虛煩不得眠眼中痛疼懊懣豉七合烏梅十四枚水四升先煮梅取二升半內豉取一升半分再服無烏梅用梔子十四枚亦得

又方黃連四兩芍藥二兩黃芩一兩膠三小挺水六升煮取三升分三服亦可內乳子黃二枚

又方千里流水一石揚之萬度二斗半半夏二兩洗之秫米一斗茯苓四兩合煮得五升分五服

附方

梅師方治傷寒差後交接發動困欲死眼不開不能語方

梔子三十枚水三升煎取一升服

治瘴氣疫癘溫毒諸方第十五

辟瘟疫藥干散

大麻仁栢子仁乾薑細辛各一兩附子半兩炮搗篩正旦以井華水舉家各服方寸匕疫極則三服日一服

老君神明散

白朮一兩附子三兩烏頭四兩桔梗二兩半細辛一兩
搗篩正旦服一錢匕一家合藥則一里無病此帶行所
遇病氣皆消若他人有得病者便溫酒服之方寸匕
亦得病已四五日以水三升煮散服一升覆取汗出也

赤散方

牡丹五分阜莢五分炙之細辛乾薑附子各三分肉
桂二分真珠四分躑躅四分搗篩為散初覺頭強邑

邑便以少許內鼻中吸之取吐溫酒服方寸匕覆眠
得汗即差晨夜行及視病亦宜少許以內粉粉身佳
牛馬疫以一匕著舌下溺灌日三四度甚妙也

度瘴散辟山瘴惡氣若有黑霧鬱勃及西南溫風皆為
疫癘之候方

麻黃椒各五分烏頭三分細辛朮防風桔梗桂乾薑
各一分搗篩平旦酒服一錢匕辟毒諸惡氣冒霧行
尤宜服之

太乙流金方

雄黃三兩雌黃二兩礬石鬼箭各一兩半羖羊角二兩搗為散三角絳囊貯一兩帶心前并門戶上月旦青布裹一刀圭中庭燒溫病人亦燒燻之即差

辟天行疫癘雄黃丹砂巴豆礬石附子乾薑分等搗蜜丸平旦向日吞之一丸如胡麻大九日止令無病常用辟溫病散方

真珠肉桂各一分貝母三分熬之雞子白熬令黃黑

三分搗篩歲旦服方寸匕若歲中多病可月月朔望服之有病即愈病人服者當可大效

虎頭殺鬼方

虎頭骨五兩朱砂雄黃雌黃各一兩半鬼白阜莢蕪黃各一兩搗篩以蠟蜜和如彈丸絳囊貯繫臂男左女右家中懸屋四角月朔望夜半中庭燒一九一方有菖蒲藜蘆無虎頭鬼白阜莢作散帶之

趙泉黃膏方

大黃附子細辛乾薑椒桂各一兩巴豆八十枚去心
皮搗細苦酒漬之宿臘月猪膏二斤煎三上三下絞
去滓蜜器貯之初覺勃色便熱如梧子大一丸不差
又服亦可火灸以摩身體數百遍佳并治賊風走遊
皮膚並良可預合之便服即愈也

單行方術西南社中栢東南枝取暴乾末服方寸匕立差
又方正月上寅日搗女青屑三角絳囊貯繫戶上帳前

大吉

又方馬蹄木搗屑二兩絳囊帶之男左女右

又方正月朔旦及七月吞麻子小豆各二十七枚又各二十七枚投井中又以附子二枚小豆七枚令女子投井中

又方冬至日取雄赤雞作腊至立春煮食盡勿分他人

二月一日取東行桑根大如指懸門戶上又人人帶之

又方埋鵲於園前

斷瘟病令不相染著斷髮仍使長七寸盜著病人臥席下

又方以繩度所住戶中壁屈繩結之

又方密以艾灸病人床四角各一壯不得令知之佳也
又方取小豆新布囊貯之置井中三日出舉家男服十
枚女服二十枚

又方桃木中蟲矢末服方寸七

又方鮑魚頭燒三指撮小豆七枚合末服之女用豆二
七枚

又方熬豉雜土酒漬常將服之

又方以鯽魚密致卧下勿令知之

又方栢子仁細辛糝米乾薑三分附子一分末酒服方寸七日服三服十日

又方用麥蘗服糝米乾薑又云麻子仁可作三種服之附方

外臺祕要辟瘟方

取上等朱砂一兩細研白蜜和丸如麻子大常以太歲日平旦一家大小勿食諸物面向東立各吞三七丸永無疾疫

乾
坤
艮
巽
震
坎
離
兌

肘後備急方卷二

總校官進士臣朱 鈺

校對官中書臣趙秉淵

謄錄監生臣孫承基