



丹溪先生醫書纂要序

醫以伐病爲功非其道則逆鋒背刃觸之而夭誠不可不慎重也程子曰事親者不可以不知醫又曰學醫最是大事朱子曰暇時將藥方看知得養生之理古之人其有見於此歟余父方強年長夏患瘧口善甘而嘔噦治之數月一醫

類以烏附熱藥盡腹容投之旬日病愈  
鑿謝去翌日毒發而狂竟不諱後余遊  
李姚江今太鑿院判潛齋章公時方以  
鑿術為識者重因具以父病狀而得其  
說始知父之夭於鑿也痛哉痛哉自此  
於鑿有一日之功又知偏門之術盛行  
於世而殺人多矣姑即以寒熱言之五

臟具五行惟火也心為君火而又有相  
火者寄肝腎間經所謂一水不勝二火  
也諸動屬火相火易動則五臟之火翕  
然而起經所謂一水不勝五火也濕為  
寒類溼則鬱而為熱濕執相火為病最  
多偏門者一以辛執香燥施之幾何其  
不害人也耶害及於人而術行於世何

也。熱主出行，寒主閉藏。人見其得寒而病，不知其腠理閉密而病，則熱也。病熱而或投以熱，則怫鬱行而病愈。人見其用熱之功，而不知其為寒用也。亢則害，承迺制。火極則兼水化，制之人則以化為本也。陰陽五行變化之道，非極深研幾之士，未足以得其肯綮。庸下之人，初

不知素難為何物，宜其競習偏門以濟方技。以媚流俗病者，以是責之。鑿者以是應之，相安於天亡而莫之知也。雖然，鑿自古聖垂教後之作者，代有其人。心派之奪不可誣也。求其於二者之間，必見其如此而不如彼，而此者無如劉守真。故曰：不由程子不知夏端之害深不

由守真不知偏門之罪大守真之後益  
粹其學尤足以救偏門之弊者則有丹  
溪朱先生出焉先生吾婺之義烏人諱  
震昌字彥脩丹溪乃後人以所居地稱  
之也初遊許文懿公門以母病問鑿得  
羅知悌傳取素問而下諸書讀之研精  
覃思融會貫通於是而折其衷若仲景

之外感東垣之內傷戴人之攻擊與夫  
業擅一家者咸均有而時出之且其為  
術易而易知簡而易能出入乎氣虛血  
虛有痰有火之論變通乎四君四物二  
陳三補之治無剖腹之神滌腸之妙而  
神妙存乎簡易之中有非至人莫能與  
者抑其初從文懿公得考亭之緒一自

理孝中来固非其他之可及耶既没以  
門人戴原禮顯其術于

朝

太宗文皇帝賜祭其墓由是名益重四方  
慕之所謂偏門之術不待辨斥而知所  
革從者甚衆此其功業之盛殆將信今  
傳後百世宗之而無弊也已但其書之

行於世者惟格致餘論外科精要發揮  
傷寒摘疑間日本草衍義補遺鑿案為  
先生手稿餘如會纂勾玄之類皆門人  
所錄制作本志畧復傳久致訛且有雜  
以他說已意者使今之人欲為鑿不能  
捨先生之書即其書無以得先生之真  
深所憾焉余於父安澤甫嘗用心於此

者每於鄉邑間訪求其遺乎錄亡慮百萬言一日命和相為纂集輒不揣仍前人法以病分篇合所錄與板行諸書凡粹語良方盡為搜括裁取而類次成編訛者正偽者削間又加以註釋附以古方雖羣書類集而混然成章論方雜具而井然不紊檢覽之便視昔當有廷庭

矣名曰纂要經不云乎知其要一言而終不知其要流散無窮先生之幸得其要而此書得先生之要也於乎鑿本道之小者故縉紳罕言之然如予之有父為鑿所死者事固莫大矣書成因幸余之故而推言偏門所以為害之大畧并叙諸首後之君子寧無惕然於此益知

所以用心者哉是為序

成化甲辰春三月吉旦東陽盧和書

于易庵

重刊丹溪纂要序

鑿之有方所以救人疾苦活人象脉理  
民生之所急不可量者周公有鑿師以  
掌業氏之疾自古仁人君子每留意焉  
但其方代代多所著作浩瀚充棟不能  
遍閱况其間功效之可述者甚少丹溪  
纂要一編出入三古類析門分病各



方、各中疾一閱之頃則人妻病之源  
用某之妙宛然在於心目矣但窮鄉僻  
壤罕見是書凡人有疾輒禱於鬼神委  
之庸醫注、為其誤札可勝嘆哉巡按  
奚映侍御史沁水李先生暇中鑄閱鑿  
書因得是編適弘治乙卯秋監臨鄉試  
涇州守陽曲陳公智高與執事之列先

生如公素有愛民之心因其事竣告歸  
乃出是書於其重刊官舍以廣其傳嗚  
呼若先生之困心可謂仁矣視民為同  
胞疾痛疴瘡拳切於身書曰民性邦本  
本固邦寧先生之愛民實所以愛

國也其書之傳家給人賜跼斯民如壽考  
康寧之域亦足以培

國本於悠久矣豈曰小補之哉

弘治丙辰之宵後三日予涼方徑州學

正雲中楊捷書

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]*

凡例

- 一丹溪有衣鉢一書其立例據病論治最為切當但畧而未備門人各為增錄名蒼葢鈎玄心法師友淵源等書固亦遺漏尚多且其中互有得失今肆為刪正裁取更加潤色以歸于一其有附會謬說竄入雜方直削之
- 一格致餘論等成書并本傳及書簡中所具長篇則摘取其要語少加潤色錄之
- 一凡門人所錄論方果係丹溪所授者不復識別
- 一篇中所有古方如內傷篇補中益氣湯之類悉附于後又有一等古方如傷寒篇麻黃湯之類雖非篇中所用

然皆切於施治而不可無者亦附之以備參用

一凡藥方惟備于一處於目錄中見之

一凡丹溪本文皆大字愚所註皆小字但其藥方下分兩制度亦照舊用小字者所以便觀覽也

一凡篇中藥方下分兩製度或有或無或詳或略或大字或小字皆仍諸書之舊也

一凡篇中方名亦用陽文各藥亦分層具列皆所以便檢覽也

一凡藥之分兩以今之斤兩錢分為數原有升斗字銖之類悉易去也

凡例終

目錄

病篇

卷上

第一	中風	第二	傷寒 <small>并中寒 附傷風</small>
第三	瘟疫 <small>附大頭病 瘴氣一方</small>	第四	內傷
第五	暑	第五	火熱
第六	溼 <small>蝦蟆瘟</small>	第六	欬嗽
第七	鬱	第七	瘧
第八	哮喘	第八	痢
第九	癰亂	第九	欬逆
第十	嘔吐	第十	
第十一		第十一	
第十二		第十二	
第十三		第十三	
第十四		第十四	
第十五		第十五	
第十六		第十六	
第十七		第十七	

卷下

廿九	虛損	卅一	吞酸	卅二	饅雜
卅二	惡寒	卅四	痞滿	卅五	腫脹
卅五	頭痛 <small>并頭風痛</small>	卅七	注夏	卅八	胃風
卅六	心痛 <small>并脾疼</small>	三十	勞瘵	卅一	蟲
卅九	脇痛	卅三	惡熱	卅四	眩運
四二	腳氣	卅七	腹痛	卅八	腰痛 <small>附腎</small>
		四十	諸氣	四一	疝
		四三	痛風 <small>附風</small>		頸強瘕

四甲	痿	四五	手麻木	四六	耳病
四七	目病	四八	口病	四九	喉病
五十	齒病	五一	鼻病	五二	衄血
五三	吐血	五四	便血 <small>下血</small>	五五	汗
五六	瘕	五七	厥	五八	癩 <small>附癩狂</small>
五九	邪祟	六十	怔忡 <small>附驚悸</small>	六一	健忘
六二	消渴	六三	便濁	六四	遺精
六五	淋閉 <small>附不禁</small>	六六	關格	六七	祕結
六八	脫肛	六九	痔漏 <small>附腸風</small>	七十	黃疸
七一	癩 <small>附丹疹</small>	七二	癭氣	七三	結核

七四瘡瘍

七五癘風

七六損傷

七七婦人證

七八小兒證

藥方

小續命湯

三化湯

大秦朮湯

愈風湯并見第一附方

麻黃湯

桂枝湯

小柴胡湯

大柴胡湯

調胃承氣湯

小承氣湯

大承氣湯

理中湯

四逆湯

小建中湯

小陷胃湯

大陷胃湯

小青龍湯

大青龍湯

大羌活湯

九味羌活湯

十神湯并見第二附方

升麻葛根湯

甘桔湯

萎薤湯

補中益氣湯見第四附方

升陽散火湯

清暑益氣湯

白虎湯並見第五附方

火鬱湯

黃連解毒湯

瀉心湯並見第六附方

導痰湯見第九篇

二陳湯

十棗湯並見第七附方

三拗湯見第八附方

千緡湯見第十篇

六和湯見第十四附方

黃芩芍藥湯

芍藥湯

大黃湯並見第十二附方

消痞湯見第十五附方

葛花解酲見第十三附方湯

胃風湯見第十八附方

索矩三和湯見第十五

四君子湯

四物湯

八物湯

十全大補湯

六君子湯

並見廿附方

羌活附子湯

白朮半夏天麻湯

安神湯

選奇湯

並見卅五附方

腎著湯

見三十一附方

蘇子降氣湯

見四十附方

治疝方

見四十一附方

禹澤通氣湯

見五十附方

五葉湯

見四十一附方

犀角地黄湯

見五十附方

當歸六黃湯

正氣湯

調衛湯

並見五十五附方

溫膽湯

見六十篇

歸脾湯

見六十附方

小薊湯

見六十附方

潤腸湯

通幽湯

見六十附方

秦艽羌活湯

見六十附方

矢苓滲溼湯

見七十附方

內托羌活湯

白芷升麻湯

黃芪六一湯

內托黃芪柴胡湯

黃昏湯

大黃牡蠣湯

內托黃芪酒煎湯

葶藶湯

葶藶大棗瀉肺湯

並見七十附方

化毒湯

見七十附方

參蘇飲

見第二方

桂苓甘露散

十味香薷飲

黃連香薷飲

香薷飲

並見第五方

防已飲

見四十二篇

安胎飲

見七十篇

六神通解散

藿香正氣散

並見第二附方

敗毒散

神朮散

並見第三附方

防風通聖散

見第一附方

益元散

即六散

大順散

五苓散

生脉散

並見第五附方

涼膈散

瀉白散

導赤散

瀉黃散

並見第六附方

瓜蒂散

稀涎散並見第九附方 九仙散附見第十方 平胃散三見二十方

實脾散 五皮散並見第五附方 紫前梅連散

蓮心散並見第十附方 天香散附見廿五方 推氣散

枳芎散並見第九附方 正氣天香散見四十篇

潛行散 二妙散並見第十三篇 蔓荊子散見四十六附方

四制白朮散見五十五附方 消風散見七十四附方 八正散見五十六附方

如神散附見七十五方 換肌散並見七十五附方 通天再造散

醉仙散 內托復煎散 黃連消毒散 烏金散

托裏散 三生散 薏苡附子敗毒散

必効散 內托散並見七十四附方 達生散 四聖散木香散異功散 活血散並見七十八附方

催生散並見七十七篇 左金丸 大補丸

黑奴丸附見第三方 清金丸並見十一篇 三補丸

抑青丸 瀉青丸並見六附方 越鞠丸見八篇

妙香丸 墜痰丸 利膈化痰丸

中和丸 潤下丸並見九篇 滾痰丸

青礞石丸 神祐丸並見七附方 溫六丸

神朮丸 固腸丸見六篇 香連丸附見十六方

清六丸並見五篇 參萸丸並見十一篇 保和丸見三篇

芎藭丸

芎藭丸

芎藭丸

芎藭丸

芎藭丸

芎藭丸

大安丸見保和丸下

枳朮丸見方十四

消痞丸

失笑丸並見方十五

舟車神祐丸

禹餘糧丸並見方十五

阿魏丸見方二十

千金硝石丸

痞氣丸

肥氣丸

伏梁丸

息賁丸

奔豚丸並見方二十

大補陰丸

補陰丸

虎潛丸即補陰丸

加味虎潛丸

滋陰大補丸

補腎丸

六味地黃丸

人參固本丸

補天丸並見方二十

寶鑑化蟲丸

集効丸

萬應丸並見方三十

玉壺丸見方三十

犀角紫河車丸

即調鼎方見

草豆蔻丸見方二十

煨腎丸見方三十

當歸龍會丸見方三十

清膈丸見方四十

木香檳榔丸

蘇合香丸並見方四十

東垣健步丸見方四十

附方十

疝氣神方見方四十

滋陰地黃丸

神仙退雲丸

羊肝丸

地芝丸並見方四十

健步丸見方四十

四生丸

聖餅子並見方五十

定志丸見方六十

硃砂安神丸附方六十

猪肚丸見方六十

半苓丸

珍珠粉丸並見方六十

滋腎丸見方六十

潤腸丸

潤躰丸

備急丸

脾約丸並見方六十

小温中丸

大温中丸

針砂丸

綠礬丸並見方七十



固經丸	東胎丸	黑龍丸	鎮驚丸	抱龍丸	香蟾丸	蘆薈丸	小胃丹	控涎丹	愈風丹	奪命丹	摩腰丹	瓊玉膏	琥珀膏	三聖膏	人參膏	清空膏	雲母膏	太乙膏	牛膝膏	春雪膏	倒倉法	芎藭法	蜜導法	竹瀝	荆瀝	紫雪
	並見七十	八見七十			九	八並見七十	九	九	五附七十	八附七十	八附三十	附方十			九附二十	五附三十		四並附七十	五附六十	七附四十	六見二十	附方二	七附六十		九並附方	附方六

目錄終

丹溪先生醫書纂要卷上

後學 東陽 盧和 廉夫 纂註

第一 中風

真中風邪者東垣中血脉中府中藏之說甚好子和三法  
 亦可中面加五也膚緩失音鼻塞耳聾眼瞽便秘皆  
 湯也中府多著四肢中藏多滯九中藏中府以化湯通其  
 而後通之也其物之劑中府及中藏者藥必兼用先表之  
 能舉口不能言此中經也宜用大秦煎湯補血以養筋  
 然其方必不輕用也邪中經中宜用大感而無內傷者斯可用  
 之邪則不可奏其氣必虛下

諸書只謂外中風邪惟劉河間作將息失宜水不制火極是然地有不同西北人外中者亦有東南人只是溼土生痰痰生熱熱生風也已下皆類中風病或為寒中或為熱中要畧諸書因著為中風方治但人之病此者甚少若內傷熱證而卒暴僵仆類乎中風者則常有之世人率若名為中風而以內傷主治王安道以為因內傷者自是類中之說而以內傷主治王安道以為因內傷者自是類中之風病與風無干宜別而出之其言當矣乃以昔人主乎風河間主乎火東垣主乎氣丹溪主乎溼而有昔人主乎子各得其一論實以三類之不知有真中風者且別過矣夫河間之論實以三類之不知有真中風者且別過中風論在詳東垣謂因傷氣病且溼熱必有外賊風襲虛而論在府在藏之異丹溪謂因於溼熱必有外賊風襲亦謂別子向嘗歸之火氣溼而不敢專具名病多因於俗所謂別子向嘗歸之火氣溼而不敢專具名病多因於俗如胃脘痛名心痛之類皆名非其病故只以真中風證治列于前類中風證治列于後如此則名同病異判然

明白俗醫之謬於此亦可正矣

局方本為外感立方而以内傷熱證表同出治其害非輕大率主血虛有痰或挾火與溼治法以痰為先補養次之初中急搯人中能醒

痰擁盛者口眼喎斜者不能言者皆用吐法輕者醒者用瓜蒂散或蝦汁或稀涎散吐之重者口噤者用藜蘆少加麝灌入鼻內吐之一吐不已再吐之亦有不可吐者虛甚故也

氣虛卒倒參芪湯補之挾痰則濃煎參湯加竹瀝薑汁血虛四物湯補之挾痰則四物用薑汁炒過加竹瀝薑汁

能食者去竹瀝加荊瀝

半身不遂大率多痰在左屬死血與無血於宜四物湯加桃

仁紅花竹瀝薑汁在右屬痰屬氣虛宜二陳湯四君子

湯加竹瀝薑汁

肥人多濕少加附子烏頭行經

烏頭天雄皆氣壯形偉可為下部藥之佐無表其害人之

禍相習用為治風之藥殺人多矣治風治寒有必用者

當以童便煮而浸之以殺其毒且助下行之力入鹽尤

捷

遺尿者屬氣虛以參芪補之

許澈宗治王太后病風不能言而脉沉其事急矣非大補

不可也若用有形之湯藥緩不及事乃以防風黃芪煎

湯數斛置于牀下湯氣薰蒸滿室如霧便口鼻俱受之

其夕便得語此非智者通神之法不能回也蓋人之口

通乎地鼻通乎天口以養陰鼻以養陽天主清故鼻不

受有形而受無形地主濁故口受有形而兼乎無形也

一人患滯下一夕昏仆目上視澀注汗泄脉大無倫此陰

虛陽暴絕也蓋得之病後酒色急灸氣海穴在臍下漸

甦服人參膏數斤而愈

夏月卒倒為暑風此類中風病見於夏者原有因火者內

以暑風另立篇名今併入

火升火合而炎爍也。有因痰者，暑氣激痰，塞碍心竅也。二者皆宜吐之後，用調理藥。

許學士云：亦有氣中者，因七情所傷，氣中即俗謂之氣厥也。脈必沉，若浮則風

脈也。中風與類，中風身溫且多痰涎，中氣身冷且無痰涎。許學士又曰：宜以蘇合香丸灌之，至醒隨其寒熱虛實調之。又曰：此氣暴逆而然，氣復即已，雖不藥而愈。

不治證：口開、手撒、眼合、遺尿、吐沫、直視、喉如鼾、睡絕、五藏氣

治：口開者，心絕；手撒者，脾絕；眼合者，肝絕；遺尿者，腎絕。聲如鼾，睡者，肺絕。若見一證，猶可治也。肉脫、筋

痛，一云筋枯者，不養筋動，皆不治。脈決又言：髮直、標、毫也。

頭上竄面赤如狂，汗綴如珠，皆不治。真中

附方

小續命湯

麻黃節去 人參 黃芩 芍藥 防己 川芎

杏仁 苻草 桂略一 附子錢五 防風一兩

右剉每服五七錢，加生薑五片，水煎，食前熱服。金匱要畧

有石膏當歸無附子

凡中風不審六經之加減，雖治之不能去其邪也。肉經云：開則淅然寒，閉則熱而悶，知暴中風邪，宜先以加減續命湯隨證治之。

中風無汗惡寒，麻黃續命主之。依本方麻黃、防風、杏仁各加一倍，宜針至陰。足小指外側爪甲 出血，崑崙足後

上跟骨

拳踞

中風有汗惡風桂枝續命主之依本方桂枝芍藥杏仁

各加一倍宜針風府項後入髮際一寸三分禁灸

上二證皆太陽經中風也

中風有汗身熱不惡寒白虎續命主之依本方甘草加

一倍外加石膏知母各二兩

中風有汗身熱不惡風葛根續命主之依本方桂枝黃

芩各加一倍外加葛根二兩宜針陷谷足大指後

中針五分去陽明之賊刺厲兌在足大指次指瀉陽

明之實

上二証皆陽明經中風也

中風無汗身涼附子續命主之依本方附子加一倍甘

草加三兩外加乾薑二兩宜刺隱白足大指內側爪甲角去太陰之賊

此太陰經中風也

中風有汗无熱桂枝續命主之依本方桂枝附子甘草

各加一倍宜針太谿足內踝後跟骨上陷中

此少陰經中風也

中風六証混淆繫之於少陽厥陰或肢節痠痛或麻木

不仁宜羌活連翹續命主之小續命八兩外羌活四

兩連翹六兩

古之續命混淆無六証之別今各分經治療又分經鍼  
刺法厥陰之井大敦足大指甲後一刺以通其經少  
陽之經絕骨外踝上三壯灸以引其熱是針灸同像法  
治之大躰也

防風通聖散

防風 川芎 當歸 芍藥 大黃

芒硝 連翹 麻黃帶節 薄荷各五 石膏

桔梗 黃芩各一 荊芥穗 白朮 山梔各二

滑石三兩 甘草二兩

右剉每服一兩加生薑水煎服

三化湯

厚朴 大黃 枳實 羌活

右剉每服一兩水煎

大秦朮湯

秦朮 石膏各二 甘草 川芎 當歸

芍藥 羌活 獨活 防風 黃芩

白芷 生地黄 熟地黄 白茯苓 白朮各一

細辛錢五

右剉每服一兩水煎天陰雨加生薑七片春夏加知  
母一兩

愈風湯療產後中風口噤手足瘳癱如角弓狀亦治血

運四肢強直

荊芥畧炒

右每服三錢豆淋酒下童便亦可其効如神又方

加當歸等分入酒少許水煎灌下即醒徐氏曰風本

惟此方以產後多因血虛故專用行血之藥

### 第二 傷寒

外感無內傷者用仲景法今採傷寒及温暑諸方附于後

傷寒挾內傷者十居八九經曰邪之所湊其氣必虛補中

益氣湯從六經所見之證加減用之氣虛甚者少加附

子以行參芪之功補中益氣加減法如見太陽證頭項

熱目疼而鼻乾不得卧加葛根倍升麻少陽胃腸痛而

耳聾加黃芩半夏川芎倍柴胡太陰腹滿而喘加枳

實厚朴少陰口燥舌乾而渴加生甘草桔梗厥陰煩滿

東垣謂內傷者極多外傷者間而有之此發前人所未發

欲辯內外傷之證東垣詳矣辨法見後人徇俗不見真

切雷同指為外傷極繆其或可者蓋亦因其不敢放肆

而多用和平之藥散之耳若粗率者必致殺人有感冒

輕病不可便認為傷寒西北二方極寒肅殺之氣外傷

甚多東南二方温和之地外傷甚少所謂千百而一二

也雜病亦有六經所見之證故世俗混而無別傷寒自  
下著述紛然未見其有的然可為後學準繩者甚至傷  
寒之名亦無定擬名不正其可言治乎夫自霜降後至  
春分前感寒而即發從太陽鬱熱以次而傳陰經或太  
陽不傳陽明少陽而即傳太陰少陽與明先後陰陽  
經或二陽三陽同受而為合病或太陽少陽與厥陰陽  
為併病或太陽與少陰陽明與太陰少陽與厥陰陽  
俱受而為兩感之類此皆感於肌膚之間至春變為溫  
傷寒也其不即病而寒毒藏於肌膚之間至春變為溫  
夏變為暑或將發而復感暴寒此不即發之類暑熱病  
與本無冬月所發之邪而春夏自感暴寒之類此皆後  
人通謂之四時傷寒也本因飲食勞倦所傷然氣虛邪  
襲每感寒而顯表證則此所謂扶內傷之傷寒也即病  
之傷寒仲景亦法班固馬四時之傷寒歷代諸書祖仲景  
而更為立法亦班固馬四時之傷寒歷代諸書祖仲景  
湯尤為切當茲惟冬時湯治之仍用仲景法其製九味羌活  
不愈者若頭痛惡寒已除不惡寒而惡熱大便難者以  
擬下畧帶表證以大柴胡湯無表證若痞大便難者以小

承氣邪在中焦作滿者以調胃承氣痞實滿燥者以大  
承氣宜詳證用之不可過也其扶內傷之傷寒則以補  
中益氣從六經證加減用之然或內傷輕則以發散為  
以補養為主而兼發散外感重而內傷輕則以發散為  
先而後補養其輕重緩急之間視之  
一失其宜則禍福霄壤李者慎之

一人舊有下疔瘡忽頭疼發熱自汗衆作傷寒治反劇脈  
弦甚七至重則瀉予曰此病在厥陰而与證不對以小  
柴胡加草龍膽胡黃連熱服四貼而安

一少年貧勞冬患惡寒吐血二三日六脉緊瀉食減中痞  
醫投溫膽湯枳殼湯三日後發潮熱口乾不渴有痰詢  
知因悲泣忍飢霜中度水以小建中湯去芍藥加桔梗

陳皮半夏四貼而安傷挾外感者  
不先問病人之虛實先問病家之虛實矣

可見  
雖貧  
餓者  
不厭  
療之  
今世  
之醫



有卒中天地之寒氣曰中寒仲景論傷寒而未及乎中寒  
先哲治冒大寒而昏中者用附子理中湯其議藥則得  
之矣曰傷曰中未有議其異同者夫傷寒有即病有不  
即病因其舊有鬱熱風寒外束肌腠自密鬱發為熱病  
邪循經而入以漸而深初用麻黃桂枝輩微表而安以  
病躰不甚虛也中寒則倉卒感受其病即發而暴因其  
腠理踈豁一身受邪難分經絡無熱可發溫補自解此  
氣大虛也不急治則死矣

傷風證屬肺者多輒入於腠理肺主皮毛故也此感冒也者是也

一時傷風頭痛發熱惡寒怕風便宜解散用防風羌活升  
麻葛根白芷台芎荊芥之類補藥痰藥隨證加減  
飲食過傷又兼傷風必用白朮陳皮山查麥蘗青皮枳實  
消其裏兼用台芎防風羌活以解其表

因起居不常房勞之後以致感傷必須以補氣血為主用  
參朮芎歸以補其裏兼用防風羌活等以解其表  
小兒傷風欬嗽吐痰用二陳湯加防風枳殼白朮桔梗有  
熱加黃芩柴胡

附說  
傷寒傳足經不傳手經

總方前  
之文信  
和之  
安也  
鳴呼

附方

麻黃湯

治太陽脉浮、頭疼、發熱、惡寒、身痛、無汗、而喘、冬

草窻劉氏曰、夫人身經絡上下手足走而不息、豈有間斷、其傳足不傳手者、蓋足經所屬皆水土木、太陽膀胱明胃土、小腸火、厥陰肝木、脾水、遇寒則溷而冰、木遇寒則葉落而枝枯、土遇寒則折而不堅、是皆不勝其寒也、手經所屬皆金與火、太陽三焦火、太陰肺金、厥陰心包火金之遇寒、則愈堅、是畏火而不畏寒也、火體極熱而寒不能籠、由是觀之、傷寒傳足不傳手之理、極其明矣、

或曰此理自諫垣而下、皆未明也、  
草窻所論可謂發前人、皆未發也、  
此段方前論粗也、脉浮之下、當有取茶之字、發熱之下、必之字、此則麻黃湯之字眼、

時即病宜服、春分後忌之、

春分之後忌之、之字方前之

麻黃 一兩半

桂枝 一兩

甘草 五錢

杏仁 五十枚

右剉每服五錢、水煎、溫服、取汗出為度、

桂枝湯治太陽中風、發熱、汗出、鼻鳴、乾嘔、冬時即病宜服、春分後忌之、

赤芍藥

桂枝 各六

甘草 四

右剉每服五錢、加生薑三片、棗二枚、水煎、溫服、須臾

發稀、粥助藥力、以取微汗、若小便數、及飲酒、人不宜用、飲酒人不宜、恐中滿而嘔、甘草

小柴胡湯治傷寒四、五、日、往來寒熱、胸滿、心煩、喜嘔、少

太陽發熱風溫身熱

柴胡二 半夏八 黃芩 甘草 人參各七

右作五服每加生薑三片棗二枚水煎溫服

天柴胡湯治內熱大便難身熱不惡寒反惡熱

柴胡二 黃芩七 芍藥三 半夏六

枳實四 大黃五

右剉作五服每加薑棗水煎溫服一方加大黃五錢

調胃承氣湯治太陽陽明不惡寒反惡熱大便秘澀語

嘔噦

甘草五 芒硝九 大黃酒浸

右剉水一鍾先煎大黃甘草至七分去粗入硝煎一

二沸溫服取利今用五錢作一服

小承氣湯治六七日不大便腹脹滿陽明無表證汗後

不惡寒潮熱狂言而喘

大黃一 厚朴五 枳實六

右剉作一服水煎溫服以利為度未利再服

大承氣湯治胃實譫語五六日不大便腹痛煩渴少陰

舌乾口燥

大黃五 厚朴兩 枳實五 芒硝三

右水二鍾半煎厚朴枳實至一鍾入大黃煎七分去

查入硝煎一二沸温服以利為度未利再服  
理中湯治大陽自利不渴寒多而嘔腹痛鴨瀉虬厥瘧  
亂

大人參

甘草

乾薑

白朮

各七

右剉每服五六分水煎本方加附子一枚名附子理  
中湯

小青龍湯治傷寒表不解心下有水氣乾水發熱而欬

或渴或利或噎或小便不利小腹滿或喘者

乾薑

炮

麻黃

肉桂

芍藥

甘草

炒各

五味

二

半夏

二兩

右剉每服三四分水煎温服

大青龍湯治傷寒見風傷風見寒太陽無汗脈浮緊發

熱惡寒煩躁若脈弱惡風汗出不可服

麻黃

三

桂枝

一

杏仁

廿

甘草

一

石膏

半雞

右剉每服五分每加薑三片棗一枚水煎温服取汗  
芻熨法治陰證身靜而重語言无声氣少難以布息目

睛不了了口鼻氣冷水漿不入大小便不禁面上惡

寒有如刀刮先用此法乃用四逆湯服之

用芻一束以繩札如餅大切去根葉留芻白長二寸

先以火炙一面令熱勿至灼火以熱面著臍及臍下

外面以熨斗盛火熨之令熱氣透入腹中更作三四餅壞則易之候病人漸甦手足溫有汗乃服四逆湯  
四逆湯治太陰自利不渴陰證脈沉身痛

甘草兩一 乾薑七 附子半斤

右剉作一服水煎溫服強人用大附子加乾薑三斤  
本方乾薑加至兩名通四逆湯治厥逆下利脈  
不至每服五錢面赤加芎白九莖嘔加生薑咽痛加  
桔梗利止脈不出加人參

小建中湯治少陰惡寒手足倦傷寒二三日心中悸而煩脈微細者可服

桂枝 甘草各一兩 芍藥六兩

右剉作三服每加薑二斤棗四枚水煎去粗入錫一合微火令汗溫服嘔者不用錫

小陷胃湯治小結胃

半夏六 黃連三 瓜蒌一箇連皮肉

右剉作一服水二鍾先煮瓜蒌至一鍾半下餘藥煎至一鍾溫服如未効再進微解得口出黃涎即愈

大陷胃湯治大結胃

大黃五兩 芒硝一分 甘遂二分

右剉作二服每服水二鍾煎大黃至一鍾去粗入硝

煎一沸次入甘遂末温服得利快利止後服

白虎湯治汗後脉洪大而渴虛煩中暍加人參名人參

白虎湯又名化斑湯

大羌活湯解利兩感傷寒經曰兩感不治然所稟有虛  
實所感有淺深若稟實而感淺者間亦可生治之而  
不救者有矣未有不治而生者用此十中或活一二

羌活一升獨活一升防已一升黃芩一升黃連一升

白朮各一升川芎各一升細辛五分生地黄一升知母各二升

右剉作一服水煎服

九味羌活湯治春分後傷寒代桂枝麻黃湯用冬月用之亦可

羌活 防風 蒼朮各一升甘草 白芷

川芎 生地黄 黃芩各一升細辛四分

右剉作一服加薑三片棗一枚水煎服覆取汗原  
有汗去蒼朮加白朮渴加知母石膏。羌活治太陽  
肢節痛大無不通小无不入乃撥亂反正之主也防  
風治一身盡痛聽君將命令而行隨所使引而至蒼  
朮雄壯上行之氣能除濕氣下安太陰使邪氣不傳  
脾經。甘草緩裏急和諸藥。白芷治陽明頭痛在額川  
芎治厥陰頭痛在腦生地黄治少陰心熱在內黃芩  
治太陰肺執在胃細辛治少陰心經苦頭痛此方所

製凡見表證悉宜服之不犯三陽禁忌實解利之神藥也然以一藥而類治諸證苟用其方而不知所以立方之意則未免有執一之弊故述各藥主治使考者詳而用之

六神通解散主發表

麻黃五

石膏

活石

黃芩各二

仙術四

甘草一

右剉每服莖五片芎白五寸豉五十二煎服防風一

兩半去麻黃或秋冬去防風加麻黃

十神湯治時氣溫疫兩感風寒

川芎

甘草

麻黃

紫蘇

升麻

白芷

陳皮

香附

芍藥各四

乾葛一兩

右剉每服五錢或一兩莖三片水煎熱服欲汗以被

蓋再煎服

藿香正氣散治外感發熱頭疼內因痰飲凝節為執或

中脘痞滿嘔逆惡心又云治傷寒頭痛增寒壯熱

茯苓

白芷

大腹皮

紫蘇各一

陳皮

桔梗

白朮

厚朴

半夏

甘草各二兩

藿香三兩

右剉每服五分莖三片棗一枚水煎熱服欲汗以被

蓋再煎服

參蘇飲治同上

陳皮去白 枳殼炒 桔梗 甘草

木香各五 半夏 乾葛 紫蘇葉

前胡 人參 茯苓各七分五分

右剉每服五斤生薑七片棗一枚水煎熱服一方不用木香

○已上三方非仲景法乃後人所製說者謂承平日久民食用充足形志逸樂病居疑似之間本因氣逸經滯乃用其法也今世俗多用之以治四時傷寒

**第三 瘟疫** 治方通傷寒篇看 瘴氣方

衆人病一般者此天行時疫治有三法宜補宜散宜降用

大黃黃芩黃連人參桔梗蒼朮防風滑石香附人中黃

冬月以竹一段刮去青留底一節餘節打通以大甘草納竹筒內以木塞其上其數以留節一頭攤於真缸中浸

一月取出晒乾待用為末神曲糊丸每服五七十九氣

名人中黃大治疫毒 虛四君子血虛四物痰多二陳作湯使送下熱甚者加

童便

瘟疫惟有三因治法可用以其分內

當推歲運

冬瘟疫為病非其時而有其氣者冬氣君子當閉藏而反泄

于外而得之脉左寸浮大於右寸浮緩而盛按之無力

宜補藥帶表錄上亦兼內傷而論治附

大頭天行病乃濕氣在高巔之上用羌活黃芩酒炒大黃酒蒸



入隨病加減不可用降藥

東垣有法有方謂陽明邪熱大甚資實少陽相火而為之  
視其腫勢在何部隨經處治之當緩勿令重劑過其病  
所陽明為邪首大腫少陽為邪出於耳前後先以黃芩  
黃連俱酒炒甘草炒煎少不住服或劑畢再用大黃鼠粘  
子炒煎成去查入芒硝各等分亦時時呷之母令飲食  
在後及邪氣已只服前藥未已再同煎次第服之取大  
便邪氣已則止陽明渴加石膏少陽渴加公萋根陽明  
行經升麻芍藥葛根甘草太陽行經羌活荊芥防風並  
與上藥相合用之或云頭疼酒芥口渴乾葛  
身痛羌活桂枝防風芍藥

蝦蟇瘟屬風熱解毒丸下之又法用側柏葉自然汁調蚯  
蚓糞炒付或丁香尖附子尖南星醋磨付或五葉藤汁  
付或車前草汁

附方

九味羌活湯

方見梅老門

藿香正氣散

方見傷寒門

六神通解散

凡疫病初起之時用正氣散煎一大鍋每  
人服一碗以防未然若已病者用羌活湯

六神通解散服之皆有奇功草窓曰  
未病之人三五日一服乃却疫捷法

敗毒散治疫癘四時通用傷風有汗夏至後用風濕身  
腫躄痛惡風口乾日晡發熱脈實

茯苓

甘草

人參

桔梗

川芎

柴胡

枳殼

前胡

羌活

獨活分等

右剉每服七八分加生薑薄荷水煎

升麻葛根湯治無汗惡寒疫癘通用及發斑

升麻

芍藥

葛根

甘草各二

右剉每服五分水煎○熱甚者用玄參去芍藥葛根

升麻湯名

黑奴丸治陽毒發斑煩躁大渴倍常時行熱病六七日

未得汗脈洪大或數面赤目脹身痛大熱煩躁狂言

欲走渴甚又五六日已上不解熱在胃中口禁不能

言為壞傷寒醫所不治棄為死人精魂已竭心下纒

暖撥開其口灌藥下咽即活

黃芩

釜底煤

芒硝

麻黃

竈突墨

梁上塵

小麥奴各一

大黃一兩

右為細末煉蜜為丸如彈子大新汲水化下飲水盡

足當發寒寒已汗出乃差若時頃不汗再服一丸須

見微利若不大渴不可與此藥

甘桔湯治冬溫

甘草

桔梗分等

右剉水煎

特痛

姜蕤湯治冬温

姜蕤分三

石膏半

麻黄

白微

羌活

杏仁

甘草

青木香

川芎各半

乾葛五

右剉分三服水煎服

神术散主山嵐瘴氣

陳皮兩

蒼术

厚朴各四

甘草

石菖蒲各二

藿香五

右剉每服四升加薑棗煎一本用香附三兩炒代菖

蒲名神术散氣散

此方出心即維珠其功補前中益氣詳加蒼术等齊使外邪不能入可也每在閩廣人以檳榔能治瘴終世常食之夫檳榔固有破滯泄氣之功

無瘴病而食之寧不自損真氣而有開門延寇之患經曰邪之所湊其氣必虛

第四 内傷

諸書有以傷者分門析類甚有不明白夫内傷本東垣以勞倦飲食所傷者世俗多有謂之曰故内作特所以傷外而内傷也今以其有表證而似乎外傷者為内傷則列於其傷寒有内傷而致外傷風寒之傷重者為内傷則列於其傷寒有内傷與虛損各立一篇庶不失東垣命相之意各以本病立篇庶不失東垣命相之意

東垣内外傷辨甚詳

無間内傷惡寒得熱間作而解外傷惡風乃不禁一切風除内傷惡寒惟惡夫此少賊風外傷惡風乃不禁一切風不利而壅盛有力内傷者不然内傷證显在鼻故鼻气知味而腹中不和後重内傷者无此外傷則邪气有餘且先壯厲且先輕而後重内傷者无此外傷則邪气有餘且先

重而後輕外傷手背熱而手心不熱內傷則手心熱而  
手背不熱東垣辨法大要如此然有內傷而無外感有  
外感而無內傷者則其脈證必並見而難辨尤宜細心求  
兼病而相挾者則其脈證必並見而難辨尤宜細心求  
之若頭內證多者則是內傷重而外感輕宜以補養為  
先若頭外證多者則是外感重而內傷輕宜以發散為  
急此東垣未之及也因贅其畧

世之病此者為多但有挾疾者有挾外邪者有熱鬱於內  
而發者皆以補元氣為主看所挾而兼用藥氣虛甚者  
必少加附子以行參芪之功挾痰者以補中益氣多加  
半夏以竹瀝薑汁傳送

一人因齋素飢寒作勞發熱頭疼醫与小柴胡自汗神昏  
視聽不能脈大如指似有力与參朮黃芪熟附炙甘草

作大劑服之一日汗少二日熱減能視聽加蒼朮与二  
貼再得汗熱除乃去蒼附作小劑服三日而安

一少年九月間發熱頭疼妄語大渴醫与小柴胡十餘貼  
熱愈甚予診視形肥脈數大左甚以參朮為君茯苓芍  
藥黃芪為佐附一片為使与二貼不愈或謂不當用附  
予曰虛甚誤投寒藥人肥而脈左大於右事急矣非附  
子則參芪焉能有急效再一貼乃去附作大劑与五十  
貼大汗而愈

一少年勤於農作忽勞倦大熱而渴恣飲泉水次日熱退  
言視謬妄自言腹脹不能轉側不食戰掉脈瀼而大右

為甚灸氣海三十壯用白朮黃芪各二錢附蕪過五分  
與十貼不效又增發熱而渴但少進稀粥予曰此氣欲  
利而血未應也於前藥去附加酒當歸以和血有熱加  
人參一糸半與三十貼而安

一肥白人年壯因勞倦成病秋間大發熱已服柴胡等藥  
七八貼矣兩手脈洪數而實觀之形色知其脈本不實  
以服涼藥所治因與溫補藥黃芪附子湯冷飲三貼困  
睡微汗而解脈亦稍軟繼以黃芪朮湯脈漸斂小而愈  
是肥白人虛勞多氣虛也

一老人飢寒作勞患頭疼惡寒發熱骨節疼无汗妄語自

服參蘇飲取汗脈洪數而左甚此胃虛作勞陽明雖受  
寒氣不可攻擊當大補其虛俟胃氣克實必自汗而解  
以參芪歸朮陳皮炙甘草每貼加附一片服五貼諸證  
雖解但口稍乾熱未退乃去附加芍藥漸思食精爽間  
與肉羹汗自出熱退

一男子素嗜酒因感傷倦怠不思食半月後大發熱惡寒  
遍身痛脈浮大按之豁然左為甚此極虛受寒以人參  
為君黃芪芍藥歸身為臣蒼朮陳皮通草乾葛為佐大  
劑與之五貼汗如雨凡三易被得睡而愈

附方

補中益氣湯

黃芪

勞役甚者一分

甘草

五分

人參

升麻

柴胡

橘紅

當歸身

白朮

各三分

右剉作一服水煎脾胃一虛肺氣先絕用黃芪以益皮毛而閉腠理不令自汗也上喘氣短損其元氣人參以補之心火乘脾炙甘草之甘溫以瀉火熱而補脾胃中元氣若脾胃急痛腹中急縮者宜多用之此三味除濕熱煩熱之聖藥也白朮苦甘溫除胃中熱利腰膝間血升麻柴胡苦平味之薄者升胃中之清氣又引黃芪甘草甘溫之氣味上升能補衛氣之散

解而實其表又緩帶脉之縮急當歸以和血脉橘紅理胃中之氣又能助陽氣上升以散滯氣助諸甘辛為用或少加黃柏以救腎水而瀉陰中之伏火也表熱者一二服氣和微汗而愈本指方如益乾者加乾葛如身刺痛乃血澁不足加當歸如精神短少者加人參五朮子如頭痛加蔓荊子痛甚加川芎頂痛腦痛加藁本細辛有痰加半夏生薑如欬軟夏加五味麥門冬秋冬加麻黃春加佛耳草款冬花久嗽肺中伏火去人參如食不下乃胃中有寒或氣澁滯加青皮木香陳皮寒月更加益智草豆蔻夏更加荅連秋更

加檳榔砂仁如心下痞悶加芍藥黃連如腹脹加枳  
實木香砂仁厚朴天寒加薑桂如腹痛加白芍藥甘  
草有寒加桂心夏加黃芩甘草芍藥冬加半夏益智  
草豆蔻如脇痛或縮急加柴胡甘草如臍下痛加熟  
地黃不已乃是寒也加肉桂如大便閉澀加當歸大  
黃如脚軟乏力或痛加黃柏不已更加防已去加減

**第五 暑**

暑脉微弱按之無力又脉來隱伏又脉虛經曰脉虛身熱  
隱伏皆虛類也

暑證用黃連香薷飲清暑益氣湯五苓散等有挾痰者加

南星半夏之類挾虛者加人參黃芩之類戴氏曰暑有中

三者輕重之分或腹痛水瀉者胃與大腸受之惡心者

胃口有痰飲此二者冒暑也可用黃連香薷飲黃連退

此為香薷消水或身熱頭疼燥亂不寧者或身如針刺者

人參或咳嗽發寒熱盜汗出不止脉數者熱在肺經火

乘金也此為中暑宜用清肺湯柴胡天水散之類急治

可則夏月陽氣盡出於地人之腹屬地氣於此時浮與肌表腹

中虛矣夏月伏陰在內此陰字有虛之義若作陰冷看

其誤甚矣前人治暑有用大順散等劑蓋以涼亭水閣

寒泉冷冰雪之傷不用溫熱病何由安非為伏陰而用也

火令之時流金爍石何陰冷之有孫真人製生脉散令  
人夏月服之非虛而何按索古謂靜而得之為中暑動  
深堂大夏得之曰中暑大順散主之日中暑而求別於中熱耶  
中熱白虎湯主之夫暑熱一也夏令之日中暑而求別於中熱耶  
而病乃夏月傷冷之病何以中暑名病而用溫熱之藥所  
王安道辨之明矣惟其以中暑名病而用溫熱之藥所  
以世謂夏月陰在內宜服溫熱則冬月通陽在內亦宜  
服寒涼之物乎

一人夏大發熱譫語肢躄莫舉喜冷飲脉洪大而數以黃  
芪茯苓濃煎如膏用凉水調服三四次後昏卧如死氣  
息如常次日方醒而愈

一人夏發熱大汗惡寒戰慄煩渴此暑病也脉虛微而數

其人好賭致勞而虛以人參作湯調辰砂四苓散八貼  
而安

附方

香薷飲治一切暑熱腹痛霍亂吐利煩心等證

香薷斤

厚朴制

白扁豆各半

右剉每服三四錢水煎服

徐氏曰世俗用於暑月中  
煎飲然氣虛者不可過多

蓋厚朴泄  
氣藥也

黃連香薷飲

前方去扁豆  
加黃連四兩

十味香薷飲

香薷斤

人參

陳皮

白朮

白茯苓



白蘆豆 黃芪 木公 厚朴 炙甘草各五

右剉每服四五升水煎服

清暑益氣湯

黃芪少汗者一升 蒼朮各一升 升麻一升 人參 白朮

陳皮 神曲炒 澤瀉各五分 甘草 黃蘗酒

當歸身 青皮 麥門冬 乾葛各三分 五味九枚

右剉作一服水煎稍熱服食遠

白虎湯治暑熱發渴

石膏以五色研 按丹溪云藥之命名亦多有義意有

名者以能名者以形名者以氣名者以質名者以味名者以固密甚於石脂非其有膏焉能為用此以其質

與能而得名正與石脂同意閻孝忠妄以方解石為  
石膏况石膏其味甘而辛本陽明經藥陽明主肌肉  
其行也至頭又緩入手太陰手少陽彼方解石能解肌出汗  
重質堅在哉此論本藥之所謂有膏味而可為三經之主  
治者一以堅師市人為石膏考其得失何如也但今之  
人仍多以堅硬者為石膏者細理白澤者良寒水石下云  
似石膏順理而細合而觀之惟軟肥者可析理而細  
不然堅硬者又均不似雲母也餘如唐註以下尤紛論  
知母二 炙甘草一

右剉作一服入粳米一撮水煎加人參一錢半名

參白虎湯

益元散一名六一散 治中暑身熱小便不利燥溼分水

益元散一名六一散 治中暑身熱小便不利燥溼分水

益元散一名六一散 治中暑身熱小便不利燥溼分水

益元散一名六一散 治中暑身熱小便不利燥溼分水

益元散一名六一散 治中暑身熱小便不利燥溼分水

益元散一名六一散 治中暑身熱小便不利燥溼分水

益元散一名六一散 治中暑身熱小便不利燥溼分水

益元散一名六一散 治中暑身熱小便不利燥溼分水

益元散一名六一散 治中暑身熱小便不利燥溼分水

益元散一名六一散 治中暑身熱小便不利燥溼分水

益元散一名六一散 治中暑身熱小便不利燥溼分水

益元散一名六一散 治中暑身熱小便不利燥溼分水

道实大府化食毒行積滯逐凝血解煩渴補脾胃降  
妄行火之要藥也

滑石六兩

甘草一兩

右和勻每服三五錢新汲水調服

桂苓甘露飲

桂

人參

藿香

茯苓

白朮

甘草

葛根

澤瀉

石膏

寒水石各一兩

滑石二兩

木香一兩

右為末每服三匙白湯調下

大順散

甘草三兩

乾薑

杏仁

桂各六分

右先將甘草用白砂炒次入薑却下杏仁炒過篩去

砂合桂為末每服二三錢湯點服王安道曰大順散

飲過多脾胃受溼嘔吐水穀不分截府不調所立故

乾薑甘草皆經火炒又肉桂而非桂枝蓋溫中藥也

五苓散

澤瀉五兩

白朮

赤茯苓

猪苓各十

肉桂十

右為末每服二匙湯調下本方除桂名四苓散倍加

茵陳名茵陳五苓散

生脉散

人參

麥門冬

五苓子等

右剉水煎

**第六 濕**

經曰因於濕首如裹蓋首為諸陽之會位高氣清為溫氣  
薰蒸而沉重似有物以蒙之也失而不治則鬱而為熱  
熱傷血不能養筋故大筋綆短而為拘牽濕傷筋不能  
束骨故小筋弛長而為萎弱矣

六氣之中濕熱為病十居八九

溼在上宜微汗而解經曰濕上甚而熱治以苦溫佐以甘

辛以汗為効而止也不欲汗多故不用麻黃乾葛等劑

濕在中下宜利小便此淡滲治濕也下宜云濕在

溼有自外入者有自內得者陰雨溼地皆從外入治宜汗

散久則踈通滲泄之

蒼朮治溼上下部都可用蒼朮其功甚烈

二陳湯加酒芩羌活蒼朮散風行濕最妙

肥人多濕

局方用燥劑為却濕病也濕得燥則豁然而收

**第七 火熱**

人具五行各一其性惟火也心為君火而又有相火者寄乎肝腎二藏之間經所謂二火也諸動屬火五者之性感物而動經所謂五火也相火易起五火相扇則妄動矣火起於妄變化莫測無時不有前發直陰陰虛則病陰絕則死

陰虛火動者難治藏抵和是脈數而虛

實火可瀉黃連解毒之類虛火可補參朮生甘草之類謂

實者邪氣實也謂

鬱火可發當看何經風寒外來者可發

輕者可降重則從其性而升之

凡火盛者不可驟用寒涼必須溫散

火急甚者必緩之生甘草兼瀉兼緩參朮亦可

人壯氣實火盛癩狂者可用正治或硝水冰水与之虛火

盛狂者以生薑湯与之若投冰水正治立死

補陰則火自降炒黃柏生地黃之類

木通下行瀉小腸火人中白即尿管岸須風瀉肝火芩連

以猪胆炒去肝胆之火黃柏加細辛瀉膀胱之火青黛

能收五藏之鬱火玄參能瀉无根之遊火

小便降火極速山梔能降火從小便泄去其性能屈曲下

行人所不知

氣有餘便是火氣從左邊起者肝火也氣從臍下起者陰火也

熱從脚下起入腹者虛之極也蓋火起九泉此病十不救

一治法以四物湯加降火藥服之以附子末罨湧泉穴

左金丸一名回令丸治肝火

黃連六兩 吳茱萸一兩湯煮少時

右末粥丸白朮陳皮湯下

丸補丸治陰火黃柏炒褐色為末粥丸水丸法

抑青丸治肝火黃連薑汁炒為末粥丸溫湯下

清金丸一名與點丸治肺火黃芩炒為末水丸溫湯下

石膏研末醋丸菜豆大瀉胃火食積痰火

陰火用四物湯加白馬脛骨降陰中火代苓連用

陰虛發熱用四物湯加黃柏是降火補陰之妙劑甚者加

龜板兼氣虛加人參芪朮

飲酒人發熱者難治不飲酒人因酒發熱者亦難治

輕手按之熱甚重手取之不甚此熱在肌表宜清之地骨

皮麥門冬竹筴之類

煩躁者氣隨火升也

一人因酒肉發熱用青黛瓜蒌仁薑汁日飲數匙三日愈

一室女六月煩悶欲入井見第八篇

手心熱屬熱鬱用火鬱湯或用梔子香附白芷半夏川芎  
曲糊丸

附方

升陽散火湯治男子婦人四肢發熱筋骨間熱表熱如  
火燎於肌膚捫之烙手此病多因血虛而得或胃虛  
過食冷物鬱遏陽氣於脾土之中並宜服之

升麻 葛根 獨活 羌活 白芍藥

人參各五分 甘草炙 柴胡各三分 防風二分 甘草生三分

右剉每服五升水煎服忌寒涼之物

三補丸

黃芩 黃連 黃柏

右為末水丸

水鬱湯治四肢熱五心煩熱因熱伏土中或血虛得之  
胃虛多食冷物抑遏陽氣於土中

羌活 升麻 葛根 芍藥 人參各五分

柴胡 甘草炙各五分 防風二分 芍藥三分

右剉水煎服

涼膈散

大黃 朴硝 甘草各二分 連翹四分

梔子仁 黃芩 薄荷各一分

右為末每服二升加竹葉與蜜此少煎服

黃連解毒湯治大熱甚煩錯語不得眠

黃連一兩 黃芩

黃柏各五

山梔子四枚

右剉水煎服

紫雪治內外煩熱不解口中生瘡狂易叫走解諸熱毒

邪熱小兒驚癇百病

黃金一百兩

寒水石

磁石

石膏

滑石各二斤

已上用水一石煮至四斗去渣入下項藥

甘草各八兩

青木香

犀角屑

羚羊角屑

沉香各五兩

丁香一兩

升麻

玄參

剉細各一斤

已上再煮至一斗五升入下項藥

硝石

二斤芒硝亦可

朴硝十斤提淨者

已上入前藥汁中微火煎柳枝不住手攪候有七升

投放木盆中半日欲凝入下項藥攪令勻

硃砂三兩

當門子一兩二分

右藥成霜雪紫色每服一升或二升冷水調下大人

小兒臨時以意加減並食後服

瀉白散治肺熱

桑白皮

地骨皮各一兩

甘草五兩

右為末服

滋腎丸 治腎熱

導赤散 治小腸實熱

生地黄 木通

甘草等

右入竹葉煎

妙香丸 治時疫傷寒解五毒潮熱積熱及小兒驚百病

巴豆 淨肉三五粒炒

牛黃

片腦

膩粉

麝香 各半

辰砂 九兩

金鉞 九十

右研極細煉蠟六兩入蜜七錢半同煉令勻每兩作

三十九丸每服一丸小兒菜豆大二丸有拔水銀方無砂金鉞

沉久積遠

瀉心湯 治心熱 黃連末水調服

瀉青丸 治肝熱

當歸

龍胆草

川芎

山梔

大黃

羌活

防風

右為末蜜丸

瀉黃散 治脾熱

藿香 七

山梔 一

石膏 五

甘草 三

防風 四

右為末用蜜酒拌畧炒服

第八 鬱吋



氣血冲和百病不生一有佛鬱諸病生焉

調

火鬱發之當看何經經曰木鬱達之謂吐之令條達也曰

奪之謂下之令无壅滯也曰金鬱泄之謂滲也曰土鬱

小便也曰水鬱折之謂抑之制其衝逆也此治鬱大法

鬱有六氣濕熱痰血食也

氣鬱戴氏曰胃脇痛脈沉瀆用香附橫行胃臆間必用蒼朮撫芎

濕鬱戴氏曰周身疼痛或關節細用蒼朮白芷川芎茯苓

熱鬱戴氏曰積小用山梔青黛香附蒼朮撫芎

痰鬱戴氏曰脈沉動則喘用海石香附南星瓜蒌

血鬱戴氏曰便紅脈沉无力用桃仁紅花青黛川芎香附

食鬱戴氏曰愛酸腹飽不能食用香附蒼朮山查神曲針

砂炒

諸鬱藥春加防風夏加苦參秋冬加吳茱萸

蒼朮撫芎搃解諸鬱

凡鬱在中脘以蒼朮撫芎開提其氣以升之假令食在氣

上氣升則食自降餘倣此

越鞠丸一名芎朮丸解諸鬱

香附 蒼朮 神曲 川芎 梔子

右末水發為丸菜豆大温湯下

一室女因事忤意鬱結在脾半年不食但日食孰麥棗數

致遇喜食饅頭彈子大深惡粥飯予意脾氣實非枳實不能散以溫胆湯去竹茹与之數十貼而安

一少婦因大不如意事膈滿不食累月憊甚已午間發熱面赤酉戌退夜小便數而點滴脉沉瀆而短重取皆有經水極少此氣不遂而鬱於胃口血亦虛中官却因食鬱而生痰遂補瀉兼施以參朮各二錢茯苓一錢紅花一豆大帶白陳皮一錢濃煎食前飲之少頃藥行与粥半匙少頃与神祐丸減輕粉牽牛細九津嚥十五九晝夜二藥各進四服食稍進熱退面不赤七日而愈

一女許婚後夫經商二年不歸因不食困卧如痴無佗病

多向裏牀坐此思想氣結也藥難独治得喜可解不然

令其怒

脾主思思則脾氣結而衝開脾氣怒矣

予自往激

之大怒而哭至三時許令父母解之与藥一貼即求食矣予曰病雖愈必得喜方已乃給以夫回既而果然病不舉

一室女素強健六月發煩悶困憊不食時欲入井脉沉細數弱口漸渴醫作暑病治不効又加嘔手心熱喜暗处脉漸伏妄語予制局方妙香丸水下一丸半日大便藥已出矣遂以射香水洗藥以針穿三孔水吞半日下稠痰數升得睡漸愈因記金匱云昔肥而今瘦者痰也

第九 痰

有熱痰有濕痰有食積痰有風痰有少痰有老痰

熱痰用青黛黃連用青礞石丸最捷

濕痰身多軟而重用蒼朮白朮

溫痰用黃芩香附半夏貝母熱痰加瓜蒌青黛

酒痰用瓜蒌青黛蜜丸嚥化

神曲丸治濕痰氣執

蒼朮

黃芩

半夏

香附

神曲糊丸

燥濕痰南星半夏各一兩蛤粉二兩為青黛為衣

油炒半夏大治濕痰又治喘心痛粥丸薑湯下三十九

食積痰用神曲桑芽山查或化痰丸消積藥攻之氣虛者

用補氣藥送之

風痰用南星白附子

老痰用礞石半夏瓜蒌香附五倍子佗藥云五倍子佐

許孝士用蒼朮治痰飲成窠囊行痰極效即神丸痰挾瘀血

成窠囊

寒痰用半夏凝結清冷其狀若寒實非寒也然亦有用溫藥者蓋寒因熱用使之為引導而無杆格也

痰之為物隨氣升降無處不到

脉浮當吐痰在膈上必用吐膠固稠濁者必用吐在經絡  
中非吐不可吐中就有發散之義

凡吐法宜升提其氣用防風山梔川芎桔梗芽茶生薑之  
類或以此藥探吐

吐時先以布帛勒腰於不通風處行之

吐藥用蘿蔔子半升搗和以漿水一椀去查入少油与蜜

温服或用蝦半斤入醬芎藭等物水煮先喫蝦後喫汁

或瓜蒂散等後用鵝翎探吐鵝翎以桐油浸以皂角水

洗晒乾待用

痰在腸胃間可下而愈

小胃丹上可取胃膈之痰下可利腸胃之痰

甘遂麩裹者令透晒乾一云麩裹大戟長流水煮一

芫花醋拌經宿炒令大黃酒紙裹煨焙乾再以酒潤

黃柏炒一色二兩

為末粥丸麻子大每服一十九丸温湯下此藥能損胃氣

惟實者可用

墜痰丸治痰飲

風化硝 枳實煨 黑丑各五 白礬生二 皂角酥炙取

右末蘿蔔汁丸每服四十九丸鷄鳴時服初見屎次見

痰古方无硝枳實用

治痰用利藥過多致脾氣下虛則痰反易生而多

虛人中膈有痰胃氣亦賴所養卒不可便攻攻盡則愈虛

痰在脇下非白芥子不能達痰在四肢非竹瀝不行痰在

皮裏膜外非竹瀝不除氣虛之人有痰非竹瀝不開

痰結核在咽喉燥不能出化痰藥加鹹能軟堅之味瓜蒌

仁杏仁海石桔梗連翹少佐以朴硝以薑汁蜜丸噙之

二陳湯一身之痰都管治痰要藥也欲下行加引下藥欲

上行加引上藥

潤下丸降痰最妙隔痰云治

陳皮半斤去白以鹽水拌者乾炒燥

甘草兩

右末蒸餅丸菘豆大每服三五十九溫湯下上熱者加

清金丸濕者加炙莢丸詳證作湯使

青礞石丸化痰積云去濕痰

風化硝三袋盛風中化之茯苓

南星

青礞石敲碎煅硝等分同煉金色另研半夏

黃芩各五

右為末神曲糊丸梧子大每服三五十九此藥重在風

化硝一方加蒼朮五斤滑石一兩一方有枳實礞石

枳實瀉痰能衝瀉壁黃芩治痰假其下火也天花粉大能

降上膈熱痰海粉熱痰能降濕痰能燥頑痰能消

人中黃飯丸菘豆大每服十九白湯下能降陰火清痰治

食積

痰因火盛逆上治火為先白朮黃芩石膏之類久病陰火

上升津液生痰不生血宜補血制相火其痰自除

血傷必用薑汁傳送

久得瀆脉痰飲瀆也固脉卒難得開必費調理

痰成塊咯吐不出无鬱滯者難治

脾虛者清中氣二陳湯加白朮之類兼提藥

腎脾土燥脾濕是治其本

導痰湯

半夏四 南星 陳皮 枳殼 甘草 赤茯苓各一

右剉薑水煎服治嗽去半夏

利膈化痰丸

南星 蛤粉 半夏 貝母治胃膈痰

瓜蒌仁 香附 皂角 杏仁

前六味為末皂角敲碎煎濃汁搗杏仁如泥再以薑汁和蒸餅丸棗豆大青黛為衣每服五十九薑湯下

附方

二陳湯

陳皮去白 半夏泡五 茯苓去皮 甘草二

右剉薑水煎服

袞痰丸 治湿热等痰

大黄 酒蒸 黄芩 酪八 沉香 五 礞石 焰硝 假金

右末水丸梧子大每服五十九量病加减多至百九少至十九食後温服水下

神术丸 治痰飲

蒼术 皮一斤 泔浸一宿去 生油麻 蓋研細取水漿

大棗 研旋入麻漿取肉

右和丸梧子大每服五七十九温酒空心下

竹瀝 其水淡竹處經謂肉薄節間有雷粉者是俗名水竹以其雷動及燕末時節筍故名雖本草不言及然丹溪多用之大抵筍可食者即可用若篔竹即筋竹本草入

藥但其味難食故多不用也取瀝法將竹截作短段兩頭去節劈開置炭火以磚兩邊煨之將竹片閣於其上炙出其瀝兩頭以盤盛之

荆瀝 用黃芩截作短段炙取同上

瓜蒂散

瓜蒂 炒 赤小豆 等

右末香豉一合水二盞煮作稀粥去查取二分之一

和末一錢頓服之不吐少加得快吐乃止凡吐時須

午時已前先令病人隔夜不食卒暴者不拘若吐不止用麝解藜芦瓜蒂菊白亦解瓜蒂白水甘草搗解

稀涎散

猪牙皂角 黑皮 四條去 白礬 一兩

右末每服七八分温水灌下禁葱蒜

控涎丹治患曾背手足頸項腰膝隱痛不可忍筋骨牽引鈞痛時時走易乃是痰涎在心膈上變為此證或手足冷痺氣脉不通誤認疹癩

甘遂心去 紫大戟皮去

白芥子劉氏云解毒非此不達 曾隔有

右末糊丸梧子大每服食後臨卧淡薑湯下五七丸至十九丸痰猛加九數一方名妙應丸即此方驚痰加硃砂痛者加全蝎酒痰加雄黃全蝎驚風成塊者加川山甲鱉甲玄胡索蓬朮臂痺加木鱉子霜桂熱痰

加益硝寒痰加丁香胡椒桂

十棗湯治懸飲內痛

芫花熬 甘遂 大戟等

右末以水一升半煮大棗十枚至八合去查納藥末強人一錢弱人五分平旦服之不下更加五分下後以糜粥調之劉氏曰芫花之辛以散飲之二物之苦以毒之聖藥然有不可輕用

三花神祐丸

十棗湯加牽牛大黃輕粉 劉氏曰牽牛大黃瀉血也積



第十 咳嗽

大率有風寒有火有勞有痰有肺脹

風寒者戴氏曰鼻塞也主發散行痰二陳湯加麻黃杏仁

桔梗之類

風寒鬱熱於肺夜嗽者三拗湯加知母脉大而浮有熱加

黃芩生薑

寒嗽古方有以生薑切作薄片焙乾為末糯米糊丸芥子

大空心米飲下三十九出整

聲啞屬寒寒息寒而嗽者宜細辛半夏生薑辛以散之

風入肺久嗽者鵝管石雄黃麝金欵花為末和艾以生薑

一片置舌上以藥艾於薑上灸之取煙入喉中南方有

韞花佛耳韞韞此即煙筒法而少異煙筒以鴛管石雄黃

銜吸

喘嗽遇冬則發此寒包熱也解表熱自除枳殼桔梗加麻

黃防風風陳皮紫蘇木通黃芩嚴寒嗽甚加杏仁去黃芩

感冷則嗽膈上有痰二陳加炒枳殼黃芩桔梗蒼朮麻黃

木通生薑

火者戴氏曰有聲痰主降火清金化痰黃芩海石瓜蒌青

黛桔梗半夏香附訶子青皮之類

乾欬嗽者係火鬱之甚難治乃痰鬱火邪在肺中用苦梗以開之下用補陰降火不已則成勞須行倒倉法此證多是不得志者有之

有痰因火逆上者必先治其火然亦看痰火孰急若痰急則先治痰也

勞者戴氏曰盜汗出兼痰多作寒熱是也主補陰清金四物加竹瀝薑汁

陰虛火動而嗽四物加二陳順而下之加黃柏知母尤妙知

陰虛喘嗽或吐紅者四物加知母黃柏五味人參麥門冬

桑白皮地骨皮

好色之人元氣虛欬嗽不愈瓊玉膏

肺虛甚者人參膏以生薑陳皮佐之有痰加痰藥此好色

腎虛者有之腎虛則水失所養不能制火火熾于畏而

久嗽勞嗽用貝母知母各一兩以巴豆同炒黃色去巴豆

再用白礬白芨各一兩為末以生薑一片蘸藥睡時噉

化藥盡嚼薑嚥之

欬嗽聲嘶者乃血虛受熱用青黛蛤粉蜜調服之醫說內

痰嗽用蚌粉新瓦上炒通紅拌青黛少許以淡齋水滴入麻油數點調服

痰者戴氏曰嗽動有痰聲痰出嗽止是也主豁痰

痰嗽用半夏瓜蒌各五兩貝母桔梗各二兩知母一兩枳

殼一兩半為末生薑汁蒸餅為糊丸服

一方黃芩一两半洗酒白芥子去滑石各五錢貝母南星各

一两風化硝二錢半蒸餅丸青黛為衣

痰多喘嗽白朮半夏蒼朮香附杏仁各一两黃芩五錢為

末薑汁糊丸

痰嗽因酒傷肺瓜蒌杏仁俱搗黃連為以竹瀝入紫蘇葉

煎再入韭汁調丸服一方用青黛瓜蒌蜜丸噙化以救

肺

久嗽有因積痰留肺腕中如膠氣不能升降或挾濕与酒

而作苗根浸僵蠶炒海粉瓜蒌仁蜂房杏仁神曲為

末薑汁竹瀝調噙化

痰嗽氣急蒼朮三两莎一两五錢蘿蔔子蒸杏仁瓜蒌仁

半夏各一两重苧茯苓各五錢川芎三升嗽而有痰灸

天突在曾橫骨上端近肺膺橫過在三椎骨下泄火

熱瀉肺氣

食積痰嗽發熱半夏南星為君瓜蒌蘿蔔子為臣青黛海

石石鱗為使

食積痰嗽三補加二母炒為末丸如椒子大以竹瀝藕汁

吞之

肺脹者戴氏曰動則喘滿主收斂

肺因火傷極遂成鬱遏脹滿用訶子為主佐以海粉香附

青黛杏仁之類

肺脹鬱遏不得眠者難治

凡嗽春是春升之氣夏是火炎上最重秋是濕熱傷肺冬是風寒外來用藥發散之後必以半夏等藥逐去其痰庶不再來

早晨嗽多者此胃中有食積至此時火氣流入肺中以知母地骨皮降肺火上半日嗽多者胃中有火貝母石膏降之午後嗽多者屬陰虛四物加知母黃柏先降其火黃昏嗽多者入氣浮於肺不宜用涼劑以五味子五倍子斂而降之

嗽而脇痛宜以青皮疎肝氣青皮入群藥中用後以二陳湯加南

星香附青黛薑汁芥子云實者白之類

嗽而心煩六一散加辰砂

嗽而失聲潤肺散訶子五味子五倍子黃芩甘草樽為末

蜜丸噙化

嗽而無聲有痰半夏白朮五味防風枳殼甘草有聲无痰

生薑杏仁升麻五味防風桔梗甘草有聲有痰白朮半

夏五味防風久不愈加枳殼阿膠

寒熱交作而痰嗽者小柴胡湯加知母之類一方加白芍

藥五味棗白皮

陰氣在下陽氣在上咳嗽嘔吐喘促瀉白散加青皮五味

人參茯苓粳米

熱嗽曾滿小陷曾湯

治嗽劫藥五味子五苓甘草二苓半五倍子風化硝各一

苓為末蜜丸噲化或用訶子百藥煎荊芥穗蜜丸噲化

治嗽最要分肺虛實若肺虛久嗽宜五味款花紫苑馬兜

苓之類補之若肺實有邪宜黃芩天花粉桑白皮杏仁

之類瀉之治嗽必用五味子東垣之法然驟用之恐

治嗽用訶子味醋若有收斂降火之功五味收肺氣乃火

熱必用之脊杏仁散肺氣風熱然性實有熱因於寒者

為宜桑白皮瀉肺氣然性不純良用之多者當戒或用

馬兜苓以其去肺熱補肺也多用生薑以其辛能發散

也瓜蒌甘能補肺潤能降氣曾有痰者以肺受大逼失

降下之令今得甘緩潤下之助則痰自降宜其為治嗽

要藥也

一人患欬惡風寒胸痞滿口稍乾心微痛脉浮緊而數

左大於右蓋表盛裏虛聞其素嗜酒肉有積後因行房

涉寒冒雨忍飢繼以飽食先以人參四苓麻黃連根節

一苓半或云此丹與二三貼嗽止寒除改用厚朴枳實

青皮瓜蒌半夏為末丸與二十貼參湯送下痞除

一人患乾咳嗽声啞用人參橘紅各一朶半白朮二朶半  
夏曲一朶茯苓葉白皮天門冬各七分甘草青皮各三  
分五貼後去青皮五朶二十粒知母地骨皮公葵子桔梗各五  
分作一貼入莖煎夏加黃芩五分仍与四物入童便竹  
瀝莖汁并炒黃蘗二藥晝夜相間服兩月声出而愈  
一壯年人患嗽咯血一壯年因勞患嗽

附方

瓊玉膏

生地黄四 白蜜斤 白茯苓耐三 人參兩六  
右以地黄搗汁和蜜以參苓為末拌入蜜汁用瓶貯

以紙箬包其口用棗柴火蒸煮三晝夜取出再換蠟  
紙包封十數重沉井底一晝夜取起再如前蒸煮一  
日白湯點服須於雞犬不聞製之

九仙散治一切咳嗽

人參 款花 桑白皮 桔梗 五朶  
阿膠 烏梅各一 貝母五 御米殼兩去頂  
右剉水煎服

三拗湯

麻黃根節去 甘草生 杏仁皮尖去  
右剉每服五朶莖五片棗二枚水煎服取痰清乃止

十一 哮喘

專主於痰宜用吐法亦有虛而不可吐者

治哮喘必使薄滋味不可純用涼藥必兼散表

紫金丹治哮喘精猪肉二斤細切散子大砒一两為細末拌

勻分作六分紙筋泥包火烘乾於無人處炭火煨令青

煙盡放地上一宿取出為末湯浸蒸餅丸菜豆大人

二十九小兒十九茶清下看虛實

一方用鷄子略敲殼不要損膜浸尿缸中三四日夜煮食之蓋鷄子能去風痰故也

一法小胃丹以二陳湯加蒼朮黃芩作湯送下看虛實

一方以訶子為末白芥子蒸熟搗丸服之

清金丸治哮喘遇厚味發者用之蘿蔔子淘淨蒸熟晒乾

為末薑汁浸蒸餅為細丸每服三十立津下

十二 喘

喘急者氣為火所鬱而為痰在肺胃也

有痰者有火炎者有陰虛自小腹下火起而上逆者有氣

虛而致氣短者

戴氏曰痰者凡喘便有痰聲火炎者作進乍退得食則減食已則喘大槩胃中

有實火膈上有稠痰得食墜下稠痰喘即止稠久食已入胃反助其大痰再升上喘反大作俗不知此作胃虛

治以燥熱之藥以火濟火也昔葉都督患此諸醫作胃  
虛治之不愈後以導水丸利五六次而安氣短喘急者  
呼吸急促而無痰聲又有胃  
虛喘者攢肩擷肚喘而不休

痰者降痰化氣為主

火炎者降心火清肺金

陰虛痰喘者補陰降火四物湯加枳殼半夏喘四物陰虛氣

皮甘草些少以降氣補陰白芍藥須用酒浸日乾忌火

氣虛者參芪補之

凡久喘未發時以扶正氣為主已發以攻邪為主

喘急甚者不可用苦寒藥火盛故也宜溫劫之後因痰治

痰因火治火

半夏湯治痰喘不能臥人扶而坐數日一服而安

半夏七筒炮帶甘草一寸南星一皂莢一寸炙去

右剉加生薑一指大水煎一方加雄黃無甘草大治痰

一方用導痰湯合千縉湯

一方用椒目為末每服一二匙薑湯調下

一方蘿蔔子二兩蒸熟皂角燒灰五錢瓜蒌仁海粉南星

用白礬一匙半各一兩為末煉蜜丸噙化瓜蒌海粉

一方用南星半夏瓜蒌香附橘紅蘿蔔子皂角灰青黛為

末神曲糊丸薑湯下一方有杏仁已上方類皆劫藥也

喘用阿膠宜分虛實若久病發喘必是肺虛故用阿膠人



參五味之類補之若新病氣實而喘者宜棗白皮葶藶  
瀉之

氣實人因服黃芪過多而喘者用三拗湯瀉之

### 十三 瘧

有暑有風有濕有痰有食

要略謂瘧脉自弦

數弦

多熱弦遲多寒亦有病久其脉極虛

微而無力似乎不弦者然於虛微之中見弦但不搏手  
耳

機要謂在太陽經為寒瘧治多汗之陽明經為熱瘧治多

下之少陽經為風瘧或曰寒瘧治多和之此三陽受病謂

之暴瘧發在夏至後處暑前乃傷之淺者在三陰經則

摠謂之溫瘧發在處暑後冬至前乃傷之重者此說良

是其三陰經瘧作於子午卯酉日者少陰瘧作於寅申

巳亥日者厥陰瘧作於辰戌丑未日者太陰瘧也

三日一發者受病一年即瘧間日一發者受病半年一日

一發者受病一月二日連發住一日者氣血俱受病

俗云脾寒乃因名而迷其實也苟因飲食所傷而得之未  
必是寒况其他乎

暑瘧宜人參白虎湯之類

有痰者二陳湯加草果恒山柴胡黃芩

不食者必從飲食上得之當以食治

虛者必用參朮一二貼托住其氣不使下陷後用他藥

無汗要有汗散邪為主帶補有汗要无汗扶正氣為主帶

散邪

數發之後便宜截而除之久則發得中氣虛弱病邪愈深

而難治世有砒丹等截藥大毒不可輕用

大渴大熱用小柴胡去半夏加知母麥門冬黃連

渴用生地黃麥門冬天花粉牛膝知母黃柏炒乾葛生甘

草

久瘧二陳湯加川芎蒼朮柴胡乾葛白朮一補一發

甚者發寒熱頭痛如破渴而飲水多汗可與參芪苓連梔

芎二朮半夏等治之

痰滯胸滿熱多寒少大便燥實大柴胡湯

久瘧不得汗以二陳湯倍蒼朮白朮加檳榔

小兒瘧疾有痞塊生地黃芩藥各一朮半陳皮川芎黃芩

炒半夏各一朮甘草二分加生薑煎調鱉甲醋末

瘧母用九藥消導鱉甲為君三稜蓬朮香附並醋海粉青

皮桃仁紅花神曲麥芽隨證加減為丸

老瘧係風暑入陰在藏宜用血藥引出陽分而散川芎撫

芎紅花當歸蒼白朮白芷黃柏甘草煎露天一宿服之  
痰瘧老瘧也三日一發陰受病也夫瘧得於暑當以汗解  
或處涼冷汗不得泄鬱而成痰又復嗜慾縱恣輕試劫  
藥胃氣大傷其病難愈必先與參朮陳皮芍藥等劑輔  
以本經之藥若得汗而體虛又須重補俟汗通身下過  
委中方是佳兆仍淡飲食避風冷遠房勞無不愈者  
常山飲截瘧

川常山

草果

檳榔

知母

甘草炙

烏梅

穿山甲炮

右剉水酒各一鍾煎至一鍾露天一宿發前二時煎服

如吐則順之

小紫胡加常  
山二名亦妙

青蒿丸截瘧

青蒿斤

冬瓜葉

官桂

馬鞭草略二

右末發丸如胡椒大每一兩分作四服臨發前一二時  
盡服之

常山性暴悍善驅逐能傷真氣病人稍虛瘧者勿用

一人形壯味厚得瘧瘧用劫藥屢止屢作僅一年知其痰  
少惟胃氣未完天寒欠汗以白朮粥丸空腹執湯下  
二百丸盡二斤大汗而愈

一人形色俱實患瘧瘧而且痢自恃強健能食但苦汗出

予曰瘧非汗不愈可慮能食耳此非痢也胃執善消脾  
病不化食積与病勢甚矣宜謹節以養胃氣避風寒俟  
汗透而安不從所言死原論不守  
禁忌及此

一婦病瘧三日一發食少經不行已三月脉無時冬寒議  
作虛寒治以四物湯加附茱萸神曲丸服疑誤再診見  
其梳洗言動如常知果誤也經不行非無血爲痰所礙  
脉無非血氣衰乃積痰生熱結伏其脉而不見耳當作  
實熱治与三花丸旬日後食進脉出帶微弦予謂胃氣  
既全不用藥瘧當自愈而經行也令其淡滋味果應  
一人作勞發瘧醫与瘧藥三發變為發執舌短痰吼脉洪

數似滑与獨參湯加竹瀝二服吐膏痰三塊語清服參  
芪湯半月全愈

一少婦人身小味厚痰瘧月餘間日發於申酉頭与身痛  
寒多喜極執粹湯脉伏面慘悔作實執痰治之以十棗  
湯為末粥丸黍米大服十立津嚥日三次令淡飯半月  
後大汗而愈

一人性急酒色味厚適多憂怒患久瘧忽大執不臭積大  
孔痛陷下此大虛也脉弦大而浮以瓦磨如錢圓燒紅  
童泉淬急取以紙裹於痛處恐外寒乘虛而入也以參  
歸陳皮煎服淡味半月而安

附方

温脾散治瘧多時不瘥

紫河車

即全樓草

綠豆

各一兩

生甘草

五

砒

一分

另研

右末每服五分發前一日夜深新汲水調服十歲者減半再幼又減孕婦不用忌葷腥生冷酒麪三日但至心合服此藥並不吐雖砒有毒有三味解得

截瘧丹

雄黃

一兩

人參

五

右末端午日用粽子尖瓦梧子大每服

一丸發日早

面東井花水吞之忌諸熱味



