


女科准繩卷之四上

内閣文庫	漢書
三〇一	三〇九
函	架
冊	號
架	類

漢書門	三〇九
冊架	函號
冊架	類

内閣文庫	漢	12549
冊數	78	(74)
函號	301	62

胎前 求子 惡阻 候胎 胎產大法 逐月養胎法 求子白字 診脈 調經 養精 針灸 知時 成胎 候胎白字 診驗胎法 胎產大法白字 胎產大法白字 起居忌



綴じ部(喉部分)の文字等が開きが不鮮明な場所あり

女科證治準繩卷之四

金壇王清堂輯 門人新安關承詒校

胎前門

求子

胡氏曰男女交媾其所以凝結而成胎者雖不離乎精血猶為後天滓質之物而一點先天真一之靈氣萌于情欲之感者妙存於其間朱子所謂稟於有生之初悟真篇所謂生身受氣初者是也醫之生工固天無子法則主於精語女則主於血著論立方男以補腎為要女以調經為先而又參之以胎前

女科證治準繩卷之四

金壇王肯堂輯 門人新安閔承詒校

胎前門

求子

胡氏孝曰男女交姤其所以凝結而成胎者雖不離乎精血猶為後天滓質之物而一點先天真一之靈氣萌于情欲之感者妙合於其間朱子所謂稟於有生之初悟真篇所謂生身受氣初者是也醫之上工因人無子語男則主於精語女則主於血著論立方男以補腎為要女以調經為先而又參之以補氣行

氣之說察其脈絡究其虧盈審而治之夫然後一舉可孕天下之男無不父女無不母矣

診脈 陳楚良曰人身氣血各有虛實寒熱之異惟察脈可知舍脈而獨言藥者妄也脈有十二經應十二時一日一周與天同運循環無端其至也既不宜太過而數數則熱矣又不宜不及而遲遲則寒矣不宜太有力而實實非正氣能自實也正氣虛而火邪來乘以實之也治法先當散鬱以伐其邪邪去而後正可補也不宜太無力而虛虛乃正氣正血虛也治法惟當補其氣血耳亦有男婦上熱下寒表實裏虛而未得子者法當臨睡時服涼膈之藥以清其上每晨食未入口時服補藥以溫其下暫進升散之藥以達其表又服厚味之藥以實其裏又有女人氣多血少寒熱不調月水違期或後或先白帶頻下而無子者皆當診脈而以活法治之務欲使其夫婦之脈皆和平有力不熱不寒交合有期不安用精必能生子子不殤歿故欲得子者必須對脈立方因病用藥

仲 男子脈浮弱而濇為無子精氣清冷。**脈** 婦人少腹冷惡寒久年少者得之此為無子年大者得之絕產。脈微弱而澀年少得此為無子中年得此為絕

胎前 婦科
產。○肥人脉細胞有寒故令少子其色黃者胸上有
寒。○少陰脉浮而緊緊則疝瘦腹中痛半產而墮傷
浮則亡血絕產惡寒。

調經 胎前之道始於求子求子之法莫先調經每
見婦人之無子者其經必或前或後或多或少或將
行作痛或行後作痛或紫或黑或淡或凝而不調不
調則血氣乖爭不能成孕矣詳夫不調之由其或前
或後及行後作痛者虛也其少而淡者血虛也多者
氣虛也其將行作痛及凝塊不散者滯也紫黑色者
滯而挾熱也治法血虛者四物氣虛者四物加參芪

滯者香附縮砂木香檳榔桃仁玄胡滯久而沉痼者
吐之下之脉證熱者四物加芩連脉證寒者四物加
桂附及紫石英之類是也直至積去滯行虛回然後
血氣和平能孕子也子每治經不調者只一味香附
末醋為丸服之亦百發百中也。素問云督脉生病
女子不孕

婦人經事不調即非受孕光景縱使受之亦不全美
宜服六味地黃丸

熟地黃 肆兩

山茱萸肉

山藥 各貳兩

牡丹皮

白茯苓

各壹兩 伍錢

澤瀉

香附米

童便浸叁次炒各壹兩

蘄艾葉

去筋醋煮伍錢

右為末煉蜜丸如梧子大每服柒拾丸白沸湯送

下隨後證作湯使或另作煎劑服

○經水過期者乃血虛也宜四物湯加參芪陳皮白

朮服之若肥白人是痰多宜二陳加南星蒼朮滑

石芎歸香附之類○經水不及期者血熱也四物

加芩連肥人亦兼痰治色紫黑者同血熱論○經

將行而作疼者氣滯也用歸身尾香附米及桃仁

紅花黃連以行之或加四物莪朮玄胡索朮香熱

加黃芩柴胡○經行後作疼者血氣虛也八物湯

丹人
痰
燥

丹婦人肥盛者多不能孕育以身中有脂膜閉塞子

宮以致經事不行瘦弱婦人不能孕育以子宮無血

精氣不聚故也肥人無子宜先服調理藥

當歸

壹兩酒洗

茯苓

貳兩

川芎

柒錢半

白芍藥

白朮

半夏

湯洗

香附米

陳皮

甘艸

各壹兩

作十貼每貼薑叁片水煎吞後九子

白朮

貳兩

半夏麴

川芎

香附米

各壹兩

神麴

炒

茯苓

各半兩

橘紅

肆錢

甘草

貳錢以上並為末

前藥訖却服後益斯丸

粥丸每服捌拾丸如熱多者加黃連枳實各壹兩服

前藥訖却服後益斯丸

附子

茯苓 各陸錢

厚朴

杜仲

桂心

秦艽

白薇

半夏

乾薑

牛膝

沙參 各貳錢

人參 肆錢

細辛 伍錢

右為末煉蜜和丸小豆大每服五丸空心酒下加至拾丸不妨覺有娠三月後不可更服忌食牛馬肉則難產當出月

按此方即秦桂丸也丹溪忌服之者蓋忌於瘦人

無血者若肥人濕多者又兼前調理藥而所服丸

數十減其丸只服五分無妨也上三方得之於丹

溪之子朱懋誠者累試有效

抑氣散 治婦人氣盛於血所以無子尋常頭眩暈

膈滿體疼怔忡皆可服

香附子 炒淨 貳兩

陳皮 焙貳兩

茯神

甘草 炙各壹兩

右為細末每服貳錢不拘時白湯調下

海大五補丸

瘦人無血

天門冬

麥門冬 去心

菖蒲

茯苓

人參

益智

枸杞子

地骨皮

遠志肉

熟地黃 各等分

右為細末煉蜜丸如桐子大空心酒下參拾丸服本方數服後以七宣丸泄之

增損三才丸

天門冬 酒浸去心

熟地黃 酒蒸

人參 去蘆

遠志 去骨

五味子

茯苓 酒浸

鹿角 酥炙

一法加白馬莖 酥炙

一法加麥門

冬令人有力 一法加續斷以續筋骨 一法

加沉香煖下焦虛冷

右為細末煉蜜和杵千下丸如桐子大每服伍拾

丸空心好酒下年老欲補加混元衣全個入藥混元

衣者是胎衣頭生兒者方佳用酒浸晒乾細剉為末

紫石門冬丸 又名紫石英丸

紫石英

鍾乳石 我鶯管通明者二味各七日研之得上浮即熟

天門冬 已上各參兩

當歸

芩藟

紫葳

卷柏

肉桂

乾地黃

牡蒙

禹餘糧 煨醋

石斛

辛夷

已上各
貳兩

人參

桑寄生

續斷

細辛

厚朴

薑製

乾薑

食茱萸

艾葉

白薇

薯蕷

烏鰂骨

甘艸

炙已上各
壹兩半

栝子仁

壹兩

右件搗羅為末煉蜜丸如梧桐子大酒服拾丸三日漸增至叁拾丸以腹中熱為度不禁房室夫行不在不可服禁如藥法比來服者不至盡劑即有娠。此方舊用烏頭牡丹牛膝按藥證此三物俱墮胎求子藥中用之蓋胎未著之時若服之已著

已著而未覺服之未已反為害也今悉去之增鍾

乳艾葉白薇茲無疑矣

白薇丸

治婦人無子或斷緒上熱下冷百病皆主

之

白薇

熟乾地黄

川椒

去目及閉口者微炒出汗

白龍骨

已上各壹兩

麥門冬

去心焙壹兩半

藁本

卷栢

白芷

覆盆子

桃仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

人參

桂心

菖蒲

白茯苓

遠志

去心已上各柒錢半

車前子

當歸

剉微炒

芎藭

蛇床子

細辛

乾薑

炮製各半兩

右件藥杵羅為末煉蜜為丸梧子大每服參拾丸空心日午以溫酒下參拾丸予之故友江君雅曾仲容俱無嗣因以此方贈之踰年而皆有子後有艾君肅黃翰公者亦然故述之

趙氏菴蓉兔絲子丸

肉菴蓉

壹兩參錢

覆盆子

蛇床子

川芎

當歸

兔絲子

各壹兩貳錢

白芍藥

壹兩

牡蠣

鹽泥固濟散

烏賊魚骨

各別錢

五味子

防風

各陸錢

條芩

伍錢

艾葉

參錢

此方不寒不熱助陰生子前藥俱焙乾為末煉蜜丸如桐子每服參肆拾丸清鹽湯下早晚皆可服加味香附丸男服聚精丸女服此

香附壹斤

四兩老酒浸兩宿炒搗碎再焙乾磨為末四兩米醋浸同上四兩童便浸同上四兩用山梔肆兩煎濃汁去渣入香附浸同上

澤蘭

淨葉陸兩酒洗

海螵蛸

陸兩搗碎炒

當歸

肆兩酒洗

川芎

參兩

白芍藥

肆兩酒炒

懷熟地

捌兩搗膏焙乾

各為末用浮小麥粉酒醋水打糊為丸如菉豆大

每日早晚服兩次忌食萊菔及牛肉生冷

調經丸

香附 半斤童便酒醋各浸一分生一分俱酒炒 川杜仲 薑汁炒半斤

大川芎 白芍藥 當歸 去尾

懷生地 廣陳皮 小茴香 酒炒

延胡索 零炒 肉蓯蓉 酒浸 舊青皮 麩炒

台烏藥 炒 枯黃芩 酒炒 烏賊魚骨 酥炙

以上各詳兩

右十四味定秤真正好料醋和麵打糊為丸如梧桐子大每服百丸空心好酒送下一方無陳皮

地黃有人參黃耆各貳兩

正元丹 調經種子

香附 壹斤同艾參兩先以醋同浸壹宿然後分開製之酒鹽酥童便各製四兩

阿膠 蛤粉炒貳兩 枳殼 肆兩半生用半麩炒 懷生地 酒洗

熟地 酒浸 當歸身 酒洗 川芎 炒各肆兩

白芍藥 捌兩半生半酒炒 加白茯苓 琥珀 治帶

末之醋糊丸如桐子大空心鹽湯吞伍陸拾丸

和戴人過謙都營中飲會有一卒說出妻事戴人問其故荅曰吾婦為室女時心下有冷積如覆盆按之如水聲以執手熨之如水娶來已十五年矣恐斷

善嗣是以去之戴人曰公勿黜也如用吾藥病可除
孕可得卒從之戴人診其脉寸脉沉而遲尺脉洪大
有力非無子之候也可不逾年而孕其良人嘆曰試
之先以三聖散吐涎一斗心下平軟次服白朮調中
湯五苓散後以四物湯和之不再月氣血合度數月
而娠一子戴人常曰用吾此法無不子之婦此言不
誣○一婦人年三十四歲夢與鬼神交驚怕異常及
見神堂陰司舟楫橋梁如此一十五年竟無妊娠巫
祈覲禱無所不至鑽肌炙肉孔穴萬千黃瘦發熱引
飲中滿足腫委命于天一日苦請戴人戴人曰陽火

盛于上陰水盛于下見鬼神者陰之靈神堂者陰之
所舟楫橋梁水之用兩手寸脉皆沉而伏知胸中有
實痰也凡三湧三泄三汗不旬日而無夢一月而有

大盪胞湯 治婦人立身以來全不產育及斷絕久
不產三十年者宜服

- | | | |
|------------------------|-----------------------|-----|
| 朴硝 | 牡丹皮 | 當歸 |
| 大黃 <small>蒸一飯久</small> | 桃仁 <small>去皮尖</small> | 細辛 |
| 厚朴 <small>薑汁炙</small> | 桔梗 | 赤芍藥 |
| 人參 | 茯苓 | 桂心 |

甘草

牛膝 去苗

陳橘皮 已上各貳兩

附子 炮壹兩半

蠱蟲 去翅足炒焦

水蛭 炒枯各拾枚

右件以清酒伍升水陸合煮取參升分四服日三夜一每相去三辰少時更服如常覆被少時取汗汗不出冬月着火籠必下積血及冷赤膿如赤小豆汁本為婦人子宮內有此惡物冷然或天陰臍下痛或月水不調為有冷血不受胎若斟酌下盡氣久弱大困不堪更服亦可二三服即止如大悶不堪可食酢飲冷漿一口即止然恐去惡物不盡不大得藥力若能忍服盡大好一日後仍著坐導藥

藥

坐導藥 治全不產及斷緒服前盪胞湯惡物不盡

用此方

皂角 去皮子

吳茱萸

當歸 各貳兩

細辛 去苗

五味子

乾薑 炮各壹兩

黃葵花

白礬 枯

戎鹽

蜀椒 各半兩

右為細末以絹袋大如指長三寸餘盛藥令滿縛定納婦人陰中坐卧任意勿行走小便時去之更安一日一度易新者必下清黃冷汁汁盡止若未

見病出可十日安之本為子宮有冷惡物故令無子值天陰冷則發疼痛須候病出盡方已不可中輟每日早晚用薺菜煎湯薰之

意

丹秦桂丸論

無子之因多起於婦人醫者不求其因起於何處遍閱古方惟秦桂丸其辭確其意專用溫熱藥近乎人情欣然受之銳然服之甘受燔灼之禍猶惜然不悔何者陽精之施陰血能攝之精成其子血成其胞胎孕乃成今婦人之無子者率由血少不足以攝精也血之少也固非一端然欲得子者必須調補陰血使無虧欠乃可推其有餘以成胎孕何

乃輕用熱劑煎熬臟腑血氣沸騰禍不旋踵矣或曰春氣溫和則萬物發生冬氣寒凜則萬物消隕非秦桂丸之溫熱何以得子臟溫暖而成胎耶予曰詩曰婦人和平則樂有子和則血氣均平則陰陽不爭今得此藥經血必轉紫黑漸成衰少或先或後始則飲食驟進久則口苦而乾陰陽不平血氣不和疾病蜂起焉能成胎縱然成胎生子亦多病而不壽以秦桂丸耗損天真之陰也戒之慎之按秦桂丸施于肥人而少其丸數兼服調理補藥亦無妨但忌施于瘦人火多者也

東

東婦人無子胞門

在關內左邊二寸灸伍拾壯

又法氣門

在關元傍

胎前 女科四

胎前 女科四

胎前 女科四

各開三寸
灸伍拾壯

集又法子宮在中極傷各開三寸針入貳寸灸叁柒壯 **中極**

垣又法關元貳拾壯三報穴

甲絕子灸臍中令人有子女女子手脚拘攣腹滿疝月

水不下乳餘疾絕子陰痒陰交主之 **腹滿疝積聚**

餘疾絕子陰痒刺石門千金云奔豚上少腹堅痛下引陰中不得小便 **女**

子絕子血在內不下關元主之千金云轉胞不得溺小腹滿名石水

痛婦人子門不端少腹苦寒陰痒及痛經閉不通

中極主之 婦人無子涌泉主之 **大疝絕子築賓**

主之 絕子商丘主之穴在內踝前宛宛中 婦人絕產若未

曾產陰廉主之刺入分半灸下壹寸

養精表寸凡先生云聚精之道一曰寡慾二曰節勞

三曰息怒四曰戒酒五曰慎味今之談養生者多言

採陰補陽久戰不泄此為大謬腎為精之府凡男女

交接必擾其腎腎動則精血隨之而流外雖不泄精

已離宮未能堅忍者亦必有真精數點隨陽之痿而

溢出此其驗也如火之有烟焰豈有復反于薪者哉

是故貴寡慾精成于血不獨房室之交損吾之精凡

日用損血之事皆當深戒如日勞于視則血以視耗

耳勞于聽則血以聽耗心勞于思則血以思耗吾隨

事而節之則血得其養而與日俱積矣是故貴節勞
主閉藏者腎也司踈泄者肝也二藏皆有相火而其
系上屬于心心君火也怒則傷肝而相火動動則踈
泄者用事而閉藏不得其職雖不交合亦暗流而潛
耗矣是故當息怒人身之血各歸其舍則常疑酒能
動血人飲酒則面赤手足俱紅是擾其血而奔馳之
也血氣既衰之人數月無房事精始厚而可用然使
一夜大醉精隨薄矣是故宜戒酒內經云精不足者
補之以味然醲郁之味不能生精惟恬澹之味乃能
補精耳蓋萬物皆有真味調和勝而真味衰矣不論
腥素淡煮之得法自有一段冲和恬澹之氣益人腸
胃洪範論味而曰稼穡作甘世間之物惟五穀得味
之正但能淡食穀味最能養精又凡煮粥飯而中有
厚汁滾作一團者此米之精液所聚也食之最能生
精試之有效○煉精有訣全在腎家下手內腎一竅
名玄關外腎一竅名牝戶真精未洩乾體未破則外
腎陽氣至子時而與人身之氣與天地之氣兩相脗
合精洩體破而吾身陽生之候漸晚有丑而生者次
則寅而生者又次則卯而生者有終不生者始與天
地不相應矣煉之之訣須半夜子時卽披衣起坐兩

手搓極熱以一手將外腎兜住以一手掩臍而凝神于內腎久久習之而精旺矣

○葆真丸 專治九醜之疾言莖弱而不振振而不豐豐而不循循而不實實而不堅堅而不久久而無精精而無子謂之九醜之疾此藥補十二經絡起陰發陽能令陽氣入胸安魂定魄開三焦積聚消五穀進食強陰益子精安五臟除心中伏熱強筋骨輕身明目去冷除風無所不治此藥平補多服常服最妙七十歲老人尚能育子非常之力及治五勞七傷無子嗣者

鹿角膠

半斤剉作豆大就用鹿角霜拌炒成珠研細

杜仲

去粗皮切碎用生薑汁壹兩同蜜少許拌炒斷絲叁兩

乾山藥

白茯苓

去粗皮人乳拌晒乾凡五七次

熟地黃

各壹兩

兔絲子

酒蒸搗焙

山茱萸肉

各壹兩半

北五味子

川牛膝

去蘆酒蒸

益智仁

去殼

遠志

泔煮去骨

小懷香

青塩叁錢同炒

川棟子

去皮核取淨肉

酥

川巴戟

酒浸去心已上各壹兩

破故紙

胡蘆巴

同故帛入羊腸內煮焙乾各壹兩

柏子仁

去殼另研如泥半兩

川山甲

酥炙

沉香

各叁錢

全蝎

去毒壹錢半

右件各製度為極細末以好嫩肉菘蓉肆兩酒洗
 淨去鱗甲皮垢開心如有黃白膜亦去之取淨貳
 兩好酒煮成膏同煉蜜和前藥末搗千餘下丸如
 桐子大每服伍拾丸淡秋石湯温酒任下以乾物
 壓之漸加至百丸服七日四肢光澤唇臉赤色手
 足温和面目滋潤又能消食理脾輕身和氣語言
 清亮是其効也

千金種子丹 此方服之令人多子并治虛損夢遺

白濁脫鉤 男子服

沙苑蒺藜 取淨末肆兩如蚕種同州者佳再以
重羅羅貳兩極細末貳兩粗末用水

壹大碗熬
膏伺候

蓮鬚 肆兩極細末金色者
固精紅色者敗精

山茱萸 極細末叁兩須得壹斤用鮮
紅有肉者佳去核取肉製末

覆盆子 南者佳去核
取細末貳兩

鷄頭實 伍百箇去殼如大小
不一等取細末肆兩

龍骨 伍錢五色者佳火煨煨法以小砂鍋入
龍骨鍋內連鍋煨通赤去火毒方用

右用伏蜜壹斤煉以紙粘去浮沫數次無沫滴水
 中成珠者伺候止用肆兩將前五味重羅過先以
 痰藜膏和作一塊再入煉蜜石臼內搗千餘下丸
 如豌豆大每服叁拾丸空心鹽湯送下忌慾事二

十日此藥延年益壽令人多子不可盡述

聚精丸 男服

黃魚鱔膠

白淨者壹斤切碎用蛤粉炒成珠以無聲為度

沙苑蒺藜

蒸一炷香久取起焙乾

右為末煉蜜丸如梧子大每服捌拾丸空心溫酒白湯任下忌食魚及牛肉

五子衍宗丸 男服此藥添精補髓該利腎氣不問

下焦虛實寒熱服之自能平秘舊稱古今第一種

子方有人世服此藥子孫蕃遂成村落之說嘉靖

丁亥於廣信鄭中丞宅得之張神仙四世孫子及

數人用之殊驗

甘州枸杞子

兔絲子

酒蒸搗成餅各捌兩

遼五味子

壹兩

覆盆子

肆兩酒洗去日

車前子

炒貳兩

右五品俱擇道地精新者焙曬乾其為細末煉蜜

丸如桐子大

服空心玖拾丸上牀時伍拾丸白

沸湯或鹽湯送下冬月用溫酒送下修合日春取

丙丁巳午夏取戊巳辰戌丑未秋取壬癸亥子冬

取甲乙寅卯忌師尼鰥寡之人及雞犬六畜見之

十子丸 四明沈嘉則無子七十外服之連舉子

槐角子

和何首烏蒸柴火

覆盆子

枸杞子

去枯者及蒂

桑椹子

冬青子

四味共蒸 各肆兩

兔絲子

製去殼 酒蒸

柏子仁

酒浸

沒石子

照重 公製

蛇床子

蒸

北五味子

去枯者打碎蜜 蒸已上各貳兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服伍陸拾九淡鹽湯下乾點心壓之

趙氏加味六子丸

兔絲子

淘洗 酒蒸

川牛膝

去蘆 酒蒸

麥門冬

去心 酒蒸

山茱萸

取肉

原蠶蛾

五味子

各壹兩 參錢

蛇床子

酒蒸壹 兩陸錢

車前子

淘洗壹 兩柒錢

大甘草

炙壹兩

沙苑蒺藜

馬乳 浸蒸

覆盆子

各貳兩 貳錢

破故帛

貳兩參錢 淘洗炒

肉苁蓉

貳兩伍錢 酒浸去鱗

腎雖屬水不宜太冷精寒則難成孕如天地寒涼則草木必無萌芽也此方極意斟酌不寒不熱得其中和修合服之如一陽初動萬物化生二三月後必孕成矣前藥俱焙乾剉碎為末煉蜜丸如桐子大每服參拾丸或肆拾丸清鹽湯送下早晚皆服

針灸

治男子無子者用熟艾壹團用鹽填臍滿却於鹽上隨鹽大小做艾丸灸之如痛即換鹽直灸至艾盡為度如一日灸不盡二日三日灸之曾效

知時表凡先生云天地生物必有網緼之時萬物
化生必有樂育之時如猫犬至微將受妊也其雌必
狂呼而奔跳以網緼樂育之氣觸之而不能自止耳
此天然之節候生化之真機也世人種子有二三十
時辰兩日半二十八九君須筭此特言其大槩耳非
的論也丹經云一月止有一日一日止有一時凡婦
人一月經行一度必有一日網緼之候於一時辰間
氣蒸而熱昏而悶有欲交接不可忍之狀此的候也
於此時逆而取之則成丹順而施之則成胎其曰
三日月出庚又曰温温鉛鼎光透簾皆言其景象
也當其慾情濃動之時子宮內有如蓮花蕊者不拘
經淨幾日自然挺出陰中如蓮蕊初開內人洗下體
以手探之自知也但含羞不肯言耳男子預密告之
令其自言一舉即中矣

成胎丹溪云成胎以精血之後先分男女者褚澄之
論也愚竊惑焉後閱東垣方有曰經水斷後一二日
血海始淨精勝其血感者成男四五日後血脉已旺
精不勝血感者成女此論亦為未瑩何以言之易曰
乾道成男坤道成女夫乾坤陰陽之性情也左右陰
陽之道路也男女陰陽之儀象也父精母血因感而

會精之泄陽之施也。血能攝之陰之化也。精成其骨
此萬物之資始於乾元也。血成其胞萬物之資生於
坤元也。陰陽交姤胎孕乃凝胎之所居名曰子宮。一
系在下上有兩岐一達於左一達於右精勝其血及
剛日陽時感者則陽為之主受氣於左子宮而男形
成精不勝血及柔日陰時感者則陰為之主受氣於
右子宮而女形成或曰分男分女吾知之矣其有雙
胎者將何如曰精氣有餘岐而分之血因分而攝之
故也若夫男女同孕者剛日陽時柔日陰時感則陰
陽混雜不屬左不屬右受氣于兩岐之間者也亦有
三胎四胎五胎六胎者猶是而已或曰其有男不可
為父女不可為母與男女之兼形者又若何而分之
耶予曰男不可為父得陽道之虧者也女子不可為
母得陰道之塞者也兼形者由陰為駁氣所乘而為
狀不一以女兼男形者有二一則遇男為妻遇女為
夫一則可妻而不可夫又有下為女體上具男之全
形此又駁之甚者也或曰駁氣所乘獨見於陰而所
成之形又若是之不同邪予曰陰體虛駁氣易於乘
也駁氣所乘陰陽相混無所為主不可屬左不可屬
右受氣于兩岐之間隨所得駁氣之輕重而成形故

所蒸之形有不可得而同也。巢金善云丹溪此論極造精微發前人之未發是知男女之分已定於萬物資始乾元之際陰陽交媾之時昧者不悟是理妄有轉女爲男之法惑矣夫萬物皆資始於乾元獨男女之分不資始于乾元乎。表先生云巢氏論婦人妊娠一月名胎胚足厥陰脉養之二月名始膏足少陽脉養之三月名始胎手心脉養之四月始受水精以行血脉手少陽脉養之五月始受火精以成其氣足太陰養之六月始受金精以成其筋足陽明脉養之七月始受木精以成其骨手太陰脉養之八月始受土精以成膚革手陽明脉養之九月始受石精以成毛髮足少陰脉養之十月臟腑關節人神俱備此其大略也若求其細則受胎在腹七日一變展轉相成各有生相大集經備矣今婦人墮胎在三月五月七月者多在二四六月者少臟陰而腑陽三月屬心五月屬脾七月屬肺皆在五臟之脉陰常易虧故多墮耳如昔曾二月墮胎則心脉受傷須先調心不然至三月復墮昔曾五月墮胎則脾脉受傷後至五月復墮宜先治脾惟有一月之內墮胎則人皆不知有胎但知不受妊不知其受而墮也一月屬肝怒則墮

多洗下體則竅開亦墮。一次既墮則肝脉受傷。他次亦墮。今之無子者大半是一月墮胎。非盡不受姪也。故凡初交之後最宜將息。勿復交接。以擾其子宮。勿令怒。勿令勞。勿令舉重。勿令洗浴。而又多服養肝平氣之藥。胎可固矣。○程鳴謙云。褚澄氏言。男女交合。陰血先至。陽精後衝。而男形成。陽精先入。陰血後參。而女形成。信斯言也。人有精先洩而生男。精後泄而生女者。獨何歟。東垣曰。經水纔斷一二日。血海始淨。感者成男。四五日。血脉已旺。感者成女。至于六七日。後則雖交感亦不成胎。信斯言也。人有經始斷。交合生女。經久斷。交合生男者。亦有四五日以前交合無孕。八九日以後交合有孕者。獨何歟。俞子木撰廣嗣要略。著方立圖。謂實陽能入。虛陰實陰不能受陽。卽東垣之故見也。又謂微陽不能射陰。弱陰不能攝陽。信斯言也。世有尪羸之夫。怯弱之婦。屢屢受胎。雖欲止之而不能止者。亦有血氣方剛。精力過人。顧乃艱于育嗣。而莫之救者。獨何歟。朱丹溪論治專以婦人經水爲主。然富貴之家。侍妾已多。其中寧無月水當期者乎。有已經前夫頻頻生育。而娶此以圖其易者。顧亦不能得胎。更遣與他人轉盼生男矣。豈不能受

孕于此而能受孕于彼乎愚以為父母之生子如天地之生物易曰坤道其順乎承天而時行夫知地之生物不過順承乎天則知母之生子亦不過順承乎父而已知母之順承乎父則種子者果以婦人為主乎以男子為主乎然所謂主於男子者不拘老少不拘強弱不拘康寧病患不拘精易洩難洩只以交感之時百脉齊到為善耳交感而百脉齊到雖老雖弱雖病患雖易洩亦可以成胎交感而百脉參差雖少雖強雖康寧雖難洩亦難以成胎矣婦人所構之血固由于百脉合聚較之男子之精不能無輕重之分也孔子贊乾元資始曰大贊坤元資生日至得無意乎若男女之辨又不以精血先後為拘不以經盡幾日為拘不以夜半前後交感為拘不以父強母弱母強父弱為拘只以精血各由百脉之齊到者別勝負耳是故精之百脉齊到有以勝乎血則成男矣血之百脉齊到有以勝乎精則成女矣至有既孕而小產者有產而不育有育而不壽者有壽而黃者無疆者則亦精血之堅脆分為脩短耳世人不察其精血之堅脆已定于稟受之初乃以小產專責之母以不育專付之兒以壽夭專談之數不亦謬乎

孕七月之月又謂之喜慶之期不亦屬乎之生子如天
 望氣已安于稟受之既以不奉專責之母以不育
 限亦謂血之望氣全為前或耳耳人亦察其血之
 昔有至而不育育而不壽昔有壽而黃者無壽者
 百神齊隆育以觀來神限以矣矣至育則孕而小奉
 孔是也神之百神齊隆育以觀來神限以矣矣血之
 胎父緣為神只以神血谷由百神之齊隆昔限觀其
 日為神不以齊半而對交氣為神不以父氣母氣
 平昔與女之辨又不以神血表對為神不以絲盡幾
 也亦于贊彈示資故曰大贊也示資坐曰至其無意

候胎

婦人懷軀七月而不可知時時衄血而轉筋者此
 為軀也衄時嚏而動者非軀也。素問云婦人足少

陰脉動甚者任子也。平人氣象論。謂太溪脉也。全

太陰當從全本。王註云動脈者如豆。厥脈動搖也。一說動甚謂動搖太甚也。陰搏陽別

謂之有子。陰陽別論。王註云陰謂尺中也。搏謂搏

觸於手也。尺脉搏擊與寸脉殊別則為有

脉妊娠初時寸微小呼吸五至三月而尺數也脉滑
 疾重以手按之散者胎已三月也脉重手按之不散

但疾不滑者五月也。此即陰搏陽別之義。言尺脉滑

也。孕脈。尺脈左偏大為男，右偏大為女，左右俱大，產

二子，大者如實狀。亦陰搏陽別之義，謂尺脈實大，與寸脈殊別，但分男左女右也。

婦人妊娠四月，欲知男女法，左疾為男，右疾為女，俱

疾為生二子。王子亨云：妊娠三部俱滑，而疾在左為男，在右為女。遣妊娠人

面南行，還復呼之，左迴首者是男，右迴首者是女。

看上圍時，夫從後急呼之，左迴首者是男，右迴首者

是女也。○巢全善云：按丹溪云：男受胎在左，子宮女

受胎在右，子宮斯言大契，是說也。蓋男胎在左，則左

重，故回首時慎護重處而就左也；女胎在右，則右重

故回首時慎護重處而就右也。推之於脈，其義亦然。

胎在左，則血氣護胎而盛於左，故脈亦從之而左，疾

為男，左大為男也；胎在右，則血氣護胎而盛於右，故

脈亦從之而右，疾為女，右大為女也。亦猶經云：陰搏

陽別，謂之有子，言受胎處在臍腹之下，則血氣護胎

而盛於下，故陰之尺脈鼓搏有力，而與陽之寸脈殊

別也。又如癰癢發上，則血氣從上而寸脈盛發，下則

血氣從下而尺脈盛發，左則血氣從左而左脈盛發，

右則血氣從右而右脈盛也。丹溪以左大順男，右大

順女，為醫人之左右手，蓋智者之一失也。

診婦人有妊娠歌：肝為血兮肺為氣，血為榮兮氣為

合前候胎。文斗曰。三五

衛陰陽配耦不參差兩臟通和皆類例血衰氣王定

無孕血王氣衰應有體肝藏血為榮屬陰肺主氣為

匹配偶合構精乃有子也若血少氣少則有孕也寸微關滑尺帶

數流利往來并雀啄小兒之脉已見形數月懷耽猶

未覺寸脉微關脉滑尺脉帶數及流利雀啄皆是經

脉是懷小兒之脉已見形狀也左疾為男右為女流利相通速來去

兩手關脉大相應已形亦在前通語左手脉疾為懷

懷女及兩脉流行滑利相通疾速來去是或左手帶

縱兩箇兒賊脉也名曰縱見在左手則懷兩箇男兒

也右手帶橫一雙女橫者妻乘夫也名曰橫見

於右手則懷一雙女子也左手脉逆生三男逆者子乘母也是水

已生脉也名曰逆見於右手脉順還三女順者母乘

行乘水木行乘火即生已之脉也名寸關尺部皆相

應一男一女分形證寸關尺部脉大小遲疾相應者

關前為陽關後為陰陰陽脉相應故懷一男一女也有時子死母身存或即母

亡存子命此二句之文無辨往來三部通流利滑數

相參皆替替陽實陰虛脉得明遍滿胸膛皆逆氣若

關尺三部通行流利皆替替有力而滑數皆是陽左

實陰虛之脉主妊婦逆氣遍滿胸膛而不順也

手太陽浮大男左手寸口為太陽其脉右手太陰沉

細女右手寸口為太陰其脉也諸陽為男諸陰女指下分

明長記取也諸陽脉皆為男即浮大疾數滑實之類是也

當懷三部沉正等無絕尺內不止真胎婦寸關尺三

女子正直齊等舉按無絕斷及尺內夫乘妻兮縱氣霧

正者按不止住者真的懷胎婦也夫乘妻兮縱氣霧

氣霧夫乘妻也水行乘火金行乘木即鬼賊脉也縱

霧潤結子也妻乘夫兮橫氣助前註謂兩旁橫氣

助也子乘母兮逆氣參逆者子乘母也謂子氣犯母

母乘子兮順氣護也凡胎聚縱橫逆順四氣以榮養

方以成小兒日足胎成聚身熱脉亂無疏苦小兒懷

箇月是以數足胎成就而結聚也必母身體壯熱當

見脉躁亂非病苦之證謂五月胎已成受火精以成

氣故身熱脉汗出不食吐逆時精神結備其中住謂

娠受五行精氣以成形稟二經以榮其母懷妊至五

月其胎雖成其氣未備故胎氣未安土衝心胸則汗

出不食吐逆名曰惡阻俗呼選滑疾不散三月胎娠

飯唯思酸辛之味以調胎氣也滑疾不散三月胎娠

三月名始胎此是未有定儀心胞脉養之故脉見滑

疾流利為少氣多血不散為血氣盛則始結為胎也

但疾不散五月母其脉但疾數而不散者弦緊牢強

滑利安沉細而微歸泉路利為安吉之脉若沉細而

微謂脉與形不相應故云死也前文雖云太陰沉細

又云諸陰為女其說似有相違謂三部脉皆不沉細

及微故不同也

驗胎法海神方驗胎散婦人三兩個月月經不行

疑是兩身却疑血滯心煩寒熱恍惚此藥可驗取

之內也外已有身病無邪脉以素問脉法推之十

台前假胎 女科 四 三十一

得八九矣。

真雀腦芎

壹兩

當歸

全用重壹兩者只用柒錢

右為細末分作兩服濃煎好艾湯壹酸調下或好酒調服亦得可待三兩箇時辰間覺腹臍微動仍頻即有胎也動罷即愈安穩無虞如不是胎即不動所滯惡物自行母亦安也如服藥不覺効再煎紅花湯調下必有神効

靈苑治婦人經脉住三箇月驗胎法真川芎為細末濃煎艾湯下一七投腹內漸動是有胎也

探胎散 婦人胎氣有無疑惑之間以此探之有胎則吐無則不吐

皂角

去皮

甘草

炙各壹錢

黃連

半錢

右為細末作壹服温酒調服

博陵醫之神者曰郝翁士人陳堯連妻病眾醫以為勞傷郝曰亟屏藥是為娠證且賀君得男子已而果然又二婦人妊一暗嘿不能言郝曰兒胎大經壅兒生經行則言矣不可毒以藥一極壯健郝診其脉曰母氣已死所以生者及恃兒氣耳如期子生母死孕不語非病也聞如此者不須服藥臨產日但服保生丸四物湯之類產後使語亦自然之理非藥之力也

○一婦暴渴惟飲五味汁名醫耿隅診其脉曰此血

欲疑非疾也。已而果孕。古方有血欲疑而渴飲五味之證。不可不知也。○潘璟診虞部員外郎張成之妻。孕五歲。南陵尉富昌齡妻孕二歲。團練使劉彞孫妾孕十有四月。皆未育。溫叟視之曰：疾也。凡醫妄以為有孕。爾於是與破血攻毒大劑飲之。虞部妻墮肉塊百餘。有眉目狀。昌齡妻夢二童子。色漆黑。倉卒怖悸疾走而去。孫妾墮大蛇。猶蜿蜒未死。三婦皆無恙。○陳斗詒治某南洲妻。經閉五月。下白或赤。午後發熱。咳嗽嘔吐。醫勞瘵。陳視曰：兩尺脉皆實。此必有孕。外受風邪。搏激故耳。飲清和之劑而安。半年生一子。

○胎產大法

潔治胎產之病。從厥陰經論之。無犯胃氣。及上三焦。謂之三禁。不可汗。不可下。不可利。小便發汗者。同傷寒。下早之證。利大便。則脉數而已。動于脾。利小便。則內亡津液。胃中枯燥。製藥之法。能不犯三禁。則榮衛自和。而寒熱止矣。如發渴。則白虎氣弱。則黃耆血刺。痛而和以當歸。腹中疼而加之芍藥。大抵產病。天行從增損柴胡。雜證從增損四物。宜詳察脉證而用之。○大抵外則和於榮衛。內則調於清便。同傷寒壞證治之。○李仲南胎前病。唯當安胎順氣。若外感四氣。

內傷七情以成他病治法與男子無異當於各證類中求之但胎前治他證者動胎之劑切須審詳爾○

丹胎前當清熱養血○產前安胎白朮黃芩妙藥也

○胎前將臨月以三補丸加炒香附炒白芍藥蒸餅

丸服○又抑熱以三補用生地黃膏丸地黃膏丸之

○有孕八九箇月必順氣枳殼蘇莖○前至八九月

因火動胎逆上作喘急者可用條芩香附之類為末

調下條芩於水中沉取重者用之○固胎地黃半錢

當歸身尾人參白芍陳皮各壹錢白朮壹錢半甘草

參分黃芩川芎各半錢黃連炒麩各少許桑上羊兒

藤銀花七葉完者糯米拾肆粒咬咀煎服血虛不安

者用阿膠痛者用硝砂行血氣故也

○夷堅志云政和中蔡魯公之孫婦有孕及期而病國

醫皆以為陽證傷寒懼胎墮不敢投以涼劑張銳至

視之曰兒處胎十月將生矣何藥之能敗即以常法

與藥且使倍服之半日而兒生病亦失去明日其婦

大泄而喉閉不入食眾醫復指其疵且曰二疾如米

炭又產蓐甫近雖司命無如之何矣張曰無庸憂也

將使即日愈乃取藥數十粒使吞之咽喉即通下泄

亦止及滿月魯公酌酒為壽曰君術道神吾不敢知

敢問一藥而愈二疾何也張曰此子經無所載特以
意處之向者所用藥乃附子理中丸裹以紫雪爾方
喉閉不通非至寒藥不為用既以下咽則消釋無餘
其得至腹中者附子力也故一服而兩疾愈公大加
嘆異

○汪機治一婦常患橫生逆產七八胎矣子皆不育汪
診脉皆細澁頗弦曰此氣血兩虛兼熱也或曰氣血
有餘方成妊娠氣血既虧安能胎耶汪曰觀其形長
瘦而脉細濡屬于氣血兩虛色青脉弦屬于肝火時
熾而兩尺浮滑似血虛為輕而氣虛為重也宜以補
陰丸除陳皮倍加香附參芪蜜丸服之常令接續踰
年臨產果順而育一子

○保生丸婦養胎益血安和子臟治妊娠將理失宜或
因勞役胎動不安腰腹痛重胞阻漏胎惡露時下
子臟挾疾久不成胎或受妊不能固養痿燥不長
一過年不產日月雖滿轉動無力或致損墮及臨產
一節適乖宜驚動太早產時未至惡露先下胎胞枯
燥致令產難或橫或逆痛極悶亂連日不產子死
腹中腹上冰冷口唇青黑吐出冷沫新產惡血上
衝運悶不省喘促汗出及瘀血未盡臍腹疔痛寒

熱往來或因產勞損虛羸未復面黃體瘦心忪盜汗飲食不進漸成羸勞入月常服壯氣養胎正順產理潤胎易產產後常服滋養血氣和調陰陽密腠理實腑臟治風虛除痼冷

大麻仁去殼壹兩半 貝母

黃芩

大豆黃卷 粳米

甘艸炙微赤

乾薑炮 肉桂去麤皮

石斛去根

石膏細研

秦椒微炒出汗各壹兩 當歸去蘆炒半兩

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服壹丸並用溫酒或棗湯化下嚼燕亦得空心食前服

交感地黃煎丸 治婦人產前產後眼見黑花或即

發狂如見鬼狀胞衣不下失音不語心腹脹滿水穀不化口乾煩渴寒熱往來口内生瘡咽中腫痛心虛忪悸夜不得眠產後中風角弓反張面赤牙關緊急崩中下血如豚肝狀臍腹疔痛血多血少結為癥瘕恍惚昏迷四肢腫滿產前胎不安產後血刺痛皆治之

生地黃淨洗研以布絞汁留滓以生薑汁炒地黃滓以地黃汁炒生薑滓各至乾為末

生薑淨洗爛研以布絞汁留滓各貳斤 當歸去蘆

延胡索拌糯米炒去米 琥珀別研各壹兩 蒲黃炒香肆兩

右為末蜜丸彈子大當歸湯化壹丸食前服

琥珀丸 治婦人胎前產後百病及療三十六種血

冷七疝八瘕心腹刺痛卒中癱瘓半身不遂八風
十二痺手足痠疼乳中毒結瘀血懷胎驚動傷犯
不安死胎不出并胎衣不下並宜服之

琥珀 另研 辰砂 另研 阿膠 碎炒

五味子 揀淨 石斛 去根 附子 炮去皮臍

肉桂 去粗皮 沉香 不見火 川芎 各半兩

牛膝 去蘆酒浸 當歸 去須炒 肉蓯蓉 酒浸炒

人參 續斷 沒藥 研

熟地黄 木香 不見火各壹兩

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服壹丸空心煖

酒化下午後食前再服能生新血去惡血 若腹

脇疼痛繞臍如刀刺及嘔逆上氣築心痰毒不思

飲食用薑汁少許和酒化服 諸痢及赤白帶下

血冷崩中下血漏胎下血用生薑與艾剉炒令赤

色入酒同煎數沸去滓調服 泄瀉不止陳米飲

化服 澀尿諸淋煎通草燈心湯服 血暈不知

人煎當歸酒調服 上熱下冷煎人參湯服 遍

身虛腫水氣煎赤小豆湯服 產內一毒傷寒及

中風角弓反張如板硬煎麻黃湯服以衣被蓋出汗
月經不通或間雜五色頻併而下斷續不止
飲食無味肌膚瘦劣面赤唇焦乍寒乍熱四肢煩
疼五心燥熱黑點遍身血斑赤腫走注及血風勞
傷無力用童子小便入薑汁少許調服常服以童
便為妙若恐惡心和以半酒如懷胎婦於臨月
一日一服至產下不覺疼痛或服至五服十服日
倍飲食是藥力也其功不能具述

龍鬚湯 治胎前產後身疼保室論云身疼者肌體
不實而受風邪客於經絡邪氣與正氣相搏交擊

於骨肉之間故身疼而不動用龍鬚湯主之若妊
娠而患身體疼者必因勞役過多致使然也不爾
經絡受風寒愈痛凡防風湯主之產者若因勞役
身疼而不能動轉者良由產後百節開張血脈流
走氣弱則骨肉之間血多凝滯是故百節經脈緊
急腰背不能轉側手足不能動搖身熱若納炭頭
如釘釘醫者不識妄為傷寒發汗變生他證宜服

黃芪 壹兩 蜜炙

當歸 去蘆 酒浸

牛膝 洗去苗酒 浸壹宿如

急用酒蒸 熟為度

白朮

防風 去蘆

獨活 去蘆

甘草 各貳 錢半

右吹咀每服半兩水伍盞生薑拾片薤白壹握同煎至參盞去滓不拘時服

佛手散 治產前產後腹痛體熱頭疼及纔產未進別物卽先服此藥逐敗血生新血能除諸疾

川芎 貳兩

當歸 參兩

右爲細末每服貳錢水壹盞酒貳分同煎柴分溫服。一方爲麤末每服肆錢水柒分酒參分同煎至柒分熱服未產前先安排此藥將兩服藥煎之產了速進之三日內日二服三日外一服。一方名芍歸湯只此二味等分吹咀水煎專治失血傷

胎去血產後去血崩中去血金瘡去血拔牙去血不止一切去血過多心煩眩暈悶絕不省人事頭重目暗舉頭欲倒悉能治之若產後眩暈宜加芍藥服之。一名桂香散治產後腹痛不可忍者加桂心等分酒與童子小便合煎服之立効。一名當歸湯治妊娠子死或未死胎動不安每服用酒水合煎連進數服胎若已死服之便下若未死其胎卽安此經累効萬不失一。一名琥珀散臨月服之只縮胎易產兼治產後諸疾。一名羊肉湯治虛損羸乏腹中疝痛往來寒熱吸吸少氣不能

支持頭眩自汗腹內拘急每服用精羊肉壹兩生薑拾片水貳盞煎至陸分溫服。一名君臣散治婦人室女心腹疔痛經脉不調用水煎服。若姪婦胎氣不安產後諸疾加酒煎服。一名芎當散治婦人血氣上喘下腫二味等分為細末每服貳錢空心煎艾湯調下又治產後損身血衝心及腹脹氣絕者神驗。難生倒橫子死腹中先用黑豆壹大合炒熟水壹盞入童子小便壹盞藥末四錢同煎至壹盞以上分為二服未効再作。產後惡血注心迷悶喘急腹痛依前用黑豆加生薑自然汁半合煎服。治臟毒每服壹錢半入炒槐花末半錢水壹盞煎至陸分無時服三日取下血塊即愈。如產後頭疼加荆芥煎如吐血亦宜服之。若產難多用百草霜香白芷等分為末名烏金散每服貳錢童子小便好醋各壹合沸湯浸服止。一服見効甚者再服已分免矣。一法以五積散加醋煎服亦能催生。崩中漏下失血過多久不能止用芎歸湯療之不止者宜以香附子炒去皮毛為細末每壹兩入甘草末壹錢清米飲點服名順元湯。有白帶者於順元湯內加芍藥半兩或

謂香附耗氣則不然許學士謂滋血養氣婦人仙藥雖羸人亦宜服之。○兼治男女吐衄便利及諸證失血用此藥佐以米飲丸百草霜末每服百餘丸或以其他燒灰藥皆能作効不可遽以燥澁之劑止之必致壅遏腐敗必生他證大抵血不能行氣使之然者氣得其平則血循故道必無妄行之患矣香附子善能導氣用之勿疑也。

返魂丹

治婦人胎前產後諸疾危證。

右用赤箭卽野天麻葉似艾葉開紫花如紅蓼花子名充蔚子又名益母草又名大札又名貞蔚又名負擔端五日採取陰乾用葉及花子以磁器研爲細末煉蜜和丸如彈子大隨後治證嚼服其根燒存性爲末酒調服功與黑神散不相上下。○如胎前臍腹作痛或作聲者溫米飲下。○胎前產後臍腹刺痛胎動不安下血不止水煎秦艽糯米湯下或當歸湯亦可。○如產時先用壹丸以童子小便化下安魂定魄自然氣血調順諸病不生又能破血止痛養脉息調經絡溫酒下。○產後胎衣不下血在胞中及橫生不順死胎經日不下者脹滿腹中心悶心痛炒鹽湯下。○產後中風牙關緊急

半身不遂失音不語童子小便無灰酒各半下○
 產後咳嗽胸膈不利惡心口吐酸水面目浮腫兩
 脇痛舉動失力者溫酒下○產後兩太陽痛呵欠
 心忡氣短肌體羸瘦不思飲食血風身熱手足頑
 麻百節疼痛溫米飲湯下○產後眼前黑暗血暈
 血熱口渴煩悶如見鬼神狂言不省人事薄荷自
 然汁如無生者濃煎薄荷湯下及童子小便酒各
 半亦可○產後面垢顏赤五心煩熱或結成血塊
 臍腹奔痛時發寒熱有冷汗者童子小便酒各半
 下溫薄荷自然汁亦可○產後餘血惡露不盡結

滯臍腹刺痛惡物上衝心胸主悶者童子小便酒
 各半下○產後大小便不通煩躁口苦者薄荷自
 然汁下如無生者濃煎薄荷湯下○產後瀉血者
 水煎棗湯下○產後白帶下者煎膠艾湯下○月
 水不調溫酒下○血崩漏下溫酒下○婦人久無
 子息溫酒下服之拾丸至貳拾丸亦能注喜○一
 子死腹中蓋因卒病臟腑蒸極蒸其胎是以子死
 也蓋子死不居子宮或墮胎於腹間冷痛小便沫
 出腹脹四肢逆冷爪甲青者是也或臨產之時此
 藥安魂定魄血氣自然調順諸疾不生破血補虛

止痛養血氣調經絡酒童子小便各柴分化下○
二難產者胎以食母之血十月滿足則餘血結成
塊俗呼為兒枕欲產之時血塊先動敗血裹其子
是以難產或產後惡物不盡臍腹刺痛惡物上衝
心胸主悶用童便酒各柴分化下○三垢面顏赤
胎衣不下既產了臟腑虛羸五心煩躁血流入衣
中則難出發寒熱有冷汗出但去其敗血其衣自
出如帶斷了服此藥下或橫生不順心悶欲死者
童便酒各柴分化下薄荷自然汁鹽湯亦可○四
產後三日起卧不得眼前黑暗生花蓋產後血氣
未定連走五臟入肝則目昏俗為暗風醫家以風
治之或血熱口乾煩渴心悶亂如見鬼神狂言妄
語不省人事童便酒各柴分薄荷自然汁亦可○
五產後口乾心悶及煩渴者血氣未定即食熟麵
積滯在內以致熱躁煩渴者俗為胸膈壅盛或兩
太陽穴痛呵欠怔忡氣短身體羸瘦不思飲食血
風身熱手足頑麻百節疼痛甚者溫米飲童便各
柴分化下○六產後四肢浮腫及寒熱者蓋因敗
血流入五臟滲入四肢停留日久化為膿狀氣喘
或小便澀或咳嗽胸膈不利惡心口吐酸水兩脇

疼痛舉動乏力。溫酒化下。○七產後寒熱往來。蓋因敗血入心。則熱入脾。則寒。狀如瘧。臍腹作痛。或作聲。溫米飲化下。桂枝湯亦可。○八產後中風。牙關緊急。半身不遂。失音不語。童便酒各柒分化下。○九產後痢。未經月滿。或誤食物下。與血相攻擊。前所積受濕。以此敗血相攻。棗湯下。○十產後大便秘結。口苦煩渴。非時不語。乃敗血衝心。蔽其心。孔童便酒各柒分化下。薄荷汁亦可。○十一產後遍身疼痛。百節開張。血乘虛流入腸中。停留不散。臍腹疼痛。米飲化下。○十二產後崩中漏下不止。蓋是傷酸物。狀如雞肝。脊背倦悶。煎糯米秦艽湯化下。當歸桂枝湯亦可。○十三產後未經月滿。血氣不通。蓋是月水未還。或食熱麵。壅結成塊。喘嗽四肢無力。多睡而汗出不止。月水不調。為骨蒸勞。便服此藥。童便酒各柒分化下。○十四產後吐逆不止。蓋因敗血停於脾胃。即發吐逆。胃膈虛脹。俗為反胃。溫酒化下。○十五產後鼻衄。口乾舌黑。蓋因心臟熱。則舌黑鼻衄也。童便酒各柒分化下。○十六產後赤白帶下。煎秦艽湯下。○十七產後氣急喉中。猶聲者。蓋因敗血衝心入喉中。萬無一瘥。

矣。○十八產後中風者蓋因未經七日勞重則百
日之中傷房事中風初病之狀眼澁腰強筋急角
弓反張牙關緊急若此者皆自傷犯耳。○十九產
後面色黑及遍身生黑靨者乃敗血入皮膚萬無
一瘥矣。

內灸散 治婦人產前產後一切血疾血崩虛憊腹
脇疔痛氣逆嘔吐冷血冷氣凝積塊硬刺痛泄下
青白或下五色腹中虛鳴氣滿堅脹瀝血腰疼口
吐青水頻產血衰顏色青黃勞傷劣弱月經不調
下血墮胎血迷血暈血痕時發疼痛頭目眩暈惡
血上心悶絕昏迷惡露不乾體虛多汗手足逆冷
並宜服之。

藿香葉 肉桂去麤皮 熟乾地黄洗焙

丁香皮各壹兩半 甘艸炙赤 山藥

當歸去蘆洗 白朮 白芷各捌兩

藁本去蘆剉 乾薑炮 川芎

黃芪去蘆各貳兩 木香壹兩 陳皮去白肆兩

白芍藥拾兩 茴香壹兩半

右劉散每服叁錢水壹大盞入生薑五片艾壹團
同煎至柒分空心食前熱服為末溫酒調下亦得

如產後下血過多加蒲黃煎服惡露不快加當歸
紅花煎服水瀉加肉豆蔻末煎服嘔吐加藿香生
薑煎上熱下冷加荆芥煎但是腹中虛冷血氣不
和並宜服產後每日一服則百病不生丈夫虛冷
氣刺心腹疼痛尤宜服之

食忌 一受孕之後切宜忌不可食之物非惟有感動
胎氣之戒然於物理亦有厭忌者設或不能禁忌非
特延月難產亦能令兒破形母損可不戒哉

食雞肉糯米合食令子生寸白蟲 食羊肝令子
多厄 食鯉魚鱠及雞子令兒成瘡多瘡 食犬
肉令子無聲音 食兔肉令子唇缺 食鼈令子
項短及損胎 食鴨子共桑椹同食令子倒生心
寒 食螃蟹令子橫生 食雀肉合豆醬食之令
子面生黥黯黑子 食豆醬合藿香食之墮胎食
水漿絕產 食雀肉令子不恥多淫 食山羊肉
令子多病 食生薑令子多指生瘡 食蝦蟇鱗
魚令兒瘖瘂 食驢騾馬肉延月難產

如此之類無不驗者則知聖人胎教之法矣

藥忌 蚘蟹水蛭地膽蟲烏頭附子配天雄躑躅野葛
蜈蚣類烏喙側子及蚤蟲牛黃水銀并巴豆大戟蛇

蛻及蜈蚣牛膝藜蘆并薏苡金石錫粉及雌雄牙硝
 芒硝牡丹桂蜥蜴飛生及麝蟲代赭蚱蟬胡粉麝芫
 花薇薔草三稜槐子牽牛并皂角桃仁鱗鱒和茅根
 樵根硃砂與乾漆亭長波流茵草中藿麥藺茹蟹爪
 甲蝟皮赤箭赤頭紅馬刀石蠶衣魚等半夏南星通
 草同乾薑蒜雞及雞子驢肉兔肉不須供切須婦人
 產前忌此歌宜記在心曾

起居忌

便產須知云勿亂服藥勿過飲酒勿妄針灸

勿向非常地便勿舉重登高涉險心有大驚犯之產
 難子疾病勿多睡卧時時行步體虛腎氣不足生子

解顱腦破不合宜温補脾胃不和榮衛虛怯子必羸
 瘦自家及鄰家修造動土犯其胎氣令子破形殞命
 刀犯者形必傷泥犯者竅必塞打擊者色青黯繫縛
 者相拘攣有此等驗如影響切宜避之

足厥陰內屬于肝肝主筋及血一月之時血行不滯
 不為力事寢必安靜無令恐畏

妊娠一月陰陽相合為胎寒多為痛熱多卒墮胎重
 腰痛腹滿胎急卒有所下當預安之宜服

烏雌雞湯

烏雌雞湯

蛇及蜈蚣牛膠等類皆宜忌食
 芒硝牡丹桂蚰蟻飛生及廢蟲代枯炸蟬胡粉麩米
 花散等藥三稜槐子桑牛并皂角桃仁勞瘧和菜根
 黃根烟砂與乾漆等長波流茵草中藎麥問如蟹爪
 甲蝦皮赤箭赤頭紅馬刀石蠶衣魚等半夏南星蒲
 葇同乾薑蒜薤雞及雞子鴨肉兔肉不須供切須婦人
 昔時辟瘴自此藥鹹成湯響母宜避之
 凡非昔汗必熱或外昔雞必塞汗藥皆色青醜藥縣
 爽自寒文瀦寒疥豉博土亦其似涼令于類汗散命
 翰醜瀝如不合宜盛蘇單胃不味紫瀦盡封于必瀦

逐月養胎法

此齊名醫徐之才云妊娠一月名始胚飲食精熟酸
 美受御宜食大麥母食腥辛是謂纒正。○妊娠一月
 足厥陰脉養不可針灸其經。如大敦行間太衝中封
五里中郗等穴是也
 足厥陰內屬于肝肝主筋及血一月之時血行否澀
 不為力事寢必安靜無令恐畏

妊娠一月陰陽新合為胎寒多為痛熱多卒驚舉重
 腰痛腹滿胞急卒有所下當預安之宜服

烏雌雞湯

烏雌雞壹隻治茯苓

阿膠各貳兩

吳茱萸 壹升

麥門冬 伍合

人參

芍藥

白朮 各叁兩

甘草

生薑 各壹兩

右咬咀以水壹斗貳升煮雞取汁陸升去雞下藥煎取叁升內酒叁升并膠烱盡取叁升放溫每服壹升日三

補胎湯 若曾傷一月胎者當預服此

細辛 壹兩

防風 貳兩

乾地黄

白朮 各叁兩

生薑 肆兩

吳茱萸

大麥 各伍合

烏梅 壹升

右八味咬咀以水柒升煮取貳升半分三服先食服寒多者倍細辛茱萸熱多渴者去之加瓜蒌根貳兩若有所思去大麥加栝子人參合一方有人參壹兩

如娠二月名始膏無食辛燥若必靜處男子勿勞白節皆痛是為胎始結。○ 妊娠二月足少陽脉養不可

針灸其經 如膽竅丘墟付陽絕骨外立陽陵泉等穴是也 足少陽內屬於膽

膽主精二月之時兒精成於胞裏當慎護驚動也。○

妊娠二月始陰陽踞經有寒多壞不成有熱即萎悴中風寒有所動搖心滿臍下懸急腰背強痛卒有所

下乍寒乍熱宜服

艾葉湯

艾葉

丹參

當歸

麻黃

人參

阿膠

甘艸

生薑

大棗

各貳兩

陸兩

各叁兩

壹兩

陸兩

拾貳枚

右九味咬咀以酒叁升水壹斗煮減半去滓內膠煎取叁升分三服一方用烏雌雞壹隻宿肥者治如食法割頭取血內叁升酒中相和次以水壹斗貳升先煮取汁去雞內藥煎取叁升內血酒并膠煎取叁升分溫三服

黃連湯

若曾傷二月胎者當預服此

黃連

人參

吳茱萸

生薑

生地黃

伍兩

一方用阿膠

右五味咬咀以酢漿柒升煮取叁升分四服日三

夜一十日一修合若頗覺不安加烏梅壹升加烏

梅者不用漿直用水耳一方用當歸半兩

妊娠三月名始胎當此之時未有定儀見物而化欲

生男者操弓矢欲生女者弄珠璣欲子美好數視璧

玉欲子賢良端坐清虛是謂外象而內感者也。妊

娠三月手心主脉養不可針灸其經。如中衝勞宮大

門曲澤等 宛是也 手心主內屬於心無悲哀思慮驚動

妊娠三月為定形有寒大便青有熱小便難不赤即

黃卒驚恐憂愁嗔怒喜頓仆動於經脉腹滿繞臍苦

痛或腰背卒有所下宜服

雄雞湯

雄雞壹隻治如食法

黃芩

白朮

生薑各壹兩

麥門冬伍合

芍藥

大棗拾貳枚擘

甘艸

人參

茯苓

阿膠各貳兩

右為咬咀以水壹斗參升者煮雞減半出雞內藥煮

取半內清酒參升并膠煎取參升分參服一日令

盡當溫卧一方用當歸等各貳兩不用黃芩生薑

茯神湯 曾傷三月胎者當預服此方

茯神

丹參

龍骨各壹兩

阿膠

當歸

甘艸

人參各貳兩

大棗貳拾壹枚擘

赤小豆貳拾拾粒

右九味咬咀以酢漿壹斗煮取參升分四服先食

服七日後服一劑腰痛者加桑寄生貳兩深師有

兩麻子壹升 丹一婦人但有孕至三箇月左右必墮

其脉左手大而無力重取則濇知其血少也以其

妙年只補中氣使血自榮時初夏教以濃煎白朮湯下黃芩末壹錢與數十貼得保全而生因思之墮于內熱而虛者於理為多曰熱曰虛當分輕重蓋孕至三月上屬相火所以易墮不然何以黃芩熟艾阿膠為安胎妙藥也。婦人經候三月驗法川芎生末濃煎湯空心下壹匙腹中微動者是有胎。

○妊娠四月始受水精以成血脉食宜稻粳羹宜魚鴈是謂盛血氣以通耳目。行經絡。○妊娠四月手少陽脉養不可針灸其經。如關衝陽池內關三陽太井曲垣等穴是也。手少

陽內輸三焦四月之時兒六腑順成當靜形體和心志節飲食。

妊娠四月有寒心下愠愠欲嘔胸膈滿不欲食有熱小便難數數如淋狀。濟下苦急卒風寒頸項強痛寒熱或驚動身軀腰背腹痛往來有時胎上迫胸心煩不得安卒有所下宜服。

菊花湯

菊花

雞子大壹枚

麥門冬

壹升

大棗

拾貳枚

人參

壹兩半

甘艸

當歸

各貳兩

麻黃

阿膠

各叁兩

半夏

肆兩

生薑 伍兩

右十味哎咀以水捌升煮減半內清酒叁升并阿膠煎取叁升分叁服温卧當汗以粉粉之護風寒四五日一方用烏雌雞壹隻煮汁煎藥

調中湯 若曾傷四月胎者當預服此

白芍藥 生薑 厚朴 各肆兩

生李根白皮 枳實 白朮

柴胡 續斷 芎藭 各叁兩

甘草 當歸 烏梅 各壹兩 壹兩半 壹升

右十二味哎咀以水壹斗煮取叁升分肆服日三

夜一八日後復服一劑

妊娠五月始受火精以成其氣卧必晏起沐浴浣衣深其居處厚其衣服朝吸天光以避寒殃其食稻麥

其羹牛羊和以茱萸調以五味是謂養氣以定五臟妊娠五月足太陰脉養不可針灸其經如隱白大都公孫商丘三

陰交漏谷陰陵泉等穴是也足太陰內輸于脾五月之時兒四肢

皆成無大饑無甚飽無食乾燥無自炙熱無大勞倦

妊娠五月有熱苦頭眩心亂嘔吐有寒苦腹滿痛小便數卒有恐怖四肢疼痛寒熱胎動無常處腹痛悶

頓欲仆卒有所下宜服

阿膠湯

阿膠 肆兩

人參 壹兩

生薑 陸兩

當歸

芍藥

甘艸

黃芩 各貳兩

旋復花 貳合

吳茱萸 柒合

麥門冬 壹升

右十味咬咀以水玖升煮藥減半內清酒叁升并膠微火煎取叁升半分四服日三夜一先食服便愈不瘥再服一方用烏雌雞壹隻割取咽血內酒中以水煮雞汁煎藥減半內酒并膠煎取叁升半分肆服

安中湯

曾傷五月胎者當預服此

黃芩 壹兩

當歸

芎藭

乾地黄

人參 各貳兩

甘草

芍藥 各叁兩

生薑 陸兩

麥門冬 壹升

五味子

大麻人 各伍合

大棗 叁拾伍枚

右十二味咬咀以水柒升清酒伍升煮取叁升半分四服日三夜一七日復服一劑

安胎當歸湯

若妊娠五月舉動驚愕胎不安小腹

痛引腰脇小便下血

當歸

阿膠 炒

川芎

胎前 婦科 四

人參 各壹兩 大棗 拾貳枚 艾葉 壹把

右以酒水各叁升煮至叁升內膠令烊分三服一
方有甘草無參棗

妊娠六月始受金精以成其筋身欲微勞無得靜處
出遊於野數觀走犬及視走馬食宜鷲鳥猛獸之肉
是謂變腠理紉筋以養其力以堅背脊。妊娠六月
足陽明脈養不可針灸其經。如厲兌豐隆陰市上足
下蕪三里等穴是也陽明內屬於胃主其口目六月之時兒口目皆成調
五味食甘美無太飽

妊娠六月卒有所動不安寒熱往來腹內脹滿身體
腫驚怖忽有所下腹痛如欲產手足煩疼宜服

麥門冬湯

麥門冬 壹升 人參 壹兩 甘草 壹兩

黃芩 各貳兩 乾地黃 叁兩 阿膠 肆兩

生薑 陸兩 大棗 拾伍枚

右八味以水柒升煮減半內清酒貳升并膠煎取
叁升分叁服中間進糜粥一方用烏雌雞壹隻煮
汁煎藥

柴胡湯

柴胡 肆兩 茯苓 壹兩 白朮 壹兩

若曾傷六月胎者當預服此方

胎前 逐月養胎

六

五

芍藥

一作紫葳

甘艸

麥門冬

芍藥

各二兩

生薑

陸兩

乾地黃

伍兩

大棗

各三拾枚

右咬咀以水壹斗煮取參升分四服日三夜一中
間進糜粥勿食生冷及堅硬之物七日更服一劑
一方有黃芩貳兩

旋復花湯

集驗療妊娠六七月胎不安常處亦治阻痛

旋復花

壹兩

厚朴

製

白朮

枳殼

黃芩

炒

茯苓

各叁兩

半夏

炒一方無

芍藥

生薑

各貳兩

右以水壹斗煮取貳升半分五服先食服日三夜

二忌羊肉錫醋桃李雀肉

○妊娠七月始受木精以成其骨勞身搖肢無使定止

動作屈伸以運血氣居處必燥飲食避寒常食稻糲

以密腠理是謂養骨而堅齒○妊娠七月手太陰脈

養不可針灸其經如少商魚際列缺尺澤太陰等穴是也手太陰內屬

於肺主皮毛七月之時兒皮毛已成無大言無號哭

無薄衣無洗浴無寒飲

妊娠七月忽驚恐搖動腹痛卒有所下手足厥冷脉

若傷寒煩熱腹滿短氣常苦頸項及腰背強蔥白湯

主之

蔥白

長參肆寸 拾肆莖

半夏

麥門冬

各壹升

旋復花

貳合

黃芩

壹兩

人參

壹兩半

甘草

當歸

黃芪

各叁兩

阿膠

肆兩

生薑

捌兩

右十一味，咬咀，以水貳升，煮減半，內清酒叁升，及膠煎取肆升，每服壹升，日三夜一，溫卧，當汗出，若不出者，加麻黃貳兩，煮服如前法。若秋後，勿強責汗。一方以黃雌雞壹隻，割啣取血，內酒中，煮雞取汁，以煎藥。

本方湯

若曾傷七月胎者，當預服此。

赤人

甘草

各貳兩

紫苑

壹兩

鍾乳

乾薑

各叁兩

麥門冬

吳茱萸

壹升

粳米

伍合

五味子

叁合

右九味，咬咀，以水捌升，煮取叁升半，分肆服，日三夜一，中間進食。七日服一劑。一方用白雞壹隻，煮汁煎藥。

妊娠八月，始受土精，以成膚革，和心靜息，無使氣極。是謂密腠理而光澤顏色。○妊娠八月，手陽明脉養不可針灸其經。

如商陽二間合谷下廉二穴是也。手陽明

胎前 婦科 五十三
內屬於大腸主九竅八月之時兒九竅皆成無食燥
物無輒失食無忍大起

妊娠八月中風寒有所犯觸身體盡痛乍寒乍熱胎
動不安常苦頭眩痛繞臍下寒時時小便白如米汁
或青或黃或使寒慄腰背苦冷而痛目眈眈芍藥湯
主之

芍藥

生薑 各肆兩

厚朴 貳兩

甘草

當歸

白朮

人參 各叁兩

薤白 切壹升

右八味㕮咀以水伍升清酒肆升合煮取叁升分

叁服日再夜一一方用烏雌雞煮汁以前煎藥

葵子湯 若曾傷八月胎者當預服此

葵子 貳升

甘草

厚朴 各貳兩

白朮

柴胡 各叁兩

芍藥 肆兩

生薑 陸兩

大棗 貳拾枚

右八味㕮咀以水玖升煮取叁升分三服日三

十日一劑一方用烏雌雞壹隻煮汁煎藥

丹溪縮胎丸 八九箇月用之

黃芩 夏壹兩以米錢
冬半兩炒

白朮 貳兩

陳皮 叁兩去白

茯苓 叁錢

右為末粥九桐子大

妊娠九月始受石精以成皮毛六腑百節莫不畢備
飲醴食甘緩帶自持而待之是謂養毛髮致才力

妊娠九月足少陰脉養不可針灸其經如湧泉然谷
實伏溜等足少陰內屬於腎腎主續縷九月之時兒

脉續縷皆成無處濕冷無著炙衣

妊娠九月若卒得下痢腹滿懸急胎上衝心腰背痛
不可轉側短氣宜服

半夏湯

半夏

麥門冬

吳茱萸

當歸

阿膠各叁兩

乾薑壹兩

大棗拾貳枚

右七味㕮咀以水玖升煮取叁升去滓內白蜜捌
合微火上溫服四服痢即止一方用烏雌雞壹隻
煮汁煎藥

豬腎湯 若曾傷九月胎者當預服此

豬腎壹具

茯苓

桑寄生

乾薑

乾地黃

葶藶各叁兩

白朮肆兩

附子中者壹枚

大豆叁合

麥門冬壹升

台行 逐月養胎 五十四

右哎咀以水壹斗煮腎令熟去腎內諸藥煎取參升半分四服日三夜一十日更一劑

丹溪縮胎丸 九箇月用之

黃芩

壹兩宜熟藥不宜涼藥怯人減半

枳殼

燒柴錢半

滑石

柴錢半臨月十日前小便多時加此一味

白朮

壹兩

右為末粥丸如桐子大每服參拾丸空心熟湯下

○ 妊娠十月五臟俱備六腑齊通納天地氣於丹田故使關節人神皆備但俟時而生

○ 如娠一月始惡二月始膏三月始胞四月形體成五月能動六月筋骨立七月毛髮生八月臟腑具九月

穀氣入胃十月諸神備日滿即產矣宜服滑胎藥入月即服

○ 滑胎枳殼散 瘦胎易生湖陽公主每產累日不下

○ 南山道士進此方

商州枳殼

貳兩

粉草

壹兩

右為細末百沸湯點貳錢服空心日三服凡懷孕七八個月已上服之令兒易生初生胎小微黑百日已後漸漸變白此雖孫真人滑胎易產方然抑陽降氣為衆方之冠此方分兩出必用方以此為正。一方枳殼陸兩甘草壹兩

故加枳殼減甘草蓋未產人甘草性

寒故也。未產前一月。一方有糯米半升淘洗控
日可三服。忌登高。乾同炒為末。米飲。或白湯調下。壹貳錢。溫隱居
加當歸木香各等分。

張氏方。治妊娠胎肥壅隘。動止艱辛。臨月服之。縮
胎易產。兼治腸中諸疾。下氣寬膈。

枳殼 伍兩

甘州 壹兩半

香附子 叁兩 炒
去毛

為末。薑煎湯點亦可。如丈夫婦人。冷氣攻刺脇肋
疼痛者。用葱白三寸同煎服。婦人脾寒。血氣成
塊。作痛。熱酒調服。大小便不通。白牽末煎湯調
服。選奇方。香附子 枳殼 各貳兩 甘草 半兩

內補丸 治妊婦衝任脉虛補血安胎

熟地黃 貳兩

當歸 微炒 壹兩

右為細末。煉蜜和丸。如梧子大。溫酒下。參肆拾丸。
許學士云。大率婦人妊娠。唯在抑陽助陰。素問云。
陰搏陽別。謂之有子。蓋關前為陽。關後為陰。尺中
之脉。按之搏手不絕者。妊身也。婦人平居。陽氣微
盛。無害及其妊子。則方閉經隧。以養胎。若陽氣盛
搏之。則經脉妄行。胎乃不固。素問所謂陰虛陽搏
謂之崩也。抑陽助陰之方甚多。然胎前藥。唯惡群
隊。若陰陽交錯。別生他病。唯是枳殼散。所以抑陽

四物湯所以助陰故爾然枳殼散差寒若單服之恐有胎寒腹痛之疾以內補丸佐之則陽不致強陰不致弱陰陽調停有益胎嗣此前人未嘗論及也

產滑胎方 其藥性滑利小便

以車前子為末酒調服方寸七不能飲者水調

詩云采采芣苢能令婦人樂有子矣 陸機注云

治婦人產難故也

神寢丸 瘦胎滑利易產臨入月服之極有神效

知蘄州施少卿方 蘄州徐太丞傳

通明乳香 別研半兩

枳殼 壹兩

右為細末煉蜜丸如梧子大空心溫酒吞下參拾

丸懷孕九月已後方可服 崔氏方名寤生丸乳

香只貳錢半酒糊丸

榆白皮散 治妊娠滑胎易生

榆白皮

甘草 各貳兩

葵子 壹兩

右為粗末每服貳錢水壹盞煎至柒分去滓溫服

一方無榆皮名葵子散

主孕九个月將產消息

豬肚

壹具全

如法用葱五味煮熟食食如不盡

更食以盡為度不得與別人食無効

保氣飲 安胎寬氣進食瘦胎易產設或居處失宜

偶然頓仆胎動胎痛漏胎下血兼服佛手散見胎產大

神寢丸法枳殼散並見上此三方入月內大宜常服

香附子肆兩 山藥貳兩 縮砂仁壹兩

粉草壹兩貳錢半 益智仁各半 紫蘇葉各半

木香肆錢

右為細末以白湯點服貳錢

無憂散 治妊婦身居富貴口厭肥甘憂喜不常食

物不節既飽便卧致令胞胎肥厚根蒂堅牢行動

艱難因致臨產難生入月可服無憂散則易生矣

當歸 川芎 白芍藥

枳殼 乳香各叁錢 木香

甘草 餘即髮灰以續緒心血和之名壹錢半

右為末每服貳錢水煎日進兩服

丹溪云世之難產者往往見於鬱悶安佚之人富貴

豢養之家若貧賤辛苦者未有也古方書止有瘦胎

飲一論而其方為湖陽公主作也實非極至之言何

者見其有用此方者其難自若予表妹苦于難產後

遇胎孕則觸而去之予甚憫焉視其形惟勤於針指

胎前 女科四
搆思旬日忽自悟曰此正與湖陽公主相反彼奉養
之人其氣必實耗其氣使平和故易產今形肥知其
氣虛久坐知其不運必氣愈弱兒在胞胎因母氣不
能自運耳當補其母之氣則兒健易產矣令其有孕
至五六個月來告遂于大傘方紫蘇飲加補氣藥與
數十貼因得男而甚快後遂以此方隨母形色性稟
參時令加減與之無不應者因名其方曰達生散
縮胎飲自產
散

大腹皮

參錢

人參

陳皮

紫蘇莖葉

各伍分

白芍

白朮

歸身尾

各壹錢

甘草

貳錢

黃楊樹腦

或加枳殼

縮砂

青蔥

伍葉

右作一貼吞下益母丸臨月得貳拾服易生產後
無病。按丹溪云難產死胎此血氣滯病也蓋此
方補中行滯春加川芎氣虛倍參朮氣實
倍香附陳皮血虛加當歸地黃形實倍紫蘇
性急加黃連熱急加黃芩濕痰加滑石半
夏食積加山查食後易饑加黃楊腦腹痛
加木香官桂黃芩冬不用芩

黑神丸

名崔氏丸
名益母丸

用益母草研末粥丸治婦人

胎前 逐月養胎

六十一

臨月一日三次服之用縮砂飲送下能催生易產
產後服能生新血去舊血只以白湯送下虛者煎
白朮人參陳皮湯送下

白朮人參陳皮湯送下
白朮人參陳皮湯送下
白朮人參陳皮湯送下
白朮人參陳皮湯送下
白朮人參陳皮湯送下
白朮人參陳皮湯送下
白朮人參陳皮湯送下
白朮人參陳皮湯送下
白朮人參陳皮湯送下
白朮人參陳皮湯送下

惡阻 痰逆不食
甘草 黃芩 樹膠
黃芩 樹膠
黃芩 樹膠

惡阻謂嘔吐惡心頭眩惡食擇食是也。金凡婦

人虛羸血氣不足腎氣又弱或當風飲冷太過心下
有痰水者欲有胎而喜病阻所謂欲有胎者其人月
水尚來顏色肌膚如常但苦沉重憤悶不欲食飲又
不知其患所在脈理順時平和則是欲有娠也如此
經二月日後便覺不通則結胎也阻病者患心中憤
憤頭重眼眩四肢沉重懈惰不欲執作惡聞食氣欲
噉鹹酸果實多卧少起世謂惡食其至三四月日已
上皆大劇吐逆不能自勝舉也此由經血既閉水漬

惡阻 痰逆不食
六十一

於藏氣不宜通故心煩憤悶氣逆而嘔吐也血脈
不運經絡否滯則四肢沉重挾風則頭目眩也覺如
此候者便宜服半夏茯苓湯數劑後將茯苓丸痰水
消除便欲食也既得食力體強氣壯力足養胎母便
健矣。○大金妊娠稟受怯弱便有阻病其狀顏色如
故脉息和順但覺肢體沉重頭目昏眩擇食惡聞食
氣好食鹹酸甚者或作寒熱心中憤悶嘔吐痰水恍
忽不能支持巢氏謂之惡阻但證有輕重耳輕者不
服藥亦不妨重者須以藥療之千金方以半夏茯苓
湯茯苓丸專治阻病然此一藥比來少有服者以半

夏有動胎之性蓋胎初結慮其易散此不可不謹也
張仲景傷寒論有用黃龍湯者小柴胡湯中去半夏
是也此蓋為妊娠而設焉王子亨則有白朮散方
則人參丁香散楊振則有人參橘皮湯齊十明則有
醒脾飲皆不用半夏用之多效。○李茂翁云若左脉
弱而嘔服諸藥不止者當服理血歸原藥則愈經云
無陰則嘔是也。○薛前證若中脘停痰用二陳湯加
枳殼若飲食停滯用六君子加枳殼若脾胃虛弱用
異功散若胃氣不足用人參橘皮湯兼氣惱加枳殼
胸脇痞悶再加蘇梗脇痛再加柴胡若飲食少思用

胎前惡阻 六十二

六君子加紫蘇枳殼頭暈體倦用六君子湯若脾胃
虛弱嘔吐不食用半夏茯苓湯蓋半夏乃健脾胃化
痰滯之主藥也脾胃虛弱而嘔吐或痰涎壅滯飲食
少思胎不安必用茯苓半夏湯倍加白朮然半夏白
朮茯苓陳皮砂仁善能安胎氣健脾胃予嘗用之驗
矣。痰逆不食證因食停滯用半夏茯苓湯加枳殼
無氣惱更加柴胡因痰壅滯用半夏茯苓湯加白朮
因風寒外傷用參蘇飲飲食腹脹用香砂六君子湯
寒熱嘔吐人參養胃湯。一妊娠嘔吐惡食體倦嗜
臥此胃氣虛而惡阻也用人參橘皮湯二劑漸愈又
用六君子加紫蘇二劑而安。一妊娠吞酸惡心時欲
作嘔此因脾胃虛而飲食停滯用六君子加枳殼香附
治之而愈。一妊婦停食腹滿嘔吐吞酸作瀉不食
余以為飲食停滯兼肝木傷脾土用六君子湯以健
脾胃加蒼朮厚朴以消飲食吳茱萸所製黃連以清
肝火諸證悉愈又以六君子加砂仁調理而脾土乃安
。一妊婦嘔吐脇脹或寒熱往來面色青黃此木旺
而尅脾土用六君子加柴胡桔梗枳殼而安。一妊
婦嘔吐酸水胸滿不食此脾土虛而肝木所侮用六
君子加芍藥而愈。一妊婦胸腹膨脹吐痰不食此

脾胃虛而飲食為痰用半夏茯苓湯漸愈又用六君子加枳殼蘇梗桔梗而飲食如常後因恚怒脇脹不食吐痰惡心用半夏茯苓湯加柴胡山梔而愈。汪石山治一婦形質瘦小面色近紫產後年餘經水不通首夏忽病嘔吐手指麻痺拳不能伸展聲音啞小噦不出聲醫皆視為風病危之汪診脈皆細微近滑曰此妊娠惡阻病也衆謂經水不通安有妊娠汪曰天下之事有常有變此乃事之變也脈雖細微似近于滑又尺按不絕乃妊娠也遂以四君子加三陳治之諸證俱減尚畏粥湯惟食乾糕香燥之物而有生意。○給事游護溪夫人病新愈月餘經事不行嘔噦眩暈飲食艱進醫以為三陽之病發心脾女子不月法在不治江瓘診之尺脈雖小按之滑而不絕此妊而惡阻非凶候也六君加砂仁數服而安後產一女。○金匱婦人得平脈陰脈小弱其人渴不能食無寒熱名妊娠桂枝湯主之於法六十日當有此證設有醫治逆者却一月加吐下者則絕之。○葉全善曰絕之者謂絕止醫治候其自安也予嘗治一二婦阻病吐愈治愈逆因思仲景絕之之旨遂停藥月餘自安真大哉聖賢之言也。

萬金方云凡妊娠惡食者以所思食任意食之必愈
仲景云妊娠嘔吐不止乾薑人參半夏丸主之
乾薑人參半夏丸

乾薑

人參 各壹兩

半夏 湯洗去滑貳兩

右三味末之以生薑汁糊為丸如梧子大飲服拾丸日三服

半夏茯苓湯 治妊娠惡阻嘔吐心煩頭目眩暈惡聞食氣好食酸鹹多卧少起百節煩疼羸瘦有痰胎孕不牢

半夏 洗壹兩貳錢半

赤茯苓

熟地黃 各柒錢半

橘紅

旋復花 千金方無旋復有細辛紫蘇

人參

芍藥

川芎

桔梗

甘草 各半兩

右咬咀每服伍錢薑柒片水煎空心服兼服茯苓丸。若有客熱煩渴口瘡去橘紅細辛加前胡知母柒錢半。若腹冷下痢去地黃加炒桂心半兩。若胃中虛熱大便秘小便赤澀加大黃柒錢半去地黃加黃芩貳錢伍分

茯苓丸

治妊娠阻病心中煩悶吐痰眩暈先服半

夏茯苓湯兩劑後服此藥

赤茯苓

人參

桂心

乾薑

半夏

湯泡七次沙黃

橘皮

各壹兩

白朮

葛根

甘草

枳殼

各貳兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服伍拾丸米飲下

日三服一方加麥門冬肘後加五味子

療妊娠心胸支滿痰逆不思飲食

赤茯苓

前胡

白朮

紫蘇葉

各壹兩

半夏

麥門冬

人參

大腹皮

各半兩

右為粗末每服四錢水壹盞薑五片煎至柒分去

滓溫服一方無腹皮人參有大腹子檳榔

療妊娠心膈氣滯嘔吐不下飲水心神虛煩四肢少

力

枇杷葉

半夏

麥門冬

人參

甘草

半兩

訶子肉

藁香

各壹兩

赤茯苓

枳殼

陳皮

各柒錢半

右咬咀每服叁錢水壹盞薑叁片棗壹枚煎至柒

分去滓溫服一方無訶子及棗

集驗療婦人妊娠惡阻嘔吐不下食

青竹茹

橘皮

生薑

茯苓各肆兩

半夏伍兩

右細切以水陸升煮取貳升半去滓分三服不差頻服忌羊肉鰾鮓等物

旋復半夏湯 治妊娠惡阻吐逆酸水惡聞食氣多

臥少起

旋復花去枝萼

川芎

細辛去土

人參

甘草炙各柒分

當歸去蘆

半夏湯泡

赤茯苓去皮

乾生薑

陳皮去白各壹錢伍分

右作一服水貳鍾薑五片煎至壹鍾不拘時服

旋復花湯 治妊娠六七月胎不安嘔吐

旋復花伍分

厚朴

白朮

枳殼

黃芩

茯苓各壹錢伍分

半夏

芍藥

生薑各壹錢

右作一服水貳鍾煎至壹鍾食前服

右諸方並用半夏蓋取其辛以散結氣瀉逆氣故嘔惡自止非專為痰設也葉全善曰大千方論半夏動胎而不用仲景方乃用之予治妊娠阻病累

用半夏未嘗動胎也。經云有故無殞是也。

白朮散 治惡阻吐清水甚者害十餘日水漿不入

白朮 壹兩 人參 半兩 丁香 貳錢

甘草 壹錢

右為細末每服貳錢水壹盞薑伍片煎至柒分温

服

人參丁香散 治妊娠惡阻胃寒嘔逆翻胃吐食及

心腹刺痛

人參 丁香 藿香葉 各貳錢半

右為散每服叁錢水壹盞煎柒分去滓温服無時

又方

人參 丁香 柿蒂 各貳兩

甘艸 良薑 各半兩

右為細末每服貳錢熱湯點下無時

醒脾飲子 治妊婦阻病嘔逆不食甚者中滿口中

無味或作寒熱此出王氏博濟方

草豆蔻 以濕紙裹灰火中煨 厚朴 薑製各壹兩

乾薑 壹兩 甘艸 壹兩貳錢半

右為細末每服貳大錢水壹大盞棗貳枚生薑叁

片煎至捌分去滓呷服病輕者只一兩服便能食

舊有橘紅貳兩治寒熱瘧痢不食後人去橘皮以乾生薑代乾薑治老人氣虛大便秘少津液引飲有奇効產科醫官齊士明依舊用乾薑去橘皮亦名醒脾飲子治阻病極神驗

右諸方與前茯苓丸並用丁香乾薑惟中寒脈遲者宜之

人參橘皮湯 治阻病嘔吐痰水

人參

橘皮

白朮

麥門冬

去心各壹兩

甘草

叁錢

厚朴

製

白茯苓

各伍錢

為粗末每肆錢加淡竹茹彈子大薑叁片水同煎

治妊娠嘔吐不食無吐痰水

生薑根

柒分

橘紅

肆分

生薑

陸分

檳榔

貳分

枇杷葉

叁分

右切水貳盞煎柒分空心熱服

治妊娠惡食心中煩憤熱悶嘔吐

青竹茹

麥門冬

各叁兩

前胡

貳兩

橘皮

壹兩

蘆根

壹握

如體熱四肢煩熱者加地骨皮壹握

右切細以水壹大升煮半升去查分兩服食前

右諸方內用門冬竹茹蘆根皆氣涼而性和有熱

無寒者通用之平劑也

惡食 治妊娠惡食古今錄驗方

人參 肆兩 厚朴 生薑

枳殼 各貳兩

水陸升煮取參升分三服

理血 歸原散 治妊娠惡阻嘔吐不止頭痛全不入食服

諸藥無効者用此藥理血歸原則愈

人參 甘艸 川芎

當歸 芍藥 丁香 各半兩

白茯苓 白朮 陳皮 各壹兩 伍錢

桔梗 炒 枳殼 去瓢炒各貳錢半 半夏 湯洗柒次切炒黃壹兩

右呔咀每服參錢生薑伍片棗壹枚水同煎

安胎飲 治懷胎三月四月至九个月日嘔吐痰水

心中憤悶頭重目眩惡聞食氣或胎動不安腰腹

疼痛或時下血及妊娠一切疾病並皆治之

甘草 茯苓 當歸

熟地黃 川芎 白朮

黃芪 白芍藥 半夏 湯泡柒次切炒

阿膠 切粉炒 地榆 各等分

右呔咀每服參錢生薑肆片水煎温服無時候

一方無半夏地榆有人參桑寄生 一方無芪朮
半夏地榆有艾葉只是膠艾湯加白茯苓

小地黃丸 治妊娠惡心嘔吐清水腹疼不食

人參 去蘆 乾薑 炮各等分

右為細末以生地黃汁和為丸如桐子大每服五
拾丸食前米飲送下

右方並理血之劑李茂翁所謂左脈弱而嘔服諸
藥不止者服理血歸原藥則愈即此類是也

保生湯 治婦人經候不行身無病而似病脈滑大

而六脈俱勻乃是孕婦之脈也精神如故惡聞食
臭或但嗜一物或大吐或時吐清水此名惡阻切

勿作寒病治之宜服此藥如覺惡心嘔吐加丁香

生薑煎服 溫隱居方

人參 甘草 各貳錢半 白朮

香附子 烏藥 橘紅 各半兩

右咬咀每服參大錢水壹盞半薑伍片煎至柒分
去滓溫服無時或作末子調服

白朮散 治妊娠胎氣不和飲食少進

白朮 炒 紫蘇 各壹錢 人參 貳錢

青皮 去白 訶子肉 川芎 各捌分

肝前
甘艸 炙半錢

右作一服水貳鍾薑叁片煎至壹鍾不拘時服

二香散 治妊娠胎動不安氣不升降飲食不美嘔

吐酸水起坐覺重

香附子 壹兩

藿香葉

甘艸 各叁錢

右為細末每服貳錢不拘時沸湯調下

補遺予嘗治妊婦惡阻嘔吐不食頭暈不敢行步以

苦柚皮濃煎湯飲數盞而愈吐甚者加薑汁

又方 縮砂仁末每貳錢薑湯調下或米飲調

右方並理氣之劑氣虛者首三方為宜氣不順者

者第三方為宜

大肝

一婦人孕三月吐痰水并飲食每日寅卯時作作

時覺少腹有氣衝上然後膈滿而吐面赤微躁頭

眩卧不起牀四肢疼微渴此肝火挾衝脉之火衝

上也一日甚一日輕脉和右寸洪大百藥不効將

二月予男病偶用沉香磨水化抱龍丸一服膈寬

氣不上衝二三服吐止眩減食進而安。又應氏

婦嘈雜吐食脉壅心下滿塞氣攻背兩肘皆痛要

人不住手以熱物摩熨得吐稍踈脉洪大處此方

黃連 壹錢

黃芩 貳錢半 各炒

白朮

半夏 各貳錢

甘草 炙

縮砂 各伍分

陳皮

當歸

山梔

枳殼 炒

香附

人參

蒼朮 各壹錢

茯苓 壹錢半

生薑 柒片

服二貼後嘈雜吐止心滿塞退但於夜間背肘痛用摩熨遂與抱龍丸化服其疾如失

卅一婦人年近三十懷孕兩月病嘔吐頭眩自覺不可禁持以人參白朮川芎陳皮茯苓等藥服五七日愈覺沉重召予脉之兩手弦左為甚而且弱予曰此是惡阻病必怒氣所激問之果然肝氣既逆又挾胎

氣參朮之補大非所宜教以時用茯苓湯下抑青丸二十四粒五貼自覺稍安診其脉略有數狀自言口乾苦稍食粥則口酸予意其為膈間滯氣未盡行教全以川芎陳皮山梔茯苓生薑煎湯下抑青丸十五粒十餘貼餘證皆平但食及常時之半食後覺口酸不食覺易飢予謂肝熱未平則以白湯下抑青丸二十粒二十日而安予又脉之見其兩手脉雖和平而左手弱甚此胎必墮此時肝氣既平參朮可用矣遂用始初參朮等藥補之預防墮胎以後之虛服之一月胎自墮却得平穩無事抑青丸一味黃連為丸是

也

元

元絲
卷之七
五
守
卷
終
文

文化乙丑

十日而安于又利之以其兩手相繼味平而
不食覺其增平臨刊燕未平似以自感不味清武二
味十鎰胡鎰鎰皆平似食又常却之半食對覺口齶
全以山苦刺支山淋芬苓上薑煎湯不味清其十五
辨苦深食酸似口齶于意其為翻間酸未盡皆燥
二十四鎰正胡自覺深之痛其細細亦燥非自言口
煎參木之麻大非西宜燥以却思芬苓湯不味清其

