

二
房

臨
床

最新實用醫學各科全書之一

臨床經驗處方

張崇熙醫師編

增
訂
五
版

杭州宋經樓書店發行

一九五〇年十

版



分類號

登記號

最新臨床經驗處方

本書基本定價十五元

(印刷地點外的加郵運費)

編	輯	者	張	崇	熙	醫	師
校	對	者	海	虞	沈	逸	南
出	版	者	宋	經	樓	書	店
發	行	所	新	醫	書	局	
分	發	行	所	新	醫	書	局
印	刷	者	建	業	印	書	館

杭州解放路三七一號
 杭州解放路三六九號
 上海漢口路六六八號
 北京宣武門內大街八五號
 地址 杭州解放路四一五號

增訂弁言

(一) 本書分爲前續兩篇，原書爲前篇，增訂部份爲續篇。增訂時完全按照原書之系統順序，所有疾病名詞亦依據之，俾讀者翻檢時較爲便利。

(二) 讀者查閱某一疾病之處方，必須同時翻檢前續兩篇之同一疾病，方可窺得全豹。

(三) 續篇對於並無增訂之需要者，概行略去。

(四) 續篇中對於內服藥，外用藥及注射藥之處方，同時列入，未加分開。

(五) 本書增訂倉卒，疏漏必多，請賢達賜正。

臨床經驗處方目錄

前篇

總論……………一—八

各論……………九

第一章 退熱劑處方……………九

一 各種發熱一般退熱方……………九

二 弛張性熱及瘧疾退熱方……………一〇

三 肺癆性發熱退熱方……………一一

四 炎症性(化膿性)退熱方……………一一

第二章 興奮劑處方……………一二

(附) 興奮(強心)注射藥……………一四

第三章 瀉下劑處方……………一五

(附) 瀉下劑外用方……………一七

第四章 利尿及尿防腐劑處方……………一七

一 利尿劑方……………一七

二 尿防腐劑方……………一八

第五章 催吐劑處方……………二〇

(附) 催吐注射藥……………二〇

第六章 發汗及制汗劑處方……………二一

一 發汗劑方及制汗劑……………二一

(附) 發汗及制汗注射藥……………二二

第七章 祛痰劑處方……………二二

(附) 祛痰注射藥……………二四

第八章 鎮咳劑處方……………二四

(附) 鎮咳注射藥……………二六

第九章 鎮痛劑處方……………二六

一 一般鎮痛方……………二六

二 各種特殊痛方……………二八

(附) 鎮痛注射藥……………三一

第十章 鎮靜劑處方……………三二

臨床經驗處方目錄

一

(附) 鎮靜劑外用方……………三四

(附) 鎮靜注射藥……………三五

第十一章 鎮吐劑處方……………二五

(附) 鎮吐注射藥……………二六

第十二章 麻醉劑處方……………二六

一 全身麻醉劑方……………二六

二 灌腸用麻醉劑方……………二六

三 腰椎麻醉劑方……………二六

四 局部麻醉劑方……………二七

五 局部麻醉劑外用方……………二八

第十三章 催眠劑處方……………二八

(附) 催眠劑灌腸方及坐藥……………四〇

第十四章 健胃劑處方……………四〇

第十五章 消化劑處方……………四一

第十六章 補劑(強壯劑)處方……………四四

(附) 補身(強壯)注射藥……………四八

第十七章 補精壯陽劑處方……………四八

(附) 補精(壯陽)注射藥……………四九

第十八章 營養劑處方……………五〇

(附) 滋養灌腸方……………五二

(附) 營養注射藥……………五三

第十九章 止瀉劑處方……………五三

一 消毒性止瀉方……………五三

二 收斂性止瀉方……………五四

第二〇章 驅蟲劑處方……………五六

(附) 驅蟲劑外用方……………五七

(附) 驅除腸寄生蟲注射藥……………五七

第二十一章 止血劑處方……………五八

(附) 止血劑外用方……………五九

(附) 出血注射藥……………六〇

(附) 急性貧血注射藥……………六〇

第二十二章 清涼劑處方……………六一

各科重要疾患分類處方摘要

第一章 傳染病劑處方……………六三

一 傷寒方……………	六三
二 霍亂方……………	六六
三 痢疾方……………	六八
四 鼠疫方……………	七〇
五 白喉方……………	七一
六 腦膜炎方……………	七二
七 丹毒方……………	七三
八 破傷風方……………	七四
九 流行性感胃方……………	七四
一〇 瘧疾(間歇熱)方……………	七六
一一 再歸熱方……………	七七
一二 敗血膿毒症方……………	七七
一三 猩紅熱(紅痧)方……………	七八
一四 麻疹・風疹・水痘方……………	七八

臨床經驗處方目錄

第二章 內科病處方……………八〇

(A) 呼吸器病

一 氣管支炎方……………	八〇
二 氣管支膿漏及腐敗性氣管支炎方……………	八三
三 格魯布性氣管支炎方……………	八三
四 毛細氣管炎方……………	八四
五 氣管支喘息(氣喘)方……………	八五
六 肺炎方……………	八七
七 肺氣腫方……………	八八
八 肺水腫方……………	八九

九 肺癆（肺結核）方……………九〇

一〇 肺膿瘍及肺壞疽方……………九四

二 肺臟梅毒方……………九四

三 肋膜炎方……………九四

三 氣胸方……………九五

一四 胸水方……………九五

(B) 消化器病

一 口內炎方……………九六

二 鵝口瘡及水癌方……………九七

三 耳下腺炎方……………九七

四 胃痛及噯氣・吐酸方……………九七

五 胃酸過多方……………九九

六 胃酸減少方……………九九

七 胃擴張方……………九九

八 胃潰瘍方……………一〇〇

九 神經性嘔吐方……………一〇一

一〇 胃弛緩症方……………一〇一

二 貪食不飽及善饑症方……………一〇二

三 異嗜症方……………一〇二

三 胃梅毒方……………一〇三

四 腸炎方……………一〇三

五 蛔突炎及盲腸炎方……………一〇四

六 十二指腸潰瘍方……………一〇五

七 腸結核症方……………一〇五

八 腸出血方……………一〇五

九 腸穿孔方……………一〇六

一〇 腸癌腫方……………一〇七

二 直腸梅毒方……………一〇七

三 腸弛緩症方……………一〇七

三 腸狹窄症方……………一〇九

四 腸閉塞症（吐糞症）方……………一〇九

五 腸疝痛方……………一〇九

六 腸寄生蟲病方……………一〇九

七 肝臟充血方……………一一一

八 肝臟膿瘍方……………一一一

九 肝臟硬變方……………一一一

三〇	肝臟梅毒方	一一二
三〇	肝癌方	一一二
三〇	黃疸方	一一二
三〇	膽石症方	一一三
三〇	膽石痛方	一一三
三〇	脾臟病方	一一四
三〇	脾腫方	一一四
三〇	脾膿瘍方	一一四
三〇	脾癌及遊走脾方	一一四
三〇	腹水(水鼓)方	一一四
三〇	急性腹膜炎方	一一五
三〇	慢性腹膜炎方	一一五
(C)	循環器病	
一	心臟病方	一一五
二	神經性心悸亢進症方	一一七
三	絞心症(狹心症)方	一一八
四	動脈硬化及血壓過高方	一一九
五	動脈瘤方	一二一

臨床經驗處方目錄

(D)	泌尿生殖器病	
一	腎臟炎・腎盂炎及腎臟水腫方	一二一
二	腎膿瘍方	一二三
三	腎臟癌腫方	一二三
四	腎臟結核方	一二三
五	尿毒症方	一二三
六	腎石症及膀胱結石方	一二三
七	膀胱炎	一二四
八	遺尿症方	一二五
九	血尿方	一二五
一〇	陽萎方	一二六
二	遺精方	一二七
三	睪丸炎方	一二八
三	疼痛性陰莖勃起及攝護腺炎方	一二九
(E)	神經系病	
一	腦貧血方	一二九
二	腦充血方	一二九
三	腦出血方	一三〇

五

臨床經驗處方目錄

四	腦動脈栓塞血塞及腦膜出血方	一三一
五	腦腫瘍方	一三一
六	腦膿瘍及急性化膿性腦膜炎方	一三一
七	流行性腦脊髓膜炎方	一三一
八	脊髓炎及脊髓軟膜炎方	一三一
九	脊髓癆方	一三二
一〇	小兒急性脊髓前角炎方	一三二
一一	神經麻痺方	一三二
一二	神經痛方	一三三
一三	頭痛及偏頭痛方	一三四
一四	神經炎方	一三四
一五	癩癩方	一三六
一六	躁症方	一三七
一七	神經衰弱方	一三八
一八	暈船症方	一三九
(F)	血液病	
一	貧血方	一三九
二	萎黃病方	一四一

六

三	白血病方	一四二
四	紫斑病方	一四二
五	壞血病方	一四二
六	血友病方	一四三
(G)	新陳代謝病	
一	糖尿病方	一四三
二	尿崩症方	一四四
三	肥胖病方	一四五
四	痛風(尿酸性關節炎)方	一四五
五	關節及肌肉癱瘓質斯(風濕症)方	一四六
六	腳氣病方	一四七
七	佝僂病方	一四七
八	骨軟化症方	一四八
(H)	內分泌腺病	
一	粘液水腫及拔塞多氏病方	一四八
二	阿狄松氏病方	一四九
三	糖尿病及尿崩症方	一四九

第三章 小兒科劑處方……………一四九

一 鵝口瘡方……………	一四九
二 水瀉方……………	一五〇
三 生齒困難方……………	一五〇
四 小兒消化不良及吐瀉方……………	一五〇
五 遺尿症方……………	一五一
六 小兒急癩方……………	一五二
七 腦性靈變性小兒麻痺方……………	一五三
八 夜驚症及夜啼症方……………	一五三
九 小兒舞蹈病方……………	一五三
〇 佝僂病及胎生性軟骨萎縮症方……………	一五三
一 腺病・結核・貧血及虛弱慢性病方……………	一五四
二 腦水腫方……………	一五六
三 百日咳方……………	一五六
四 腸寄生蟲方……………	一五七
五 傷寒・發疹傷寒方……………	一五七
六 麻疹・痘瘡・水痘方……………	一五七

七 赤痢・瘧疾・流行性感胃方……………	一五七
八 腦脊髓膜炎・破傷風方……………	一五七
九 白喉・丹毒方……………	一五八
〇 糖尿病・尿崩症方……………	一五八
一 毛細氣管支炎・肺炎方……………	一五八
二 肋膜炎・腎臟炎方……………	一五八
三 拔塞多氏病・粘液水腫方……………	一五八
四 遺傳性梅毒方……………	一五八
五 急性鼻炎及喉頭炎方……………	一五八
六 結膜乾燥症(疳眼)・角膜軟化症・	
膿漏性結膜炎方……………	一五八
七 初生兒發熱方……………	一五八
八 初生兒黑吐症方……………	一五八
九 初生兒剝脫性皮膚炎方……………	一五九
〇 初生兒鞏硬症方……………	一五九
一 初生兒假死方……………	一五九
二 臍出血方……………	一五九
三 臍膿漏方……………	一五九

壹 臍瘻因方	一五九
貳 臍炎方	一五九

第四章 婦科劑處方

一 催進月經方	一五九
二 強壯卵巢調經方	一六〇
三 痛經（經來腹痛）方	一六二
四 月經過多（制經）方	一六三
五 白帶方	一六四

第五章 產科劑處方

一 妊娠性嘔吐方	一六五
二 子癰（妊癰）方	一六五
三 產褥熱・子宮內膜炎方	一六六
四 催奶方	一六七
五 產後貧血方	一六七
六 子宮弛緩症方	一六七
七 子宮外翻症方	一六八

八 陰道裂傷及會陰破裂方	一六八
--------------	-----

第六章 外科劑處方

一 癰腫・癰疽・膿瘍・肌炎・腱炎・骨髓炎・骨膜炎・膿胸・乳腺炎・血管炎・淋巴管及腺炎・關節炎等各種消炎方	一六八
A 外用消炎方	一六八
B 內服消炎方	一六九
二 外科消毒（殺菌防腐）方	一七一
三 防腐生肌方	一七三
四 止血方	一七四
五 止痛方	一七四
六 全身麻醉方	一七五
七 腰椎麻醉方	一七六
八 局部麻醉方	一七六
九 腐蝕劑方	一七七
一〇 火傷方	一七七

二	凍傷方	一七九
三	化膿性全身傳染方	一八〇
三	丹毒方	一八〇
四	破傷風方	一八〇
五	狂犬病方	一八〇
六	蛇咬症方	一八一
七	鼠咬症方	一八一
八	昆蟲刺整方	一八二
九	蜈蚣咬方	一八二
一〇	屍毒症方	一八二
二	狼瘡方	一八二
三	皮膚結核症方	一八三
三	潰瘍方	一八三
四	走馬疳方	一八四
五	痔瘡方	一八四
六	骨折及脫臼方	一八五
七	蛔突炎・盲腸炎・腹膜炎方	一八五
八	神經炎・肺結核・腹水・膀胱結石	一八五

臨床經驗處方目錄

第七章 皮膚病劑處方

一	濕疹方	一八六
二	脂漏性濕疹方	一八九
三	汗疱方	一九〇
四	尋常性乾癬方	一九一
五	傳染性膿疱疹方	一九二
六	紅色苔癬方	一九三
七	尋常性瘰癧方	一九四
八	面皰方	一九五
九	酒皰鼻方	一九五
一〇	帶狀匍行疹方	一九六
二	痒疹及皮膚搔癢症方	一九六
三	天疱瘡方	一九八
三	禿髮症方	一九九
四	黃癬及白癬方	二〇〇
五	頑癬方	二〇一

一六	癩風方	二〇二
一七	疥疥方	二〇三
一八	頭虱及陰虱方	二〇四
一九	狼瘡及皮膚結核方	二〇四
二〇	腺病性苔癬方	二〇四
二一	惡液質性瘡瘡方	二〇五
二二	癩病（麻瘋）方	二〇五
二三	魚鱗癬方	二〇六
二四	母斑方	二〇六
二五	雀斑方	二〇六
二六	肝斑方	二〇七
二七	疣贅方	二〇七
二八	胼胝腫及鷄眼方	二〇八
二九	紅斑性狼瘡方	二〇八
三〇	尋常性白斑（白癩風）方	二〇九
三一	鞏皮症方	二〇九
三二	尋麻疹方	二一〇
三三	急性限局性皮膚水腫方	二一一

第八章 花柳科劑處方

一	多形滲出性紅斑方	二一一
二	結節性紅斑方	二一一
三	腫瘍方	二一二
四	藥疹方	二一二
五	多汗症方	二一二
六	腋臭（腋窩多汗症）方	二一三
七	無汗及少汗症方	二一四
八	爪甲黃癬及白癬方	二一四
九	爪甲炎方	二一四
一〇	爪甲萎縮症及爪甲彎曲症方	二一四
一一	初期梅毒（硬性下疳）方	二一四
一二	混合性下疳方	二一五
一三	梅毒性橫痃方	二一五
一四	第二期梅毒方	二一六
一五	第三期梅毒方	二一七
一六	先天梅毒（遺傳梅毒）方	二一九

七	男子淋病方	二二〇
八	淋病內服方	二二二
九	龜頭包皮炎方	二二四
一〇	淋疾性橫痃方	二二五
二	副睪丸炎方	二二五
三	膀胱炎方	二二六
三	攝護腺炎方	二二六
四	精囊炎方	二二六
五	尿道狹窄方	二二六
六	淋毒性關節炎方	二二六
七	淋毒性內膜炎方	二二七
八	淋毒性結膜炎(膿漏炎)方	二二七
九	女子淋病方	二二七
一〇	軟性下疳方	二二八

第九章 眼科劑處方

一	眼洗滌及器包方	二二九
二	眼臉水泡疹方	二二九

三	眼臉濕疹方	二二九
四	眼部癰腫方	二三〇
五	眼瞼緣炎方	二三一
六	麥粒腫方	二三一
七	淚腺炎方	二三二
八	淚囊炎方	二三二
九	結膜炎方	二三二
一〇	顆粒性眼膜炎(砂眼)方	二三三
二	水泡性結膜炎(腺病性結膜炎)方	二三四
三	淋毒性結膜炎(膿漏眼)方	二三四
三	結膜乾燥症(疳眼)方	二三五
四	實質性角膜炎方	二三六
五	水泡性角膜炎(腺病性角膜炎)方	二三六
六	角膜炎(肉攀睛)方	二三六
七	角膜潰瘍方	二三七
八	角膜軟化症方	二三七
九	角膜翳方	二三八
一〇	鞏膜炎方	二三八

臨床經驗處方目錄

一一

第十章 耳鼻咽喉科劑方……………二四一

一 急性限局性外聽道炎方……………	二四一
二 急性瀰漫性外聽道炎方……………	二四二
三 盯瞤栓塞方……………	二四二
四 急性鼓膜炎方……………	二四二
五 慢性鼓膜炎方……………	二四三
六 急性中耳炎方……………	二四三
七 慢性中耳炎方……………	二四四
三 虹彩炎及毛樣體炎方……………	二三八
三 網膜炎方……………	二三九
三 脈絡膜炎方……………	二三九
三 視神經炎及視神經萎縮方……………	二四〇
三 全眼球炎方……………	二四〇
三 白內障及綠內障方……………	二四〇
三 夜盲症方……………	二四〇
三 眼精疲勞症方……………	二四〇
三 眼外傷方……………	二四一

第十一章 齒科劑處方……………二五二

一 齶齒（蛀牙）方……………	二五二
二 齒齦炎方……………	二五二
三 齒膜炎方……………	二五二
八 耳茸方……………	二四四
九 乳嘴突起骨膜炎方……………	二四四
〇 急性鼻炎方……………	二四五
二 慢性鼻炎方……………	二四六
三 惡臭鼻漏方……………	二四六
三 衄血（鼻血）方……………	二四七
四 咽頭炎及扁桃腺炎方……………	二四七
五 喉頭炎方……………	二四八
六 聲門水腫方……………	二四九
七 聲門痙攣方……………	二四九
八 喉頭結核及喉頭潰瘍方……………	二五〇
九 白喉方……………	二五一
〇 喉腫瘍方……………	二五一

四	齒齦炎方	二五三
五	齒齦出血方	二五三
六	齒齦瘻肉方	二五四
七	齒石方	二五四
八	齒痛方	二五四
第十二章 急救科劑處方 二五五		
一	服毒方	二五五
(附)	各種中毒急救摘要	二五五
二	創傷・出血・骨折・脫臼方	二五八
三	咬傷・火傷・凍傷・電傷方	二五八

臨床經驗處方目錄

續篇

第一章	退熱劑處方	一	第十八章	止血劑處方	八
第二章	興奮劑處方	二			
第三章	瀉下劑處方	二			
第四章	利尿及尿防腐劑處方	二			
第五章	發汗及制汗劑處方	三			
第六章	祛痰劑處方	四			
第七章	鎮痛劑處方	四			
第八章	鎮靜鎮痙劑處方	五			
第九章	鎮吐劑處方	五			
第十章	麻醉劑處方	五			
第十一章	催眠劑處方	六			
第十二章	健胃消化劑處方	六			
第十三章	補劑(強壯劑)處方	六			
第十四章	補精壯陽處方	七			
第十五章	營養劑處方	七			
第十六章	止瀉劑處方	七			
第十七章	驅虫劑處方	八			
			第一章	傳染病劑處方	九
			一	傷寒方	九
			二	霍亂方	九
			三	痢疾方	一〇
			四	鼠疫方	一〇
			五	白喉方	一一
			六	腦膜炎方	一二
			七	丹毒方	一三
			八	破傷風方	一三
			九	流行性感胃方	一三
			十	癩疾方	一四
			十一	再歸熱方	一四
			十二	敗血膿毒症方	一五
			十三	猩紅熱方	一五

第二章 內科病處方

十四 麻疹風疹水痘方	一五
十五 疔瘡(天花)方	一六
十六 流行性耳下腺炎方	一六
十七 黑熱病方	一七

A 呼吸器病

一 氣管支炎方	一七
二 腐敗性氣管支炎方	一九
三 氣管支喘息方	一九
四 肺炎方	二〇
五 肺水腫方	二〇
六 肺結核方	二〇
七 肋膜炎方	二一

B 消化器病

一 口內炎方	二一
二 口頬壞疽方	二二
三 胃酸過多方	二二
四 胃酸缺乏方	二三
五 胃擴張方	二三
六 胃潰瘍方	二四

七 神經性嘔吐方	二五
八 胃弛緩症方	二五
九 腸炎方	二五
十 盲腸炎方	二六
十一 腸結核方	二六
十二 腸出血方	二六
十三 腸穿孔方	二七
十四 腸弛緩方	二七
十五 腸閉塞症方	二七
十六 腸痛症方	二七
十七 腸寄生蟲方	二八
十八 黃疸方	二八
十九 胆石症方	二九
二十 腹水方	二九
二十一 腦膜炎方	三〇

C 循環器病

一 心臟病方	三〇
二 動脈硬化及血壓過高方	三一
三 血壓過低方	三一

D 泌尿生殖器病

泌尿生殖器病	三一
--------	----

一	腎炎方	三三	一	貧血方	四一
二	腎盂炎方	三四	二	萎黃病方	四二
三	腎結核方	三四	三	白血病方	四二
四	尿管症方	三四	四	紫斑病方	四二
五	膀胱炎方	三五	五	壞血病方	四二
六	血尿方	三六	六	血友病方	四三
七	陽萎方	三六	G 新陳代謝病		
八	遺精方	三六	一	糖尿病房	四四
九	睪丸炎方	三六	二	尿崩症方	四四
E 神經系病			三	肥胖病房	四四
一	腦出血方	三七	四	宿風方	四五
二	脊髓癆方	三八	五	關節及肌肉僵硬實斯方	四五
三	神經痛方	三八	六	腳氣病房	四六
四	頭痛及偏頭痛方	三九	七	骨軟化病房	四六
五	神經炎及多發性神經炎方	三九	H 內分泌腺病		
六	癱瘓方	四〇	一	巴錫陀氏病房	四六
七	臟躁症方	四〇	二	粘液水腫方	四七
八	神經衰弱方	四〇	三	阿狄森氏病房	四七
九	暈船症方	四一	第三章 小兒科劑處方		
F 血液病			一	鴉口瘡方	四七

二 生齒困難方	四七	第六章 外科劑處方	五三
三 小兒消化不良及吐瀉方	四八	一 癰腫、癰疽、膿瘍、肌炎、腱炎、骨髓炎、骨膜炎、膿胸、乳腺炎、血管炎、淋巴管及腺炎、關節炎等各種消炎方	五三
四 遺尿症方	四八	(甲) 外用消炎方	五四
五 小兒急痢方	四九	(乙) 內服及注射消炎方	五四
六 佝僂病方	四九	外科消毒(殺菌防腐)方	五五
七 腺病，結核，貧血及虛弱慢性病方	五〇	止血方	五六
八 百日咳方	五〇	止痛方	五六
九 腸寄生蟲病方	五〇	全身麻醉方	五六
第四章 婦科劑處方	五〇	四 止血方	五六
一 催進月經方	五一	五 全身麻醉方	五六
二 痛經方	五一	六 腰椎麻醉方	五六
三 月經過多方	五一	七 局部麻醉方	五六
四 白帶方	五一	八 火傷方	五七
第五章 產科劑處方	五一	九 凍傷方	五八
一 妊娠期嘔吐方	五一	十 代膿性全身傳染方	五九
二 子癲方	五一	十一 狂犬病方	五九
三 產褥熱方	五二	十二 蛇咬症方	五九
四 催乳方	五三	十三 鼠咬症方	五九
五 產後貧血方	五三	十四 昆蟲刺整方	五九
六 子宮弛緩症方	五三	十五 狼瘡方	六〇

十六	潰瘍方	六〇	十六	雀斑方	六七
十七	走馬疔方	六〇	十七	胼胝腫及鷄眼方	六七
十八	痔瘡方	六一	十八	尋麻疹方	六七
十九	盲腸炎及腹膜炎方	六一	十九	多汗症方	六八
第七章	皮膚病劑處方	六一	第八章	花柳科處方	六八
一	濕疹方	六一	一	初期梅毒（硬性下疳）方	六八
二	汗皰方	六一	二	梅毒性橫痃方	六八
三	尋常性乾癬方	六一	三	第二期梅毒方	六八
四	傳染性膿疱疹方	六二	四	第三期梅毒方	七〇
五	紅色苔癬方	六三	五	先天梅毒方	七〇
六	尋常性瘡瘡方	六三	六	淋病方	七〇
七	酒皰鼻方	六四	七	膀胱炎方	七一
八	帶狀皰疹方	六四	八	軟性下疳方	七一
九	痒疹及皮膚搔痒方	六四	九	鼠蹊淋巴肉芽腫方	七一
十	天疱瘡方	六四	十	花柳性肉芽腫方	七一
十一	疥癬症方	六五	第九章	眼科劑處方	七二
十二	疥瘡方	六五	一	眼瞼緣炎方	七二
十三	頭虱及陰虱方	六六	二	麥粒腫方	七二
十四	麻風病方	六六	三	霰粒腫方	七二
十五	魚鱗癬方	六七	四	結膜炎方	七二

五 砂眼方.....	七三	五 急性鼻炎方.....	七六
六 水泡性結膜炎(腺病性結膜炎)方.....	七三	六 慢性鼻炎方.....	七七
七 淋毒性結膜炎(膿漏眼)方.....	七三	七 惡臭鼻漏方.....	七七
八 結膜乾燥症方.....	七三	八 鼻血方.....	七七
九 實質性角膜炎方.....	七四	九 咽頭炎及扁桃腺炎方.....	七八
十 水泡性角膜炎方.....	七四	十 喉頭結核及喉頭潰瘍方.....	七八
十一 角膜寶奴司(翼狀胬肉)方.....	七四	十一 白喉方.....	七八
十二 角膜潰瘍方.....	七四	十二 喉腫瘍方.....	七九
十三 角膜軟化症方.....	七四	第十一章 齒科劑處方.....	七九
十四 鞏膜炎方.....	七四	一 齶齒(蛀牙)方.....	七九
十五 虹膜炎及睫狀體炎方.....	七四	二 齒髓炎方.....	八〇
十六 視網膜及脈絡膜炎方.....	七五	三 齒膜炎方.....	八〇
十七 全眼球炎方.....	七五	四 齒齦炎方.....	八〇
第十章 耳鼻喉科劑處方.....	七五	五 齒齦出血方.....	八〇
一 急性外聽道炎方.....	七五	六 齒痛方.....	八〇
二 鼓膜炎方.....	七五	第十二章 急救科劑處方.....	八〇
三 中耳炎方.....	七五	一 服毒方.....	八〇
四 乳嚙突起骨膜炎方.....	七六		

臨床經驗處方

張崇熙醫師編

總論

處方 (Rezept, Arzneiformel) 者。即醫師所授患者之藥方。其記載順序。先寫患者之姓名，診病之月日，次書藥名及分量，再次記調製或用法。最後爲醫師簽字。此係歷來處方一定之格式也。中醫用藥。有所謂君，臣，佐，使。西醫處方。亦分主，輔，矯味，賦形等數種。分述其意義如左。

(一) 主藥 (Basis, Hauptmittel) 即對疾病可奏主要功效之藥。關係重大。不可不審慎應用。

(二) 輔藥 (Adjvans, Unterstützungsmittel) 一名佐藥。即輔助主藥效力，或防遏其不快副作用而用之藥。是否當用。宜視主藥性質及病情而決定。

(三) 矯味藥 (Corrigens, Verbesserungsmittel) 一名調味藥。即矯正藥劑之不良氣味，使容易內服而用之藥。例如糖漿，薄荷水等屬之。

(四) 賦形藥 (Constituens, Formgebendesmittel) 一名成形藥。即用以混和各藥，使成一定形態之藥品。例如蒸餾水，乳糖，凡士林等屬之。

曩昔處方。分東西兩派。今則東派漸見淘汰（藥名寫譯文者）。處方藥名大概全用拉丁原文。惟方末用法一項。各國均以本國文字為記載。現時吾國醫界。寫法亦不一致。有用德文或拉丁文。亦有用英文或中文。均可隨醫師意旨而自定。

(院址) 梅白格路金樁里
電話 三八八二
(分院) 大西路五八一號
電話 二〇〇八〇

滬太醫院
主 任 張 崇 熙 醫 師

WU TAI HOSPITAL
DR. C. H. CHANG. M. D.

診 時
出診預約
上午在分院應診
下午在總院應診
深夜謝絕

For _____ Shanghai, _____ 19 _____

Rp.

Kali jodat 1.5

Tinc amara 2.0

Sirup simplex 10.0

Aq dest 100.0

S. Täglich 3 Mal nach jeder

Mahlzeit z. n.

_____ M. D.

(附註) 上列處方。第一種即主藥，第二種即防止不快副作用之輔藥，第三種，即使成甜味之矯味藥，第四種，即賦形藥。上列處方中之末段德文字句。譯意為「記載，每日三次，食後分服」。

處方中應用之拉丁文。通常不將原文完全寫出。多用縮寫。現將最常用之縮寫字母舉述如下

縮寫

拉丁原文

解釋

aa.

ana

各，等量

ad (add).

adde

加入

q.

Cum

以

d.

da, des

授以

s.

Signa

紀載

q. s.

Quantum Satis

適量

D. T. d.

Dentur Tales dosis

授與同量

F. Ft.

Fiat, Fiant

配製

M. F.

Misce Fiant

混合製之

No. Nr

Numerus,

數

us Int.

Usum Internum

內用

ad us. ext.

ad usum externum

外用

Gtt.

Gutta

滴用

Sol.

Solutio

溶液

Pill

Pilulae

丸

臨床經驗處方

四

Ungt.	Unguentum	軟膏
aq. dest.	Agua Destillata	蒸餾水
Col	Colatura	濾過
Conc	Concentratum	濃厚
Dil	Dilue	沖淡
Dim	Dimidiis	半量
Coq	Coque	煮沸
Ft. Pul.	Fiat Pulvis	配散劑
Mist	Mistura	水劑
Garg	Gargarisma	含嗽劑
Infus	Infusum	浸劑
Emuls	Emulsio	乳劑
Ol	Oleum	油
M. D. S.	Misce, Detur, Signatur	混和書明用法給與
D. Tar. dos	Dentur Tales Doses	與以等量
T. I. d.	Ter in Die	一日三次
Omni. Hor	Omni Hora	每小時
h. s.	Hora Somni	就寢前

處方中常用之德文。舉述如下。

德文

Innerlich
Äußerlich
Zur Waschung
Zur Umschlagen
Zur Einreiben
Zur Inhalation
Zum Klistieren
Zum Getränk
Zum Augentropfen
Zum Babinsehn
Streupulver
Mundwasser
Opium Gelatin
Lösung
Tablets
Wie Oben

解釋

內用

外用

爲洗滌劑

爲覆包劑

爲塗擦劑

爲吸入劑

爲灌腸劑

爲飲料

爲點眼劑

爲搽布劑

撒布劑

含嗽劑

膠囊

溶液

錠劑，片

同上樣

Flasche (習慣寫英文 Bottle, bot)

Boxen (習慣寫英文 Box)

Ampul e

2 Stü dlich 1 Esslöffel

Jede 2 Stü dlich 1 Kinderlöffel

3 Täglich Mal zu nehmen

Auf Ein Mal zu nehmen

Täglich 3 Mal 1 Pill

Täglich 3 Mal 1 Pulver

Täglich 3 Mehrmal

Vor dem Schlafengehen z. n.

Beim Schläfe z. n.

In Nüchtern z. n.

Jede Mahlzeit 1 Esslöffel

Morgens und Abends z. n.

Beim Husten 10 Tropfen z. n.

Beim Fieber Auf Einmal z. n.

Auf Einmal z. n. mit Oblaten

瓶

盒

玻璃管

二小時一食匙

每二小時一小兒匙

每日三次分服

一次頓服

每日三次各一九

每日三次各一包

每日多次

臨睡前服

近睡時服

空腹服

每食後一食匙

早晚分服

咳嗽時服十滴

發熱時一次頓服

一次服，用軟膠紙包

Teile 3 Stunde 1 Weisglas

1 bis 2 Pillen Auf Einmal

Täglich 3 Mal nach jeder Mahlzeit 1 Pulver

Täglich 3 Mal Für 2 Tage z. n.

10—20 Tropfen in Wasser 1 Stunde nach dem Essen

2 Bis 3 Mal Täglich 10 Tropfen

5 Minuten 1 Theelöffel bis zur Wirkung

In Suppe oder in Bier z. n.

Täglich 3 Pulver in Oblaten

Abends zu Nennen, Wasser Nachtrinken lassen

Abends in etwas Wasser zu nehmen

Abends 1 Pulver in Warmwasser

Ausserlich zum Einpinseln

Bei Nüchternem Magen Auf Einmal z. n.

Morgens und Abends 1 Pulver durch 3 Tage

Morgens 1 Pulver nach der Frühstück

Täglich Mehrmals zu Gebrauchendes Munderwasser

Mehrals Täglich in 2 Tagen

每三時服半茶匙

一至二粒一次

一日三次每食後一包

一日三次二日分服

十至廿滴加入水中，食後半小時服

一日二至三次十滴

十五分鐘一食匙至奏效為止

放入湯中或啤酒中服

每日三包，包於膠紙

晚間服，服後飲水

晚間和入少量之水服下

晚間一包放入溫水

作外部塗布用

空腹時一次頓服

三日間早晚一包

晨間一包早餐後服

每日多次含嗽用

一日數回，二日分服

臨床經驗處方

八

Zur Subkutanen oder Intravenösen Injection Täglich 3 bis

6 Mal eine Spiritze

皮下或靜脈注射一日三次至六次一筒

各論

第一章 退熱劑處方

一 各種發熱一般退熱劑

- (一) 阿司必林 Aspirin 〇・五
上爲一包臨臥頓服
- (二) 安替疋林 Antipyrin 二・〇
乳糖 Sacch lact 二・〇
上混和分爲六包，一日三次，二日分服
- (三) 薩里匹林 Salipyrin 二・〇
上分三包，一日分服
- (四) 正拉密洞 Pyramidon 一・二
乳糖 Sacch lact 二・〇
上分六包，一日三次分服，二日量
- (五) 飛那西汀 Phenacetin 〇・五

上爲散劑一包，與等量三包，一日三四分服

- (六) 安替飛孛林 Antifebrin 〇・三
白糖 Sacch alba 〇・三
上爲一包，給等量三包，一日三次分服
- (七) 水揚酸鈉 Nat. Salicylicum 三・〇
重曹 Nat. bicarbonicum 二・〇
糖漿 S. S. 一〇・〇
溜水 Aq. dest 二〇〇・〇
上一日三次，二日分服
- (八) 克利金 Cryogenine 一・五
乳糖 Sacch lact 一・五
上分三包，一日分服
- (九) 阿卡奴 Arenol 三片
上一日三次分服

臨床經驗處方

10

一 弛張性熱及瘧疾退熱方

- | | | | |
|------|---------------------------------|-----|--|
| (10) | 加當 Gardan | 三片 | |
| | 上一日三次，每次一片 | | |
| (11) | 蓬祕靈 Bonpyrin | 1·5 | |
| | 龍膽根末 Pulv. Radix Gentianae 〇·六 | | |
| | 上為二包，二日分服 | | |
| (12) | 蓬祕靈奎寧片 Bonpyrin Quinine Tab. 六片 | | |
| | 上每日三次各二片 | | |
| (13) | 特別賴爾 Thieryral | 1·5 | |
| | 上分二包，一日三次分服 | | |
| (14) | 新亞斯片 Simushin Tab. | 三片 | |
| | 上一月三次分服 | | |
| (15) | 司泰靈 Sturin | 三片 | |
| | 上一日三次分服 | | |
| (16) | 福白龍片 Febnon Tableta | 九片 | |
| | 上一日三次，每次三片 | | |
-
- | | | | |
|-----|---------------------------------|--|--|
| (1) | 鹽酸規甯 Chinin hydro-chloricum 〇·五 | | |
| | 上裝入膠囊，一次頓服（瘧疾須於發作前四五小時服） | | |
| (2) | 鹽酸規甯 Chinin hydrochloricum 1·〇 | | |
| | 上分裝膠囊六個，一日三次各一個，二日服完 | | |
- (註) 規甯亦有製成之藥片，便利內服，亦可應用。
- | | | | |
|-----|---------------------|-----|--|
| (3) | 歐規甯 Euehinin | 1·〇 | |
| | 上為散劑，一次頓服 | | |
| (4) | 福白龍片 Febnon Tab. | 五片 | |
| | 上於瘧疾發作前一次頓服 | | |
| (5) | 阿立斯妥清 Aristochin | 六片 | |
| | 上每日三次各一片，二日服 | | |
| (6) | 克瘧寶 Quinolbin | 1〇片 | |
| | 瘧疾發作前頓服四片，其餘一日三次各二片 | | |
| (7) | 瘧滌平(阿的平) Atebrin | 十五片 | |

(註) 阿司必林，安替正林，薩里正林，克利金等。均有錠劑製成者出售。使用較為便利。其用量可視每錠中所含主藥分量為標準。或用一片或二三片。完全與普通所用藥量相仿為適合。

上每日三次，每次一片，連服五日

(八) 撲瘧母星 *Plasmoquine* 九片
上每日三次每次一片 (此方繼續上方連服最效)

服最效)

(九) 鷄納撲瘧母星 *Quino-plasmoquine* 十五片
上每日三次，食後各一片。

(十) 殺瘧萬能 *Chinormina* 六片
上每日三次，每次一片

三 肺癆性發熱退熱方

(一) 愛爾邦 *Elbon* 三・〇或三片
上一日三次分服

(二) 愛迪那爾 *Aethynal* 三・〇
上分三包，一日三次分服

四 炎症性(化膿性)退熱方

詳見外科劑處方中。

(附) 一般退熱注射藥

重鹽酸規寧 *Quinine Dihydrochloride*・規甯烏
來坦 *Quinine Urethane*・福白龍 *Febnon*・沸

臨床經驗處方

李隆 *Fiberung*・敗熱速 *Bacsal*・巴苦諾恩 *Ba*

enon・百克諾恩 *Paenon*・退熱平 *Tanonpen*・

熱禍辟盡 *Neopyretin*・蓬祕靈 *Bonpyrin*。

握姆納丁 *Omnadin*・安替保 *Antipol*・愛而斯

丁 *Fustin*・百乃定 *Panadin*・萬應乃丁 *Vinatin*

・息熱定 *Sinadin*・抗熱元 *Confefrogen*・伐熱

丁 *Vinutin*。

(附) 細菌傳染性(敗血性)高熱注

射藥

百浪多息 *Prontosil*・沙呂賽勃他星 *Solu-Sep-*

tazine・百膿清 *Pronzin*・滅多病 *Metabin*。

電銀膠 *Electargol*・電化可拉哥耳 *Electrocol-*

Iargol・銀愛齊克勞益多 *Eleclodid Silver*・拿佛

哥電膠銀 *Novargol*。

(附) 急性傳染病高熱注射用之各

種固有血清

傷寒血清 *Antityphoid Serum*・白喉血清 *Anti*

Dyphtheria-Serum・共生血清 *Symbiose Se-*

- rum, 腦膜炎血清 Anti Meningococcus Serum.
 鼠疫血清 Anti Plague Serum, 破傷風血清
 Anti Tetanus Serum, 猩紅熱血清 Anti Scar-
 latina Serum, 丹毒血清 Anti Erysipelas Se-
 rum, 肺炎血清 Anti Pneumococcus Serum.
 赤痢血清 Anti Dysenterie Serum.

(附) 回歸熱及惡性瘧之注射藥

新洒爾佛散 Neosalvarsan, 撲瘧母星 Plasmoquine
 , 鷄納撲瘧母星 Quino-Plasmoquine.

第二章 興奮劑

- (一) 精製樟腦 Camphor depurata 1.00
 白糖 Sacch alba 5.00
 上分爲十包, 每一時服一包
- (二) 可拉明 Coramine 3.00
 烏維透賓 Urotropin 2.00
 糖漿 Sirup simplex 1.00
 溜水 Aq dest 1.00

上三次分服, 一日量

- (三) 科德孝 Cadechol 六片
 上每日三次各二片

- (四) 毛地黃丁幾 Tine Digitalis 1.5
 斯忒羅仿丁幾 Tine Strophanthi 1.0

- 糖漿 Sirup simplex 5.0
 溜水 Aq dest 1.00
 上每二小時服一格

- (五) 毛地黃葉浸 Inf. Folia Digitalis (0.6) 1.00
 糖漿 Sirup simplex 1.00
 苦味丁幾 Tine amara 2.00

上一日三次二日分服

- (六) 毛地黃丁幾 Tine Digitalis 1.5
 番木甏丁幾 Tine Strychnina 1.0

- 赤葡萄酒 Rotwein 1.5
 糖漿 Sirup simplex 1.0
 溜水 Aq dest 1.00

上每二小時服一食匙

(七) 咖啡鱒 Caffein

乳糖 Sacch lact

上為一包，與等量三包，一日分服

(八) 安息香酸咖啡 Caffein Nat. benzoicum

精製樟腦

乳糖 Sacch lact

上分六包，每二小時服一包

(九) 狄加林 Digalen

糖漿 Sirup simplex

溜水 Aq dest

上一日三次，一日分服

(十) 海葱末 Pulv Bulbus scillae

毛地黃葉末 Pulv Folia Digitalis

白糖 Sacchar. alba

上混和，與同量十包，一日數次，每次

一包

(二) 毛地黃葉末 Pulv Folia Digitalis

精製樟腦 Camphor depurata

咖啡鱒 Caffein

乳糖 Sacch lact

上混和頓服，每三時間一次

(三) 卡代柴而 Cardiazol

上每日四次分服，每次一片

(三) 復力靈 Folinerin

上每日三次，每次二片

(四) 樂黛靈液 Liq. Rodealin

含糖百布聖 Pepsin sacchar.

稀鹽酸 Acid hydrochloric. diluti

溜水 Aq dest

上一日三次分服

(五) 布福他利斯 Butofalis

上每日三次，每次三片

(六) 萬羅地僅 Verodigen

臨床經驗處方

一三

三片

九片

一〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

臨床經驗處方

上每日三次，每次一片

(一七) 卡狄司 Cardase 三・〇

毛地黃丁幾 Tinc Digitalis 一・五

溜水 Aq dest 六〇・〇

上每日三次分服

(一八) 尼可命 Nicomin 六・〇

杏仁水 Aq Laurocerac 三・〇

葡萄酒 Rotwein 一〇・〇

溜水 Aq dest 六〇・〇

上每日三次，每次二格，一日服完

(一九) 樟腦 Camphor 〇・二

卵黃 Eigelb 一個

阿片丁幾 Tinc Opium 〇・五

溜水 Aq dest 一〇〇・〇

上混和為乳劑灌腸

(二〇) 芥子精 Spiritus sinapis 九五・〇

杜松實油 Ol Juniperi 五・〇

一四

上為皮膚擦劑

(三二) 芥子 Semen sinapis 五〇・〇

上放入溫水洗浴用

(三三) 銻水 (阿母尼亞水) Tiq Ammoniac 適量

上倒在棉花置患者鼻部。使之適宜吸入

(附) 興奮劑注射藥

樟腦油注射液 Ol Camphor, 樟腦水溶液 Camphor Solution, 可拉明 Coramine, 康福那心

Camphonasin, 可羅那金 Calonasin, 海克賽通

Hexetone, 狄茄令 Digalen, 樂百齡 Lobelin

純葡萄糖注射液 Glucose Solution。斯忒維仿丁

(唐毗箭毒子素) Strophantin, 硝酸士的年 Sty

-ehinin nitricum, 鹽化腎上腺液 Adrenalin

chloride, 安息香酸鈉咖啡精 Caffeine Nat-Ben

zoicum。

卡代柴而 Cardiazol, 伊可賴 Icoral, 樂黛靈

Rodealin, 維他康復 Vitacamphor, 卡狄司

Cardase, 開提心 Cardisin, 洋地黃精 Dig talin

• 布福他利斯 *Butebalis* • 樟腦樂地儂 *Kampher-Lodinon* • 葡萄糖康福那心 *Camphonasin Glucose* 新亞樂彼利 *Sinolobabi*。

第三章 瀉下劑處方

- (一) 蓖麻子油 *Ol Ricini* 15-20.0
上一次頓服
- (二) 蓖麻子油 *Ol Ricini* 40.0
阿拉伯樹膠 *Gummi arabicum* 10.0
糖漿 *Sirup simplex* 20.0
溜水 *Aq dest* 140.0
上混和爲乳劑，每二小時服一食匙，至下瀉爲度
- (三) 阿開司多 *Arcastol* 15-20.0
上一次頓服
- (四) 樂家之油 *Ro-Cast-Oil* 10-30.0
上一次於空腹時頓服

- (五) 阿加路 *Agarol* 50.0
上每臨睡前服一食匙
- (六) 大黃浸 *Inf. Radix Rhei* (6.0) 180.0
重碳酸鈉 *Nat. bicarbonicum* 6.0
薄荷油 *Ol Menthol* 四滴
糖漿 *Sirup simplex* 20.0
上混和，每二三時服一食匙
- (七) 硫酸鈉 *Nat. sulfuricum* 30.0
大黃糖漿 *Sirup Rhei* 20.0
溜水 *Aq dest* 180.0
上每小時服一食匙，至瀉下爲度
- (八) 人工加爾斯泉鹽 *Sal carolinum factitium* 15.0
上溶於溫水中一次頓服
- (九) 硫酸鎂 *Mag. sulfuricum* 20.0
上溶於溫水中頓服
- (十) 硫酸鎂 *Mag. sulfuricum* 20.0

臨床經驗處方

臨床經驗處方

一六

苦味丁幾 <i>Tinc amara</i>	二〇〇	(一七)	阿路芬丸 <i>Pill Alophan</i>	二粒
糖漿 <i>Sirup simplex</i>	一〇〇〇		上一次頓服	
溜水 <i>Aq dest</i>	一〇〇〇〇	(一八)	導便穀 <i>Normacol</i>	三〇〇〇
上混和，一日二次分服			上每次一二茶匙，以溫水送下，食後服	
(二) 大黃末 <i>Pulv Rhei</i>	二〇〇	(一九)	一掃散 <i>Isacen</i>	二粒
重碳酸鈉 <i>Nat. bicarbonicum</i>	三〇〇	(二〇)	芬奴拉克藥糖 <i>Fructinolax Wafers</i>	二片
上分三包，一日三次各一包			上晚間睡前頓服	
(三) 甘汞 <i>Calomel</i>	〇・五	(二一)	俾西瀉藥 <i>Fructines-Vichy</i>	二片
乳糖 <i>Sacch lact</i>	〇・五	(二二)	上臨睡前一次頓服	
上混和一次頓服				
(三) 甘汞錠 <i>Pastill Calomel (〇・二五)</i>	二片	(二三)	一試滌淨 <i>Istizin</i>	二片
上一次頓服			上臨睡前一次頓服	
(四) 複方大黃丸 <i>Pill Rhei compositae</i>	三粒	(二四)	一粟通 <i>Isaton</i>	〇・二或二片
上臨臥頓服			上臨睡一次頓服	
(五) 蘆薈丸 <i>Pill Aloe</i>	十二粒	(二五)	阿布夫林 <i>Abfurin</i>	二片
上每日三次，每次二粒			上臨睡一次頓服	
(六) 加司加拉錠 <i>Pastill cascara sagrada</i>	四片	(二六)	拉矢輕 <i>Laxasen</i>	二片
上每臨睡前服二片			上臨睡一次頓服	

瀉下劑外用方

- (三六) 甘油 Glycerin 110—130.0
上為灌腸用
- (三七) 甘油坐藥 Supposit Glycerin 一個
上插入肛門
- (三八) 橄欖油 Ol Olivarum 110—130.0
上為灌腸用
- (三九) 藥用石鹼 Sapo Medicatus 100.0
溜水 Aq dest 500.0
上為灌腸用
- (四〇) 食鹽 Nat. chloratum 50.0
溜水 Aq dest 500.0
上為灌腸用

第四章 利尿及尿防腐劑處方

一 利尿劑處方

- (一) 醋酸鉀 Kali aceticum 6.0
硝酸鉀 Kali nitricum 6.0
糖漿 Sirup simplex 10.0
溜水 Aq dest 100.0
上一日三次，二日分服
- (二) 毛地黃葉浸 Inf Folia Digitalis (1.0) 180.0
醋酸鉀液 Liq Kali acethici 20.0
苦味丁幾 Tinc amara 3.0
糖漿 Sirup simplex 10.0
上一日三次，二日量
- (三) 狄午雷汀 Diuretin 3.0
上分三包，一日分服
- (四) 替俄金 Theophyllin 0.6
狄午雷汀 Diuretin 1.5
糖漿 Sirup simplex 10.0
溜水 Aq dest 100.0
上一日三次分服

(五) 阿辯靈 Agurin 十二片

上每日三次，每次二片

(六) 太半利定 Takalidin 三・〇或六片

上一日三次分服

(七) 鈣化代猶嚕忒 Calcium Diuretin 六片

上每小時服一片，一日數次

(八) 烏利鈣片 Diurecol Tablets 十二片

上每日三次，每次二片，二日量

(註) 毛地黃葉，安息香酸咖啡鈉，咖啡鹼等。除強心興奮外，亦兼有利尿功效。惟不及本類作用之顯著。

二 尿防腐劑處方

(一) 科派巴樹脂 Balsam Copaivae 〇・五

上入膠囊，與等量十二個，一日三次，

每食後服二個

(二) 科派巴藥片 Copaivae Tablets 十二片

上每日三次，每食後二片

(三) 萼澄茄膏 Ext Cubebae 三・〇

上分三包，一日分服

(四) 白檀油 Ol Santal 〇・三一〇・五

上入膠囊，與等量六個，一日三回分服

(五) 亞萊華勒 Arheol 十二片

上每日三次，每次二片

(六) 戈諾山 Gonosan 十二個

上每日三次各二個

(七) 薩梯耳 Santyl 十八粒

上每日三次，每次二粒

(八) 烏羅透賓 Urotropin 三・〇

醋酸鉀 Kali acetici 四・〇

糖漿 Sirup simplex 一〇・〇

溜水 Aq dest 一〇〇・〇

上每日三次，每次一格，二日分服

(九) 烏羅透賓片 Urotropin Tablets 十二片

上每日三次，每次二片

(十) 午乏午耳西葉浸 Inf Folia Uvae Ursi

(一〇・〇) 一八〇・〇

糖漿 *Sirup simplex*

二〇・〇

上每日三次，二日分服

(一) 海而密安 *Hemitol*

十二片

上每日三次，每次二片

(二) 護爾顏靈 *Uripurin*

十二片

上每日三次，每次二片

(三) 嗽華葉素 *Uvarsol*

六・〇

烏羅透蜜 *Urotropin*

三・〇

糖漿 *S. S.*

一〇・〇

餽水 *Aq. dest*

一〇〇・〇

上一日三次，二日分服

(四) 薩羅耳 *Salol*

一・五

上分三包，一日分服

(五) 包尅淋 *Buccosperin*

十八片

上每日三次，每次二片

(六) 安樂穩 *Arhovin*

十八粒

上每日三次，每次二粒

(七) 歐布他爾 *Obutal*

十八粒

上每日三次，每次二粒

(八) 必可尅淋 *Piccolchrome*

十八粒

上每日三次，每次二粒

(九) 獅牌藥用美趣靈藍片 *Methylenblau Medici-*

cianle

十八片

上每日三次，每次二片

(十) 療濁病 *Neotropin*

十八片

上每次三次各二片

(註) 治療淋病之藥品。現時又有最新磺醯胺化學製劑。詳見花柳病劑處方中。

(附) 利尿注射藥

奈迫且而 *Nephal*，拿佛阿色羅 *Novosaurol*，

洒利汞 *Saltrygan*，退惡水 *Theosol*，益水通

Isidrone。

(附) 利尿兼有強心作用之注射藥

狄加令 *Digalen*，純葡萄糖注射液 *Glucose Sol-*

ufion，斯忒羅仿丁 *Strophantinn*，安息香酸鈉

臨床經驗處方

一九

咖啡精 Caffein Sod benzoate · 維他康復 Vita
 Cumphor · 布福他利斯 Bufokalis · 樟腦樂地
 儂 Kampher-Iodinon 等 (詳見興奮注射藥)

(附)對尿有防腐殺菌作用之注射

藥

烏羅脫羅並 Urotropin · 喜那脫那賓 Cytotropin
 · 烏羅透賽 Urotrosal · 海克散明 Hexamin · 脫
 呂帕弗拉文 Trypflavine · 果能克淋 Gonacrin-
 tin · 果乃克淋 Gonacrine · 邦鈣兒Pancal ·
 伊斯拉文 Israviv · 湧濁溥消 Panseptin · 配力
 定 Pyridium 愛惜克淋 Aeridin Calcivin。

第五章 催吐劑處方

(一) 吐根末 Pulv Radix Ipecacuanhae 〇 · 五

吐酒石 Stibio kali tartaricum 〇 · 〇 · 五

乳糖 Sacch lact 〇 · 〇 · 三

上為一包，與等量三包，每十五分鐘服
 一次

(二) 吐根丁幾 Tinc Ipecacuanhae 1 · 5 · 〇

上一次頓服

(三) 硫酸銅 Cuprum sulfuricum 1 · 〇 · 〇

糖漿 Sirup simplex 1 · 〇 · 〇

溜水 Aq dest 3 · 〇 · 〇

上每十五分鐘服一茶匙(連用)

(四) 硫酸銅 Cuprum sulfuricum 1 · 〇 · 〇

溜水 Aq dest 5 · 〇 · 〇

上先服一半，如無效，經五分鐘後再服

(五) 鹽酸阿坡嗎啡 Apomorphin hydrochlori-

cum 〇 · 〇 · 〇 · 1

白糖 Sacch alba 〇 · 〇 · 五

上為散劑一包，與等量五包，每十五分

鐘服一包，至奏效為止

(附)催吐注射藥

鹽酸阿坡嗎啡 Apomorphin hydrochloric · 百

莫陸爾 Pomolor。

第六章 發汗及制汗劑處方

一 發汗劑處方

- (一) 鹽酸必羅卡而賓 *Pilocarpin hydrochloricum* 〇・〇・一
 乳糖 *Sacch lact* 〇・三
 上一次頓服
- (二) 醋酸鈣液 *Liq Ammonia acetic.* 1 〇・〇
 接骨木花浸 *Inf Flores Sambuci* (1 〇・〇) 1 〇〇・〇
 橙皮糖漿 *Sirup cortex auranti* 1 〇・〇
 上一日數次分服
- (三) 卡米兒花 *Floris Chamomillae* 1 〇・〇
 上浸於熱水中服用

(註) 解熱劑中如阿司必林 *Aspirin*，安替正林 *Antipyrin*，飛那西汀 *Phenacetin*，安替飛李林 *Antifebrin*，水揚酸鈉 *Nat Salicylicum* 等。均兼有發汗作用。不過不及本劑之顯著耳。惟本劑性質似覺劇烈。不如解熱藥之發汗為和平。故實際

臨床經城處方

上應用較少。

二 制汗劑處方

- (一) 硫酸阿忒羅品 *Atropin sulfuric.* 〇・〇・一
 甘草末 *Pulv liquorit* 適量
 甘草膏 *Succus liquorit* 適量
 上為九十粒，臨臥時服一粒
- (二) 阿加而辛 *Agaricin* 〇・一五
 佗淨氏散 *Pulv Doveri* 三・〇
 阿拉伯樹膠 *Gummi arabicum* 適量
 上為九三十粒，每夜服一或二粒
- (三) 阿加而辛 *Agaricin* 〇・〇・一
 乳糖 *Sacch lact* 〇・三
 上為一包，臨臥頓服
- (四) 樟腦酸 *Acid Camphoricum* 1 〇・〇
 上為一包，每夜臨臥服
- (五) 阿第弗林 *Adiphorin* 〇・五
 上為一包，每夜臨臥服

(六) 泰和庚 Taugen

上臨睡前頓服

1.0

(註) 上述係內用止汗藥。尙有外用止汗藥。例如酒精 Alkohol (約二至五倍稀釋) 搽拭，明礬末滑石粉 Alumin Talcum 等分撒布亦有效。

(附) 發汗及制汗注射藥

鹽酸必羅卡而賓 Pilocarpin hydrochloricum

(發汗) · 硫酸阿忒羅品 Atropin sulphate (制汗)。

第七章 祛痰劑處方

(一) 遠志根煎 Decoct Radix Senegae

(10.0) 180.0

杏仁水 Aq Laurocerae 6.0

糖漿 Sirup simplex 20.0

上一日三次，二日分服

(二) 吐根浸 Inf. Radix Ipecacuanhae

(0.6) 180.0

鹽化銨 Ammonium chloratum 3.0

遠志糖漿 Sirup senegae 20.0

上一日三次，二日量

(三) 吐根丁幾 Tine Ipecacuanhae 1.5

阿母尼亞茴香精 Spiritus Ammonia foeniculi

杏仁水 Aq Laurocerae 3.0

糖漿 Sirup simplex 10.0

溜水 Aq dest 100.0

上一日三次分服

(四) 安息香酸 Acid benzoicum 0.1

樟腦 Camphor 0.05

白糖 Sacch alba 0.5

上為一包，與等量十包，每二時服一包

吐酒石 Stibio Kali tartaricum 0.01

鹽化銨 Ammonium chloratum 0.3

乳糖 Sacch lact 0.3

上爲一包，與以六包，一日三次，二日分服

(六) 發多馨片 *Fatosin Tab.* 十二片

上每日三次，每次二片

(七) 百咳定粉 *Pulv Paclina* 一·五

乳糖 *Sacch lact* 一·五

上分三包，一日分服

(八) 保利加素 *Polygasol* 六·〇

百咳定液 *Liq Paclina* 六·〇

糖漿 *S. S.* 一〇·〇

餾水 *Aq dest* 一〇〇·〇

上每日三次，二日分服

(九) 咳復樂寧 *Kaflöse* 九·〇

新愛服寧 *Neo-Evanin* 三·〇

糖漿 *S. S.* 一〇·〇

溜水 *Aq dest* 一〇〇·〇

上二日三次分服

(十) 安嗽精 *Antihustin Liq.* 六·〇

知阿可爾 *Thiocol* 三·〇

阿耳退糖漿 *S. Althaeae* 一〇·〇

溜水 *Aq dest* 一〇〇·〇

上每日三次，二日分服

(二) 百咳定液 *Liq Paclina* 六·〇

咳利舒開 *Kresocol* 三〇·〇

碘化鉀 *Kali jodot* 二·〇

阿耳退糖漿 *S. Althaeae* 一〇·〇

餾水 *Aq dest* 一五〇·〇

上每日三次，二日分服

(三) 法邁氏止咳糖汁 *Siroop Fannel* 一 瓶

每日二三次，每次一食匙

(三) 須羅靈 *Siolin* 一 瓶

每日三四次，每次二茶匙

(四) 愛佛託寧治咳糖漿 (咳嗽露) *Cos onol* 一 瓶

每日二三次，每次半至一食匙

(五) 克司大納 (克司蘭納止咳露) *Cocidana* 一 瓶

每日三四次，每次半至一茶匙

臨床經驗處方

二四

- | | | |
|------|--------------------|----|
| (一六) | 肺特羅斯 Phedros | 一瓶 |
| | 每日三次，每次一至二茶匙 | |
| (一七) | 撲脫嗽（止咳糖漿） Pertusal | 一瓶 |
| | 每日三次，每次一食匙 | |
| (一八) | 克利西佛 Cresival | 一瓶 |
| | 每日三次，每次一食匙 | |
| (一九) | 庫阿可斯 Guajacose | 一瓶 |
| | 每日三次，每次一食匙 | |
| (二〇) | 脫嗽母 Tusamag | 一瓶 |
| | 每日三次，每次一至二食匙 | |
| (二一) | 的確靈 Tiokorin | 一瓶 |
| | 上每日二三次，每次一至二茶匙 | |
- (註) 祛痰劑除內服藥外。尚有吸入劑。例如鹽化銨 Ammonium Chloratum 1—3.0。置金屬板上。以微弱火焰熱之。使蒸發成霧後吸入。銨水 Liq. Ammoniac 加溫使成蒸氣後吸入。松節油 Ol. Therebintinae 10—30滴，滴於棉花上吸入。此外如石灰水 Aqua Calcariae 及 (10%) 重碳酸鈉水或食鹽水等。加溫吸入。均有祛痰之功。

(附) 祛痰注射藥

氯化鈣注射液 Calcium chloride，碘化鈣注射液 Calcium iodatum，葡萄糖鈣 Gluco-Calcium，古卡新 Glucalcin，安安碘 Entondon，喬託碘 Jotodin
 山德士鈣 Calcium "Sandoz"，長命新鈣注射液 Glucoal，山德士奎寧鈣 Quinin Calcium "Sandoz"，奎寧益壽鈣 Quinin Isocalcium，特朗補命 Transpulmin，託靈保賽而注射液 Transpulmin Amp. 雙治拍菌 Transpoin。
 (註) 祛痰注射藥。應用於頑固性氣管支炎時頗宜。

第八章 鎮咳劑處方

- (一) 鹽酸嗎啡 Morphin hydrochloric. 0.05
 乳糖 Sacch. lact 3.0
 上分為十包，每三時服一包
- (二) 鹽酸嗎啡 Morphin hydrochloric. 0.11

苦扁桃水 Aq Amygdalar amar. 二〇・〇

上於咳嗽時頓服十五滴

(三) 鹽酸嗎啡 Morphine hydrochloric. 〇・一五

甘草根末 Pulv liquorit 一・〇〇

白糖 Sacch alba 一・〇〇

蒸餾水 Aq dest 適量

上液和為丸二十粒，一日三次各一粒

(四) 磷酸科亭 Cod-in phosphoricum 〇・〇二

乳糖 Sacch lact 〇・五

上為一包，咳嗽時頓服

(五) 磷酸科亭 Codein phosphoricum 〇・〇六

發多馨 Fatosin 一・〇〇

上分三包，一日三次分服

(六) 鹽酸海洛因 Heroin hydrochlor. 〇・〇二

乳糖 Sacch lact 二・〇〇

上分三包，一日三次分服

(七) 佗浮氏散 Pulvis Doveri 〇・六

乳糖 Sacch lact 一・〇〇

上分三包，一日分服

(八) 磷酸科亭 Codein Phosphoricum 〇・三

杏仁水 Aq Laurocerae 五・〇〇

溜水 Aq dest 五・〇〇

上以一〇—一五〇滴和入一盃糖水中，咳

嗽時頓服

(九) 狄烏甯 Dionin 〇・〇五

杏仁水 Aq Laurocerae 一〇・〇〇

上混和，一日二至三次各十滴

(一〇) 巴畢那兒 Pavinal 〇・〇三

新愛服寧 Neo-Evanin 二・〇〇

上分三包，一日三次分服

(一一) 萇若末 Pulv Scopolia 〇・二

白糖 Sacch alba 五・〇〇

上分十包，一日三次各一包

(一二) 大咳司鎮粉 Pulv Takastin 一・五

百咳定粉 Pulv Paedin 一・五

上分三包，一日三次分服

(三) 勃隆仿謨 Bromoform 二—四滴

上加入乳汁中飲，一日三次（小兒百日咳用）

(四) 配妥辛 Pertussin 1000.0

上每日三次，每次服一茶匙（同上）

(五) 溴化鉀 Kali bromatum 0.5

糖漿 Sump simplex 100.0

溜水 Aq dest 50.0

上一日六次，二日分服（同上）

(六) 福羅而仿水 Solutio Finoriform 100.0

上每日三次，每次一茶匙（同上）

(註) 鎮咳亦有應用吸入劑。例如 1—2% 杏仁水 aq Laur-oocerae, 0.1% 鹽酸科卡音水 aq Cocain hydrochloricum, 0.25—0.5% 阿片丁澱水 Aq Tine Opium, 0.5—1% 溴化鉀液 Liq Kali bromat 等。加熱使成蒸氣。令患者吸入均有效。

又方。杏仁水 Aq Laurocerae 10.0, 鹽酸嗎啡 Morphin hydrochloricum 0.1。每回十滴加入熱水中吸入。功效亦著。

(附) 鎮咳注射藥

鹽酸嗎啡注射液 Morphin hydrochloricum, 嗎啡阿刀邊注射液 Morphin Atropine, 鹽酸海洛因 Heroin hydrochloricum, 台歐寧 Dionin, 盼得本 Pantopon, 巴畢那兒 Favinal, 油科多耳 Fukodal, 代馬那 Dimonal, 大咳司鎮 Takastin, 新北地那兒 Neo-Pedinal。

第九章 鎮痛劑處方

一 一般鎮痛方

(一) 阿片末 Pulv Opium 0.3

乳糖 Sacch lact 1.5

上為三包，一日三次分服

(二) 鹽酸嗎啡 Morphin hydrochloric. 0.01

乳糖 Sacch lact 0.5

上一回頓服

(三)	磷酸科亭 Codein phosphor 乳糖 Sacch lact	〇・一五 二・〇	(八)	纈草丁幾 Tine Valerianae 派他蓬 Pantopan	一〇・〇 〇・〇三
	上分三包，一日三次分服			上每日三四次各二十滴	
(四)	印度大麻膏 Ext Cannabis Indicae 白糖 Sacch alba	〇・二 五・〇	(九)	萹蓉根末 Pulv Rad. scopolia 乳糖 Sacch lact	〇・〇六 一・〇
	上爲十包，每三時服一包			上研和爲三包，一日三次分服	
(五)	萹蓉膏 Ext Scopolia 乳糖 Sacch lact	〇・〇六 一・〇	(十)	凡拉蒙片 Veramon Tablets 代嗎那片 Dimonal Tablets	一片 三片
	上研和分三包，一日分服			上一日三次分服	
(六)	顛茄膏 Ext Bellatona 阿片膏 Ext Opium	〇・二 〇・三	(十一)	油科多耳片 Eukodal Tab. 上一次頓服	一片
	番木鱉膏 Ext S rynchinin 甘草末及膏 Pulv u. Saecus liquoriae	〇・三 各適量	(十二)	巴畢那兒片 Pavinal Tab. 上一次頓服	一片
	上爲九二十粒，一日二三各一粒		(十三)	痛必靈 Tonbelin 上分三包，一日分服	一・五
(七)	阿片丁幾 Tine Opium 萹蓉丁幾 Tine Sc poliae 庶斯丁幾 Tine Hyoseyami	一〇・〇 一〇・〇 一〇・〇	(十四)	痛必靈藥片 Tonbelin Tablets 上一次頓服	一—二片

臨床經驗處方

臨床經驗處方

二八

(一五)	康普樂 Compral	一一二片	(一四)	抗痛 Conton	二片
	上臨臥頓服			上一次頓服	
(一六)	鎮痙汽巴兒勁 Spasmo-Cibalgin	六片	(一五)	俄耳妥封 Orthoform	一·五
	每日三次，每次一片			乳糖 Sacch lact	一·五
(一七)	奧克替隆 Oktyron	三〇·〇		上一日三次分服	
	上於劇痛時頓服二十滴		(一六)	阿那雖信 Anaesthesin	一·〇
(一八)	斯澁斯曼爾琴 Spasmalgine	三片		重碳酸鈉 Nat bicarbonicum	三·〇
	每劇痛時頓服一二片			上一日三次分服	
(一九)	優巴科 Eupaco	三片	(一七)	諾福樂仿 Noroloform	〇·五
	上每日三次各一片			上一次頓服	
(二〇)	別那福林 Bellafolin	六片	二 各種特殊痛應用之處方		
	每日三次，每次二片		(一八)	亞佗方片 Atophan Tablets	六片
(二一)	樂和鳴 Taumin	一·五		上每日三次，每次一片（痛風，肌肉關節痛，神經痛等）	
	上分三包，一日三次分服		(一九)	海克蘇方片 Hexophan Tablets	六片
(二二)	散利痛 Saridon	二片		上每日三次，每次一片（同上）	
	上一次頓服		(二〇)	息爾風 Sinophan	十二片
(二三)	威健年止痛藥片 Vegamin	六片		每日三次分服	

(一)	上一日三次，每次二片(同上)	(三)	蓬祕靈 Bonpyrin	三一六片	
(二)	羅瓦而精規甯 <i>Norvalgin Quinine</i>	十二片	上一日三次分服(同上)		
(三)	上一日三次，每次二片(同上)	(四)	特別賴爾 <i>Thepyral</i>	一·五	
(三)	加當 <i>Garlan</i>	三片	上一日三次分服(同上)		
	上每日三次，每次一片(頭痛，牙痛，神經痛，關節痛等)	(二)	水揚酸鈉 <i>Nat Salicylicum</i>	六·〇	
(三)	阿卡奴 <i>Arcanol</i>	三片	苦味丁幾 <i>Tinc amara</i>	三·〇	
	上每日三次分服(同上)		糖漿 <i>Sirup simplex</i>	一〇〇·〇	
(三)	阿司必林 <i>Aspirin</i>	一·五	餾水 <i>Aq dest</i>	一〇〇·〇	
	上分三包，一日分服(同上)		上每日三次，二日分服(痛風，肌肉關節痛用)		
(三)	薩里正林 <i>Salpyrin</i>	三·〇	(三)	安替必林 <i>Anti-pyrin</i>	一·〇
	上分三包，一日分服(同上)			咖啡鹼 <i>Caffein</i>	〇·一
(三)	安替必林 <i>Anti-pyrin</i>	一·五		上一次頓服(偏頭痛用)	
	上分三包，一日分服(同上)		(三)	密格來寧 <i>Migranin</i>	〇·五—一·〇
(七)	新亞斯片 <i>Sinasbin</i>	三一六片		上一次頓服(同上)	
	上一日三次分服(同上)		(四)	重碳酸鈉 <i>Natrium bicarbonicum</i>	三·〇
(三)	司泰靈 <i>Starin</i>	三一六片		次硝酸鉍 <i>Bismut subnitricum</i>	一·五
	上一日三次分服(同上)			上分三包，每日三次分服(胃痛用)	

臨床經驗處方

臨床經驗處方

三〇

(註) 劇甚胃痛。可加入麻醉性鎮痛藥品。例如莨菪膏 Ext Scopolia 〇・〇六，或鹽酸嗎啡 Morphine Hydrochloric 〇・〇三，或顛茄膏 Ext Belladonna 〇・〇三，或痛必靈粉 Tonbein 一・五，或俄耳安封 Orthoform 一・五分服均可。

對營養礙障而起之多發性神經炎，神經痛。宜應用

維他命B製劑

(四) 彼他比恩片 Belabion Tablets 二〇片

每日三次，每次二片

(四) 秉乃維片 Benerva Tab. 二〇片

每日三次，每次一二片

(四) 惟皮革新片 Vibixin Tab. 二〇片

上每日三次各二片

(四) 維他新片 Vitasin Tab. 二〇片

上一日三次各二片

(四) 賜貝而仁 Spelzon 六・〇

上分六包，二日分服

鎮痛外用方

(一) 俄耳安封 Orthoform 二〇・〇

澱粉或滑石 Amylum od. Talcum 一〇〇・〇

上混和為撒布用(創傷痛，潰瘍痛用)

(二) 諾福樂仿 Novoloform 二〇・〇

澱粉 Amylum 一〇〇・〇

上混和為撒布用(同上)

(三) 阿那維信 Anaesthesia 二〇・〇

凡士林 Vaselin 一〇〇・〇

上調和為軟膏塗布用(同上)

(四) 亞佗方軟 Atophansalbe 一管

上塗擦於疼痛部皮膚用(痛風，肌肉關節痛用)

(五) 芥子末 Pulv Semen sinapis 二〇・〇

上加適宜之水攪為泥狀。塗布於疼痛部

皮膚(神經痛，肌肉關節痛用)

(六) 松節油 Ol Terebinthinae 一〇・〇

上為塗擦用(同上)

(七) 迷迭香油 Ol Rosmarini 二〇・〇

上為塗擦用(同上)

(八) 樟腦酒精 Spiritus Camphor 二〇・〇

上為塗擦用(同上)

(九) 哥羅方 Chloroform 二〇・〇

上為塗擦用(同上)

(十) 鹽酸嗎啡 Morphin hydrochloric. 〇・一五

酒精 Alkohol 三・〇

哥羅方 Chloroform 一五・〇

上混和，以一滴和棉球填塞齶齒腔(齒痛用)

(二) 哥羅方 Chloroform 五・〇

上以棉球蘸填齶齒腔(同上)

(三) 鹽酸科卡音 Cocain hydrochloric. 〇・五

鹽酸嗎啡 Morphin hydrochloric. 〇・五

幾阿蘇(克雷沙忒) Kresosol 五・〇

上為溶液，以棉球浸漬後填入蛀齒腔(同上)

鎮痛栓劑

(一) 鎮痙汽巴兒勁栓劑 Spasmo-Cibalgin Suppositoria 一個

上塞入肛門(各種劇痛)

(二) 優巴科栓劑 Eupaco Suppositoria 一個

上塞入肛門(同上)

(三) 立刻抵疼 Reethidon Suppositoria 一個

上塞入肛門(同上)

(註) 倘係炎症原因而起之灼熱疼痛。則須另用消炎外用藥。劇甚時並注射消炎藥品。詳見外科劑處方中。

(附)鎮痛注射藥

鹽酸嗎啡注射液 Morphin hydrochloride. 嗎啡

阿刀邊注射液 Morphin Atropine. 鹽酸海洛因

Heroin hydrochloride. 台歐當 Dionin. 盼得

本 Pantopon. 油科多耳 Eukodal. 巴畢那兒

Pavinal. 代馬那 Dimonal. 痛必靈 Tonbelin.

巴畢那兒·巴巴肥林 Pavinal Papaverin, 優巴科 Eupaco, 格理真 Grelan, 戒痛 Chartong, 安痛必靈 Atopelin。

(附)痛風及肌肉關節痛注射藥

亞佗方耐耳 Atophanyl, 美盧白靈 Melubin, 水揚酸鈉注射液 Sodium Salicylate, 鹽酸喜椰美仁 Sinomenine hydrochloride, 喜美靈 Simalin, 河豚毒素 Tetrodotoxin。
 羅瓦而精 Novalgin, 撒而索·格理真 Salsogrelan, 柳酸益壽鈣 Salso-Isocalcium, 阿露寇 Apicour, 樂和鳴Launin, 息爾風 Sinophan, 蜜歐妥甯 Myotonin。

(附)營養障礙而起之多發神經炎

及神經痛之注射藥

培他生 Betaxin, 彼他比恩 Betabion, 秉乃維 Benerva, 米太寶靈 Metabolin, 惟皮革新 Vi-

bixin, 維他新 Vitasin 維彼命 Vibemim。

第十章 鎮靜劑處方

- | | | | |
|-----|---------------|---------------------|-------|
| (一) | 溴化鉀 | Kali bromatum | 二·〇 |
| | 苦味丁幾 | Tine amara | 一·五 |
| | 溜水 | Aq dest | 一〇·〇 |
| | 上一日量, 三次分服 | | |
| (二) | 溴化鉀 | Kali bromatum | 二·〇 |
| | 溴化鈉 | Nat. bromatum | 二·〇 |
| | 溴化銨 | Amn. bromatum | 二·〇 |
| | 糖漿 | Sirup simplex | 一〇·〇 |
| | 溜水 | Aq dest | 一〇〇·〇 |
| | 上一日三次分服 | | |
| (三) | 三溴片 | Triple Brom Tablets | 十八片 |
| | 上每日三次, 每次二至三片 | | |
| (四) | 字羅米品 | Bromipin (10%) | 一〇〇·〇 |
| | 上每日三次各一茶匙 | | |

(五) 李維摩科耳 Bromcoll 1.0—2.0

上為散劑，與同量六包，一日三次各一

包

(六) 阿特蒙 Adamon 六片

上每日三次各一片

(七) 纈草根浸 Inf. Rad. Valerianae (10.0) 180.0

龍膽丁幾 Tinc Gentianae 3.0

糖漿 Sirup simplex 10.0

上一日三次，二日分服

(八) 纈草丁幾 Tinc Valerianae 2.0

莨菪丁幾 Tinc scopoliae 1.5

薄荷水 Aqua Menthae 3.0

糖漿 Sirup simplex 10.0

溜水 Aq dest 100.0

上一日三次分服

(九) 纈草丁幾 Tinc Valerianae 2.0

阿片丁幾 Tinc Opium 1.0

溜水 Aq dest 100.0

糖漿 Sirup simplex 10.0

溜水 Aq dest 100.0

上一日三次分服

(10) 纈草酸鋅 Zinc Valerianicum 0.3

白糖 Sacch alba 3.0

上分為十包。每日三次各一包

(11) 阿魏丁幾 Tinc Asae foetidae 5.0

纈草丁幾 Tinc Valerianae 10.0

上每日三次各二十滴，放入糖水中服

(12) 盧密拿 Lumninal 1.0

乳糖 Sacch lact 1.5

上分三次，一日三次分服

(13) 溴素樟腦 Camphora monobromat 0.6

乳糖 Sacch lact 1.0

上分三包，一日分次

(14) 佛里耳 Valyl 六粒

上每日三次，每次一粒

(15) 色多波片 Sedobrol Tablets 六片

(一六)	息癩那藥片 <i>Sedinal Tablets</i>	六片	(二四)	抱水格魯拉兒 <i>Chloral hydratum</i>	三〇〇
	上每日三次，每次一二片			溴化銨 <i>Amn. bromatum</i>	三〇〇
(一七)	阿特靈 <i>Atalin</i>	一〇〇		糖漿 <i>Sirup simplex</i>	一〇〇〇
	上分三包，一日分服			溜水 <i>Aq dest</i>	一〇〇〇
(一八)	普密拿片 <i>Prominal Tablets</i>	六片		上每日六次分服	
	上一日三次各一包				
(一九)	鈕羅立須 <i>Neurolixir "Miller"</i>	一〇〇〇			
	上每日三次，每次一至二茶匙				
(二〇)	加爾茂清 <i>Calmoftin</i>	〇・六	(一)	溴化鉀 <i>Kali bromatum</i>	二〇〇
	乳糖 <i>Sacch lact</i>	一〇〇		阿拉伯樹膠漿 <i>Mucilag Gummii arabicum</i>	一〇〇〇
	上分三包，一日三次分服			溜水 <i>Aq dest</i>	五〇〇
(二一)	佛里霜 <i>Valisan</i>	六粒		上混和灌腸	
	上每日三次各一粒		(二)	抱水格魯拉兒 <i>Chloral hydrat.</i>	一〇〇
(二二)	泛船拿 <i>Vasano</i>	六片		溜水 <i>Aq dest</i>	五〇〇
	每日三次，每次一二粒			上混和灌腸	
(二三)	補益癩草神經片 <i>Compretten mixtura</i>	六片	(四)	哥羅方 <i>Chloroform</i>	一五—三〇〇
	<i>Nervinacum Valerianae</i>			上為吸入劑	

鎮靜劑外用方

(五) 立刻抵疼液 Liq. Rectidon

溜水 Aq. dest.

上混和為灌腸料

四〇〇

(附) 鎮靜注射液

氫溴酸斯科伯拉民 Scopalamine hydrobromide

嗎啡斯科伯拉民 Morphin scopalamine

化液注射鈣 Solution Calcium bromide

拿溶液 Linninal Solution

靈 Magnesium sulphate

靈 Magsolin

Magbron

Brocalin

蔽腦湯 Pernocton

用於劇烈精神興奮及高度癲癇症)

(一) 鹽酸嗎啡 Morphin hydrochloric

鹽酸科卡音 Cocain hydrochloric

杏仁水 Aq. Pruni armeniaca

上每次服一〇滴，一日數次

(二) 鹽酸科卡音 Cocain hydrochloric

白糖 Sacch. alba

上分十包，一日三次各一包

(三) 哥羅方 Chloroform

縵草丁幾 Tinc. Valerianae

上混和，每一小時服二十滴見效為度

(四) 哥羅方 Chloroform

溜水 Aq. dest.

上一次二十滴，一日數次

(五) 礞酸攝留謨 Cerium oxalicum

乳糖 Sacch. lact.

上分三次，一日分服

(六) 改奶阻兒 Genesol

一日三次，每次二片

第十一章 鎮吐劑處方

臨床經驗處方

(七) 溴化鉀 Kali bromatum 三〇〇

頭茄膏 Fxt belladonnae 〇〇〇六

糖漿 Sirup simplex 一〇〇〇

溜水 Aq dest 一〇〇〇〇

上每二小時服一格，一日六次分服

(附)鎮吐注射藥

硫酸阿忒羅品 Atropin sulphate · 鹽酸嗎啡

Morphin hydrochloride · 盧密拿溶液 Intrinal

Solution · 溴化鈣注射液 Solution Calcium

bromide ·

(妊娠性嘔吐注射藥) 路特益諾兒 Luteinal ·

第十二章 麻醉劑處方

一 全身麻醉劑方

(一) 以脫 Aether 一份

哥羅方 Chloroform 三份

酒精 Alkohol 一份

上為全身麻醉吸入劑(必耳羅忒氏合劑

方)

(二) 酒精 Alkohol 一份

哥羅方 Chloroform 二份

以脫 Aether 三份

上為全身麻醉吸入劑(英國劑方)

(三) 蘇納司丁 Solasolin 五〇〇〇

上為全身麻醉吸入劑

二 灌腸用新麻醉劑

(一) 安穩訂 Averin (二·五)

上為灌腸劑

三 腰椎麻醉劑方

(一) 忒羅伯科卡音 Tropacocain 〇·五

溜水 Aq dest 一〇〇〇

上為腰椎麻醉注入劑(每次一西西)

四 局部麻醉劑注射方

(一) 鹽酸科卡音 Cocain hydrochloricum

〇・一〇〇・二

〇・二%食鹽水 Aq Nat. chlorat. 二〇・〇

腎上腺液 Adrenalin hydrochlor. 三滴

上爲局部麻醉料(用量視麻醉之廣狹而

不一)

(註) 科卡音毒性頗大。使用不可過多。

(二) 鹽酸科卡音 Cocain hydrochloricum

〇・一〇〇・二

鹽酸嗎啡 Morphin hydrochlor. 〇・〇二

食鹽 Nat chloratum 〇・二

溜水 Aq dest 一〇〇・〇

上爲局部麻醉料(用量同上)

(三) 諾服卡音 Novocain 〇・五—一・〇

〇・五%食鹽水 Aq Nat chloratum

(〇・五%)五〇・〇

上爲局部麻醉料(用量同上)

(四) 諾服卡音 Novocain 一・〇

食鹽 Nat chloratum 〇・五

重曹 Nat bicarbonicum 〇・二五

溜水 Aq dest 一〇〇・〇

上爲局部麻醉料(用量同上)

(五) 諾服卡音 Novocain 〇・六

食鹽 Nat chloratum 〇・一

重曹 Nat bicarbonicum 〇・一五

溜水 Aq dest 三〇・〇

上爲局部麻醉料(此方較上方效力爲大)

(註) 諾服卡音毒性較科卡音少。故現代醫師大都喜用諾服卡

音。通常便利起見。調製該項麻醉溶液。單用〇・五%食鹽水便

可。如欲預防手術出血。可於麻醉溶液中。加入鹽化腎上腺液

四五滴。

(六) 本妥卡音 Pantocain 〇・一

食鹽水 Liq Nat chloratum 五〇・〇

上爲局部麻醉劑

(七) 鹽化歐欺兒 Chloroethyl

上噴射局部為麻醉用(淺表小手術用之)

五 局部麻醉劑外用方

(一) 諾服卡音 Novocain 〇・四—一・〇

溜水 Aq. Dest 二〇・〇

上為塗布用

(二) 俄耳妥封 Orthoform 二・〇

澱粉或滑石 Amylum od. Talcum 一〇・〇

上為撒布用

(三) 阿那雖信 Anaesthesin 二・〇

澱粉或滑石 Amylum od. Talcum 一〇・〇

上為撒布用

(四) 諾福樂仿 Novoloforn 二・〇

澱粉或滑石 Amylum od. Talcum 一〇・〇

上為撒布用

(五) 俄耳妥封 Orthoform 一〇・〇

凡士林 Vaselin 一〇〇・〇

上為軟膏外用

(附) 局部麻醉現成注射藥

鹽酸科卡音 Cocain hydrochloricum, 奴佛客

因(即諾服卡音) Novocain, 奴佛根阿特雷乃

林 Novocain adrenalin, 鹽酸奴吾客因 Sinocain

hydrochloricum, 星牌奴吾客因阿篤列那林

Sinocain et. Adrenalin, 忒羅怕科卡音 Tropa-

cocain (腰髓麻醉用)。

(附) 外科手術麻醉注射新藥

蔽腦湯 Pennocton, 索寐靈芬 Somnifen。

第十三章 催眠劑處方

(一) 抱水格魯拉兒 Chloral hydratum 一・〇

糖漿 Simup simplex 五・〇

溜水 Aq. dest 六〇・〇

上臨臥頓服

(二)	薩耳佛那耳 Sulfonal	○·五—一·〇	(10)	地地阿耳片 Didial	一片
	上臨臥溶於水中頓服			上臨臥前服	
(三)	浮羅那耳 Veronal	○·五—一·〇	(11)	愛露耐而片 Allonal	一—二片
	上臨臥溶解於多量溫水中服下			上臨臥前服	
(四)	忒利烏那耳 Trional	○·五—一·〇	(12)	福眠錠 Phandorm	半—一片
	上臨臥頓服，以溫水送下			上臨臥前服	
(五)	鬧歐羅那耳 Neuronal	○·五—一·〇	(13)	一宿眠 Isomural	○·五或二片
	上給三包，每夜臨臥一包，放入糖水中服			上臨臥前頓服	
(六)	孛薩拉耳 Bromural	○·三—〇·六	(14)	阿特靈 Adalin	一·〇
	上臨臥放入糖水中頓服			上臨臥前服	
(七)	午雷坦 Urethan	一·〇	(15)	盧蜜拿 Luminol	〇·二
	溜水 Aq dest	六〇·〇		上臨睡前頓服	
	上臨臥前服		(16)	盧蜜拿鈉 Luminol Natrium	〇·五
(八)	寐底拿片 Medinal	半—一片	(17)	索寐靈芬 Somnifen	二〇—三〇滴
	上臨臥溶於糖水中服			上臨睡前放入糖水中服	
(九)	地阿耳片 Dial	一片	(18)	索睦那兒 Somnal	〇·五
	上臨臥溶於糖水中服			上臨睡前頓服	

臨床經驗處方

四〇

(一九) 加爾茂清 Calmotin

〇・五

上臨睡前頓服

(二〇) 安道耐 Adonal

二片

上臨睡前頓服

(二一) 山多伯泰爾 Sandoptal

一片

上臨睡前頓服

(二二) 索眠補爾 Sombrol

五〇・〇

上臨臥頓服半至一茶匙

催眠劑灌腸方及坐藥

(一) 抱水格魯拉兒 Chloral hydrat 11・〇

阿拉伯樹膠漿 Muclago Gummi arabi-

cum 50・〇

溜水 Aq dest 50・〇

上混和爲灌腸用

(二) 立刻抵疼 Liq Rectidon 四一八・〇

上爲灌腸用

(三) 抱水格魯拉兒 Chloral hydrat 五一一〇・〇

白蠟 Cera alba

五・〇

可可脂 Ol Cacao

100・〇

上混和爲坐藥五個，每夕用一個

(四) 立刻抵疼(坐藥) Suppositoria Rectidon

上塞入肛門

第十四章 健胃劑處方

(一) 苦味丁幾 Tinc amara

30・〇

番木鱈丁幾 Tinc Strychnin

11・〇

桂皮丁幾 Tinc Cinnamomi

100・〇

溜水 Aq dest 1100・〇

上每日三次，二日量

(二) 稀鹽酸 Acid hydrochloric diluti 1・〇

橙皮糖漿 Sirup aurati corticis 100・〇

溜水 Aq dest 1000・〇

上一日三次分服

(三) 古倫布根煎 Decoct Radix Colombo

(一〇・〇) 100.00
糖漿 Sirup Simplex 10.00

上一日三次分服

(四) 番木鱈丁幾 Tinc Strychnin

龍膽丁幾 Tinc Gentianae

桂皮水 Aq Cinnamomi

溜水 Aq dest

上一日三次分服

(五) 那規皮煎 Decoct Cortex chinae

(五・〇) 100.00

稀鹽酸 Acid hydrochloric diluti

糖漿 Sirup simplex

上一日三次分服

(六) 規那丁幾 Tinc Chinae

大黃丁幾 Tinc Rhei

生薑丁幾 Tinc Zingiberis

溜水 Aq dest

上一日三次分服

(七) 重碳酸鈉 Nat bicarbonicum

苦味丁幾 Tinc amara

糖漿 Sirup simplex

溜水 Aq dest

上一日三次分服

(八) 空杜蘭戈皮煎 Decoct Cortex Condu-

rango

稀鹽酸 Acid hydrochloric diluti

糖漿 Sirup Simplex

上一日三次，每次一食匙

(九) 芳香散 Pulvis aromaticus

乳糖 Sacch lact

上分三包，一日分服

第十五章 消化劑處方

(一) 稀鹽酸 Acid hydrochloric diluti

百布辛 Pepsin

臨床經驗處方

四二

糖漿	Sirup simplex	100.0	(七)	路易清	Luizym	十二片
溜水	Aq dest	100.0		每日三次，每食後二片		
	上一日三次分服		(八)	卡力伯液	Liq Caripeptic	15.0
				番木鱈丁幾	T. Strychnin	1.5
(二)	重碳酸鈉	Nat bicarbonicum		大黃丁幾	T. Phei	1.0
	糖化素	Diastase		橙皮糖漿	S. an anti corticis	10.0
	上分三包，每食後即服一包			溜水	Aq Dest	100.0
(三)	胰液素	Pankreatin		上一日三次分服		
	重碳酸鈉	Nat Bicarbonicum	(九)	補利奇酶粉	Polyzyme Pulv	1.5
	上與等量三包，每食前服一包			上分三包，每食後一包		
(四)	派派膏	Papainum	(10)	普羅太米	Protamylase	0.6
	乳糖	Sacch lact	(11)	芳香散	Pulv aromaticus	1.5
	上分三包一日三次各一包		(12)	胃精片	Gastro-Enterin Tab	十二片
(五)	百布辛酒	Vinum pepsin		上每日三次，每食後二片		
	麥芽膏	Ext Malti	(13)	強胃素	Digestesin	一瓶
	橙皮糖漿	S. auranti corticis	(14)	阿飢萌片	Ochimon Tabl ts	十二片
	上一日三次，每食後各一食匙					
(六)	百化靈	Pankroptorin				
	上一日三次，每次二片					

上每日三次，每次二片

(一五) 阿即多耳配符新 Acidol-Pepsin

十二片

上每日三次，每次二片，食時或食後服

(一六) 倍泰辛 Betacel 1

十二片

上每日三次，每次一至二片

(一七) 略蘭吐拉克斯 Glandu-Lax

十八片

上每日三次，每次二至四片

(一八) 凡食泰 Festal

六粒

上每日三次，每次一粒，食後即服

(一九) 阿稗精片 Apelin Tablets

二〇片

上每日三次，每次四片

(二〇) 酵母維生素 Yeastamin

二〇片

上每日三次，每次二至三片

(二一) 寶青春 Biozygen Tablets

二〇片

上每日三次，每次四片

(二二) 舒胃素藥片 Stoveson Tab.

十一片

上每日三次，每次二片

(二三) 蘇打明片 Sodamit

十二片

上每日三次，每食後各二片

(二四) 大黃蘇打片 Rhei So Jamit

十二片

上每日三次，每食後各二片

(註) 上列各種消化劑。均兼有健胃功效。凡食慾不振，消化不良用之尤宜。

(二五) 雷沙而辛 Resorcin

一·五

橙皮糖漿 S. auranti corticis

一〇〇〇

溜水 Aq dest

一〇〇〇〇

上一日三次分服

(二六) 甘汞 Calomel

一·〇

表飛鳴 Biofermin

一·五

乳糖 Sacch lact

一·五

上分三包，一日分服

(二七) 薩羅耳 Salol

一·五

上分三包，一日分服

(二八) 保爾泰素 Biolactase

一·〇

上分三包，一日分服

(二九) 胃太平片 Vitabin Tablets

十二片

上每日三次各二片，食後服

(三〇) 歐力新片 *Orexin Tablets*

十二片

上每日三次各二片，食後服

(註) 胃腸病變頗多。尙有其他處方。詳見胃病劑及腸病劑中。

第十六章 補劑(強壯劑)處方

(一) 硫酸鐵 *Ferri sulfuricum*

五・〇

龍膽末 *Pulv Gentianae*

一・〇

甘草根末 *Pulv liquoritiae*

適量

糖漿 *S. S.*

適量

上爲九五十粒，一日三次各二粒

(二) 還元鐵 *Ferri reductum*

五・〇

鹽酸規寧 *Chinin hydrochloricum*

一・五

龍膽膏 *Ext Gentianae*

三・〇

上爲五十九，一日三次各二九

(一) 亞砒酸 *Acid arsenicosum*

〇・二

還元鐵 *Ferri reductum*

一〇・〇

鹽酸規寧 *Chinin hydrochloricum* 五・〇

番木鱉膏 *Ext Strychnin* 一・〇

甘草末及膏 *Pulv et. Succus liquoritiae*

適量

上爲九二百粒，一日三次各一粒，漸次

增至二粒

(二) 亞砒酸 *Acid arsenicosum*

〇・一

乳酸鐵 *Ferri lacticum*

一〇・〇

毛地黃葉末 *Pulv Folia digitalis* 二・〇

甘草末及膏 *Pulv et. Succus liquoritiae*

各適量

上爲九百粒，一日三次，每次一二粒

(三) 含糖炭酸鐵 *Ferri Carbonic saccharatum*

二・〇

大黃根末 *Pulv Rhei* 三・〇

上分九包，一日三次各一包

(四) 還元鐵 *Ferri reductum* 一・〇

乳糖 *Sacch lact* 二・〇

上分十包，一日三次，每食後服一包

(五) 乳酸鐵 *Ferri lacticum* 二・〇

上分六包，一日三次各一包，二日量

(六) 林檎鐵丁幾 *Tinc Ferri Pomati* 二〇・〇

大黃丁幾 *Tinc Rhei* 二〇・〇

上一日三次，每服二十滴

(七) 亞砒酸鉀液 *Liq Kali arsenicosi* 一〇・〇

複方規甯丁幾 *Tinc China comp.* 二〇・〇

上每日三次各五滴，和水服下，漸次增

加至十五滴

(八) 林檎鐵丁幾 *Tinc Ferri pomati* 三・〇

亞砒酸鐵液 *Liq Kali arsenicosi* 一・〇

蘆薈丁幾 *Tinc Aloe* 三・〇

橙皮糖漿 *Sirup auranti corticis* 一〇・〇

溜水 *Aq dest* 一〇〇・〇

上一日三次，每次一格，二日分服

(九) 枸橼酸鐵 *Ferri Citricum oxydatum* 二・〇

重碳酸鈉 *Nat bicarbonicum* 五・〇

上為十包，朝夕各一包

(一〇) 鐵酒 *Vinum Ferri* 一〇〇・〇

上一日數次，每次一茶匙至一食匙

(一一) 含糖碘化鐵 *Ferri Jodat saccharat.* 〇・二

乳糖 *Sacch lact* 〇・五

上為散劑，給等量十包，一日三次各一

包

(一二) 蘆薈鐵丸 *Pilulae Aloe et. Ferri* 十二粒

上每日三次，每次一或二粒

(一三) 伯勞氏鐵丸 *Plautsche Pills* 十二粒

上每日三次，每次二粒

(一四) 鐵質菲亭液 *Ferrophytin Liq* 一瓶

上每日三次，每次一茶匙

(一五) 碘化鐵糖漿 *Sirup Ferri jodatum* 一〇・〇

糖漿 *Sirup simplex* 一〇・〇

水溜 *Aq dest* 九〇・〇

上一日三次，二日分服

(一六)	磷 Phosphor	0.01			
	肝油 Ol Jecoris	100.0			
(一七)	羅氏大補汁 Tonic "Roche"	1瓶			
(一八)	惟斯可內服液 Visco.Serum "Buvahe"	十支			
(一九)	奧補多甯 Opotonic	1瓶			
(二〇)	百福臨 Bioferol	1瓶			
(二一)	先靈大補藥 Fortamin "Scheining"	1瓶			
(二二)	馬力多 Myeladol	1瓶			
(二三)	信石化露多時 Arsenoferratose	二〇片			
(二四)	彌太通 Metatona	1瓶			
(二五)	補活斯多 Bovtrol	10支			
(二六)	海伯多加年 Hepatocarmine	10支			
(二七)	愛血靈 Arsylen	三〇粒			
(二八)	福克沙 Forxol	1瓶			
(二九)	禮來麥精色素 Malt extract with Hemoglobin "Tilly"	1瓶			
(三〇)	砒鐵補血汁 Arsen.Ferrin	1瓶			
(三一)	碘鐵補血汁 Jod.Ferrin	1瓶			

上每日三次，每次一片

上每日三次，每次一茶匙

上每日三次，每次一支

上每日三次，每次一支

上每日三次，每次一粒

上每日三次，每次食後一茶匙

上每日三次，每次食後二茶匙

上每日三次，每次食後一茶匙

上每日三次，每次一湯匙

- | | | | | | |
|-----|------------------------|----|-----|------------------------------------|-----|
| (三) | 補力靈 Tonikorin | 一瓶 | (四) | 力弗肝流膏 Livex Ext. | 一瓶 |
| | 上每日三次，每次食後二茶匙 | | | 上每日二次，每次一食匙 | |
| (三) | 保利他民 Iig Polytamin | 一瓶 | (四) | 安度肝精汁 Endopatina concentra-
ted | 一瓶 |
| | 上每日三次，每次二茶匙 | | | 上每日三次，每次一茶匙 | |
| (三) | 多年可糖漿 Tonicol Sirup | 一瓶 | (四) | 敏狄納思糖漿 Sirup Minadex | 一瓶 |
| | 上每日三次，每次食後一食匙 | | | 上每日三次，每次二茶匙 | |
| (三) | 補爾神內服液 Blusen Iiq | 一瓶 | (四) | 伊斯登糖片 Tablets Easton Syrup | 十八片 |
| | 上每日三次，每次約半食匙 | | | 上每日三次，每次一片 | |
| (三) | 補血素 Bloodsol | 一瓶 | (四) | 得力補丹片 Tryplan Tab. | 十八片 |
| | 上每日三次，每次食後一食匙 | | | 上每日三次每次二片 | |
| (三) | 補血多 Terropheplose | 一瓶 | (四) | 胖麗巴片 Panliver Tab. | 五〇片 |
| | 上每日三次，每次食後一食匙 | | | 上每日三次，每次三片 | |
| (三) | 納綠吐福 Neurophol | 一瓶 | (四) | 補使命片 Phosmin Tab. | 三〇片 |
| | 上每日三次，每次食後二茶匙 | | | 上每日三次，每次一片 | |
| (三) | 「威來金」肝浸膏 Liver Extract | 六支 | (四) | 乃而本片 Narbin Tab. | 一〇片 |
| | 上每日三次各一支，和入溫水中服 | | | 上每日三次，每次五片 | |
| (四) | 康巴飛樂 Campoferron | 一瓶 | (四) | 賴克屈隆膠囊劑 Pulvules Lextron | 五〇粒 |
| | 上每日三次，每次一茶匙 | | | | |

上每日三次，每次三粒

(五) 血補肝精膠囊 Hepatonia Cap.

三〇個

上每日三次，每次二個

(五) 人參精 Ginsengrina

一瓶

上每日三次，每食前服二茶匙

(五) 康甯 Cantiolin

十八片

上每日三次，每次一片

(註) 婦女補身。除用補血藥外，兼宜用卵巢製劑。處方詳見婦科劑中。

(附)補身(強壯)注射藥

奧拍泰純 Oparson, 所拉純 Solarson, 錢福丁

補針 Tonikaine Chevrein, 海而平 Helpin,

愛斯法 Esfar, 托拿福賜芬 Tonophosphan,

補爾神 Blusen, 鐵開古地 Iron Cacodylate,

奧福仁 Opharson, 肝補儂(即康E隆) Camplon

, 力活肝 Levex, 返老補血汁 Ferotonic, 甘油

磷酸鐵 Glycerphosphate of Iron.

惟斯可血清 Visco Serum, 英海普登 Inhepton,

多年可注射液 Tonicol Amp, 利腦富人工血清

Renovo Serum, 海普拉克登 Hepracton, 愛伯

蒙 Heparnone, 利凡命 Livemin, 乃而本 Na-

fin, 利福利索肝精 Liverise, 補使命 Phosmin

, 福斯補爾命 Fosfo-Plasmina, 新力活肝 Neo-

Levex, 血肝補精 Hepatonia, 人參精 Ginsen-

crine。

第十七章 補精壯陽劑處方

(一) 天福鱗 Testiphorin 一瓶

上每日三次，每次二片

(二) 搭司託僅 Testogan 一瓶

上每日三次各一片

(三) 安達祿素 Androsin 一管

上每日三次每次一片，食後以溫水送下

(四) 補素母 Pasuma 一管

上每日三次，每次一片

(五) 推斯荷蘭杜 Testiglandol 一管

上每日三次，每次一片

(六) 愛的體士丁 Anteston 一管

上每日三次，每次二片

(七) 賀爾統 Forton 一管

上每日三次，每次一片

(八) 男用多價腺體製劑 Puriglandular M 一管

上每日三次，每次一片

(九) 英男兒萌 Enarmon Tab. 一管

上每日三次，每次一片

(十) 恩男龍片 Endonol Tab. 一管

上每日三次，每次一片

(一) 英得蒙 Intremon 一管

上每日三次，每次一片

(二) 賜保命片 Spermin Tablets 一管

上每日三次，每次二片

(三) 鹿茸素 Loyuncerine 一瓶

上每日三次，每次食前三〇至四〇滴，和入溫水中服

(四) 虎猛精片 Hormangen Tab. 一管

上每日三次，每次二片

(五) 雙魚牌司保命片 Spermin Tab 一管

上每日三次，每次二片

(六) 補茸賜保命 Prospermin Tab. 一管

上每日三次，每次二片

(七) 今則雷 Ginsenin 二片

上一次頓服，或分二次服

(八) 鹽酸育亨賓 Yohimbin hydrochloric. 六片

上每日三次各一片

(九) 鹽酸育維雷 Juvenin 六片

上每日三片，午前一片，臨睡服二片

(附)補精(壯陽)注射藥

安度賜保命 Endospermin · 賀爾賜保命 Horm-spermin · 維他賜保命 Vitaspermin · 福爾賜彼

命 Spermin Poehl·斯保買丁 Spermatin·塔
 司托僅 Testogen·謀克老病 Macrobin·育嗣
 得麟 Yohistin·安樂根 Erogen·偉樂克倫
 Viroglan·英男兒萌 Inarmon·推羅平 Tria-
 pan·百利多命 Polytolin·育維雷 Juvenin·
 鹽酸育亨賓 Yohimbine hydrochloric。
 安達祿壽 Androstin·補素母 Pasuma·推斯
 齋蘭杜 Testiglandol·愛的體士丁 Antetestin
 ·賀爾統 Forton·百賴特靈 Perantren·男性
 多價腺體製劑 Pluriglandular M·恩男龍 En-
 donol·英得蒙 Intremon·鹿茸素 Ioyuncine
 ·虎猛精 Hornongen·雙魚牌司保命 Spemin
 “Fish Brand”。

第十八章 營養劑處方

(一) 麥精魚肝油 Malt-Iebertan 一瓶
 上每日三次，每次一食匙

- | | | | |
|-----|--------------------------|------------------------|-----|
| (一) | 奧新 Ossin | 上每日三次，每次一食匙 | 一瓶 |
| (二) | 所買妥司 Somatose | 上每日三次，每次一茶匙，混於牛乳或肉湯中內服 | 一瓶 |
| (三) | 樂口福麥乳精 Lactova-Malt | 上每日三次，每次一二食匙 | 一瓶 |
| (四) | 葡萄糖 Glucose | 上每日三次，每次一食匙 | 一瓶 |
| (五) | 四維葡萄糖 Glucose A B C D | 上每日三次，每次一食匙 | 一瓶 |
| (六) | 乃絡維乳劑 Nestrovit Emulsion | 上每日三次，每次三茶匙 | 一瓶 |
| (七) | 富維他 Fourvita | 上每日三次，每次一食匙 | 一瓶 |
| (八) | 蘇伯第液 Super I | 上每日三次，每次一茶匙 | 一瓶 |
| (九) | 安特所囊膠靈 Adexolin Cap. | | 十二粒 |

(一)	上每日三次，每次一個 甘油奧斯得靈藥片 Osetelin Tab.	一〇片	(一〇)	上每日三次，每次二片 秉乃維片 Benerva Tab.	十二片
(二)	上每日三次，每次一片 革老斯特靈片 Gallosterin Tab.	十二片	(一一)	上每日三次，每次二片 惟皮革新片 Vibixin Tab.	十二片
(三)	上每日三次，每次一片 海力補B丸 HalibolB	三〇粒	(一二)	上每日三次，每次二片 維他新片 Vitasin Tab.	十二片
(四)	上每日三四次，每次一粒 海力補橘子汁 Haliborange	一瓶	(一三)	上每日三次，每次二片 維彼命片 Vibemin Tab.	十二片
(五)	上每日二三次，每次一茶匙 肥太特 Detavit	一瓶	(一四)	上每日三次，每次二片 賜貝而仁片 Spalzon Tab.	十八片
(六)	上每日二三次，每次一食匙 好力生膠囊 Halisun Cap.	二〇個	(一五)	上每日三次，每次三片 康泰 Cantan	六片
(七)	上每日二二次，每食後一個 海力命丸 Halimin	二〇粒	(一六)	上每日三次，每次一片 力度伸 Redoxon	六片
(八)	上每日二二次，每食後一粒 軋局爾 Gaduol	二〇粒	(一七)	上每日三次，每次一片 西比恩 Cebion	六片
(九)	上每日二二次，每食後一粒 彼他比恩片 Betabion Tab.	十二片	(一八)	上每日三次，每次一片 維斯命 Vicsimin	六片

(二) 西他新片 Citasin Tab
上每日三次，每次一片

六片

(三) 富爾生命 Frucimin
上每日三次，每次二片

十二片

(三) 維剛妥丸 Vigantol
上每日三次，每次一粒

十二粒

(三) 山德士鈣粉 Calcium Pulv. "Sandoz"
上每日三次，每次一食匙

一瓶

(三) 新亞鈣劑 Sinocalcin Pulv
上每日三次，每次一食匙

一瓶

(四) 鈣美仁補片 Calcimellen "Ingelheim"
上每日三次，每次二片

十二片

(四) 普洛肉汁 Fleischsaft "Puro"
上一日三次，每次一茶匙，和入溫水中

一瓶

服

滋養灌腸劑

(一) 牛乳 Kuhmilch 1100.0

卵黃 Eigelb 二個

食鹽 Nat chloratum 三.0

(二) 牛乳 Kuhmilch 上十分拌攪混和，為灌腸用

卵黃 Eigelb 二五〇.〇

葡萄酒 Vinum 二個

食鹽 Nat chloratum 一五.〇

上為灌腸用 三.〇

(三) 牛乳 Kuhmilch 上為灌腸用

澱粉 Amylum 二五〇.〇

上為灌腸用 六〇.〇

(四) 愛雷澱通 Eprepton 上為灌腸用

乳糖 Sacch lact 二〇.〇

溜水 Aq dest 二〇〇.〇

上為灌腸用

(五) 潑洛托根 Protogen

三〇・〇

溜水 Aq. dest.

一〇〇・〇

上為灌腸用

(六) 牛乳 Kuhmilch

三〇・〇

肉汁 Fleischsaft

二五〇・〇

葡萄酒 Vinum

二〇・〇

澱粉 Amylum

六〇・〇

上為灌腸用

(七) 五%純葡萄糖溶液

Glucose Solution

一〇〇—二〇〇

上為灌腸用

(註) 行滋養灌腸之前。須先洗腸。洗後約一小時方可施行。一次灌入之量。最多以三〇〇西西為度。灌腸之藥液。宜稍行微溫。

(附) 營養注射藥

純葡萄糖注射液 Glucose Solution, 樂地儂 Lo-

dion, 葡萄糖鈣 Gluco-Calcium, 古卡新 Glu-

臨床經驗處方

五三

calcin, 新亞鈣劑 Sinocalcin。

山德士鈣 Calcium "Sandoz", 樂地儂鈣 Lodion

Calcium, 長命新鈣注射液 Gluco-cal, 維他葡萄

糖西 Vitadextrose, 甲丁維他 A. D. Vita, 康

泰 Cantan, 力度伸 Redoxon, 西比忌 Cobion,

富爾生命 Frucimin, 西他新 Citasin, 維斯命

Vicemin, 彼他比恩 Betabion, 乘乃維 Benerva

, 培他生 Detaxin, 惟皮革新 Vibixin, 維他新

Vitasin, 維彼命 Vibemin, 維皮西 Vibici。

第十九章 止瀉劑處方

一 消毒性止瀉劑

(一) 亞力山丁 Allisatin

十二粒

上每日三次, 每次二粒

(二) 腸用慰歐仿 Entero-Vioform

六片

每日三次, 每次一片

(三) 表飛鳴 Biofermin

三・〇

臨床經驗處方

- (四) 甘汞 Calomel 上分三包，一日分服 1.0
- 病根甯 Biogenin 1.5
- 乳糖 Sacch lact 1.0
- (五) 保爾泰素 Biolactase 上分三包，一日分服 3.0
- (六) 保莫迪 Pomaton 上分三包，每日三次各一包，攪拌於溫水中服 10.0
- (七) 加爾康 Garcon 上分三包，一日三次分服 11.0
- (八) 百哥消片 Peptosol 每日三次，每次二片 六片
- (九) 愛兒杜方 Edoform 上每日三次，每次一片 六片
- (10) 超炭 Ultracarbon 上分三包，一日三次各一包 六.0

- (11) 阿爾細林 Alsin 上分三包，一日三次分服 3.0
 - (12) 腸固甯 Charomin 上分三包，每日三次各一包 3.0
 - (13) 優炭 Fucarbon 上分三包，每日三次各一包 3.0
 - (14) 矽鋁康 Silical 上分三包，每二小時一包 六.0
 - (15) 矽炭銀片 Agsicol 上每日三次各二片 六片
- (註) 上列處方，適用於消化不良，腸內異常發酵引起之腹瀉
- 一一 收斂性止瀉劑
- (1) 阿片末 Pulv Opium 上分三包，一日三次各一包 0.1
 - 乳糖 Sacch lact 11.0
 - (11) 阿片末 Pulv Opium 次硝酸鉍 Bismuth subnitricum 3.0

上分六包，二日分服

(三) 阿片丁幾 Tine Opium

糖漿 Sirrup simplici

溜水 Aq dest

上每日三次分服

(四) 阿片膏 Ext Opium

番木鱉膏 Ext Strychnin

甘草末及膏 Pulv et. Sucus liquoritae

適量

上為丸二〇粒，以石松子末為衣，一日

三次各一粒

(五) 阿片丁幾 Tine Opium

番木鱉丁幾 Tine Strychnin

番椒丁幾 Tine Capsici

精製樟腦 Camphora depurata

薄荷油 Ol Menthae

酒精 Alkohol

上以二〇滴至三〇滴，混於水或酒中，

每一時或數時飲用一次

(六) 佗浮氏散 Pulv Doveri

乳糖 Sacch lact

上分三次，一日分服

(七) 單乃並 Tannalbin

上分三次，一日分服

(八) 獸炭末 Carboanimalis

單乃並 Tannalbin

次硝酸鉍 Bismuth subnitricum

上分六包，每二時各一包

(九) 太拿卡耳 Tanocal

上分三包，一日分服

(一〇) 麻而單甯片 Mullannin

上每日三次，每次二片

(一一) 阿收單甯片 Acetanin Tablets

上每日三次，每次二片

(註) 上列處方。適用於排便暢快，腸內腐敗性食物或細菌性產物已減少時。

三 止瀉劑外用方

(一) 〇・五%單甯酸水 Acid Tannicum

(〇・五%)三〇〇・〇

阿片丁幾 Tinct Opium 一〇滴

亞拉伯樹膠 Gummi arabicum 七・〇

上為灌腸料

(二) 阿片膏 Ext Opium 〇・〇五

可可脂 Ol Cacao 二・〇

上為坐藥一個，一日二三次插入肛門

(附)止瀉注射藥

鹽酸嗎啡注射液 Morphine hydrochloricum。

(註)劇烈之瀉。亦可注射鹽酸嗎啡。因嗎啡有鎮靜腸蠕動效力。作用與阿片類似故也。

第二十章 驅蟲劑處方

(一) 綿馬根末 Pulv Radix Filicis 一二・〇

上用膠紙分為三包，經十五分至一時再服一包

(二) 綿馬膏 Ext Filicis 五・〇—一〇・〇

上分裝膠囊十個，每十五分鐘服一個

(三) 山道年 Santonin 〇・〇五

甘汞 Calomel 〇・〇三

乳糖 Sacch Lact 〇・〇五

上為一包，與等量三包，每晨空腹各一包

(四) 山道年錠 Pastilli Santonin (〇・〇1)二片

上空腹一次頓服

(五) 替摩耳 Thymol 一・〇

上入膠囊，一次頓服

(六) 替摩耳 Thymol 一・〇

那夫答林 Naphthalin 〇・三

上為一包，給等量二包，每晨服一包

(七) 石榴根皮 Cortex Radix Granati 四〇・〇

上用冷水四〇〇西西，浸十二小時後，更濃煎爲二〇〇西西，在晨間一二時間內，分三四次服下

- (八) 蛔滅納 Helminal 三片
上每日三次分服
- (九) 布妥倫 Putalan 三片
上每日三次分服
- (十) 賽雷丁 Seretin 三粒
上空腹時以溫水送下
- (一) 阿斯卡立舵丸 Ascariidol Pill. 三粒
上空腹時頓服
- (三) 治疳仁 Digemin 四・〇
上服時以十倍之水沖淡，一日三次分服
- (二) 克痢殺螟 Chrysemine 十五粒
上晨間空服時服三粒，五日服完
- (四) 貝代明 Bedermin 三粒
上晨間空服時頓服
- (五) 純四鹽化炭素 Carb. Tetrachlor 一・〇
臨床經驗處方

上分裝膠囊二個，每晨服一個

驅蟲劑外用方

- (一) 藥用石鹼 Sapo medicatus 五・〇
溜水 Aq dest 五〇〇・〇
上調和爲灌腸料，每日一次，連用數日
 - (二) 常醋(食醋) Acetum 二五・〇
溜水 Aq dest 二五・〇
上爲灌腸料
 - (三) 克痢殺螟液 Liq Chrysemine 一〇〇〇滴
溫水 Aq dest 二〇〇・〇
上爲灌腸料
 - (四) 水銀軟膏 Quicksilbersalbe 三・〇
上爲肛門周圍塗擦劑(肛門搔癢時用之)
- (附) 驅除腸寄生蟲注射藥
- 妥拉司敏 Drasmin・珊篤曹兒 Santisol・山道年

水 Santonisol・賜福嬰 Santoin。

第二十一章 止血劑處方

- | | | | |
|-----|---------|------------------------|---------|
| (一) | 白阿膠 | Gelatina alba | 一〇〇〇 |
| | 食鹽 | Nat chloratum | 二〇〇 |
| | 溜水 | Aq dest | 一〇〇〇 |
| | | 上一日三次分服 | |
| (二) | 鹽化鈣 | Calcium cholratum | 二〇〇 |
| | 糖漿 | Sirup simplex | 一〇〇 |
| | 溜水 | Aq dest | 一〇〇 |
| | | 上一日量・三次分服 | |
| (三) | 可阿古連 | Coagulen | 五〇 |
| | 糖漿 | Sirup simplex | 一〇〇 |
| | 溜水 | Aq dest | 一〇〇 |
| | | 上每次一食匙・一日三次 | |
| (四) | 食鹽 | Nat Chloratum | 五〇 |
| | | 上一日數次各一茶匙・溶入微溫水中服 | |
| | | 下 | |
| (五) | 麥角膏 | Ext Secalis cornuti | 〇・五 |
| | 阿片末 | Pulv Opium | 〇・一 |
| | 白糖 | Sacch alba | 二〇〇 |
| | | 上為五包・每三時服一包 | |
| (六) | 麥角丁幾 | Tinc Secalis cornuti | 一・五 |
| | 金印草流膏 | Ext Hydrastis fluidum | 一・〇 |
| | 苦味丁幾 | Tinc amara | 一・五 |
| | 糖漿 | Sirup simplex | 一〇〇 |
| | 溜水 | Aq dest | 一〇〇 |
| | | 上每日三次分服 | |
| (七) | 攝加可甯 | Secacornin | 二・〇—三・〇 |
| | 溴化鉀 | Kali bromatum | 一・五 |
| | 橙皮糖漿 | Sirup auranti corticis | 一〇〇 |
| | 溜水 | Aq dest | 一〇〇 |
| | | 上每日三次分服 | |
| (八) | 歐牛丁或胎孛星 | Ernutin(Tenosin) | 一・五 |
| | 苦味丁幾 | Tinc amara | 一・五 |
| | 溜水 | Aq dest | 一〇〇 |

上每日三次分服

(九) 過氯化鐵液 *Liq Ferri Ssqnichlor.* 11.0

桂皮水 *Aq Cinnamomi* 1100.0

橙皮糖漿 *Sirup auranti corticis* 10.0

上每二時服一食匙

(十) 沒食子酸 *Acid Gallicum* 1.5

乳糖 *Sacch Lact* 1.0

上分三包，一日分服

(十一) 醋酸鉛 *Plumbum aceticum* 0.2

阿片 *Opium* 0.1

白糖 *Sacch alba* 0.2

上為十包，每二小時一包

(十二) 斯錫普錫輕片 *Stypticin Tab.* 六片

上每日三次，每次二片

(十三) 克羅甸 *Clauden* 六片

上每日三次，每次一片

(十四) 奧保司太丁片 *Opostatin Tab.* 十八片

上每日三次，每次三片

(十五) 脫淪補靈 *Thromburin Tab.* 十八片

上每日二三次，每次三片

(十六) 歐益斯他普親 *Eustaphin Tab.* 十二片

上每日三次，次每二片

(十七) 維他命丙製劑 *Vitamin C Präparat*

(註) 維他命丙製劑甚多，例如康泰 *Cantam*，力度伸 *Reloxon*，西北恩 *Cebion*，西他新 *Chasin*，富爾生命 *Frueminin*，維他命 *Vitamin* 等。對齒齦出血，出血性素質，壞血病（出血性紫斑病），血友病等均有效。處方詳見營養劑章中。

止血劑外用方

(一) 單寧酸 *Acid Tannicum* 適量

上撒布出血部

(二) 克羅甸粉 *Clauden Pulv.* 適量

上撒布出血部

(三) 脫淪補靈粉 *Thromburin Pulv.* 適量

上為外出血撒布料

(四) 過鹽化鐵液 *Liq Ferri Ssqnichlor.* 適量

上以棉花蘸藥液貼於出血部

(五) 二%諾服卡音液 Liq Novocain

(11%) 二〇・〇

腎上腺液 Adrenalin

二—三滴

上注射局部・行麻醉手術・可防出血

(六) 腎上腺液 Liq Adrenalin

一・〇

溜水 Aq dest

二〇〇・〇

上為尿道注入料(膀胱出血)

(七) 過氯化鐵液 Liq Ferri sesquichlor 三・〇

溜水 Aq dest

二〇〇・〇

上灌洗陰道用(子宮出血)

(附) 出血注射藥

鹽化腎上腺液

Adrenalin hydrochloricum・麥

角注射液 Ergotina・濃氯化鈣注射液 Calcium

chloride (10%)・白阿膠注射液 Gelatin So-

lution・可阿古連 Coagulan・濃厚食鹽水 Sodi-

um chloride Strong solution・古卡新 Cluca-

lein・斯錫普錫輕 Stypticin・血來必定 Helap-

tin・胎擊星 Tanosin・攝加可雷 Secacornin・

克羅甸 Clauden・孟納安爾 Maniol・奧保司太

丁 Opatin・阿那普托膠 Anaptol Gelatin・脫

淪補靈 Thrompurin・古阿哥 Koagol・克羅登

Cloten・阿芬尼而 Afenil・吐血乃蘇 Calcinasol

・咯血來定 Calsoride・福特拉新 Hydrasin・歐

益斯他普親 Eustapin・制血痼 Stypton・

(維他命丙製劑) 康泰 Cantan・西比恩 Cebion

・力度伸 Redoxon・富爾生命 Frucimin・西他

新 Chasin・維斯命 Vicamin・

(附) 大出血發見急性貧血現象

時之注射藥

林格兒氏液 Liq Ringeri・洛克氏液 Liq Lockei

・生理食鹽水 Kochsalz Lösung・

第二十二章 清涼劑處方

(一)

稀鹽酸	Acid hydrochloric. diluti	1.00
赤葡萄酒	Rotwein	100.00
糖漿	Sirup simplex	100.00
溜水	Aq. dest.	1000.00

上一日三次分服(或每二小時一格)

(註) 如嫌稀鹽酸味太酸。可減少用量至0.5。再各種熱性病應用清涼劑時。倘欲預防心臟衰弱。可加入其他強心興奮藥。例如毛地黃丁幾(1.5)，斯忒羅仿丁幾(1.0)等。

(二)

枸橼酸	Acid Citricum	0.5-1.00
糖漿	Sirup simplex	100.00
溜水	Aq. dest.	1000.00

(三)

酒石酸	Acid Tartaricum	1.00
重碳酸鈉	Nat. bicarbonicum	1.00
糖漿	Sirup simplex	100.00
溜水	Aq. dest.	1000.00

上一日三次分服(或每二小時一格)

各科重要疾患分類處方摘要

第一章 傳染病劑處方

一 傷寒方

- | | | | |
|--------------------|------|------------------------------------|-------|
| (一) 甘汞 Calomel | 1.0 | (六) 正拉密洞 Pyramidon | 0.6 |
| 乳糖 Sacch lact | 1.5 | 溜水 Aq dest | 100.0 |
| 上分三包，一日三次分服(腸消毒用) | | 每日三次，一日分服(同上) | |
| (二) 山道年 Santonin | 0.05 | (七) 鹽酸規寧 Chinin hydrochloricum | 0.5 |
| 甘汞 Calomel | 0.5 | 上為一包頓服(同上) | |
| 上一次頓服(同上) | | (八) 克利金 Cryogenine | 1.5 |
| (三) 薩羅耳 Salol | 1.5 | 乳糖 Sacch. lact | 1.5 |
| 上分三包，一日三次分服(同上) | | 上分三包，一日分服(同上) | |
| (四) 雷沙而辛 Resorcin | 1.5 | (九) 蓬祕靈奎甯片 Bonpyrin Quinine Tab.六片 | |
| 上分三包，一日三次分服(同上) | | 上每日三次各二片(同上) | |
| (五) 安替疋林 Antipyrin | 1.5 | (十) 福白龍片 Febnon Tab. | 九片 |
| 乳糖 Sacch lact | 1.5 | 上每日三次各三片(同上) | |
| | | (二) 傷寒溶菌汁 Typhophagin | 三管 |
| | | 上一日三次，每次一管，調入溫水中內 | |

臨床經驗處方

六三

臨床經驗處方

六四

服（殺菌用）

(三) 稀鹽酸 Acid hydrochloric diluti 1.0

赤葡萄酒 Rotwein 5.0

橙皮糖漿 Sirup auranti corticis 10.0

溜水 Aq dest 100.0

上每兩小時服一食匙（解渴用）

（附）傷寒注射藥

傷寒血清 Antityphoid Serum, 握姆納丁 Om-nadin, 愛而斯丁 Erstin, 安替保 Antipol, 百乃定 Panadin, 規甯烏來坦 Quinine urethan 巴苦諾恩 Bagnon, 福白龍 Febnon, 電銀膠 Elect-fargol, 滅多病 Metabin, 百浪多息 Pronfosil。
 （預防）傷寒預防漿苗 Typhoid Vaccine, 傷寒混合疫苗 Triple typhoid Vaccine。

(三) 毛地黃丁幾 Tine Digitalis 1.5

斯忒維仿丁幾 Tine Strophanthi 1.0

赤葡萄酒 Rotwein 10.0

溜水 Aq dest 100.0

每二小時服一格，一日六次（預防心臟衰弱用）

衰弱用）

(四) 布福他利斯 Bufotalis 十二片

上每日三次，每次二片（同上）

(五) 葡萄糖 Glucose 100.0

上每日三次，每次一食匙（營養目的）

(六) 康泰 Cantan 六片

上每日三次，每次一片（同上）

(七) 西比恩 Cebion 六片

上每日三次，每次一片（同上）

(八) 富爾生命 Frucinin 十二片

上每日三次，每次二片（同上）

（附）預防衰弱·營養注射藥

純葡萄糖注射液 Glucose Solution, 樂地儂 Lodinon, 山德士鈣 Calcium "Sandoz", 維他葡萄糖西 Vitadextrose, 康泰 Cantan, 西比恩 Cebion, 富爾生命 Frucinin, 維皮西 Vibitei 等。

(一九) 精製樟腦 *Camphor depurata*

白糖 *Sacch lact*

上分十包，每一時服一包（急性心臟衰弱用）

1.0
5.0

(附) 急性心臟衰弱注射藥

樟腦油注射液 *Ol Camphor*，可拉明 *Coramine*，
康福那心 *Camphonasin*，海克賽通 *Hexetone*，
狄茄令 *Digalen* 等。

(二〇) 可拉明 *Coramine*

烏羅透賓 *Urotropin*

糖漿 *S. S.*

溜水 *Aq dest*

上一日三次分服（同上）

3.0

2.0

10.0

100.0

(二一) 白阿膠 *Gelatin alba*

糖漿 *Sirup simplex*

溜水 *Aq dest*

上為水劑，一日三次分服（腸出血用）

10.0

10.0

100.0

(二二) 粗製明礬 *Alumin crudum*

阿片末 *Tine Opium*

白糖 *Sacch alba*

上分為十包，每三時服一包（同上）

1.0

0.3

3.0

(二三) 科德孝 *Cadechol*

(二四) 卡代柴而 *Cardiazol*

上一日四次分服（同上）

卡狄司 *Cardase*

毛地黃丁幾 *Tine Digitalis*

橙皮糖漿 *S. auranti corticis*

溜水 *Aq dest*

四片

3.0

1.5

10.0

100.0

(二五) 可阿古連 *Coagulen Liq.*

糖漿 *Sirup simplex*

溜水 *Aq dest*

上每次一食匙，一日三次

(二六) 斯錫普錫輕 *Slypticin Tab.*

上每日三次，每次二片

5.0

10.0

100.0

六片

臨床經驗處方

六六

(二) 克羅甸 Clauden

上每日三次，每次一片

六片

(附)腸出血注射藥

白阿膠注射液 Gelatin Solution，可阿古連 Co-
agulen，濃厚食鹽水 Sodium Chloride strong
Solution，克羅甸 Clauden，孟納安耳 Manetol，
古阿哥 Koagol 等。

(二) 單乃並 Tannalbin

上分三包，一日分服(下痢劇烈時用)

三〇〇

(三) 麻而單寧片 Maltania

上每日三片，每次二片(同上)

六片

(三) 超炭 Ultracarbon

上分三包，一日三次各一包(同上)

三〇〇

(三) 腸固寧 Charcenin

上分三包，一日三次各一包(同上)

三〇〇

(三) 矽炭銀 Agsicol Tab.

上一日三次各二片(同上)

六片

二 霍亂方

(一) 甘汞 Calomel

乳糖 Sacch lact

〇・五

上為一包，一次頓服(腹鳴便瀉初期用)

(二) 甘汞錠 Pastill Calomel

二片

上一次頓服(同上)

(三) 阿片丁幾 Tine Opium

一〇〇〇

番木鱈丁幾 Tine Strychnin

一〇〇〇

番椒丁幾 Tine Capsici

一〇〇〇

精製樟腦 Camphora depurata

二〇〇〇

薄荷油 Ol Menthae

二〇〇〇

酒精 Alkohol

上以二〇滴至三〇滴，混於水或酒中，
每二時服一次(鎮吐止瀉用)

(四) 毛地黃丁幾 Tine Digitalis

一・五

斯忒羅仿丁 Tine Strophanthi

一・〇

哥羅力 Chloroform

七滴

阿片丁幾 Tine Opium

一・五

糖漿 Sirup simplex

100.0

溜水 Aq dest

100.0

上一日六次分服，每兩小時一次(強心)

止瀉止吐用)

(五) 哥羅頓 Chlorodin

1.5

阿片丁幾 Tinc Opium

1.5

番木鱉丁幾 Tinc Strychnin

1.5

溜水 Aq dest

100.0

上每二小時服一格(同上)

(六) 阿片 Pulv Opium

0.2

樟腦 Camphor

0.3

白糖 Saech alba

5.0

上為十包，每一時服一包(強心止瀉用)

(七) 單乃並 Tannalbin

3.0

次硝酸蒼鉛 Bismut subnitricum

1.5

上分三包，一日分服(止瀉用)

(八) 腸固寧 Charconin

2.0

單乃並 Tannalbin

3.0

臨床經驗處方

六七

上分三包，一日分服(同上)

(九) 阿爾細林 Alsilin

2.0

上分三包，一日分服(同上)

(十) 超炭 Ultracarbon

3.0

上分三包，一日三次分服(同上)

(註) 劇烈大吐瀉之注射藥。可用鹽酸嗎啡 Morphine hydro-

chloricum o

(11) 稀鹽酸 Acid hydrochloric. diluti

1.0

赤葡萄酒 Rotwein

10.0

糖漿 Sirup simplex

10.0

溜水 Aq dest

1100.0

上每日多次分服(作飲料解渴用)

(12) 千倍過錳酸加里液 Liq. Kali Perman-

ganicum (0.1%)

1100.0

上每日多次分服(同上)

(13) 食鹽 Natrium chloratum

6.0

碳酸鈉 Natrium carbonicum

1.0

溜水 Aq dest

1000.0

臨床經驗處方

六八

上即生理食鹽水，經消毒後，注入靜脈或皮下（補充體內水分）

（註）生理食鹽水有現成裝入玻璃管者出售。有三〇〇西西及五〇〇西西等數種。便利起見。均可購用。

（四）林格兒氏液 *Liq. Ringeri* 五〇〇・〇

上為靜脈注射用（同上）

（五）洛克氏液 *Liq. Lockei* 五〇〇・〇

上為靜脈注射用（強心兼補充水分用）

（六）芥子精 *Spiritus Sinapis* 九五・〇

杜松實油 *Ol juniperi* 五・〇

上為擦劑（腓腸肌痙攣用）

（七）霍亂保安使 *Cholperos* 三片

每晨空腹時吞服一片（預防霍亂用）

（八）霍亂內服萬克醒片 *Cholera Orovacin* 六片

空腹時吞服綠色藥片一片，隔一時後再

服褐色藥片一片，連服三日（同上）

（九）霍亂安妥星 *Cholera Enterocin* 六片

空腹時吞服綠色藥片，一時間內再服淡

紅色藥片，服後暫勿飲食，以連服三日為度（同上）

（附）霍亂注射藥

霍亂血清 *Anticholera Serum*。

（預防）霍亂漿苗 *Cholera Vaccine*。

三 痢疾方

（一）甘汞 *Calomel* 〇・五

乳糖 *Sacch lact* 〇・五

上一次頓服

（二）蓖麻子油 *Ol Ricini* 二〇・〇

上一次頓服

（三）阿開司多 *Areastol* 二〇・〇

上一次頓服

（四）硫酸鎂 *Mag. sulfuricum* 二〇・〇

上溶於糖水中一次頓服

（五）藥特靈丸 *Yatren Pills* 十二粒

- (六) 特生靈痢疾丸 *Dysentulin Pills* 十二粒
 上每日三次，每次四粒
- (七) 雷佛奴耳粒吞 *Rivanollets* 六粒
 上每日三次，每次一或二粒
- (八) 腸用慰歐仿 *Entero-Vioform* 六片
 上每日三次，每次一或二片
- (九) 膠衣鹽酸吐根素「大寶來」 *Emetine hydrochloride "Tabloid"* 二粒
 上每晚頓服
- (十) 碘化吐根素鉍「大寶來」 *Emetine bismuth iodide "Tabloid"* 六片
 上每日三次，每次一粒
- (一) 卡白松 *Carbarsone* 九粒
 上每日三次，每次一粒
- (二) 卡羅芬 *Kharophen* 十粒
 上每日二次，每次一粒
- (三) 好梅親片 *Homethin Tablets* 六片

- (四) 麗芽恩片 *Rimaon Tab.* 六片
 上每日三次，每次一片
- (五) 阿米脫痢丸 *Amoetren Pill.* 十二粒
 上每日三次，每次二粒
- (六) 去痢的靈 *Tyteren* 六片
 上每日三次，每次二片
- (七) 安痢生丸 *Andyzen Pill.* 六粒
 上一日三次，每次二粒
- (八) 滅痢疾桿菌苗 *Bacte-Dysenterii-Phage* 六管
 上每三小時一次，每次以藥液一管和入重曹水內服
- (九) 滅痢菌汁 *B. D. Phage* 三管
 以藥液一管，和入水中內服，一日三次
- (十) 敵痢菌汁 *D. S. Phage* 三管
 以藥液一管，和入水中內服，一日三次
- (三) 滅痢菌苗 *Bacte-Intesti Phage* 四管
 以藥液一管，和入水中內服，每三小時

一次

(三) 高黎底格 Colitigue

上和入溫水中，一次頓服

一管

(附)痢疾灌腸方

(一) 食鹽水 Aq. Nat. Chlorat. (1%) 三〇〇・〇

上為灌腸料

(二) 藥特靈溶液 Yalren Lösung (1%)

一〇〇・〇

上為一次灌腸料

(三) 特生靈溶液 Dysentulin Lösung (2%)

一〇〇・〇

上為一次灌腸料

(四) 腸用懋歐仿溶液 Entero Vioform Lösung

(0.5%)

一〇〇・〇

上為灌腸料，每日一次

(五) 五千倍麗茅恩溶液 Rimaon Lösung (5%)

一五〇・〇

上為灌腸料，每日一次

(六) 去痢的靈溶液 Tryteren Lösung (2%)

一五〇・〇

上為灌腸料

(七) 灌腸用滅痢菌汁 P. B. Phage (120 cc) 一管

上為灌腸用

(附) 痢疾注射藥

鹽酸愛美丁 Imetine hydrochloricum・滅痢仁

Melysin・赤痢血清 Anti-Dysenterie serum等。

(預防)赤痢伐克辛 Dysenterie Vaccine・星牌傷

寒混合疫苗 Dysentery Vaccine "Star Brand"

四 鼠疫方

(一) 毛地黃丁幾 Tine Digitalis 1・5

斯忒羅仿丁幾 Tine Strophanthi 1・〇

糖漿 Sirup simplex 1・〇・〇

溜水 Aq dest 1・〇〇・〇

上每二小時服一格

(二) 安息香酸咖啡鈉 *Caffein-Nat. benzoic* 1.0

精製樟腦 *Camphor depurata* 0.6

乳糖 *Sacch. lact.* 2.0

上分六包，每二小時服一包

(三) 伊克度軟膏 *Ung. Ichthyol* 1.0

上為鼠疫性癰發炎時塗布用

(四) 水銀軟膏 *Ung. Hydrargyri cinereum* 1.0

上為發炎部塗布用

(註) 鼠疫尚無內服特效藥。其他均不外對症治療。

(附)鼠疫注射藥

鼠疫血清 *Anti-plague serum.*

(預防) 鼠疫漿苗 *Plague Vaccine.*

五 白喉方

(一) 氯化鉀 *Kali Chloricum* 5.0

薄荷油 *Ol. Menthae* 兩滴

臨床經驗處方

溜水 *Aq. dest.* 200.0

上為含嗽用

(二) 福美明達 *Fonamint* 六片

上每一至二小時含一片口內，待其溶化

(三) 旁弗拉文錠 *Panflavin Tab.* 六片

上為口內含嗽用，一日多次

(四) 派派沃汀 *Papyotin* 1.0

溜水 *Aq. dest.* 2.0

鹽酸 *Acid. hydrochloricum* 適量

上調和，每十至十五分鐘塗布一次

(五) 昇汞 *Hydrargyri bichloratum* 0.5

酒石酸 *Acid. Tartaricum* 0.1

溜水 *Aq. dest.* 5.0

上為患部塗布用

(六) 雷沙而辛 *Resorcin* 3.0

甘油 *Glycerin* 3.0

上為患部塗布用

臨床經驗處方

七二

酒精 Alcohol

110.00

哥羅方 Chloroform

110.00

上爲患部塗布用

(八) 洛各氏液 Solutio Lugol

上爲塗布劑

適量

(九) 硝酸銀液 Liq. Argent. nitricum (2%) 適量

上爲塗布劑

(附)白喉注射藥

白喉血清 Anti-Diphtheria serum, 白喉抗毒素

Diphtheria Antitoxin, 握姆納丁 Omnadin, 百

乃定 Panadin, 安替保 Antipol, 愛而斯丁 Eis-

tin, 百浪多息 Prontosil 等。

(預防)白喉預防藥苗 Diphtheria prophylactic

Vaccine。

六 腦膜炎方

(一) 水銀軟膏 Ung. Hydrargyri cinereum

六·〇—一二·〇

羊毛脂 Lanolin

二四·〇

上爲六包，每三時一包，塗擦於頭項上
部(消炎用)

(二) 水蛭 Blutegel

數條

上貼於耳後(同上)

(三) 溴化鉀 Kali. Bromatum

一·五

溴化鈉 Nat. Bromatum

一·五

溴化銣 Amm. Bromatum

一·五

溜水 Aq. dest.

100.00

上每二小時服一次，每次一格(鎮靜用)

(四) 抱水格魯拉兒 Chloral hydratum

11.00

橙皮糖漿 S. auranti corticis

100.00

溜水 Aq. dest.

100.00

上每二小時服一食匙(同上)

(五) 盧密拿 Luminol

1.00

乳糖 Sacch. lact.

1.50

上分三包，一日三次分服(同上)

(六) 普密拿片 Prominal Tab.

三片

上一日三次各一片(同上)

(七) 薩耳佛那耳 *Sulfonal* 〇・五

上為一包，每三時一包(同上)

(八) 抱水格魯拉兒 *Chloral hydratum* 二・〇

溜水 *Aq. dest.* 一〇〇・〇

上為灌腸料

(九) 哥羅方 *Chloroform* 一五—三〇・〇

上為吸入劑

(十) 洛太龍 *Rodilone* 六片

上一日三次，每次一片(殺菌)

(十一) 大健風 *Dagenan* 六片

上一日三次至六次，每次一片(同上)

(附) 腦膜炎注射藥

腦膜炎血清 *Anti-Meningococcus Serum.*

(預防) 腦膜炎漿苗 *Meningococcus Vaccine.*

預防腦膜炎疫苗 *Antimeningococcus Vaccine.*

(十二) 阿司必林 *Aspirin* 〇・五

上為一包，一次頓服(頭痛發熱用)

臨床經驗處方

(十三) 散利痛 *Saridon*

上一次頓服(同上)

二片

七 丹毒方

(一) 伊克度軟膏 *Ung. Ichthyol* 一〇・〇

上塗擦患部，每日二至四次(消炎用)

(二) 石炭酸 *Acid. Carboricum* 一・〇

酒精 *Alkohol* 一・〇

松節油 *Ol. Trebinthinae* 二・〇

甘油 *Glycerin* 五・〇

上塗布患部，每二小時一次(同上)

(三) 千倍雷佛奴耳液 *Liq. Rivanol (0.1%)* 適量

上注射於患部附近之皮下

(註) 丹毒發生原因。係連鎖狀球菌而起。內服藥與猩紅熱同。參閱第七八頁猩紅熱處方。

(附) 丹毒注射劑

丹毒血清 *Anti-Erysipelas Serum.* 鍊狀球菌血

清 *Anti-Streptococcus Serum.* 電銀膠 *Elec*

七三

targol, 百浪多息 Pronstosil, 沙呂賽勃他星 Solu-Septazine, 百膿清 Pronzin 等。

八 破傷風方

- (一) 抱水格魯拉兒 Chloral hydratum 二・〇
阿拉伯樹膠漿 Mucilag Gummi ara-
bicum 一〇・〇
溜水 Aq dest 一〇〇・〇
上混和爲灌腸料
- (二) 哥羅方 Chloroform 一〇—三〇・〇
上爲吸入劑
- (三) 溴化鉀 Kali. Bromatum 二・〇
溴化鈉 Nat. Bromatum 二・〇
溴化銣 Amm. Bromatum 二・〇
溜水 Aq dest 一〇〇・〇
上一日三次分服
- (四) 纈草丁幾 Tine Valerianae 二・〇
阿片丁幾 Tine Opium 一・〇

糖漿 Sirrup simplex 一〇・〇
溜水 Aq dest 一〇〇・〇

上一日三次分服

(五) 盧密拿 Luminol 一・五

乳糖 Sacch lact 一・五

上分三包, 一日三次分服

(六) 普蜜拿片 Prominal Tab. 二片

上一日二次分服

(七) 立刻抵疼 Suppositoria Rectidon 一個

上塞入肛門

(附) 破傷風注射劑

破傷風血清 Anti-Tetanus Serum, 盧密拿溶液
Luminal Solution, 硫酸鎂注射液 Magn sium
sulphate, 鎂固素靈 Magsofin, 麻苦部龍 Mag-
bron 等。

九 流行性感冒方

- | | | | | | |
|-----|------------------------------|-----|-----|--------------------------------|-------|
| (一) | 安替疋林 Antipyrin | 一·五 | (一) | 補利奇酶粉 Polyzyme tuly | 一·五 |
| | 上分爲三包，每日三次分服（解熱鎮痛用） | | (二) | 大黃蘇打片 Rhei-Sodamit | 六片 |
| (二) | 水揚酸鈉 Natrium Salicylicum | 一·〇 | (三) | 甘汞 Calomel | 一·〇 |
| | 上一次頓（同上） | | (四) | 乳糖 Sacch lact | 一·五 |
| (三) | 薩里疋林 Salipyrin | 二·〇 | (五) | 保爾泰素 Triolacase | 二·〇 |
| | 上分三包，一日分服（同上） | | (六) | 吐根丁幾 Tine Ipecacuanhae | 三·〇 |
| (四) | 阿司必林 Aspirin | 二·〇 | (七) | 阿母尼亞苗香精 Spiritus Ammonia ferri | 三·〇 |
| | 上分三包，一日分服（同上） | | (八) | 杏仁水 Aq pruni armeniacae | 六·〇 |
| (五) | 阿卡奴 Arcanol | 三片 | (九) | 溜水 Aq dest | 一〇〇·〇 |
| | 上分三包，一日分服（同上） | | (十) | 安息香酸 Acid Benzoicum | 一·五 |
| (六) | 加當 Gardan | 三片 | | | |
| | 上一日三次各一片 | | | | |
| (七) | 蓬祕靈奎寧片 Benpyrin Quinine Tab. | 六片 | | | |
| | 上每日三次各二片（同上） | | | | |
| (八) | 福白龍片 Felnon Tab. | 九片 | | | |
| | 上一日三次，每次三片 | | | | |
| (九) | 重曹 Natrium bicarbonicum | 三·〇 | | | |
| | 上一日三次，每次三片 | | | | |

- | | | | |
|---------------------------------|-------|-------------------------------------|------|
| 白糖 Sacchar. alba | 三・〇 | (110) 鹽酸嗎啡 Morphine hydrochloricum | 〇・二 |
| 上分作十包，每隔三小時一包(同上) | | 苦扁桃水 Aq Amygdalar. amarum | 二〇・〇 |
| (16) 保利加素 Polygasol | 六・〇 | 上於咳嗽時頓服十五滴(同上) | |
| 百咳定液 Liq. Paedin | 六・〇 | (111) 浮羅那耳 Veronal | 〇・五 |
| 糖漿 Sirup simplex | 一〇・〇 | 上臨臥時一次頓服(催眠用) | |
| 溜水 Aq dest | 一〇〇・〇 | (112) 寐底拿 Medinal | 一片 |
| 上每日三次，二日分服(同上) | | 上臨臥頓服(同上) | |
| (17) 安嗽精 Antihustin Liq. | 六・〇 | (113) 凡普樂 Veparon (預防感冒外用藥) | 一瓶 |
| 知阿可爾 Thicool | 三・〇 | 上滴於手帕上，嗅入鼻內，一日數次 | |
| 阿耳退糖漿 S. Althaeae | 二〇・〇 | (附)感冒注射藥 | |
| 溜水 Aq dest | 一〇〇・〇 | 握姆納丁 Ommadin，百乃定 Panadin，安替保 | |
| 上每日三次，二日分服(同上) | | Antipol，愛而斯丁 Eristin，息熱定 Simadin， | |
| (18) 鹽酸海洛因 Heroin hydrochloric. | 〇・〇五 | 抗熱元 Confobrogen，重鹽酸奎寧 Quinine Dihy | |
| 乳糖 Sacch lact | 五・〇 | drochloride，規寧烏來坦 Quinine urethane， | |
| 上分十包，每日三四次各一包(劇咳用) | | 福白龍 Febnon，巴苦諾恩 Bagnon，洪宇隆 | |
| (19) 磷酸科亭 Cofein phosphoricum | 〇・〇二 | Fiberung，敗熱速 Barfal等。 | |
| 乳糖 Sacch lact | 〇・五 | | |
| 上為一包，咳嗽時頓服(同上) | | | |

一〇 瘧疾(間歇熱)方

(一) 鹽酸規寧 *Chinin hydrochloricum* 〇・五

上裝入膠囊，於發作前四五小時頓服

(二) 鹽酸規寧 *Chinin hydrochloricum* 二・〇

上分裝膠囊六個，一日三次各一個，二

日分服

(三) 歐規寧 *Fuchinin* 一・〇

上一次頓服

(四) 福白龍片 *Felnon Tab.* 五片

上於發作前一次頓服

(五) 阿立斯妥清 *Aristochin* 六片

上每日三次各一片，二日分服

(六) 瘡滌平 *Atebrin* 十五片

上每日三次，每次一片，連服五日（惡

性瘡）

(七) 撲瘧母星 *Plasmoquine* 九片

上每日三次，每次一片（繼續上方連服

最效）

(八) 雞納撲瘧母星 *Quino-plasmoquine* 十五片

臨床經驗處方

(九) 殺瘧萬能 *Chinormina* 六片

上每日三次，食後各一片

(附) 瘧疾注射藥

重鹽酸規寧 *Quinine dihydrochloride*・規寧烏來

坦 *Quinine urethane*・福白龍 *Felnon*・希宜佐

爾 *Chinisol*・巴苦諾恩 *Bagnon*・沸字隆 *Fiberung*・百苦諾恩 *Paeonon* 等。

（惡性瘧・久瘧）撲瘧母星 *Plasmoquine*・雞

納撲瘧母星 *Quino-plasmoquine*・新洒爾佛散

Neosalvarsan。

一一 再歸熱方

不外對症治療，應用規寧及其他退熱劑。參閱感

冒劑處方。

(附) 再歸熱注射藥

新洒爾佛散 *Neosalvarsan*（頗有特效）

一二 敗血膿毒症方

詳見外科劑處方中（參閱化膿性全身傳染）。

一二 猩紅熱（紅痧）方

- (一) 稀鹽酸 Acid hydrochloric diluti 1.0.0
赤葡萄酒 Rotwein 1.0.0
烏羅透賓 Urotropin 1.5
糖漿 Sirup simplex 1.0.0
溜水 Aq dast 1.00.0
上每日三次分服
- (二) 百浪多息 Pronstosi 六片
上每日三次，每次一片
- (三) 賽勃他星 Septazine 六片
上每日三次，每次一片
- (四) 百膿清 Pronzin 六片
上每日三次，每次二片
- (五) 消發滅定 Sulfamidine 六片
上每日三次，每次二片
- (六) 殺鏈龍 Sulfolinon 六片

上每日三次，每次一片

(七) 氯化鉀液 Liq. Kali Chloric. (2%) 1100.0
上為含嗽劑

(八) 洛各氏液 Solutio Iugol 適量
上為猩紅熱性咽喉炎塗布劑

(九) 硝酸銀液 Argent. nitricum (2%) 適量
上為咽喉發炎部塗布用

(註) 咽喉炎時。亦可應用福美明達，勞弗拉文錠等含於口內。

(附) 猩紅熱注射藥

猩紅熱血清 Anti-Scarlatina Serum，鍊狀球菌血清 Anti-Streptococcus Serum，百浪多息 Pronstosi，沙呂賽勃他星 Sola-Septazine，百膿清 Pronzin，電銀膠 Electrareol 等。

(預防) 內服猩紅熱預防藥苗 Scarlat Fever Vaccine Prophylactic

一四 麻疹·風疹·水痘方

內服藥均以對症治療為原則。應用清涼，緩下，

興奮，解熱劑等。

(附) 麻疹·風疹·水痘注射藥

握姆納丁 *Ornadin*·安替保 *Antipol*·百乃定 *Panadin*·愛而斯丁 *Erstin*等。

(預防) 胎盤精 *Embryonin*。

一五 痘瘡方

(1) 甘油溶液 *Glycerin Solution* (50%) 適量

上於皮膚緊張時為塗布用

(11) 亞鉛華 *Zinc oxydatum* 五·〇

澱粉 *Amylum* 五·〇

上於痘瘡乾燥發癢期為撒布用

(12) 水楊酸 *Acid Salicylicum* 三·〇

澱粉 *Amylum* 三〇〇

甘油 *Glycerin* 一〇〇〇

上為泥膏，塗於軀幹及四肢，如面部及頸部，則以扁桃油代甘油，用假面固定之。

(註) 痘瘡內服藥。亦不外對症治療。可酌用退熱劑，清涼劑，興奮劑等。

臨床經驗處方

(附) 痘瘡注射藥

與麻疹注射藥同。

一六 百日咳方

(註) 詳見小兒科劑處方中。

一七 流行性耳下腺炎方

(1) 伊克度軟膏 *Ung. Ichthyol* 一〇〇

上為塗布用

(11) 安福消腫膏 *Aniiphologisium* 一〇〇

上為塗布用

(12) 醋酸鉛液 *Plumbum aceticum* (2%) 一〇〇

上為器包用

(13) 氯化鉀液 *Liq. Kali chloricum* (2%) 二〇〇

上為含嗽用 (口腔清潔)

(註) 耳下腺炎內服藥。與其他一般炎症同。可參閱外科劑中消炎內服方。

(附) 耳下腺炎注射藥

握姆納丁 *Omnadin*，百乃定 *Panadin*，百浪多息 *Prontosil*，百膿清 *Prouzin* 等。

一八 登革熱及黃熱病方

此兩種疾患。多流行於熱帶之地。溫帶極屬少見，療法不外應用腸消毒劑，下劑。其他均對症治療。

一九 睡眠病及黑熱病方

內服除對症治療外。宜用銻劑注射，頗有特效。

(附) 睡眠病及黑熱病注射藥

新斯銻波霜 *Nositosan*，安銻母霜 *Antimosan*，糖化銻錒 *Sibamine Glucoside*，酒石酸銻鉀 *Tartar Emetic*，安銻母素 *Antimosol*。

第二章 內科病處方

A 呼吸器病

一 氣管支炎方

- (一) 鹽酸嗎啡 *Morphin hydrochloric* 〇・〇五
乳糖 *Sacch lact* 三・〇
- (二) 磷酸科亭 *Codain phosphoricum* 〇・〇二
乳糖 *Sacch lact* 〇・五
上為一包，咳嗽時頓服(同上)
- (三) 佗浮氏散 *Pulvis Doveri* 〇・六
乳糖 *Sacch lact* 一・〇
上分三包，一日分服(同上)
- (四) 鹽酸嗎啡 *Morphin hydrochloric* 〇・二
苦扁桃水 *Aq Amygdalar amar.* 〇・〇
上於咳嗽時頓服十五滴(同上)

(五) 巴畢那兒 Pavinal 〇・〇三

新愛服雷 Neo-Evanin 二・〇

上分三包，一日三次分服(同上)

(六) 大咳司鎮粉 Pulv Takastin 一・五

百咳定粉 Pulv Paedin 一・五

上分三包，一日三次分服(同上)

(註) 氣管支炎劇咳時，亦可用二%杏仁水 Aq Laurocerae、

〇・一%鹽酸科卡音水 Aq Cocain hydro chloride、〇・五%

阿片丁幾水 Aq Tine Opium、或一%溴化鉀液 Liq Kali

Bromat 等。加熱使成氣體。為吸入療法。

具有止咳作用之注射藥。於必要時亦可酌量採用。例如鹽酸嗎啡

注射液 Morphin hydrochloric、鹽酸海洛因 Heroin hydroch

loric、盼得本 Pantopon、油科多耳 Eukodal、大咳司鎮 Taka

stin 等。

(八) 吐根丁幾 Tine Ipecacuanhae 一・五

阿母尼亞茴香精 Spiritus Ammonia

foeniculi 三・〇

杏仁水 Aq Laurocerae 三・〇〇

糖漿 Sirup simplex 一〇・〇

溜水 Aq dest 一〇〇・〇

上一日三次分服

(九) 遠志丁幾 Tine Senegae 一・五

阿母尼亞茴香精 Spiritus Ammonia

foeniculi 三・〇

阿耳退糖漿 Sirup Altheae 一〇・〇

溜水 Aq dest 一〇〇・〇

上每二小時服一茶匙

(十) 保利加素 Polygasol 六・〇

百咳定液 Liq Paedin 六・〇

糖漿 S. S. 一〇・〇

溜水 Aq dest 一〇〇・〇

上每日三次，二日分服

(〇・六) 一八〇・〇

鹽化銻 Ammonium chloratum 三・〇

遠志糖漿 Sirup Senegae 二〇・〇

上一日三次分服，二日量

臨床經驗處方

八二

(一) 咳復樂宰 Kaflose

九・〇

新愛服甯 Neo-Evanin

三・〇

糖漿 S. S.

一〇〇・〇

溜水 Aq dest

一〇〇・〇

上一日三次分服

(二) 安嗽精 Antihustin Liq

六・〇

知阿可爾 Thiocol

三・〇

阿耳退糖漿 S. Althaeae

二〇・〇

溜水 Aq dest

一〇〇・〇

上一日三次，二日分服

(三) 法邁氏止咳糖汁 Sirop Famel

一瓶

上一日二三次，每次一食匙

(四) 愛佛託甯治咳糖漿 Cosonol

一瓶

上一日二三次，每半至一食匙

(五) 克利西佛 Cresival

一瓶

上一日三次，每次一食匙

(六) 須羅靈 Sirolin

一瓶

上一日三四次，每次二茶匙

(七) 克司大納 Coqidana

一瓶

上一日三次，每次半至一茶匙

(八) 撲脫嗽 Pertusal

一瓶

上一日三次，每次一食匙

(註) 以上均係祛痰劑。急性氣管支炎均可內服。惟慢性氣管支炎經久不愈時。宜於祛痰劑中。加入碘化鉀 Kali jodatum (一日量一至一・五)。可使咯痰減少，而達吸收消炎之效。

氣管支炎祛痰性吸入劑。有銨水 Liq. ammoniacae，石灰水 Aq. Calcaria，重碳酸鈉水 Aq. Nat. bicarbonic，食鹽水 Aq. Nat. chlorat，鹽化銨 Ammonium chlorat 等。均可作為輔助治療。

(附) 氣管支炎注射藥

氯化鈣 Calcium chloride，葡萄糖鈣 Gluco-cal-cium，山德士鈣 Calcium "Sandoz"，碘化鈣 Calcium jodatum，特明補命 Transpulmin，託靈保賽而注射液 Transpusal Amp.，雙治拍蘭 Transpoin 等。

一 氣管支膿漏及腐敗性氣管

支炎方

(一) 克雷沙武丸 Kresot Pills(〇・〇五)十八粒

上每日三次，每食後二三粒

(二) 松節油 Ol Therobinthinae 二・〇

上分裝膠囊六個，一日三次各一個

(三) 松節油 Ol Therobinthinae 二・〇

重碳酸鈉 Nat bicarbonicum 三・〇

吐根丁幾 Tinc Ipecacuanhae 三・〇

杏仁水 Aq Laurocerae 六・〇

溜水 Aq dest 一〇〇・〇

上每日三次，二日分服

(四) 松節油 Ol Therobinthinae 二・〇

溜水 Aq dest 二〇〇・〇

上加熱使成蒸氣，爲吸入劑

(註) 其他祛痰藥品。參閱上節氣管支炎處方。

(附) 氣管支膿漏及腐敗性氣管支

注射藥

碘化鈣 Calcium jodatun・安安碘 Entondon・

喬託碘 Jotodin。

特朗補命 Transpulmin・託靈保賽而注射液 Tr

ranspulsal・雙治拍菌 Transpoin等。

二 格魯布性氣管支炎方

(一) 碘化鉀 Kali jodatun 三・〇

苦味丁幾 Tinc amara 三・〇

糖漿 Sirup simplex 一〇〇・〇

溜水 Aq dest 一〇〇・〇

上每日三次，二日量

(二) 吐根浸 Inf. Rad. Ipecacuanhae

(〇・六) 一八〇・〇

鹽化銨 Ammonium chloratum 三・〇

遠志糖漿 Sirup Senegae 二〇・〇

上一日三次・二日量

(三) 吐酒石 *Sibio kali tartaricum* 〇・〇・一

鹽化銨 *Ammonium chloratum* 〇・〇・五

乳糖 *Sacch lact* 〇・〇・三

上爲一包・與等量六包・一日三次・二

日分服

(四) 石灰水 *Aqua Calcariae* 一〇〇・〇・〇

溜水 *Aq dest* 一〇〇・〇・〇

上爲吸入劑

(註) 格魯布性氣管支炎如發生窒息症狀時(高度呼吸困難)。
宜注射鹽酸阿坡嗎啡 *Apomorphia hydrochloricum* 等催吐劑。

四 毛細氣管支炎方

(一) 吐根丁幾 *Tinc Ipecacuanhae* 一・五

阿母尼亞茴香精 *Spiritus Ammonia*

foeniculi 三・〇・〇

杏仁水 *Aq Laurocerae* 三・〇・〇

糖漿 *Sirup simplex* 一〇・〇・〇

溜水 *Aq dest* 一〇〇・〇・〇

上一日三次分服

(二) 安息香酸 *Acid benzoicum* 〇・〇・一

樟腦 *Camphor* 〇・〇・〇・五

白糖 *Sacch alba* 〇・〇・〇・五

上爲一包・與等量十包・每二時服一包

(註) 毛細氣管支炎劇甚時。往往呼吸困難，鼻翼煽動，苦悶不安。此時亦宜酌用催吐劑。

(三) 吐根末 *Pulv Radix Ipecacuanhae* 三・〇・〇

吐酒石 *Sibio Kali tartaricum* 〇・〇・〇・五

上分五包・每十分鐘服一包(催吐用)

(四) 吐根末 *Pulv Radix Ipecacuanhae* 〇・〇・五

吐酒石 *Sibio kali tartaricum* 〇・〇・〇・五

乳糖 *Sacch lact* 〇・〇・〇・三

上爲一包・與等量三包・每十五分鐘服

一次(同上)

(五) 鹽酸阿坡嗎啡 *Apomorphin hydrochlori-*

cum 〇・〇・〇・一

白糖 Sacch alba 〇・五

七為散劑一包，與等量五包，每十五分鐘服一包，至奏效為止（同上）

五 氣管支喘息（氣喘）方

(一) 鹽酸麻黃素片 Ephedrin hydrochloride 十片

上每日三次，每次一片

(二) 鹽酸嗎啡 Morphine hydrochloric. 〇・〇一

乳糖 Sacch lact 〇・五

上為一包，每發作時頓服

(三) 磷酸科亭 Codein phosphoricum 〇・一五

乳糖 Sacch lact 二・〇

上分五包，每發作時服一包

(四) 吐根末 Pulv Rad. Ipecacuanhae 〇・二

庶斯膏 Ext Hyoscyami 〇・二

硫酸規甯 Chinin sulfuricum 一・〇

白糖 Saccharum 二・〇

上為十包，每三小時服一包

(五) 拉西特靈 Racedrin 二片

上於發作時頓服

(六) 卡代柴而麻黃精 (Cartiazol Ephedrin) 六片

上每日三次，每次一片

(七) 安泰斯多 Antasthol 十八片

上每日三次，每次三片

(八) 沃度鈣化代猶嘔黍 Jod. calcium-Diuretin 六片

上每日三次，每次一片

(九) 斯潑斯曼爾琴片 Spasmalgine Tab. 二片

上每日一二次，每次一片

(十) 壓氣抹喘片 Asthmasal 十二片

上每日三次，每次二片

(十一) 遏滅喘兒 Iminol 三片

上於發作前頓服一片

(註) 氣喘發作停止後。欲預防其再發。該劑頗有特效。處方舉例如下。

(三)	碘化鉀 Kali jodatium	三〇〇
	糖漿 S. S.	一〇〇〇
	溜水 Aq. dest.	一〇〇〇
	上每日三次，二日分服	
(三)	約達洛斯 Jodalose	二〇滴
	糖漿 S. S.	一〇〇
	溜水 Aq. dest.	一〇〇
	上每日三次分服	
(五)	亞歷佛耳 Alival	六片
	上每日三次，每次一片	
(二)	洒乍錠 Sajodin	十二片
	上每日三次，每次二片	
(六)	沃度拏 Jodipin (10%)	一瓶
	上每日三次，每次食後各一食匙	
(七)	喬碘鈣 Jodalose	十八片
	上每日三次各二片	
(八)	安度沃碘 Jandojodin	十八片
	上每日三次各二片	

(附) 氣管支喘息注射藥

鹽酸嗎啡注射液 Morphine hydrochloride, 阿刀邊嗎啡 Atropine Morphine, 鹽酸海洛因 Heroin hydrochloride, 白歐雷 Dionin, 代馬那 Dimonal, 盼得本 Pantopon, 巴畢那兒 Pavinal, 硫酸阿刀邊 Atropin sulphate。

艾司摩列星 Astimolysin, 鹽化腎上腺腺液 Adrenalin chloride, 鹽酸麻黃素 Ephedrine hydrochloride, 愛佛特辣靈 Ephedralin, 逆服靈 Reprin, 拉西特靈 Raceprin, 卡代萊而麻黃精 Cardiazol Ephedrin 阿芬尼而 Afeinil, 安泰斯多 Antasthol, 壓氣抹喘注射液 Asthmasal Amp, 加佛特靈 Caphedrin, 哮喘沒苦 Asthmacur, 海泡非生 Hypophysen, 亞歷佛耳 Alival 碘化鈣 Calcium jodatium, 約達山布丁 Jodaseptine, 喬託碘 Jotoitin。

六 肺炎方

包(祛痰強心用)

- | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|----------------------------|
| (一) | 吐根丁幾
發多擊液
阿母尼亞茴香精
niculi | Tine Ipecacuanhae
Liquor Fatosin
Spiritus Ammonia foeniculi | 三・〇
一・五
二・〇 |
| | 糖漿
溜水 | Sirrup simplex
Aq dest | 一〇〇・〇
一〇〇・〇 |
| | 上每日三次分服(祛痰用) | | |
| (二) | 吐酒石
鹽化銨
乳糖 | Sibio Kalium tartaricum
Ammonium chloratum
Sacch lact | 〇・〇一
〇・三
〇・三 |
| | 上為一包，共給六包，一日三次，二日分服(同上) | | |
| (三) | 安息香酸
樟腦
白糖 | Acid Benzoicum
Camphor
Saccharum | 〇・一
〇・〇五
〇・五 |
| | 上為一包，與等量六包，每日三次各一 | | |
| (四) | 遠志丁幾
新愛服甯
毛地黃丁幾
溜水 | Tine Senegae
Neo-Evanin
Tine Digitalis
Aq dest | 三・〇
六・〇
三・〇
一〇〇・〇 |
| | 上每日三次，二日分服(同上) | | |
| (五) | 鹽酸規甯
上裝入膠囊三個，一日三次分服(退熱用) | Chinin hydrochloricum | 一・〇 |
| (六) | 歐規甯
正拉密洞
上分三包，一日分服(同上) | Euchinin
Pyramidon | 一・五
〇・六 |
| (七) | 福白龍片
上每日三次，每次三片 | Fehnon Tablets | 九片 |
| (八) | 安福消腫膏
上薄塗紗布後，貼於胸壁肺部兩側(消炎用) | Anthiphologisthine | 適量 |
| (九) | 三福消腫膏
適量 | Sanflويد | 適量 |

臨床經驗處方

上為胸壁肺部貼布劑(同上)

(註)肺炎除對症療法，應用祛痰，興奮，退熱等劑外。以撲滅肺炎菌為目的。又可應用下列新處方。

- | | | |
|------|-------------------------|-----|
| (10) | 鹽基性阿布托與 Opiolin basicum | 〇・六 |
| | 乳糖 Sacch lact | 一・〇 |
| | 上分三包，一日三次分服 | |
| (11) | 赫納隆 Chmeron | 一・二 |
| | 乳糖 Sacch lact | 二・〇 |
| | 上分六包，二日分服 | |
| (12) | 洛太龍 Rodilone | 六片 |
| | 上每日三次，每次一片 | |
| (13) | 大健風 Dagenan | 六片 |
| | 上每日三次，每次一片 | |
| (14) | 殺鏈龍 Sulfolinon | 六片 |
| | 上每日三次，每次一片 | |
| (15) | 比力大 Pyridal | 六片 |
| | 上每四小時一片 | |
| (16) | 配力定片 Pyridium Tab | 六片 |

八八

上每日三次，每次一片

(附)肺炎注射藥

肺炎血清 Anti-Pneumococcus Serum，特朗補
 令 Transpulmin，託靈保賽而注射液 Transpul-
 sal Amp，雙治拍菌 Transpoin，赫納隆 Chi-
 neron，比力大 Pyridal，亞濟普隆 Adiplon。
 重鹽酸規甯 Quinine Dihydrochloride，規甯烏
 來坦 Quinine Urethane，福白龍 Felmon，沸
 亭隆 Fibrang，巴苦諾恩 Bagnon，山德士奎甯
 鈣 Quinine Calcium "Santaloz"，奎甯益壽鈣 Qui-
 nine Isocalcium，握姆納丁 Omnia lin，安替保
 Antipol，百乃定 Panadin，萬應乃丁 Vinatin
 ，息熱定 Simadin，抗熱元 Confabrogen。
 (預防)肺炎球菌預防伐克辛 Pneumococcus
 Vaccine prophylatic。

七 肺氣腫方

- (1) 吐根丁幾 Tinc Ipecacuanhae 三・〇

遠志丁幾 Tinc Senegae

三〇〇

碘化鉀 Kali Jodatium

二〇〇

糖漿 Sirup simplex

一〇〇〇

溜水 Aq dest

一〇〇〇

上每日三次，二日分服

(二)

吐酒石 Sulfio kali tartaricum

〇〇一

鹽化銻 Ammonium chloratum

〇〇三

乳糖 Sacch lact

〇〇三

上為一包，與等量三包，一日分服

(三)

吐根末 Puly Ipecacuanhae

〇〇三

巴畢那兒 Pavinal

〇〇三

白糖 Saccharum

一〇五

上分三包，一日三次分服

(註) 肺氣腫治療要旨。亦不外祛痰鎮咳。倘心機有衰弱現象。宜用興奮劑。處方參照肺水腫。

(附) 肺氣腫注射藥

碘化鈣 Calcium jodatium · 葡萄糖鈣 (Gluco-

Calcium · 山德士鈣 Calcium "Sandoz" 等。

臨床經驗處方

八 肺水腫方

(一) 安息香酸 Acid benzoicum

〇〇一

樟腦 Camphor

〇〇五

白糖 Saccharum

〇〇五

上為一包，與等量十包，每二時服一包

(二)

吐根丁幾 Tinc Ipecacuanhae

三〇〇

阿母尼亞苗香精 S.Amm. foeniculi

六〇〇

毛地黃丁幾 Tinc Digitalis

三〇〇

糖漿 Sirup simplex

一〇〇〇

溜水 Aq dest

一〇〇〇

上每二小時一格，二日分服

(註) 肺水腫突發顏面青紫，呼吸困難時。立宜用強心劑。

(三) 安息香酸咖啡鈉 Caffein Nat. benzoicum

二〇〇

精製樟腦 Camphor depurata

〇〇六

乳糖 Sacch lact

二〇〇

上分六包，一日三次各一包

八九

(四) 咖啡礮 *Caffein*

乳糖 *Sacch lact*

上爲一包・與等量三包・一日分服

〇・一
〇・三

non 等。

九 肺癆(肺結核)方

(五) 毛地黃丁幾 *Tine Digitalis*

斯忒羅仿丁幾 *Tine Strophanthi*

糖漿 *Sirup simplex*

溜水 *Aq dest*

上每二小時服一格

一・五
一・〇
五・〇
一〇〇・〇

(一) 克雷沙忒(即幾阿蘇) *Kresot*

阿耳退糖漿 *Sirup Althaeae*

溜水 *Aq dest*

上每日三次，每次一食匙

四・〇
二〇・〇
一〇〇・〇

(二) 克雷沙忒 *Kresot*

甘草末 *Pulv liquorit*

甘油 *Glycerin*

上爲九六十粒，一日三次各三粒

二・〇
適量
適量

(六) 可拉明 *Coramine*

烏羅透賓 *Drotropin*

糖漿 *Sirup simplex*

溜水 *Aq dest*

(附) 肺水腫注射藥

肺水腫倘症狀危篤時。強心興奮內服藥。不如注射爲妥速。可應用下列藥品。

可拉明 *Coramine*・康福那心 *Camphonasin*・

狄茄令 *Digalen*・卡代柴而 *Cardiazol*・維他康

復 *Vitacamphor*・樟腦樂地儂 *Kampfer Lodi-*

(四) 魚肝油 *Ol Jecoris*

上每日三次，每次一食匙

一瓶

(五) 克雷沙忒 *Kresot*

魚肝油 *Ol Jecoris*

三・〇
一磅

上混和，每次服一食匙，一日三次
 (註) 克雷沙忒丸及含克雷沙忒之魚肝油。市上均有現成製就者出售。可省臨時自行配製之麻煩。

(六) 夸挨藥科耳 (拐阿寇) Guajacol 一·二
 上分裝膠囊六個，每日三次各一個

(七) 夸挨藥科耳 Guajacol 三·五
 龍膽膏 Ext Gentianae 五·〇
 甘草根末 Pulv Iiquirit 五·〇
 甘油 Glycerin 適量

(八) 肺而舒藥片 Fersot Tablets 二〇片
 上為九六十粒，一日三次各三粒
 上每日三次，每次一二片

(九) 蘇伯第液 Super D 一瓶
 上每日三次，每食後一茶匙

(十) 安特所靈膠囊 Adexolin Cap. 一瓶
 上每日二次，每次一個

(二) 海力補B丸 Halibol-B 一瓶
 上每日三次，每次二粒

(三) 好力生膠囊 Halisum Cap. 一瓶
 上每日二次，每次一粒

(三) 海力命丸 Halimin Pill. 一瓶
 上每日二次，每次一粒

(四) 奧斯得靈片 Ostelin Tab. 一二粒
 上每日三次，每次一片

(五) 丁種葡糖 Glucofin 一瓶
 上每日三次，每次一食匙

(六) 山德士鈣劑 Calcium Pulv "Sandoz" 100·0
 上每日三次，每次一食匙

(七) 新亞鈣劑 Sincalcium Pulv 100·0
 上每日三次，每次一食匙

(八) 固元綠鈣片 Compretten Calcium chloratum 三〇片
 上每日三次，每次一片

(九) 固元乳鈣片 Compretten Calcium lacticum 三〇片
 上每日三次，每次一片

臨床經驗處方

臨床經驗處方

九二

- | | | | |
|---|----------------------|--------------------------------|------|
| (二九) | 上每日三次，每次二片 | 羅氏大補藥 Tonic "Roche" | 一瓶 |
| (三〇) | 上每日三次，每次二茶匙 | 惟斯可內服液 Viscosorum "buvable" 十管 | 十管 |
| (三一) | 上每日二次，每次食前一管 | 拐阿可爾保利他民 Guajacol Polyamin | 一瓶 |
| (三二) | 上每日三次，每次一〇西西 | 克癆補藥 Cloetonic "Tilly" | 一瓶 |
| (三三) | 上每日三次，每次一至二茶匙 | | |
| <p>(註) 肺癆病人如發現潮熱盜汗，劇咳，痰多，咯血等顯著症狀時。均可兼行對症療法。</p> | | | |
| (三四) | 上每日三次，每次一片(潮熱用) | 愛耳蓬 Elbon | 六片 |
| (三五) | 上分六包，一日三次，二日分服(同上) | 愛迪那爾 Aethynal | 六〇〇 |
| (三六) | 上於臨睡前頓服(止汗用) | 樟腦酸 Acid Camphoricum | 一〇〇 |
| (三七) | 上每日三次，每次一格，二日分服(祛痰用) | 溜水 Aq deat | 一〇〇〇 |
| (三八) | 上分三包，一日三次分服(同上) | 知阿可爾 Thiocol | 四〇〇 |
| (三九) | 上分三包，一日三次分服(同上) | 百咳定液 Liq Paedin | 六〇〇 |
| (四〇) | 上分三包，一日三回分服(同上) | 杏仁水 Aq Laurocerac | 六〇〇 |
| (四一) | 上分三包，一日三回分服(同上) | 大咳司鎮 Takastin | 一〇五 |
| (四二) | 上分爲十包，每三時服一包(劇咳用) | 鹽酸海洛因 Heroin hydrochloric | 〇〇三 |
| (四三) | 上爲一包，於夜間臨睡前服(同上) | 乳糖 Sacch lact | 一〇〇 |
| (四四) | 上分爲十包，每三時服一包(劇咳用) | 乳糖 Sacch lact | 五〇〇 |
| (四五) | 上分爲十包，每三時服一包(劇咳用) | 鹽酸嗎啡 Morphin hydrochloric | 〇〇五 |
| (四六) | 上分爲十包，每三時服一包(劇咳用) | 乳糖 Sacch lact | 五〇〇 |
| (四七) | 上分爲十包，每三時服一包(劇咳用) | 鹽酸嗎啡 Morphin hydrochloric | 〇〇五 |
| (四八) | 上分爲十包，每三時服一包(劇咳用) | 乳糖 Sacch lact | 五〇〇 |
| (四九) | 上分爲十包，每三時服一包(劇咳用) | 鹽酸嗎啡 Morphin hydrochloric | 〇〇五 |
| (五〇) | 上分爲十包，每三時服一包(劇咳用) | 乳糖 Sacch lact | 五〇〇 |
| (五一) | 上分爲十包，每三時服一包(劇咳用) | 鹽酸嗎啡 Morphin hydrochloric | 〇〇五 |
| (五二) | 上分爲十包，每三時服一包(劇咳用) | 乳糖 Sacch lact | 五〇〇 |
| (五三) | 上分爲十包，每三時服一包(劇咳用) | 鹽酸嗎啡 Morphin hydrochloric | 〇〇五 |
| (五四) | 上分爲十包，每三時服一包(劇咳用) | 乳糖 Sacch lact | 五〇〇 |
| (五五) | 上分爲十包，每三時服一包(劇咳用) | 鹽酸嗎啡 Morphin hydrochloric | 〇〇五 |
| (五六) | 上分爲十包，每三時服一包(劇咳用) | 乳糖 Sacch lact | 五〇〇 |
| (五七) | 上分爲十包，每三時服一包(劇咳用) | 鹽酸嗎啡 Morphin hydrochloric | 〇〇五 |
| (五八) | 上分爲十包，每三時服一包(劇咳用) | 乳糖 Sacch lact | 五〇〇 |
| (五九) | 上分爲十包，每三時服一包(劇咳用) | 鹽酸嗎啡 Morphin hydrochloric | 〇〇五 |
| (六〇) | 上分爲十包，每三時服一包(劇咳用) | 乳糖 Sacch lact | 五〇〇 |

(三) 克利西佛 Cresival 一瓶

上每日三次，每次一食匙(同上)

(三) 庫阿可斯 Guajacose

上每日三次，每次一食匙(同上)

(三) 法邁氏止咳糖漿 Sirop Famel 一瓶

上每日三次，每次一食匙(同上)

(三) 須羅靈 Sirolin 一瓶

上每日三次，每次二茶匙

(三) 吐根丁幾 Tine Ipecacuanhae 三〇〇

新愛服寧 Neo Evantin 六〇〇

杏仁水 Aq Pruni armeniaca 六〇〇

阿母尼亞茴香精 Spiritus ammonia foeniculi 三〇〇

溜水 Aq dest 一〇〇〇〇

上每日三次各一格，二日量(同上)

(三) 麥角膏 Ext Secalis cornuti 〇・五

阿片末 Pulv Opium 〇・一

白糖 Sacch alba 二・〇

上為五包，每三時服一包(略用)

(三) 白阿膠 Gelatina alba 一〇〇〇

食鹽 Nat chloratum 一一〇〇

溜水 Aq dest 一〇〇〇〇

上 一日三次分服

(三) 鹽化鈣 Calcium chloratum 一一〇〇

糖漿 Sirup simplex 一〇〇〇

溜水 Aq dest 一〇〇〇〇

上 一日量，三次分服(同上)

(四) 食鹽 Nat Chloratum 五〇〇〇

上 一日數次各一茶匙，溶入微溫水中服

下(同上)

(四) 克維甸藥片 Glanden Tab. 三片

上每日三次分服(同上)

(附)肺癆注射藥

鐵勃固靈 Tuberculin，三鈣注射液 Tricaine

，比荷哥靈 Biocholone，山德士鈣 Calcium

臨床經驗處方

九三

臨床經驗處方

九四

“Sandoz”，葡萄糖鈣 Gluco Calcium，古卡新
 Gluacalcin，氯化鈣 Calcium chloride，碘化鈣
 Calcium iodatum，海而平 Helpin，愛活 A-O
 ，安癆福 Aurophos，河馬克林 Hormocline，
 新亞哥靈 Sinocholin，脾素 Endo-Miltin，肺藥
 蘇 Pulmosol，福賜母全劑 Fosfinu granol，鈣
 固神 Calchosen，癆可生 Amp. Lungosen，梯皮
 可治 Amp. Tubecosal，拍癆多淨 Platosin，
 幾阿蘇注射液 Creosote，怪阿寇砒觸基 (Guaja-
 col Cacodylate)。

一〇 肺膿瘍及肺壞疽方

與腐敗性氣管支炎療法同。處方見八三頁。

一一 肺臟梅毒方

(1) 碘化鉀 Kali iodatum 三・〇
 百咳定液 Liq Paedin 六・〇
 苦味丁幾 Tinc amara 三・〇

糖漿 Sirup simplex

一〇・〇

溜水 Aq dest

一〇〇・〇

上每日三次，二日分服

其他參閱花柳病劑中之梅毒處方。

一一 肋膜炎方

(1) 毛地黃葉浸 Inf. Folia Digitalis

(1・〇) 一八〇・〇

醋酸鉀液 Kali aceticum

一一・〇

苦味丁幾 Tinc. amara

三・〇

糖漿 Sirup simplex

二〇・〇

上一日三次，二日分服

(2) 醋酸鉀 Kali aceticum

四・〇

碘化鉀 Kali iodatum

三・〇

杏仁水 Aq Laurocerae

六・〇

糖漿 Sirup simplex

一〇・〇

溜水 Aq dest

一〇〇・〇

上每日三次，二日分服

(三) 狄午雷汀 Diuretin 三〇〇

上分爲三包，一日三次，每服一包

(四) 水楊酸鈉 Nat Salicylicum 三〇〇

重曹 Nat bicarbonicum 一一〇〇

糖漿 S. S. 一〇〇〇

溜水 Aq dest 一一〇〇〇

上一日三次，二日分服

(五) 安替正林 Antipyrin 一一〇〇

上分爲三包，一日三次分服

(六) 碘化鉀 Kali jodatam 一一〇〇

碘 Jodium 〇〇五

甘油 Glycerin 一一〇〇〇

上外用塗擦(消炎，使滲出液吸收)

(七) 安福消腫膏 Antiphlogistine 適量

上爲肋膜部塗布用(同上)

(附)肋膜炎注射藥

碘化鈣 Calcium jodatam · 葡萄糖鈣 Gluco

臨床經驗處方

九五

calcium · 百克安兒 Peccol · 古卡新 Glucalcin
，撒而索格理莫 Sal-so-Grelan · 柳酸益壽鈣 Sa-
Iso-Isocalcium · 解迫精注射液 Cabrogin Amp
· 喝斯百靈 Hesperin ·

一三 氣胸方

(一) 鹽酸嗎啡 Morphin hydrochloric. 〇〇〇一

乳糖 Sacch lact 〇〇五

上一次頓服

(二) 派他蓬 Pantopan 〇〇三〇

莨菪根末 Pulv Rad. Scopolia 〇〇〇六

乳糖 Sacch lact 一〇〇

上研和爲三包，一日三次分服

(註)氣胸祇有對症療法。除服鎮痛藥外。倘胸廓受壓，不堪忍受時。祇有施行手術穿刺或切開。排除空氣或滲出液之一部。

一四 胸水方

(一) 毛地黃葉浸 Inf. Folia Digitalis

(一)	醋酸鉀液	Liq Kali aceticum	二〇・〇
	苦味丁幾	Tinc amara	三・〇
	糖漿	Sirup simplex	一〇・〇
	上	上日三次，二日量	
(二)	狄午雷汀	Diuretin	三・〇
	上	上分三包，一日分服	
(三)	醋酸鉀	Kali aceticum	六・〇
	硝酸鉀	Kali nitricum	六・〇
	糖漿	Sirup simplex	一〇・〇
	溜水	Aq dest	一〇〇・〇
	上	上日三次，二日分服	

(附)胸水注射藥

奈迫且而 Nepal・拿佛阿色羅 Novosurul・
洒利汞 Salrgan・益水通 Isidrone 等。

(B) 消化器病

一 口內炎方

(一)	氯化鉀	Kali chloricum	五・〇
	溜水	Aq dest	二〇〇・〇
	上	上為含嗽用	
(二)	過酸化水素	Hydrogenium peroxidatum	一〇・〇
	溜水	Aq dest	二〇〇・〇
	上	上為含嗽用	
(三)	福美明達	Fomamint	一片
	上	上以一片含於口內，任其溶化，每日多次	
(四)	旁弗拉文錠	Panflavin-Tablets	半片
	上	上為含嗽藥片，每日可連用多次	
(五)	愛惜夫拉文片	Aciflavin Tablets	一片
	上	上為含嗽藥片，每日可連用多次	
(六)	二%硝酸銀液	Liq Argent. nitricum	適量
	(2%)		

上爲局部塗布用

(七) 千倍脫呂帕拉文 *Trypallavine 0.1%* 適量

上爲局部塗布用

(八) 碘 *Iodum* 〇・一

碘化鉀 *Kali iodatum* 〇・二

甘油 *Glycerin* 一〇・〇

薄荷油 *Ol Menthae* 二滴

上爲局部塗布用

二 鵝口瘡及水瘡方

(註) 詳見小兒科處方中。

三 耳下腺炎方

(註) 詳見外科消炎劑處方中。

四 胃痛及噯氣・吐酸方

(註) 急性慢性胃病，胃炎，胃潰瘍，胃神經痛，胃酸過多發生之胃痛或噯氣，吐酸，均可應用下列處方。

(一) 重碳酸鈉 *Nat bicarbonicum* 三・〇

臨床經驗處方

萹荈膏 *Ext Scopolia* 〇・六

上分三包，一日三次分服

(二) 重碳酸鈉 *Nat bicarbonicum* 三・〇

次硝酸鉍 *Bismut subnitricum* 一・五

俄耳安封 *Orthoform* 一・〇

(三) 次硝酸鉍 *Bismut subnitricum* 五・〇

佗浮氏散 *Pulvis Doveri* 一・〇

白糖 *Saccharum* 五・〇

上爲十包，每日三次各一包

(四) 重碳酸鈉 *Natrium bicarbonicum* 三・〇

次硝酸鉍 *Bismut subnitricum* 一・五

鹽酸嗎啡 *Morphin hydrochloric.* 〇・〇三

上分三包，一日三回分服

(五) 的是開胃 *Biscama* 六・〇

上分三包，一日分服

(六) 諾餌妙散 *Normosan* 二・〇

每食前半小時頓服

(七) 雙養鎂 *Dioxima* 一・五

九七

- | | | |
|------|------------------------------------|------|
| | 重碳酸鈉 <i>Nat. bicarbonicum</i> | 三・〇 |
| | 上一日三次，每次一包，食後約二十分鐘內服 | |
| (八) | 鋁出倫 <i>Neutralon</i> | 五〇・〇 |
| | 上每日三次，每次一茶匙，溶於熱水中內服 | |
| (九) | 莨菪精鋁出倫 <i>Bellafonna-Neutralon</i> | 三〇・〇 |
| | 上每日三次，每次一茶匙 | |
| (一〇) | 莨菪諾餌妙散 <i>Boto-Normosan</i> | 一一・〇 |
| | 上分六包，一日三次，每次一包，食前服 | |
| (一一) | 顯茄安胃鋁省 <i>Alumisan</i> | 二〇・〇 |
| | 上分六包，每次食前服一包 | |
| (一二) | 鈣鉍鎂 <i>Cal-Bis-Ma</i> | 一瓶 |
| | 每隔四小時服一次，每次一茶匙，溶於溫水中服 | |
| (一三) | 太卡糖酶 <i>Takazyme</i> | 三〇・〇 |
-
- | | | |
|------|---------------------------------------|------|
| (一四) | 安答奇津 <i>Antacidin</i> | 二・〇 |
| | 上一日三次，每次一茶匙
上分三包，一日分服 | |
| (一五) | 過養化鎂片 <i>Magnesium-Perhydral Tab.</i> | |
| | 上每日三次，每次二片 | |
| (一六) | 鎂養胃 <i>Magnoxide Tab.</i> | 十二片 |
| | 上每日三次，每次二片 | |
| (一七) | 益多納 <i>Hydrona</i> | 十二片 |
| | 上每日三次，每次二片 | |
| (一八) | 肝胃氣痛片 <i>Gastralgia Tab.</i> | 十二片 |
| | 上每日三次，每次二片 | |
| (一九) | 阿片膏 <i>Ext Opium</i> | 〇・〇三 |
| | 可脂肪 <i>Cacao</i> | 適量 |
| | 上為栓劑十個，一日二次，插入肛門一個 | |
| (二〇) | 鐵瘧汽巴兒勁栓劑 <i>Suppositoria Spasma</i> | 一個 |
| | <i>Gibalgin</i> | |

上朝晚插入肛門各一次
 (三) 優巴科 Suppositoria Eupaeo 二個
 上朝晚二次，插入肛門用

(附) 胃痛注射藥

鹽酸嗎啡注射液 Morphine hydrochloride · 阿刀
 便嗎啡 Atropin Morphin · 代馬那 Dimonal ·
 巴畢那兒 Pavinal · 盼得本 Pantopon · 油科多
 耳 Eukodal · 優巴科 Eupaeo 等。

五 胃酸過多方

皆禁刺激性飲食。服大量2%重曹水或行胃洗滌
 。頗有特效，其他處方同上。

六 胃酸減少方

(1) 稀鹽酸 Acid hydrochloricium diluti 1 · 0
 番木鱈丁幾 Tine Stryelinin 1 · 5
 橙皮糖漿 Sirup auranti corticis 10 · 0

臨床經驗處方

九九

溜水 Aq dest 100 · 0

(二) 稀鹽酸 Acid hydrochloricium diluti 1 · 0
 上 一日三次，食後分服。

百布辛 Pepsin 1 · 0

糖漿 Sirup simplex 10 · 0

溜水 Aq dest 100 · 0

(三) 阿即多耳配符新 Acidol-Pepsin 十二片
 上 一日三次分服

(四) 倍泰辛 Bafacid 十二片
 上 每日三次，每次二片，食時或食後服

七 胃擴張方

(一) 人工加爾斯泉鹽 Sal Carolinum factitium 110 · 0

七 胃擴張方

番木鱈丁幾 Tine Stryelinin 1 · 5

溜水 Aq dest 100 · 0

上 一日三次分服

溜水 Aq dest 100 · 0

上 一日三次分服

(二) 雷沙而辛 Resorcin

1.0

苦味丁幾 Tinc amara

1.5

溜水 Aq dest

100.0

上一日三回分服

(三) 番木鱉膏 Ext Strychnin

0.1

白糖 Saccharum

2.0

上分爲六包·一日三次·每服一包

(四) 克雷沙忒 Kresot

0.05

乳糖 Sacch lact

0.3

上入膠囊·每日三次各二個·食後服

(註)胃擴張症狀劇甚時，宜用食鹽水 Lig Nat chlorat，或
2%重碳酸鈉水 Lig Nat bicarbonicum，或雷沙而辛水 Lig
Resorcin，或水揚酸鈉水 Lig Nat Salicylicum 等行胃洗滌。

八 胃潰瘍方

(一) 次硝酸鉍 Bismuth subnitricum

1.0

重碳酸鈉 Nat bicarbonicum

0.5

白糖 Sacch alba

0.5

上爲一包，每食前十五分鐘服一包

(二) 煨製鎂 Magnesium usta

3.0

重碳酸鈉 Nat bicarbonicum

6.0

萸藪膏 Ext Scopolia

0.12

上爲六包·一日三次·每食後服一包

(三) 硝酸銀 Argent nitricum

0.25—0.5

白陶土 Bulbus alba

5.0

上爲丸五十粒·一日三次·一或二粒

(四) 鹽酸科卡音 Cocain hydrochloric 0.05

乳糖 Sacch lact

0.5

上爲一包頓服(嘔吐劇甚時用)

(註)胃潰瘍如發現顯著出血症狀時。宜施對症治療。參閱止
血劑處方。

(附)胃潰瘍注射藥

樂努食丁 Larstidin·鹽酸組織酸 Histidine

hydrochloride.

九 神經性嘔吐方

乳糖 Saech lact

1.5

上分三包，一日分服

(附) 神經性嘔吐注射藥

鹽酸嗎啡 Morphin hydrochloricum · 硫酸阿刀邊 Atropin sulphate · 溴化鈣注射液 Solution · Calcium bromide ·

1.0 胃弛緩症方

(1) 苦味丁幾 Tinc Amara 3.0

番木鱉丁幾 Tinc Strychnin 1.0

桂皮丁幾 Tinc Cinnamomi 1.0

溜水 Aq dest 1.0

上每日三次，每次一格，二日量

(2) 那規皮煎 Decoct Cortex Chinae

(5.0) 1.0

稀鹽酸 Acid hydrochloric diluti 1.0

糖漿 Sirup simplex 1.0

- (一) 鹽酸嗎啡 Morphin hydrochloric. 0.1
- 鹽酸科卡音 Cocain hydrochloric. 0.1
- 杏仁水 Aq Pruni armeniaca 1.0
- 上每次服一〇滴，一日數次
- (二) 溴化鉀 Kali bromatum 3.0
- 顛茄膏 Ext Belladonnae 0.3
- 糖漿 Sirup simplex 1.0
- 溜水 Aq dest 1.0
- 上每二小時服一格，一日六回分服
- (三) 鹽酸科卡音 Cocain hydrochloric. 0.3
- 白糖 Saech alba 3.0
- 上分十包，一日二至三次各一包
- (四) 哥羅方 Coloroforn 1.0
- 纈草丁幾 Tinc Valerianae 1.0
- 上混和每一時服二十滴，見效爲度
- (五) 蓼酸攝溜謨 Cerium oxaleum 0.3

臨床經驗處方

1.0

上一日三次分服

(三) 重碳酸鈉 *Nat bicarbonicum*

糖化素 *Diastase*

上分三包，每食後服一包

三〇〇
〇〇六

(四) 胰液素 *Pankreatin*

重碳酸鈉 *Nat bicarbonicum*

上與等量三包，每食前服一包

〇〇三
〇〇五

(五) 卡力伯液 *Liq. Caripeptic*

木鼈丁幾 *T. Stryehinin*

大黃丁幾 *T. Rhei*

橙皮糖漿 *S. auranti corticis*

溜水 *Aq dest*

上一日三次分服

一五〇

一〇五

一〇〇

一〇〇〇

一〇〇〇〇

(六) 補利奇酶粉 *Polyzyme Pulv.*

上分三包，每食後一包

一〇〇

(七) 胃精片 *Gastro-Lenterin Tab.*

上每日三次，每次二片

十二片

(註) 上列處方。功能亢進食慾，旺盛消化。凡胃呆飽脹或食

量減少。均可適用。

一 一 貪食不飽及善饑症方

(一) 溴化鉀 *Kali bromatum*

溴化鈉 *Nat bromatum*

溴化銨 *Ammonia bromatum*

溜水 *Aq dest*

上一日每次分服

二〇〇

二〇〇

二〇〇

一〇〇〇〇

(二) 三溴片 *Triple Brom Tablets*

上每日三次，每次二至三片

十八片

(三) 阿魏丁幾 *Tine Asae foetidae*

顯草丁幾 *Tine Valerianae*

上每日三次各二〇滴，放入糖水中服

五〇〇

一〇〇〇

(註) 其他處方參閱鎮靜劑。

一 一 異嗜症方

本症多見於精神病或腸寄生蟲病人。究其原因而施治療，處方可參閱鎮靜劑及驅蟲劑。

一三 胃梅毒方

療法與肺梅毒同。參閱花柳病劑中之梅毒方

一四 腸炎方

腸炎初起。不消化或腐敗性物質停滯時。宜用下列腸消毒方。

(一) 甘汞 Calomel 1.00

乳糖 Sacch lact 1.00

上分三包，一日三次各一包

(二) 表飛鳴 Biofermin 3.00

甘汞 Calomel 0.06

上分三包，一日分服

(三) 薩羅耳 Salol 1.50

上分三包，一日分服

(四) 亞力山丁 Alisatin 十二粒

上每日三次，每次二粒

(五) 腸用慰歐仿 Entero-Vioform 六片

上每日三次，每次一片

(六) 保爾泰素 Biolaclase 3.00

上分三包，一日分服

(七) 百哥消片 Peptoal 六片

上每日三次，每次一片

腸內容有多量不消化物蓄積起酸酵作用時。亦可用下列瀉下或緩下劑。

(一) 蓖麻子油 Ol Ricini 110.00

上一次頓服

(二) 阿開司多 Arcastol 110.00

上一次頓服

(三) 硫酸鎂 Magnesium sulfuricum 110.00

上溶於糖水中一次頓服

(四) 大黃浸 Inf. Rad. Rhei(六.00) 180.00

重碳酸鈉 Nat bicarbonicum 6.00

薄荷油 Ol Menthae 四滴

糖漿 Sirup simplex 110.00

上每三時服一食匙

(五) 人工加爾斯泉鹽 Sal carolinum facti-

linum

10.0

薄荷水 Aq. Menthae

3.0

溜水 Aq. dest.

100.0

上一日三回分服

(六) 苦士大黃散 Pulv. Infantum

3.0

上分三包，一日三次分服（此方應用於

小兒尤宜）

腹部雷鳴，排出水樣便時。可用下列處方。

(一) 超炭 Ultracarbon

6.0

上分三包，一日三次各一包

(二) 腸固甯 Charconin

3.0

上分三包，每日三次各一包

(三) 矽炭銀片 Agsicol

六片

上每日三次各二片

排便十分暢快，不感腹痛，或痛甚輕微，而下痢次數仍繁時。可酌用下列止瀉方。

(一) 次硝酸鉍 Bismuth subnitricum

1.5

血炭末 Carbo animalis

3.0

上分三包，每日三次分服

(二) 單乃並 Tannalbin

3.0

上分三包，一日三次各一包

(三) 佗浮氏散 Pulv. Doveri

1.5

乳糖 Sacch. lact.

1.0

上分三包，一日分服

(四) 麻而單甯片 Malinin

六片

上每日三次，每次二片

(五) 太拿卡耳 Tanocal

3.0

上分三包，一日分服

(六) 阿片末 Pulv. Opium

0.2

次硝酸鉍 Bismuth subnitricum

3.0

上分六包，二日分服

二五 蛔突炎及盲腸炎方

(一) 阿片末 Pulv. Opium

0.5

白糖 Sacch. alba

3.0

上分十包，每三時服一包

(II) 阿片丁幾 *Tine Opium* 1.5

糖漿 *Sirup simplex* 10.0

溜水 *Aq dest* 100.0

上1日三回分服

(III) 阿片丁幾 *Tine Opium* 10.0

莨菪丁幾 *Tine Scopoliae* 10.0

庶斯丁幾 *Tine Hyoscyami* 10.0

纈草丁幾 *Tine Valerianae* 10.0

上每日三四次各二十滴

(IV) 阿片膏 *Ext Opium* 0.05

可可脂 *Ol Cacao* 11.0

上為坐藥一個一日三回插入肛門

(註) 痢疾及盲腸炎初起時。除內服阿片劑使腸蠕動鎮靜外。腹部宜用冰罷法，或水銀軟膏塗布。更須兼用強力消炎注射藥。例如百浪多息 *Protosil*、沙呂賽勃他星 *Solu-Septazin* 等。參閱外科消炎劑處方。

一六 十二指腸潰瘍方

對症治療。參照胃滑瘍。

一七 腸結核方

(I) 單乃並 *Tannalbin* 3.0

次硝酸鉍 *Bismut subnitricum* 1.5

上分三包，一日三次各一包

(II) 阿片末 *Pulv Opium* 0.1

乳糖 *Sacch lact* 11.0

上分三包，一日三次各一包

佗浮氏散 *Pulv Doveri* 1.5

乳糖 *Sacch lact* 1.0

上分三包，一日分服

麻而單甯片 *Mullania* 六片

上每日三次，每次二片

(註) 其他處方。參閱收斂性止瀉劑。按胸結核為肺結核之一分症。除對症治療外。兼宜用營養強壯劑。參照肺結核療法。

一八 腸出血方

- | | | | | | |
|-----|-----------------------------|------|-----------|---|------|
| (一) | 單乃並 Tannalbin | 三〇〇 | (五) | 斯錫普錫輕片 Stypticin Tab. | 六片 |
| | 麥角膏 Ext Secalis cornuti | 〇・三 | | 上每日三次，每次二片 | |
| | 白糖 Sacch alba | 一〇〇 | (六) | 克羅甸 Clauden | 六片 |
| | 上分三包，每日三次分服 | | | 上每日三次，每次一片 | |
| (二) | 醋酸鉛 Plumbum aceticum | 〇・二 | (七) | 過鹽化鐵液 Liq Ferri sesquichlorati | 〇 |
| | 阿片 Opium | 〇・一 | | 溜水 Aq dest | 1000 |
| | 白糖 Sacch alba | 〇・二 | | 上為灌腸劑 | |
| | 上為十包，每二小時一包 | | | | |
| (三) | 麥角丁幾 Tinc Secalis cornuti | 一・五 | (附)腸出血注射藥 | | |
| | 金印草流膏 Ext Hydrastis fluidum | 一・五 | | 濃厚食鹽水 Sodium chloride strong solution | |
| | 苦味幾丁 Tinc amara | 一・五 | | 濃氯化鈣注射液 Calcium Chloride (10%) | |
| | 糖漿 Sirup simplex | 100 | | 可阿古連 Coagulen, 克羅甸 Clauden, 孟納安爾 Manetol 等。 | |
| | 溜水 Aq dest | 1000 | | 一九 <u>腸穿孔方</u> | |
| | 上每日三次分服 | | (一) | 鹽酸嗎啡 Morphin hydrochloric. | 〇・〇六 |
| (四) | 攝加可甯 Secacornin | 三〇〇 | | 乳糖 Sacch lact | 三〇〇 |
| | 橙皮糖漿 Sirup auranti corticis | 1000 | | 上分六包，每二小時服一包 | |
| | 溜水 Aq dest | 1000 | (二) | 阿片末 Pulv Opium | 〇・三 |
| | 上每日三次分服 | | | | |

乳糖 Sacch lact

1.5

上分三包，一日三次分服

(三) 印度大麻膏 Ext Cannabis Indicae 〇.二

白糖 Sacch alba

五.〇

上為十包，每三小時服一包

(四) 莨菪膏 Ext Scopolia

〇.〇六

乳糖 Sacch lact

1.〇

上研和分三包，一日分服

(五) 鎮痙汽巴兒勁 Spasmo-Chibalgin

六片

每日三次，每次一片

(六) 斯潑斯曼爾琴 Spasralgine

三片

上於劇痛時頓服一二片

(三) 優巴科 Eupaco

三片

上每日三次各一片

(附) 腸穿孔注射藥

鹽酸嗎啡注射液 Morphin hydrochloride · 嗎啡

阿刀邊注射液 Morphin Atropine · 盼得本 Pap

-topon · 優巴科 Eupaco 等。

(註) 腸穿孔非常危險。倘發現虛脫症狀時。應速用樟腦，毛地黃等強心臟，處方參閱興奮劑。

110 腸癌腫方

本症宜延外科專門醫師行手術療法。藥物不外對症治療。參用緩下劑，鎮痛劑，強壯劑等。

111 直腸梅毒方

(1) 2% 硝酸銀液 Argent nitricum (2%) 適量

上為直腸內潰瘍部塗用劑

(2) 20% 鉻酸 Chromsäure (20%) 適量

上為直腸內潰瘍部塗布劑

(註) 內服藥與胃梅毒同。不外應用碘劑等，參閱梅毒劑處方。

112 腸弛緩方

(1) 複方大黃丸 Pill Rhei compositae 三粒

上臨臥頓服

臨床經驗處方

一〇八

(二)	蘆薈丸 <i>Pill Aloe</i>	十二粒	(一)	路易清 <i>Lutizym</i>	十二片
	上每日三次，每次二粒			每日三次，每食後二片	
(三)	加司加拉錠 <i>Pastill cascara sagrada</i>	二片	(二)	卡力伯液 <i>Liq Caripeptic</i>	一五〇〇
	上每臨睡前服二片			番木鱈丁幾 <i>Tine Strychnin</i>	一〇五
(四)	阿路芬丸 <i>Pill Alophan</i>	二粒		大黃丁幾 <i>Tine Rhei</i>	一〇五
	上一次頓服			糖漿 <i>Sirup simplex</i>	一〇〇〇
(五)	導便殼 <i>Nornacol</i>	三〇〇〇		溜水 <i>Aq dest</i>	一〇〇〇〇
	上每次或一二茶匙，以溫水送下，每食後分服		(三)	補利奇酶粉 <i>Polyzyme Pulv</i>	一〇五
(六)	阿加路 <i>Agarol</i>	五〇〇〇		上分三包，每食後一次	
	上每臨睡前服一食匙		(四)	胃精片 <i>Gastro-Enterin Tab.</i>	十二片
(七)	療塞通 <i>Laxaton</i>	二片		上每日三次，每食後二片	
	上臨睡一次頓服		(五)	阿飢蒴片 <i>Oehimon Tablets</i>	十二片
(八)	一粟通 <i>Izaton</i>	〇・二或二片		上每日三次，每次二片	
	上臨睡一次頓服		(六)	大黃蘇打片 <i>Rhei Sodamit</i>	十二片
(九)	芬奴拉克藥糖 <i>Phenolax Wafers</i>	二片		上每日三次，每食後各一片	
	上晚間前頓服				

(註)腸弛緩症。亦可應用消化劑。處方舉例如下。

(附)腸弛緩症注射藥

哀司麻地 *Ismodil*

一三三 腸狹窄症方

本症亦宜用緩下劑。參閱腸弛緩前段處方。或用食鹽水，藥用石鹼，甘油等灌腸亦可。其他不外對症治療。

一四 腸閉塞症(吐糞症)方

(一) 蓖麻子油 *Ol Ricini* 四〇〇〇

阿拉伯樹膠 *Gummi arabicum* 一〇〇〇

糖漿 *Sirup simplex* 二〇〇〇

溜水 *Aq dest* 一〇〇〇

上混和為乳劑，每二小時服一食匙，至下瀉為度

(二) 阿開司多 *Arcastol* 二〇〇〇

上一次頓服

(三) 硫酸鎂 *Mag. sulfuricum* 二〇〇〇

上溶於溫水中頓服

(註)凡因宿便異物等原因而起之腸閉塞症。可用上列瀉劑。其餘均宜用鎮靜腸蠕動藥品。處方如下。

臨床經驗處方

一〇九

(一) 阿片末 *Pulv opium* 〇・三

乳糖 *Sacch lact* 一・五

上分三包，一日分服

(二) 鹽酸嗎啡 *Morphin hydrochloric* 〇・〇三

乳糖 *Sacch lact* 一・五

上分三包，一日三次分服

(三) 莨菪膏 *Ext Scopolia* 〇・〇六

乳糖 *Sacch lact* 一・〇

上分三包，一日分服

(附) 腸閉塞症注射藥

硫酸阿刀邊(即阿忒羅品) *Atropin Sulphate*。

二五 腸疝痛方

(一) 鹽酸嗎啡 *Morphin hydrochloric* 〇・〇一

乳糖 *Sacch lact* 〇・五

上於發作時一次頓服

(二) 莨菪膏 *Ext Scopolia* 〇・〇六

乳糖 *Sacch lact* 一・〇

- 上分三包，一日分服
- (三) 印度大麻膏 Ext Cannabis Indicae 〇・二
白糖 Sacch alba 五・〇
上為十包，每三小時一包
- (四) 阿片末 Pulv Opium 〇・三
莨菪根末 Pulv Rad. Scopolia 〇・〇六
乳糖 Sacch lact 一・〇
上分三包，一日分服
- (五) 鎮痙汽巴兒勁 Spasmo-Cibalgin 二片
上一次頓服
- (六) 斯潑斯曼爾琴 Spasmalgin 二片
上發作時頓服
- (七) 優巴科 Eupaco 二片
上發作時頓服
- (八) 阿片膏 Ext Opium 〇・〇五
可可脂 Ol Cacao 二・〇
上為坐藥一個，插入肛門
- (九) 鎮痙汽巴兒勁栓劑 Spasmo-Cibalgin Sup-

Positoria

上塞入肛門

一個

(10) 優巴科栓劑 Eupaco Suppositoria 一個

上塞入肛門

(註)本症於不發作時。可兼行溫水灌腸法，腹部按摩法，水治法等。亦能收相當功效。

(附)腸疝痛注射藥

鹽酸嗎啡注射液 Morphine hydrochloride，嗎啡阿刀邊注射液 Morphin Atropine・盼得本 Pantonon・巴畢那兒 Pavinal 等。

一六 腸寄生蟲病方

- (一) 綿馬膏 Ext Filicis 五・〇—一〇・〇
上分裝膠囊十個，每十五分鐘服一個
- (二) 山道年 Santonin 〇・〇五
甘汞 Calomel 〇・〇三
乳糖 Sacch lact 〇・五
上為一包，與等量三包，每晨空腹各一包

(三) 山道年錠 Fastill Santonin (O·O11) 二片

上空腹一次頓服

(四) 替摩耳 Thymol 一·〇

上入膠囊，一次頓服

(五) 替摩耳 Thymol 一·〇

那夫答林 Naphthalin 〇·三

上為一包，給等量二包，每時服一包

(六) 蛔滅納 Helminal 三片

上每日三次分服

(七) 布妥倫 Butalan 三片

上每日三次分服

(八) 克痢殺螟 Chrysemine 十五粒

上每晨空腹時服三粒，五日服完

(九) 貝代明 Bedernin 三粒

上晨間空腹時頓服

(十) 克痢殺螟液 Liq Chrysemine 1000滴

溜水 Aq deest 1100·〇

上為灌腸料

(11) 水銀軟膏 Quicksilberalbe 11·〇

上為肛門周圍塗擦劑(肛門搔癢時用之)

(註)腸寄生病發現慢性貧血時。宜兼用補血藥。處方參閱強壯劑。

(附)腸寄生蟲病注射藥

妥拉司敏 Drasmin, 山道年水 Santonisol 等。

二七 肝臟充血方

對症治療。內服緩下劑。外用消炎塗布劑。處方見瀉下劑·外科劑中。

二八 肝臟膿瘍方

治療與其他炎症同。除主用消炎藥外。不外對症治療。酌用解熱劑，鎮痛劑等。處方見前。

二九 肝臟硬變方

緩下劑，利尿劑對本症均可應用(處方見前)。此外宜細究其原因。而施根本治療。

三〇 肝臟梅毒方

治療與胃梅毒同。內服不外碘劑。參閱花柳病劑中之梅毒方。

三一 肝癌方

無特效藥。惟有對症處置。

三二 黃疸方

(一) 人工加爾斯泉鹽 *Sal carolinum factium*

薄荷水 *Aq Menthae* 110.00

溜水 *Aq dest* 3.00

上一日三次分服

(二) 硫酸鎂 *Magnesium sulfuricum* 110.00

苦味丁幾 *Tinc amara* 3.00

糖漿 *Sirup simplex* 100.00

溜水 *Aq dest* 100.00

上一日三次，二日分服

(三) 重碳酸鈉 *Nat. bicarbonicum* 3.00

大黃末 *Pulv Rhei* 2.00

上分三包，一日三次各一包

(四) 水楊酸鈉 *Nat. salicylicum* 1.50

重碳酸鈉 *Nat. bicarbonicum* 1.50

上分三包，一日三次分服

(五) 烏羅透賓 *Urotropin* 3.00

醋酸鉀 *Kali aceticum* 4.00

糖漿 *Sirup simplex* 100.00

溜水 *Aq dest* 100.00

上每日三次，每次一格，二日分服

(六) 利膽弗拉文 *Choleflavine* 18.00

上每日三次，每次二粒

(七) 石克利 *Veracolate* 9.00

上每日三次，每次一片

(八) 肥樂民 *Felamin* 12.00

上每日三次，每次一片

(九) 格魯庫倫 *Grucelon* 十二片

上每日三次，每次二片

(十) 皮耳隆膠囊劑 *Pulvules Biron* 十八粒

上每日三次，每次二粒

(十一) 瑪瑙派靈 *Normo Eparina* 十二片

上每日三次，每次一片

(附)黃疸注射藥

一克太擊散 *Icterosan*，膽素靈 *Decalin*，烏羅脫羅並 *Urotropin*，烏羅透賽 *Urotrosal*，硫酸鎂注射液 *Magnesium Sulphate*，鎂固素靈 *Magsolin*，鎂固拿兒 *Magnol*。

三三三 膽石症方

(一) 水楊酸鈉 *Nat salicylicum* 1.0.0

重碳酸鈣 *Nat bicarbonicum* 1.0.0

硫酸鈣 *Nat sulfuricum* 1.0.0

上為一包量，與等量三包，一日三次各

一包

(二) 以脫 *Aether* 十八滴

松節油 *Terepentinol* 六滴

上裝入膠囊六個，一日三回各二個

(三) 人工加爾斯泉鹽 *Sal Carolinum fa rithium* 三〇.〇〇

溜水 *Aq dest* 100.0

上一日三次，二日分服

(四) 膽石克利 *Yeracolate* 十二片

上每日三次，每次一片

(五) 肥樂民 *Felamin* 十二片

上每日三次，每次一片

(六) 格魯庫倫 *Grucelon* 十二片

上每日三次，每次二片

(註)其他處方與黃疸病同。注射藥亦可應用一克太擊散 *Icterosan*，膽素靈 *Decalin* 等。

三四 膽石痛方

此即膽石症發作之疝痛。處方及注射藥與腸疝痛

同。

三五

脾臟病方

脾臟病較為少見。根治頗難。不外應用消化劑處方劑，行對症治療。

三六

脾腫方

脾腫除局部塗布安福消腫膏等消炎藥外。宜用砒鐵劑，規甯劑等(參閱強壯劑處方)。其由黑熱病而起者。宜注射新斯錫波霜 *Neostibosan*。至急性傳染病誘起之脾腫。大抵傳染病漸入恢復期時。脾腫亦可隨之而消退。

三七

脾膿瘍方

參閱外科消炎劑處方。施行治療。

三八

脾癌及遊走脾方

初期參用強壯劑(處方見前)。藥物無效時。宜行

外科手術治療。

三九

腹水(水鼓)方

(一) 毛地黃葉浸 *Inf. folia digitalis*

(1.0) 一八〇.〇

醋酸鉀液 *Liquor kali aceticum*

二〇.〇

糖漿 *Sirup simplex*

一〇.〇

上一日三次分服。二日量

(二) 醋酸鉀 *Kali aceticum*

六.〇

硝酸鉀 *Kali nitricum*

六.〇

糖漿 *Sirup simplex*

一〇.〇

溜水 *Aq. dest.*

一〇〇.〇

上一日三次，二日分服

(三) 狄午雷汀 *Diuretin*

六.〇

上分六包二日分服

(四) 阿辯靈 *Asurin*

十二片

上每日三次，每次二片

(註)腹水除用上述利尿劑外。亦可用瀉下劑及發汗劑。

處方舉例如下。

(五) 大黃末 Pulv Rhei 二〇〇

重碳酸鈉 Nat. bicarbonicum 三〇〇

上分三包，一日三次各一包

(六) 硫酸鎂 Mag. sulfuricum 二〇〇

上溶於溫水中頓服

(七) 硫酸鈉 Nat sulfuricum 三〇〇

大黃糖漿 Sirup simplex 二〇〇

溜水 Aq dest 一〇〇

上每小時服一食匙，至瀉下為度

(八) 鹽酸必羅卡而賓 Pilocarpin hydrochloric. 〇〇〇

〇〇〇

乳糖 Sacch lact 〇〇〇

上一次頓服

(附) 腹水注射藥

奈迫且而 Naptal, 拿佛阿色羅 Novasurrol, 酒
利末 Salyrgan, 退惡水 Theosol 等。

臨牀經驗處方

一一五

四〇 急性腹膜炎方

本症宜用阿片嗎啡等鎮靜腸蠕動藥品。腹部行冰
罨法。並注射腹膜炎血清，或百浪多息，沙呂賽
勃他星等。處方詳見外科消炎劑中。

四一 慢性膜腹炎方

單純性，滲出性者。初起參照腹水療法。用利尿
劑，發汗劑等。結核性者宜用強壯劑，碘劑等。
此外局部處置。可塗水銀軟膏，伊克度肝油劑，
或溫罨包。

C 循環器病

一 心臟病方

(一) 毛地黃丁幾 Tinc Digitalis 一，五

斯忒羅仿丁幾 Tinc Strophanthi 一〇〇

糖漿 Sirup simplex 五〇〇

溜水 Aq dest 一〇〇〇

上每二時服一格

(二) 毛地黃丁幾 Tinc Digitalis 1.5

番木鱉丁幾 Tinc Strychnin 1.0

赤葡萄酒 Rotwein 15.0

糖漿 Sirup simplex 10.0

溜水 Aq dest 100.0

上每二時服一食匙(同上)

(三) 毛地黃葉末 Pulv Folia Digitalis 0.05

海葱末 Pulv Bulbus scillae 0.05

白糖 Sacch alba 0.3

上混和與同量十包一日三次各一包(同上)

(四) 毛地黃葉末 Pulv Folia Digitalis 0.1

精製樟腦 Camphor depurata 0.1

咖啡蘇 Caffein 0.1

乳糖 Sacch lact 0.3

上混和頓服，每三時間一次

(五) 狄加林 Digitalen 3.0

烏羅透賓 Urotropin 3.0

糖漿 Sirup simplex 20.0

溜水 Aq dest 180.0

上一日三次，二日分服

(六) 樂黛靈液 Liq. Ro.leanin 3.0

醋酸鉀 Kali aceticum 2.0

溜水 Aq dest 100.0

上一日三次分服

(七) 安息香酸咖啡 Caffein Nat. benzoicum 2.0

精製樟腦 Camphor depurata 0.6

乳糖 Sacch lact 2.0

上分六包，每二時服一包

(八) 復力靈 Folinerin 六片

上每日三次，每次二片

(九) 布福他利斯 Bufotalis 九片

上每日三次，每次三片

(十) 萬羅地僅 Verodigen 三片

上每日三次，每次一片

萬羅地僅 Verodigen 三片

(註)凡患急性心臟內膜炎，心臟瓣膜病，心肌炎，脂肪心，心臟炎，心臟水腫等。均可應用上列處方。倘發其他高熱，水腫呼吸困難等。則行對症治療。(參閱退熱劑及利尿劑，鎮靜及麻醉劑)。此外保守安靜。避煙酒及過度勞動。亦屬重要。

(附)心臟病注射藥

樟腦油 Ol camphor, 可拉明 Coramine, 康福那心 Camphonasin, 狄茄令 Digalen, 斯忒羅仿丁 Strophatin, 卡代柴而 Cardiazol 等(挽救虛脫)
 葡萄糖注射液 Glucose solution, 樂地儂 Lotinon, 古卡新 Glucalin 維他葡萄糖 Vitadextrose 等(增進心臟營養) 雷銀膠 Electrargol, 百浪多息 Prontosil, 握姆那丁 Ornadin 等(撲滅病菌及解熱) 生理食鹽水 Kochsalz Lösung (稀釋毒素) 洒利汞 Salyrgran, 退熱水 Theosol (等血行障礙而起之水腫)。

二 神經性心悸亢進症方

(一) 溴化鉀 Kali bromatum 1.5

臨床經驗處方

一一七

溴化鈉 Nat bromatum. 1.5

溴化鉍 Amm. bromatum 1.5

糖漿 Sirup simplex 100.0

溜水 Aq dest 1000.0

上一日三次分服

(二) 三溴片 Triple Brom Tab. 十二片

上每日三次，每次二片

(三) 李羅米品 Bromipin (10%) 100.0

上每日三次各一茶匙

(四) 阿魏丁幾 Tinc Asae foetidae 5.0

纈草丁幾 Tinc Valerianae 100.0

上每日三次各二〇滴，放入糖水中服

(五) 盧密拿 Lunninal 1.0

乳糖 Sacch lact 1.5

上分三包，一日三次分服

(六) 鈕羅立順 Neurolixir "Miller" 100.0

上每日三次，每次一至二茶匙

(七) 色多波 Sedobrol Tablets 六片

上每日三次各一片

(九) 佛里耳 Valyl

上每日三次，每次一粒

(註)其他處方。參閱抑靜劑。

三 絞心症(狹心症)方

(一) 亞硝酸阿邁耳 Amylium nitrosum 五・〇

茴香油 Ol Foeniculi 一〇::〇

上發作時，倒於棉花數滴，作嗅入用

(二) 鹽酸嗎啡 Morphin hydrochloric. 〇・〇一

乳糖 Sacch lact 〇・五

上一次頓服

(三) 萹蓄膏 Ext Sepolia 〇・〇六

乳糖 Sacch lact 一・〇

上研和分三包，一日分服

(四) 鎮痙汽巴兒勁 Spasmo-Cibalgin 二片

上發作時一次頓服

(五) 斯潑斯曼爾琴 Spasmalgine 二片

上發作時頓服

(六) 優巴科 Eupaco 二片

上發作時頓服

(註)絞心症發作後。欲圖預防其再發。宜用下列處方。

(七) 局卡潑拉 Jocalpral 六片

上每日三次，每次一片

(八) 梯烏密拿 Theominal 六片

上每日三次，每次一片

(九) 鈣化代猶囉黍 Calcium-Diuretin 六片

上每日三次，每次一片

(十) 碘化鉀 Kali jodatun 三・〇

毛地黃丁幾 Yine Digitalis 三・〇

糖漿 Sirup simplex 一〇・〇

溜水 Aq dest 一〇〇・〇

上每日三次，二日分服

(二) 沃度地理太而藥片 Jol-Diuretal 六片

上每日三次，每次半片或一片

(三) 台拉士吞 Telatun 四片

上每日二次，每次一片

(三) 阿尼麻沙 Animasa

六片

上每日三次，每日一片

(四) 保安町 Padutin

一管

上一日三次，每次三〇滴，和入溫水中服

(註) 絞心症除用上述處方外。兼宜參用興奮劑(處方見前)。以防其虛脫。

(附) 絞心症注射藥

鹽酸嗎啡 Morphine hydrochloride，嗎啡阿刀邊

Morphin Atropin，盼得本 Pantopon，優巴科

Rupaco 等(劇痛時用)。

台拉士吞 Telatuten，阿尼麻沙 Animasa，保安

町 Padutin，來克諾 Lacamol，加爾的儂 Car-

dinen，哈塞斯維兒注射液 Hasethrol Injection，

哈斯蒙 Herzmon，吉里那爾 Silinal，理德羅斯

格蘭 Nitrocleran，矽酸鈉注射液 Nat Silic。

四 動脈硬化及血壓過高方

(一) 碘化鉀 Kali jodatium

三・〇

苦味丁幾 Tinc. amara

三・〇

糖漿 Syrup simplex

一〇・〇

溜水 Aq. dest

一〇〇・〇

上每日三次，二日分服

(二) 亞歷佛耳 Alival

一〇片

上每日三次，每次一片

(三) 洒年錠 Ssjodin

十二片

上每日三次，每次二片

(四) 沃度拚 Jodipin

(10%) 一瓶

上一日三次，每次一食匙

(五) 調脈泰 Theobrodal

一〇片

上每日三次各一片

(六) 犀寶托那爾 Hypotonal

三・〇

乳糖 Sacch. lact

二・〇

上分六包，一日三次分服

(七) 咖啡蜜拿 Cafeminal

一〇片

上每日二三次，每次一片

- | | | | | | |
|------|---------------------------|-----|------|-------------------------|---------|
| (八) | 台拉土吞 Talatun | 三〇片 | (二六) | 烏利鈣片 Diurecal Tablets | 二〇片 |
| | 上每日二次，每次一片，第三日後，改爲每日三次各一片 | | (二七) | 烏利鈣碘片 Jod Diurecal Tab. | 二〇片 |
| (九) | 阿尼麻沙 Animasa | 二〇粒 | (二八) | 約達洛斯 Todalose | 三〇滴 |
| | 上每日三次，每次一粒 | | | 苦味丁幾 Tinc amara | 二〇〇 |
| (一〇) | 保妥耐 Padutin | 一瓶 | | 糖漿 Sirrup simplex | 一〇〇〇 |
| | 上每日三次，每次二十五滴，和入溫水中服 | | | 溜水 Aq dest | 一〇〇〇 |
| (一一) | 蘇補通甯 Subtonin | 三〇片 | (二九) | 喬碘鈣 Jolincal | 十八片 |
| | 上每日三次，每次二片 | | (三〇) | 安度沃碘 In tojodin | 十八片 |
| (一二) | 局卡撥拉 Joca pral | 二〇片 | (三一) | 加爾的儂 Cardimon | 六〇滴 |
| (一三) | 梯烏密拿 Theominial | 二〇片 | | 溴化鉀 Kali bromat | 二〇〇 |
| (一四) | 鈣化代猶囉泰 Calcium-Diuretín | 二〇片 | | 糖漿 Sirrup simplex | 一〇〇 |
| | 上每日二次，每次二片 | | | 溜水 Aq dest | 一〇〇 |
| (一五) | 沃度地理太而藥片 Jod-Diuretal | 一〇片 | | | 上一日三次分服 |
| | 上每日三次，每次半至一片 | | | | |

(註)血壓過高，除應用上列處方外。亦可參用溴素等鎮靜劑為對症治療。

(附)動脈硬化及降低血壓注射藥

台拉士吞 Telatuten, 阿尼麻沙 Animasa, 保妥
耐 Padutin, 蘇補通寧 Subtonin, 哈塞斯羅兒注
射液 Hasethrol Injection, 優碘霜 Entolon, 喬
託碘 Joto-in, 約達山布丁 Jodaseptin, 吉里那
爾 Silinal, 理德斯格蘭 Nitroscleran, 醋酸可林
Aecocolin, 矽利脈 Silimon, 矽利康那 Siliconal,
硅酸鈉注射液 Nat Silic.

五 動脈瘤方

(1) 碘化鉀 Kali jodatum 三〇〇
糖漿 Sirup simplex 一〇〇〇
溜水 Aq dest 一〇〇〇〇

上每日三次，二日分服

其他碘製劑。例如—亞歷佛耳，洒乍錠，沃度拚，局卡撥拉，約達洛斯，喬碘鈣，安度沃碘等。

臨床經驗處方

均可應用(處方可參閱上章)。

(二) 醋酸鉛 Plumbum acetatum 〇・三
乳糖 Sacch lact 一〇〇

上分六包，每日三次各一包

(三) 白阿膠 Gelatin alba 二〇〇

食鹽 Kochsalz 〇・七

溜水 Aq dest 一〇〇〇〇

上經消毒後，加熱與體溫等，注射於胸部之皮下。

(註)本症後期。大部藥物無效。宜行手術療法。

D 泌尿生殖器病

一 腎臟炎腎盂炎及腎臟水

腫方

(一) 毛地黃葉浸 Inf. Folia digitalis

(〇・五) 一〇〇〇〇

安息香酸鈉咖啡 Caffein Nat. ben-

zoicum	1.5	溜水 Aq dest	100.0
上一日三次分服		上每日三次，每次一格，二日分服	
(二) 醋酸鉀 Kali aceticum	2.0	(六) 午乏午耳西葉浸 Inf. Folia Uvae Ursi	(110.0) 180.0
硝酸鉀 Kali niticum	2.0	糖漿 Sirrup simplex	20.0
苦味丁幾 Tinc amara	2.0	上每日三次，二日分服	
糖漿 Sirrup simplex	10.0	(七) 阿耨靈 Agurin	十二片
溜水 Aq dest	100.0	上每日三次，每次二片	
(三) 狄午雷汀 Diuretin	3.0	(八) 太卡利定 Takalidin	六片
上一日三次分服		上一日三次分服	
(四) 替俄金 Theophyllin	0.6	(註) 治療腎臟炎。亦可酌用發汗劑或瀉下劑。	
狄午雷汀 Diuretin	1.5	(附) 腎臟炎等利尿注射藥	
糖漿 Sirrup simplex	10.0	烏羅脫羅並 Urotropin, 喜那脫那賓 Cytotropin,	
溜水 Aq dest	100.0	烏羅透賽 Urotrosal, 安息香酸鈉咖啡精 Caffeine	
上一日三次分服		Sodium benzoate, 水楊酸鈉咖啡精 Caffeine	
(五) 烏羅透賓 Urotropin	3.0	Sodium Salicylate, 邦鈣兒 Pancaal, 解迫精	
醋酸鉀 Kali aceticum	4.0	Cabrogin Amp. 喝斯百靈 Hesperin	
糖漿 Sirrup simplex	10.0	奈迫且而 Neptal, 洒利汞 Salyrgan, 退惡水	

Theosol 等。

二 腎膿瘍方

主用消炎劑(見外科劑處方)。兼用鎮痛，止血等藥為對症治療。

三 腎臟癌腫方

本症不易根治。藥物用止血劑及鎮痛劑等處方為對症治療。

四 腎臟結核方

參照肺結核行強壯療法。兼用烏羅透賓等尿防腐劑。

五 尿毒症方

用利尿劑，發汗劑，興奮劑等處方。注射藥可用生理食鹽水 Kochsalzlösung，烏羅脫羅並 Urotropin，喜那脫那賓 Cylotropin，烏羅透賓 Urotropin。

臨床經驗處方

trosal 等。

六 腎石症及膀胱結石方

- | | | |
|-----|------------------------------|-------|
| (一) | 碳酸鉀 Kali carbonicum | 一・五 |
| | 白糖 Saccha alba | 一・〇 |
| | 上分三包，一日三次分服 | |
| (二) | 碳酸鎂 Mag. carbonicum | 六・〇 |
| | 重碳酸鈉 Nat bicarbonicum | 六・〇 |
| | 糖漿 Sirup simplex | 一〇・〇 |
| | 溜水 Aq dest | 二〇〇・〇 |
| | 上一日三次，二日分服 | |
| (三) | 甘油 Glycerin | 八〇・〇 |
| | 糖漿 Sirup simplex | 二〇・〇 |
| | 上一日三次，每次一食匙，臨服搖勻 | |
| (四) | 稀鹽酸 Acid hydrochloric diluti | 一・〇 |
| | 烏羅透賓 Urotropin | 三・〇 |
| | 糖漿 Sirup simplex | 一〇・〇 |
| | 溜水 Aq dest | 一〇〇・〇 |

上一日三次分服

(五) 枸橼酸 *Acid citricum* 1.0.0

酒石酸 *Acid tartaricum* 1.0.0

橙皮糖漿 *S. auranti corticis* 1.0.0.0

溜水 *Aq dest* 1.00.0.0

上一日三次分服

(註)腎石及膀胱結石之內科治療。宜檢查結石之性質。設法使溶解縮小而排出。第(一)至(三)方適用尿酸性結石。第(四)

(五)方適用於磷酸鹽及磷酸鹽類結石。

本症發作痲病時。亦不外應用嗎啡等鎮痛劑。處方及注射藥可參照膀胱痛。

七 膀胱炎方

(一) 薩羅耳 *Salol* 3.0.0

上為六包，每日三次各一包

(二) 水揚酸鈉 *Nat salicylicum* 6.0.0

上分三包，每日三次各一包

(三) 烏羅透賓 *Urotropin* 3.0.0

醋酸鉀 *Kali aceticum* 4.0.0

糖漿 *Sirup simplex* 1.0.0.0

溜水 *Aq dest* 1.00.0.0

上每日三次，每次一格，二日分服

(四) 嗽華葉素 *Uvarsol* 6.0.0

烏羅透賓 *Urotropin* 3.0.0

糖漿 *Sirup simplex* 1.0.0.0

溜水 *Aq dest* 1.00.0.0

上每日三次，二日分服

(五) 午乏午耳西葉煎 *Decoct folia Uvae Ursi*

(1.0.0.0) 1.8.0.0

糖漿 *Sirup simplex* 1.0.0.0

上每日三次，二日分服

(六) 科派巴樹脂 *Balsam Copaivae* 0.5

上入膠囊，與等量十二個，一日三次，

每食後服二個

(七) 華澄茄膏 *Ext Cubebae* 3.0.0

上分三包，一日分服

(八) 烏羅透賓片 *Urotropin Tablets* 十二片

上每日三次，每次二片

(九) 海而密安 Helmitol

十二片

上每日三次，每次二片

(十) 護爾頗靈 Uripurin

十二片

上每日三次，每次二片

(十一) 療濁病 Neotropin

十八片

上每日三次各二片

(註) 膀胱炎疼痛劇烈，尿意頻數時。除應用服藥外。更可用下列鎮痛坐藥。

(十二) 莨菪膏 Fxt Scopolia

〇・〇二

可可脂 Cacao

二・〇

上為坐藥一個。插入肛門

(附) 膀胱炎注射藥

烏羅脫羅並 Urotropin・喜那脫那賓 Cytotropin・

烏羅透賽 Urotrosal・脫呂帕弗拉文 Trypflavine・

果乃克林 Gonacrine・配力定 Pyridine・固拿可

兒 Gonacarl・鈣色文 Calciviv 等。

八 遺尿症方

詳見於小兒科處方中。

九 血尿方

(一) 麥角膏 Fxt Secale cornuti

一・〇

阿片末 Pulv opium

〇・一

白糖 Sacch alba

二・〇

上為五包。每三時一包

(二) 過鹽化鐵液 Liq Ferri sesquichlorat 一・〇

桂皮水 Aq Cinnamomi 一・〇〇〇

橙皮糖漿 S. auranti Corticis 一・〇〇

上每二時服一食匙

(三) 麥角丁幾 Tine Secale cornuti 一・五

金印草流膏 Fxt Hydrastis fluidum 一・〇

苦味丁幾 Tine amara 一・五

糖漿 Sirup simplex 一・〇〇

溜水 Aq dest 一・〇〇

上每日三次分服

(四) 醋酸鉛 Plumbum aceticum

阿片 Opium

白糖 Sacch alba

上為十包，每二小時一包

(五) 斯錫普錫輕片 Strychnin Tab.

上每日三次，每次二片

(六) 奧保司太丁片 Opostatin Tab.

上每日三次，每次二片

(七) 腎上腺液 Iiq Adrenalin

溜水 Aq deat

上為尿道注入劑

(附) 血尿注射藥

麥角注射流 Ergotin, 白阿膠注射流 Gelatin So-

lution, 濃厚食鹽水 Sodium chloride strong

Solution, 斯錫普錫輕 Strychnin, 血來必定 He-

lepin, 可阿可連 Coagulien, 克羅甸 Clauden

等。

一〇 陽萎方

(一) 鹽酸育亨賓 Yohimbini hydrochloric 六片
上每日三次各一片

(二) 育維寧 Juvenin 六片
上每日三片，午前一片，臨睡服二片

(三) 今則寧 Ginsenin 二片
上一次頓服，或分二次服

(四) 天福鱗 Testiphoria 一瓶
上每日三次，每次二片

(五) 搭司託僅 Testogan 一瓶
上每日三次各一片

(六) 安達祿壽 Androstin 一管
上每日三次，每次一片，食後溫水送下

(七) 補素母 Pasuma 一管
上每日三次，每次一片

(八) 愛的體士丁 Antestestin 一管

上每日三次，每次二片

九) 英男兒萌 Enarmon Tab.

一管

上每日三次，每次一片

10) 賜保命片 Spermin Tablets

一管

上每日三次，每次二片

(附)陽萎注射藥

士的年 Stryehinin，鹽酸育亨賓 Yohimbin hyd-rochloric。育維寧 Juvenin 安達祿壽 Androstin，補素母 Pasuma，推斯辯蘭杜 Testiglandol，愛的體士丁 Antetestin，安樂根 Erugen，謀克老病 Macrobin，英男兒萌 Enarmon，福爾賜彼命 Spermin Poehl，安度賜保命 Endospermin 等。

一一 遺精方

(一) 溴化鉀 Kali bromatum

二〇〇

糖漿 Sirup simplex

一〇〇〇

溜水 Aq dest

一〇〇〇

上每日三次分服

臨床經驗處方

(二) 流動金印草膏 Ext Hydrastis fluid. 二〇〇

苦味丁幾 Tinc. amara

二〇〇

漿糖 Sirup simplex

一〇〇〇

溜水 Aq dest

一〇〇〇

上一日三次分服

(三) 溴素樟腦 Camphora monobromat 〇・六

上分三包，一日三次分服

(四) 三溴片 Triple Brom Tablets

十片

上每日臨臥前頓服二片

(五) 民生遺精片 Tab. Spermatorrhoea

六片

上於臨睡前半小時服一或二片

(附)遺精注射藥

育維寧 Juvenin，英男兒萌 Enarmon，安特祿

壽 Androstin，補素母 Pasuma，愛的體士丁

Antetestin，河豚毒素 Tetrodotoxin 百利多命

Porvotonin 等。

(註)補精壯陽注射劑。雖可適用於遺精劑。但未必有特效。且用後更有引起勃起起催淫等之副作用。故對本症以單用內服為宜。

一一一 睪丸炎方

(一) 伊克度軟膏 Ung. Ichthyol

上爲局部塗布劑

適量

(二) 安福消腫膏 Antiphlogistin

上爲局部塗布劑

適量

(三) 醋酸鉛液 Plumbum aceticum (2%)

100.0

上爲局部罨包劑

(四) 硫酸鎂 Mag. sulfuricum

10.0

上溶於溫水中一次頓服

(五) 薩羅耳 Salol

1.5

上爲三包，每日三次各一包

(六) 百浪多息片 Prontosil

六片

上每日三次，每次二片

(七) 烏利龍 Uleron

六片

上每日三次，每次二片

(八) 大健風 Dagenan

六片

(九) 百膿清 Pronzin

上每日三四次，每次一片
上一日三次各二片

六片

(十) 碘化鉀 Kalium jodatum

1.0

糖漿 Sirup simplex

10.0

溜水 Aq dest

100.0

上每日三次，一日分服(促進吸收消炎)

(二) 莨菪膏 Ext Scopoliae

1.0

凡士林 Vaselin

10.0

上爲陰囊塗布劑(鎮痛用)

(附) 睪丸炎注射藥

碘化鉀注射液 Calcium jodatum, 邦鈣兒Pancal.

百浪多息 Prontosil, 沙呂賽勃他星 Soluseptazine

·百膿清 Pronzin。

由淋疾而起者，宜用阿爾梯共 Arthigon, 白濁

藥特靈 Gono-Yatren, 阿魯賴司卿 Allestin, 脫

呂弗拉文 Trypallavine, 鈣色文 Calcavin, 固

拿可兒 Gonocarl 等。

二三 疼痛性陰莖勃起及攝

護腺炎方

詳見花柳病劑處方中。

E 神經系病

一 腦貧血方

(一) 銻水 *Liq. Ammoniae*

適量

上倒在棉花，置患者鼻部，使適宜吸入

(二) 精製樟腦 *Camphor depurata*

〇・二

白糖 *Sacch. alba*

〇・五

上一次頓服

(三) 科德孝 *Caltechol*

二片

上一次頓服

(四) 咖啡碱 *Cafein*

〇・一

乳糖 *Sacch. lact.*

〇・三

臨床經驗處方

上為一包，一次頓服

(五) 李蘭地酒 *Brandy*

100.0

上一次頓服

(六) 毛地黃丁幾 *Tinc. Digitalis*

1.5

斯忒羅仿丁幾 *Tinc. Strophantii*

1.0

赤葡萄酒 *Rotwein*

51.0

糖漿 *Sirup simplex*

100.0

溜水 *Ap. dest.*

100.0

上每二小時服一格

(註)腦貧血急救時。宜用強心藥。其他處方可參閱上述之興奮劑。至本症發作後之預防。則可用砒鐵等強壯劑。

(附)腦貧血注射藥

樟腦油注射液 *Ol. Camphor.* 可拉明 *Coramine.*

康福那心 *Camphonasin.* 狄茄令 *Digalen.* 海克

賽通 *Huxatone.* 樂百齡 *Lobelin* 等。

二 腦充血方

(一) 硫酸鎂 *Mag. sulfuricum*

110.0

一二九

臨床經驗處方

130

上溶於溫水中一次頓服

(二) 人工加爾斯泉鹽 *Salcarolinum factitium*

一五〇

上溶於溫水中，一次頓服

(三) 三溴片 *Triple Brom Tablets*

十八片

上每日三次，每次二至三片

(四) 台拉士吞 *Telatuten*

五〇片

上每日二次，每次一片，第三日後，改

為每日三次各一片

(五) 阿尼麻沙 *Animasa*

二〇粒

上每日三次，每次一粒

(六) 亞歷佛耳 *Alival*

十二片

上每日三次各一片

(七) 酒乍錠 *Sajodin*

十二片

上每日三次，每次二片

(八) 喬碘鈣 *Jodineal*

十八片

上每日三次各二片

(九) 安度沃碘 *Endojodin*

十八片

上每日三次各二片

(註)其他處方。可參閱動脈硬化症。

(附)腦充血注射藥

台拉士吞 *Telatuten*，阿尼麻沙 *Animasa*，保妥

酞 *Padutin*，吉里那耳 *Silinal*，矽利脈 *Silimon*，

理德羅斯格蘭 *Nitroscleran*，醋酸可林 *Aceolin*

優碘霜 *Euroion*，喬託碘 *Jokodon*，約達山布丁

Jodaseptine 等。

三 腦出血方

(一) 大黃浸 *Inf. Radix Rhei*

(一五〇) 一五〇〇

蓖麻子油 *Ol Ricini*

三〇〇

上為灌腸用，二次量

(二) 旃那葉 *Folia Sennae* (一〇〇) 二〇〇

硫酸鎂 *Mag. sulfuricum* 二〇〇

糖漿 *Sirup simplex* 一〇〇

上每二小時服一食匙

(11) 水蛭 Brintegel

五條

上貼於顛顛部或耳後

(四) 芥子末 Pulv Sinapis

等分

微溫水 Lanheit Wasser

上為泥狀，塗於布片，貼於下腿部，約

經十數分鐘除去之。

(註) 腦出血非帶危險。預後大多不良。不幸發生時。速將患者頭部高舉。兼宜用冰囊放置於頭部。體格強健者。可行刺絡瀉血法(即由血管抽出血液二百至五〇〇西西)。其他不外對症治療。昏睡用興奮劑，痙攣用鎮靜劑等處方)。

倘症狀輕緩或發作後之處理。則可用碘化鉀，亞歷佛耳，洒乍錠，喬碘鈣，台拉士吞，阿尼麻沙等。參閱腦充血處方。

(附) 腦出血注射藥

與腦充血注射藥同。

四 腦動脈栓塞·血塞及腦

膜出血方

治療與腦出血同。倘因梅毒而起者。兼宜用驅梅毒劑。

五 腦腫瘍方

應用碘劑或水銀劑。其他不外對症治療。

六 腦膿瘍及急性化膿性

腦膜炎方

除頭部用冷罨法外。內服藥與注射藥。均以消炎殺菌為主。可參閱外科消炎劑處方。

七 流行性腦脊髓膜炎方

詳見傳染病劑處方中。

八 脊髓炎及脊髓軟膜炎方

探究原因。而行根本治療。其餘視症狀之如何。行對症處置。急性症可沿脊柱部用冷囊罨包或塗

布水銀軟膏。內服藥可酌用解熱劑，緩下劑，利尿劑，鎮痛劑，碘劑等。

九 脊髓癆方

- | | |
|-----------------------|------|
| (一) 碘化鉀 Kali Jodatium | 三〇〇 |
| 苦味丁幾 Tinc amara | 三〇〇 |
| 糖漿 Sirup simplex | 一〇〇〇 |
| 溜水 Aq dest | 一〇〇〇 |
| 上一日三次，二日分服 | |
| (二) 亞歷佛耳 Alival | 十二片 |
| 上一日三次，每次一片 | |
| (三) 利破沃典 Lipiodin | 十二片 |
| 上一日三次，每次一片 | |
| (四) 碘斯推靈 Jodosterin | 十二片 |
| 上一日三次，每次一片 | |
| (五) 沃度拏 Jodipin (10%) | 一瓶 |
| 上一日三次，每次一食匙 | |
| (六) 約達洛斯 Jodalose | 六〇滴 |

- | | |
|----------------------------|------|
| 亞砒酸鉀液 Liq Kali arsenicosum | 二〇〇 |
| 龍膽丁幾 Tinc Gentianae | 三〇〇 |
| 糖漿 Sirup simplex | 一〇〇〇 |
| 溜水 Aq dest | 一〇〇〇 |
| 上一日三次，每次一格，二日量 | |

(註) 脊髓炎多見於晚期梅毒。為不易根治之疾患。除主用上列藥劑等處方外。兼可用強壯劑，鎮痛劑，行對症治療。

(附) 脊髓癆注射藥

新洒爾佛散 Neo-Salvarsan，新銀洒爾佛散，Neosilber-salvarsan，腦絡惜花滅 Neurosyphamide，安妥碘 Entodon，亞歷佛耳 Alival，鉍是無倫 Wismulen，嘉色鈹 Cadis，新安立生 Neo-Olesal 等。

一〇 小兒急性脊髓前角炎方

詳見小兒科劑處方中。

一一 神經麻痺方

(一) 硝酸番木鱉鹼 Strychinin nitricum 1.0

哥羅方 Chloroform

一〇・〇

(三) 水楊酸鈉 *Nat Salicylicum*

三・〇

上調和為塗擦劑

上分三包，一日分服

(二) 精製樟腦 *Camphor depurata*

五・〇

(四) 加當 *Garden*

三片

酒精 *Alkohol*

五〇・〇

上一日三次各一片

上為局部塗擦劑

(五) 亞佗方片 *Atophan Tablets*

六片

(註)神經麻痺。除局部塗擦外。亦須究其原因而謀根治。例如風溼性者用發汗劑。梅毒性者用驅梅毒劑。此外溫浴，按摩，電氣療法，亦可兼用為輔助治療。

上一日三次各一片

(附)神經麻痺注射藥

(六) 海克蘇方片 *Hexophan*

六片

硝酸士的年 *Strychnin nitricum*。風濕性者可注射鹽酸必羅卡而賓 *Pilocarpin hydrochloricum*。梅毒性者可注射洒爾佛散 *Salvarsan* 等。

上一日三次，每次一片

一二一 神經痛方

(七) 息爾風 *Sinophan*

十二片

(一) 阿司必林 *Aspirin*

一・五

上一日三次，每次二片

(二) 薩里正林 *Salypirin*

三・〇

(八) 羅瓦而精規寧 *Novalein Quinine*

十二片

上分三包，一日分服

上塗擦於疼痛部，每日一二次

上分三包，一日分服

(九) 亞佗方軟膏 *Atophan Salbe*

一管

上為局部皮膏塗擦用

(十) 松節油 *Ol Terebinthinae*

一〇・〇

亞佗方耐耳 *Atophanyl*，美盧白靈 *Melubrin*，鹽

亞佗方耐耳 *Atophanyl*，美盧白靈 *Melubrin*，鹽

(附)神經痛注射藥

亞佗方耐耳 *Atophanyl*，美盧白靈 *Melubrin*，鹽

亞佗方耐耳 *Atophanyl*，美盧白靈 *Melubrin*，鹽

亞佗方耐耳 *Atophanyl*，美盧白靈 *Melubrin*，鹽

亞佗方耐耳 *Atophanyl*，美盧白靈 *Melubrin*，鹽

酸喜挪美仁 Sinomenine hydrochloride, 羅尼而

精 Novalgin, 撒而索格理茂 Salso Grelan, 阿

霹蕊 Apieur, 息爾風 Sinophan 等。

(註)神經痛亦有因營養障礙, 缺乏維他命 B 而起者。亦可試用維他命 B 製劑。例如培他生 Betaxin, 彼他比恩 Petabion, 樂乃維 Tenerva, 惟皮革新 Vixxin 等。此外按摩法, 溫浴法, 電氣療法。作為本症之輔助治療。亦有裨益。

一三三 頭痛及偏頭痛方

(一) 阿司必林 Aspirin 一·五

上分三包, 一日三次分服

(二) 密格來寧 Migrainin O·五—一·〇

上一次頓服

(三) 安替必林 Antipyrin 一·〇

咖啡鹼 Caffein O·一

上一次頓服

(四) 加當 Gardan 三片

上一日三次, 每次一片

(五) 阿卡奴 Arcanol 三片

上每日三次分服

(六) 新亞斯片 Sinasin 三片

上一日三次分服

(七) 司泰靈 Starin 三片

上一日三次分服

(八) 咖啡蜜拿 Cafeminal 三片

上一日三次分服

(九) 散利痛 Saridon 二片

上一次頓服

(十) 凡拉蒙 Veramon 一片

上一次頓服

(註)頭痛除通常應用上列處方外。倘係腦充血或梅毒性而起者。宜用溴素劑, 碘劑等。各按其因而施治療。

一四 神經炎方

(一) 冰囊 Eis Sack

上為局部罨包(急性神經炎)

(二) 水銀軟膏 Graue Quecksilberalbe 適量

上為局部塗布劑

(三) 安福消腫膏 Antiphlogistine 適量

上為局部塗布劑

(四) 亞佗方軟膏 Atophans Salbe 一管

上為局部塗擦劑，每日一二次

(五) 安替疋林 Antipyrin 二・〇

上分三包，一日三次分服

(六) 飛那西汀 Phenacetin 二・〇

上分三包，一日三次分服

(七) 亞佗方片 Atophan Tab. 三片

上一日三次分服

(八) 海克蘇方片 Hexophan Tab. 三片

上一日三次分服

(九) 息爾風 Sinophan 六片

上一日三次，每次二片

(十) 羅瓦而精規寧 Novalgin Quinine 六片

上一日三次各一片，二日分服

因營養障礙而起之多發性神經炎。宜用下列處方

(一) 彼他比恩片 Betabion Tab. 十二片

上每日三次，每次二片

(二) 秉乃維片 Benerva Tab. 十二片

上每日三次，每次二片

(三) 惟皮革新片 Vibixin Tab. 十二片

上每日三次，每次二片

(四) 維他新片 Vitasin Tab. 十二片

上每日三次，每次二片

(五) 維彼命片 Vibemint Tab. 十二片

上每日三次，每次二片

(六) 賜貝而仁片 Spelzon Tab. 十八片

上每日三次，每次二片

(註)神經炎亦有因近部炎症之波及而起者。宜用百浪多息 Pro-nestil 等殺菌消炎劑。此外更有所謂中毒性神經炎者。療法以除去其原因為最要。其他可內服碘劑，注射土的年 Strychnin 等。對於神經麻痺。可行硫黃浴，或按摩法，電氣療法等等。

(附)神經炎及多發性神經炎

注射藥

撒而素格理莨 Salso-Grelan · 邦鈣兒 Panca1 ·
 柳酸新亞鈣劑 Sahiso-Sinocalcin · 柳酸益壽鈣
 Salso-Isocalcium · 密歐安寧 Myotonin 等。
 培他生 Betaxin · 彼他比恩 Betabion · 秉乃維
 Benerva · 米太寶靈 Metabolin · 惟皮革新 Vib-
 ixin · 乙種維他命 Vitamin B · 維他新 Vitasin ·
 維彼命 Vibemin 等。

一五 癲癇方

- (一) 溴化鉀 Kali bromatum 100.0
 糖漿 Sirup simplex 100.0
 溜水 Aq dest 100.0
 上一日三次分服
- (二) 溴化鉀 Kali bromatum 2.0
 溴化鈉 Nat bromatum 2.0
 溴化鋁 Amm bromatum 2.0
 糖漿 Sirup simplex 100.0

- 溜水 Aq dest 100.0
 上一日三次分服
- (三) 盧蜜拿 Lumnal 1.5
 乳糖 Sacch lact 1.0
 上分三包，一日分服
- (四) 普蜜拿 Prominal 三片
 上一日三次各一片
- (五) 息癲那藥片 Sedinal Tablets 六片
 上一日三次各二片
- (六) 阿特癲 Adamon 六片
 上一日三次各二片
- (七) 字羅摩科耳 Bromcoll 100.0
 上分六包。每三小時服一包
- (八) 阿魏丁幾 Tine Asae foetidae 五.0
 纈草丁幾 Tine Valerianae 100.0
 上每日三次各二〇滴，放入糖水中服
- (九) 抱水格魯拉兒 Chloral hydratum 三.0
 溴化鋁 Amm. bromatum 三.0

糖漿 *Sirup simplex*

100.0

溜水 *Aq dest*

100.0

上 一日六次分服

(10) 抱水格魯拉兒 *Chloral hydratum*

2.0

溜水 *Aq dest*

50.0

上為灌腸料(發作頻數時用)

(附)癲癩注射藥

癩溴酸斯科伯拉民 *Scopolamine hydrobromide*,

硫酸阿忒羅品注射液 *Atropin sulphate*, 溴化鈣

注射液 *Solution Calcium bromide*, 盧密拿注射

液 *Luminal Solution*, 蔽腦湯 *Pernoclon*, 索

寐靈芬 *Sonnifen* 等。

一六 臟躁症方

(一) 溴化鉀 *Kali bromatum*

2.0

苦味丁幾 *Tine amara*

1.5

溜水 *Aq dest*

100.0

上 一日三次分服

(11) 三溴片 *Triple Brom Tablets*

十八片

上 每日三次, 每次二片

(3) 佛里耳 *Valyl*

六粒

上 每日三次, 每次一粒

(4) 色必波片 *Sedobrol Tablets*

六片

上 每日三次各一粒

(5) 佛里霜 *Valisan*

六粒

上 每日三次各一粒

(6) 補益顯草神經片 *Compretten mixtura*

nervinacum Valerianae

六片

上 每日三次各一片

(7) 鈕羅立須 *Neurolixir "Miller"* 100.0

上 每日三次, 每次一至二茶匙

(附)臟躁症注射藥

溴化鈣注射液 *Solution Calcium bromide*, 葡羅

納脫林 *Bronatrin*, 溴格里莖 *Brom-Grelan*, 普

羅卡林 *Brocalin*, 補美心 *Bromagsin* 等。

一七 神經衰弱方

- (一) 亞砒酸鉀液 Iiq. Kali arsenicosi 10.0
複方規寧丁幾 Tine china comp. 10.0
上每日三次各五滴，和水服下，漸次增
加至十五滴
- (二) 亞砒酸 Acid arsenicosum 0.1
乳酸鐵 Ferri lactcum 10.0
甘草末及膏 Pulv. et. Succus liquoritiae 各適量
- (三) 鐵質非亭液 Ferrophytin liq. 一瓶
上每日三次，每次一茶匙
- (四) 羅氏大補汁 Tonic "Roche" 一瓶
上每日三次，每次一或二茶匙
- (五) 彌太通 Metatone 一瓶
上每日三次，每次一茶匙
- (六) 納綠吐福 Neurotrophol 一瓶

上每日二次，每次食後二茶匙

(七) 先靈大補藥 Fo. tamin "S. hering" 一瓶
上每日三次，每次一食匙

(八) 惟斯可內服液 Visco-Serum "Bivarble" 十支
上每日二次，每食前一次各一支，和入
糖水中服

糖水中服

(九) 信石化露多時 Arsenoferrulose 二〇片
上每日三次，每次一片

(10) 補使命片 Phosmin Tab. 二〇片
上每日三次，每次二片

(註)其他處方，參閱強壯劑。此外精神症狀興奮時。亦宜兼用
溴素等鎮靜劑。

(附)神經衰弱注射藥

愛斯法 Esfar, 托拿福賜芬 Tonophosphan, 福
斯補爾命 Fosfo-Plasma, 甘油燐酸鐵 Glycer-
phosphate of Iron 奧拍泰純 Oparson, 所拉純
Solarson, 補爾神 Blusen, 惟斯可血清 Visco-
Serum, 英海普登 Inhepton, 補使命 Phosmin.

賜保命 Spermin 等。(其他參閱補身注射藥)

一八 暈船症方

- (一) 泛船拿 Vasaro 二片
上一日頓服
- (二) 三溴片 Triple Brom Tab. 二片
上一日頓服
- (三) 色多波片 Sedobrol 二片
上溶於熱水中，一日頓服
- (四) 阿特蒙 Adamon 一片
上於發作時頓服
- (五) 索寐靈芬 Somnifen 二〇滴
上於發作時放入糖水中頓服

(註)其他處方，參閱鎮靜劑。

F 血液病

一 貧血方

(一) 林搗鐵丁幾 Tine Ferri pomati 三・〇

臨床經驗處方

一三九

-
- 橙皮糖漿 S. Auranti corticis 1〇・〇
 - 溜水 Aq dest 1〇〇・〇
 - 上每日三次，二日量
 - (二) 林搗鐵丁幾 Tine Ferri pomati 三・〇
 - 亞砒酸鐵液 Liq Kali arsenicosi 1・〇
 - 蘆薈丁幾 Tine Aloe 三・〇
 - 橙皮糖漿 Sirup auranti corticis 1〇・〇
 - 溜水 Aq dest 1〇〇・〇
 - 上每日三次，每次一格，二日分服
 - (三) 亞砒酸鉀液 Liq Kali Arsenicosi 1〇・〇
 - 複方規寧丁幾 Tine China comp. 1〇・〇
 - 上每日三次各五滴，和水服下，漸次增加至十五滴
 - (四) 林搗鐵丁幾 Tine Ferri pomati 二〇・〇
 - 大黃丁幾 Tine Rhei 二〇・〇
 - 上每日三次，每服二十滴
 - (五) 硫酸鐵 Ferri sulfuricum 五・〇
 - 龍膽末 Pulv Gentianae 1・〇

臨床經驗處方

一四〇

甘草根末 Pulv. Lignitiae	適量	(三)	砒鐵補血汁 Arsen-Ferrin	一瓶
糖漿 S. S.	適量	(三)	鐵質菲亭液 Ferrophytin Liq.	一瓶
上爲九五十粒，一日三次各二粒		(三)	上每次三次，每次食後一食匙	
(六) 乳酸鐵 Ferri lacticum	二・〇	(四)	保利他民 Liq. Polytamin	一瓶
上分六包。一日三次各一包，二日量		(四)	上每日三次，每次二茶匙	
(七) 還元鐵 Ferri reductum	一・五	(五)	康巴飛樂 Campoferron	一瓶
鹽酸規寧 Chinin hydrochloricum	一・五	(五)	上每日三次，每次一茶匙	
龍膽膏 Ext. Gentianae scabrae	適宜	(六)	力弗肝流膏 Livex Ext.	一瓶
上爲三十九。一日三次，每服一丸		(六)	上每日三次，每次一食匙	
(八) 羅氏大補汁 Tonic "Roche"	一瓶	(七)	敏狄納思糖漿 Sirup Minalex	一瓶
上每日三次，每次二茶匙		(七)	上每日三次，每次一茶匙	
(九) 惟斯可內服液 Visco-Serum "Buvable" 十支		(八)	福克沙 Torxol	一瓶
上每日二次，每食前一次各一支，和糖		(八)	上每日三次，每次食後一茶匙	
入水中內服		(九)	伯勞氏鐵丸 Plausche Pills	十二粒
(十) 奧補多甯 Opotonic	一瓶	(九)	上每日三次，每次二粒	
上每日三次，每次二食匙		(十)	蘆薈鐵丸 Pilulae Aloe et Ferri	三〇粒
(二) 馬力多 Myeladol	一瓶	(十)	上每日三次，每次一食匙	

(三) 愛血靈 Arsylen 三〇粒

上每日三次，每食後一粒

(三) 信石化露多時 Arsenoferratose 一管

上每日三次，每次一片

(三) 得力補丹片 Tryptan Tab. 十八片

上每日三次，每次二片

(三) 血補肝精膠囊 Hepatonia Cap. 三〇個

上每日三次，每次二個

(三) 利凡命片 Livemin Tab. 五十片

上每日三次，每次五片

(附)貧血注射藥

奧拍泰純 Optarson，所拉純 Solarson，錢福丁

補針 Tonikaine Chavrelin，惟斯可血清 Visco-

Serum，英海普登 Inhepton，肝補儂(即康巴隆)

Camplon，海普拉克登 Hepracton，愛伯蒙 He-

parnone，利凡命 Livemin，新力活肝 Neo-

Levex，血肝補精 Hepatonia，等。(其他參閱補

壯劑注射新藥)。

一 萎黃病方

萎黃病除可用「鐵劑」，或「肝膏製劑」，參照貧血症治療外。兼宜採用卵巢製劑。處方舉例如下。

(一) 保女榮 Progynon 二〇粒

上每日三次，每次一粒

(二) 溫敦 Uden 十五粒

上每日三次，每次一粒

(三) 愛的依文 Anteoivin 一〇片

上每日三次，每次一片

(四) 奧佛辯蘭杜 Oroglandol 一〇片

上每日三次，每次一片

(五) 好美滿汁 Homova 十八片

上每日三次，每次二片

(六) 嫻閱好萌 Oyahornon 十八片

上每日三次，每次二片

(七) 阿葛滿新 Agomensin 十八片

上每日三次，各二片

(註)本病注射藥。可用砒劑，肝膏劑及卵巢劑等注射液(參閱強壯劑及婦科劑)。

三 白血病方

本症治療。亦與慢性貧血同，處方參閱強壯劑。

四 紫斑病方

(1) 規那皮煎 Decoct Cortex China

(110.0)100.0

稀鹽酸 Acid hydrochloric diluti 1.0

糖漿 Sirup simplex 10.0

上每日三次，二日分服

(11) 麥角膏 Ext Secalis cornuti 1.0

阿片末 Pulv Opium 0.1

白糖 Sacch alba 11.0

上為五包，每三時服：包

(11) 斯錫普錫輕片 Stypticin Tab.

六片

上每日三次，每次二片

(四) 奧保司太丁片 Opostatin Tab. 十八片

上每日三次，每次三片

(註)本症除可用止血劑。亦宜兼用維他命C製劑。參閱壞血病處方。

五 壞血病方

(1) 枸橼酸 Acid citricum 2.0

糖漿 Sirup simplex 10.0

溜水 Ap dest 180.0

上一日數次，二日分服

(11) 複方規寧丁幾 Tine china comp 30.0

橙皮丁幾 Tine auranti 10.0

上一日三次，每次一食匙

(11) 康泰 Cantan 六片

上每日三次，每次一片

(11) 力度伸 Redoxin 六片

上每日三次，每次一片

西比恩 Cebion

六片

上每日三次，每次一片

維他命 Vicemin

六片

上每日三次，每次一片

西他新 Citasin Tab.

六片

上每日三次，每次一片

富爾生命 Furamin

十二片

上每日三次，每次二片

(註)壞血病發生之齒齦炎。可用氯化鉀液，或福美明達，勞弗拉文錠，愛惜夫拉文片等含嗽(參閱咽喉劑處方)。對皮膚出血。可用白阿膠注射液 Gelatin Solution，可阿古連 Coagulen 等(參閱止血劑)。

(附)壞血病注射藥

泰康 Cantan，西比恩 Cebion，力度伸 Redo-

xon，富爾生命 Furamin，西他新 Citasin，維斯

命 Vicemin。

六 血友病方

有血友病嫌疑時。宜常用強壯劑及營養劑(例如砒鐵劑及維他命C製劑等，處方見前)。以圖預防。既發本症時。可用麥角，氯化鈣，白阿膠，可阿可連，鹽化腎上腺液，斯鐸普錫輕，克羅甸，孟納妥爾等。參閱止血劑處方。

F 新陳代謝病

一 糖尿病方

(一) 阿片膏 Ext Opium 〇・〇五

莨菪膏 Ext Scopolia 〇・〇二

乳糖 Sacch lact 〇・三

上為一包，每日三次各一包

(二) 阿片末 Pulv. Opium 1・〇

甘草膏 Succus Iquiritiae 適量

上為二十九，每日三次各一九

(三) 阿片末 Pulv Opium 〇・〇三

重碳酸鈉 Nat bicarbonicum 〇・五

(四) 新蘇林 Synthalin
上為一包，每日三包
六片

(五) 新蘇林 B Synthalin B
上每日二次，每次一片
九片

(六) 因蘇林內服藥片 Insulin Tab.
上每日三次各一片
十二片

(七) 飲服靈片 Inverin Tab.
上每日三次各二片
十二片

〔註〕糖尿病有昏睡症狀時。宜用大量炭酸鈉內服（一日可用五〇克）或注射生理食鹽水。此外本病注意食餌療法（即限制含水炭素類之攝食）。極關重要。

(附) 糖尿病注射藥

因蘇林 Insulin

二 尿崩症方

(一) 纈草丁幾 Tinc Valerianae 110.0

上每日三次各二〇滴，放入溫水中內服

(二) 醇製纈草膏 Ext Valerianae alcoholicum 3.0

甘草膏 Ext Succi liquoritiae 適宜

上為三十九，每日三次各二丸

(三) 阿片末 Pulv Opium 0.3

重碳酸鈉 Nat bicarbonicum 3.0

上為六包，每日三次各一包

(四) 麥角膏 Ext Secalis cornuti 1.0

甘草膏及末 Ext et pulv. Succi liquoritiae 適量

上為二十九，每日三次各二粒

(五) 三溴片 Triple Brom Tablets 十二片

上每日三次，每次二片

(六) 溴化鉀 Kali bromatum 1.5

纈草丁幾 Tinc Valerianae 1.0

糖漿 Sirup simplex 100.0

溜水 Aq dest 100.0

上每日三次分服，每次二格

(附)尿崩症注射藥

安提愛奴來新 Antidiuresin

三 肥胖病方

(一) 人工加爾斯泉鹽 *Sal carolinum factitium*

一五・〇

上溶於溫水中頓服

(二) 硫酸鎂 *Mag. sulfuricum*

一〇・〇

上溶於溫水中頓服

(三) 大黃浸 *Inf. Radix Rhei*

(六・〇) 一八〇・〇

重碳酸鈉 *Nat bicarbonicum*

六・〇

薄荷油 *Ol Menthae*

四滴

糖漿 *Sirup simplex*

二〇・〇

上一日三次，每次一食匙

〔註〕肥胖病應用瀉下劑。僅能奏小效於一時。不能認爲根治之良法。須從生理原則。變更其日常生活方法。即禁止過食，除每日八小時睡眠外。不得晝寢。此外更宜節制攝食脂肪食品及

酒類。勵行適當之戶外運動。

(附)肥胖病注射藥

體落瘦 *Thyroxin*・利肝離生 *Li polysin*・希伯色曼 *Hypertennan*。

四 痛風(尿酸性關節炎)方

(一) 水揚酸鈉 *Nat Salicylicum* 三・〇

上分三包・一日三次分服

(二) 亞佗方片 *Atophan Tab.* 六片

上每日三次，每次一片

(三) 海克蘇方片 *Hexophan Tablets* 六片

上每日三次，每次一片

(三) 息爾風 *Sinophan* 十二片

上每日三次，每次二片

(四) 羅瓦而精規寧 *Novalgin Quinine* 十二片

上每日三次，每次二片

(五) 碘化鉀 *Kali Jodatum* 一・〇

碘 *Jodium* 〇・一

凡士林 Vaselin

110.0

上為軟膏，塗擦患部

(六) 伊克度軟膏 Ung. Ichtyol

適量

上為患部塗布劑

(七) 安福消腫膏 Anti-phlogisticin

適量

上為患部塗布劑

(八) 亞佗方軟膏 Atophansalbe

一管

上為患部塗布用

痛風發作後。欲圖預防其再發。除節減肉食，禁止酒類外。宜內服烏羅透賓或鹼性藥劑。以促尿酸之溶解與排泄。處方如下。

(九) 碳酸鎂 Mag. carbonicum

六.0

重碳酸鈉 Nat. bicarbonicum

六.0

糖漿 Sirup simplex

100.0

溜水 Aq. dest.

200.0

上一日三次，二日分服

(10) 碳酸鉀 Kali carbonicum

三.0

白糖 Sacch. alba

1.0

上分三包，一日三次分服

(11) 透維透賓片 Urotropin Tab.

十二片

上每日三次各二片

〔註〕慢性痛風宜內服碘化鉀。

(附) 痛風注射藥

亞佗方耐耳 Atophanyl, 美盧白靈 Melubrin, 烏爾風 Sinophan 水揚酸鈉 Sodium Salicylate 等。

五 關節及肌肉僵麻質斯(即

風溼症)方

(註)本症內服藥品。亦以水揚酸鈉，薩里正林，亞佗方，海克蘇方，息爾風，羅瓦而精規寧等為最有效。可參閱神經痛及痛風處方。

本症局部處置。急性症可用冷罨法，或其他消炎外用藥。慢性症宜行溫罨法，或按摩法

(附) 關節及肌肉僵麻質斯注射藥

亞佗方耐耳 Atophanyl · 美盧白靈 Melubrin · 息爾風 Sinophan · 鹽酸喜挪美仁 Sinomenin · 羅瓦而精 Novalgin · 撒而索格理莨 Salso-Grelan · 柳酸益壽鈣 Salso-Isocalcium · 阿霹寇 Apicour · 蜜歐妥寧 Myotonin 等。

六 脚氣病方

- (一) 毛地黃丁幾 Tine Digitalis 三・〇
 醋酸鉀 Kali aceticum 四・〇
 糖漿 Sirup simplex 一〇・〇
 溜水 Aq deest 一〇〇・〇
- 上每日三次，二日分服
- (二) 人工加爾斯泉鹽 Sal carolinum factitium 一五・〇
- 上每朝頓服
- (三) 彼他比恩片 Betabion Tab. 二〇片
- 上每日三次，每次二片
- (四) 秉乃維片 Benerva Tab. 二〇片

臨床經驗處方

一四七

(五) 維他新片 Vitasin Tab. 十八片
 上每日三次，每次二片

(六) 維彼命片 Vibemim Tab. 十八片
 上每日三次，每次二片

(七) 惟皮革新粉劑 Vibixin Pulv. 六・〇
 上分六包，一日三次各一包

(八) 賜貝而仁粉劑 Spelzon pulv. 六・〇
 上分六包，一日三次各一包

(附)脚氣病注射藥

阿利攀 Orypan · 乙種維他命 Vitamin B · 巴拉努
 妥林 Paranutrin · 彼他比恩 Betabion · 秉乃維
 Benerva · 培他生 Relaxin · 惟皮革新 Vibixin ·
 維他新 Vitasin · 維彼命 Vibemim · 新派拉努安
 林 Neo-Paranutrin 。

七 佝僂病方

(註)詳見小兒科劑處方中。

八 骨軟化症方

- (一) 燐 Phosphor 〇・〇・一
肝油 Ol jecoris 一〇〇・〇
上每日三次，每次一食匙
- (二) 沉降磷酸鈣 Calcium phosphor praecipitatum 〇・〇・五
白糖 Sacch alba 〇・〇・五
上為一包，與等量十包一日三次各一包
- (三) 乳酸鐵 Ferri lact 〇・〇・五
白糖 Sacch alba 〇・〇・五
上為一包，與等量十包一日三次各一包
- (四) 鐵質菲亭 Ferrophytin 一瓶
上每日三次，每次一茶匙
- (五) 康寧 Candolin 二〇片
上每日三次，每次一片
- (六) 維剛妥丸 Vigantol 十二粒
上每日三次，每次一粒
- (七) 鈣美仁補片 Calmimellen "Engelheim" 十二片

上每日三次，每次二片

〔註〕骨軟化症。因骨組織內缺乏石灰分而起。故注射藥以鈣製劑為適宜。例如三鈣劑注射液 Tricalcium, 葡萄糖鈣 Gluconcalcium, 氯化鈣 Calcium Chloride, 山德士鈣 Calcium "Sandoz", 新亞鈣劑 Sino-calcin 等。

G 內分泌腺病

一 粘液水腫及拔塞多氏病方

- (一) 替雷烏伊丁 Thyreoidin 十二片
上每日三次，每次一片
 - (二) 替雷烏伊兌西丁 Thyreoidectin 二・〇
乳糖 Sacch lact 一・〇
上分六包，二日分服
 - (三) 益利特靈 Elixiran 九片
上一日三次，每次一片，逐漸可增至每服二三片
- 〔註〕拔塞多氏病。除用上列處方外。亦可內服溴素劑及碘劑。(例如碘化鉀，亞歷佛耳，洒乍錠，約達洛斯，喬託碘，安度沃，碘斯推靈等)。

(附) 粘液水腫及拔塞多氏病注

射藥

甲狀腺注射液 Thyreoid

安妥碘 Iododon · 亞歷佛耳 Alival · 約達山布丁 Jodaseptine · 喬託碘 Jotodin 等。

二 阿狄松氏病方

(註) 本症以注射腎上腺液為最效。內服藥可用強壯劑。此外維他命 C 製劑亦可應用。處方參閱壞血病。

三 糖尿病及尿崩症方

詳見於上章新陳代謝病中。

第三章 小兒科劑處方

一 鵝口瘡方

(1) 硼砂 Borax

1.00 (七) 1.00

甘油 Glycerin 15.00

上為局部塗布

(二) 硝酸銀 Argent nitricum 0.1

溜水 Aq dect 10.00

上為局部塗布劑

(三) 0.1% 脫呂帕弗拉文液 Liq. Trypflavine (0.1%) 10.00

上為塗布劑

(四) 雷沙而辛 Resorcin 0.5

溜水 Aq dest 100.00

上每兩小時服一小兒匙 (細菌已蔓延至

食管時用)

(五) 2% 硼酸水 Acid Boric(2%) 1100.00

上為口腔洗滌劑

(六) 1.0% 過酸化水素 Hydrogenium peroxy-

dat(10%) 1100.00

上為口腔洗滌劑

1.0% 皮育他寧 Pyoklammin(2%) 100.00

臨床經驗處方

一五〇

上爲口腔洗滌劑

〔註〕年齡較大之小兒。可用福美明達 Formamin，勞弗拉文錠 Panflavin Tablets，愛惜夫拉文片 Aciflavin Tablets 等含嗽。較爲便利。處方見咽喉科劑章中。

二 水癌方

詳見外科劑章中。

三 生齒困難方

(一) 肥太特 Detavit 一瓶

上每日三次，每次一茶匙

(二) 維剛妥 Vigantol 十二粒

上每日二三次，每次一粒

(三) 溴化鉀 Kali bromatum 〇・五—一・〇

糖漿 Syrup simplex 五・〇

溜水 Aq dest 六〇〇・〇

上每日三時服一茶匙(啼哭不眠時用)

四 小兒消化不良及吐瀉方

(一) 甘汞 Calomel 〇・〇二—〇・〇五

白糖 Sacch alba 〇・三

上爲一包，給等量六包，每二時一包

(二) 表飛鳴 Biofermin 一・五

上分三包，一日三次分服

(三) 保爾泰素 Biolactase 一・五

上分三包，一日三次分服

(四) 小兒散(苦土大黃散) Pulv. Infantum 一・五

上分三包，一日分服

(五) 普羅太米 Protamylase 〇・三

乳糖 Sacch lact 一・〇

上分一包，一日分服

(六) 阿開司多 Arcastol 五—一〇・〇

上一次頓服

(七) 阿加路 Agarol 一茶匙

上一次頓服

(八) 雷沙而辛 Resorcin 〇・五—1・〇

苦味丁幾 Tinc amara 1・〇

卡力伯液 Liq. Calipeptic 1・5

糖漿 Sirup simplex 1・〇

溜水 Aq dest 1・〇

上每日三次分服

(九) 大黃根浸 Inf. Radix Rhei (1・〇)

1・〇

重曹 Nat bicarbonicum 3・〇

糖漿 Sirup simplex 1・〇

上每日三次，每次一小兒匙

(10) 亞力山丁 Allisatin 三粒

上每日三次，每次半粒

(11) 拉勞山 Larosan 二〇〇

牛奶 Kuhmilch 100

上混和一日三次分服，臨飲再加水稀釋

(12) 超炭 Ultracarbon 1・〇

上分三包，一日分服

(13) 病根寧 Biogenin 〇・六

乳糖 Sacch lact 〇・六

上分三包，一日三次分服

(14) 矽鋁康 Silical 一・五

上分三包，一日三次分服

(15) 矽炭銀 Agsicol 三片

上每日三次，每次半片

(16) 百哥消片 Pepsosal 三片

上每日三次，每次半片

(17) 單乃並 Tannalbin 1・〇

上分三包，一日分服(大便通暢後可用)

(18) 佗浮氏散 Pulv Doveri 〇・三

乳糖 Sacch lact 1・〇

上分三包，一日分服(同上)

五 遺尿症方

(1) 萸蓉膏 Ext Scopolia 〇・〇1

白糖 Sacch alba 〇・三

上為一包，每臨寢前頓服

(二) 溴化鉀 *Kali bromatum*

苦味丁糖 *Tine amara*

糖漿 *Sirup simplex*

溜水 *Aq dest*

上一日三次分服

(三) 盧蒲林 *Lupulin*

白糖 *Sacch alba*

上為十包，朝夕各一包

(附)遺尿症注射藥

硝酸士的年 *Styeyminin nitricum* · 安提愛奴來新

Antihuresin。

六 小兒急癩方

(一) 溴化鉀 *Kali bromatum*

溴化鈣 *Amn. bromatum*

糖漿 *Sirup simplex*

溜水 *Aq dest*

上每日三次各一食匙

(二) 抱水格魯拉兒 *Chloral hydratum*

溴化鉀 *Amn. bromatum*

糖漿 *Sirup simplex*

溜水 *Aq dest*

上每半小時服一小兒匙

(三) 午雷坦 *Urethan*

上為一包，溶於糖水中頓服

(四) 盧密拿 *Luminal*

乳糖 *Sacch lacticum*

上分三包，一日三次分服

(五) 色多波片 *Sedobrol*

上一日三次各半片

(六) 哥羅方 *Chloroform*

上為吸入劑

(七) 抱水格魯拉兒 *Chloral hydratum*

溜水 *Aq dest*

上為灌腸劑

1 · 0 · 0

1 · 0 · 0

1 · 0 · 0

100 · 0 · 0

0 · 5

1 · 0 · 0

1 · 0 · 0

100 · 0 · 0

0 · 3

0 · 3

1 · 0 · 0

一片半

5 · 0 · 1

0 · 2 · 5

50 · 0 · 0

〔註〕小兒急癩屢屢發作者。可於發作後配服溴化鉀製劑。大便不利者用腸消毒劑。

〔附〕小兒急癩注射藥

硫酸阿忒羅品 Atropin sulphate，溴化鈣注射液
Solution calcium bromide，硫酸鎂注射液 Magsol-
nesium sulphate，鎂固素靈 Magsolin，麻苦部
龍 Magbron，溴格里貫 Brom-Grelan 等。

七 腦性痙攣性小兒麻痺方

本症除內服腸消毒劑或瀉下劑外。鎮靜劑亦為常用。可參閱小兒急癩處方。此外倘遺留下肢麻痺，強直，拘攣等。則可行按摩，水治，或電氣等為輔助療法。

八 夜驚症及夜啼症方

(1) 三溴片 Triple Brom Tablets 二片

上以一片溶於溫水中，臨睡前頓服

(11) 阿特蒙 Adamon 半至一片

上溶於溫水中，臨睡前頓服

臨床經驗處方

一五三

(三) 色多波片 Sedobrol Tab. 半至一片

上溶於溫水中，臨睡前頓服

(四) 鈕羅立須 Neurolixin 一茶匙

上溶於溫水中，臨睡服

(五) 索睦那兒 Somnal 〇・一

乳糖 Sacch lact 〇・二

上於臨睡前頓服

〔註〕其他處方可參閱鎮靜劑。

九 小兒舞蹈病方

本症無特效藥。不外用砒鐵等強壯劑，溴素等鎮靜劑，安替正林等解熱劑。此外保守安靜。兼行水浴，冷水摩擦，電氣療法等為輔助治療。

一〇 佝僂病及胎生性軟骨

萎縮症方

(1) 磷 Phosphor 〇・〇〇五

肝油 Oil jeoritis 一〇〇・〇

一五三

臨床經驗處方

一五四

- | | | | |
|------|---|------------------------------|--------------|
| (一) | 康寧 Cantholin | 上每日三次，每次一茶匙 | 一〇片 |
| (二) | 乳酸鐵 Ferri lacticum | 上每日三次，每次半至一片 | 一・五 |
| (三) | 乳糖 Sacch lact | 上為十包，一日三次各一包 | 一・五 |
| (四) | 碘化鐵糖漿 Sirup Ferri jodat
糖漿 Sirup simplex | 上每日三次，每次十至十五滴 | 一五・〇
一五・〇 |
| (五) | 沉降磷酸鈣 Calcium phosphor
praecipitatum | | 〇・一 |
| | 乳酸鐵 Ferri pomati | | 〇・一 |
| | 白糖 Sacch alba | 上為一包，一日三次各一包 | 〇・三 |
| (六) | 維剛妥丸 Vigantol Pill | 上每日二次，每次一粒 | 一〇粒 |
| (七) | 海力補 B 丸 Halibol B | 上每日二次，每次一粒 | 一〇粒 |
| (八) | 蘇伯第液 Super D | 上每日三次，每次半茶匙 | 一瓶 |
| (九) | 甘油奧斯得靈 Ostein Liq. | 上每日三次，每次二三滴，混於牛乳或
溫水中服 | 一瓶 |
| (一〇) | 海力補橘子汁 Haliborange | 上每日二次，每次一至二茶匙 | 一瓶 |
| (一一) | 好力生 Halisan | 上每日一次，每次五至一〇滴，溶於牛
乳或肝油中內服 | 一瓶 |
| (一二) | 安特所靈膠囊 Adexolin Cap. | 上每日一次，每次一個 | 一〇粒 |
| (一三) | 鈣美仁補片 Calcimellen "Ingelheim" | 上每日三次，每次半至一片 | 十片 |

一 腺病・結核・貧血及

虛弱慢性病方

(一)	魚肝油 <i>Oil Jecoris</i>	一瓶	(八)	好力生藥液 <i>Halsum</i>	一瓶
	上每日三次，每次一茶匙			上每日三次，每次二三滴，滴於溫水或牛乳中服	
(二)	乳酸鐵 <i>Ferri Lacticum</i>	一·五	(九)	海力補橘子汁 <i>Halit orange</i>	一瓶
	乳糖 <i>Sacch lact</i>	一·五		上每日二次，每次一至二茶匙	
	上為十包，一日三次各一包		(十)	羅氏大補汁 <i>Tonic "Roche"</i>	一瓶
(三)	碘化鐵 <i>Sirup Ferri iodat</i>	一五·〇		上每日三次，每次一或二西西，和入溫水內服	
	糖漿 <i>Sirup simplex</i>	一五·〇			
	上一日三次，每次一〇至十五滴		(一)	馬力多 <i>Myeladol</i>	一瓶
(四)	沃度化露多時 <i>Jodferatose</i>	一〇片		上每日三次，每次一茶匙	
	上一日三次，每次半片		(二)	福施命 <i>Fortamin "Schering"</i>	一瓶
(五)	安特所靈膠囊 <i>Adexolin Cap.</i>	一〇粒		上每日三次，每次二茶匙	
	上每日一次，每次一個		(三)	敏狄納思糖漿 <i>Sirup Minalex</i>	一瓶
(六)	甘油奧斯得靈 <i>Ostelin Liq.</i>	一瓶		上每日三次，每次半至一茶匙	
	上每日三次，每次二三滴，混於牛乳或溫水中服		(四)	奧補多寧 <i>O potonic</i>	一瓶
(七)	復康 <i>Vogan Liq.</i>	一瓶		上每日三次，每次一茶匙	
	上每日三次，每次二三滴，入溫水或牛奶中內服		(五)	力弗肝流膏 <i>Livex Ext. Liq.</i>	一瓶
				上每日三次，每次一茶匙	

臨床經驗處方

臨床經驗處方

一五六

(六) 鐵補血汁 *Tod-Ferrin* 一瓶

上每日三次，每次一茶匙

〔註〕其他處方，參閱強壯劑。

一一 腦水腫方

急性症用冰罨法，冷水灌漑法，灌腸法等。或行脊髓液排除手術(3.5—10c.c.)。慢性者多由佝僂病或遺傳梅毒而起。宜究其原因而處置。參閱營養劑及驅梅毒處方。

一二 百日咳方

(一) 歐規寧 *Euchinin* 〇・五

上為三包，一日三次分服

(二) 阿里斯多與 *Aristochin* 一・〇

上分三包，一日三次各一包，溶化於熱

水中服

(三) 勃隆仿謨 *Bromoforn* 二一四滴

上加入乳中飲服，一日三次

(四) 福羅而仿水 *Solutio Fluoroforn* 三〇・〇

上為每日三次，每次半至一茶匙

(五) 配安辛 *Pertussin* 三〇・〇

上每日三次，每次一茶匙

(六) 氯化鉀 *Kali bromat* 〇・五

糖漿 *Simp simplex* 五・〇

溜水 *Aq dest* 一〇〇・〇

上每日三次，每次一小兒匙

(七) 磷酸科亭 *Codin phosphor* 〇・〇二

杏仁水 *Aq Laurocerac* 一〇・〇

上每日三次，每次十五滴至二十滴

(八) 莨菪末 *Pulv Scopolia* 〇・一

白糖 *Saccharum* 五・〇

上分十包，一日三次各一包

〔註〕第(七)(八)處方，為麻醉性藥品。小兒應用。宜特別慎

重。

(附)百日咳注射藥

必退癩 *Petain*・飛散特靈 *Phystatin*・百日咳漿

苗 *Pertussis Vaccine*・伊打吐辛 *Ethertussin*。

(百日咳灌腸液)得福兒 Thelcol。

一四 腸寄生蟲方

(一) 綿馬膏 Ext Filicis 二・〇

白糖 Sacch alba 二・〇

上研和為散劑。分成二份於晨間分服

〔註〕綿馬膏用量。一歲至二歲一次最多一・〇。五歲以內一次最多二・〇。

(二) 山道年 Santonin 〇・〇二

乳糖 Sacch lact 〇・二

上為一包，空腹時一次頓服

〔註〕山道年小兒之一次用量約述如下。

一至二歲 〇・〇〇四 三至四歲 〇・〇一

五至十歲 〇・〇二 十至十五歲 〇・〇三

(三) 蛔滅納 Helminal 三片

上每日三次，每次半片

(四) 布妥倫 Butalan 三片

上每日三次，每次半片

(五) 克痢殺螟藥液 Chrysemine Liq. 五〇滴

(六) 貝代明 Bedernin 一粒
上於晨間空腹時和入少許溫水頓服

〔註〕其他處方。參閱驅蟲劑。

(附)腸寄生蟲注射藥

妥拉司敏 Drasmin・山道年水 Santonisol 等。

一五 傷寒・發疹傷寒方

詳見傳染病劑處方中。(小兒依年齡酌減劑量)

一六 麻疹・痘瘡・水痘方

詳見傳染病劑處方中。(小兒依年齡酌減劑量)

一七 赤痢・瘧疾・流行性

感冒方

詳見耳鼻喉病劑處方中

一八 腦脊髓膜炎・破傷風方

詳見傳染病劑處方中。(小兒依年齡酌減劑量)

一九 白喉·丹毒方

詳見傳染病劑處方中。(小兒依年齡酌減劑量)

二〇 糖尿病·尿崩症方

詳見內科病劑處方中。(小兒依年齡酌減劑量)

二一 毛細氣管支炎·肺炎方

詳見內科病劑處方中。(小兒依年齡酌減劑量)

二二 肋膜炎·腎臟炎方

詳見內科病劑處方中。(小兒依年齡酌減劑量)

二三 拔塞多氏病·粘液水

腫方

詳見內科病劑處方中。(小兒依年齡酌減劑量)

二四 遺傳性梅毒方

詳見花柳病劑處方中。

二五 急性鼻炎及喉頭炎方

詳見眼科病劑處方中。

二六 結膜乾燥症(疳眼)

角膜軟化症·膿漏性結

膜炎方

詳見眼科病劑處方中。

二七 初生兒發熱方

細檢其發熱是否因疾病而起。如係一時性者。祇須用冷水蘸布片行纏絡法，液體缺乏時。用生理食鹽水 Kochsalzlösung 或林格兒氏液 Liq. Rigel 灌腸。

灌腸。

灌腸。

二八 初生兒黑吐症方

初生兒黑吐症方

注意營養及保溫法。注射鹽化腎上腺液 Adrenalin chloride，或白阿膠 Gelatin alba。有虛脫病狀時。宜用興奮劑。

三〇 初生兒剝脫性皮膚炎方

塗布防腐性軟膏。例如硼酸軟膏 Ung. Boricum，亞鉛華軟膏 Ung. Zinc 等。並注意患兒營養。

三一 初生兒鞏硬症方

以溫濕布包裹全身。或試行溫浴。或注射生理食鹽水於皮下。並行按摩法。

三二 初生兒假死方

行人工呼吸法，溫熱刺戟法，或酌用少量樂百齡 Lobelin，新亞樂彼利 Sinoloberi 等注射。

三三 臍出血方

撒布單寧酸 Acid Tannin 兼用壓迫綑帶。重症

臨床經驗處方

一五九

注射腎上腺液 Adrenalin 或可阿古連 Coagulant

三四 臍膿漏方

用硼酸粉 Acid Boricum，沃度仿 Jodoform，或代馬安耳 Dermatol 等撒布。

三五 臍瘻肉方

用硝酸銀 Argent nitricum 腐蝕後。撒布防腐劑。

三六 臍炎方

局部塗布伊克度軟膏 Ung. Ichtyol，或用醋酸鉛液 Liq. Plumbum aceticum 等行褱包法。

第四章 婦科劑處方

一 催進月經方（用於經少或

閉止）

(一) 蘆薈鐵丸 Pillulae Aloe et. Ferri 十八粒
上每日三次各二粒

臨床經驗處方

一六〇

- | | | | | |
|-----|--|---------|----------------------------|--------------------------------|
| (二) | 蘆薈 Alo ₃ | 1.0.0 | 寧坤水 Liguor Sedans | 110.0.0 |
| | 硫酸鐵 Ferri sulfuricum | 1.0.0 | 龍胆丁幾 Tinc Gentianae | 3.0.0 |
| | 上為丸二十粒，一日三次各一粒 | | 糖漿 Sirup simplex | 100.0.0 |
| (三) | 蘆薈丁幾 Tinc Alo ₃ | 3.0.0 | 溜水 Aq dest | 100.0.0 |
| | 亞砒酸鉀液 Liq. Kali arsenicosum | 1.0.0 | 上每日三次，二日分服 | |
| | 林搗鐵丁幾 Tinc Ferri pomati | 3.0.0 | (七) | 寒薺薇流膏 Ext Viburnum Prunifolium |
| | 橙皮糖漿 Sirup auranti corticis | 5.0.0 | Fluidum | 6.0.0 |
| | 溜水 Aq dest | 100.0.0 | 蘆薈丁幾 Tinc Alo ₃ | 6.0.0 |
| | 上每日三次，二日分服 | | 糖漿 Sirup simplex | 10.0.0 |
| (四) | 當歸兒 Tanenol | 12.0.0 | 溜水 Aq dest | 100.0.0 |
| | 苦味丁幾 Tinc amara | 1.5.0 | 上每日三次，二日分服 | |
| | 糖漿 Sirup simplex | 100.0.0 | (八) | 婦美素片 Omensal Tab. |
| | 溜水 Aq dest | 100.0.0 | 上每日三次，每次一片 | 12.0.0 |
| | 上每日三次分服 | | (九) | 健美露 Ginneror |
| (五) | 優美靈 Eumenol | 1.0.0 | 上每日三次，每次四至八西西，混於溫水中內服 | 1.0.0 |
| | 上每日三次各一茶匙 | | 水 | |
| (六) | 優露調經水 Elixir Viburnum prunifolium compound | 110.0.0 | (一) | 阿葛滿新 Agom ⁿ sin |
| | | | 一 强壯卵巢調經方 | 18.0.0 |

(一)	安婦靈 Oophorin	上每日三次各二片	十八片
(二)	安婦能 Ovarnon	上每日三次，每次一片	十二片
(三)	薩立僅 Therygan	上每日三次，每次二片	十八片
(四)	必吾懷兒 Biovar	上每日三次各二片	十八片
(五)	溫敦 Uden	上每日三次各二片	十五粒
(六)	保女榮 Prognon	上每日三次，每次一粒	二〇粒
(七)	愛的依文 Antevin	上每日三次，每次一粒	一〇片
(八)	奧佛荷蘭杜 Oroglandol	上每日三次，每次一片	一〇片
(九)	好美滿 Homova	上每日三次，每次一片	十八片
(十)			

(一)	奧佛百卵 Ovobol	上每日三次，每次二片	十八片
(二)	嫻闊好萌 Orahormon	上每日三次，每次二片	十八片
(三)	百樂寧 Pelania	上每日三次，每次一片	十二片
(四)	女用多價腺體製劑 Pluriglandular	上每日三次，每次二片	三〇片
(五)	母得宜 Crino Menstryl	上每日三次，每次二片	一瓶
(六)	女用虎猛精 Hormongen F	上每日三次，每次二片，連服二星期	三〇片

(附) 強壯卵巢及催進月經注射劑

卵巢注射液 Ovosan，阿葛滿新 Agomensin，保女榮 Prognon，補奴郎 Prolan，歐歐福林 Oophorin，溫敦注射液 Uden，胎盤注射液 Placentine 安度卵巢精 Endo Ovarina，姬宜克倫

Gineplan, 福太農 Fontanon "Feminin", 愛的
 依文 Anteoivin, 奧佛辯蘭杜 Ova glandol, 好
 美滿 Humova, 婦萬靈 Ovarin, 百樂寧 Pelamin
 , 炯閱好萌 Oyalhornen, 婦力蒙 Follimon,
 女用多價腺體製劑 Pluriglandular F, 婦萬多年
 Ovarionie, 女用虎猛精 Hormongen。

三 痛經(經來腹痛)方

- (一) 安替疋林 Antipyrin 〇・五
 乳糖 Sacch Lact 〇・五
 上為一包, 與等量三包, 一日分服
- (二) 飛那西汀 Pfenacetin 〇・五
 乳糖 Sacch Lact 〇・五
 上為一包, 與等量三包, 一日分服
- (三) 溴化鉀 Kali Bromat 六・〇
 安替疋林 Antipyrin 四・〇
 寒薺微流膏 Ext. Viburnum Prunifolium
 Fluidum 一〇・〇

- 白蘭地酒 Congnac 二〇・〇
 橙皮糖漿 Sirup auranti corticis 一〇・〇
 溜水 Aq dast 六〇・〇
 上每日三次各一食匙
- (四) 印度大麻膏 Ext Cannabis Indicae 〇・三
 上為十包, 每三時服一包
- (五) 凡拉蒙 Veramon 二片
 上朝夕一次各一片
- (六) 痛必靈 Tonbelin 三片
 上每日三次各一片
- (七) 康普樂 Compral 三片
 上一日三次分服
- (八) 阿片丁幾 Tine Opium 一〇・〇
 冀丁若幾 Tine Scopoia 一〇・〇
 庶斯丁幾 Tine Hyoseyami 一〇・〇
 續草丁幾 Tine Valerianae 一〇・〇
 上每日三四次各二十滴
- (九) 寧坤水 Liq Sedans 三〇・〇

糖漿 *Sirup simplex*

二〇・〇

上每日三次各二茶匙

(10) 安濟室悶 *Andysmen*

三〇〇片

上每日三次，每次三片，於月經前三日
至一星期開始內服

(11) 鎮痙汽巴兒勁 *Spasmo-Cibalgin*

六片

上每日三次，每次一片

(12) 斯潑斯曼爾琴 *Drasmalgine*

二片

上每日二次各一片

(13) 優巴科 *Eupaco*

二片

上分二次各一片

(附)痛經注射藥

鹽酸嗎啡 *Morphine hydrochloride*・鹽酸海洛

因 *Heroin hydrochloride*・台歐寧 *Dionin*・巴

畢那兒 *Pavinal*・代馬那 *Dimonal*・盼得本 *Pan-*

-topon・油科多耳 *Eukodal*・痛必靈 *Tonbelin*・

優巴科 *Eupaco*。

四 月經過多(制經)方

(一) 麥角膏 *Ext Secalis cornuti*

1・〇

白蘭地酒 *Cognac*

二〇・〇

糖漿 *Sirup simplex*

1〇〇・〇

溜水 *Aq dest*

二〇〇・〇

上每兩小時服一食匙，二日量

(二) 麥角丁幾 *Tinc Secalis cornuti*

二・〇

金印草流膏 *Ext Hydratis fluidum*

1・〇

苦味丁幾 *Tinc amara*

1・五

糖漿 *Sirup simplex*

1〇〇・〇

溜水 *Aq dest*

1〇〇・〇

上每日三次分服

(三) 攝加可寧 *Secacornin*

1・五

溴化鉀 *Kali bromat*

1・五

橙皮糖漿 *Sirup auranti corticis*

1〇〇・〇

溜水 *Aq dest*

1〇〇・〇

上每日三次分服

(四) 斯錫普錫輕 *Slypticin*

1・〇

- 、桂皮水 *Aq Cinnamon* 100.0
 上每日三至四次各十五滴，入糖水中服
- (五) 西斯多滿新 *Sistolmnsin* 十二片
 上每日三次，每次二片
- (六) 胎拳星或歐牛丁 *Tenosin od. Ernutin* 1.5
 糖漿 *Sirup simplex* 100.0
 溜水 *Aq dest* 1000.0
 上每日三次分服
- (七) 格樂維安 *Gravitol* 三片
 上一日三次各一片，食後
- (八) 克羅甸 *Clauden* 六片
 上每日三次，每次二片
- (九) 歐益斯他普親 *Fustapatin* 六片
 上每日三次，每次二片
- 月經過多。除內服藥外。亦可用藥液注入陰道。
 附述處方如下。
- (10) 過氯化鐵液 *Liq Sesquichloricum* 三.0
 溜水 *Aq dest* 1100.0

上注入陰道用

- (11) 硝酸銀 *Argent nitricum* 5.0
 溜水 *Aq dest* 1000.0

上注入陰道用

(附) 月經過多注射藥

麥角注射液 *Ergotine*，攝加可甯 *Secacornin*，
 胎拳星 *Tenosin*，斯錫普錫輕 *Stypticin*，血來
 必定 *Helapatin*，西斯多滿斯 *Sistolmnsin*，匹丟
 脫忒 *Pituitrin*，保路通 *Proluton*，克羅甸 *Clau-*
den，古阿哥 *Koagol*，歐益斯他普親 *Fustapatin*，
 制血痲 *Stypton*。

五 白帶方

- (1) 安度白帶片 *Tablets Endometritis* 六片
 上每日三次，每次一片內服
- (11) 萬宜散白堊藥片 *Lenicet-Bo-lus Vaginal*
Tablets 三片
 上每於臨睡前，用一片塞入陰道深部

(三) 帶伐根 *Devagan* 三片

上以一片塞入陰道深部用

(四) 安期福祿渦林 *Antiflorin* 三片

臨睡以一片塞入陰道

(五) 亞採多那陰道藥球 *Acetone Vaginae* 三個

Capsules

臨睡以一顆塞入陰道

〔註〕白帶由淋病或子宮陰道不潔而起者頗多。宜細察原因而施治療。參閱花柳病劑及消毒殺菌劑處方。

第五章 產科劑處方

一 妊娠性嘔吐方

(一) 蓼酸攝備謨 *Cerium Oxalicum* 〇・五

乳糖 *Sacch lact* 一・五

上分三包，一日分服

(二) 鹽酸科卡音 *Cocain hydrochloricum* 〇・三

白糖 *Sacch alba* 三・〇

臨床經驗處方

一六五

上分十包，一日二至三次各一包

(三) 哥羅方 *Chloroform* 二〇滴

溜水 *Aq dest* 一〇〇・〇

上一日數次，每次服二〇滴

(四) 改奶阻兒 *Genesol* 六片

上一日三次分服

(附) 妊娠性嘔吐注射劑

鹽酸嗎啡 *Morphin hydrochloricum*・硫酸阿忒

羅品注射液 *Atropin sulphate*・溴化鈣注射液

Solution Calcium bromide・盧密拿溶液 *Luminal*

nal Solution・改奶阻兒 *Genesol*・保路通 *Pro-*

taton・路特益諾兒 *Luteinol*。

二 子癇(妊娠)方

(一) 鹽酸嗎啡 *Morphin hydrochloric* 〇・〇一

乳糖 *Sacch lact* 〇・五

上一次頓服

(二) 阿片丁幾 Tine Opium

10.0

莨菪丁幾 Tine Scopoliae

10.0

庶斯丁幾 Tine Hyoscyami

10.0

續草丁幾 Tine Valerianae

10.0

上每日三次·各二十滴

(三) 溴化鉀 Kali. Bromat

2.0

溴化鈉 Nat. Bromat

2.0

溴化銻 Amm. Bromat

2.0

溜水 Aq. dest.

100.0

上 1日三次分服

(四) 盧蜜拿 Luminat

1.0

上分三包·一日分服

(五) 哥羅方 Chloroform

10.0

上為吸入劑

(六) 抱水格魯拉兒 Chloral hydrat

112.0

溜水 Aq. dest.

50.0

上混和為灌腸料

(七) 斯潑斯曼爾琴 Spasmalgine

三片

上每日三次分服

(八) 鎮痙汽巴兒勁栓劑 Spasmo-Cibaléine

Suppositoria

一個

上塞入肛門

(附) 癲癇注射劑

硫酸鎂注射液 Magnesium sulphate·鎂固拿兒

Magnol·鎂固素靈 Magsofin·鎂蘇爾注射液

Magsol。

二 產褥熱，子宮內膜炎方

(一) 百浪多息 Prontosil

六片

上每日三次，每次二片

(二) 賽勃他星 Septazine

六片

上日三次，每次一至二片

(三) 百膿清 Prunzine

六片

上每日三次各二片

(四) 擄疾兒 Lusiil

六片

上每日三次各二片

(五) 配力定 Pyridium

六片

上每日三次各二片

(附) 產褥熱·子宮內膜炎注射劑

握姆納丁 Omadin, 百乃定 Panadin, 電銀膠
Electargol, 電化可拉哥耳 Electrocollargol,
銀愛齊克勞益多 Eleclold silver, 阿耳葛克婁姆
Argechrom, 鍊狀球菌血清 Streptococcus Serum,
產褥熱混合傳染抗毒素 Puerperal-Mixed Sepsis
-Antitoxin。

四 催奶方

(一) 泡來勒安克催乳粉 Polylactol

一罐

上每日三四次，每次二茶匙，先以冷開
水少許調和。再沖牛乳或糖水中服。

(二) 奶歐蜜督欣 Neomilchen

十二片

上分三次，一日分服

(三) 勒德高姆母生奶粉 Lactagol

一罐

上每日三次，每次一茶匙，調和於牛乳

臨床經驗處方

一六七

或溫開水中內服

(附) 催奶注射劑

乳腺注射液 Mameline, 保女榮 Progynon。

(附) 催生注射劑

海泡非生 Hypophysin, 赫破弗辛 Hepophysin,
匹丟脫林 Pituitrin, 匹吐脫來 Pituitary, 英芬
定 Infundin, 畢多勝 Pitocin, 必產靈 Pitra-
phorin。

五 產後貧血方

急性注射生理食鹽水。慢性應用砒鐵，肝膏劑等。
處方詳見補血劑章中。

六 子宮弛緩症方

藥物不外收縮子宮劑，止血劑等。例如麥用
Ergotin, 匹丟脫林 Pituitrin, 攝加可甯 Seca-
cornin, 斯錫普錫輕 Stypticin 等均可應用。症狀

劇甚時。宜行手術療法。

七 子宮外翻症方

本症預後大都不良。宜速行整復手術後。再行腹壁按摩法，或子宮熱水灌注法，並投麥角劑以促其吸收。如無效時。須延專家施行手術。

八 陰道裂傷及會陰破裂方

傷口嚴密消毒。依照一般創傷處置。如裂傷較大者，宜用縫合手術。

第六章 外科劑處方

一 癰腫·癰疽·膿瘍·肌炎

· 腱炎·骨髓炎·骨膜炎

· 膿胸·乳腺炎·血管炎

· 淋巴管及腺炎·關節炎
等各種消炎方

A 外用消炎方

(一) 伊克度 Telytol 10.00

凡士林 Vaseline 100.00

上調和為軟膏塗布用(即伊克度軟膏)

(二) 安福消腫膏 Antiphlogistin 適量

上塗於紗布上。貼敷患部

(三) 三福消腫膏 Saniloid 適量

上為塗布用

(四) 水銀軟膏 Graue Quicksilberalbe 適量

上為塗布用

(五) 沃度丁幾 Tine Jodahum 適量

上以棉球蘸塗患部

(六) 乍鐵紅藥油 Jothion 100.0

上為塗布用

(七) 匹克氏硬膏 Picks Plaster

上剪一小方，貼於患部(顏面癰腫)

(八) 甘美羅爽 Kamillosan 100.0

凡士林 Vaseline 100.0

上調和為軟膏塗布用

(九) 石良氏皮炎藥膏 Pommade Salantale 1管

上塗布患部，每日一二次

(十) 勃羅比東藥膏 Propidex 1管

上塗紗布後，貼於患部，每日更換一二

次

(二) 癰癰瘡塗布治療劑 Zecanin 1管

上為患部塗布用

(三) 新亞綠藥膏 Sino-Green Ointment 1管

上為每日塗布患部

(三) 醋酸鉛 Plumbum aceticum 100.0

溜水 Aq dest 500.0

(四) 上振盪倒在棉花，罌敷患部，頻頻更換
醋酸礬土水 Liq Aluminii aceticum 50.0

溜水 Aq dest 150.0

(五) 上混和倒在棉花，罌敷患部，頻頻更換
硼酸 Acid Boricum 4.0

溜水 Aq Dest 200.0

(六) 上倒在棉花，罌敷患部，一日多次更換
九六%酒精 Alkohol (96%) 200.0

上倒在棉花。罌敷患部。

(七) 冰塊 Eis 適量

上裝入冰袋為卷包用

(註)廣大炎症，病狀劇烈時。均宜用罌包劑。例如(一七)(一八)(一九)方等。尤以冰罌包為最效。

B 內服消炎方

(一) 硫酸鎂 Magnesium sulfuricum 200.0

上溶於糖水中頓服

(二)	愛太衣那克西路 <i>Etainoxyl</i> 乳糖 <i>Sacch lact</i>	11.0 1.0	(11)	大健風 <i>Dageran</i>	上每日三次，每次二片	六片
(三)	士丹洛克西片 <i>Stainoxyl Tablets</i>	六片	(12)	洛太龍 <i>Podlone</i>	上每日三四次，每次一片	三片
	上一日三次分服				上每日三次，每次一片	
(四)	奧克錫丹 <i>Oxystannol</i>	1.5	(13)	優龍 <i>Yuron</i>	上每日三次，每次一片	三片
	上分三包，一日分服				上每日三次，每次一片	
(五)	百浪多息 <i>Prontosil</i>	六片	(14)	滂日爾 <i>Ponsil</i>	上每日二次，每次一片	六片
	上每日三次，每次二片				上每日三次，每次二片	
(六)	賽勃他星 <i>Seplazine</i>	六片	(15)	無色波浪消滅 <i>Prasinia album</i>	上每日三次，每次二片	六片
	上每日三次，每次二片				上每日三次，每次二片	
(七)	百膿清片 <i>Pronzin Tab.</i>	六片	(16)	配乃定 <i>Pyridium</i>	上每日三次，每次二片	六片
	上一日三次，每次二片				上每日三次，每次二片	
(八)	消發滅定 <i>Sulfamidine</i>	1.5	(17)	殺鏈龍 <i>Sulfolinon</i>	上每日三次，每次二片	六片
	上每日三次分服				上每日四次，每次一片	
(九)	擄疾兒 <i>Lusil Pulv.</i>	1.5	(18)	比力大 <i>Pyridal</i>	上每日四次，每次一片	八片
	上分三包，一日三次分服					
(10)	烏利龍 <i>Uleron</i>	六片	(19)	烏龍太 <i>Urontal</i>		八片

上每日四次，每次一片

(附)消炎注射藥

握姆那丁 Ommadin，安替保 Antipol，愛爾斯丁
Ertin，百乃定 Panadin，萬應乃丁 Viatin，
奧倫 Aolan。

士丹洛克西 Stannoxyl，電銀膠 Electrarrol，
電化可拉哥耳 Electrocollarol，銀愛費吉勞益
多 Elecloid Silver，拿佛哥雷銀膠 Novalsol，百
浪多息 Prontosil，沙呂賽勃他星 Solu-Septa-
zire，百膿清 Prontozin，撈疾兒 Lusil，滂日爾
Ponsil，配乃定 Pyridium。

葡萄狀球菌血清 Anti-Staphylococcus Serum，
葡萄狀球菌漿苗 Staphylococcus Vaccine，鍊狀
球菌血清 Anti-Streptococcus Serum，斯太法
Staphar，勞可淨 Leukogen，葡萄菌鍊球菌混合漿
苗 Staphylo-Strepto Vaccine Mixel，藥特靈化
膿菌混合漿苗 Antiphogonous Yatron Vaccine。

拍膿 Boilon，史太佛膿 Staphylon，勃維比東癩
毒藥苗 Preption，愛安斯可爾 Elosol。
腹膜炎血清 Anti-Peritonitis Serum，癩病菌液
Furunculosis Vaccine。
(註)普通炎症，所需外用及內服藥已足，倘症狀劇烈，則宜兼
用注射劑。

二 外科消毒(殺菌防腐)方

- (一) 炭酸 Acid carbonicum 1.0-1.0
溜水 Aq dest 100.0
上為洗滌用
- (二) 利沙耳 Lysol 1.0-1.0
溜水 Aq dest 100.0
上為洗滌用
- (三) 遇錳鉀 Kali Permanganicum 0.1
溜水 Aq dest 100.0
上為洗滌用
- (四) 雙養水 Hydrogenium Peroxydat 30.0

臨床經驗處方

一七二

(五)	昇汞 Sublimat	0.1	(二)	藥特靈 Yatren	1.0-2.0
	溜水 Aq dest	100.0-1500.0		溜水 Aq dest	100.0
	上為洗滌用			上為洗滌用	
(六)	硼酸 Acid Boricum	2.0	(三)	賜福露 Zephiran	0.2
	溜水 Aq dest	100.0		溜水 Aq dest	100.0
	上為洗滌用			上為洗滌用	
(七)	雷佛奴耳 Rivanol	0.1-1.0-5	(三)	皮育他甯 Pyoktanin	1.0
	溜水 Aq dest	100.0		溜水 Aq dest	100.0
	上為洗滌用			上為洗滌用	
(八)	脫呂帕弗拉文 Trypaflavine	0.1	(四)	麗芽恩 Rimaon	0.1-1.0-2
	溜水 Aq dest	100.0		溜水 Aq dest	100.0
	上為洗滌用			上為洗滌用	
(九)	托拉明 Tolnolamin	0.5-1.0	(五)	賴防 Labon	1.0
	溜水 Aq dest	100.0		溜水 Aq dest	100.0
	上為洗滌用			上為洗滌用	
(十)	得利沙而 Trisol	1.0	(六)	甘美羅爽 Kamillosan	2.0
	溜水 Aq dest	100.0		溜水 Aq dest	100.0

上爲洗滌用

(一) 瑪嵩甯 Merzolin 0.1

生理食鹽水 Kochsalz Lösung 100.0

上爲洗滌用

(二) 汞色質 Necurochrome 0.5-1.0

溜水 Aq dest 100.0

上爲洗滌或塗布用

(三) 耐可姆 Neochrome 0.1-1.0

溜水 Aq dest 100.0

上爲洗滌或塗布用

(四) 五洲紅溴汞 Interchrome 1.0

溜水 Aq dest 100.0

上爲洗滌或塗布用

(五) 沃度丁幾 Tine Jodatium 適量

上以棉球蘸塗患部

(六) 乍鐵紅油 Jothion 適量

上爲塗布用

(七) 撲滅絕藥液 Pemyase Liq. 適量

上以紗布蘸後塗塞患部

三 仿腐生肌方

(一) 海碘方或雷佛奴耳紗布 Jodoform Gasa

od. Rivanol Gasa

上剪成細條栓塞創口用

(二) 海碘方 Jodoform 適量

上爲撒布用

(三) 海鉍仿 Haibiform 適量

上爲撒布用

(四) 慰歐仿 Vioform 適量

上爲撒布用

(五) 代馬妥耳 Dermatol 適量

上爲撒布用

(六) 海碘方 Jodoform 1.0-2.0

甘油 Glycerin 10.0

上爲局部注射用

(七) 海碘方 Jodoform 10.0

凡士林 Vaseline 100.0

上混和為軟膏塗布用

(八) 甘美羅爽 Kamillosan 100.0

凡士林 Vaseline 100.0

上混和為軟膏塗布用

(九) 雷佛奴耳 Rivanol 1.0

凡士林 Vaseline 100.0

上混和為軟膏塗布用

四 止血方

(一) 單甯酸 Acid Tannicum 適量

上為止血部撒用劑

(二) 過鹽化鐵液 Liq. Ferri sesquichlorat 適量

上以棉球蘸藥液貼止血部

(三) 鹽化腎上腺液 Adrenalin hydrochloric. 適量

上以棉球藥液蘸貼於出血部

(四) 克羅甸藥粉 Clauden Pulv. 適量

上為出血部撒布劑

(五) 脫倫補靈藥粉 Thromburin Pulv. 適量

上為出血部撒布劑

〔註〕上列處方。祇可適用於小出血。倘對較大血管破裂之出血。則須行血管結紮法。再大出血發現急性貧血症狀時。須注射生理食鹽水 Kochsalz Lösung, 林格兒氏液 Liq. Ringeri, 洛克氏液 Liq. Lockel 等。

五 止痛方

(一) 凡拉蒙片 Veramon Tablets 一片

上一次頓服

(二) 代嗎那片 Imonal Tablets 二片

上一日三次分服

(三) 痛必靈 Tonbelin 1.5

上分三包, 一日分服

(四) 痛必靈藥片 Tonbelin Tablets 一片

上一次頓服

(五) 康普樂 Compral 一片

上臨臥頓服

(六) 威健年止痛藥片 *Veganin* 三片

上每日三次，每次分服

(七) 抗痛 *Conton* 一片

上一次頓服

(八) 安痛錠 *Anodine Tablets* 一片

上一次頓服

(九) 鹽酸嗎啡 *Morphin hydrochloric.* 〇・〇一

乳糖 *Sacch lact* 〇・五

上一次頓服

(十) 俄耳安封 *Orthoform* 〇・五

上一次頓服

(十一) 諾福樂仿 *Novoloform* 〇・五

上一次頓服

(附) 止痛注射藥

鹽酸嗎啡注射液 *Morphin hydrochloric.* 阿刀邊

嗎啡 *Atropin Morphine*・代嗎那 *Dimonal*・痛

必靈 *Tombelin*・巴畢那兒 *Pavinal*・戒痛 *Cha-*

tong.

(十二) 俄耳安封 *Orthoform* 二〇・〇

澱粉或滑石 *Amylum od. Talcum*

一〇〇・〇

(十三) 上混和為局部撒布用(創傷痛，潰瘍痛)

諾福樂仿 *Novoloform* 五・〇

澱粉 *Amylum* 五・〇

上混和為撒布用(同上)

(十四) 阿那雖信 *Anesthesin* 二〇・〇

凡士林 *Vaseline* 一〇〇・〇

上混和為軟膏塗布用(同上)

(十五) 諾福樂仿 *Novoloform* 一〇・〇

凡士林 *Vaseline* 五〇・〇

上混和為軟膏塗布用(同上)

六 全身麻醉方

(一) 以脫 *Aether* 一份

哥羅方 Chloroform

三份

純酒精 Alcohol

一份

上為全身麻醉吸入劑(必耳羅忒氏 Bi-Iroch 合劑方)

純酒精 Alcohol

哥羅方 Chloroform

一份

以脫 Aether

二份

蘇納司丁 Solasthin

三份

上為全身麻醉吸入劑(英國劑方)

蘇納司丁 Solasthin

五〇・〇

上為全身麻醉吸入劑

(附) 麻醉注射劑

蔽腦湯 Pernoclon・鈉伊惟本 Eviplan-Sodium

七 腰椎麻醉方

(一) 忒羅怕科卡音 Tropacocain

〇・五

溜水 Aq dest

一〇〇・〇

上為腰椎麻醉注入劑

八 局部麻醉方

(一) 鹽化歐欺兒 Chloromethyl

一管

上噴射局部為麻醉用

(二) 鹽酸科卡音 Cocain hydrochloricum

〇・一〇〇・二

食鹽水 Aq Nat. chlorat (0.2%) 二〇・〇

鹽化腎上腺液 Adrenalin hydrochlorat

三滴

上為局部麻醉料

(三) 鹽酸科卡音 Cocain hydrochloric.

〇・一〇〇・二

鹽酸嗎啡 Morphin hydrochloric. 〇・〇二

食鹽 Nat. chloratum 〇・二

溜水 Aq dest 一〇〇・〇

上為局部麻醉料

(四) 諾服卡音 Norocain 〇・五 一・〇

食鹽水 Aq. Nat. chlorat (0.5%) 五〇・〇

上爲局部麻醉料

(五) 諾服卡音 Novocain

食鹽 Nat. chloratum

重曹 Nat. bicarbonicum

溜水 Aq. dist.

上爲局部麻醉料

(六) 諾服卡音 Novocain

食鹽 Nat. chloratum

重曹 Nat. bicarbonicum

溜水 Aq. dist.

上爲局部麻醉料

匿耳乏甯 Nirvanin

溜水 Aq. dist.

上爲局部麻醉料

本安卡音 Pantocain

食鹽 Nat. chloratum

溜水 Aq. dist.

上爲局部麻醉料

臨床經驗處方

九 腐蝕劑方

(一) 濃石炭酸液 Liq. Acid Carbolium (20%) 適量

上以小棉球蘸後塗布患部

(二) 純石炭酸 Acid Carbolium 適量

上以錫子箝着少許塗布患部

(三) 苛性鉀液 Kali causticum (50%) 適量

上以棉球蘸塗患部

(四) 硝酸銀棒 Styli Argent nitricum

上用以塗布患部

一〇 火傷方

(一) 甘油或橄欖油 Glycerin od. Ol Olivarium

110.00

上塗布用

(二) 硼酸軟膏 Ungt. Boricum 110.00

上塗布用

(三)	亞鉛華軟膏 Ung. Zinc oxydatum	110.00	豚脂 Adeps suillus	110.00
	上塗布用		石灰水 Aq Calcariae	110.00
(四)	2% 硼酸水或醋酸鉛水 Aq Boric od. Aq Plumbum aceticum (2%)	100.00	上外用塗布	
	上罨包用		(10) 亞麻仁油 Ol Lini	5.00
(五)	亞鉛華或次硝酸鉍 Zinc oxydatum od. Bismuth subnitricum	10.00	石灰水 Aq Calcariae	5.00
	澱粉 Amylum	10.00	替摩耳 Thymolium	0.05
	上撒布用		上外用塗布	
(六)	次硝酸鉍 Bismuth subnitricum	10.00	(11) 次硝酸鉍 Bismuth subnitricum	6.00
	亞鉛華 Zinc oxydatum	10.00	硼酸 Acid Boricum	4.00
	上撒布用		羊毛脂 Lanolin	70.00
(七)	硼酸 Acid Boricum	5.00	橄欖油 Ol Olivarum	20.00
	沃度仿 Jodoform	5.00	上為軟膏外用	
	上撒布用		(12) 俄耳安封 Orthoform	11.00
(八)	代馬安耳 Dermatol	5.00	澱粉或亞鉛華 Amylum od. Zinc oxydatum	10.00
	上撒布用		上為撒布用	
(九)	羊毛脂 Lanolin	10.00	(13) 甘美羅爽軟膏 Kamillosan Salbe (10%)	

適量

上塗布患部，每日一二次

(四) 勃羅比東藥膏 Propidax 適量

上藥塗紗布後貼於患部

(二) 格拉鈕僅軟膏 Gramogen Pasta 適量

上塗於紗布上，敷於患部

〔註〕廣大火傷，亦宜用生理食鹽水 Liq. Nat. chloratum 注射或灌腸。

一一 凍傷方

(一) 樟腦 Camphor 五〇〇

酒精 Alcohol 五〇〇

上每日塗擦用(未潰爛用)

(二) 酒精 Alcohol 九〇〇

阿片丁幾 Tine Opium 五〇〇

石炭酸 Acid Carbo'icum 一〇〇

樟腦 Camphor 一五〇〇

坎他利斯丁幾 Tine Cantharides 一〇〇

單甯酸 Acid Tannin 〇・五

莨菪丁幾 Tine Scopolia 一〇〇

甘油 Glycerin 五〇〇

上每日塗擦用(同上)

(三) 明礬 Alumin 五〇〇

醋酸鉛 Plumbum aceticum 二五〇〇

溜水 Aq desl 五〇〇〇

上為罨包用(同上)

(四) 伊克度軟膏 Ung. Ichtyol 一〇〇〇

上為塗布用

(五) 朋淨 Benzin 一〇〇〇

樟腦 Camphor 二〇〇

單軟膏 Ung. simplex 九〇〇

上每日塗布用(已潰爛用)

(六) 樟腦 Camphor 五〇〇

凡士林 Vaselin 一〇〇〇

上每日塗布用(同上)

(七) 樟腦 Camphor 五〇〇

單甯酸 Acid Tannin 五〇〇

單軟膏 Ung. simplex

100.0

上每日塗布用(同上)

(註)已潰爛凍瘡。簡便應用亞鉛華軟膏，硼酸軟膏，沃度仿軟膏塗布亦妙。

一一 化膿性全身傳染方

(一) 百浪多息 *Prontosil* 六片

上每日三次，每次二片

(二) 賽勃他星 *Septazine* 六片

上每日三次，每次二片

(三) 百膿清 *Pronzine Tab.* 六片

上每日三次，每次二片

(四) 消發滅定 *Sulfamidine* 一·五

上每日三次分服

(附)化膿性全身傳染注射藥

電銀膠 *Electrargol*，電化可拉哥耳 *Ele trocol*

lauroi，百浪多息 *Prontosil*，沙呂賽勃他星 *Sol-*

lu-Septazine，百膿清 *Pronzin*，葡萄狀球菌血

清 *Anti-Staphylococcus Serum*，鍊狀球菌血清

Anti-Streptococcus Serum，葡萄菌鍊球菌混合

藥苗 *Staphylo-Strepto Vaccine-Mixed*，生理

食鹽水 *Liq. Nat. chloratum* 等。

一二 丹毒方

見傳染病劑處方中。

一四 破傷風方

見傳染病劑處方中。

一五 狂犬病方

(一) 苛性鉀液 *Kali causticum*(20%) 適量

上為咬傷部腐蝕用

(二) 硫酸 *Acid Sulfuricum* 適量

上為咬傷部腐蝕用

(三) 純硫酸 *Acid Carbohicum* 適量

上為咬傷部腐蝕用

(註) 狂犬病內服藥，可參照上章傳染病劑中破傷風項同樣處置。

(附) 狂犬病注射藥

狂犬病疫苗 *Lyssa Vaccine*。

一六 蛇咬症方

(一) 5% 過錳酸鉀液 *Liq. Kali Permanganicum (5%)* 10.0
上注射於咬傷部皮下

(二) 20% 苛性鉀 *Liq. Kali caustic. (2%)* 適量
上為局部腐蝕用

(三) 0.1% 昇汞 *Liq. Sublimat (0.1%)* 適量
上為局部洗滌用

(四) 0.1% 雷佛奴耳液 *Rivanol (0.1%)* 適量
上為局部洗滌用

(五) 0.1% 過錳酸鉀液 *Liq. Kali Permanganicum (0.1%)* 500.0
上為洗胃劑

可拉明 *Coranine*

毛地黃丁幾 *Tinc. Digitalis* 3.0

烏羅透賓 *Urotropin* 2.0

糖漿 *Sirup simplex* 3.0

溜水 *Aq. dest.* 100.0

上每二小時服一格，一日六次分服

(附) 蛇毒症注射藥

蛇毒血清 *Antivenomous Serum* · 鹽酸必羅卡而賓 *Pilocarpin hydrochloricum*。

一七 鼠咬症方

(一) 0.1% 昇汞 *Sublimat (0.1%)* 適量
上為局部洗滌用

(二) 0.1% 雷佛奴耳 *Rivanol (0.1%)* 適量

臨床經驗處方

一八二

上為局部洗滌用

外用消毒藥液，參閱鼠咬症。

(三) 二%石炭酸 Acid Carbolium (2%) 適量

上為局部洗滌用

(附) 屍毒症注射藥

(附) 鼠咬症注射藥

電銀膠 Electargol，電化可拉哥耳 Electrocoll-argol，拿佛哥電銀膠 Novargol。

新洒爾佛散 Neosalvarsan。

一一 狼瘡方

一八 昆蟲刺螫方

(一) 銻水 Aq. Ammonia

適量

(一) 硝酸銀桿 Styli Argent nitricum

上每日一次，以桿尖插入狼瘡疹中

上塗布患部

(二) 硝酸銀 Argentum nitricum 五・〇

一九 蜈蚣咬方

溜水 Aq. dest 五・〇

上為塗布用

(一) 阿片膏 Ext. Opium

適量

(三) 苛性鉀 Kali causticum 二〇・〇

上塗布患部

生石灰 Calcaria 二〇・〇

酒精 Alkohol 適量

二〇 屍毒症方

(四) 苛性鉀 Kali causticum 二・〇

上為軟泥為局部塗擦腐蝕用

溜水 Aq dest 100.0

上為患部塗布用

(五) 焦性沒食子酸 Acid Pyrogallicum 100.0

凡士林 Vaselin 500.0

上每次一二次塗布，數日後用硼酸軟膏

替代，其後再反覆塗布

(六) 碘 Jodium 50.0

碘化鉀 Kali jodatium 100.0

甘油 Glycerin 200.0

上為塗布用

(七) 亞札路而外用藥 Engallol 100.0

上以棉花蘸藥少許塗布患部

(註) 狼瘡除局部治療外，兼宜內服肝油砒鐵等強壯劑。

(附) 狼瘡注射藥

安癆福 Anuphos·沙克拿 Solganal 等。

一二一 皮膚結核方

(一) 伊克他賓 Ektebin 一管

臨床經驗處方

一八三

以本品放於指尖，交換摩擦胸腹背部等處，每日一次

(註) 疣狀皮膚結核之治療。可參照狼瘡處方。內服藥不外強壯療法為主。可應用肝油，砒鐵劑，碘化鉀等。

一二二 潰瘍方

(一) 沃度仿 Jodoform 適量

上為撒布用

(二) 海鈹仿 Haibiform 適量

上為撒布用

(三) 慰歐仿 Vioform 適量

上為撒布用

(四) 代馬妥耳 Dermatol 適量

上為撒布用

(五) 海碘方軟膏 Jodoform Salbe 適量

上為患部塗布

(六) 撲滅絕軟膏 Penryase Salbe 適量

上為患部塗布

(七) 勃羅比東藥膏 Propidex Salbe

適量

上為患部塗布劑

(八) 甘美羅爽 Kamillosan

100.0

凡士林 Vaseline

100.0

上混和為軟膏塗布用

(九) 雷佛奴耳 Rivanol

1.0

凡士林 Vaseline

100.0

上混和為軟膏塗布用

(註) 潰瘍倘深大凹陷，宜改用沃度仿紗布或雷佛奴耳紗布栓塞。

二四 走馬疳方

(一) 硝酸銀 Argent nitricum

5.0

溜水 Aq dest

5.0

上為患部腐蝕劑

(二) 雷佛奴耳液 Rivanol (0.1%)

100.0

上消毒後注射於患部周圍皮下

(附) 走馬疳注射藥

有遺傳性梅毒之患者，宜注射洒爾佛散 Neosal-

varsan。

二五 痔瘡方

(一) 明礬 Alumen

10.0

單甯酸 Acid Tannin

10.0

可可脂 Cacao

適量

上為坐藥十個，每日插入肛門一二個

(二) 咯維導爾坐藥 Kavidol Suppositoria 一個

上除去包衣，插入肛門用

(三) 肛密佗坐藥 Kamidol Suppositoria 一個

用法同上

(四) 保拉巨諾爾坐藥 Borraginol Sup. 一個

上插入肛門，每日三次

(五) 安那蘇痔瘡坐藥 Anusol Suppositoria 一個

上臨臥插入肛門

(六) 長命牌拔痔藥膏 Pile Cure 10.0

上每日一二次塗布患部

(註)上列坐藥。大多均另有軟膏。對於外痔。宜改用軟膏塗敷。

(附)痔瘡注射藥

却痔病 Caseobin, 馬格內莘 Magnesian, 海馬靈 Haemorin。

一六 骨折及脫臼方

(一) 煨製硫酸鈣(燒石膏) Calcium sulfuric

ustum

適量

上混和水後，即成石膏綳帶，為固定患部之用

(註)骨折與脫臼。並無內服療法。惟有迅速整復。再施固定。待其將愈時。漸漸施行自動或他動的適當運動。以防肌肉或關節之強直。此外按摩浴治，電氣療法。亦可為輔助療法。

二七

蠕突炎·盲腸炎·腹膜炎方

(一) 水銀軟膏 Grana Quicksilbersalbe 適量

臨床經驗處方

一八五

上為患部塗布用

(二) 二%鉛糖水 Plätzucker (2%)

適量

上為患部卷包料

(三) 冰塊 Eis

適量

上為卷包料

(四) 阿片末 Pulv Opium

〇·五

白糖 Sacch alba

三·〇

上分十包，每三時服一包

(五) 阿片丁幾 Fine Opium

一·五

萹蓉丁幾 Tine Scopolia

一·五

糖漿 Sirup simplex

一〇〇·〇

溜水 Aq dest

一〇〇·〇

(六) 印度大麻膏 Ext Cannabis Indicae 〇·二

白糖 Sacch alba

五·〇

上分十包，每三時服一包

(七) 鹽酸嗎啡 Morphin hydrochloric. 〇·〇三

乳糖 Sacch lact

上分三包，一日三次分服

(附) 蛔突炎・盲腸炎・腹膜炎注

射藥

電銀膠 Electargol, 百浪多息 Protosil, 沙呂
賽勃他星 Solu-Septazine, 腹膜炎血清 Anti-Pe
ritonilis。

(註) 上列三症。病變異常危險。倘藥物應用無效時。速宜就外科
專門醫師行手術治療。

二八 神經炎・肺結核・腹水

膀胱結石方

詳見內科劑處方中。

此外畸形外科，例如斜頸，兔唇，贅指或駢指，
馬足，脊柱側彎症，包莖，先天性肛門閉鎖及直
腸閉鎖，腫瘍等。均須應用手術治療。並無處方
可以獻貢。特此附註

第七章 皮膚病劑處方

一 濕疹方

(一) 亞鉛華 Zinc oxydatum 五〇〇

澱粉或滑石 Amyl od. Talcum 五〇〇

上為撒布用

(二) 水揚酸 Acid Salicylicum 〇〇五

滑石 Talcum 一〇〇〇

上為撒布用

(三) 亞鉛華 Zinc oxydatum 一〇〇〇

凡士林 Vaseline 九〇〇〇

上為軟膏塗布用

(四) 亞鉛華 Zinc oxydatum 二五〇〇

水揚酸 Acid Salicylicum 一〇〇

澱粉 Amylum 二五〇〇

凡士林 Vaseline 五〇〇〇

上調和爲軟膏塗布用

(五)

亞鉛華 *Zinc oxydatum*

10.0

硫黃華 *Sulfur sublimatum*

10.0

木煤油 *Pix liquida*

10.0

凡士林 *Vaselin*

30.0

上調和爲軟膏塗布用

(六)

木煤油 *Pix liquida*

30.0

硫黃華 *Sulfur sublimatum*

30.0

綠石鹼 *Sapo viridis*

60.0

凡士林 *Vaselin*

60.0

滑石粉 *Talcum*

15.0

上調和爲軟膏塗布用

(七)

亞鉛華 *Zinc oxydatum*

5.0

水揚酸 *Acid Salicylicum*

2.5

硼酸 *Acid Boricum*

5.0

凡士林 *Vaselin*

100.0

上調和爲軟膏塗布用

(八)

沉降硫黃 *Sulfur praecipitatum*

5.0

亞鉛華 *Zinc oxydatum*

5.0

凡士林 *Vaselin*

50.0

上爲軟膏塗布用

(九)

雷沙而辛 *Resorcin*

5.0

亞鉛華軟膏 *Ung. Zinc oxydatum*

50.0

上混和爲軟膏塗布用

(十)

皮可淨軟膏 *Ung. Benzoin*

一管

上爲局部塗布用

(十一)

亞鉛華軟膏 *Ung. Zinc oxydatum* 15.0

伊克度軟膏 *Ung. Ichtyol* 15.0

上調和爲塗布用

(十二)

匹替維耳 *Pityrol* 10.0

凡士林 *Vaselin* 100.0

上爲軟膏塗布用

(十三)

克里薩羅並 *Chrysarobin* 10.0

凡士林 *Vaselin* 100.0

上爲軟膏塗布用

(十四)

乙那弗安耳 *Beta Naphtholum* 10.0

(一)	凡士林 Vaseline 上調和爲軟膏用	100.0	凡士林 Vaseline 上爲軟膏塗布用	100.0
(二)	皮治樂 Pixrol 凡士林 Vaseline 上爲軟膏塗布用	100.0 100.0	(110) 水揚酸 Acid Salicylicum 精製硫黃 Sulfur depuratum 鉀石鹼 Sapo Kalium 上爲石鹼劑洗滌用	3.0 5.0 6.0
(三)	必治癒 Pitjol 凡士林 Vaseline 上爲軟膏塗布用	100.0 100.0	(111) 木煤油 Pix liquida 綠石鹼 Sapo viridis 酒精 Alcohol 上爲水劑，塗擦患部，每日數次	10.0 10.0 10.0
(四)	雪克諾林 Gignolin 凡士林 Vaseline 上爲軟膏塗布用	0.2 100.0	(112) 替摩耳 Thymolum 酒精 Alcohol 上爲患部摩擦用	1.0 100.0
(五)	安的拉索而 Anthrasol 凡士林 Vaseline 上爲軟膏塗布用	10.0 100.0	(113) 石炭酸 Acid Carbohicum 酒精 Alcohol 上爲患部塗布用	1.0 100.0
(六)	土門奴耳 Tumenol-Ammunium 凡士林 Vaseline 上爲軟膏塗布用	10.0 100.0	(114) 薄荷腦 Menthol 酒精 Alcohol	1.0 100.0
(七)	來尼軌路而 Lenigalol	10.0		

上為患部塗布用

(三) 水楊酸 Acid Salicylicum

1.0

酒精 Alcohol

100.0

上為患部塗布用

(三) 亞砒酸鉀水 Liq Kali arsenicosum

1.0

林搗鐵丁幾 Tinc Ferri pomati

3.0

糖漿 Sirrup simplex

100.0

溜水 Aq dest

100.0

上每日三次，二日分服

(三) 色而伐納 Selvorol

一瓶

每日三次，每次一茶匙

(註) 上列「第一」至「第一〇」方。可應用於普通濕疹。如搔癢則甚表皮未糜爛時。亦可用「第二」至「二五」方塗擦。倘合併有炎症狀態時。則宜用第(十一)方。慢性濕疹可用第(十二)至(二〇)方。頑固性而營養不良者。亦可兼服砒鐵劑，或鈣製劑(參閱二六及二七方)

(附)濕疹注射藥

氯化鈣注射藥 Calcium chloride · 癢可樂民 Jo-

臨床經驗處方

一八九

coromide · 癢可樂 Jokolol · 佑苦勞民 Jokuro-mine · 邦鈣兒 Pancaal · 所拉純 Solarson · 鐵開古地 Iron cacodylate · 鈉開古地 Nat. cacodylate · 皮濕固可靈 Glucoilin-Broms · 阿芬尼而 Afenil · 克療病 Kriobin · 退苦病 Tekupin · 頑固性濕疹可注射奧倫 Aolan · 來克丁 Lactin · 息那倫 Sinalen · 新酒爾佛散 Neo-Salvarsan 等。

二 脂漏性濕疹方

(一) 沉降硫黃 Sulfur praecipitatum

5.0

亞鉛華 Zinc oxydatum

5.0

凡士林 Vaselin

50.0

上為軟膏外用

(二) 重碳酸鈉 Nat. bicarbonicum

3.0

甘油 Glycerin

15.0

拉凡大精 Spiritus Lavendulae

15.0

上為塗擦劑

(註)與濕疹注射藥同。

三 汗疱方

(三)	軟鉀石鹼 Sapo Kali venalis 酒精 Alkohol	五〇・〇 二〇・〇		
	拉凡大精 Spiritus Lavendulae 上爲塗布用	五・〇		
(四)	雷沙而辛 Resorcin 亞鉛華軟膏 Zinc Pasta	五・〇 五〇・〇	(一)	沉降硫黃 Sulfur praecipitatum 亞鉛華 Zinc oxydatum 澱粉 Amylum 甘油 Glycerin 溜水 Aq dest
	上混和爲塗布用	〇・二 一〇〇・〇		四・〇 二〇・〇 一〇・〇 一〇〇・〇 一〇〇・〇
(五)	雪克諾林 Cignolin 酒精 Alkohol	一〇〇・〇		上混和外用
	上爲塗擦劑		(二)	亞鉛華 Zinc oxydatum 橄欖油 Ol Olivarium
(六)	亞來索而軟膏 Ung. Euresol 上爲局部塗擦用	二〇・〇		二〇・〇 四〇・〇
(七)	皮可淨藥液 Liq. Benecozin 上爲局部塗布用	二〇・〇	(三)	木煤油軟膏 Ung. pix liquida 上爲局部塗布用
	長命皮膚膏 Exematin cream for Skin discases	一管	(四)	疱膚靈 Pomphorin 上每日塗布患部一次
	上爲局部塗布用			一管

(附)脂漏性濕疹注射藥

四 尋常性乾癬方

上為塗擦劑，每日以毛刷蘸藥塗布二次，經十日後行全身浴。

(一)	伊克度 <i>Ichtyol</i>	五〇〇	(五)	白降汞 <i>Hydrargyri praecipitatum alba</i>	五〇〇
	水揚酸 <i>Acid Salicylicum</i>	三〇〇		次硝酸鉍 <i>Bismuth. subnitricum</i>	五〇〇
	甘油 <i>Glycerin</i>	二〇〇		凡士林 <i>Vaseline</i>	五〇〇
	酒精 <i>Alkohol</i>	一〇〇		上調和為軟膏塗布用	
	上為塗布用		(六)	土門奴耳 <i>Tunenol-Ammonium</i>	一〇〇
(二)	克里薩暹並 <i>Chrysarobin</i>	一〇〇		凡士林 <i>Vaseline</i>	五〇〇
	凡士林 <i>Vaseline</i>	五〇〇		上調和為軟膏塗布用	
	上為軟膏塗布用		(七)	知其納耳 <i>Thigenol</i>	一〇〇
(三)	焦性沒食子酸 <i>Pyrogallic acid</i>	五〇〇		凡士林 <i>Vaseline</i>	五〇〇
	凡士林 <i>Vaseline</i>	五〇〇		上調和為軟膏塗布用	
	上為軟膏塗布用		(八)	雪克諾林軟膏 <i>Ung. Cignolin</i>	三〇〇
(四)	精製硫黃 <i>Sulfur depuratum</i>	一〇〇		上為塗布用	
	木煤油 <i>Pix liquida</i>	一〇〇	(九)	格來腦 <i>Grenol</i>	一管
	綠石鹼 <i>Sapo viridis</i>	二〇〇		上加入溫水少許，攪成泥狀為塗布用	
	凡士林 <i>Vaseline</i>	二〇〇	(十)	污癬露 <i>Euro</i>	一管

上爲患部塗布劑

(註)本症亦宜兼用內服藥。例如砒劑，碘劑等。

(附)尋常性乾癬注射藥

奧倫 Aolan，來克丁 Lactin，息那倫 Sinolen，
所拉純 Solarson，以諾茶而 Enesol，新洒爾佛
散 Neo-Salvarsan 等。

五 傳染性膿疱疹方

(一)	次硝酸鉍 Bismuth subnitricum	三〇〇	(四)	凡士林 Vaseline	二五〇
	凡士林 Vaseline	三〇〇		上爲軟膏塗布用	
	上爲軟膏塗布用		(五)	雷佛奴耳 Rivanol	〇〇五
(二)	白降汞 Hydrargyri praecipitatum	二〇〇		凡士林 Vaseline	五〇〇
	alba	三〇〇		上爲軟膏塗布用	
	凡士林 Vaseline	三〇〇	(六)	脫呂帕弗拉文 Tryptoflavine	一〇〇
	上爲軟膏塗布用			亞鉛華 Zinc oxydatum	五〇〇
(三)	水揚酸 Acid Salicylicum	一〇〇		凡士林 Vaseline	五〇〇
	亞鉛華 Zinc oxydatum	一〇〇		上爲軟膏塗布用	
	澱粉 Amylum	一〇〇	(七)	賽勃他星軟膏 Dermoseptazine	一管
				上爲患部塗敷用	
			(八)	知其納耳 Thigenol	一〇〇
				甘油 Glycerin	一〇〇
				溜水 Aq dest	六〇〇
				上混和爲塗布用	

(九) 賜福露 Zephiran

溜水 Aq dest

〇・四
二〇〇・〇

上爲患部覆包劑

(十) 甘美羅爽 Kamlosan

溜水 Aq dest

四・〇
二〇〇・〇

上爲患部覆包用

(附) 傳染性膿疱疹注射藥

克療病 Kriobin，瘧苦病 Tekupin，奧倫 Aolan，來克 Lactin，息那倫 Sinolen，藥特靈化膿菌混合漿苗 Antipyrogenous Yatren Vaccine，貝靈化膿菌抗素 Anti-pyogen-Behring，拍膿 Botton 等。

六 紅色苔癬方

(一) 白降汞 Hydrargyri Praecipitatum

alba

三・〇

凡士林 Vaselin

二〇・〇

上爲塗擦用

(二) 昇汞 Hydrargyri bichloratum

石炭酸 Acid Carbolium

〇・一
二一・〇

亞鉛華軟膏 Zinc Pasta

一〇〇・〇

上混和，每日朝夕塗布各一次

(三)

焦性沒食子酸 Acid Pyrogallium

三・〇

白降汞 Hydrargyri Praecipitatum

三・〇

凡士林 Vaselin

三〇・〇

上爲軟膏塗布用

(四)

木煤油 Pix Liquida

二〇・〇

凡士林 Vaselin

五〇・〇

上爲軟膏塗布用

(五)

皮治樂 Pixrol

一〇・〇

凡士林 Vaselin

五〇・〇

上爲軟膏塗布用

(六)

皮可淨油膏 Benzoin Ointment

十管

(註) 本症內服藥以砒劑爲最有效。例如亞砒酸鉀液，砒鐵丸等均

可應用。

(附)紅色苔癬注射藥

所拉純 Solarson, 鐵開古地 Iron cacodylate.
 阿沙蒙 Arsamon, 新洒爾佛散 Neosalvarsan
 等。

七 尋常性疥瘡方

(一) 乙那弗安耳 Beta Naphtholum	1.0.0	(二) 昇華硫黃 Sulfur sublimatum	1.0.0	(三) 溜水 Aq dest	100.0
酒精 Spiritus	5.0.0	上混和以毛筆塗布其沈澱物		上為洗滌劑	
鉀石鹼 Sapo Kalinus	1.5.0	昇汞 Hydrargyrum bichloratum	0.2	沉降硫黃 Sulfur praecipitatum	5.0
甘油 Glycerin	5.0	樹膠漿 Macilago Gummi	5.0	炭酸鉀 Kalium carbonicum	2.0
		甘油 Glycerin	5.0	甘油 Glycerin	1.0.0
		杏仁水 Aq Pruni armeniacae	1.0.0	李蘭地 Brandy	2.0.0
酒精 Spiritus	1.5.0			上混和為軟泥，接連三夜貼於瘡面。每 晨洗滌後再擦前用之軟膏	
		(四) 昇華硫黃 Sulfur sublimat	4.0	亞鉛華 Zinc oxydatum	6.0
		甘油 Glycerin	1.0.0	滑石粉 Talcum	1.0.0
		溜水 Aq dest	1.0.0	上每夕塗布用	
		(五) 勃羅比東藥膏 Propidex	1管	上薄塗紗布，貼於患部，每日更換一二 次	
		(六) 亞來索而軟膏 Euresol Salbe	1管		

上爲患部塗布用

(七) 癩癰瘡塗布治療劑 *Zecamin* 一管

上藥膏塗於紗布後，貼於患部，每日一

(註)本症除局部治療外。亦可應用砒製劑。注意便通。並禁飲酒類及刺戟性食物。

(附)瘰癧注射藥

混合性瘰癧菌液 *Aene Vaccine combined.*

八 面皰方

(一) 鉀石鹼精 *Spiritus Sapo kalinus* 五〇・〇

上爲洗滌或塗布擦料

(二) 沉降硫黃 *Sulfur praecipitatum* 一〇・〇

李蘭地 *Brandy* 五〇・〇

拉凡大精 *Spiritus Lavendulae* 一〇・〇

甘油 *Glycerin* 一・五

上爲塗擦料

(三) 沉降硫黃 *Sulfur praecipitatum* 二五・〇

凡士林 *Vaseline* 一五・〇

綠石鹼 *Sapo viridis* 一五・〇

上爲軟膏，每日塗擦二三次，每次擦至發輕度之潮紅或熱感時拭去。再塗以中性軟膏

九 酒皰鼻方

(一) 伊克度 *Ichtyol* 三・〇

橄欖油 *Ol Olivarium* 三〇・〇

上爲塗布劑

(二) 沉降硫黃 *Sulfur praecipitatum* 一〇・〇

雷沙而辛 *Resorcin* 三・〇

亞鉛華 *Zinc oxydatum* 二五・〇

澱粉 *Amylum* 二五・〇

凡士林 *Vaseline* 一〇〇・〇

上混和塗布用

(三) 沉降硫黃 *Sulfur praecipitatum* 三〇・〇

甘油 *Glycerin* 一〇・〇

酒精 Alkohol

100.0

(四) 醋酸鉛液 Liq. Plumbum aceticum (2%) 100.0

上將沉澱以筆塗之

(註)上列硫黃劑用後。如發炎症症狀。則改用緩和和其他軟膏代之。

。迨炎症消退。再用硫黃軟膏。

(四) 亞來索而軟膏 Ung. Furessol

一管

上為患部塗布用

一〇 帶狀匱行疹方

(一) 亞鉛華 Zinc oxydatum

10.0

橄欖油 Ol. Olivarium

10.0

上為患部塗布用

(二) 硼酸軟膏 Ung. Acid. bor. cum

10.0

上為患部塗布用

(三) 亞鉛華 Zinc oxydatum

5.0

阿那雖信 Anaesthesin

5.0

凡士林 Vaseline

50.0

上混和為塗布用

上為卷包用

(五) 甘美羅爽液 Kamilosan (3%) 100.0

上為卷包用

(註)本症發現神經痛時。宜內服鹽酸規寧，阿司必林，安替正林，水揚酸鈉等解熱鎮痛劑。

一一 痒疹及皮膚搔癢症方

(1) 乙那弗安耳 Beta Naphhol

10.0

滑石 Talecum

10.0

鉀石鹼 Sapo Kali

10.0

凡士林 Vaseline

上每夕一回塗布

(二) 昇華硫黃 Sulfur Sublimat

10.0

木煤油 Pix liquida

10.0

鉀石鹼 Sapo Kali

40.0

滑石 Talcum 五〇〇

凡士林 Vaseline 四〇〇

上調和塗布用

(三) 昇華硫黃 Sulfur Sublimat 五〇〇

木煤油 Pix liquida 五〇〇

亞鉛華 Zinc oxydatum 五〇〇

凡士林 Vaseline 一五〇〇

上調和塗布用

(四) 阿拉伯樹膠 Gummi arabicum 五〇〇

石炭酸 Acid Carboicum 〇〇五

亞鉛華 Zinc oxydatum 一〇〇〇

甘油 Glycerin 三〇〇

溜水 Aq dest 一〇〇〇

上為糊劑(即粥劑)塗布用

(五) 薄荷腦 Menthol 二〇五

橄欖油 Ol Olivae 七〇五

羊毛脂 Lanolin 五〇〇

上為塗布用

(六) 石炭酸 Acid Carboicum 一〇〇

甘油 Glycerin 一〇〇〇

酒精 Alkohol 九〇〇

上為塗擦用

(七) 水揚酸 Acid Salicylicum 一〇〇

酒精 Alkohol 一〇〇〇

上為患部塗布用

(八) 安的拉索而 Anthrasol 一〇〇

凡士林 Vaseline 五〇〇

上為軟膏塗布用

(九) 灑爾膚 Sulfor 一瓶

上為塗擦用

(十) 皮治樂油膏 Pixrol Ointment 二管

上為塗擦用

(註)本症除局部療法外。亦可應用糠浴，利沙耳浴，硫黃浴，溫泉浴。此外內服溴素劑，砒劑，鈣劑，碘劑等亦有功效。

(附) 痒疹及皮膚搔癢症注射藥

癢可樂民 Joeromide，癢可樂 Jokolol，佑苦勞

民 Jokumomine · 阿芬尼而 Afenil · 皮溼固可
 靈 Glucolin-Broms · 氯化鈣注射液 Calcium
 chloride · 奧倫 Aolan · 來克丁 Lactin · 新洒爾
 佛散 Neo-Salvarsan 等。

一一一 天疱瘡方

- (一) 亞鉛華 Zinc oxydatum 二〇〇
 水揚酸 Acid Salicylicum 〇〇五
 澱粉 Amylum 三〇〇〇
 上研和爲撒布用
- (二) 亞鉛華軟膏 Ung. Zinc oxydatum 二〇〇〇
 上爲塗布用
- (三) 木煤油軟膏 Ung. Pix liquida 二〇〇〇
 上爲塗布用
- (四) 雷佛奴耳軟膏 Ung. Rivanol 二〇〇〇
 上爲塗布用
- (五) 脫呂帕弗拉文 Trypaflavine 一〇〇

亞鉛華 Zinc oxydatum 五〇〇

凡士林 Vaselin 五〇〇〇

上爲軟膏塗布用

(六) 賽勃他星藥膏 Dermoseplazine 二〇〇〇

上塗於紗布上，貼敷患部

(七) 土門奴耳軟膏 Tumenol-Ammonium (10%) 二〇〇〇

上爲患部塗布用

天疱瘡發炎症狀強劇時。宜用下列卷包劑

(八) 醋酸鉛液 Plumbum aceticum (2%) 二〇〇〇〇

上爲卷包用

(九) 賜福露液 Zephiran (0.2%) 二〇〇〇〇

上爲卷包用

(十) 甘美羅爽液 Kamilosan (2%) 二〇〇〇〇

上爲卷包用

(註) 天疱瘡倘水泡巨大時。宜先以消毒針刺破其內容。然後塗布藥品。較爲妥善。敷在性者亦可兼行糠浴，硫黃浴，明礬浴，或

過猛鹼鉀浴，利沙耳浴等。此外倘發其他全身症狀時。均不外對症治療。

(附)天疱瘡注射藥

克療病 Kriobin，退苦病 Tekupin，奧倫 Aolan
 • 來克丁 Lactin • 息那倫 Sinolen。
 劇甚之化膿性天疱瘡。可注射藥特靈化膿菌混合藥苗 Antipyrogenous Yaten Vaccine，貝靈化膿菌抗素 Antipyrogen-Behring，拍騰 Bolton 等。

一三 禿髮症方

(一) 克甲薩羅並 Chrysarobin

精製硫黃 Sulfur depuratum

雷沙而辛 Resorcin

凡士林 Vaselin

上為軟膏塗擦用

臨床經驗處方

(二) 昇汞 Hydrargyrum bichloratum 〇・三

肉荳蔻油 Ol Myristica 三・〇

坎他利斯丁幾 Tine Cantharides 一〇・〇

酒精 Alkohol 二〇・〇

上塗布用

(三) 番椒丁幾 Tine Capsici 二五・〇

甘油 Glycerinum 二五・〇

上外用塗擦

(四) 坎他利斯丁幾 Tine Cantharides 一〇・〇

石炭酸 Acid Carbolicum 二・〇

水揚酸 Acid Salicylicum 五・〇

蓖麻油 Ol Ricini 一〇・〇

酒精 Alkohol 八〇・〇

上為頭部塗布劑

(五) 雪克諾林 Gignolin 〇・一

甘油 Glycerin 五〇・〇

上為塗擦用

(六) 格來腦 Grenol 二〇・〇

以本藥加入溫水少許，攪和為塗布用

(七) 亞來索而 *Furesol*

一〇〇

肉荳蔻油 *Ol Myristica*

五〇〇

上為塗擦用

(八) 庇顛墨 *Pilminin*

二四片

上每日三次，每食後各四片

(註)本症宜細究其原因。倘係營養障礙，或貧血，衰弱等而起者。宜兼服強壯劑。

一四 黃癬及白癬方

(一) 水揚酸 *Acid Salicylicum*

五〇〇

酒精 *Alkohol*

五〇〇

甘油 *Glycerin*

五〇〇

上貼於黃癬痂除去部

(二) 克里薩羅並 *Chrysurubin*

五〇〇

水揚酸 *Acid Salicylicum*

二〇五

凡士林 *Vaselin*

三〇〇

上為軟膏塗布用

(三) 昇汞 *Hydrargyri bichloratum*

〇・一

酒精 *Alkohol*

五〇〇

上為塗擦用

(四) 白降汞 *Hydrargyri praecipitatum*

五〇〇

alba

次硝酸鉍 *Bismuth subnitricum*

五〇〇

凡士林 *Vaselin*

五〇〇

上為軟膏塗布用

(五) 焦性沒食子酸 *Acid pyrogallicum*

五〇〇

凡士林 *Vaselin*

五〇〇

上為軟膏塗布用

(六) 木煤油 *Pix liquida*

五〇〇

凡士林 *Vaselin*

一〇〇

上為軟膏塗布用

(七) 雪克諾林軟膏 *Ung. Cignolin*

二〇〇

上為患部塗布用

(八) 格來腦 *Grenol*

二〇〇

上藥加溫水少許攪勻爲塗布用

(九) 汚癬露 *Furo* 一管

上爲患部塗布用，每日一二次

(10) 賜福露液 *Liq. Zephiran (0.2%)* 三〇〇〇

上爲患部塗布用

(註)爪甲部黃癬或白癬之治療。宜於每日用銳利小刀。括去爪甲肥厚部之表面。以不出血爲度。然後再用藥塗布爲妥。

一五 頑癬方

(1) 綠石鹼 *Sapo viridis* 五〇〇〇

上爲洗滌用

(二) 苛性鉀 *Kali causticum* 一〇〇〇

溜水 *Aq dest* 二〇〇〇〇

上每日二次塗擦用

(三) 克里薩羅並 *Chrysarobin* 五〇〇〇

凡士林 *Vaselin* 五〇〇〇

上爲軟膏塗布用

(四) 沈降硫黃 *Sulfur praecipitatum* 五〇〇〇

那弗妥耳 *Beta Naphtholum* 一〇〇〇

鉀石鹼 *Sapo Kali viridis* 二〇〇〇〇

酒精 *Alkohol* 一〇〇〇〇〇

甘油 *Glycerin* 二〇〇〇

上混和爲塗布用

(五) 水揚酸 *Acid Salicylicum* 一〇〇〇

酒精 *Alkohol* 三〇〇〇〇

上爲水劑塗布用

(六) 雪克諾林軟膏 *Ung. Cignolin* 二〇〇〇〇

上爲患部塗布用

(七) 格來腦 *Trenol* 二〇〇〇〇

上藥加入溫水少許攪勻爲塗布用

(八) 汚癬露 *Furo* 一管

上爲患部塗布用，每日一二次

(九) 皮治樂軟膏 *Ung. Pixrol* 二〇〇〇〇

上爲患部塗布用

(10) 土門奴耳軟膏 *Ung. Tumenol-Ammonium*

臨床經驗處方

二〇二

• 新洒爾佛散 Neo-Salvarsan 等 •

一六 癩風方

(一)	立司丁 Ristin	上為患部塗布用	二〇・〇	(一)	水揚酸 Acid Salicylicum	五・〇
(二)	灑爾膚 Sulfur	上為患部塗擦劑	三〇・〇	(二)	鉀石鹼 Sapo Kalinus	一〇〇・〇
(三)	知其納耳 Thigenol	上為患部塗擦用	五〇・〇	(三)	水揚酸 Acid Salicylicum	二・〇
(四)	酒精 Alkohol	上為患部塗擦用	五〇・〇	(四)	雷沙而辛 Resorein	二・〇
(五)	司托勒索 Storaxol	上為患部塗擦用	三〇・〇	(五)	沉降硫黃 Sulfur Praecipitatum	一〇・〇
(六)	酒精 Alkohol	上為患部塗擦用	三〇・〇	(六)	凡士林 Vaseline	二〇・〇
(七)	賜靈露 Zephiran	上為患部塗擦用	〇・一	(七)	羊毛脂 Lanolin	七〇・〇
(八)	酒精 Alkohol	上為患部塗擦用	五〇・〇	(八)	上外用塗擦	
(九)	(附)頑癬注射藥			(九)	乙那弗安耳 Beta Naphtholum	五・〇
(十)	奧倫 Aolan・來克丁 Lactin・息那倫 Sinolen			(十)	酒精 Alkohol	滴量
(十一)	以諾茶而 Enesol・癬瘡清血漿 Trichophlytin			(十一)	鉀石鹼 Sapo Kalinus	一〇〇・〇
(十二)				(十二)	上為塗擦劑・每日一次	
(十三)				(十三)	克里薩羅並軟膏 Ung. Chrysarabin	二〇・〇

上爲塗擦用

(五) 焦性沒食子酸軟膏 Ung. Acid Pyrogallie

110.0

上爲塗擦用

(六) 雪克諾林軟膏 Ung. Gignolin

110.0

(七) 格來腦 Grenol

上藥加入溫水少許攪勻爲塗布用

(八) 汚癒露 Furo

上爲患部塗布用，每日一二次

(九) 皮可淨藥膏 Benecozin Liq.

上爲患部塗布用

一七 疥瘡方

(一) 硫黃軟膏 Ung. Sulfur

上每日塗擦用

(二) 乙那弗安耳 Beta Naphtholum

臨床經驗處方

綠石鹼 Sapo viridis

50.0

滑石 Talcum

10.0

凡士林 Vaselin

上每日塗擦，四日後入浴

(三) 昇華硫黃 Sulfur sublimatum

白堊 Calcium carbonicum praecipitat

綠石鹼 Sapo viridis

甘油 Glycerin

(四) 祕魯脂 Perubalsam

流動蘇合香 Styrax liquid

上混和爲塗擦用

(五) 滅疥 Mitigal

上爲塗擦用，每日一次

(六) 立司丁 Ristin

上爲塗擦用，每日一次

(七) 掃洗汚兒 Sosyol

上爲塗擦用

(八) 亞施加皮藥 *Ascabiol*

上為塗擦用

一瓶

(九) 灑爾膚 *Sulfor*

上為塗擦用

一瓶

(十) 知其納耳 *Thigenol*

甘油 *Glycerin*

五〇〇

五〇〇

上為塗擦用

(十一) 司特勒索 *Stornxol*

甘油 *Glycerin*

五〇〇

五〇〇

上為塗擦用

(附) 疥瘡注射藥

疥瘡劇烈搔癢。亦可注射癢可樂民 *Jocoronide*，癢可樂 *Jokolol*，佑苦勞民 *Jokunomine*，新洒爾佛散 *Neo-Salvarsan* 等。

一八 頭虱及陰虱方

(1) 灰白軟膏 *Ung. Hydrargyri cinereum*

凡士林 *Vaseline*

一五〇
一五〇

上混和為塗布用

(二) 白降汞軟膏 *Ung. Hydrargyri Praecipitata*

album

一一〇

凡士林 *Vaseline*

一一〇〇

上混和為塗布用

(三) 庫普來克司 *Cuprex*

一一五〇

上為患部塗擦用

(四) 千倍昇汞水 *Sublimat Lösung (0.1%)*

一〇〇〇

上為洗滌用

一九 狼瘡及皮膚結核方

詳見外科劑處方中。

二〇 腺病性苔癬方

(1) 肝油 *Ol. Jecoris*

五〇〇

凡士林 Vaselin

五〇・〇

上為軟膏塗布用

(11) 亞砒酸鈉液 Liq Nat. Arsenicosum 100・0

亞麻仁油 Ol Lini 100・0

單鉛硬膏 Emp. Lithargyri 100・0

上調和為塗布用

(註)本症以改善患者營養為最要。宜常服肝油，碘化銲等強壯劑，參閱小兒科劑中之腺病處方。

一一 惡液質性瘡方

內服用強壯劑處方・局部療法。可行利沙耳等溫浴，或照尋常性瘡瘡處置。

一二 癩病(麻瘋)方

(1) 大楓子油 Ol Gynocardiæ 100・0

橄欖油 Ol Olivarum 1000・0

臨床經驗處方

二〇五

上為塗擦劑

(11) 焦性沒食子酸軟膏 Ung. Acid pyrogallicum 1100・0

上為塗布用

(12) 克雷沙武丸 Kresot pills (0.05) 卅粒

上每日三次，每次二粒

(13) 亞砒酸鉀液 Liq Kali Arsenicosum 1100・0

龍膽丁幾 Tinc Gentianæ 1100・0

糖漿 Sirup. simplex 1000・0

溜水 Aq dest 1000・0

上每日三次，二日分服

(註)癩病除藥物治療外。病勢蔓延迅速時。亦可應用結節切除手術，燒灼，腐蝕等法。防止其進行。

(附)癩病注射藥

大楓子油 Ol Gynocardiæ (與橄欖油等分混和為注射料)，碘化大楓子油 Jodo-Maphanol，

安癩露 Antieprol・癩比路耳 Leprol・沙克拿

Solgnal・納斯丁 Nasin・安癩福 Autrophos・

脫力發 Triphal·犀特諾加林 Hydnoecarin 等·

二二三 魚鱗癬方

(一) 鉀石鹼 Sapo Kalinus 五・〇

上溶於溫水為洗滌用

(二) 水揚酸 Acid Salicylicum 五・〇

精製硫黃 Sulfur depuratum 一〇・〇

綠石鹼 Sapo Viridis 五〇・〇

豚脂或凡士林 Adeps Sulis od. Vaselin 二〇〇・〇

右為軟膏，每夕塗擦患部，早晨以石鹼洗去之

(三) 乙那弗妥耳 Beta-Naphtholum 二・〇

凡士林 Vaselin 五〇・〇

上為軟膏塗布用

(四) 伊克度 Ichtyol 二・〇

水揚酸 Acid Salicylicum 一・〇

焦性沒食子酸 Acid pyrogallicum 一・〇

鉀石鹼 Sapo Kalinus 二〇・〇

凡士林 Vaselin 二〇・〇

上調和為塗布用

(附) 魚鱗癬注射藥

迫沙脫落 Psorhanol

二二四 母斑方

(1) 昇汞水 Sublimat Lösung(1%) 二〇・〇

上為患部塗布劑

(註)本症之另一局部療法。可切布片約與母斑大。浸昇汞水貼母斑部。約經三四小時。俟表皮發炎形成水泡時。刺破水泡之內容。再撒布硼酸粉或亞鉛藥粉。可奏一時之效。本症尙無根治良藥。此外電氣，燒灼，切除等法亦可應用。

二二五 雀斑方

(1) 石炭酸 Acid Carbohicum 適量

上為患部腐蝕用

(11) 苛性鉀 *Kali causticum*

11.0.0

溜水 *Aq. dest.*

110.0.0

上為患部腐蝕用

(12) 苛性鉀 *Kali causticum*

100.0.0

煨製石灰 *Calcaria usta*

100.0.0

上研為細末，臨用以少許酒精調和，點

於患部

(四) 海勃拉氏剝離膏 *Ung. Diachylon Hebrae*

100.0.0

上剪成小圓形貼於患部

(註)本症之又一治療。有用糯米浸於一〇%苛性鉀液內。經數小時。迨糯米透明後。研為糊狀。塗於患部。暫時後用水洗去。

二六 肝斑方

本症宜細究其原因而施治療。普通可參照母斑局部療法。倘皮膚有灼熱及表皮剝脫傾向時。改塗

緩和性軟膏。

二七 疣贅方

(1) 濃硝酸 *Acid Nitricum*

適量

上用玻璃桿塗布

(2) 石炭酚 *Acid Carbohcium*

適量

上為患部塗布用

(3) 乳酸 *Acid Lacticum*

1.0.0

水揚酸 *Acid Salicylicum*

3.0.0

可羅亨 *Collodium*

5.0.0

上用棉球蘸後塗布

(4) 苛性鉀液 *Liq. Kali causticum (10%)*

10.0.0

上用棉球蘸後為塗布用

(5) 亞砒酸 *Acid Arsenicosum*

0.0.05

水銀軟膏 *Grüne Quecksilbersalbe* 10.0.0

上調和外用。以綳帶固定之。至表皮剝

脫時止用。並除去軟膏

(註)塗布上列藥品時。須注意周圍皮膚全部。最好用棉花包蔽。以防延及。

本症內服藥。可應用亞砒酸鉀液，砒鐵丸等。再老人性疣贅。

可改用二〇%單寧酸軟膏或克里薩羅維軟膏塗布。

二八 胼胝腫及鷄眼方

- (一) 水揚酸硬膏 Empl. Salicylicum 一〇・〇
 上塗於厚布片上，貼於患部，每日更換
 一二次
- (二) 海勃拉氏軟膏 Ung. Hebrae 一〇・〇
 上塗於厚布上，剪成小圓形，貼於患部
- (三) Picks 氏硬膏 Picks plaster 一小方
 上剪成適當圓形貼於患部
- (四) 石鹼硬膏 Empl. Sapo 五・〇
 水銀硬膏 Empl. Hydrargyrum 五・〇
 上塗於布片後貼用，每日更換，俟表皮
 軟化剝離爲度
- (五) 水揚酸 Acid Salicylicum 五・〇
 印度大麻膏 Ext. Cannabis indicae 一・〇
 可羅亨 Collodium 五〇・〇
 上用棉球蘸藥，每日塗布一二次。

二九 紅斑性狼瘡方

- (一) 水銀硬膏 Empl. Hydrargyri 一〇・〇
 上藥塗厚布上，貼於患部
- (二) 水揚酸硬膏 Empl. Salicylicum 五・〇
 石鹼硬膏 Empl. Sapo 五・〇
 上混和塗布於厚布片，貼於患部
- (三) 碘化鉀 Kali Jodatium 五・〇
 碘 Jod 五・〇
 甘油 Glycerin 二〇・〇
 上爲塗布用
- (四) 水揚酸 Acid Salicylicum 一・〇
 焦性沒食子酸 Acid Pyrogallicum 二・〇
 凡士林 Vaseline 二〇・〇
 上爲塗布用
- (五) 伊克度 Ichtyol 一〇・〇
 水揚酸 Acid Salicylicum 二・〇
 雷沙而辛 Resorcin 五・〇

凡士林 Vaselin

五〇・〇

上為塗布用

(註)本症之內服藥。宜用鹽酸規寧，砒劑，鐵劑，克雷沙忒等。

三〇 尋常性白斑(白癜風)方

(一) 伊克度 Ichtyol

三・〇

硝酸銀 Argent. nitricum

〇・三

酒精 Alkohol

三〇・〇

過鹽化鐵 Ferri sesquichlorat

〇・二

甘油 Glycerin

一〇・〇

上為塗布用，每日一次

(二) 伊克度 Ichtyol

一・五

焦性沒食子酸 Acid Pyrogallicum

三・〇

酒精 Alkohol

三〇・〇

上為塗布用，每日一次

(三) 水揚酸 Acid Salicylicum

五・〇

鹼石鉀 Sapo Kalium

一〇〇・〇

上朝夕塗擦患部

臨床經驗處方

二〇九

(四) 乙那弗妥耳 Beta-Naphtholum

五・〇

酒精 Alkohol

適宜

綠石鹼 Sapo viridis

一〇〇・〇

上為塗擦用

(五) 雪克諾林軟膏 Ung. Cignolin

二〇・〇

上為患部塗布用

(六) 格來腦 Grenol

二〇・〇

上藥加溫水少許攪勻塗布用

(七) 汚癒露 Euro

一管

上為患部塗布用，每日一二次

(八) 皮可淨軟膏 Ung. Benzozin

一管

上為局部塗布用

(註)本症亦有沃度丁幾，芫菁丁幾(斑貓丁幾)，發泡膏，石炭酸等塗布。以促色素之形成。

三一 鞏皮症方

(一) 水銀軟膏 Ung. Hydrargyri cinereum

臨床經驗處方

二一〇

上為患部塗布用

- (一) 水揚酸硬膏 Empl. Salicylicum 五〇〇
- 石鹼硬膏 Empl. Sapo 五〇〇

上混和塗於厚布片，貼於患部

- (二) 伊克度 Ichtyol 二〇〇
- 水揚酸 Acid Salicylicum 一〇〇
- 焦性沒食子酸 Acid Pyrogallicum 一〇〇
- 鉀石鹼 Sapo Kalinus 二〇〇
- 凡士林 Vaseline 二〇〇

上調和為塗布用

- (四) 替烏西拿明 Thiosinamin 二〇〇
- 甘油 Glycerin 四〇〇
- 酒精 Alkohol 一六〇

上為注射料。每日或隔日注射於皮下
一筒。

(註)本症內服藥。宜用強壯劑。例如肝油，砒劑，鐵劑，規寧劑，碘劑等。均可常服。此外局部按摩法，電氣療法，蒸氣浴

，硫黃浴等。亦可為輔助治療。

(附)鞏皮症注射藥

尿素體滲納明 Thiosinamin-Urea (即尿素替烏西拿明現成注射液)・迫沙脫落 Psolhanol・

三二一 蕁麻疹方

- (一) 醋酸 Acid Aceticum 五〇〇
- 酒精 Alkohol 二〇〇

上為洗滌劑

- (二) 水揚酸 Acid Salicylicum 一〇〇
- 酒精 Alkohol 五〇〇

上為塗布用

- (三) 薄荷腦 Menthol 一〇〇
- 酒精 Alkohol 五〇〇

上為塗布用

- (四) 替摩耳 Thymolum 五〇〇
- 酒精 Alkohol 五〇〇

上爲塗布用

(五) 硫酸鎂 Mag. sulfuricum

二〇・〇

苦味丁幾 Tine amara

一・五

糖漿 Sirup simplex

一〇・〇

溜水 Aq dest

一〇〇・〇

上一日三次分服

(六) 薩羅耳 Solol

二・〇

上分三包・一日分服

(七) 鹽酸麻黃素片 Ephedrine hydrochloric.

Tablets

六片

上每日三次，每次一片

(八) 拉西特靈片 Racedin Tab.

六片

上每日三次，每次一片

(九) 固元綠鈣片 Comprehen Calcium chlorat

六片

上每日三次，每次一或二片

(10) 色而伐納 Selvorat

一瓶

上每日三次，每次一茶匙

臨床經驗處方

一一一

(註)本症其他內服藥。亦可用克雷沙忒，那天答林，或安答正林等解熱劑。此外兼行曹達浴，硫黃浴，利沙耳浴，明礬浴亦有效。

(附) 蕁麻疹注射藥

氯化鈣注射液 Calcium chloride・癢可樂民 Joco romide，癢可樂 Jokolol，佑苦勞民 Jokrom-ine，皮溼固可靈 Glucolin-Broms，阿芬尼而 Afenil，亞的克蒙注射液 Urticannon Injection。

三三 急性限局性皮膚水腫方

局部用5%水揚鈉與1%重碳酸鈉混和液，或醋酸鉛液等爲罨包劑。內服藥可用鹽酸規甯，阿司必林，安替疋林，水揚酸鈉等。此外阿刀邊，葡萄糖鈣，解迫精注射液，喝斯百靈等亦可注射。

三四 多形滲出性紅斑方

局部用亞鉛華澱粉撒布。或亞鉛華橄欖油塗布。兼用硼酸水或醋酸鉛液等溫性罨包。對水疱或膿

拖可塗布緩和性硼酸軟膏，白降汞軟膏，雷佛奴耳軟膏等。注射藥亦可應用氯化鈣，葡萄糖鈣等。

三五 結節性紅斑方

局部可用伊克度軟膏，水銀軟膏等塗布。內服藥為水揚酸鈉，阿司必林，規甯等。慢性者可內服碘製劑。

三六 腫瘍方

參閱外科劑處方中。

三七 藥疹方

暫停內服藥。局部施防腐性撒布劑或軟膏塗布。一方兼行沐浴。以亢進新陳代謝。亦有良效。

三八 多汗症方

(一)	單甯酸 Acid Tannin	二〇〇
(二)	酒精 Alkohol	一〇〇〇
	上每日多次塗擦用	
(三)	鉻酸 Acid Chromicum	五〇〇
	酒精 Alkohol	一〇〇〇
	上為塗擦劑	
(四)	明礬 Alumin	二〇〇
	滑石 Taleum	一〇〇
	上為撒布用	
(五)	水揚酸 Acid Salicylicum	五〇
	硼酸 Acid Boricum	一〇〇
	酒石酸 Acid Tartaricum	一〇〇
	亞鉛華 Zinc oxydatum	四〇〇
	滑石 Taleum	四〇〇
	上研和為撒布用	
	阿加而辛 Agaricin	〇〇〇
	乳糖 Sacch lact	〇〇三
	上為一包・臨臥頓服	

(六) 樟腦酸 Acid Camphoricum 1.0

上為一包，每夜臨臥服

(七) 阿第弗林 Adiphorin 0.5

上為一包，每夜臨臥服

(八) 泰和庚 Taugen 1.0

上臨睡前頓服

(附)多汗症注射藥

硫酸阿忒羅品 Atropin sulphate.

三九 腋臭(腋窩多汗症)方

(一) 達萊蘭 Damola 1管

上每日為塗布用

(二) 五%硼酸水 5% Acid Chromicum 10.0

10%福買林水 10% Formalin 10.0

酒精 Alcohol 10.0

拉凡大精 Spiritus Lavendulae 10.0

上為塗擦用

四〇 無汗及少汗症方

(一) 鹽酸必羅卡而賓 Pilocarpin hydrochloric

0.01

乳糖 Sacch Lact 0.3

上一次頓服

(二) 卡米兒花 Flores Chamomillae 10.0

上浸於熱水中服用

(三) 阿司必林 Aspirinum 1.0

上一次頓服

(四) 飛那西汀 Phenacetin 0.5

上一次頓服

(五) 安替飛李林 Antifebrin 0.2

上一次頓服

(六) 水揚酸鈉 Nat. Salicylicum 0.5

上一次頓服

(註)本症原因頗多。最妙細察其原因而施根本治療。

(附)無汗即少汗症注射藥

鹽酸必羅卡而賓 Pilocarpin hydrochloric.

四一 爪甲黃癬及白癬方

局部療法。見於黃癬及白癬章中。

四二 爪甲炎方

初起用伊克度軟膏等消炎藥塗布。如係梅毒性者。宜行驅梅毒療法。如已化膿。則行手術切開。

四三 爪甲萎縮症及爪甲彎曲症

方

本症原因頗多。局部治療大概無甚良效。宜細加診斷，而行根本療法。

第八章 花柳科處方

一 初期梅毒(硬性下疳)方

(一) 水銀軟膏 Ung. Hydrargyri cinereum 10.00

上為塗布用

(二) 白降汞軟膏 Ung. Hydrargyri album 10.00

上為塗布用

(註)硬性下疳倘已潰爛時。宜改用下列撒布劑。

(三) 甘汞 Hydrargyrum chloratum 1.00

次硝酸鉍 Bismut subnitricum 10.00

上為撒布用

(四) 沃度仿 Jodoform 5.00

硼酸 Acid Boricum 5.00

上為撒布用

(五) 樹歐仿 *Vioform*

三〇〇

上為撒布用

(六) 甘汞 *Hydrargyrum chloratum*

五〇〇

代馬妥耳 *Dermatol*

五〇〇

上為撒布用

(七) 過錳酸鉀 *Kali Permanganicum*

〇〇一

溜水 *Aq dest*

一〇〇〇〇

上為撒布用

(八) 石炭酸 *Acid Carboicum*

一〇〇〇

溜水 *Aq dest*

一〇〇〇〇

上為洗滌用

(九) 昇汞 *Sublimat*

〇〇〇五—〇〇一

溜水 *Aq dest*

一〇〇〇〇

上為洗滌用

(10) 斯多凡所耳 *Stovarsol*

八片

第一日服二片，第二三日各三片

(11) 斯砒螺刺脫 *Spirocid*

九片

每日三次各一片，三日分服

二 混合性下疳方

局部治療同上。

三 梅毒性橫痃方

(一) 沃度丁幾(碘酒) *Tinc Jodatum* 一〇〇〇

上以棉球蘸塗患部

(二) 伊克度軟膏 *Ung. Ichtyol* 一〇〇〇

上為塗布用

(三) 水銀軟膏(灰白軟膏) *Ung. Hydrargyri cinereum* 一〇〇〇

上為塗布用

(四) 醋酸鉛液 *Liq Plumbum aceticum* (2%) 二〇〇〇〇

上振盪倒於棉花，使溼潤後裹包患部，

頻頻更換

臨床經驗處方

二一五

(註)本症除可注射酒爾佛散(六〇六)外。亦可應用奧倫，來克丁，葡白西特等。

四 第二期梅毒方

(一) 水銀軟膏 Ung. Hydrargyri cinereum

三〇・〇

上為塗擦用(用法列下)

(註)取軟膏一—五瓦。置手掌中。輕擦患處十五至二十分鐘。次以棉花蔽於該部。纏以細帶。至翌日將細帶除去。洗滌清潔。更於患處塗擦。如是由第一日至第六日止。第七日暫停而行全身浴。其塗擦部位之順序如下。

- 第一日 左腋中央內面 第二日 右腋中央內面
- 第三日 左股內面 第四日 右股內面
- 第五日 左胸部 第六日 右胸部
- 第七日 全身浴 第八日 再以同一順序反覆塗擦

(二) 梅可停 Mercutin 三〇・〇

上為塗擦用

(三) 昇汞 Sublimat 五・〇

上入溫湯中，洗浴用

(四) 水銀硬膏 Empl. Hydrargyri 五・〇

上塗於厚布上，貼於患部

第二期梅毒之內服處方。摘要舉述如下

(一) 甘汞 Calomel 〇・〇三

乳糖 Sacch. lact. 〇・三

上為一包，朝夕各服一包

(二) 單甯酸水 Hydrargyrum tannicum 三・〇

甘草膏及末 Succus n. Pulv. liquoritiae 適量

上為六十九，一日三次，每食後一丸至二丸

(三) 水揚酸水 Hydrargyrum salicylicum 〇・六

甘草膏 Pulv. liquoritiae 適量

龍膽管 Ext. Gentianae 適量

上為六十九，一日三次，每食後一丸

(四) 碘化汞 Hydrargyrum Jodatum 三・〇

甘草單及末 Succus n. Pulv. liquoritiae 適量

上為九六十粒，一日三次，每食後一粒

(五) 昇汞 Sublimat 〇・五

阿片膏 Ext. Opium 〇・一

甘草膏及末 *Succus n. Pulv. Iiquiritiae*

適量

(六) 水銀丸 *Pilulae Hydrargyrum*

十八粒

上為百丸，一日一粒，逐次增至九粒
上每日三粒，每次一粒

(七) 撒末丸 *Pilulae Hydrargyri salicylicum*

十八粒

上每日三次，每次一粒

(註) 汞劑內服極易惹起水銀蓄積等副作用。不如應用塗擦或注射為妙。

五 第三期梅毒方

(一) 碘化鉀 *Kali Jodatum*

三〇〇

苦味丁幾 *Tinc amara*

三〇〇

糖漿 *Sirrup simplex*

一〇〇〇

溜水 *Aq dest*

一〇〇〇

上一日三次，二日分服

(二) 碘化鉀 *Kali Jodatum*

三〇〇

龍膽末及膏 *Pulv. et Ext. Gentianae* 適量

上為六十九，一日二次，每服五至十粒

(三) 亞歷佛耳 *Alival*

十八片

上每日三次各一片

(四) 酒乍錠 *Sajodin*

三〇片

上每日三次，每次二片

(五) 一〇%沃度拏 *Jodipin (10%)*

一瓶

每日三次，每一食匙

(六) 利破沃典 *Lipojodin*

十八片

上每日三次各一片

(七) 碘斯推靈片 *Jodosstarin Tab.*

十八片

上每日三次，每次一片

(八) 喬碘鈣 *Jodical*

十八片

上每日三次，每次二片

(九) 安度沃碘 *Fnojodin*

十八片

上每日三次，每次二片

(十) 提及道爾 *Dijodyl*

十八粒

上每日三次，每次一膠丸

臨床經驗處方

二一七

- (二) 約達洛斯 Jodalose 六〇滴
 龍膽丁幾 Tinc Gentianae 一・五
 橙皮糖漿 S. auranti corticis 一〇・〇
 溜水 Aq dest 一〇〇・〇
 上每日三次，二日分服

(註) 碘劑雖為第三期梅毒之特效藥。但對於第二期梅毒後期所發身熱，頭痛，骨痛，關節炎等。亦能奏效。

梅毒患者身體羸弱，或症狀急速增進，又可參用強壯療法。處方舉例如下。

- (一) 含碘碘化鐵 Ferri Jodat saccharat 一・〇
 乳糖 Saccha lacticum 一・〇
 上分三包，一日分服

- (二) 林檎鐵丁幾 Tinc Ferri pomati 三・〇
 亞砒鉀液 Liq Kali arsenicosum 一二滴
 苦味丁幾 Tinc Amara 一一・〇
 溜水 Aq dest 一一〇〇・〇
 上每日三次，每食後一次，二日分服

- (三) 亞砒酸 Acid Arsenicosum 〇・〇〇一

- 還元鐵 Ferri Reductum 〇・〇一
 龍膽末 Pulv Gentianae 適量

上為丸一粒，一日三次，自一至五粒

- (四) 碘化鐵糖漿 Sirup Ferri jodat 一五・〇

- 亞砒鉀液 Liq Kali arsenicosum 〇・五

上每日三次，每食後服一次

- (五) 沃度化露多時 Jofferratoso 一瓶

上每日三次，每次一食匙

- (六) 碘鐵補血汁 Jod Ferrin 一瓶

上每日三次，每次一湯匙

(註) 其他強壯新藥頗多。可參閱強壯劑處方。

(附) 梅毒注射藥

- 酒爾佛散 (六〇六) Salvarsan, 新酒爾佛散
 (新六〇六) Neo-Salvarsan, 新銀酒爾佛散 Neo
 -Silbersalvarsan, 蘇爾佛克石酒爾佛散 Sulfo
 oxy Salvarsan, 克靈九一四 Ne -Itrarsenan
 , 皮隆氏九一四 Novarsenobenzol "Billon",
 紐卡西文 Neokharisvan, 新梅毒剋 (羅氏九一

四) Neo-Mesarca, 新斯必類如神 Neo-Spirarsen, 撈源殺而淨 Luensarsin, 新惜花散 Neo-Sypharsan, 新消梅毒 Neosarvas。

妙婉洒爾佛散 Myo-Salvarsan, 聖露洒爾佛散 Solu-Salvasan, 妙婉益啦梅佐兒 Myocharisoli, 肌安惜花散 Thio-Sypharsan, 亞散第拉 Ace-tylarsan, 阿米拿而霜 Amiraran。

(註)以上均係砒製劑注射藥。初期梅毒。最為適用。其餘二期三期梅毒。亦有功效。惟對後期梅毒。宜與鉍劑或碘劑合併治療。倘遇神經梅毒。則以改用膠絡惜花滅 Neurosyphamide 為宜。

以諾茶而 Fnesol, 梅掃淨 Mersen, 拿佛阿色維 Novasural, 洒利末 Salyrgan, 伊格羅新 Igrosine。

(註)以上水銀製劑注射藥。應用於二期梅毒。較為適當。

梅內融 Mirion, 安妥碘 Eufodon, 碘化鈣 Calci-um Jodatium, 亞歷佛耳液 Alival, 沃度拏 Jodipin, 約達山布丁 Jodasepine, 喬託碘 Jolo-

din, 育度格羅碘 Jodoglutina, 鉍是無倫 Wismulen, 嘉色鉍 Gabis, 畢斯莫蓋拿耳 Bismogenol, 鉍是莫撒而 Bismosal, 賽鉍司母 Thio-Bismol, 品泰皮 Bentabi, 鉍治梅毒 Bismudol, 新安立生 Neo-Olesal, 速柳脫落 Solutanol, 肝製鉍 Hepbi, 鉍治梅毒 Bismoxil。

六 先天梅毒 (遺傳梅毒) 方

(一) 甘汞 Calomol 1.0.0
乳糖 Sacch lact 1.0.0

上為十包, 朝夕各一包 (四歲以下小兒酌減其量)

(二) 碘化汞 Hydrargyri jodatium 0.2
白糖 Sacchar alba 1.0.0

上為十五包, 每朝晚各一包

(三) 蘆丹 Iudin 十二粒
上一日三次, 每次一粒

(四) 蘆丹糖漿 *Ludin Sirup* 100.0

上一日三次，每次一茶匙

(五) 水銀軟膏 *Ung. Hydrargyri ceneruum* 1.0

凡士林 *Vaselina* 11.0

上為十次塗擦，每日二次（應用於一二

歲小兒，但不宜久用）

(六) 昇汞 *Sublimat* 5.0

鹽化銨 *Ammonium chloratum* 11.0

溜水 *Aq. dest.* 1100.0

上為三次浴劑

(七) 赤降汞軟膏 *Ung. Hydrargyri oxydat.*

rubrum 10.0

上外用（用於口粘膜膿疱，或口角鼻翼

裂傷）

(附) 先天梅毒注射藥

小兒用阿散米拿注射液 *Arsaminol en Medicine*

Infantile · 小兒用亞散第拉 *Acetylarsan Infan-*

file.

七 男子淋病方

(一) 硼酸水 *Aq. Acid. Boricum* (2%) 50.0

上為尿道洗滌劑

(二) 過錳酸鉀液 *Liq. Kali Permanganicum*

(0.1%) 50.0

上為尿道洗滌劑

(三) 蛋白銀液 *Protargol Lösung* (0.5—2%)

110.0

上為尿道注入劑（由輕量用起，逐漸增

加）

(四) 硝酸銀液 *Argent. nitricum* (0.2—0.5%)

110.0

上為尿道注入劑（注意同上）

(五) 硫酸鋅液 *Zinc. sulfuricum* (0.2—0.5%)

110.0

上爲尿道注入劑(注意同上)

(六) 硫酸銅液(Cuprum sulfuricum(0.2-0.5%)) 二〇〇〇

上爲尿道注入劑(注意同上)

(七) 亞耳敗近 Albargin 〇・一〇〇・二

溜水 Aq dest 一〇〇〇〇

上爲尿道注入劑・每次一〇—二〇西西

(八) 海各農 Hegnon 一片

溜水 Aq dest 五〇—一〇〇〇

上爲尿道注入劑・每次一〇—二〇西西

(九) 雷佛奴耳 Rivanol 〇・一

溜水 Aq dest 一〇〇〇〇

上爲尿道注入劑・每次一〇—二〇西西

(十) 次硝酸鉍 Bismut. subnitricum 四〇〇

溜水 Aq dest 二〇〇〇〇

上爲尿道注入劑・臨時時振盪

(十一) 次硝酸鉍 Bismut. subnitricum 三〇〇

甘油 Glycerin 七〇〇

臨床經驗處方

三%硼酸水 Aq. Acid Boricum (3%) 一〇〇〇〇

上爲尿道注入劑・臨時時振盪

(十二) 硫酸鋅 Zinc Sulfuricum 一〇〇

醋酸鉛 Plumbum aceticum 一〇〇

溜水 Aq dest 二〇〇〇〇

上爲尿道注入劑・臨時時振盪

(註)見淋病初起不宜洗滌或注入。上法最妙於急性症狀稍退。在亞急性或慢性時用之。

八 淋病內服方

(一) 白檀油 Ol Santali 〇・五

上裝入膠囊・與同量三個・一日分服

(二) 戈諾山 Gonosan 四粒

上每日三四次各二粒

(三) 薩梯耳丸 Santyl 十八粒

上每日三次・每次二粒

(四) 歐布他爾 Obatal 十八粒

二二一

臨床經驗處方

1111

- | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----------------------------|--------------|--|--|
| (五) | 安樂穩 Arhovin | 上每日三次，每次二粒 | 十八粒 | | |
| (六) | 科派巴膠囊或藥片 Cap. od. Tab. Caputivae | 上每日三次各二粒 | 十八片 | | |
| (七) | 包尅淋 Buccosperin | 上次日三次，每次二顆或二片 | 十二片 | | |
| (八) | 療濁病 Neotropin | 上每日二次，每次一至二片 | 十八片 | | |
| (九) | 烏羅透賓片 Urotropin Tab. | 上每日三次，每次二至三片 | 十二片 | | |
| (十) | 海而密安 Helmitol | 上每日三次，每次二片 | 六片 | | |
| (二) | 午乏午耳西藥 Folia Uvae Ursi | 上每日三次，每次二片 | | | |
| (三) | 獅牌藥用美趣靈藍片 Methylenblau medii | 上一日六次分服 | | | |
| | | | (一五・〇)1000・〇 | | |
| (一) | 鹽化樟腦 Camphor monobromat | 上每日三次，每次二片 | 十八片 | | |
| (二) | 白糖 Sacch alba | 上分三包，一日分服 | 一・五 | | |
| (三) | 烏羅透賓 Urotropin | 上每日三次，每次一格，二日份(排尿不暢或尿意頻數時用) | 三・〇 | | |
| (四) | 醋鉀酸 Kali acieici | | 四・〇 | | |
| (五) | 苦味丁幾 Tinc amara | | 三・〇 | | |
| (六) | 糖漿 Sirup simplex | | 一〇・〇 | | |
| (七) | 溜水 Aq dest | | 一〇〇・〇 | | |
| (八) | 啞華葉素 Uvaresol | | 六・〇 | | |
| (九) | 烏羅透賓 Urotropin | | 三・〇 | | |
| (十) | 糖漿 Sirup simplex | | 一〇・〇 | | |
| (二) | 溜水 Aq dest | | 一〇〇・〇 | | |
| (三) | 溴化樟腦 Camphor monobromat | | 〇・三 | | |
| (四) | 白糖 Sacch alba | | 〇・五 | | |

上爲一包，與等量三包。一日分服（陰莖有疼痛性勃起時用）

(一七) 溴化鉀 *Kali bromatum*

1.5

烏羅透賓 *Urotropin*

1.5

糖漿 *Sirup simplex*

5.0

溜水 *Aq dest*

100.0

上一日三次分服（同上）

(一八) 麥角丁幾 *Tine Ergotin*

1.5

上加入藥水中，一日分服（血淋時用）

淋病新藥甚多。附述處方如下。

(一) 烏利龍 *Uleron*

1.0片

上每日三次，每次二片

(二) 大健瓜 *Dogeman*

1.0片

上初服每日六次，第三第四減爲四次，

第五第六日減爲二次，第七日減爲一次，

每次各一片

(三) 洛太龍 *Rodlone*

1.0片

上每日三次，每次一或二片

(四) 優龍 *Yuron*

二〇片

上每日三次，每次二片

(五) 百浪多息片 *Prontosil*

二〇片

上每日三次，每次一或二片

(六) 滂日爾 *Ponsil*

二〇片

上每日三次，每次一或二片

(七) 擔疾兒 *Tusil*

二〇片

上每日三次，每次一或二片

(八) 百膿清 *Pronzin*

二〇片

上每日三次，每次二片

(九) 殺鏈龍 *Sulfoninon*

十二片

上每日三次，每次一或二片

(一〇) 比力大 *Pyridal*

十二片

上每日三四次，每次一至二片

(一一) 壓白息 *Albaucid*

十二片

上每日三次，每次二片

(一二) 烏龍太 *Urontal*

十二片

上每日三次，每次一片

(一) 配力定片 Pyridium 十二片

上每日三次，每次一至二片

(二) 必可尅淋 Picochroma 十八粒

上每日三次，每次一至二膠囊

(三) 亞萊華勒 Arheol 十二片

上每日三次，每次二片

(四) 護爾頗靈 Uripurin 十二片

上每日三次，每次二片

(註)淋病不易根治。除藥物療法外，亦有賞用透熱電療法等理學的輔助治療。此外保守安靜。注意攝生。亦屬重要。

(附)淋病注射藥

脫呂帕弗拉文 Trypaflavine · 果乃克淋 Genacrine · 新亞果能克淋 Sinoacridin · 伊斯拉文 Israviv · 滂濁溥清 Parsyptin · 配力定 Pyridium · 愛惜克淋 Acridin · 阿魯賴司卿 Al-leslin · 鈣色文 Calciviv · 邦鈣兒 Panca · 洒撲淋 Salpalin · 阿爾梯共 Arthigon · 白濁藥特靈液 Gono-Yalren · 敵爾濁 Diagon · 果乃金 Go-

nargin · 白濁漿苗 Gono-Vaccins · 克靈淋菌伐克辛(Vaccin) Antigonococcique · 新製德美貢樂苗 Neo-Dnegon · 狄門氏疫苗 Demonchy Vaccin · 抗濁剛 Compigon · 百淋恐 Polygon · 固拿可兒 Gonocarl ·

先靈烏羅特羅屏 Urotropin "Schering" · 嘉那脫那賓 Cylotropin · 烏羅透養 Urotrosal · 海克散明 Hexamin ·

(註)淋病注射藥之適用。概言之。第一類注射藥適用於急性淋。第二類注射藥適用於慢性及淋毒性引起之各種變症至第三類則具有利尿消毒作用。最妙用於淋病將愈，小便溷濁或膀胱疾患等。

九 龜頭包皮灸方

(一) 亞鉛華 Zinc oxydatum 五〇〇

滑石 Taleum 五〇〇

上為撒布用

(二) 代馬安耳 Dermatol 五〇〇

上為撒布用

(三) 醋酸鉛液 *Liq. Plumbum aceticum* (2%)

1100.0

上為罌包劑(腫脹劇甚時用)

(四) 沃度仿或慰歐仿 *Jodoform* od. *Vioform*

適量

上為撒布用(潰瘍部用)

10 淋疾性橫痃方

(一) 伊克度軟膏 *Ung. Ichthyol* 1.0

上為塗布用

(二) 安福消腫膏 *Antipholorizin* 1.0.0

上為塗布用

(三) 醋酸鉛液 *Liq. Plumbum aceticum* (2%) 1100.0

上為罌包用

(附) 淋疾性橫痃注射藥

奧倫 *Aolan* · 來克丁 *Lactin* · 葡白西特 *Bubueid*

· 葡白東 *Buboton* · 退苦病 *Tekupin* · 克療病 *Kriobin* 等。

11 副睪丸炎方

(一) 伊克度軟膏 *Ung. Ichthyol* 1.0.0

上為塗布用

(二) 醋酸鉛液 *Liq. Plumbum aceticum* 1100.0

上為罌包用

(三) 萇蓉膏 *Ext. Scopolia* 11.0

凡士林 *Vaseline* 110.0

上為塗布用

(註) 內服藥參閱淋病處方。

(附) 副睪丸炎注射藥

阿爾梯共 *Arthigon* · 白濁藥特靈液 *Gono-Yatren* · 阿魯賴司卿 *Allesin* · 邦鈣兒 *Pancal* · 固拿可兒 *Gonocarl* · 碘化鈣 *Calcium Jodatum* 等。

一二 膀胱炎方

(一) 莨菪膏 Exl. Scopolia 〇・〇二

可可脂 Ol. Cacao 二・〇

上為尿道坐藥一個，插入尿道（疼痛劇

烈尿意頻數時用）

(二) 鹽酸嗎啡 Morphin hydrochloric. 〇・〇五

可可脂 Ol. cacao 二・〇

上為尿道坐藥一個，插入尿道（同上）

（註）普通膀胱炎，毋需應用坐藥。祇須服藥或注射。即能見效。

通常本症應用之內服藥為薩羅耳，水楊酸鈉，烏羅透賽，午乏午耳西葉等尿防腐劑。

(附) 膀胱炎注射藥

烏羅特羅屏 Urotropin, 喜那脫那賓 Cylo'ropin

, 烏羅透賽 Urotrosal, 海克散明 Hexamin, 固

拿可兒 Gonocarl, 配力定 Pyridium 等。

一三 攝護腺炎方

內服藥亦不外尿防腐劑。急性症用瀉下劑及局部冷罨包。慢性症宜長期以收斂性藥液洗滌尿道。此外施行攝護腺按摩。

一四 精囊炎方

療法參照攝護腺炎。急性症宜行溫水坐浴。或用伊克度軟膏塗布，莨菪膏等坐藥。慢性可用尿道點滴器注入收斂性藥液。並行按摩法。內服藥為溴素劑，碘劑等。

一五 尿道狹窄方

本症非藥物可能治愈。宜插出尿道擴大管。施行手術療法。

一六 淋毒性關節炎方

急性者用冰罨法或塗布其他消炎劑。慢性者用溫罨包。此外局部透熱療法，局部溫浴。亦可為輔

助治療。內服藥爲水揚酸鈉，安替疋林等。注射藥可用阿爾梯共，白濁藥特靈液等。對於關節水腫，輕度可注射碘化鈣。腫脹高度時，須行手術穿刺。

一七 淋毒性心內膜炎方

療法與他種原因而起之心臟內膜炎同。藥品可用毛地黃，狄加林，葡萄糖，葡萄酒，可拉明等與奮劑。

一八 淋毒性結膜炎(膿漏眼)方

詳見眼科劑處方中。

一九 女子淋病方

- (一) 硝酸銀 Argent nitricum
 甘油 Glycerin
 可可脂 Ol Cacao

○・二
 適量
 適量

臨床經驗處方

二二七

(二) 單甯酸 Acid Tannin 五・〇
 阿片末 Pulv Opium 〇・三
 甘油 Glycerin 適量

上爲陰道藥球十個，用法同上

(三) 精製明礬 Alumen 一・〇
 羊毛脂 Lanolin 適量
 可可脂 Ol Cacao 適量

上爲陰道球十個，用法同上

(四) 亞採多那陰道藥球 Acetone Vaginae Capsules 一個

上插入陰道深部，每日一次

(五) 萬宜散白堊藥片 Lenicel-Bolus Vaginal Tablets 一片

上臨睡前塞入陰道深部

(六) 帶伐根 Devetan 一片
 用法同上

(七) 安期福祿渦林 Antifluorin 一片

臨床經驗處方

二二八

用法同上

(註) 女子淋病發生之合併症頗多。例如陰門炎，陰道炎，子宮內膜炎，卵巢炎，輸卵管炎等。治療處方。參閱婦科劑中。

二〇 軟性下疳方

- | | | |
|-----------|----------------------------|-------|
| (一) 硝酸銀桿 | Argent nitricum | 適量 |
| 上為創面腐蝕用 | | |
| (二) 石炭酸液 | Liq. Acid Carbohcum (20%) | 適量 |
| 上為創面腐蝕用 | | |
| (三) 醋酸鉛液 | Liq. Plumbum aceticum (2%) | 100.0 |
| 上為罨包用 | | |
| (四) 福爾買林 | Formalin | 1—2滴 |
| 溜水 | Aq. dest. | 300.0 |
| 上為陰莖浴或罨包用 | | |
| (五) 海碘方 | Jodoform | 5.0 |
| 上為患部撒布用 | | |

(六) 慰歐仿 Vioform

5.0

上為患部撒布用

(七) 海碘方軟膏 Ung. Jodoform

10.0

上為塗布用

(八) 雷佛奴耳軟膏 Ung. Rivanol

10.0

上為塗布用

(九) 硼酸軟膏 Ung. Acid Boricum

10.0

上為塗布用

(十) 斯知勿那露軟膏 Stibnal Salbe

10.0

上為塗布用

(十一) 敗瘍膏 Panicoel

10.0

上為塗布用

(附) 軟性下疳注射藥

德美高斯 Dem. lens, 奧倫 Aolan, 來克丁 Lactin, 斯知勿那露 Stibnal, 安錫蒙那爾 Anid-menil 等。

(註) 軟性下疳。極易誘發疼痛性橫痃。初起除局部塗布消炎藥外。亦可注射奧倫 Aolan, 來克丁 Lactin, 葡白西特 Bubocid

，斯知勿那露 Subinal 等。如已化膿。則須施行手術切開。依照外科一般處置。

第九章 眼科劑處方

一 眼洗滌及罨包方

(一) 硼酸 Acid Boricum 四〇〇

溜水 Aq dest 二〇〇〇〇

上洗滌或罨包用

(二) 昇汞 Sublimat 〇〇〇二

食鹽 Nat. chloratum 〇〇〇二

溜水 Aq dest 二〇〇〇〇

上洗滌或罨包用 (便利調劑，可預配多量，以便臨時應用)

(三) 匹烏克他甯 Pyoktanin 二一〇〇

溜水 Aq dest 一〇〇〇〇

上為洗滌用

(四) 過錳酸鉀 Kali Permanganicum 〇〇二

臨床經驗處方

溜水 Aq dest 二〇〇〇〇

上為洗滌用

(五) 醋酸鉛 Plumbum aceticum 五〇〇

溜水 Aq dest 二〇〇〇〇

上為罨包用

(註) 上列數方。常用於一般結膜炎及眼緣緣炎。

二 眼瞼水泡疹方

(一) 亞鉛華 Zinc oxydatum 五〇〇

澱粉 Amylum 五〇〇

上為撒布用

(二) 亞鉛華軟膏 Ung. Zinc oxydatum 一〇〇〇

上為塗布用

(註) 眼部帶狀水泡疹劇痛時。可塗布伊克度軟膏。或用鉛糖水。或用水泡疹內服藥。可應用規甯，安替正林，阿司必林，水揚酸鈉等。

三 眼瞼濕疹方

(一) 白降汞軟膏 Ung. Hydrargyri album

10.00

上為塗布用

(二) 亞鉛華軟膏 Ung. Zinc oxydatum 10.00

上為塗布用

(三) 伊克度 Ichthyol 1.50

亞鉛華 Zinc oxydatum 10.00

澱粉 Amylum 10.00

凡士林 Vaseline 10.00

上調和塗布用

(四) 匹替羅耳 Ictyol 1.00

凡士林 Vaseline 10.00

上調和塗布用

(五) 雷佛奴耳眼藥膏 Rivanol-Eye Ointment 1管

上為患部塗布用

(註) 身體虛弱者。乘宜內服肝油，沃度鐵等強壯劑。

四 眼部癬腫方

(一) Pick 氏硬膏 Pick's Plaster

上剪一小方貼之(眼癬腫用)

(二) 伊克度軟膏 Ung. Ichthyol

上為塗布用

(三) 安福消腫膏 Anti-phlogisticin

上為塗布用

(四) 三福消腫膏 Sanfloid

上為塗布用

(五) 沃度丁幾 Tine Jodatium

上為塗布用

(六) 二% 汞色質 Meurochrome (2%)

上為塗布用

(註) 本症除局部塗布消炎藥外。亦可服硫酸鎂或愛太衣那克西路，士丹洛克西，百浪多息，百濃清等。處方參閱外科消炎內服劑。

適量

適量

適量

適量

適量

五 眼瞼緣炎方

- (一) 黃降汞軟膏或白降汞軟膏 Ung. Hydrargyri flavum od. Ung. Hydrargyri album 五・〇
上每朝夕塗布各一次
- (二) 硼酸軟膏 Ung. Acid Boricum 五・〇
上爲塗布用
- (三) 硝酸銀液 Liq. Argent nitricum (2%) 一〇・〇
上以毛筆或棉球塗布，每日一次
- (四) 匹烏克他寧液 Liq. Pyoktanin (2%) 一〇・〇
上每日以毛筆或棉球塗布
- (五) 硫酸鋅 Zinc Sulfuricum 〇・一
溜水 Aq dest 二〇・〇
上爲點眼料，朝夕各一次
- (六) 雷佛奴耳藥膏 Rivanol-Eye Ointment 1管

- (七) 奧太司 Optrex 一瓶
上爲塗布劑，每日一二次
上藥液傾置於洗眼杯內應用

六 麥粒腫方

- (一) 黃降汞軟膏 Ung. Hydrargyri flavum 五・〇
上爲塗布用
- (二) 白降汞軟膏 Ung. Hydrargyri album 五・〇
上塗布用
- (三) 醋酸鉛或單寧酸 Plumbum aceticum o.l. 二・〇
溜水 Aq dest 一〇〇・〇
上爲卷包用
- (四) 硼酸水 Aq. Acid Boricum 一〇〇・〇
上爲卷包用
- (註) 應用上方倘無效時。可改用溫卷包。以促化膿。而施手術切開。或聽其自潰亦可。

七 淚腺炎方

急性症用硼酸水，或鉛糖水罨包。慢性症塗布沃度丁幾或汞色質消炎劑。如不能消散已至化膿時。須行手術切開。

八 淚囊炎方

急性症初期用冰罨法或其他消炎劑冷罨包。慢性症宜每日指壓淚囊。不令淚液蓄積。並可用注射器注入〇・〇二%昇汞水，或三%硼酸水，〇・五%硝酸銀液等。

九 結膜炎方

- (一) 硝酸銀 Argent nitricum 〇・〇五—〇・二
溜水 Aq dest 1〇〇・〇
上為點眼用 (即〇・五—二・〇%硝酸銀液)

(註)用硝酸銀液眼點後。須將〇・九%食鹽水充分洗滌。以免起銀沉着症。

- (二) 蛋白化銀 Protargol 〇・〇五—〇・二
溜水 Aq dest 1〇〇・〇
上為點眼用 (即〇・五—二・〇%蛋白化銀液)

- (三) 硫酸鋅 Zinc sulfuricum (0.5%)
1〇〇・〇
上為點眼用

- (四) 一五%阿久羅 Argryol (15%)
1〇〇・〇
上為點眼用

- (五) 〇・五%硫酸鋅 Zinc sulfuricum (0.5%)
1〇〇・〇
腎上腺液 Athenalin 1—2滴
上為點眼用

- (六) 硫酸鋅 Zinc sulfuricum 〇・一
單寧酸 Acid Tannin 〇・一五
溜水 Aq dest 三〇〇・〇

上爲點眼料

(七) 硫酸銅 Cuprum sulfuricum 〇・一五

凡士林 Vaseline 五・〇

羊毛脂 Lanolin 五・〇

上每日一次，以玻璃棒點眼

(八) 雷佛雙耳眼藥 Rivanol-Eye Ointment 一管

上將藥膏擠入眼內，每日一二次

(九) 奧太司 Optraex 一瓶

上將藥液傾置於洗眼杯內應用

(十) 奧點爾 Optyre 一瓶

上滴入眼內每日二三次

(十一) 硼酸水 Aq. Acid. Boricum (2%) 一〇〇・〇

上洗眼或卷包用

(十二) 醋酸鉛液 Plumbum aceticum (1-2%) 一〇〇・〇

上洗眼或卷包用

一〇 顆粒性結膜炎(砂眼)方

(一) 硝酸銀液 Liq. Argent. nitricum (1-2%) 一〇・〇

上爲點眼用

(二) 硫酸鋅液 Liq. Zinc sulfuricum (0.5%) 一〇・〇

上爲點眼用

(三) 硫酸銅液 Liq. Cuprum sulfuricum (0.5%) 一〇・〇

上爲點眼用

(四) 枸橼酸銅液 Liq. Cuprum citricum (0.5%) 一〇・〇

上爲點眼用

(五) 石良氏砂眼藥膏 Tricho-Salantale 一管

上臨睡將藥膏擠入眼角，輕行閉眼摩擦，每日一二次

(註)角膜有潰瘍時。忌用硫酸鋅及硫酸銅。

(六) 硫酸阿刀邊 *Atropin sulfuricum (0.5%)*

10.0

上為點眼用(角膜層發生炎症時用之)

(七) 狄烏寧 *Dionin*

0.06—0.15

科卡音 *Cocain*

0.03

凡士林 *Vaselin*

1.5

羊毛脂 *Lanolin*

1.5

上一日三次，點眼後按摩(同上)

(八) 黃降汞軟膏 *Ung. Hydrargyri oxydat*

flavum

31.0

上點眼後輕行摩擦(同上)

(註)砂眼據最近醫界實驗報告。有謂內服洛太龍 *Rodione*，大健風 *Dagefin*，烏利龍 *Uleron*，殺鏈龍 *Sulfoinon* 等亦有相當效果。

砂眼如藥物失效時。宜行顆粒括破法，穹窿部結膜切除法，電氣破壞法等手術治療。

膜炎)方

(一) 黃降汞軟膏 *Ung. Hydrargyri oxydat*

flavum

10.0

上以玻棒入結膜下穹窿部，由眼瞼上按摩之

摩之

(二) 甘汞 *Calomel*

適量

上以毛筆蘸後撒布患部

(三) 硝酸銀液 *Liq. Argent nitricum (0.5%)*

10.0

上為點眼用

(四) 惠目眼藥膏 *Amol Eye Ointment* 一管

上點入眼內，輕加按摩，每日一次

(註)本症多係腺病而起。除局部治療外。宜內服肝油，碘化鐵糖漿，沃度化露多時，燒劑，安特所靈，好力生等。參閱強壯劑及營養劑處方。

一一 水泡性結膜炎(腺病性結

一一 淋毒性結膜炎(膿漏眼)方

(一) 過錳酸鉀液 Liq. Kali Permanganicum

(0.1%)

1100.0

上為洗滌用

(二) 昇汞水 Aq. Hydrargyri bichloratum

(0.1%)

100.0

上為洗滌用

(三) 硼酸水 Aq. Acid boricum (2%)

100.0

上為洗滌或器包用

(四) 硝酸銀液 Liq. Argent nitricum

(1-2%)

10.0

上為點眼用

(五) 蛋白銀液 Liq. Protargol (2%)

上為點眼用

10.0

(六) 硫酸鋅液 Liq. Zinc sulfuricum (0.5%)

10.0

上為點眼用

(七) 硫酸銅液 Liq. Cuprum sulfuricum (0.5%)

上為點眼用

10.0

一三 結膜乾燥症(疳眼)方

(一) 牛乳 Milch

10.0

上為點眼用

(二) 重曹水 Aq. Nat. bicarbonicum (2%)

10.0

上為點眼用

(三) 甘扁桃油 Ol. Amygdalarum dulces 10.0

上為點眼用

(四) Amol Eye Ointment

一管

上以點眼棒蘸後塗入眼內，每日二次

(註) 疳眼多由營養不良而起。宜常服肝油牛乳等營養品。其他內服處方如下：

(五) 蘇伯第液 Super D

一瓶

上每日三次，每次一茶匙

(六) 海力補B丸 Halibol-B

三〇粒

上每日三次，每次一粒

(七) 復康 Vogon

一瓶

上每日二次，每次二三滴，調入牛乳中

內服

(八) 好力生膠囊 Halisum Cap.

二〇粒

上每日一二次，每食後一個

(九) 安特所靈 Adoxolin Cap.

十二粒

上每日二三次，每次一粒

(十) 甘油奧斯得靈藥片 Ostelin Tab.

一〇片

上每日三次，每次一片

一四 實質性角膜炎方

(一) 硫酸阿刀邊 Atropin sulfuricum 〇・〇五

狄烏寧 Dionin 〇・一

溜水 Aq dest 一〇・〇

上為點眼用

(二) 黃降汞軟膏 Ung. Hydrargyri oxydat

flavum 一〇・〇

上為點眼用

(三) 二%鹽酸卡音 Cocain hydrochloricum

(2%) 一〇・〇

上為點眼用(刺戟症狀劇烈及疼痛時用)

(註)實質性角膜炎，多由梅毒而來。宜用驅梅毒療法。注射洒爾佛散，或塗布水銀軟膏。兼宜內服藥劑及其他強壯劑。

一五 水泡性角膜炎(腺病性角

膜炎)方

點眼藥同上。惟本症多發於腺病質。宜兼行全身療法。處方可參閱強壯劑及營養劑。

一六 角膜賁奴司(胬肉攀睛)方

(一) 〇・五%硫酸阿刀邊 Atropin sulfuricum

(0.5%) 一〇・〇

上為點眼用

(二) 二%鹽酸科卡音 Cocain hydrochloric.

(2%)

上為點眼用

10.0

(三) 硝酸銀 Argent nitricum

0.5

醋酸鉛 Plumbum aceticum

0.5

凡士林 Vaselin

10.0

上混和入角膜面·每日一次(症狀劇烈者用)

(四) 黃降汞軟膏 Ung. Hydrargyri oxydat.

Flavum

10.0

上為點眼用(症狀消退殘留白翳時用)

(五) 惠目眼藥膏 Amol Eye Ointment 1管

上為點眼用

(註)頑固難治之實奴司。須行手術治療。或用電氣燒灼。或用消毒銳匙搔除亦可。亦可施行角膜周圍切除法。

一七 角膜潰瘍方

(一) 硼酸水 Aq. Acid Boricum (2%) 100.0

臨床經驗處方

一三七

上為洗滌用

(二) 昇汞水 Liq. Sublimat (0.5%) 10.0

上為洗滌用

(三) 硫酸阿刀邊液 Liq. Atropin sulfuricum (0.5%) 10.0

上為點眼用

(四) 海碘方 Jodoform 5.0

上研為細末，撒布潰瘍部

(五) 硫酸歐雖林 Iserin sulfuricum 0.1

溜水 Aq. dest 10.0

上為點眼用

(六) 惠目眼藥膏 Amol Eye Ointment 1管

上為點眼用

(註)角膜潰瘍有疼痛時。可內服阿司必林，凡拉蒙，痛必靈等鎮痛劑。劇甚者亦可注射鹽酸嗎啡。此外溫罌法對本症亦有效。倘潰瘍無治癒希望者。則宜用電氣燒灼手術。

一八 角膜軟化症方

本症亦由營養障礙而來。點眼藥同上。內服藥亦宜用營養劑。可參閱結膜乾燥症處方。

一九 角膜炎方

(一) 黃降汞軟膏 Ung. Hydrargyri oxydat flavum 10.00
上為點眼用

(二) 狄烏寧液 Liq. Dionin (2%) 10.00
上為點眼用

(三) 碘化鉀 Kali Jodatium 0.1
重碳酸鈉 Nat. bicarbonicum 0.25
溜水 Aq dest 15.00
上為點眼劑

(註) 淺在性之角膜翳。兼用溫罨法亦有其效。濃厚難除者。則惟有行入墨法。以修飾外貌。

二〇 鞏膜炎方

(一) 硫酸阿刀邊液 Liq. Atropin sulfuricum

(0.5%) 10.00
上為點眼用

(二) 狄烏寧液 Liq. Dionin (2%) 10.00
上為點眼用

(三) 硼酸水 Aq. Acid Boricum (2%) 100.00
上為溫罨包料

(註) 本病除局部治療外。更宜檢查發病之原因。兼行全身療法。

二一 虹彩炎及毛樣體炎方

(一) 硫酸阿刀邊液 Liq. Atropin sulfuricum (1-2%) 10.00
上為點眼用

(二) 溴氫酸庶斯精 Hyoscyanini hydrobromat-

cum 溜水 Aq dest 10.00
上為點眼用 (對阿忒羅品有特異質者可
用此為代用品)

(三) 鹽酸嗎啡 *Morphin hydrochloricum*

〇・〇五

硫酸阿刀邊 *Atropin sulfuricum*

〇・〇五

溜水 *Aq dest*

一〇・〇

上為點眼用(疼痛羞明劇烈時用)

(四) 鹽酸科卡音 *Cocain hydrochloricum*

〇・一

硫酸阿刀邊 *Atropin sulfuricum*

〇・〇五

溜水 *Aq dest*

一・〇

上為點眼用(同上)

(五) 硫酸歐雖林 *Eserin sulfuricum*

〇・一

溜水 *Aq dest*

一〇・〇

上為點眼用(內壓亢進者用)

(六) 鹽酸必羅卡而賓 *Pilocarpin hydrochlori-*

cum

〇・二

溜水 *Aq dest*

一〇・〇

上為點眼用(同上)

(註) 原因療法。頗關重要。屬於風溼性者。可內服水揚酸鈉，阿司必林等。梅毒性者。可注射洒爾佛散，或內服碘化鉀。結

核性者。可內服克雷沙忒，吞揆藥科耳等。

二二 視網膜炎方

本症由梅毒，結核，腎臟炎，或糖尿病而起頗多。局部除用黃降汞軟膏點眼，或用食鹽水行結膜下注射外。當細察其原因。而謀適當之治療。

二三 脈絡膜炎方

(一) 水銀軟膏 *Ung. Hydrargyri cinereum*

一〇・〇

上分五次塗布於前額部(可促滲出物吸)

收)

(二) 水銀軟膏 *Ung. Hydrargyri cinereum*

五・〇

莨菪越幾斯 *Ext. Scopolia*

一・〇

單軟膏 *Ung. simplex*

五・〇

上塗布前額

臨床經驗處方

二四〇

(註) 脈絡膜炎。亦可內服碘化劑。或注射食鹽水於結膜下。此外注意原因治療。與虹彩炎同。

二四 視神經炎及視神經萎縮方

局部治療。可參閱視網膜炎及脈絡膜炎。欲求根本治療。亦惟有推究其原因。

二五 全眼球炎方

(一) 醋酸鉛液 *Liq. Plumbum aceticum (2%)*

100.0

上爲罌包用

(二) 冰塊 *Ice*

適量

上裝入冰袋，罌包眼部

(註) 全眼球炎。可注射消炎新藥。例如百浪多息，沙呂賽勃他星，百膿清等。疼痛劇烈時。可注射嗎啡，或內服凡拉蒙，痛必靈等鎮痛藥。

二六

白內障及綠內障方

(一) 碘化鉀 *Kali iodatum*

0.1

溜水 *Aq. dest.*

10.0

上點眼或注射於結膜下

(二) 硫酸歐羅林 *Eserin sulfuricum*

0.1

溜水 *Aq. dest.*

10.0

上爲點眼用

(三) 鹽酸必羅卡而賓 *Pilocarpin hydrochloricum*

0.1

cum

溜水 *Aq. dest.*

10.0

上爲點眼用

(註) 上列藥物倘點眼無效時。宜延眼科專門醫師施行手術治療

二七 夜盲症方

本症亦係營養不良而起。治療可參閱結膜乾燥症處方。

二八 眼精疲勞症方

配用適當眼鏡。兼注意原因療法。

二九 眼外傷方

角膜上皮損傷。可用硼酸軟膏，或海碘方軟膏塗布。或用二%狄烏寧液點眼。如有異物存在。可用科卡音液點眼後。翻開眼瞼。用棉花刷除，或以鉗子等摘去。如係鐵片。可用磁石吸出之。然後再用硼酸水洗滌。點入黃降汞軟膏。劇痛可改用一%阿那雖信軟膏。外施保護綳帶。

第十章 耳鼻咽喉科劑處方

一 急性限局性外聽道炎方

- (一) 白降汞軟膏 Ung. Hydrargyri album 10.00
 上以棉球蘸塗插入
- (二) 伊克度軟膏 Ung. Ichthyol 10.00
 上為棉球蘸塗插入

臨床經驗處方

二四一

- (三) 醋酸鉛液 Liq. plumbum aceticum (2%) 100.00
- (四) 硼酸水 Aq. Acid Boricum (2%) 100.00
 上為罌包用
- 炎症倘進行劇烈時。更宜內服消炎劑。處方如下。
- (一) 士丹洛克西片 Stainoxyl Tab. 十二片
 上一日三次分服
- (二) 奧克錫丹 Oxytanol 一.五
 上分三包，一日分服
- (三) 百浪多息 Promosil 六片
 上每日三次，每次二片
- (四) 賽勃他星 Septazine 六片
 上每日三次，每次二片
- (五) 百膿清 Pronzin 六片
 上每日三次，每次二片
- (註) 耳痛劇甚時。可內服阿司必林，凡拉蒙等。或於軟膏內調

入阿那雖信等局部鎮痛藥。

二 急性瀰蔓性外聽道炎方

- (一) 硼酸軟膏 Ung. Acid Boricum 100.0
 上以棉球蘸塗患部
- (二) 亞鉛華軟膏 Ung. Zine oxydatum 100.0
 上以棉球蘸塗患部
- (三) 白降汞軟膏 Ung. Hydrargyri album 100.0
 上以棉球蘸塗患部
- (四) 硼酸水 Aq. Acid Boricum (2%) 100.0
 上為洗滌用
- (五) 石炭酸水 Aq. Acid Carbohcium 100.0
 上為洗滌用
- (六) 硼酸 Acid Boricum 5.0
 沃度仿 Jodoform 5.0
 上研成細末，為撒布用

(註)本症之內服藥同上。

三 盯瞤拴塞方

- (一) 微溫水 Warme Wasser 100.0
 上為耳內洗滌用
- (二) 硼酸 Acid Boricum 0.3
 橄欖油 Ol. Olivarium 15.0
 上為點耳用
- (三) 炭酸鈉 Nat. Carbonicum 1.0
 溜水 Aq. dest 100.0
 上微溫一日三次點耳，放置十分鐘
- (四) 重碳酸鈉 Nat. bicarbonicum 1.0
 甘油 Glycerin 5.0
 溜水 Aq. dest 15.0
 上混和為點眼料，一日三次各十滴至十五滴

四 急性鼓膜炎方

(1) 二%醋酸鉛 Plumbum aceticum (2%) 1000.0

上為耳部塞包用

(二) 醋酸鉛 Plumbum aceticum 0.2

阿片丁幾 Tinct Opium 100滴

溜水 Aq dest 400.0

上每日三次每次點入十滴

(三) 沃度 Jod 0.001

沃度鉀 Kali Jodatium 1.00

甘油 Glycerin 100.0

上為耳內塗布用

(註) 急性鼓膜炎劇痛時。可內服鎮痛劑，安眠劑。此外兼宜應用消炎劑。

五 慢性鼓膜炎方

(1) 硼酸水 Aq. Acid Boricum (2%) 1000.0

上為洗滌用

臨床經驗處方

(二) 硫酸鋅水 Aq. Zinc sulfuricum (1%) 100.0

上每日二次。每次點入數滴

(三) 硝酸銀液 Liq. Argent nitricum (2%) 100.0

上每日二次。每次十數滴

(四) 醋酸鉛液 Liq. Plumbum aceticum (2%) 100.0

上每日二次每次點入數滴

(五) 硼酸粉 Pulv Acid Boricum 1.00

上為耳內吹入用

六 急性中耳炎方

(一) 醋酸鉛液 Liq. Plumbum aceticum (2%) 1000.0

上為塞包用

(二) 握搭耳根 Olalgem 1管

上滴入耳內，每日二三次

(三) 硼酸 Acid Boricum

甘油 Glycerin

上點入耳內，每次數滴

〇・二
一〇・〇

(四) 千倍鹽化腎上腺液 Adrenalin hydro-

chloricum (0.1%)

蛋白化銀 Protargol

甘油 Glycerin

溜水 Aq dest

上點入耳內，每次數滴

一・〇
〇・四
五・〇
一五・〇

(五) 硼酸 Acid Boricum

阿那雖信 Anaesthesin

上研和，爲耳內吹入用

一〇・〇
一・〇

(註) 急性中耳炎劇痛時。亦可內服或注射鎮痛劑及消炎劑等。

七 慢性中耳炎方

(一) 硼酸 Acid Boricum

上研和爲粉末，吹入耳內

五・〇

(二) 明礬 Puly Alumen

五・〇

上研和爲粉末，吹入耳內

八 耳茸方

初起試用收斂性硝酸銀液等塗布。如無效時。可以科卡音液用行局部麻醉。再施行手術摘除。後療法可用防腐性藥粉撒布。

九 乳嘴突起骨膜炎方

(一) 沃度丁幾 Tinc Jodatuna

上塗布用

五・〇

(二) 伊克度軟膏 Ung. Ichthyol

上塗布用

一〇・〇

(三) 醋酸鉛液 Liq. Plumbum aceticum (2%)

一〇・〇

上爲罨包用

(四) 醋酸礬土液 Liq. Aluminii aceticum

一〇・〇

溜水 Aq dest 100.0

上卷包用

(五) 冰塊 Ics 適量

上裝入冰囊，卷包患部

(註)其他內服消炎劑。可參閱急性限局性外聽道炎處方。

(附)耳科病各種急性炎症之注射藥

藥

百浪多息 Prontosil · 沙呂賽勃他星 Solu-septazine · 百膿清 Pronzin · 銀膠 Electargol · 握姆那丁 Omnadin · 葡萄狀菌及鍊狀球菌血清 Beta-plate-strepto-Vaccine Mixed · 藥特靈化膿菌混合漿苗 Antiphogenous Yatron 等。

10 急性鼻炎方

(一) 鹽酸科卡音 Cocain hydrochloricum 0.1

薄荷腦 Mentholum 0.1

乳糖 Sacch lacticum 10.0

臨床經驗處方

二四五

上研和吹入鼻內用

(二) 鹽酸科卡音 Cocain hydrochloricum 1.0

薄荷油 Ol Menthae 二滴

溜水 Aq d st 100.0

上為鼻粘膜塗布劑

(三) 石炭酸 Acid Carboricum 5.0

苛性阿母尼亞亞液 Lig. Ammonia causticum 5.0

酒精 Alcohol 1.5

溜水 Aq dest 10.0

上以五至十滴浸於手巾，每二時間吸入

(四) 石良氏鼻炎藥膏 Rhino-Salantale 一管

上擠出少許，塗入鼻內，每日二三次

(五) 愛特芬 Adrephine 適量

上以棉球蘸後塗塞鼻內

(註)急性鼻炎兼宜內服阿司必林，安替疋林，水揚酸鈉等解熱劑頗有功效。

一一 慢性鼻炎方

- (一) 鹽酸科卡音 Cocain hydrochloricum 〇・一
鹽化腎上腺液 Liq Adrenalin hydrochloricum 一—二滴
溜水 Aq dest 一〇・〇
上為塗布用
- (二) 鹽酸科卡音 Cocain hydrochloricum 〇・二
硝酸銀 Argent nitricum 一・〇
白陶土 Bolus alba 三・〇
上為吹入用
- (三) 薄荷腦 Mentholum 〇・四
科卡音 Cocain 〇・二
硼酸 Acid Boricum 三〇・〇
上吹入鼻內，一日三次
- (四) 碘 Iodum 一・五
碘化鉀 Kali Jodatum 二・五
甘油 Glycerin 二五・〇

上混和塗布鼻內

- (五) 愛特芬 Adicphine 適量
上以棉球蘸後塗塞鼻內

- (六) 逆伏靈 Rephin 適量
上以棉球蘸後塗塞鼻內

一二 惡臭鼻漏方

- (一) 食鹽水 Aq. Nat. chloratum (1%) 一〇〇・〇
上為鼻洗滌劑
- (二) 過錳酸鉀水 Aq. Kali Permanganicum (1%) 一〇〇・〇
上為鼻洗滌劑
- (三) 硼砂 Borax 二・〇
重碳酸鈉 Nat. bicarbonicum 二・〇
甘油 Glycerin 七・〇
溜水 Aq dest 一〇〇・〇
上為鼻洗滌劑，一日數次噴霧

(四) 碘 Iodum 1.0.0

碘化鉀 Kali Jodatium 1.0.0.0

甘油 Glycerin 1.00.0.0

薄荷油 Ol Menthae 1.0.滴

上用棉花浸漬，塞入鼻腔，隔日一次

(五) 亞鉛華軟膏 Ung. Zinc oxydatum 5.0.0

上以棉球塗藥塞入鼻腔中。數時後取出

，再以〇.五%硝酸銀液塗布

(六) 薩羅耳 Salol 1.0.0

水揚酸 Acid Salicylicum 〇.〇.二

硼酸 Acid Boricum 四.〇.〇

單寧酸 Acid Tannicum 四.〇.〇

上研和為嗅入劑，每日數次

(註) 本症檢查原因。倘係梅毒而起者。宜行驅梅毒療法。

一三 衄血(鼻血)方

(1) 單寧酸 Acid Tannicum 二.〇.〇

上以棉球蘸藥塞入鼻腔

臨床經驗處方

二四七

(二) 過鹽化鐵液 Liq. Ferri sesquichloratum 二.〇.〇

上以棉球蘸藥液塞入鼻腔

(三) 千倍鹽化腎上腺液 Liq. Adrenalin hyd-
rochloricum 二.〇.〇

上以棉球蘸藥液塞入鼻腔

(四) 明礬末 Pulv. Alumen 一〇.〇.〇

溜水 Aq. dest 一〇.〇.〇

上為吸入劑

(五) 硝酸亞鉛 Zinc sulfuricum 一.〇.〇

明礬 Alumen 二.〇.〇

溜水 Ap. dest 五〇.〇.〇

上為吸入劑

一四 咽喉炎及扁桃腺炎方

(1) 硝酸銀液 Liq. Argent nitricum (2%) 一〇.〇.〇

上為塗布用

(二) 千倍脫呂帕拉文 Trypaflavine (0.1%)

100.0

上爲塗布用

(三) 單寧酸 Acid Tannicum

1.00

甘油 Glycerin

100.0

上爲塗布用

(四) 碘 Jodum

0.1

碘化鉀 Kali Jodaturn

0.2

甘油 Glycerin

100.0

上爲塗布劑

(五) 氯化鉀 Kali Chloricurn

5.00

溜水 Aq dest

1100.0

上爲含嗽用

(六) 福美明達 Pomamint

六片

上以一片食於口內。待其溶化，一日可

用數次

(七) 勞弗拉文錠 Panflavin-Tablets

六片

上爲口腔含嗽用，每日數次

(八) 愛惜夫拉文片 Aciflavin Tab.

六片

上爲口腔含嗽用，每日數次

(註) 急性咽喉炎與扁桃炎。內服藥可用阿司必林，規寧，飛那西汀，阿卡奴等解熱劑。

一五 喉頭炎方

(一) 醋酸鉛液 Liq. Plumbum aceticum (2%)

100.00

上爲頸部卷包用

(二) 醋酸礬土水 Liq. Aluminii aceticum

100.00

溜水 Aq dest

1000.00

上爲頸部卷包用

(三) 安福消腫膏 Antiphlogistine

100.00

上爲頸部卷包用

(四) 單寧酸 Acid Tannicum

0.50

溜水 Aq dest

1000.00

上爲吸入劑

(五) 明礬 Alumen 11.00

溜水 Aq dest 10.00

上為吸入劑

(六) 食鹽或重碳酸鈉 Nat. chlorat od. Nat.

bicarbonic 1.00

溜水 Ab dest 10.00

上為吸入劑

(七) 杏仁水 Aq. Pruni armeniaca 10.00

鹽酸嗎啡 Morphin hydrochloricum 0.1

上每次十滴加於吸入液

(八) 硝酸銀液 Liq. Argent nitricum (2%) 10.00

上為塗布用

上為塗布用

(九) 單甯酸甘油 Acid Tannic Glycerin

(10%) 10.00

上為塗布用

(10) 洛各氏液 Solutio Lugol 10.00

上為塗布用

(11) 2%氯化鉀 Kali Chloricum (2%) 11.00

上為含嗽用

(註) 其他處方。參閱急性咽喉炎。內服藥可用發汗劑，鎮咳劑等。倘轉成慢性時。則塗布收斂性藥液為宜。

(附) 咽喉炎·扁桃腺炎注射藥

握姆納丁 Omalin, 百乃定 Panadin, 安替保 Antipol, 愛而斯丁 Erstin 等。

一六 聲門水腫方

本症非常危險。除用硝酸銀液塗布外。速宜注射百浪多息等消炎劑。內服瀉劑或行局部亂刺手術

一七 聲門痙攣方

(1) 哥羅方或以脫 Chloroform od. Aether

5.00

(2) 溴化鉀 Kali bromatum

1.00

上於發作時為吸入用

糖漿 *Sirup simplex*

100.0

溜水 *Aq. dest.*

5.0

上一日三次，二日分服

(三)

磷 *Phosphor*

0.0005

肝油 *Ol. Jecoris*

1000.0

上每日三次，每次一茶匙

(四)

乳酸鐵 *Ferri lacticum*

1.5

乳糖 *Sacch. lacticum*

1.5

上為十包，一日三次各一包

(註) 本病概發於三歲以內之小兒。與佝僂病頗有關係。發作後宜常服強壯劑。可參閱佝僂病處方。

一八 喉頭結核及喉頭潰瘍方

(一) 10% 乳酸液 *Liq. Acid Lacticum (20%)*

100.0

上為塗布用

(二) 2% 硝酸銀液 *Liq. Argent nitricum (2%)*

100.0

上為塗布用

(三)

薄荷腦 *Mentholum*

1.0

橄欖油或甘油 *Ol. Olivarium od. Glycerin*

100.0

上為塗布用

(四)

明礬末 *Pulv. Alumen*

2.0

乳糖 *Sacch. lact.*

11.0

上為喉內吹入用

(五)

單甯酸 *Acid Tannin*

適量

上為喉內吹入用

(六)

代馬妥耳 *Dermatol*

適量

上為喉內吹入用

(七)

氯化鉀水 *Aq. Kali Chloricum (2%)*

1100.0

上為含嗽用

(八)

科卡音液 *Liq. Cocain hydrochloricum*

100.0

上為塗布用(止痛)

(九) 俄耳妥封 Orthoform

乳糖 Sacch lact

11.0
11.0

上吹入喉內(同上)

(註) 咽頭結核。除局部治療外。一面宜注意營養。參照結核病一般療法。

一九 白喉方

(一) 洛各氏液 Solutio Lugol

上為塗布用

10.0

(二) 1% 硝酸銀液 Lig. Argent nitricum

上為塗布用

10.0

(三) 碘 Jodium

酒精 Alkohol

哥羅方 Chloroform

上塗布用

0.4
10.0
11.0

(三) 派派沃汀 Papayotinum

鹽酸 Acid hydrochloricum

1.0
適量

臨床經驗處方

溜水 Aq dest

11.0

上調和，每十至十五分鐘塗布用

(四) 雷沙而辛 Resorcin

甘油 Glycerin

上為塗布用

3.0
30.0

(五) 昇汞 Sublimat

酒石酸 Acid Tartaricum

溜水 Aq dest

上為塗布用

0.05
0.1
5.0

(註) 白喉除局部用塗布劑外。最妙用白喉血清注射。頗有特效。

二〇 喉腫瘍方

(一) 10% 硝酸銀液 Liq. Argent nitricum (10%)

上以綿球略蘸少許，塗布患部

10.0

(二) 乳酸 Acid lacticum

上以棉球略蘸少許，塗布患部

10.0

(註) 喉腫瘍應用藥品腐蝕後。倘無確效時。宜施行手術療法。

第十一章 齒科處方劑

一 齲齒(即蛀牙)方

- (一) 藥用哥羅力 Chloroform 適量
 上以棉球蘸後，填塞齲齒內
- (二) 阿那雖信 Anaesthesia 適量
 上以棉球蘸藥少許，塞入齒內
- (三) 克雷沙忒 Kreosot 〇・三
 薄荷水 Aq Menthae 一五・〇
 上以棉球浸塞齒腔
- (四) 亞砒酸 Acid Arsenicosum 〇・五
 鹽酸嗎啡 Morphin hydrochloricum 一・〇
 克雷沙忒 Kreosot 適量
 上調和為軟泥，先拭清齒腔，乃以小棉
 蘸此泥。貼於齒髓露出之腔內，封以臘
 放置二十四小時更換之
- (五) 維剛安 Vigantol 十八粒

(六) 復康 Yogan Tab. 十八片
 每日三次，每次一粒(齲齒初起或預防)
 上每日三次，每次一片(同上)

(註)齲齒之根治療法。宜延牙科專門醫師行填補術。

二 齒髓炎方

- (一) 凡拉蒙片 Veramon Tablets 一片
 上一次頓服
- (二) 痛必靈 Tonbein 一・五
 乳糖 Sacch lact 一・五
 上分三包，一日三次分服

(註)亞砒酸泥劑(即上章第四方)。亦可應用。如無效時。宜
行拔牙或齒髓剔出術。

三 齒膜炎方

- (一) 氯化鉀 Kali Chloricum 二・〇
 溜水 Aq dest 一〇〇・〇
 上為含嗽用

(二) 過酸化水素(雙養水) Hydrogenium Per-

oxydatum (10%) 三〇・〇

上為洗滌用

(三) 福美明達 Fomentint 六片

上每一二小時，含一片於口內

(註) 急性齒齦炎若已化膿。宜速拔除原因病齒。或穿刺齒髓腔
排出膿汁。洗滌後插入消毒紗布。慢性齒齦炎化膿時。宜切開
齒齦。除去壞死的齒根端。以銳匙充分搔肥患部組織。然後填
塞消毒紗布。勤於交換。

四 齒齦炎方

(一) 硼砂 Borax 五・〇

甘油 Glycerin 五・〇

上為塗布用

(二) 沃度丁幾 Tine Jodatum 適量

上以棉花蘸後，塗布患部

(三) 沒藥丁幾 Tine Myrrha 一〇・〇

拉他尼亞丁幾 Tine Ratanhia 一〇・〇

臨床經驗處方 一五三

甘油 Glycerin 一〇・〇

上為齒齦塗布劑

(三) 氯化鉀 Kali Chloricum 四・〇

溜水 Aq. dest. 二〇〇・〇

上為含嗽用

(四) 旁弗拉文錠 Panflavin Tab. 六片

上為口內含嗽用，一日多次

五 齒齦出血方

(一) 單甯酸 Acid Tannicum 適量

上以棉球蘸後撒布出血部。

(二) 過鹽化鐵液 Liq. Ferri sesquichloratum 適量

以上棉球蘸藥液貼於出血部

(三) 斯錫普錫輕片 Stypticin Tab. 六片

上每日三次，每次二片

(四) 康泰 Cantan 六片

上每日三次，每次一片

(五) 力度伸 Redoxon

上每日三次，每次一片

六片

(二) 沃度丁幾 Tine Jodatium

上為塗布用

適量

(註) 齒齦劇烈出血時。可注射可阿古連，斯錫普錫輕等止血。由壞血病而起者。宜注射康泰等維他命C製劑。

(註) 先以上方洗滌及塗布。然後以鐵篋括除齒石頗便。

六 齒齦瘻肉方

(一) 10% 硝酸銀液 Argent nitricum (10%)

適量

(一) 阿司必林 Aspirin 1·5—2·0

上分三包，一日分服

(二) 凡拉蒙片 Veramon Tablets 三片

上以棉球蘸藥後後為腐蝕用

(二) 硝酸銀桿 Styli Argent nitricum

上用以塗布患部

(三) 痛必靈片 Tonbelin Tablets 三片

上一日三次分服，每次一片

(註) 齒齦瘻肉劇甚時。可用小刀或剪刀切除之。

(四) 加當 Gardan 三片

上每日三次，每次一片

七 齒石方

(五) 康普樂 Compral 三片

上一日三次分服

(1) 過酸化水素 Hydrogenium Peroxydatum

(10%) 三〇〇〇

上為洗滌用

(六) 威健年止痛藥片 Veganin 三片

上每日三次，每次一片

(七) 抗痛 Conton 三片

八 齒痛方

上一日三次分

(註)齒痛除內服痛藥外。亦須細審其原因。倘因齶齒而起者。可用棉花蘸蘇羅方填塞齒腔，或應用亞砒酸泥劑。倘齒齦發炎。則用沃度丁幾或沒藥丁幾等塗布。如有化膿現象。則行切開手術。倘膿為齒所障礙而難排泄時。則拔去其病齒。

第十二章 急救科劑處方

一 服毒方

- (一) 過錳酸鉀 *Kali permanganicum* 1.0
溜水 *Aq dest* 1000.0
上為洗胃劑，或令大量飲下
- (二) 硫酸銅 *Cuprum sulfuricum* 1.0
溜水 *Aq dest* 50.0
上先服一半，如無效，經十分鐘，再服一半
- (三) 吐根丁幾 *Tinc Ipecacuanhae* 15.0
上一次頓服

臨床經驗處方

二五五

- (四) 吐根末 *Pulv Radix Ipecacuanhae* 0.5
吐酒石 *Sibio Kali tartaricum* 0.05
乳糖 *Sacch lact* 0.3
上為一包，與等量三包，每十五分鐘服一次
- (註)上係一般催吐處方。不論何種中毒。凡毒物入胃未久。欲期迅速排除。均可適用。但遇腐蝕性毒物時(例如硝酸，硫酸，鹽酸等)。則吐劑及胃洗滌。均須禁忌。蓋恐引起胃穿孔之虞。
- (五) 血炭末 *Carboanimalis* 10.0
上一次頓服
- (六) 超炭 *Ultracarbon* 10.0
硫酸鎂 *Mag. sulfuricum* 10.0
上混和調入溫水，一次頓服，或多次連續分服
- (七) 蓖麻子油 *Ol Ricini* 30.0
上一次頓服
- (八) 甘油 *Glycerin* 30.0
上為灌腸用

(九) 藥用石鹼 *Sapo medicatus*

100.0

溜水 *Aq. dest.*

500.0

上為灌腸用

(註) 中毒時間已久。胃洗滌不能適用時。宜用上述處方。使毒物變成無害毒質。或使瀉下而排除其毒性之一部份。此外毒物如為血液所吸收。惟有施行瀉血法。或行生理食鹽水注射。

(附) 服毒注射藥

欲使催吐作用迅速發現。可注射下列藥品。

鹽酸阿坡嗎啡 *Apomorphin hydrochloricum* .

百莫陸爾 *Porofol* .

各種中毒不幸發生時。均宜維護心力。以防虛脫。故興奮性注射藥。亟宜採用。舉述主要者如下。

樟腦油 *Ol. Camphor* . 可拉明 *Coramine* . 可羅

那金 *Calonasin* . 樂百齡 *Lobelina* . 硝酸士的年

Strychnin nitricum . 安息香酸咖啡精 *Caffeine*

Nat-benzoicum . 維他康復 *Vitacamphor* . 卡

狄司 *Cardase* . 新亞彼利 *Sinoloberi* 等。

(附) 各種中毒急救摘要

(一) 磷及火柴中毒 用吐劑或洗胃法。或用下列

處方。

陳松節油 *Terpentinöl*

30.0

卵黃 *Eigelb*

二個

薄荷水 *Aq. Menthae*

250.0

糖漿 *Sirup simplex*

100.0

上混和振盪，每半時服一食匙，服完全量四分之一後，每一時服一食匙

(二)

鴉片及嗎啡中毒 用吐劑或洗胃法。多飲咖啡或濃茶。注射阿刀邊 *Atropin* 及其他興奮劑。

(三)

砒中毒 用吐根或洗胃法。內服大量牛乳或卵白亦妙。

下列解毒方。亦有特效。

煨製鎂 *Magnesium usta*

100.0

溜水 *Aq. dest.*

200.0

上頓服三分之一，以後每時服一食匙

硫酸酸化鐵液 *Liq. Ferri sulf. oxydatum*

100.0

溜水 Aq dest 150.0

上作為第一液

(三) 煨製鎂 Magnesium usta

溜水 Aq dest 15.0
250.0

上作為第二液

臨時將兩藥混和，每十分乃至三十分

鐘服一茶匙至一食匙

(四) 鉛粉及鉛糖中毒 用吐劑或洗胃法，內服

硫酸鎂。並注射阿刀邊。亦可應用下列

處方

碘化鉀 Kali Jodatium 2.0

溴化鉀 Kali Bromatum 6.0

糖漿 Sirup simplex 100.0

溜水 Aq dest 200.0

上每小時服一格

(五) 水銀及其鹽類中毒 先服大量牛乳及白乳。

用吐劑或洗胃法。此外給服阿片劑及鐵劑。

(六) 煙草中毒 行胃洗滌。內服興奮劑或下列處

方。

單甯酸 Acid Tannin 4.0

糖漿 Sirup simplex 100.0

溜水 Aq dest 200.0

上每五分鐘服一食匙

(七) 酒精中毒 行胃洗滌。內服或注射興奮劑。

病人能咽下時。給服濃咖啡茶。或同下列處

方。

阿母尼尼水 Aq Ammoniae 100滴

溜水 Aq dest 100.0

上每半時服一或二食匙

(八) 阿豚中毒 用吐劑或胃洗滌。內服或注射興

奮劑。

腐肉中毒 用吐劑或胃洗滌。內服蓖麻子油

或甘汞。亦可應用下列處方。

以脫 Aether 1.0

阿片丁幾 Tine 10滴

糖漿 Sirup simplex 100.0

臨床經驗處方

二五七

溜水 *Aq. Cast.*

一八〇・〇

上每小時服一食匙。

(一〇) 蕈類中毒 用吐劑或胃洗滌。次服蓖麻油或甘汞等。如有虛脫狀態。兼用興奮劑。

(一一) 鹽酸硝酸硫酸等中毒 不可洗胃。祇宜內服解毒藥品。例如煨製鎂，碳酸鈉，碳酸鉀等。均可大量應用。

(一二) 抱水格魯拉兒安眠藥中毒 洗胃。服瀉下劑及灌腸。注射阿刀邊及其他興奮藥。

(一三) 木鱉子中毒 用吐劑或洗胃法。痙攣劇甚者。可吸入少量哥羅方。或用抱水格魯拉兒。溴化鉀，嗎啡，阿片安眠鎮靜，麻醉劑等。

(一四) 亦可注射大量生理食鹽水，或行瀉血法。煤氣中毒 多吸新鮮空氣。用冷水灌注或冷溼布摩擦全身，嗅入阿母尼亞水。內服或注射其他興奮劑。

詳見外科劑處方中。茲從略。

二 創傷・出血・骨折・脫臼方

三 咬傷・火傷・凍傷・電傷方

(臨床經驗處方完)

臨床經驗處方

續篇

連潔羣醫師編

第一章 退熱劑處方

(一) 白樂君 Paludrine

〇・三

上一日二次分服。(各型瘧疾)

(二) 愛利命片 Arelan tab.

一〇片

對良性瘧及惡性瘧第一日第一劑服四片，經 8 小時後服第二劑二片，第二日及第三日各於晨起服二片；三日間共服四次，計十片。

(三) 五堯喹啉 Quinoline

〇・〇五

用本藥 0.01gm. 與硫酸奎寧 0.2—0.3gm. 內服，每四小時一次，日夜六次，以後每日服一次，連服一週。(各型瘧疾)

(四) 對氨基柳酸 Para-Aminosalicylic Acid

一一・〇

上分七次內服，每三小時服一次，第一次至第六次每次一・五公分，末後一次在臨睡前服三公分。(肺癆發熱)

(五) 鏈黴素 Streptomycin

一〇〇

縮水 Aq. dest

六〇〇

上每隔四小時一次服內注射，每次 1c.c. 或每十二小時注射一次，每次 3c.c.。(肺癆發熱)

(六) 磺胺嘧啶 Sulfadiazine

六〇〇

重曹 Sodium Bicarb

六〇〇

上分六包，先服二包，以後每四或六小時服一包。(炎症性化膿性發熱)

(七) 磺胺噻唑 Sulfathiazole

六〇〇

重曹 Sodium Bicarb

六〇〇

上分六包，先服二包，以後每四小時服一包。(炎症性化膿性發熱)

(八) 馬法生 Marpharsen

〇・〇四

縮水 Aq. dest

四〇〇

上為一次靜脈注射(回歸熱發熱)

第二章 興奮劑處方

臨床經驗處方 (續篇)

一

臨床經驗處方 (續篇)

11

- (一) 硫酸苯齊特林片 Benzadrime Sulfate tab. 三片
 上每次服半至一片，一日三次。(興奮中
 樞神經，減少疲勞感)
- (二) 硫酸苯齊特林醴 Benzadrime Sulfate Elixer 二五・〇
 上一日三次分服。(同上)
- (三) 苦味素 Picrotoxin 〇・〇〇二
 上爲一次肌肉或靜脈注射(興奮蘇甦)
- (四) 白蘭地 Brandy 一〇・〇
 上爲一次頓服(興奮)
- (五) 葡萄酒 Rot-wine 二〇・〇
 上爲一次頓服(同上)

第三章 瀉下劑處方

- (一) 鎂乳 Milk of Magnesium 三〇・〇
 上爲一次頓服(緩瀉)
- (二) 重酒石酸鉀 Kali-bitartrate 一五・〇
 苦味酞 Tinct. Amarae 一・〇

- 糖漿 Simple Syr. 一〇・〇
 餾水 Aq. dest. 一〇〇・〇
 上一日三次分服(同上)
- (三) 煨製鎂 Mag. usta 五・〇
 上一日三次分服(同上)
- (四) 酚醌 Phenolphthalein 〇・三
 流動石臘 Liq. Paraffin 三〇・〇
 上於就寢前服一次，分三次服。(同上)
- (五) 流動石臘 Liq. Paraffin 三〇・〇
 上爲空腹一次頓服(同上)
- (六) 洋菜 Agar-Agar 二〇・〇
 上爲空腹一次頓服(同上)

第四章 利尿及防腐劑處方

- (一) 氨基茶鹼 Aminophylline 〇・一五
 橙皮糖漿 Syr. Aurant 一〇・〇
 餾水 Aq. dest 一〇〇・〇
 上一日三次分服(利尿)
- (二) 茶鹼醋醜鈉 Theophylline Sodium Acetate

	橙皮糖漿 Syr. Aurant	〇・六
	餾水 Aq. dest	一〇・〇
(三)	上日三次分服(同上)	一〇〇・〇
	汞菲靈 Mercurophylline	一・〇
(四)	上為一次靜脈或肌肉注射(同上)	一・〇
	含鈉梅毒特溶液 Meralluride Sodium Solution	一・〇
(五)	上為一次靜脈或肌肉注射(同上)	八・〇
	孟德立酸 Acid. Mendelic	六・〇
(六)	上分四次於一日內服完(尿防腐)	六・〇
	磺胺嘧啶 Sulfadiazine	六・〇
	重曹 Sodium Bicarb	六・〇
(七)	上分六次於一日內分服(同上)——所有之磺 胺劑均為尿防腐藥)	200,000i. u.
	青黴素 Penicillin	3c.c.
(八)	上分四次或六次於一日內肌肉注射(同上)	一・〇
	鏈黴素 Streptomycin	六・〇
	餾水 Aq. dest	六・〇

臨床經驗處方 (續篇)

(九)	上分四次或二次於一日內肌肉注射(同上)	〇・〇四
	馬法生 Marpharsen	四・〇
	餾水 Aq. dest	四・〇
(十)	上為一次靜脈注射(同上)	〇・六
	新阿斯凡納明 Neo-Arsphenamine	六・〇
	餾水 Aq. dest	六・〇
(十一)	上為一次靜脈注射(同上)	一一・〇
	醋酸鉀 Pot. Acetate	一一・〇
	檸檬酸鉀 Pot. Citrate	一五・〇
	開楊花酞 Tinnet Hyosgami	九〇・〇
	薄荷水 Aq. Menth. q.S.	九〇・〇
	上每三小時服一茶匙，和水內服。(利尿)	
【附註】	有利尿作用之藥物尚有甲狀腺素(Thyroid)・ 副甲狀腺(Parathyroid)，洋地黃類，咖啡鹼 類，水解蛋白質，葡萄糖，生理食鹽水，阿拉伯 樹膠，血漿，氯化鈣等。	

第五章 發汗及制汗劑處方

(一)	阿斯匹林 Aspirin	一・〇
-----	--------------	-----

上爲一次頓服(發汗)

(二) 精製樟腦 Camphor Depurat

乳糖 Sacch Lact

〇・三
一・〇

上一日三次分服(發汗)

(三) 莨菪膏 Extract Scopolia

乳糖 Sacch Lact

〇・〇六
〇・六

上一日三次分服(止汗)

第六章 祛痰劑處方

(一) 氯化銨 Ammonia Chloride

磷酸可台因 Cedin phosphor

妥魯糖漿 Syr. Tolu

簡水 Aq. dest

三・〇
〇・一二
一五・〇
一〇〇・〇

上一日三次分服(祛痰)

(二) 山大吐辛 Sedatussin

上一日三次分服(祛痰)

三〇・〇

(三) 信壽咳 Sinaco

上一日三次分服(同上)

三〇・〇

(四) 聖露 Sirof

二〇・〇

上一日三次分服(同上)

第七章 鎮痛劑處方

(一) 大老地特 Dilaudid

上爲一次皮下注射(鎮痛)

〇・〇〇三

(二) 優可大 Eucodal

上爲一次皮下注射(同上)

〇・〇〇三

(三) 度冷丁 Dolantin

上爲一次肌肉注射(同上)

〇・〇一

(四) 察托盼 Pantopon

上爲一次皮下注射(同上)

〇・〇一

(五) 安替匹林 Antipyrin

上爲一次皮下注射(同上)

一・一一

(六) 咖啡因 Caffein

上一日三次分服(同上)

〇・一一

(七) 披拉米洞 Pyramidon

上一日三次分服(同上)

〇・六

(八) 披拉米洞 Pyramidon

上一日三次分服(同上)

〇・六

(九) 比巴特魯 Barbitral

〇・六

(八) 咖啡密拿 *Caffeinal* 三片
 上一日三次分服(同上)

第八章 鎮靜鎮痙劑處方

- (一) 大命丁鈉 *Dilantin Sodium* 〇・三
 上裝入膠囊一日三次分服(特別對於痙攣)
- (二) 三美沙亭 *Trimethadione* 一・五
 上一日三次分服(同上)
- (三) 癩立蘇 *Dilantin* 六片
 上一日三次分服(同上)

第九章 鎮吐劑處方

- (一) 薄荷腦 *Menthol* 〇・五
 酒精 *Spirit* 二五・〇
 糖漿 *Simple Syr.* 一五・〇
 上一日三次, 每次一茶匙。(嘔吐, 暈船)
- (二) 阿那雖信 *Anesthesin* 一・五

臨床經驗處方 (續篇)

上一日三次分服(嘔吐)

第十章 麻醉劑處方

- (一) 鈉伊維木 *Eviqum Sodium* 〇・五
 餾水 *Aq. dest* 五・〇
 上一日二次緩靜脈注射(全身麻醉)
- (二) 木得所鈉 *Pentathal Sodium* 一・〇
 餾水 *Aq. dest* 五〇・〇
 上緩靜脈注射, 每分鐘一二公撮(同上)
- (三) 氧化亞氮 *Nitrous Oxide* 一・〇
 上與氧 10—20% 混合吸入(短時間手術之全身麻醉)
- (四) 圓丙烷 *Cyclopropane* 一・〇
 上與 38% 氧混合吸入(同上)
- (五) 乙烯醚 *Divinyl Ether* 一・〇
 上為吸入麻醉料
- (六) 鹽酸米替卡因 *Metycaine Hcl.* 一〇〇・〇
 餾水 *Aq. dest* 一〇〇・〇
 上為浸潤麻醉料

五

(七) 鹽酸奴潑開因 Nupercaine Hcl

餾水 Aq. dest 100.0

上爲浸潤麻醉料

(八) 鹽酸拉羅卡因 Laroacaine Hcl

餾水 Aq. dest 100.0

上爲傳導麻醉料

(九) 鹽酸何羅卡因 Holocaine Hcl

餾水 Aq. dest 100.0

上爲浸潤麻醉料

(十) 硫酸布他卡因 (布丁 Butacaine Sul-

fate 11.0

餾水 Aq. dest 100.0

上爲眼科麻醉料

第十一章 催眠劑處方

(一) 伊維本片 Evipna tab. 1片

上臨睡1次頓服(催眠)

(二) 朋乃諾片 Bonnox tab. 1片

上臨睡1次頓服(同上)

(三) 烹托巴比通鈉 Pentobarbital Sodium 0.1

上臨睡1次頓服(同上)

(四) 阿米他爾鈉 Amytal Sodium 0.1

上臨睡1次頓服(同上)

(五) 台而維那鈉 Delvinal Sodium 0.1

上臨睡1次頓服(同上)

第十二章 健胃消化劑處方

(一) 太卡釀酶 Liq Taka Diastasa 15.0

餾水 Aq. dest 100.0

上1日三次分服(助消化)

(二) 果百雅 Capaya Liq. 14.0

餾水 Aq. dest 100.0

上1日三次分服(同上)

(三) 胆鹽 Bile Salt 1.5

上1日三次分服(同上)

第十三章 補劑(強壯劑)處方

(一) 葉酸 Folic Acid 〇・〇一五

上為一次肌肉注射(補血)

(二) 肝浸膏 Livex Extract 1.0〇

上為一次肌肉注射(同上)

(三) 胖得榮 Pentamine 一瓶

上每次一湯匙，日服三次(貧血，衰弱)

附註：補劑種類繁多，不及備載。

第十四章 補精壯陽劑

(一) 奧利疝 Oreton 25mg.

上為一次肌肉注射，每三四日一次。

(二) 蓋世雄雞 Testoviron 25mg.

上為一次肌肉注射，每三四日一次。

(三) 安樂根 Ergon 25mg.

上為一次肌肉注射，每三四日一次。

(四) 百賴特靈 Perandron 25mg.

上為一次肌肉注射，每三四日一次。

(五) 得勢天生 Testison 25mg.

上為一次肌肉注射，每三四日一次。

臨床經驗處方 (續篇)

(六) 得勢雄 Testone 25mg.

上為一次肌肉注射，每三四日一次。

第十五章 營養劑處方

營養劑包括各種維生素劑，肝臟製劑，鈣劑，葡萄糖劑，魚肝油劑，水解蛋白質製劑，以及各種食物如牛肉汁，牛乳等。

第十六章 止瀉劑處方

(一) 磺胺脲 Sulfaguanidine 六〇〇

重曹 Sodium Bicarb 六〇〇

(二) 琥珀醯磺胺嘧啶 Sulfasuxidine 六〇〇

重曹 Sodium Bicarb 六〇〇

(三) 酞醯磺胺噻唑 Sulfathalidine 六〇〇

重曹 Sodium Bicarb 六〇〇

(四) 白陶土 Kaolin 1.0〇〇

上分六包，四小時服一包(同上)

上一日三次分服(止瀉, 吸着)

第十七章 驅虫劑處方

- (一) 赫昔雷瑣萃 *Ilexylresorcinol* 一・〇
上裝入膠囊空腹頓服, 服後二小時給瀉藥。
- (二) 土荆芥油 *Chenopodium oil* 十滴
上裝入膠囊空腹頓服, 服後二小時給瀉藥。
- (三) 四氫乙烯 *Tetrachlorethylene* 二・〇
上裝入膠囊空腹頓服, 服後二小時給瀉藥
- (四) 龍胆紫片 *0.03 Gentiana violet tab* 六片
上一日三次, 飯前服二片。

(五) 乙那弗他林 *Beta-Naphthalin* 〇・四
上一日三次分服。

第十八章 止血劑處方

- (一) 維生素K製劑, 每次二公絲片劑二—二片, 一日三次。
- (二) 仙鶴草素片 *Aggrimonine tab.* 六片
上一日三次分服。
- (三) 硫酸氫鈉梅那低翁 *Menadione Sodium Bisulfite* 一・〇
上一次肌肉或靜脈注射。

各科重要疾病分類處方摘要

第一章 傳染病劑處方

一 傷寒方

(1) 氯微素 Chloromycetin 五・〇

上第一次服二・五公分，以後每二小時服〇・二五公分，迄熱度降至常溫，改爲每三十一小時服一次。平均服藥八日。此爲治傷寒之新藥。

(2) 磺胺噻唑 Sulfathiazole 六・〇
磺胺脒 Sulfaguanidine 六・〇

上分六包，每四小時服一包。(腸消毒用)

(3) 狄茄令液 Digalen Liq. 一・五

烏羅透品 Urotropin 一・五

橙皮糖漿 Syr. Aurant 一五・〇

鹽水 Aq. dest 一〇〇・〇

上一日三次分服(預防心臟衰弱及尿路殺菌)

用)

(4) 溴化鈉 Sodium Bromide 二八・〇

含水氯醛 Chloral Hydrate 二八・〇

薄荷水 Peppermint water ad 一〇〇・〇

上每三四小時服一茶匙(譫妄時用)

(5) 次炭酸鈣 Bicnuth Subcarbonate 三〇・〇

甘油 Glycerin 一五・〇

生薑糖漿 Syr. of Ginger ad 一〇〇・〇

上每二小時服一茶匙，共服十次(止瀉用)

(6) 苦味素 Picrotoxin 二・〇

上一次肌肉注射(強心用)

二 霍亂方

(1) 酞磺胺噻唑 Sulfathalidine 六・〇

重曹 Sodium Bicarb 六・〇

上分六包，先服二包，以後每隔四小時服一包。

(2) 琥珀醯磺胺噻唑 Sulf. suxidine 六・〇

上分四至六次肌肉注射，每四或六小時一次

- (一) 磺胺嘧啶 Sulfadiazine 六〇〇
重曹 Sodium Bicarb 六〇〇
上分六包，先服二包，以後每四小時服一包
- (二) 磺胺噻唑 Sulfathiazole 六〇〇
重曹 Sodium Bicarb 六〇〇
上分六包，先服二包，以後每四小時服一包
- (三) 狄茄令液 Digalen Liq. 一〇・五
精製樟腦 Camphor Depurat 〇・五
覆盆子糖漿-Syr. Rub. idea. 一〇〇〇
餾水 Aq. dest 一〇〇〇
上一日三次分服（早期預防心臟衰弱用）
- (四) 林格氏液 Ringer's Solution 一〇〇〇〇
上為一次靜脈注射（促進毒素之排洩）
- (五) 顯茄膏 Ex. Belladonna 一〇〇
凡士林 Vaseline 五〇〇
上為塗布料（早期腺腫）

臨床經驗處方（續篇）

五 白喉方

- (一) 青黴素 Penicillin 400,000i.u.
餾水 Aq. dest 一〇〇〇
上每次注射 2c.c.，每三小時注射一次。最好同時併用白喉抗毒素。
- (二) 過錳酸鉀 Pot. Permang. 一〇〇
餾水 Aq. dest 一〇〇〇〇
上為含漱料（口有惡臭者用）
- (三) 硝酸士的年 Strychnine Nitrat 〇・〇〇一
餾水 Aq. dest 一〇〇
上為一次皮下注射（白喉性麻痺）
- (四) 5mg. 硫胺片 Thiamine Chloride tab. 六片
上一日三次分服（同上）
- (五) 雙氧水 2% Hydrogen Peroxide 三〇〇〇
上為含漱料
- (六) 鹽酸可卡因液 1-2% Cocaine HCl Sol. 一〇〇
上為咽部塗布料，一日二三次（嚥下困難者用）

- (七) 安息香酸鈉 Sodium Benzoiic 110.00
 餾水 Aq. dest 1100.00
 上為吸入料 (兼有咳嗽者用)
- 六 膽膜炭方
- (一) 青黴素 Penicillin 400,000i.u.
 餾水 Aq. dest 20c.c.
 每二小時肌肉注射一次，每次 2c.c.。(殺菌退熱)
- (二) 青黴素 Penicillin 20,000i.u.
 餾水 Aq. dest 40c.c.
 上為一次血管內注射用 (同上)
- (三) 磺胺嘧啶鈉 Sulfadiazine Sodium 11.00
 餾水 A. dest 400.00
 上為一次靜脈靜脈注射用 (同上)
- (四) 磺胺嘧啶 Sulfadiazine 10.00
 重曹 Sodium Bicarb 100.00
 上分十包，先服二—三包，以後每隔四小時服一包。(同上)
- (五) 磺胺甲基噻唑 Sulfamerazine 100.00
- 重曹 Sodium Bicarb 100.00
 上分十包，先服二—三包，以後每四小時服一包 (同上)
- (六) 磺胺雙甲噻唑 Sulfamethazine 100.00
 重曹 Sodium Bicarb 100.00
 上分十包，先服二—三包，以後每四小時服一包 (同上)
- (七) 磺胺嘔啶 Sulfapyridine 100.00
 重曹 Sodium Bicarb 100.00
 上分十包，先服二—三包，以後每四小時服一包 (同上)
- (八) 嗎啡阿刀平 Morphine Atropin 1c.c.
 上為皮下注射 (狂燥不眠用)
- (九) 卡代紫而 Cardiazol 3.00
 精製樟腦 Camphor Depurat 0.30
 橙皮糖漿 Syr. Aurant 100.00
 水 Aq. dest 100.00
 上目三次分服 (昏睡衰弱者用)
- (十) 水銀軟膏 Ointment of Mercury 100.00
 塗擦頸項等部 (項肌強直痙攣用)

七 丹毒方

(1) 青黴素 Penicillin 200,000 i.u.

餉水 Aq. dest 10c.c.

上每隔三—四小時肌肉注射一次，每次10c.c.

0.0 (消炎退熱)

(11) 氨基磺胺 Sulfanilamide 六.〇〇

重曹 Sodium Bicarb 六.〇〇

上分六包每四小時服一包(同上)

(12) 磺胺噻唑 Sulfathiazole 六.〇〇

重曹 Sodium Bicarb 六.〇〇

上分六包，每四小時服一包(同上)

(13) 硫酸鎂 Mag. Sulfate 五〇.〇〇

餉水 Aq. dest 一〇〇.〇〇

上為局部熱罨料(消炎)

八 破傷風方

(1) 破傷風抗毒素 Tetanus Antitoxin 20—50c.c.

上為一次皮下或靜脈注射，(愈早愈佳)

(11) 嗎啡司可朴拉明 Morphine Scopolamin 1c.c.

臨床經驗處方 (續篇)

(11) 食鹽 Sodium Chloride 〇.八九

葡萄糖 Glucose 五〇.〇〇

餉水 Aq. dest 一〇〇〇.〇〇

上為一次靜脈注射(強心，營養，稀釋毒素)

)。

(12) 安穩酞 Avertin 五.〇〇

餉水 Aq. dest 一〇〇.〇〇

上為一次灌腸料(鎮靜鎮痙用)

九 流行性感冒方

(1) 氟化銻 Ammonie chloride 一.五〇

錫香精 Spt. Amm. Aromatic 一.〇〇

甘草流浸膏 Ext. Licqurit fluid 一.〇〇

餉水 Aq. dest 一〇〇.〇〇

上1日三次分服(祛痰)

(11) 氟化銻 Ammonia chloride 一.五〇

磷酸可待因 Codein phosphor 〇.〇〇六

安魯糖漿 Syr. Tolu 六.〇〇

餉水 Aq. dest 一〇〇.〇〇

上1日三次分服(鎮咳祛痰用)

(三) 鏈黴素 Streptomycin 1.00

鹽水 Aq. dest 4.00

下分四次肌肉注射(退熱)

(四) 磺胺噻唑 Sulfathiazole 3.00

重曹 Sodium Bicarb 3.00

上分六包，每四小時服一包。(預防併發症)

(五) 硝酸士的年 Strychnine Nitrat 0.001

鹽水 Aq. dest 1.00

上為一次皮下注射(早期應用以防心力衰弱)

十 瘧疾方

(一) 白樂君 Paludrine 0.110.4

上1日二次分服(一切瘧疾用)

(11) 愛利命片 Ar. lan tab. 10片

第一劑第四片，經六—八小時後服二片，第二、第三日各於晨起服二片(良性瘧，惡性瘧)

(三) 五烷喹啉 Quinoine 0.05

用本藥 0.01gm.，與硫酸奎寧 0.2—0.3

gm. 內服，每四小時一次，日夜六次，以後

每三日服一次，連服一星期。

(四) 新阿斯凡納明 Neo-Arsphenamine 0.45

鹽水 Aq. dest 9.00

上為一次靜脈注射(久用奎寧不愈者試用本品)

【附註】：舊篇中瘧疾方項下之阿的平服法，應改為第一日服九片，分三次服，第二每日服三片，連服六日。

十一 再歸熱方

(一) 新阿斯凡納明 Neo-Arsphenamine 0.3

鹽水 Aq. dest 6.00

上為一次靜脈注射(退熱)

(11) 馬法生 Mapharsen 0.04

鹽水 Aq. dest 4.00

上為一次靜脈注射(同上)

(三) 酒石酸鉍鉀鈉 Sodium potassium bismuth

Tartrate 0.11

鹽水 Aq. dest 11.00

上為一次肌肉注射(効同上)

(四) 斯砒螺刺脫 Spirocid tab. 六片

上一日三次分服 (退熱)

(五) 斯妥乏所兒 Stovarsol tab. 六片

上一日三次分服 (同上)

十二 敗血膿毒症方

(一) 青黴素 Penicillin 200,000—400,000 i.u.

繭水 Aq. dest 10—20c.c.

上分五至十次肌肉注射，每三小時一次。(退熱)

(二) 磺胺嘧啶 Sulfadiazine 六〇〇

重曹 Sodium Bicarb 六〇〇

上分六包，每四小時服一包 (同上)

(三) 食鹽 Sodium chloride 〇・八五

葡萄糖 Dextrose 五〇〇〇

繭水 Aq. dest 一〇〇〇〇

上為一次靜脈注射 (稀釋處素)

十三 猩紅熱方

(一) 青黴素 Penicillin 200,000 i.u.

臨床經驗處方 (續篇)

繭水 Aq. dest 10c.c.

上分五次肌肉注射，每三小時一次。(殺菌退熱)

(二) 磺胺甲基噁啶 Sulfamerazine 六〇〇

重曹 Sodium Bicarb 六〇〇

上分六包，先服二包，每四小時服一包 (同上)

(三) 氯酸鉀液 3% Kali chlorat Sol. 三〇〇〇

上為含漱料，(咽喉發汗時用)

(四) 薄荷腦 Menthol 一〇〇

酒精 Spirit 一〇〇〇〇

上皮膚塗布 (皮膚搔痒用)

(五) 替莫兒 Thymol 〇〇五

凡士林 Vaseline 五〇〇〇

上為軟膏劑，皮膚塗布 (落屑時用)

十四 麻疹風疹水痘方

(一) 丙種維生素 Ascorbic Acid 500mg.

繭水 Aq. dest 5c.c.

上為一次肌肉或靜脈注射 (增強抵抗力，預防併發症)

(11) 磺胺噻唑 Sulfathiazole

重曹 Sodium Bicarb

上分六包，每六小時服一包(預防肺炎等併發病)

發病)

【附註】：其他用對症治療。

十五 痘瘡(天花)方

(1) 橄欖油 Oliver Oil

上為皮膚塗布料(皮膚緊張疼痛者用)

(11) 過錳酸鉀 Potassium permang

餾水 Aq. dest

上為皮膚塗布料(化膿期用)

(三) 磺胺噻唑 Sulfathiazole

重曹 Sodium Bicarb

上分六包，每五小時服一包(預防肺炎，中

耳炎等併發病用)

(四) 安替匹林 Antipyrin

盧米那 Luminol

上一日三次分服(頭痛，腰痛兼有煩燥不安

者用)

(五) 檸檬酸 Acid citric

赤葡萄酒 Rot wein

糖漿 Simple Syr.

餾水 Aq. dest

上一日三次分服(清涼飲料)

(六) 美鼠李流浸膏 Ex. Cascara Sag. fl.

複方大黃酊 Tct. Rhei co.

苦味酊 Tct. Amarae

餾水 Aq. dest

上一日三次食前分服(大便不暢者用)

十六 流行性耳下腺炎方

(1) 新阿斯凡納明 Neo-Arsphenamine

餾水 Aq. dest

上為一次靜脈注射(消炎退熱)

(11) 馬法生 Mapharsen

餾水 Aq. dest

上為一次靜脈注射(同上)

(三) 磺胺噻唑 Sulfathiazole

重曹 Sodium Bicarb

六〇〇

六〇〇

一〇〇〇

一〇〇〇

一〇〇〇

一〇〇〇

一〇〇〇

一〇〇〇

一〇〇〇

一〇〇〇

六〇〇

六〇〇

六〇〇

一〇〇〇

一〇〇〇

一〇〇〇

一〇〇〇

一〇〇〇

一〇〇〇

一〇〇

一〇〇

一〇〇

一〇〇

一〇〇

一〇〇

一〇〇

一〇〇

一〇〇

一〇〇

一〇〇

一〇〇

一〇〇

一〇〇

一〇〇

一〇〇

一〇〇

一〇〇

一〇〇

一〇〇

上分六包每四小時服一包（併發掌丸炎時用）

十七 嬰孩病方

(1) 新斯鐸波霜 Neo-Stibosan

鹽水 Aq. dest

〇・一
一・〇

上為一次靜脈注射第一日用 0.1gm.，以後用 0.2gm.，間日注射一次，約十次為一治療。（殺菌退熱用）

(11) 聖露斯鐸波霜 Solu-Stibosan

一・〇

上為一次靜脈或肌肉注射，第一日用 2c.c.，以後每日遞加 2c.c.，至加到 10c.c. 為度，全量可用 63c.c.。（同上）

(111) 尿素斯鐸貝明 Urea-Stibamine

〇・〇五

鹽水 Aq. dest

一・〇

上為一次肌肉或靜脈注射，每二三日注射一次，劑量漸次遞增至每次 0.2gm.，其後用此量繼續注射，共計 15—25 針，總量達 1.5—2.5gm. 為度。

(四) 加濃斯鐸波霜 Concentrated Solustibosan

一・〇

上為一次肌肉或靜脈注射，每十二小時注射一次，五日內共注射十次為一治療。

(五) 加濃斯鐸波霜混懸液 Solu-Stibosan Suspension

八・〇

上為一次肌肉注射，間日注射一次，五次為一治療。

(六) 聖露斯鐸新 Solu-Stibain

一・〇

上為一次肌肉或靜脈注射，可遞加至每次 5 c.c.。

第二章 內科病處方

A 呼吸病器

一 氣管支炎方

(1) 青黴素 Penicillin 200,000 i.u.

鹽水 Aq. dest 8c.c.

上分八次肌肉注射，每三小時一次（急性氣管支炎用）

二 腐敗性氣管支炎方

- (一) 米而安兒 MyrtoI 〇・五
 上裝入膠囊分五次於一日間內服(除臭, 減少分泌)
- (二) 青黴素 Penicillin 50,000 i. u.
 餉水 Aq. dest 五〇・〇
 上為吸入料
- (三) 磺胺嘧啶 Sulfadiazine 六・〇
 重曹 Sodium bicarb 六・〇
 上分六包, 每四小時服一包(消炎用)
- (四) 松節油 Terebithin Oil 一・〇
 上裝入膠囊一日三次分服(除臭, 減少分泌)
- (五) 氯仿酒精 Spt. Chloroform 四・〇
 猶卡列流浸膏 Fl. Ext. eucalypti 三〇・〇
 吐根流浸膏 Fl. Ext. ipeca 一・〇
 薄荷 Menthol 〇・〇六五
 水化松節油精醃 Elixir terpeni Hydras q. s.
 ad 一二〇・〇

臨床經驗處方 (續稿)

上每二小時服 4c. c. 。

三 氣管支喘息方

- (一) 鹽酸麻黃素 Ephedrine Hcl 〇・七八
 碘化鈉 Sodium iodide 八・〇
 盼托宗 Pantopon 'Roche' 〇・二六
 硝酸甘油酒精 Spt. Glyceryl trinitratis 一・〇
 菲諾巴比通醃 Elixir phenobarbital q. s. ad 一二〇・〇
 上每次服 4c. c. , 數小時一次(氣喘性呼吸困難)
- (二) 開楊花酞 Tet. Hyoscyami 一・五
 樂比利酞 Tet. Lobelia 一・〇
 苦味酞 Tet. Amarae 一・〇
 餉水 Aq. dest 一〇〇・〇
 上一日三次分服(緩解哮喘)
- (三) 拍司拍多 Paspal 〇・二
 上每星期接種一次, 共十次(上為腦下垂體中葉及多價性抗體原混合物之接種劑)

一九

- (四) 愛弗安甯 Ephedrin 〇・七五
- 枸橼酸鈣 Calcium citric 一・五
- 足拉米洞 Pyramiden 〇・三
- 上一日三次分服

四 肺炎方

- (一) 青黴素 Penicillin 200,000—400,000 i.u.
- 餽水 Aq. dest 10—20c.c.

上分五至十次肌肉注射，每隔二—四小時一次。(消炎退熱)

- (二) 鏈黴素 Streptomycin 一・〇
- 餽水 Aq. dest 六・〇

上分六次肌肉注射，每隔三—四小時一次(結核性肺炎)

- (三) 磺胺噻唑 Sulfathiazole 六・〇
- 重曹 Sodium Bicarb 六・〇

上分六包，先服二包，以後每四小時服一包

(消炎退熱)

- (四) 磺胺噻啉 Sulfadiazine 六・〇
- 重曹 Sodium bicarb 六・〇

上分六包，先服二包，以後每四小時服一包(同上)

- (五) 益解紛 Irgafen 六・〇
- 重曹 Sodium bicarb 六・〇

上分六包，先服二包，以後每四小時一包(同上)

五 肺水腫方

- (一) 硫酸鎂 Mag. Sulfate 三〇・〇
- 餽水 Aq. dest ad 六〇・〇

上清晨空腹頓服(減輕肺水腫用)

- (二) 食鹽水 5% Sodium chloride Sol. 一〇〇〇

上為一次靜脈注射(同上)

六 肺結核方

- (一) 鏈黴素 Dihydrostreptomycin 一・〇—三・〇
- 餽水 Aq. dest 四・〇—一二・〇

上於一日中分二—四次肌肉注射。(本品對大多數進行性或停滯性滲出型肺結核有效；對陳舊性乾酪性者則效果極微。)

(一) 對胺基柳酸 Para-Aminosalicylic Acid

11.0

上分七次內服，每三小時服一次，第一次至第六次每次1.5公分，末後一次在臨睡前服三公分。

七 肋膜炎方

(一) 青黴素 Penicillin

200,000 i.u.

澀水 Aq. dest

4.0

上分四次肌肉注射每3—4小時一次。(消炎退熱)

(二) 鏈黴素 Streptomycin

1.0—1.2.0

澀水 Aq. dest

4.0—1.8.0

上一日內分3—5次肌肉注射(結核性肋膜炎用)

(三) 磺胺嘧啶 Sulfadiazine

6.0

重曹 Sodium bicarb

6.0

上分六包，先服二包，以後每四小時服一包。(消炎退熱)

(四) 磺胺噻唑 Sulfathiazole

6.0

臨床經驗處方 (續篇)

重曹 Sodium bicarb

6.0

上分六包，先服二包，以後每四小時服一包(同上)

(五) 柳酸鈉 Sodium Salicylate

3.0

硫酸奎寧 Quinine sulfate

0.8

上一日三次分服(消炎退熱)

(六) 凡拉蒙 Veranon tab.

3片

上一日三次分服(止痛用)

B 消化器病

一 口內炎方

(一) 青黴素錠 Penicillin Lozenges

24片

上每小時含一片於口內，聽其徐徐溶化(消炎止痛)

(二) 磺胺噻唑片 Sulfathiazole tab.

12片

上每二小時含一片於口內，聽其徐徐溶化(同上)

(三) 龍胆紫 Gentiana Violet

1.0

澀水 Aq. dest

5.0

上為塗布料(殺菌消炎用)

(四) 阿那羅信 Anesthasin 1.0.0

上爲撒佈料(止痛用)

(五) 硫酸鎂 Mag. Sulfate 1.0.0.0

煨製鎂 Mag. usta 3.0.0

餾水 Aq. dest 1.00.0.0

上一日三次分服(輕瀉用)

一一 口頰環道方

(一) 青黴素 Penicillin 200,000 i.u.

餾水 Aq. dest 4—8 c.c.

上分4—8次肌肉注射,每3—6小時一次

(殺菌消炎退熱用)

(二) 青黴素鈣 Penicillin Calcium 100,000 i.u.

磺胺噻唑 Sulfis thiazole 30 gm.

上爲口腔患部撒佈料(同上)

(三) 青黴素鈣 Penicillin Calcium 150,000 i.u.

羰基磺胺 Sulfanilamide 1.5 3.0

輕質氯化鎂 Light Mag. Oxide 1.7.0.0—1.8.5

上爲口腔撒佈料(同上)

(四) 磺胺雙甲噻唑 Sulfamerazine 6.0.0

重曹 Sodium bicarb 6.0.0

上分六包,先服二包,以後每四小時服一包

(同上)

(五) 雙氧水 Hydrogen Peroxide 1.0.0.0

雷佛奴兒 Rhyanol 0.0.0.5

餾水 Aq. dest 1.00.0.0

上爲漱口料

(六) 硼醃水 3% Boric Solution 3.00.0.0

上爲漱口料

(七) 抗壞血酸 Ascorbic Acid 0.0.5

餾水 Aq. dest 5.0.0

上爲一次靜脈或肌肉注射

(八) 硝酸銀液 2% Argent Nitrat Sol. 1.00.0.0

上患部塗布(初期用,後期不可用)

三 胃酸過多方

(一) 重碳酸鈉 Sodium bicarb 1.0.8

氯化鎂 Mag. Oxide 1.0.8

上一日三次分服(制酸用, Sippy 氏粉

N.0.1)

- (二) 重碳酸鈉 Sodium Bicarb 一・八
次炭酸鈹 Bismuth Subcarb 一・八
上一日三次分服(同上) Sippy 氏粉 (No.2)
- (三) 鎂乳 Milk of Magnesia 一・〇
上一日三次分服(制酸用)
- (四) 三矽酸鎂 Magnesium Trisilicate 六・〇
上一日三次分服(同上)
- (五) 氫氧化鋁膠凝體 Aluminum Hydroxide Gel 一・〇
上一日三次分服(同上)
- (六) 氫氧化鋁 Aluminum Hydroxide 三・〇
三矽酸鎂 Magnesium Trisilicate 三・〇
上一日三次分服(同上)
- (七) 胃粘液素 Gastric Mucin 六・〇
上一日三次分服(同上)
- (八) 阿那雖信 Anesthesin 一・五
莨菪膏 Ex. Scopolia 10% 〇・七
上一日三次分服(制酸止痛)

- (一) 流質太干釀醱 Irg taka diastase 一五・〇
番木鱈酊 Tot. Nucis Vomica 一・二
餾水 Aq. dest 一〇〇・〇
上一日三次分服(健胃, 促進胃液分泌)。
 - (二) 番木鱈管 Ext. Nucis Vomica 〇・〇八
龍胆根末 Radix Gentiana Powder 三・〇
上一日三次分服(同上)
 - (三) 錫納酊 Tot. china 二・〇
大黃酊 Tot. Rhei 二・〇
生薑酊 Tot. Zingiber 二・〇
餾水 Aq. dest 一〇〇・〇
上一日三次分服(同上)
 - (四) 歐力新 Orexin 一・〇
上一日三次分服(同上)
- 五 胃擴張方
- (一) 食鹽 Sodium chloride 五・〇
餾水 Aq. dest 五〇〇・〇
上為胃洗滌料
 - (二) 帕帕維林 Papaverin 〇・一

臨床經驗處方 (續篇)

二四

- (一) 龍胆末 *Gentiana powder* 一〇〇
- 上一日三次分服(胃擴張性幽門痙攣)
- (二) 硫酸阿托品 *Atropine Sulfate* 〇〇〇〇
- 番木鱉膏 *Ext. Nucis Vomice* 〇〇〇
- 乳糖 *Aq. dest* 〇〇
- 上一日三次分服(同上)
- (三) 磷酸可待因 *Codein phosphor* 〇〇〇六
- 次柳酸鈹 *Bismuth subsalicylic* 一〇〇五
- 番木鱉膏 *Ext. Nucis Vomice* 〇〇〇六
- 乳糖 *Sacch Lact* 一〇〇
- 上一日三次分服(健胃止痛)
- (四) 水解蛋白質 *Protein Hydrolysate* 一磅
- 上每日服 30—50 公分, 用熱開水或牛乳調
- 和待涼後分次飲開, 連服至痊癒為止。(促
- 進潰瘍之痊癒, 止痛, 增進營養用)
- (五) 氫氧化鋁膠體 *Aluminium Hydroxide Gel* 一四〇
- 上分六次內服, 每二三小時一次, 和開水或

- (一) 牛乳服。(制酸止痛用)
- (二) 奴佛卡因 *Novocain* 一〇〇
- 餽水 *Aq. dest* 一〇〇〇〇
- 上每次服 1cc, e., 每 3—4 小時一次。(
- 止痛用)
- (三) 抗壞血酸 *Ascorbic Acid* 〇〇五
- 餽水 *Aq. dest* 五〇〇
- 上為一次肌肉或靜脈注射, 每日一次。(促
- 進潰瘍痊癒)
- (四) 菲諾巴比通鈉 *Phenobarbital Sodium* 〇〇三
- 顛茄酞 *Tct. Belladonna* 〇〇六
- 餽水 *Aq. dest* 一〇〇〇
- 上臨睡前半小時頓服(安眠止痛用)
- (五) 重曹 *Sodium bicarb* 三〇〇
- 炭酸鈣 *Calcium carbon* 一〇〇
- 維生素 γ *Thiamine Chloride* 15 mg.
- 上一日三次分服(中和胃酸, 止痛助消化)
- (六) 薛配粉一號及二號 *Sippy's Powder No. 1-2*

上交替應用（見胃酸過多方）

七 神經性嘔吐方

(一) 阿那雖信 Anaesthesin

莨菪膏 Ext. Scopolia 10%

上一日三次分服。

(二) 克魯布他諾 Chlorbutanol

苯坐卡因 Benzocaine

顛茄膏 Ext. belladonna

上吐時一包內服。

(三) 非諾巴比通諾 Phenobarbital Sodium

含水氯醛 Chloral Hydrat

複方荳蔻酊 Tct. Cardamon co

餾水 Aq. dest

上一日三次分服。

八 胃弛緩症方

(一) 甘油磷酸鈉 Sodium Glycerophosphate 1c.c.

上為一次肌肉注射（強壯用）

臨床經驗處方（續篇）

(一) 普淨 Purgin

藥喇叭末 Jalapae powder

上混和一次頓服。

(三) 番木鱉膏 Ext. Nucis Vomice

乳糖 Sacch Lact

上一日三次分服。

九 腸炎方

(一) 磺胺脈 Sulfaganidine

重曹 Sodium Bicarb

上分六包，先服二包，以後每四小時服一包

（細菌性腸炎用）

(二) 琥珀磺胺噻唑 Sulfasuxidine

重曹 Sodium Bicarb

上分六包，先服二包，以後每四小時服一包

（同上）

(三) 表飛鳴 Biofermin

愛而杜方 Eldoform

上一日三次分服（止酵止瀉用）

(四) 阿拉伯樹膠漿 Syr. Gummi Arabia

二五

次碳酸鉍 Bismuth Subcarbon 三・〇
阿片酊 Tct. Opium 〇・八

上每二或三小時服 20c.c.。(鎮靜腸管，止痛)

龍蜀葵糖漿 Syr. Althae 一〇・〇
鱈水 Aq. dest 一〇〇・〇

十一 腸結核方

上一日三次分服(止痛止瀉)

(一) 鏈黴素 Streptomycin 一・〇
鱈水 Aq. dest 四・〇

十 盲腸炎方

(一) 青黴素 Penicillin 200,000 i.u.
鱈水 Aq. dest 六・〇

(一) 對胺基柳酸 Para-Aminosalicylic Acid 一・〇
上分四次肌肉注射，每3—4小時一次。

上分4—6次肌肉注射，每四小時一次。(消炎)

上分九包，每三小時服一包，最後一次於臨睡前服二包，連服六日，休止一日。

(二) 磺胺噻唑 Sulfathiazole 三・〇

(二) 替阿可兒 Thiocol 三・〇

磺胺噻唑 Sulfathiazole 三・〇

(三) 上日三次分服。

重曹 Sodium Bicarb 六・〇

(四) 炭酸怪阿寇 Guajacol Carbon 一・〇

上分六包，先服二包，以後每四小時服一包(同上)

十二 腸出血方

(三) 蕁茄酊 Tct. Belladonna 一・〇

(一) 鹽酸優卡因液 5% Eucain Hcl Solution 10grtt

硫酸可亭 Codein Sulfate 〇・〇九

(一) 上日數次分服(安靜腸管)

縵草酊 Tct. Valeria 一・五

(二) 仙鶴草素 Agrimoline 10c.c.

鱈水 Aq. dest 六〇・〇

上爲一次肌肉注射（止血）

(三) 得羅保根 Thrombogen

10c.c.

上爲一次肌肉注射（同上）。

(四) 白阿膠 Gelatine Alba

30.0

(一)

赫破飛生 Hypophysin

5 unit

食鹽 Sodium chloride

10.0

(一)

上爲一次肌肉注射（麻痺性腸閉塞用）

餾水 Aq. dest

100.0

(一)

氯化鈉 Sodium Chloride

9.0

上一日三次分服（同上）

餾水 Aq. dest

100.0

(五) 嗎啡託品 Morphine Atropin

1c.c.

上爲一次皮下注射（鎮痛用）

上爲高壓灌腸料（因腸套疊而起之腸閉塞用，但僅限於發病初期，後期禁用）

十三 腸穿孔方

本症除用嗎啡類製品注射以外，須立即用外科手術治療，遲則不治。

(一)

溴化鉀 Pot. Bromide

11.0

療，遲則不治。

庶斯酞 Tet. Hyocynami

1.5

十四 腸弛緩方

苦味酞 Tet. Amarae

11.0

上爲一次肌肉注射（促進腸蠕動用）

餾水 Aq. dest

100.0

(一) 必妥得靈 Pituitrin

1c.c. (10unit)

(一)

上一日三次分服（止痛解痙）

(二) 必屈里興 Pitressin

0.5c.c.

(一)

嗎啡司可枋拉明 Morphin-Scopolamin

0.5-1c.c.

上爲一次肌肉注射（同上）

上爲一次皮下注射（同上）

(三) 新好美那兒 Neo-Hormonal

10-20c.c.

(一)

氯化鈣 Calcium Chloride

11.0

臨床經驗處方（續篇）

礦茄甙 Tct. Elladonna 1.00

苦味酞 Tct. Amarae 2.00

餾水 Aq. dest 100.00

上一日三次分服(同上)

十七 腸寄生蟲方

(一) 赫昔雷瑣辛 Hexylresorcinol 1.00

上裝入膠囊於清晨空腹頓服，服後2—3小時給與硫酸鎂一劑。(驅蛔蟲，鈎蟲，蟯蟲，短小絛蟲，薑片蟲用)

(二) 土荆芥油 Chenopodium Oil 10—15滴

上裝入膠囊於清晨空腹頓服後2—3小時給與硫酸鎂一劑。(驅鈎蟲及蛔蟲用)

(三) 四氯乙烯 Tetrachlorethylene 2c.c.

上裝入膠囊於清晨空腹一次內服，服後2—3小時給與硫酸鎂一劑。(驅鈎蟲，十二指腸鈎蟲，鞭蟲，蛔蟲，薑片蟲，蟯蟲用)，但對蛔蟲病有危險)

(四) 四氯化碳 Carbon tetrachlorat 2c.c.

上裝入膠囊分兩次於清晨空腹服，兩次之間

相隔為1—2小時，服完後2—3小時服瀉藥。(驅鈎蟲及薑片蟲用)

(五) 鹽酸奎寧 Quinine Hcl 2.00

餾水 Aq. dest 600.00

上為灌腸料(驅蟯蟲用)

(六) 龍胆紫片 0.03 gm. Gentiana Violet tab. 六片

上一日三次，食前服二片(驅肝蛭，腸圓蟲及蟯蟲用，如病人有蛔蟲，宜先用山道年驅蛔蟲)

十八 黃疸方

(一) 苯那弗安兒 Benzonaphthol 1.50

薄荷腦 Menthol 0.10

重曹 Sodium bicarb 2.00

乳糖 Sacch Lact 1.00

上一日三次分服(利尿利胆用)

(二) 甘露 Calomel 0.30

乳糖 Sacch Lact 1.00

上一日三次分服(利尿瀉下用)

- (二) 重酒石酸鉀 *Kali bitartaric* 10.0
- 硝酸鉀 *Kali Nitric* 1.5
- 苦味酞 *Tinct Amarae* 2.0
- 醋水 *Aq. dest* 100.0
- 上一日三次分服(利尿利胆用)
- (四) 除氯胆酸片 *Dechlorin tab.* 三片
- 上一日三次分服(同上)
- (五) 胆素靈 *Iscalin* 5c.c.
- 上為一次靜脈注射(同上)
- (六) 維生素丙 *Ascorbic Acid* 0.5
- 醋水 *Aq. dest* 5.0
- 上為一次靜脈注射
- (七) 子種維生素 *Vitamin K* 0.001
- 醋水 *Aq. dest* 1.0
- 上為一次肌肉注射
- (八) 青黴素 *Penicillin* 200,000 i.u.
- 醋水 *Aq. dest* 10c.c.
- 上分五至十次肌肉注射(胆管炎時消炎用)
- (九) 磺胺噻唑 *Sulfathiazole* 6.0
- 重曹 *Sodium Bicarb* 6.0

上分六包，每四小時服一包(同上)

十九 胆石症方

- (一) 阿托仿 *Atophan* 1.5—3.0
 - 上一日三次分服(溶解胆石，止痛用)
 - (二) 阿托仿耐而 *Atophanyl* 5—10c.c.
 - 上為一次靜脈注射用(同上)
 - (三) 油酸鈉 *Funtrrol* 九片
 - 上一日三次分服(溶解胆石，利胆用)
 - (四) 阿忒羅品帕帕維林 *Atropin-papaverin* 1c.c.
 - 上為一次皮下注射用(止痛用)
 - (五) 可賴乏兒 *Choleval 10%* 10—20c.c.
 - 上為一次靜脈注射用(溶解胆石，利膽用)
- 二十 腹水方
- (一) 重酒石酸鉀 *Kali bitartaric* 3.0
 - 尿素 *Urea* 1.0
 - 番木鱉酞 *Tct. Nux. Vomica* 1.0
 - 醋水 *Aq. dest* 100.0
 - 上一日三次分服(利尿強心用)

(一) 氨基茶鹼 Aminophylline

〇・二

橙皮糖漿 Syr. Aurant

一〇〇・〇

餾水 Aq. dest

一〇〇・〇

上一日三次分服(利尿用)

(二) 梅露特鈉 Meralluride Sodium

1c.c.

上爲一次肌肉或靜脈注射(利尿用)

(四) 尿素 Urea

三〇・〇

樹膠水 Acacia Water

一一〇・〇

桂皮糖漿 Syrup of Cinnamon ad 1110・〇

上每次一茶匙水釋內服(利尿用)

二十一 腹膜炎方

(一) 青黴素 Penicillin

200,000—400,000i. u.

餾水 Aq. dest

6—10 c.c.

上分六至十次肌肉注射，每隔3—4小時一

次(消炎用)

(二) 鏈黴素 Dihydro-Streptomycin

1・〇—11・〇

餾水 Aq. dest

三・〇—六・〇

上分二次肌肉注射，每隔十二小時一次(結

核性腹膜炎用)

(三) 磺胺噻啉 Sulfadiazine

111・〇

重曹 Sodium bicarb

111・〇

上分九包，先服2—3包，以後每四小時服

一包，症狀減輕時則應減少劑量。(消炎用)

C 循環器病

一 心臟病方

(一) 青黴素 Penicillin

200,000 i. u.

餾水 Aq. dest

1000 c.c.

上爲一日間靜脈內持續滴入用(心內膜炎、

心包炎，心肌炎殺菌，菌退熱用)

(二) 肝素(海泊林) Heparin

50 mg.

上溶於明膠溶液中每小時注射一次，與青黴

素之治療同時進行(心內膜炎防止血凝用)

(三) 鏈黴素 Dihydrostreptomycin 1・〇—11・〇

餾水 Aq. dest

三・〇—六・〇

上每六小時肌肉注射一次，每次1—1.5c.c.

。(對鏈黴素敏感細菌所致之心內膜炎，心

肌炎心包炎，用)

(四) 磺胺嘧啶 Sulfadiazine

一一·〇

重曹 Sodium bicarb

一一·〇

上分九包，先服二包，以後每四小時服一包

(心內膜炎，心肌炎用)

(五) 酒利汞 Salrgan

1c.c.

上為一次肌肉注射(退腫利尿用)

(六) 狹茄令液 Liq. Digalen

一·五

代猶雷汀 Diuretin

一·〇

苦味酞 Tct. Amarae

一·〇

糖水 Aq. dest

一〇〇·〇

上一日三次分服(強心利尿用)

(七) 樂盛靈液 Liq. rodealin

三·〇

醋酸鉀 Kali Acet

一·〇

糖水 Aq. dest

一〇〇·〇

上一日三次分服(同上)

(八) 卡代紫而液 Liq. Cardiazol

一·〇

安息香酸鈉咖啡靈 Caffein Sodium benzoic

一·〇

覆盆子糖漿 Syr. Rub. Idea

一〇〇·〇

臨床經驗處方 (續篇)

糖水 Aq. dest

一〇〇·〇

上一日三次分服(同上)

哇瓦因 Ouabain

0.5c.c.

上為一次靜脈或肌肉注射(強心用)

(九) 硫酸奎尼亭 Quinidine Sulfate

〇·六

上多製成片劑，一日三次分服(慢性心臟性不整脈)

(十) 碘化鉀 Potassium iodid

一·〇

(十一) 重曹 Sodium bicarb

一·〇

苦味酞 Tct. Amarae

一·〇

糖漿 S. S

一〇〇·〇

糖水 Aq. dest

一〇〇·〇

上一日三次分服(慢性心機炎用，須長期內服)

(十二) 硝基甘油 Nitroglycerin

〇·〇二

酒精 Spirit

一〇〇·〇

糖水 Aq. dest

一〇〇·〇

上每次服二十滴，一日數次。心绞痛發作時用)

(十三) 盼託烹 Pantopon Amp.

1c.c.

三十一

上爲一次皮下注射(同上)

(十四) 梯烏密拿 Theominal tab, 六片

上一日三次分服(預防心绞痛發作)

(十五) 鈣化代猶雷丁片 Calcium Diuretin tab, 六片

上一日三次分服(同上)

(十六) 男性荷爾蒙 Oreton 25 mg.

上爲一次肌肉注射, 每隔 2—3 日注射一次(同上)

(十七) 阿託方片 Atophan tab, 六片

上一日三次分服(由於風濕病所引起之心包炎用)

(十八) 鎮痙汽巴而勁 Spasmo-cibalgin 二片

上一次頓服(心绞痛發作時用)

二 動脈硬化及血壓過高方

(一) 醋酸鈉可可鹼 Theobromine & Sodium Acetate 六片

上一日三次分服(動脈硬化用)

(二) 甲狀腺粉 Thyreoidin 〇・二

上一次頓服, 每日一次(同上)

(三) 重曹 Sodium bicarb 五・〇

硝酸鉀 Kali Nitric 三・〇

硝酸鈉 Sodium Nitros 〇・二

苦味酞 Tct. Amarae 一・〇

餾水 Aq. dest 一〇〇・〇

上一日三次分服(減低血壓用)

(四) 碘化鈉 Sodium Iodid 一・〇

重碳酸鈉 Sodium bicarb 一・〇

苦味酞 Tct. Amarae 一・〇

餾水 Aq. dest 一〇〇・〇

上一日三次分服(同上)

(五) 硫酸鎂 Magnesium Sulfate 一・〇

餾水 Aq. dest 一〇〇・〇

上爲一次靜脈注射, 每日一次。(同上)

(六) 蘆丁 Rutin 300 mg.

上一日三次分服(同上)

(七) 鹽酸阿西芬哥靈 Acetylcholin hcl 〇・〇二

上爲一次皮下或肌肉注射, 一日二次(同上)

上)

(八) 硝基甘油 Nitroglycerin 六滴

上一日三次分服(同上)

三 血壓過低方

(一) 番本驚酞 Tct. Nucis Vomica 1.0.0

安息香酸鈉咖啡鹼 Caffein Sodium Benzoic 1.0.0

橙皮糖漿 Syr. Aurant 1.0.0.0

餾水 Aq. dest 1.00.0.0

上一日三次分服(強壯增高血壓)

(二) 奧拍太純 Oplarson 1c.c.

上為一次皮下注射,每日一次。(同上)

(三) 托拿福賜芬 Tonophosphin 1c.c.

上為一次肌肉注射,每日一次。(同上)

D 泌尿生殖器病

一 腎炎方

(一) 醋酸鉀液 Liq. Kali Acet 111.0.0

硝酸鉀 Kali Nitric 11.0.0

毛地黃酞 Tct. Digitalis 1.5

臨床經驗處方 (續篇)

六滴

苦味酞 Tct. Amarae 11.0.0

餾水 Aq. dest 100.0.0

上一日三次分服(利尿退腫用)

(二) 烏伐烏爾西葉 Inf. Folia uvae ursi (10.0)

糖漿 Simple syr. 5.0.0.0

餾水 Aq. dest 1.0.0.0

上一日三次分服(利尿用)

(三) 硫酸鎂 Magnesium Sulfate 25.0.0

餾水 Aq. dest ad 5.0.0.0

上為清晨空腹一次頓服(瀉下,退腫,減低

血壓用)

(四) 水解蛋白質 Protein Hydrolysate 100.0.0

上於一日間沖牛乳或開水分數次內服。(利

尿用)

(五) 甲狀腺粉 Thyroidin 0.3

上一日三次分服(甲狀腺肌能不足之腎炎用)

)。

(六) 柯柯納柳酸鹼 Theobromine sodii Salicylate 15.0.0

1.5.0.0

臨床經驗處方 (續篇)

- 檸檬酸鈉 *Sodii citras* 二四〇〇
 - 醋酸鈉 *Sodii acetat* 二〇〇〇
 - 毛地黃酞 *Tet. Digitalis* 三〇〇〇
 - 繡水 *Aq. dest ad* 一四〇〇
 - 上每次食後服 4c.c. 一日三次。(利尿用)
- 二 腎上腺方

- (一) 青黴素 *Penicillin* 200,000 i.u.
- 繡水 *Aq. dest* 10c.c.

上分五次肌肉注射，每 3-4c.c. 一次。(由於淋菌，鏈球菌等所傳染之腎盂炎用)

- (二) 磺胺噻唑 *Sulfathiazole* 六〇〇
- 重曹 *Sodium bicarb* 六〇〇

上分六包，每四小時服一包。(同上)

- (三) 鏈黴素 *Dihydrostreptomycin* 一〇〇
- 繡水 *Aq. dest* 4c.c.

上分兩次肌肉注射，上午八時及下午八時各一次。(由於大腸菌，傷寒菌所致之腎盂炎用)

- (四) 杏仁酸 *Mandelic Acid* 一二〇〇

上為一日三次分服。(泌尿道防腐殺菌用，最好同時內服酸類藥品)

- (五) 烏羅透品 *Urotropin* 一一〇〇
- 稀鹽酸 *Acid Hydrochloride Dil.* 一一〇〇
- 覆盆子糖漿 *Syr. Rub. idea* 一〇〇〇
- 繡水 *Aq. dest* 一〇〇〇
- 上一日三次分服(同上)

三 腎結核方

- (一) 鏈黴素 *Dihydrostreptomycin* 一〇—一一〇〇
- 繡水 *Aq. dest* 四〇〇—一八〇〇

上分二次肌肉注射，早晚各一次。

- (二) 氯黴素 *Chloromycetin* 五〇〇

上第一次服 2.5 公分，以後每二小時服 0.5 公分。(本品效果尚在臨床試用中)

- (三) 對氨基柳酸 *Para-aminosalicylic Acid* 一一〇〇

上分九包，每三小時服一包，臨睡前服二包。

四 尿毒症方

(一) 阿特林 Adalin 〇・六

代猶雷丁 Diuretin 一・五

鹽酸帕帕維林 Paraverin Hcl 〇・〇一二

上一日三次分服(鎮瘡利尿用)

(二) 溴素樟腦 Bromcamphor 四・〇

代猶雷丁 Diuretin 四・〇

柳酸鈉咖啡因 Caffein Sodium Salicyl 二・〇

甘草流膏 Extrat Liquirit q.s.

上混和為五十九丸，一日兩次，每次服三丸(同上)

(三) 硫酸鎂 Magnesium Sulfate 一五—三〇・〇

餾水 Aq. dest 三〇—六〇・〇

上為一次頓服量，每小時服一次，一日三次。(減低血壓及減輕神經症狀用)

(四) 食鹽 Sodium chloride 四・二五

餾水 Aq. dest 五〇〇・〇

上為一次靜脈注射用。

(五) 毛地黃酞 Tinct Digitalis 二・〇

烏羅透品 Urotropin 二・〇

硫酸鎂 Mag. Sulfate 三〇〇・〇

臨床經驗處方 (續篇)

餾水 Aq. dest 一〇〇・〇

上一日三次分服(強心利尿減低血壓減輕神經症狀用)。

(六) 含水氯醛 Chloral Hydrat 二・〇

餾水 Aq. dest 一〇〇・〇

上為一次灌腸料(鎮瘡用)

五 膀胱炎方

(一) 青黴素 Penicillin 200,000 i.u.

餾水 Aq. dest 10c.c.

上分十次肌肉注射，每三—四小時一次(消炎用)

(二) 磺胺噻唑 Sulfathiazole 六・〇

重曹 Sodium bicarb 六・〇

上分六包，每四小時服一包(同上)

(三) 鏈黴素 Dihydro Streptomycin 一・〇

餾水 Aq. dest 四・〇

上分二次肌肉注射，早晚各一次(大腸菌、結核菌、傷寒菌所傳染之膀胱炎用)

(四) 杏仁酸 Mandelic Acid 二・〇

臨床經驗處方 (續篇)

上一日三次分服 (消炎)

(五) 利瓊辛 Resorcin

餾水 Aq. dest

1.0
200.0

上為膀胱沖洗料

(六) 食鹽 Sodium chloride

餾水 Aq. dest

1.7
200.0

上為膀胱沖洗料。

六 血尿方

(一) 乳酸鈣片 Calcium Lact

上一日三次分服。

六片

(二) 得羅保根 Thrombogen

上為一次肌肉注射。

10c.c.

七 陽萎方

(一) 磷酸鋅 Zinc phosphor

番木鱞膏 Ext. Nucis Vomica

0.01
0.06

甘草末 Pulv. Liquirit

q.s.

上為丸數粒，一日三次分服。

(二) 奧利通 Oreton

25mg.

上為一次肌肉注射，每隔3—4日一次。

(四) 百賴特靈 Parandren

上為舌下應用，放置舌下，聽其徐徐溶化。

三片

(五) 蓋世維雄 Testoviron

上為一次肌肉注射，每隔3—4日一次。

25mg.

八 遺精方

(一) 路普林 Lupulin

白糖 Sacch. Alba

1.0
1.0

上分四包，一日四次分服。

(二) 巴比通 Barbitone

加爾摩丁 Calmetin

0.2
0.3

上為就寢前一次頓服。

(三) 含水氯醛 Chloral Hydrat

溴化鉀 Potassium Bromida

1.0
1.5

苦味酞 Tct. Amarae

餾水 Aq. dest

1.0
0.0

上一日三次分服。

九 睪丸炎方

(一) 青黴素 Penicillin 200,000 i.u.

鹽水 Aq. dest 六〇〇

上分六次肌肉注射，每3—4小時一次。

(二) 磺胺噻唑 Sulfathiazole 六〇〇

重曹 Sodium bicarb 六〇〇

上分六包，每四小時服一包。

(三) 明礬 Alumen 四〇〇

醋酸鉛 Plumb Acet 二〇〇〇

鹽水 Aq. dest 四〇〇〇

上為罨包料 (Burov's 液)

E 神經系病

一 腦出血方

(一) 可拉明液 Coramine 2c.c.

上為一次皮下注射 (昏睡甚深，脈搏微弱，呼吸不整者用)

(二) 康福那心 Camphonasin 2c.c.

上為一次皮下注射 (同上)

(三) 士的年針 Strychnine Nitrit 1c.c.

上為一次皮下注射 (同上)

(四) 巴比士酸鈉 Barbital Natrium 〇〇五

鹽水 Aq. dest 一〇〇〇

上為灌腸料 (痙攣不安者用)

(五) 含水氯醛 Chloral Hydrat 一〇〇〇

鹽水 Aq. dest 一〇〇〇

上為灌腸料 (同上)

(六) 可阿古連 Coagulen 10c.c.

上為一次肌肉注射 (制止出血)

(七) 碘化鉀 Potassium iodid 一〇〇

重曹 Sodium Bicarb 二〇〇

橙皮糖漿 Syr. Aurant 一〇〇

鹽水 Aq. dest 一〇〇〇

上一日三次分服 (發作後減低血壓，促進溢

出血液之吸收用)

(八) 酒年錠 Sajodin 六片

上一日三次分服 (同上)

(九) 亞瀝佛耳 Alival 三片

上一日三次分服 (同上)

(十) 哥羅仿 Chloroform 一〇〇

橄欖油 Oliver Oil 九〇〇

臨床經驗處方 (續篇)

三八

上局部塗擦用 (發作後之癰瘰)

一 脊髓癆方

- (一) 亞砒酸 Acid Arsenic 〇・〇・五
 硝酸銀 Argent Nitrit 〇・〇・五
 白陶土 Kaolin 一〇・〇〇
 甘草膏 Ext. Liquirit q.s.
 上為丸五十粒，一日三次，每次一粒，(長服)
- (二) 台盼腫胺 Tryparamide 一・〇〇
 餉水 Aq. dest 一〇・〇〇
 上為一次肌肉或靜脈注射(驅梅毒法)
- (三) 馬法生 Maphasen 〇・〇・六
 餉水 Aq. dest 六・〇〇
 上為一次靜脈注射(同上)
- (四) 青黴素 Penicillin 200,000i.u.
 餉水 Aq. dest 六・〇〇
 上分六次肌肉注射，每小時一次(同上)
- (五) 青黴素油劑 Penicillin Oil with procaine 300,000i.u.

上每日注射一劑(同上)

(六) 甲狀腺素 Thyroxin

5m₃.

上為一次肌肉或靜脈注射(心悸鬱悶，振顫，肌肉拘攣用)

(七) 秉乃維 Berbera

10 m₃.

上每日皮下或肌肉注射一劑。(恢復神經機能用)

三 神經痛方

- (一) 含水氫醌 Chloral Hydrat 一・〇〇
 溴化鉀 Potassium Bromide 一・〇五
 苦味酞 Tct. Amarae 一・〇〇
 餉水 Aq. dest 一〇〇・〇
 上一日三次分服(止痛)
- (二) 疋拉米洞 Pyramidon 〇・〇・六
 巴比通 Barbitone 〇・〇・六
 上一日三次分服(同上)
- (三) 阿司匹靈 Aspirin 一・〇五
 非那昔丁 Phenacetin 一・〇〇
 咖啡因 Carfein 〇・三〇

上一日三次分服(同上)

(四) 鹽酸嗎啡 Morphine Hcl

白糖 Sacch alba

上為一包頓服(同上)

(五) 密古雷絳 Migrænin

上一日三次分服(同上)

(六) 迄巴而勁 Cibagin tab.

上一日三次分服(同上)

(七) 散利痛 Saridon tab.

上一日三次分服(同上)

四 頭痛及偏頭痛方

(一) 硝基甘油 Nitroglycerin

磷酸 Acid phosphor

酒精 Spirits

上一日二次，每次二滴(偏頭痛用)

(二) 硫酸奎寧 Quinine Sulf.

亞砷酸 Acid arsenic

印度大麻膏 Ext. Cannabis ind.

甘草膏及末 Liquirit Ext. & pulv.

〇・〇・一

一・〇

一・五

三片

三片

上為丸三十粒，每夜服一粒(同上)

(三) 酒石酸麥角酸 Ergotamine Tartrate

0.25 mg.

上為一次皮下或肌肉注射(同上)

(四) Dihydroergotamine (簡稱 D.H.E.) 0.25 mg.

上為一次皮下或肌肉注射(同上)

【附註】：其他可用神經痛方

五 神經炎及多發性神經炎

(一) 新阿斯凡納明 Neo-Arsphenamine 〇・四五

餽水 Aq. dest

上為一次靜脈注射(梅毒性神經炎)

(二) 馬法生 Mapharsen 〇・〇四

餽水 Aq. dest

上為一次靜脈注射(同上)

(三) 阿托方片 Atophan tab. 三片

上為一次靜脈注射(痛風性神經炎)

(四) 維乙素 5mg. Thiamine Chloride tab. 六片

上為一次靜脈注射(多發性神經炎)

(五) 樟腦酒精 10% Spt. Camphor 一〇〇・〇

臨床經驗處方 (續篇)

上爲局部塗擦用 (慢性神經炎用)

(六) 硝酸士的年 Strychnine Nitrite 1c.c.

上爲皮下注射用 (慢性神經炎, 先用小量, 漸次增加)

(七) 皮他林 Betalin S 100mg c.c. 0.5—1c.c.

上爲一次皮下注射 (多發性神經炎)

六 癩癩方

(一) 癩立膏 Dilantin tab. 十二片

上一日三次分服。(癩癩)

(二) 三美沙亭 Trimethadione 一·五

上裝入膠囊, 一日間分 3—6 次內服。(小發作型癩癩)

(三) 大命丁鈉 Dilantin Sodium 〇·三

上裝入膠囊, 一日三次分服。(癩癩)

(四) 米散替紅 Mesantoin 〇·三

上一日三次分服。(大發作用)

(五) 氫溴酸斯可朴拉明 Scopolamine Hydrobromide 一·〇

上爲一次皮下注射 (同上)

七 躁躁症方

(一) 癩立膏 Dilantin tab. 十二片

上一日三次分服。

(二) 含水氫醯 Chloral hydrate 二·〇

溴化鉀 Pot. Bromide 一·五

苦味酞 Tct. Amarae 一·〇

餾水 Aq. dest 一〇〇·〇

(三) 安眠朋片 Evipan tab. 二片

上一日二次分服。

八 神經衰弱方

(一) 甘油磷酸鈣 Calcium Glycerophosphate 五〇·〇

規那酒 Vin. China 一〇〇·〇

橙皮糖漿 Syr. Aurant 五〇·〇

餾水 Aq. dest 一〇〇·〇

上一日三次, 每次一茶匙。

(二) 溴化鉀 Pot. Bromide 二·〇

溴化鈉 Sod. Bromide 1.0.0

額草酞 Tet. Valeria 11.0.0

苦味酞 Tet. Amarae 11.0.0

鹽水 Aq. dest 100.0.0

上一日三次分服。

(三) 甘油磷酸鈉 Sodium Glycerophosphate 1c.c.

上為一次肌肉注射。

九 暈船症方

(一) 硫酸士的年 Strychnine Sulfas 0.0.011

硝酸鉀 Kali Nitrates 0.0.065

硫酸阿托品 Atropin Sulfas 0.0.015

咖啡因 Caffeine 0.0.315

鹽酸可卡因 Cocain Hydrochloride 0.0.16

硫胺 Thiamine Hydrochloride 0.0.065

菸鹼酸 Nicotinic Acid 0.0.315

薄荷 Menthol 0.0.315

丁香油 Caryophylli Oil 0.0.616

碳酸鎂 Magnesium Carbonas 0.0.130

臨床經驗處方 (續篇)

上製成丸劑一粒，給十二粒，暈船時服一粒。

(一) 加爾茂丁 Calmotin 0.5

上船時一次頓服。

(三) 含水氯醯 Chloral Hydrat 11.0

溴化鉀 Potassium bromide 1.5

苦味酞 Tet. Amarae 11.3

鹽水 Aq. dest 100.0.0

上一日三次分服。(長途旅行車船上用)

(四) 巴比通 Barbitone 0.3

上船時一次頓服。

(五) 司可朴拉明 Scopolamin 0.5 mg.

上為一次皮下注射。(嘔吐時注射)

F 血液方

一 貧血方

(一) 肝膏 Liver Extract 2u.s.p. 1c.c.

上為一次肌肉注射，每日或間日注射一次。

(二) 葉酸 Folic Acid 15 mg.

鹽水 Aq. dest 1c.c.

上為一次肌肉注射(巨血球性貧血)

- (三) 亞砒酸鉀液 *Liq. Kali Arsenic* 〇・五
- 番木鱉鹵 *Tct. Nucis Vomice* 一・〇
- 苦味酞 *Tct. Amarae* 二・〇
- 糖水 *Aq. dest* 一〇〇・〇
- 上一日三次分服。
- (四) 鐵質菲羅液 *Ferrophytin Liq.* 一五・〇
- 上一日三次分服。
- (五) 否雷爾氏液 *Liq. Fowlers* 一・五
- 林檎鐵酞 *Tct. Ferri pomat* 一・五
- 複方規那酞 *Tct. China Co.* 二・〇
- 番木鱉鹵 *Tct. Nucis Vomice* 一・〇
- 糖水 *Aq. dest* 一〇〇・〇
- 上一日三次分服。
- (六) 枸橼酸鐵 *Ferric citric* 三・〇
- 龍胆末 *Rad. Gentiana Pulv* 〇・六
- 龍胆根浸膏 *Ext. Gentiana Rac.* 一・八
- 上混和為丸三十粒。一日三次，每次一粒。
- (七) 胃粉 *Stomach Powdered* 2單位
- 上一日數次分服，此單位為內服單位。

(八) 文屈口林 *Ventriculin*

四〇・〇

(九) 愛克屈林 *Extralin*

三・〇

上一日數次分服。(同上)

二 萎黃病方

本病之治療除用砒，鐵，肝胃等製劑外，其他用維生素甲，丙，卵巢製劑等，茲舉數例如下：

(一) 抗壞血酸 *Ascorbic Acid* 〇・五—一・〇

上一日三次分服。

(二) 比日魚肝油 *Halibut Liver oil* 一・〇

上一日數次分服。

(三) 愛司屈龍 *Estrens* 5mg.

上為一次肌肉注射，每週2—3次。

三 白血病方

本病治療用砒劑，肝臟製劑，脾抽出劑等。

四 紫斑病方

(一) 奧斯得靈鈣 *Calcium Ostelin* 1c.c.

- | | | | | | |
|-----|------------------------|---------|------|-------------------------|------|
| (二) | 子種維生素 Vitamin k | 2mg | (十) | 消毒牛乳 Milk Sterilized | 五〇〇 |
| | 上為一次肌肉注射。 | | | 上為一次肌肉注射。 | |
| (三) | 丙種維生素 Ascorbic Acid | 〇・五 | | 五 環血病方 | |
| | 上為一次靜脈或肌肉注射。 | | (一) | 抗壞血酸 Ascorbic Acid | 〇・五 |
| (四) | 可阿古連 Coagulen | 10c.c. | | 鹽水 Aq. dest | 五〇〇 |
| | 上為一次肌肉注射。 | | | 上為一次靜脈注射。 | |
| (五) | 剛果紅 Congo Red | 〇・11 | | 六 血友病方 | |
| | 鹽水 Aq. dest | 20c.c. | (一) | 葡萄糖酸鈣 Calcium Gluconate | 1〇〇 |
| | 上為一次靜脈注射。 | | | 鹽水 Aq. dest | 1〇〇〇 |
| (六) | 氯化鈉 Sodium chloride | 11〇〇 | | 上為一次靜脈注射。 | |
| | 鹽水 Aq. dest | 11〇〇〇 | (11) | 氯化鈉 Sodium Chloride | 五〇〇 |
| | 上為一次靜脈注射。 | | | 葡萄糖 Glucose | 五〇〇〇 |
| (七) | 乳酸鈣片 Calcium Lact tab. | 九片 | | 鹽水 Aq. dest | 五〇〇〇 |
| | 上二日三次分服。 | | (三) | 上為一次靜脈注射。 | |
| (八) | 副腎素 Adrenaline | 0.5c.c. | (三) | 乳酸鈣片 Calcium Lact tab. | 六片 |
| | 上為一次皮下注射。 | | | 上二日三次分服。 | |
| (九) | 柳酸鈉 Sodium Salicylate | 11〇〇 | (四) | 抗壞血酸 Ascorbic acid | 〇・五 |
| | 重曹 Sodium bicarb | 11〇〇 | | 鹽水 Aq. dest | 五〇〇 |
| | 上二日三次分服。 | | | | |

上為一次靜脈注射。

(五) 子種維生素 Vitamin K 1.5mg.

餾水 Aq. dest 1c.c.

上為一次肌肉注射。

(六) 仙鶴草素 Agrimoline 10c.c.

上為一次肌肉或靜脈注射。

G 新陳代謝病

一 糖尿病方

(一) 胰島素 Insulin 1 bottle

上開始每日注射5—10單位，皮下注射。注

射時間以在飯前十五分鐘至二十分鐘最為相

宜。亦有需用每日 20-40 單位者，但須分

2-3 次注射。

(二) 含鋅胰島素 Zinc insulin 1 bottle

上開始每日注射5—10單位，皮下注射。

二 尿管症方

(一) 必妥得靈 Pitu trin 1c.c.

上為一次皮下或肌肉注射。

(二) 赫破飛生 Hypophysin 1c.c.

上為一次皮下或肌肉注射。

(三) 英芬定 Infundin 1c.c.

上為一次皮下或肌肉注射。

(四) 腎酸腦垂體後葉素油劑 Pitressin tannate in oil 0.5

上為一次肌肉注射，隔 36-48 小時一次。

三 肥胖病方

(一) 甲狀腺粉 Thyreoidin 0.3

上一日三次分服 (促進脂肪之新陳代謝用)

(二) 甲狀腺素 Thyroxin 1mg.

上為一次靜脈注射 (同上)

(三) 必妥得靈 Pituitrin

上為一次肌肉注射 (同上)

(四) 代猶雷丁 Diurelin 1.5

安息香酸鈉咖啡因 Caffein Sodii Benzole

1.0

橙皮糖漿 Syr, Aurant 10.0

餾水 Aq. dest 100.0

上一日三次分服 (同上)

(五) 碘化鉀 Pot, iodid 一〇〇〇

重曹 Sodium bicarb 二〇〇

苦味酞 Tot Amarae 一〇〇〇

餾水 Aq. dest 一〇〇〇

上一日三次分服(同上)

四 痛風方

(一) 奴乏阿托方 Novatophan 三片

上一日三次分服(促進尿酸排泄止痛用)

(二) 哥枝禁酒 Tot. colchici 四〇〇

烏頭酞 Tot. aconiti 四〇〇

鴉牙酞 Tot. Cyium 四〇〇

上每小時服六滴，至輕快為止。

五 關節及肌肉痲痺費斯方

(一) 阿司匹林 Aspirin 一〇五

非那普丁 Phenacetin 一〇〇

上一日三次分服。

(二) 水楊酸鈉 Sodium Salicylate 三〇〇

苦味酞 Tot. amarae 三〇〇

薄荷水 Aq. Menthol pip, ad 一〇〇〇

上一日三次分服。

(三) 阿托方 Atophan tab, 三片

上一日三次分服。

(四) 水楊酸鈉 Sodium Salicylate 八〇〇

水楊酸鈉咖啡因 Sodium Caffein Salicylic 二〇〇

餾水 Aq. dest 五〇〇

上煮沸消毒，注射，一公撮於皮下。

(五) 乳酪藥特靈『弱』 Yatrencasein, 'Weak' 5c.c.

上為一次肌肉注射，以後每隔一日注射 1-2 公撮。

(六) 消毒牛乳 Milk Sterilized 5c.c.

上為一次肌肉注射。

(七) 阿托方耐而 Atophanyl 10c.c.

上為一次肌肉注射。

(八) 鹽酸喜那美仁錠 Sinomenin Hcl. 3—5片

上一日三次分服。

(十) 精製樟腦 Camphor Depurat 三〇〇

臨床經驗處方 (續篇)

- 碘酒 Ict. iodine 3% 100.0
- 鼠仿 Chloroform 100.0
- 上塗擦局部。
- (十一) 魚石脂 Ichthyol 1.5
- 鼠仿 Chloroform 5.0
- 樟腦酒 Spt. Camphor 7.0
- 上混和為塗擦藥。

六 腳氣病

- (一) 硫胺 Thiamine Hydrochloride 100mg.
- 狄茄令 Digalen 1.5
- 覆盆子糖漿 Syr. Rub. Idea 100.0
- 餾水 Aq. dest 100.0
- 上一日三次分服。
- (二) 皮他林 Betalin S 100mg/c.c. 1c.c.
- 上為一次皮下或肌肉注射。
- (三) 皮他比恩 Betabion tab. 十二片
- 上一日三次分服。
- (四) 硫酸鎂 Mag. Sulfate 100.0
- 稀鹽酸 Acid Hydrochloride Dil. 1.0

- 番木鱈酊 Tct. Nucis Vomica 1.5
- 餾水 Aq. dest 100.0
- 上一日三次分服(衝心及浮腫型用)
- (五) 狄吉福林 Digitolin 2.0
- 代猶雷丁 Diuretin 1.0
- 橙皮糖漿 Syr. Aurant 100.0
- 餾水 Aq. dest 100.0
- 上一日三次分服(同上)

七 骨軟化病方

本症之處方與佝僂病同，參看小兒科劑處方項下。

H 內分泌腺病

- 一 巴錫陀氏病方
- (一) 睪酮 Testosterone 0.6
- 上分六包，每三小時服一包，臨睡前一次服二包。
- (二) 洛各氏液 Lugol's Solution 1.5
- 上一日三次分服。
- (三) 碘化鉀 Potassium Iodid 1.0

縮水 Ag, dest 110.0

(四) 抗甲狀腺液 Anti-thyroidin Liq. 六.0

(五) 濟諾革 Gymergen 1c.c.

(六) 愛哥可靈 Ergocholin 1c.c.

(七) 魚肝油精 Cod-liver-oil Concentrated 10c.c.

(八) 胰島素 Insulin 2unit

上為一次靜脈注射，一日二次，經二週後，改為每次五至十單位，連用6—8週，注射期間同時內服或注射葡萄糖。

一 粘液水腫方

(1) 甲狀腺素 Thyroxin 1mg.

(11) 甲狀腺片 Thyroid tab, u.s.p. 三片

臨床經驗處方 (續稿)

上為一日二次分服。

(11) 益利特靈 Elixylan 六片

上為一日二次分服。

三 阿狄森氏病方

(1) 可丁(副腎皮質內分泌素) Cortin 1—5c.c.

上為一次肌肉或靜脈注射，每日一次。

(11) 結晶性副腎皮質內分泌素 Desoxycorticosterone 5—25mg

上為一次肌肉注射，每日一次。

(11) 食鹽片 Sodium Chloride tab. 十二片

上為一日數次分服。

第三章 小兒科劑處方

一 鵝口瘡方

(1) 龍胆紫液 1% Gentiana Violet 100.0

上以棉花球蘸少許每日塗抹口腔一次。

(11) 朵貝爾氏溶液 Dobell's Solution 1100.0

上為口腔洗滌料。

一 生齒困難方

(一) 奧斯得靈鈣 *Osteim Calcium* 0.5—1c.c.

上每日肌肉注射一次。

(二) 魚肝油精 *Cod-liver-oil Concentrate*

10c.c.

上每日服 3—9 滴。

(三) 乳酸鈣片 *Calcium Lact tab.* 二片

上一日三次分服。

(四) 葡萄糖鈣片三片 *Calcium Gluconate tab.* 三片

上一日三次分服。

附註：疼痛不眠者可用鎮痛鎮靜劑。

三 小兒消化不良及吐瀉方

(一) 重碳酸鈉 *Sodium bicarb* 〇.三

薄荷 *Menthol* q.s.

餾水 *Aq. dest* 三〇.〇

上每次服 2—4 公撮。(鎮吐用)

(二) 阿那雖信 *Anaesthesia* 〇.二

阿刺伯樹膠漿水 *Sol. Gummi Arabia*

二〇.〇

(三) 阿利品溶液 *1% Alipin Solution* 二〇.〇

上每次服五公撮。(同上)

(四) 磺胺胍 *Sulfaguanidine* 一.五

次硝酸銻 *Bismuth Subnit* 〇.八

重曹 *Sodium bicarbonate* 一.五

上分六包，每四小時服一包，(3—4 歲小兒腸道內傳染之腹瀉用)

(五) 磺胺噻唑 *Sulfathiazole* 一.五

乳酸鈣 *Calcium Lact* 一.〇

重曹 *Sodium bicarb* 一.〇

上分六包，每四小時服一包。(3—4 歲小兒腸道外傳染之腹瀉)

(六) 鎂乳 *Milk of Magnesia* 五—一〇.〇

上為一次空腹頓服(緩瀉劑)

(七) 亞力山丁 *Allisatin tab.* 二片

上每日三次，每次半粒，(3—4 歲小兒之酸酵性腹瀉)

四 遺尿症方

(一) 溴化鉀 Potassium Bromide 〇・六

番木鱈甙 Tct. Nuc s Vomica 〇・三

苦味甙 Tct. Amarae 一・〇

餾水 Aq. dest 三〇・〇

上一日三次分服。

附註：小兒遺尿用藥多無效，應去其原因，如包莖，龜頭炎，寄生蟲病，膀胱炎，腎盂炎等，宜設法先治之。

五 小兒急癇方

(一) 麻酔用伊打 Aether For anaesthesia q.s.

(二) 阿佛丁 Avertin 三〇・〇

(三) 抱水克羅拉兒 Chloral Hydrat 〇・二

(四) 嗎啡司可朴拉明 Morphine Scopolamin 0.1—0.3c.c.

(五) 加錫佛僕 Calciferol 一五滴

(六) 照射魚肝油 Cod-liver-oil With Viosterol 三・〇

(七) 合力獲僕 Heliverol 一五滴

(八) 納維安兒 Navitol 一五滴

上為一次皮下注射(同上)

附註：其他須行各種原因治療。

六 佝僂病方

(一) 奧斯得靈鈣 Calcium ostelin 一・〇

(二) 滴鈣 Decal 一・〇

(三) 託拿福賜芬 Tonophosphan 一・〇

(四) 照射麥角醇油劑 Viosterol in oil 一五滴

(五) 加錫佛僕 Calciferol 一五滴

(六) 照射魚肝油 Cod-liver-oil With Viosterol 三・〇

(七) 合力獲僕 Heliverol 一五滴

(八) 納維安兒 Navitol 一五滴

臨床經驗處方 (續篇)

五〇

上一日三次分服。

餵水 Aq. dest

1:10:100

(九) 魚肝油精 Cod-liver-oil Concentrated

10c.c.

(十) 氧氣 Oxygen

一筒

上一日三次，每次五滴。

上為適量吸入用。

(十) 葡萄糖酸鈣片 Calcium Gluconate tab. 二片

上一日三次分服。

九 腸寄生蟲病方

(十一) 乳酸鈣片 Calcium Lact tab. 二片

二片

參照內科病篇，劑量按規定酌減。

七 腺病、結核、貧血及虛弱慢性病方

用魚肝油劑，鈣劑，磷劑，維生素劑，肝胃等補血劑，處方參看各該節下。

一 催進月經方

八 百日咳方

(一) 丙種維生素 Ascorbic Acid tab. 六片

六片

(一) 阿革滿新 Agomensin 1c.c.

1c.c.

上為一次肌肉注射，二三日一次。

(二) 垂體同性腺激素 Pituitary Gonadotropin 二五單位

二五單位

上一日三次分服。

上為一次皮下或肌肉注射，每日一次。

(二) 溴化鉀 Potassium Bromide 〇.三

(三) 黃體酮油劑 Progesterone in oil 1c.c.

氯化銨 Ammonia chloride 〇.三

上為一次肌肉注射，每日或隔日一次。

杏仁水 Aq. Leuroc 1.〇

(四) 愛司屈龍 Estrone 5mg.

甘草流浸膏 Ext. Liquirit fluid 一.五

上為一次肌肉注射，每星期注射2—3次。

第四章 婦科劑處方

(五) 甲狀腺素 Thyroxin 1mg.

上為一次靜脈注射，數日一次。

二 痛經方

(一) 溴化鉀 Potassium Bromide 六〇〇

安替匹林 Antipyrin 四〇〇

寒濟瀉流浸膏 Ex. Viburnum Prunifolium fl. 一〇〇〇

白蘭地酒 Brandy 一〇〇〇

橙皮糖漿 Syr. Aurant 一〇〇〇

餾水 Aq. dest 六〇〇

上一日三次，每次一食匙。

(二) 甯坤水 Liq. Sedans 一五〇

阿片酞 Tet. Opium 一〇〇

糖漿 S. S. 一〇〇

餾水 Aq. dest 一〇〇

上一日二次分服。

三 月經過多方

(一) 必妥得靈 Pituitrin 五單位

臨床經驗處方 (續篇)

上為一次肌肉注射。

(二) 西斯多滿新 Sistolensin 1c.c.

上為一次肌肉注射，每二三日注射一次。

(三) 酒石酸麥角脛 Gynergen 0.25mg.

上為一次肌肉注射。

(四) 白阿膠 Gelatine Alba 五一一〇〇

食鹽 Sodium Chloride 〇〇九

餾水 Aq. dest 一〇〇〇

上經消毒後取五公撮靜脈注射。

四 白帶方

白帶之由於淋濁性者，用青黴素及磺胺劑；由於滴蟲性者用 Devagan 或其他類似陰道球栓塞；由於陰道或子宮及其附屬器官之炎症者，則治療原疾患。一般可注射葡萄糖酸鈣，維生素丙等劑。

第五章 產科劑處方

一 妊娠性嘔吐方

(一) 幾阿蘇 Creosot 1:〇〇滴

臨床經驗處方 (續篇)

- | | | | | |
|-----------------------|-------|-----|---------------------|----------------------|
| 醋酸 Acid Acet | 四〇滴 | (七) | 愛思屈龍 Estrone | 5mg. |
| 鹽酸嗎啡 Morphine Hcl | 〇・〇六 | | 上為一次肌肉注射，每隔2—3日注射一次 | |
| 餾水 Aq. dest | 六〇・〇 | | | |
| (二) | | | 二 子痛方 | |
| 依莫兒 Eamol | 二・〇 | | | |
| 上為一次皮下注射用。 | | | | |
| (三) | | (一) | 鹽酸嗎啡 Morphine Hcl | 〇・一 |
| 鹽酸嗎啡 Morphine Hcl | 〇・二 | | 杏仁水 Aq. Leuroc | 一〇・〇 |
| 冰醋酸 Glacial Acet | 適量 | | 上每十五分鐘用十五滴。 | |
| 溶解後再加 Chloroform | 五・〇 | (二) | 食鹽 Sodium Chloride | 四，五 |
| 酒精 Alcohol | 一五・〇 | | 餾水 Aq. dest | 五〇〇・〇 |
| 上調和後以五滴和糖水服用。 | | | 上為灌腸料。 | |
| (四) | | | 三 產褥熱方 | |
| 薄荷腦 Menthol Cryst. | 一・〇 | (一) | 青黴素 Penicillin | 200,000—400,000i. u. |
| 上二日三次分服。 | | | 餾水 Aq. dest | 4—8 |
| (五) | | | 上分四至八次肌肉注射。(殺菌退熱) | |
| 碘酒 Tet. iodine | 一〇滴 | (二) | 兩效西林 Delaycillin | 300,000i. u. |
| 餾水 Aq. dest | 一五〇・〇 | | 上為一次肌肉注射，每日一次。(同上) | |
| (六) | | | | |
| 溴化鉀 Potassium Bromide | 二・〇 | | | |
| 含水氯醛 Chloral Hydrat | 一・五 | | | |
| 苦味酞 Tct. Amarae | 二・〇 | | | |
| 餾水 Aq. dest. | 一〇〇・〇 | | | |

(三) 磺胺噻呢 Sulfathiazine 六·〇

重曹 Sodium bicarb 六·〇

上分六包，先服二包，以後每四小時服一包

。(同上)

(四) 磺胺雙甲噻呢 Sulfamerazine 六·〇

重曹 Sodium bicarb 六·〇

上分六包，先服二包，以後每四小時服一包

。(同上)

四 催乳方

(一) 催乳素 Prolactin 一二〇〇單位

上為一次肌肉注射。

(二) 維生素丙 100mg. Ascorbic Acid 六片

上一日三次分服。

(三) 維生素乙複體 Vitamin B Complex tab. 六片

上一日三次分服。

(四) 必安得靈 Pituitrin 五單位

上為一次肌肉注射。

臨床經驗處方 (續篇)

五 產後貧血方

，參照內科病貧血方項下。

六 子宮弛緩症方

(一) 麥角流浸膏 Ext. Ergotin Fluid 二·〇

苦味酞 Tcf. Amarae 二·〇

餾水 Aq. dest 100·〇

上一日三次分服。

(二) 必安得靈 Pituitrin 五單位

上為一次肌肉注射，每日一次，連用數日。

(三) 英芬定 Infundin 五單位

上為一次肌肉注射，每日一次，連用數日。

(四) 麥角針 Ergotin Amp. 2c.c.

上為一次肌肉注射。

第六章 外科劑處方

一 癰腫，癰疽，膿瘍，肌炎，腱炎，

骨髓炎，骨膜炎，膿胸，乳腺炎，

血管炎，淋巴管及腺炎，關節炎

上分六包，每四小時服一包。

(十二) 磺胺雙甲噁啉 Sulfamethazine 六〇〇

重曹 Sodium bicarb 六〇〇

(十三) 磺胺吡嘧 Sulfapyrazine 六〇〇

重曹 Sodium bicarb 六〇〇

(十四) 青黴素 Penicillin 200,000i.u.

餾水 Aq. dest 4—8c.c.

(十五) 青黴素油劑 Penicillin in bees & wax 300,000i.u.

上為一次肌肉注射，每日一次。

(十六) 英得西林 Intracillin 300,000i.u.

上為一次肌肉注射，

(十七) 鏈黴素 Streptomycin 1,000

餾水 Aq. dest 四〇〇

附註：大部份之磺胺藥，其鈉鹽溶液可供肌肉及靜脈注射。

臨床經驗處方 (續篇)

一一 外科消毒 (殺菌防腐) 方

(一) 青黴素鈣 Penicillin Calcium 100,000i.u.

磺胺嘧啶 Sulfathiazole 30gm.

上為傷口撒布料。

(二) 青黴素鈉 Penicillin Sodium 100,000i.u.

磺胺醋胺鈉 Sulfacetamide Sodium 20gm.

餾水 Aq. dest 100〇〇

上為創口裹敷料或沖洗料。

(三) 青黴素鈣 Penicillin Calcium 50,000i.u.

羊毛醇軟膏 Ointment of wool alcohols 100〇〇

上為皮膚表面創傷塗敷料。

(四) 氨基磺胺 Sulfanilamide 五〇〇

凡士林 Vaseline 100〇〇

上為皮膚表面創傷塗敷料。

(五) 龍胆紫 Gentiana Violet 11〇〇

餾水 Aq. dest 100〇〇

上為皮膚塗佈料。

(六) 品紫 Crystal Violet 11〇〇

品紫 Crystal Violet 11〇〇

臨床經驗處方 (續篇)

五六

上為皮膚表面創傷塗敷料

餾水 Aq. dest 100.0

上為皮膚塗佈料。

三 止血方

(一) 氯化高銨酒 Tinct Ferri-Perchloride q.s.

上以棉球蘸藥液貼敷出血部。

(二) 可阿可連粉 Consalen Powder q.s.

上撒佈出血部而包紮之。

(三) 得羅保根粉 Thrombogen Powder q.s.

上撒佈於出血部而包紮之。

四 止痛方

(一) 鹽酸可卡因 Cocain Hydrochloride 0.5

拉諾林 Lanolin 18.0

洋橄欖油 Oliver oil 11.0

上混和為軟膏塗佈。

(二) 奴佛卡因 Novacain 1.0

凡士林 Vaseline 110.0

上調和為軟膏塗佈。

附註：內服止痛劑參着前鎮痛劑方。

五 全身麻醉方

(一) 木得所納 Pentothal Sodium 1.0

餾水 Aq. dest 50.0

上緩靜脈注射，每分鐘 1—2公撮。

(二) 納伊維本 Evipan-Sodium 0.5—1.0

餾水 Aq. dest 5.0—10.0

上緩靜脈注射，愈緩愈佳。

(三) 乙烯醚 Divinyl ether 30.0

上為吸入麻醉用。

(四) 蔽腦湯 Pernocion 4c.c.

上緩靜脈注射，愈緩愈佳。

六 腰椎麻醉方

(一) 普羅卡因 Procaine 11.0

餾水 Aq. dest 100.0

上為脊髓麻醉料，每次可用3c.c.

(二) 鹽酸奈潑卡因 Nupercaine Hel. 7—10mg.

餾水 Aq. dest 11.0

上為一次脊髓麻醉料。

七 局部麻醉方

(一)	鹽酸諾服卡因 Novacaine Hcl.	○·五——二·○
	鹽酸腎上腺素 Adrenaline Hcl.	五滴
	餾水 Aq. dest	100·0
	上為浸潤或傳達麻醉用。	
(二)	鹽酸脫羅帕可卡因 Tropacocaine Hcl.	100·0
	餾水 Aq. dest	100·0
	上為粘膜塗布麻醉用。	
(三)	斯托芬因 Stovain	1·0
	餾水 Aq. dest	100·0
	上為傳達麻醉用。	
(四)	培他歐卡因 Beta-Eucain	0·1
	餾水 Aq. dest	100·0
	上為浸潤麻醉用。	
(五)	硫酸布他卡因 Butacaine (Baly) Sulfate	0·2
	餾水 Aq. dest	100·0
	上為醫眼科 (麻醉止痛)	
(六)	鹽酸阿利品 Alypin Hcl.	0·5——1·5

臨床經驗處方 (續篇)

(七)	鹽酸赫羅卡因 Holocaine Hcl.	0·1
	餾水 Aq. dest	100·0
	上為點眼料 (麻醉止痛)	
(八)	鹽酸米替卡因 Metycaine Hcl.	0·5——1·2
	餾水 Aq. dest	100·0
	上浸潤麻醉，或眼科，耳鼻喉科麻醉料。	
八 火傷方		
(一)	氧化鋅 Zinc Oxide	100·0
	氨苯磺胺 Sulfanilamide	5·0
	奴佛卡因 Novacain	1·0
	凡士林 Vaseline	1000·0
	上製成軟膏塗敷火傷面用。	
(二)	青黴素鈣 Penicillin Calcium	50,000i. u.
	代馬安兒 Dermatol	100·0
	液體石蠟 Liq. Paraffin	500·0

白凡士林 Vaselin white 五〇・〇

上製成軟塗敷火傷面用。

(三) 青黴素鈣 Penicillin Calcium 100,000i .u.

次炭酸錒 Bismuth Subcarbon. 五〇・〇

上爲火傷面撒佈料。

(四) 磺胺醋胺 Sulfacetamide 五・〇

甘油 Glycerin 一〇〇・〇

魚肝油 Cod-liver-oil 一〇・〇

白陶土 Kaolin 八〇・〇

上製成泥膏塗敷火傷面。

(五) 琥珀磺胺嘧啶 Sulfasuxidine 一・〇—一五・〇

上撒佈火傷面，再用硼酸或錳華軟膏覆蓋之。

(六) 龍胆紫 Gentiana Violet 二・〇

餾水 Aq. dest 一一〇〇・〇

上塗佈火傷面後用消毒紗布包紮。

(七) 硝酸銀 Silver Nitrat 一・〇・〇

餾水 Aq. dest 一〇〇〇・〇

上塗佈火傷面。

(八) 青黴素乳膏 Penicillin Cream q.s.

上塗佈火傷面。

九 凍傷方

(一) 魚石脂 Ichthjol 〇・四

利瓊辛 Resorcin 〇・四

鞣酸 Acid Tannic 〇・四

餾水 Aq. dest 一〇・〇

上塗佈局部，以繃帶包之。(未潰用)

(二) 石炭酸 Acid carbolic 一・〇

鞣酸 Acid Tannic 一・〇

樟腦 Camphor 二・〇

碘酒 Tet. iodine 二・〇

拉諾林 Lanolin 一〇・〇

上每日塗擦局部。(同上)

(三) 碘酊 Tet. iodine 一・〇

蓖麻油 Castor oil 三・〇

酒精 Alcohol 六・〇

火棉膠 Collodium 五〇・〇

上混和爲搽布料。(同上)

(四) 代馬吐兒 Dermatol

碘仿 Iodoform

凡士林 Vaseline

上為塗布料。(已潰用)

一〇〇〇
五〇〇
一〇〇〇〇

(五) 硝酸銀 Argent Nitrit

祕魯樹脂 Balsam Peru

凡士林 Vaseline

上為塗布料(同上)

一〇〇〇
三〇〇
三〇〇〇

(六) 樟腦 Camphor

鞣酸 Acid Tannic

凡士林 Vaseline

上為塗布料(同上)

五〇〇
五〇〇
一〇〇〇〇

(七) 樟腦 Campher

朋淨 Ianzin

凡士林 Vaseline

上為塗布料(同上)

二〇〇
一〇〇〇
九〇〇〇

十 化膿性全身傳染方

用青黴素及磺胺藥，參着外科病處方。

十一 狂犬病方

臨床經驗處方 (續篇)

如已發病，則惟有時症施治。未發以前宜注射狂犬病血清，局部用苛性鉀液等腐蝕劑塗布。

十一 蛇咬病方

(一) 氨水 2% Ammonia Sol. 10c.c.

上注射於傷口周圍。

(二) 硝酸土的年針 Styehimine Nitrit Amp. 1c.c.

上為一次皮下注射。

十二 鼠咬症方

(一) 馬法生 Mapharsen 〇〇〇mg

餾水 Aq. dest 四〇〇

上為一次靜脈注射。

(二) 水銀軟膏 Ointment of Mercury 五〇〇

上為皮膚塗擦用。

十四 昆蟲刺瘡方

(一) 過錳酸鉀 Potassium Permang. 一〇〇

餾水 Aq. dest 一〇〇〇〇

臨床經驗處方 (續篇)

六〇

上沖洗局部。

(一) 葡萄糖酸鈣溶液 10% Calcium Gluconate

10c.c.

上為一次肌肉注射。(減輕疼痛及痙攣)

十五 狼瘡方

(一) 利真平 Resorcin

110.0

滑石粉 Talcum Powder

110.0

阿刺伯樹膠 Gummi Arabia

10.0

祕魯樹脂 Balsam Peru

5.0

上混和一日塗布 6—8 次。(粘膜狼瘡用)

十六 潰瘍方

(一) 魚肝油 Cod-liver-oil

50.0

碘仿 Iodoform

2.0

上為潰瘍面塗布料。

(二) 氨基磺胺 Sulfanilamide

5.0

凡士林 Vaseline

100.0

上為潰瘍面塗布料。

十七 走馬疳方

(一) 青黴素 Penicillin

100,000i. u.

餾水 Aq. dest

上每三小時肌肉注射一次，每次 2c.c.。

(二) 青黴素鈣 Penicillin calcium

100,000i. u.

磺胺噻唑 Sulfathiazole

30gm.

上為口腔患處撒布料。

(三) 青黴素鈣 Penicillin calcium

150,000i. u.

氨基磺胺 Sulfanilamide

15—3.0gm.

輕質氧化鎂 Light mag. Oxide

27—28.5gm.

上為口腔撒布料。

(四) 磺胺噻唑 Sulfadiazine

6.0

重曹 Sodium bicarb

6.0

上分六包，先服二包，每四小時服一包。

(五) 磺胺噻唑 Sulfathiazole

6.0

重曹 Sodium bicarb

6.0

上分六包，先服二包，每四小時服一包。

(六) 雙氧水 Hydrogen Peroxide

10.0

雷佛奴兒 Rivanol

〇・〇・五

餾水 Aq. dest

二〇〇・〇

上為漱口料。

(七)

硼酸 Acid Boric

三・〇

餾水 Aq. dest

一〇〇・〇

上為漱口料。

十八 痔瘡方

(一) 氯化鈣液 3% Calcium Chloride Sol.

1c.c.

上注射入痔核內。

(二)

石炭酸 Acid Carbollic

三——五滴

上注射入痔核內。

(三)

馬格內辛 Magnesium

1c.c.

上注射入痔核內。

十九 盲腸炎腹膜炎方

(一)

青黴素 Penicillin

200,000i.u.

餾水 Aq. dest

10c.c.

上為五次肌肉注射，每3-4小時一次。

臨床經驗處方

(續篇)

(二)

磺胺噻唑 Sulfathiazole

六・〇

重曹 Sodium bicarb

六・〇

上分六包，先服二包，以後每四小時服一包。

(三)

莨菪酞 Tct. Scopolia

一・〇

苦味酞 Tct. Amarae

二・〇

薄荷水 Ag. menthol pip od

一〇〇・〇

上一日三次分服。(減輕疼痛，鎮靜腸管用)

(四)

阿片膏 Ext. Opium

〇・〇・五

可可脂 öl Cacao

二・〇

上為生藥一個，一日三次插入肛門。(止痛)

川)

第七章 皮膚病劑處方

一 濕疹方

(一)

水楊酸 Acid Salicylic

〇・一五

杜松油 Pine tar

〇・一五

氧化鋅 Zinc Oxide

八・〇

流動石臘 Lig. Paraffein ad

三〇・〇

上皮膚塗布用。(慢性期用)

(二) 氧化鋅 Zinc Oxide 三〇・〇

沉降碳酸鈣 Precipitated Calcium Carbonate 三〇・〇

亞麻仁油 Linseed oil 三〇・〇

石灰水 Lime Water 三〇・〇

上塗布創面包裹之(亞急性期用)

(三) 甘油 Glycerin 一二・〇

澱粉 Starch 一四・〇

滑石粉 Talcum 一四・〇

鉛糖溶液 Sol. of Lead Subacetate ad 一四・〇

上塗布創面另加包裹(同上)

二 汗疱方

(一) 醋酸鋁 Alum. Acetate 一・〇

餾水 Aq. dest 五〇〇・〇

上襪包局部。(數日後用下方)

(二) 石炭酸 Acid carbohic 〇・五

氧化鋅 Zinc Oxide 五・〇

橄欖油 Oliver oil 五〇・〇

上塗布局部。

(三) 稀鹽酸 Acid Hydrochloride Dil. 三・〇

硫酸鎂 Magnesium Sulfate 三〇・〇

苦味酞 Tct. Amarae 一・〇

餾水 Aq. dest 一〇〇・〇

上二日三次分服。

三 尋常性乾癬方

(一) 昇汞 Sublimat 一・〇

安息香酸酒 Tct. Benzoes ad 一〇〇・〇

上塗布局部。

(二) 鞣酸 Acid tannic 五・〇

沉降硫黃 Sulfur Praecipitat 三〇・〇

氧化鋅 Zinc Oxide 三・〇

凡士林 Vaselin 五〇・〇

上塗布局部。

四 傳染性膿疱疹方

(一) 氨基磺酸 Sulfanilamide 五・〇

氧化鋅 Zinc Oxide 100.00
凡士林 Vaseline 100.00

上混和塗布局部。

(二)

磺胺噻唑 Sulfathiazole 5.00
代馬安兒 Dermatol 100.00

凡士林 Vaseline 100.00

上混和塗布局部。

(三)

青黴素鈣 Calcium Penicillin 50,000i.u.
羊毛醇軟膏 Ointment of wool alcohols 100.00

上混和塗布局部。

(四)

龍胆紫 Gentiana Violet 0.40
餾水 Aq. dest 100.00

上塗布局部。

五 紅色苔癬方

石炭酸 Acid Carbolie 0.50
鐘汞油膏 Ammoniated Mercury oint. 12.00

氧化鋅 Zinc Oxide 6.50

臨床經驗處方 (續稿)

澱粉 Starch 6.50

白凡士林 White Vaseline 50.00

上每日塗敷數次。

(二)

斯妥凡所兒 Stovarsol 1.00
上一日三次分服。

(三)

薄荷 Menthol 6.00
替莫兒 Thymol 8.00

含水氯醛 Chloral Hydrat 4.00

氯仿 Chloroform 6.00

猶卡列油 Oil of Eucalyptus 6.00

冬綠油 Oil of winter green 1.50

酒精 70% Alcohol ad 12.00

上塗擦局部(止痛)

六 尋常性瘡瘡

(一)

樟腦 Camphor 6.00
阿拉伯樹膠 Gummi Arabic 6.00

沉降硫黃 Sulfur Praecipitat 12.50

餾水 Aq. dest 120.00

上塗布局部。(結節發炎時挑出其內容後用)

(二)	利瑣辛 Resorcin	110.00	硼酸 Acid Boric	110.00
	錫華糊劑 Zinc Paste	10.00	上為局部撒佈劑，撒佈後包以繃帶。	
	凡士林 Vaseline	10.00	(二) 磺胺噻唑 Sulfathiazole	3.00
	上塗布局部(重症用)		重曹 Sodium bicarb	3.00
(三)	酵母粉 Yeast Powder	3.00	上分六包，每四小時服一包。(預止傳染)	
	上一日三次分服。		(三) 非那昔丁 Phenacetin	1.00
(四)	沉降硫黃 Sulfur praecipitat	10.00	安替匹林 Antipytin	1.00
	白蘭地 Brandy	50.00	上一日三次分服。(止痛用)	
	拉凡大油 Spirit Lavendulae	10.00	九 痒疹及皮膚搔痒方	
	甘油 Glycerin	1.50	(一) 魚肝油 Cod-liver-oil	一瓶
	上為局部塗擦料。		上每次食後一食匙。	
七 酒鼓鼻方			(二) 乙那非安兒 Beta-naphthol	11.00
(一)	昇華硫黃 Sulfur Sublimat	11.00	酒精 Spirit	100.00
	那非安兒 Naphthol	1.00	薄荷 Menthol	11.00
	凡士林 Vaseline	110.00	酒精 Spirit	100.00
	上為局部塗布料。		上為皮膚塗擦用。	
八 帶狀匱形疹方			十 天庖瘡方	
(一)	代馬安兒 Dermatol	10.00		

(一) 龍胆紫 Gentiana Violet 二・〇

餾水 Aq. dest 一〇〇・〇

上爲局部塗布用。

(二) 硝酸銀 Silver Nitrat 〇・二

餾水 Aq. dest 一〇〇・〇

上爲局部塗布用。

(三) 過錳酸鉀 Pot. Permang. 〇・一

餾水 Aq. dest 一〇〇・〇

上爲襪包用(增殖性天疱瘡之有惡臭者用)

(四) 青黴素鈣 Penicillin Calcium 50,000i.u.

羊毛醇軟膏 Ointment of wool alcohols 一〇〇・〇

上爲局部塗佈料。

(五) 磺胺嘧啶 Sulfathiazole 五・〇

凡士林 Vaseline 一〇〇・〇

上爲局部塗布料。

(六) 新阿斯凡納明 Neearsphenamine 〇・四五

餾水 Aq. dest 九・〇

上爲一次靜脈注射。

十一 禿髮症方

(一) 重碳酸鈉 Sodium bicarb 四・〇

可命酒精 Spt. Colon 一〇〇・〇

甘油 Glycerin 一〇〇・〇

餾水 Aq. dest 一五〇・〇

上作爲頭髮水塗布用。

(二) 魚石脂 Ichthyol 二・〇

甘油 Glycerin 一五・〇

拉文大酒精 Spt. Lavanduae 一〇〇・〇

餾水 Aq. dest ad 一〇〇・〇

上作爲頭髮水塗布用。

(三) 品黴 Penten 一瓶

上代生髮油用。

十一 疥瘡方

(一) 沉降硫黃 Sulfur Praecipitat 三〇・〇

澱粉 Amyl 一〇〇・〇

水楊酸 Acid Salicylic 〇・五

甘油 Glycerin 一〇〇・〇

餾水 Aq. dest ad 一〇〇・〇

上振盪皮膚塗布用。

(二) 杜松焦油 Pix Juniperi 二・〇

沉降硫黃 Sulfur Praecipitatus

三〇・〇〇

(四) 祕魯樹脂 Peru Balsam

一五・〇〇

凡士林 Vaseline

六〇・〇〇

依打 Aether

二五・〇〇

上為皮膚塗擦用。

酒精 Alcohol

二五・〇〇

(三) 地地替 D.D.T.

一〇・〇〇

上塗布患部。

凡士林 Vaseline

一〇〇・〇〇

上為皮膚塗擦用。

十四 麻風病方

(四) 滅疥 Mitigal

三〇・〇〇

(一) 大風子油 Chaulmoogric oil

六〇・〇〇

上為皮膚塗擦用。

樟腦油 Camphor oil

六〇・〇〇

雷瓊辛 Resorcin

四・〇〇

十三 頭虱及陰虱方

上每次注射五滴於臀肌肉，每星期二三次。

(一) 歐士林 Gaseline

三〇・〇〇

(二) 碘 Iodine

一・〇〇

橄欖油 Oliver oil

三〇・〇〇

猶卡列油 Eucalypti

八・〇〇

上混和塗於頭皮及陰毛部份。

樟腦 Camphor

二・〇〇

(二) 地地替 D.D.T.

一〇・〇〇

橄欖油 Oliver oil

一四七・〇〇

滑石粉 Talcum Powder

一〇〇・〇〇

大風子油 Chaulmoogric oil

一五〇・〇〇

上撒佈於頭皮及陰部，再用繃帶包裹，次日

上每週注射一次，每次注射五公撮。

以梳篦清理頭髮後，再同樣撒佈。

(三) 普羅明 Promin

一・〇〇

(三) 地地替 D.D.T.

一〇・〇〇

上為一次肌肉注射用。

凡士林 Vaseline

一〇〇・〇〇

(四) 大艾松片 Diasone tab.

三片

上塗布局部。

上一日三次分服。

(五) 普羅嘮唑 Promizol 一·五

上一日三次分服。

十五 魚鱗癬方

(一) 水楊酸 Acid Salicylic 一·〇〇

凡士林 Vaseline 一〇〇·〇

上於浴後塗布患部。

十六 雀斑方

(一) 鹽酸奎甯 Quinia Hydrochloric 二·〇〇

酒精 Alcohol 三·〇〇

甘油 Glycerin 二·〇〇

餾水 Aq. dest 九〇·〇

上面部塗布用(春夏之季用)

(二) 昇汞 Sublimat 〇·五

酒精 Alcohol 五〇·〇

上早晚塗面部(切勿入眼)

(二) 白降汞 Ammoniated Mercury 五·〇〇

次蒼 Bismuth Subnit 五·〇〇

甘油軟膏 Glycerin Ointment 二〇·〇

上面部塗布用(每日塗一次，數次皮膚潮紅落層後，則中止)

十七 疥癬腫及鷄眼方

(一) 水楊酸 Acid Salicylic 一·〇〇—二·〇〇

火棉膠 Collodium 一〇·〇

上塗布局部(疥癬及鷄眼用)

(二) 水楊酸 Acid Salicylic 二〇·〇

軟皂粉 Pulv. Sapon 五·〇〇

精製樟腦 Camphor Depurat 一·〇〇

橄欖油 Oliver oil 一·〇〇

黃蠟 Cer. Flav. 一〇·〇〇

單鉛硬膏 Emplaster diachylon 七〇·〇

上製成 Plichs 硬膏局部貼布(同上)

十八 蕁麻疹方

(一) 奧斯得靈鈣 Ostelin Calcium 1—2c.c.

上每日或間日肌肉注射一次。

(二) 葡萄糖酸鈣 Calcium Gluconate 10% 10c.c.

上爲一次靜脈注射。

(三) 苯那屈里兒 Benadryl 150mg.

上一日三次分服。

(四) 潑立奉日明 50mg. Pyribenzamine tab.

三一—四片

上一日 3-4 次分服。

(五) 維生素丙 Ascorbic acid tab. 六片

上一日三次分服。

(六) 子種維生素 Vitamin K tab. 六片

上一日三次分服。

十九 多汗症方

(一) 蟻醛溶液 Formalin 三〇〇

鹼水 Aq. dest 100〇〇

上皮膚塗布用。

(二) 薄荷 Menthol 〇〇五

酒精 Spirit 100〇〇

上皮膚塗布後，撲以柳酸滑石粉。

(三) 柳酸 Acid Salicylic 五〇〇

坦諾仿 Tannoform 100〇〇

滑石粉 Talcum Powder

八五〇〇

上一日數次撒佈用。

第八章 花柳科處方

一 初期梅毒(硬性下疳)方

(一) 硫酸銅 Cupri Sulfate 〇〇二五

鹼水 Aq. dest 100〇〇

上爲局部瘻包用(炎症劇烈時)

(二) 醋酸鉛 Plumb Acet 1〇〇

鹼水 Aq. dest 100〇〇

上爲局部瘻包料(同上)

【附註】全身治療見第二期梅毒方項下。

一一 梅毒性橫痃方

(一) 乍鉄紅軟膏 Iothin Ointment 100〇〇

上局部塗敷用。

附註：全身治療見第二期梅毒方項下。

三 第二期梅毒方

(一) 馬法生 Mapharson 〇・〇六
縮水 Aq. dest 100.00

上為一次靜脈注射，每星期二次，共注射二十次，停止六星期，再注射二十次為一治程。

(二) 青黴素油蠟劑 Penicillin in Bees & Wax 300.000i.u.

上為一次肌肉注射，每日一次，連用八日，以後改用馬法生或鉍劑治療。

(三) 青黴素 Penicillin 200.000i.u.
縮水 Aq. dest 10c.c.

上分五次肌肉注射，每三小時一次，連續二百四十萬單位，再改用馬法生，新阿斯凡納明或鉍劑。

(四) 新阿斯凡納明 Neo-ArspheNamine 〇・三
縮水 Aq. dest 六・〇

上為一次靜脈注射，每星期一次，劑量自〇・二公分漸次增至〇・四五至〇・六至〇・七五，共注射二十次，中間並須間以鉍或汞劑之注射。

(五) 次柳酸鉍油劑 Bismuth Subsaliicylic in Oil 0.2mg.

上每星期注射一次，與第一方馬法生之治療同時開始，先注射五次，停止五星期，再注射六次，又停止五星期後再注射五次。

(六) 藍色鉍 Casbis 1.5
上為一次肌肉注射，每星期二次。

(七) 鉍司莫洒爾 Bismosal 11.0
上為一次肌肉注射，每星期二次。

(八) 鉍阿斯凡納明 Bismarsen 〇・11
上為一次肌肉注射，每星期二次。

(九) 乙烷樟腦酸鉍 Bismuth ethylcamphorate 11.0
上為一次肌肉注射，每星期二次。

(十) 洒利汞 Salygon 2c.c.
上為一次肌肉注射，每星期二次。

(十一) 昇汞 Sublimat 1.0
安息香酸酒 Tct. Benzoic 100.0

上外用塗布(粘膜梅毒用)

四 第三期梅毒方

(一) 台盼酰胺 Tryparsamide 1.0.0
 餽水 Aq. dest 10.0.0

上為一次肌肉或靜脈注射，每星期一次，連用十次。(神經梅毒用)

(二) 恩託同 Entodon 1.0.0

上為一次肌肉注射，每隔二三日一次。

附註：本病除用上列處方外，可用鉍劑，參看第二期梅毒方項下。

五 先天梅毒方

先天梅毒之治療主用 Penicillin, Sulfarsphenamine 及 Acetarsone，前二者之用量應按照年齡增減，Acetarsone 之用量如下：

- 第一星期每磅體重每日用 0.002gm.
- 第二星期每磅體重每日用 0.005gm.
- 第三星期每磅體重每日用 0.007gm.
- 第四星期每磅體重每日用 0.01gm.，連用至第十星期。

六 淋病方

(一) 青黴素 Penicillin 200,000i.u.
 餽水 Aq. dest 10c.c.

上分五至十次肌肉注射，每三小時一次。

(二) 青黴素油蠟劑 Crystalline Procaine Penicillin G in Peanut oil 30?, 000i.u.

上為一次肌肉注射，每日一次。

(三) 英得西林 Intracillin 300,000i.u.

上為一次肌肉注射。

(四) 鏈黴素 Dihydrostreptomycin 1.0.0
 餽水 Aq. dest 3.0.0

上為一次肌肉注射。

(五) 磺胺嘧啶 Sulfathiazole 4.0.0
 重曹 Sodium bicarb 4.0.0

上分四包，一日內分服，連服五日。

(六) 磺胺噻啉 Sulfadiazine 4.0.0
 重曹 Sodium bicarb 4.0.0

上分四包，一日內分服，連服五日。

附註：其他淋病之併發症除用通常之局部治療外，

全身治療參看淋病方下。

七 膀胱炎方

(一) 青黴素油蠟劑 Penicillin in oil

300,000i.u

上為一次肌肉注射。

(二) 磺胺噻唑 Sulfathiazole

重曹 Sodium bicarb 六・〇

上分六包，每四小時服一包。

(三) 鏈黴素 Streptomycin

餾水 Aq. dest 一・〇

上分二次肌肉注射，早晚各一次。

(四) 硝酸銀 Argent nitrit

餾水 Aq. dest 〇・一

上為膀胱沖洗料。

(五) 食鹽 Sodium chloride

餾水 Aq. dest 一・七

上為膀胱沖洗料。

八 軟性下疳方

(一) 氨基磺胺 Sulfanilamide

一・〇

上為局部撒佈用。

(二) 磺胺噻唑 Sulfathiazole

一・〇

凡士林 Vaseline

一〇〇・〇

上為局部塗敷料。

(三) 德美高斯 Dimelcos Amp.

1 box

上每次靜脈注射一安瓶，隔日注射一次，自第一號至第六號。

(四) 磺胺噻唑 Sulfathiazole

四・〇

重曹 Sodium bicarb

四・〇

上分四包，一日四次分服，連服五日，以後每次減半量連服十日。

九 鼠蹊淋巴肉芽腫方

(一) 磺胺噻唑 Sulfathiazole

五・〇

重曹 Sodium bicarb

五・〇

上分五包，每四小時服一包，連服二星期，繼則每日三公分，連服三星期，共服藥六星期。

(二) 福錫 Fouadin

1.5c.c.

上為一次肌肉注射，第二日用 3.5c.c.，第三日 5c.c.，以後間日注射 5c.c.，總量達 40c.c.，為一治程。

(三) 安錫質林 Anthiomaline 1c.c.

上為一次肌肉注射，第二第三日各 2c.c.，第四日 3c.c.，以後間日 3c.c.，直至總量 40—60c.c.，為一治程。

十 花柳性肉芽腫方

(一) 鏈黴素 Streptomycin 一〇〇——二〇〇

甯水 Aq. dest 四〇〇——一八〇〇

上分二次肌肉注射，每日早晚各注射一次。
附註：此外主用錐劑，參看鼠蹊淋巴肉芽腫節下。

第九章 眼科劑處方

一 眼險緣炎方

(一) 青黴素軟膏 Penicillin ointment q.s.

上為塗抹險緣用 (每公分含一千單位)

(二) 磺胺噻唑 2% Sulfathiazole ointment

上為塗抹險緣用。
(三) 醋酸鉛 Alumin Acet 一〇〇
甯水 二五〇〇

上為翳包料。

(四) 魚肝油 Cod-liver-oil 一五〇

上一日三次分服。(小兒險緣炎用)

二 麥粒腫方

本症未化膿者用熱敷或硼酸軟膏包敷，已化膿者切開排膿。

三 霰粒腫方

本症須用手術摘除。

四 結膜炎方

(一) 磺胺噻唑 Sulfathiazole 四〇五

重曹 Sodium bicarb 四〇五

上分六包，每四小時服一包。

(二) 青黴素 Penicillin 20,000i, u.

鹽水 Aq. dest

20c.c.

上為點眼料。

(三) 磺胺嘧啶 Sulfadiazine

〇・四

凡士林 Vaseline

二〇・〇

上製成軟膏於臨睡塗眼。

五 砂眼方

(一) 磺胺嘧啶 Sulfadiazine

一・五

凡士林 Vaseline

二〇・〇

上製成軟膏點眼(消炎用)

(二) 純石炭酸 Phenol Pure

q.s.

上塗眼險後用酒精中和，再用鹽水沖洗，每

星期一次。

(三) 阿久羅溶液 5% argyrol Sol.

一〇・〇

上每日點眼二三次(充血狀態時)

六 水瀉性結膜炎(腺病性結膜炎)方

(一) 坡他戈溶液 10% Protargol sol.

一〇・〇

上每日點眼用。

(二) 昇汞 Sublimat

〇・〇一

凡士林 Vaseline

五〇・〇

上製成軟膏點眼。

附註：本症須行一般的強壯治療，內服魚肝油等。

七 淋毒性結膜炎(膿漏眼)方

(一) 磺胺嘧啶 Sulfadiazine

六・〇

重曹 Sodium bicarb

六・〇

上分六包，每四小時服一包。

(二) 青黴素 Penicillin

50,000i.u.

鹽水 Aq. dest

五〇・〇

上為點眼料，每半小時一次。

八 結膜乾燥症方

(一) 硫酸阿托品 Atropin Sulf.

〇・一

鹽水 Aq. dest

一〇・〇

上為點眼料。

(二) 碘仿 Iodoform

一・〇

白凡士林 Vaseline white

一〇・〇

上為點眼料，一日二三次。

(三) 胡蘿蔔素油劑 Carotene in oil

3—6c.c.

上一日三次分服。

(四) 魚肝油精 Cod-liver-oil concentrated

一五滴

上一日三次分服。

(五) 魚肝油 Cod-livr-oil

15—30c.c.

上一日三次分服。

九 實質性角膜炎方

(11) 狄俄甯液 2% Dionine

10c.c.

上為點眼料。

十 水泡性角膜炎方

局部治療同實質性角膜炎，此外行全身強壯治療。

十一 角膜賁奴司 (翼狀贅肉)

本症須行手術治療。

十二 角膜潰瘍方

(1) 青黴素眼軟膏 Penicillin eye ointment

100.0

上為點眼料，每小時一次。

十三 角膜軟化症方

本症治療與結膜乾燥症同。

十四 鞏膜炎方

(1) 鹽酸腎上腺素 Adrenalin Hcl,

0.5

鹽酸可卡因 Cocain Hcl,

0.05

餾水 Aq. dest

100.0

上一日三次分服。

(11) 黃降汞軟膏 2% ungs. Hydrarg. Oxide Fl-

100.0

上為點眼劑。

附註：全身治療準腺病及結膜病。

十五 虹膜炎及睫狀體炎方

(1) 狄俄甯溶液 5% Dionine

100.0

上為點眼料。

(11) 青黴素 Penicillin

200.0001 n.

餾水 Aq. dest

5c.c.

上分五次肌肉注射，每三——四小時一次。

十六 視網膜及脈絡膜炎方

除用散瞳劑及熱敷外，其他均行原因治療。

十七 全眼球炎方

(1) 青黴素 Penicillin 200,000i.u.

餾水 Aq. dest Ec.c.

上分五次肌肉注射，每三—四小時一次。

(2) 磺胺噻唑 Sulfathiazole

重曹 Sodium bicarb 六〇〇

上分六包，每四小時服一包。

附註：必需時行全眼球摘出術。

第十章 耳鼻喉科劑處方

一 急性外聽道炎方

(1) 石炭酸 Acid carbolic 〇・五

甘油 Glycerin 一〇〇〇

上以數滴點耳用。

(2) 銀苯磺胺 Sulfanilamide 一〇〇

臨床經驗處方 (續篇)

上撒佈外耳道。

附註：重症可注射 Penicillin 或內服磺胺噻唑。

一 鼓膜炎方

(1) 磺胺噻唑 Sulfathiazole 一〇〇

上以吹粉器吹入。

(2) 癩他根 Oralgan 二—五滴

上為點耳料。

三 中耳炎方

(1) 青黴素 Penicillin 200,000i.u.

餾水 Aq. dest 10c.c.

上分五次肌肉注射，每三—四小時一次。

(消炎)

(2) 磺胺噻唑 Sulfathiazole 六〇〇

重曹 Sodium bicarb 六〇〇

上分六包，每四小時服一包。(同上)

(3) 青黴素鈉 Penicillin Sodium 100,000i.u.

餾水 Aq. dest 一〇〇〇

上半小時一次，每次二三滴滴入耳內。(消

炎)

(四) 痢他根 *Otalgan* 三一—五滴

(五) 鹽酸可卡因 *Cocain hel.*

上為點耳料。(止痛消炎) 一·〇

酳水 *Aq. dest* 一〇·〇

(六) 石炭酸甘油 5% *Carbolic Glycerin* 五·〇

上為點耳料，每次數滴。(止痛消炎)

四 乳嘴突起骨膜炎方

(一) 青黴素鈣 *Penicillin Calcium* 100,000i.u.

磺胺醋胺 *Sulfacetamide* 三〇·〇

上為乳突擊開排膿後撒布用。

(二) 青黴素油劑 *Penicillin in oil* 300,000i.u.

上為一次肌肉注射，每日一次。

(三) 磺胺噻啉 *Sulfadiazine* 六·〇

重曹 *Sodium bicarb* 六·〇

上分六包，每四小時服一包。

五 急性鼻炎方

(一) 磺胺噻啉 *Sulfathiazole* 一·〇

麻黃素 *Ephedrine* 〇·二

薄荷 *Menthol* 〇·一

凡士林 *Vaseline* 一〇·〇

流動石臘 *Paraffin Lig.* 一〇·〇

上為鼻腔塗布料。

(二) 青黴素鈉 *Penicillin sodium* 50,000i.u.

乳化蠟 *Emulsifying wax* 七·〇

硬石臘 *Paraffin* 五·〇

流動石臘 *Paraffin Lig.* 四一·〇

氯甲酚 *Chlorocresol* 〇·一

酳水 *Aq. dest* 四七·〇

上為鼻腔塗布料。

(三) 青黴素鈉 *Penicillin sodium* 75,000i.u.

氯甲酚 *Chlorocresol* 〇·〇三

氯化鈉 *Sodium Chloride* 〇·二七

酳水 *Aq. dest* 三〇·〇

上為鼻腔滴入用。

(四) 鼻通 *Baton 'sine'* 1 tube

上擠入少許於鼻腔內，一日二三次。

（五） 蛋白銀 Protargol

可卡因 Cocain

甘油 Glycerin

餾水 Aq. dest

上塗布鼻腔粘膜。

（六） 猶卡列油 Eucalypt oil

福馬林 Formalin

凡士林 Vaseline

流動石臘 Pasaffin lig.

上為鼻腔塗布料。

（七） 猶卡列油 Eucalypt oil

安息香酞 Tct. Benzoic

薄荷 Menthol

酒精 Alcohol

上混和倒少許於手帕內吸入用。

六 慢性鼻炎方

（一） 重碳酸鈉 Sodium bicarb

餾水 Aq. dest

上加熱微溫沖洗鼻腔。

（二） 食鹽 Sodium Chloride

餾水 Aq. dest

上加熱微溫沖洗鼻腔。

（三） 薄荷腦 Menthol

樟腦 Camphor

黃降汞 Hydrarg oxide Flav.

流動石臘 Paraffin lig.

上混和振盪點入鼻腔。

七 惡臭鼻漏方

（一） 薄荷 Menthol

橄欖油 Oliver oil

上以棉棒蘸藥液堵塞鼻腔。

（二） 黃色素 Trypaflavine

餾水 Aq. dest

上為鼻腔洗滌料。

（三） 魚肝油精 Cod-liver-oil Concentrated

上一日三次分服。

八 衄血方

(一) 蘇潑來拉甯 *Supraerenin* 2c.c.

上以棉花蘸透栓塞鼻腔。

(二) 可阿古連 *Coagulen* 10c.c.

上為一次肌肉注射。

(三) 白阿膠 *Gelatine Alba* 11.0

餾水 *Aq. dest* 110.0

上為一次靜脈注射。

九 咽頭炎及扁桃腺炎方

(一) 青黴素 *Penicillin* 200,00i.u.

餾水 *Aq. dest* 10.0

上分五次肌肉注射，每三小時一次。

(二) 磺胺噻唑 *Sulfathiazole* 6.0

重曹 *Sodium bicarb* 6.0

上分六包，每四小時服一包。

(三) 青黴素錠 *Penicillin Lozenges* 二四片

上每小時一片，含於口腔任其自然溶化。

(四) 硼酸 *Acid Boric* 6.0

石炭酸 *Acid Carbolic* 1.0

甘油 *Glycerin* 10.0

薄荷 *Menthol* q.s.

餾水 *Aq. dest* 1100.0

上為漱口料。

(五) 洛各氏液 *Lugol's Sol.* 110.0

上用棉花蘸少許塗布咽喉用。

十 喉頭結核及喉頭潰瘍方

(一) 鏈黴素 *Streptomycin* 1.0

餾水 *Aq. dest* 四.0

上分二次肌肉注射，早晚各一次。

(二) 鏈黴素 *Streptomycin* 0.1

餾水 *Aq. dest* 10.0

上一日數次噴射於咽喉用。

(三) 阿那雖信 *Anaesthesin* q.s.

上為喉部撒布料。

附註：梅毒性者用驅梅毒療法。

十一 白喉方

(一) 白喉抗毒素 *Diphtheria Antitoxin*

五〇〇〇——一四〇〇〇〇單位

上爲一次肌肉或靜脈注射。

(二) 青黴素 Penicillin 400,000i. n.

餾水 Aq. dest 5-10c. c.

上每次注射 1c. c. , 每三小時肌肉注射一

次。

(三) 雙氧水 2% Hydrogen Peroxide 1100.0

上爲含漱料。

(四) 重碳酸鈉水 2% Sodium bicarb Sol. 1100.0

上爲含漱料。

(五) 石灰水 Aq. Calcaria 100.0

餾水 Aq. dest 100.0

上爲吸入或噴霧料。

(六) 過錳酸鉀 Potassium Permang. 1.0

餾水 Aq. dest 1000.0

上爲含漱料 喉部形成潰瘍，口有惡臭者用)

(七) 水銀軟膏 (ointment of mercury) 110.0

上爲頸部塗佈料。(頸淋巴腺腫脹時用)

(八) 安息香酸酒 Tct. Benzoic 50.0

餾水 Aq. dest 1100.0

上爲吸入料(兼有咳嗽者用)

十一 喉腫瘍方

(一) 青黴素 Penicillin 200,000i. n.

餾水 Aq. dest 5.0

上分五次肌肉注射，每3-4小時一次。

(二) 磺胺噻唑 Sulfathiazole 6.0

重曹 Sodium bicarb 6.0

上分六包，每四小時服一包。

附註：本症如用上方無效時，宜用手術切開排膿。

第十一章 齒科劑處方

一 齶齒(即蛀牙)方

(一) 乳酸鈣片 Calcium Lact 六片

上一日三次分服。

(二) 照射麥角碎油劑 Vios'etrol in oil 一五滴

上一日三次分服。

一 齒髓炎方

本症之治療普通多將病齒拔去，或行根管治療，均須由專門牙醫師施治。全身可用青黴素或磺胺類等劑。

二 齒膜炎方

(1) 磺胺噻唑 Sulfadiazine

重曹 Sodium bicarb

六・〇
六・〇

上分六包，每四小時服一包。

(2) 朵貝爾氏溶液 Dobell's Solution

上為漱口料。

三〇〇・〇

四 齒齦炎方

除牙科專門治療外，可用齒膜炎方。

五 齒齦出血方

(1) 抗壞血酸片 Ascorbic Acid tab.

上一日三次分服

六片

附註：本症須察其原因而治之。

六 齒痛方

本症除用各種止痛劑外，仍須察其原因延請牙科專門醫師治療之。

第十一章 急救劑處方

一 服毒方

服毒之處理方法大致有下列數種：

(一) 洗胃：毒物尚未吸收入血時，則可用洗胃法以使毒物排出，洗胃之溶液最通用者為活性炭懸浮液，千分之一過錳酸鉀溶液，百分之一重曹溶液，生理食鹽水等

(二) 催吐：催吐與洗胃之目的相同，通常用阿朴嗎啡之皮下注射，或 1% 硫酸銅溶液 50c.c. 內服。

(三) 下瀉：欲使毒物迅速自腸內排洩，則可用瀉劑，最良好之瀉劑為硫酸鎂。

(四) 用解毒劑：能中和毒物之藥物稱為解毒劑，例如鹼類中毒用酸類，酸類中毒用鹼類；阿托品中毒用鴉片，鴉片中毒用阿托品；巴比土酸類中毒用可拉明或番木鱉鹼之注射；磷中毒用銅劑，砷，汞中毒時用 B.A.L. 等是。

(五) 利尿：多種毒物經由腎排洩者，則可給予大量水份，或注射生理食鹽水以促其由腎排洩。

其他如人工呼吸以及症狀治療，茲不具贅。

張崇熙醫師編

現代研究醫學唯一良好巨著

包羅萬有：述敘明晰

內容完美：譽滿全國

最新實用醫學各科全書

第五版

全部精裝三巨冊皮脊邊金

基本定價……二百四十元
……多寄費照章
……少補

實用醫學各科全書目錄

醫藥法規	臨床處方	診療指鏡	顯微鏡	衛生醫學	看診醫學	急救醫學	耳鼻喉科	眼科	兒科	婦科	產科	花柳病	皮膚病	外科	內科	傳染病	醫藥化學	注射療法	調劑學	新藥集	藥物學	診斷學	病理解學	細菌學	組織生理學	解剖生理學
------	------	------	-----	------	------	------	------	----	----	----	----	-----	-----	----	----	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	------	-----	-------	-------

杭州宋經樓書店出版