

欽定四庫全書

普濟方卷二百九十五

瘰癧門

諸瘰 附論

明周王朱橚撰

夫漏者諸瘰之潰漏也狼瘰鼠瘰螻蛄瘰蜂瘰虬蟬瘰
癩瘰瘰癧瘰癧轉脉浮疽瘰所謂九瘰也狼瘰者由大
怒傷陰氣上而不下所致也鼠瘰者由飲食之間有蟲

鼠餘毒所致也。螻蛄瘰者因食菓瓜蟲噉之所致也。蜂瘰者因倦飲水即得蜂毒所致也。虬蟬瘰者因中寒毒腹中臏脹所致也。蟻螞瘰者恐懼憂思哭泣不止所致也。浮疽瘰者志結馳思往返變化所致也。轉脈瘰者大醉驚嘔轉側失枕所致也。瘰癧瘰者則瘰癧諸證論之為詳。三因方云：狼漏根於肝，得之憂怒；鼠漏根於胃，得之食鼠毒；螻蛄漏根於大腸，得之食菓；蜂漏根於脾，得之飲流水；有蜂毒、虬蟬瘰根於腎，得之食中有虬蟬毒。

蟻螞漏根於心得之喜怒哭泣；浮疽漏根於膽，得之思慮；瘰癧漏根於腎，得之新沐髮；轉脈漏根於小腸，得之驚卧失枕；此等因證文不明，未知所始。若以理例較之，怒根在肝，鼠毒在胃，食瓜果在大腸，蜂水在脾，姑且通俗易曉。如轉脈漏因驚，根當在膽，却云在小腸；浮疽漏因思慮，根當在脾，却云在膽；瘰癧漏因沐髮，亦不當在腎。名義不通，難以考據。又況哭泣得蟻螞之名，思慮得浮疽之名，此尤不可曉也。其外更有蝎漏、風漏、冷漏、蟻

漏蟻螂漏蚯蚓漏蝦蟇漏等名狀不一諒皆出乎土俗
隨象命名耳難以考據治法觀其末著于肌肉而為膿
血者從本引可使衰去針之灸之傳之角之從其所因
宣通本藏皆有成法甲乙鍼經云寒熱癰癰論黃帝問
曰寒熱癰癰在於脛腋者皆何氣所生岐伯對曰此皆
鼠癰癰寒熱之氣也稽留于脉而不去者也鼠癰之本
皆在于臟其未上出于頸腋之間其浮于脉中未著于
肌肉而外為膿血者去易問曰去之奈何對曰請從其

末引其本可使衰去而絕其寒熱審安其道以治之徐
往徐來以去之其小如麥者一刺之三刺之而已決其
生死法反其人目視之其中有赤脉從上下貫瞳子見
一脉一歲死見一脉半一歲半死見二脉二歲死見二
脉半二歲半死見三脉三歲死此赤脉不下貫瞳子者
可療大抵外傷四氣內窘七情與夫飲食乖常染觸蠱
動含靈之毒未有不變為癰瘡穿孔一深膿汁不盡得
冷而風邪併之於是涓涓而成痛矣漏喜發于項腋亦

喜發于陰僻肛門之間療治失時即生寒熱不特瘻能為漏凡癰疽諸發隨所在處苟有宿膿敗肉朽骨停蓄其間皆一切漏瘡之萌蘖也聖惠云瘻病初發之由不同至瘻成於狀亦異病源所載復有三十六種經方不依次第表其名目也又有蠅螂蚯蚓等諸瘻此非九瘻之名即應是三十六種之數也但瘻病之生或因寒暑不調故血氣壅結所作或因飲食不節狼鼠之精入于臟腑毒流經脈變化而生皆能使血脈結聚寒熱相交

久則成膿而潰漏也其生身體皮肉者亦始有結腫與石瘻相似所可異者其腫之中按之壘壘有數脈喜發于頸邊或兩邊俱起便是瘰癧音瘻證也赤發兩腋下及兩顳顙之間初作喜不痛不熱若不暗治即生寒熱也所發之處而有輕重重者有二一則發口上脣有結核大小無定或如桃李大此蟲之窠止在其中發口下無有結核而穿成瘡又蟲毒之居或縱橫無定故瘻發身體亦有其處其相應通者多死

治法用溫散風冷為急收水次之生肌又次之藿香厚朴半夏橘皮蒼朮細辛川芎白芷以官桂乾薑一匕佐之此足以清散風冷矣然近年漏者色則淡紅或帶微腫或留小核久則上而槁白內而黑爛淫蟲惡臭生焉近者不過前藥數品而久者復其元陽亦當以蘆輩加減而用之如其不當用而輕用又恐熱氣乘虛變移結核蚘綠相通而孔竅為尤甚若夫收水一節蓋水屬腎也腎虛不能傳道而役水溢於腎水溢則滲漉于漏瘡

行腎之水無如黑牽牛取米入猪腎慢火煨熟隨而溫酒下之則借腎入腎一縱一擒兩得其便惡水既泄不復淋漓繼以當歸黃香川芎官桂川續斷葫蘆巴等修治細末佐以髮灰空心溫酒酒音調下仍以安腎丸山藥

丸兼而濟之庶幾腎得所養真元凝合然後以龍骨牡蠣人齒犬牙加之血竭乳麝髮灰內外相維生肌必矣然新肉方生又當以羊肉猪蹄米舖為養不惟滋味益腎而陽明之相生肌肉亦藉穀氣以充之此則自本自

根之論也 凡項邊腋下先作瘰癧者欲作漏也宜禁五辛酒麪及諸熟食凡漏有以石癰瘰癧累然作瘰子有核在兩頸及腋下不痛不熱治者皆鍊石散傳其外內服五香連翹湯下之已潰者治癰法諸漏結核未破火鍼鍼使者枯核中無不瘥者內經云陷脈為痿留連肉腠脈得寒即下陷凝滯肌肉故曰留連肉腠肉冷亦能為膿血故為冷漏須用溫藥陷脈散專治漏瘡及二三十年癭瘤或大如杯孟經久不瘥致有漏潰令人骨肉消盡或堅或軟令人驚惕寐卧不安體中掣痛愈而復作者宜用之濟生方云瘰瘡當探其深淺渠在裏間時有一人害瘰瘡於脇間因以榆細皮枝取線以綿裹其尖以線牽繫之以榆皮探瘡中瘡之穴乃自脇而達于腰在膚皮之間乃遂于病者腰間以針決破用追毒丹三粒納于瘡中三日即潰而脇間之漏遂止則膿悉自腰針孔中出膿盡則其肌遂愈其服狗寶丸敷烏龍膏乳香膏生肌散并如治癰疽法

肉消盡或堅或軟令人驚惕寐卧不安體中掣痛愈而復作者宜用之濟生方云瘰瘡當探其深淺渠在裏間時有一人害瘰瘡於脇間因以榆細皮枝取線以綿裹其尖以線牽繫之以榆皮探瘡中瘡之穴乃自脇而達于腰在膚皮之間乃遂于病者腰間以針決破用追毒丹三粒納于瘡中三日即潰而脇間之漏遂止則膿悉自腰針孔中出膿盡則其肌遂愈其服狗寶丸敷烏龍膏乳香膏生肌散并如治癰疽法

方

蝟皮散 出聖濟總錄

治諸漏

蛇皮 炙焦半枚 蜀椒 去閉目者炒出汗 當歸 焙切 露蜂房 炙 地榆

醋炙各三分 班貓 去足翅糯米炒 蛇蛻 劉炒 烏賊骨 去甲 葛上亭長

去頭足翅糯米炒各半兩 鮫鯉甲 炙焦四兩 藺茹 一兩 細辛 去苗葉半兩 樗

鷄 四兩 蜈蚣 去黃足一枚 蜥蜴 去頭足一枚 薏苡仁 乾漆

炒烟出用 蒺藜子 炒去角 桂 去粗皮 漏蘆 去蘆頭 木通 劉 附子

炮製去皮臍 牡丹皮 龍膽 土瓜根 各三分 鶴骨 酒炙 狸

骨 酒炙 雄黃 細研 蛇床子 大黃 劉炒 苦參 各一兩半

右為細末每服二錢匕空心用溫酒調下日晚再服

漸加至三錢匕

治九癭方 出千金方

蝟皮 半枚 鮫鯉甲 樗鷄 各四枚 蜥蜴 蜈蚣 各一枚 蜀

椒 附子 當歸 蜂房 地榆 桂心 通草

乾漆 牡丹 薏苡仁 蒺藜子 漏蘆 一作瞿蘆

龍膽 一作龍骨 土瓜 各三分 班貓 四分 蛇床子 苦參 大

黃雄黃 蛇蛻 蔞茹各三 細辛分六 鶴骨分六

右為末每服五分以溫酒調下以知為度日二服

治九癭方出千金方

空青 商陸 知母 狸骨 桔梗 防風 荏

子 礬石 黃芩 白芷 芍藥 甘草 雄黃

白朮 地膽 斑貓 雌黃各等分

右為末蜜丸菽豆大以水服三丸三十日消四十日愈六十日平復百日内慎房室一方為散醋服一

圭日二者老少者減半服

續斷散出仁齋直指方 治止漏活血益腎氣續筋脉

槿藤子去積麻炙 當歸 川芎 川續斷洗晒 黃耆微炙 葫

蘆巴炒 紫金皮 生乾地黄洗 牡蠣粉各半兩 木香

辣桂各三錢 甘草炙二錢

右為末每服二錢空心溫酒調下或加髮灰佐之

溫解散出仁齋直指方 治濕散漏瘡風冷

藿香 厚朴製 半夏麩 橘皮 蒼朮 細辛

川芎 白芷 各二分 辣桂 川白薑 生 甘草 炙各半分

右判散每服三錢水一盞生薑棗子煎服

蝟肝膏 出聖濟錄 治諸瘕陰徧腫堅硬或發潰膿血不絕

蝟肝 炙令熟 芍藥 芎藭 細辛 去葉各半兩 半脰脂

五錢 當歸 焙切 蠟 黃連 去鬚 黃芩 去黑心 松脂 各一兩

右除半脂蠟松脂外搗羅為末先熬脂令沸下蠟松脂銷鎔即下諸藥末攪令勻以瓷盒盛塗瘡上日三度換

陷脉散 出三方 治漏瘡及三二十年癭瘤或大如孟杯

經久不差致有漏潰令骨肉消盡或軟或潰令大驚惕寐卧不安體中製痛愈而復作

乾薑 炮 琥珀 研 大黃 附子 炮去皮各一兩 丹參 三錢 石硫

黃 研 鍾乳粉 研 烏賊魚骨 研各半兩

右為末貯以瓷盒韋囊勿令洩氣若瘡濕即傅瘡乾即煎猪脂和傅之以乾為度或死肌不消加芒硝二兩益佳一方用胡燕屎一枚

芫青丸 出千方 治一切瘰

班貓 四十枚 豉 四十枚 芫青 二十枚 生豆 大黃 地膽

各十枚 蜈蚣 一條 犀角 牛黃 各棗核大

右為末蜜丸如桐子大服二丸須臾多作酸漿水粥冷飲之病從小便出尿盆中相視如有蟲形狀又似膠汁此病出也間一日服飲粥如常小弱者各三四日候無蟲出瘡漸瘥時忌膩一切食物器皆須灰洗乃作食一方以溫酒服之一方虛悶可煮食蔓菜羹

後仍作二十日將息便不須服

麝香散 治漏瘡

麝香 研 突厥白 蟻娘 蜜陀僧 研 石灰 研 青蒿 心 膩粉 硫黃 研各半兩

右搗研拌勻先以鹽漿水洗瘡用散子填滿瘡口以帛縛定三兩日若有惡物除去依前換藥如無不用換不過三兩上即瘥

葛上亭長丸 出聖濟錄 治諸漏

葛上亭長 地膽 班貓 三味並去頭足翅糯 鼠

婦 六十枚炙 衣中白魚 四十枚 真珠 一研各 檳榔 對二枚 雄黃

研

右為末煉蜜丸如桐子大每服三丸每日空心温酒

下日晚再服漸加五丸

芫青散 出聖方 療癩有九種久不瘥不過此方

芫青 四十枚去翅炒 海藻 八分洗 昆布 八分洗 雄黃 研八分 狸

骨 炙五分 牡蠣 四分煨 地膽 二十枚熬 青木香 三分

右為細末酒服一錢七日二服痛從小便出如爛筋

忌生冷粘食猪肉陳臭物

桂附丸 出三方 治氣漏冷漏諸瘡

附子 炮製米醋中浸再 桂心 厚朴 薑製 粉草 炙白

朮 各一兩 木香 一分 乳香 二味別研

右為細末煉蜜丸如桐子大空心米飲下二三十丸

青金錠子 出瘡科精要 治諸惡瘡膿水出不快及多年疔

癩瘡愈而後復發

白丁香 銅青 硃砂 粉霜各五分 輕粉一匙 龍腦

一匙 麝香一匙

右為細末麵糊為丸撚作錠子每用絃于瘡口中膿水出快

治漏瘡

滑石 輕粉 赤石脂 海蝶蛸 膩粉 乳香

明礬

右各等分研細末以筒子吹藥入漏孔內一夜再用

耳鑷子取出孔內敗肉物再用荆芥湯淨洗復用藥仍前

天靈蓋膏

出聖惠方

治一切瘰

天靈蓋

一分淨洗

虎下頷骨

一分炙

臙月猪脂

四兩

附子

一分炮製

人參

一兩去蘆頭

鐵精

一分

川烏頭

一兩炮製

去皮臍

右為細末用猪脂和令稀稠得所可塗之四畔不得

侵瘡口

麝香丸 治痿瘡絀瘡

麝香 研 石膽 研 膩粉 研 杏仁 去皮尖雙仁炒各一分 香鼠 一枚

去腸胃洗 巴豆 一粒去皮心
淨炙乾 全油出盡

右為末用麵糊和丸黍米大絀在瘡內一日一二次

通治諸痿方

班貓 一枚一方云三分去頭足翅 牡礪 枳殼根 酸棗根

虎薊根 貓薊根 各一把

右搗羅為末蜜丸日一服如棗一枚以丸著瘡口中

漏瘡方

真龍骨 蜂房 炙黃各三錢 黃丹 煨 降真節 五倍子

枯骸骨 瓦煨各一錢

右為細末傅之凡惡核漏瘡並戒怒氣不然核大漏

則水多也

安息膏 仁存方有 治膿水不絕骨中疼痛成漏

安息香 花乳石 火煨紅 血蜴 乳香 各半錢 麝香 減半

右為細末用蠟少許入麻油些小同鎔開搜藥捻作

米粒大依前方看大小深淺逐粒屑入藥於瘡孔中以滿為度藥透內從內生肉一二日退出一粒漸生肉漸退出出盡則瘡中自然平復其功效如神如瘡口冷痛淺濶只用少許乾傳

治漏瘡

木香 丁香 乳香 麝香 各末三錢 黑牽牛

右分作十服每服用烏鷄子一个去其黃用白調藥再入鷄子殼中用頂蓋頭紙糊定於飯甑上蒸熟取

出細嚼温酒下日進一服空心服未効再作即愈矣

班貓散

出聖濟總錄

治諸瘻

班貓 去頭足翅糯米炒七枚 真珠 研 桂皮 去 水銀 與衆藥研令星盡各半兩

葛上亭長 去足翅糯米炒七枚

右為末每服半錢米飲調下空心午後服小便有所出即瘻

乳麝雲母膏

出仁氏直指方

治漏瘡効

穿山甲

浸一宿去肉用一百片

真蚌粉

同炒候香熟起泡出粉以甲為末四兩

右入麝香末一錢夾雲母膏十五貼為丸桐子大每服三十九酒下仍以鹿角膠調鹽酒服神授丸方見勞瘵

門勞瘵類兼服之

生地黄膏出仁氏直指方 治漏通用

露蜂房炙黃 五倍子 木香各三錢 滴浮香二錢 輕粉一匙

右細末用地黃一握搗細和為膏攤生絹貼瘡

蛇蛻散出仁齊直指方 治漏瘡血水不止

蛇皮洗焙焦 五倍子 龍骨各一分 川續斷酒洗三分

右細末入麝香少許唾津調傅

人牙散出仁齊直指方 治漏瘡惡瘡生肌裏欲乾則用

人牙 油髮二味燒存性 雄雞肉各等分

右為末入麝香輕粉少許濕則乾搽乾則麻油調傅

生肉膏出肘後方 療漏

棟白皮二兩 鼠肉二兩 薤白三兩 當歸二兩 生地黄五兩

右五味以鴈月猪脂參升煎薤白色黃成膏傅瘡孔

上令生肉也

班貓散

出千方

治一切瘰及瘰癧瘻生於項上結腫有膿並皆治之

班貓

十枚去頭足翅以糯米拌炒黃色為度用

真珠

半兩

蝟皮

半兩

雄

黃

一分

右為細末每日空心以溫酒調下半錢午後再服可

日三服

白花蛇散

出三方

寒發熱

治九漏瘰癧發於項腋之間痒痛增

白花蛇

酒浸軟去皮焙乾三兩

犀角

半錢

黑牽牛

半兩一半生炒

青皮

半兩

右為末每服二錢膩粉半錢研勻五更糯米飲調下

以利下惡物為度十餘日再進一服可絕根源如已

成瘡一月可効忌發風壅熱物

治一切瘰

出千方

班貓

三十枚

雄黃

桂心

犀角

各一兩

右為治下篩酒一錢匕服日再服病從小便出

鍛落鐵屑膏出千方 治一切痛方

鍛落屑 虎糞 狗頰連齒膏炙 鹿皮合毛燒為灰各等分

右治下篩以猪膏和納瘡中須臾即易日五六度一方無鹿皮有鹿角

治漏瘡

胭脂 血竭 輕粉各一錢 麝香半錢

右碾為末乾傅之

又方

五倍子一兩 青黛 臘茶各半兩 麝香隨用

右為細末於漏瘡上乾摻或用生油調傅之輕粉少

許尤妙

芫青散出聖濟總錄 治諸漏腫

芫青 班貓 葛上亭長三味並去足翅糯米炒各十枚 桂一兩去粗

皮

右為散每服半錢匕空心酒調下日晚再服更宜炙陽明絡脉在肩前申頭二寸陷中有青脉至上向卧

交兩臂勿令開乃夾取之炙隨年壯即差

治諸痿涓涓出膿血疼痛日夜不止漸加羸瘦宜服此

方出千金方

赤小豆 白斂 牡蠣燒赤細研 黃耆各等分

右為散每服三錢匕酒一盞半煎至一盞去滓不拘

時

黑靈散出仁齋直指方

治瘰瘡通用

露蜂房剉二分 牡蠣粉 獬丹 硫黃研各一分

右同炒令烟盡為細末入髮灰一分麝香少許拌和

傳患處麝能引藥透達亦殺蟲

鐵屑膏出仁齋直指方 治漏瘡露乾則用

鍛落鐵屑半兩 鹿角燒灰一兩 真輕粉一錢 狗頭連齒骨炙黃

一兩

右為細末用猪脂傅調

薰漏瘡方出仁齋直指方

艾葉 五倍子 白膠 苦楝根等分

右判如燒香法置長桶內坐薰瘡處

角鷹散 出仁存方

角鷹屎 乳香 葱白

右等分為末先鹽水洗瘡口看大小以燈心探入瘡口深淺內藥入明日其骨及蟲惡水自出不過兩次

治一切漏瘡惡瘡生肌止痛 出余居選奇方

人牙 不以多燒過 麝香 各少許

右都研令勻濕則乾摻乾則用生油調傳

莉蘆塗傳方 出聖惠方 治諸漏浮核不盡及諸惡瘡癰疽

息內在於肌中

莉蘆 以鷄子去黃取 蔞茹 各一兩 雄黃 研一錢

右研為末塗傳息肉上日五度即差傳瘡不得入眼內入藥恐與瘡有碍只敷瘡上則可

治漏藥 出藥院方

獨角仙 一箇火去殼 甜葶藶 各半錢 砒 同研

右為末細煉蜜為錠子每用臨時覩瘡口大小旋捏

作餅子放入瘡口內其蟲俱出即時見効

班貓丸出可一 治一切瘰癧方

班貓四十枚去足翅糯 地膽三十枚去足翅首 蜥三枚 蛭三枚

右搗之千杵蜜和丸如大豆服二丸空心臨晚温酒

下

神驗伏翼糞丸出聖 治一切瘰癧瘡及治久瘰

伏翼糞四兩 班貓三分去頭足翅以糯米拌炒令米黃 皂莢子一兩

一作是皂莢花

右搗為細末煉蜜和丸如梧桐子大每日空心以莢白皮塗酥炙微黃搗末煎湯下一丸服至三丸病根並於小便中出

馬齒莧膏出聖 治一切瘰癧

馬齒莧陰乾 臘月燭燼各等分一作臘月鼠灰

右為末以臘月猪脂和其瘡先以暖泔清淨洗拭乾然後以藥傅之日三

欽定四庫全書

普濟方

三

又方出千金方

乾牛尿 乾人尿各等分

右搗末先用綿裹瘡上綿著尿蟲聞尿香即出若瘡即舉綿上之更別取尿及綿著其上如前蟲盡乃止

蜂巢膏出千金方

治漏作瘡孔方見本門蜂瘻類

治漏心胸以下者方

松脂 武都雄黃各三兩

右為末和塊刀子刮為散飲服一方寸匕日三服不

瘥再合

附子塗傳方 治漏瘡晝開出膿夜復合

附子一枚搗末 鯽魚頭間去肚腸

右將附子末內魚肚中滿以泥固濟炭火上燒通赤取出去泥研細為末冷傳瘡口內日用三五次以差為度

伊蘭草塗傳方 治漏瘡

伊蘭草七葉 狗頭骨燒過二兩

欽定四庫全書

普濟方

三

右為末塗傳瘡口內日一換之以差為度

巴豆塗傳方 治漏瘡

巴豆 一分去心皮 肥棗 十枚去核皮

右細研以水一升煮稀稠放布中絞出取汁塗傳瘡

上日一次

地鼈散 治漏瘡

乾地鼈 末 麝香 各研少許

右研勻乾摻或貼隨乾濕治之

蝕瘻瘡

生油髮 燒留性 白芨 一錢

右為細末摻傳之

療瘻方

右用槲木皮長一尺濶六寸去黑皮細切以水一斗
煮取五升去滓內白糖十挺煎取一升三分服以銅
器吐出看視之病矣

治一切瘻 出聖惠方

普濟方

用死蛇白礬各一兩燒灰細研傅之

又方

蝮 一十四枚燒
為灰研如粉

右件藥以煉雄猪脂和作膏著瘡中

治一切瘰 出千金方

用成煉松脂末填瘡孔令滿日三四度七日瘰大有

神驗

又方 出千金方

用霜下瓠花曝乾為末傅之

洗漏瘡方

出危氏方

治漏瘡孔中多有惡穢常須避風洗

淨

用露蜂房白芷煎湯洗或用大腹皮苦參煎湯洗如洗畢候水出拭乾先用東向石榴皮曝為末乾摻以殺淫蟲少頃傅藥即愈

苦瓠方

出千金方

治一切瘰及蟻瘰大妙

用苦瓠四枚大如盞者各穿一孔如指大置湯中煮

欽定四庫全書

十数沸取一竹筒長一尺一頭內瓠孔中一頭注瘡孔上冷則易之徧止

治一切瘰

出千金方

用煮鹽花以麩擁病上內鹽花麩匡中厚二寸實下以桑葉三重藉候冷熱得所可忍冷無益熱則以內一日一度候瘰癧根株勢消則止若已作瘡者搗糝殼為末粉之一方用鹽麩燒灰傅之

槲皮煎

出千金方

治一切瘡瘰

用槲皮北陰白皮三十斤剉碎以水一石煮取一斗去滓煎如糖又取都厠上雌雄鼠屎各四十枚燒令汗盡為末內煎中又酒溫一升投煎中合攪之羸人服五合當有蟲出

治一切瘰

出千金方

用搗土瓜根傅之燥則易不限時節

杏仁塗膏

出千金方

治一切瘰

用死蛇去皮肉取骨為末和封瘡上生油調方得大

痛杏仁研膏磨之以方死蛇和臘月猪脂燒灰為末
內孔中一方單用死蛇灰醋和傳一方治蛇瘻用蛇
蛻皮燒灰臘猪脂和摩之

又方出千金方

用燒死蟻螂為末醋和塗乾摻亦得一方用鹽湯洗
瘡塗傳一方蟻螂尿為末傳之

治一切瘻方出千金方

用故布裹鹽如彈丸大燒令赤為末酒調服

又方出千金方

用白馬屎絞取汁每服合水和尿取汁亦可

又方出千金方

用猪脂一升酒五合煎沸頓服一方用臘猪脂塗傳
瘡二用紙貼定

治一切惡瘻中冷應肉方出聖惠方

用正月雄狐屎陰乾搗末汲水和服一錢食前

治一切冷瘻方出聖惠方

用所吐蛔蟲燒為灰先用甘草湯洗去瘡然後著灰
無不瘥者慎口物

治膿瘻方

出聖
惠方

用桃花末以猪脂和封之佳

治漏瘡

用嚼五倍子和血竭末塞之

治脇下生漏瘡如牛眼之狀膿水不止

用鹽少許安白牛耳內然後取耳中垢以傅瘡上即

瘥如不用鹽即牛耳不痒難取垢

治漏瘡口子不乾

用蝦蟇膽肝不見水拭乾用銀篋搗碎搽於口子內

外用尋常膏藥貼之久之其膽肝熟變為好肉

啄酒散

治瘻有頭出膿水不止

方見痔漏
門痔漏類

治漏方

右以巴豆用青紅紙各一張減去油推麝香少許絀
入瘡內却用紅紙作捻子蘸藥末入瘡口內填滿瘡

孔如四邊有紅點是漏瘡未發却用銅筋或銀釵尖按破用前藥搽之後用黃連黃丹龍骨雄黃四味封口七八日可

治漏瘡

用多年海船底土泥石灰為末以烏鷄子清調火煨為末傅之自然生肌提出元藥

朝生暮落花傅方 治漏瘡

用朝生暮落花陰乾為末取塗傅瘡上日三次

鷄子塗傅方 出肘後方 治諸瘻亦治鼠瘻

用鷄子三枚蒸熟去殼白取黃炒黑色先用鹽湯洗瘡後塗日三五次即愈一方治下血不止肌體黃瘦四肋無力宜服此方

又方

用取新生鼠糞一百日已來者収置蜜器中取塗傅瘡口日數度即瘥之

猪腎酒 治通行漏中惡水自大腸出

用牽牛碾細去皮取末一分入猪腎中以綿扎青竹葉包用慢火煨熟空心溫酒嚼下

治瘰若著口裏

用取東行棟根細剉水煮濃汁含之數內吐却嚥

治瘰瘡

用鴛鴦肉以清酒炙食之則美麗又主夫婦不和作羹臠私與食即相怜愛

又方 治諸瘰瘡喉嚨痛及喉痺並宜煎服

用通草或礬亦得急即含一方治頂上瘤漏用通草根煎服

治瘰有九種不過此方

用芥子搗碎以水及蜜和滓傅喉上下乾易之

治瘰

用鯉魚腸切作五斷火上炙之洗瘡拭乾以腸封之冷即易自暮至旦乾止覺痒開看蟲出差

効驗方 療瘰衆不差

用牡蒙數雨搗之湯和適寒溫取一升許薄瘡上冷
易經宿者佳

生肉膏 療瘻

用桑薪灰三升水四升淋之復重淋之取三升石灰
熬令黃內灰汁中以兩重帛裹絞去滓更魚日煎去
二升勿用急火煎隨瘻孔深淺初時作服散而瘻孔
若深四寸新藥與孔裏薤白使糯安藥薤白入藥孔
裏若深四寸隨瘻根而灸兩處四十壯雄勿灸瘻孔
隨深淺去膿散與膏安著瘡孔裏十五過少遷延日
月取瘻肉滿膿亦斷神良無比

通治諸瘻方

右以八月多取斑貓蟲即納入苦酒中半日許出曝
乾取六七枚著銅器中蒸火上熬令熟搗作屑巴豆
一粒去皮熬之又取黃犬背上毛三七枚亦熬作屑
好砂一錢五分匕都合和以苦酒頓服之蟲當盡出
若一服未効先時可預作三兩劑後日服遠不過三

兩劑

又方

若先著下部邊或上出耳後頸項諸處者苦參切五升以苦酒一斗浸三四日宜服一斗亦如之但每作以知為度不過三四度必瘥

槲皮膏 療癩

用槲皮白皮切取五升以水八升煮令冷絞出滓重令成膏日服半棗漸加至一棗許亦敷瘡上無忌患

瘡唯宜煮飯苜蓿鹽醬又不得多食之

療諸癩方

用葶藶子搗細羅取加白蜜和丸每於著藥先温泔洗著瘡孔中以丸內之若塞以物道開日三度瘡痛是瘥候勿停藥

又方

先以泔清温洗以綿拭之取葵葉微火暖貼之瘡引膿不三二百葉膿盡出即肉生忌雜諸魚蒜房室

治瘻方

用煎桃葉枝作湯淨洗瘡了內孔中大驗

治諸惡瘻方

用杏仁二兩去皮以水研取汁每二合溫服一方治一切瘻

治蝗蝻瘻方

用取甜瓜根搗羅為末傅之至瘡慎口

治石瘻兩頭出者其狀堅實令人寒熱方

用大錐針破之次用鼠粒葉二分為末和鷄子白一枚封之

又方

用搗槐子和井花水封之

治蠅娘漏方

用黑牛屎燒灰臘猪脂和傅之先用鹽湯洗瘡一方用乾牛屎為末傅之瘡即撥去根厚封瘡乃止一方用熟牛屎塗之數易應有蠅娘出亦治鼠瘡

治蚯蚓瘻方

鷄屎 蚯蚓屎

右為末用牡猪下頷髓和傅之

治蠍瘻五六孔皆相通者方

用搗茅根汁著孔中

又方

用半夏搗羅為末以甲煎調塗之一分

治蝦蟇瘻方

用五月五日蛇頭及野猪脂同水衣封之佳

治蚯蚓漏

用胡粉不限多少用猪脂和調塗摩瘡上日再即瘥

治蛙瘻螳螂瘻方

用取母猪屎燒灰臘月猪膏和傅之當蟲出如雀形

温經丸 治陷脉瘻

厚朴薑製 官桂去皮 白朮炙 甘草炙 乾薑炮 木香各一兩

附子半兩醋浸炮碎七次去皮臍

右為細末煉蜜和丸桐子大每服三十九食後米飲

湯下

鴨脂膏 治蚯蚓瘻

鴨脂 三兩 胡粉 三兩 巴豆 去殼研去油盡半兩

右先鎔脂入二味調如膏每日三五度塗瘡上即瘥

內瘻方

用黃皮白搗丸綿裹內下部中傳効

一方 治瘡有漏孔

即以桑蟲五條焙乾末摻之即愈

治一切漏瘡三方

甘草 草菓

右等分碎切煎湯洗瘡口

又方

馬骨 敗龜殼

右為細末用麻油調傅瘡口如藥不細則瘡疼

又方

皂角刺 天蘿 乾者各等分

右燒留性為細末加燒酒調下用火筋挾燒服三錢

治瘰

用馬莧搗指之

治瘰

以紫荆木煮汁服之

療下瘰

右取鼠尾草濃煮取汁用可丸服亦用作飲

治毒腫下瘰

右以紫珠者汁服之

療諸瘰瘡及妬乳癰腫

右以白狗骨燒屑傅之

治瘰瘡及溪毒丁腫出根

右以狗屎和臘月猪脂傅

治諸蟲瘰惡瘡

右取木通花上粉內瘡中良

治瘻

右煎根枝作煎淨洗瘡子孔大効

治瘻瘡

右以壁錢蟲滴汁傅瘡上

治惡瘡瘻

右以斑貓去翅足炒末傅之

治惡瘡瘻

以傅落迴和百丈青雞桑灰等為末傅瘡瘻

治癰腫疽瘻癩癧

以毛蓼杆碎內瘡中引濃血生肌亦作湯洗瘡

治疽瘻惡瘡

以楊櫨木葉水煮汁洗瘡立瘥

治瘡瘻

以鰾魚斷取血塗之

治瘡瘻

右取黃藥根研服之亦塗瘡上

治瘰瘡

以多年鵲雀巢燒灰傳之良

治風腫瘰瘡

以驢屎熬尉之

狼瘻 附論

夫狼瘻者由寒暑不調飲食有毒或大怒氣止不下之所生也始發之時在于頸項有根出缺盆上轉連其本其根在肝也

方

神効蝟皮散 治狼瘻出膿水不絕寒熱肢節煩疼

蝟皮一枚 川椒三分 附子三分 當

歸三分 露蜂房三分 地榆三分 木通三分 苦參

班貓半兩 鱖鯉甲四枚 桂心半兩 細辛

半兩 樗雞三分 川大黃一分 蜈蚣一分 雄黃一分

蛇床子一分 蛇蛻半兩 蜥蜴一枚 薏苡仁三分 蘭茹

牡丹三分 龍膽三分 雞骨一分 土瓜根三分 藿蘆

分三白蒺藜三分微炒去刺

右為細末每於食前以温酒調下一錢以瘥為度

空青商陸散 治狼漏始發於頸腫無頭有根起於缺

盆之上連延耳根腫大此得之憂恚氣氣上不得下

其根在肝一作在肺空青主之商陸為之佐

空青 蝟腦各三分 蝟肝 芎藭半 獨活 黃芩

鱉甲 婦人蓐草 商陸 班貓 乾薑 地膽

當歸 茴香 礬石各一錢 川椒三十粒

右治下篩酒下方寸七日三服十日服之外臺秘要

為商陸

空青散 治狼瘻發於頸耳疼痛出膿水

空青半兩燒過細研 蝟腦半兩 蝟肝一具微炙 芎藭半兩 獨活三分 黃

芩半兩 乾薑一分炮 當歸半兩微炒 班貓一分以糯米

為度去頭翅足 鱉甲三分塗醋炙令 川椒五十枚去目及

汗 茴香子一分 白礬一兩燒灰

右為細末每服一錢以温酒調下食前

空青丸

空青燒過細研 高陸 知母 狸骨炙 桔梗去蘆頭 礬石

泥裹燒半日細研 防風去蘆頭 荏子 白礬燒令汁盡 蛇蛻皮燒灰

白芷 赤芍藥 班貓以糯米拌炒令米黃為度去頭翅足已上各等分

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每一空心醋湯下

三九

芫青丸 治狼瘡

芫青二十枚去頭翅足糯米拌炒令黃色 班貓十枚去頭翅足糯米拌炒令黃色 生

犀角屑如棗大 黑豆黃五十枚炒熟 牛黃半棗大研細 蜈蚣一枚

去足大者炙令焦黃

右前件六味為末入牛黃研令勻煉蜜和丸如梧桐

子大和服藥隔夜少食每日空心以溫水下二九須

臆可煮醋漿水薄粥稍稍飲之其瘻有形狀皆從小

便中出至心甚虛悶可煮蔓菁菜羹食之如壯人隔

日一服人弱隔兩三日一服服藥後瘡瘻蟲盡為度

若瘥仍將息一月藥欲盡須預合勿使斷絕藥氣

鯨鯉甲散

出聖惠方

治狼瘻

鯨鯉

一兩

鳩鳥嘴

半兩

蝟皮

一枚

犬牙

一分

蜈蚣

一枚

右件藥入瓦爐子內燒煙絕便以盆合之勿令成灰候冷研令細以臘月猪脂煉過調傅瘡上日二換之

鼠漏

附論

夫鼠漏者由飲食不擇蟲鼠之毒而變化入於臟出於肺稽留脈內而不去使人寒熱其根在胃若於出頸腋之間猶浮于脈中而未內著於肌肉及外為膿血者易

療之也

方

黃耆散

出聖濟總錄

治鼠漏

黃耆

剉

白礬

燒灰

附子

炮裂

去皮

當歸

切

防風

去

括

萋根

芎藭

黃芩

去黑

狸骨

酒炙

甘草

二兩

大黃

剉乾薑

炮

露蜂房

炙

各一兩

細辛

去苗

班貓

一兩

芫青

二味

並去翅足糯

米炒

各五枚

右為末每服一錢匕空心以溫酒調下日再服

狸骨知母散

出千金方

治鼠漏始發於頸無頭尾如鼯鼠

使人寒熱脫肉此得之食鼠毒不去其根在胃狸骨主之知母為之佐

狸骨 知母 桂心 鮫鯉甲 山龜殼 甘草

雄黃 乾薑 各等分

右治下篩飲服方寸匕日三仍以蜜和內瘡中無不差先灸作瘡灸以藥傅之已作瘡不用灸

狸骨散

出聖惠方

治鼠漏瘰癧寒熱

狸骨 酒炙一分 躑躅 炒 龍骨 王不留行 當歸 切焙

土瓜根 鼠姑 各半兩外臺秘要作鼠粒子

右為末每服二錢匕食移溫酒調下日晚再服一方有蝟皮無狸骨名蝟皮散

鮫鯉甲散 出聖惠方 治鼠漏發起無頭尾如鼯鼠使人寒

熱此得之食鼠毒不去其根在胃

鮫鯉甲 炙 鱉甲 炙 醋 甘草 炙 桂皮 去粗 雄黃 研 乾薑

狸骨 酒炙各半兩

飲定四庫全書

右為末每服二錢匕酒調下日晚再服又法以蜜為
丸內瘡中日一度易之一方無狸骨煉蜜和作餅子
量大小貼日二換之

鰻鱺魚丸

出聖惠方

療鼠瘻

鰻鱺魚

四兩炙令焦

野猪皮

四兩炙令焦

瞿麥

一兩

班貓

二十枚去

首足翅炒

巴豆

十五枚去皮焦

臘月猪脂

五分

五月五日蟾蜍

一箇

炙

右搗野猪皮下篩合諸藥更搗下篩內鰻鱺以膏和

搗千杵平旦未食服如梧桐子大二枚覺者寒熱不
覺暮投明旦一起更服三九稍稍增之慎勿食煩悶
穀人蟲當從小便出以物盛之屎便視乃有百數耳
不可以見亦大便出此方神驗服百要愈忌猪肉蘆
芽

五白膏

一名漏蘆膏出千金方

治鼠瘻癰

白馬尿

白牛尿

白猪尿

白羊尿

白雞尿

各一升

漏蘆

二斤

右各於石上燒作灰研絹篩之以猪膏一升三合煎
亂髮一两半令極沸蘆消乃內諸末微火上煎五六
沸藥成去瘡痂以鹽湯洗新帛拭乾然後傅膏洗無
痂猶須洗日再若著膏當以帛裹上勿令中風冷神
驗外臺秘要有藁本二斤

療鼠漏方

出肘後方

山龜殼

炙

桂心

雄黃

乾薑

狸骨

甘草

炙

右等分為散飲服方寸匕日三蜜和內瘡中無不愈

先炙作瘡後與藥良忌生葱海藻菘菜

松脂煎

療鼠瘻

松脂

硫黃

狼毒

各二兩

猪腦

具一

白斂

二兩

右熬猪腦取汁狼毒白斂咀以水三升煮取一升
內腦汁中煎得五合細研硫黃松脂下篩內中攪令
相得綿裹內瘡中七日知二七日病除神效

療鼠瘻方

出肘後方

石南

生地黃

雄黃

茯苓

黃連

各二兩

右作散傳瘡日再忌猪肉蕪荑

療頸鼠瘻累者方

貝母 乾薑 藁本 桂心 蜀椒 各一分 去汗

右搗下篩先食吳萸一分以酒服一撮忌生葱

赤小豆散 出聖方 治鼠瘻及出膿水項強頭底四肢寒

熱

赤小豆 一合 炒熟 白歛 一兩 露蜂房 一兩 燒灰 蛇皮 二條 燒灰

右為細末每服食前以溫酒調下一錢

死鼠膏 出聖方 治鼠瘻

死鼠 一枚 中形者 亂髮 松脂 二兩 黃丹 六兩 紫色炒

右件藥用油一斤以文火煎鼠髮候消以綿濾去滓又入鎊中然後下松脂黃丹以柳木篋攪令勻膏成于瓷器中盛每日塗貼日二易之

外正膏 治鼠漏

死貓兒骨 酒和醋炙一條 三寸長 皂莢 去皮子挺炙一挺 木鼈子 去殼

生用二重粉 半錢 研

右為末每用三錢用米醋熬成膏傳之如一兩日未
効即用溫酒調二錢七服畢衣被蓋出汗即差

馬齒莧膏

出聖惠方

治一切癰疽皆是瘡痕根本所患癰

之後膿汁不止冷即是鼠瘻是以漏者急須療之

馬齒草

五升切

槲白皮

一斤水五升煮取一升清澄

麝香

半臍乾之仍研

作杏仁半升油煎令末黑搗如膏

右以薨器貯之合和以三四重帛密繫口病已成瘡
者以泔清淨洗拭乾煎作貼子塗藥貼著瘡上日三

易若未作瘡如作癩癰子者以艾一升薑黃如棗大
乾漆如棗大末之兼釜下土三味並和艾作炷灸三
七狀

馬靈丹

烏魚骨

二錢半

狗脊

二錢半

輕粉

二錢半

銅綠

二錢半

右用成人姓人不犯紅日搗為末竹紙包就大効

班貓散

出聖惠方

治鼠漏著頸上生小者如棗大者如杯

班貓

十枚去頭翅足糯

牡丹

三分

海藻

一兩洗去鹹味焙乾

右為末每日空心及夜卧時以葱白湯調下半錢病根當於小便中出如魚子利後只得喫粥一方有牡蠣無牡丹酒調服忌蒜

仙人曉散

出聖濟總錄

治鼠漏

黑貓骨

取一兩燒灰存性

甘草

炙為末三分

麝香

別研半分

右研細分作六服每服臨卧時温酒調下

療鼠瘻諸惡瘡方

苦參

三斤 露蜂房

三兩 麵

右以水三斗漬藥三宿去滓黍米二升釀熟飲日三一方得蝟皮一具

又方 治老鼠瘡久不瘥

用臘月八日醋浸川烏五箇五月初五日午時烏頭切作三十五塊與同醋浸三十五日却用三味

胡椒

三十枚

麥門冬

三十粒

川烏

搗爛為末

右為末黃蠟為丸忌用鐵器用黃丹用丙午日合黃蠟為丸鼠糞大右卧左點左卧右點之即可

死鼠膏

治鼠瘻

方見本門 蟻瘻類

槲皮煎

治鼠瘻

方見本門 諸瘻類

貓腦骨散

出聖 惠方

治鼠瘻

方見本門 諸瘻類

半夏膏

出聖 惠方

治鼠瘻

半夏

一兩搗 羅為末

鯪魚脂

一兩煎 了者

右一處調如膏旋取塗瘡上

狐頭散

出聖 惠方

治鼠瘻

野狐頭

一枚炙 令黃

狸頭

一枚炙 令黃

右搗為末先將水洗拭乾以猪脂調傅之

杏仁塗膏

治鼠瘻

方見本門 諸瘻類

治鼠漏瘡方

出聖 惠方

死鼠

中形者 一枚

亂髮

如鷄子 大一束

右以臘月猪脂一斤煎二味合消盡瀘去滓膏成分
作二分一分稍稍塗瘡一分稍稍酒服之瘥鼠子當
從瘡中出良

療鼠瘻方

烏頭炮 附子炮各二兩

右咬咀著五升淳苦酒中漬之待乾復內若酒中燥復內以苦酒浸盡暴令乾搗末酒服方寸匕日三忌猪肉冷水等

療鼠瘻方

馬齒

礬石

燒

真珠粉

右為末厚塗瘡上不過三愈

療鼠瘻方

出肘後方

礬石

三分燒

班貓

一分去頭足翅炒

右為細末用酢醬服半匙須臾瘻蟲從小便出

麝香塗方

出聖惠方

療鼠瘻穿穴成瘡痛不可忍

麝香

研

雌黃

研一作雄黃

右等分研為末取蝦蟇背白汁和塗瘡孔中日一度一方用酥和內瘡孔中

治鼠瘻方

出聖惠方

用糞燒為灰細研傅上

又方出聖惠方

用瓠花曝乾搗羅為末傅之

地黄膏出千金方

治鼠漏瘡瘥後復發及不愈出膿血不

止

用不中水猪脂咬咀生地黄內脂中令脂與地黄足相淹和煎六七沸其瘡先用桑灰汁洗去惡汁次以地黄膏傅瘡上一日一易之

治鼠漏方出千金方

右得蛇腹所蚕鼠燒灰末服方寸匕日再不過三服此大驗但難過耳并傅瘡中佳外臺秘要有蝦蟆一方用蛇腹中所吞鼠乾之末傅

治鼠漏腫核痛未成膿者出肘後方

用栢葉傅腫上熬鹽著葉上熨之令熱氣下即消

治鼠漏已有口膿血出者出肘後方

用白鮮皮煎汁服一升當吐出鼠子愈

治鼠漏腫核痛若有瘡口出膿水者出肘後方

用蜘蛛二十枚燒傅良

治鼠瘻

用新鼠屎一百粒入密器中五六十杵碎以傅瘡孔

中

又方

用蝮蛇磨著物皆透

治鼠瘻鼠拗齒人瘡

用狸頭骨燒灰傅之

療鼠瘻方

用五月五日櫻桃搗末先鹽湯洗拭之令乾以末傅

瘡上

療鼠漏要方

出肘後方

用柞木皮五升水一斗煮一熟去皮煎令汁得二升

稍稍服盡當有宿虫出即愈

療鼠漏久不瘥方

用柞木不限多少常作羹粥任喫之必驗

療鼠瘻方 兼治螻蛄瘻

用榭葉搗末傅腫上炒熱鹽熨之即消良効

治鼠漏腫核痛若已有瘡口膿血出者

出肘後方

用牛熱尿傅之日三有蜚蠊出

又方

用貓狸物料理作羹如食法空心進之鼠子死出又

當生吞其功彌効一方單用貓作羹食之

鷄子塗傅方

出肘後方

治鼠瘻

方見本門諸瘻類

治鼠漏惡瘡

用蟾酥眉脂以麻油調塗立効

治猝得鼠瘻有瘰癧未發疼而速熱者

出肘後方

用搗烏鷄足并車前子傅之

治老鼠瘡久不瘥

用綿絮燒灰或瘡乾者用油調傅如濕乾末搽之

又方

用龜心焦土碎研香油調傅之

班烏散

出衛生家寶

治癩瘰鼠漏

班貓

何首烏

糯米

右等分同炒令黃色去班貓用二藥為末酒調服取虫出如鼠能動其病自愈

五靈脂散

出衛生家寶

塗瘡口

治鼠瘻

出本草

右用死蜚蠊燒作末苦酒和傅之數通即愈先以鹽湯洗之

治鼠瘻瘡

出本草

右以通草煎服之摩亦得

療諸毒鼠瘻

出本草

以玄參又名馥草酒漬飲之

療鼠瘻癰瘰

出本草

取臘月猪脂調塗之

治鼠瘻

用鷄卵一枚米下蒸半日取出黃炒令黑色先拭瘡

上汗令乾以炒黑鷄子黃內瘡孔中三度即差
又方

用堇菜乾為末和油煎成膏摩癩上三度差
堇菜野生非人

所種名堇葵葉似
柳子如米花紫色

癩蝨癩 附論

夫癩蝨者由食菓蔬子不避有蟲即便噉食內傷于
腸有毒不去變化所生也始發之時在于頭上狀如蝸
形癰疔而出其根在大腸也

方

苳子桔梗丸 出千金方 治癩蝨始發於頸項狀如腫此

得之食瓜果實毒不去其根在大腸苳子主之桔梗
為之佐

苳子 龍骨 各半兩 附子 一兩 蜀椒 一百粒 桂心 桔梗

乾薑 外臺秘要作礬石 獨活 芎藭 各五分

右為末以棗十枚合搗醋漿和丸如大豆溫漿下五
丸加至十九

丹參散出聖方

治螻蛄瘻生于項門腫硬疼痛

丹參

二兩

蒟蒻根

二兩

甘草

半兩炙對

秦艽

一兩去苗

獨活

一兩

牛蒡子

一兩

躑躅花

半兩

川椒

半兩去目及閉

牛膝

一兩

去苗

一兩

去苗

右咬咀每服三錢水一鍾煎至六分去滓每日空心

及晚食前服之

桂心丸

出聖方

治螻蛄瘻疼痛出膿水

桂心

一分

黃耆

半兩對

礬石

一分煨煉者

芎藭

一分

大黃

半兩對碎

微炒

烏啄

半兩炮去尾

川椒

一百粒去目及閉

者微炒去汗

虎脰骨

半兩

塗酥炙黃

右為細末煉蜜和丸如菉豆大每日空心及晚食前

以溫漿水下二丸

亭長散

出聖方

治螻蛄瘻

亭長

六枚去頭足翅糯米拌炒令黃色

川大黃

半兩對碎微炒

細辛

半兩

心一分

鮫鯉

一兩炙令黃

楓樹中蟲糞

三撮

右為細末每日空心溫酒調下一錢晚食前再服

馬齒莧膏

治螻蛄瘰

方見本門諸瘰類

治螻蛄瘰

出聖惠方

用槲葉燒灰細研右以泔別漬槲葉取汁洗瘡拭乾內少許灰於瘡中

蜂瘰

附論

夫蜂瘰者由飲食勞倦渴乏多飲流水即蜂毒不去變化所生也如發之時其根在頭癰癧三四處俱腫潰生瘡狀如癰形差而復生其根在脾也

方

雄黃黃芩散

出千金方

治蜂漏初發於頸癰癧三四處俱

相連以潰此得之飲流水中有蜂毒不去其根在脾雄黃主之黃芩為之佐

雄黃

黃芩

各一兩

蜂房

焙

鱉甲

茴香

吳茱萸

乾薑

各半兩

蜀椒

三百粒

右治下篩傳瘡口上日一度十日止外臺秘要無雄

黃黃芩

五香散出聖惠方

治蜂瘻發於頸項累累相連腫痛

沈香一兩半

丁香一兩木香一兩半

薰陸香一兩半

川升麻

一兩半連翹

一兩半麝香一分

右件藥搗細羅為散同研藥令勻每服一錢以水一

中盞煎至六分每空心及晚食前溫服

露蜂散出聖惠方

治蜂瘻有頭

露蜂房

一枚鱉甲

一分吳茱萸

一分川椒

一百粒

乾薑

一分雄

黃一分

右為細末研入雄黃以生油調塗瘡口日三度用之

皂莢丸出聖惠方

治蜂瘻生於項間三五相連如彈子腫

赤疼痛

皂莢

八兩以四兩搥碎用新汲水二升浸一宿搗絞取汁四兩去皮以酥一兩塗炙令黃焦

牛蒡子

蝸牛

牽牛子

微炮已上各一兩半

右為細末取前皂莢汁於銀器中以慢火熬至一升

如未入藥味更熬令可丸即丸如梧桐子大每服二

十九以黃香湯下每日空心及晚食前服

索豆散

出聖 惠方

治蜂瘻

索豆

二兩 炒熟

白斂

一兩

牡蠣

一兩 燒灰

右為細末每服以溫酒調下一錢日三服

治蜂瘻方

出聖 惠方

用人尿蛇蛻皮灰臘月猪脂和傅之一方有麝香

蜂窠膏

出聖 惠方

治蜂瘻

用蜂窠燒灰炙黃為末亦可用臘月猪膏和傅孔中一方療鼻內肉外查瘤膿血出者是蜂瘻方單用蜂

房炙焦為末酒調一錢服粥飲亦得空心日一服

蜂瘻初生狀如桃而痒搔之則引大如鷄子如覆手者

出聖 惠方

用熬鹽熨之三宿四日瘻不瘥至百日成瘻其狀大如四五子石廣三寸中生蜂作孔乃有數百以石玃黃隨多少燃燭燒令汁出著瘡孔中須臾間見蜂數十蜂盡乃瘥

又方

出聖 惠方

用死蟪娘燒為灰細研醋和塗之

又方出聖惠方

用鴟頭燒灰細研傳之

虬蟬瘰 附論

夫虬蟬瘰者因寒腹中澎脹所得寒毒不去變化所生也始發之時在其頸項使人狀熱若傷寒者有似疥癬瘰瘰孔出膿血其根在肺也

方

礬石防風散出千金方 治虬蟬漏發於頸項初發有如傷

寒此得之食中有虬蟬毒不去其根在腎礬石主之防風為之佐

礬石 防風 知母 雄黃 桃白皮 乾地黄

獨活 青黛 班貓去頭足 白芷 松脂一作白脂 芍

藥 海藻 當歸各一分 白朮四分 蝟皮各四分 蜀椒一百

粒去目及閉口者微炒出汗

右治下節每服一錢日三服外臺秘要無礬石防風

礬石散 出聖濟總錄

治蚘瘻始發在項如患傷寒此因

喫食中蚘瘻毒其根在腎可皆治之

白礬 燒令汗枯半兩 李白皮 桃白皮 獨活 去蘆頭 知母

焙 生乾地黄 一分 雌黃 研一分 蝟皮 炒 白朮 各三分 青黛

研 班貓 去足翅糯米炒 白芷 桐皮 蜀椒 去目并開口炒出汗一百

粒 芍藥 海苔 當歸 焙各一分

右為細末每日空心温酒調下一錢日三

桃白皮散 出聖惠方 治蚘瘻發於頸上初得狀熱後却

成瘡出膿水疼痛

桃白皮 半兩 川大黃 半兩 知母 乾生地黄 兩半

雄黃 一分 蝟皮 一分 獨活 兩半 青黛 一分 川椒 百

粒去目及開口者微炒出汗 白芷 一分 松脂 赤芍藥 一分 海苔 一分

右為細末都研令勻每日空心及晚食前温粥調下

一錢

治蚘瘻 出聖惠方

龜膽 三枚 犬牙 三枚 琥珀 兩半 虺蛇頭 一枚 猪牙 三枚

頭各灸 雄黃 半兩
令黃色 細研

右為細末以醋和勻傅瘡一宿神驗

赤小豆散

出聖方

治蚬蜃瘻

方見本門鼠瘻類

瘰癧

附論

夫瘰癧者由恐懼愁憂思慮哭泣不止餘毒變化所生也始發之時在頸項無頭尾如棗核或移動皮中使人寒熱心慙其根在心也

方

礬石白朮散

出千方

治瘰癧始發於頸下無頭尾如

棗核塊累移在皮中使人寒熱心慙得之因喜怒哭泣其根在心礬石主之白朮為之佐

礬石 白朮

空青

當歸

各三分

細辛

一兩

蝟皮 一作

乾蝟肉

班貓

枸杞

一作根

地膽

各一分

乾烏腦脂

二

豆

大許

右治下篩以酢漿服方寸匕日三病在上側轉卧在下高枕卧使藥下流忌生菜桃李雀肉生血物

玄參散 出聖方

治瘰癧瘻結核腫痛

玄參 二兩 川升麻 二兩 獨活 二兩 漢防風 一兩 甘菊花 一兩 連翹 三兩 犀角屑 半兩 川大黃 半兩 碎微炒

右咬咀每服四錢水一中盞煎至六分去滓每於食

前溫服

空青散 出聖方 治瘰癧瘻發於頸如棗核在皮中不能

消散結腫疼痛

空青 三分 燒當歸 三分 細辛 三分 枸杞根 三分 蝟皮 三分 炙令

黃乾鳥腦 三分 班貓 一分 糯米 炒足 地膽 一分 糯

米拌炒米黃為度去頭翅足

右為細末每於食前以溫漿水調下一錢

神驗犀角丸 一名甘草丸 治瘰癧瘻 方見本門熱毒類

又方 出聖方

蝸牛殼 一兩 以牛乳 半升 炒黃細研 川大黃 三分 搗為末

右為細末每日空心以溫酒調下一錢即於大便中

瀉出惡物

蟬疽癩 附論

夫蟬疽癩者因慮結馳思往反變化所生也始發之時先在於頸亦在腋下如兩指無頭尾使人寒熱常嘔吐其根在膽也

方

商陸散 出聖方 治蟬癩或生於頸或發於腋腫硬如指

久即穿潰有膿

商陸 一兩 曾青 二分 黃芩 一兩 防風 一兩 白礬 一兩

汁 人參 一兩 小薊根 一兩 石膽 一分 甘草 一兩

雌黃 一兩 赤芍藥 一兩 白芷 一兩 桂心 一兩 知母 一兩 桔梗

一兩 雄黃 一兩 狸骨 一兩 銀星礬石 一兩

七 地膽 一分 班貓 十枚

右為細末入研了藥更研令勻每日空心及晚夜臨卧時以淡醋調下一匙三十日知愈七十日平復甚者百日無復所苦凡服藥寧從少起過度即令人淋瀝淋瀝則減服之

地膽甘草散出方治蜉疽漏始發於頸如兩指使人

寒熱欲卧此得之思慮憂慙其根在膽地膽主之甘

草為之佐

地膽 雄黃 乾薑 續斷 石決明 菴蘭根

龍膽各三分 細辛二分 大黃半 甘草一分

右治下篩傳瘡上日四五度古今錄驗無雄黃有硫

黃外臺秘要無甘草有生菜一方無雄黃有石中黃

子

治蜉疽癩穿潰出膿水不止出方

雄黃一分 白礬一分 龍膽三分 細辛半 川大黃

地膽半兩 石決明一分 續斷一分 菴蘭

根一分

右為細末以傳患上日四五度用之

犀角散出方 治蜉疽癩發於頸腋大如兩指結硬四

肢寒熱

犀角屑一兩 木通一兩 赤芍藥一兩 柴胡一兩 桔

梗一兩半連翹一兩枳殼一兩半惡實一兩
去蘆頭
微黃去穢
炒
炒

甘草三分半
炙
微赤對

右咬咀每服四錢水一中盞煎取六分每於食前溫服之

犀角丸出聖惠方 治浮疽瘰

犀角屑一分小蛭一分甘草一分黑豆半合
炒
炒
微赤對
熟去皮

右為細末煉和如菘豆大每日空心以溫酒調下三九至三日小便內當下惡物此是病出盡即息止如

未至即不得住藥無不神効

瘰癧瘻 附論

夫瘰癧瘻者或因強力入水以坐濕地或因沐浴汗入頭中流在頭上之所生也始發之時在其頭頂恒有膿水使人寒熱其根在腎也

方

雄黃芍藥丸出千金方 治瘰癧漏始於頸有根初苦痛令

人寒熱此得之因新沐濕結發汗流於頸所致其根

在腎雄黃主之芍藥為之佐

雄黃 芍藥 茯苓 續斷 乾地黄 空青

礬石 乾薑 桔梗 蜀椒 相山 虎骨一作指

狸肉 烏腦 班貓各一分 附子一分

右為末蜜丸大豆大酒服十九日二忌猪肉冷水生

葱蕪荑生菜生血物及酢物

露蜂房丸出方聖 治療癰瘻發於頸項腋多頭作孔常

出膿水

露蜂房一兩 續斷一兩 礬石一兩 泥裏 犀角屑半兩 空青

半兩 雄黃一分 桔梗半兩 去 狸頭一枚 燒 麝香

一分 川大黃一兩 劉 班貓一兩 為度去頭足翅

右為細末令勻煉蜜和搗二三百杵丸如菘豆大每

於食前以粥飲下十九

蜥蜴丸出方聖 治療癰瘻

蜥蜴一枚 芫青五十枚 去頭足翅以麝香一分 犀

角屑三分 班貓二十枚 去頭足翅以地膽三十枚 去

米拌炒米 黑豆黃 三分 甘草 三分 微赤剉

右為細末以粟米飯和丸如棗豆大每日空心以酒
下一丸一百日効

又方 出聖方 治療癰腫破成瘻宜用此方

麝香 一分 胡粉 一分 黃丹 一分 微炒

右件藥都研令勻取煖漿水淨洗瘡用軟帛拭乾以
蜜調攤於故帛上貼日二換之

蛇床子膏 出聖方 治療癰瘻作數孔

蛇床子 三兩 黃蠟 二兩 亂髮灰 半兩 大麻油 四兩

右以文火養油煎蛇床子十數沸濾去滓次下髮灰
并蠟熬成膏旋取貼於帛上貼之

治療癰成瘻 出聖方

砒霜 半兩 粉霜 半兩

右為細末麵和丸如大豆大安在癰子頭著麵糊紙
條子封住候癰子出便以生肌膏貼之

治療癰瘻橫潤作頭狀若杏仁形一方作瘰癧方 出千金方

用雄鷄屎燒灰臘月猪脂和傅之

菘若子方

出聖
惠方

治療癰瘻

用以菘若子三兩淘去浮者炒熟用醇醋一升浸一宿曝乾再入酒漬一宿又曝乾重以酒半升淨洗又晒乾每日空心取三指撮以井華水下服之服後食三五匙飯壓之十日差

楸葉煎

出聖
惠方

治療癰瘻瘡神方

用秋分前後平旦令人持囊袋於枝上摘葉內袋中

秤取十五斤水一石淨釜中煎取三斗又別換鍋煎取七升再換鍋煎取二升即成煎內不漏器中凡患者先麻油半合蠟一分酥一粟許同消如面脂又取杏仁七粒生薑少許同研令細米粉二錢同入膏中攪令勻先塗瘡上經二日來乃拭却即以篋子勻塗楸葉煎滿瘡上仍用軟帛裹却二日一度拭却更上新楸葉煎不過五六上已作頭便生肌平復未穴者即內消瘡後須將理半年以來採葉及煎合時禁孝

子婦人僧人鷄犬見之

療鼠漏瘰癧身熱方

用臘月猪膏正月鼠頭燒令作灰以膏和傅之愈若不瘥者瘰癧右炙右肩頭三指度以下炙炷皆如鷄子大良若不能堪者即炙如黄豆大亦可已試有良

驗

白花蛇散

出包氏方

治九漏瘰癧生項腋之間寒熱作或不痛

白花蛇

酒浸去皮骨焙乾二兩

生犀角

半錢青皮兩半

右為末每服二錢膩粉半錢研勻五更糯米飲下已時下惡物一日再一服忌食發風熱物已成瘡一月効後用黃芪散補之

海藻

洗

石決明

煨

羌活

瞿麥

右各等分為末米飲下二錢日三

治療癰痔瘻瘡

出本草單方

以蟾蜍糞油調傅之

治瘰癧根結核瘰癧毒腫 出本草單方

以射干塗肉四畔漸漸近瘡習習逐病至骨瘡若有熟膿及黃水出者塗之若無膿水有生肉及傷肉破即不可塗塗即殺人

治瘰癧鼠瘻 出本草單方

右以夏枯草初生嫩時採之須浸洗淘去苦水作菜食之

治瘰癧瘰瘡及風頑疥癬 出本草單方

以鼈甲炙燒酒浸服之

治癰瘡腫瘰繫結等 出本草單方

以山慈菘根醋磨傅之

治瘰癧成瘻孔者 出本草單方

右取露蜂房二枚炙末臘月猪脂和塗孔上瘰

治瘰癧五痔瘰癧瘤瘡根惡腫 出本草單方

右以石黃空青桂心並四兩乾薑一兩為末鐵片濶五寸燒赤以藥置鐵上用甕碗以猪脂塗碗底藥飛

上得冷即可如此五度隨瘡孔大小以藥如兒尿內孔中麵封之三度根出也無孔者鐵皮內之

轉脉癭 附論

夫轉脉癭者因飲酒大醉夜卧不安多驚欲嘔轉側失枕之所生也始發之時在其頸項脉轉身如振使人寒其根在于小腸也

方

班貓白芷丸 出千金方 治轉脉漏始發於頸濯濯脉轉苦

驚惕身振寒熱此得之因驚卧失枕其根在小腸班貓主之白芷為之佐

班貓 去頭翅足以糯米拌炒米黃為度 白芷 綠青 大黃 各三兩

升麻 鍾乳 甘草 防風 地膽 去頭足翅糯米拌炒米黃

為續斷度 麝香 礬石 各一兩 人參 當歸 桂心

各二兩 白朮 麥門冬 各一兩

右為末蜜九大豆大酒服十九日三勿食菜慎房室百日外臺秘要無大黃桂心麥門冬白朮鍾乳

班貓丸 出聖惠方

治轉脉癩發於頭腫痛寒熱出膿水

班貓

一分以糯米拌炒米黃為度去頭足翅

人參

三分去蘆頭

地膽

一分糯米

拌炒黃去頭足翅

當歸

三兩 川升麻

三分 麥門冬

去心一分焙

白朮

三分 川大黃

三分 鍾乳粉

三分 桂心

三分 甘草

一分炙防

防

半兩 風去蘆續斷

三分 麝香

一分 白礬

一兩燒令汗盡

右為細末後入研了藥令勻煉蜜搗三二百杵丸如

梧桐子大每服以酒下十九日三服

連翹散

一名連翹丸 出聖惠方

治轉脉癩發於頸項寒熱有膿

方見本門癩瘡寒熱類

漏蘆膏

一名五白膏 出聖惠方

治轉脉癩

方見本門鼠癩類

風癩 附論

夫風癩者因風邪結聚所成或得諸風不即差變而作

癩也其得風者是因瘡遇冷膿汁不盡乃成也其風在

經脉者初生之時其狀如腫有似覆手搔之則皮脫赤

汁出乍腫乍減漸漸生根結實附著骨間不知首尾後

潰成癩若至五十日不消不潰變成石腫名為石癰久

則不治令人寒熱惡氣入腹絕悶刺心及咽項皆腫不
早治即死也

方

神効班貓丸

出聖方

治風癩赤腫出膿汁不止

班貓

一分去頭足翅以糯米拌炒米黃為度

連翹

三分

玄參

三分

烏蛇

三分

去皮骨浸酒中一宿炙令黃

漏蘆

三分

荏子

三分

空青

三分燒過細研

川大

黃

一兩對微炒

牛蒡子

一兩半微炒

黑豆

黃一分

右為細末入空青研令勻煉蜜和搗三百杵丸如

菘豆大每日空心及晚夜卧時以温酒下五丸漸加

至十九

露蜂房膏

出聖方

治風癩消腫化膿

方見本門諸毒類

槲皮散

出聖方

治風癩出赤水腫痛

槲皮

一分

玄參

一分

蟬殼

五枚

苦參

一分

班貓

二十枚去頭翅

足糯米拌炒米黃為度

白殭蚕

四十九枚微炒

右為細末每日空心以鹽茶調下二錢良久以鹽茶

投之小便內當下惡物

赤小豆散 治風癩結腫常出惡膿水 方見本門 諸毒類

松脂煎 治風癩 方見本門 諸毒類

蜂窠膏 治風癩結腫常出惡腫水 方見本門 諸癩類

蟻癩 附論

夫蟻癩者由飲食有蟻精氣毒入五臟流出結脉多著頸項澱生瘡微腫核細而乃遍于身體也

方

鮫鯉甲散 治蟻癩

鮫鯉甲 二兩炙 令黃色 礬石 一兩泥裹 燒半日 赤足蜈蚣 二枚炙 令黃色

雄雞膊黃皮 一具 炙乾

右為末以三年好醋傳于瘡上

治蟻癩

雄黃 雌黃 各等分

右件藥研細傳瘡上

死蛇鼠膏 治蟻癩鼠癩

用死蛇腹中鼠取臘月猪脂煎候焦去滓傳之一方

用死鼠燒灰為末傅瘡亦可

又方

用大鯊鮓燒耕垡土令赤以苦酒浸垡土時合壁土故熱以鯊鮓著土上展轉令熱傅瘡上

鮫鯉甲膏 治蟻瘻

用鮫鯉甲二大枚燒末以猪膏和傅瘡上鯉魚鱸魚亦可用之

又方

用半夏一枚搗末鴨脂和傅瘡上一方無鴨脂以水調傅之

又方

用雄鷄糞燒為灰細研傅瘡日三度用之

鯢鱓塗傅方 治蟻瘻

用鯢鱓燒灰研細以醋調如糊塗傅瘡上日三度立即瘥

又方

用螻蛄以酒研細塗傳瘡上日三五度即差
除蟻瘻

用水蘇按碎傳之

治蟻瘻孔容針亦有三四孔者方

用蝟皮蝟肝蝟心燒灰為末酒服一錢一方炙黃為末服之

治蟻瘻惡瘡

右取黃褐候鳥五味淹炙食之
鶯形如鳩綠褐色聲如小兒吹竽

冷瘻 附論

夫冷瘻者亦是因心得風冷久不差因成瘻膿汁不絕故為冷瘻

方

生肌丁香膏 治冷瘻瘡及癩癧瘻疼痛

丁香 三分 沒藥 三分 安息香 三分 麝香 一分 當歸 三分 乳香

三分 附子 三分 白芷 三分 桂心 三分 雄雀糞 四分 燕

薏仁 二分 黃丹 三分 麻油 一斤

右件藥都細剉入油以慢火煎候白芷黃焦色去滓入黃丹更微煎攪勿住手膏成収于不津器中頻取貼之一方無安息香白芷

丹砂膏 治冷瘰及諸瘰瘡

丹砂三分細研 川大黃一兩 雄黃二兩細研 苦參一兩 黃連一兩去鬚

莽草三分 蔞茹一兩 礬石三兩細研 雌黃三分細研

右件藥剉入臘月猪脂一升二合以慢火煎大黃等藥候焦絞去滓入丹砂雄黃礬石雌黃末更煎攪勻

入甕盒盛取旋貼

雄黃膏 治積年冷瘰黃水不止

雄黃一分 硫黃一分 頭髮各一分 黃蠟各半兩

右用麻油二兩煎熬頭髮鎔盡去滓次入雄黃硫黃碎片黃蠟慢火上桑枝頻攪為膏攤生絹上貼貼藥先以赤耳草頭煎湯洗或露蜂房白芷煎湯常洗常貼

青黛散 治多年冷瘰瘡

青黛一分麝香一分荇若子一分蘭茹一分

右為末都研令勻用一捻內瘡孔中更以後用雄黃

膏貼之

治冷瘰及諸瘰瘡出聖方

蜚蠊三枚麝香一分松脂一兩乾蟾一枚

右為細末入蜜少許和捻作餅子先淨洗瘡上貼之以差為度

治冷瘰及膏疽瘡一切癬數年不差者出聖方

附子一分硫黃半分膩粉一分

右件藥都研勻以生油調塗之甚効

治冷瘰及諸瘰瘡出聖方

皂莢一兩荇蘆一兩

右件藥都燒為灰細研漸漸傳之

又方出聖方

硃砂一分砒黃一分

右件藥同研合細以糯米飯和丸如麻子大填入瘡

口內旬日便差

乳香九出仁齋直指方

治冷漏

白淨滴乳香分一牡蠣分半

右為細末雪糊糕九麻子大每服三十九道地川白

殭生用煎湯空心送下

久癩附論

夫久癩者是諸癩連滯經久不差或暫差後復發或移易三兩處更相應通故為久癩也

方

五方白膏出聖惠方

治積年癩瘡及一切惡瘡之急者

五方白分一亂髮 黃芩兩一 紫苑去苗 菘蓉子土

傲鈞棘針 乳香兩二 石鹽兩一 黃蠟兩二 麝香細兩

黃丹兩七 胡椒兩二 生麻油升一 松脂一兩 水銀一兩

許水研令星盡用

右件藥各搗研訖先將油入鐺中煉烟少出即下五方帛亂髮用活火煎髮帛消盡後下黃芩等四味良

久下粉脂乳香二味又攪良久下麝香黃蠟又熟攪
次下黃丹胡粉石鹽水銀又微用火急攪勿住手取
一碗冷水點著硬即收之每用攤於故帛上貼日二
三換之

截疔散 出瘡科
精要

治年深疔癩瘡

黃連 兩半

白欵

白芨

黃丹 各一兩

輕粉 一錢

龍腦

麝香

各半錢
別研

密陀僧

一兩

右為細末和勻乾摻或捻上以膏貼之

生肌散

出齊生
枚辟方

寒水石

劉

滑石

一兩

烏魚骨

龍骨

各一兩

定粉

密

陀僧

白礬灰

乾胭脂

各半兩

右為極細末乾摻用之

黃耆丸 治漏瘡連年不瘥出膿水不止

黃耆

劉

牡丹皮

各三分

犀角

鎊

甘草

炙劉各一兩

玄參

惡實

炒

木通

劉各一兩半

右為丸煉蜜和如梧桐子大每服二十九空心温酒

送下晚再服之

治久漏移易三數處皆生瘡孔者出聖方

烏蛇皮一兩半酒浸去微黃 蒺藜子三分 曲頭棘針兩半 馬齒

莧三分 頭髮燒兩 雄黃一分 緋帛燒兩

右件都搗研為末以酒調納瘡中看乾即更著以差

為度

平肌散出仁齊直指方 治漏瘡久不合露乾則用

老狗頭骨 露蜂房 生髮燒存性 新桑白皮分半

右為細末入麝香輕粉少許津唾調傅乾則更搽

露蜂房散出仁齊直指方 治年久漏瘡或暫瘥復發或移於

別處

多孔露蜂房灸三分 穿山甲灸 龍骨各五分

右末入麝香以臘月猪脂調傅

治久瘻移易三數處皆生瘡孔者出聖方

蝙蝠糞一兩半 白殭蠶兩半 雄蠶蛾兩半 乳頭香兩半 蜀茶

末兩半

右為細末傅瘡上以差為度

久漏方 出仁齊直指方

右用九孔蜂房炙黃為末臘月猪脂研傅候收汁以真龍骨降真香節細末入些乳香內瘡孔中

又捷効方 出危氏方

用信石新瓦上火煨過為末以津液潤紙探子蘸少許推入瘡孔中如瘡孔多不可齊上藥免使害人

烏藥膏 出聖濟總錄 治諸漏久不差

烏藥 二兩末 猪膽 三枚

右以膽汁和烏藥末令勻以薄綿裹內瘡口日三五度

神助散 出危氏方 治癩瘡十餘年不瘥

檳榔 黃連 去鬚

右為細末用活鱖魚一條擲于地候鱖魚盤屈以竹針五七枚貫之覆瘡良久取視當有白蟲數十如針著鱖上取去復覆之如此五六度即已用藥量多少

覆之一方傳藥明日以乾艾作湯三二錢洗不一月全愈蓋老人血氣冷必候艾力以佐陽而艾性亦能殺虫凡瘡一有虫喘動氣血亦隨之故瘡不可即合則結痛莫當實虫所為

治瘻瘡多年不差出於胷前或脇肋脚脛間者無不効

方出聖惠方

用江淮多年破船上泥縫脂灰不限多少搗羅為末以鷄子清和作團用炭火燒令通赤待冷准前團燒

之如此三徧即搗細羅末入麝香

蜂窠膏 治九瘻生九孔者方見本門蜂瘻類

又方出聖惠方

用梔子燒成灰細研以羊髓調塗之

治遠年漏瘡黍葉裹傳方

用黍葉亂搗裹傳瘡上日三度

又方

用括萎根搗羅為末塗傳瘡上日三五度

殭蠶塗傳方 治遠年漏瘡不瘥

用殭蠶炒搗為末塗傳瘡口以熟艾作炷灸之痒痛如惡腫出後清血出便用蠶末塞瘡內以帛裹定

三奇散 出衛生家保 治漏瘡久不生肌臭爛不止

麒麟竭 黃連 白礬 各半兩

右為末傳於瘡上用膏藥寬貼之

蜚蠊丸 出衛生家保 治惡漏瘡經久不瘥惡肉內潰

蜚蠊蟲 自死者一分燒灰 巴豆 一錢去殼燒灰微存性

右碾細以津丸如麻子大內一九入漏瘡孔內

治漏瘡孔成了膿水淋漓經時不差用之立驗 出衛生家寶

降真香 三兩 雄黃 一兩有墻壁者研水飛過 躑躅花 半兩 麝香 少許別研

右為末用紙撚子蘸上藥絃瘡竅中痛即止

治漏腮膿水淋漓不止 出衛生家寶

右用猪蹄殼用鹽泥固濟燒為灰末以麻油輕粉調

塗瘡口三兩上即瘥

普濟方卷二百九十三

欽定四庫全書

普濟方卷二百九十四

明周王朱橚撰

瘰癧門

總論

夫瘰癧者多由喜怒不節憂思過度而成斯病馬大抵人之氣血循環常欲無滯留之患調攝失宜氣凝血滯為瘰為癧為瘰者多結於頸項之間癧者隨氣凝結於

皮肉之內忽然腫起狀如桃李子久則滋長醫經所謂瘰有五種瘡有六證五瘰者石瘰肉瘰筋瘰血瘰氣瘰是也六瘡者骨瘡脂瘡血瘡石瘡膿瘡肉瘡也法治瘰之五瘰不可決破決破則膿血崩潰多致夭枉六瘡者脂瘡可破去脂粉則愈外五瘡亦不可輕易決潰慎之

諸瘰瘡

附論

夫氣血凝滯結為瘰瘡瘰則憂患所生着於肩項皮寬不急槌槌而垂是也瘡則隨氣瘡住初作桃李之狀皮

嫩而光漸如盃卵是也其肉色不變者謂之肉瘰其筋脉呈露者謂之筋瘰其赤脉交絡者謂之血瘰隨憂患而消長者謂之氣瘰堅硬而不可移者謂之石瘰瘰之名有五者此也一曰骨瘡二曰脂瘡三曰肉瘡四曰膿瘡五曰血瘡六曰石瘰瘡之種有六者此也瘰瘡一者雖無痛養最不可決破決破則膿血崩潰滲漏無已必至殺人其間肉瘡攻療尤所不許若夫脂瘡氣瘰隨順用藥尚庶幾焉

方

海藻丸

海藻洗晒 海蛤煨

松蘿各七錢半

當歸

川芎

官桂

白芷

細辛

霍香

白欬

明礬煨

昆布

洗晒各五錢

右為細末煉蜜丸彈子大每一丸含咽下

穿癭丸

治癭瘤結硬

通草

二兩

杏仁

去皮尖研

牛蒡

各一兩出油

五射干

昆布

去鹹

呵黎勒

海藻

去鹹各四兩

右為末煉蜜為丸如彈子大噉化嚥津下日進三服

海藻散

治癭瘤

海藻

洗去鹹焙各一兩

昆布

洗去鹹焙一兩半

白茯苓

去黑皮半兩

海

蛤

研

木通

剉

桂

去粗皮半兩

羊廩

十枚去脂炙令黃

右為散非時溫酒下三錢 夜一服

治癭瘤方

昆布

洗去鹹焙二兩

桂心

逆流水根柳髮

海藻

各一兩

海

去

鹹 各二兩
乾薑 炮製
羊麀 七枚 陰乾

右為末蜜丸小彈子大含一九咽津無時忌五辛濕麵熟物

海蛤散 治癭瘤

海蛤 研 海藻 馬苔者洗 去鹹焙 白茯苓 去黑皮 人參 半夏

火煮一兩洗去 滑切焙各半兩

右為散每服一錢再入豬廩子末錢半甜藤一尺去根五寸取之甘草一寸水五盞同煎取一盞半分三

次每次調散二盞至臨卧服男人四服女人八服次用丸藥宣下

除毒丸 治癭瘤服海蛤散後宜服此

巴豆 針串穿燈上 燒了去心 大黃末 各半兩

右研端午日粽子丸如菘豆大空心冷茶下三九良久熱茶投之下多以冷水止之

連殼丸 治氣瘤或癭

連殼 微炒 石榴皮 醋 乾薑 炮各三分 枳殼 微炒去穢一兩

右為末更入百草霜一兩射香少許各細研打醋麵糊為丸如小豆大每日空心用胡椒米飲湯下三十丸至五十丸

豬廩散 治氣瘤瘰

豬廩二十七枚半夏洗去滑二枚

右為散每服溫酒調一錢 臨卧垂頭服

海藻酒方 治頸下卒結核漸大欲成瘤瘰

用海藻洗去鹹一斤酒二升漬一宿取三合飲之酒

盡將海藻曝乾搗末酒調一錢乙日三即差如浸用絹袋盛子漬春夏二日秋冬三日

柳根酒 治瘤瘰

用柳根三斤須水所經露出者水一斗煮取五升用米三升釀之酒成每服飲半升空心日午臨卧各一服

治瘰癧鬼氣症

用鉛錫為末和清香油傅之

瘰附論

瘰者由憂愁氣結所生亦由飲沙水沙隨氣入於脉搏
 頸下而成之初作與瘰核相似而當頸下也皮寬不急
 垂植槎然是也 氣結成瘰者但垂核脰然無脉也
 飲沙水成瘰者有核瀰瀰然無根浮動在皮中又云有
 三種瘰有血瘰可破也息肉瘰可割之有氣瘰可具針
 之養生方云諸山水黑土中出泉流者不可久居常食
 令人作瘰病動氣增患瘰病者始作與瘰核相似其瘰
 病喜當頸下當中央不偏兩邊也乃不急脰然則是瘰

也中國人息氣結瘰者但垂脰然無核也長安及襄陽
 蠻人其飲沙水喜瘰有核瘰瘰耳無根浮動在皮中其
 地婦人患之腎氣實沙石性合於腎則令腎實故病瘰
 也地方婦人飲沙水者產乳其於難非針不出是以此
 家有不救者良由此也凡瘰袋脹悶養生論云兩山夾
 山其人多瘰瘡土厚水深其人多瘰地勢使然也此可

服人參化瘰丹自消瘰藥多用海藻海帶味屬鹹寒

事親書云新寡一婦人年四十余有瘰三瓣戴人以鹹
 令吐三涌三汗三下瘰也半消次服化瘰之藥遂大消

去夫病在工者皆宜吐
亦自有消息之法耳

治瘰 名化瘰丹

海藻 海帶 昆布 澤瀉 木通 豬廩 牡羊

廩 各三枚 海蛤 連翹

右為細末研廩為丸如鷄頭子大每服一丸臨卧噙
化一方無木通

療瘰

昆布 六分 海藻 七分 松蘿 乾薑 桂心 各四分 通

草 五分

右搗篩蜜為丸如梧桐子大每服吞七丸即住在頸
下瘰處欲至食時即先飲少酒下却丸子然後食禁
酢蒜鹽醋臭肉倉米若瘰大者加藥令取差

又方 療頸下卒結囊欲成瘰

昆布 洗 海藻 洗各一斤

右細切好酒五斤浸七日量力取數服酒更浸兩遍
藥力盡當以此酒下藥彌良一方為末密合丸如杏

核大含稍咽汁日四五度住

木通散 治頸下卒生結囊欲成瘰

木通

到 海藻

昆布

松蘿 桂心

蛤蚧

塗酥炙
令微黃

白斂

琥珀

各洗去
鹹味

右為末散每服不時計候以溫酒調下二錢

海藻散 療瘰

海藻

八兩洗
去鹹味

貝母

二兩

土瓜根

二分

小麥麩

二分
炙

右作散酒服方佳一日三服

昆布丸 治一切瘰病不問久新

昆布

洗一兩

海藻

洗一兩

小麥

好醋煮
乾一兩

右為細末煉蜜為丸如杏核大每服一丸食前噲嚙

治瘰項

蒲黃

三兩如無用
寒食代之

猪廔

羊廔

各五兩去
脂膜焙乾

右為細末用錫糖為丸如彈子大噲化

療瘰方

昆布

洗

松蘿

各三分

海藻

洗五

右搗蜜丸如杏核大含咽津日三夜二住
治忽生瘰癧一二年者

用萬州黃藥子三斤須緊重者為上如輕虛即是他
州者力漫須用一焙取無灰酒一斗投藥其中固濟
瓶口以糠火燒一服時停月待酒冷即令患者時時
飲一盞不令絕酒氣經三五日後常把鏡自照覺銷
即停飲不爾便令人頸細也糠火將不可多堆燒酒
氣香出瓶頭有津即止火不可待經宿也已驗如神

忌毒食

療瘰癧方

用淳苦酒一升漬小麥一升含溫漚出曝燥後不須
使苦酒浸曝麥燥搏篩以海藻五兩別搗以和麥末
令調酒服方七每日三禁葷生魚生菜生肉

入方

用秣米三升依酒法飲取圓葉白楊皮十兩去土蒼
者捐勿令見風細切五升煮取二升濃汁漬麩末五

兩用前件秫末依酒法釀之熟訖封塞一七日後空心腹脹一大盞日再服三日即効

又方

用小麥三升三年米醋三升漬麥暴乾更浸使醋盡又暴乾搗節為散別搗昆布為散每服取麥散二錢昆布散一錢但飽食訖清酒和服之若不能飲酒者以水和服亦得服盡即或多服彌善無所禁但不用舉重及悲啼煩惱等事

救急療癰方

用鼠粘草根大一升湯洗細切除皮者一升以水三升煮取一升半分溫三服服相去如人行四五里一服宜頓服六劑病即差又一方削皮細切取三大升搗篩為散密和丸如梧桐子大一服一十九日再服之稍稍加至三十九以無灰酒進之

治癰

以杜蘅食之

五癭 附論

石癭泥癭勞癭憂癭氣癭是為五癭石與泥則因山水
 飲食而得之憂勞氣則本於情情之所感氣則隨之或
 上而不下或結而不散是也破結散下治五癭堅便不
 可移名石癭皮色不變名肉癭筋絡露結名筋癭筋脈
 交絡名血癭隨憂愁消長名氣癭五癭皆不可妄決破
 決破則膿血崩潰多致敗枉服此
 五癭丸

葛蒲二 海蛤二 白斂 續斷 海藻 松蘿 官

桂心 蜀椒 倒掛草 半夏各二 神麴三 羊廐

百枚

右治下節以牛羊髓脂為丸如梧桐子大日服三九
 一方以醬浸牛羊髓脂為丸

破結散 治五癭等證

海藻洗 龍膽草 海蛤 通草 昆布洗 礬石

松蘿各三 麥麴四 半夏 海帶各三

右為末每服方寸溫酒調日三服忌猪鷄魚豆辛生
蒙及諸毒物十日知二十日愈一方有貝母無海帶

海藻散 治五癭

海藻

洗去鹹焙

海蛤

各三兩

昆布

洗去鹹

半夏

湯洗七遍去滑

土瓜根

松蘿

各一兩

木通

剉

白斂

龍膽

各二兩

右為細末每服一錢溫酒調服日再不得作勞用力

昆布散 治五癭

昆布

洗去鹹焙三兩

白斂

木通

剉

海蛤

研

松蘿

各三兩

桂

去粗皮

海藻

洗去鹹焙

各三兩

右為細末每服溫酒調下二錢每日二服不拘時候

禁生冷醋滑鷄猪肉魚蒜

玉壺散 治三種癭

海藻

去鹹味焙

海帶

去鹹味焙

昆布

去鹹味焙

雷丸

各一兩

青鹽

廣茂

各五錢

右為細末陳米飯為丸如榛子大每服一丸含化嚥
津不拘時候常令藥力不斷煉蜜和丸亦可一方無

青鹽廣茂

又方

小麥麵一斗海藻一升時生礬石一十兩

右以三年米醋浸小麥麵曝乾各搗為散合和服一方可日四五服含極乃因之禁薑五辛猪魚生菜忌吹及讀誦耳語等

又方

取鹿廬以佳酒浸令沒汁炙乾內酒中更炙令香含

咽汁味盡更易盡十具愈

治五癭

右以昆布一兩並切如脂大酢漬含嚙汁愈

氣癭附論

夫癭之初結者由人憂志氣逆蘊蓄之所成也又飲沙石流水毒氣不散之所致也皆是肺脾壅滯膈舌嚙不得宜通邪氣搏咽頸故令漸漸結聚成癭宜早療之便當消散也

白前湯 治氣癭初作

白前 洗去鹹 昆布 洗去鹹 厚樸 去粗皮生薑汁炙 杏仁 湯津去皮尖雙

仁 陳橘皮 湯浸去白切乾 附子 炮裂去皮濟 海藻 洗去鹹 半夏

湯洗七遍 甘草 炙判各 小麥 醋浸一宿暴乾三合

右判如麻豆每服三錢用水一盞半生薑一棗大拍

碎煎至分去滓食後溫服日三

杏仁丸 治氣結頸項蓄聚不散成癭

杏仁 去皮尖雙仁炒令黃 連殼 名一 海藻 洗去鹹焙 訶黎勒

煨去核 昆布 洗去鹹焙 木香 各二兩 蔓荊實 搽去皮 羊躑 各

一兩 欖柳 剉 陳橘皮 去白焙

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九空心米飲

下仍常含化一丸

因氣成癭

海藻 海帶 昆布 木通 甘草 各一兩 訶子

薄荷 各半兩 杏仁 雙仁

右為細末煉蜜為丸如鷄頭大嚼化忌油膩鹹物

白前湯 治氣癭初作

白前 昆布

洗去鹹 炙乾

厚樸

去粗皮生薑汁炙

杏仁

湯津去皮炙雙

仁炒 陳橘皮

湯浸去白切乾

附子

炮裂去皮濟

海藻

洗去鹹炙乾

半夏

湯洗七遍

甘草

炙判各一兩

小麥

醋浸一宿暴乾三合

右判如麻豆每服三錢用水一盞半生薑一棗大拍

碎煎至分去滓食後溫服日三

杏仁丸 治氣結頸項蓄聚不散成癭

杏仁

去皮尖雙仁炒令黃

連殼

名一兩

海藻

洗去鹹焙一兩一分

訶黎勒

煨去核

昆布

洗去鹹焙

木香

各二兩

蔓荊實

搽去皮

羊靨

各

一兩 櫝柳

判 陳橘皮

去白焙各半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九空心米飲

下仍常含化一丸

因氣成癭

海藻

海帶

昆布

木通

甘草

各一兩

訶子

薄荷

各半兩

杏仁

雙仁浸煎

右為細末煉蜜為丸如鷄頭大嚼化忌油膩鹹物

必効主氣癭方一名白頭翁丸兼治氣瘰

白頭翁半兩昆布十分海藻七分通草七分玄參連

殼子各八分桂心三分白斂六分

右擣篩密丸如梧桐子大每服五丸用酒服藥蒜麩

猪魚生葱

治氣結喉中蓄聚不散成癭

白茯苓去黑皮三兩半夏湯洗去滑生薑切焙各二兩昆布洗去鹹焙

海藻洗去鹹各五兩桂皮去粗皮陳橘皮去白焙各一兩

右為末煉蜜丸如杏仁大含一二粒細細嚥津令藥

不絕

紫蘇膏 治咽喉氣噎塞成氣癭

紫蘇子炒桂粗皮去皮大黃剉當歸切乾薑炮各半兩陳橘

皮湯浸去白蜀椒去目并閉口者猪脂臘月者煎去滓半斤

右咬咀如麻豆大先以水六升煎至二升綿濾過去

滓肉猪脂油煎成膏取塗癭工日二夜一以差為度

忌生葱

治氣瘕

問荆 一兩出 海島 錫羊廩 白斂 蜀椒 去目并閉口者

炒令出汗 甘草 炙各一分 小麥麴米 二兩熬

右為散羊廩一種別搗為末相和如好漿浸更搗作

丸如小棗大一服五丸無禁

昆布丸 治瘕氣初結喉中壅悶不治即漸腫大宜服

昆布 洗去鹹味 訶黎勒皮 各一兩 檳榔 一兩 松蘿 半兩 乾薑 半兩

炮 桂心 半兩 海藻 一兩洗去鹹味 木通 二兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每於食後以溫酒下

二十九

又方

昆布 一兩洗去鹹味 海藻 一兩洗去鹹味 訶黎勒皮 一兩 枳殼 半兩

去穢

右為末煉蜜和丸如杏核大常以含一丸嚥津

又方

琥珀 一兩 大黃 一兩微炒 昆布 半兩洗去鹹味

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每日空心及晚食後
溫酒下二十九又名琥珀丸

又方

檳榔

三兩洗
兩 去鹹味

昆布

三兩洗
去鹹味

右為末煉蜜和丸如小彈子大每日常含一九徐徐
嚥津一名檳榔丸忌鹽

治氣瘕

海藻

海帶

海螵蛸

右等分為細末酒煮空心服

治氣瘕

用海藻為末露一宿浸晨不須洗面旋汲井花水調
而東禮拜而東服每日如此服之至半月如已消滅
不可再服則差細矣

針砂方 專治氣瘕

用針砂浸於水缸平日飯食俱皆用此水十日一換
針砂服之半年自然消散針砂能不漬也

治氣瘰

用羊廩一具去脂生含汁盡去

療氣瘰方

用平旦手挽瘰令難項插其下眼脉斷愈一日一度
插易愈者七日難愈者三七日

礬蝎散 治項氣又名瘰氣

白礬

一兩生
令細

全蝎

兩半

右將礬為末用耳鍋一箇將蝎用麻黃包子線扎定

將礬分作兩處一半在底一半在上全蝎在中心用
瓦片子蓋定再用鹽泥固濟候乾用熱火二斤煨一
將取出為細末每服一錢入麝香少許將雄猪奄一
箇切入藥內用濕紙包五七重火煨熟取出臨卧細
嚼只將津液送下

海帶丸 治瘰氣久而不消

海帶 南貝母 青皮 陳皮

右各等分為細末煉蜜和丸如彈子大食後嚥化一九

海藻漬堅丸 治瘰氣盛大久而不散

海藻 海帶 昆布 各一兩 青鹽 半兩 廣茂 半兩

右為細末煉蜜為丸如指尖大每服一丸噙化食服

治一切瘰已結成將潰或未潰時欲結已潰欲未潰

右用皂角刺四兩牽牛子四兩洗淨掃濶塼石上補

定皂角刺搯牽牛子在上焰火燒之成火速以盆枕

合之候冷勿使成灰為末每服一錢半或二錢飯飲

調下

瘰病咽喉噎塞 附論

夫瘰病咽喉噎塞者由憂愁之氣在於胃膈不能消散
搏於肺脾之故咽門者胃氣之道路喉嚨者肺氣之往
來今二經為邪氣所乘致經絡否滯氣不宣通結聚成
瘰在於咽喉下抑鬱滯留則為之出納者噎塞而不通
病瘰者以是為急也

半夏散 治瘰氣咽喉腫塞心胃煩悶

半夏 湯洗七遍去滑 射干 牛蒡子 微炒各一兩 杏仁 湯浸去皮尖雙

仁 炒 羚羊角屑 木通 剉 桔梗 去芦 昆布 檳

柳 赤茯苓 各三分 枳殼 半兩 微黃去穢 甘草 半兩 炙

右為散每服四錢以水一中盞入生姜半分煎至六

分去滓不計時候溫服

桂心散 治瘰氣咽喉腫塞

桂 去粗 昆布 海藻 洗去鹹味 甘草 炙 白麩 炙 龍膽

海蛤 洗去鹹味 土瓜根 半夏 為末生薑汁和 吳茱

黃 洗湯去涎焙炒 牡蠣 燒各一兩半

右為散每服二錢用酸漿水調下食後臨臥

治瘰氣咽喉腫塞防悶宜服此方

木通 一兩 剉 昆布 一兩 洗去鹹味 乾薑 一分 炮 射干 三分 甜葶

藜 一兩 隔紙炒令紫也 羚羊角屑 三分 人參 半兩 去芦頭 海藻 半兩 洗去

鹹 檳榔 三分

右為末煉蜜和丸如梧桐子大不計時候以溫酒下

二十九

治瘰氣咽喉胸中滿悶腫塞

昆布 三兩 大黃 一兩 木通 一兩 海藻 一兩 射干 一兩 枳殼 半兩

杏仁 二兩 湯浸 去皮尖 牛蒡子 二兩 海蛤 一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以粥飲湯下二十九

昆布散 治瘰氣結腫胃膈不利宜服

昆布 洗去鹹味 海藻 洗去鹹味 松蘿 細辛 半夏 洗七遍去滑

海蛤 細研 甘草 炙微赤 白斂 各一兩 龍膽 去芦 土瓜根

檳榔 各一兩

右為散每於食後以温酒調下二錢不得用力勞動

療瘰結氣方

昆布 十二分 馬尾海藻 十分 杏仁 去皮尖 通草 麥

門冬 去心 連翹 六分 乾薑 陳橘皮 各六分 茯苓 八分 松蘿

三兩

右蜜丸含之齒微微嚼藥袋子汁出入咽中日夜勿停看有間則加四分自忌嗔及勞油膩粘食

二廩散 一名實 治瘰氣

豬羊廐各十枚煨水洗去脂膜切炒海藻洗去鹹炙乾海帶各一兩丁

香木香 琥珀 麝香研各一兩真珠半分研

右為散每服一錢用熟酒一盞調下垂頭臥少伸若
是去室男女不十服見効男子婦人患者百日見効
婦人有孕不可服

治癭腫結漸大宜服此方

海藻洗去鹹味海帶 海蛤細研昆布 木香已上一兩金

薄五十斤細研猪廐七枚炙乾羊廐七枚炙乾

右為末每夜臨臥時以溫酒調下二錢仍不得着枕
臥如不得法癭即難治

訶黎勒丸 治年老癭氣噎塞

訶黎炒去核檳榔 海藻洗去鹹焙乾薑炮白茯苓

去黑皮龍膽 桂去料皮昆布洗去鹹焙

右為末煉蜜和丸如紅棗大每服一丸含化不拘時

海藻丸 治咽喉中噎悶成癭

海藻洗去鹹炙乾檳榔剉昆布洗去鹹炙乾訶黎勒皮 文

蛤研各三兩 海蛤研 半夏湯洗七遍 生薑切焙各一兩 小麥朱醋浸三

宿暴乾
三合

右為末煉蜜和丸如彈子大每服一九含化日三

通氣丸 治瘰氣咽喉腫塞毒氣壅悶不通

木通剉 射干 杏仁湯浸去皮尖雙人炒 訶黎勒煨去核 海藻

洗去鹹焙 黃耆各一兩 白茯苓去黑皮三兩 惡實微炒 昆布洗去鹹焙

右為末煉蜜和丸如彈子大每服一九含化日三

治瘰氣胃膈壅塞咽喉漸寤宜服此方

高陸二兩 昆布二兩洗去鹹味 射干一兩 木通一兩 海藻一兩

羚羊角屑一兩 杏仁雙 炒微黃 牛蒡子一兩

右為散每服三錢水一盞入生薑半分煎至六分去

滓不計時候溫服

羊靨丸 治咽喉不利項頸漸寤將成瘰病

羊靨二十枚 炙黃切 人參一兩 木通剉一兩 海蛤研 昆布去

炙乾
三兩

右為末蜜煉和丸如桐子大每服十五丸至二十九

米飲下再服

昆布丸 治咽喉塞冷氣上築搏防悶漸成癭氣

昆布 去鹹 炙乾 杏仁 去皮尖雙 炒研 犀角 鎊 人參 二兩 半 吳茱

萸 洗焙 乾炒 海藻 去鹹 炙乾 各二兩 乾薑 炮 葶藶子 紙上炒 各一兩

右為末煉蜜和丸如桐子大每服二十九米飲下日

三次

連翹丸 治癭病咽喉噎氣塞

連翹 木通 剉 乾薑 炮各 一兩 羊廬 尖七 枚 昆布 去鹹 焙 一兩

杏仁 去皮尖雙 人 炒一十七枚 車前子 微炒 一兩 半夏 為末生薑汁 和作餅子暴

乾一兩

右為散每服二錢用米飲調下日三服食後臨臥

治癭氣咽喉腫塞宜服此方

松蘿 一兩 昆布 二兩 洗 去鹹味 海藻 二兩 洗 去鹹味 羚羊角屑 一兩 木

通 剉 一兩 柳根髮 一兩 檳榔 一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時二十九

粥飲下

茯苓湯

白茯苓去黑枝 人參各一兩 海藻洗去鹹味 海蛤洗去鹹味 甘草炙

蒼朮子各一兩 半夏為末 生薑汁和作餅子曝乾一兩

右為麤擣篩每服三錢用水一盞煎至七分去滓溫

服

治瘰氣咽喉腫塞煩悶

半夏湯洗七遍去滓 海藻洗去鹹味 龍膽去淨頭 昆布洗去鹹味 土瓜

根 射干 小麥麵各三分

右為散每服不計時候生薑酒調下一錢

治瘰氣神驗方

琥珀半兩 昆布一兩洗去鹹 小麥三分酒煮熟晒乾 烏賊骨二兩 桔

梗半兩去芦

右為末煉蜜丸如小彈子大綿裹一丸常含燕津

治瘰氣結腫心胃不利煩滿宜服此方

海藻一兩洗去鹹 昆布一兩洗去鹹 木通一兩洗 連翹一兩 麥門冬

一兩半 杏仁二兩湯浸去皮炙 赤苓一兩 人參半兩去心焙

頭陳橘皮半兩去浸牛蒡子一兩羊廩二十枚

右為末煉蜜和丸如小彈子大綿裹一九含燕津日

三四服

蛤蚧丸 治瘰氣腫塞

蛤蚧全者酒炙一對真珠末 海藻洗去鹹焙各一分

右為末棗肉為丸如桐子大每服二十九木通湯下

麥門冬 治瘰腫悶

麥門冬去心焙昆布洗去鹹焙各三分黃耆焙大黃剉一蒸陳

橘皮湯浸去白焙杏仁湯浸去皮雙炒甘草炙剉各一兩

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一九含化

治瘰氣胃隔壅塞咽喉漸竅宜服

羊廩一百枚洗去脂炙棗二十枚去皮核

右同杵作丸梧桐子大每服水下七丸

治瘰氣令內消方

用黃牛食絲三具乾者於次丸瓶中以瓦子蓋頭鹽泥固齊候乾燒令通赤待冷取出細研為散每於食

後以粥飯調下一錢

海藻酒方 治咽喉噎塞冷氣妨悶結成瘰氣

用海藻洗去鹹二兩細剉以清酒四升浸兩宿後去滓每服半盞細細含燕日三不拘時以差為度

治瘰氣結核癰腫硬

用昆布一兩洗去鹹搗為末每以一錢綿囊於錯中浸一宿以津含燕藥未盡再含之一方蜜為丸含化自消

治瘰氣結硬腫大諸藥無効服之百日必得痊差方

黃牛食絲

五具以猛炭灰火燭為灰研為末於瓷瓶內枚密蓋瓶口不得見風

海藻

昆布

五兩以上二味以清水漬五日旋換清水洗去鹹味暴乾

白薑

切五兩半微炒

右為末散入牛食絲末研令勻每服以溫酒調下二錢日三服以差為度

治瘰氣結腫方

昆布

洗去鹹味

馬芹子

兩半

茵芋

兩半

蕪荑仁

兩半

芥醬

兩

右為末以醋浸蒸餅和瓦如小彈子大以綿裹一丸

含化燕津日四五服以差為度

治瘰氣咽喉腫塞心胃煩悶

琥珀半兩 皂莢子仁微炒 牛蒡子半生用各一兩半

右為散每服食前以葱白湯調下二錢

通氣丸 治咽喉氣悶胃膈滿塞項頸漸麓

木通剉 海藻洗去鹹味炙乾 海蛤研各一兩 昆布洗去鹹味炙乾一兩 羊

厲二十枚炙黃切

右為末煉蜜和丸如彈子大每服一九含化忌生菜

熱麵炙肉蒜芽

羚羊角丸 治瘰氣胃悶壅塞咽喉漸麓宜服大服

羚羊角屑一兩 昆布一兩洗去鹹味 桂心一兩 大黃一兩剉木

通一兩剉

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服不計時以粥飲

下二十九

治瘰氣經久不消神効方

海帶一兩 海藻 昆布各一兩洗去鹹味

右為末煮赤小豆并棗肉同研為丸如小粟子大以
綿裹每月如大關

盡取二十八日夜小盡取二十七日至月終三夜臨
臥時淨灌漱含臥嚙津不語至明別日不得服

松蘿丸 治瘰氣結核癰瘡腫硬

松蘿 昆布 洗去鹹味 木通 剉 柳根鬚 逆水生者洗焙 乾以上各二兩

右為末煉蜜和搗三二杵丸如小彈子大常含一丸
細細嚙津令藥在喉中相接為妙

瘰 附論

瘰之為義留滯而不去也氣血流行不失其常則形體
和平無或餘贅及鬱結壅塞則乘虛投隙瘰所以生初
為小核浸以長大若盃盂然不痒不痛亦不繼強方劑

所治與治瘰法同但瘰有可鍼割而瘰慎不可破決爾

儒門事親書云戴人在西華泉皆訖以為吐罵一日魏
壽之與戴人在食肆中見一夫病一瘰正當日之上納
皆色如灰李下垂覆之日昨不能視拘戴人謂壽之日
吾不待食熟立取此瘰魏未之信也戴人曰吾與爾取
此瘰何如其人曰人皆不敢割戴人曰吾非用刀割別
有術焉其人從之乃引一小室中令晚卧一床以繩束

其疔刺委中人出血先令以手搗其自瘡止亦刺出
 瘡立平出戶毒之大驚戴人曰人之有奇技可盡觀乎
 郭戴人之類有一女子未嫁年十八兩手背皆有瘤一
 類雞距一類角九腕不能馴向明望之如挑膠然夫家
 破棄之戴人見之曰在手背為膠瘤在面者為粉瘤此
 膠瘤也以錐鍼十字刺破按出黃膠膿三兩匙立平按
 更不再作婚事復成非素明不敢用此法耳 外臺秘
 要肘後云皮肉中忽有腫起初如梅李漸長大不痒不
 痛又不堅強按之搗軟此血瘤也不瘵至如盤大則不
 可消而非殺人病耳亦慎不可破方乃有大瘵今如覺
 但依瘵家瘵瘵若
 不清更別有大方

陷腫散 治二三十年瘤及骨瘤肉瘤膿血瘤瘰內大

如盂孟久不差致有癰潰令人骨消肉盡或潰令人

驚惕寢寐不安身體瘰縮愈而後發

烏賊魚骨

半兩 燒灰

硫黃

半兩 細研

白石英

半兩

鍾乳

半兩

分丹參

三 分 琥珀末

二兩

附子

一兩 炮裂 去皮刺

乾薑

一兩 炮裂

大黃

一兩

川芒硝

二兩

右為散以囊盛勿泄氣如瘡濕即乾傳之若瘡乾以
 猪脂和傅之日三四以上工効為度若汗不盡者至五
 劑十劑止藥令之人不痛若不消加芒硝二兩一方

有紫石英

治癭腫悶宜服此

大黃 二兩 剉 鹹炒 昆布 一兩 洗 去鹹味 海藻 二兩 洗 去鹹味 玄參 一兩 枳

殼 一兩 微黃去穢 芍藥 一兩 杏仁 一兩 湯浸去皮尖 雙入參炒微黃 延胡

索 一兩 琥珀 一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服以水通湯下食

二十九

枯瘤方

砒 礞砂 黃丹 雄黃 粉霜 輕粉 以上各一分

班猫 二十箇 生用 朱砂 一錢 乳香 八分 沒藥

右同研為末粥糊為丸捏作瘡子樣曝乾先炙破瘤頂三炷然後以藥餅蓋上用闕末以水調貼立

數日自然乾而下落

餅金散 治枯瘤子

砒霜 一兩 砒黃脚 一兩 巴豆 半兩 去皮 木鼈子 一兩 去皮 研如泥

右同為細末入石腦油和一塊用紙二十四重象藥

磁合內盛入地二尺埋兩箇月取出陰乾後入

輕粉一錢 雄黃半錢 粉霜二兩 乳香一錢 沒藥二兩 蟾酥一錢
 右同前藥研為細末先放艾團子項上灸三壯唾調塗
 之上用紙封三重每日上次先藥體去了

金黃散 作錠子瘤子破子用此藥任在四次自落薑

酒下早晚各一九如小腸氣三九切生薑三錢炒焦

酒下如傷酒二九飛白礬生薑自然汁調下婦人心

氣痛醋湯下二九

紫蘇子膏 治項氣成瘤方見本門氣瘰類

生肉膏 治癰瘤潰漏及金瘡百瘡方

當歸 附子 甘草 白芷 芎藭各一兩 薤白

生地黄各半兩

右咀咬以猪脂三升煎白芷地黃去滓稍以傳之日三

蔓荊實丸 治瘤

蔓荊實去白皮 甘草炙剉 羊廩二十枚去 白斂半兩

椒目一分 小麥麵微炒

昆布黃耆湯一名麥門冬丸 治瘤腫方見本類

右將五味為末與羊廩末相和以好醬更搗丸如梧
桐子大每服酒下五丸

消毒散 治毒氣項下結核成為瘤者

皂角子 五百枚慢火炒烈 薄荷 乾者二兩 檳榔 剉半兩 甘草 炙連

翹 各一兩

右為散每服二錢俟食後臨臥米飲調下臘茶亦可
深思療瘤脂細瘤方

吳茱萸 一分 礬石 燒 芎藭 當歸 大黃 黃連

芍藥 白斂 黃芩 各等分

右合搗下篩和和鷄子塗著細故布上便瘤大小薄
厚貼之燥輒易之著藥當熟作膿貼時細細從空中
出探之知濃血盡著生肉膏若膿血不盡因後起故也
繫瘤子自落方

砒黃 砒霜 硃砂 各半兩 巴豆 五粒去皮心 芫青 去翅足七

班猫 去頭足翅七枚

右研為末先取蜘蛛網及絲共搓為線子水濕塗藥

末於上貼子中常以藥末養遇有患者以線繫之留
線頭如痒即繫之如痛即不用繫其瘤自黑乾如梧
桃大者三四日自落如茄子大者半日落更大者不
過二十八日如瓜者不過一月如血瘤繫之血出者
服定血藥燕服藥治之

黃芩散 治諸瘤血出

黃芩

去黑心

黃蘗

去粗皮剉

黃連

去鬚

鬱金

各半兩

右為散入寒食麩五錢用水調貼之

小黃膏 治瘤

黃蘗

黃芩

大黃

各等分

右為末以水調為糊比胡瘤藥大一遭塗之三日一
易至八九上不取直候可取

治小瘤方 治宜先用甘草煎膏筆蘸疔瘤四傍乾厚
復粧俟三次然後用藥

大戟

芫花

甘遂

右等分為末米醋調別筆粧傳其中不得便著甘草

處次日縮小又以甘草膏粧小暈三次中門仍用大戟光花甘草遂如前自然焦縮

凡膏瘤肉瘤膿瘤血瘤石瘤皆不可決惟脂瘤決去其脂無不愈蓋六種瘤尤不可治治則殺人

信一兩 玳黃一兩 井泉石二兩 玄精石一兩

右將藥研作小塊入砂鍋內赤石脂并鹽泥固濟勿令透炆入於文武火內燒煙盡取出放在地上冷定取藥後入

輕粉一錢 乳香二錢 石砂二錢 沒藥二錢 雄黃二錢

右同研為細末用蒸餅心和為小錠子在四次為効治瘤贅如破者用藥一餅安破處漸漸腐化去之不破者用針挑動用藥

信五錢 硫黃五錢 白丁香四錢 班猫十六箇 巴豆十六

筒去殼油 雄黃四錢 輕粉一錢

右為細末用油餅邊和丸如彈子大捏作餅子

龍膽丸 治氣瘤

龍膽 去芦頭 炙一兩 昆布 洗去鹹 炙 海藻 洗去鹹 炙 各二兩 馬刀研

海蛤 研 香草 各半 大黃 剉炒 一分

右為末煉蜜為丸如梧桐子大用破日綿裹一九朗

暮含燕之

白頭翁丸 治氣瘤

二色丸 治一切腫赤皮膚毒及瘤

天南星 半夏 甘草 大戟 各三錢 乾薑 胡椒

肉桂 草撥 各二錢 代赭石 一兩 大黃 生用

右取前四味以漿水一升煮水盡為度晒乾餘六味

用搗為末每用一錢巴豆三枚燒得焰起盞合却候

冷與前藥一處研更用醋一盞煎成膏共藥同丸如

菜豆大均分兩處丹砂為衣一用膩粉為白衣此兩

等顏色全者或捏作餅子亦可用治女子每服一九

生薑湯下

神効散 治項氣瘤結附贅日漸增長

猪羊廩 各三十枚 入鹽膽內 過令人乾只用 鹽亦得 廣陳皮 去白焙 炒一兩

右為散每服二錢須空心米飲下初結不過數服覺消不用火服

治瘡

雄黃

一錢一分

右研為細末稀爛糊調藥攤在瘡頂兒上用針針破用貼藥紙封

治白瘡方

白礬

硫黃一分

右為末以醋和封止

治候子

獨掃子

本草名地膚子

白礬

右等分為末煎湯洗不數次即盡去陳即中親曾用之果然

枯瘡方

用銅碌為草末刺破瘡摻在上以膏藥貼之

南星膏

治皮膚頭面生瘡不可輒用鍼灸大者如拳

小者如粟或軟或硬不疼不痛宜服闕

用生南星大者一枚去土薄切細研同粘為膏滴好醋五七滴如無生者以乾者為末投醋研為膏先將小刺病處令氣透以藥膏攤紙上像瘤大小貼覺疼三五易瘥

繫瘤法兼去鼠孀痔

用芫花根淨洗帶濕不得犯鐵器於末石器中搗取汁用線壹條浸半日或一宿以線繫定經宿即落末

落再換線不過兩次自落後以龍骨并訶子末傳瘡口即合依上法繫鼠孀痔累用得効繫瘤法蘓沈良方亦有用蜘蛛者然費力也不如此徑捷如無根只用花泡濃水浸線亦得昔趙氏嘗用以繫腰間一瘤不半日即落亦不痛

治果報面生贅瘤

用艾負灸十壯即用醋磨雄黃塗紙上剪如海螵子大貼所灸處更用膏藥重貼二日一換候痒旋出膿

如菘豆粉即愈

治瘤方

法用舊牛皮洗煎凍常食之瘤若破如豆腐極臭

治瘤方

用鹿草鹿二鍾肉剖如厚脯炙令熟搗掩一日四炙
四易痛攪出膿便愈不除更炙新肉用之良

治瘤

用人精一合半亦得青竹箇盛火上燒炮之以器蒸

取汁密置器中數傳瘤上良

蓖麻子方 治大人小兒項下結核漸成瘤

用蓖麻子炒黃風中次乾每服溫湯下一枚不拘時
候日服三五枚服之五日後擣玄參為散食後溫米
飯調下一錢與蓖麻子相間服三日後依前只服蓖
麻五日後却與玄參同服三日周而復始

繫瘤方

用稻上花蜘蛛十餘枚置桃李枝上候絲垂下取東

邊者搵為線子繫定于七日候換瘤子自落昔人病
瘤如拳大以此繫之至三換瘤子遂乾一夜忽失所
在天明於枕邊得之如一乾粟

又方

用狗屎拌鷄子傳之去濃水如前方說傅生肉膏取瘥

治肉瘤

先將麻布擦令血熱方上藥大者用藥四五次小者
用藥三四次以至根頭不痛有巨暈即止辨瘤數種

於後

軟筋瘤帶經絡垂

番花瘤形如石榴花

米瘤開如米

粉瘤內如粉

肉瘤色紅

茄子瘤

氣瘤肉實

骨瘤硬實

血瘤色如紫茄

軟自油瘤擦開如牛血

右十般瘤子惟有七般可醫如軟瘤番花瘤并自有破者不可療用藥之際切須審察

贅瘤方

用綿紋大黃醋磨塗瘤上漸消

白瘤方

摩令極熱但以繩縛之即愈又取東向木空申水搗向瘤上洗之一日三次即愈

治身上生贅肉

用海藻為末傳仍煎海藻酒服之則去

治贅瘤

用茄子咬去蒂於贅瘤上搗千百遍以茄搗於地上茄若爛瘤平復矣

平復以點贅瘤法

凡剪去薄皮以藥點之若落即去大者內捻出一肉片子仍須擦令血熱方可用藥

治瘰子

用濃研好京墨筆抹在瘰子上候乾更抹以多為妙數次即失去

又方

用大路紙不令人接見後密藏撒於路上街磚下紙爛則疾愈矣

又方

用青柴燒出灰搽之

治流腫悶方

羊廐一兩青橘皮一兩湯浸乾者燒銀沙鍋兩

右為末用糯米飲和丸如梧桐子大每於食後以木

通湯下二十九

井金散 粘瘰歷大有神效

土黃二錢雄黃二錢礞砂二錢粉霜一錢輕粉一錢乳香半錢

沒藥

半錢

右為細末假令瘡子如胡桃許用藥末少許半用津唾調稀糊得所攤去瘡子頂上如小棗許唾津濕紙花兩重蓋之後用黃龍膏蓋之

黃龍膏

用黃蘗一味為細末唾調攤去紙上

生肌青龍散

呵子皮 高茶 龍骨

右等分為細末乾揆上

做土法

砒黃

搗為末
三兩
木二兩

木鼈子

半兩
去殼

巴豆

半兩
去殼

礶砂

為

又砒黃一處為末後用木鼈子同石腦油和成一塊油紙裹定理於坑內四十九日取出收於磁器盛罈

作小塊

枯瘡子藥方

桑柴灰二膩白石灰三朽木三乾桑耳三草烏頭兩

半川烏頭四

右朽木等四味燒灰存性同煎桑柴灰自用水一桶

淋汁如法火熬成膏敷之

又方 治頭面生瘡子

用蛛絲勒瘡字根三二日自然退落

治宿肉贅瘡

右以蝙蝠燒為末加臘月猪脂傅之

治癭根瘤贅瘻肉

右用博落迪和百丈青鷄桑灰為末傅之

治繫指并贅瘤方

右以花蜘蛛網絲於黃丹中養之繫指與瘤夜至則

甚

釘棺鐵斧聲

嵩去人身上努肉可候有候時專聽其聲聲發之時

即便下手速治二七遍已後自得消平也產婦勿用

普濟方卷二百九十四

總校官候補知府臣葉佩蓀

校對官編修臣馮敏昌

謄錄監生臣馮克鞏