

傷寒論
三

存四堂

傷寒論注解卷第四

仲景述 王叔和撰次 成無已注解

辨太陽病脉證并治下第七

問曰病有結胃有藏結其狀何如荅曰按之痛寸脉浮關脉沈名曰結胃也何謂藏結荅曰如結胃狀飲食如故時時下利寸脉浮關脉小細沈緊名曰藏結

舌上白胎滑者難治結胃者邪結在胃藏結者邪結在藏二者皆下後邪氣乘虛入

裏所致下後邪氣入裏與陽相結者為藏結以陰受之

陽受氣於胃中故爾與陰相結者為結胃以陰受之

則入五藏故爾與陰分則陽氣不得下通是二者皆心

不得上通邪結陰分則陽氣不得下通是二者皆心

下鞭痛寸脉浮關脉沈知邪結在陽也寸脉浮關脉小細沈緊知邪結在陰也陰結而陽不結雖心下結

痛飲食亦自解藏結得熱證多則易治舌上白胎滑者

陰得陽則解藏結得熱證多則易治舌上白胎滑者

結育中亦寒 故云難治 藏結無陽證不往來寒熱其人反靜舌

上胎滑者不可攻也 藏結於法當下无陽證為表无

熱其人反靜為裏无熱經曰舌上如胎者以丹病發

於陽而反下之熱入因作結育病發於陰而反下之

因作痞所以成結育者以下之太早故也 發熱惡寒

也而反下之則表中陽邪入裏結於育中為結育无

熱惡寒者發於陰也而反下之表中之陰入裏結於

心下 結育者項亦強如桑瘞狀下之則和宜大陷育

丸 結育病項強者為邪結育中育膈結滿心下緊

与大陷育丸 下結泄滿 實但能仰而不能俛是項強亦如桑瘞之狀也

大陷育丸 大黃 半斤 味苦寒 葶藶 半升 熬 芒消 半升 味鹹寒

杏人

半升去皮尖熬
黑味甘温

大黃芒消之苦鹹所以直達白蜜取其潤利皆以下泄

滿實物也

右肆味搗篩貳味內杏人芒消合研如脂和散取
如彈丸壹枚別搗甘遂末壹錢匕白蜜貳合水貳
升煮取壹升温頓服之壹宿乃下如不下更服取
下為效禁如藥法

結胃證其脉浮大者不可下下之則死

結胃為邪結
胃中屬上焦

之分得寸脉浮關脉沈者為在裏則可下若脉浮大
心下雖結是在表者猶多未全結也下之重虛邪氣

復結則難可制結胃證悉具煩躁者亦死

結胃證悉
具邪結已

故云下之則死太陽病脉浮而動數浮則為

深也煩躁者正氣散亂
也邪氣勝正病者必死

風數則為熱動則為痛數則為虛頭痛發熱微盜汗
出而反惡寒者表未解也醫反下之動數變遲膈內
拒痛胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊懷陽氣
內陷心下因鞅則為結胃大陷胃湯主之若不結胃
但頭汗出餘處無汗劑頸而還小便不利身必發黃
也動數皆陽脈也當責邪在表睡而汗出者謂之盜汗為邪氣在半表半裏則不惡寒此頭痛發熱微盜汗出反惡寒者表未解也當發其汗醫反下之虛其胃氣表邪乘虛則陷邪在表則見陽脈邪在裏則見陰脈邪氣內陷動數之脈所以變遲而浮脈獨不變者以邪結胃中上焦陽結脈不得而沈也客氣者外邪乘胃中空虛入裏結於胃膈中拒痛者客氣動膈也金匱要略曰短氣不足以息者實也短氣躁煩心中懊懷皆邪熱為實陽氣內陷氣不得通於膈壅於心下為鞅滿而痛成結胃也與大陷胃湯以下結熱若胃中空虛陽氣內陷不能發黃若但頭汗出身中者遍身汗出則為熱越不能發黃若但頭汗出身

無汗劑頭而還小便不利者熱不得越必發黃也

大陷胃湯方

大黃陸兩去皮苦寒

芒消壹升鹹寒

甘遂壹錢匕苦寒

大黃謂之將軍以苦蕩滌芒消一名消石以其鹹能更鞭夫間有甘遂以通水也甘遂若夫間之遂其氣可以直達透結陷胃三物為允

右參味以水陸升先煮大黃取貳升去滓內芒消

煮壹兩沸內甘遂末温服壹升得快利止後服

傷寒六七日結胃熱實脉沈而緊心下痛按之石鞭

者大陷胃湯主之病在表而下之熱入因作結胃此不云下後而云傷寒六七日則是

傳裏之實熱也沈為在裏緊為裏實以心下痛按之實鞭是以為結胃與大陷胃湯以下結熱傷寒

十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯但結

腎無大熱者此為水結在腎脇也但頭微汗出者大

陷腎湯主之傷寒十餘日熱結在裏是可下之證復往來寒熱為正邪分爭未全斂結與大

柴胡湯下之但結腎無大熱者非熱結也是水飲結於腎脇謂之水結腎周身汗出者是水飲外散則愈

若但頭微汗出餘處無汗是水飲不得外泄停畜而不行也與大陷腎湯以逐其水太陽病重

發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所

小有潮熱從心下至少腹鞭滿而痛不可近者大陷

腎湯主之重發汗而復下之則內外重亡津液而邪熱內結致不大便五六日舌上燥而渴也

日晡潮熱者屬胃此日晡小有潮熱非但在胃從心下至少腹鞭滿而痛不可近者是一腹之中上下邪

氣俱甚也與大陷小結腎病正在心下按之則痛脉

浮滑者小陷腎湯主之心下鞭痛手不可近者結腎也正在心下按之則痛是熱

氣猶淺謂之小結腎結腎脉沈緊或寸浮關沈今脉浮滑知熱未深結與小陷腎湯以除腎膈上結熱

小陷胃湯方

黃連

壹兩 苦寒

半夏

半升 洗 辛溫

括婁實

大者壹 个 苦寒

苦以泄之辛以散之黃連括婁實
苦寒以泄熱半夏之辛以散結

右參味以水陸升先煮括婁取參升去滓內諸藥

煮取貳升去滓分溫參服

太陽病二三日不能卧但欲起心下必結脉微弱者

此本有寒分也反下之若利止必作結胃未止者四

日復下之此作協熱利也太陽病二三日邪在表也

者以心下結滿卧則氣壅而愈甚故不能卧而但欲

起也心下結滿有水有寒分有氣分今脉微弱知

本有寒分醫見心下結而反下之則太陽表邪乘虛
入裏利止則邪氣留結為結胃利不止至次日復如
前下利不止者是邪熱
下攻腸胃為挾熱利也
太陽病下之其脉促不結胃

者此為欲解也脉浮者必結胃也脉緊者必咽痛脉
 弦者必兩脇拘急脉細數者頭痛未止脉沈緊者必
 欲嘔脉沈滑者協熱利脉浮滑者必下血此太陽病
 氣傳變其脉促者為陽盛下後脉促為陽勝陰也故
 不作結胃為欲解下後脉浮為上焦陽邪結而為結
 胃也經曰結胃者寸脉浮開脉沈下後脉緊則太陽
 之邪傳於少陰經曰脉緊者屬少陰內經曰邪客於
 少陰之絡令人嗌痛不可內食所以脉緊者必咽痛
 脉弦則太陽之邪傳於少陽經曰尺寸俱弦者少陽
 受病也其脉循脇絡於耳所以脉弦者必兩脇拘急
 下後邪氣傳裏則頭痛未止脉細數為邪未傳裏而
 傷氣也細為氣少數為在表故頭痛未止脉沈緊則
 太陽之邪傳於陽明為裏實也沈為在裏緊為裏實
 陽明裏實故必欲嘔脉滑則太陽之邪傳於腸胃以
 滑為陰氣有餘知邪氣入裏于下焦也沈為血勝
 氣虛是為協熱利浮為氣勝血虛是知必下血經
 曰不宜下而便攻之諸變不可勝數此之謂也病
 在陽應以汗解之反以冷水瀝之若灌之其熱被劫

不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服
 文蛤散若不差者與五苓散寒實結胃無熱證者與
 三物小陷胃湯白散亦可服病在陽為邪在表也法
濕之灌洗熱被寒水外不得出則反攻其裏彌更益
煩肉上粟起者水寒之氣客於皮膚也意欲飲水者
裏有熱也反不渴者寒在表也與文蛤散以散表中
水寒之氣若不差是水熱相搏欲傳於裏與五苓散
發汗以和之始熱在表因水寒制之不得外泄內攻
於裏結於胃膈心下鞭痛本以水寒伏熱為實故謂
之寒實結胃無熱證者外無熱而熱悉收斂於裏
也與小陷胃湯以下逐之白散下熱故亦可攻

文蛤散方

文蛤五兩味鹹寒

鹹走腎則可
以勝水氣

右壹味為散以沸湯和壹錢匕服湯用伍合

白散方

桔梗

參分味辛苦微温

芭豆

壹分去皮心熬黑研如脂平温

貝母

三分味辛苦平

辛散而苦油桔梗貝母之辛苦辛用以下氣芭豆之辛用以散實

右件參味為末內芭豆更於臼中杵之以白飲和服強人半錢羸者減之病在膈上必吐在膈下必利不利進熱粥壹杯利過不止進冷粥壹杯身熱皮粟不解欲引衣自覆者若水以澀之洗之益令熱劫不得出當汗而不汗則煩假令汗出已腹中痛與芍藥參兩如上法

太陽與少陽併病頭項強痛或眩冒時如結胃心下痞鞭者當刺大椎第一間肺俞肝俞慎不可發汗發

汗則讖語脉弦矣日讖語不止當刺期門太陽之脉絡頭下項

頭項強痛者太陽表病也少陽之脉循脊絡脇如結

脊心下痞鞭者少陽裏病也太陽少陽相併為病不

純在表故頭項不但強痛而或眩冒亦未全入裏故

時如結脊心下痞鞭此邪在半表半裏之間也刺大

推第一間肺俞以寫太陽之邪刺肝俞以寫少陽之

邪邪在表則可發汗邪在半表半裏則不可發汗發

汗則亡津液損動胃氣少陽之邪因干於胃土為木

刑必發讖語脉弦至五六日傳經尽邪熱去而讖語

當止若復不止為少陽之氣婦人中風發熱惡寒經

甚也刺期門以寫肝膽之氣水適來得之七八日熱除而脉遲身涼胃脇下滿如

結胃狀讖語者此為熱入血室也當刺期門隨其實

而寫之中風發熱惡寒表病也若經水不來表邪傳

裏則入府而不入血室也因經水適來血室

空虛至七八日邪氣傳裏之時更不入府乘虛而入

於血室熱除脉遲身涼者邪氣內陷而表證罷也胃

脇下滿如結胃狀讖語者熱入血室而裏實期門者

肝之募肝主血刺期門者寫血室之熱審看何經氣

實更隨其婦人中風七八日續得寒熱發作有時經

水適斷者此為熱入血室其血必結故使如瘡狀發

作有時小柴胡湯主之中風七八日邪氣傳裏之時本無寒熱而續得寒熱經水

適斷者此為表邪乘血室虛入於血室與血相搏而

血結不行經水所以斷也血氣與邪分爭致寒熱如

瘡而發作有時與小柴胡湯以解傳經之邪婦人傷寒發熱經水適來晝

日明了暮則讖語如見鬼狀者此為熱入血室無犯

胃氣及上二焦必自愈傷寒發熱者寒已成熱也經水適來則血室虛空邪熱乘

虛入於血室若晝日讖語如見鬼狀是邪不入於血

晝日明了暮則讖語如見鬼狀是邪不入於血

室而陰爭也陽盛讖語則宜下此熱入血室不可與

下藥犯其胃氣熱入血室而結熱者與小柴胡湯

散邪發汗此雖熱入血室而結熱者與小柴胡湯

犯其上焦熱入血室而結熱者與小柴胡湯

此雖熱入血室而結熱者與小柴胡湯

自愈者以經行則熱隨血去血下也巳則邪熱悉除

而愈矣所為發汗為犯上焦者發汗則動衛氣衛氣
出上焦故也刺期門為犯中焦者刺期門則動榮氣
榮氣出中焦故也脉經曰无犯胃氣傷寒六七日發
及上二焦必自愈豈謂藥不謂針耶

熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴

胡加桂枝湯主之傷寒六七日邪當傳裏之時支散

裏發熱微惡寒支節煩疼為外證未去傷寒五六日

已發汗而復下之胃脇滿微結小便不利渴而不嘔

但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也柴胡桂枝

乾薑湯主之傷寒五六日已經汗下之後則邪當解

頭汗出往來寒熱心煩者即邪氣猶在半表半裏之

間為未解也胃脇滿微結寒熱心煩者邪在半表半

裏之間也小便不利而渴者汗下後亡津液內燥也
若不熱消津液令小便不利而渴者其人必嘔汗出而餘
無嘔者津液不足而陽虛於上也
柴胡桂枝乾

姜湯以解表裏之邪
復津液而助陽也

柴胡桂枝乾薑湯方

柴胡 半斤 苦平

桂枝 三兩 去皮 味辛熱

乾薑 二兩 辛熱

括婁根 四兩 苦寒

黃芩 三兩 苦寒

牡礪 二兩 熬 鹹寒

甘草 二兩 炙 味甘平

內經曰熱淫於內以苦發之柴胡黃芩之苦以解
傳裏之邪辛甘發散為陽之鹹以消胃脇之滿辛
在表之邪鹹以更之壯陽之鹹以消胃脇之滿辛
以潤之乾姜之辛以固陽虛之汗津液不足而為
渴苦以堅之括婁
之苦以生津液

右柒味以水壹斗貳升煮取陸升去滓再煎取參

升溫服壹升日參服初服微煩復服汗出便愈

傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲

食大便鞭脉細者此為陽微結必有表復有裏也脉
沈亦在裏也汗出為陽微假令純陰結不得復有外
證悉入在裏此為半在裏半在外也脉雖沈緊不得
為少陰病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非
少陰也可與小柴胡湯設不了了者得屎而解傷寒五六
日邪當傳裏之時頭汗出微惡寒者表仍未解也手
足冷心下滿口不欲食大便鞭脉細者邪結於裏也
大便鞭為陽結此邪熱雖傳於裏然以外帶表邪則
熱結猶淺故曰陽微結脉沈雖為在裏若純陰結則
更无頭汗惡寒之表證諸陰脉皆至頸背中而還不
上循頭今頭汗出知非少陰也与小柴胡湯以除半
表半裏之邪服湯已外證罷而不了了者為裏
熱未除与湯取其微利則愈故云得屎而解
傷寒
五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴
胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸

蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而鞭痛者此為
 結背也大陷背湯主之但滿而不痛者此為痞柴胡
 不中與之宜半夏瀉心湯傷寒五六日邪在半表半
裏之證是為柴胡證具以他藥下之柴胡證不
罷者不為逆却與柴胡湯則愈若下後邪氣傳裏者
邪在半表半裏則陰陽俱有邪至於下後邪氣傳裏
亦有陰陽之異若下後陽邪傳裏者則結於背為
結背以背為中為陽受氣之分與大陷背湯以下其結
陰邪傳裏者則留於心下為痞以心下為陰受氣之
分與半夏瀉心湯以通其痞經曰病發於陽而反下之
熱入因作結背病發於陰而反下之病發於陰而反下之
謂也

半夏瀉心湯方

半夏半升洗

黃芩苦寒

乾薑辛熱

人參已上各三兩甘溫

黃連苦寒

大棗十二枚擘甘溫

甘草三兩炙

甘平

辛入肺而散氣半夏之辛以散結氣苦入心而泄
熱黃芩黃連之苦以泄痞熱脾欲緩急食甘以緩
之參甘草大棗之甘以緩之

右柒味以水壹斗煮取陸升去滓再煮取叁升温
服壹升日叁服

太陽少陽併病而反下之成結胃心下鞭下利不止

水漿不下其人心煩太陽少陽併病為邪氣在半表

虛而入太陽表邪入裏結於胃中為結胃心下鞭少

陽裏邪乘虛下干腸胃遂利不止若邪結陰分則飲

食如故而為藏結此為陽邪脉浮而緊而復下之緊

反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳浮而緊浮為傷

發其汗而反下之若浮入裏為陽邪入裏則作結太陽
中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人熱熱汗出發

作有時頭痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也十棗湯主之下利嘔逆裏受邪也邪在裏者可下亦須待表解者乃可攻之其人藜藜汗出發作有時不惡寒者表已解也頭痛心下痞鞭滿引脅下痛乾嘔短氣者邪熱內畜而有伏飲是裏未和也与十棗湯下熱逐飲

十棗湯方

芫花

熬味辛温

甘遂

寒

大戟

苦寒

大棗

拾枚擘甘温

辛以散之芫花之辛以散飲苦以泄之甘遂大戟之苦以泄水水者腎所主也甘者脾之味也大棗之甘者益土而勝水

右上參味等分各別搗為散以水壹升半先煮大棗肥者拾枚取捌合去滓內藥末強人服壹錢匕

羸人服半錢温服之平旦服若下少病不除者明日更服加半錢得快下利後糜粥自養

太陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞表裏俱虛陰陽氣並竭無陽則陰獨復加燒針因背煩面

色青黃膚暍者難治今色微黃手足温者易愈病太陽

發汗遂發熱惡寒者外虛陽氣邪復不除也

之及虛其裏表中虛邪內陷傳於心下為痞發汗表

虛為竭陽下之裏虛為竭陰表證罷為無陽裏有痞

為陰獨又加燒針虛不勝火火氣內攻致背煩也傷

寒之病以陽為主其人面色微黃手足温者即陽氣得復故

愈云易心下痞按之濡其脉關上浮者大黃黃連瀉心

湯主之之心下韋按之痛關脉沈者實熱也心下痞按

導其虛熱

大黃黃連瀉心湯方

大黃 苦寒 貳兩 味

黃連 苦寒 壹兩 味

內經曰火熱受邪心病生焉苦入心寒除熱大黃黃連之苦寒以導瀉心下之虛熱但以麻沸湯清服者取其氣薄而泄虛熱

右貳味以麻沸湯貳升漬之須臾絞去滓分溫再服

心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之心下痞者虛熱

與瀉心湯攻痞加附子以固陽也本以下之故心下

痞與瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利者

五苓散主之本因下後成痞當與瀉心湯除之若服

者為水飲內畜津液不行非熱痞也與五苓散發汗

散水則愈一方忍之一日乃愈者不飲者外水不入而痞亦愈也傷寒汗出解之後胃中不和心下痞

鞭乾噫食臭脅下有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉

心湯主之胃為津液之主陽氣之根大汗出後外亡

要略曰中焦氣未和不能消穀故今噫乾噫食臭者

胃虛而不殺穀也脅下有水氣腹中雷鳴土弱不能

勝水也與瀉心湯以傷寒中風醫反下之其人下利

日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心

煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚

此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞭也甘草瀉

心湯主之傷寒中風是傷寒或中風也邪氣在表醫

反下之虛其腸胃而氣內陷也下利日數

十行穀不化腹中雷鳴者下後裏虛胃弱也心下痞

鞭乾嘔心煩不得安者胃中空虛客氣上逆也與瀉

心湯以攻痞加甘草以補虛前以汗後胃虛是外傷

陽氣故加生薑此以下後胃虛是內損陰氣故加甘

草傷寒服湯藥下利不止心下痞鞭服瀉心湯已復

以他藥下之利不止醫以理中與之利益甚理中者
 理中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯主之復利不
 止者當利其小便傷寒服湯藥下後利不止而心下
 痞鞭者氣虛而客氣上逆也與瀉
 心湯攻之則痞已醫復以他藥下之又虛其裏致利
 不止也理中丸脾胃虛寒下利者服之愈此以下焦
 虛故與之其利益甚聖濟經曰滑則氣脫欲其收也
 如開腸洞泄便溺遺失澁劑所以收之此利由下焦
 不利約與赤石脂禹餘糧湯以澁劑而利不止當利小便
 以利者水穀不分也若服澁劑而利不止當利小便
 其氣分

赤石脂禹餘糧湯方

赤石脂壹斤碎
味甘濕

禹餘糧壹斤碎
味甘平

本草云澁可去法脫石脂之澁以收
 斂之重可去法餘糧之重以鎮固

已上貳味以水陸升煮取貳升去滓參服

傷寒吐下後發汗虛煩脉甚微八九日心下痞鞭脇

下痛氣上衝咽啞眩冒經脉動惕者久而成痿傷寒吐下

後發汗則表裏之氣俱虛煩脉甚微為正氣內虛邪氣獨在至七八日正氣當復邪氣當罷而心下痞

脇下痛氣上衝咽啞眩冒者正氣內虛而不復邪氣留結而不去經脉動惕者經絡之氣虛極久則熱氣

還經必成痿弱傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞭噫氣不

除者旋復代赭石湯主之大邪雖解以曾發汗吐下胃氣弱而未和虛氣上逆

故心下痞鞭噫氣不除與旋復代赭石湯降虛氣而和胃

旋復代赭石湯方

旋復花二兩味鹹温

人參二兩味甘温

生薑伍兩味辛温切

代赭石壹兩味苦寒

大棗十枚味甘温

甘草二兩味甘平

半夏半升洗味辛温

鞭則氣堅鹹味可以熨之旋復之鹹以熨痞鞭性
則氣浮重劑可以鎮之代赭之重以鎮虛逆辛者
散也生姜半夏之辛以散痞者
緩也人參甘草大棗之甘以補胃弱

右件柒味以水壹斗煮取陸升去滓再煎取叁升

温服壹升日叁服

下後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱者可與

麻黃杏子甘草石膏湯前弟三卷廿六蓋云發汗後

无大熱者爲与此證治法同汗下雖殊既不當損正

氣則一邪氣所傳既同遂用一法治之經所謂若發

汗若下若吐太陽病外證未除而數下之遂協熱而

利利下不止心下痞鞭表裏不解者桂枝人參湯主

之外證未除而數下之爲重虛其裏邪熱乘虛而入

之裏虛協熱遂利不止而心下痞若表解而下利心

下痞者可與瀉心湯若不表下利故與桂枝人參湯

可先解表而後攻痞以表裏不解故與桂枝人參湯

和裏
解表

桂枝人參湯方

桂枝

四兩去皮
味辛熱

甘草

四兩炙
味甘平

白朮

二兩味
甘平

人參

二兩味
甘溫

乾薑

二兩味
辛熱

表未解者辛以散之裏不足者甘以緩之此以裏氣大虛表裏不解故加桂枝甘草於理中湯也

右五味以水玖升先煮四味取伍升內桂更煮取

參升溫服壹升日再夜壹服

傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可

攻痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞

宜大黃黃連瀉心湯

大下後復發汗則表裏之邪當

之邪俱不解也因表不解而下之為心下痞先與桂枝湯解表表解乃與大黃黃連瀉心湯攻痞內經曰

從外之內而盛於內者傷寒發熱汗出不解心中痞
 先治其外而後調其內者傷寒發熱汗出不解已成
 和而裏病也吐利心腹濡瀉為裏虛嘔吐而下利
 心下痞鞭者是裏實也與大柴胡湯以下裏熱病
 如桂枝證頭不痛項不強寸脈微浮胃中痞鞭氣上
 衝咽喉不得息者此為胃有寒也當吐之宜瓜蒂散
 病如桂枝證為發熱汗出惡風言邪在表也頭痛項
 強為桂枝湯證具若頭不痛項不強則邪不在表而
 傳裏也浮為在表沈為在裏今寸脈微浮則邪不在
 表亦不在裏而在胃中也胃中與表相應故知邪在
 胃中者猶如桂枝證而寸脈微浮也以胃中痞鞭上
 衝咽喉不得息知寒邪客於胃中而不在表也千金
 曰浮上部填塞胃心胃中痛者吐
 之則愈與瓜蒂散以吐胃中之邪

瓜蒂散方

瓜蒂 壹分 熬黃
 味苦寒

赤小豆 壹分
 酸温 味

其高者越之越以瓜蒂香豉之苦在上者湯之以赤小豆之酸內經曰酸苦湧泄為陰

右貳味各別搗篩為散已合治之取壹錢匕以香

豉壹合用熱湯柒合煮作稀糜去滓取汁和散溫

頓服之不吐者少少加得快吐乃止諸亡血虛家

不可與瓜蒂散

病脇下素有痞連在臍傍痛引少腹入陰筋者此名

藏結死素有宿昔之積結於脇下為痞今因傷寒邪氣入裏與宿積相合使藏真之氣結而不通

致連在臍傍痛引少腹入陰筋而死傷寒病若吐若下後七八日不解

熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩

欲飲水數升者白虎加人參湯主之若吐若下後七八日則當解復

不解而熱結在裏表熱者身熱也裏熱者內熱也本因吐下後邪氣乘虛內陷為結熱若無表熱而純為

裏熱則邪熱結而為實此以表熱未罷時時惡風若
 氣純在表則惡風無時若邪氣純在裏則更不惡風
 以時時惡風知表裏俱有熱也邪熱結在裏表裏俱熱未
 無大渴邪熱散漫則渴今雖熱結在裏表裏俱熱未
 為結實邪氣散漫與白虎加參湯散熱生津傷寒
 而煩欲飲水數升與白虎加參湯散熱生津傷寒
 無大熱口渴燥渴心煩背微惡寒者白虎加參湯主
 之無大熱者為身無大熱也口燥渴心煩者當作陽
 明病然以背微惡寒為表未全罷所以屬太陽也
 昔為陽背惡寒口中和者少陰病也當與附子湯今
 口燥而渴背雖惡寒此裏也則惡寒亦不至甚故云
 微惡寒與白虎湯和表傷寒脈浮發熱無汗其表不
 散熱加人參止渴生津傷寒脈浮發熱無汗其表不
 解者不可與白虎湯渴欲飲水無表證者白虎加人
 參湯主之傷寒脈浮發熱無汗其表不解不渴者宜
 欲水無表證者乃可與白虎加參湯散熱生津傷寒
 湯以散裏熱臨病之工大宜精別參太陽少陽併病
 心下鞭頸項強而眩者當刺大椎肺俞慎勿下之心

痞鞭而眩者少陽也項強者太陽也刺大推肺俞
 以寫太陽之邪以太陽之邪故余太陽為在表少陽為
 少陽之邪以膽為肝之腑故余太陽云不可發汗發汗
 在裏即是半表半裏證前弟八證云不可發汗發汗
 則識語是發汗攻太陽之邪少陽之邪益甚干胃必
 發識語此云慎勿下之攻少陽之邪太陽之邪乘虛
 入裏必作結胸經曰太陽少陽與少陽合病自下
 陽併病而反下之成結胸
利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生薑湯主之
 陽明合病自下利為在表當與葛根湯發汗陽明少
 陽合病自下利為在裏可與承氣湯下之此太陽少
 陽合病自下利為在半表半裏非汗下所宜故與黃
 芩湯以和解半表半裏之邪嘔者胃氣逆也故加半
 夏生薑以散逆氣

黃芩湯方

黃芩 苦寒 兩味

甘草 味甘平 兩炙

芍藥 酸平 兩味

大棗 味甘溫 拾枚 擘

拾枚 擘

拾枚 擘

虛而不實者苦以堅之酸以收之黃芩芍藥之苦
酸以堅斂腸胃之氣弱而不足者甘以補之甘草
大棗之甘以補固腸胃之弱

右肆味以水壹斗煮取叁升去滓溫服壹升日再
夜壹服若嘔者加半夏半升生薑叁兩

傷寒胃中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃連

湯主之

濕家下後舌上如胎者以丹田有熱胃上有寒是邪氣入裏而為下熱上寒也此傷寒邪

氣傳裏而為下寒上熱也胃中有邪氣使陰陽不交陰不得升而獨治於下為下寒腹中痛陽不得降而獨治於上為胃中熱欲嘔吐與黃連湯升降陰陽之氣

黃連湯方

黃連

味苦寒

甘草

炙味甘平

乾薑

味辛熱

桂枝

去皮味辛熱各參兩

人參

味甘溫

半夏

味辛溫半升洗

大棗

拾式救擘味甘温

上熱者泄之以苦黃連之舌以降陽下寒者散之以辛桂姜半夏之辛以升陰脾欲緩急食甘以緩之人參甘草大棗之甘以益胃

右柒味以水壹斗煮取陸升去滓温服壹升日叁

服夜貳服

傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自轉側不嘔

不渴脉浮虛而瀦者桂枝附子湯主之傷寒至七八日

再經之時則邪氣多在裏身必不苦疼痛今日數多復身疼不能自轉側者風濕相搏也煩者風也

身疼不能自轉側者風濕相搏也煩者風也來瀦者為病寒濕也嘔不渴裏無邪也脉得浮虛

而瀦身有疼煩知風温但在經也若其人大便鞭小

與桂枝附子湯以散表中風濕也便自利者去桂枝加白朮湯主之桂發汗走津液此小便便利大便鞭為

津液不足
去桂加朮

桂枝附子湯方

桂枝

味四兩去皮
辛熱

附子

破八片
炮去皮
辛熱

生薑

辛溫
兩切

甘草

味式兩炙
甘溫

大棗

味拾式枚擘
甘溫

風在表者散以桂枝甘草之辛甘溫在經者逐以
附子之辛熱姜棗辛甘行榮衛通津液以和表也

右伍味以水陸升煮取貳升去滓分溫三服

風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗

出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草

附子湯主之

風則傷衛濕流關節風濕相搏兩邪亂

痛劇也風勝則衛氣不固汗出短氣惡風不欲去衣

為風在表濕勝則水氣不行小便不利或身微腫為
濕外薄也與甘草附子湯散濕固衛氣

甘草附子湯方

甘草

式兩炙味甘平

附子

式枚炮去皮破味辛熱

白朮

式兩味甘溫

桂枝

肆兩去皮味辛熱

挂枝甘草之辛甘發散風邪而利衛
附子白朮之辛甘解濕氣而溫經

右肆味以水陸升煮取叁升去滓溫服壹升日叁服初服得微汗則解能食汗出復煩者服伍合恐壹升多者宜服陸柒合為妙

傷寒脈浮滑此表有熱裏有寒白虎湯主之

浮為在表滑為在裏

在裏表有熱外有熱也裏有寒有邪氣傳裏也以邪未入府故止言寒如瓜蒂散證云膈上有寒者是矣與白虎湯以解內外之邪

白虎湯方

知母 陸兩味 居寒

石膏 壹斤碎 味甘寒

甘草 貳兩 味甘平

粳米 陸合味 甘平

內經曰熱淫所勝佐以苦甘知母石膏之苦甘以散熱熱則傷氣甘以緩之甘草粳米之甘以益氣

右肆味以水壹斗煮米熟湯成去滓溫服壹升日叁服

傷寒脈結代心動悸炙甘草湯主之

結代之脈動而中止能自還者

名曰結不能自還者名曰代由血氣虛衰不能相續也心中悸動知真氣內虛也與炙甘草湯益虛補血氣而復脈

炙甘草湯方

甘草 肆兩炙 味甘平

生薑 三兩切 味辛溫

桂枝 叁兩去皮 味辛熱

人參 貳兩味 甘溫

生地黃 壹斤味 甘寒

阿膠 貳兩味 甘溫

麥門冬

味甘平

麻子

味甘平

大棗

味甘温

補可以去弱人參甘草大棗之甘以補不足之氣
挂枝生姜之辛以益正氣聖濟經曰津耗散為枯
五藏痿弱榮衛涸流温劑所以潤之麻入阿
膠麥門冬地黃之甘潤經益血復脉通心也

右取味以清酒柒升水捌升先煮捌味取叁升去

滓内膠烱消盡温服壹升日叁服一名復脉湯

脉按之來緩而時一止復來者名曰結又脉來動而

中止更來小數中有還者反動名曰結陰也脉來動

而中止不能自還因而復動名曰代陰也得此脉者

必難治結代之脉一為邪氣留結一為真氣虛衰脉
來動而中止若能自還更來小數止是邪氣

留結名曰結陰若動而中止不能自還因其呼陰
陽相引復動者是真氣衰極名曰代陰為難治之脉

經曰脉結者生代
者死此之謂也

傷寒論注解卷之四

釋音

俛

音免俯也

睨

如倫切目動也

匱

求位切匣也

焯

音羊燖也

痿

於危切痺病也

熨

音軟柔也

推

鍤

音昌列切

涸

乎各切竭也

焯

音羊燖也

痿

於危切痺病也

熨

音軟柔也

傷寒論注解卷第五

仲景述 王叔和撰次 成無已注解

辨陽明病脉證并治第八

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂

也答曰太陽陽明者脾約是也陽明胃也邪自太陽

便數大便因鞭者与小承氣湯即是大陽也

也病正陽陽明者胃家實是也謂之正陽

明病脉遲雖汗出不惡寒其身必重短氣腹滿而喘

有潮熱者外欲解可攻裏也手足濇然汗出者此

大便已鞭也即正陽也明胃家實也少陽陽明者發汗利小

便已胃中燥煩實大便難是也邪自少陽經傳之入

經曰傷寒脉弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可陽

發汗發汗則譏語此屬胃即是少陽明病也

明之為病胃家實也

邪傳入胃熱毒留結則胃家為實華佗曰熱毒入胃要須下去

之不可留於胃中是知邪在陽明為胃家實也

問曰何緣得陽明病答曰太

陽病發汗若下若利小便此亡津液胃中乾燥因轉

屬陽明不更衣內實大便難者此名陽明也

本太陽病不解

因汗利小便亡津液胃中乾燥太陽之邪入府轉屬陽明古人登廁必更衣不更衣者通為不大便不更衣則胃中物不得泄故為內實胃无津液加之畜熱大便則難為陽明裏實也

問曰陽明病

外證云何答曰身熱汗自出不惡寒反惡熱也

陽明病為

邪入府也邪在表則身熱汗出而惡寒邪既入府則表證已罷故不惡寒但身熱汗出而惡熱也

問曰病有得之一日不發熱而惡寒者何也答曰雖得

之一日惡寒將自罷即自汗出而惡熱也

邪客在陽明當發熱

而不惡寒今得之一日猶不發熱而惡寒者即邪未全入府尚帶表邪若表邪全入則更无惡寒必自汗

出而惡問曰惡寒何故自罷荅曰陽明居中土也萬

物所歸無所復傳始雖惡寒二日自止此為陽明病

也胃入胃則更不復傳如大陽傳之入胃則更不傳

陽少陽病傳之入胃則更不傳三陰本太陽初得病

時發其汗二先出不徹因轉屬陽明也傷寒傳經者

二日陽明此太陽傳傷寒發熱無汗嘔不能食而反

汗出澀二然者是轉屬陽明也傷寒發熱无汗嘔不

若反汗出澀然者太陽之邪轉傷寒三日陽明脉

大傷寒三日邪傳陽明之時經曰尺寸俱長者陽明

以脉傷寒脉浮而緩手足自温者是為繫在太陰太

陰者身當發黃若小便自利者不能發黃至七八日

大便鞭者為陽明病也浮為陽邪緩為脾脈傷寒則

手足熱邪在三陰則手足寒今手足自溫是知繫在

太陰也太陰土也為邪蒸之則色見於外當發身黃

小便自利者熱不內畜不能發黃至七八日傷寒轉

大便鞭者即太陰之邪入府轉屬陽明也

繫陽明者其人澼然微汗出也多汗此以傷寒邪轉

繫陽明故澼然微汗出陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡

寒脈浮而緊若下之則腹滿小便難也脈浮在表緊

中風口苦咽乾腹滿微喘者熱傳於裏也發熱惡寒

者表仍未解也若下之裏邪雖去表邪復入於裏又

亡津液故使腹陽明病若能食名中風不能食名中

寒陽明病以飲食別受風寒者以胃為水穀之海風

殺穀故傷寒陽明病若中寒不能食小便不利手足

澼然汗出此欲作固瘕必大便初鞭後溏所以然者

以胃中冷水穀不別故也殺陽明中寒不能食者寒不

不化也陽明病法多汗則周身汗出此手足濕然而汗

出而身无汗者陽明中寒也固瘕者寒氣結積也胃

中寒者甚欲留結而為固瘕則津液不得通行而大便

必鞭者若汗出小便不利者為實也此以小便不利

水穀不別雖大便陽明病欲食小便反不利大便自

初鞭後必溏也調其人骨節疼翕翕如有熱狀奄然發狂澼然汗出

而解者此水不勝穀氣與汗共併脉緊則愈熱初傳客

入胃二熱則消穀而欲食陽明病熱為實者則小便

當數大便當鞭今小便反不利大便自調者熱氣散

漫不為實也欲食則胃中穀多內經曰食入於陰長

氣於陽穀多則陽氣勝熱消津液則水少經曰水入

於經其血乃成水少則陰血弱金匱要畧曰陰氣不
通即骨疼其入骨節疼者陰氣不足也熱甚於表者
翕翕發熱甚於裏者蒸蒸發熱此熱氣散漫不專
著於表裏故翕翕如裏者熱其狀奄忽也然發狂者陰
不勝陽也內經曰陰不勝其陽者則脉流薄疾并乃
狂陽明蘊熱為實者須下之愈熱氣散漫不為實者

必待汗出而愈故云澱然而汗出解也水穀之等者
陰陽氣平也水不勝穀氣是陰不勝陽也汗出則陽
氣衰脈緊則陰氣生陰陽氣平兩無陽明病欲解時
偏勝則愈故云与汗共并脈緊則愈

從申至戌上四月為陽土王於申酉陽明病不能食

攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也以其人本虛

故攻其熱必噦虛寒相搏故令噦也經曰關脈弱胃

氣虛有熱不可大攻之陽明病脈遲食難用飽飽則

微煩頭眩必小便難此欲作穀疸雖下之腹滿如故

所以然者脈遲故也陽明病脈遲則邪方入裏熱未

中有執食難用飽則微煩而頭眩者穀氣与熱氣

相搏也兩執相合消搏津液必小便難利者不能發

黃言執得泄也小便不利則熱不穀疸熱實者下之則
愈脈遲為執氣未實雖下之腹滿陽明病法多汗反

亦不減也經曰脈遲尚未可攻

無汗其身如蟲行皮中狀者此以久虛故也胃為津液之本

氣虛津液少病則反無汗胃候身之肌陽明病反無

汗而小便利二三日嘔而效手足厥者必苦頭痛若

不效不嘔手足不厥者頭不痛陽明病法多汗反无

傷寒而寒氣內攻也至二三日嘔效而支厥者寒邪

發於外也必苦頭痛若不效不嘔手足不厥者是寒

和但攻裏而不外陽明病但頭眩不惡寒故能食而

發其頭亦不痛也

欬其人必咽痛若不效者咽不痛陽明病身不重痛

者陽明中風而風氣內攻也經曰陽明病若能食名

中風邪攻胃二氣上逆則效咽門者胃之系效甚

逆則不效其咽亦不痛也陽明病無汗小便不利

心中懊懣者身必發黃陽明病无汗而小便不利者

懷者熱氣鬱蒸欲陽明病被火額上微汗出小便不

發於外而為黃也

利者必發黃陽明病則為內熱被火則火熱相合而甚若遍身汗出而小便不利者熱得泄哉

不能發黃今額上微汗出而小便不利則熱不得越鬱丞於胃必發黃也陽明病脉浮而

緊者必潮熱發作有時但浮者必盜汗出浮者為在經

脉浮而緊者表熱裏實也必潮熱發作有時若脉但

浮而不緊者止是表熱也必盜汗出盜汗者睡而汗

出也陽明病裏熱者自汗表熱者盜汗陽明病口燥但欲漱水不欲

飲者此必衄陽明之脉起於鼻絡於口陽明裏熱則渴

在經而裏無熱也陽明氣血俱多經中熱甚迫血妄行必作衄也陽明病本自汗出醫

更重發汗病已差尚微煩不了了者此大便必鞭故

也以亡津液胃中乾燥故令大便鞭當問其小便日

幾行若本小便日三四行今日再行故知大便不久

出今為小便數少以津液當還入胃中故知不久必

大便也先亡津液使大便鞭小便數傷寒嘔多雖有

陽明證不可攻之嘔者熱在上焦未全入府故不可下陽明病心下鞭

滿者不可攻之攻之利遂不止者死利止者愈陽明病腹

滿者為邪氣入府可下之心下鞭滿則邪氣尚淺未全入府不可便下之得利止者為邪氣去正氣安正

氣安則愈若因下利不止者為正氣脫而死陽明病面合赤色不可攻之

必發熱色黃小便不利也合通也陽明病面色通赤者熱在經也不可下之下

之虛其胃氣耗其津液經中之熱乘虛入胃必發熱色黃小便不利也陽明病不吐不

下心煩者可與調胃承氣湯吐後心煩謂之虛煩今陽

明病不吐不下心煩即是胃有鬱熱也與調胃承氣湯以下鬱熱陽明病脉遲雖汗

出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此

外欲解可攻裏也手足濇然而汗出者此大便已鞭

也大承氣湯主之若汗多微發熱惡寒者外未解也
 其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小
 承氣湯微和胃氣勿令大泄下陽明病脈遲若汗出多微發熱惡寒者表未解也若
脈遲雖汗出而不惡寒者表證罷也身重短氣腹滿而喘有潮熱者熱入府也四肢諸陽之本津液足為熱蒸之則周身汗出津液不足為熱蒸之其手足濇然而汗出知大便已鞭也與大承氣湯以下胃熱經曰潮熱者實也其熱不潮是熱未成實故不可便與大承氣湯雖有腹大滿不通之急亦不可與大承氣湯與小承氣湯微和胃氣
大承氣湯方

大黃

四兩苦寒酒洗

厚朴

半斤苦溫炙去皮

枳實

五枚苦片炙

芒消

三合鹹寒

內經曰燥淫所勝以苦下之
 燥除熱又曰燥淫於內治以苦溫厚朴之苦下結
 燥又曰熱淫所勝治以鹹
 宗芒消之鹹以攻蘊熱

右四味以水壹斗先煮貳物取伍升去滓內大黃
黃取貳升去滓內芒消更上火微宣兩沸分溫再
服得下餘勿服

小承氣湯方

大黃

四兩

厚朴

二兩炙去皮

枳實

三枚大者炙

大熱結實者與大承氣湯小熱微結者與小承氣湯以熱不大甚故於大承氣湯去芒消又以結不至堅故亦減厚朴枳實也

已上三味以水肆升煮取壹升二合去滓分溫二
服初服湯當更衣不爾者盡飲之若更衣者勿服
之

陽明病潮熱大便微鞞者可與大承氣湯不鞞者不

與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小
 承氣湯二入腹中轉失氣者此有燥屎乃可攻之若
 不轉失氣者此但初頭鞭後必溏不可攻之攻之必
 脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者必
 大便復鞭而少也以小承氣湯和之不轉失氣者慎
 不可攻也朝熱者實得大便微鞭者便可攻之若不
 鞭者則熱未成實雖有潮熱亦未可攻若不
 不大便六七日恐有燥屎當先與小承氣湯積之如
 有燥屎小承氣湯藥勢緩不能宣壯必轉氣下失若
 不轉失氣是胃中無燥屎但腸間少鞭爾止初頭鞭
 後必溏攻之則虛其胃氣致腹脹滿不能食也胃中
 乾燥則欲飲水二入胃中虛寒相搏氣逆則噦其後
 却發熱者則執氣乘虛還聚於胃中胃燥得熱必
 大便復鞭而少與小承氣湯微利與和之夫實則讖
 故以重云不轉失氣不可攻內慎之至也
 語虛則鄭聲鄭聲重語也內經曰邪氣盛則實精氣
 奪則虛讖語由邪氣盛而

神識昏也鄭聲由精氣奪而論語不全也讖語者言語
 不次也鄭聲者鄭音不正也論語云惡鄭聲之亂
 又曰放鄭聲遠佞人鄭聲淫佞人殆言鄭聲不正也
 今新差氣虛人聲轉者是所謂重語者也若聲重亦
 聲轉直視讖語喘滿者死下利者亦死直視讖語邪
 氣上脫下利為氣發汗多若重發汗者亡其陽讖語
 下脫是皆主死發汗多若重發汗者亡其陽讖語
 脉短者死脉自和者不死亡陽胃燥讖語者脉短津
 為正氣未衰傷寒若吐若下後不解不大便五六日
 而尤可生也傷寒若吐若下後不解不大便五六日
 上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀
 若劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視
 脉弦者生瀕者死微者但發熱讖語者大承氣湯主
 之若一服利止後服若吐若下皆傷胃氣不大便五
 氣虛邪熱內結也陽明王於申酉戌日晡所發潮熱
 熱者陽明熱甚也不惡寒者表證罷也獨語如見鬼

狀者陽明內實也以為熱氣有餘若劇者是熱一氣甚
大也熱大甚於內昏冒正氣使不識人至於循衣摸
牀陽而不安微喘直視傷寒陽勝而陰絕者死陰勝
陽絕者死熱劇者為陽勝脈弦為陰有餘溢為陰不
足陽熱而劇脈弦知陰未絕而猶可生脈溢則絕陰
故不可治其邪熱微而未至於劇者但發熱識語可
與大承氣湯以下胃中熱經曰凡服下藥中病即止
不必盡劑此以熱未劇故云若一服利則止後服
陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞭鞭
則識語小承氣湯主之若一服識語止更莫復服津
液胃燥大便鞭而識語無大熱內結亦須與小承
氣湯和其胃氣得一服識語止則胃燥以潤更莫後
與承氣湯以本陽明病識語發潮熱脈滑而疾者小
無實熱故也承氣湯主之因與承氣湯一升腹中轉失氣者更服一
升若不轉失氣勿更與之明日不大便脈反微澀者
裏虛也為難治不可更與承氣湯也陽明病識語發潮熱若脈沉實

者內實者也則可下若脈滑疾為裏熱未實則未可
下先與小承氣湯和之湯入腹中轉失氣者中有燥
屎可更與小承氣湯一升以除之若不轉失氣者是
無燥屎不可更與承氣湯至明日邪氣傳時脈得沉
實緊牢之類是裏實也反得微澁者裏氣大虛也若
大便利後脈微澁者止為裏虛而尤可此不曾大便
脈反微澁是正氣內衰陽明病讞語有潮熱反不能
為邪所勝故云難治

食者胃中必有燥屎五六枚也若能食者但鞭尔宜

大承氣湯下之讞語潮熱為胃熱當消谷引食反不

能食者胃中虛熱重鞭不得為有燥屎而胃中實也若

欲食實為欲食傷寒則胃實熱甚者不能食胃中虛

熱甚者能食與雜病為異也陽明病下血讞語者此

為熱入血室但頭汗出者刺期門隨其實而瀉之澱

然汗出則愈語陽明病熱入血室迫血下行使下血讞

頭汗出也刺期門以散血室之熱隨其熱而瀉之然

除陽明之邪熱散邪除熱榮衛得通津液得後澱然

汗出而解汗出讖語者以有燥屎在胃中此為風也須下

之過經乃可下之下之若早語言必亂以表虛裏實

故也下之則愈宜大承氣湯胃中有燥屎則讖語以汗出為表未罷故云風

也燥屎在胃則當下以表未和則未可下須過太陽

經無表證乃可下之若下之早燥屎未除則表邪乘

虛復陷於裏為表虛裏實胃虛甚則語言傷寒四五

必亂与大承氣湯却下胃中邪熱則止日脉沈而喘滿沉為在裏而反發其汗津液越出大

便為難表虛裏實又則讖語邪氣入內之時得脉沉

下之反發其汗令津液越出胃中乾燥三陽合病腹

大便必難久則屎燥胃實必發讖語滿身重難以轉側口不仁而面垢讖語遺尿發汗則

讖語下之則額上生汗手足逆冷若自汗出者白虎

湯主之腹滿身重難以反側口不仁讖語者陽明也針經曰少陽病甚則面微塵此面垢者少陽

也遺尿者太陽也三者以陽明證多故出陽明篇中

三陽合病為表裏有邪若發汗攻表則燥熱益甚必

愈讖語若下之攻裏表熱乘虛內陷必額上汗出手

足逆冷其自汗出者三陽經熱甚也內經曰熱則腠

理開榮衛通汗大泄與二陽併病太陽證罷但發潮

白虎湯以解內外之熱

熱手足熱二汗出大便難而讖語者下之則愈宜大

承氣湯本太陽病併於陽明名曰併病太陽證罷是

熱越今手足熱汗出是熱聚於胃也必大便難而

讖語經曰手足熱然而出者必大便已鞭也去大

承氣湯以下陽明病脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘

胃中實熱發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憤

反讖語若加燒鍼必怵惕煩躁不得眠若下之則胃

中空虛客氣動隔心中懊憹舌上胎者梔子豉湯主

之脉浮發熱為邪在表咽燥口苦為熱在經脉緊腹

滿而喘汗出不惡寒反惡熱身重為邪在裏此表

裏俱有邪猶當和解之若發汗攻表者心亂雖除而內
熱益甚故躁而憤反譏語憤者心亂雖除而內
微者加燒針則損動陰氣故休煩躁不得眠也若下
若加燒針則損動陰氣故休煩躁不得眠也若下
之裏熱雖去則胃中空虛表中之氣乘虛陷於
上焦煩動於膈使心中懊懣而邪氣乘虛陷於
者熱氣客於胃中舌上胎白知熱氣客若渴欲飲水
於胸中與梔子豉湯以吐胸中之邪

口乾舌燥者白虎加人參湯主之若下後邪熱客於

下後邪熱不客於上焦而客於中焦者是若脉浮發

為乾燥煩渴與白虎加人參湯散熱潤燥

熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之此下後客熱

也邪氣自表入裏客於下焦三焦俱帶熱也脉浮發

邪者上焦熱也渴欲飲水者中焦熱也小便不利者

猪苓湯利小便以瀉下焦之熱也

猪苓 去皮 甘平

茯苓 甘平

阿膠 甘平

滑石 碎甘

澤瀉

甘鹹寒 各一两

甘甚而反淡 味滲泄為陽 猪苓茯苓之甘以行 小便鹹味湧泄為陰 澤瀉之鹹以泄伏水 滑利竅

阿膠滑石之 滑以利水道

右五味以水肆升先煮四味取二升去滓內下阿膠烱消温服七合日三服

陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多胃中

燥猪苓湯復利其小便故也

針經曰水穀入於口輸於腸胃其液別為五天

寒衣薄則為溺天熱衣厚則為汗是汗溺一液也汗多為津液外泄胃中乾燥故不可與猪苓湯利小便

也脉浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之

表熱遲為裏寒下利清穀者裏寒甚也與四逆湯温裏散寒

若胃中虛冷不能食

者飲水則噦

噦者咳逆是也千金曰咳逆者噦逆之名胃中虛冷得水則水寒相搏胃氣逆

而脈浮發熱口乾鼻燥能食者則衄脈浮發熱口乾

也能食者裏和也熱甚於經迫血為衄胃中虛冷陰

勝也水入於經其血乃成飲水者助陰氣逆為噦發

熱助陽血妄為衄三者偏陰偏陽之疾也陽明病下

之其外有熱手足温不結胃心中懊懣飢不能食但

頭汗出者梔子豉湯主之表未罷而下者應邪熱內

无手足寒今外有熱而手足温者熱雖內陷然而不

深故不作結胃也心中懊懣飢不能食者熱客胃中

為虛煩也熱自胃中熏蒸於上故但頭汗出陽明病

而身无汗与梔子豉湯以吐胃中之虛煩

發潮熱大便溏小便自可胃腸滿不去者小柴胡湯

主之陽明病潮熱為胃實大便鞭而小便數今大便

溏者應氣降而胃腸滿去今反不去者邪氣猶陽明

在半表半裏之間与小柴胡湯以去表裏之邪陽明

病腸下鞭滿不大便而嘔舌上白胎者可與小柴胡

湯上焦得通津液得下胃氣因和身濺然而汗出解

也陽明病腹滿不大便舌上胎黃者為邪熱入府可下若脇下鞭滿雖不大便而嘔舌上白胎者為邪

未入府在表裏之間与小柴胡湯以和解之上焦陽

得通則嘔止津液得下則胃氣因和汗出而解

明中風脉弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按

之氣不通鼻乾不得汗嗜卧一身及面目悉黃小便

難有潮熱時二噦耳前後腫刺之小差外不解病過

十日脉續浮者與小柴胡湯脉但浮無餘證者與麻

黃湯若不尿腹滿加噦者不治浮大為陽風在表也弦則為陰風在裏也

短氣腹滿脇下及心痛風熱壅於腹中而不通也若

寒客於內而痛者按之則寒氣散而痛止此以風熱

內壅故雖久按而氣亦不通陽明病鼻乾不得卧自

汗出者邪在表也此鼻乾不得汗而嗜卧者風熱內

攻不干表也一身面目悉黃小便難有潮熱時二噦

者風熱攻於胃也陽明之脉出大迎循頰車上耳前

過客主人熱勝則腫此風熱在經故耳前後腫刺之
經氣通腫則小差如此者外證罷則可攻若外證不
解雖過十日脉續浮者邪氣由在半表半裏与小柴
胡湯以和解之若其脉但浮而不弦大無諸裏證者
是邪但在表也可與麻黃湯以發其汗若尿腹滿
加噦者閉格之疾也故云不治難經曰關格者不得
盡其命陽明病自汗出若發汗小便自利者此為津
而死

液內竭雖硬不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導而

通之若土瓜根及與大猪膽汁皆可為導津液內竭腸胃乾燥

大便因硬此非結熱故不可攻宜以藥外治而導引之

蜜煎導方

蜜柒合壹味內銅器中微火煎之稍疑似飴狀攪
之勿令焦著欲可丸併手捻作挺令頭銳大如指
長貳寸許當熱時急作冷則硬以內穀道中以手

急抱欲大便時乃去之

猪膽汁方

大猪膽壹枚瀉汁和醋少許以灌穀道中如壹食頃當大便出

陽明病脉遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜

桂枝湯陽明病脉遲汗出多當責邪在裏以微惡寒知表未解与桂枝湯和表陽明病

脉浮無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯陽明傷寒表實脉浮無汗

而喘也与麻黃湯以發汗陽明病發熱汗出此為熱越不能發黃

也但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴引水漿

者此為瘵熱在裏身必發黃茵陳湯主之但頭汗出

頸而還者熱不得越也小便不利渴引水漿者熱甚於胃津液内竭也胃為土而色黃胃為熱蒸則色奪

於外必發黃也與茵陳湯逐熱退黃

茵陳蒿湯方

茵陳蒿

陸西苦微寒

梔子

拾肆枚擘苦寒

大黃

二兩去皮苦寒

小熱之氣涼以和之大熱之氣寒以取之茵陳梔子之苦寒以逐胃燥宜下必以苦宜補必以酸大黃之苦寒以下療熱

右參味以水壹斗先煮茵陳減陸升內貳味煮取參升去滓分溫參服小便當利尿如皂角汁狀色正赤壹宿腹減黃從小便去也

陽明證其人喜忘者必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘屎雖鞭大便反易其色必黑宜抵當湯下之

內經曰血并於下亂而喜忘此下本有久瘀血所以喜忘也津液少大便鞭以畜血在內屎雖

鞭大便反易其色黑也陽明病下之心中懊憹而煩
與抵當湯以下瘀血

胃中有燥屎者可攻腹微滿初頭鞭後必溏不可攻

之若有燥屎者宜大承氣湯下後心中懊憹而煩者

若胃中有燥屎者非虛煩也可與大承氣湯下之其

腹微滿初鞭後溏是無燥屎此熱不在胃而在上也

故不可攻病人不大便五六日繞臍痛煩躁發作有時者

此有燥屎故使不大便也不大便五六日者則大便

氣不得下通故繞臍痛煩躁發作有時也病人煩熱汗出則解又如瘧狀

日晡所發熱者屬陽明也脉實者宜下之脉浮虛者

宜發汗下之與大承氣湯發汗宜桂枝湯雖得陽明

為裏實審看脉候以別內外其脉實者執已入府為

實可與大承氣湯下之其脉浮虛者是熱未入府由

在表也可與桂枝湯發汗則愈大下後六七日不大便煩不解腹滿

痛者此有燥屎也所以然者本有宿食故也宜大承

氣湯大下之後則胃弱不能消谷至六七日不大便

知有燥屎也與大承氣湯以下除之病人小便不利大便下難下易時

有微熱喘冒不能卧者有燥屎也宜大承氣湯利小便

大便鞭此以有燥屎故小便不利而大便下難下易胃

熱者發熱喘冒無時及嗜卧也此燥屎在胃故時有

微也喘冒不得卧也與大承氣湯以下燥屎食穀欲嘔者屬陽明也吳茱

萸湯主之得湯反劇者屬上焦也上焦主內胃為之

不受也與吳茱萸湯以溫胃氣得湯反劇者上焦不內也以治上焦法治之

吳茱萸一升洗 人參三兩 生薑六兩切

大棗十二枚

擘甘溫

內經曰寒淫於內治以甘熱佐以苦辛吳茱萸
黃生薑之辛以溫胃人參大棗之甘以緩脾

右肆味以水柒升煮取貳升去滓溫服七合日三

服

太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔
但心下痞者此以醫下之也如其不下者病人不惡
寒而渴者此轉屬陽明也小便數者大便必鞭不更
衣十日無所苦也渴欲飲水少少與之但以法救之

渴者宜五苓散

太陽病脈浮陰弱為邪在表今寸
緩關浮尺弱邪氣漸傳裏則發熱汗

出復惡寒者表未解也傳經之邪入裏裏不和者必
嘔此不嘔但心下痞者豎下之早邪氣留於心下也
如其不下者必漸汗後小便秘數大便鞭者當與小承
也若吐若下若發汗後小便秘數大便鞭者當與小承
氣湯和之此不因吐下發汗後小便秘數大便鞭者當
无蒲實蚘不更衣十日无所苦也候津液還入胃中

小便數少大便必自出也渴欲飲水者少少与与之以

潤胃氣但審邪氣所在以法救之如渴不止与与五苓

散是也脉陽微而汗出少者為自和也汗出多者為大

過和脉陽微者邪氣少汗出少者為適當故自陽脉實

因發其汗出多者亦為太過太過為陽絕於裏亡津

液大便因鞭也陽脉實者表熱甚也因發汗執乘虛

亡其陽陽絕於裏腸胃乾燥大便因鞭也脉浮而乳浮為陽乳為陰浮乳

相搏胃氣生熱其陽則絕浮乳相搏陰陽不諧胃氣

其陽為絕跌陽脉浮而澁浮則胃氣強澁則小便數浮澁

相搏大便則難其脾為約麻人丸主之跌陽者脾胃

陽知胃氣強澁為陰知脾為約約者後約之約又約

束之約內經曰飲入於胃遊溢精氣上輸於脾二氣

散精上歸於肺通調水道下輸於膀胱水精四布五

經並行是脾主為胃行其津液者也今胃強脾弱約

東津液不得四布但輸膀胱致小便數大便難与脾約九通腸潤燥

麻人丸方

麻子人甘平升

芍藥半斤

枳實半斤灸

大黃壹斤去皮苦寒

厚朴一尺灸去皮苦寒

杏仁壹斤去皮尖熬別作

脂甘温

內經曰脾欲緩急食甘以緩之麻子杏人之甘緩脾而潤燥津液不足以酸收之為藥之酸以斂津液腸燥胃強以苦泄之枳實厚朴大黃之苦下燥結而泄胃強也

右陸味為末煉蜜為丸桐子大飲服十九日三服

漸加以知為度

太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者屬胃也調胃承

氣湯主之

蒸蒸者如熱熏蒸蒸言其熱也太陽病三日發汗不解則表邪已罷蒸蒸發熱胃熱為

甚与調胃承氣湯下胃熱傷寒吐後腹脹滿者與調胃承氣湯

內經曰諸脹腹大皆屬於熱在上焦則吐吐後不解復腹脹滿者邪熱入胃也与調胃承氣湯下其胃熱

太陽病若吐若下若發汗微煩小便數大便因鞭者

與小承氣湯和之愈吐下發汗皆損津液表邪乘虛傳裏大煩者邪在表也微煩者邪入裏也小便數大便因鞭者其脾為約也小承氣湯和之愈

得病二三日脉弱無

太陽柴胡證煩躁心下鞭至四五日雖能食以小承

氣湯少少與微和之令小安至六日與承氣湯一升

若不大便六七日小便少者雖不能食但初頭鞭後

必溏未定成鞭攻之必溏須小便利屎定鞭乃可攻

之宜大承氣湯針經曰脉軟者病將下弱為陰脉當

魚淺而邪氣已入裏也無太陽證為表證已罷無柴胡證為无半表半裏之證煩躁心下鞭者邪氣內甚

也胃實熱甚則不能食胃虛熱甚至四五日雖能食亦當与小承氣湯微和之至六日則熱甚与大承氣湯

湯一升若不大便六七日小便多者為津液內竭大便必鞭則不可下之小便少者則胃中水谷不別必初

鞭後溇雖不能食為胃實以小便少則未定傷寒六成鞭亦不可攻須小便利屎定鞭乃可攻之

七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者此為實也急下之宜大承氣湯

內經曰諸脈者皆日邪氣入裏之時日中不了了睛不和者邪熱內甚上熏於目也無表裏證大便難者裏實也身大熱者

表熱也身微熱者裏熱也針經曰熱病日不明熱不已者死此目中不了了睛不和則證近危惡也須急

湯下之陽明病發熱汗多者急下之宜大承氣湯

入府外發熱汗多者熱迫津液將竭急与大承氣湯以下其府熱

發汗不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯

腹滿痛者傳之迅也是須急下之腹滿不減減不足言當下之宜大承氣湯

腹滿不減減不足言當下之宜大承氣湯

實也經曰大滿大實自可除下之大承氣湯下其滿實若腹滿時減非內實也則不可下金匱要畧曰腹滿時減復如故此為寒當與溫藥是減不足言也陽明少陽合病必下利其

脈不負者順也負者失也互相尅賊名為負也脈滑

而數者有宿食也掌下之宜大承氣湯陽明土少陽木二經合病

氣不相和則必下利少陽脈不勝陽明不負是尅為順也若少陽脈勝陽明脈負者是鬼賊相尅為

正氣失也脈經曰脈滑者為宿食也又曰滑數則胃氣實下利者脈當微厥今脈滑數知胃有宿食與大

承氣湯以病人無表裏證發熱七八日雖脈浮數者

可下之假令已下脈數不解合熱則消穀喜飢至六

七日不大便者有瘀血宜抵當湯七八日邪入府之時病人无表裏證

但發熱雖脈浮數亦可與大承氣湯下之浮為熱客

於氣數為熱客於血下之邪熱去而浮數之脈俱當解若下後數脈去而脈但浮則是榮血間熱并於衛氣間也當為邪氣獨留心中則飢邪熱不殺穀潮熱

發渴之證此下之後浮脉去而數不解則是衛氣間

熱合於榮血間也熱氣合併迫血下行胃虛協熱消

穀喜飢血至下焦若大便利者下血乃愈若六七日

不大便則血不得行畜積於下為瘀血与抵當湯以

下去若脉數不解而下不止必協熱而便膿血也後

脉數不解而不大便者是熱不得泄畜血於下為瘀

血也若下後脉數不解而下利不止者為熱得下泄

迫血下行傷寒發汗已身目為黃所以然者以寒濕

必便膿血傷寒發汗已身目為黃所以然者以寒濕

在裏不解故也以為不可下也於寒濕中求之要金匱

曰黃家所起從濕得之汗出熱去則不能發黃發汗

已身目為黃者凡氣去濕氣在也脾惡濕濕氣內著

脾色外奪者身目為黃若瘀血在裏發黃者則可傷

寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵陳

蒿湯主之當熱甚之時身黃如橘子色是熱毒發泄

出小便不利於外內經曰膀胱者津液藏焉氣化則能

不得下行也與茵陳湯利小便退黃逐熱傷寒身

黃發熱者梔子蘖皮湯主之傷寒身黃胃有瘀熱當須下去之此以發熱為

熱未實与梔子蘖皮湯解散之

梔子蘖皮湯方

梔子一十五箇苦寒 甘草一兩甘平 黃蘖二兩

右三味以水肆升煮取一升半去滓分温再服

傷寒發熱在裏身必發黃麻黃連軹赤小豆湯主之

濕熱相交民多病瘴瘴黃也傷寒為寒濕在表發黃為瘀熱在裏与麻黃連軹赤小豆湯除熱散濕

麻黃連軹赤小豆湯方

麻黃二兩甘温去節 赤小豆一升甘平 連軹二兩連軹根也苦寒

杏仁四十箇甘温去皮尖 大棗十二枚甘温 生梓白皮一升苦寒

生薑二兩辛温切 甘草二兩炙甘平

內經曰濕上甚而熱治以甘溫佐以甘平以汗為
故止此之謂也又前用瀉水者亦取其水味薄則
濕氣不助

已上捌味以瀉水一斗先煮麻黃再沸去上沫內
諸藥煮取三升分溫三服半日服盡

辨少陽病脉證并治第九

少陽之為病口苦咽乾目眩也足少陽膽經也內經曰

甲乙經曰膽者中精之府五藏取決於膽咽為之使

少陽中風兩耳無所聞目赤胷中滿而煩者不可吐

下吐下則悸而驚少陽之脉起於目眇走於耳中其

熱少陽中風氣壅而熱故耳聾目赤胷滿而煩邪在

少陽為半表半裏以吐除煩吐則傷氣二虛者悸以
下除滿下則亡傷寒脉弦細頭痛發熱者屬少陽少
血虛者驚

陽不可發汗發汗則譏語此屬胃胃和則愈胃不和

則煩而悸經曰三部俱弦者少陽受病脉細者邪漸傳裏魚頭痛發熱為表未解以邪客少陽

為半在表半在裏則不可發汗發汗亡津液胃中乾燥少陽之邪因傳入胃必發譏語當與調胃承氣湯

下之胃和則愈不下則胃為少陽木邪干之故煩而悸本太陽病不解轉入少

陽者脇下鞕滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下脉

沉緊者與小柴胡湯太陽轉入少陽是表邪入於裏脇下鞕滿不能食往來寒熱者邪在半表半裏之間若已經吐下脉沉緊者邪氣入府為裏矣尚未經吐下而脉沉緊為傳裏也深未全

入府外猶未解也与小柴胡湯以和解之若已吐下發汗温鍼譏語柴胡

湯證罷此為壞病知犯何逆以法治之少陽之邪在表裏之間

若妄吐下發汗温鍼損耗津液胃中乾燥木邪干胃必發譏語若柴胡證不罷者則不為逆柴胡證罷者

壞病也詳其因何三陽合病脉浮大上關上但欲眠

治之逆以法救之

睡目合則汗

之關脈以候少陽之氣大陽之脈浮陽合病熱

則睡少陰病但欲眠睡目合則汗知三陽合病膽有熱也傷

寒六七日無大熱其人躁煩者此為陽去入陰故也

表為陽裏為陰邪在表則外有熱六七日邪氣入裏之時外無大熱內有躁煩者表邪傳裏也故曰陽去

陰傷寒三日三陽為盡三陰當受邪其人反能食而

不嘔此為三陰不受邪也

傷寒四日表邪傳裏又不和則不能食而嘔今反能

食而不嘔是邪不傳陰但在陽也傷寒三日少陽脈小者欲已也

曰大則邪至小則平傷寒三日邪傳少陽少陽病欲

解時從寅至辰上氣寅卯辰少陽木王之時

傷寒論注解卷第五

釋音

廁

初吏切也

痕

音假腹中久病

疸

音旦黃病

憤

古對切也

怵

勅律切也

惕

音陽敬也又憂懼也

瘧

丁賀切也

傷寒論注解卷第六

仲景述 王叔和撰次 成無已注解

辨太陰病脉證并治第十

太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛

若下之必胃下結鞭太陰為病陽邪傳裏也太陰之

不得降者嘔吐而食不下不得升者自利益甚時

腹自痛陰寒在內而為腹痛者則為常痛此陽邪干

裏雖痛而亦不常痛但時時腹自痛也若下之則陰

邪留於胃下為結鞭經曰病發於陰而反下之因作

痞太陰中風四肢煩疼陽微陰澁而長者為欲愈太

脾也主營四末太陰中風四肢煩疼者風淫末疾也

表邪少則微裏向和則澁而長者陽也陰病見陽

脉則生以陰得陽太陰病欲解時從亥至丑上脾為陰

則解故云欲愈太陰病脉浮者可發汗宜桂枝湯經曰

故為解時太陰病脉浮者可發汗宜桂枝湯浮為

在表沉為在裏太陰病脉浮者邪在經也故當汗散之自利不渴者屬太陰以

其藏有寒故也當溫之宜服四逆輩自利而渴者屬少陰為寒在下

焦自利不渴者屬太陰為寒在傷寒脉浮而緩手足中焦與四逆等湯以溫其藏

自溫者繫在太陰太陰當發身黃若小便自利者不

能發黃至七八日雖暴煩下利日十餘行必自止以

脾家實腐穢當去故也太陰病至七八日大便鞭者為太陰入府傳於陽明也今

至七八日暴煩下利十餘行者脾家實腐穢去也下利煩躁者死此以脾氣和逐邪下泄故雖暴煩下利

日十餘行而利必自止本太陽病醫反下之因爾腹滿時痛者

屬太陰也桂枝加芍藥湯主之表邪未罷醫下之邪因乘虛傳於太陰裏

氣不和故腹滿時痛與桂枝湯以解表加芍藥以和裏大實痛者桂枝加大黃

湯主之大實大滿自可除下之故加大黃以下大實太陰為病脉弱其人

續自便利設當行大黃為藥者宜減之以其人胃氣

弱易動故也腹滿痛者太陰病也脈弱其人續自便利則邪雖在裏未成大實欲與大黃為

藥攻滿痛者宜少與之以胃氣尚弱易為動利也

辨少陰病脈證并治第十一

少陰之為病脈微細但欲寐也少陰為病脈微細為

行於陽則寤行於陰則寐邪傳少陰則氣行於陰而不行於陽故但欲寐少陰病欲吐不

吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也虛故

引水自救若小便色白者少陰病形悉具小便白者

以下焦虛有寒不能制水故令色白也欲吐不止心煩者表邪傳

裏也若腹滿痛則屬太陰此但欲寐則知屬少陰五

六日邪傳少陰之時自利不渴者寒在中焦屬太陰此自利而渴為寒在下焦屬少陰腎虛水燥渴欲引水自救下焦虛寒不能制水小便色白也經曰下利

欲飲水者以有熱故也此下利雖渴病人脈陰陽俱

然以小便色白明非裏熱不可不察病入脈陰陽俱

緊反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復吐利

脈陰陽俱緊為少陰傷寒法當无汗反汗出者陽虛

不固也故云亡陽以无陽陰獨是屬少陰內經曰邪

客少陰之絡令人益痛不可內食少陰病欬而不利

少陰寒甚是當咽痛而復吐利

讖語者被火氣劫故也小便必難以強責少陰汗也

效而下利裏寒而亡津液也反以火劫強責少陰少

汗者津液內竭加火氣煩之故讖語小便難也少陰

陰病脈細沉數病為在裏不可發汗少陰病始得之

為邪在經可與麻黃附子細辛湯發汗此少陰病脈

微不可發汗亡陽故也陽已虛尺脈弱瀆者復不可下

之脈微為亡陽表虛不可發汗脈少陰病脈緊至七

弱瀆為亡陽裏虛復不可下

八日自下利脈暴微手足反溫脈緊反去者為欲解

也雖煩下利必自愈少陰病脈緊者寒其也至七八日傳經盡欲解之時自下利脈

暴微者寒氣得也若手足厥反溫脈緊反去知陽氣復

足厥而脈緊不去今手足反溫脈緊反去知陽氣復

寒氣去故為欲解下利必自止少陰病下利若利

自止惡寒而踈卧手足溫者可治少陰病下利惡寒

也利自止手足溫者裏少陰病惡寒而踈時自煩欲

和陽氣得復故為可治去衣被者可治惡寒而踈陰寒甚也時自煩欲少

去衣被者為陽氣得復故云可治陰中風脈陽微陰浮者為欲愈少陰中風脈當浮

也陰脈當沉而陰脈浮者裏氣和也陽少陰病欲解

中有陰陰中有陽陰陽調和故為欲愈少陰病欲解

時從子至寅上三陽生於子為一陽丑為二陽寅為少陰病吐利手足不逆冷反發熱者不死脈不至者

灸少陰七壯經曰少陰病吐利躁煩四逆者死吐利

不死脉不至者吐利暴虛少陰病八九日一身手足

也灸少陰七壯以通其脉

盡熱者以熱在膀胱必便血也膀胱太陽也少陰太陽為表裏少陰病至

八九日寒邪變熱復傳太陽太陽經多血少氣為熱所乘

則血散下行少陰病但厥無汗而強發之必動其血

必便血也

未知從何道出或從口鼻或從目出是名下厥上竭

為難治但厥無汗熱行於裏也而強發汗虛其經絡

從目出諸厥者皆屬於下但厥為下厥血亡少陰病

於上為上竭傷氣損血邪甚正虛故為難治

惡寒身踈而利手足逆冷者不治針經曰多寒者難已此

內外寒極純陰少陰病吐利躁煩四逆者死吐利者

無陽故云不治少陰病吐利躁煩四逆者死寒甚於

裏四逆者寒甚於表躁煩少陰病下利止而頭眩時

時自冒者死下利止則水穀竭眩少陰病四逆惡寒

而身踈脉不至不煩而躁者死四逆惡寒而身踈則寒甚脉不至則真氣

絕煩熱也躁亂也若憤躁之躁從煩至躁為熱來有漸則猶可不煩而躁是氣欲脫而爭也譬猶燈將滅而暴明其少陰病六七日息高者死

能久乎少陰病六七日息高者死腎為生氣之源少陰病六七日不愈而息高者生氣斷絕也

不煩自欲吐至五六日自利復煩躁不得卧寐者死利煩躁不得卧寐則正氣弱陽不能復病勝藏故死

少陰病始得之反發熱脉沉者麻黃附子細辛湯主之少陰病當无熱惡寒反發熱者邪在表也雖脉沉以始得則邪氣未深亦當温劑發汗以散之

麻黃附子細辛湯方

麻黃式兩去細辛式兩附子壹枚炮去皮

內經曰寒淫於內治以甘熱佐以苦辛以辛潤之麻黃之甘以解少陰之寒細辛附子之辛以温少

節甘熱細辛辛熱附子破八片辛熱

內經曰寒淫於內治以甘熱佐以苦辛以辛潤之麻黃之甘以解少陰之寒細辛附子之辛以温少

經之

右參味以水壹斗先煮麻黃減貳升去上沫內藥
煮取參升去滓溫服壹升日參服

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二

三日無證故微發汗也二三日邪未深也既无吐利厥逆諸裏證則可与麻黃附

子甘草湯微汗以散之

麻黃附子甘草湯方

麻黃

式兩去節

甘草

式兩炙

附子

壹枚炮去皮

麻黃甘草之甘以散表寒附子之辛以溫經氣

右參味以水柒升先煮麻黃壹兩沸去上沫內諸

藥煮取參升去滓溫服壹升日三服

少陰病得之二三日以上心中煩不得卧黃連阿膠湯

主之

脉經曰風傷陽寒傷陰少陰受病則得之於寒
二三日已上寒極變熱之時熱煩於內心中煩

不得卧也與黃連
阿膠湯扶陰散熱

黃連阿膠湯方

黃連

肆兩 苦寒

黃芩

壹兩 苦寒

芍藥

貳兩 酸平

雞子黃

貳枚 甘溫

阿膠

參兩 甘溫

陽有餘以苦除之黃芩黃連之苦以除熱陰不足
以甘補之雞子黃阿膠之甘以補血酸收也泄也芍
藥之酸收陰
氣而泄邪熱

右伍味以水伍升先煮參物取貳升去滓內膠烱

盡小冷內雞子黃攪令相得溫服柒合日參服

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附

子湯主之少陰客熱則口燥舌乾而渴口中和者不苦不燥是無熱也背為陽背惡寒者陽氣弱陰氣勝也經曰無熱惡寒者發於陰也灸之助陽消陰與附子湯溫經散寒

附子湯方

附子

貳枚破剝片去皮辛熱

茯苓

參兩甘平

人參

貳兩甘溫

白朮

肆兩甘溫

芍藥

參兩酸平

辛以散之附子之辛以散寒甘以緩之茯苓人參白朮之甘以補陽酸以收之芍藥之酸以扶陰所以然者偏陰偏陽則為病火欲實水當平之不欲偏勝也

右伍味以水捌升煮取參升去滓溫服壹升日參服

少陰病身體痛手足寒骨節痛脈沉者附子湯主之

少陰腎水而主骨節身軀疼痛手足冷脈沉者寒盛於陰也身疼骨痛若脈浮手足熱則可發汗此手足寒

厥沉故當與少陰病下利便膿血者桃花湯主之陽病
附子湯溫經也少陰病下利便膿血者桃花湯固下散寒
者下焦不約而裏寒也與桃花湯固下散寒

桃花湯方

赤石脂

壹斤壹半全用

乾薑

壹兩

粳米

壹升

瀉可去脫赤石脂瀉以固腸胃辛以散之
乾薑之辛以散裏寒粳米之甘以補正氣

右參味以水柒升煮米令熟去滓溫服柒合內赤

石脂末方寸匕日參服若壹服愈餘勿服

少陰病二三日至四五日腹痛小便利不利下利不止

便膿血者桃花湯主之

二三日以至四五日寒邪入裏深也腹痛者裏寒也小便利

不利者水穀不別也下利不止便膿血者腸胃虛弱下焦不固也與桃花湯固腸止利

少陰病

下利便膿血者可刺

下焦血氣留聚腐化則為膿血刺之以利下焦宣通血氣

陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之利吐

手足厥冷則陰寒氣甚煩躁欲死者少陰病下痢咽

痛背滿心煩者猪膏湯主之少陰之脉從腎上貫肝

別者從肺出絡心注背中心邪自陽經傳於少陰陰虛

猪膏湯方

猪膏 壹斤

猪水畜也其氣先入腎少陰客熱是以猪膏解之加白蜜以潤燥除煩白粉以益氣漸利

右壹味以水壹斗煮取伍升去滓加白蜜壹升白

粉伍合熬香和相得温分陸服

少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差者與桔梗

湯陽邪傳於少陰邪熱為咽痛服甘草湯則差若寒熱相搏為咽痛者服甘草湯若不差與桔梗湯以

和少陰
之氣

甘草湯方

甘草貳兩

右壹味以水參升煮取壹升半去滓温服柒合日

貳服

桔梗湯方

桔梗壹兩
甘微温

甘草貳兩
平

桔梗辛温以散寒甘草味甘平
以除熱甘梗相合以調寒熱

右貳味以水參升煮取壹升去滓分温再服

少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不出者苦酒湯主

之熱傷於絡則經絡乾燥使咽中傷生瘡不能
言語聲不出者與苦酒湯以解絡熱愈咽瘡

苦酒湯方

半夏

洗破如棗核大拾肆枚辛温

雞子

壹枚去黃內上苦酒著雞子殼中甘微寒

辛以散之半夏之辛以發音聲甘以緩之雞子之甘以緩咽痛酸以收之苦酒之酸以斂咽瘡

右貳味內半夏著苦酒中以雞子殼置刀環中安

火上令參沸去滓少少含嚥之不差更作三劑

少陰病咽中痛半夏散及湯主之

甘草湯主少陰客熱咽痛桔梗湯主

少陰寒熱相搏咽痛半夏散及湯主少陰客寒咽痛也

半夏散及湯方

半夏

洗辛温

桂枝

去皮辛熱

甘草

炙甘平以

內經曰寒淫所勝平以辛熱佐以甘苦半夏桂枝之辛以散經寒甘草之甘以緩正氣

已上參味各別搗篩已合治之白飲和服方寸匕

日參服若不能散服者以水壹升煎七沸內散兩方寸匕更煎參沸下火令小冷少少嚥之

少陰病下利白通湯主之少陰主水少陰客寒不能制水故自利也白通湯溫

裏散寒

白通湯方

葱白四莖 辛溫

乾薑一兩 辛熱

附子一枚生用去皮 破八片 辛熱

內經曰腎苦燥急食辛以潤之葱白之辛以通陽氣薑附之辛以散陰寒

右參味以水參升煮取壹升去滓分溫再服

少陰病下利脉微者與白通湯利不止厥逆無脉乾

嘔煩者白通加猪膽汁湯主之服湯脉暴出者死微

續者生少陰病下利脉微為寒極陰勝與白通湯復陽散寒服湯利不止厥逆無脉乾嘔煩者寒

氣大甚內為格拒陽氣逆亂也與白通湯加猪膽汁
湯以和之內經曰逆而從之從而逆之又曰逆者正
治從者反治此之謂也服湯脈暴出者正氣因
發泄而脫也故死脈微續者陽氣漸復也故生

白通加猪膽汁湯方

葱白肆

乾薑兩

附子一枚生去皮破剝片

人尿伍合

猪膽汁一合

猪膽汁苦寒

苦寒

內經曰若調寒熱之逆冷熱必行則熱物冷服下
益之後冷身既消熱性便發由是病氣隨愈嘔噦
皆除情且不違而致大益此和人尿猪膽汁苦寒
寒物於白通湯熱劑中要其氣相從則可以去格
拒之寒也

已上參味以水參升煮取壹升去滓內膽汁人尿
和令相得分温再服若無膽亦可用

少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢

沉重疼痛自下利者此為有水氣其人或欬或小便

利或下利或嘔者真武湯主之少陰病二三日則邪氣猶淺至四五日則邪

氣已深腎主水腎病不能制水二飲停為水氣腹痛者寒濕內甚也四肢沉重疼痛寒濕外甚也小便不利

自下利者濕勝而水穀不別也內經曰濕勝則濡泄与真武湯益陽氣散寒濕

真武湯方

茯苓三兩

芍藥三兩

生薑三兩

白朮二兩

附子一枚

脾惡濕甘先入脾茯苓白朮之甘以益脾逐水寒淫所勝平以辛熱濕淫所勝佐以酸平附子芍藥

生薑之酸辛以溫經散溫

右伍味以水捌升煮取參升去滓溫服柒合日叁

服後加減法

若效者加五味子半升細辛乾薑各壹兩氣逆效者五味子之

酸以收逆氣水寒相搏則效若小便利者去茯苓便

利則无伏水若下利者去芍藥加乾薑貳兩芍藥之

乾薑之若嘔者去附子加生薑足前成半斤氣逆則

辛散寒若嘔者去附子加生薑足前成半斤嘔附子

補氣生薑散氣千金曰嘔家少陰病下利清穀裏寒

外熱手足厥逆脉微欲絕身反不惡寒其人面赤色

或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脉不出者通脉四逆

湯主之下利清穀手足厥逆脉微欲絕為裏寒身熱

通脉四逆湯方

甘草二兩

附子大者一枚生用

去皮破八片

乾薑 參兩強人 可肆兩

右參味以水參升煮取壹升貳合去滓分温再服
其脉即出者愈

面色赤者加葱玖莖 葱味辛以通陽氣 腹中痛者去葱加芍

藥貳兩 芍藥之酸通寒利腹中痛為氣不通也 嘔者加生薑貳兩 散之

嘔為氣不散也 咽痛者去芍藥加桔梗壹兩 咽中如結加桔

利止脉不出者去桔梗加人參貳兩 利止脉不出者亡血也加人參

以補之經曰脉微而利亡血也四逆加人參湯主之病皆與方相應者乃可服之 少陰病四

逆其人或欬或悸或小便利或腹中痛或泄利下

重者四逆散主之 四逆者四肢不温也傷寒邪在三

温至少陰則邪熱漸深故四肢逆而不温也及至厥陰則手足厥冷是又甚於逆四逆散以散傳陰之熱

四逆散方

甘草 平 灸其

枳實 破水漬灸 乾苦寒

柴胡 苦寒

芍藥 酸微寒

內經曰熱淫於內佐以甘苦以酸收之以苦發之枳實甘草之苦甘以泄裏熱芍藥之酸以收陰氣柴胡之苦以發表熱

右肆味各拾分搗篩白飲和服方寸匕日參服

欬者加五味子乾薑各伍分并主下痢 肺寒氣逆則欬五味子之

酸收逆氣乾薑之辛散肺寒并主下痢者悸者加桂

枝伍分 悸者氣虛而不能通行心下築二然悸也桂猶圭也引導陽氣若執以使小便

不利者加茯苓伍分 茯苓味甘而淡用以滲泄腹中痛者加附子

壹枚炮令坼 裏虛遇邪則痛虛泄利下重者先以水伍

升煮薤白參升煮取參升去滓以散參方寸匕內湯

中煮取壹升半分溫再服也加薤白以泄氣滯少

陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯

主之下利不渴者裏寒也經曰自利不渴者屬太陰

不得眠以其藏寒故也此下利嘔渴知非裏寒心煩

水穀經曰復不止當利其小便便此之謂故少陰病

得之二三日口燥咽乾者急下之宜大承氣湯傷寒

五六日邪傳少陰則口燥舌乾而渴為邪漸深也今

少陰病得之二三日邪氣未深入之時便作口燥咽

乾者是邪熱已甚腎水乾也急少陰病自利清水色

純青心下必痛口乾燥者急下之宜大承氣湯少陰

也青肝色也自利色青為肝邪乘腎難經曰從前來

者為實邪以腎蘊實邪必心下痛口乾燥也與大承

氣湯以下實邪少陰病六七日腹脹不大便者急下之宜大

承氣湯此少陰入府也六七日少陰之邪入府之時

腎水則乾急以救腎水少陰病脉沉者急温之宜四逆

湯既吐且利小便復利而大汗出下利清穀內寒外

温者彼虫寒甚然而不云急温此少陰病脉沉而云急

此初頭脉沉未有形證不知邪氣所治之將發何病是

急温之四逆少陰病飲食入口則吐心中温温欲吐復

不能吐始得之手足寒脉弦遲者此胃中實不可下

也當吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也急温之

宜四逆湯傷寒表邪傳裏至於少陰少陰之脉從肺

飲食入口則吐心中温温欲吐陽受氣於胃中而不散者

留於胃中則吐胃氣不得宣發於外是以始得之手足

寒脉弦遲此是胃中實不可下而當吐其膈上有寒

飲亦使人心中温温而手足寒吐則物出嘔則物

不出吐与嘔別焉胃中實則吐而物出若膈上有寒

飲則但乾嘔而不吐也此不可吐可吐与四逆湯以温

其少陰病下利脉微澁嘔而汗出必數更衣反少者

當温其上灸之脉微為三陽澁為二血下利嘔而汗出三陽二血也津液不足裏有虛寒

必數更衣反少者温其上以助其陽也灸之以消其陰

辨厥陰病脉證并治第十二

厥陰之為病消渴氣上撞心中疼熱飢而不欲食

食則吐衄下之利不止和傳厥陰則熱已深也邪自

乾未成渴也邪至少陰者口燥舌乾而渴未成消也

至厥陰成消渴者熱甚能消水故也飲水多而小便

少者謂之消渴木生於火肝氣通心厥陰客熱氣上

撞心者謂之消渴木生於火肝氣通心厥陰客熱氣上

動聞食臭入府胃虛客熱飢不欲食此熱在厥陰經也若便下

和相乘必吐下不止厥陰中風脉微浮為欲愈不浮

為未愈脉微浮為邪氣還表向汗之時故云欲愈

厥陰病欲解時從丑至卯上厥陰木也王於卯丑寅向王故為解時厥

陰病渴欲飲水者少少與之愈邪至厥陰為傳經尺欲汗之時渴欲得水

者少少與之胃氣得潤則愈諸四逆厥者不可下之虛家亦然

者四肢不溫也厥者手足冷也皆陽氣少而陰氣多故不可下虛家亦然下之是為重虛金匱玉函曰虛

者十補勿傷寒先厥後發熱而利者必自止見厥復

利陰氣勝則厥逆而利陽氣復則發熱利必自止見厥則陰氣還勝而復利也傷寒始發

熱六日厥反九日而利凡厥利者當不能食今反能

食者恐為除中食以索餅不發熱者知胃氣尚在必

愈恐暴熱來出而復去也後三日脉之其熱續在者

期之旦日夜半愈所以然者本發熱六日厥反九日

復發熱三日并前六日亦為九日與厥相應故期之

旦日夜半愈後三日脉之而脉數其熱不罷者此為

熱氣有餘必發癰膿也始發熱邪在表也至六日邪

厥反九日陰寒氣多當不能食而反能食者恐為除

中除去也中胃氣也言邪氣大甚除去胃氣胃欲引

食自救故暴能食此欲勝也食以索餅試之若胃氣

絕得麩則必發熱若不發熱者胃氣尚在也恐是寒

極變熱因暴熱來而復去使之能食非除中也金匱

要畧曰病人素不能食而反暴思之必發熱後三日

脉之其熱續在者陽氣勝也期之旦日有夜半愈若

旦日不愈後三日脉數而熱不罷者為熱氣有餘必

發癰膿經曰數脉傷寒脉遲六七日而反與黃芩湯

不時則生惡瘡

徹其熱脉遲為寒今與黃芩湯復除其熱腹中應冷

當不能食今反能食此名除中必死傷寒脉遲六七

反與黃芩湯寒藥兩寒相搏腹中當冷不消穀則

不能食反能食者除中也四時皆以胃氣為本胃氣

已絕故傷寒先厥後發熱下利必自止而反汗出咽

云必死

中痛者其喉為痺發熱無汗而利必自止若不止必

便膿血便膿血者其喉不痺傷寒先厥而利陰寒氣勝也寒極變熱後發熱

下利必自止而反汗出咽中痛其喉為痺者熱氣上行也發熱无汗而利必自止利不止必便膿血者熱

氣下行也熱氣下而傷寒一二日至四五日而厥者

必發熱前熱者後必厥厥深者熱亦深厥微者熱亦

微厥應下之而反發汗者必口傷爛赤前厥後發熱者寒極生熱

也前熱後厥者陽氣內陷也厥深熱深厥微熱微隨陽氣陷之深淺也熱之伏深必須下去之反發汗者

引熱上行必口傷爛赤內傷寒病厥五日熱亦五日

設六日當復厥不厥者自愈厥終不過五日以熱五

日故知自愈陰勝則厥陽勝則熱先厥五日為陰勝至六日陽復勝熱亦五日後復厥者陰

復勝若不厥為陽全勝故自愈經曰發熱四日厥反三日復熱四日厥少熱多其病為愈凡厥者

陰陽氣不相順接便為厥厥者手足逆冷是也三手之

三陽相接於手十指足之三陰三陽相接於足十指陽氣內陷陽不與陰相順接故手足為之厥冷也

傷寒脉微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安時者

此為藏厥非為虵厥也虵厥者其人當吐虵令病者

靜而復時煩此為藏寒虵上入膈故煩須臾復止得

食而嘔又煩者虵聞食臭出其人當自吐虵虵厥者

烏梅圓主之又主久利方藏厥者死陽氣絕也虵厥雖厥而煩吐虵已則靜不

若藏厥而躁無暫安時也病人藏寒胃虛虵動上膈聞食臭出因而吐虵与烏梅真温藏安蟲

烏梅圓方

烏梅參百箇味酸温細辛陸兩辛熱乾薑拾兩辛熱黃連壹斤苦寒

當歸四兩辛温附子陸兩辛熱蜀椒四兩去汗辛熱

桂枝陸兩

人參六兩

黃蘗陸兩

肺主氣肺欲收忌食酸以收之烏梅之酸以收肺
氣脾欲緩忌食甘以緩之人參之甘以緩脾氣寒
淫於內以辛潤之以苦堅之當歸桂椒細辛之辛
以潤內寒寒淫所勝平以辛熱薑附之辛熱以勝
寒虻得甘則動得苦則安
黃連黃蘗之苦以安虻

右拾味異搗篩合治之以苦酒漬烏梅壹宿去核

蒸之伍升米下飯熟搗成泥和藥令相得內臼中

與蜜杵貳千下真如梧桐子大先食飲服拾圓日

參服稍加至貳拾圓禁生冷滑物臭食等

傷寒熱少厥微拍頭寒默默不欲食煩躁數日小便

利色白者此熱除也欲得食其病為愈若厥而嘔皆

脇煩滿者其後必便血指頭寒者是厥微熱少也默默不欲食煩躁者邪熱初傳

裏也數日之後小便色白裏熱去欲得食為胃氣既
和其病為愈厥陰之脈挾胃貫膈布脇肋厥而嘔胃
脇煩滿者傳邪之熱甚於裏也厥陰肝主血後
數日熱不去又不得外泄迫血下行必致使血病者
手足厥冷言我不結胃小腹滿按之痛者此冷結在
膀胱關元也手足厥不結胃者無熱也小傷寒發熱
四日厥反三日復熱四日厥少熱多其病當愈四日
至七日熱不除者其後必便膿血先熱後厥者陽氣
邪氣在表至四日後厥者傳之陰也後三日復傳陽
經則復熱厥少則邪微熱多為陽勝其病為愈至七
日傳經盡熱除則愈熱不除者為熱氣傷寒厥四日
有餘內搏厥陰之血其後必大便膿血傷寒厥四日

熱反三日復厥五日其病為進寒多熱少陽氣退故

為進也傷寒陰勝者先厥至四日邪傳裏重陰必陽

者傳作再經至四日則當復熱若不愈而復厥
至五日厥不除者陰勝於陽其病進也傷寒六七

日脉微手足厥冷煩燥灸厥陰厥不還者死傷寒六七日則

正氣當復邪氣當罷脉浮身熱為欲解若反脉微而厥則陰勝陽也煩燥者陽虛而爭也灸厥陰以復其

絕不能復正而死傷寒發熱下利厥逆躁不得卧

者死傷寒發熱邪在表也下利厥逆陽氣傷寒發熱

下利至甚厥不止者死手足寒五藏氣絕於內者利下

不禁傷寒發熱為邪氣獨甚下利傷寒六七日不利

便發熱而利其人汗出不止者死有陰無陽故也傷寒

至七日為邪正爭之時正勝則生邪勝則死始不下利而暴忽發熱下利汗出不止者邪氣勝正陽氣脫

也故傷寒五六日不結胃腹濡脉虛復厥者不可下

此為亡血下之死傷寒五六日邪氣當作裏實之時

虛者亡血也復厥者陽氣少也不可下下之為發熱

重虛故死金匱玉函曰虛者重瀉真氣乃絕

而厥七日下利者為難治發熱而厥邪傳裏也至七日

汗出而解反下利則邪傷寒脈促手足厥逆者可灸

氣勝裏氣虛則為難治

之為陽虛不相接灸之以助陽氣

裏有熱也白虎湯主之滑為陽厥氣內陷是裏熱也

足厥寒脈細欲絕者當歸四逆湯主之手足厥寒者

溫四未脈細欲絕者陰血內弱脈行不利與當歸四逆湯助陽生陰也

當歸參兩 辛溫 桂枝參兩 辛熱 芍藥參兩 酸寒 細辛參兩 辛熱

大棗貳拾伍 甘溫 甘草貳兩 炙 甘平 通草貳兩 甘平

內經曰脈者血之府也諸血者皆屬心通脈者必先補心益血苦先入於心當歸之苦以助心血心

苦緩急食甘以緩之大棗甘草通草之甘以緩陰血

右柴味以水捌升煮取參升去滓温服壹升日參服

若其人内有久寒者宜當歸四逆加吳茱萸生薑湯

主之生薑辛温以散久寒大汗出熱不去内拘急四

肢疼又下利厥逆而惡寒者四逆湯主之大出汗出則

反不去者亡陽也内拘急下利者寒甚於裏四肢大

汗若大下利而厥冷者四逆湯主之大出汗若大下利

津液損陽氣則一也陽虛陰勝病人手足厥冷脉乍

緊者邪結在胃中心中滿而煩飢不能食者病在胃

中當須吐之宜瓜蒂散手足厥冷者邪氣内陷也脉

沉今脉乍緊知邪結在胃中為實故心下滿而煩胃

中無邪則喜飢以病在胃中雖飢而不能食與瓜蒂

散以吐胃傷寒厥而心下悸者宜先治水當服茯苓

甘草湯却治其厥不尔水漬入胃必作利也金匱要

停心下甚者則悸厥雖寒勝然以心下悸為水飲內甚先与茯苓甘草湯治其水而後治其厥若先治厥

則水飲浸漬入胃必作下利傷寒六七日大下後寸脉沉而遲手

足厥逆下部脉不至咽喉不利唾膿血泄利不止者

為難治麻黃升麻湯主之傷寒六七日邪傳厥陰之時大下之後下焦氣虛陽

氣內陷寸脉遲而手足厥逆下部脉不至厥陰之脉貫膈上注肺循喉嚨在厥陰隨經射肺因亡津液遂成

肺痿咽喉不利而唾膿血也金匱要畧曰肺痿之病從何得之被快藥下利重亡津液故得之若泄利不

止者為裏氣大虛故云難治与麻黃升麻湯以調肝肺之氣

麻黃升麻湯方

麻黃貳兩半去節甘温

升麻一兩一分甘平

當歸一兩一分辛温

知母

寒苦

黃芩

寒苦

姜蕤

甘平各

石膏

碎綿裹
甘寒

白朮

溫甘

乾薑

熱辛

芍藥

酸平

天門冬

去心
甘平

桂枝

熱辛

茯苓

甘平

甘草

炙甘平
各陸銖

玉函曰大熱之氣寒以取之甚熱之氣以汗發之
麻黃升麻之甘以發浮熱正氣虛者以辛潤之當
歸桂薑之辛以散寒上熱者以苦泄之知母黃芩
之苦涼心去熱津液少者以甘潤之茯苓白朮之
甘緩脾生津肺燥氣熱以酸收之以甘緩之芍藥
之酸以斂逆氣萎蕤門冬石膏甘草之甘潤肺除
熱

右拾肆味以水壹斗先煮麻黃壹兩沸去上沫內
諸藥煮取叁升去滓分溫叁服相去如炊叁斗米
頃令盡汗出愈

傷寒四五日腹中痛若轉氣下趣少腹者此欲自利

也傷寒四五日邪氣傳裏之時腹中痛轉氣下趣少腹者裏虛遇寒寒氣下行欲作自利也傷寒

本自寒下醫復吐下之寒格更逆吐下若食入口即

吐乾薑黃連黃芩人參湯主之傷寒邪自傳表為本自寒下醫反吐下損

傷正氣寒氣內為格拒經曰格則吐逆食入口即吐謂之寒格更復吐下則重虛而死是更逆吐下與乾

薑黃連黃芩人參湯以通寒格

乾薑黃連黃芩人參湯方

乾薑辛 黃連苦 黃芩苦 人參甘溫各

辛以散之甘以緩之乾薑人參之甘辛以補正氣苦以泄之黃連黃芩之苦以通寒格

右肆味以水陸升煮取貳升去滓分溫再服

下利有微熱而渴脉弱者今自愈下利陰寒之疾反大熱者逆有微熱

而渴裏氣方温也經曰諸弱發熱下利脈數有微熱

脈弱者陽氣得復也今必自愈

汗出今自愈設復緊為未解下利陰病也脈數陽脈也陰病見陽脈者生微

熱汗出陽氣得通也利必自愈諸緊為寒設復脈緊陰氣猶勝故云未解下利手足厥冷

無脈者灸之不温若脈不還反微喘者死下利手足厥逆无脈

者陰氣獨勝陽氣大虚也灸之陽氣復手足温而脈還為欲愈若手足不温脈不還者陽已絕也反微喘

者陽氣脫也少陰負跌陽者為順也少陰腎水跌陽脾土下利為腎邪干脾水

不勝土則為微邪故為順也下利寸脈反浮數尺中自濡者必清

膿血下利者脈當沉而遲反浮數者裏有熱也濡為无血尺中自濡者腸胃血散也隨利下必便膿

血清與圖通脈下利清穀不可攻表汗出必脹滿經曰清者溲也

者脾胃虚也胃為津液之主發汗亡津液則胃氣愈虛必脹滿下利脈沉弦者下重也脈大者為未止脈微弱數者為欲自止雖發熱不

死沉為在裏弦為拘急裏氣不足是主下重大則病

自止雖發熱止由下利脈沉而遲其人面少赤身有微

熱下利清穀者必鬱冒汗出而解病人必微厥所以

然者其面戴陽下虛故也下利清穀脈沉而遲裏有

未解也病人微厥針經曰下虛則取表邪欲解下利

脈數而渴者今自愈設不差必清膿血以有熱故也

經曰脈數不解而下下利後脈絕手足厥冷時

脈還手足溫者生脈不還者死下利後脈絕手足厥

時也周時厥愈脈出為陽氣復則生若傷寒下利日

十餘行脈反實者死下利者裏虛也故死難經曰脈不

應病不應下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脈

四逆湯主之

下利清穀為裏寒身熱不解為外熱汗出陽氣通行於外則未當厥其汗出而厥者陽氣大虛也

脈四逆湯以固陽氣

利則津液少熱則傷氣氣虛不利致後重也白頭翁湯散執厚腸

白頭翁湯方

白頭翁

二兩

黃連

苦

黃栢

秦皮

苦寒各三兩

內經曰腎欲堅急食苦以堅之利則下焦虛是以純苦之劑堅之

右肆味以水柒升煮取貳升去滓溫服壹升不愈

更服壹升

下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫

裏四逆湯攻表桂枝湯

下利腹滿者裏有虛寒先與四逆湯溫裏身疼痛為表未

解利止裏和與桂枝湯攻表

下利欲飲水者以有熱故也白頭翁

湯主之

自利不渴為藏寒去四逆湯以溫藏下利飲水為有熱去白頭翁湯以涼中

讖語者有燥屎也宜小承氣湯

經曰實則讖語有燥屎為胃實下利為腸

虛與小承氣湯以下燥屎

下利後更煩按之心下濡者為虛煩也

宜梔子豉湯

下利後不煩為欲解若更煩而心下堅者恐為穀煩此煩而心下濡者是邪熱

乘虛客於胃中為虛煩也

嘔家有穢膿者不可治嘔

膿盡自愈

胃脘有穢則嘔而吐膿不嘔而脈弱小便

復利身有微熱見厥者難治四逆湯主之

嘔而脈弱為邪氣傳

裏嘔則氣上逆而小便當不利小便復利者裏虛也身有微熱見厥者陰勝陽也為難治去四逆湯溫裏

助乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯主之

乾嘔吐涎沫者裏寒也頭

痛者寒氣上攻也去

嘔而發熱者小柴胡湯主之

經

柴胡證具

傷寒大吐大下之極虛復極汗出者以

其人外氣怫鬱復與之水以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也大吐大下胃氣極虛復極發汗又亡陽氣外邪怫鬱於表則身熱豎得水虛寒相搏成噦也傷寒噦而腹滿視其前後知何部不利利之則愈噦而腹滿氣上而不下也視其其氣前部小便也後部者大便也

傷寒論注解卷第六

釋音

蹠音拳不也

憤扶粉切

惡濕上烏路切

撞宅江切

宅江切

宅江切

宅江切