


醫聖元戎

十一卷  
終



庫文閣内			
架	函	冊	漢
内閣文庫			
番號	漢	12422	
冊數	6 ( 6 )		
函號	300	215	







厥陰證

醫壘元戎卷第十一

王朝奉厥陰例

仲景吳茱萸湯

古方治頭痛欲烈者

茱萸湯

益血丹

四物湯例

四物湯

八珍湯

活人論厥陰茱

四物蒼朮各半湯

活血丹

四物膠艾湯

芎藭湯



保安湯

當飯地黄丸

四神散

地黄膏子爽

易簡樽損四物湯

易簡熟地黄湯丸

温大湯

羌活龍胆湯

神方驗胎散

治胎不定方一或淋漓年久者

四君子湯

四物二連湯

二補湯丹

真降心丹

易簡芍飯湯

白芍茶散

又方

地黄膏子丸

靈花丸

易簡惺々散

海藏當飯丸

十全白重丸

十全悼救方

苦鍊丸

四聖丸

茴香散

蜘蛛散

八風五痺

三汁法

保安湯

易簡酒煮當飯丸

加減白重丸

王紹顏信救方

茴香湯

破聖散

錢氏捻頭散

集驗方

八風散

候氏里散



至癩痢方

頭風摩散方

烏頭湯

附子續命湯

八味丸

風痲例

五痲王獸

蝎梢丸

東垣先生驪珠丹

至寶丹

仿己地黄湯

桂枝芍藥知母湯

治脚氣衝心方

三黃湯

越婢加木湯

女香丸

鶴頂丸

百方甘露丸

易簡三生飲

五生丸

局方青州白丸子

白茯苓丸

十靈寶丹

枸杞丸

南星半夏例

易簡紅丸子

局方藜合香丸

返魂丹

八風例

局方生白丸

易簡青州白丸子

二白丸

靈寶丹

治痲方

局方紅丸子

易簡藜合香丸



局方八風丹

辰砂丸

立應散

鮮活丸

玉芝丸

局方通聖白花蛇散

仲景皂角丸例

皂莢丸

皂莢丸

祛風丸

辰砂天麻丸

麝香全蝎散

除老丸

玉液丸

人參半夏丸

木香保命丹

皂莢半夏湯

枳殼丸

備急五噎丸

小枳壳丸

換柳木香例

導飲丸

小換柳丸

三稜丸

泄水丸

錢氏利驚丸

木香定痛丸

四物附子湯

附子湯

三倍丸

大換柳丸

木香三稜丸

錢氏宣風散

守真藏用丸

仲景附子湯

仲景甘草附子湯

萬病無憂散



枳實丸

古方玄胡丸

卷第十二

厥陰證

調胃散

還陽丹

半硫丸

三寶丹

易簡來復丹

四神丹

搜風利膈丸

洗心麴蘖丸

許學士破陰丹

反陰丹

局方金液丹

楊氏五神丸

百方來復丹

龍腦大白丹

局方震靈丹

至室丹

聖功丹

不換金丹

錢氏溫白丸

局方如聖餅子

蠟氣丸

烏荊丸

老君神明散

極濟換骨丹

易簡鞭正丹

朝真丹

軟金丹

蠟梢丹

上青白附丸

易簡如聖餅子

化風丹

治傷寒將死者

化水丹

換骨丹



局方大已寒丸

易簡大已寒丸

大已寒

吳茱萸丸

小吳茱萸丸

快活丸

艾煎丸

艾煎丸

噎氣湯

奔氣湯

小七氣

戊己丸

小已寒丸

煎烏頭例

張鐵確煎烏頭蒼朮法

移刺相公神心保命金丹

佑經丸

佐經丸

玉柱杖

張鐵確方

安宜差傳到筋骨藥

硃砂例

王倪丹

造丹砂法

造梳實煎法

小硃砂丸

硃砂寒熱溫涼各有加減例

硃砂散

鶴頂丸

鎖心丸

驪珠丹

石龍散

拍龍丸



牛黃膏

御方活命金丹

金箔鎮心丹

紫花丸

治風

潔洗藥

生眉散

如聖散

化風丹

文路公療癰癩外臺方

虎睛丸

五福化毒丸

定風丹

脫蛇丸

神仙經進秀骨丹

神效膏

又方

還魂丹

局方槿皮散

聖餅子

聖惠方

活人脚氣木瓜散例

木瓜散

四斤丸

立應丸

立效丸

香附子例

立應散

定血散

斗門

脚氣木瓜丸

香附子散

活血崩脬腹痛方

霹靂散

靈花內補丸



又方

交感丸

又方

小烏洗湯

蝶蛸散

又方

地榆條

產寶方

千金方

雷氏方

又方

降氣湯

孫思邈九竅血出方

千金白壺丸

又方

又方

簡要方

正元廣利方

論傷寒雜病分二科

醫墨元戎卷第十一

趙別教授兼提學管内醫學主好古進之至治

厥陰證 先足經從湯液 後手經從雜例

王朝奉厥陰例 併二條註本出仲景傷寒論要略故錄於此湯液後

夫厥者手足厥逆也有陰厥有陽厥誤投藥

則死可不審乎 脈滑而厥者衣有寒裏有

熱白虎湯 常器之忘云下者宜用柴胡加

芒硝湯此陽厥也 張翼云冷厥者四肢逆

冷脈沈微而不數足多寧卧惡寒或引衣自

覆也其伏熱在內而厥者脈難沈伏按之至



骨而未數也其人或引飲或揚手抑足煩燥  
不得眠或奔狂或大小便不利取見皆熱證  
也宜隨證下之 假令大便難澀語奔狂宜  
兼氣湯下之小便不利奔黃宜茵陳湯下之  
若善忘而大便下黑物是兼有瘀血宜以桃仁  
兼氣湯下君奔狂宜白虎湯紫雪之類若兩  
脈俱不見者亦止以外證辨冷熱也後須參  
以脈為準 常器之云凡厥當求得病之因  
君初得病便四肢逆冷脈沈細而不數或身  
上粟起不利清穀或清便自調謂大小便如

常者必寒厥也君初得病便身熱頭痛外別  
有陽證至二三日乃至四五日方奔厥故須至  
三二日後也更以餘證而參之 孫兆云陽  
病深熱而厥暈意脈緊外證須狂語揭衣被  
也陰厥按之脈沈遲而形靜也君證不明未  
便陰陽者且與四頃凡誠之是陽厥便見熱  
証君陰厥便見寒証乃可漸進理中四逆也  
四頃凡即理中凡加甘草一結是也 高保  
外云寒厥則證多靜而了了脈雖伏君實按  
之遲而弱也熱厥外證多昏寒脈雖伏亦實



按之須按數而有力也

仲景其茱萸湯當飯四逆湯當飯四逆加

吳茱萸湯已上三茱並見陰證論

活人論厥陰茱並見陰證論

正湯散有皂莢霹靂散有火煽散

肉桂散有茱萸回湯丹有茱萸

已上四藥皆有厥陰之劑隨經取宜則可

厥陰身青黑花厥一條並見陰證略例

古方治頭痛欲烈者憑此系有高下之分

右用當飯二兩一升煮取六合如心痛細

未調服方寸匕小便出血細末酒煮服

治頭痛不言未只言三兩酒煮意在取清也

治心痛言未酒調意在取濁也乃清則行而

上濁則沈而下小便出血酒煎細末此之心

疼又熱故入下極之分故治頭治心治小便

古自有高低之分右人已分治之不得不辨其

四物蒼朮各半湯治血丹相表裏治四肢疼痛不能舉動

湯仲景治嘔而胸滿者吳茱萸湯主之

莫茱萸一升人參生薑各一兩棗三十枚

又水五升煮取三升每服七合日三如乾已



吐涎沫而頭痛者亦主之  
又南行竹投主  
大小便卒閉格不通取之度如手第二指中  
節舍之立下出

治血丹 与四物蒼朮各半湯相表  
裡治遍身骨節疼痛有神

熟地黄 當歸 白朮 白芍

續斷 人參各一兩

右細末酒糊丸相子大每六七十九丸温酒下

益血丹 治大便燥久虛七血

當歸 熟地黄 各等分

右細末煉蜜為丸彈子大一丸細嚼酒下

熟

四物湯例

四物湯 主治並見局方

熟地黄 當歸 芍藥 川芎

右依古方多不効易老四時運氣加減例与  
諸六合等湯十餘條並見二十五論婦人有  
身傷寒畜血不互用隨胎前下之宜四物加  
酒浸大黃湯及生地黄下之子母而全經云  
有故無損也四物与紫蘇飲相合為補心湯  
治虛熱四物与調胃養氣各半為玉燭散四  
物与理中湯各半流濕酒燥四物与砂仁四



君子湯各半石八珍湯保胎氣令人孕

四物膠艾湯治胎漏血崩不止

四物湯加阿膠并草艾

右通七味治諸漏不止小產胎傷產後餘血

仍作堅硬子宮不閉淋血不止數月不定互

斷血湯牡丹皮散主之

活人四物加減例

妊婦下血者加膠艾 熱与血相搏口舌乾

渴飲水加括萎麥門冬 腰中刺痛惡血不

下加當歸芍藥 血崩者加也黃蒲黃蓄芩

黃 若頭昏頂強者加茱萸蓄芩 因熱生爪者

加川芎柴胡防風 臟秘澀者加大黃蓄仁

滑泄者加官桂附子 吧者加白朮人參生

姜 大渴者加知母石膏 奔寒熱者加姜

牡丹皮芍藥柴胡 水停心下微吐逆加豬

苓茯苓防己 虛寒似傷寒者加人參柴胡

防己

潔古老人加減法救條並見二十五論雲岐子

加減法并治傷寒例並見金匱玉函經

四君子湯合四物湯為八珍湯



治女子不孕癥閉遺漏咽乾女子因服熱茶吐  
乾者亦七血損氣之取教也宜八珍湯

人參 縮砂 白茯苓 甘草

末 右藥水煎取清服

芎藭湯 易簡十全六神湯与桂正同並見局

方 治產後去血多崩中不止去血多金瘡

破傷去血多牙齦去血多去血多流一切傷

血心懸眩暈目暗耳聾拳頭欲倒

當歸 川芎 各三五

右水四升煮取一升去渣分二盞定後治

等湯茶治之

保安湯

縮砂 甘草 与四物湯各半是也

四君子湯

人參 白朮 茯苓 甘草

右四君子湯當在太陰證後條下 四君子

湯加羊葶附子桂為大半麥湯 四物加桂

湯与海藏黃芩湯各半同十全散加桂附子

芍藥為附子湯 百合四君子湯治先弱虛

人不能眠 易老八物湯並見證二十五條

論



黄芩芍药汤治血不止 四物胶艾汤桑内  
有并草 易简芍药汤 产婦诸症各随六  
經以四物湯与仲景藥各半服之其効如神  
四物湯与桂枝麻黄白虎柴胡理中四逆藥  
莫美气凉膈等皆可作各半湯 此易先用

芎大略

當皈地黄丸 安胎補虛

當皈酒浸 地黄酒蒸

桐

右細末蜜丸桐子大食前酒下五七十丸  
四物二連湯丸

治男子婦人玉心煩熱或因傷酒或因產七  
血或勞虛發熱之人宜治之

四物湯加黃連 胡黃連各等分

右以胆每服二散水二盞煎至八分温飲清  
或為細末陰丸桐子大每服二十丸膝卧温  
水下地黃預用半者

黃

四神丸 治婦人以氣心腹痛不可忍者

當皈酒洗 芍藥 川芎 各一 乾姜炮半

右細末藥而調服二匙

二神丹 治婦人男子使矣久虛氣血但亡



蒼朮 熟地黃 各等分

石細末蜜丸桐子大八九十九空心酒下

地黃膏子煎

十月株地黃二十五分取自煎汁以木炭火

一十八分熬成膏點服子蒼朮煎合點服尤

佳

真降心丹 並見局方

易簡增損四物湯

治婦人血氣不足四肢收急隨乏力少氣兼治  
產後下血過多榮衛虛損陽不和作寒乍

熱並宜治之

當歸酒洗 川芎 芍藥 人參

乾姜炒一本无 甘草 各等分

右以咀每服四錢水一盞煎至六分去渣溫  
服若產後寒熱腹中刺痛則有敗血當服五  
積散硝黃及大聖散之類若取下過多猶有  
刺痛亦宜服上二藥 一方治經血凝滯肢  
中血氣不流用四物湯加白朮官桂等合名  
六合湯且方治下血不止及妊好胎動加  
熟艾乾姜甘草阿膠黃芩等分名膠艾湯

分



一方治血痢加膠艾 治產後血燭口乾煩  
渴加括萎麥門冬 煩熱小便澀大便秘加  
大黃桃仁兩肺脹加厚朴枳實虛煩不得睡  
加竹葉人參大渴煩燥加知母石膏 一方  
治婦人血虛心腹疼痛不可忍者去地黃加  
乾姜名曰四神湯 大率產後不問下血多  
少須日進黑神散三服下血少者以大聖散  
間之至二晝以後順內若急疼痛方服四物  
湯建中湯之類若早服之則補<sub>住</sub>敗血為後  
患不淺黑神大聖非逐血藥但能推陳致新

順

多服不妨今人往往疑其逐血性寒則不看  
其用藥可見矣若惡血去多徐<sub>々</sub>補之亦不  
為晚不可姑息以貽後患且如古方用四<sub>順</sub>  
理中丸為產後進食之劑既用蜜丸又倍耳  
單耳餅特甚豈能快脾不若只用理中湯少  
損耳草素有疼飲者二陳湯之類服之為佳  
且如妊婦惡阻古方有茯苓丸內有地黃竹  
茹川芎輩能定吐服之則愈見堪劇大抵惡  
阻皆由素有疼飲以致之可用二陳湯改名  
小茯苓湯用之極効不可知也



易簡芎藭湯

治一切去血過多眩暈回絕不省人事傷胎

去血產後去血崩中去血按牙去血金瘡去血不止者心煩眩暈頭重目暗耳聾拳頭欲倒悉能治之

川芎

當歸各等分

石吡咀每服四匙水一盞半煮至七分去渣熱服無時若產後眩暈宜加芍藥服之若因去血過多則是痰飲眩暈各用二陳湯四七湯之類各見本方芎藭湯其名甚多

一名桂香散治產後腹痛不可忍者加官桂等分酒下小便名煎服之立效一名高敏湯治妊婦或子死或不死胎動每服用酒水合煮連進救服胎若已死服之即下若未死者其胎即安此藥累用之方每一失一方名佛手散治產後胎前腹痛新熱氣治產後諸疾逐敗血生新血一方半肉湯治虛損羸之腸中疼痛性寒熱吸少氣不能支持致眩自行服內搗急每服加精鮮肉一匙生薑十片水二盞煮至六分一名琥珀散臨



服

用服之則備胎易產 乃口君臣散治室女  
婦人心腹疼痛怪脉不調用水煎服 妊婦  
胎氣不安產後諸疾如酒煎服 難產倒摸女  
子死腹中先用黑豆一大合炒熟水子小便  
因灸連進數服即効 產後多用百草霜香  
白芷等分為末每服二錢童子小便好醋各  
一合沸湯浸服一服見効甚者兩服以分免  
矣 一法五積散加醋煎服亦能催生產後  
惡血住心連吐喘急心腹作痛亦用黑豆加  
生姜自然汁半合煎服此兼治腸風疝毒每

服加槐花末半錢服之三日取下血塊而愈心  
吐血亦宜服產後頭痛加荆芥煎 若崩中  
漏下失血過多不能止服桑葉不効者用  
香附子炒去皮毛每服一兩入耳草一匙沸  
湯點服仍用震靈丹問之 有白芨者加芎  
藭半兩則以白丹問云 一法治赤白芩下  
用芎藭乾姜等分為末未飲調下久服之  
皆能作効 或謂香附子乾芩則不然芩  
實血氣婦人云仙藥惟羸劣之人尤宜服  
之



易簡齋地黃丸 與校正同主治倍製並其為

方

白芍藥散 治婦人赤白帶下脛肢疼痛有神

白芍藥 二錢 乾姜 半兩

右為細末每服三匙空心濕米湯調下晚又

進一服十日作効

濕六湯

四物湯加羌活等分 一本加白朮茯苓

海藏改正上三味只為蒼朮相拌治諸痛有

神

又方与白朮相拌加

天麻 茯苓 穿山甲

石別為細末酒煮或調服亦可

羌活龍胆湯 治日赤暴赤雲翳疼痛不可忍

右四物各半兩加 羌活 防風 各三錢

草龍胆 防己 各二錢

不化鐵器研為末水浸服

地黃膏子丸

治男子婦人胎下奪脉氣塊小腹疼痛即痛  
助控暈相似或微腫陰上腫心腹痰不可忍



豆服菜

血竭炒

沉香

木香

廣茂炮

蛤蚧酥炙

玄胡索

人參

川芎

川練熟炒

生飯

芍藥

川芎

饒新炒

白朮

全蝎炒

柴胡

茴香炒

沒藥已上

隨症

分五不定

多氣者加青皮陳皮

多血者加肉桂吳茱萸

右同為細末地黃膏子凡相子大空心濕酒

下二十丸每日加一丸至三十丸

神方驗胎散

婦人三二箇月經血不行捷似雙身却疑血

滯心煩寒熱恍惚此藥可驗取之內也外以

身病急和脈索間脈推之十得八九矣

真雀腦川芎一兩 生飯全用重一兩 共用七匙 煮

右二味為細末分作一服濃煎好艾湯一盞

調下或好酒調服亦得可待三兩箇時辰間

覺臍腹微動仍頻即有胎也動罷即愈安穩

而無慮如不是胎即血滯急物行過好亦安

也如服藥後不覺効再煎紅花湯下必有神

効

好官本母



靈苑丹 治好人血脈往往三月驗胎法

真川芎 不須多少

右細末濃煎艾湯下一丸 腹內微動是有

七

治崩不定或淋病歲久者

白朮

銛 同或 汁一兩

沒藥

一錢

研破

黃丹

各半 錢

右伴將白朮銛開成汁下餘藥細末一處攪

勻乾成丸子如彈子大每服一丸 新婦裏定

內強中玄効

不 婦人月事不至是為胎閉為血不足宜服四物

湯婦人崩者是為血有餘也又服四物湯者

曰 何也答曰 婦人月事不至者內損其源不能

生故胞閉不通是血不足宜服四物湯是血

原和血之藥也婦人崩中者是血多也暴損

其原是女過妄行因湯為枯宜四物湯、足

潤燥益便之藥也

素問曰諸水病者故不得卧、則驚、則欬甚

也腹中鳴者病本於胃也薄脾則不煩則能飲

食不下者胃脘痛也身重難以行者胃募在

足也日事不來者胞脈閉也胞脈者屬心而

月



格於胞中令氣上通肺心氣不得下通故月  
事不來也

易簡惺散 並見前大陰證

劫四君子湯加木香 藿香 乾葛

治小兒泄瀉胃熱煩渴不向陰陽此一法子

錢氏意同實則泄其上逆行而南故白木

茯苓之類 官本其 保安湯 治茶揀揚刺胎動不安

黃芩 縮砂各二 酒水煎服

海藏當歸丸 治三焦受邪心跡小腹疼痛黃

風鄉等

右四物湯各半兩加防風半兩 獨活半兩

全蝎各五 茴香炒 統斷各一 玄胡索

苦練各七 木香半錢 下香各二 枳半

同為細末酒糊丸空心濕酒下三五十九大

易簡酒煮當歸丸 主治並見活法按象

千金白朮丸

治怪水通未通斷多少不白淋瀝不斷臍腹

腰痛虛弱不食經水或青或黑色如水肢體



沈重

白堊

白石脂

牡蛎

禹餘糧

烏魚骨

龍骨

細章

各二

當飯

茯苓

乾姜

黃連

桂心

人參

瞿麥

石葦

白芷

欬

白飯

附子

升草

各

為茶

切

細末蜜丸

相子大空心

酒下

二十丸

日進三

服至候未時日四五服

加減白堊丸

煎茶內加

藁本

升草

大黃各二兩

君十二癥倍

上助牡蛎

禹餘糧

烏魚骨

白石脂

龍骨

若九痛倍

白飯

升草

當飯

黃連

若七害倍

細辛

藁本

升草

花椒

茱萸

若五傷邪者倍

大黃

石葦

瞿麥



君三病信

入参 石脂 白朮 巴戟 各二分

右各隨證加減主治並見金匱

十全博救方 治橫生產難

蛇皮一條瓶子內鹽泥固濟燒黑存性每服

二錢榆白皮湯調服立效

產書云治產不須手足先見者蛇皮燒灰研面

東酒服一錢七更以茶末傳手足即須生也

王紹顏信效方云項年得腰膝痛不可忍遂以

腎風攻刺諸藥不效見傳信方有此驗立製

一劑神效故錄之

海桐皮 二兩 牛膝 川芎 羌活

地骨皮 五加皮 薏苡仁 各一兩 甘草 半兩

生地黄 十兩

右凡物淨洗焙乾細剉生地黄以竹刀子切

用錦一兩都包裹入無灰酒二斗浸冬二七

日夏七日候熟空心飲一盃或控乾焙末蜜

丸亦得

若練丸 治癩疥小腹痛神效

川練子 茴香 各二兩 附子 一兩 焙去皮脂

綿



右三味酒二升煮尽為度焙乾細末之每秤  
菜味一兩入玄胡索半兩全蝎一十八箇炒  
丁香一十八箇別為細末二味斗酒糊丸桐  
子大温酒下五十丸空心服痛甚加當歸煎  
酒下

茴香湯

練

茴香九錢三分 川練子三錢三分 甘草一兩一分  
鹽一兩七錢六分已上四味 陳皮一錢一分五分

右五味空心點服

四聖散

水

茴香炒 苦練 麩全蝎炒 胡椒量情加減  
右細末監湯煎服一法加玄胡索取香宅加  
桂附

又方破鹽丸

破故紙二兩 蘿蔔子一兩炒

右細末皂角子凡桐子大監湯空心下三五  
十凡

茴香散

茴香一兩 巴豆七箇 去皮油

右二味同炒茴香黃色去豆不用好紙上鋪



茶以盆合之一宿去火毒為末每服三錢酒調下酒糊丸亦得

錢氏捻頭丸

又茴香丸茴香良姜肉桂蒼朮酒糊丸

仲景療狐疝氣偏有大小時之上下者蜘蛛散

主之方

蜘蛛十四枚焦

桂半兩要入厥陰取  
其肉厚者

右為散每服一錢七蜜丸亦可雷公云丸

候勿用五色者兼身上有刺毛生者皆薄小者已上並不堪用丸須屋西南有徧身小尾

腹方內有蒼黃膿者真也丸用去頭足了碾

如膏投茶中用此徐方之法若仲景炊焦余

用無礙陶居士云取其細者衣領中碎忘

詩蠮螋產庭正謂此也千金治人心孔曾

塞多忘喜誤七月七日取蜘蛛者衣領中勿

使入知則永不忘也狐之名夜伏而冬見

以其疝氣處厥陰中分即人之陰募德與之

所放又狐疝名烏翠即病之名切即其名也

經亦以控切補之入作凡腫呼之入大陽受

寒血凝為癥大陰受寒氣聚為疝小兒疝氣



偏大如石厥張之方而太陰主之故芎之為  
病太陰主之以灸章門二穴麥粒大各三壯  
効  
集驗方治男子陰腫如斗大并核腫痛又取  
麻豆者

右蔓菁根搗傳之腫處

八風五痺

黃帝問曰凡之傷于人也或為寒熱或為寒中  
或為熱中或為厲風或為偏枯或為凡也其  
病各異其名不同或內至五藏六腑不知其解

問

願聞其故岐伯對曰凡氣藏於皮膚之間內  
不得通外不得泄夫凡者善行而數變曉理  
閑則濡然寒閑則絕熱而閑其寒也則寒衣  
食飲其熱也則消肌肉故使人慎燔而不能  
食名曰寒熱凡氣入陽明入胃循脉而上至  
目內紫其人肥則凡氣不得外泄為熱而目  
黃人瘦則外泄而為寒中而泣書  
凡隨四時各入五臟為各各入其門戶所中  
為偏凡  
凡氣循凡脉而上為腦凡入系頭為目凡



冷

眼寒入房汁出中風為內風  
飲酒中風為漏風  
新浴中風為首風  
右外膝理為泄風  
久風入中為腸風  
瘰泄  
肺風多汗惡風時眩短氣暴甚  
差診在肩  
色白  
心風焦心絕善怒言不可快診左口色赤  
肝風善悲色蒼嗔乾憎女子診在目下色青  
脾風急嗜四支不欲動不嗜飲食診在臍  
色黃

六

腎風面龐然浮腫脊痛奇正立德曲不利  
診在肌色黑  
胃風頭汗多惡風飲食不可腸塞不通腹滿  
失衣食寒則泄診在形衰而腹大  
首風頭面多汗惡風先一日病甚頭痛至其  
風日劫如許

渴

漏風多汗不可單衣食則汗出身軀自汗惡  
以衣濡湯不奈勞也  
泄風多汗惡風汗出泄衣以乾上漬風不能  
勞事身甚疼痛則寒



古中風之病至而治之湯泄十日以去八風  
五痺之病

八

八風謂八方之風五痺謂皮肉筋骨脈之痺  
也

靈柩經曰風從東方來名曰嬰兒風其傷人  
也內舍於肝外在於筋

風從東方來名曰弱風其傷人也內舍於胃  
外在於肌

大

風從南方來名曰飢風其傷人也內舍於  
心外在於脈

風從西南來名曰謀風其傷人也內舍於脾

外在於肉 風從西方來名曰剛風其傷人

也內舍於肺外在於皮 風從西北方來名曰

折風其傷人也內舍於小腸外在於手太陽

之脈 風從北方來名曰大剛風其傷人也

內舍於腎外在於骨 風從東北方來名曰玄

風其傷人也內於大腸外在於腋腋又解論曰

以春甲乙日傷於風為筋痺以夏丙丁日傷

於風者為脈痺以秋庚辛日傷於風者為皮

痺以冬壬癸日傷於風者為骨痺以至陰過



此者為肉痺也取謂八風五痺之病也  
按新校正之按所註引痺論令經中痺論不  
如此當之風論曰以春甲乙日傷於風者為  
肝風以夏丙丁日傷於風者為心風以季夏  
戊己日傷於風者為脾風以秋庚辛日傷於  
風者為肺風以冬壬癸日傷於風者為腎風  
痺論曰風寒濕三氣雜至合為成痺以冬  
過此者為骨痺以春遇此者為筋痺以夏遇  
此者為肌痺以至陰遇此者為肉痺以秋遇  
此者為皮痺氣穴云黃帝曰餘已知風之

處沐針之若願聞孫終難谷亦有取心乎岐  
伯曰孫終三百六十五穴會亦有忘一歲有  
溢奇邪以通榮衛稽留衛教榮溢氣謂血着  
外為癢熱內為少氣疾深急急以通榮衛見  
而深之其間取會者曰願聞難名之會岐伯  
曰內之大會為谷而小會為谿肉分之間谿  
谷之會以行榮衛以會大風邪溢氣壅脈熱  
內敗榮衛不行必將為膿肉消骨髓外破大  
咽流於筋膝必將為敗積寒留舍榮衛不居  
卷內縮筋助肘不得伸內為骨痺外為不仁余



曰不足大寒留於穀谷也穀谷三百六十五、  
穴會亦應一歲其小痺淫溢俗脈往來微鍼  
取及五法曰源痺在皮寒在脉血凝為筋屈  
不伸右骨重在肉不仁在皮膚易已在筋骨  
疼入腸則死陽多陰少為熱痺陰多陽少為  
寒痺陽少陰盛汗出為濡肌痺至陰遇此也  
五痺不已重感於邪內舍於臟各有取法淫  
溢之氣妄行隨臟取主而入為痺也行痺風  
勝周痺熱勝著痺濕勝痛痺寒勝諸痺不已  
亦益肉也下有胞痺等當在竹下

八風五痺

筋痺春遇 脈痺夏遇 皮痺秋遇

骨痺冬遇

頭風 腦風 迎風奪大寒 腦痛漏風

酒消

癩風戒癩 伏梁為風根 寢行憎風

胞痺 腸痺 熱痺當在五痺下

四時之正氣八節之風素朝天乙風氣安靜  
乃可利經脈調血氣故曆志忌之八節前後  
各五日不可灸刺以朝太乙具見天元玉冊



取 取  
 八正者取以候八风之虚邪以时至者也  
 四时者取以分春夏秋冬之气候以在时调  
 之八正之虚邪而避之勿犯也以身之虚逢  
 天之虚而虚相感其气至骨入则伤五藏故  
 曰天急君子不可不知也 海藏云豈特八  
 风而已凡遇七十二候中诸节候之气寒暑  
 温凉亦尔其变异者可避忌之 酒湿之  
 为病亦能作痺證口眼喎斜半身不遂  
 痺似中风古语不正當泄湿毒不可作风病  
 取 治之而苦汗也行義取諱甚當易簡取之

此相同見 參 蕪 飲 條 下

八风散

治捌风十二痺環腿病半身不遂筋痛皮脚  
 筋緩急痛不在一處目眩失神恍惚妄言身  
 上瘡癩面上疱起黃汗染衣燥湿不等顏色  
 尔赤尔青尔白尔黑尔寒尔热身及强一切  
 等證

- 雄 天雄 蔓荆子 白芷 防风
- 为菜 石膏 天门冬 各十兩
- 麻黄 去節 白朮 各一 桂枝 根 甘草



黃芩<sup>一斤</sup> 山茱萸 羌活 食茱萸

踰躅花<sup>各二斤</sup> 茵蔯<sup>十斤</sup> 大黃<sup>半斤</sup>

細辛 乾姜 桂心<sup>各二斤</sup> 丹參

雄黃 硃砂<sup>各一斤</sup> 別破

石二十五味為散酒調服方寸匕日一服一

月後再服十日知一日日瘥一歲可常服先

食

患熱厥者先治熱毒治四肢不收不能用力先

神不知人合三汁法

竹瀝 生薑汁<sup>各一斤</sup> 生姜汁<sup>三合</sup>

右三味相合濕煖分三服平旦日脯各一服

訖覺四肢有異以疾人多慾者加薏苡仁人

參不能屈伸者加牛膝文路公棗準取載外

臺荆瀝竹瀝法并大續命後竹瀝法並見前

四季之以其傷人也各舍本臟先外後內雜經

曰妄不受邪者乃是也

全匱要略中風歷筋病脈證治<sup>後代名醫諸書取說各取出為</sup>

法

夫風之為病半身不遂或但臂不遂者此為痺

脈微數中以使然寸口脈浮而緊之則為中



浮則為虛之寒則搏邪在皮膚浮者血虛脉  
診空虛邪賊不浮或在右邪氣及緩正氣即  
急正氣引邪喝僻不遂邪在於絡肌膚不仁  
邪右於經即重不勝邪入於筋則不識入邪  
入於臟則舌強難言口吐涎沫

侯氏黑散 外臺治風痙治大風四肢頓重心中惡寒不足者

菊花 四分 白朮 防風 當歸 各十

細辛 五分 黃芩 五兩 牡蠣 三分 人參 三分

白朮 三分 乾姜 三分 川芎 三分 桔梗 八分

桂枝 三分 茯苓 三分

右十四味為散酒服方寸匕日一服初服二  
十日濕酒下禁一切魚肉大蒜當宜冷食六  
十日止即茶查在腸中不下也熱食即下矣  
飢食自能助茶外臺有鐘乳粉三分無桔  
梗

主癩疔方

大黃 乾姜 龍骨 凝水石

滑石 赤石脂 紫石英 白石脂

石膏 各四分 炙甘草 牡蠣 煨各二兩 桂枝 去浮皮

石十二味杵齋篩以韋囊盛之取三指撮并



数

花水三升煮三沸去粗温服一升深喉云大  
人凡强少水驚痲癩癩日救十奔医取不治  
保热方効宜凡引也

防己地黄湯

治病如强状妄行獨語不休每寒热其脉浮  
者

防己一分 桂枝去皮 防己各 炙甘草二分

右四味㕮咀以酒一盃漬之一宿絞取汁取  
生地黄二升㕮咀蒸之如粟米爛篩以銅器  
盛其汁更絞地黄等汁和分再服

頭風摩散方

大附子炮去 鹽 各等分

故

右二味為散沐子以方寸匕摩臍上令柔行  
寸口脉浮而弱沉即主筋浮即主腎弱即主肺  
出入水中如水浮心歷筋黃汁去故曰歷筋  
跌陽脉浮而滑之則穀氣實浮則汗自出少陰  
脉浮而弱則血不足浮則為凡血以相搏而  
疼如掣盛人脉濡小短氣自汗出歷筋疼不  
可屈伸世皆飲酒汗出當以取致筋即疼身  
軀塊癩脚腫如脫頭眩短氣温々欲吐者以

脱



桂枝芍藥知母湯主之

桂枝皮去浮

防風

知母各四兩

麻黃二兩

甘草各二兩

附子炮去

芍藥各三兩

白朮

生薑切各五兩

右以水七升煮取三升去粗溫服七合

日三服

烏頭湯

治歷節疼痛不可屈伸

烏頭

切以蜜三升至一升用烏頭煮

麻黃去節

煎

芍藥

黃芪

各三兩

甘草一兩

右四味以水三升煮取一升去渣內蜜

衝

煎熟溫服七合不知再服之

治脚氣衝心方

右以礬石二兩將水一升五合煎數沸浸脚良

附方續命湯

治中風半身不能自收口不能言胃味不知痛處或物急不得轉側

麻黃

去節

桂枝

去皮

當歸

石膏

升麻

乾姜

人參

各二兩

川芎

一兩

杏仁十四枚去皮尖



右凡味咬咀水一斗煮取四升去粗溫服一  
升宜小汗薄覆被憑几坐汗出即愈不汗更  
服每取禁勿當風 姚云子大續命湯同兼  
治婦人產後云血者及老人小兒尤宜服  
并治但伏不得臥欬逆上氣面目浮腫古今  
詠驗方 范注云是仲景方欠兩味  
三黃湯

治中風手足拘急百筋疼痛煩熱心亂惡寒  
不下食

麻黃 去節五分 獨活 四分 細辛 二分 黃耆 二分

黃芩 三分  
右五味咬咀以水七升煮取三升去粗分溫  
三服一服小汗兩服大汗心熱加大黃二分  
脈痛加枳殼實一枚氣逆加人參三分悸加牡  
蛎三分渴加栝蒌根三分先省寒加附子一  
枚 見千金方

八味丸  
治風虛頭眩苦極口不知味肢體溫中益精  
氣附子湯方見風濕中見近効治脚氣上入  
小腹不仁



熟地黄

山茱萸

薯蕷

牡丹皮

澤瀉

桂枝

附子

茯苓

右細末煉蜜丸桐子大酒下十五丸日再服

加至二十五丸見崔氏

越婢加木湯

官本雪

治肉極熱則身體津脫腠理開汗大霍病凡下焦脚氣并治之

麻黃

去節

石黑

半斤

甘草

炙

白朮

四兩

生姜

切

大棗

十枚

右六味以水六升先煮麻黃再佛去上沫內

諸茶煮取三升去渣分溫三服惡心加附子一枚炮見千金方

凡痛例

經云因母腹中感驚凡氣而得後成人至欲

壯總矣是其源也

五痛五歎

犬痛反折上竄大叫肝也 雞痛驚跳反折

雞叫脈也 羊痛目瞪吐舌羊叫心也 蛇

癩并舌搖頭心也 牛痛目直視腹滿牛叫

脾也 豬痛如尸吐沫豬叫腎也 己上五



痲重者死病後甚者亦死 錢氏云大喜後  
食乳食多成驚痲 大哭後食乳食多成吐  
瀉服冷乳則浮青 食熱乳則浮黃 胃  
擗目左視無聲右視有聲 女夸擗目右視  
無聲左視有色相勝故也別有夸時證  
妙香丸 並見局方  
後有蝎稍丸 一名靈砂級余升  
治小兒每一粒分作一十五丸每服二丸  
蜜水下世治脈有力內熱無力外寒五十九丸治  
之

鶴頂丹 硃砂丸 錢氏抱龍丸 錢氏安神

九主治並見局方

山茱 麥門冬 凝水石 牙硝  
脫砂 龍腦

東垣先生驪珠丹 治老人虛熱皮燥不食安  
神

局方耳露丸 主治並見本條  
至寶丹 治命金丹 不換金丹 蝎稍丸  
軟金丸 並見王癘大通痺木瓜後



易簡三生飲

治卒中昏不知人事口眼歪斜半身不遂咽  
候作色痰氣上壅無問外感風寒內傷喜怒  
或六脉沈伏或指下浮盛並宜服之兼治癆  
厥飲厥及氣虛眩暈悉有神効但口開手散  
眼合遺尿声如鼾鼻者並難治療

南星 一兩

川烏

生附 各半

木香

一分

右咬咀每服半兩水二盞姜十片煎至六分  
去渣濕服或口禁不省人事者用細辛皂角  
各少許為細末以芦管吹入鼻中候噴嚏其

散

人女更然後進茶痰涎壅盛者每服加全蝎  
四枚仍用銀正丹鎮墜之一法氣盛人止用  
南星半兩木香一錢加生薑七片煎各星香  
散一法氣虛人用生附子并木香如前散煎  
名附香散亦有天雄代附子者並治卒中始  
作無不効因氣中以淨揚化蕪合香丸  
乘熱灌服仍用煎茶汁濃磨沉香一呷許再  
煎一沸服之候服煎茶已定審其的然是沉  
方用醒風湯小續命湯之類 中寒只用附  
子理中湯姜附湯類 中溫則白朮酒朮附



湯之類皆可用。中暑不錄。按世疾飲厥逆  
氣虛眩暈止用本方。

五生丸 李仲南傳治痛有神

南星 半夏 川烏 白附子

大豆 去皮秤一錢半

右細末滴水丸桐子大每服三丸至五丸不

得過七丸姜湯下

局方生白朮 治以大痛筋脈掣急

白附子 南星 半夏 川芎

已上咬咀銀器磁器內將水煮五沸取出焙

乾用

右細末糯米麩糊為丸如桐子大生姜湯下

二十丸不拘時

局方青州白丸子

治男子婦人半身不遂手足頑麻口眼喎斜

痰涎壅塞一切風病他藥取不能療者小兒

驚風大人頭風洗頭以婦人血氣並宜治之

南星 半夏 白附子

川烏

右鴉羅極細末以生絹囊盛于花水攪末去



者更以手揉令出如有查更研再入緇囊  
攤烏度於磁盆內日曬夜霧至晚棄水別用  
井花水攪又曬要未日早再換新水攪如此  
春五夏三秋七冬十日方去水曬乾後如王  
斤碎碾以糯米粉煎粉清為丸如藥豆大初  
服五丸加三服至三日後渣宜有行便能舒  
辰眼經三五日呵欠是應常服十粒以來亦  
無瘧瘴寒之患小兒驚風薄為湯下三四丸  
易簡青州白丸子 主治脩製並見本方

南星

白附子

半夏

川芎

湯

右每服五十九生薑湯下此藥本方取服丸  
類極少志難愈病今加數服之咳嗽痰實咽  
喉作声大人小兒宜加服之 一切痰涎為  
患及中風偏癱之病常服志有神効 若小  
兒深後合熱多作慢驚常雜以金液丹用之  
甚驗 男子婦人小兒小便白濁及思念過  
多致陰湯不分清濁相干此藥極能分利  
若心多驚悸夜卧不寧或復健忘甚者狀如  
癩痛皆由心氣鬱結或思慮傷脾致積飲中  
筋迷乱心經之取致也不宜遽用涼心之劑

念



且服此藥用濕胆湯佐之。若心下怔忡  
雜眩暈頭目昏沉肌肉胸動頭項強痛四肢  
痠疼手足戰栗甚者半身不遂多因痰飲使  
然若例作心病以痰治之寒濕治之必非其宜  
亦宜用之仍以刺痰飲之剋服之每不忒手  
而愈一方用南星白附子等分半夏倍之滴  
水為丸服之亦効

白茯苓丸 此皆治痼證  
南星 半夏 白木 白附子  
茯苓 白苓 各等

右細末生薑汁滴水丸藜豆大生薑湯下

三十丸每時

二白丸 此二味正溫涼不可不察

白苓 一坵 酌一兩許

右用生薑餘藥蒸熟去皮臨丸入怪粉一字  
或半錢量虛實加減丸桐子大每服二三十  
丸姜湯下小兒丸小

小靈寶丹

附子 炮二  
天麻 全蝎 炒  
白僵蚕 炒  
藿香葉 南星 炮 白附子 炮 各半兩



右細末酒糊丸相子六温酒下十五丸  
靈室丹又有草烏黑豆謂之空靈室丹  
拘杞丸

大丹明拘杞 姜屑 半夏 姜製 天麻

白卷 各一兩

右為細末好酒和作丸以生蒸餅剝裹蒸  
熱去上薄皮搗和勻如硬瀝酒些小可丸

治痢方 治大湯之明二疳為病

荊芥穗 四兩 白卷 三兩為細末

右棗肉丸相子大每服二十丸荊芥湯下

服三十丸次服四十丸次服五十丸食前服

食療云蛇脫皮主去風邪明目治小兒一百二

十種驚癇寒熱腸痔盡毒惡瘡安胎熬用治

蛇癇弄舌搖頭者宜用全脫也

狂邪顛癇不欲卧眠自賢自智屬倨妄行一躄

方此能安臟下氣

右用白雄雞一隻煮熱五味調和作羹粥食

之

右鏡味亭毒主驚病邪氣小兒誰惡疾者取

汁和誅棗煮服之又字弥古者尤佳



南星半夏例

加黃苓為小黃丸 加入參苦葶藶為定喘丸

又一法加硃砂煮半夏白附子糊丸桐子大每服十五丸生姜湯薄湯亦得

惟合治療之法並見局方

白附子炮 草拚 各一 乾 炒 黃 酒 浸 切 焙

桂支 皮 去 淨 天南星 湯 洗 乾 炒 然 汁 煮 軟

防風 去 芦 阿膠 碎 如 珠 子 藿香葉 去 梗

烏梢蛇 酒 浸 一 宿 炙 乾 去 皮 骨 用 田 八 兩 紙 五 十 小 會 煎 取

沈香

梔膠

白花蛇

酒 浸 一 宿 炙 乾 去

活

皮骨用田

羌活 去 芦

細辛根

麻黃 去 根

半夏 湯 泡 姜 汁 浸 三 日 炒 黃

羚羊角 鎊 陳皮 各 一 兩 已 上

天竺黃 研

木香

人參 去 芦

乾姜 炮

茯苓 去 皮

蔓荊子 皮 去 白

晚蚕紙 微 吹

藁朮 去 土

敗龜板 醋 酒 塗 炙 黃

桑螵蛸 炒

白芷

何首烏

未 湯 浸 煮 炮 乾

虎骨 醋 酒 塗

煅 礞 石

白朮

切 焙 乾 一 宿

枳殼 去 穢 炒

丁香

厚朴

去 蘼 皮 姜 汁 塗 炙 令 熱 已



上各三 蟬殼 去土炒 川芎 去土炒

附子 水浸炮 石斛 去根剉 肉豆蔻

龍腦 別研 牛黃 別研 硃砂 別研 水燬

雄黃 別研 水燬 鹿茸 別研 一錢

烏雞 一隻 去嘴翅足 批肝 三具 已上

內尾 醜益 蓋回 俗木 尖 金箔 二十角 為衣

右藥五十八味 並須如法製造 秤令 細煉 蜜

和合 入酥 搗三五千下 丸如 相子 大金箔

為衣 每一歲 現濕薄 荷自然 汁化下 每時

蓬朮 三稜 橘皮 青皮

胡椒 乾姜 何魏 礬石

右每服六十丸 姜湯 嚥下 大治 大人 小兒 脾

胃之 證極 有神 効但 三稜 蓬朮 木能 破癥 消

癖其 性猛烈 人不 次此 為常 服之 剉然 今取

用者 以生 產之 處 橫 札 二 葉 不 得 其 真 乃 以

紅 蒲 根 之 類 伐 之 性 雖 相 近 而 功 力 不 同 志

老 弱 虛 人 小 兒 妊 婦 以 其 治 病 不 能 傷 耗 具

氣 俱 服 之 兼 疑 此 藥 須 是 合 令 臻 至 用 好 米 之

醋 煮 陳 米 粉 糊 凡 若 脩 合 之 時 尚 去 何 魏 荅

紅 小 橘 皮 煎 治 尋 常 飲 食 取 傷 中 脫 瘡 滿 服



之應平而愈。大病之後，穀食難化，及治中  
脫停滯，醋並生姜湯下。脾寒瘧疾，生姜橘  
皮湯下。心腹脹痛，紫蘇橘皮湯下。脾疼  
作楚，芎藭湯下。酒疸，穀疸，遍身白，蒼朮  
湯下。兩脇引乳痛，沈香湯下。酒積，食積  
面黃，腹脹，或乾嘔，煨生姜湯下。婦人脾血  
作楚，及血癥，氣塊，經血不調，或過時不來，並  
用醋湯嚥下。寒熱往來者，宜服。產後，伏  
如顛，痲世，乃欺血上攻，迷乳，心神取致，尚以  
此藥。熱醋湯下，其効尤速。男子，婦人，有願

痲患者，未必皆因心經蓄熱，亦有膽氣不固  
舒遂致痲，飲上迷心，竅故成斯疾。若服涼劑  
過多，則奪見，發乳常以此藥。衣以辰砂，用橘  
葉煮湯嚥下，名小鎮心丸。妊婦患但嘔吐  
全不飲食，百藥不治，惟此最妙。乃佐二陳湯  
服之，但入疑其控胎，必不信服，每易為用之。  
時有神効，但必妊婦服之。此後偶爾損動，必  
敏於此藥，故不散極言不効。

局方紅丸子  
治丈夫脾積，滯氣，胸膈滿悶，面黃，腹大，四肢







右細末入研葉勻用安息香膏并煉白蜜和  
剖每服旋凡桐子大早取并花水濕冷任意  
化服四凡老人小兒可服一丸濕酒化服空  
心服之用蠟紙裹一丸如彈子大緞箔袋盛  
帶心剪之一切切心不敢逆

易簡蘊合香丸 主治脩製并見前局方

每服一二丸沸湯少許化服治卒中昏不知  
人事及霍亂不止及心腹撮痛鬼疰客忤癩  
癩驚怖或跌撲傷損多暈欲倒丸是倉卒之  
患悉能治療丸隨身不可暫闕碎諸急丸

禦山災障丸無以喻此若吊喪間病之處尤  
不可無但亦難取賣多用腦子宜以火上焙  
去能者以酒調服若用心過度夜卧不安尤  
宜服切効不可具述

返魂丹

治小兒諸風癩癩潮奔痰癡口眼相引項背強  
真牙固緊急日睛上視及諸病久虛去虛  
以多睡皆因在菴不解宜服之

烏犀 鎊屑 水銀 半兩  
天麻 酒洗 枳椇 各半  
硫黃 半兩 烏末 用磁  
壺慢火養却入



八爪例

水銀急炒去青成砂  
研要知緊慢  
煙少許合舊新土卷  
三冷取出

獨活 去芦  
川烏 燒通  
乾蝎 炙

海藏云撓萬物者莫疾乎風之者百病之長善  
行而數變衝蕩吹擊而無窮從前未者為虛  
邪後未者為實邪也自病者為正邪假令春  
得金爪是為賊邪非認歸之爪為賊爪也故  
古人云虛邪賊爪避之有則

局方八爪丹

半夏 白卷製兩  
白殭蚕 炒  
白附子 炮各五錢

滑石 研

天麻 酒浸

龍腦

麝香

研各三錢半

寒水石 燒赤水飛半斤

右細末入碾菜再碾勻煉蜜丸櫻桃大細嚼  
一丸荆芥湯茶湯任下食後服

辰砂天麻丸

天麻 二兩

南星

二兩 姜浸 川芎 二錢

白附子 炮五錢

白芷 一錢八分半

麝香 二錢二分半

硃砂 五錢一分半入  
茶一半為衣

右細末水糊丸相子大荆芥湯下二十九盒  
時



辰砂丸 治心热驚風痰涎壅塞

神砂 半兩 半夏 兩 煨 蝎梢 煨 一 白附子 二 煨

半身 白僵蚕 煨 二 匙 半 牛黃 別 研

鵬砂 別 研 各 一 匙

右細末糊丸相子大生薑煎茶湯下二十丸

每時

麝香全蝎散 治小兒驚癇

麝香 碎砂 各 半 錢 全蝎 一 箇 大 者

右三味碾爛熱酒調下空心

立應散 治急慢驚風

射香 少許 蝎梢 全頭 蝎 腦 分 兩

右為末細鼻內噴隨左右用之

徐老丸 推蒸皆生用 常服皆聚

茵星 半夏 蛤粉 白朮

乾姜 大黃 黃連 黃柏

牽牛

解語凡 治中風言語 逆次不正

白附子 石菖蒲 遠志 全蝎

羌活 天麻 南星 白姜蚕

右為細末蜜丸豆大服之



玉液丸 主治 聖藥 五

半夏洗 白朮 寒水石

玉芝丸 主治 並見本方

人參 白朮 茯苓 南星 半夏

薄荷

人參半夏丸 上玉芝

藿香 黃連 黃蘗 乾姜 寒水石

右未之上主藥並用糊為丸

右子藏用丸相和為搜風丸与金花丸相合為

軟金花丸

局方通聖白蛇散 主治 並見本條

天麻 赤芍 防風 厚朴

藁朮 海桐皮 草棉 木香 不見

肉桂 杜仲 白蛇 山藥

當歸 威靈仙 白附子 甘草

菊花 蔓荆子 郁李仁 羌活

虎骨 白芷 乾蝎 牛膝 酒浸

各等

右細末每服一錢或二錢温酒調下荆芥湯

亦得空心服之久病之人宜服之



木香保命丹

通聖白花喝細散 一星燥蚕獨射均攤  
蜜丸如彈朱衣色 便是木香保命丹

仲景皂角丸例

皂莢丸 治咳嗽上氣燥渴立坐不卧

皂角一物將朱蜜丸桐子大之膏膏汁下

一法加半夏一法加大黃一法加細辛利膈

一法加槐莢子青皮半夏黑牽牛 右用

生姜糊丸桐子大生姜湯下一十五丸 孫

真人治大小便不通因格不利燒皂莢粥飲

下三錢立通

崔元慶治咳嗽脈脹

皂角去皮弦

右細末蜜丸桐子大肉汁下十丸利後忌肉

一月

神 皂角為君 一法加神曲 麥蘖

半夏 白朮 南星

青皮 陳皮 白芷

右細末姜糊丸桐子大每服三十丸姜湯下

硃砂為衣



皂莢半夏湯 治痰胸中不散

皂莢五大錠打碎半夏五兩二味同煮一

日去皂莢取半夏曬乾為散每服一錢水

一鍾生姜十片芎藭白三莖蒸六分去查濕

服每時

衍義云 治以涎潮熱寒氣不通

皂莢負一白朮生半輕粉半錢

史 右末之水調一二錢灌之須更吐涎用凡者

分臈下涎也

皂莢治喉閉遠巡不救方

皂莢 去皮子生半兩為細末煎取黑汁右痛亮更以醋糊菜末厚塗項上須

史便破血 出互効

皂莢丸 治咳嗽久不差

皂莢 不以多少去皮弦 肺膈炎蒂去子

右為細末蜜丸相子大每服十丸聽臥菜白

皮煎湯下

治暑中久痛濕熱

皂角子蒼朮燒之以碎濕熱疫氣濕邪

治遠年近日休息痢皂莢不蛀者不以多少

土磚燒有焰盆子合定以土圍之存性搗為



未每服二錢茶末一錢相和  
白湯點服病雖  
大不過三五服愈日可二服

枳殼丸

皂角 二兩酥炙  
去皮子弦 枳殼 二兩  
缺炒 木香

枳擻 半夏

桐

右為細末姜糊丸桐子大姜湯下三十丸食  
後臨卧服

祛風丸

皂莢 者 車前 赤菴 木香

枳柳 枳實 大黃 牽牛

青皮 陳皮 半夏 各等

右為細末米飲丸桐子大三十丸姜湯下

備急五噎丸

皂莢 乾姜 桂 各等

右為細末蜜丸桐子大每服五丸酒米飲仕

下

小枳殼丸

枳殼 茯苓 白朮 乾姜

半夏

右等分細末姜糊丸桐子大姜湯下三十丸



枳柳木香例  
導飲丸

枳殼 木香 枳柳 青皮

白木 陳皮 半夏 茯苓

三棱 廣茂 各等分

一法如掌牛用生薑自然汁糊為丸

三倍丸 木香 二兩 青皮 二兩 半夏 三兩

石細末姜糊丸姜湯下

小枳柳丸

木香 一兩 二錢半 枳柳 三兩 枳實 一兩 五錢

大黃 五兩 牽牛頭末 二兩

右細末水丸如青皮為多錢凡一法去大黃

加乾姜以其取傷有寒熱之異也去枳殼大

黃加陳皮乾姜為枳柳丸

大枳柳丸

木香 枳柳 黃連 黃蘗

廣茂 香附子 牽牛頭末 生飯

大黃 枳殼 青皮 陳皮 各半

右二葉生薑糊丸綠豆大姜湯下二十九丸並



實熱入可以服  
一法枳實木香枳櫛香皮  
陳皮三稜廣茂枳殼大黃牽牛為細末糊丸  
相子大 一法去大黃牽牛如神麴麥蘖

三稜丸

治男子婦人癥瘕痞積聚成塊不散堅滿

胸膈痞悶飲食不下兩服時痛一切腹脹積

聚等證並皆治之

又參五錢 木香 枳櫛 各三

三稜 廣茂 枳殼 白朮

右細末生姜汁糊丸相子大臨臥姜湯下

三四十九 一法為散每日空心沸湯調服

晚 三錢早上各二服

木香三稜丸

木香 半兩 三稜 廣茂 香附子

右加耳遂為泄水丸 加耳遂牽牛苗香為

泄水散姜汁調下 子和泄水丸藏用丸一

料加耳遂一兩

泄水散

牽牛 苗香 木香

耳遂 三錢



右為細末姜汁調一二錢服

錢氏宣風散

右為細末食茶蜜水調服半錢或一錢

錢氏初驚丸

右細末蜜丸

軟金丸

守真藏用丸

遍身疼痛者加白芥子為心痛

丸

解

大熱瘧疾者加芫硝為解毒丸 腸胃燥澀

者加郁李仁為潤腸丸 日久歲積加蜜陀僧

則為消積丸 加桃仁為桃仁丸 加桂陳

橘皮茴香為和中丸 加木香枳椇為彌善

通聖散加 地骨皮 井菊花 生地黃

加蜜丸通聖菊聖丸 加天麻井菊熟地黃蜜

丸為通聖天麻丸 右藥丸如彈子大每服

一丸

大抵通聖散解利治實人外傷傳濕有形大便



六結者効作仲景本藥也子易老羌活散加大  
必黃同意若內傷冷物寸口脈小者更證必矣

戒之

泄水丸散治脚瘡中痛法在十惠湯後益一飲

分也

木 女香定痛丸

治遠年近日患腰脚疼痛不能起坐灸血凝  
滯走注疼痛一切疼痛

木香半兩

青皮半兩

陳皮

茴香

桂枝

川芎

大黃

黑牽牛

一本作  
七錢

并遂

沒藥

白芥子

一炒

錢半

五畝

三錢

右細末酒糊丸桐子大每服十五丸二十九丸

食茶臨臥溫湯下

仲景附子湯此下五方宜去少陽條下

附子

人參

白朮

茯苓

為藥

四物附子湯

治風濕相搏骨節煩痛四肢拘急不可屈伸  
近日則自汗出而氣短小便不利惡風不欲



去衣或頭面手足皆浮腫  
附子炮一桂心八錢白朮六錢甘草四錢  
生薑六錢

右或咀水一升半煮取八合分三服微汗出  
對病加減 大汗煩者三服三合身重者  
亦加防己八錢 悸多小便不利者加茯苓六  
錢

仲景其草附子湯 此四物附子湯每乾姜  
附子湯 此尚在四君子湯條下  
治濕痺後凡身疼痛如折肉骨割准刺

四君子湯加桂附芍藥 白朮附子為君而多  
右七味水一升煮六合分三服對證增損  
易簡附子湯 以附子同在少陰姜附湯下  
萬病無憂散

木香 胡椒各半 黃耆 木通

陳皮 桑白皮 白朮各一 黑牽牛六

右七味細末二錢七牽牛末二錢七空心姜  
湯調下

積實丸 積實三錢 大黃 牽牛各半



右三味為末子子和細水丸為小兒通腸丸  
如皂角為祛風丸

搜風利福丸

天黃煨 牽牛 炒各 二兩 芫硝 半兩

右細末糊丸綠豆大量虛實加減

玄胡例

右方玄胡丸 此藥多在每各丸條論內外感

每也

玄胡 青皮 陳皮 錢 各五

木香 三稜 廣茂 各四

乾姜 雄黃 別礮 當歸 各三

右細末酒糊丸桐子大回五十丸

說麴蘖丸

青皮 去核 陳皮 去白

三稜 廣茂 木香

枳椇 半夏 製 白朮

麥蘖 姜屑 神麴 各等分

右為細末糊丸溫水下二三十九每時已上

元泄後用白粥一二白忌油膩肉食忌成痢

也







返陰丹 並見陰證論

半硫丸 治老弱人虛 臟腑秘結 並見局方

硫黃 半夏

局方金液丹 主治修製並見局方

上二藥並在五苓化水丹後

三寶丹

雄黃 半夏 牡蛎 硃砂

揚氏五神丸 一名耒復丹

硫黃 硃石

右同與磁器內用文武火炒得取勿令太過

須二氣透方可若未透則氣不相感

五靈脂 青皮 陳皮 等分

右件陳皮等未與硫黃硃石和勻面糊丸桐

子大此藥二氣相配陰陽均平天地平和之

氣則可熱中冷可緩可急是以治陰陽不調冷

熱相攻榮衛稍勝心腎不升降水火不交養

一切丈夫婦人嬰兒危急但胃氣在無不獲

効邪氣冷上煩燥冷氣攻急痛膈氣痛塞不

可忍腎氣眩下攻之氣滿不可轉動諸霍亂吐

瀉渴茶不止一服定大抵吐逆唇口青手足



不  
厥冷脚轉筋者兩服傷寒煩燥昏塞倒臥不  
省人事不得飲新久患崩漏泄利口問赤白  
冷熱患病深淺服數服止若非時嘔吐飲食  
不可服之立愈每服五十九空心米飲下  
者七十九重雅十九嬰兒五七九新生兒二  
三九化破與服如小兒急慢驚風若胃氣在  
雖困無不救者但是臟腑一切急病不問證  
疾並可治之非與尋常方一同乃博効救濟  
人菜也

復

易簡末後丹

主治修製並見局方

硫黃

五灵脂

橘細

玄精石

每服二十九米飲下食前此菜可冷可熱與  
養正丹黑錫丹相類但體輕不能鎮墜耳然  
硝石性寒佐以陳皮其性疏快硫黃且能利  
人若作熱菜用以止瀉誤矣但霍亂一證吐  
利交作蓋日冷食生冷或暑濕熱之氣中脘  
結閉揮霍變亂此菜通利三焦分理陰陽服之  
其效最驗兼治翻胃吧逆其效尤速中暑霍  
亂此菜最切小兒驚風用亦有驗蓋上證候



皆由涎飲中節致之此菜濕利涎飲既出則諸證悉去若男子婦人心腹作痛疎利之劑得效者未應遽補當以菜徐飲之令大便常通利則痛不復作矣嘔吐用之其意亦然不可不知腎厥頭痛老人頭痛並宜常服一法治老人並虛損之人寒氣入腹大小便不通者用生姜半兩連根葉和泥葱一根鹽一撮豆豉五十粒爛碾略炒盒胛心兩胛更易用之以利為度亦良法也

局方耒復丹

耒

此菜配類二氣均調陰陽奪天地中和之氣乃水火既濟之方可冷可熱可緩可急善治榮衛不交養心腎不升降上實下虛氣閉疼厥心腹冷痛藏府虛弱不問男女老幼危急之證但有胃氣無不獲安助真補虛救陰助陽為效殊勝

舶上硫黃夾透明不者大陰玄精石水一兩研  
硝石以半兩火燉黃並為細末入定陰陽相  
入不可火過傷菜力  
再研極細名曰二氣末  
五靈脂破石曬乾揀海杵  
臺山者用水證去



陳皮去白青皮去皮

右用五灵脂二皮為細末次之玄精石未及前二葉末拌勻以酒醋打糊為丸如硫豆大每服五十丸空心粥飲吞下甚者五十粒小兒慢驚風或吐痢不止變成風搐搦非風也胃氣欲絕故也用五粒碾細末飲送下老人伏暑逆亂紫蘊湯下婦人產後血逆上搶心悶絕并惡露不止及赤白帶下並用醋湯下常服和陰陽益神散腰骨間陰濕止眼疼痛立見神效心諸疾不辨陰陽證者並宜

眼之神異不可具述

四神丹

治百病補五藏遠疫病疔却嵐瘴除尸症盡毒鬼魅邪氣大治男子婦人真元虛損精髓耗傷形羸氣弱中滿下虛水火不交養陰陽失升降精神困倦面色枯槁亡血盜汗逆瀉失精大便自利小便滑數夢寐驚恐陽事不舉腰腿沉重筋脈拘急及治一切沉寒痼冷痲痺痲癩絞痛久泄久痢傷寒陰絕脈候沉微身涼自汗四肢厥冷婦人百病胎藏久冷

搞

大丸



結孕無子赤白帶下因候不調服諸藥久不  
差並皆至之此丹假陰陽造化之功得天地  
中和之氣却尋常一煨一煉借燥丹藥功  
効不同此丹治血實髓安竟定竟悅澤顏色  
輕身保封苟不恃藥力縱情恣欲久服之  
可通仙道

雄黃

硫黃

雌黃

朱砂

右件四味各五兩碾細入皂合內將馬鞭草  
為末監泥固濟慢火四圍煨煨一日一夜取  
出再碾細以糯米糝和為丸如棗豆大每服

一丸空心新汲水吞下妊婦勿服忌羊血蕪  
菜

龍腦大白丹

治風壅偏正或疼癢膈不利四肢拘急疼痛

辟風邪清神志

硫黃

硝石

各二兩

白附子

炮為末

右件入龍腦少許同碾細滴水丸雞頭大每  
服一丸細嚼荊芥湯下無時

易簡春正丹注治修製見局方

硫黃

黑錫

水銀

朱砂



右每服五十九丸食前米飲送下此菜用硫黃  
黑錫木有利性或利在丹菜用以補虛冷治  
泄瀉之類大不得其宜若卒中之患痰涎壅  
盛此鎮墜便大便溏利病亦隨去則於三生  
飲選菜為之湯液

若氣虛喘急之患或癆咳沉附煎湯調鐘  
乳粉咽下於降氣湯中選用之 若翻胃之  
患皆因中脘停寒涎痰凝滯食入即吐當用  
此菜以丁香附子之類煎湯下但丁香桂枝  
恐為痰飲隔節蓄右上焦反為僭燥則於二

陳湯中選菜用之凡治嘔者先以加減感應  
丸微利之次用此菜無不尅效半硫丸亦在  
性利用之尤當切仍以水煮半夏丸服之見  
二陳湯後 若脚氣之患入腹衝心或見吧  
吐之證無法可療千金以大黃利之大黃性  
寒病既深入必難導達是速其吧吐也不若  
用此菜或黑錫丹末復丹之類煎降氣湯下  
便須多服以大便流利為度脚氣每補法此  
在利性即非補菜服之無疑 瘰癧疝氣膀  
腕奔豚之氣入腹者亦宜用此 若尊年之



人大腑寒秘者尤宜服之黑錫丹与此同類亦效

局方震靈丹

紫府丸君南兵魏夫人方出道藏一名紫金丹此丹不化金石飛走有性之菜不備不燥奪造化中和之氣又治男子婦人真元衰備心五勞七傷脗腹冷痛肢體痠痛上盛下虛頭目眩暈心神恍惚血氣衰微又中風癱瘓手足不遂筋骨拘急腰膝沉重容枯肌瘦目暗耳聾口舌乾苦飲食無味心腎不足精滑夢

遺腰腹痲墜小便淋瀝夜多盜汗久泄久痢嘔吐不食八爪五痺一切沉寒痼冷服之如神及治婦人血氣不足崩漏虛損帶下久冷胎臟每子服之無不愈者

禹餘糧石以火煨碎不計遍數丁頭代赭石

亦如禹餘糧石煨法赤石脂紫石英各四兩

右四味並用乾鍋內鹽泥因濟候乾用炭十斤煨通紅火盡為度入地坑埋出火毒二宿

滴乳研二兩沒藥去炒石研二兩五灵脂去研二兩

朱砂大飛過一兩



右通前茶共八味並為細末以糯米粉煮粥  
為丸如雞頭大曝乾出光每服一丸空心溫  
酒冷水亦得常服鎮心神駐顏色溫脾胃理  
腰膝除尸瘧盡毒辟鬼魅邪厲久服輕身漸  
入仙道忌猪羊血恐減菜力婦人醋湯下孕  
婦不可服極有神効

朝真丹

治腸胃虛弱內受風冷或食生冷內傷泄瀉  
暴下日夜無度腸鳴腹痛手足厥冷

硫黃生一兩研 枯礬七錢五分 朱砂二錢一分

右合勻水漫蒸餅為丸桐子大米飲下三十  
丸無時夏月宜用以備急諸沉寒痼冷之疾  
諸熱茶不能效者多飲元五七壯即效

至寶丹脚氣赤在方寒熱處三日及  
有用紅雪紫雪及諸元藥者

軟金丹 人參 天麻 白姜蚕 菖蒲

乾蝟各半兩 防風 半夏牛膽製 白茯苓各九錢

遠志錢 薄荷兩 黃連半兩 雄黃錢二

烏犀鎊 玳瑁 琥珀 朱砂

天竺黃各三錢 龍腦半 麝香



牛黃

金銀箔

已上七兩九錢一字通碾細再拌白蜜十兩  
濕漉紙覆取蠶泔次日再煨和菜末每兩作  
十五丸茶酒任下

海藏云初病疾不互服至寶丹小兒微疾亦不  
宜服五寶丹大抵凡毒始自皮毛入留孫絡  
絡不已流入大絡小絡不已流入大經小經  
不已流入骨髓先湯液次丸散次丹劑丹劑  
為凡入骨髓不能得出故用入骨髓透肌膚  
之劑為開竅痛之藥龍麝牛雄犀珀金硃皆

入骨髓透肌膚之劑而便凡邪得以出於外  
也初病凡疾未及於裏便服入透骨肌之藥  
是引賊入家如油入麵不可出也其互招容  
如卅大抵疾有淺深治有次序初至淺不  
可以重劑治兼之小兒傷冒細小肌肉莫脆  
遽以入骨透肌之藥治之若在他證草木之  
劑不可也富貴之家深宜戒此若遇潮涎  
不省疼證急甚不拘此例事至不得已而用  
之是謂得宜其當實猶之射也高則過下則  
不及要之適乎中而已無病人服凡藥開竅



過極及便風入亦猶引賊入家与每病在經  
而服至宝丹每異

聖功丸 血專治痢

臧粉 七錢 定粉 七錢 一法加蛤粉錢

右同研勻水浸蒸餅為丸菘豆大剪艾湯下  
五七丸或十丸

蝎稍丸 功當在後

治急風牙噤驚癇搐搦眼目不定恍惚潮涎  
昏悶不省人事利胞膈清頭目化疼實寧心  
神安藏府

蝎稍 微炒 白附子 炮 天麻 龍腦

朱砂 研 半夏 湯洗製

右細末白麵糊丸菘豆大每服三十丸細嚼  
薄荷湯下臨臥服

不換金丹

荆芥穗 一兩 薄荷 二兩 天麻 一兩 甘草 一兩

白薑蚕 一兩 防風 一兩 藿香葉 一兩 細辛 一兩

川芎 白附子 羌活 全蝎 炒各半兩

朱砂 二錢

右未蜜為丸彈子大每服一二丸茶下



治破傷風

蝎梢七條為細末熱酒

上青白附丸錢氏濕

白附子炮白薑蚕天南星半夏

天麻川芎甘菊花旋覆花

陳皮各一兩全蝎半兩

右細末薑糊丸桐子大每服三十丸薑湯下

錢氏濕白丸

治小兒脾氣虛困泄瀉瘦弱冷痺洞利及因吐浮或久病後慢驚身冷痰癥

天麻薑蚕炮白附子生

乾蝎炮去足南星

右細末湯浸寒食麵丸菘豆大丸子仍以寒食麵養內七日取出每服七丸加至二三十

丸空心生姜末飲湯下漸加元數

易簡如聖餅子備台治療治之法

川烏南星乾姜中甘草

川芎天麻防風半夏姜製

右每服二十餅嚼破生姜湯下本方只服五餅安能作効初感傷寒日汗而解尚餘頭疼

因



濃煎生姜葱白湯皆可此茶須是自合庶步  
糊少且料菜精製故易為效也一切頭疼  
不問內外取因並宜服之凡兼治中脘疼飲  
停積及療脾胃飲食取傷濕中快膈尤得其  
宜偏正頭疼茶湯下冷服之不得茶

局方如聖餅子

治男子婦人氣血上盛下虛疼飲停積風寒  
伏留陽經偏正頭疼痛連腦顛吐逆惡心目  
眩耳聾常服清頭目消風化痰煖胃

川烏皮去

南星洗

乾姜

醋一

甘草

川芎略二天麻

防風

半夏

各半兩

右細末湯浸蒸餅丸如鷄頭大捻作餅子暴  
乾每服五餅同荊芥三五穗細嚼酒任下  
漿水亦得每時

化風丹

治中風涎盛胸膈不快頭重目不開或目睛  
上視一切諸病

烏蛇生去骨

白附子炮

南星

各一兩

朱砂二兩

姜蚕一兩

麝香錢

雄黃二錢

腦子字



右蛇附星蚕為細末另入麝香朱砂等四物  
細末再碾勻煉蜜丸鷄頭大酒化下如牙關  
緊急不開以蒜一大瓣搗為泥塗在兩牙關  
外豆淋酒化下蘸菜擦牙自開更服二錢效  
如神

治患後轉浮腹脹如鼓蝎氣散

全蝎燒灰研麝香少許

右細末每服二錢匕米飲調下甚者再服必  
愈

治傷寒將死者

川芎生 南星生 半夏生 天麻生

等

右為細末每服一錢煎豆淋酒下稍溫服次  
用一二盞投之若牙關噤幹嚙之但菜得下  
無不治者

烏荆丸

川烏一兩炮 荆芥穗二兩

右為細末醋丸桐子大每服二十九溫酒送  
下熱水亦得有病日食三每病日一服此菜  
外腸風尤妙



化水丹

川烏 附子 乾姜 炮 赤石脂  
蜀椒 桂 等

右蜜丸 桐子大 每早服三丸 夜三丸 温酒下

老君神明散

白朮 二兩 桔梗 兩一 細辛 兩一 附子 炮 去  
川烏 炮 去 皮 兩一

右五味 為粗末 縫絹囊袋 盛帶之 居間里 皆  
無疾 若有疫疾 温酒服方寸匕 覆取汗 得吐  
即差 若經三四日 抄方寸匕 以水二碗 煎令

大沸去查二服

換骨丹

槐蔓 蒼桑香 歲人 防何 苦

十味 麝朱 麻 佳人 稱換骨

右製度 並見廣清宣明方

槐皮 芎朮 芷 仙人 防首 蔓

十味 各停勻 苦味 香減半

龍麝 即少許 朱砂 作衣 纏

麻黃 膏煎丸 大小 如指 彈

極濟換骨丹 服海藏 汗家忌 重發汗也



治半身不遂口眼喎邪手足不仁言語蹇塞  
或骨痛連髓或痺襲皮膚或中急爪涎潮不  
言精神昏澁行步艱難筋脉拘急左癱右瘓  
一切風疾並皆治之

槐莢子 人參 桑白皮 蒼朮

白芷 何首烏 蔓荊子 威靈

防風各二兩 五味子 苦參 香附各一兩

麝香二錢 另研 龍腦二錢 另研 川芎一兩

右十四味為細末入麝香令勻又用麻黃十  
斤去根節用天河水三石熬至六斗漉去渣

再煎至二升半入銀石器內熬成膏入煎藥  
和勻拌三五斤下每兩作十丸朱砂為衣每  
服一丸搗碎酒一盞自晨浸至晚食後飽得  
卧微攪勻服之神清每睡是茶之驗再服須  
更五日服之如中風每汗宜服若髓虛自汗  
服之是重之津液也若風盛之人當於蜜室  
中溫以取汗稍避若風寒者至室丹之類凡  
虛者靈室之類

局方大已寒丸 易簡大已寒丸同  
治久寒積冷府藏虛弱心腹疼痛脹滿泄



浮腸鳴自利自汗米穀不化陽氣暴衰陰氣  
獨盛手足厥冷傷寒陰盛神昏脈短四肢怠  
幅並宜服之

乾姜六斤 高良姜六斤 桂四斤 草揀四斤

每服五十九米飲下此藥熱燥能治藏府虛

寒滑而不利反泄浮腸鳴水穀不化若心腹

疼痛中脘停寒大便溏泄者尤宜服之

大已寒丸

吳茱萸 官桂 乾姜 良姜

烏頭 附子 一法加芍藥 一法加

茴香引陽氣下行不傷眼目

右為末 醋糊丸亦得桐子大每服三五十

丸米飲下宜心食前日二服每取忌

吳茱萸丸

治下痢藏府不調脹滿腹痛水穀不化怠惰

嗜臥時々下利

吳茱萸湯洗 神麴炒 白朮炒

桂去皮 乾姜炮 川椒去目

右細末糊丸桐子大米飲湯下十五丸至二

十丸食前上證乃陰濕勝也



小吳朱萸丸

吳朱萸半兩洗 良姜三兩 乾姜三兩

右醋糊丸桐子大每服三五十九丸米飲下

快活丸

治瘧痞嘔吐不愈腹脹大便不通秘者陰燥勝也

吳茱萸洗 木香各一兩 良姜 乾姜炮

枳實炒 陳皮各三兩

右酒煮神麩末作糊丸桐子大姜湯下十五丸二十丸每時陳皮湯亦得

艾煎丸治男子陰證

艾葉四兩炒 大椒 赤石脂 乾姜

川烏炮去 生硫黃已上各

右糊丸桐子大每服二三十丸艾湯鹽湯註

下

艾煎丸治婦人久病

蒼朮四兩製 當歸酒浸焙 小椒半兩

右細末好醋一斗好艾葉一升浸一宿砂鍋慢火熬五升去担再入鍋內熬出膏子同和前藥丸桐子大每服三四十九丸溫醋滯下



食前炒陳艾上餘葉共為末糊丸亦可  
噎氣湯

吳茱萸焙兩 桂二錢 半夏姜製

右以咀每服五錢生姜五片水一盞餘煎六

分去渣溫服

奔氣湯

吳茱萸 人參 生薑 粳米

右於吳茱萸湯中去粳米加半夏桂心耳草亦

名奔氣湯

小七氣湯陰證

戊己丸

吳茱萸 白芍藥 黃連治等

右三味同炒微黃放冷為末糊丸米飲下三

十九食前

小已寒丸一名強

治脾胃積冷中寒銅泄倦怠不思飲食進食

止自汗厚腸胃見後

艾葉四兩 蒼朮一兩 陳皮二兩 吳茱萸二兩

右件用未醋二升浸一宿漉出暴乾再於厚

沒藥醋內拌和勻炒令紫色焙乾為末稀糊



九桐子大每服三十九濕酒鹽湯醋湯下空  
心食前

前烏頭例

張鐵確前烏頭蒼朮法

右烏頭去黑皮用白心微炒蒼朮泔浸炒黃

為細末酒糊丸

移刺相公神仙保命金丹

治男子丹田衰弱五臟虛損血少氣微肌瘦

面塵手足顫掉目視荒、迎風出淚耳鳴旋

運筋骨無力春秋發嗽疾疼喘滿悶腰膝疼

痛眩上癢疹難生立衣多盜汗四肢怠惰陽

事不強精滑無子悉宜服此丹

草烏頭

四兩秋收宜色者去皮同焙乾  
黃存性地內埋二宿去大者焙乾

金鈴子

三兩破故紙酒一宿  
去皮破故紙酒一宿茴香二兩

右細末酒糊丸桐子大每服三二十九空心

溫酒下婦人醋湯下服數日取病即效痼寒

久利尤宜服婦人血冷月事不調赤白絕孕

面色焦乾髮退不生瘦惡自汗每服三十九

批醋湯下久服補益男子每風中卒病世茶

性濕無毒保全天壽



佐經丸

草烏眩

當飯

乳香

沒藥

自然銅碎

斑猫翅

木鱉子

地龍

右等分

前少陰厲風條下有治白癩龍蛇散內有二

佐經丸味後方少膠五灵脂

右各碾醋糊丸雞頭大打碎温酒磨化隨病

上下服茶後飲酒三二盞

佐經丸

草烏頭

白膠



張守道傳世張鉄確方治男子陽精不足

牡蛎一升 赤椹子一升 草烏頭焙

右為末酒糊丸桐子大每服二三十丸宜心

濕酒下鹽湯亦得一法張守道加蒼朮一升

不去皮炒黃子上同為末丸

安宜差傳到筋骨藥

川烏頭 沃浮 五灵脂 地龍去土

蘿蔔子已上各一兩 蒼朮二兩 川當飯

赤芍藥各一兩 木鱉子去皮

沒藥 乳香各三錢

右細末醋糊丸桐子大自然銅為衣每服十丸食前溫酒服

朱砂例

坎 玉倪丹補心益腎上下通主升津

丹砂二十箇 甘草 遠志心去 煨榔一兩

河黎勒皮一兩 桂八兩 搗碎

右每食前服一丸日三食計服三丸溫人參

湯下

海藏老人云北砂煉成亦可与大補丸五藏隨茶合和用之或全用五藏茶和丸亦可大補



丸在少陽條下局  
方五補丸後

造丹砂法

右甘草等四味剉水二大斗釜中細以布袋  
盛丹砂盛於釜中着水和茶煮之 牙一日  
兼夜用湯火紋動 牙二日兼夜湯火魚眼  
沸 牙三日兼夜水火死陳沸 牙四日兼  
夜冷火涸涸沸 牙五日兼夜土火微沸  
牙八日兼夜金火沸愈緩作急 牙七日  
兼夜水火沸緩調 先期泥二釜一釜  
常煖水用添煮茶釜中水減即添煖水常令

桂

其合內先布桂一兩勻即与桂布朱砂又以  
金一兩覆足即下合置甑中泥布糯米厚  
二寸乃置合久以糯米覆培之亦合厚二寸  
許桑柴大蒸之每五日換米桂其甑蔽一日  
以行竹子為之不尔側間一小孔常煖水固  
竹筒註添釜中勿令水減牙一五日兼夜用  
如春火如常炊飲牙二五日兼夜用夏火猛  
如炊飲牙三五日兼夜用秋火如炊飯作緩  
作急牙四五日兼夜用冬火煖如炊飯作五



行相生文武助之某即成出丹炒以五抱鉢  
 碾之和臙粉即可用服之煎栝實搜和桐子  
 大每日食前服一凡人參湯下每日三服食  
 前許之煉成丹砂秤四兩為一劑二年服尽  
 復服每十年即煉三兩仍取正月一日取服  
 一月便盡既盡酒服十年一二兩不冷旋令  
 宜須煉一劑

造栝實煎法  
 六月六日收取栝實熟者緩絞取汁拾銀器  
 內燉大熬成膏搜和前菜末為劑丸

小硃砂丸

硃砂五兩 牙硝括六兩 寒水石煨四錢 麝香字一

鵬砂字一 梅腦錢一 廿草半錢浸許 葵膏

右碾勻用甘草膏和每兩作一十丸每噲化  
 一丸小兒夜驚啼薄荷水化下

朱砂寒熱溫涼各有加減例

寒大黃 巴豆 牛黃 黃連  
 黃栢 熟附子 巴豆 烏頭  
 南星 半夏

朱砂散



治小兒神亂驚悸睡臥不安大便不利謔語  
齒癢之疼嗽

辰砂七兩 桔梗兩五 人參 蛤粉

牙硝各三兩 甘草二兩 腦子二錢 金箔二十

右細末一歲兒半錢薄荷湯調下未滿百日

大人小兒口瘡咽喉少許搽咽喉熱新水調

臨臥

兒發熱多睡不安大便不利蜜湯調下一字

鶴頂丹

治大人小兒風疹不利煩渴不安中暑頭痛

不解

麝香二錢 朱砂兩十 牙硝十二兩 寒水石十

一兩 甘草三兩

右細末煉蜜丸龍眼大大人生姜湯化下中

暑腦子新水下小兒心經熱薄荷汁化下

鎮心丸 金箔鎮心丸 安神丸

驪珠丹

麥門冬 牙硝 白茯苓 龍山棗

寒水石 甘草各半 朱砂兩一 龍腦一字

已上數茶池手太陰大人絳宮下至丹田



前八味加 人参 生地黃 沈香  
各為細末入茶為東垣先生離珠丹法例詳  
說具見雞知一名石龍散

石石龍散

寒水石

腦子

朱砂

拘龍丸

化毒丹

大青丸

並見錢氏

牛黃膏

治驚邪熱止涎嗽

人参 二錢半

甘草 兩

牙硝 錢

雄黃 錢

朱砂 錢

蛤粉 二兩

生龍腦 錢

金銀箔 錢

衣為

右為細末煉蜜為丸搜和每兩秤作二十九

以金銀箔為衣一歲兒每服菘豆大薄荷湯

化下量歲救臨時加減服之食後

虎睛丸

治小兒驚風壯熱風邪熱

天麻

防風

人参

乾蝎 各一兩

白薑 兩

朱砂

雄黃 各一兩

牛黃

麝香 各一錢

甘草 錢

活

右未蜜丸如桐子大每服一二丸薄荷湯下

御方活命金丹

主治五

烏犀

牛黃

真珠

薄荷 各半兩



金箔片一兩 牙硝 貫衆 甘草

板藍根 乾葛 官桂各一兩 斤腦

麝香 青黛各三錢 大黃一兩半 蒸餅未三錢

煉蜜丸每兩作十九金箔為衣每一丸薄荷湯下

五福化毒丹主治五

苦參 桔梗 茯苓 人參

牙硝 青黛 甘草 麝香

右勻細末蜜丸雞頭大薄荷湯下斑疹毒氣

生地黃汁化下有日夜不見物陳米泔化下

金箔鎮心丸

紫河車 人參 茯苓 山萸

甘草 朱砂 龍腦 麝香

牙硝 金箔等分

右勻細末蜜丸

定風丹

治大風癩疾鼻塌眉鬚脫落遍身疙瘩或  
瘡疥等證

升麻 細辛根 川芎 穿山甲

天麻 防風 定風艸 白附子

丹參 人參 苦參 玄參



紫參

蔓荊子

威灵仙各一兩

蜈蚣一對

何首烏

木白中取

右細末每二兩用胡麻一升淘淨炒香為末

和勻密丸彈子大每用一丸細嚼温漿水下

日三初服時或吧吐勻怪或不吐

紫花丹丸

治五種瓜癩之疾

紫團參

人參

沙參

玄參

栝柳

黃連

川芎

山梔子

海桐皮

紫花

防風

赤芍藥

菟活

赤茯苓

生地黄

天仙子

地骨皮

白蒺藜

天麻

乳香絡等

右二十味細末密丸桐子大每服三十丸清

米湯下日三忌動風發氣物

脫蛻丸

治癩爪遍身膿血及諸惡瘡疥癬等經云厉

爪成癩

苦丁香

白丁香等

皂莢

去皮強子

右与上菜末為丸桐子大先十丸至十五丸

至二十丸温水下疾退為止不可使多恐致

惡心從少至多乃其法



治風疾癩病遍身生瘡者

天麻七錢 荊芥二錢 薄荷葉一錢 白花蛇四兩

浸酒

右四物為細末好酒二升蜜四兩石罈中蒸成膏子每服一盞濕服日三煎餅壓下急於暖處令汗出十日見效

神仙經進透骨膏

治大風疾遍身生瘡變成頑麻不痛不痒眉

髮脫落鼻梁崩塌目新白仁

海金砂兩 草烏頭兩 綠礬

旋花

瓦松

盆硝

膽礬

鸞管石

朱砂

雄黃研別

磁石

杏仁各二兩

黃礬

雌黃

草麻

砒霜另研各二兩

硃砂錢

木賊兩

木鱉子七箇

寒水石兩

僧祇黃

斑猫箇

巴豆粒

川烏頭兩

石燕子對

蛤粉兩

天仙子兩

黃松脂兩

粉雷錢

乳香錢

麝香錢

硫黃兩

小油六兩

臟粉錢

右將剉細末油勻和新拍瓶子一箇埋于地下止用新瓦子一隻于地上鑿數十孔鹽



拍

泥固濟盛菜在內用碗一雙合定亦固濟勿  
令透烟坐在拍瓶子口上穗放木炭火八秤  
看緊慢燒灰尽為度其菜滴在切磁子內核  
兒胎髮一塊細剪菜內攪勻入後菜信霜雄  
黃僧祇粉霜輕粉乳麝等細不在燒數

泔洗藥

何首烏

荊芥

防風

馬鞭草

蔓荊子

右粗末二兩水一斗煎十數沸得菜力每凡  
處菜洗後塗前菜

神效膏

油

當飯酢

杏仁兩半

木鱉子兩半

好油斤一

黃丹兩三

油髮兩二

乳香兩三

苦參錢二

沒藥錢二

人參錢二

右除丹外剉細油煮褐色与丹一處熬成膏

塗痛處

生眉散

桑寄生

天南星

半夏

沒藥

右各一錢為細末生姜自然汁調成膏子先  
用自然銅擦過次以膏塗之



又治鼻梁崩塌喘息不快者

雄黄 黄连 没药 川芎

盆硝各一两 脑子钱

右细末搗之日三次

如聖散 漂洗茶

頑荆子 蔓荆子 威灵仙 白芷

苦参 厚朴 荆芥 紫参

陳皮 沙参 防风 麻黄

右粗末每用茶末一两水一桶挑柳枝同一

處煎五七沸避风淋洗

還元丹 治中不語涎潮不

天麻 川芎 防风 乾山菜

活 羌活 姜蚕 犀角 细辛

當皈 白附子 甘草 藿香葉

人參 全蝎

右为细末蜜丸櫻桃夫每用一九细嚼酒下

化瓜丹

治中风涎多胸膈不利目瞑不闻睛上視一

切諸瓜

烏地骨 白附 南星 姜蚕



麝香錢肆 朱砂錢三 雄黃錢二 龍腦字一

右前四味為細末入麝香等再碾令勻煉蜜

丸鷄頭大用水酒化下如牙關緊急不開以

大蒜一大瓣杵為泥塗兩牙關外豆淋酒化

下一丸蘸茶擦牙自開更服茶二丸神效

局方搗皮散 並見本方

文潞公療癰瘡外臺方

生地黃汁升瀝 荊瀝各一 防風兩四

獨活分八 附子一枚

右以咀二升煮取一升去查空心分四服或

五服隔日一劑若虛者三日一劑可絕根本

聖餅子

草烏換水煎 川芎 細辛 白芷

荊芥 蒼朮 防風 甘草各等

右生用細末糊丸桐子大按作餅細嚼茶清

下加羗活獨活為十生餅子

斗門方

治中風口眼喎斜用 灰向右即於左邊塗

之向左即於右邊塗之候方正如舊即須以

新 水洗下大餅



聖惠方治中風口喎

以巴豆七箇去皮爛碾如左喎塗石手心如

右喎塗左手心仍以煖水一盞安向手心須

臆便正洗去茶頻搗掣中指

治人脚氣木瓜散例

木瓜散

大腹子二錢 紫蘆一錢 乾木瓜 甘草

木香各二錢 卷活半錢

右剉散分作三服每服用水一盞煎至半盞

通口服

脚氣木瓜丸

木瓜大者二箇切 菊花一兩 青鹽二錢

右內菜木瓜中合定線繫甑蒸爛碾成膏子

丸桐子大每服五十九丸空心酒下日三病甚

者百丸病處有香汁出為效

四竹丸

治風寒濕合而成痺脚腫痛或不仁及諸謔

脚氣

牛膝去 天麻

右以咀好酒五升浸三日取出焙乾為細末



以浸茶酒煮糊丸桐子大每服二十九空心  
食前温酒下

香附子散 已下總血崩例

治血崩不止面色蒼血刺疼痛不可忍小產  
血不止一名倍金散

香附子不以多炒去毛搗碎再炒

右極細末每服三五錢好酒調下能破血積  
米飲調下能止血冷氣姜湯下帶下艾湯下  
醋少許婦人一切心腹諸疾並治之粥飲下  
許學士治婦人血氣不調有積血者能破之

若血崩者能止之

立應散治心腹急痛

香附子研半 良姜

右細末每用二錢也沸湯點服立効

治血崩脇腹痛

當歸 木賊 香附子 熟地黃

赤芍藥 牡丹皮各二 沒藥 丁香

桂各三錢

右細末酒調三錢温服

立効散 治婦人  
脇腹痛



香附三兩 當飯一兩 赤芍藥兩半 良姜兩半

五靈脂兩半

右細末三錢酒一盞童子小便少許同煎服

香附子例 定則加乾姜 熱則加黃苓

立應散 治婦人血海崩敗人治

香附二兩 櫻皮一兩 取存性

右為細末每五錢酒半盞童子小便半盞煎

至七分溫服無時如腸風不用童子便用酒一

盞煎至八分服

霹靂散 治經脈

香附子三兩 川芎一兩 石灰一兩 油炒

右細末燒秤鎰滓酒調服二錢七甜酒亦得

定血散 此四方

治婦人血海崩漏小產血不止

烏梅燒存性 櫻布燒 甘草二寸半 半燒

右為細末每服二三錢泔醋湯調服立止

灵苑內補丸

溫中調血治婦人久病血崩不止累醫不効

宜此立驗

黃連 山茱萸 乾姜 當飯



鱉甲 芫花醋浸 白芷 乾漆油浸

川烏頭去皮各一分 巴豆大者殼 桃仁和

亂髮三味各半

已上十二味同入一瓶子內用泥固濟頂上

留一眼子大煨候白烟出急取候冷取細碾

官桂去皮 陳橘皮去粗皮 芫藿子一枚

白細研 白龍骨一枚

右四味為細末同前碾藥却作一處拌合再

研令勻煉蜜為丸桐子大每服一丸臨臥濕

酒下久患甚者不過四服

又方

巴豆紙厚畏 芫花醋拌 硃砂

白芷 枳柳面畏原 乾漆油潤炒

常飯頭 大黃蒸 乾姜炒製剉

又方

木香 枳柳 縮砂仁 神麴炒

麥蘗炒 訶子炒 當飯 乾漆油炒

金絲水蛤火灰中煨去里或

交感丸

茯神丙 香附子炒 黃



右細末煉蜜丸彈子大每晨一丸

降氣湯

養神二香附子半斤甘草一兩

右細末點服

又方

香附子五兩生薑三兩汁浸三兩炒存性細末

青鹽一錢

右同為細末搗牙

孫思邈凡竅血出方

荊葉搗取汁酒和服之

小烏沉湯當在前烏沉湯後

香附子二兩

烏菜二兩甘草二錢

右細末鹽少許湯點服

千金白堊丸在四物湯後

螵蛸散治血崩酒下久不止痛

烏魚骨燒存性細末二錢剪木賊湯調下

又方

蚕退紙一燒木賊一燒

寒水石一

黑附子半斤白礬半斤

烏魚骨一

右為末水一盞煎四五沸食前和滓服効

又方



龍骨 蒲黃各半 艾葉 附子炮二

當飯七錢 右為細末水煎三錢

又方

當飯 川芎 黃芩 芍藥等分

右粗末水煎

桂燒灰酒調下立愈

五灵脂末炆出烟尽當飯酒煎如血室乾

醋煎和滓服空心

血崩如流防風灸焦為末每二錢日麩半

錢酒調下盡夜不止者丁香二兩酒煮服

又黃芩粗末水煎

右並治血崩如流葉異不一隨經可擇是為

知本

地榆條唐本注云出孔氏音義王帶十二病

一日多赤 二日多白

三日水不通 四日陰蝕

五日子藏堅 六日子門閉

七日合陰湯患痛 八日小腹寒



九日子門閉

十日子宮冷

十一日夢與鬼交

十二日五臟不定

用地榆作菜飲代茶甚解

無溫不成浮無積不成痢大腹泄者小便少  
溫在後也小腸有敗血久有積滯崩滿不已  
隨帶而下大便燥結溫在前也濕在後當利  
小便濕在前當利大便此其法也  
或因胎產而得或因酒色而得山崩海嶽前  
後脫血帶漏不已先由子藏侵入赤腸沃液  
惡穢前行大過滓糞燥結後滯不通此胎腸

云

俱病治宜推去敗血膿積益血而致新也心  
取不生脾取不裹肝取不藏此三焦經絡也  
崩雖為病亦有淺深新久治亦從而輕重之  
張仲景云三焦絕經是為血崩又經血得熱  
而妄行又云血枯前後血得之年少時有取  
火得脫血醉以入房氣竭肝腸久成血閉  
畧舉於此皆有熱也脈或洪大而有力或能  
食不能食漏下不止或陰中如有癢撲或大  
便難因而暴下或觸之而不定內外俱治慎  
勿遺一



王叔和云微脉主敗血面無色歌曰微指下尋  
之有若無凝之敗血小腸虛崩中日久為白  
帶漏下多時骨脉枯此脉有瀦之貌花之體  
皆血病也此皆陰脉而為冷謔寒熱即分藥  
不可執一取以有連藥生地黃四物牡丹芍  
藥續折縮砂香附烏賊白芷乾姜之分也明  
者其擇之  
產室方療崩中不止下  
問年深月遠  
槐木身燒灰為末酒服方寸匕  
簡要方治婦人漏  
下血不絕

槐花萼不以多少燒灰細碾食前濕酒服  
二錢匕

正經云治婦人乳痂子藏急痛

槐實以七月七日取入搗取汁銅孟內盛  
之日煎令可丸大如鼠矢內竅中三易愈

又主隨胎

千金方治婦人血  
故尿血

龍骨二兩以酒調服方寸匕空心日三

又方治崩中尽衣不止

芎藭八兩清酒五升前取二升半分三服



徐々飲之

又治胎婦忽然倒地拳驚重促損腹中不安及子死腹中

川芎生末酒服方寸匕須臾一二服出

治崩中

防風去蘆頭炙赤色為末每服二錢以麩

糊酒調下更以麩糊投之

治婦人經血不止

五灵脂末炒令過熱出尽烟每服五六錢

當飯二片酒一盞与茶同煎至六分去滓

温服連三五服效

治產婦血暈昏迷上衝悶絕不知人事者

五灵脂一两五錢 一半生用

右為細末每服一錢温熱水調下如口噤者

以物幹開灌之入喉即愈謂之搗勝散

又治血崩不止

五灵脂耐

右為細末水五盞煎至三盞去滓譚清再煎

為膏入神麩末二兩和丸桐子大每服二十

丸空心温酒下便止



正元廣利方 治婦人赤白帶下  
年深月久不差者

白芍藥 乾姜 半夏

右細剉炒令黃搗羅細空腹和飲汁服之二

錢七

治婦人木臟虛損元氣冷敗崩中漏下經歲不

止服諸藥不效極甚者宜服此藥

龍骨 煨四兩 蒲黃 一兩 艾葉 二兩 當歸 半兩

五灵脂 半兩 炮 兩 炒 黑附子 炮半兩

香附子 炒紫包

右件同為末水一盞半茶秤三錢同煎至六

分去滓食前空心日三病輕者二服重者一

料

雷氏方 治婦人遠年近日血崩或血氣不止

木賊 二兩 香附子 一兩 朴硝 碎

右三味為細末色黑者好酒一盞煎三五沸  
和滓溫服色紅赤者水一盞煎至七分和滓  
溫服忌生冷硬猪魚肉雜物每服三錢空心  
每日二如膈下作痛乳香沒藥當歸各一錢

剉細入上藥一處同煎不痛勿用

論傷寒雜病分二科



海藏云世之治傷寒有法療雜病有方是則是  
矣然猶未也吾謂治雜病亦有法療傷寒亦  
有方、即法也法即方也豈有異乎要當全  
識部分經絡表裡臟腑豈有二哉以其後世  
才智之不及古也取以分傷寒雜病施為所  
故有長於此而短於彼者亦有長於彼而短  
於此者逮夫國家取士分科為此宜乎愈學  
而愈陋愈專而愈粗也試以傷寒雜病二科  
論之傷寒從外而之內者法當先治外而後  
治內雜病從內而之外者法當先治內而後

治外至於中外不相及則治主病其方法一  
也亦何必分之為二哉大抵雜病之外不雜  
乎表傷寒之內不離乎裡表則汁裡則不中  
則和不易之法也劑之寒熱溫涼在其中矣  
餘爪產二條目疾瘡腫小兒等科各自專門  
每怪其工之陋且粗也是以知證不知脈知  
某不知性是豈真知而全識者哉耳熱目厭  
習壞多經涉久誤合則病愈契則不疾甚取  
常見所常聞者粗有曉會其取未常見未常  
聞則有取不知也此逆而不及於物者遠



俾

矣嗚呼天之取錫其智識有限量故邪衰哉  
庸夫以衣食迫以口舌爭視學業如讐隙殆  
忌為能幹誤人性命恬不知恤甘為忍人不  
顧道理其教之有取失邪時世之取在得邪  
抑疾者之不事而有取自致邪處暑後嘆而  
書

是書已成於辛卯至丁丙春為人陰取  
之元藁已絕更無餘本予職州庠杜門  
養拙蓋鹽之暇每取用心想像始終十  
得七八試書首尾僅得復完猶遺一二

尚未之備故今日得而今日錄明日得  
而明日書待以歲月久則方成每欲速  
無忌心也好古再題



醫墨元戎跋

醫墨元戎舊刻於楚秋山顧公序之

詳矣甲辰予遊楚見而說之每以自

隨壬子遭家變因散失不知取在求

之者數年竟不可得詢知板焚矣嗚

呼其數耶使是書不行於世也幸酉

冬予起廢草土補關中飯自京師偶

此書已散於世... 醫墨元戎跋... 楚秋山顧公序之... 詳矣甲辰予遊楚見而說之... 每以自隨壬子遭家變因散失不知取在求之者數年竟不可得詢知板焚矣嗚呼其數耶使是書不行於世也幸酉冬予起廢草土補關中飯自京師偶



病醫苗生者來視予謾道及之生日  
家有藏本是掌手錄者盍刻之予聞  
之甚喜越五日病愈遂攜之開命工  
鐫諸梓嗚呼其數耶使是書復行於  
世也工告完因嘆一書之顯晦尚亦  
有數而况於人乎是故不能不有感  
於茲云

嘉靖壬戌仲春之吉鈞陽魏尚純識

醫星元戎卷之十二終







