

醫方類聚卷之一百三十八

諸痢門 三

千金月令

主赤白痢不問冷熱方

赤石脂

龍骨

各三

乾薑

黃連

各三

右搗篩為末以飲服二錢匕日再服忌冷

水

主老小百種冷熱等痢百方不差者神驗方

檮根白朮

十分

乾者切

甘草

十分

檮皮

四分



五味子五分 柳木耳十分 色苦參六分 龍骨二分
 主橫椰仁四分 當歸三分 黃連二分 黃蘗二分 厚朴二分
 炙

右擣篩為散空腹飲下服三錢七十歲已下五歲已上二錢七五歲已下壹錢七更主小兒量事減之皆再服若是疳七服即有干虫下以盡為度如他痢有膿血皆以盡為度尤忌熱肉麵葱菜冷水猪肉魚油膩等海上仙方

血痢 食積 濕熱 痢疾 腹痛 泄瀉

多時血痢莫留延濕紙包塩火內燃研碎分為三處用白調粥飲即時安

赤白痢疾 木燻之餅外煎血藥行公懸

七个烏梅七个棗七个粟殼七寸草更加燈

心酒共煎赤白痢疾登時好

聖惠方 遠之餅外煎血藥行公懸

而治水穀痢諸方 木燻之餅外煎血藥行公懸

夫水穀痢者由體虛腠理開血氣虛春傷於

風邪之氣留在肌肉之內後遇脾胃大腸虛弱而邪氣乘之故為水穀痢也胃者脾之府也為水穀之海脾者胃之藏也其候身之肌肉而脾氣主消水穀水穀消其精化為營衛以養藏腑充實肌膚大腸肺之腑也為傳導之府化物出焉水穀之精化為血氣行於經脈其糟粕行於大腸也肺與大腸為表裏而肺主氣其候身之皮毛春陽氣雖在表面而血氣尚弱其飲食居處運動勞役血氣虛者則

為風邪所傷客在肌肉之間後因脾胃氣虛風邪又乘虛而進入於腸胃其脾氣弱者不能化於水穀故糟粕不結聚而變為水穀痢也
 治水穀痢腹內疼痛兩脇虛脹不思飲食厚朴散方
 厚朴 一兩 去麤皮塗生薑汁炙令香熟
 木香 半兩 人參 半兩 去蘆頭訶梨勒 三分 煨乾薑 半兩 炮陳橘皮 兩 湯浸去白粉焙當歸 半兩 剉地榆 三分 附子 壹兩 白粉焙

厚朴 一兩 去麤皮塗生薑汁炙令香熟
 木香 半兩 人參 半兩 去蘆頭訶梨勒 三分 煨乾薑 半兩 炮陳橘皮 兩 湯浸去白粉焙當歸 半兩 剉地榆 三分 附子 壹兩 白粉焙

去皮

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞煎至五分去滓不計時候稍熱服

治水穀痢心腹脹滿不能飲食宜服肉苳菘散方

肉苳菘 壹兩 木香 壹兩 甘草 半兩 乾薑 壹兩

炮裂厚朴 二兩 去麤皮塗生薑汁炙令香熟

右件藥搗篩為散每服三錢用水壹中盞入棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱

眼

治水穀痢不止腹內疼痛草苳菘散方

草苳菘 壹兩 白石脂 壹兩 當歸 壹兩 乾薑 壹兩

壹兩 炮裂

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥

飲調下二錢

治水穀痢無問老小日夜百餘行神妙橡實

散方

橡實 二兩 乾楮葉 壹兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候煎烏梅湯調下一錢

治水穀痢日夜百度馬蘭散方

馬蘭子一兩乾薑一兩炮黃連一兩去鬚裂制

右件藥搗細羅為散不計時候以粥飲調下二錢

又方椽子五枚盛菴若半柿蒂七

右件藥搗細羅為散不計時候以粥飲調下一錢

治水穀痢腹脇虛脹時復疼痛不欲飲食訶

梨勒丸方

訶梨勒一兩煨乾薑三分炮當歸壹兩剉

黃連壹兩去鬚微炒白朮一兩木香三分厚朴一兩去

生薑汁炙令香熟

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以粥飲下三

十丸

治水穀痢臍腹冷痛日夜數行四百丸方

白石脂二兩白礬二兩白龍骨二兩胡粉二兩

右件藥搗研為末用粳米飯和擣一二百

杵丸如梧桐子大每於食前以粥飲下三

十丸

治水穀痢日夜數腹內疼痛竜骨丸方

竜骨三分艾葉一兩赤石脂三分白礬二兩

黃連三分當歸三分附子壹兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和擣三二百杵丸

如梧桐子大每於食前以粥飲下三十丸

治水穀痢及冷氣腹肚虛鳴菖蒲丸方

菖蒲三兩乾薑壹兩半

右件藥搗羅為末用粳米飯和丸如梧桐

子大每於食前以粥飲下三十丸

又方竜骨末三兩巴豆二七粒

右以粟米稠粥和凡如麻子大每服以陳

米粥飲下三丸如或微轉即以井花水下

治水穀痢久不止腹脇妨悶不欲飲食方

訶梨勒二兩草薢二兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞煎至五分去滓不計時候溫服

治水穀痢久不止方

胡粉二兩

又右以棗肉和搗作餅子急火中燒令赤即出置地上以梳合之勿令風入待冷細碎

食前以粥飲調下半錢

又方黃牛角鯁

用白蠶真滿燒為灰細研

右件藥每於食前以粥飲調下二錢

治赤痢諸方

夫赤痢者由腸胃虛弱風邪所傷則夾熱熱乘於血則流滲入腸與痢相雜下黃為赤痢也

治赤痢腹中疼痛小便澁口乾煩熱犀角散

方 犀角屑三分 木香兩半 黃芩壹兩 地榆三分 黃

連壹兩 當歸壹兩 炒 黃芩壹兩 炒 地榆三分 黃

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

煎至五分去滓不計時候溫服

煎至五分去滓不計時候稍熱服神巧萬全方同

治赤痢多腹痛不可忍赤芍藥散方

赤芍藥二兩黃蘗二兩以蜜半合塗炙令盡剉

右件藥搗篩為散每服三錢以淡漿水一

中盞煎至五分去滓不計時候稍熱服

治赤痢煩渴腹痛不欲飲食龍骨散方

龍骨壹兩去黃連壹兩去地榆壹兩剉當歸壹兩剉

犀角屑半兩黃芩壹兩阿膠壹兩擣碎

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥

飲調下二錢

治赤痢遠年不差方

鼠尾草壹兩秦皮壹兩薔薇根壹兩剉槲樹皮壹兩

黃芩壹兩右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

治赤痢腹痛不可忍艾葉丸方

艾葉壹兩黃連壹兩去木香壹兩地榆壹兩

伏龍肝壹兩阿膠壹兩當歸壹兩剉赤

炒壹兩黃連壹兩去木香壹兩地榆壹兩

芍藥 壹兩 黃芩 壹兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵
如梧桐子大每服不計時候以粥飲下三
十九

又方寒水石 壹分 砒霜 半

右件藥細研如粉以軟粟米飯和丸如棗
豆大每於食前以冷甘草湯下三丸忌食
熱物

又方右用牛角鯁燒為灰細研每於食前以

粥飲調下二錢 瑣碎錄同

又方黃連 二兩去鬚 當歸 壹兩到

右以水酒共三大盞煎取壹大盞半去滓

食前分溫三服

治白痢諸方

治白膿痢晝夜無數牡蠣散方

牡蠣 壹兩燒 龍骨 壹兩 烏梅肉 半 白頭翁 半

女萎 半兩去 黃連 半兩去 當歸 半兩去 甘草 半兩

炙 微 藥 微 赤痢

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調下二錢

治白痢腹痛不思飲食瘦瘁骨立宜服黃連丸方

黃連一兩去鬚微炒乾薑壹兩炮裂剉厚朴壹兩去麩皮塗生薑

汁炙令神麴壹兩炒禹餘糧壹兩燒醋焙香熟神麴壹兩微黃馬餘糧壹兩燒醋焙

萬全方七遍赤石脂二兩當歸壹兩剉醋石榴皮

壹兩川烏頭壹兩炮裂去皮臍○萬右件藥搗羅為末以醋煮麴糊萬全方和

丸如梧桐子大每服不計時候以艾湯下

三十九

治白痢食不消化烏梅丸

烏梅肉二兩微炒艾葉二兩微炒黃蘗二兩微炒甘草

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

令每於食前以粥飲下三十九

而赤白痢諸方

夫痢者皆由榮衛不足腸胃虛弱冷熱之氣

乘虛入客於腸間虛則泄故為痢也然其痢而有赤白者是熱乘於血血滲腸內則赤也冷氣入腸搏於腸間津液凝滯則白也冷熱相交故赤白相雜重者狀如膿涕而血雜之輕者白膿上有赤脉薄血狀如魚之腥世謂之魚腥痢也

治赤白痢腹中疼痛口乾或作寒熱黃連散方

黃連三分去鬚微炒 白朮半兩 黃芩半兩 當歸三分剉

烏梅肉半兩 乾薑半兩炮裂剉 阿膠壹兩壽碎

甘草半兩炙微赤剉 右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

煎至五分去滓不計時候稍熱服聖濟總錄

治赤白痢腹中疼痛時作寒熱阿膠散方

阿膠半兩搗碎 甘草半兩炙 附子壹兩炮裂去皮

黃連一兩六分 當歸半兩剉

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

煎至五分去滓不計時候稍熱服

治赤白痢地榆散方

地榆一斤 樗樹白皮壹兩 白朮三分 當歸三分

微炒

右件藥搗篩為散每服參錢以水壹中盛

煎至五分去滓不計時候稍熱服

治赤白痢無問日數老小並宜服此乾薑散

方

乾薑二兩 炮裂對 梔子人 十四枚

右件藥搗篩為散每服參錢以水壹中盛

入薤白七莖豉半合煎至五分去滓不計時候稍熱服

治赤白痢日夜不絕赤石脂散方

赤石脂壹兩 竜骨一斤 阿膠壹兩 搗碎炒令黃燥 地榆壹兩

厚朴壹兩 生薑兩半 去籠皮塗 訶梨勒壹兩 煨當

歸一兩 乾薑壹兩 炮裂對 黃連壹兩 去微炒

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥

飲調下二錢神巧萬全方同

治赤白痢內補散方

黃連

一兩去

甘草

半兩炙

乾薑

半兩炮

紫

等茶

半兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥

飲調下二錢

聖濟總錄日三

治赤白痢日夜行數不減宜服此石榴皮散

方

醋石榴皮

壹兩

竜骨

壹兩

訶梨勒

壹兩煨用皮

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥

飲調下二錢

治赤白痢不止多渴附子散方

附子

一枚生

烏梅

二枚

右件二味各燒令半生半熟搗細羅為散

每於食前以粥飲調下壹錢

治赤白痢日夜不禁宜服椽實散方

椽實

壹兩

醋石榴皮

壹兩

黃牛角鯁

壹兩燒灰

右件藥搗細羅為散不計時候以粥飲調

下二錢

聖濟總錄日三

治赤白痢冷熱未調下痢不止枳殼散方

枳殼三分 炒去瓢厚朴三分 去麤皮 塗生薑汁 炙令香熟甘草

三分 炙梟椿根三分 炙地榆二分 判紫草三分

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥

飲調下二錢

治痢白多赤少沒石子散方

沒石子半兩 判黃連壹兩 去鬚 微炒乾薑壹兩 炮白朮

芩半兩 厚朴 壹兩 去麤皮 塗生薑汁 炙令香熟當歸壹兩 判

右件藥搗細羅為散每服不計時候用粥

飲調下二錢聖濟總錄同

治赤白痢及水穀冷熱氣痢並主之白朮方

方

白朮三分赤石脂三分犀角屑三分乾薑半兩 炮

厚朴壹兩 去麤皮 塗生薑汁 炙令香熟龍骨三分黃連壹兩 去鬚

過判烏梅肉三分 判當歸三分 判甘草半兩 炙微

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗五七百杵凡

如梧桐子大每於食前以粥飲下二十九

治赤白痢行數不減時或口乾發歇烏梅散

方

烏梅肉半兩黃連三分去乾薑兩訶

梨勒三分煨白礬半兩燒灰

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥

飲調下二錢神巧萬

治赤白痢冷熱相攻腹中疴痛宜服此方

黃連半兩去蕪荑兩乾薑半兩炮甘草一分

多微

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥

飲調下二錢

治赤白痢服諸藥不效宜服此麝香丸方

麝香一分菉豆粉一分朱砂一分巴豆一分去皮

壓去

右件藥都研以粟米飯和丸如菉豆大

空心以冷粥飲下二九子當甘食忌熱物

聖濟總錄同

又方粉霜二錢膩粉錢砒霜錢

右件藥同研以燒飯和丸如黍米大空心

以冷水下三丸忌食熱物

又方黃丹

壹兩炒令紫色

白麵

半兩

巴豆

九枚去心皮研紙裏

油壓去

右件藥以水壹大盞調攪候澄清傾却

面者用底下稠者丸如棗豆大每服以冷

水下三丸

又方乾薑

半兩物裂剉

雀糞

半兩微妙

右件藥搗羅為末用軟飯和丸如梧桐子

大每服不計時候以粥飲下十九

又方川烏頭

六枚炮裂去皮臍為末

巴豆

十四枚

麻子大

右件藥以巴豆於熱油內煤黃焦去皮心

入烏頭末相和為末用米醋壹升於銚子

內以慢火熬成膏用寒食麵觀手丸如棗

豆大每服以二宜湯下三丸

又方定粉

壹兩炒令黃

砒霜

一分

右都研如粉以飯和丸如黍米大每服以

新汲水下二丸忌食熱物

治赤白痢神効方

砒霜半兩附子半兩去皮臍去寒水石壹兩定粉壹兩

右件藥並生用同研令細以水浸蒸餅和丸如棗豆大每服以冷水下三丸忌食熱

物

又方川烏頭末壹兩黑豆末壹兩

右件藥用新汲水和丸如棗豆大朱砂末

內衮過每服以冷水下七丸神巧萬全方同

又方黃丹壹兩炒壹兩黃連一兩去去

右件藥搗羅為末以麴糊和丸如麻子大

每服煎生薑甘草湯下丸方

治赤白痢服藥過度未得痊減宜服此方

砒霜半兩粉霜半兩巴豆一分去心皮研紙裏壓去油

右件藥同研令細以糯米粥和丸如粟米大空心以冷粥飲下壹丸忌食熱物

治赤白痢所下不多遍數不減宜服此方

黃丹壹兩炒壹兩附子壹兩炮裂去皮臍搗末

右件藥用煮棗肉和丸如梧桐子大每服

不計時候以粥飲下十丸

又方蜜隨僧三兩燒令黃色

右細研如粉每服壹錢以醋茶調下日三服

又方定粉壹錢細研小麥鹽燒不灰宜服此方

右以雞子清和作餅子用塘灰火燒熟碾為末空心以冷水調下米錢味甘暖藥米

治久赤白痢諸方

夫久赤白痢者由冷熱乘血血滲於腸間與腸間津液相雜而下甚者腸虛不復故赤白

連滯日久不差脾胃虛弱則變嘔噦胃弱氣逆故嘔也氣逆而外有冷折之不通故噦亦變於蠶蟲蝕人五藏也

治久赤白痢不止臍腹疔痛木香散方

木香三兩附子壹兩半炮裂去皮臍黃連壹兩去鬚微炒當歸壹兩去薑兩對吳茱萸半兩湯浸七微炒厚朴三兩去生薑汁炙令香熟

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞煎至五分去滓不計時候稍熱服

治久赤白痢不止樗樹皮散方

樗樹皮壹兩炙甘草壹分炙川椒五十粒

閉口者微炒去汗

右件藥以水二大盞浸壹宿煎至中盞內

七分去滓食前分温二服

治久赤白痢腹痛不止附子散方

附子壹兩炮裂黃連壹兩去訶梨勒壹兩

皮去皮臍乾薑壹兩炮甘草壹兩炙蜜壹兩僧壹兩

研裂到微赤判燒兩

右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下二

錢日三四服

治久赤白痢不止腹中疼痛白朮散方

白朮壹兩附子壹兩炮裂龍骨二兩黃連壹兩

微炒二兩擣碎乾薑壹兩炮赤石脂三兩

地榆壹兩當歸壹兩微炒兩判

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥

飲調下二錢

治久赤白痢日夜無數腹痛不可忍烏賊魚

骨丸方

烏賊魚骨

三兩改炙研細

樗根皮

二兩炙黃亂髮灰

兩

雀兒糞

炒黃兩

代赭

龍骨二兩

白石脂兩

右件藥搗羅為末用醋煮麵糊和丸如梧

桐子大每服不計時候以粥飲下二十丸

治久赤白痢不差紫笋茶散方

紫笋茶

為末

臘月狗頭骨

壹兩半

右件藥同細研令勻每服不計時候以粥

飲調下二錢

治久赤白痢日夜不止橡實散方

橡實

壹兩

乾薑

壹兩炮裂制○備頂百要方各二兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥

飲調下二錢

治久赤白痢累醫不効肉荳蔻散方

肉荳蔻

一兩

鹿角屑

一兩用酥

定粉

三分

黃密陀僧三分燒

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥

飲調下壹錢○聖濟總錄治赤白痢肉豆

類聚

菘去殼鹿角屑炙一胡粉燒蜜陶僧各參

過於冷地右四味搗羅為散每服二錢匕

米飲調下

治久赤白痢腹內冷痛白多赤少宜服厚朴

散方

厚朴二兩去麁皮塗生木香三分黃連壹兩

微炒吳茱萸半兩湯浸七乾薑半兩炮當歸

微炒

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥

飲調下二錢

治久赤白痢不止腹痛不食龍骨丸方

龍骨叁分地榆壹兩赤石脂叁分沒石子三分艾

葉叁分黃蘗叁分微炒微炒橡實半兩當歸叁分微炒

芎藭半兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵

如梧桐子每服不計時候以粥飲下二十

丸

治久赤白痢日夜無數腹痛不可忍代赭丸

方

代赭兩 二黃二兩 塗蜜微赤 黃耆壹兩 龍骨壹兩

赤石脂壹兩 燒赤兩 投中 艾灰兩 狗頭骨壹兩 灰兩

右件藥擣羅為末 鍊蜜和丸 如梧桐子每

服不計時候 以粥飲下 二十丸

治久赤白痢不差 日夜度數無恒 神効朱砂

丸方

朱砂壹分 定粉壹分 粉霜壹分 巴豆壹分

右件藥同研如麩 川水浸蒸餅和丸 如棗

豆大空心以冷二宜湯下 二丸忌食熱物

治久患赤白痢 括聖丸方

硫黃兩 蜜兩 陶僧壹分 燒通赤 白礬灰兩 寒水石兩

二兩 燒通赤

右件藥都研為末 以麩糊和丸 如棗豆大

每服以冷水下 五丸

治久赤白痢不差 羸困雲實丸方

雲實兩 附子壹兩 炮裂去皮 龍骨壹兩 女萎兩

右件藥搗羅為末 煮棗肉和丸 如梧桐子

大每服不計時候以粥飲下十九

又方黃連三分去鬚微炒龍骨三分白礬壹兩燒胡粉三分

黃炒三分

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服不計時候以粥飲下二十九

又方赤烏脚四兩附子壹兩炮裂去皮臍乾薑壹分炮裂判

右件藥搗羅為末用醋煮麩糊和丸如棗

豆大每服以粥飲下五十九

又方白礬二兩黃丹二兩

右件藥先搗白礬為末布在銚子內便以

黃丹覆之武火燒至沸定却切為末用軟

夫飯和丸如梧桐子大每服不計時候以粥

飲下十九

又方黃藥三兩微炙判

右煨獨頭蒜令熟滷丸如梧桐子大每服

不計時候以粥飲下二十九

又方鼠尾草花衛中易簡方無花字

右搗末每服不計時候以粥飲調下一錢

治久赤白痢及水瀉方

又川烏頭二枚壹枚豆煮一枚生用為末

右以黑豆半合入水同煮黑豆熟為度與

豆同研爛丸如菉豆大每服以黃連湯下

又五生

續碎錄同

治血痢諸方

夫血痢者由熱毒皆滲血入於大腸故也血之隨氣循環經絡通行藏腑常無停積則熱毒氣不能乘之遇腸虛者則血滲入於腸腸

虛則泄故為血痢也身熱者死身寒者生診

其關上脉芤大便去血暴下血數升也

治血痢心神煩熱腹中痛不納飲食茜根散

方

茜根兩黃連二兩地榆一兩梔子半兩

生乾地黄一兩當歸一兩犀角屑一兩黃芩一兩

兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞入豉五十粒薤白十寸煎至六分去滓不

類聚百病

二五

計時候溫服

治熱毒下痢黑血藏腑痔痛日夜百行氣息欲絕黃連散方

黃連壹兩去鬚 龍骨二兩 地榆兩 阿膠二兩

炒令當歸壹兩 梔子人兩 赤芍藥兩 黃兩

芩兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治熱毒血痢成片臍下疔痛阿膠散方

阿膠一兩 擣碎 川升麻兩 地榆兩 黃連壹兩

壹兩 去刺 薊兩 犀角屑兩 熟乾地黄壹兩 梔兩

子人兩 當歸壹兩 微炒

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入薤白七寸豉一百粒煎至六分去滓不

計時候溫服

治血痢止腹痛除煩熱口乾犀角散方

犀角屑兩 阿膠三分 擣碎 黃連壹兩 艾壹兩

半兩 伏龍肝兩 當歸兩 微炒

類聚百病

二五

類聚本草

卷之五

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢

治血痢日夜不止腹中疝痛心神煩悶黃蘗

散方

黃蘗壹兩炙當歸壹兩剉黃連壹兩去地

榆三分

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥

飲調下二錢

又方聖濟總錄名醋石榴皮一枳殼壹兩炒黃

去常歸二分剉微炒剉以安...

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥

飲調下二錢

又方聖濟總錄黃連去鬚黃蘗炙黃芩各

兩名黃連丸

右件藥搗羅為末鍊蜜和凡如梧桐子大

每於食前以粥飲下十五丸至六分

又方犀角屑兩地榆半兩

右二味以水二大盞入蜜三合煎至壹盞

類聚本草

卷之五

隨大小增減服之

又方熟乾地黄各壹分黃芩各壹分

右件藥細剉用水壹大盞煎至六分去滓分溫二服

又方黑木耳壹兩

右件藥川水二大盞煮木耳令熟先以鹽醋食木耳盡後服其汁日二服○衛生易簡方治血痢用黑木耳燒灰每服二錢匕冷水調服無時或以姜醋煮木耳熟食之

亦効

又方右以生地黄汁三合煎取二合下蜜壹

合攪令勻溫服頻服効神巧萬全方

又方蠶薑搗絞取汁二合蜜壹合同煖令溫

服之搗碎

治血痢百方無効不問遠近宜服此方

牛角鯁壹兩大麥二兩

右件藥擣細雜為散每服不計時候以粥

飲調下二錢

又方聖濟總錄治血痢裏急後重腸中疼痛當歸散方當歸三分到

又黃連言兩去黃連微炒當歸二分到

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥

飲調下錢總錄二錢宜此

又聖濟總錄地榆壹兩到甘草半兩炙

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

煎至六分去滓不計時候溫服○總錄右

二味麤搗篩每服五錢此以水壹盞煎取

七分玉滓溫服日二夜一

又方荷言兩去龜突墨二兩半木香兩

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

又下二錢言兩去三合味壹盞同煎

又方黃連二兩去右搗羅為末以雞子白和作餅子如二分

又厚煨令乾煨細研為散每服不計時候以

粥飲調下壹錢神巧萬全方此下云此方

無効遂用○澹寮方赤痢方黃連去右為

此方立止○澹寮方赤痢方黃連去右為

又未雞子清為圓米飲下三十粒

又方右以濕白紙二張裏揅一匙於猛火中
燒作灰細研分爲三服食前以粥飲調服
之

又方沒石子一兩
細研

右以軟飯和丸如小豆大每於食前以粥
飲下十九

又方右搗馬齒葉汁三合和蜜壹匙同煖服
之

又方乳腐貴幽切

右以醋漿水一中盞煎至半盞去滓溫溫
服之

又方篇竹汁四合蜜壹合相和頓服之

又方醋石榴壹枚和皮搗絞取汁用蜜一合

和暖服之瑣碎錄同

治久血痢諸方

夫久血痢者由體虛受熱熱折於血血滲入
腸故成血痢熱若不歇胃虛不復故爲痢也
血久不差者多變嘔噦及爲濕匿也

治久血痢心神煩熱腹內疼痛不思飲食犀角散方

犀角屑三分赤芍藥三分伏龍肝二分川升麻半

青橘皮半兩湯浸當歸三分剉黃連三分

微炒甘草半兩炙木香兩地榆三分

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治血痢經年月不差黃連散方

黃連去鬚黃蘗微炒梔子人地榆半馬蘭

子常歸黃芩微茜根葉栝葉已上

右件藥搗篩為散每服半兩水壹中盞煎

至去分去滓不計時候溫服黃芩半

治久血痢不差四肢黃瘦腹內疼痛木香散

木香半檮樹皮壹兩炙茜根壹兩地榆壹兩

甘草半兩炙犀角屑三分黃連壹兩當歸壹兩

微赤剉犀角屑三分黃連壹兩當歸壹兩

類聚百病

壹兩 剉
微炒

右件藥搗羅為散每服三錢以水一中
盞煎至六分去滓不計時候溫服

治久血利不差地榆散方

地榆 梟椿樹皮 狼牙 黃芩 已上各半兩

右件藥搗篩為散每服半兩以水壹大盞
煎至七分去滓不計時候分溫二服

治久血痢小腹結痛不可忍艾葉散

艾葉 壹兩 微炒 黃芩 壹兩 赤芍藥 壹兩 地榆 半兩 當

歸 壹兩 剉 微炒

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞
煎至五分去滓不計時候溫服

又方栢葉 兩 地榆 一分

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞
煎至六分去滓不計時候溫服

治久血痢不止腹痛心煩桑黃散方

桑黃 一分 地榆 三分 黃連 三分 去當歸 一分

剉微炒 黃芩 半兩 甘草 半兩 微炒 赤芍

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞煎至
煎至六分去滓不計時候溫服

治久血痢連年不差鼠尾草散方

鼠尾草四兩地榆三兩

右件藥細剉每服半兩以水壹中盞煎至

六分去滓不計時候分溫二服

治久血痢不止腹中疝痛面黃羸瘦當歸散

方

當歸壹兩剉 樗樹皮壹兩炙 黃連壹兩去

微炒 黃連壹兩去 鬚微炒

地榆壹兩 艾葉壹兩 酸石榴皮三分 阿膠

三分 黃連壹兩 燥令黃燥

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥

飲調下三錢

治久而痢膿不化宜服此樗樹皮散方

樗樹皮壹兩炙 橡實壹兩 地榆壹兩 黃連壹兩

去髮 甘草半兩炙 赤剉

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥

飲調下二錢

又方香墨二兩木香半兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下壹錢

又方地膚子壹兩地榆三分黃芩三分

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下三錢

治久而痢腹內疼痛四肢羸弱面色萎黃阿膠九方

阿膠三分搗碎地榆壹兩訶梨勒五分熟

乾地黃壹兩葶藶半兩炮赤芍藥半兩黃連兩

去鬚白朮兩艾葉三分枳殼半兩麩炒木

香兩當歸壹兩剉二兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三三百杵凡

如梧桐子大每服不計時候以粥飲下三

十九食前以粥飲下壹錢

治久而痢不効方團人文火熟令黃連兩

構葉壹兩椽斗子半兩縮沙半兩去皮

右件藥都微炒過搗細羅為散每於食前

以粥飲調下二錢

又方牡蠣二兩燒為粉細研

若以棗肉和為團入文火燒令黃色細研

每於食前以粥飲調下壹錢

又方當歸青兩細剉微炒

若以水壹大盞入生薑半分煎至六分去

滓食前稍熱分為二服

治膿血痢諸方

夫膿血痢者為春時陽氣在表人運動勞役

腠理則開而氣虛者則傷於風至夏又熱氣

乘之而性得熱則流散其遇大腸虛血滲入

焉與腸間津液相搏積熱蘊結血化為膿腸

虛則泄故成膿血痢也所以夏月多膿血痢

者由腸胃虛也秋冬診其脾脉微澹為內潰

多下膿而又脉懸絕則死滑大則生脉微小

者生實急者死脉沉細虛遲者生數疾大而

有熱者死

治下痢膿血心腹疴痛不止白礬散方

白礬壹兩 燒灰 黃丹壹兩 胡粉二兩 龍骨壹兩

當歸壹兩 訶梨勒壹兩 黃連三兩

甘草壹分 微赤剉

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥

飲調下二錢

治膿血痢腹內疴痛行數不恒食飲不下黃

連散方

黃連壹兩 黃蘗壹兩 艾葉壹兩 附子壹兩

烏梅肉壹兩 乾薑壹兩

厚朴壹兩 薑汁壹兩 炙令香熟

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥

飲調下二錢

治膿血痢遠臍疼痛阿膠散方

阿膠二兩 當歸壹兩 黃連壹兩

赤芍藥兩 乾薑壹兩 赤石脂兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥

飲調下二錢

治膿血痢心煩腹疴痛黃蘗散方

黃蘗壹兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥

飲調下二錢

黃蘗一兩炙 梔子一兩 黃連去鬚 阿膠一兩

搗碎炒 當歸一兩 令黃燥微炒

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下壹錢

治膿血痢腹痛心煩口乾不欲飲食當歸散

方

常歸一兩 地榆兩 甘草半兩 赤石

脂二兩 烏梅肉壹兩 梔子人兩 白朮一兩 黃芩

壹兩 乾薑壹兩 炮

右件藥搗細羅為散每服不計時計以粥飲調下二錢

治膿血痢腹內疴痛口乾心煩木香散方

木香半兩 龍骨兩 白朮半兩 黃連去鬚 鼈甲

黃土半兩 當歸半兩 微炒

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢

治膿血痢腹痛不欲飲食乾薑散方

乾薑三分 黃連三分 桂心三分 木香半兩

厚朴

壹兩半去蘆皮塗

當歸

三分剉

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥

飲調下二錢

治冷熱氣不和腹痛下痢膿血附子散方

附子

青兩炮裂

神麴

三分炒

乾薑

三分炮裂剉

甘草

一分炙

當歸

半兩剉

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥

飲調下二錢

治痢下膿血食不消化烏梅丸方

御醫撮要名梅連丸

烏梅肉

二兩

黃連

二兩去鬚微炒

艾葉

二兩微炒

黃蘗

一兩剉

乾薑

二兩炮裂剉

甘草

一兩炙微赤剉撮要已上二

味各半兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

撮要如每服以粥飲下三十九撮要二日

三四服

治痢下膿血及諸痢疾黃連丸方

黃連

二兩去鬚微炒

當歸

二兩剉

烏梅肉

三兩微炒

膠

二兩搗碎

厚朴

二兩去蘆皮塗生薑汁炙令香熟

右件藥搗羅為末以醋煮麵糊和丸如梧
桐子大每服以粥飲下三十丸日三四服

又方麴三兩炒赤石脂三兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥

飲調下二錢

又方右以薤白於醋中煮令熟及熱飽食即

止錄同

治冷痢諸方

夫冷痢者由腸胃虛弱受於寒氣腸虛則泄

故為冷痢也凡痢青色白黑並皆為冷痢色
黃色赤並是熱也故痢色白食不消謂之寒
中也診其脉沉則生浮則死也

治冷痢腹痛不食四肢羸弱葦茈散方

葦茈三分乾薑二分炮甘草半兩炙陳橘皮

一兩湯浸厚朴一兩去蘆皮塗附子一兩

去白瓢焙生薑汁炙香熟附子炮裂

去皮當歸半兩赤石脂半兩梨勒三分

皮吳茱萸半兩肉荳蔻一兩去殼

飲調下二錢

治冷痢四肢不和心腹疼痛少欲飲食漸加

羸瘦附子散方

附子去皮炮裂陳橘皮一兩易凌乾薑半

炮裂白朮三分桂心半當歸半兩龍骨三分

厚朴一兩去麤皮塗生厚朴汁炙令香熟

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥

飲調下二錢

治冷痢心腹疼痛不欲飲食漸加羸弱木香

散方

木香半兩附子三分炮阿膠半兩壽碎白朮

三分赤石脂二分草薺一兩乾薑三分炮桂

心三分厚朴口去麤皮塗生心薑汁炙令香熟

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥

飲調下二錢

治冷痢洞洩腹中疴痛不可忍竜骨散方

龍骨二兩赤石脂三兩當歸一兩到肉豆蔻一兩

去牡蒙二兩乾薑一兩炮裂牡蒙裂牡蒙裂牡蒙

右件藥搗細羅爲散每服不計時候以粥飲調下二錢

治冷痢不差宜服此方

乾薑四兩炮裂到熟艾四兩

右件藥以新塼上先鋪乾薑次以熟艾勻薄蓋之於艾上以火點著後燒熟烟盡以物蓋合不令透氣候冷開取乾薑并灰同研令細入麝香壹分和研令勻每服不計時候以粥飲調下二錢

治冷痢不差四肢不和腹痛不欲飲食附子先方

附子一兩炮裂去皮臍 萸蓉子一兩水淘去浮者

却炒令乾 薑三分炮裂到 吳茱萸半兩湯浸七

黃黑色去 青橘皮二分湯浸厚朴二兩去麤皮塗生

當歸三分炮裂到 艾葉三分微炒 白朮三分

右件藥搗羅爲末鍊蜜和搗三百杵

如梧桐子大每服不計時候以粥飲下三

十丸

治冷痢不差漸加羸弱喫食減少宜服縮沙
丸方

縮沙三分去皮當歸半兩劉乾薑三分炮青橘
皮三分湯浸吳茱萸半兩湯浸肉荳蔻
半兩厚朴一兩半去麓皮塗白朮一兩附子
去殼厚朴生薑汁炙香熟白朮一兩附子
去皮厚裂生薑汁炙香熟白朮一兩附子
去皮厚裂生薑汁炙香熟白朮一兩附子
右件藥搗維爲末鍊蜜和搗三二百杵丸
如梧桐子大每服不計時候以粥飲下三
十九

治久冷痢諸方

治久冷痢食不消化四肢不和心腹多痛不
能飲食艾葉散方

艾葉壹兩微炒白石脂壹兩白朮三分龜骨兩當歸
壹兩乾薑三分炮附子壹兩炮裂吳茱萸
壹兩湯浸七阿膠三分搗碎厚朴壹兩
煎皮塗生薑汁炙香熟
右件藥搗細羅爲散每服不計時候以熱
粥飲調下二錢

治久冷痢食不消化心腹疔痛四肢少力厚
朴散方

厚朴壹兩半去麤皮塗肉苳蔻壹兩去殼常歸

三分剉龍骨壹兩木香半兩阿膠三分搗碎

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞

入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計

時候稍熱服

治久冷痢不止心腹疼痛飲食不消四肢乏

刀吳茱散方

吳茱萸半兩湯浸七遍白朮三分白石脂壹兩

木香半兩當歸壹兩剉黃連半兩去鬚乾薑

三分炮厚朴壹兩半去麤皮塗

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥

飲調下二錢

治久冷痢食不消化日夜三二十行漸加困

篤竜骨散方

白竜骨壹兩當歸壹兩剉白礬三兩燒白石

脂壹兩附子壹兩炮裂乾薑三分炮

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢

治久冷痢腹脇脹滿食不消化肉荳蔻散于方

肉荳蔻 壹兩 六殼 訶梨勒 壹兩 煨 用皮 乾薑 半兩 炮 裂到

白木 二分 藁芩 兩半 木香 兩半 陳橘皮 壹兩 湯浸 去白瓢

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

治久冷痢食不消化臍腹疼痛乾薑散方

乾薑 三兩 炮 裂到 附子 壹兩 半 炮 裂去皮臍 龍骨 二兩

右件藥搗細為散不計時候煎烏梅湯調

下壹錢

又方赤石脂 壹分 乾薑 壹分 炮 白龍骨 半兩

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

又方川烏梅 半兩 慢火煨令黃 熟於濕地上出毒 乾薑 壹兩 煨 裂濕地

上出 毒到 右件藥同搗細羅為散每於食前以粥飲

調下壹錢

治久冷痢大腸滑泄喫食不消腹脇疼痛附子九方

附子一兩炮裂去皮臍龍骨三分當歸壹兩剉白朮壹兩剉

青乾薑三分炮裂桂心半兩白礬二兩燒灰厚朴一兩

去麤皮塗生薑汁炙令香熟

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計時候以粥飲下三十九

治熱痢諸方

夫熱痢者山腹胃虛弱風邪夾熱乘之腸虛

則泄痢也其色黃若熱甚則黃而赤也

治熱痢下赤黃膿血腹痛心煩困悶犀角散

方犀角一兩黃連壹兩木香三分當歸半兩

妙地榆一兩黃耆壹兩三錢以水壹中煮

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中煮

煎至六分去滓不計時候溫服

治熱痢心煩渴小便赤澀黃芩散方

類聚聖方

四十三

黃芩三分赤茯苓一分川升麻一分吳藍一分阿膠一分

三分黃連黃連一分鬼臼一分黃蘗一分

甘草一分微炒一分三錢以水壹中

右件藥擣篩為散每服三錢以水壹中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治熱痢下赤黃膿腹痛心煩黃者散方

黃耆三分黃連一分生乾地黃一分黃蘗一分

犀角屑一分龍骨一分地榆一分

當歸一分黃芩一分犀角屑一分龍骨一分地榆一分

右件藥擣細羅為散每服不計時候以粥

飲調下二錢

治熱痢腹內疼痛煩渴不食木香丸方

木香一分地榆一分當歸一分甘草一分

赤黃連一分微炒一分枳殼一分黃耆一分

犀角屑一分微炒一分

右件藥擣羅為末鍊蜜和擣三壹百杵丸

如梧桐子每服不計時候以粥飲下三十

丸

治熱痢諸治不差右檮車前子葉絞取汁壹

中盞入蜜壹合同煎壹兩沸分溫二服碎

錄同錄

治冷熱痢諸方

夫冷熱痢者由腹胃虛弱宿有寒而為熱所傷冷熱相乘其痢乍黃乍白是也若熱搏於血血滲腸間則變為血痢也而冷伏腸內搏於津液則變凝白則成赤白痢也

治冷熱痢不止腹□□□□□悶犀角散方

犀角屑一兩白朮一兩黃連一兩當歸一兩

炒地榆一兩木香半兩

右件藥搗羅羅為散每服三錢以水壹中

盞煎至六分去滓不計時候溫服

治冷熱痢心神煩渴腹痛背膈滯悶宜服此

方

甘草一寸炙烏梅肉五枚訶梨勒五枚

右件藥都剉以水壹大盞煎至六分去滓

食前分溫二服

治冷熱痢煩悶不欲飲食訶梨勒散方

訶梨勒壹兩煨用皮 當歸一兩剉微炒 黃連兩去

甘草半兩炙 木香半兩 乾薑半兩炮

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治冷熱痢心腹痠痛不止黃連散方

黃連一兩去 龍骨二兩 木香半兩 當歸一兩剉微炒

赤芍藥兩 訶梨勒一兩半 赤石脂二兩 甘草半兩炙

乾薑一兩炮

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥

飲調下二錢

治冷熱痢腹痛不能飲食附子散方

附子一兩炮裂 黃連一兩去 龍骨兩 當歸一兩

地榆一兩 木香半兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥

飲調下二錢

治冷熱不調痢下膿血不止腹痛不可忍阿

膠丸方

阿膠一兩 黃連一兩 乾薑一兩 木香一兩 龍骨

二赤脂二兩 黃連一兩 當歸一兩 黃芩

一厚朴一兩 薑汁令香熟

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服不計時候以粥飲下三十丸

治冷熱不調下痢不止厚朴丸方

厚朴一兩 薑汁令香熟 黃連壹兩 乾薑

裂到半兩 甘草半兩 龍骨兩 赤石脂兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗百餘杵丸如

梧桐子大每服不計時候以粥飲下三十

丸

治冷熱氣不和腹痛下痢不止內補丸方

黃連壹兩 當歸三分 乾薑半兩 阿膠

膠三分 炒令黃燥

夫右件藥搗羅為末鍊蜜和搗百餘杵丸如

梧桐子大每服不計時候以粥飲下三十

丸

又方當歸壹兩 黃連壹兩 乾薑壹兩

又右件藥搗細羅爲散每服不計時候以粥
飲調下二錢

治休息痢諸方

夫休息痢者由胃管有停飲因飲積久或冷
氣或熱氣乘之氣動於飲而腸虛受之故爲
痢也冷熱氣調其飲則靜而痢亦休也腸胃
虛弱易爲冷熱其邪氣或動或靜故其痢乍
發乍止故謂之休息痢也

治休息痢脾胃氣虛冷大腸轉泄或發或止

飲食全少四肢無力没石子散方

没石子

半兩

肉苳蔻

半兩

桂心

半兩

訶梨勒

壹兩

煨用

厚朴

壹兩

半兩

去麤皮

龍骨

壹兩

麝香

兩

細研

右件藥搗細羅爲散每於食前以粥飲調

下壹錢

治休息痢發歇不恒羸瘦少力安息香散方

安息香

半兩

阿膠

半兩

搗碎

黃連

壹兩

去

桃

白皮壹兩漢椒壹分去目及閉

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下壹錢

治休息痢發歇不定經久不差硫黃丸方

硫黃壹兩砒黃壹兩何首烏壹兩白礬壹兩

右件藥相和研令勻入瓷餅子中五月五

日取不食井水和六一泥固濟封頸候乾

安餅子向火中燒令通赤候冷取藥細研

以麴糊和丸如棗豆大患近者黃連湯下

久者橘皮湯下壹丸

又方黃牛角鯁壹兩木賊壹兩草薹壹兩薹壹兩

香壹分楮葉壹兩霜者曝乾杵末後微炒

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下壹錢

治休息痢不止腹內冷痛不思飲食硫黃散

硫黃壹兩肉苳薹壹兩櫻攔皮壹兩阿魏壹分

熟裏煨麩壹兩熟為度

右件藥搗細羅為散每服於食前以粥調

下壹錢

治休息痢諸藥無效黃丹散方

黃丹三兩炒棗肉三十枚得為塊用紙緊

曲枳殼半兩麩炒黃連半兩去

右件藥都搗細羅為散每於食前以粥飲

調下壹錢赤白痢及水瀉粥飲調下半錢

治休息痢多時不差肌體瘦黃連散方

黃連二兩去竜骨二兩阿膠二兩搗碎

艾葉二兩

右件藥搗細羅為散每於食前煮倉米粥

飲調下三錢

治休息痢立効菰蘆散方

菰蘆壹枚出却白礬壹兩石英壹兩

右二味入菰蘆中以濕紙裹燒候赤為度

待冷搗細研為散每於食前以粥飲調下

壹錢

又方烏賊魚骨兩蜚隨僧兩白竜骨兩

又右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調下壹錢

治休息痢久不止日漸黃瘦白礬丸方

白礬四兩燒令汁盡硫黃一兩消石一兩

右件藥同研於銚子內火上鑿成汁候冷研令極細用軟飯和丸如小豆大每於食前以粥飲下十九

治休息氣痢久不差食即嘔吐腹內疼痛肉荳蔻丸

肉荳蔻壹兩去殼訶梨勒一兩煨用皮白梅肉一兩微炒

黃連壹兩去鬚微炒白礬二兩燒令汁盡

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每於食前以粥飲下二十九

治休息痢肌羸無力腰膝冷臍下痛茱萸煎

丸方三十六

吳茱萸壹兩湯浸七遍焙乾微炒陳橘皮二兩湯浸生

薑壹斤絞取汁無灰酒壹升附子二兩炮去皮臍當歸壹兩

微炒兩到

右件藥搗為末先將薑汁并酒入口口口于
 內慢火煎不住手攪次入藥末口口膏候
 可丸即丸如梧桐子大每於食前以粥飲
 下三十九

治休息痢日夜不止腹內冷痛白頭翁丸

白頭翁一兩黃丹二兩并白頭翁入乾薑一兩

煎裂芫荽子半升以水淘去浮者煮令白

藥二兩燒令汁盡白藥二兩

右件藥搗羅為末以醋煮麩糊和丸如梧

桐子大每於食前以粥飲下三十九

又方神麩一兩半炒令微黃蕪荑二兩半吳茱萸一兩

湯浸七遍焙乾微炒○簡易方各等分

右件藥搗羅為末以熬生薑汁和丸如梧

桐子大每於食前以粥飲下三十九

又方黃連一兩去微炒常歸二兩烏梅肉一兩微炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每於食前以粥飲下三十九

治休息氣痛神效阿膠丸方

阿膠二兩搗碎烏梅肉二兩黃連二兩去

右件藥搗羅為末用煨蒜研和丸如梧桐

子大每於食前以粥飲下三十丸

治休息痢久不差面色青黃四肢逆冷不思

飲食玄精丸方

太陰玄精二兩白礬半斤黃丹二兩青鹽半斤

右件藥細研入牛鐵銚子內燒白礬汁盡

為度後以不艸皂莢三挺存性燒熟都研

為末用糯米飯和丸如梧桐子大每於食

前以粥飲下十九

治休息痢羸瘦宜服此方

杏人二兩湯浸去皮尖獾猪肝壹具去筋

右件肝以水洗去血漉出後於淨鐺中一

重肝一重杏人入盡後用童子小便三升

入鐺中以物蓋慢火煎令小便盡即熟放

冷任意食之

又方縮沙壹兩肉苳蔻半兩

右件藥搗羅為末用羊肝半具細切拌藥

以濕紙三五重裹上更以麵裹用慢火燒
令熟去燠麵并紙入軟飯研丸如梧桐子
大每於食前以粥飲下壹十九

又方黃連

半兩去
鬚為末

定粉

半兩

棗

二十枚
去核

右件藥搗聚如泥鋪在紙上安二味藥裹
之燒令通赤取出候冷細研為散每服使
好精羊肉半斤切作片子用散藥三錢摻
在肉上使濕紙裹燒熟放冷食之不過三
兩服効

治休息痢腸滑宜服此方

訶梨勒皮

正三兩
合

右件藥相和以慢火炒以粟黃為度搗細
羅為散不計時候以粥飲調下三錢

又方藤蘿

二兩

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調
下二錢○瑣碎錄休息痢藤蘿信搗羅為
末食前以粥飲調下

治氣痢諸方

夫氣痢者由表裏不足腸胃虛弱積冷之氣
客於腸間藏腑不和因虛則洩故為氣痢也

治氣痢腹內疼痛不欲食溫中散方

白芍藥兩半白朮三分甘草一分桂心兩半吳

茱萸通焙當歸微炒半兩到

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分棗二枚煎至六分去滓不計

時候稍熱服

治氣痢腹內疼痛四肢不和少欲飲食木香

散方

木香三分紅薤蔥一兩乾薑半兩炮當歸三分

剉微訶梨勒壹兩赤石脂兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥

飲調亦二錢

治氣痢心腹疼痛不欲飲食訶梨勒散方

訶梨勒壹兩當歸三分紅薤蔥三分

木香兩半龍骨兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥

飲調至二錢服之消積逐水不傷脾胃以

治氣痢心腹疼痛白朮方治氣痢也

白朮三兩枳殼半兩黃連半兩當歸半兩

三分山蕪荑一兩加黃芩一兩煨爛入

布待藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子每

服不對時候以粥飲下二十丸以

治久氣痢不差腹內冷痛木香丸方

木香半兩砂礶一兩白礬二兩燒黃丹壹兩龍

骨一兩

右件藥搗羅為末用軟飯和丸如梧桐子

大每服不計時候以粥飲下廿丸

治氣痢久不止枳殼丸方治血熱

枳殼壹兩黃連壹兩黃芩壹兩黃連壹兩黃芩壹兩

右件藥搗羅為末以軟飯和丸如梧桐子

夫大每服食前以粥飲下三十丸

又方右取寒食薑百五日預採木蓼曝乾運化

採蓼芽寒食日用時搗羅為末食前粥飲調

又下膏錢碎同碎一小薑末一錢不

又方右取黃牛乳一小盞煎葦茛末一錢不

計時候稍熱服錄同葦茛末食前飲

又方治蠱注痢諸方正日許科木膠膠黃

夫蠱注痢者由歲時寒暑不調則有濕毒之

氣傷人隨經脉血氣漸至於藏腑大腸虛者

毒氣乘之毒氣挾熱與血相搏則成血痢也

毒氣侵蝕於藏腑如病蠱注之狀 血雜膿

痰黑有片如雞肝與血雜下是蠱注痢也

治蠱注痢下血如鴉鴨肝腹痛不止地榆散

方

地榆一兩甘草半兩赤芍藥一兩栢葉一兩

微茜根壹兩訶梨勒壹兩當歸壹兩

黃連壹兩右件藥持羅羅為散每服四錢以水壹中

煎蓋煎取六分去滓不計時候溫服神巧萬全方同

治蠱注痢血如雞肝者心神煩躁宜服此方

犀角屑壹兩地榆三分蘘荷根壹兩馬兜零根

兩壹

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

煎至六分去滓不計時候溫服神功萬全方同

治蠱注下血如雞肝體熱心腹中煩悶茜根

散方照方 茜根壹兩 川升麻壹兩 犀角屑壹兩 地榆壹兩

黃芩壹兩 黃連壹兩 黃芩壹兩 黃連壹兩 黃芩壹兩 黃連壹兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

又方黑豆壹兩 毛桃膠半兩

右件藥以水壹大盞煎至六分去滓食前

分溫二服

治蠱注痢下血如鵝鴨肝心中煩悶不欲飲

食升麻散方

川升麻壹兩 茜根壹兩 犀角屑壹兩 桔梗壹兩

黃芩壹兩 黃連壹兩 黃芩壹兩 黃連壹兩 黃芩壹兩 黃連壹兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以溫

酒調下二錢

頭黃藥壹兩 黃芩壹兩 地榆壹兩 蘘荷根壹兩

半

右件藥搗細羅為散每服不計時候以溫

酒調下二錢

酒調下二錢

治蠱注痢下血心神煩悶腹中疴痛黃芩散

方

黃芩一兩地榆一兩犀角屑一兩茜根一兩栢葉一兩

一兩甘草一兩訶梨勒一兩煨牛角鯁一兩

灰一兩當歸一兩右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

煎至六分去滓不計時候溫服

治蠱注熱毒痢血或如小豆汁腹痛煩悶犀

角散方

夫犀角屑一兩地榆一兩黃連一兩栢葉一兩

微炒黃蘗一兩黃芩一兩當歸一兩赤地

利一兩生乾地黃一兩右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥

飲調下二錢又方蕭竹葉一兩右以水壹大盞煎至六分去滓入吳藍汁

二合更煎三五沸食前分溫二服

治痢或先下白後下赤或先下赤後下白此

治痢或先下白後下赤或先下赤後下白此

治痢或先下白後下赤或先下赤後下白此

治痢或先下白後下赤或先下赤後下白此

治痢或先下白後下赤或先下赤後下白此

治痢或先下白後下赤或先下赤後下白此

治痢或先下白後下赤或先下赤後下白此

治痢或先下白後下赤或先下赤後下白此

治痢或先下白後下赤或先下赤後下白此

爲腸蠱痢宜服此方

牛膝三味去

右以酒三升漬經三宿每於食前溫飲壹

又小蒸○聖濟總錄治腸蠱先下赤後下黃

白沫連年不差方牛膝兩一右壹味切椎碎

以醇酒壹升漬壹宿平旦空心服之再服

愈

治痢腸滑下腸垢諸方

夫痢腸滑下腸垢者是腸間津汁垢膩也此

由於熱蘊積腸間虛滑所以因下痢而便腸垢也

治腸滑下腸垢陟厘丸方

陟厘三兩吳礬三兩綠礬一兩白礬一兩黃丹壹兩

半石灰三兩赤石脂壹兩白石脂壹兩定粉壹兩

牛

右件藥搗羅爲末入餅子內燒一復時取

出研令細以麪糊和丸如梧桐子大每服

空心以粥飲下壹十九晚食前再服之

治久痢腸滑不止下腸垢羸困葇蓉丸方

葇蓉子二兩水淘去浮者煮令芽出曬乾炒令黃黑色乾薑二兩炮裂

剉白礬二兩燒令汁盡

右件藥搗羅為末以醋煮麵糊和丸如梧

桐子大每服以粥飲下三十丸神巧萬日全方同日

三服

治久患冷痢及休息氣痢脾胃冷極大腸滑

洩下腸垢不絕麝香丸方

麝香半兩細研鹿茸壹兩去毛塗酥炙令微黃

右件藥搗羅為末煮棗瓠和丸如梧桐子

大每服不計時候以粥飲下三十丸○是

齋醫方香茸元治下痢危困醫方火或下

弱四麝香半錢別研鹿茸壹兩火燎右鹿

茸為細末方入麝香以燈心煮棗肉為元

如梧桐子大每服五十元空心服嚴氏濟

或空心米飲送下繆立夫云有一醫者每料添滴

乳香半兩尤有效醫方集成南北經方

同紹熙王子紹興人苦痢疾者極多往往

而死凡平時所用治痢如罌粟殼之類不可向口唯服此等藥或沒石子元作効

同方

治水穀痢積久不差下腸垢赤石脂凡方

赤石脂壹兩桂心兩壹白礬二兩燒乾薑壹兩

附子壹兩炮裂去皮臍凡方

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗百餘杵丸如

梧桐子大每服不計時候以粥飲下三十

丸神巧萬全方同

治痢下積久不差腸垢已出方

烏梅肉二十枚

右件藥以水壹大盞煎至六分去滓食前

分為二服

又方右取醋石榴壹枚和皮搗絞取汁隨多

少煖服之

治痢後不能食諸方

夫痢後不能食者由脾胃虛弱氣逆胃間之所為也風邪入於腸胃而痢痢則水穀減耗

脾胃虛弱痢斷之後脾胃尚虛不勝於食邪搏於氣逆上則胃弱不能食也
 治痢後脾胃虛乏不能飲食四肢羸瘦宜服人參散方

人參壹兩 去高良薑
壹兩 白木壹兩 白茯苓
壹兩 厚朴二兩 薑汁炙 香熟生 乾木瓜壹兩 肉荳蔻壹兩 當歸壹兩 甘草半兩 炙
 右件藥搗細羅為散每服不計時候煮棗粥飲調下二錢

治久冷下痢後脾胃尚虛不能飲食四肢少力白木散方

白木壹兩 乾薑壹兩 炮木香
半兩 甘草半兩 炙
壹兩 厚朴壹兩 薑汁炙 香熟生 阿膠壹兩 搗
令 微黃當歸
壹兩 訶梨勒壹兩 煨用

右件藥搗細羅為散每服不計時候煮棗粥飲調下二錢
 治痢後虛羸不下飲食訶梨勒丸方

訶梨勒壹兩煨木香半兩丁香半兩肉荳蔻壹兩

去當歸壹兩剉乾薑壹兩炮乾薑壹兩剉白芍藥壹兩桂

心半兩縮沙壹兩陳橘皮三分湯浸白朮壹兩

厚朴壹兩去薑汁炙令香熟

右件藥搗維為末煮棗瓠和擣三二百杵

丸如梧桐子大每服不計時候以薑棗湯

下三十九

治痢後脾胃虛弱不思飲食四肢乏力猪肝

丸方

猪肝一大葉以醋煮令爛研如糊烏梅肉壹兩乾薑

壹兩炮川草壹分炙草荳蔻壹兩當歸壹兩

剉微草荳蔻壹兩剉訶梨勒壹兩煨桂心半兩肉荳

蔻壹兩厚朴壹兩去薑汁炙令香熟

右件藥擣羅為末用猪肝和搗三二百杵

丸如梧桐子大每服不計時候以粥飲下

三十九

治痢後四肢羸弱不能飲食白朮丸方

白朮二兩神麩壹兩炒肉荳蔻壹兩乾薑壹兩

炮裂當歸壹兩到人參壹兩去桂心半兩木

香附子兩附子兩去皮臍

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵

如梧桐子大每服不計時候煮棗粥飲下

三十丸

治痢後不能食氣虛羸瘦麥蘖丸方

麥蘖二合炒令微黃麴半斤炒附子壹兩

炮裂神巧萬全方二兩烏梅肉壹兩人參壹兩去

皮臍壹兩桂心兩白茯苓壹兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸
如梧桐子大每服不計時候煮棗粥飲下

三十丸

治痢後脾胃氣虛弱不能飲食四肢乏力

香丸方火煉四黃木香壹兩丁香半兩

近木香兩訶梨勒半兩煨縮沙半兩去皮

大肉荳蔻壹兩人參壹兩甘草半兩炙乾

薑壹兩厚朴壹兩薑汁炙令香熟

右件藥搗羅為末醋煮麵糊和丸如梧桐

守太每服不計時候煮棗粥飲下三十丸

治一切痢諸方

夫一切痢者謂痢色無定或水穀或膿或血或青或黃或赤或白變雜無常或雜色相兼而痢也夾熱則黃赤熱甚則變膿血也冷則白冷甚則青黑皆由飲食不節冷熱不調胃氣虛弱故變易也

治一切痢久不差朱砂丸方

朱砂壹分 蛤粉半兩 巴豆壹分 硫黃壹分

烏頭末半分 麝香半錢 砒霜半分

右件藥都細研令勻用煮棗肉和丸如黍

米大每服不計時候以冷粥飲下三丸忌

食熱物

治一切痢久不差立効丁香丸方

母丁香三 巴豆四十九枚 去皮心油煎

壓去麝香壹分 砒霜壹分

右件藥都研為末以粟米飲和丸如菉豆

大空心以冷水下壹丸忌食熱物

又方雄黃兩胡粉半消石半蜜陀僧兩

右件藥細研如粉以軟飯和丸如梧桐子

大每於食前以粥飲下十九

治一切痢久醫不差乾漆丸方

常乾漆精碎炒硫霜朱砂麝香錢

巴豆十枚去皮

右件藥都研如麵以軟飲和丸如麻子大

每服不計時候以新汲水下壹丸

治一切痢諸藥無効宜服此方

巴豆三七枚去皮心桃人二十枚去皮

炒令朱砂壹分硫黃壹分硫霜壹分麝香半錢杏人

二十枚去皮尖雙人湯浸

右件藥同研令細用軟飯和丸如菉豆大

每服以冷粥飲下三丸忌食熱物

又方巴豆七枚去皮心油深色燕脂錢

右件藥先研巴豆為末次入燕脂同研令

細煮棗肉和丸如黍米大每服以冷粥飲

下三丸小兒壹丸忌食熱物

又方巴豆十枚去心硫黃三分朱砂三分

右件藥細研如粉以麵糊和丸如菜豆大

每服以新汲水下兩丸忌食熱物

又方白礬壹兩朱砂兩麝香半錢

右件藥都研如粉以糯米飲和丸如黃米

大每服不計時候以二宜湯下十丸

又方寒水石壹分附子壹分皮壹分礬霜壹分

粉壹分右件藥都研如粉以水浸蒸餅和丸如黍

米大每服不計時候以新汲水下三丸忌

食熱物

又方朱砂兩硫黃兩砒霜兩黃丹一兩

右件藥相和細研如粉用水浸蒸餅和丸

如梧桐子大每服以冷粥飲下壹丸忌食

熱物

治水瀉諸方

夫脾與胃為表裏脾主消於水穀胃為水穀之海其精氣化為氣血以養藏腑其糟粕傳

於大腸也若腸胃虛弱受於寒氣或飲食生冷傷於脾胃冰穀不消大腸虛寒故成水瀉也

治水瀉腹痛不納飲食龍骨散方

龍骨壹兩 木香壹兩 當歸壹兩 肉荳蔻壹兩

麩黃為度 藥味壹兩 破壹兩 木壹兩 炒壹兩 餅壹兩 令

治痢下脫肛諸方

治大腸風冷久痢不差脫肛赤石脂散方

赤石脂壹兩 當歸壹兩 蓬莪茂壹兩 龍骨壹兩

肉荳蔻壹兩 白石脂壹兩 黃連壹兩 白芍壹兩

藥兩 厚朴壹兩 薑汁壹兩 炙壹兩 香熟壹兩 炙壹兩 麻壹兩 大

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

下二錢

治痢疾時久不差變種種痢兼脫肛荳蔻丸

方

荳蔻子壹兩 一升水淘去浮者水煮令芽壹兩 醋

升二青州棗

壹升煮令

右以醋煮二味為膏候可丸即丸如梧桐

子大每於食前以粥飲下二十九

治久痢不差右蟲兼下部脫肛蕪荑丸方

蕪荑

二兩

黃連

二兩

蟬蛇膽

兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服以杏入湯下三十九日再服

治諸痢疾脫肛久不止龍骨散方

龍骨

壹兩

艾葉

一兩

鼈頭骨

三枚

塗酥

炙令焦黃

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調

內下二錢

四時纂要

痢藥阿膠散子

當歸

剉碎

黃連

去毛

訶子

煨取

阿膠

慢火

起 卽止

甘草

漿水

右件五味各等分細搗羅為末

黃丹三白礬二二味相和細研入瓶子內

以炭火斷之通炙良久放冷卽出細併之

此藥與前草藥等和合為散每服三錢
 米飲調下若要作丸子以麩糊和和為丸
 年如豌豆大一服十粒此散兼治一切瘡
 及小兒瘡以人乳調塗餘瘡皆用
 和劑湯方
 朝黃丹治腸胃虛弱內受風冷或飲食生冷
 內傷脾胃泄瀉暴下日夜無度腸鳴腹痛手
 足厥寒藥性
 和劑湯方
 朝黃丹治腸胃虛弱內受風冷或飲食生冷
 內傷脾胃泄瀉暴下日夜無度腸鳴腹痛手
 足厥寒藥性

硫黃 生研細 白礬 煨七 朱砂 三兩一錢
三十兩 兩半 研為衣

右合研勻用水浸蒸餅為圓如梧桐子大
 以前朱砂為衣每服三十圓溫米飲下不
 計時候夏月宜備急
 訶梨勒圓治腸胃虛弱內受風冷水穀不化
 泄瀉注下腹痛腸鳴胃滿短氣又治腸胃積
 寒久痢純白或有青黑日夜無度及脾胃傷
 冷暴瀉不止手足厥冷脉微欲絕

肉苳蔻 去木香 乾薑 炮各二 縮砂仁
皮 火 不見 十兩

阿藜勒皮木川烏頭炮去皮白礬煨各四兩

骨洗赤石脂各八兩

右為末用粟米飯為圓如梧桐子大每服

二十圓至三十圓溫粟米飲下食前服甚

者可倍加圓數

大溫脾圓治脾胃虛弱冷氣攻衝飲食不化

心腹脹痛嘔吐吞酸痞噎不通腸鳴泄利水

穀不分面黃肌瘦食減嗜卧常服溫脾益胃

消穀進食久虛痼冷食少傷多宜常服

吳茱萸湯洗大麥蘖炒肉桂去麩皮附子

炮去細辛去苗各枳殼麩炒壹分神麴

皮碎炒三人參去薑炮甘草炙桔梗各三

兩膏錢

右為細末煉蜜和圓如梧桐子大每服二

十圓溫酒或米飲下日三服空心食前

黃連阿膠圓治腸胃氣虛冷熱不調下痢赤

白狀如魚腦裏急後重臍腹疼痛口燥煩渴

小便利
阿膠碎炒一兩○醫方大茯苓去皮二兩黃連

夫鬚

右黃連伏苓同為末水調阿膠末

大成油

類鈴方微義

搜和圖如梧桐子大每服二

十圓前易方五十九圓大溫米飲下

衛生寶鑑

下食前服醫方集成南北經

神效胡粉圓治腸胃虛滑下利無度赤白相

雜臍腹疔痛裏急後重減食羸瘦或經久未

差並宜服之

烏賊魚骨

洗

阿膠

抄魚如

胡粉

各四蜜陀

僧二十白礬

枯龍骨

洗各八

右為末以粟米飯為圓如梧桐子大每服

二十圓至三十圓溫粟米飲空心下

靈砂丹治藏府怯弱內有積滯臍腹撮痛下

痢膿血日夜無度裏急後重腸鳴腹脹米穀

不化少氣困倦不思飲食或發寒熱漸至羸

瘦

桂府滑石

乳香

研各

黃丹

枯礬

研各

信州砒霜

硝石

與砒霜一處研入

蓋口炭火燒半臛粉研粉霜半兩朱砂研
日取出去火毒臛粉霜半兩朱砂飛
壹兩

右為末用蒸餅貳兩四錢和為圓如梧桐

子大每服五圓溫粟米飲下未愈加圓數

再服小兒可服一圓至二圓隨大小臨時

加減服之

不二圓治大人小兒一切瀉痢無問冷熱赤

白連絲不差愈而復發腹中疼痛者宜服之

白膠香研細砒霜膏兩六錢研入磁罐子
四錢以赤石脂固縫泥固

濟燒通赤木鼈子十介乳香六錢黃丹二
候冷取出半兩朱砂研飛巴豆去皮心杏仁炒

法皮尖各三錢朱砂半兩巴豆膜出油杏仁七

右研勻鎔蠟和圓如黃米大每錢作壹百

二十圓每服一圓小兒半圓水瀉新汲水

下赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白痢

下赤痢乾薑湯下並放冷臨卧服忌熱物壹

兩時辰

訶梨勒散治脾胃虛弱內挾冷氣心脇臍腹

訶梨勒散治脾胃虛弱內挾冷氣心脇臍腹

脹滿刺痛嘔吐惡心飲食減少腸鳴泄利水

穀不化怠惰少力漸向瘦弱並宜服醫方大成息上

有漸成痢疾四字

訶子皮大成訶子仁青皮去穰各四十兩附子

炮去皮臍十斤肉桂去麤皮五斤肉豆蔻

仁大成一兩麩裏煨令熟四十兩右為末每服三錢水盞半生薑三片煎七

分食前溫服醫方集成南北經驗方袖珍方永類鈔方玉機微義與大

同成

木香散治脾胃虛弱內挾風冷泄瀉注下水

穀不化臍下疔痛腹中雷鳴脊隔痞悶脇肋

虛脹及積寒久利腸消不禁肢體羸困不進

飲食

肉荳蔻仁當歸去蘆一本及甘草鑑

木香各二兩赤石脂附子去皮臍

片焙乾訶子皮針方訶子肉藿香葉洗

各十兩附子針方訶子肉藿香葉洗

右為末每服壹大錢水壹盞生薑二片棗

一箇同煎至六分溫服空心食前○得效
 方右判散每服三錢生薑三片棗子二枚
 煎空心溫服大成右咬咀每服三錢水一
 盞姜棗同煎空心溫服醫方集成南北經
 驗方袖珍方與大
 成同
 七棗湯治脾胃虛弱內受寒氣泄瀉注下水
 穀不分腹脇脹滿臍腹疝痛心下氣逆腹中
 虛鳴嘔吐惡心胃隔痞悶困倦少力不思飲
 食食

茴香法川烏炮去縮砂取仁各甘草六

乾薑炮厚朴去皮益智去皮各壹斤○

斤一本此一味半

右為蠶末每服二錢水一盞大棗七箇擘

破同煎七分去滓溫服食前空心

胃風湯治大人小兒風冷乘虛入客腸胃水

穀不化泄瀉注下腹脇虛滿腸鳴疝痛及腸

胃濕毒下如豆汁或下瘀血日夜無度並宜

服之

白芍藥

白朮

肉桂

去龜皮○嚴氏濟生方佳心不見火

人參

去

當歸

去

芎藭

茯苓

去皮各等分○濟生方玉

機微義白茯苓

右為麤末每服二錢

濟生方醫方大成集或南北經驗方永類

鈞方水壹大盞

濟生方一盞半

粟米百餘粒同煎

七分去滓稍熱服空心小兒量力減之

衛生

寶鑑袖珍方同濟生方有甘草炙

○易簡方治大人小兒

風冷乘虛入客腸胃風散氣故有血行大腑多便鮮血及腸胃間濕毒下如豆汁或

又下瘀血日夜無度此藥主之今人多用

以治痢并泄瀉皆非所宜若患血痢脾胃

壯者可服

此藥兼治腸風下血及婦人下血過多面

色痿黃筋力衰憊者服之尤能滋補但性

味不便於脾胃恐傷穀氣耳人參白茯苓

芎藭官桂當歸白芍藥白朮

並等分

右咬咀

每服四錢水壹大盞粟米百餘粒同煎七

分去滓稍熱服空心食前小兒量力減之

此方加熟地黄黃耆甘草等分足為十味名
 十補湯大治虛勞嗽加五味子有痰加半
 夏發熱加柴胡有汗加牡蠣虛寒加附子
 寒甚加乾薑皆依本方等分此須脾胃壯
 者可服稍不喜食則不可用往往令人止
 因脾虛停積痰飲發為寒熱便作虛勞治
 之服此等藥愈傷胃氣至於不救者比比
 皆是於真武湯方中亦互言之施治之法
 却於逍遙飲方中求之有人患消渴者用

十補湯煎代湯飲服之仍下三因方中玄

兔煎

用兔絲子酒浸軟研焙乾別取末十兩白茯苓蓮肉各三兩五味子七兩

酒浸別

碾並為末用山藥末六兩將浸藥酒煮糊杵熟為圓如梧子大每服五十圓

米飲空

其效甚著須是戒酒色并火上炙

燻之物以久服取效若骨蒸發熱飲食

自若者用十補湯加劉柴胡各二分作十

服服之簡易方治大人小兒風冷乘虛入

客脾胃風散氣故血行大腑多便鮮血水

穀不化泄瀉注下腸胃濕毒下如豆汁或

下瘀血日夜無度臍腹疔痛腸風下血近
 婦人下血過多面黃力倦服此尤能滋補
 但味甜恐傷穀氣耳人參白朮茯苓當歸
 芍藥桂心芎藭各二兩防風半兩定公十
 右咬咀每服三錢水壹大盞粟米煎餘粒
 煎取七分去滓熱服小兒量力與服
 今人多用此治痢止瀉皆非所宜但血痢
 脾胃素壯者宜服肉桂三兩
 瘧痢皆生於脾胃若脾胃虛而有痰外胃

風暑致陰陽紛爭寒熱更作休作有時病
 名曰瘧若脾胃虛而受積內挾風暑致臟
 腑不調赤白雜下登廁頻數病名曰痢瘧
 痢二病中外證雖不同要知皆能傷耗氣
 血治瘧之法當先分陰陽然後與之驅截
 治痢之法當先除積滯然後與之調止由
 是而知痰者瘧之根積者痢之原治之者
 必先求其要可也直指方治風冷客入腸
 胃泄下鮮血及腸胃濕毒下如豆汁或下

瘀血人參白茯苓當歸梓桂白朮白芍藥分等右剉每服三錢粟米百餘粒同煎食前熱服腹痛加木香

半硫圓除積冷暖元藏溫脾胃進飲食治心腹一切疝癖冷氣及年高風秘冷秘或泄瀉等並皆治之

硫黃

明淨好者研令極細用柳木槌子殺過

半夏

湯洗七次焙乾為末

右等分以生薑自然汁同熬入乾蒸餅末攪和勻入臼內杵數百下圓如梧椰子大

每服空心溫酒或生薑湯下十五圓至三十圓婦人醋湯下

赤石脂散治腸胃虛弱水穀不化泄瀉注下腹中雷鳴及冷熱不調下痢赤白腸滑腹痛遍數頻多脇肋虛滿胃膈痞悶肢體因倦飲食減少

縮砂仁

二十兩

赤石脂

五兩

甘草

仁

麪裏煨令熟四十兩

右為末每服二錢溫粟米飲調下食前空

心服

純陽真人養臟湯治大人小兒腸胃虛弱冷熱不調藏府受寒下痢赤白或便膿血有魚腦裏急後重臍腹疔痛日夜無度胃膈痞悶脅肋脹滿余不思食及治脫肛墜下酒毒

神而諸藥不效者並治之
赤芍藥 一兩六錢 ○經驗秘當歸 法
去白朮 各六錢 ○澹寮 肉豆蔻 麵煨半兩
方一兩二錢 方簡奇 肉桂 去麤皮 ○秘方 甘草

炙各八錢 ○大成玉機 木香 壹兩四錢 ○
微義一兩八錢 不見火
寶鑑壹兩六錢 訶子皮 一兩二錢 ○一
微義二兩四錢 本及大成去核 壘
栗殼 三兩六錢

右為籩末每服貳大錢 寶鑑水膏 壹半 大

承類鈐方微義每煎八分去滓食前溫服
鈐方微義此下云臍寒者加附子醫方老
集成南北經驗方袖珍方與大成同
人孕婦小兒暴瀉急宜服之立愈忌酒麪

生冷魚腥油膩如藏府滑泄夜起久不差
者可加炮了附子參四片煎服此藥的有

神效不可具述

一本不用
肉豆蔻

感應圓治證并方見諸氣門

大已寒圓治證并方見傷寒門

御米湯治久患痢疾或赤或白臍腹痛裏

急後墜發歇無時日夕無度及下血不已全

不入食並治之

罌粟殼炙白茯苓去皮甘草炙各五兩人參去蘆乾

薑地各二兩厚朴去蘆皮薑製炒十圓

右咬咀每服三錢水一盞半生薑三片大

淮棗三枚烏梅一箇煎至壹盞去滓空心

食前通口服如年老及七八十歲每服二

大錢小兒每服一錢半更量兒歲加減

地榆散治腸胃氣虛冷熱不調泄瀉不止或

下鮮血或如豆汁或如豚肝或膿血相雜赤

多白少腹痛後重遍數類併全不入食並宜

服之

鶯粟殼去穢石榴皮 蓮蓬去甘草炒各

右為細末每服二大錢水壹盞半生薑三

片煎至一盞通口服不拘時候
 余粟湯治丈夫婦人室女小兒一切下痢無
 問新久冷熱不調日夜無度臍腹絞痛即痢
 肢體困倦小便閉澀不思飲食漸加羸瘦又
 治傷生冷脾胃怯弱飲食不消腹脹雷鳴泄
 瀉不止連月不瘥並宜服之

罌粟殼去瓢帶蜜炒 甘草炒各半斤 陳皮去白壹斤壹分〇一
 本半 車前子四兩炒 乾薑二兩炮
 右為細末每服二大錢水壹盞棗壹枚生

薑二片煎至七分空心食前稍熱服如或

用飯飲調下亦得忌生冷油膩魚腥鮓醬

等物○朱氏集驗方治痢車前子炒 陳皮

罌粟殼審炙去穢各四兩 乾薑一兩 枳實半兩 右改

咀每服三大錢水壹盞生姜三片棗壹枚

煎七分空心服王氏集驗方治下痢赤白

裏急後重心腹絞痛及遠年滑泄並宜服

之罌粟殼去蓋帶子細蜜炒半斤 陳皮半斤 乾薑炮二兩
 車前子四兩炒 甘草半斤 右為粗末每服半

兩水壹觥半生薑三片棗兒二個煎至壹
觥空心熱服全家入病滑泄痢經口不差
因閱此方中有車前子冷熱痢皆可服故
服之皆服便止後以治遠年滑泄方中加
竜骨牡礪其效如神
育腸圓治腸胃虛弱丙挾生冷腹脹泄瀉時
時刺痛裏急後重下痢赤白或變膿血晝夜
頻併經久不瘥

烏梅肉 黃連 去鬚硬 各一分 當歸 去蘆酒浸透 壹宿焙青兩

肉豆蔻 濕紙裹煨 訶子皮 小鶯粟殼 去蓋筋蜜炙

右爲細末煉蜜圓如梧桐子大每服三十
圓至五十圓空心食前飯飲下如小兒作
小圓煎甘草乾薑湯下

腸風黑散治榮衛氣虛風邪冷氣進襲藏腑
之內或食生冷或啖炙博或飲酒過度積熱
腸間致使腸胃虛弱糟粕不聚大便鮮血臍
腹疼痛裏急後重或肛門脫出或久患酒痢
大便頻併並皆治之

木饅頭

燒

敗櫻

燒

烏梅

去核

甘草

炙各二兩

右為細末每服二錢水壹盞煎至七分空

心溫服

斗門散治八種毒痢藏腑撮痛膿血赤白或

有五色相雜日夜頻併兼治禁口惡痢裏急

後重大渴不止酒痢臟毒全不進食

鶯粟殼

去穰

黑豆

炒去殼

當歸

去蘆

乾薑

炮

兩匙榆

去蘆

甘草

炙各二兩

乾葛

去皮

右為細末每服二錢水壹盞煎至七分溫

服不拘時候

水煮木香圓治一切赤白膿血相雜裏急後

重或臟腑滑泄日夜無度或積寒久冷臍腹

疼痛可思簡易方飲食

青皮

白

甘草

炙各二兩

鶯粟殼

去穰

三兩六錢去蒂

當歸

去蘆

木香

不見火

各六錢

炮法核

○醫方大

木香

簡易方

各六錢

○

右為細末煉蜜圓如彈子大每服壹圓水

入分蒸煎至六分空心食前溫服簡易方

服不拘時候醫方集成南北

大斷下圓治藏腑傳寒腸胃虛弱腹痛泄瀉

全衣思食

高良薑去蘆赤石脂研乾薑炮竜骨研各壹

酸石榴皮一宿淨米醋浸白漆枯附子去

臍肉乾麩裏訶子煨去核牡蠣火煨各細

辛去土葉木去右為細末醋煮麵糊為圓如梧桐子大每

服五十圓空心温米飲下醫方大成集成南北經驗方類

珍方永類
鈐方同

狗頭骨圓治久患下痢臍腹痛所下雜色

晝夜不止或其人久虛頻下腸垢謂之惡痢

並能治之

肉荳蔻麩裏煨附子炮去臍皮狗頭骨壹具火燒

各壹兩赤石脂敗龜燒有性乾薑各半兩

右為末醋糊圓如梧桐大勿服五七十圓

米飲空心下

水煮木香圓治證與前水煮木香圓同

木白芍藥去蘆各當歸二兩罌粟殼去帶蓋蜜炒黃色八

兩陳橘皮去核二青皮去白甘草炒木香各宜兩

訶子皮去核二

右為細末煉蜜圓每一兩作六圓每服一

丸水一盞煮至七分和滓空心溫服不拘

時亦得一本加乾姜炮一兩半

大香連圓丈夫婦人腸胃虛弱冷熱不調泄

瀉煩渴米穀不化腹脹腸鳴胃膈痞悶脇肋

脹滿或下痢膿血裏急後重夜起頻併可澹

力作思飲食或小便不利肢體倦怠漸即瘦

弱○醫方大成香連元治冷熱不調下痢亦

白膿血相雜裏急後重玉機微義同

木香四兩八錢八分○一本及大成不黃

連去蘆鬚一十兩用吳茱萸十兩同炒令赤去茱萸不用○澹寮方黃連壹兩用

吳茱萸更半兩同炒赤去茱萸不用

右為細末醋糊為圓如梧桐子大每服二

十圓飯飲吞下空心食前醫方集成南北經驗方袖珍方

與大成同日進三二服○直指方香連圓

治冷熱不調瀉痢黃連

註用表黃半兩炒去菜黃不用

木香分右取香連為末醋糊圓桐子大每

三十圓米飲下戊巳圓方見泄瀉門通用

戊巳圓治脾受濕氣泄利不止米穀遲化臍

腹刺痛小兒有疳氣下痢亦能治之玉機微義治胃

經受熱泄利不止

吳茱萸去梗炒黃連去須白芍藥各五

右為細末麪糊為圓如梧桐子大每服二

十圓醫方大成集腋珍方微義衛生易簡乃三十圓濃煎米飲

下空心食前日三服○御藥院方右同炒

候吳茱萸黃熟則止放合為細末水煮麪

糊為丸如梧桐子大每服五七丸食前

米飲下簡易方治冷熱不調泄瀉不止臍

腹刺痛黃連法芍藥吳茱萸去梗湯分將

黃連芍藥炒微黃次下茱萸同炒深黃色

為末水糊圓梧桐子大每服三十圓溫米

飲下口二三服不拘時一方水浸蒸餅

為圓良方作末水煎治痢疾表白朴息

等粥
瀉聖散子治丈夫婦人遠年日近赤白休息

黃栢皮去麤皮枳殼去穢穢甘草一本及御米

粟子鶯粟殼去蒂蓋乾薑炮當歸去蘆各

右為麤散每服三錢水壹盞半醫方大成

經驗方神珍方薤白二條擘碎同煎八分

去滓食前溫服老人小兒加減服食忌在

冷油膩物

豆附圓治丈夫婦人腸胃虛弱內受風冷外

穀不化泄瀉注下腹痛腸鳴手足厥冷服諸藥不效者此藥主之

肉豆蔻炮附子炮片茯苓白者焙木香不見

火肉桂去麤皮乾薑炮丁香壹兩不見火

右為細末薑汁麵糊為圓如梧桐子大每

服五十圓至壹百圓生薑湯下粥食亦得

空心食前進

溫中圓治脾藏傷冷宿食不消霍亂吐瀉心

腹膨脹攻刺

良薑去薑乾薑炮

青皮去白

陳皮去白

各五兩

右為細木用醋打麵糊為圓如梧桐子大

每服三十圓米飲下不拘時候又療丈夫

小腸疝氣塊疔痛炒茴香少許嚼鹽湯或

塩酒任下日進二服

肉豆蔻散治脾胃氣虛腹脇脹滿水穀不消

藏府滑瀉腹內虛鳴困倦少力口苦舌乾不

思飲食日漸瘦弱

訶子皮

川烏

炮去膽皮

肉桂

去麤皮

茴香

炒各二兩

肉豆蔻

麤裏煨

厚朴

去麤皮薑炒

甘草

煨

乾薑

炮

陳橘皮

各四兩

蒼朮

米泔浸一宿去皮焙八兩

右為末每服二錢水壹盞薑二片棗一枚

煎七分溫服

神應黑玉丹治丈夫婦人久新腸風痔瘻著

床頭痛不可忍者服此藥不過三四次便見

功效初得此疾發痒或疼穀道周回多生硬

核此是痔如破是瘻只下血是風皆因酒色

氣風食五事過度即成此疾人多以外醫塗

治病在腸自有蟲若不去根本其病不除此藥的有神効

刺蝟皮十六兩 猪懸蹄一伯隻○二百隻 雷丸

脂麻各四兩 牛角腮十二兩 苦練根五兩 亂髮皂角

水浸敗櫻 各八兩 槐角六兩

右剉碎用瓷罐內燒存性碾為末入乳香

二兩麝香八錢研和勻用酒打麪糊為圓

如梧桐子大每服八粒先細嚼胡桃一枚

以溫酒吞下空心晚食前日二服如病甚

日三服切忌引藥不過三兩日永除根本

鶯粟湯治腸胃氣虛冷熱不調或飲食生冷

內傷脾胃或飲酒過度臍腹疔痛泄瀉腸鳴

下痢或赤或白裏急後重日夜頻併飲食減

少及腸胃受濕膨脹虛鳴下如豆汁或下鮮

血

鶯粟殼 去帶蜜炙四兩 艾葉去梗 黑豆炒去皮 乾薑炮

陳皮去白 甘草炙各二兩

右為麤散每服三錢小壹盞半煎至壹盞

去滓温服食前忌生冷油膩毒物小兒量
歲數加減與之

固腸散治脾胃虛弱內受寒氣泄瀉注下水
穀不分冷熱不調下痢膿血赤少白多或如
魚腦腸滑腹痛遍數類併心腹脹滿食減少
力

陳米炒二兩肉豆蔻生用罌粟殼去帶益糞蜜炙各二兩

乾薑炮甘草炙各二兩木香一兩不見火

右爲末每服二錢酒一盞牛薑二片棗一

枚同煎至七分温服不計時如不飲酒水
煎亦得忌酒麵魚腥等物

麴朮圓治時暑暴瀉壯脾温胃進美飲食及
療飲食所傷胃膈痞悶

神麴炒蒼朮米泔浸一宿焙乾

右各等分爲細末麩糊爲圓如梧桐子大
每服三十圓不拘時米飲吞下衛生寶鑑同

纏金丹治大人小兒一切瀉痢無問冷熱赤
白連綿不癒愈而復發腹中疼痛者宜服之

白膠香錢壹黃蠟錢壹朱砂各壹兩乳香壹兩礪砂

各二錢半木鼈兩半黃丹二兩砒霜三錢半巴豆

去皮心杏仁兩○一本各八錢半

右研為末鎔蠟和圓如麻子仁大每服壹

圓小兒半圓水瀉新汲水下赤痢甘草湯

下白痢乾薑湯赤白痢甘草乾薑湯並於

冷臨卧服孕婦莫服忌熱物一二時辰

縛虎圍治休息痢經一二年不瘥羸瘦衰弱

及脾疼腰痛

黃蠟半兩砒成塊乳細

右將黃蠟鎔開下砒以柳條七箇逐箇攪

頭焦即換俟川足取起旋圓如梧桐子大

每服一圓痢冷水下脾疼亦然腰痛冷酒

下並食前小兒圓如黍米大每服一圓湯

使同上

遇仙立效散治諸般惡痢或赤或白或濃淡

相雜裏急後重臍腹絞痛或下五色或如魚

腦日夜無度或禁口不食不問大人小兒虛

弱老人產婦並宜服之

御米殼

去帶蓋炒○得効方六

川當歸

去

甘草

各二兩○得効方各一兩

赤芍藥

酸榴皮

地

榆

各半兩○得効方各二兩

右為麤散每服三錢水一盞半

得効方煎

至七分空心溫服小兒量歲數加減以瘥

為度忌生冷油膩腥臊等物

三神圓治清濁不分泄瀉注下或赤或白臍

腹疝痛裏急後重

草烏

三枚各去皮尖生一炮一燒作灰

右為細末醋糊圓如蘿蔔子大人五七

圓小兒三圓水瀉倒流水下赤痢甘草湯

下白痢乾薑湯下○衛生易簡方治痢赤

白久不差羸用草烏三兩一生一熟一炒

為末酒糊圓如菜豆大每服三五圓空心

服赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下水瀉煨

姜汁下

地榆散治大人小兒脾胃氣虛冷熱不調下

痢膿而赤多白少永類鈐方赤少白多或因腸胃乘虛為熱毒所滲下痢純血臍腹痛裏急後重口燥煩渴小便不利純下鮮血或先經下痢不應服熱藥而誤服熱藥蘊毒不散積於腸間滲而成血者並宜服之兩一土一燕一也

赤芍藥去皮各茯苓六兩地榆炒乾葛斤鶯粟殼二兩當歸去苗甘草兩乾薑二兩

右為細末每服二錢鈐方川溫熟水調下

不拘時候小兒三歲可服半錢更量歲數

加減與之若下醫方大成集成南痢純白

或下紫黑血腸滑不禁者不可服抽珍

秘傳斗門散治八種毒痢藏腑撮痛膿血赤

白或下瘀血或成片子或有五色相雜日夜

頻併兼治禁口惡痢裏急後重久渴不止全

不進食他藥不能治者立見神效

鶯粟殼蜜炒地榆炒甘草各白芍藥三

乾薑炮黑豆炒去皮

右為細末每服二錢水一盞同煎至七分
 溫溫此藥
 下香豆蔻散治脾胃虛弱宿寒停積或飲食
 生冷內傷脾胃泄瀉注下水穀不化胃滿短
 氣嘔逆惡心臍腹疔痛脇肋脹滿腹內虛鳴
 飲食減少及積寒久痢純白或白多赤少
 夜無度或脾胃虛寒泄瀉日久愈而復發者
 前宜服
 京三稜炮 白茯苓去木香 乾薑炮 肉

豆蔻炮 厚朴去麩皮 人參去 芍藥各五 吳
 茱萸湯先 甘草炙 丁香二兩 蒼朮去皮
 右為細末每服三錢水一盞生薑三片棗
 壹枚同煎至八分空心食前溫服如不及
 煎入揅少許湯點服亦得
 萬金飲治脾胃虛弱內受風寒或飲食生冷
 傷於脾胃嘔吐泄瀉臍腹疔痛脇肋脹滿腸
 內虛鳴及腸胃受濕膿血相雜下如豆汁或
 下瘀血裏急後重日夜無度飲食減少漸至

羸瘦並能治之

陳皮去黑皮甘草半生炙鷓鴣粟殼去帶蓋半生炙

右為羅末每服四錢先用沸湯泡熟又

於碗內盛重湯坐盞在內却抄藥末在盞

內用沸湯泡至七分盞上川蓋蓋之良久

紗絲濾去滓空心食前溫服○三因方萬

金散治冷熱痢嬰粟殼一兩赤用蜜炙白

炙橘皮甘草並如上法右為剉散每服四

錢以百沸湯七分盞急川蓋蓋之候溫澄

清者服血痢入烏梅一个嬰粟殼本草不

說治痢近用之極効其功不下地榆黃蘗

秦皮但性緊澁服之則嘔不可不知

如神止瀉圓治藏腑虛寒脾胃受濕泄瀉無

度腸鳴腹痛不進飲食漸至羸瘦並宜服之

蒼木米甘浸軟半夏湯洗七次去滑各半斤川烏米

浸軟去皮細作片焙乾用鹽四兩同炒黃色為度去鹽不用淨秤四兩

右為末薑汁糊圓如梧桐子大每五十圓

空心飯飲下

神効參香散治大人小兒藏氣虛怯冷熱不
調積在藏腑作成痢疾或下鮮血或如豆汁
或如魚腦或下瘀血或下紫黑血或赤白相
雜或成五色裏急後重日夜頻併臍腹絞痛
甚不可忍及噤口疳蟲時瘟諸痢無問新舊
並能治

肉豆蔻

去皮○醫方大成
南北經驗方煨

茯苓

去皮各人
四兩

參去木香

白扁豆

炒各二兩

鶯粟殼

去帶陳皮

去白各十二兩○
驗經方各十三兩

右爲末每服三大錢溫米飲調下不拘時

候立見神効

醫方集成袖珍方永
類鈐方與大成同

大余本草

今世藥譜卷之三

劉禹錫傳信方治氣痢巴石丸取白礬一大
斤以炭火淨地燒令汁盡則其色如雪謂
之巴石取一大兩細研治以熟猪肝作丸
空腹飲下丸數隨氣力加減水牛肝更佳
如素食人饑餅丸之亦通或云白礬中青
黑者名巴石

斗門方治瀉痢用白石膏乾薑二物停搗治
 以百沸湯和麵為稀糊搜勻併手丸如梧
 子暴乾飲下三升丸久痢不定更加三十
 升霍亂煎漿水為使以蘇麻油
 古磚熱燒之主下部久患白痢膿泄下以物
 裹上坐之入秋小腹多冷者亦用此古磚
 火煮泮服之主噦氣又令患處熨之三五度
 差
 崔氏治血痢十年方石灰三升熬冷黃以冰

斗攪令清澄一服壹升日三服

陳藏器云好土主洩痢冷熱赤白腹內熱毒

絞結痛下血取入地乾土以水煮三五沸

絞去滓適稀稠及煖服壹二升又解諸藥

毒中肉毒合口椒毒野菌毒並解之取東

壁土用之功亦小同止洩痢霍亂煩悶為

要取其向陽壁久乾也張司空云土三尺

已上日糞三尺已下日土服之當去上惡

物勿令人客水

陳藏器云胡粉本功外主久痢成疳和水及
 鷄子白服以糞黑為度為其殺蟲而止痢
 也凡痢下者入此散同空碗內炒之入
 梅師方治初得痢冷熱赤白及霍亂甘草壹
 兩炙豆蔻七箇剉以水三升煎取壹升分
 服凡霍亂吐瀉者服之立止
 楊氏產乳療久痢脫肛不止取女萎切一升
 燒薰之凡痢下者服之立止
 孫尚藥治丈夫婦人小兒痢木香一塊方圓

壹寸黃連半兩右件二味用水半升同煎
 乾去黃連只薄切木香焙乾為末三服第
 一橘皮湯第二陳米飲第三甘草湯調凡
 此方李景純傳有一婦人久患痢將死夢
 中觀音授此方服之遂愈凡痢下者服之立止
 茅膏菜主赤白久痢煮服之草高一尺生茅
 中葉有毛如油膩黏人手子作角中有小
 干也
 圖經曰胡洽方載九蒸湯主下痢不問冷熱

赤白穀帶休息久下悉主之以黃連長三寸三十枚秤重一兩半龍骨如碁子四枚重四分附子大者一枚乾薑一兩半膠二兩半並切先以水五合著銅器中去火三寸煎沸便下著生土土沸止又上水五合如此九上九下內諸藥著火上沸輒下著土上沸止又復九止九寸度可得一升頓服卽止

又香連丸亦主下痢近世盛行其法以宣連

青木香分兩停同搗篩白蜜凡如梧子空腹飲下三二十九日再如神其久冷人卽用煨熟大蒜作丸此方本出李絳兵部手集方嬰孺用之亦效

勝余方治久痢累醫不差黃連壹兩爲末以雞子白和爲餅炙令如紫肝色杵爲末以漿水三升煨火煎成膏子白痢加酒半盞同煎每服半合溫米飲調下食前服

陳藏器本草云忍冬主熱毒血痢水痢濃煎

服之

集驗方治血痢神妙乾薑急於火內燒黑不
令成灰尾梳合放冷爲末每服壹錢米飲
調下

孫真人治水瀉無度乾薑末粥飲調壹錢服
立効

張文仲治水痢百起以馬藺子乾薑黃連元
無分兩爲散熟煮湯取一合許和二方寸
匕入腹卽斷冷熱皆治常用神効不得輕

之忌猪肉冷水

藥性論云治冷滑下痢不禁虛羸縮沙熬末
以羊子肝薄切川末逐片糝丸上焙乾爲
末入乾薑末飯爲丸每二服五十丸
又方炮附子末乾薑厚朴陳橘皮等分爲丸
日二服四十丸

經驗後方治痢獨聖丸川烏頭一箇好者柴
炙火燒煙欲盡取出地上盞子合良久細
研用酒蠟丸如大麻子每服三丸赤痢用

黃連甘草黑豆煎湯放冷吞下如白痢用汁
草黑豆煎湯放冷吞下如瀉及肚疼水吞
下每於空心服之忌熱物

圖經曰菹草主久痢成疳取乾夢持篩量多
少管吹穀道中不過三四差已若神

楊氏產乳治赤白痢黃麻子一兩炒令香熟
為末以蜜漿下一錢不過再服

圖經曰取側柏葉焙乾為末與川黃連二味
同煎為汁服之以療男子婦人小兒大腹

下黑血紫脚色或膿血如淀色所謂虫痢
者治之有殊効

楊炎南行方治瘡痢無問老少日夜百餘度
者取乾楮葉三兩熬擣為末煎烏梅湯服
方寸匕日再兼取羊肉裹末內穀道痢出
即止

孫真人備急方赤痢臍下痛吳茱萸壹合黑
豆湯吞之効

圖經曰梔子療血痢挾毒熱下者葛洪方以

十四枚去皮搗蜜丸服如梧子三九日三
大効

孟詵云治赤白痢腹痛者取安石榴醋煮壹
枚并子搗汁頓服

梅師方治水穀痢久不差厚朴三兩黃連五
兩剉水三升煎取壹升空心服

角落木皮主赤白痢皮煮汁服之
經驗方鄭獬侍御傳治氣痢巴豆壹兩去皮
心熬細研取熟猪肝和丸空心米飲下量

力加減服之牛肝尤佳如食素人以蒸餅
丸服

圖經曰張仲景治氣痢以訶梨勒十枚麩裹
煨灰火中煨之令麩黃熟去核細研爲末
和粥飲頓服

又長服方訶梨勒陳橘皮厚朴各三大兩搗
篩蜜丸大如梧子每服二十九至三十九
唐劉禹錫傳信方云予曾苦赤白下諸藥服
遍久不差轉爲白膿令狐將軍傳此法用

訶梨勒三枚上好者兩枚炮取皮壹枚生
取皮同末之以泔漿水壹兩合服之淡水
亦得若空水痢加壹錢匕甘草末若微有
膿血加二匕若血多加三匕皆効六兩樹
集驗方木痢以訶梨勒三顆麩裹炮赤去麩
取訶梨勒皮搗爲末飯和爲丸米飲空腹
下三七丸已百人見効
圖經曰樗根煮汁主下血及小兒疳痢亦取
白皮和倉稭米葱白甘草豉同煎飲服血

痢便斷

楊氏產乳疳痢曉夜無度者取樗根濃汁一

雞子殼許和粟米泔雞子許灌下部再度

卽差其驗如神小孩減用之甚妙

橡實主下痢厚腸胃肥健人其殼爲散及煮

汁服亦主痢

圖經曰患血痢者取狼把草二斤搗絞取汁

一小升內白麩半雞子許和之調令勻空

腹頓服之極重者不過三服若無生者但

收取苗陰乾搗爲散患痢者取散一方寸
七和蜜水半錢服之
水楊葉嫩枝主久痢赤白搗和水絞取汁服
膏升日二大效

續傳信方著張仲景調氣方云治赤白痢無
問遠近小腹疝痛不可忍出入無常下重
疼悶每發面青手足俱變者黃連一兩去
毛好膠手許大碎蠟如彈子大三味以水
壹大升先煎膠令散次下蠟又煎令散卽

下黃連末攪相和分爲三服惟須熱喫冷

卽難喫神妙

太平廣記正觀中太宗苦於氣痢衆醫不較
詔開殿庭左右有能治其疾者當重賞之
有術士進以牛乳汁煎葦擦服之立差
經驗後方治冷痢沙角胎燒灰粥飲調下兩
錢

葛氏方治久下痢經時不止者此成休息瘵
之取犬骨炙令黃焦搗飲服方寸七日三

服即愈也
蓋說云卒熱悶於羊角屑作末研和少蜜服
亦治熱毒痢及血痢

張文仲治痢久下經時不愈者此名休息取
大蟲骨燒令黃焦搗末飲服方寸匕日二
即愈

孟詵云獐主服丹石勞熱患赤白痢多時不
差者別燒肉經宿露中明日空腹和醬食
之六頓即差

孟詵云豺皮主疳痢腹中諸瘡煮汁飲之或
燒灰和酒服之

孟詵云黃雌雞子醋煮熟空腹食之治久赤
白痢

葛氏方卒腹痛下赤白痢數日不絕以雞卵
壹枚取出黃去白內胡粉令滿殼燒成屑
以酒服壹錢匕

譚氏方治痢生雞子一箇連紙一幅烏梅十
箇有肉者取雞子白攤徧連紙日乾摺作

四重包撮烏梅安熨斗中用白炭火燒煙
欲盡取出以盞椀蓋覆候冷研令極細入
水銀粉少許和勻如大人患分爲二服小
兒分三服不拘赤白痢空心井花水調服
如魯藏府微有利踈更不須再服
食療治心肚痛血刺腹痛及赤白痢則生搗
地黃汁和蜜壹大匙服卽下又長服之面
如花色仙方中甚貴此物若覺熱四肢不
和卽服蜜漿膏椀甚良又能止腸辟除口

瘡明耳目久服不飢又點目中熱膜家養
白蜜爲上木蜜次之崖蜜更次

楊氏產乳療溫痢久不斷體瘦昏多睡坐則
閉目食不下髯蛇膽大如豆二枚煮通草
汁研膽以意多少飲之并塗五心并下部
葛氏治赤白痢下部疼重以梅實二十枚打
碎水二升煮取一升頓服

古今錄驗治冷熱不調或下帶水或赤白青
黃者酸石榴子五枚合殼舂絞取二升汁

每服五合至二升盡卽斷小兒以意服之
廿二三合

圖經曰治赤白痢龍牙草洗淨揀擇去蘆頭

焙乾不計分兩搗羅爲末用米飲調服一

錢匕無所忌

醫方類聚卷之一百三十八

治痢其日八州小兒調日中熱期寒瘧