

1  
草部

本  
州  
備  
要  
行

增訂本草備要目錄

二卷

牡丹皮

續斷

骨碎補

益母草子

澤蘭蘭草

白薇

艾野艾

延胡索

紅花脂脂

茵草

紫草并

凌霄花

木薊

三七又三

地榆

蒲黃

卷柏

蘭茹

菴藷子

鬱金

薑黃片子

荻花

荆三稜

白茅根針 蘆根

芋根皮

薺薇根營實

芭蕉根

大黃

蓼麥

黃連

胡黃連

蓼麥

知母

龍胆草

青黛

大青

牽牛

防己漢巴 薺薇苦

甘遂

大戟

商陸

芫花

芫花

澤漆

常山蜀漆

藜蘆

木通

通草

澤瀉

車前子

薺草

瞿麥

扁蓄

本草備要

卷二目錄

天仙籛 地膚子 葉 石韋 无草 海金沙 茵陳 香薷 膏 青蒿

附子 烏頭 烏附尖 草烏頭 射 白附子 破故紙 肉蓯蓉 瑯陽

巴戟天 胡盧巴 仙茅 淫羊藿 蛇牀子 鬼絲子 覆盆子

蒺藜子 沙苑蒺藜 使君子 藟薈子 砂仁 白苳蔻 肉苳蔻

草苳蔻 草 香附 木香 藿香 茴香 大小 甘松香 山柰

良薑 紅苳 葶麥 煙草 金銀花 膏 蒲公英 紫花地丁 杜牛膝

鶴虱 山苳根 牛蒡子 根 山慈菴 漏蘆 貫眾 射干

續隨子 馬蘭子 根 苳麻子 白頭翁 玉瓜子 玉不留行 冬葵子

子 蜀 白鮮皮 草薺 拔節 土茯苓 赤 白斂 赤斂 預知子 旱蓮草 膏

寄奴草 馬鞭草 穀精草 青箱子 嵩子 藜實 馬勃 木鱉子

增訂本草備要卷之二

休甯汪 昂初菴著輯

弟汪 桓殿武泰訂

同鄭會慶贊寰同訂

男汪 端實爾

姪汪 惟龍子錫

姪婿 仇 雲天一同訂

草部

牡丹皮

瀉伏火 而補血



辛甘微寒入手足少陰 腎厥陰 肝心包 瀉血中伏火丹

故入血分時珍曰伏火即陰火也陰火即相火也世人專以黃柏治相火不知丹皮之功更勝故仲景腎氣丸和血涼血而生血 血熱則枯 破積血 積瘀不去 則新血不

生通經脈為吐衄必用之藥 血屬陰本靜因相火 治中風五勞驚癎瘵

癎筋脈伸縮抽掣為癎瘵或手足抽掣口眼喎邪卒然眩仆吐涎 除煩 身軟時發時止為癎蒼陰虛血熱風火相傳瘵隨火湧所致

本草備要

牡丹皮

續斷

骨碎補

卷之二

熱療癰瘡涼下胞胎退無汗之骨蒸張元素曰丹皮治無汗之骨蒸地

少陰志不足者足少陰故仲景腎氣丸用丹皮治神志不足也按內經云水之精為志故腎藏志火之精為神故心藏神單蓮花

紅者入藥肉厚者佳酒拌蒸用畏貝母兔絲大黃忌蒜胡葵伏砒時珍曰花

白者補赤者利人所罕悟宜分別之

續斷

補肝腎  
理筋骨



苦溫補腎辛溫補肝能宣通血脈而理筋骨主傷中

補不足經疏云味甘故然煖子宮縮小便破瘀血治腰痛胎

漏懷奸崩帶遺精腸風血痢屋齋方平胃散一兩川

米飲下治腫毒又主金瘡折跌以功止痛生肌外科需為上

劑川產良狀如雞脚皮黃皺節節斷者真去向裏硬筋酒浸用地黃

為使

骨碎補

補腎治

折傷

經曰腎

者胃之

關也前

陰利水

後陰利

穀

益母草

一名羌

蔚

通行瘀

血生新

血



蒸



苦溫補腎故治耳鳴

耳鳴必由腎虛

及腎虛久瀉

研末入猪腎煨熟至

心食之腎主二便久瀉多屬腎虛不可專責脾胃也

腎主骨故治折傷

以功命名粥和

傳傷牙痛炒黑為末擦處

又入厥陰

心包

能破血止血

入血行傷故治折傷弱和味裏傷處

根似薑而扁長去毛用或密拌

辛微苦寒八手足厥陰

肝心包

消水行血去瘀生新調

經解毒

瘀血去則經調

治血風血運血痛血淋胎痛產難崩

中帶下

帶脈橫於腰間病生於此故名為帶亦屬血屬氣氣虛者補中益氣而兼升降血虛者

養血滋陰而兼調氣

為經產

良藥消疔腫乳癰

亦取其散

通大小便然辛散之藥

曠子散大者息服

益母子主治暑同調經益精明目

血滯病目者則宜之活血

天直青夏草

續斷

骨碎補

益母草

卷之三

澤蘭

通行血  
消水

順氣逐風氣行則血行行中有補治心煩頭痛血氣血熱之候胎產帶崩令人

有子有補陰之功時珍曰益母根莖花葉實皆可同用若治瘡腫胎產

消水行血則宜並用若治血分風熱明目調經用子為良益根莖花葉專于行子則行中有補也產實濟陰返魂丹小暑端午或六月六日採益母莖葉花實為末密丸治胎產百病近効方搗汁熬膏亦良

忌鐵子微炒用

苦泄熱甘和血辛散鬱香舒脾八足太陰厥陰肝脾通

九竅利關節養血氣長肌肉破宿血調月經消癥瘕

散水腫防已為使治產後血瀝腰痛瘀行未盡吐血鼻洪目痛

頭風癰毒撲損補而不滯行而不峻為女科要藥方古



滯蘭九甚多時珍曰蘭草澤蘭一類二種俱生下濕紫莖素枝赤節綠葉

藥對節生有細齒但以莖圓節長葉尤有岐者為蘭草莖微方節短葉

有毛者為澤蘭嫩時並可按音那而佩之楚詞所謂級秋蘭以為佩是也

朱文公雜駮辨證云必花葉俱香燥濕不變方可刈佩今之蘭惠花雖香而葉無氣質弱易萎不可刈佩吳人呼為香草俗

名孩兒菊夏曰采置髮中則髮不脯浸澤蘭草走氣分故能利水道除痰

癖殺蠱辟惡而為消渴良藥經曰數食肥甘傳為消渴治之以蘭除陳氣也澤蘭走血分故能

消水腫塗癰毒破瘀除癰而為婦人要藥以為今之山蘭者誤矣防已

為使寇宗莖朱丹溪並以蘭草為山蘭之葉李時珍考眾說以譏之按別本云蘭藥甘寒清肺開胃消痰利水解鬱調經闡產者力勝李

土材云蘭藥稟金水之氣故人肺臟東垣方中嘗用之內經所謂治之

以蘭除陳氣者是也余屢驗之李時珍又謂東垣所用乃蘭草也其集

諸家之言曰陳遜齋閑覽云楚騷之蘭或以為都梁香或以為澤蘭或

以為荷蘭當以澤蘭為正今之所種如麥門冬者名幽蘭非真蘭也故

陳止齋著盜蘭說以譏之方虛谷訂蘭說言古之蘭草即今之于金草俗名孩兒菊者今之所謂蘭其葉如茅者根名土續斷因花馥郁故得蘭名楊升菴云世以如痛骨者為蘭九畹之受誣也久矣又吳草虛有蘭說云蘭為醫經上品有根有莖草之梅者也今所謂蘭無枝無莖因

閩產為

勝則是

建蘭矣

既名幽

蘭正合

醫經矣

升菴九

種多有

澤蘭

澤蘭

卷二三



朱確故  
陳文燭  
作正場  
以辨之

黃山谷稱之世遂謬指為離騷之蘭寇氏本草溺于流俗反疑舊說為非夫醫經為實用豈可誣哉今之蘭果可以利水殺蠱而除痰癖乎其種盛于閩朱子閩人豈不識其土產而辨析若此世俗至今猶以非蘭為蘭何以惑之甚也昂按朱子辨蘭援離騷初佩以為證竊謂初佩亦騷人風致之詞耳如所云飲木蘭之墜露餐秋菊之落英豈真露可飲而英可餐乎又云製芰荷以為衣集芙蓉以為裳豈真芙蓉可衣芙蓉可裳乎宋儒釋經執泥恐未可為定論也第騷經既言秋蘭則非春蘭明矣本經既言澤蘭則非山蘭明矣是離騷之秋蘭當屬本經之澤蘭無疑也然離騷不常曰春蘭今秋菊乎不又曰結幽蘭而延晷乎不又曰疏石蘭以為芳乎若秋蘭既屬之澤蘭將所謂春蘭幽蘭石蘭者又不得為山蘭當是何等之蘭乎且山蘭為花中最上之品古今評者列之梅蘭之前今反屈于孩兒菊之下以為盜襲其名世間至賤之草皆收入本草獨山蘭清芬佳品攢葉不錄何其不幸若斯之甚也本草殺蠱之藥良多皆未必有驗至乎行水消痰固山蘭之葉力所優為者也蓋李時珍陳方吳楊輩皆泥定陳藏器以澤蘭蘭草為一類二種遂併發經而疑之崇澤蘭而黜山蘭遂令蘭草無復有用之者不思若以為一類則本經蘭草一條已屬重出何以本經蘭草反列之上品而澤蘭止為中品乎况一入氣分一人血分迥然不同也又騷經言蘭者凡五除木蘭人所共識其餘春蘭秋蘭幽蘭石蘭若皆以為孩兒菊是不特二類一種且四種一類矣而以為九畹之受誣豈理也哉蓋本經言澤

澤蘭可  
性幾品

幽字何  
可當也

白微

瀉血熱

蘭所以別平山也言蘭草明用葉而不用其花也醫經言秋蘭所以別乎春也言石蘭所以別平澤也愚謂秋蘭當屬澤蘭而春蘭石蘭定是山蘭其曰幽蘭則山蘭之別名以其生于深山窮谷故也寇氏朱氏之論又安可全非也姑附愚說以豁多識之士



苦鹹而寒陽明衝任之藥利陰氣下水氣主中風身

熱支滿忽忽不知人陰虛火旺則內熱生風火氣焚灼故身熱支滿痰隨火湧故不

知血厥汗出過多而少陽氣獨土氣塞不行而厥婦人尤多此症宜白微湯白微當歸各一兩參

五錢甘草錢熱淋温瘧惕惕寒熱酸痛婦人傷中淋

露血熱千金白微散治胎前產後遺尿不知時白微芍藥等分酒調服

丹溪曰此即河間所謂熱甚廷孔鬱結神無所依不能收禁之意也

廷孔女人產虛煩嘔仲景安中益氣竹皮丸用之經疏云古方調經種似牛膝而短

弱水也子往往用之益不孕緣于血熱血少而其源起于真陰不足陽勝而內熱故營血自枯也益陰清熱則血

自生旺而有子矣須佐以歸地芍藥杜仲菴蓉等藥

小柔軟去鬚酒洗用惡大黃大戟山茱萸棗

本草

白微

三四

艾葉

宜理氣  
血燥逐  
寒濕



苦辛生溫熱純陽之性能回垂絕之元陽通十二

經走三陰大小理氣血逐寒濕煖子宮止諸血溫中

開鬱調經安胎胎動腰痛下血膠艾湯良治吐衄崩

帶治帶腹痛冷痢霍亂轉筋皆理氣血逐殺蛇治癰

醋煎外科有用乾艾作湯投白荅二三錢洗瘡然後敷藥  
者益人血氣冷必假艾力以佐腸而艾性又能殺虫也  
以之灸音九火

能透諸經而治百病血熱為病者禁用灸火則氣下行入藥則熱上衝

者以熟艾裝袋兜臍腹甚妙寒  
濕脚氣亦宜以此火入襪內  
陳者良採搗如綿謂之熟艾炙火用

婦人丸散醋煮搗餅再為末用入荻荅數片煎服宜鮮者苦酒醋附

為使艾附丸調婦人諸病末時垂湯陰艾自明成化來則以蘄州艾為


種艾滕云炙酒雲一或便透蒙筌發明並以野艾為真蘄艾雖香實非

本草綱目

卷二

延胡索

宜活血  
利氣



辛苦而溫入手足大陰脾厥陰經能行血中氣

滯氣中血滯通小便除風痺治氣疑血結上下內外

諸痛通則不痛癥瘕崩淋月候不調氣血不和因而產後疑滯不以時至

血運暴血上衝折傷積血疝氣危急為治血利氣第一藥然辛溫走而

不守獨用力迅宜兼補氣血藥通經墜胎血熱氣虛者禁用 根如半夏肉黃小而

堅者真酒炒行血醋炒止血生用破血炒用調血

紅花

紅藍花  
通行血  
潤燥



辛苦甘溫入肺經而破瘀血活血瘀行則血活有熱結於中慕吐紫黑

血者吐出為好吐未盡加桃仁紅花行之大抵鮮血宜止瘀血宜行潤燥消腫止痛血

熱血瘀則治經閉便難血運口噤胎死腹中非活血作腫作痛行血不

能瘡瘡血熱本草不喉痺不通又能入心經生新血須兼補益藥為佐使 俗用

# 茜草



**染紅併作胭脂** 胭脂活血解毒疔挑 少用養血多則行血過用能使  
**血行不止而斃** 血生于心色藏于肝属于衝任紅花汁與相類故治血  
 病有產婦血悶而死名醫陸氏以紅花數十斤煮湯寢  
 婦于上而薰之湯冷再加半日而蘇金  
 匱有紅籃花迺云治婦人六十二種風

**色赤入營氣溫行滯味酸走肝而鹹走血** 本經  
 苦寒入厥

**陰血分** 肝心包 **能行血止血** 經能行故能止消瘀通消痰

**通經** 酒煎一兩 **治風痺黃疸** 疸有五黃疸穀疸酒疸  
 通經甚効 黃汗疸女勞疸此蓋蓄

血發黃不專于濕熱者也女勞疸必屬腎虛亦不可以濕熱例  
 治當用四物知柏壯其水參木培其氣隨症而加利濕清熱藥

**損痔瘻瘡血少者忌用** 根可染絳忌鐵

# 紫葳

瀉血熱  
 滑腸



**甘鹹氣寒入厥陰血分** 肝心包 **涼血活血利九竅通二**

**便** 鹹寒 **治心腹邪氣** 即熱 **水腫五疳癬惡瘡** 血熱  
 性滑

及痘瘡血熱毒盛二便閉澹者血熱則毒閉得紫草涼之則血行而毒出大便利者忌之活幼心書云紫草性寒小兒脾實者可用脾虛者反能作瀉古方惟用茸取其初瀉者忌用得湯氣以類觸類用發痘瘡今人不達此理一槩用之誤矣瀉者忌用

去頭鬚酒洗

凌霄花

一名紫葳

歲

瀉血熱



甘酸而寒入厥陰血分

肝

能去血中伏火破血去

瘀主產乳餘疾崩帶癥瘕腸結

不大

血閉淋悶風痒

血熱生風之症女科多用孕婦忌之

本經云養胎經疏云破血之藥非所宜也

肺癰有用之為君藥者

凌霄花為末和蜜吃僧唾調敷酒船甚驗

繁生花開五辨黃赤有黠不可近鼻聞傷腦

大小薊

瀉涼血

大薊 小薊



甘溫

大明

皆能破血下氣行而帶補治吐衄腸癰女

子赤白沃安胎

涼血之功

小薊力微能破瘀生新保精養

血退熱補虛不能如大薊之消癰毒

丹溪曰小薊治下焦結熱血淋

本草綱目

茜草

紫草

凌霄花

大小薊

六六

本事方一人冷氣入陰囊腫  
滿疼痛煎大薊汗服立瘥

兩薊相似花如髻大薊莖高而葉皺小

薊莖低而葉不皺皆用根

三七亦各

山漆  
瀉散瘀  
定痛



甘苦微溫散血定痛治吐血衄血血痢血崩目赤癰  
腫醋磨塗即散已為金瘡杖瘡要藥杖時先服一二錢則血不衝心  
杖後敷之去瘀消腫易愈大抵  
陽明厥陰血分之藥故治血病

中特之從廣西山洞來者畧似白芨地黃有節味微甘頗似人參以未

瘳猪血中血化為水者真近出一種葉似菊艾而勁厚有岐尖莖有赤稜夏秋開黃花莖如金絲盤組可愛而氣不

香根大如牛蒡味甘苦易繁衍云是三七  
治金瘡折傷血病甚効與南中來者不同

地榆

瀉止血



苦酸微寒性沉而瀉本草未嘗言瀉然能收汗止血皆酸斂之功也  
除血熱治吐衄崩中血虛者為腸風隨臧禁用  
腸風而見也血瘀者為癥

蘇頌著  
本草圖  
經

蒲黃

生滑行  
血炒  
止血

卷栢  
生用破  
血炙用  
止血

毒積久而發也糞前為近血血可蘇頌曰古方斷下多用之寇宗  
出腸胃糞後為遠血出肺肝血痲頰曰遠寒虛弱及初起者忌用  
柳根外黑裏紅取上截炒黑用梢皮行血得髮良惡麥冬



一切血崩帶泄精

香蒲花中溢屑湯成八藥

薑末等分漆之愈時珍曰觀此則蒲黃之涼血活血可知矣  
益舌為心苗心包相火乃其臣使得乾薑是陰陽相濟也  
炒黑性滑

甘平厥陰血分藥  
利小便祛心腹膀胱寒熱  
損傷癆瘵諸重  
生用性滑行血消瘀通經脈



生用辛平破血通經治癥瘕淋結炙用辛溫止血治

腸風脫肛生石上拳擊如雞足俗呼萬年松凡使

鹽水煮半日井水煮半焙用

本草補要草

三七

地榆

蒲黃

卷栢

三七



藟姑  
瀉破血



辛寒有小毒蝕惡肉排膿血殺疥虫除熱痺破癥瘕  
內經同烏剛骨  
治婦人血枯  
根如萊服皮黃肉白葉長微潤折之

菴葶子  
瀉行水

散血



苦辛微寒  
別錄  
八肝經血分行水散血散中有補治  
陽痿經澁腰膝骨節重痛產後血氣作痛閃剝折傷

鬱金

宜行氣  
解鬱瀉  
泄血破  
瘀



撲打方能制蛇  
見之  
多用之  
則爛

葉似菊而薄莖似艾而粗以意為使

辛苦氣寒純陽之品其性輕揚上行入心及包絡兼

入肺經涼心熱散肝鬱下氣破血  
行滯氣亦不損正  
氣破瘀血亦能生

新治吐血尿血婦人經脈逆行  
諸症用鬱金末加非  
血治吐衄尿血婦人經脈逆行諸症用鬱金末加非

汁薑汁童便服其血自  
清痰中帶血者加釘泥  
血氣諸痛產後敗血攻心顛狂失心  
願多喜笑  
尚知畏懼

蕪黃  
瀉破血  
行氣

症屬不足狂多忿怒人莫能制症屬有餘此病多因驚憂瘀血塞于心  
竅所致鬱金七兩白礬三兩米糊丸服名白金丸鬱金入心散悲血明  
礬化頑瘰癧入心 鬱金一兩甘草二錢半煮乾焙研末水片五分每用  
痰故也瘰癧入心 一錢加猪血五七滴新汲水下治疔瘡如有白泡忍  
搐入腹紫 下蠱毒 同升麻服 黑無膿 不吐則下  
微香味苦帶甘者真 市人多以 蕪黃偽之



苦辛 本草大寒 器大明曰熱 色黃入脾兼入肝經理血中之氣  
下氣破血除風消腫功力烈于鬱金治氣脹血積產  
後敗血攻心通月經療撲損片子者能入手臂治風

寒濕痺 血虛臂痛者勿用時珍曰入臂  
治痛其兼理血中之氣可知 出川廣 陳藏器曰鬱金苦寒  
色赤蕪黃辛溫色黃

述味苦色青三物不同所用各別經疏曰蕪黃主治介乎三稜鬱金之  
間時珍曰蕪黃鬱金莖葉形狀功用大畧相近但鬱金入心專治血薑  
黃八脾兼治血中之氣述入肝治氣中之血稍為不同今時以扁如乾  
薑首為片子蕪黃圓如蟬腹者為蟬肚鬱金並可染色莖形雖似鬱金

本草綱目 蕪黃 卷筒子 鬱金 薑黃 卷二八

我遊音  
瀉破血  
行氣消積

而色不黃也



辛苦氣溫八肝經血分破氣中之血能通肝消痰通

經開胃化食解毒止痛治心腹諸痛冷氣吐酸奔豚

痞瘕酒醋磨服瘕音賢小腹積瘕瘕多見于男子瘕

治積聚諸氣良按五積心積曰伏梁起臍上至心下肝積曰肥氣在左

脇肺積曰息賁在右脇脾積曰痞氣在胃腕右則腎積曰奔豚在小腹

上至心下治之不宜專用下藥恐損真氣宜于破血行氣藥中加補脾

胃藥氣旺方能磨積正旺則邪自消也經曰大積大聚其可犯也衰其

大半而止過者死東垣五積方用三稜我遊音兼人參黃助成功後治

積諸藥神麵麥芽化穀食藜蘆化麵食的砂阿魏山杏化肉食紫蘇化

魚蟹毒葛花枳椇消酒積麝香消酒積果積羌花牽牛大戟行水飲三

稜我遊音甲消癥瘕木香瀝瀝行氣帶礞石蛤粉攻痰積巴豆攻冷積

大黃芒硝攻熱積雄黃臘粉雖為泄劑亦能益氣王好古曰故治氣短

攻涎積蠅虫水蛭攻血積不能接續大小七香

丸集香丸諸湯

散中多用之

根如生薑我生根下似卵不齊堅硬難擣灰火煨透

荆三稜

瀉行氣

破血消

積

破血消

積

白茅根

瀉火補

中止血

止歲

乘熱搗之八氣或醋磨酒磨或者熟用八血

苦平色白屬金皮黑肉白八肝經血分破血中之氣肝亦通

聚兼八脾經散一切血瘀氣結瘡硬食停者塊堅積

乃堅者削之從血藥則治血從氣藥則治氣須輔以健脾補氣藥良昔有人黑癥痕死遺言開腹取之得

病塊如石文理五色削成刀柄因卽消腫止痛通乳墮胎功近香附而三稜柄消成水乃知此藥可療癥瘕

力峻虛者慎用色黃體重若鯽魚而小者良醋浸炒或麩裏煨

甘寒入手少陰心足太陰陽明胃脾補中益氣除伏熱

消痰血利小便解酒毒治吐衄諸血心肝火旺逼血上行則吐血肺

火盛則衄血茅根甘和血寒涼血引火下降故治之搽損瘀血搗汁服名茅花湯亦治鼻衄產淋血



閉寒熱血瘀則閉閉淋瀝崩中則崩傷寒噦逆也東垣作乾嘔之甚者

本草

荻蒨 荆三稜 白茅根

卷一九

蘆根

蘆熱止

蘆熱散

未市熱喘急內熱煩渴黃疸水腫清火行水時珍曰良藥也丑人以微是肺熱喘急內熱煩渴黃疸水腫而忽之惟事苦寒之劑傷中和之氣烏足知  
此哉 茅針潰癰瘡酒煮服二針潰一孔二針潰一孔



甘益胃寒降火治嘔噦反胃胃熱火丹則嘔逆食不下金匱方蘆根煎服

消渴客熱傷寒內熱止小便敏肺為水之上源脾氣散精上歸平肺始能

通調水道下輸膀胱腎為水藏而主二便三經有熱則小便數甚至不能少忽火性急速故也蘆中空故入心肺清上焦熱熱解則肺之氣化行而小便復其常道矣 能解魚鱗河豚毒 取逆水肥厚者去鬚節用



甘寒而滑補陰破瘀解熱潤燥治天行熱疾大渴大

狂胎動下血諸淋血淋搗貼赤遊丹毒癰疽發背金

瘡折傷止血魚骨硬湯下魚骨魚湯下汁能化血為水芋皮與產婦

作枕止血運安腹上止產後腹痛散瘀之功蘆芋汁療消渴

薺微根

瀉濕熱



苦澁而冷八胃大腸經除風熱濕熱生肌殺虫治泄

痢消渴牙痛口糜煎汁含漱遺尿好眠腫疔瘡癬 花背

黃白紅紫數色以黃心白色粉紅者八藥子名營質酸温主治畧同余

曰薺微根角蒿口瘡之神藥角蒿所在多有聞淡紅紫花角微亦長之寸許辛苦有小毒治惡瘡有虫及口齒瘡

芭蕉根

瀉熱



味甘大寒治夫行熱狂煩悶消渴屢後血脹煎搗汁服塗

腫毒為未油調敷

大黃

大瀉血

分實熱

平有形

積滯



大苦大寒八足大陰脾手足陽明厥陰大腸胃心包肝血分

其性淨而不沉其用虛而不守若酒浸亦能引至

高之分仲景大陽門調胃承氣湯大黃註曰酒浸陽明門大承氣湯大黃註曰酒洗少陽陽明小

承氣湯大黃不用酒製皆有分別東垣曰邪氣在上非酒不至若用生者則遺至高之邪熱病愈後或目赤喉痺膜腫膈上執疾住也 用

本草綱目要草

蘆根

薺微根

芭蕉根

大黃

卷二十一

腹音噴

以蕪條腸胃下燥結而除痰熱治傷寒時疾發熱譫語大腸有燥糞故譫語宜下之

音溫熱障瘡下痢赤白腹痛裏急黃疸水腫癰癢積聚積久成形謂之積屬陰聚散無

常謂之聚屬陽積多足留飲宿食心腹痞滿二便不通皆十鬱吐血

血血閉血枯損傷積血一切實熱血中伏火行水除痰餽臙消腫能推

陳致新然傷元氣而耗陰血下多陰若病在氣分胃虛血弱人禁用病在氣分

而用之是為誅伐無過東垣曰能推陳致新如定禍亂以致太平所以有將軍之號時珍曰仲景瀉心湯治心氣不足吐衄血者用大黃黃連

黃芩乃瀉心包肝脾胃四經血中之伏火也又治心下痞滿按之軟者大黃黃連瀉心湯亦瀉脾胃之濕熱非瀉心也病發于陰而反下之

則痞滿乃寒傷營血邪結上焦用之上脘當心故曰瀉心經曰大陰所至為痞滿又曰濁氣在上則生膈服是已病發于陽而反下之則結胸

乃熱邪陷八血分亦在上腕故大咽胸湯九常用大黃亦傷脾胃血分之邪而降其濁氣也若結胸在氣分只用小陷胸湯痞滿在氣分只用

半夏瀉心湯或問心氣不足而吐衄何以不瀉心而反瀉心丹溪曰少陰不足元陽無輔致陰血妄行故用大黃瀉其亢甚之火又心水不足

琴  
火除

肝肺各受火邪而病作故用黃芩以移其熱通其血而使之平肝者心之母血之合也肺肝火退則血歸經而自安矣寇宗奭曰以苦泄其熱就以苦補其心蓋一舉而兩得之李士材曰古人用大黃治虛勞吐血意甚深微蓋濁陰不降則清陽不生瘀血不去則新血不生也

川產錦紋者良有酒浸酒蒸生熟之不同生用更峻莫為礙欲取通利者不

得驟進穀食大黃得穀食便不能通利耳夷堅志湯火傷者搗生大黃醋調敷止痛無驗



苦八心寒勝熱瀉中焦實火除脾家濕熱治疴利腹

痛便血日癖寒痛忌用凡腹痛有寒熱虛實食積瘀血痰食之不同寒宜溫熱宜清虛宜青實宜下食

宜消導痰血宜行散痰濕宜化痰利濕痛時寒在

來邪在黃疸五淋血閉實熱在氣逆癰疽瘡癤諸失血滑痰丹溪以

痰假其降火也按痰利水解渴安胎胎孕宜清熱涼血養陰退陽補勝

因火動當先降火血不妄行則胎安肺主氣熱傷氣治上焦之風熱瀼

黃芩  
三三王



丸丹溪曰黃芩  
熱上中二焦藥  
火嗽喉腫五臭肺  
鼻腫痛過脹損胃虛寒中者禁

用得柴胡退寒熱得芍藥治痢得厚朴黃連止腹痛得桑皮瀉肺火得  
白朮安胎之聖藥時珍曰仲景治少陽症小柴胡湯太陽少陽合病  
下利黃芩湯少陽症下後心滿瀉心湯並用之蓋黃連苦寒人心瀉熱  
除脾家濕熱使胃火不流八肺不致刑金即所以保肺也肺虛不宜者  
苦寒傷土損其母也少陽症雖在半表裏而心膈痞滿實兼心肺上  
焦之邪心煩喜嘔默默不欲食又兼脾胃中焦之症故用黃芩以治手  
足少陽相火黃芩亦少陽藥也楊士瀛曰柴胡退熱不及黃芩時珍曰  
柴胡乃苦以發之散火之標也黃芩乃寒能勝熱折火之本也東垣治  
肺熱身如火燎煩燥引飲而晝盛者宜一味黃芩湯以瀉  
肺經氣分之火黃芩一兩煎服本專方用治前中暴下黃明者長中

虛者名精芩即片芩瀉肺火清肌表之熱肉實名條芩即子芩瀉大腸火  
補膀胱水上行酒炒瀉肝胆火猪胆汁炒山茱萸為便良丹皮丹砂

大苦大寒入心瀉火  
王海藏曰瀉心實瀉  
脾也實則瀉其子  
鎮肝涼血



凡治血防風為上部之使黃連  
為中部之使地黃為下部之使  
燥熱開鬱  
單用

黃連  
瀉火燥

消除煩益肝胆厚腸胃消心痰能去心去汗涼心治腸瀉瀉痢便血曰

連九濕熱鬱而為痢黃連治痢要禁口者熱壅上焦同人參煎湯脾

之但得下咽便好喻嘉言曰下痢必先汗解其外後調其內首用辛涼

以解表次用苦寒以攻裏機要云後重宜下腹痛宜和身重宜除濕脉

肱宜去風風邪丙結宜汗身冷自汗宜温膿血稠整宜重劑以竭之下

痢赤屬血分白屬氣分戴氏曰俗謂赤熱自寒痼燥濕開鬱仲景治

者非也通作濕熱處治但有新久虛實之分痼九種心下痞五等

瀉心湯清腹痛清心痛清伏梁清心積清痛傷清人乳浸點或合歸芍等

皆用之清酒毒胎毒清小兒初生入口甘草清明目清傳信方羊肝一具黃連

治各羊清定驚清止汗清解毒除疔清同猪肚殺虻清虻得苦清虛寒為病者清

久服黃連苦參反執從火化也昂按炎上作苦味苦必燥燥則執矣且

苦寒沉陰肅殺伐傷生和之氣也韓懋曰黃連與肉桂同行能交心腎

于頃刻時珍曰治痢用香連九瀉連九用黃連乾薑黃散用黃連生

薑左金丸用黃連吳茱萸黃治口瘡用黃連細辛止血用黃連大蒜一

陰一陽寒內執用執因

寒角最得製方之妙

出宜州者粗肥出四川者瘦小狀類鷹屎連

黃連

六二五

珠者良去毛治心火生用虛火醋炒肝胆火猪胆汁炒土焦火酒炒有

醋嘈雜等症亦有吐酸者名酢心宜黃連吳茱萸降火開鬱酢音醋中焦火薑汁炒下焦火鹽水或薑便

炒食積火黃土炒治濕熱在氣分吳茱萸湯炒在血分乾漆水炒點眼

赤人乳浸時珍曰諸法不獨為之引導蓋辛熱黃連為使惡花制其寒苦鹹寒制其燥性用者詳之

立麥麩麩白鮮皮長款冬牛膝烏猪肉時珍曰方有熾連在黃連猪肉肚丸豈忌肉而不忌熾時平余

烏豈巴豆黃連瀉心火佐以龍胆瀉肝胆火白芍瀉脾火石膏瀉胃火梔子佐之瀉大腸火黃連佐之柴胡瀉肝胆火黃連佐之瀉三焦火黃連佐之鄭奠一日執機惡心兀兀欲吐用黃連數分甚効

苦寒去心熱益肝胆厚腸胃治骨蒸勞熱五心煩熱

# 胡黃連

瀉熱療驚疳



心富手三消渴而多飲為上消肺熱也心移熱于肺也痺成為消中是也渴而小便數有膏為下消腎熱而水虧也五痔牡痔牡痔厥痔

參 火燥 補陰



下流傷血分無所施洩  
則通肛門而為痔腫  
慈朱二允曰解吃烟  
藥毒合茶服之甚効

性味功用同黃連故名出波斯國今奉龍南游  
亦有之心黑外黃折之塵出如烟者真異惡同黃連

苦燥濕寒勝熱沉陰主腎補陰益精養肝胆安五臟

濕熱去則血氣和平而五臟目安 利九竅生津止渴明目止淚淚為肝熱

治濕病血痢純下清血者風傷用也宜散風涼血腸下如蓋汁者濕傷脾也宜清熱滲濕腸

風濕疔黃疸酒毒熱生風濕生蟲又能祛風逐水殺虫治大腸瘰癧然

大苦大寒肝腎虛而主熱者勿服張從正曰凡藥皆毒也雖苦參甘草不可不謂之毒久服必偏勝為患經

曰五味入胃各歸其所喜攻久而增氣物化之常也氣增而久之由也玉水註曰氣增不已則藏有偏勝偏勝則藏有偏絕故令人暴夫筆

談云久用苦參參牙遂病腰痛由其氣傷腎也經又曰大毒治病十去其六常毒治病十去其七小毒治病十去其八無毒治病十去其九設

藥能醫

病不能

養人食

能養人

不能醫

病

知母

瀉火補

水潤燥

瀉腸

東垣治

便秘以

渴不渴

分之

肉菓其食養盡之無使過之傷其正也按人參補脾少參補肺紫雲

參補肝丹參補心玄參補腎苦參不在五參之內然名參者皆補米

泔浸去腥氣蒸用玄參為使質其免絲干漏厚反熬盧酒煎或醋者

能吐天

行時毒

行時毒



辛苦寒滑上清肺去瀉火

瀉胃熱勝膀胱邪

下潤腎

燥滋陰八二經氣分黃栢八二經血分故

消痰定

嗽止渴安胎

莫非清

火之用治傷寒煩熱瘧疾勞骨蒸退有

骨蒸燥渴虛煩久瘧

痢治嗽者清肺火也治渴者清

胃熱也退蒸骨者瀉腎火也利二便消浮腫小

利則腫消東垣曰熱在上焦氣分結秘而渴乃肺中伏熱不能生水膀胱

眈絕其化源宜用滲濕之藥瀉火清金滋水之化源熱在下焦血分便

閉而不渴乃真水不足膀胱乾涸無陰則陽無以化宜用黃栢知母大

苦寒之藥滋腎與膀胱之陰而陽自化小便自通丹溪曰小便不通有

熱有濕有氣結于下宜清宜燥宜丹又有隔二隔三之治始肺不燥但

膀胱轉宜瀉膀胱此正治而四肺熱不能生水則清肺此隔二之治如

煎下焦 肝胆 胆草

因脾濕不通而精不上升故肺不能生水則潤胃健脾此隔三之治瀉  
膀胱黃柏知母之類清肺車前茯苓之類燥脾二木之類昂按凡病皆  
右隔二隔三之然苦寒傷胃而滑腸多服令人瀉李士材曰苦寒滑殺  
非長養萬物者也世  
治不獨便閉也以其滋陰施之虛損之人則  
如水益深矣特夫出以為戒 得酒良上行酒浸不行鹽水拌忌鐵



大英寒沈陰行益肝胆而瀉火

相火寄于肝胆  
有瀉無補瀉其

邪熱節所兼入膀胱腎候下焦之濕九與防己同  
以補之也

功瀉亦能外行上行治骨間寒熱腎主驚疇和氣

肝經時氣過熱熱疝瘡黃寒濕脚氣足傷寒濕則成脚氣腫而痛者為  
濕脚氣宜清熱利濕搜風又有壅

風火時氣過熱熱疝瘡黃寒濕脚氣足傷寒濕則成脚氣腫而痛者為  
濕脚氣宜清熱利濕搜風又有壅

縮柘細痛而不腫者名咽喉風熱赤睛齩瀉肝胆火能明目元素曰  
柴胡為主龍胆為使目疾

要藥昂按若目疾初起宜發散忌用寒涼癰疽瘡疥過服損胃甘草水浸一宿曝用小豆  
貫衆為使忌地黃

龍胆草 卷二 齒

青黛

瀉肝散  
鬱火



鹹青色瀉肝散五臟鬱火解中下焦蓄熱

日一婦患臍腹二陰過生濕瘡熱痒而痛出黃汁二便澀用鱧鮓松脂黃丹之類塗之熱痛愈甚其婦嗜酒喜食魚蝦蟹風之物仍用馬齒莧四兩研爛入青黛一兩和塗熱痛皆去仍服入正散而愈此中下焦

苦厚風熱毒氣若不出富作腸風治傷寒發斑吐咯血痢陰虛火炎者

內痔婦不能禁酒物果仍發痔研置柿餅中煨食名聖餅子治咯血小兒驚癇疳積并熱傳癰瘡虫大毒即定花取燻

碧者水飛淨用內多石灰故須淘淨

大青

瀉心胃  
熱毒



微苦鹹大寒解心胃熱毒治傷寒時疾熱狂陽毒

王執甚傷血裏實表虛則發斑輕如珍子重如錦紋

犀角大黃痘熱痢丹毒喉痺處處有之高三尺清湯

花圓葉長葉對節生八月開小紅花成簇大如椒色赤用莖葉

牽牛

大瀉氣  
分濕熱



辛熱有毒屬火善走八肺瀉氣分之濕肺主氣

金而能達胃命門走精滲通下焦鬱遏及天腸風

秘氣秘利大小便逐水消痰殺蟲墮胎治水腫喘滿

疝瘕氣塊若濕熱在血分胃弱氣虛人禁角東垣曰牽牛苦寒誤矣其味辛辣久嚼猛烈雄壯所

謂苦寒安在哉乃瀉氣之藥比諸辛藥泄氣尤甚若濕從下受下焦主

血血中之濕宜苦寒之味而反用辛熱之藥泄上焦之氣是血病瀉氣

使氣血俱損也王好古曰以氣藥引則人氣以大黃引則入血時珍曰

一婦腸結年幾六十服養血潤燥藥則泥結服硝黃藥則若問知如此

三十餘年其人體肥膏梁而多鬱口吐酸痰乃寬此乃三焦氣滯有升

無降津液皆化爲痰不能下潤腸腑非血燥也潤劑留滯硝黃八血不

能入氣故無効用牽牛爲末皂角膏丸繞服便通外甥素多酒色病二

便不通脹痛呻吟七晝夜用通利藥不効十言此乃濕熱之邪在精道

蘊隧路病在二陰之間故前阻小便後阻大便病不在大腸膀胱也用

棟實尚香穿山甲諸藥倍牽牛三服而平東垣補下焦陽虛天真丹用

牽牛鹽水炒黑佐沉香吐仲肉桂

破故紙諸藥添得補瀉兼施之妙

有黑白二種黑者力速亦名取子



防已

通行水

瀉下焦

血分濕

熱

木集以

行水為

通劑改

熱藥為

燥劑

淘去浮者春去皮用得米香乾置

此藥葉前未入本草故仲景方中無此別錄始載之宋後始多用者

大辛苦寒

木經平別錄溫太陽經藥勝能行十二經通腠理

利九竅瀉下焦血分濕熱為療風水之要藥治肺氣

喘嗽水九氣者瀉降氣濕熱脚氣足傷寒濕為脚氣



則腫熱則痛防已為主藥溫加苡仁蒼朮木瓜木通熱加芩栝風加羌

活草薺痰加竹瀝南星痛加香附木香活血加四物大便秘加桃仁紅

花小便秘加牛膝澤瀉痛連臂加桂枝威靈仙痛連

脇加枳草又有足跟痛者屬腎虛不與脚氣同論

瘡或濕熱流八十二經致二陰不通者非此不可然性險而健陰虛及

濕熱在上焦氣分者禁川十劑白通可去滯通草防已之屬是也通草

無以別矣木通甘淡瀉氣介即木通是徐之才亦以行水者為通與燥劑

濕熱防已苦寒瀉血分濕熱

漢防已黑黧黃腥木強者名木防已不佳陳藏器曰治風用水酒洗用

惡細辛畏葶

葶

大瀉氣  
秘通行



辛苦大寒屬火性急大能下氣行膀胱水肺中水氣

膈著非此不能除破積聚癥瘕伏留熱氣消臍除

痰止咳定喘水濕泛溢為腫脹通經利便久服入

虛子劑曰洩可去閉葶大黃之屬是也大黃泄陰分血閉葶泄陽

肺而傷胃宜大棗輔之仲景有葶大棗瀉肺湯治肺氣喘急不得臥昂按輔以大棗補土所以制水

色黃合糯米微炒去米用得酒長榆皮為使 子如黍粟糞

甘遂

大通瀉  
經隧水



苦寒有毒能瀉腎經及隧道水濕直達水氣所結之

處以攻寒為用為下水之聖藥仲景大陷胸湯用之 丰三種

水大腹腫滿名水蠱喻嘉言曰腎為水穀之海五臟六腑之源脾不能散胃之水積于肺而

腎者胃之關也前陰利水後陰利穀

# 大戟

大通瀉藏肺水



苦寒有毒能瀉臟腑水濕行血破汗利大小便治十二水腹滿急痛積聚癥瘕腫風毒脚腫通經

病于中肺不能通胃之水道于膀胱而病于上腎不能司胃之關時其蓄泄而病于下以致積水浸淫無所底止王好古火者脾肺腎三經所主有五臟六腑十二經之部分上頭而中四肢下腰脚外皮膚中肌肉內筋骨脉有尺寸之殊浮沉之別不可輕瀉當知病在何經何臟方可用之按水腫有痰裏食積瘀血致精不升濁不降而成者有濕熱相生墜道阻塞而成者有燥熱沖擊秘結不通而成者症屬有餘有眼寒涼傷飲食中氣虛衰而成者有大病後正氣衰憊而成者有小便不通水液妄行脾莫能制而成者症屬不足宜分別治之然其源多由中氣不足而起丹溪口水病當以健脾為主使脾胃而氣運則水自行宜參苓為君視所挾症加減苟徒用利水藥多致不救癥瘕積聚開飲宿食痰迷癰廔者忌用皮赤肉白根作連珠事實者其麩裏煨熟用或用水甘草齊芫汁浸三日其水如黑以清為度再煎裏煨心下雷飲與甘草同用取其相反以立功也有治水腫及腫毒者以甘草遂未傳腫虛癰煎甘草湯服之其腫立消二物相反感應如此

鹽胎誤服損真氣

時珍曰痰延為物隨氣升降無處不到入心則迷盛癩癩入肺則寒竅為咳喘背冷入汗則脇痛乾嘔寒

熱往來人經絡則麻痺疼痛入筋骨則牽引隱痛入皮肉則癩癧癰腫陳無澤並以控涎丹主之殊有音効此乃治痰之本痰之本水也濕也得氣與火則結為痰大戟能泄臧腑水濕甘遂能行經絡水濕白芥子能散皮裏膜外痰氣惟善用者能收奇功也又曰錢仲陽謂腎為真乃有補無瀉復云痘症變黑歸腎者用百祥膏下之非瀉腎也瀉其腑則臟自不實腑者膀胱也百祥惟大戟一味能行膀胱之水故也竊謂非獨瀉腑乃腎邪實而瀉肝也實則瀉其子大戟浸水青綠肝胆之色也痘疔毒盛火熾則水溢瀉風挾外勢則土受虧故津液內竭不能化膿而成黑陷之症瀉其風火之毒所以救腎扶脾也昂按瀉心乃所以補心瀉腎即所以救腎邪熱退則真陰復矣機要用大戟一兩棗三枚同煮焙乾去戟用芫丸  
服名芫變百祥丸  
杭產紫者為上北產白者傷人漿水煮去骨用  
得大戟則不損脾畏葛蒲反甘草

商陸  
水大通行



苦寒有毒

諸家辛酸沉陰下行與大戟甘遂同功療  
水腫脹滿  
腫屬脾脹屬肝腫則陰氣猶行如單脹而不腫者名蠱脹為木橫尅土難治腫脹朝

芫花  
大通行  
水



寬暮急為血虛暮寬朝急為氣虛朝暮俱急為氣血兩虛腫脹由心腹而散四肢者古由四肢而入心腹者危男自下而上女自上而下皆難治  
**瘰癧腫喉痺不通**  
薄切醋炒  
**濕熱之病瀉蠱毒傳惡瘡隨胎孕合**  
**人見鬼神取花白者良**  
亦者傷人只堪貼臍入屬  
**黑豆湯浸蒸用得蒜**  
三分搗貼小便利則腫消

長

**苦寒有毒去水飲痰癖瘵五水在五臟皮膚脹滿喘**

**急痛引胸脇咳嗽瘴瘧**  
五水者風木皮水正水石水黃汗也水積胸中堅滿如石

名石水汁如相汗名黃汗久不愈必致癰膿時珍曰仲景治傷寒太陽症表未解心下有水而咳乾嘔發

熱或喘或利者小青龍湯主之表已解有時頭痛出汗惡寒心下有水乾嘔引痛兩脇或喘或嗽者十棗湯主之蓋青龍散表邪使水從汗出內經所謂開鬼門也十棗逐邪使水從兩便出內經所謂  
**葉似**  
潔淨府去陳莖法也十棗湯芫花甘草大戟等分棗十枚

**柳二月開花紫葉色葉生花落陳久者良醋煮過水浸暴用根療疥子**

**毒魚反甘草**  
閩詔者取葉擦皮膚輒作赤腫假傷以誣人

**辛散結苦洩熱行提藥主治暑同莖花**



**莖花**  
 大通行  
 水

**澤漆**  
 通行水



**辛苦微寒消痰退熱止嗽殺虫利大小腸治大腹水腫益丈夫陰氣 生平澤葉圓黃綠頗類貓睛一名**  
時珍曰別錄云是大戟苗非也功相類耳

**常山**  
 宜吐痰  
 散瘧通  
 行水



**辛苦而寒有毒能引吐行水祛老痰積飲**  
痰有六風痰熱痰食痰氣痰也飲有五流于肺為支飲于肝為懸飲于心為伏飲于經絡為溢飲于腸胃為痰飲也  
**常山力能專治諸瘧然悍暴能損真氣弱者慎用**  
時珍曰常山蜀漆劫痰截瘧須在發散表邪及提出陽分之後用之瘧有經

瘧藏瘧風寒暑濕痰食瘧魄之別須分陰陽虛實不可藥論常山蜀漆

大青葉草

莖花 莖花 澤漆 常山

藜蘆

宜引吐

得甘草則吐得大黃則利得烏梅穿山甲則入肝得小麥竹葉則入心  
 得林米麻黃則入肺得龍骨附子則入腎得草薺檳榔則入脾蓋無痰  
 不作瘡一物之功亦在驅逐痰水而已李士材曰常山發吐唯生用多  
 用為然與甘草同用亦必吐若酒浸炒透但用錢許每見奇功未見其  
 或吐也世人泥于雷效老人久病忌服之說使良藥見疑沉疴難起柳  
 何患也○常山吐瘧痰瓜蒂吐熱痰烏附尖吐濕痰萊服子吐氣痰藜  
 蘆吐風痰

**雞骨者良酒浸蒸或炒用栝實為使忌葱薤菜老蜀漆功用**

**畧同** 古方有蜀漆散取其苗性輕揚發散上焦邪結

**甘草水拌蒸**



**辛寒至苦有毒入口即吐善通頂令人噎風癩症多**

**用之** 張子和曰一婦病風癩初一二年一作後漸日  
 作甚至一日數作求死而已直歲大飢採百草

食見野草若慈采蒸飽食覺不安吐膠涎數日約一  
 二斗汗出如洗甚昏困後遂輕健如常人以所食慈

訪人乃慈葱苗即藜蘆是矣李時珍曰和王妃年七十中風不省牙關  
 緊閉先考太醫吏日月池翁診說藥不得入不獲已打去一齒濃煎藜  
 蘆湯灌之少頃噫氣遂吐痰而甦藥不壞眩厥疾不瘳誠然

**取根去頭用黃連為使反細辛芍藥**

諸參惡大黃畏葱白  
吐者服葱湯即止

木通  
古名

通草  
輕通行  
水瀉小  
腸火



甘淡輕虛上通心包降心火清肺熱  
心火降則肺熱清矣化津

液則津液化水道通  
肺為水源肺熱清  
下通大小腸膀胱導諸濕熱由

不便出  
故導赤散用之凡利小便者多不利大便以

大便通利九竅血脉關節治胸中煩熱遍身拘痛  
楊仁齋云遍身隱熱傷

血血屬于心宜木通以  
通心竅則經絡流行也  
大渴引飲  
中焦  
淋瀝不通  
下焦  
心移熱于小腸

則淋水腫浮大  
利小便  
耳聾  
泄腎火  
目眩口燥舌乾  
舌為  
喉痺咽痛  
火炎

鼻鼈  
音壅熱壅清道  
失音  
清脾熱  
好眠  
脾主四肢倦則好眠心為  
除煩

退熱止痛排膿破血催生行經下乳  
火不亢牙肉氣順血行  
汗多者禁

用東垣曰肺受熱邪津液氣化之源絕則寒水斷流膀胱受濕熱癰閉  
約束則小便不通宜此治之未二允曰火在上則口燥眼赤鼻乾在

寒水太  
陽膀胱

本草

藜蘆

木通

卷二十九



也

通草  
古名

通脫木  
經通利

澤瀉

瀉利水  
瀉膀胱


火

本草

中則心煩嘔歲浮腫在下則淋秘足腫必藉此甘平之性瀉諸經之火  
火退則小便自利便利則諸經火邪皆從小水而不降矣 君火宜木  
通相火宜澤瀉利  
水雖同所用各別  
筋有細孔兩頭皆通故通



治五淋水腫目昏耳聾鼻塞失音淡通發寒降 火利肺氣 退熱催生



甘淡微鹹入膀胱利小便瀉腎經之火邪功最利濕  
行水治消渴痰飲嘔吐瀉痢腫脹水痞脚氣疝痛淋  
瀝陰汗陰間有汗 尿血洩精既利水而又止洩精何也此乃濕熱為病不為虛滑者言

也虛渾則當濕熱之病濕熱既除則清氣上行又能養五臟益氣力起  
用補瀝之藥  
陰氣補虛損止頭旋有聰耳明目之功脾胃有濕熱則頭重耳鳴目昏 滲去其濕則熱亦隨去土乃得

卷二

脾喜燥  
腎惡燥  
故兼補  
為難

車前子  
通行水  
瀉熱涼

命而清氣上行故本經列之土品云聰耳  
明目而六味丸用之今人多以昏目疑之  
多服昏目小便通利而腎水  
屬膀胱過利則水瀦而火生仲景八味丸用澤瀉寇宗奭謂其接引桂  
附入腎經李時珍曰非接引也乃取其瀉膀胱之邪氣也古人用補藥  
必兼瀉邪邪去則補藥得力一闢一闢此乃玄妙後人不知此理謂一  
于補必致偏勝之患矣王履曰地黃山茱萸茯苓丹皮皆腎經藥桂附石  
腎命門之藥何待接引乎錢仲陽謂腎為真水有補無瀉或云脾虛腎  
旺故瀉腎扶脾不知腎之真水不可瀉瀉其伏留之邪耳易老云去脾  
中留垢以其微鹹能瀉伏水故也昂按六味丸有熟地之溫丹皮之涼  
山藥之瀉茯苓之滲山茱之收澤瀉之瀉補腎而兼補脾有補而必有  
瀉相和相濟以成平補之功乃平淡之神竒所以為古今不易之良方  
也郎有加減或加紫河車一具或五味麥冬杜仲牛膝之類不過一二  
味極三四味而止今人或疑澤瀉之瀉而減之多揀本草補藥恣意加  
入有補無瀉且客倍于主責成不專而之味之功且退處于虛位失製  
方配合之本旨矣此  
近世庸師之誤也

鹽水拌或酒浸用忌鐵

甘寒涼血去熱止吐衄消癢明目通淋

凡利水之劑多損子



甘寒涼血去熱止吐衄消癢明目通淋  
而日清矣雷教曰使葉勿使莖蓋

子甘寒清肺

本草青葉草

通草

澤瀉

車前子

卷三

肝風熱滲膀胱濕熱利小便而不走氣與茯苓同功強陰益精令人有

子腎有二竅車前子能利水叛而固精竅精盛則有子五子衍宗丸用之枸杞兔絲各八兩五味覆盆各四兩車前二兩蜜九貫遺洩者車

前易蓮子時珍曰人服食須佐他藥如治濕癰五淋暑濕瀉痢歐陽文六味丸之用澤瀉可也若單用則過瀉

下國醫不能愈夫人云市有藥三文一貼甚効公不肯服夫人雜他藥進之一服而愈問其方乃車前子為末米飲下二錢一云此藥利水而

不動氣水通利則清濁分谷藏自止矣  
目赤障翳能除肝熱 催生下胎 酒蒸搗餅焙研酒蒸搗餅

八濕補藥妙研入利水泄瀉藥

# 燈草

輕通利 水清熱



甘淡而寒降心火心能清肺熱利小腸 心與小腸相

則補熱小腸亦清入心清肺熱利小腸 表裏心火清

而熱從小便出矣通氣止血治五淋水腫燒灰吹喉

痲塗乳止夜啼擦癩最良縛成把擦極痒時虫從草出浮水可見十餘次則

能斷也

瞿麥

通利水  
破血



苦寒降心火利小腸逐膀胱邪熱為治淋要藥故入

用之五淋大抵皆屬濕熱熱淋宜入正及山梔滑石  
之類血淋宜小薊牛膝膏腎虛淋宜補腎不可濁瀉  
老人氣虛者宜參朮兼木通山梔亦有痰滯中焦  
作淋者宜行痰兼通利藥最忌發汗汗之必便血破

血利竅決癰消腫明目去翳通經墮胎性利善下虛者慎用寇宗奭曰心徑雖有

熱而小腸虛者服之則心熱未清而小腸別作病矣花大如錢紅白斑爛色甚媚俗呼洛陽

花用殼丹皮為使惡蝶蛸產後淋當去血瞿麥蒲黃皆為要藥

扁蓄  
各一

扁竹  
通淋



苦平殺虫芥利小便治黃疸熱淋蛇咬腹痛虫蝕下

部煮葉葉細如竹芴莖蔓引促節有粉三月開紅花

天仙籐

通活血  
消腫



苦溫疏氣活血治風勞腹痛妊娠水腫有天仙籐散

葉似葛圓而小有白毛根有鬚四時不凋水香籐

天直青草

燈草 瞿麥 扁蓄 天仙籐

卷二十一

地膚子  
通利水  
補陰



石韋  
通淋補  
勞



數是膀胱血多陽火扁任也治法當補膀胱陰血瀉火邪為主而佐以收澀之劑如牡蠣山茱五味之類不可獨用病木屬熱故宜瀉火困水不足故火動而致便數小便既多水益虛矣故宜治癩疔散惡瘡煎湯補血補血瀉火治其本也收之瀉之治其標也  
良藥作浴湯去皮膚風熱丹腫洗眼除雀盲澀痛 葉如薑莖赤子類  
蚕砂惡蝶蛸

甘苦氣寒益精強陰入膀胱除虛熱利小便而通淋  
時珍曰無陰則陽無以化亦猶東垣治小便不通用知柏滋腎之意王節齋曰小便不禁或頻數古方多頻為寒而用溫游之藥殊不知屬熱者多益膀胱火邪妄動水不得甯故不能禁而頻數也故老人多頻

甘苦微寒清肺金以滋化源  
凡行水之藥必通膀胱皆能先清肺火

而利水道益精氣補五勞  
利濕清熱之功高陽負對黃帝治勞傷用石韋汁

治淋崩發背  
炒未冷調酒  
生石陰柔勒如皮背有黃毛

海金砂  
通淋瀉  
濕熱

茵陳  
通利濕  
熱治諸  
黃

香薷  
宜通利  
濕清暑

去毛微火用杏仁滑石射于為使得薑蒲長生古瓦上者名瓦薑治淋



甘寒淡滲除小腸膀胱血分濕熱治腫滿五淋莖痛

得梔子牙硝逢砂治傷寒熱狂大熱利小便此金底抽薪之義也

莖細如線引竹木上葉紋皺處有砂黃赤色忌火

苦燥濕寒勝熱入足太陽經膀胱發汗利水以泄太陰

陽明之濕熱脾為治疸黃之君藥脾胃有濕熱則發黃黃者脾之色也

熱甚者身如橘色汗如柏汗亦有寒濕發黃身薰黃而色暗大抵治以茵陳為主陽黃加大黃梔子陰黃

加附子乾薑各隨寒熱治之

又治傷寒時疾狂熱瘴癘頭痛頭旋女人瘕疝皆濕熱為病

辛散皮膚之蒸熱溫解心腹之凝結屬金水而主肺

為清暑之主藥肺氣清則小便行而熱降暑必兼濕治暑必兼



身寒寒  
字當熱  
字看傷  
寒必病  
熱  
青蒿  
瀉熱補  
勞

利濕若無濕但治嘔逆水腫熬膏服小脚氣口氣煎湯單服治霍亂轉  
為乾熱非暑也  
筋時珍曰暑有乘涼飲冷致陽氣為陰邪所遏反中人內遂病頭痛發  
熱惡寒煩燥口渴吐瀉霍亂宜用之以發越陽氣散邪和脾則愈若  
飲食不節勞役作傷之人傷暑大熱大渴汗出如雨煩躁喘促或瀉或  
吐者乃內傷之症宜用清暑益氣湯人參白虎湯之類以瀉火益元可  
也若用香薷是重虛其表而濟之熱矣蓋香薷乃夏月解表之藥如冬  
月之用麻黃氣虛者尤不宜多服今人謂能解暑藥用代茶誤矣李士  
材曰香薷為夏月發汗之藥其性溫熱只宜于中暑之人若中熱者誤  
服之反成大害世所未知按潔古云中暑為陰症為不足中暑為陽症  
為有餘經曰氣盛身寒得之傷寒氣虛身  
熱得之傷暑故中暑宜溫散中熱宜清涼  
陳者勝宜冷飲熱

苦寒得春木少陽之令最早二月故入少陽厥陰血



分胆治骨蒸勞熱童便搗葉  
肝取汁熬膏  
辱勞虛熱凡苦寒之藥  
多傷胃氣惟

青蒿芬香夫脾獨宜子血虛  
有熱之人以其不犯胃氣也  
風毒熱黃久瘡久疔癰

疥惡瘡鬼氣尸疰  
時珍曰月令通纂言伏內庚曰采蒿懸門庭可辟邪  
冬至元旦各服一錢亦良明清蒿之治鬼疰益亦有

也所供  
補中明目

宜便浸葉用熬膏亦良使子勿使葉使根勿使莖



辛甘有毒大熱純陽其性浮而不沉其用走而不守  
通行十二經無所不至能引補氣藥以復散去之元  
陽引補血藥以滋不足之真陰引散藥開腠理以

燥回  
下腎  
火逐  
琴濕

還在表之風寒

同乾薑桂枝溫經散寒發汗

引溫煖藥燄下焦

以祛在表之寒濕能

八味  
內亦  
地黃  
補陰

火下行亦有津調貼足心者

治三陰傷寒

吳緩曰附子陰症要藥凡傷寒傳變三陰中寒夾陰身雖大熱而脈沉細者或厥陰

腹痛甚則唇青囊縮者急用須用之若待陰極陽結而用之已遲東垣治陰盛格陽傷寒面赤目赤煩渴引飲脈七八至但按之則散里盡附湯加人參投牛筋得汗而愈此神聖之妙也

中寒中風

卒中曰中漸傷曰傷輕為感胃重則為傷又重則為中

氣厥痰

厥虛寒而厥者宜之如傷寒陽盛格陰身冷脈咳逆風嘔噎胃膈

多由氣血虛胃治胃穢而成飲可下而食不可下穢在吸門喉間之厥會也食下胃脘痛須與吐出穢在賁門胃之止口也此上焦名噎食下

與非  
午乳



一條參  
有論治

良久吐出稿在幽門胃之下口也此中焦名膈朝食暮吐稿在關門大  
小腸下口也此下焦名反胃又有痰飲食積痰血壅塞胃口者如寒痰  
胃冷則宜薑附參木胃稿者當滋  
潤宜四物牛羊乳血厥者加韭汁脾泄命火冷痢寒瀉霍亂轉筋脾虛  
中焦為霍亂寒容下焦肝拘攣風癩瘰癧積聚督脉為病春強而厥小  
賢為轉筋熱霍亂者禁用拘攣風癩瘰癧積聚督脉為病春強而厥小

兒慢驚痘瘡灰白癰疽不斂一切沉寒痼冷之症經曰陰盛生內助陽

退陰殺邪辟鬼本草通經墮胎凡陰症用薑附藥宜冷服熱因寒用也

益盛治之以熱則拒格不納用熱藥治飲下噎之後冷體既消熱性便  
發情且不違而致火益此反治之妙也又有寒藥執飲治熱症者此寒  
因熱用義亦相同也經曰正者正治反者反治如用寒治熱用執治寒  
此正治也或以寒治寒以熱治熱此反治也經所謂必伏其所主而先  
其所因蓋借寒藥執藥為反佐以作向導也亦曰從治王好古曰用附  
子以補火必防涸水如陰虛之人久服補陽之藥則虛陽益熾真陰愈  
耗精血日枯而氣無所  
附麗遂成不救者多矣  
母為鳥頭附生者為附子連生者為側子細

長者為英雄兩岐者為烏喙五物同出異名附子以西川彰明亦小產

者為最良黑體圖底平八角重二兩以上者良或云二兩者更勝然難得生用散

熟附趙嗣其曰仲景麻黃附子辛細湯熟附配麻黃發中有補四配乾薑補中有發其旨微矣丹溪曰烏附行經仲

景八味丸用為少陰嚮導後世因以為補藥誤矣附子走而不守取其健悍走下以行也漬之帶耳初習用為風藥及補藥殺人多矣昂按附

子味甘氣熱峻補元陽賜微欲絕者回生起死非此不為功故仲景四逆真武白通諸傷多用之其有功于生民甚大況古人日用常方用之

最多本非禁劑丹溪乃僅以為行經之藥而云用作補藥多致殺人言亦過矣蓋丹溪法重陰故每警湯藥亦其偏也王節齋曰氣虛用四

君子湯血虛用四物湯虛甚者俱宜加熟附蓋四君四物皆平利寬緩之劑須得附子建悍之性行之方能成功附子熱藥本不可輕用但當

病則雖暑熱時月亦可用也水浸麩裏煨令發折乘熟切片炒黃去火毒用又替

草二錢鹽水薑汁童便各半煮熟用畏人參黃耆甘草防風犀角絲

夏覆衣貝母生薑葶藶白及白欬中其毒者黃連犀角甘草煎湯解

之重水亦可解烏頭功同附子而稍緩附子性重峻溫脾逐寒烏

人用  
豈煮  
佳

草烏頭  
大燥  
頑痰

頭性輕疎溫脾逐風寒疾宜附子風疾宜烏頭為附尖吐風痰治癩

癩取其鋒銳直達病所吐之不透後用附子尖和漿水與之始得大吐

膠痰  
數碗  
天雄補下焦命門陽虛寇宗奭張元素皆云補上焦丹溪曰可

下行然補下乃所以益上也若上焦陽虛治風寒濕瘡為風家主藥發

則屬心肺之分當用參耆不當用雄附矣  
汗又能止陰汗 側身散側旁生宜于發散四肢充遠皮毛治手足風

濕諸疽



辛苦大熱搜風勝濕開頑痰治頑瘡以毒攻毒頗勝

川烏藥毒無所醜制不可輕投 野生狀類川烏

亦名烏喙鼻汗炒或豆腐煮虜熬膏名射罔傳箭射

獸見血去茹

白附子

燥祛風

濕治面

疾

破故紙

一名補

骨脂

燥補命

火



草烏之小者長寸許

皴紋有節炮用

陶弘景曰此藥久絕無復真者今惟涼州生



辛甘有毒大熱純陽陽明經藥能引藥勢上行治面

上百病陽明之脈營于面白附能去頭面遊風作面脂消斑疵補肝虛祛風痰

治心痛血痺諸風冷氣中風失音陰下濕癢根如

辛苦大溫八心包命門補相火以通君火煖丹田壯

元陽縮小便亦治遺尿治五勞七傷五藏之勞七情之傷腰膝冷痛

腎冷精流腎虛泄瀉腎虛則命門火衰不能蒸氣則胃脾胃虛寒遲于運化致飲食

病少腹脹腸鳴泄瀉如蠶金之下無火物終不熟故補命門相火即所以補脾破故紙四兩五味三兩肉桂二兩是菜一兩薑煮藥七名

四神丸治婦人血氣婦人之血脫氣陷亦墮胎酒出南蕃者色赤嶺南五更骨唐

者色綠酒浸蒸用亦有童便乳浸鹽水炒香得胡桃胡麻良薑甘草唐

本草綱目 白附子 破故紙 卷之二十一

芸臺補菜也


肉苁蓉

補腎命  
弱腸

鎖陽

補陽滑腸

相國方疏說菟絲子酒浸蒸為末胡桃肉二十兩去皮爛研密相每日酒調一匙或水調服白飛霞曰破故紙屬火堅固元陽引挑馬水固燥養血有水火相生之妙忌寒臺羊血加杜仲名青娥丸



一宿刷去浮甲壁破除內筋膜酒蒸半日又酥炙用忌鐵蘇恭曰今人所用多草菴

容功方和劣



有酸鹹溫八腎經血分補命門相火滋潤五臟益髓

強筋治五勞七傷絕陽不興絕陰不產腰膝冷痛崩

帶遺精峻補精血時珍曰補而不峻聚用恐妨心渴或有菟蓉之說

大便長大如臂重至斤許有松子鱗用者良酒浸

甘溫補陰益精興陽潤燥養筋強筋故能興陽治痿弱滑大

便便藥者啖之可代鱗甲櫛比狀類勇陽酥炙

巴戟天

補腎祛濕



甘辛微溫八腎經血分強陰益精治五勞七傷辛溫

散風濕治風氣脚氣水腫根如連珠擊破中紫而

鮮潔者偽也中雖紫微有白粉粉色而理小暗者真

也蜀產佳

山律根似巴戟但色白人或醋煮以亂之

去心酒浸焙用覆盆子爲使惡丹參

胡盧巴

燥補腎命除寒濕



苦溫純陽八右腎命門煖丹田狀元陽治腎臟虛冷

陽氣不能歸元

同附子硫黃

瘕疝冷氣

同茴香巴戟川烏用棟吳茱萸

濕脚氣

出嶺南番舶者良云是香菘煎子酒浸暴或蒸或炒

仙茅

燥補腎命除寒濕



辛熱有小毒助命火益陽道明耳目補虛勞治失溺

無子心腹冷氣不能食溫腰脚冷痺不能行殘筋相

火盛者急服葉如茅而畧潤根如小指黃白多涎

淫羊藿  
補腎命

蛇床子  
補腎命  
去風濕

竹刀去皮切糯米泔浸去赤汁出毒用忌鐵唐虞羅國始進此方當時盛傳服之多効照前製陰

乾密丸酒服或食生乳牛肉許真者嘗云甘能養肉辛能養節苦能養氣鹹能養骨酸能養筋滑能養膚和苦酒服之必効也



辛香甘温八肝腎補命時珍曰手足陽明三焦命門藥益精氣堅

筋骨利小便治絕陽不興絕陰不產冷風勞氣四肢

不仁手足麻木一名仙靈脾北部有羊一曰百合食此

藿所致故名去枝羊脂拌炒山藥為使得酒良



辛苦而温強陽益陰補腎散寒祛風燥濕治陰痿

濕女子陰痛陰癢濕生虫同若煎湯洗子藏虛寒產閉不閉炒熱

之腎命之病及腰酸體痛帶下脫肛喉痺齒痛濕癬

惡瘡殺虫風濕諸病煎湯治去風癢時珍曰腎命三焦氣分之藥不獨補助男子而且有益婦人世人舍

此而求補藥于遠城  
豈非貴耳賤目乎

似小苗而細微炒殺毒則不辣以地黃汁卦煎  
蒸三遍生

### 丹皮貝母巴豆

### 兔絲子

平補三陰



甘辛和平凝正陽之氣八足三陰脾肝強陰益精温而不燥不助相火治五勞七傷精寒淋瀝口苦燥渴

脾虛腎燥而生內熱兔絲益陰清熱祛風明目補衛氣助筋脉益氣力

### 肥健人

補肝腎之効老羸瘠筆記子族弟少服兔絲子凡數年飲食倍常血氣充盛忽因浴見背腫隨視隨長乃大疽也適值金銀花

開飲至數斤腫遂消兔絲過服尚能作疽以此加金石藥不可不戒

無根蔓延草上子黃如黍粒得酒

良淘去泥炒酒浸一宿暴乾搗末山藥為使

### 覆盆子

平補肝



甘酸微温益腎臟而固精補肝虛而明目起陽痿縮

小便寇氏曰服之當覆其溺器故名淫飢膚烏髻髮培汁塗髮不自女子多

平補肝



孕同密為膏治肺氣虛寒李士林曰：寒腎無燥熱之屬，則精無凝滯之害，金玉之品也。狀如覆盆

故名。帶潤淨搗餅，用時酒拌蒸。栗絞汁，摘自中出，目眩重除，膚赤

收濕止淚

苦溫補腎辛溫瀉肺氣而散肝風益精明目肝以散為補凡

補肝藥首治虛勞腰痛遺精帶下咳逆肺痿乳閉癥

瘕疔漏陰瘡音癩腎肝肺三經之病催生墮胎刺莢藜主惡血

故能破癥下胎沙苑藜綠色似腎故補炒用亦可刺莢藜三角有刺去刺酒

拌蒸風家宜刺莢藜補首煎餘功用瑞竹堂方齒牙打動首藜藜根燒灰傳之

甘溫健脾胃除虛熱殺臟蟲治五疳便濁瀉痢瘡癰

為小兒諸病要藥經疏曰：五疳便濁瀉齒腹重皆由脾胃虛弱因而乳停食滯濕熱聚

便毒 補脾殺 蟲消積

瘦藜子 平補肝 腎



按地黃 胡麻皆 殺虫

# 益智子

燥脾胃 補心腎

砂仁 縮

砂仁 宜行氣

寒而成脾胃隨則積滯清濕熱散水迫利而前症盡除矣時珍曰凡能殺虫之藥多是苦辛獨使君子樞子甘而殺虫每月上旬至頭向上中旬頭橫下旬向下道藏云初一至初五至頭向上凡有虫病者每月上旬空心食數枚虫皆死而出也  
**出閩蜀五莢有稜內仁如榧亦可煨食久則油不可用忌飲熱茶犯之作瀉**



**辛熱水脾藥兼入心腎主君相二火補心氣命門三**

**焦之不足**心為脾母補火故能生土**能瀆精固氣**本草未載**又能開發**

**鬱結使氣宣通**味辛能散**溫中進食攝涎**涎胃冷則瀉**小**

**便**腎與膀胱相表裏益智辛溫固腎鹽水炒同烏藥等分酒煮山藥糊丸鹽湯下名縮泉丸**治嘔吐泄瀉客寒犯胃**

**令氣腹痛崩帶泄精**瀆精固氣因熱而崩濁者禁用**出嶺南刑如棗用仁**

**辛溫香竄補肺益腎和胃醒脾快氣調中運行結滯**

**治腹痛痞脹**痞滯有傷寒下早裏虛邪入而痞者有食蘊痰塞而痞者有脾虛氣弱而痞者



# 白豆蔻

宣行氣  
暖胃

須分虛，具治之不宜而用利氣藥，恐變為鼓脹。鼓脹，內腸而外有形痞脹，惟覺痞悶而已。皆太陰為病也。噎膈嘔吐，上氣咳嗽，赤白瀉痢，濕熱積滯客于火腸，霍亂轉筋，奔豚崩帶，痰逐冷消食，醒酒止痛，安胎氣，行則痛止，散咽喉口齒浮熱，化銅鐵骨硬。王好古曰：得檀香豆蔻人肺，得入參益智入脾，得黃柏茯苓入腎，得赤石脂入大小腸，腎道曰辛，能潤腎燥，引諸藥歸宿。丹田地黃用之，拌蒸亦取其能達下也。經疏曰：腎虛氣不歸元，用為嚮道，始勝柱附藥，藥為害。 出嶺南研用。



**辛熱流行三焦**，溫煖脾胃。三焦利脾胃運則諸病自平矣。 而為肺家

**本藥** 肺主氣 散滯氣，消酒積，除寒燥，濕化食，寬膨，治脾

虛癯疾，感寒腹痛，吐逆反胃。肺者火盛及氣虛者，禁用。 白睛翳膜

自睛屬肺 能散肺滯，太陽經目背紅筋。起目背。 番舶者良研

細用

肉荳蔻

一名肉

菓

燥脾瀉腸

草荳蔻

一名草

菓

燥燥祛

寒除痰

截瘧



辛溫氣香理脾煖胃下氣調中逐冷祛痰消食解酒

治積冷心腹脹痛挾痰挾食者並宜之中惡吐沫小兒吐逆乳

食不下又能瀉大腸止虛瀉冷痢初起忌用出嶺南似

草蔻外有皺紋內有斑紋糯米粉裏煨熟用忌鐵

辛熱香散煖胃健脾破氣開鬱燥濕祛寒除痰化食

治瘴癘寒瘧佐常山能截瘧或與知母同用取其一陰一陽治寒熱瘴瘧蓋草菓治大陰獨

勝之寒知母治陽明獨勝之火寒客胃痛散滯氣利膈痰因滯因寒者多効霍亂瀉

痢噎膈反胃痞滿吐酸痰飲積聚解口臭氣酒毒魚肉毒故食料用之過劑

助脾熱耗氣損目 閩產名草蔻如龍眼而微長皮黃白薄而稜峭仁

如砂仁而辛香氣和滇廣所產名草菓如訶子皮黑厚而稜密子粗而

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

本草綱目

香附一名

莎草根

宣調氣

開鬱

素問中

仍有寒

則氣收

熱則氣

泄各丸

故古人

治湯多

用五香

連翹飲

辛臭雖是一物然有不同類裏煨熟取仁用忌鐵

性平氣香味辛能散微苦能降微甘能和乃血中氣

藥通行十二經入脉氣分主一切氣人身以氣為主

裏順則平逆則病絕則死矣經曰怒則氣結恐則氣

下喜則氣發悲則氣消驚則氣亂思則氣結勞則氣

耗此七情之氣也以香附為利三焦解六鬱鬱氣鬱

君隨症而加升降消補之藥利

血鬱濕 鬱食鬱 止諸痛通則不痛 治多怒多憂痰飲痞滿胸腫腹脹飲食積聚霍亂

吐瀉腎氣脚氣癱瘓瘡瘍血凝氣滯所致香附一味未服名獨勝丸治

亦宜服之大凡瘡疽喜服香藥行氣通血最忌臭穢不潔觸之康祖左  
乳痛癰又腕間生核痛楚半載禱張王憂投以方薑注製香附為未每  
服二錢米 飲下逐愈吐血便血崩中帶下月候不調氣為血配血因氣行經成塊  
行後作痛氣血俱虛也色淡亦虛也色紫氣之熱色黑則熱之甚也錯  
經者氣之亂肥人痰多而經阻氣不運也香附陰中快氣之藥氣順則



血和暢然須輔以涼血補氣之藥丹溪曰能合舊病能推陳致新故引血藥至氣分而生血此正陽生陰長之義

諸書皆云益氣行中有補丹溪曰天行健運不息所以生生無窮即此理耳時珍曰凡人病則氣滯而穢香附為氣分君藥臣

以參耆佐以月苧治虛怯甚速也去毛用生則上行胸膈外達皮膚熟則下走肝腎

麥徹腰膝童便浸炒則入血分而補虛鹽水浸炒則入血分而潤燥或

水炒青鹽炒則補腎氣酒浸炒則行經絡醋浸炒則消積聚且飲薑汁炒

則化痰飲炒黑又能止血時珍曰得參木則補氣得歸地則補血得木香則散滯和中得檀香則理氣醒

脾得沉香則升降諸氣得芍藥若木則總解諸鬱得梔子黃連則清降火熱得扶神則交濟心腎得茴香破故紙則引氣歸元得厚朴半夏則

決壅消脹得紫蘇葱白則發汗散邪得三稜莪朮則消積磨塊得艾葉則治血氣煖子宮乃氣病之總司女科之仙藥也大抵婦人多鬱氣行

則鬱解故服之尤効非宜于婦人不宜于男子也李士材曰乃治標之劑惟氣實血虛大虛者宜之不然恐損氣而燥血愈及其疾矣此俗泥

于女科仙藥之一語借未有發明及此者

木香 宣行氣



辛苦而溫三焦氣分之藥能升降諸氣泄肺氣疏肝

氣和脾氣怒則肝氣上肺氣調則金能制木而肝平木不尅土而肺和治一切氣

痛九腫心痛痛屬胃脘曰寒痛熱痛氣痛血氣濕痛痰痛食痛虺痛悸痛蓋君心不易受邪

真心痛者手足冷過胸節朝發夕死嘔逆反胃霍亂瀉痢後重同檳榔用劉涓子問曰痢疾

後重自除癰閉痰壅氣結疝癖癥塊腫毒蠱毒衝脈為病氣逆裏急殺鬼物

禦瘴霧去腋臭實大腸消食安胎胎氣逆則胎不安過服損其氣丹溪曰味辛氣升若陰火衝上

者反助火邪當用黃柏知母少以木香佐之王好古曰本草王氣劣氣不足補也通壅導氣破也安胎健脾胃補也除痰癥瘕塊破也不同如

此汪機曰與補藥為佐則補與瀉藥為君則瀉時珍曰諸氣臍鬱皆屬干肺上焦氣滯用之者金鬱泄之也中氣不運皆屬於肺中焦氣滯用

之者脾胃喜芳香也大腸氣滯則後重膀胱氣不化則瘴閉丹氣鬱則為痛下焦氣滯用之者壅者通之也番舶上來形

如枯骨味苦粘舌者良名青木香今所用者皆廣木香土木香廣汁用東垣用黃連

藿香

宣去惡氣

製亦有蒸用麴製煨用者畏用實腸止瀉畏火



辛甘微温入手足太陰脾快氣和中開胃止嘔胃熱

而嘔者忌用去惡氣進飲食治霍亂吐瀉心腹絞痛肺虛

有寒吐焦壅熱能理脾肺之氣古方有藿香正氣散正氣通陽則邪逆自除出

交廣方莖有節葉微似茄葉古惟用葉今枝莖亦用之因寒多偽也

茴香古作

懷香補腎命門寒疝



大茴辛熱入腎膀胱煖丹田補命門開胃下食調中

吐嘔療小腸冷氣癩疝陰腫疝有七種氣血寒水筋

經以厥陰肝脈絡陰器也多因寒濕所致亦有挾虛者當加參木于温散藥中乾濕脚氣多

食損目發瘡小茴辛平理氣開胃亦治寒疝食粒宜之 大如麥粒輕

而有細稜者名大茴出寧夏他處小者名小茴自番舶來實八瓣者名

本草 木香 茴香 藿香 卷二十三



八角茴香炒黃用得酒良得監則入腎發腎邪故治陰疝受病于肝見症于腎大小

苗各一兩為末猪脾一箇連尿八藥酒煮爛為丸服

甘松香

宣理氣醒脾



山柰

宣溫中辟惡



良薑

宜燥煖胃散寒



甘溫芳香理諸氣開脾鬱治腹卒滿痛風疝齒齲脚膝氣浮煎湯淋洗出京州及黔蜀葉如茅根根用根

辛溫煖中辟惡治心腹冷痛寒濕霍亂風疝牙痛生廣中根葉皆如生薑八合讀音用

辛熱煖胃散寒消食醒酒治胃脘冷痛凡心口一點痛非也乃胃脘有滯或有虫及因怒因寒而起以良薑酒洗七次香附醋洗七次焙研因寒者薑一錢附

一錢因怒者附二錢薑一錢寒怒兼者每錢半米飲加薑汁一匙監霍少許服初梁纒患心脾痛夢神投此方一味等分服後人各炒分用霍

亂瀉痢吐惡噎膈瘴瘧令癖肺胃熱者忌之 出嶺南高州子名紅薑

華菱 一作

撥除胃 冷散浮 熱

烟草 宣行氣 癩寒

蔻温肺散寒醒脾燥濕消食解酒 東垣脾胃藥 中常用之 並東壁土炒用



辛熱除胃冷温中下氣消食祛痰治水瀉氣痢 牛乳 點服

虛令腸鳴 亦入大腸經 冷痰惡心嘔吐酸水疔瘵陰疔辛

散陽明之浮熱治頭痛 偏頭痛者口含温水隨左石以未吹一字人鼻効 牙

痛 寒痛宜乾薑 羶辛細熱痛宜石膏牙硝風痛宜皂角 羶蚕蜂房二烏 疔痛宜石灰 雄黃 鼻淵多服泄真氣動脾

肺之火損目 出南番嶺南亦有類棋子而長青色去挺用頭醋浸刮

淨皮粟免傷人肺



辛温有毒治風寒濕痺滯氣停痰山嵐瘴霧其氣入

口不循常度頃刻而周一身令人通體俱快醒能使

醉醉能使醒飢能使飽飽能使飢人以代酒代茗終

甘松香 良薑 華菱 烟草 山柰 卷三十一

身不厭故一名相思草然火氣薰灼耗血損年人自不覺耳

聞塵者佳烟筒中水

能解蛇毒

### 金銀花

濕熱解



甘寒八肺散熱解毒清熱即補虛凡物皆補療風養血

止渴丹溪曰癰疽安後發渴黃耆六一湯吞忍治癰

瘰癧楊梅惡瘡腸癖血痢五種尸疰 經冬不凋一名忍冬又名左纏勝

花葉同功花香尤佳釀酒代茶熬膏並妙忍冬酒治癰疽發背一切惡毒初起便服奇効乾者亦可

不及生者力速忍冬五兩甘草二兩水二碗煎至一碗再入酒一碗煎分三服一日一夜吃盡重者日二劑服至大小腸通利則藥力到忍冬丸照前分兩酒煮晒乾同甘草為末以所煮餘酒打糊為丸陳藏器云熱毒血痢濃煎服之為末糖調常服能稀痘

### 蒲公英

一名黃花地丁



甘平花黃屬土八六陰陽明脾化熱毒解食毒治腫

核高治乳癰乳頭屬厥陰乳房屬陽明同疔毒亦為

瀉熱解毒

這淋妙品

諸家不言治淋試之甚驗

擦牙烏髭髮

瑞竹堂有還少丹方取其通腎東垣曰苦寒腎經君藥

白汁

塗惡刺

凡螻螂諸虫盛夏孕育游諸物上必遺精汁乾久則有毒人手獨之成疾名狐尿刺滲痛不眠百療難功取汁厚塗即愈于金

方極言其功

葉如蒿芭花如單瓣菊花四時有花花罷飛葉斷之莖中有

白汁

鄭方升曰一莖兩花高尺許者掘下數尺根大如拳旁有人形拱抱搗汁酒服治噎噎如神

紫花地

下

瀉熱解毒



辛苦而寒治癰疽發背疔腫癩瘰無名腫毒葉如

柳而細夏開紫花結角生平地者起莖生溝壑者起

蔓

杜牛膝

一名天一名精

一名地一名松



甘寒微毒能破血一婦產後口渴氣喘面赤有癍大便泄小便秘用行血利水藥不効

用牛膝濃煎膏飲下血一桶小便通而愈能止血吐痰除熱解毒殺蟲治

乳蛾喉痺砂淋血

淋良方云濃煎加乳麝少許神効

小兒牙關緊閉急慢驚風不省人事者絞

本草

金銀花

蒲公英

紫花地丁

杜牛膝

卷三十五

瀉熱吐  
痰破血  
解毒

鳥鼠  
瀉殺臣

山薑根  
瀉熱解毒

汁八好酒灌之即甦  
以醋拌渣傅項下

再熬毒

根白如短牛膝地黃為使

煎湯洗痔渣

塞患處良

服汁吐瘧痰

傷風服之亦

漱汁止牙痛搗之傅蛇

傷風服之亦



肥肉汁  
謂未服

沈存中筆記云是杜牛膝子

別是一種最

苦辛有小毒殺五臟虫治蚘腹痛

面自唇紅時發

粘人衣有狐氣炒熱則香

苦寒瀉心火以保金氣去肺大腸之風熱

心火降則

金清肺與大腸相表裏  
肺金清則大腸亦清

消腫止痛止喉癰喉風腫

齒痛

名之

喘滿熱咳腹痛下痢五痔諸瘡解藥諸毒

傳禿瘡蛇狗蜘蛛傷人馬急黃

血熱極

所致

苗莫如



薑經冬不凋

牛旁子

一名鼠

一名惡

實

瀉熱解

山慈菝

瀉熱解

漏蘆

瀉熱解



辛平潤肺解熱散結除風利咽膈理痰嗽消斑疹利

二便行十二經散諸腫瘡瘍之毒利腰膝凝滯之氣

性冷而滑利痘症虛寒泄消者忌服

實如蒲萄而褐色酒拌蒸待有

霜拌去用根苦寒

竹刀刮淨絞汁密和服治中風汗出乃愈搗和猪脂

貼瘡腫及反花瘡

肉反出如花狀



甘微辛有小毒功帶清熱散結治癰瘡疔腫癩結

核醋磨塗解諸毒蠱毒蛇虫狂犬傷根與慈菝小蒜

相類去毛殼用玉樞丹中用之廣筆記云出處州遂昌縣淇山無毛少真者有毛誤也

鹹軟堅苦下泄寒勝熱入胃大腸通肺小腸散熱解

毒通經下乳排膿止血生肌殺虫治遺精尿血癰疽



六直草

鶴虱

山荳根牛旁子山慈菝

漏蘆

卷三十四

貫眾

瀉熱解  
毒

射干

瀉火解  
毒散血  
消痰

發背古方以漏盧湯為稱首

及預解時行痘疹毒取其寒勝熱又能入陽明故也

出閩中莖如

油麻枯黑如漆者真甘草拌蒸連翹為使



味苦微寒有毒而能解邪熱治毒治崩中帶下產後血氣脹痛破癥瘕發狂痘王海臧快班散用之化骨硬能軟殺三虫根似狗脊而大汁能制三黃化五金伏鍾乳

結砂制水解毒軟堅

以此浸水用中曰飲其水能辟時痰



苦寒有毒能瀉實火火降則血散腫消而痰結自解

故能消心脾老血行太陰厥陰之積痰肺脾治喉痺

咽痛為要藥搗汁醋和噲之引涎于金方治喉痺有烏扇膏治結核瘰癧便

毒瘡母驚甲煎丸治瘡母用之通經閉利大腸鎮肝明目扁竹花根

續隨子

一名干

金子

瀉行水

破血解

毒

馬蘭子

一名蠶

實

瀉濕熱

解毒

苴麻子

瀉通殺

拔毒出

也葉橫鋪如鳥羽及扇  
故一名烏扇烏嬰  
泔水浸一日篋竹葉煮半日用



辛溫有毒行水破血治癥瘕飲冷氣脹滿蠱毒鬼

疰利大小腸下惡滯物塗疥癬瘡王樞丹用之治百病多効驗疏曰乃

以毒治毒之功  
去殼取色白者壓去油用時珍曰續隨子大或澤漆甘遂

莖葉相似主癰亦相似長于利水用之得法皆要藥也



甘平治寒疝喉痺癰腫癩婦人血氣煩悶血運崩

帶利大小腸久服令人瀉叢生葉似薤而長厚結

角子如麻大赤色有稜炒用治疝用醋拌根葉同功

辛甘有毒性善收亦善走能開通諸經絡治偏風

不遂喎邪搗餅右貼左貼左即止口噤鼻窒耳聾搗爛綿裹塞耳塞鼻喉



大黃青雲草

實象 射干續隨子 馬蘭子 苴麻子 卷之三十五



有形滯

白頭翁  
瀉熱涼血

痺舌服

油作飛然烟薰能利水氣治水腫

研服當下青黃水壯人只可五粒

能出有形滯

物治針刺入肉

搗敷傷處頻看刺出即去藥恐怒出好肉

竹木骨硬苲麻子一兩疑水石二

然不見胞胎不下

胎下即去之若子腸涎出者搗膏塗項心即收能道

膿拔毒傳癩惡瘡外用屢奏奇功

能拔病氣出外故諸膏多用之然

有毒熱氣味頗近巴豆內服不可輕率

去皮黃連水浸每晨用浸水吞一粒至三四粒治大風疥癩

形如牛蟬黃褐有斑鹽水煮去皮研或用油忌鐵

食苲麻一生不得食炒豆犯之脹死

苦堅腎寒涼血八陽明血分腸

治熱毒血痢治熱



痢有白頭翁湯合黃連黃柏秦皮東垣曰腎欲堅濕急食苦以堅之病則下焦虛故以純苦之劑堅之瘡寒熱齒痛骨痛腎主齒骨明鼻劬禿瘡癩疔痕血

痔偏墜

搗傅患處

明目消疣

有風反靜無風則搖近根處有白茸得酒良

王瓜 土郎

瓜根 瀉熱利 水行血



治畧似栝藹傷寒發斑用王瓜搗汁和伏龍肝未服甚効

苦寒瀉熱利水治天行熱疾黃疸消渴搗汁飲便數帶

下月閉瘀血利大小腸排膿消腫下乳通乳藥多用之單服亦可

墮胎 根如栝藹之小者味如山藥根子通用經疏曰主

玉不留

行

通行血



甘苦而平其性行而不住能走血分通血脈乃陽明

衝任之藥陽明多氣多血除風去痺止血定痛通經利便下

乳催生俗云穿山甲玉不留婦人服之乳長流治金瘡止血癰瘡散出竹

木刺孕婦忌之

花如鈴鐸實如燈籠子殼五稜取苗子蒸漿水浸用

甘寒淡滑潤燥利竅通營衛滋氣脈行津液利二便

消水腫用榆皮等分煎服通關格下乳滑胎 秋葵復種經

冬葵子 滑腸和 痰



本草綱目

白頭翁 玉不留行 王瓜 冬葵子

卷三十六

白鮮皮  
通祛風  
濕

冬至春作子者名冬葵子根葉同功春葵子亦滑不堪入藥 蜀葵花  
赤者治赤帶白者治白帶赤者治血燥白者治氣燥亦治血淋關格皆  
取其寒潤滑利之功也



氣寒苦行味苦性燥

八脾胃除濕熱兼八膀胱

小腸行水道通關節利九竅為諸黃風痺之要藥

白鮮皮湯治產後風時珍兼治風瘡疥癬女子陰中  
腫痛世醫止施之瘡科淺矣根黃白而心實取皮用惡桑  
腫痛熱乘虛客腎與膀胱所致

鱗蛸桔梗茯苓草薺



甘苦性平八足陽明厥陰胃祛風去濕以固下焦陽  
主肉屬濕厥補肝虛風堅筋骨筋骨風濕去則益精明目

草薺  
通祛風  
濕補下

焦

腎有二  
竅淋症  
出于溺  
竅濁症  
出于精  
竅

土茯苓  
通祛濕  
熱補脾

治風寒濕痺腰痛久令關節老血膀胱宿水陰痿失溺莖痛遺溺痔瘻

惡瘡諸病皆陽明濕熱流八下焦草薺能除濁分清古方有草薺分清

方云凡人小便頻數便時痛不可忍者此疾必因大腸秘熱不通水液

只就小腸大腸愈加乾竭甚則身熱心躁忌水即重症也此疾本因貧


酒色或過食辛熱葷膩之物積有熱毒腐物瘀血乘虛流入小腸故便

時作痛也此便數而痛與淋症澼而病不同宜用草薺一兩鹽水炒為

末每服二三錢使水道朝入大腸仍以葱湯  
有黃白二種黃長鞭音  
頻洗穀道令氣得通則便數及痛自滅也

白虛軟軟者良薏苡為使畏大黃柴胡前胡忌茗  
時珍曰草薺薺莖  
主治不甚相遠豈一類數種平草

薺根細長淺白薺莖根作塊亦黃  
甘淡而平陽明主藥胃大健脾胃祛風濕脾胃健則



營衛從風濕除則筋骨利利小便止瀉泄治筋骨拘  
攣楊梅瘡毒  
楊梅瘡占方不載明正德間起于嶺表  
其症多屬陽明厥陰而兼及他經蓋相

本草

白鮮皮 草薺 土茯苓

卷二十七

火寄于厥陰肌肉属于陽明故也醫輕粉切劑其性燥烈入陽明劫去痰涎從口齒出瘡即乾愈然毒氣竄入經絡筋骨血液枯槁筋失所養變為拘攣癩漏竟致癩痢土茯苓能制輕粉之毒去陽明濕熱用一兩為君苡仁金銀花防風木通木瓜白鮮皮各五分皂角子四分氣虛加人參七分血虛加當歸七分名搜風解毒傷癩癧瘡腫濕鬱而為熱營衛不和則生瘡腫經淡能治甘能補患膿疥者煎湯代茶甚妙大如鴨子連綴而生俗名冷飯團有赤白二種

白者良可煮食亦可生啖忌茶

白欵  
瀉火散  
結



苦能泄辛能散甘能緩寒能除熱殺火青散結氣生

肌止痛治癰疽瘡腫而上疔瘡金瘡撲損箭鏃不出者同丹皮

或半夏為未酒服欵瘡方多用之故名每與採凍耳同黃柏白及相須未油調

蔓赤枝有五葉根如卵而長三五枚同菓皮烏肉白一種亦欵功用皆

同鄭奠一日能溫瘡而痢腸風痔瘻赤白帶下

預知子

熱補勞瀉

旱蓮草

一名鯉

腸又名

金陵草

補腎

劉寄奴

草

瀉破

止血



苦寒補五勞七傷治疝癖氣塊天行溫疾蛇虫咬毒

殺虫療蠱綴衣領中几遇蠱毒則利便催生勝生

子如皂莢褐色光潤出蜀中云亦難得

甘鹹汁黑補腎止血黑髮烏鬚千金云當及時多收其効甚速經疏云性

涼不益脾胃故千金方苗如旋覆實似蓮房斷之

有汁須臾而黑熬膏良

甘溫破血通經除癥下脹止金瘡血多服令人吐利

一莖直上葉尖長糙澁花白莖黃如小菊花有白

絮如苦蕒絮子細長亦似苦蕒子莖葉花子皆可用

劉裕小字寄奴微時曾射一蛇明目見童子林中搗藥問之答曰吾王為劉寄奴所傷合藥敷之裕曰工何不殺之童曰寄奴王者不可殺也

本草青更草

白歛預知子旱蓮草劉寄奴草


卷三十八

此之不見乃收葉回  
每遇金瘡傳之立愈

馬鞭草  
瀉破血  
熱脹殺

穀精草  
輕明目

青箱子  
一名草  
决明



精煮熟食之  
或作丸茶下

味苦微寒破血通經殺虫消脹治氣血癥瘕癰瘡陰  
腫搗塗壚啗甚多方莖葉似益母對生夏秋開細紫  
花穗如車前草類蓬蒿而細根白而小用苗葉

辛溫輕浮上行陽明胃兼八厥陰肝明目退翳之功  
在菊花之上亦治喉痺齒痛陽明風熱 收穀後荒  
田中生葉似嫩秧花如目星小兒省膏者搗羊用一  
具不洗竹刀割開八穀

味苦微寒入厥陰肝祛風熱鎮肝明目治青盲障翳  
疔疥惡瘡瞳子散大者忌服能動  
腸火類雞冠而穗尖

用明


肝明

質溫中

勃

解熱  
用傳

長



甘苦鹹平入肝經除風熱治一切目疾故有決名之

名曰益腎精腫子神光屬腎且華曰明目甚于黑豆作枕治頭風狀如馬

蹄俗呼馬蹄決明搗碎前慈大麻仁

辛溫溫中明目耐風寒去水氣時珍曰古人種麥為蔬收子入藥今惟酒

麴用其汗耳以香有麥青麥紫麥赤麥水

麥馬麥

辛平輕虛清肺藥錄上普濟消散血止嗽治喉痺

烟痛吹喉中良或加白礬鼻衄失音外用傳諸瘡良

生濕地朽木上狀如肺肝紫色虛軟彈之粉出取



粉用

木鱉子

瀉熱外  
時治瘡



苦溫微甘有小毒利大腸瀉痢瘕積癰瘡痔乳

癰毒消腫道毒生肌除黥音旱瘡入外科核扁

如鱉綠色揀去油者能瘡