

本草備要

牛部

苦心人天不負

有志者自竟成

增訂本草備要目錄

二卷

牡丹皮

續斷

骨節補

益母草子

澤蘭蘭草 蘭葉

白薇

艾艾草 艾葉

延胡索

紅花胭脂

茵陳

紫葳葳葳

凌霄花

木薊

三七三七

地榆

地黃

卷柏

薺菜

梅藟

紫葳

葛黃片子 葛黃

我朮

荆三稜

白茅根劍根

牻牛兒苗

芋根皮 水

薺菜根 營實 角蒿

芭蕉根

大黃

蓼

薺菜

胡黃連

薺菜

知母

龍胆草

青黛

大青

牽牛

防己漢木 苦

甘遂

大戟

商陸

芫花

芫花

澤漆

常山蜀漆

藜蘆

木通

通草

澤瀉

車前子 葉

燈草

瞿麥

扁蓄

本草綱目

卷二目錄

天仙筋
地膚子葉
石韋无草
海金沙
茵陳
香薷蒿
青蒿

附子烏頭 天雄 烏附尖 側子
草烏頭射
白附子
破故紙
肉從蓉
瑋陽

巴戟天
胡盧巴
仙茅
淫羊藿
蛇床子
鬼絲子
覆盆子

蒺藜子沙苑 蒺藜 刺疾藜
使君子
磁石
砂仁
白豆蔻
肉豆蔻

草薺草
香附
木香
藿香
茴香八角 小
甘松香
山奈

良薑紅薑 蔻
葶麥
煙草
金銀花實
蒲公英
紫花地丁
桂牛膝

鶴虱
山慈根
牛蒡子根
山慈菝
漏蘆
眞粟
射干

續隨子
馬蘭子根 葉
龍腦子
白頭翁
玉瓜子
玉不留行
冬葵子

子蒴
白鮮皮
車前子拔節
土茯苓赤 白 欬 赤 欬
預知子子
旱蓮草實

寄奴草
馬鞭草
穀精草
青箱子
滑石子
蓼實馬勃 木鱉子

2587
0012

熟地黃

平補肝腎養血滋陰



甘而微溫入手足少陰厥陰經滋腎水補真陰填骨

髓生精血聰耳明目耳為腎竅目為肝竅目得血而能視耳得血而能聰黑髮

烏髮治勞傷風痺胎產百病為補血之上劑丹溪曰產前當

清熱養血為主產後宜大補氣血為主雖有雜症從未治之昂按丹溪產後大補氣血一語誠至當不易之論後人不善用之以是風寒未解

痲血未盡妄施峻補反致大害者不可不察王頌云男子多陰虛宜熟地女子多血熱宜生地以好酒拌砂仁末浸

蒸晒九次用地黃性寒得酒與大與日則溫性泥得砂仁則和氣具能引丹田六味丸用之為君尺脈弱者加桂附所謂益水

之厚以消陰翳也尺脈旺者加知伯所謂壯水之主以制陽光也

何首烏

平補肝腎滋精



苦堅腎溫補肝甘益血瀦收斂精氣添精益髓養血

去風治風先治血強筋骨烏髮故名令人有子為

滋補良藥氣血太和則勞瘵風虛崩帶痔瘡癰

何首烏

熟地黃 何首烏

卷一

腫者病自己營血調則腫消赤止惡瘡益陰補肝瘡疾要藥而本草不言治瘡時珍曰不寒不燥

功在比黃天冬諸藥之上有赤白二種夜則藤交一名交藤有陰陽交合之象赤

雄入血分白雌入氣分以大如拳五瓣者良三百季者大如栲栳服之

成地僊凡使赤白各半泔浸竹刀刮皮切片用黑豆與首烏拌勻鋪柳

甌入砂鍋九蒸九晒用挾芥為使忌諸血無鱗魚菜服葱蒜鐵器唐時

首烏者祖名能嗣父名延秀能嗣五十八尚無妻子服此藥七日而思

人道娶妻連生數子延秀服之壽百六十歲首烏又服之壽百三十歲

髮猶烏黑李嗣為立可首烏傳然流傳雖久服者尚少明嘉靖初方士

邵應節進七寶美髯丹世宗服之連生皇子遂盛行十世方用赤白首

烏各一斤黑豆拌九蒸晒挾芥半斤乳拌當歸枸杞兔絲各半勸俱酒
浸牛膝半斤酒浸同首烏第七次蒸至第九次破故紙四兩黑芝麻炒
蜜丸並忌鉄器按地黃何首烏皆君藥也故六味丸以地黃為君七
寶丹以何首烏為君各有配合末可同類而其施也即有加減當各依
本方隨病而施損益今人多以何首烏加人地黃丸中合兩
方而為一方是一藥二君安所適從乎失製方之本義也

增訂本草備要卷之二

休甯汪昂訂 菴著輯

弟汪恒殿武來訂

同鄭會慶贊襄同訂

草部

勇汪端其兩

姪汪惟龍子錫

姪婿仇灑天一同

牡丹皮

瀉伏火而補血



辛甘微寒入手足少陰腎厥陰肝瀉血中伏火也

故入血分時珍曰伏火即陰火也陰火即相火也世人專以黃柏治相火不知丹皮之功更勝故仲景腎氣丸和血涼血而生血血熱則枯破積血積瘀不去用之則新血不

生通經脈為吐衄必用之藥血屬陰本靜因相火所逼故越出上竅治中風五勞驚癇

癎筋脈伸縮抽掣為癎癎或手足抽掣口眼喎邪卒然眩仆吐涎除煩

本草備要草

牡丹皮

續斷

骨碎補

卷之二

續斷

補肝腎
理筋骨

熱療癰瘡

涼

下胞胎退無汗之骨蒸

張元素曰丹皮治無汗之骨蒸地骨皮治有汗之骨蒸神不足者手

少陰志不足者足少陰故仲景腎氣丸用丹皮治神志不足也按內經云水之精為志故腎藏志火之精為神故心臟神

單莖花

紅者入藥肉厚者佳酒拌蒸用畏貝母兔絲大黃忌蒜胡葵伏磁

時珍曰花

白者補赤者利人所罕悟宜分別之

苦溫補腎辛溫補肝能宣通血脈而理筋骨主傷中

補不足

經疏云味甘故然

煖子宮縮小便破瘀血治腰痛胎

漏瀝

懷奸崩帶遺精腸風血痢

星齋方平胃散一兩川續斷二錢牛每服二錢



米飲下治癰毒腫毒又主金瘡折跌

以功止痛生肌外科需為上

劑川鹿茸狀如雞脚皮黃皺節節斷者真去向裏硬筋酒浸用地黃

為使

膏石補

補腎治

折傷

經曰腎

者胃之

開也前

陰利水

後陰利

穀

益母草

一名羌

蔚

通行瘀

血生新



蒸



苦澀補腎故治耳鳴由腎虛及腎虛久瀉腎燥熱室

心食之腎主二便久瀉多腎主骨故治折傷以功命

屬腎虛不可專責脾胃也腎主骨故治折傷名粥和

傳傷牙痛炒黑為末擦又入厥陰心包能破血止血

入血行傷故治折傷

傷粥和味裏傷處根似薑而扁長去毛用或密拌

辛微苦寒八手足厥陰心包消水行血去瘀生新調

經解毒則經調治血風血運血痛血淋胎痛產難崩

中帶下血屬氣氣虛者補中益氣而兼升降血虛者

養血滋陰為經產良藥消疔腫乳癰亦取其散通大小便然辛散之藥

曠子散大者忌服

益母子主治暑同調經益精明目者則宜之活血

天直青夏草

續斷

骨碎補

益母草

卷二二

澤蘭
通行血
消水

順氣逐風

氣行則血行
血活則風散


行中有補治心煩頭痛血氣血熱之候胎產崩命人

有子

有補陰之功時珍曰益母根莖花葉實皆可同用若治瘡腫胎產消水行血則宜並用若治血分風熱明目調經用子為良益根莖

花葉專于行子則行中有補也產實濟陰返魂丹小暑端午或六月六日採益母莖葉花實為末密丸治胎產百病近効方搗汁熬膏亦良

忌鐵子微炒用



苦泄熱甘和血辛散鬱香舒脾八足太陰厥陰脾通

九竅利關節養血氣長肌肉破宿血調月經消癥瘕

散水腫防已治產後血瀝腰痛為使痰行木盡吐血黃淇目痛

頭風癰毒撲損補而不滯行而不峻為女科要藥古

帶蘭丸
甚多

時珍曰蘭草澤蘭一類二種俱生下濕紫莖素枝赤節綠葉

葉對節生有細齒但以莖圓節長葉光有岐者為蘭草莖微方節知葉

有毛者為澤蘭時並可按而佩之楚語所謂綴秋蘭以為佩是也

朱女公難騷辨證云必花葉俱香燥濕不變方可刈佩吳人呼為香草俗佩今之蘭惠花雖香而葉無氣質弱易萎不可刈佩

名孩兒菊夏曰采置髮中則髮不補浸蘭草走氣分故能利水道除痰

癖殺蠱辟惡而為消渴良藥經曰敷食肥甘傳為消渴治之以蘭除陳氣也澤蘭走血分故能

消水腫空癰毒破瘀除癥而為婦人嬰藥以為今之山蘭者誤矣防已

為使寇宗奭朱丹溪並以蘭草為山蘭之葉李時珍考眾說以譏之按別本云蘭葉甘寒清肺開胃消痰利水解鬱調經開產者力勝李

士材云蘭藥稟金水之氣故人肺臟東垣方中嘗用之內經所謂治之以蘭除陳氣者是也余屢驗之李時珍又謂東垣所用乃蘭草也其集

諸家之言曰陳遜齋閑覽云楚騷之蘭或以為都梁香或以為澤蘭或以為荷蘭當以澤蘭為正今之所僅如麥門冬者名幽蘭非真蘭也故

陳止齋著盜蘭說以譏之方虛谷訂蘭說言古之蘭草即今之于金草俗名孩兒菊者今之所謂蘭其葉如茅者根名土續斷因花馥郁故得

蘭名揚升菴云世以如楠骨者為蘭九蛇之受誣也久矣又吳草盧有蘭說云蘭為醫經上品有根有莖草之梅者也今所謂蘭無枝無莖因

閩產為勝則是建蘭矣

既名幽

蘭正合

騷經矣

升菴九種多有

朱確故
陳文燭
作正揚
以辨之

黃山谷稱之世遂謬指為離騷之蘭寇氏本草溺平流俗反疑舊說為非夫醫經為實用豈可誣哉今之蘭果可以利水殺蠱而除痰癖乎其種盛于閩朱子閩人豈不識其土產而辨析若此世俗至今猶以非蘭為蘭何以惑之甚也昂按朱子辨蘭援離騷紉佩以為證竊謂紉佩亦騷人風致之詞耳如所云飲木蘭之墜露餐秋菊之落英豈真露可飲而英可餐乎又云製菱荷以為衣集芙蓉以為裳豈真艾荷可衣芙蓉可裳乎末儒釋經執泥恐未可為定論也第騷經既言秋蘭則非春蘭明矣本經既言澤蘭則非山蘭明矣是離騷之秋蘭當屬本經之澤蘭無疑也然離騷不常曰春蘭今秋菊乎不又曰結幽蘭而延晷乎不又曰疏石蘭以為芳乎若秋蘭既屬之澤蘭將所謂春蘭幽蘭石蘭者又不得為山蘭當是何等之蘭乎且山蘭為花中最上之品古今評者列之梅蘭之前今反屈于孩兒菊之下以為盜襲其名世間至賤之草皆收入本草獨山蘭清芬佳品壞棄不錄何其不幸若斯之甚也本草殺蠱之藥良多皆未必有驗至乎行水消痰固山蘭之葉方所優為者也益李時珍陳方吳楊輩皆泥定陳臧器以澤蘭蘭草為一類二種遂并騷經而疑之崇澤蘭而黜山蘭遂令蘭草無復有用之者不思若以為一類則本經蘭草一條已屬塗出何以本經蘭草反列之上品而澤蘭止為中品乎况一人氣分一人血分迥然不同也又騷經言蘭者凡五除木蘭人所共識其餘春蘭秋蘭幽蘭石蘭若皆以為孩兒菊是不特二類一種且四種一類矣而以為九畹之受誣豈理也哉蓋本經言澤

吐賤品
幽字何
可當也

白微

瀉血熱

乎春也言石蘭所以別乎澤也愚謂秋蘭當屬澤蘭而春蘭石蘭定是
山蘭其曰幽蘭則山蘭之別名以其生于深山窮谷故也
寇氏朱氏之論又安可全非也姑附愚說以豁多識之士



苦感而寒陽明衝任之藥利陰氣下水氣主中風身

熱支滿忽忽不知人陰虛火旺則內熱生風火氣焚灼故身熱支滿痰隨火湧故不

知血厥汗出過多血少陽氣獨土氣塞不行而厥婦人尤多此症宜白微湯白微當歸各一兩麥

五錢甘草錢熱淋温瘧傷寒熱酸痛能內營故酸痛婦人傷中淋

半每服五錢露血熱千金白微散治胎前產後遺尿不知時白微芍藥等分酒調服

靈丹溪曰此即河間所謂熱甚廷孔鬱結神無所依不能收禁之意也
廷孔女人產虛煩嘔仲景安中益氣竹皮丸用之經疏云古方調經種

弱水也真陰不足陽勝而內熱故營血自枯也益陰清熱則血似牛膝而短
自生旺而有子矣須佐以歸地芍藥杜仲從蓉等藥

小柔軟去鬚酒洗用惡大黃大戟山茱萸棗

天直青身草

白微

三二四

艾葉

宜理氣
血燥逐
寒濕



苦辛生溫熱純陽之性能回垂絕之元陽通十二

經走三陰太少理氣血逐寒濕煖子宮止諸血溫中

開鬱調經安胎胎動腰痛下血膠艾湯良治吐衄崩

帶治帶腹痛冷痢霍亂專治寒濕之效殺蛇治癩

醋煎外科有用乾艾作湯投白朮二三錢能治瘡然後散藥以之灸音火

者益人血氣冷必假艾力以佐陽而艾性又能殺虫也

能透諸經而治百病血熱為病者禁用灸火則氣下行入藥則熱上衝

者以熟艾裝袋兜臍腹甚妙寒濕脚氣亦宜以此火入襪內陳者良採搗如綿謂之熟艾灸火用

婦人丸散醋煮搗餅再為末用入茯苓數片煎服宜鮮者苦酒也香附

為使艾附丸調婦人諸病末時垂湯陰艾自明成化來則以蘄州艾為種艾艾附云須酒雲一效便透蒙筌發明並以野艾為真蕪艾雖香實非

延胡索

宜活血
利氣



辛苦而溫人手足大陰脈厥陰肝心包經能行血中氣

滯氣中血滯通小便除風痺治氣凝血結上下內外

諸痛通則不痛癥瘕崩淋月候不調氣血不和因而產後

血運暴血上衝折傷積血疝氣危急為治血利氣第一藥然辛溫走而

不守獨用力迅宜兼補氣血藥通經墜胎血熱氣虛者禁用 根如半夏肉黃小而

堅者良酒炒行血醋炒止血生用破血炒用調血

紅花

紅藍花
通行血
潤燥



辛苦甘溫入肺經而破瘀血活血瘀行則血活有熱結於中暮吐紫黑

血者吐為好吐未盡加桃仁紅花行之大抵鮮血宜止瘀血直行潤燥消腫止痛凡

熱血瘀則作腫作痛治經閉便難血運口噤胎死腹中非活血行血不

能瘡瘡血熱本草不喉痺不通又能入心經生新血須兼補益藥為佐使 俗用

艾葉 延胡索 卷二五

茜草
通行血



染紅併作胭脂
胭脂活血解毒疔挑
少用養血多則行血過用能使
血行不止而斃
病有產婦血悶而死名醫陸氏以紅花數十斤煮湯寢
婦于上而薰之湯冷再加半日而蘇金
匱有紅藍花酒云治婦人六十二種風

色赤入營氣溫行滯味酸走肝而鹹走血
本經

陰血分心包能行血止血
經又能止吐崩尿血消痰

通經
酒煎一兩治風痺黃疸
瘡有五黃疸穀疽酒疽
黃汗疽女勞疽此蓋蓄

血發黃不專于濕熱者也女勞疽必屬腎虛亦不可以濕熱例
治當用四物知柏壯其水參朮培其氣隨症而加利濕清熱藥

損痔癢瘡瘡血少者忌用
根可染絳忌鐵

紫草

瀉血熱
滑腸



甘鹹氣寒入厥陰血分
心包
涼血活血利九竅通二

使鹹寒治心腹邪氣
水腫五疔癩惡瘡
血熱

及痘瘡血熱毒盛二便閉滯者出大便利者忌之活幼心書云紫草性寒小兒脾實者可用脾虛者反能作瀉古方惟用茸取其初得湯氣以類觸類用發痘瘡今人不達此理一槩用之誤矣瀉者忌用

去頭鬚酒洗

凌霄花

一名紫葳

葳

瀉血熱



甘酸而寒八厥陰血分肝心包能去血中伏火破血去

瘀主產乳餘疾崩帶癥瘕腸結不大血閉淋悶風痒

血熱生風之症女科多用孕婦忌之本經云養胎經疏云破血之藥非所宜也肺癰有用之為君藥者

凌霄花為末和蜜吃僧睡調敷酒齏甚驗鮮生花開五辨黃赤有黯不可近鼻聞傷腦

大小薊

瀉涼血

薊小薊大



甘溫大明曰涼皆能破血下氣行而帶補治吐衄腸癰女

子赤白沃安胎涼血之功小薊力微能破瘀生新保精養

血退熱補虛不能如大薊之消癰毒丹溪曰小薊治下焦結熱血淋

本草青真草

茜草 紫草 凌霄花 大小薊

卷六

本事方一人冷氣入陰囊腫
滿疼痛煎大薊汗服立瘥

兩薊相似花如薔大薊莖高而葉嫩小

三七亦各

山漆
瀉散
定痛
癩



甘苦微溫散血定痛治吐血衄血血痢血崩目赤

腫醋磨塗即散已為金瘡杖瘡要藥杖時先服一二

杖後敷之去瘀消腫易愈大抵此藥近時始出軍

中特之從廣西山洞來者審似白芨地黃有節味微甘頗似人參以未

疹猪血中血化為水者真近出一種葉似菊艾而勁厚有岐尖莖有赤

香根大如牛蒡味甘苦易察衍云是三七侵夏秋開黃花莖如金絲盤組可愛而氣不

治金瘡折傷血病甚効與南中來者不同本草未嘗言瀼然能收

地榆
瀉止血



除血熱治吐衄崩中血虛腸風血鮮者為腸風隨臧

汗止血皆酸欬之功也八下集

本草圖
經

蒲黃

生滑行
血炒
止血

出腸胃後為遠血出肺肝血病頰曰虛寒處痢及初起者忌用
柳根外裹紅取上截炒黑用稍皮行血得髮良惡麥



甘平厥陰血分藥心包生用性滑行血消痰通經脈

利小便祛心腹膀胱寒熱同五靈脂治心腹疼痛打

損傷癆瘵諸虛一婦舌脹滿日以蒲黃頰搽比曉乃

薑末等分搽之愈時珍曰觀此則蒲黃之涼血活血可知矣
蓋舌為心苗心包相火乃其臣使乾薑是陰陽相濟也
炒黑性滑

止一切血崩帶泄精香蒲花中澁屑湯成八藥

卷栢

生用破
血炙用

止血



生用辛平破血通經治癥瘕淋結炙用辛溫止血治

腸風脫肛生石上拳擊如雞足俗呼萬年松凡使

鹽水煮半日并水煮半焙用

地喻蒲黃卷栢

藟姑
瀉破血

菴蒿子
瀉行水
散血

鬱金
宜行氣
解鬱瀉
泄血破
瘀



辛寒有小毒蝕惡肉排膿血殺疥虫除熱痺破癥瘕

內經同烏啣骨 根如萊菔皮黃肉白葉長微潤折之 治婦人血枯

有汁結實如豆一顆三粒甘草為使

苦辛微寒別錄八肝經血分行水散血散中有補治

陽痿經澁腰膝骨節重痛產後血氣作痛閃到折傷

撲打方能制蛇見之則爛

葉似菊而薄莖似艾而粗莖意為使

平苦氣寒純陽之品其性輕揚上行入心及包絡兼

入肺經涼心熱散肝鬱下氣破血行滯氣亦不損正

新治吐血尿血婦人經脈逆行經不下行上為吐衄

汁薑汁童便服其血自血氣諸痛產後敗血攻心顛狂失心頗多喜笑 尚知畏懼

毒黃
瀉破血
行氣

症屬不足狂多忿怒人貴能制症屬有餘此病多因驚憂痰血塞于心
竅所致鬱金七兩白礬三兩米糊丸服名白金丸鬱金入心散悲血明
礬化頑瘡毒入心 鬱金一兩甘草二錢半煮乾焙研末水片五分每用
痰故也 瘡毒入心 一錢加猪血五七滴新汲水下治斑痘痲有白泡忽
插入腹紫 下鼻毒 同升麻服
黑無膿 不吐則下
微香味苦帶甘者真 市人多以
薑黃偽之



苦辛 本草大寒 藥器大明曰熱 色黃入脾兼入肝經理血中之氣

下氣破血除風消腫功力烈于鬱金治氣脹血積產
後敗血攻心通月經療撲損疔子者能入手臂治風

寒濕痺 血虛臂痛者勿用時珍曰入臂
出川廣 陳藏器曰鬱金苦寒
色赤薑黃辛溫色黃

滋味苦色青三物不同所用各別經疏曰薑黃主治介乎三稜鬱金之
間時珍曰薑黃鬱金莪朮形狀功用大畧相近但鬱金入心專治血薑
黃八脾兼治血中之氣莪朮入肝治氣中之血稍為不同今時以扁如乾
薑者為片子薑黃圓如蟬腹者為蟬肚鬱金並可染色莪形雖似鬱金

天
至青
草
簡茹
菴筒子
鬱金
薑黃
卷二八

我述音
瀉破血
行氣消積

而色不黃也



辛苦氣溫八肝經血分破氣中之血能通肝消痰通

經開胃化食解勞止痛治心腹諸痛冷氣吐酸奔豚

瘕瘕酒醋磨服瘕音賢小腹積瘕瘕多見于男子瘕瘕瘕多見于婦人我述香烈行氣通竅同三稜用

治積聚諸氣良按五積心積曰伏梁起膈上至心下肝積曰肥氣在左

脇肺積曰息賈在右脇脾積曰痞氣在胃腕右則賢積曰奔豚在小腹

上至心下治之不宜專用下藥恐損真氣宜于破血行氣藥中加補脾

胃藥氣旺方能磨積正旺則邪自消也經曰大積大聚其可犯也其

大半而止過者死東垣五積方用三稜我述皆兼人參黃助成功按治

積諸藥神麩麥芽化穀食萊菔化麵食詢鈔阿魏山杏化肉食紫蘇化

魚蟹毒葛花枳椇消酒積麝香消酒積菓積莞花牽牛大戟行水飲三

稜我述紫甲消瘕瘕木香瀝榔行氣滯礞石蛤粉攻痰積巴豆攻冷積

大黃芒硝攻熱積雄黃臘粉雖為泄劑亦能益氣王好古曰故治氣短

攻涎積蚘虫水蛭攻血積不能接續大小七香

丸棗香丸諸湯散中多用之根如生薑生根下似卵不齊堅硬難擣灰火煨透

荆三稜

瀉行氣

破血消

積破血消

白茅根

瀉火補

中止血

止歲

乘熱搗之入氣或醋磨酒磨或者熟用八血



苦平色白屬金皮黑八肝經血分破血中之氣亦通
聚兼入脾經散一切血瘀氣結瘡硬食停者塊堅積
乃堅者削之從血藥則治血從氣藥則治氣須輔以
健脾補氣藥良昔有人黑癥瘕死遺言開腹取之得

病塊如石文理五色削成刀柄因御
三稜楠消成水乃知此藥可療癥瘕消腫止痛通乳墮胎功近香附而
力峻虛者慎用
色黃體重若鮒魚而小者良醋浸炒或麩裏煨



甘寒入手少陰心足太陰陽明脾補中益氣除伏熱
消痰血利小便解酒毒治吐血諸血心肝火旺逼血
火盛則動血茅根甘和血寒家血引火下降故治
之操損瘀血鴉汁服名茅花湯亦治鼻衄產淋血

開寒熱血瘀則閉閉
寒熱則寒熱作
淋瀝崩中則崩傷寒噦逆也東垣作乾嘔之甚者

我遊 荆三稜 白茅根 卷二九

蘆根

驅瀉熱止

蕩熱散

未是肺熱喘急內熱煩渴黃疸水腫清火行水時珍曰良藥也世人以微烏足知是肺熱喘急內熱煩渴黃疸水腫而忽之惟事苦寒之劑傷中和之氣此哉



茅針潰癰瘡孔二針潰一孔

甘益胃寒降火治嘔噦反胃胃熱火丹則嘔逆食不下金匱方蘆根煎服

消渴客熱傷寒內熱止小便敏散肺為水之上源脾氣散精上歸平肺始能

運調水道下輸膀胱腎為水藏而主二便三經有熱則小便數甚至不能少忽火性急速故也蘆中空故入心肺清上焦熱熱解則肺之氣化行而小更復能解魚蟹毒取逆水肥厚者去鬚節用其常道矣



甘寒而滑補陰破瘀解熱潤燥治天行熱疾火渴大狂胎動下血諸淋血淋搗貼赤遊丹毒癰疽發背金

瘡折傷止血雞魚骨硬搗如龍龜雞骨雞能化血為水葶皮與產婦

作枕止血運安腹上止產後腹痛散瘀葶汁療消渴

薔薇根
瀉濕熱



苦澁而冷八胃大腸經除風熱濕熱生肌殺虫治泄
痢消渴牙痛口糜煎汁遺尿好眠腫疔瘡癬花有

芭蕉根
瀉熱



味甘大寒治天行熱狂煩悶消渴產後血脹並搗汁服塗
腫痛為末油調敷
腫痛為末油調敷
腫痛為末油調敷

大黃

大瀉血
分實熱
平有形
積滯



大苦大寒八足大陰脾手足陽明厥陰大腸胃
其性淨而不沉其用走而不守若酒浸亦能引至
高之分仲景大腸門調胃承氣湯大黃註曰酒浸陽
明門大承氣湯大黃註曰酒洗少陽陽明小

承氣湯大黃不用酒製自有分別東垣曰邪氣在上非酒不至若用
生者則遺至高之邪熱病愈後或目赤喉痺腫膈上熱疾住也

本草

蘆根

薔薇根

芭蕉根

大黃

卷二十

以蕩滌腸胃下燥結而除痰熱治傷寒時疾發熱譫語大腸有燥糞故

音溫熱障瘧下痢赤白腹痛裏急黃疸水腫癰瘰積聚積久成疔謂之積屬陰聚散無

常謂之聚屬陽積多是氣留飲宿食心腹痞滿二便不通皆十鬱吐血

血閉血枯損傷積血一切實熱血中伏火行水除痰腫脹消腫能推

陳致新然傷元氣而耗陰血下多若病在氣分胃虛血弱人禁用氣分

而用之是為誅伐無過東垣曰能推陳致新如定禍亂以致太平所以

有將軍之號時珍曰仲景瀉心湯治心氣不足吐衄血者用大黃黃連

黃芩乃瀉心包肝脾胃四經血中之伏火也又治心下痞滿按之軟者

則痞滿乃寒傷營血邪結上焦用之上脘心故曰瀉心經曰大陰所

至為痞滿又曰濁氣在上則生脹服是已病發于陽而反下之則結胸

腹音嘔

之邪而降其濁氣也若結胸在氣分只用小陷胸湯痞滿在氣分只用

半夏瀉心湯或問心氣不足而吐衄何以不補心而反瀉心丹溪曰少

陰不足元陽無輔致陰血妄行故用大黃瀉其亢甚之火又心木不足

黃芩
瀉火除濕



就以苦補其心蓋一舉而兩得之李士材曰古人用大黃治虛勞吐
芻意甚深微蓋濁陰不降則清陽不生瘀血不去則新血不生也
川產錦紋者良有酒浸酒蒸生熟之不同生用更峻黃芩為使
得敷進穀食大黃得穀食便不能通利耳
堅志湯火傷者搗生大黃醋調敷止痛無嫌
欲取通利者不

苦八心寒勝熱瀉心傳實火除胆家濕熱治瀉利腹

痛便血日澀寒痛忌用凡腹痛有寒熱虛實食積瘀
血痰食之不同寒宜溫熱宜清虛宜青實宜下食

宜消導痰血宜行散痰濕且化痰利濕痛時
手不可按者為實痛按之痛止者為虛痛 寒熱往

來邪在少陽黃疸五淋血閉實熱在血分氣逆癰瘡瘰癧諸失血消痰丹藥以黃芩降

痰假其降火也按痰利水解渴安胎胎孕宜清熱涼血養陰退陽補勞

因火動富先降火 胎主氣熱傷氣治上焦之風熱

黃芩
六三土

丹溪曰黃芩
素上中二焦藥
火嗽喉腫
五臭肺
鼻腫痛
過服損胃
虛寒中者禁

用得柴胡退熱得芍藥治痢得厚朴黃連止腹痛得桑皮瀉肺火得
白木安胎之聖藥時珍曰仲景治少陽症小柴胡湯太陽少陽合病

下利黃芩湯少陽症下後心滿瀉心湯並用之蓋黃連苦寒人心瀉熱
除脾家濕熱使胃火不流八肺不致刑金即所以保肺也肺虛不宜者

苦寒傷土損其母也少陽症雖在半表裏而心膈痞滿實兼心肺上
焦之邪心煩喜嘔默默不欲食又兼脾胃中焦之症故用黃芩以治手

足少陽相火黃芩亦少陽藥也楊上瀛曰柴胡退熱芩及黃芩時珍曰
柴胡乃苦以發之散火之標也黃芩乃寒能勝熱折火之本也東垣治

肺熱身如火燎煩燥引飲而晝盛者宜一味黃芩湯以瀉
肺經氣分之火黃芩一兩煎服本方用治胸中暴下
黃明者養中

虛者極其即片苓瀉肺火清肌表之熱內實者條苓即子苓瀉大腸炎

補膀胱水上行酒炒瀉肝胆火猪胆汁炒山茱龍骨健胃丹皮丹砂

黃連

寫火燥



大苦大寒入心瀉

王海藏曰瀉心實瀉
脾也實則瀉其子
鎮肝涼血

凡治血防風為上部之使黃連乘熱身涉罕為單用

連九濕熱鬱而為痢黃連治痢要禁口者熱壅上焦同人參煎湯脾
之但得下咽便好喻嘉言曰下痢必先汗解其外後調其內首用辛涼
以解表次用苦寒以攻裏機要云後重宜下腹痛宜和身重宜除濕脉
眩宜去風風邪丙結宜汗身冷自汗宜溫膿血稠整宜重劑以竭之下
痢赤屬血分白屬氣分戴氏曰俗謂赤熱白寒
者非也通作濕熱處治但有新久虛實之分
瘧 瘧九種心下痞五等

瀉心湯
皆用之
腹痛 清熱
心痛 伏梁
心積 目痛
背傷 人乳浸點或合歸芍等
分煎湯熱洗散熱活血
癰瘡

赤 諸痛瘡瘡
皆屬心火
酒毒 胎毒
小兒初生合甘草
為末密調合熨之
明目 傳信方羊肝一具黃連
一兩搗丸凡是目疾皆

治各羊
疔丸 **定驚鎮止汗解毒除疔** 同猪肚殺蛇蚋得苦
悉為丸殺虫則伏
虛寒 益病者菊

久服黃連苦參反執從火化也昂按炎上作苦味苦必燥燥則執矣且
苦寒沉陰肅殺伐傷生和之氣也韓愈曰黃連與肉桂同行能交心腎

于頃刻時珍曰治痢用香連九瀉連九用黃連乾薑薑黃散用黃連生
薑左金丸用黃連吳茱萸治口瘡用黃連細辛止下血用黃連天蒜一

陰一陽寒因執用執因
寒用最得製方之妙
出宜州者粗肥出四川者瘦小狀類鷹選連

珠者良去毛治心火生用虛火醋炒肝胆火猪胆汁炒土焦火酒炒

醋嘈雜等症亦有吐酸者名酢心宜黃連吳茱萸降火開鬱酢音醋中焦火薑汁炒下焦火鹽水或薑便

炒食積火黃土炒治濕熱在氣分吳茱萸湯炒在血分乾漆水炒點眼

赤人乳浸時珍曰諸法不獨為之引導蓋辛熱黃連龍骨為使藥花

玄參爛羅白鮮皮長款冬牛膝忌猪肉時珍曰方有穢運在黃連猪皮

烏豈巴豆毒黃連瀉心火佐以龍胆瀉肝胆火白芍瀉脾火石膏瀉胃

火梔子佐之瀉大腸火黃連佐之柴胡瀉肝胆火黃連佐之瀉三焦火黃連佐之御莫一日熱傷惡心兀兀欲吐用黃連數分甚効

胡黃連

瀉熱療

驚疳



苦寒去心熱益肝胆厚腸胃治骨蒸勞熱五心煩熱

心高手足三消渴而多飲為上消肺熱也心移熱于肺心是心三消傳為兩消是也多食善飢為中消胃熱

也痺成爲消中是也渴而小便赤壯痔壯痔脈痔

則通肝門而為痔腫

性味功用同黃連故名波斯國今秦隴南游

藥朱二允曰解吃烟
毒毒合茶服之甚効

亦有之心無公黃折之塵出如烟者真異酒同黃連

苦燥寒勝熱從陰主腎補陰益精養肝胆安五臟

葵

湯火燥
濕補陰



治濕熱去則血氣和
平而五臟目安
利九竅生津止渴明目止淚
淚為肝熱

治濕熱去則血氣和
平而五臟目安
利九竅生津止渴明目止淚
淚為肝熱

風濕赤黃濕酒毒熱生蟲之能祛風逐水殺蟲治大腸疥癩然

大苦大寒肝腎虛而平熱者勿服
張從正曰凡藥皆毒也雖苦參甘草不可不謂之毒久服必偏勝為患經

日五味入胃各歸其所喜攻久而增氣物化之常也氣增而久天之由

也玉水註曰氣增不已則藏有偏勝偏勝則藏有偏絕故令人暴失筆
談云久用苦參牙疼病腰痛由其氣傷腎也經又曰大毒治病十去
其六當毒治病十去其七小毒治病十去其八無毒治病十去其九設

本草

胡黃連 苦參

卷二十三

病不能
養人食

能養人
不能醫

病

知母

瀉火補
水潤燥

滑腸

東垣治

便秘以

渴不渴
分之

肉菓食盡之無使過之傷其正也按人參補脾少參補肺紫菀
參補肝丹參補心玄參補腎苦參不在五參之內然名參者皆補米
泔浸去腸氣蒸角玄參為使質母免絲子漏盧反藜盧酒煎或醋者
能吐天
行時毒



辛黃滑上清肺並瀉火

瀉胃熱膀胱邪
下潤腎
熱腎命相火

燥滋陰八二經氣分黃栢八二經血分故

消痰定

嗽止渴安胎

黃非清
火之用

治傷寒煩熱

勞骨蒸汗之

骨蒸燥渴虛煩久瘧

利治嗽者清肺火也治渴者清
利胃熱也退蒸骨者瀉腎火也

利二便消浮腫小

利則腫消東垣曰熱在上焦氣分結秘而渴乃肺中伏熱不能生水勝
眇絕其化源宜用滲濕之藥瀉火清金滋水之化源熱在下焦血分便
悶而不渴乃真水不足膀胱乾涸無陰則陽無以化宜用黃栢知母大

苦寒之藥滋腎與膀胱之陰而腸自化小便自通丹溪曰小便不通有
熱有濕有氣結于下宜清宜燥宜丹又有隔三脘三之治始肺不燥且

熱有濕有氣結于下宜清宜燥宜丹又有隔三脘三之治始肺不燥且

龍胆草

瀉肝胆

火下焦

濕熱



右隔二隔三之疾皆寒傷胃而滑腸多服令人瀉李士材曰苦寒瀉非長養萬物者也世
 治不獨便腸也以其滋陰施之虛損之人則
 如水益深矣特失出以為戒
 得酒浸上行酒浸不行鹽水拌勻鐵

大寒寒沈陰下行益肝胆而瀉火柳火奇子肝胆
 有瀉無補瀉其

邪熱即所兼入膀胱腎經下焦之濕熱與防已同
 以補之也

功酒浸亦能上行治骨間寒熱腎主驚癇和氣

肝經時氣溫熱刺瘡寒濕脚氣足傷寒濕則成脚氣腫而痛者為
 風火時氣溫熱刺瘡寒濕脚氣濕脚氣宜清熱利濕搜風又有蟻

縮柘細痛而不腫者名咽嗑風熱赤睛肉瀉肝胆火能明目元素曰
 乾脚氣宜養血潤燥柴胡為主龍胆為使目疾

要藥昂按若目疾初起宜發散忌用寒涼癰疽瘰癧過服損胃甘草水浸一宿曝用小豆

貫衆為使忌地黃

知母 龍胆草

卷二四

青黛

傷肝散
鬱火

大青

瀉心胃
熱毒



蓄蘊風熱毒氣若
不出富作腸風
內痔婦不能禁酒
物與仍發痔
研置柿餅中煨食
名聖餅子治咯血
小兒驚癇疳積
即定花取孺

碧者水飛淨用
故須淘淨
內多石灰

鹹寒色青瀉肝散五臟火解中下焦蘊風熱

日一婦患臍腹二陰遍生濕瘡熱痒而痛出黃汁二
便澁用鰻鱧松脂黃丹之類塗之熱痛愈甚其婦嗜
酒喜食魚蝦發風之物仍用馬齒莧四兩研爛入青
黛一兩和塗熱痛皆去仍服入正散而愈此中下焦

治傷寒發斑吐咯血痢
陰虛火炎者
忌用合杏仁

微苦鹹大寒解心胃熱毒治傷寒時疾熱狂陽毒發

王執甚傷血真實表虛則發斑輕如珍子重如錦政
王紫黑者執極而胃爛也多死活人治赤斑煩痛有
犀角大
清湯

黃疸熱痢丹毒喉痺 處處有之高三尺

大瀉氣
分易熱



金而能達有賢而門走精通下焦鬱遏及天腸風
泄肺能達有賢而門走精通下焦鬱遏及天腸風
必氣必利大小更逐水消痰殺蟲墮胎治水腫喘滿

疝瘕氣塊若濕熱在血分胃弱氣虛人禁川味辛辣久嚼益癢喉其

謂苦寒安在哉乃瀉氣之藥比諸辛藥泄氣尤甚若濕從下受下焦主

血血中之濕宜苦寒之味而反用辛熱之藥甜上焦之氣是血病瀉氣

使氣血俱損也王好古曰以氣藥引則人氣以大黃引則入血時珍曰

一婦腸結年幾六十服養血潤燥藥則泥結服硝黃藥則若罔知如此

三十餘年其人體肥膏梁而多鬱口吐酸痰乃寬此乃三焦氣滯有升

無降津液皆化爲痰不能下潤腸腑非血燥也潤劑留滯硝黃入血不

能入氣故無効用牽牛爲末皂角膏丸繞服便通外甥素多酒色病二

便不通脹痛呻吟七晝夜用通利藥不効十言此乃濕熱之邪在精道

壅隊路病在二陰之間故前阻小便後阻大便病不在大腸膀胱也用

揀實尚香穿山甲諸藥倍牽牛三服而平東垣補下焦陽虛天真丹用
牽牛鹽水炒黑佐沉香杜仲肉桂
破故紙諸藥法得補瀉兼施之妙
有醫三種異者方速亦名取子

青黛 大青 牽牛 黑丑 取子

淘去浮者春去皮用得水香乾置良此藥漢前未入本草故仲景方中無註別錄始載之宋後始多用者

芫

通行水

瀉下焦

血分濕

熱



大辛苦寒木經平太陽經藥勝能行十二經通腠理

利九竅瀉下焦血分濕熱為療風水之要藥治肺氣

喘嗽水氣喘痛降氣熱瘧胎氣足傷寒濕為脚氣寒濕鬱而為熱濕

則腫熱則痛防以為干藥濕加苡仁蒼朮木瓜木通熱加芩栢風加羌活草薢痰加竹瀝商是痛加香附木香活血加四物大便秘加桃仁紅花小便秘加牛膝澤瀉痛連臂加桂枝威靈仙痛連水腫風腫癰腫惡脈加卍草又有足跟痛者屬腎虛不與脚氣同論

瘡或濕熱流八十二經致三陰不腫者主七六下家生以後因虛及

濕熱在上焦氣分者聖角十劑白通可去滯通草防已之屬是也通草即木通是徐之才亦以行水者為通與煉劑

無以別矣木通甘淡瀉氣介出漢中根大而虛通心有花紋色黃名

濕熱防已苦寒瀉血分濕熱大方已不至噴藏器日治風用水西先用

本集以
行小為
通劑改
熱藥為

葶藶

大瀉氣
秘通行



辛苦大寒瀉火性急大能下氣行膀胱水肺中水氣

廣著非此不能除破積聚癥瘕伏留熱氣消腫除

痰止咳定喘水濕泛溢為腫脹通經利便久服令人

虛

子劑曰洩可去閉葶藶大黃之屬是也大黃泄陰分血閉葶藶泄陽

分氣閉氣味俱厚木咸大黃然有甜苦二種甜者性緩苦者性急泄
肺而傷胃宜大棗輔之仲景有葶藶大棗瀉肺湯治
肺氣喘急不得臥昂按輔以大棗補土所以制水

色黃合糯米微炒去米用得酒長榆皮為使

子如黍米糞

甘遂

大通瀉
經隧水



苦寒有毒能瀉腎經及隧道水濕直達水氣所積之

處以攻決為用為下水之聖藥仲景大陷胸湯用之丰二種

水大腹腫滿名水蠱喻嘉言曰腎為水穀之海五藏六腑之源脾不能散胃之水精于肺而

本草綱目

防已

葶藶

甘遂

卷之六

腎者胃之關也前陰利水後陰利穀

大戟

大通瀉

藏腑水



病于中肺不能通胃之水道于膀胱而病于上腎不能司胃之關時其蓄泄而病于下以致積水浸淫無所底止王好古 火者脾肺腎三經所主有五臟六腑十二經之部分上頭而中四肢下腰脚外皮膚中肌肉內筋骨脈有尺寸之殊浮沉之別不可輕瀉當知病在何經何臟方可用之按水腫有痰裏食積瘀血致精不升濁不降而成者有濕熱相生墜道阻塞而成者有燥熱沖擊秘結不通而成者症屬有餘有眼寒涼傷飲食中氣虛衰而成者有大病後正氣衰憊而成者有小便不通水液妄行脾莫能制而成者症屬不足宜分別治之然其源多由中氣不足而起丹溪口水病當以健脾為主使脾胃實而氣運則水自行宜參苓為君視所挾症加減苟徒用利水藥多致不救瘕瘕積聚

胃飲宿食痰迷癩癩虛者忌用 **皮赤肉白根作連珠事實者長麵裏**

煨熟用 或甘草齊芫汁浸三日其 **瓜蒂為使惡惡反甘草** 仲景治心下雷

水如黑以清為度再麵裏煨

飲與甘草同用取其相反以立功也有治水腫及腫毒者以甘遂未傳腫虛囊煎甘草湯服之其腫立消二物相反感應如此

苦寒有毒能瀉臟腑水濕行血破汗利大小便治

臨胎誤服掛氣

癩病入肺則寒竅為咳喘背令人汗則脇痛乾嘔寒

熱往來入經絡則麻痺疼痛入筋骨則牽引隱痛入皮肉則癩癧癰腫

陳無澤並以控涎丹主之殊有音効此乃治痰之本痰之本水也濕也

得氣與火則結為痰大戟能泄藏腑水濕甘遂能行經絡水濕白芥子

能散皮裏膜外痰氣惟善用者能收奇功也又曰錢仲陽謂腎為真乃

有補無瀉復云疝症變黑歸腎者用百祥膏下之非瀉腎也瀉其腑則

臟自不實腑者膀胱也百祥惟大戟一味能行膀胱之水故也竊謂非

獨瀉腑乃腎邪實而瀉肝也實則瀉其子大戟浸水青絲肝胆之色也

疝症毒盛火熾則水益涸風挾外勢則土受虧故津液內竭不能化膿

而成黑陷之症瀉其風火之毒所以救腎扶脾也昂按瀉心乃所以補

心瀉腎即所以救腎邪熱退則真陰復矣機要用大戟一兩棗三枚同

煮焙乾去戟用棗丸 杭產紫者為上北產白者傷人漿水煮去骨用

服名棗變百祥丸

得大棗則不損脾畏薑蒲反甘草

商陸

水大通行



苦寒有毒 諸家辛酸 沉陰下行 與大戟甘遂同功 療

水腫脹滿 腫屬脾脹屬肝 腫則陰氣猶行如單脹而

本草青吳草

大戟 尚陸

六一七

芫花
水 大通行



寬暮急為血虛暮寬朝急為氣虛朝暮俱急為氣血兩虛腫脹由心腹而散四肢者吉由四肢而入心腹者危男自下而上女自上而下皆難治
瘦疝癰腫喉痺不通
薄切醋炒
濕熱之病瀉毒傳惡瘡墮胎孕令
人見鬼神取花白者良
亦者傷人只堪貼臍人屬三分搗貼小便利則腫消黑豆湯浸蒸用得蒜

良

苦寒有毒去水飲痰瘵瘵五水在五臟皮膚脹滿喘

急痛引胸脇咳嗽瘡癩
五水者風木皮水正水石水黃汗也水積胸中堅滿如石

名石水
仲景治傷寒太陽症表水解心下有水而咳乾嘔發

熱或喘或利者小青龍湯主之表已解有時頭痛出汗惡寒心下有水乾嘔引痛胸脇或喘或嗽者十棗湯主之蓋青龍散表邪使水從汗出內經所謂開鬼門也十棗逐裏邪使水從兩便出內經所謂潔淨府去陳莖法也十棗湯芫花甘草大戟等分棗十枚

葉似

柳二月開花紫華色葉生花落陳久者良醋煮過水浸暴用根療疥子

毒魚反甘草
作赤腫假傷以誣人

大通行

水

澤漆

通行水

常山

宜吐痰

散瘧通

行冰



辛散結苦洩熱行提藥藥主治畧同莖花



辛苦微寒消痰退熱止嗽殺虫利大小腸治大腹水
腫益丈夫陰氣 生平澤菜圓黃綠頗類貓睛一名
貓兒眼睛草莖中有白汗粘人時珍曰別錄云是大
戟苗非也功相類耳



辛苦而寒有毒能引吐行水祛老痰積飲痰有六風
痰熱痰食痰氣痰也飲有五流于肺為支飲于肝為
懸飲于心為伏飲于經絡為溢飲于腸胃為痰飲也
常山力能專治諸瘧然悍暴能損真氣弱者慎用時
珍

日常山蜀漆劫痰截瘧須在發散表邪及捷出陽分之後用之瘧有經
瘧藏瘧風寒暑濕痰食瘧魄之別須分陰陽虛實不可槩論常山蜀漆

藜蘆
宜引吐



得甘草則吐得大黃則利得烏梅穿山甲則入肝得小麥竹葉則入心
 得林米麻黃則入肺得龍骨附子則入腎得草菓檳榔則入脾蓋無痰
 不作瘡一物之功亦在驅逐痰水而已李士材曰常山發吐唯生用多
 用為然與甘草同用亦必吐若酒浸炒透但用錢許每見奇功未見其
 或吐也世人泥于雷效老人久病昂服之說使良藥見疑沉痾難起柳
 何患也○常山吐瘧痰瓜蒂吐熱痰烏附頭吐濕痰萊服于吐氣痰藜
 蘆吐
 風痰 雞骨者良酒浸蒸或炒用栝蠟為使忌葱茗莖葉名蜀漆功用
 畧同古方有蜀漆散取其苗性輕揚發散上焦邪結甘草水拌蒸

辛寒至苦有毒入口即吐善通頂令人噎風癩症多

用之張子和曰一婦病風癩初一二年一作後漸曰作甚至一日數作求死而已直歲大飢採百草

食見野草若葱采蒸飽食見不安吐膠涎數日約一
 二斗汗出如洗甚昏困後遂輕健如常人以所食葱

訪人乃致葱苗即藜蘆是矣李時珍曰和王妃年七十中風不省牙關
 緊閉先考太醫吏目月池翁診說藥不得入不獲已打去一齒濃煎藜
 蘆湯灌之少頃噫氣遂吐痰而
 避藥不眩厥疾不瘳誠然
 取根去頭用黃連為使反細辛芍藥

木通
古名

通草
輕通行
水瀉小
腸火

寒水木
陽膀胱

諸參惡大黃畏葱白
吐者服葱湯即止



甘淡輕虛上通心包降心火清肺熱
肺為水源肺熱清則津液化水道通
肺熱清矣化津

液則津液化水道通
下通大小腸膀胱導諸濕熱由

小便出
故導亦故用之凡利小便者多不利大便以

大便利九竅血脉關節治胸中煩熱遍身拘痛
楊仁齋云遍身隱熱傷

血血属于心宜木通以
通心竅則經絡流行也大渴引飲中焦淋瀝不通
下焦火心與小腸相

則淋水腫浮大便利小耳聾泄腎火目眩口燥舌乾
心苗喉痺咽痛上焦

鼻壅音壅熱壅清道失音清脾熱好眠
脾主四肢倦則好眠心為除煩

退熱止痛排膿破血催生行經下乳
火不亢牙肉氣順血行汗多者禁

用東垣曰肺受熱邪津液氣化之源絕則寒水斷流膀胱受濕熱癰閉
約束則小便不通宜此治之未二允曰火在上則口燥眼赤鼻乾在

本草
木通
二十九

也

通草
名古

通脫木
經通利
水退熱

澤瀉

通利水
瀉膀胱
火

中則心煩嘔歲浮腫在下則淋秘足腫必藉此甘平之性瀉諸經之火
火退則小便自利便利則諸經火邪皆從小水而不降矣 君火宜木
通相火宜澤瀉利
水雖同所用各別
筋有細孔兩頭皆通故通



色白氣寒體輕味淡氣寒則降故入肺經引熱下行
而利小便味淡則升故入胃經通氣上達而下乳汁

治五淋水腫目昏耳聾鼻塞失音淡通竅寒降火利肺氣退熱催生



甘淡微鹹入膀胱利小便瀉腎經之火邪功帶利濕
行水治消渴痰飲嘔吐瀉痢腫脹水痞脚氣疝痛淋
瀝陰汗陰間有汗尿血洩精既利水而又止洩精何也此乃濕熱為病不為虛滑者言

也虛津則當濕熱之病濕熱既除則清氣上行又能養五臟益氣力起
用補益之藥

陰氣補虛損止頭旋有聰耳明目之功脾胃有濕熱則頭重耳鳴目昏滲去其濕則熱亦隨去土乃得

脾喜燥
腎惡燥
故兼補
為難

車前子
通行水
瀉熱涼

合而清氣上行在本經及之士品云... 明目而六味丸用之今人多以昏目疑之... 屬膀胱過利則水涸而火生仲景八味丸用澤瀉寇宗奭謂其接引桂... 必兼瀉邪去則補藥得力一闢一闢此乃玄妙後人不知此理... 于補必致偏勝之患矣王履曰地黃山茱萸茯苓丹皮皆腎經藥桂附石... 腎命門之藥何待接引乎錢仲陽謂腎為真水有補無瀉或云脾虛腎... 旺故瀉腎扶脾不知腎之真水不可瀉瀉其伏留之邪耳易老云去... 中留垢以其微鹹能瀉伏水故也昂按六味丸有熟地之溫丹皮之涼... 山藥之瀉茯苓之滲山茱之收澤瀉之瀉補腎而兼補脾有補而必有... 瀉相和相濟以成平補之功乃平淡之神竒所以為古今不易之良方... 也即有加減或加紫河車一具或五味麥冬杜仲牛膝之類不過一二... 味極三四味而止今人或疑澤瀉之瀉而減之多揀本草補藥恣意加... 入有補無瀉且密倍于主責成不專而之味之功且退處于虛位失製... 方配合之本旨矣此 鹽水拌或酒浸用忌鐵



甘寒涼血去熱止吐衄消痰明目通淋
凡利水之劑多損于

目性此能解汗與小腸之熱濕熱退
而日清矣雷教曰使葉勿使莖蔞
子甘寒清肺

本草

通草

澤瀉

車前子

卷二十一

肝風熱滲膀胱濕熱利小便而不走氣與茯苓同功強陰益精令人有

子腎有二竅車前子能利水敷而固精發精盛則有子五子衍宗丸用

前易蓮子時珍曰人服食須佐他藥如治濕癩五淋者濕瀉痢歐陽文

六味丸之用澤瀉可也若單用則過瀉治濕癩五淋者濕瀉痢歐陽文

下國醫不能愈夫人云南有藥三文一鼎甚効公不肯服夫人維他藥

進之一服而愈問其方乃車前子為末米飲下二錢一云此藥利水而

不動氣水通利則清目赤障翳能除能生下胎酒蒸搗餅焙研搗餅

燈草
輕通利
水清熱



甘淡而寒降心火心能清肺熱利小腸心與小腸相
則補熱小腸亦清通氣止血治五淋水腫燒灰吹喉

而熱從小便出矣
癩塗乳止夜啼擦瘡最良
草出淨水可見十餘次則

能斷也

瞿麥

通利水
破血



苦寒降心火利小腸逐膀胱邪熱為治淋要藥故入

用之五淋大抵皆屬濕熱熱淋宜八正及山梔滑石
之類血淋宜小蘆牛膝膏腎虛淋宜補腎不可濁瀉
老人氣虛者宜參朮兼木通山梔亦有痰滯中焦
作淋者宜行痰兼通利藥最忌發汗汗之心便血破

血利竅炎癰消腫明目去翳通經墮胎性利善下虛者慎用按宗奩曰心經雖有

熱而小腸虛者服之則心熱未清而小腸別作病矣花大如錢紅白斑爛色甚媚俗呼洛陽

花用薤殼丹皮為使惡蝶蛸產後淋當去血瞿

扁蓄一名

扁竹
通淋



苦平殺虫疥利小便治黃疸熱淋蚊咬腹痛虫蝕下

部煮葉葉細如竹芴莖蔓引促節有粉三月開紅花

天仙籐

通活血
消腫



苦溫疏氣活血治風勞腹痛妊娠水腫有天仙籐散

葉似葛圓而小有白毛根有鬚四時不凋一云即青木香籐

直青之草

燈草

瞿麥

扁蓄

天仙籐

卷二十一

地膚子

通利水
補陰



甘苦氣寒益精強陰入膀胱除虛熱利小便而通淋

時珍曰無陰則陽無以化亦猶東垣治小便不通用知柏滋腎之意王節齋曰小便不禁或頻數古方多類為寒而用溫澁之藥殊不知屬熱者多蓋膀胱火邪妄動水不得清故不能禁而頻數也故老人多頻

數是膀胱血多陽火偏任也治法當補膀胱陰血瀉火邪為主而佐以收澁之劑如牡蠣山茱五味之類不可獨用病木屬熱故宜瀉火因水不足故火動而致便數小便既多水益虛矣故宜補血補血瀉火治其本也收之澁之治其標也

疥癩作浴湯去皮膚風熱丹腫洗眼除舊澁痛 葉如蒿莖赤子類

赤石脂

石韋

通淋補
勞



甘苦微寒清肺金以滋化源凡行水之藥必通膀胱皆能先清肺火

而利水道益精氣補五勞利濕清熱之功高陽負對黃帝治勞傷用石韋汁

治淋崩發背 炒未冷 生石陰柔勒如皮背有黃毛

海金沙
通淋瀉
濕熱

茵陳
通利濕
熱治諸
黃

香薷
宜通利
濕清暑

去毛微火用杏仁滑石射干為使得膏劑良生古死上者名丸嘉治淋



甘寒淡滲除小腸膀胱血分濕熱治腫滿五淋華痛
得梔子牙硝逢砂治傷寒熱狂大熱利小便此金
底抽薪之義也



莖細如線引竹木上葉紋皺處有砂黃赤色忌火
苦燥濕寒勝熱入足太陽經膀胱發汗利水以泄太陰

加附子乾薑各
隨寒熱治之

又治傷寒時疾狂熱瘧瘧頭痛頭旋女人瘕疝首濕熱
為病
陽明之濕熱脾胃為治疸黃之君藥脾胃有濕熱則發
黃黃者脾之色也
熱甚者身如橘色汗如柏汗亦有寒濕發黃身薰黃
而色暗大抵治以茵陳為主陽黃加大黃梔子陰黃



辛散皮膚之蒸熱溫解心腹之凝結屬金水而主肺
為清暑之主藥肺氣清則小便行而熱降暑必兼濕
治暑必兼

本草 每全少 有東 香薷

利濕若無濕但治嘔逆水腫熱膏服小邪氣口氣煎湯服治霍亂

所時珍曰暑有乘涼飲冷致陽氣為陰邪所遏反中人內逆病頭痛發熱惡寒煩燥口渴吐瀉霍亂宜用之以發越陽氣散邪和脾則愈若

飲食不節勞役作傷之人傷暑大熱大渴汗出如雨煩躁喘促或瀉或吐者乃內傷之症宜用清暑益氣湯人參白虎湯之類以瀉火益元可也若用香薷是重虛其表而濟之熱矣蓋香薷乃夏月解表之藥如冬

月之用麻黃氣虛者尤不宜多服今人謂能解暑藥用代茶誤矣李士材曰香薷為夏月發汗之藥其性溫熱只宜于中暑之人若中熱者誤

服之反成大害世所未知按潔古云中暑為陰症為不足中暑為陽症為有餘經曰氣盛身寒得之傷寒氣虛身熱得之傷暑故中暑宜溫散中熱宜清涼

陳者川勝宜冷飲熱服令人瀉

青蒿

瀉熱補勞

身寒寒字當熱字看傷寒必病熱



苦寒得春木少陽之令最早二月故入少陽厥陰血

分肝治骨蒸勞熱童便搗葉取汁熬膏辱勞虛熱凡苦寒之藥

青蒿芬香夫脾獨宜子血虛也風毒熱久瘧久疰

疥惡瘡鬼氣尸疰

時珍曰月令通纂言伏內庚曰采蒿懸門庭可辟邪冬至元旦各服一錢亦良明清蒿之治鬼疰蓋亦有

附子

大燥回

陽下腎

命火逐

風寒濕

人八味

丸內亦

從地黃

等補陰

當與韭

汁牛乳



辛甘者善大熱補陽其性浮而不沉其用走而不守

通行十二經無所不至能引補氣藥以復散去之元

陽引補血藥以滋不足之真陰引散藥開腠理以

還在表之風寒

同乾薑桂枝溫經散寒發汗

引溫燥藥下焦以祛在表之寒濕能

火下行亦有

治三陰傷寒

吳緩曰附子陰症要藥凡傷寒傳變三陰

腹痛甚則唇青養縮者急用須用之若待陰極陽結而用之已遲東垣

治陰益格陽傷寒面赤目赤煩渴引飲脉七八至但按之則散甲晝附

湯加人參投牛飴得汗中寒中風卒中曰中漸傷曰傷輕為感氣厥痰

厥虛寒而厥者宜之如傷寒陽盛格陰身冷脉咳逆風嘔胃膈噎

多由氣血虛胃治胃稿而成飲可下而食不可下稿在吸門喉間之厭

三五五五五

黃芩

附子

卷三十三

二條參
看論治

本草

卷二

良久吐衄在幽門胃之下口也此中焦各膈朝食暮吐積在關門大
小腸下口也此下焦名反胃又有痰飲食積瘀血壅塞胃口者如寒痰

胃冷則宜薑附參水胃積者當滋脾泄命火冷痢寒瀉亂轉脾虛

潤宜四物牛羊乳血脈者加韭汁不足拘攣風痺癥積聚督脈為病脊強而厥小

中焦為霍亂寒客下焦肝腎為轉筋熱霍亂者禁用拘攣風痺癥積聚督脈為病脊強而厥小

兒慢驚瘧瘵灰白癰疽不斂一切沉寒痼冷之症經曰陰盛生內寒助陽

退陰殺邪辟鬼本草通經墮胎凡陰症用薑附藥宜冷服熱因寒用也

益盛治之以熱則拒格不納用熱藥治飲下隘之後冷體既消熱性便

發痛且不遠而致火益此反治之妙也又有寒藥熱飲治熱症者此寒

因熱用義亦相同也經曰正者正治反者反治如用寒治熱用熱治寒
此正治也或以寒治寒以熱治熱此反治也經所謂必伏其所主而先
其所因蓋借寒藥熱藥為反佐以作向導也亦曰從治王好古曰用附
子以補火必防涸水如陰虛之人久服補陽之藥則虛陽益熾真陰愈
耗精血日枯而氣無所附竈遂成不救者多矣

母為烏頭附生者為附子連生者為御子細

今人用
黑豆煮
亦佳

熟附子趙嗣其曰仲景麻黃附子辛細湯熟附配麻黃發中有補四

景八味丸用為少陰嚮導後世因以為補藥誤矣附子走而不守取其健悍走下以行也黃之帶耳和習用為風藥及補藥殺人多矣昂按附

子味甘氣熱峻補元陽陽微欲絕者回生起死非此不為功故仲景四逆真武白通諸傷多用之其有功于生民甚大況古人日用常方用之

最多本非禁劑丹溪乃僅以為行經之藥而云用作補藥多致殺人言亦過矣益丹溪法重滋陰故每警湯藥亦其偏也王節齋曰氣虛用四

君子湯血虛用四物湯虛甚者俱宜加熟附益四君四物皆平利寬緩之劑須得附子健悍之性行之方能成功附子熱藥本不可輕用但當

病則雖暑執持水浸酒裏煨發折乘執切片炒黃去火毒用又替月亦可用也

草二錢鹽水煮汗童便各半煮熟用畏人參黃耆其草防風犀角綠

豆黃芩貝母半夏積實白芍飲中其毒者黃連犀角甘草煎湯解

之黃土水亦可解烏頭功同附子而稍緩附子性重峻溫脾逐寒烏

附子

卷二 五

草烏頭
大燥閉
頑痰



濕諸癩

頭性輕疎溫脾逐風寒疾宜附子風疾宜烏頭為附子吐風痰治癩
 癩取其鋒銳直達病所吐之不透後用附子尖和漿水與之始得大吐
 膠痰數碗天雄補下焦命門陽虛寇宗奭張元素皆云補上焦丹溪曰可
下行然補下乃所以益上也若上焦陽虛治風寒濕痺為風家主藥發
則屬心肺之分當用參耆不當用雄附矣汗又能止陰汗側身散側旁生宜子發散四肢充達皮毛治手足風

辛苦大熱搜風勝濕開頑痰治頑瘡以毒攻毒頗勝
 川烏煆草毒無所醜制不可輕投 野生狀類川烏
 亦名烏蒙鼻汗炒或豆腐煮用熬膏名射罔備箭射

白以
燥祛風
濕治面
疾

破故紙

一名補

腎脂

燥補命

火



草烏之小者良

可許皺紋有節炮用

陶弘景曰此藥久絕無復真者今惟涼州生

辛苦大温八心包命門補相火以通君火煖丹田壯
元陽縮小便亦治遺尿五勞七傷五勞之勞七傷之傷腰膝冷痛
腎冷精流腎虛泄瀉腎虛則命門火衰不能蒸蒸則胃脾胃虛寒遲于運化致飲食
少腹脹痛即所以補脾破故紙四兩五味三兩肉桂二兩是菜一兩薑煮取九名
四神丸治婦人血氣婦人之血脫氣陷亦墮胎酒出南蕃青色赤嶺南
五更腎虧男子之腎冷精流墮胎酒出南蕃青色赤嶺南
青色綠酒蒸用亦有童便乳浸鹽水炒首得胡桃麻良惡甘草煎



即所以補脾破故紙四兩五味三兩肉桂二兩是菜一兩薑煮取九名

四神丸治婦人血氣婦人之血脫氣陷亦墮胎酒出南蕃青色赤嶺南

五更腎虧男子之腎冷精流墮胎酒出南蕃青色赤嶺南

本草綱目 破故紙 卷之三

芸臺補菜也

肉苁蓉

補腎命弱腸

相國方疏談城世爾酒後蒸為末胡桃肉二十兩去皮爛研密相每日酒調一匙或水調服白飛黃日破放紙馬火堅固元陽引桃馬水備巢

養血有水火相生之妙忌其
臺羊血即杜仲名有雄丸



百酸鹹溫入腎經血分補命門相火滋潤五臟益髓

帶精治五勞七傷絕陽不興絕陰不產腰膝冷痛崩

帶遺精峻補精血時珍曰補而不峻聚用恐妨心滑

大便長大如鷲重至斤許有松子鱗用者良酒浸

一宿刷去淨甲變破除內筋膜酒蒸半日又酥炙用忌鐵蘇恭曰今人所用多草莖

容功方和劣



鎮陽

補陽

腸

甘溫補陰益精興陽潤燥養筋強筋故台痿弱滑大

便便燥者咳之可代

鱗甲節比狀類勇陽酥炙

補腎
命除寒

胡盧巴

燥補腎
命除寒

濕

仙茅

燥補腎

命除寒



也蜀產佳山律根似巴戟但色印人或醋煮以配之

去心酒浸焙用復孕子為使惡丹參



苦溫純陽八右腎命門煖丹田狀元陽治腎臟虛冷

陽氣不能歸元同附子癩痢冷氣同商香巴戟川烏用棟吳茱萸寒

濕脚氣 出領兩番船者良云是番蒸煎下酒浸暴或蒸或炒



辛熱有小毒助命火益陽道明耳目補虛勞治失溺

無子心腹冷氣不能食溫腰膝冷痺不能行度筋相

火盛者忌服 葉如茅而暑潤根如小指黃白多涎

淫羊藿
補腎命

蛇床子
補腎命
去風濕

竹刀去皮切糯米泔浸去赤汁出毒用忌鐵唐裴鑿國始進此方當時盛再服之多効照前製陰

乾密丸酒服菜食生乳牛肉許真石書云甘能養肉辛能養節百能養氣能養骨能養筋滑能養膚和若酒服之必効也



辛香甘溫入肝腎補命時珍曰手足陽明三焦命門藥益精氣堅
筋骨利小便治絕陽不興絕陰不產冷風勞氣四肢
不仁手足麻木一名仙靈脾北部有羊一曰百合食此

藿所致故名去枝羊脂拌炒山藥為使得酒良

辛苦而溫強陽益陰補腎散寒祛風燥濕治陰痿囊

濕女子陰痛陰癢濕生虫同子藏虛寒產門不閉炒熱

之腎命之病及腰酸體痛帶下脫肛喉痺齒痛濕癬



惡瘡殺虫風濕諸病煎湯治去風癢時珍曰腎命三焦氣分之藥不獨

豈非膏耳騰目乎
凡小童而細砂必終尋貝才類
三遍主

丹皮貝母巴豆

鬼絲子

平補二

陰



昂按此
人或感
他毒示
可盡歸
咎于兔
孫也

覆盆子

平補肝



良淘去泥沙酒浸一宿暴乾搗末山藥為使

肥健人 補肝腎之効老孳癢筆記子族弟少服兔絲子凡數年飲食倍
常血氣充盈因浴見背腫隨視隨長乃大疽也適值金銀花
開飲至數斤腫遂消兔絲過服尚
能作疽以此加金石藥不可不戒
無根蔓延草 上子黃如黍粒得酒

甘辛和平凝正陽之氣八足三陰
肝 強陰益精温
而不燥不助相火治五勞七傷精寒淋瀝口苦燥渴

脾虛腎燥而生內
熱兔絲益陰清熱祛風明目補衛氣助筋脉益氣力

甘酸微温益腎臟而固精補肝虛而明自起陽痿縮

小便
寇氏曰服之當
覆其溺器故名 澤飢膚烏髮
補汁塗
不自 女子多

大宜有是
程羊齋
鹿來子
鹿絲子
覆盆子
三毛


孕同密為膏治肺氣虛與李士材曰氣腎無燥熱之屬狀如覆盆

故名去帶淘淨搗餅用時酒拌蒸 藥絞汁滴目中出目眩重除膚赤

收濕止瀉

覆盆子

平補肝腎



苦溫補腎辛溫瀉肺氣而散肝風益精明目肝以散為補

能明目 治虛勞腰痛遺精帶下咳逆肺痿乳閉瘰

瘰癧音瘰癧腎肝肺三經之病催生墮胎刺莫藜

故能破少死葉綠色似腎故補炒用亦可刺藜蒸三角有刺去刺酒

拌煮風家宜刺藜藜補餘功畧用瑞竹堂方齒牙打動

便毒

補脾殺



甘溫健脾胃除虛熱殺臟蟲治五疳便濁瀉痢瘡癰

為小兒諸病要藥種疏曰五疳便濁瀉齒腹重皆由脾胃虛弱因而乳停食滯濕熱

重消積

按地黃 胡麻皆 殺五

益智子

燥脾胃 補心腎

砂仁 縮

砂仁 宜行氣

寒而成脾胃隨則積滯清濕熱散水迫利而前症盡除矣時珍曰凡能殺五之藥多是苦辛獨使君子榧子甘而殺五每月上句至頭向上中句頭橫下句向下道藏云初一至初五至頭向上凡有虫病者每月上句空心食數枚至皆死而出也 出閩蜀五錢有稜內仁如榧亦可煨食久則油不可用忌飲熱茶犯之作瀉



辛熱水脾藥兼入心腎主君相二火補心氣命門三

焦之不足 心為脾母補火故能生土 能瀆精固氣 本草未載 又能開發

鬱結使氣宣通 味辛能散 溫中進食攝涎唾 胃冷則宿小

便腎與膀胱相表裏益智辛溫固腎鹽水炒同治嘔吐泄瀉客寒犯胃烏藥等分酒煮山藥糊丸鹽湯下名縮泉丸

令氣腹痛崩帶泄精 瀆精固氣因熱而射濁者禁用 出嶺南刑如棗 用仁

辛溫香氣補肺益腎和胃醒脾快氣調中通行結滯



治腹痛痞脹 痞滯有傷寒下早裏虛邪入而痞者有食壅痰塞而痞者有脾虛氣弱而痞者

使君子 益智子 砂仁

調中

白豆蔻

宣行氣
暖胃

細用



須分虛，良治之不宜，而用利氣藥，恐變為鼓脹。鼓脹，內腸而外有形，痞脹，惟覺痞悶而已。皆太陰為病也。噎膈，嘔吐，上氣，咳嗽，赤白瀉痢，濕熱積滯，客于火腸。霍亂轉筋，奔豚，崩帶，祛痰，逐冷，消食。
 醒酒止痛安胎，氣行則痛止，散咽喉口齒浮熱，化銅鐵骨硬。王好古曰：得檀香豆
 蔻入肺，得入參，益智入脾，得黃柏、茯苓入腎，得赤石脂入大小腸。腎道曰辛，能潤腎燥，引諸藥歸宿，丹田地黃用之，并蒸亦取其能達下也。經疏曰：腎虛氣不歸元，用為嚮道，殆勝杜附藥，藥為害。出嶺南研用。

辛熱流行三焦，溫煖脾胃。三焦利脾胃運而為肺家

本藥氣散滯氣消酒積除寒燥濕化食寬膨治脾

虛瘧疾感寒腹痛吐逆反胃。肺皆火盛及氣虛者禁用白睛翳膜

自睛屬肺能散肺滯太陽經目昏紅筋起目昏番舶者良研

一名肉

一名肉

場 燥脾瀉

草壹薺

一名草

菓

燥濕祛

寒除痰

戒滯



草壹外有皺紋內有斑紋糯米粉裏煨熟用忌鹹

辛溫氣香理脾煨胃丁氣調中逐冷祛痰消食解酒

治積冷心腹脹痛挾痰挾食中惡吐沫小兒吐逆乳

食不下又能瀉大腸止虛瀉冷痢初起出類南似

辛熱香散煨胃健脾破氣開鬱燥濕祛寒除痰化食

治瘧疾寒瘧在常山能截瘧或與知母同用取其一

勝之類知母治一陽治寒熱瘧瘧蓋草藥治太陰獨

痢噎膈反胃痞滿吐酸飲積聚解口臭氣酒毒魚肉毒故食料過劑

助脾熱耗氣損胃 開產者草壹如龍眼而微長皮黃白薄而稜峭仁

如砂仁而辛香氣和淡廣所產者草壹如訶子皮無厚而稜峭子粗而

本草綱目 卷之...

香附

一名

莎草根

宜調氣

開鬱

素問中

仍有寒

則氣收

熱則氣

泄各丸

氣

故古人

治瘍多

用五香

連翹飲

辛臭雖是一物微有不同類製熟散仁用忌鐵


性平氣香味辛能散微苦能降微甘能和乃血中氣

藥行十二經入脈氣分主一切氣人身以氣為主

及燥則平逆則病絕則死矣經曰怒則氣逆則氣

下傷則氣鬱悲則氣消驚則氣亂思則氣結勞則氣

耗此七情之氣也以香附為右腦症而加升降補之藥利三焦解六鬱痰鬱火



血鬱癥 止諸痛並則治之怒多憂疾飲痞滿胸膈腹脹飲食積聚霍亂

吐瀉腎氣脚氣癰疽疔瘍血氣帶所發皆附一味衣服名獨勝丸治

亦宜服之大凡瘡疽毒服香藥行氣通血最忌臭穢不潔觸之康祖左

乳痛癰又脫間什核疔楚半載痲張土夢授以方薑汁製香附為末每

服二錢米飲下逐愈吐血便血崩中帶下月候不調氣為血配血因氣行經成塊

行後作痛氣血俱虛也色淡亦虛也色紫氣之熱色黑則熱之甚也錯

本草綱目 卷之...

引血藥至氣分而生血此正陽生陰長之義月
謂書督云益氣行中有補丹溪曰天行健運不息所以生生無窮即此
以參耆佐以甘草理耳時珍曰凡人病則氣滯而饑香附為氣分君藥臣
治虛快甚速也
去毛用生則上行胸膈外達皮膚熱則下走肝腎

勞瘵腰膝童便浸炒則入血分而補虛鹽水浸炒則入血分而潤燥

炒青鹽炒則補腎氣酒浸炒則行經絡醋浸炒則消積聚且飲其散薑汁炒

則化痰飲炒則止血皂鐵時珍曰得參木則補氣得歸地則補血

脾得沉香則升降諸氣得芍藥若木則解諸鬱得梔子黃連則清降

火熱得茯苓則交濟心腎得茴香破故紙則引氣歸元得厚朴半夏則

決壅消鬱得紫蘇葱白則發汗散邪得三稜莪朮則消積磨塊得艾葉

則治血氣煖子宮乃氣病之總司女科之仙藥也大抵婦人多鬱氣行
則鬱解故服之尤効非宜于婦人不宜于男子也李士材曰乃治標之
劑惟氣實血虛太虛者宜之不然恐損氣而燥血也及其疾矣世俗泥
于女科仙藥之一語
惜未有發明及此者

木香
宣行氣



辛香而溫三焦氣分之藥能升降諸氣泄肺氣疏肝

氣和脾氣怒則肝氣上肺氣調則金能制木而肝平木不尅土而肺和治一切氣

痛九腫心痛痛屬胃脫曰寒痛熱痛氣痛血氣濕痛痰痛食痛虻痛悸痛蓋君心不易受邪

真心痛者手足冷過胸節朝發夕死嘔逆反胃霍亂瀉痢後重同檳榔用劉涓子曰痢疾

後重自除癰閉痰壅氣結疝癖癥塊腫毒蠱毒衝脉為病氣逆裏急殺鬼物

禦瘴霧去腹吳實大腸消食安胎氣逆則胎不安過服損其氣丹溪曰味辛氣升若陰火衝上

香反助火邪當用黃柏知母少以木香佐之王好古曰本草主氣劣氣不足補也通壅導氣破也安胎健脾胃補也除痰癖癥塊破也

此汪機曰與補藥為佐則補與瀉藥為君則瀉疴珍曰請氣膈鬱皆屬干肺上焦氣滯用之者金鬱泄之也中氣不運皆屬于肺中焦氣滯用

之者脾胃喜芳香也大腸氣滯則後重膀胱氣不化則澹閉肝氣鬱則為痛下焦氣滯用之者舉者通之也

如枯骨味苦粘舌者良名青木香今所用者皆廣廣汁用東垣用黃連

本草綱目卷之九 木部 木香 老

藿香

宣去惡氣

茴香古作

藜香補腎命門寒疝

製亦有蒸用麴畏用實煨用者腸止瀉畏火



辛甘微温入手足太陰肺快氣和中開胃止嘔胃熱

而嘔者忌用去惡氣進飲食治霍亂吐瀉心腹絞痛肺虛

有寒吐焦能理脾肺之氣古方有藿香正氣散正氣通陽則邪逆自除出

文廣方莖有節葉微似茄葉古惟用葉今枝莖亦用之因藥多偽也



大茴辛熱入腎膀胱煖丹田補命門開胃下食調中

吐嘔療小腸冷氣癩疝陰腫疝有七種氣血寒水筋

經以厥陰肝脉絡陰器也多因寒濕所致亦有挾虛者當加參木于温散藥中乾濕脚氣多

食損自發瘡小茴辛平理氣開胃亦治寒疝食粒宜之 大如麥粒輕

而有細稜者名大茴出寧夏他處小者名小茴自番船來實八瓣者名

本草 木香 茴香 藜香 卷二十三

八角茴香炒黃用得酒良得鹽則入腎被腎邪故治陰疝受病于肝見症于腎大小

茴各一兩為末猪脾一箇連尿入藥酒煮爛為丸服



甘松香理諸氣開脾鬱治腹卒滿痛風疔齒齲脚膝氣浮煎湯淋洗出京州及黔蜀葉如茅根根用其繁密

山奈



辛溫煖中辟惡治心腹冷痛寒濕霍亂風疝

宜溫中辟惡

生廣中根葉皆如生薑八合諸香用

心口一熱痛俗言心氣痛起以良

良薑



辛熱煖胃散寒消食醒酒治胃腕冷痛痛非也乃胃脘有滯或有重及因怒因寒而起薑酒洗七次香附醋洗七次焙研因寒者薑一錢

宜燥煖胃散寒

一錢因怒者附二錢薑一錢寒怒兼者每錢半米飲加薑汁一匙鹽少許服初梁纒患心脾痛夢神投此方一味等分服後人各炒分用霍

孔竊利生惡瘡疔瘡令癖肺胃熱者芝山嶺南高州子名紅蓮

藥作一

擦

燥除胃


希散浮

熱

烟草

宣行氣
癖寒

煎溫散寒
煎濕化食
煎酒
中常用之
並東壁土炒用



辛熱除胃冷溫中下氣消食祛痰治水瀉氣痢牛乳煎服

虛谷腸鳴亦人大腸經冷痰惡心嘔吐酸水疝瘕陰疝辛

散陽明之浮熱治頭痛偏頭痛者口含溫水隨至牙

痛寒痛宜乾薑藜荑辛細熱痛宜石膏牙痛風鼻淵多服泄真氣動脾

痛痛宜皂角蠶蚕蜂房二烏垂痛宜石灰雄黃

肺之火損目 出南番嶺南亦有類槓子而長青色去挺用頭醋浸刮淨皮粟免傷人肺



辛溫有毒治風寒濕痺滯氣停痰山嵐瘴霧其氣入口不循常度頃刻而周一身令人暈體俱快醒能使醉醉能使醒飢能使飽飽能使飢人以代酒代茗終

本草
良薑
麻黃
烟草
山柰

身不厭故一名然火氣熹灼耗血損年人自不覺耳 聞塵者佳烟筒

能解蛇毒

金銀花

濕熱解



甘寒入肺散熱解毒清熱即補虛凡物皆補療風養血

止渴丹溪曰癰疽安後發渴黃耆六一湯吞忍治癰

瘡疥癬楊梅惡瘡腸澀血痢五種尸疰 經冬不凋一名忍冬又名左纏藤

花葉同功花香尤佳釀酒代茶熬膏並妙忍冬酒治癰疽發皆一切惡毒初起便服奇効乾者亦可

不及生者力速忍冬五兩甘草二兩水二腕煎至一碗再入酒一碗罌煎分三服一日一夜吃盡重者日二劑服至大小腸通利則藥力到忍冬丸照前分兩酒煮爛乾同甘草為末以所煮餘酒打糊為

丸陳藏器云熱毒血痢濃煎服之為末糖調常服能稀痘

蒲公英

一名黃花地丁



甘平花黃屬土八木陰陽明胃化熱毒解食毒治腫

核前治乳癰乳頭腐厥陰乳房腐腸明同疔毒亦為

毒

紫花地

丁

瀉熱解

毒

杜牛膝

一名天

名精

一名地

松

通淋妙品 淋試之甚驗 擦牙痛 髮 腎東垣曰苦寒腎經君藥 白汁


塗惡刺 凡螳螂諸虫盛夏孕育游諸物上必遺精汁乾久則有毒人手 獨之成疾名狐尿刺 瘡痛不眠白瘡難取取汁厚塗即愈于金

其功 方極言 葉如蒿 莖花如單瓣菊花四時有花 花能飛 葉斷之莖中有

白汁 鄭方升曰一莖兩花高尺許者掘下數尺根大 如拳 莖有人形拱抱 搗汁酒服治噎噎如神

辛苦而寒治癰疽發背疔腫癩瘡無名腫毒 葉如

柳而細夏開紫花結角生平地者莖生溝壑者起



甘寒微毒能破血 一婦產後口渴氣喘面赤有癍大 便泄小便祕用行血利水藥不効

用牛膝濃煎膏飲下 能止血吐痰除熱解毒殺蟲治 血一桶小便通而愈

乳我喉痺砂淋血 淋良方云濃煎加 小兒牙關緊閉急慢驚風 不省人 事者絞

下直青葉草 金銀花 蒲公英 紫花地丁 杜牛膝 卷一

瀉熱吐
痰破血
解毒

鶴虱

瀉殺虫

山莖根

瀉熱解
毒

汁八好酒灌之即甦
以醋半渣傳項下

重螯毒

根白如短牛膝地黃為使

煎湯洗痔渣
寒患處良

服汁吐瘡痰

驚風服之亦效
取其吐痰

漱汁止牙痛搗之傳蛇



苦辛有小毒殺五臟虫治

虻咬腹痛

面自唇紅時發
時止者為虫痛

肥肉汁
調未服

沈存中筆記云是杜牛膝子

或曰非也
別是一種最

粘人衣有狐氣炒熱則香

苦寒瀉心火以保金氣去肺大腸之風熱

心火降則
不灼肺而

金清肺與大腸相表裏
肺金清則大腸亦清

消腫止痛止喉癰喉風齧腫

齒痛

名之
燕汁

喘滿熱咳腹痛下痢五痔諸瘡解藥諸毒

傅亮瘡蛇狗蜘蛛傷人馬鼻黃

血熱極
所致

苗莫如



蓋經久不凋

牛旁子

一名鼠

枯了

一名惡

實

為熱解

毒

山慈菰


為熱解

毒

漏蘆

為熱解

毒



辛平潤肺解熱散結風和嘔膈理痰止咳疹和

二便行十二經散諸瘡瘍之毒利腰膝凝滯之氣

性冷而滑利痘症虛寒泄消者忌服

實如蒲葷而褐色酒拌蒸待有

霜拌去用根苦寒竹刀刮淨絞汁蜜和服治中風汗出乃愈搗和猪脂

貼瘡腫及反花瘡

肉反出如花狀

甘微辛有小毒功帶清熱散結治癰瘡疔腫癩結

核醋磨解諸毒蠱毒蛇虫狂犬傷根與慈菰小蒜

相類去毛殼用玉樞丹中用之廣筆記云出處州遂昌縣淇山無毛少真者有毛誤也

鹹軟堅苦下泄寒勝熱入胃大腸通肺小腸散熱解

毒通經下乳排膿止血生肌殺虫治遺精尿血癰疽

鶴虱

山荳根牛旁子山慈菰

漏蘆

卷十七

貫眾
瀉熱解
毒

射干
瀉火解
毒散血
消痰

發背古方以漏盧湯為稱百及預解時行痘疹毒取其寒勝熱又出箇中莖如
油麻枯黑如漆者真甘草并蒸連翹為使



味苦微寒有毒而能解邪熱治毒治崩中帶下產後
血氣脹痛破癥瘕發狂痘王海臈快化骨硬能軟殺
三虫 根似狗脊而大汁能制三黃化五金伏鍾乳

結砂制永解毒軟堅以此浸水用中曰飲其水能辟時疫



苦寒有毒能瀉實火火降則血散腫消而痰結自解
故能消心脾老血行太陰厥陰之積痰肺脾治喉痺
咽痛為要藥搗汁醋和嚙之引涎于治結核瘰癧便

毒瘡母鷲甲煎丸治瘡母用之皆取其降厥陰相火也通經閉利大腸鎮肝明目 扁竹花根

續隨子

一名干

金子

瀉行水

破血解

毒

馬蘭子

一名蠶

實

瀉濕熱

解毒

苎麻子

瀉通竅

拔毒出

也
故一名烏扇烏嬰
非水漬一日其葉煮牛日用



辛溫有毒行水破血治癥瘕飲冷氣脹滿靈毒鬼

連利大小腸下惡滯物塗疥癬瘡王樞丹用之治百

以毒治毒之功去殼取色白者壓去油用時珍曰續隨子

莖葉相似王療亦相似長于
利水用之得法皆要藥也



甘平治寒疝喉痺癰腫瘡癩婦人血氣煩悶血運崩

帶利大小腸久服令人瀉護生菜似淫而長厚結

角子如麻大赤色有稜炒用治疝用醋拌根葉同功

辛甘有毒性善收亦善走能開通諸竅經絡治偏風

不遂喎邪搗餅右貼右左貼左即止口噤鼻窒耳聾搗爛綿裹喉



大青草

實象 射于續隨子 馬蘭子 苎麻子

三十五

有形滯

白頭翁
瀉熱涼血

本草綱目

痺舌服油作飛能利水氣治水瘰浮腫研服當下青黃水能治有形滯

物治針刺入肉搗敷傷處頓看刺出竹木骨硬苳麻子一兩疑水石二

胎不下胎下即去之若子腸挺出者搗膏塗項心即收能追

膿拔毒傳癰惡瘡外用屢奏奇功能拔病氣出外故諸膏多用之然

有毒熱氣味頗近巴豆內服不可輕率去皮黃連水浸每晨用浸水吞

形如牛蟬黃褐有致鹽水煮去皮研或用油忌鐵食食苳麻一生不得

苦堅腎寒涼血八陽明血分治熱毒血痢



瘡寒熱齒痛骨痛腎上齒骨鼻衄禿瘡癩癧疔痕血

痔偏墜搗處明目消疣有風反靜無風則搖近根處有白茸得酒良

王瓜
子郎

瓜根
瀉熱利
水行血

王不留

行

通行血

冬葵子

滑腸和
寒



治畧似栝藹傷寒發斑用王
瓜搗汁和伏龍肝未服甚効



木刺孕婦忌之



苦寒瀉熱利水治天行熱疾黃疸消渴搗汁飲便數帶

下月閉瘀血利大小腸排膿消腫下乳通乳藥多用之單服亦可

墮胎 根如栝藹之小者味如山藥根子通用經疏曰主

甘苦而平其性行而不住能走血分通血脈乃陽明

衝任之藥陽明多氣多血除風去痺止血定痛通經利便下

乳催生俗云穿山甲王不留婦人服之乳長流治金瘡止血癰瘡散出竹

花如鈴鐸實如燈籠子殼五稜取苗子蒸漿水浸用

甘寒淡滑潤燥利竅通營衛滋氣脈行津液利二便

消水腫用榆皮等分煎服通關格下乳滑胎 秋葵復經

本草

王不留行

王瓜

冬葵子

白鮮皮

濕 通祛風

草薺

濕 通祛風 補下

冬至春作子者名冬葵子根葉同功春葵子亦滑不堪入藥蜀葵花赤者治赤帶白者治白帶赤者治血燥白者治氣燥亦治血淋關格皆取其寒潤滑利之功也



鱧鮑桔梗茯苓薺



氣寒善行味苦性燥

八脾胃除濕熱兼入膀胱

小腸行水道通關節利九竅為諸黃風痺之要藥味

白鮮皮湯治產後風時珍曰世醫止施之瘡科淺矣兼治風瘡疥癬女子陰中

腫痛 濕熱乘虛客腎 根黃白而心實取皮用惡桑

根黃白而心實取皮用惡桑

甘苦性平八足陽明厥陰 祛風去濕以固下焦

主肉腐濕厥 補肝虛去風堅筋骨 益精明

腎有二
竅淋症
出于溺
竅濁症
出于精

土茯苓
通祛濕
熱補脾
胃

治風寒濕痺腰痛久冷關節老血膀胱宿水陰痿失溺羸痛遺精疔癩

惡瘡諸病皆陽明濕熱流八下焦草薺能除濁分清古方有草薺分清

方云凡人小便頻數便時痛不可忍者此疾必因大腸秘熱不瀉水液

只就小腸大腸愈加乾竭甚則身熱心躁忌水即重症也此疾本因真

酒色或過食辛熱葷膩之物積有熱毒腐物瘀血乘虛流入小腸故使

時作痛也此便數而痛與淋症瀦而病不同宜用草薺一兩鹽水炒為

末每服二二三錢使水道朝人大腸仍以葱湯
頻洗穀道令氣得通則便數及痛自滅也
有黃白二種黃長鞭音

白虛軟軟者良薑為使畏大黃柴胡前胡忌苦時珍曰草薺莖葉

主治不甚相遠豈一類數種草薺
薺根細長淺白莖葉根作塊亦黃



甘淡而平陽明主藥胃大健脾胃祛風濕脾胃健則
營衛從風濕除則筋骨利利小便止瀉泄治筋骨拘

攣楊梅瘡毒

傷梅瘡古方不載明正德間起于嶺表
其症多屬陽明厥陰而兼及他經蓋

白欵
瀉火散
結



火寄于厥陰肌肉属于陽明故也醫經輕粉切劑其性燥烈大陽明誤
去痰涎從口齒出瘡即乾愈然毒氣竄入經絡筋骨血液枯槁筋失所
養變為拘攣癩漏竟致癩痢土茯苓能制輕粉之毒去陽明濕熱用一
兩為君改仁金銀花防風木通木瓜白鮮皮各五分皂角子四分氣虛
加人參七分血虛加當歸麩瘡腫濕鬱而為熱營衛不和則生瘡腫經
歸七分名搜風解毒傷瘰癧瘡腫云濕氣害人皮肉筋脈是也土茯苓
淡能滌甘能補患膿
疥者煎湯代茶甚妙
大如鴨子連綴而生俗名冷飯團有赤白二種
白者良可煮食亦可生啖忌茶

苦能泄辛能散甘能緩寒能除熱殺火毒散結氣生

肌止痛治癰疽瘡腫而上疔瘡金瘡搗損者同丹皮

或半夏為
未酒服
欵瘡方多用之
故名每與
白及相須
搽凍耳
未油調

蔓赤枝有五葉根如卵而長三五枚同葉皮烏肉白一種亦欵功用皆

同 煎奠一日能溫瘧而
痢腸風痔瘡亦白帶下

預知子
補勞瀉
熱

旱蓮草

一名鯉

腸又名

金陵草

補腎

劉寄奴

草

瀉破

止血



苦寒補五勞七傷治瘧氣塊天行溫疾蛇虫咬毒

殺虫療蠱綴衣領中凡遇蠱毒則聞其聲而預知之故耳利便催生勝生

子如皂莢褐色光潤出蜀中云亦難得

甘鹹汁黑補腎止血黑髮烏鬚言千金云當及時多收其効甚速經疏云性

涼不益脾胃故千金方金陵煎丸用薑汁和劑苗如旋覆實似蓮房斷之

有汁須臾而黑熬膏良

甘溫破血通經除癥下脹止金瘡血多服令人吐利

一莖直上葉尖長糙澁花白莖黃如小菊花有白

絮如苦蕒絮子細長亦似苦蕒子莖葉花子皆可用

劉裕小字寄奴微時曾射一蛇明目見童子林中搗藥問之答曰吾王為劉寄奴所傷合藥敷之裕曰工何不殺之童曰寄奴王者不可殺也

本草青芝草



白歛預知子旱蓮草劉寄奴草

叱之不見乃收葉回
每遇金瘡傳之立愈

馬鞭草
瀉破血
熱脹殺

穀精草
輕明目

青箱子
一名草
决明



精煮熟食之
或作九茶下

味苦微寒破血通經殺虫消脹治氣血癥瘕癰瘡陰

腫搗壻 壻壻甚多方莖葉似益母對生夏秋開細紫

花穗如車前草類蓬蒿而細根白而小用苗葉

辛溫輕浮上行陽明胃兼入厥陰肝明目退翳之功

在菊花之上亦治喉痺齒痛陽明風熱 收穀後荒

田中生葉似嫩秧花如目星小兒省者搗羊用一具不洗竹刀割開八穀

味苦微寒入厥陰肝祛風熱鎮肝明目治青盲障翳

虫疥惡瘡瞳子散大者忌服能動陽火 類雞冠而穗尖

决明子



目 瀉肝明

麥實

宜温中

馬勃

輕解熱 外用傳 瘡



甘苦鹹平入肝經味風熱治一切目疾故有决名之

名又曰菴菁精曠子神光屬腎日華日明狀如馬

蹄俗呼馬蹄决明搗碎煎蘇大麻仁

辛温平明目耐風寒下小氣時珍曰古人種麥爲蔬收子入藥今惟酒

麵用其汗耳以香有麥青麥紫麥赤麥水

麥青麥紫麥赤麥水

辛平輕膚清肺角藥母飲中用之散血止嗽治喉痺

烟痛吹喉中良或加白蜜鼻衄失音外用傳諸瘡良

生濕地朽木上狀如肺肝紫苞虛軟彈之粉出取

烏龍草殼精草青種子决明子菴菁馬勃木微草

粉用

木鱉子

瀉丸外時治瘡



苦澀微甘有小毒利大腸瀉痢疔積癩癧瘡疥乳

癰腫消腫通毒生肌除黥音皀諸入外科核扁

如蜜綠色搽去油者能癩

